



PETRI ANDREÆ
MATTHIOLI
MEDICI CÆSAREI
ET FERDINANDI

Archiducis Austriae,

O P E R A

quæ extant omnia:

HOC EST,

*Commentarij in VI. libros Pedacij Dioscoridis
Anazarbei de Medica materia:*

Adiectis in margine variis Græci textus lectionibus, ex anti-
quissimis Codicibus desumptis, qui Dioscoridis de-
prauatam lectionem restitunt:

Nunc à

CASPARO BAVHINO D. BOTANICO
ET ANATOMICO BASILIENSI ORDINARIO,

Post diuersarum editionum collationem infinitis locis aucti:

SYNONYMIIS QVOQVE PLANTARVM ET NOTIS ILLUSTRATI:

*ADIECTIS PLANTARVM ICONIBVS, SVpra
priors editiones plus quam trecentis (quarum quamplurima nunc
primum describuntur) ad viuum delineatis.*

*DE RATIONE DISTILLANDI AQVAS EX OMNIBVS
plantis: Et quomodo genuini odores in ipsis Aquis conseruari possint.*

ITEM

APOLOGIA IN AMATVM LVSITANVM, CVM
Censura in eiusdem Enarrationes.

EPISTOLARVM MEDICINALIUM LIBRI QVINQVE.

DIALOGVS DE MORBO GALLICO.

CVM LOCYPLETISSIMIS INDICIIS, TVM AD REM
Herbariam, tum Medicamentariam pertinentibus.

Cum Gratia & Privilegio Caf. Maieft. speciali ad decennium.

BASIL. M. DC. XCVIII. LXXIV.



ILLVSTRIS. ET CLEMENTIS.
PRINCIPI HEROI
D. D.

FRIDERICO D. G.
DVCI

WIRTEMBERG. & TECCEN.
COMITI

MONTISBELIGARD. &c.

ORDD. REGG.

FRANCOR. ET ANGLOR.

EQVITI TORQVATO

IYSTO FORTISS. PRVDENTISS.

DOMINO SVO CLRMENTISS.

FID. OBS. ET SVMMIS. GRAT. ERGO

D. D.

CASPARVS BAVHINVS. D.

Memo-

EPISTOLA DEDICATORIA.



MEMORABILE est Illustrissime ac Clementiss. Dux^s Regum illud sapientissimi Salomonis exemplum, quod is inter tot tantaq; imperij sui negotia, omnium Plantarum, quo DEI OPT. MAX. sapientiam admirandam predicaret, à Cedro inquam Libani usque ad Hyssosium murorum, Historiam texere voluerit: quæ (heu optata) non sine magno mortaliū damno interiit. Cuius tam illustre exemplum Ethnicorum Reges plures & conati & idem imitati sunt. Et, ut ex multis aliquos referam: en eximios Reges, Gentium quidem Illyrorum, à quo Gentiana: Lysimachum Macedonia, à quo Lysimachia: Telephum Mysea, à quo Telephium: deniq; Mithridatem Ponti, à quo Mithridatica nomen sibi reservat perpetuum. Quid? quod monumenta tradunt, Euacem Arabum Regem primum herbas pinxisse, ac eiusmodi depictum librum Neroni Casari honoris gratia misisse? Recte, equidem. Existimarunt etenim, licet clari & armis & consilio forent, illustriores futuros se, & nominis claritatem auctam iri, si de plantis vel scriberent, vel aliquas à se inventas denominarent. Quin eadem ratione quoq; nomen suum non modo perpetuò hominum memoriis inhaerurum, verū etiam dum plantis repullulantibus, & reuiuiscen-
tibus quotannis quasi reuicturū, haud temere iudicarunt. Sanè, hoc nostro seculo neutiquā desunt HEROES vere magnanimi, qui nullis sumptibus parcentes, Hortos plantarum exoticarū feracissimos colunt: inter quos ILLUSTRISS. DVX inter primos merito collocandus: Ecquis enim quaeso Principum hoc seculo, duos hortos simplicibus exoticis refertissimos, si qui alij hodie sunt, vel fuerint olim, præter I. C. T. excoli curat: alter Sturgardia, multis miraculo: Montisbelgardi alter exoticarum fertilitate notissimus, quem Iohannes Bauhinus, Celsitudinis Tuae Archiater, optimus frater meus, magna cura, indefessis laboribus, ex I. C. T. mandato, indies auget & illustrat. His equidem, & maioribus etiam motus ego, (posteaquam de simplicibus aliquid nunc ab annis aliquot meditari cepissem, & quaedam publici iuris fecissem) labores hosce & qualescunque notas, adiectasq; Cicones plantarum CCC. inter quas plures nuper inuentarū stirpium, plurimasq; descriptiones, quod in Matthiolo me præstitisse fateor, dicare volui: sed & iure etiā debui. Tantum enim est I. C. T. erga plantas harumq; cultores & studiosos, studium atq; patrocinium, ut nullum alium hodie videam, cui Botanica mea studia potius voueam. Accedit quod ante sesquiannum ab I. C. T. in Medicorum numerum fuerim cooptatus. Pro quo tantoq; tanti Herois fauore, quid deberem, agnoui dudum, sed hætenus occasio defuit: nunc conatus sum, quod conatum I. C. T. videt. Efficiat modo ut qualescunque hoc chartaceum munusculum: verius animi obsequentis & fidei debita signum, aliquam apud C. T. mereatur gratiam. Quod ILLUSTRISS. DVX, te, prout es ingenio, virtutum, disciplinarum, scientiarumque omnium capacissimo, facturum planè confido: quod etiam submisisse obtestor. Quod unum superest, DEVM VNVM ET TRINVM precor, ut CELSITVD. TVAM, ad Christianæ Reipublicæ bonum incolumem diu conseruet, clementer protegat, atque regat. Basilea XVI. KAL. VII BR. ANNO CIO. ID. IIC.

T. CELSITVDINIS

Humilis & obseruan.

Casparus Bauhinus D.

INVICTISSIMO POTENTISSIMOQUE ROMANORVM IMPERATORI

semper Augusto, MAXIMILIANO secundo, &c.

SERENISSIMIS, ET ILLUSTRISSIMIS SACRI ROMANI IMPERII ELECTORIBVS, &c.

FERDINANDO, ET CAROLO, AVSTRIÆ ARCHIDVCIBVS, &c.

AC CÆTERIS VNIVERSE GERMANIÆ PRINCIPIBVS,

DOMINIS MEIS CLEMENTISSIMIS.



ERBARIAM MEDICINAM (vt ab ea primum sermonem exordiar) Inuictissime Imperator, ac Serenissimi Principes, antiquis temporibus à Chirone illo magni nominis Centauro, Saturni ex Phyllira filio, primum repertam esse testantur, cum Plinius, tum plerique historiarum antiquarum autores. Alii vero ab Apolline inuentam volunt, alii ab Aesculapio eius filie, tantæ facultatis excellentiam à nemine excogitari, inuenitque posse putantes, præterquam à Diis immortalibus. Non enim fieri posse censent, vt homo ipse abditas stirpium naturas, facultatesq; inuestigare, ac perspe-

*Herbaria
Medicina
origo diuina.*

ctus Namque (vt Plinius inquit) si quis id ab homine excogitari posse credat, ingrata Deorum numen intelligit. Atqui non desunt probatissimi autores, qui reiectis Poetarum figmentis, & aliorum, fabulose suis in historiis de Herbariæ Medicinæ inuentoribus scribentium, certo credunt, allatis cum antorum testimoniis, tum efficacissimis rationibus, omnium creatorem Deum, Optimum, Maximum, plantarum, & cæterarum rerum omnium, quas terra procreat, & alit, facultates Adæ, primo humani generis propagatori indicasse, eique illarum cognitionem infudisse, simulatque illi è limo terræ conformato vitæ lumen inspirauit. Quod autem admiranda Medicinæ secreta, quæ non solum in herbis, & arboribus, sed in omnibus rebus, quæ in vniuerso habentur esse, in humani generis vltimè creata fuerint, apertissime testatur in sacris literis moralis, ac vere diuinus ille philosophus Iesus Syrach: quippe qui scribit Medicinam à summo Deo è terra esse creatam, quam vitæ prudens abhorre non debet. Quod vero rerum omnium scientiam in Adam infuderit ab initio Deus, facile quidem coniecere quisque potest ex Mosais monumentis libro primo Geneseos. Etenim cum parentibus primis nostris potestatem dederit ipse Deus, vt dominarentur volucribus Cæli, piscibus maris, cæterisque terræ animantibus: En vobis trado (inquit) omnes herbas, quæ in omni terræ solo frugiferae sunt, omnesque si ueriter sceræ præditas arbores, semenque patientes, quibus ad alimoniam vobis vi liceat, Bestiis autem omnibus terrestribus, cæterisque volucribus, & quæcunque vitali spiritu animata mouentur, his omnem herbarum viriditatem ad sese alendum tribuo. Hinc itaque (inquam) coniecendum est, quod cum Deus tam immensis muneribus hominem ornauerit, haudquamquam prætermisisset illum, quin omnium rerum vires, ac naturam hominem ipsum, vno tantum spiritus diuini afflatu doceret. Nihil enim à quoquam æstimaretur, preciosissimum quantumuis donum, nisi scientiam in quem vltimum sibi esset futurum. Cum autem Dei opera omnia omni profus defectu careant, aliter sane nobis censendum non est, quod certiores sumus ipsum Deum haud vnquam latuisse, humanum genus, tot, tantisque subiici debere rebus, quibus tollendis, ac mulcendis (vt pium decet patrem) nunquam prætermisisset, quin homines auxilia, ac remedia docuisset, quæ plantis inessent, ipsius tantum hominis causa procreatis, vt non desperaret in afflictionibus, quæ in morbis atrocissimis proueniunt. In quibus ingenti solatio afficimur, vbi medicamentorum auxilia præsentia esse videmus. Ab Adamo omnium parente subsequenter voluntatem omnium notitiam habuisse, ac subinde industria adaucta, rem altius, diligentiusque exquirere cepissent, vt hinc primum rei herbariæ plurimum cognitionis ac ornamenti accesserit. Quod cum postea animaduertissent sapientes, nouissentq; maximam huiusce facultatis esse præstantiam, ac vtilitatem, eius voluptate capti, ipsi quoque rei herbariæ, & cæteris, de quibus ars medica tractat inuestigandis, ac cognoscendis, studium impenderunt. Atqui non tantum mira eorum cura fuit, in his, quæ sibi blandiuntur, aut in cibum veniunt, sed culmina quoque montium inuia, & solitudines abditas, omnesque terræ fibras scrutari, inuenere, quid quæque radix polleret, ad quos vsus herbarum folia pertinerent, etiam quadrupedum pabulo intacta, ad salutis vltimum vertentes, quibus quantum illis debeamus, non equidem facile dixerim, cum tanti beneficii præmium, nullo profus thesauro compensari possit. De herbis autem pri-

*Planta ad
vsu homi-
nū condita.*

*Primi her-
barum scri-
ptores.*

Epistola

Plantarum facultatibus composuit, Apollini, Aesculapioque omnia accepta referens. Composuit, & Deocritus volumina de plantis, Perside, Arabia, Aethiopia, & Aegypto prius peragratis. Hoc quoque sequenti sunt alii nobilitate, ac iuuentute huiusce diuinæ facultatis allekti: quinetiam studio iuuantæ posteritatis non dubitarunt se variis vitæ periculis committere, dum multas ignotas, asperasque peragrarent regiones, ut veram, legitimamque medicamentorum cognitionem consequerentur. Inter hos reperio fuisse Hippocratem, Cræteum, Aristotelem, Theophastrum, Dioclem Caristium, Pamphilum, Mantiam, Herophilum, Dioscoridem, Galenum, Plinium, & alios quamplurimos, quorum nomina, ne longior videar, quam par sit, lubens prætereo. Cæterum quod plantarum pericia, aut inuentio, præter eam, quam maximam affert voluptatem, vtilitatem quoque, gloriam, & laudem pariat sempiternam, noverunt non tantum vniuersi orbis sapientes, diligentissimi rerum indagatores, sed summi etiam, ac potentissimi Reges: quippe illorum claritatem, quæ hinc potissimum ortum habuerat admirati, rati in hac antiquissima facultate summum splendorem, singularemque præstantiam esse, tantum otii, ac studii ad eam percipiendam, & illustrandam contulerunt, ut eorum plerique de Plantarum historia, & viribus libros condiderint, nonnulli generosa antidota composuerint, ut ita suæ, & aliorum mortalium vitæ, vtiq; consulerent. Alii, etsi ex rebus consilio, & armis præclare gestis, se illustres reddidissent, cum tamen illustriores effici se posse cernebant, si clarissimam stirpium facultatem ipsi quoque suo essent studio prosequuti, è remotissimis terrarum regionibus raras, nobilesque plantas ingenti sumptu, & labore conquiritas, ad se transferri curarunt, ut certam, ac veram earum historiam describerent. Neque illos certe hoc latuit, quod si hac in re studiose diutius versati, egregiam quicquam inuenissent, aut scriptis tradidissent, suum nomen esset nullis non seculis celebre duraturum: quandoquidem herbarum, quæ singulis annis reuiuiscunt, repullulant, & renouescunt, eos perpetuo in hominum memoriam reuocant, qui illas inuenerunt, vel de ipsarum historia, & viribus aliquid posteritatis memoriæ prodiderunt. Gentianam herbam vbiq; scriptoribus commendatam à Gentio Illyriorum Rege inuentam, & ab eo appellationem mutuatam esse, illi vero claritatem, & immortalitatem tribuisse, plures sunt, qui scribant autores. Similiter Lysimachus Macedoniæ Rex Lysimachiam (ut Plinius est autor) inuenit, & ex se nominavit ob hanc perpetuis laudibus celebris. Scordium item Mithridatem Ponti Regem nominis æterni commendat. Clymenos præterea herba, Clymeno Regi inuentori suo Euphorbium, Iubæ Mauritanorum: Telephium, Telepho Misia Regibus. Echium, & Anchusa Alcibiadi Atheniensium Duci, famam largiuntur æternam. Hinc etiam clarent Attalus Pergami, & Eux Arabum Reges. Siquidem hic de simplicium medicamentorum viribus ad Neronem Imperatorem multa descripsit: ille vero dum plura aduersus venena, & animalium virus eiaculantium ictus conficeret antidota plurimum laboris insumpsit, ut legitimas nancisceretur plantas. His accedunt Archelaus Cappadociæ, Massinissa Numidiæ, & Agamemnon Argiotorum Rex, quorum nomina nulla penitus verustate extingui poterunt ob eam, quam in cognoscendis prode disq; stirpibus, curam, diligentiamque adhibuerunt. Omittam Philometra, Hieronem, & alios nonnullos, magni nominis Reges, ne verbosius, quam oporteat rem prosequi videat, qui vel ipsi ex hoc immortalis gloriam retulerunt, quod rei herbarum studiosi extiterint, in eaq; de posteris præclare sint meriti. Parto tracta temporis migravit hæc facultas etiam nunc ad Romanos, apud quos M. Cato omnium bonarum artium magister, primus, & diu solus hanc facultatem attigit, bonum etiam medicina non omissa. Post eum vnus illustris, nempe C. Valgius eruditione clarus, de re plantaria plura scribere tentauit, imperfecto tamen volumine, diuo Augusto dicato. Sed antea condiderat solus apud Latinos plantarum volumina Pompeius Lenæus, magni Pompei libertus, ex Mithridatis præcipuo edoctus. Næque cum is Rex esset, in reliqua ingenii magnitudine medicæ materiæ peculiariter curiosus, à subiectis hominibus, quæ fuerit magna pars terrarum, singula exquirens, scrinium commentationum harum, & exemplaria, effectusque in arcanis suis reliquit. Pompeius autem omni Regia præda potitus eo deuicto, & superato, transferre ea Latino sermone Lenæum, Grammaticæ artis doctissimum, iussit, vitæque ita profuit, non minus, quam Reipublicæ victoria illa. Hos multo post tempore sequutus Plinius de Naturali historia scribens, pluribus & continuis libris de plantis, & herbis fusius egit, cui ea omnia, quæ ab aliis ante ipsum scripta sunt, accepta referre debemus, cum iam diu perditis eorum scriptis, nihil emolumenti ex iis capere valeamus, præterquam iis tantum, quæ ab eodem Plinio, in sua translata sunt monumenta. Contemplanda quoque fuit ante id tempus plurimas alebat plantas, centesimum ætatis annum excedens, nullum corporis malum expertus, ac ne ætate quidem memoria, aut vigore concussus, nec aliud mirata magis antiquitas reperietur. Fuit etiam inter Latinos, qui huiusce facultatis meminere, Poetæ nonnulli, nempe Virgilius, Ouidius, Macer, siquidem hi plura de plantis notata digna, & nunquam interitura carminibus, recinerunt. Herbarum gloriam Mulieres quoque affectasse, & allecutas esse, ut quæ multum curæ, ac studii earum viribus, inuestigandis impenderint, non modo Poetæ, sed etiam historici tradunt. Etenim ob id Circeam, à qua Circea herba dicta est, Poetæ Solis filiam fuisse fabulantur: Sed hæc re vera, eam demum exquisitam herbarum notitiam adeptam est, ut non temere ob eius mirabilia facta illis seculis, diuina potius, quam humana sit habita. Talis quoque Medea fuit, quæ tantam herbarum notitiam habuit, ut cum compositis ex iis medicamentis pluribus senectutem retardasset, Aesonem Poetæ finxerint ultimo affectu senio, ab hac iuuentuti fuisse restitutum. Helena adhuc, Helenio herbarum, quæ primum (ut quidam volunt) senit, suum nomen imperita est, atque ideo in ea nunc etiam nominatissima viuic. Artemisia vero Mausoli Cariz Regis vxor alioquin præclarissimi nominis mulier, vel ex hoc memorabilis, & immortalis reddita est, quod suum nomen herbarum inditum reliquerit. Illud insuper satis esse potest, ut quemque ad plantarum cognitionem capessendam inuitaret, quod hæc tantum vtilitatis in se habeat, ut & animalia irrationalia, natura ipsa edocta, plurimarum plantarum vires cognoscant easque mortalibus indicant. Quandoquidem Cerui dictamnum herbam, quod vulnerati eius pastu telum venatorum eiecissent, sagittarum vulneribus mederi ostenderant, vbi ferrum vulneri inhaerit. Itæ Ceruæ, Seseli herbarum demonstrarunt. Testudines, cunilæ, mustelæ, ruræ, accipitres, hieracium: columbæ, verbenacam, hirundines, chelidonium, ciconiæ, origanum, & alia denique animalia alias innumeras herbas inuenere. Quocirca si ad prædicta mentem, animusque homines conuerterent, si medicæ materiæ primordia spectarent, utpote cum plangere

Priscorum Regum plantarum inquisitione curam studium.

Romanorum illustrium virorum monumenta.

Plinius laus.

Antonii Castoris in colendis plantis diligentia.

Poeta Latini qui de plantis scripserunt.

Heroica plantarum studia.

Helena.

Artemisia.

Animalia bruta, quæ plantarum inuestigauerunt.

Nuncupatoria.

suis diuinis præditæ virib. statim ab elementis conditis, è terra emerferint, nullum mihi dubiū est, quin omnes faterentur hæc facultatē antiquitate, nobilitate, & diuinitate cæteras antecellere. Neq; ob id solū illi tantum laudis, admirationis, & gloriæ debetur, quod eius cognitio iucunda, ac delectabilis sit, sed etiā quia utilis admodū, & necessaria existit. Ea nanq; sanitatem, qua nihil exoptatius homini esse potest, tuetur, varia, innumeraq; morborū genera fugat, feratū virus euincit, & venenorū lethaliū vim demolitur: quin etiam homines in vita diutius seruat, & sæpe etiam deploratos, quorum scilicet salutis nulla spes reliqua sit, ad vitam renouat. Quod cum recte quidem æstimassent Romanorum Imperatorum nonnulli (vt libro primo de Antidotis testis est Galenus) etsi in Republica administranda, & prouinciis gubernandis, tuerentur, plurimum essent occupati, eos tamen non mediocriter tenuit studium colendæ rei Herbariæ, atque etiam illustrandæ. Quippe, vt genuinas consequerentur plantas, vtque veris aromatis potirentur, in multis ac longisq; regionibus, Herbarios magnis sumptibus alebant, muneribusq; donabant: hac præterea animi inductione, vt inde non minus gloriæ, quam utilitatis referrent, quod ita quoque studerent immortalitatē beneficio demereri. Sane memorabili maiorum suorum exemplo ducebantur, qui non solum exuias Regum quos in bello deuicerant, trophæis dicatas, in triumphis portare, ipsosque Reges victos ante se ducere solebant, sed etiam raras, & peregrinas plantas, & generosa aromata, quibus raræ præclaræque dotes inerant, in iisdem magno cum honore ferebant, nec putabant ii se minorem laudem, & gloriam adeptos ex plantis illis, quas postea per quam diligenter suis in hortis ferebant: idem ex aromatis, quæ inter sua alia præciosa reponabant in suum, & cæterorum commodum, quam ex trophæis, simulachris, & arcub. quæ omnia erigi curabat Senatus, Populusq; Romanus, in perpetuam rerū gestarum memoriam, & eorū gratiam, qui se tali laude dignus exhibuerant. Magno èt honore apud Romanos habiti sunt ii, qui de plantarum historia, & virib. scripserunt, & in hac facultate claruerunt, argumento satis manifesto, quod expugnata Carthagine omnes Bibliothecas, quas inuenerunt, variis Regib. & Principib. donauerint, præter duo & triginta volumina de re herbaria, & agricultura tatum à Magone Pæno scripta, quæ Romanæ attulerunt, & vt in Latinâ linguâ verterentur, mandarunt: tantam nimirum solus iniit gratiam Mago ille rei herbariæ, & agriculturæ peritus. Adeo deniq; fuit attonita ad herbarū facultates antiquitas, vt illorū temporum scriptores affirmarent etiam mirabilia dictū, ita vt Xantus historicus in primo historiarum libro scripserit, occisum Draconis Catulu in herba quadam à parente reuocatum ad vitam, quam Magi Balim nominant; eadem Thilonem, quem Draco occiderat, saluti restitutum. Et Iuba Rex Mauritanie herba quadam in Arabia hominem ad vitam reuocatum esse tradidit. Picum etiam auem ad actum suis cavernis cuneum, quas in arboribus habet, admota quadam herba extrahere tradiderunt, cum Democritus, tum etiam Theophrastus. Quin etiam Aethiopide herba, tactu clausa omnia aperiri, quibusdam admurmurantis cantilenis. Id quod mihi miraculo non est. Memini enim dum superioribus annis Venetiis agerem, me quendam suspendio damnatum vidisse, cui fores omnes patescerent disiectis seris, vna tantum herba admota signaculis quibusdā decantata. Talis fere facultatis alia haud mihi incognita habetur, in Italiæ montibus proueniens, qua ab equis calcata continuo ferrei soluntur calcei. Herophilum clarissimum antiquitatis medicum posteritatis memoriæ tradidisse ferunt historiarum autores, quasdam haberi plantas, quæ calcatae tantum prodesse, quæq; etiam obesse possunt. Obseruatum certe est inflammari vulnera, vlceraq; superuentu eorum qui pedibus iter confecerunt per loca perniciosis plantis scatentia; contra vero sanari morbos, vbi ab itinerantibus vulneratis, salubres calcatae sunt. Nam Hemionitidis contactu spleneticos lanatos scimus: Comitiales suspensa collo Pæoniæ Romanæ radice: Ictericos substrato in calceis, nudis pedibus maiori Chelidonio aut Pastoria burla: Aconitum pardalianches contactis tantū feminei sexus pudendis, paulo post necē afferre certum est. Tam diu quempiam lippitudine haud tentari obseruatum est, quā diu is syluestris Rumicis radicē, secum nitidissime habuerit. Desinet stranguria cruciari, qui Tamaricis lignum ardens sua ipsius extinxerit vrina. Inguinis tumorem haudquaquā iis subcrefcere putant, qui Myrti surculum secum gerat. Varices in cruribus sanari scribunt, vbi hederæ radicibus, Luna Aquarium occupante, erutis circunderetur affectio. Idemq; effici, si ternæ eiudem hederæ baccæ, per murum repentis, affecto cruri adalligentur. Scordii contactu præseruari Cadauera, non solum Michridatis, sed etiam Galeni testantur monumenta. Scythæ, Scythiam herbam circa Bæotiam nascentem adinuenerunt, gustatu quidem prædulcem, cuius magna nimirum commendatio, quod in ore eam habentes, fame sitimq; non sentiant. Idem præstat apud eosdem Hippice dicta, quod equis quoque eundem effectum præbeat: Traditq; his herbis Scythas èt in duodenos dies durare in fame, & siti. Tantæ gloriæ herbæ Vetonice tradidere quidam, vt domus in qua lata sit tuta existimeretur à piaculis omnib. Coriaceia herba, quinetiam Callicia, Pythagoras aquam glaciari tradidit. Minaidis succo in aqua decocto protinus sanari serpentium morsus, si eo foneantur, idem tradidit, & eundem effusum in herba, qui vestigio contigerint, vel eo resperfi fuerint, insanabiles perire monstrifica prorsus natura veneni, præterquam cōtra venena. Ab eodem Pythagora Aproxia herba appellatur, cuius radix nō minus quam Naphtha è longinquo concipiat ignes. Achemenidon plantam colore electri sine folio nasci in Tardytilis Indiæ meminit Democritus, cuius radice in pastillos digesta in dieque ex vino pota, noxii per cruciatus nocte consistantur, omnia, per vanas numinum imaginationes. Adamantida Armeniæ & Cappadociæ alumnam, qua Leonibus admota, resupinati eos illico laxo hiati: nominis causam habere aiunt, quod Adamantis modo cōteri nequeat. Ariamidis herbæ contactu ligna oleo prius peruncta, illico accenduntur, si decerpatur, cum Sol fuerit in Leone. Therionarca in Cappadocia, & Misia nascente, omnes feras torpelcere, quib. fuerit admota, nec nisi Hiensæ vrinæ aspersu recreari, tradidere veteres. Ophiusa in Elephantina Aethiopiæ nasci etiam tradunt, liuidam, & horribili aspectu, qua pota terrore, minasq; serpentū obuersari, ita vt mortem sibi eo metu cōsciscant, qui biberint, ob idq; cogi sacrilegos illā bibere: aduersari tamen ei palmeū vinum, Potamanticum ad Indum fluiū inueniri narrant, qua pota lymphati homines obseruantibus miraculis. Manicum Solanum (vt Dioscorides est autor) varias facere species, imaginesq; nō incundas obuersari, si eius radicis drachma ex vino bibatur. Theangelida in Lybano Syriæ nasci, qua deuorata futura prælagiant homines. In Bactris, & circa Boristhenē planta puenit Gelotopylis dicta, quæ si cū vino, & myrrha, bibatur, varias dicūt obuersari species, ridendiq; sine non fieri, ni potis

Herbarum cognitio vtilis & necessaria.

Cesarum Romanorū in re herbaria studium.

Magi Pæni volumina de plantis conscripserunt.

Quarundā plantarum admirandū & prope stupendi effectus.

Claustrore apertio.

Alii effectum ex solo contactu.

Scythica herba vna magna ad auerigendā famem.

Herba quam Reos sua malefacta consistens cogit.

Epistola

ex palmeo vino pineæ nucis nucleis, pipere, & melle additis. Ascitomenes herba (vt Apollodorus est autor) vino aspersa, folia in se cōtrahit. Oenothera (Crateus autor est) meraco aspersa, omnium animalium feritares domat, collo adalligata, vel iugo suspensa. Parthos ab Antonio fugatos scribit Appianus Alexandrinus, cum fame premerentur, in quandam herbam incidisse, quam qui comederent, nihil aliarum rerum reminiscerentur, aut intelligerent, nisi quod lapides continuò effoderent, quasi quidpiam magni operis facturi, & sic debacchati, bilem de murem euomentes interirent. Rhamni tertij ramus (autore Dioscoride) valuis fenestrisue impositus veneficia omnia depellit. Scilla tota in limine ianuz suspensa, mali medicamenti noxam arceat. Lapathi radices, quinetiam Plantaginis collo adalligata (codem autore) chæradas & strumas sanant. Vermicali in echinatis Diplaci capitulis autumno reperti, collo in folliculo adalligati, aut sinistro brachio appensi, quartana febre affectos incolumitati restituunt. Atractylis herbæ gestatu obrunditur Scorpionum ictus, quousq; icti gestauerint: deposita tamen illico recrudescere dolorem scribit Dioscorides: Quin etiam posteritates memoriæ tradidit, à Scorpione non icti eos, qui polemoniaz herbæ radicem secum tulerit, vel si forte fortuna quispiam ictus fuerit, eum quidem nihil molesti passurum. Nascitur in Iudæa radix Baaras, à loco appellata (vt Flavius Iosephus scribit libro de bello Iudaico) quæ flammam colore imitatur, circa vesperam vero veluti iubar fulgurans: accedentibus autem, eamq; vellere volentibus, facilis res factu non est, nam tamdiu refugit, quousque vrina muliebris, vel menstruus sanguis super eam fundatur: quinetiam tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi forte eam ipsam radicem ferat de manu pendentem: ideo effossæ circumquaq; radici, nec dum extirpatæ canem alligant, qui abeuntem inde dominum sequi volens, eam extirpat, & continuò moritur, tanquã eius vice, à quo tollenda erat: nullus enim posthac accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter vnam vim capi eam operepretium est: Siquidem iis admota, qui cacodæmonibus oppressi sunt, illico libertate fruuntur. Cæterum & mihi quidem radix est, à Francisco Galceolario Veronensi reperta, qua vino per noctem macerata, & epoto subinde vino, linteolo percolato, à quouis quantumcunq; famelico, is quidem edere nequit, nec cibi tantillum degustare, nisi aceti cochlear absorbuerit. Ridendus profecto iocus, sed res ipsa non omnibus committenda. Foditur radix apud occidentales Indos, foliis Sambuci, quæ humanæ coxæ complet crassitudinem, cuius succus epotus lethalis est. Reliqua vero expressa radix in farinam molita, optimum ac nutritioni saluberrimum conficit panem. Illud etiam his addi potest, quod in Circulatorum spectaculis sæpe demirantur homines. In vinum radicis cuiusdam puluerem, cuius gustatu fauces conuelluntur, immiscent, & cui fucum facere volunt, iubent, vt illo in vino intinctum digitum, quasi prægustandi causa sugat, tum illico digitum in vino madidum in os inditum, sibi mordicus, nõ sine dolore, & clamore premit inuitus. Interea perinde atque blanditiis maren: em consulari Circulator, temporum, carpique arterias, alio quopiam oblini in medicamento, deinde nummum in terram proiectum horrat, vt tollat. Ibi ille pronus, primum se se nequit attollere, mox vnguine vi amens factus, concidit, statim que eius more, qui metuit, ne mergator in aqua, natat, ac vociferatur simul se fluctibus obrui. Ergo eum erigit Circulator. Ille quasi vltutus iniuriam, primum maleficium obliquo actoris intuitu exprobrare, mox hominem aggredi videtur. Postremo fugientem Circulatorem persequi, donec absteris tandem illi medicamenti veneno, recipiat animum, ac menti restituatur. Vbi autem ad se rediit, quasi, qui euaserit à mari naufragus, capillum, vestimenta que, veluti vela torquere, exprimere que, brachia tergere, & nates emungere conspicitur. Hæc, fabulæ non sunt. Nam non desunt multorum testimonia, qui viderunt, quique imposturam suspicantes, suis & amicorum suorum famulis (vt hoc anno Pragæ factum est) hæc fieri iusserunt. Herbam commemorat Theophrastus, qua deuorata septuagies coeundi potestas accedat. Quin & in Indiæ Occidentalis prouincia quadam versus Darien, arborem esse Pyri faciem referentem, scribunt Hispani, cuius fructus deuorati (sunt ij butyri sapore) adeo valide eos, qui deuorarunt, in Venetem agunt, vt prope miraculo sit eorum efficacia: Agnoscat illi nomen est. Achemenide herba in hostium aciem coniecta trepidate agmen, & terga dare scribit Plinius. Quinetiam Latice Legatis dari solitam à Persarum regibus, vt quocunq; venissent, rerum omnium copia abundaret. Apud Tartaros plantam inueniri tradunt, cuius fructus Agnum per omnia refert. Obducitur is tenuissimo corio, quo vtuntur incolæ ad capitis tegmina: internam pulsam Cammari carnes referre aiunt, & è vulnere luccum manare sanguini omnino similem; item dulcore esse admirabili: radicemque humo exertam, subrigere ad vmbilicum vsque. Illud miraculi fouet magnitudinem, quamdiu obsidetur herbis, viuere illum, quasi agnum in lato pascuo: euulsis vero illis, paulatim contabescere. Atqui & illud admirationem auget, appetit à Lupis illum, atque vorari. Non ne & id mirum, quod de Ægyptia traditur. Loto? Huius cum flores, tum etiam scapum vesperi sub aquis mergi Ægyptij narrant, vsque ad medias noctes, totumque abire in altum, adeo, vt demissa quidem manu inueniri non possint: vorti deinde paulatimque subrigi, & ad Solis exortum emergere extra aquas, ac flores patefacere, & capitula exerere, vt planè ab aqua abisit alte. Cæterum nec sylvarum quidem, nec saxa, nec antra, horridiorque naturæ facies, medicinis carent, Sacra illa parante rerum omnium, nusquam non remedia disponente homini. Innumere fere sunt in syluis plantæ, ac arbores, à quibus morborum salutem petimus. Sunt & in saxis, & in antris aliæ vtilissimæ: quin etiam in ipso mari plantæ nascuntur salubres, quemadmodum in lacubus, fluminibus, fontibus, ac paludibus, è quibus sua habet medicina auxilia: adeo, vt nullus prorsus extet locus, qui hisce doribus destituatur. Nihil enim quispiam à natura creatum inueniet, quod in medicum usum venire non possit. Quandoquidem ipsa venena non solum sese destruunt inuicem, sed quamplurimis medentur morbis. Aconitum enim, & si (vt prædiximus) adeo perniciosissimum sit, vt contactis tantum feminei sexus genitalibus, necem paulo post afferat, epotum tamen, ictis à Scorpione, præsentaneo fere auxilio eos liberat. Mirum quidem, exitialia ambo cum per se sint hæc duo venena, in homine commoriuntur, vt homo super sit. Idem oculorum medicamentis, leuandi doloris gratia commodissime adificitur. Cicuta præterea pernecans planta, sacros ignes, & vlcera, quæ serpunt, illitu restinguit, oculorum inflammationes mulcet, & alios quidem plures in Medicina habet vsus. Nerium asinos, mulos, equosque, qui deuorauerint, interficit; cæterum è vino potum demorsos à serpentibus sanat. Meconium in perpetuum somnum sumentes ducit; contra vero dolorificos morbos omnes mulcet. Cantharides deuoratz, in necem hominem trahunt, atque iisdem curantur à cane rabido

Baaras ad mirabilis planta.

Fucus parasiticus conueniens.

Circulatorum quorundam socer.

Plata agnum proferens.

Venena venenis quandoque antidota esse possunt.

Nuncupatoria.

tabido demorsis. Vipera reptilium fere perniciosissima, non solum sui ipsius venenum extinguit deuorata, & illita, sed alia etiam venena destruit, & superat. Quid demum plura? nihil non herbarum vi effici posset, si plurimarum vires non ignorarentur. Hæc tamen si quibusdam fide carere videantur, admiratione tamen implent, coguntque confiteri, multum esse, quod vero superfit. Quapropter male audiunt apud doctos, qui talia plantarum miracula rident, cum & rerum euenta prorsus tam æ suffragentur. Non protinus hystoriis fidem derogare consentaneum est, si vel aucupium causæ, quo potiri nequeamus, nos fugiat: Siquidem innumera fere sunt hominibus conspicua, quorum ratio non possit iniri. Multa in intimis naturæ penetralibus delitescunt, quæ nec ratio vlla, nec humanus intellectus comprehendere potest. Voluit enim natura hæc potius admirari homines, quam à quoquam vnquam intelligi. Quare qui scrupulosius in pernestigandis singulorum rationibus versantur, ex omnibus naturæ miracula submouent. Etenim vbi nos ratio deficit, hinc dubitandi manat exordium, hoc est philosophandi. Idcirco philosophiam modo quodam conantur abolere, qui prodigiosis naturæ miraculis fidem non habent. Sed quare non plures noscantur plantarum (inquit Plinius) causa est, quod eas agrestes, literarumque ignari experiantur, vt qui soli inter illas viuant. Multis enim inuentis nomina desunt. Næ scimus sine nomine plantam in angulis segetis defossam, præstare ne qua ales intret. Turpissima causa raritatis, quod & qui sciunt, demonstrare nolunt, tanquam ipsis periturum, quod tradiderunt alii. Ita certe reconduunt, qui pauca alia nouere, inuidentes aliis, & neminem docentes, in scientiæ autoritatem: tantum excogitandis nouis, ac humana iuuanda vita, quorundam mores absunt. Summumque opus ingeniorum diu iam hoc fuit, vt intra vnumquemque recte facta veterum perirent. At nos elaborata, ac iis, nobisque, laboribus ingentissimis parua abscondere atque suppressere cupimus, & fraudare vitam alienis bonis? minime omnium, imo non tantum aliorum inuentis, sed propriis nostris comparatis auxiliis præsentium, & posterorum vitam iuuandam statuimus, completum ætatis nostræ clarissimorum, doctorumque virorum institutum sequuti, in quorum catalogo præcipui sunt, Hermolaus Barbarus, Nicolaus Leonicensis, Ioannes Marardus, Ioannes Ruellius, Marcel-
Clariss. hæc atato viri qui de re herbaria scripsero.
lus Vergilius, Leonardus Fuchsius apud Germanos claræ eruditionis medicus, Antonius Musa Brasauolus, Iacobus Syluius, Aleysius Mundella, & alii, qui cum animaduertissent, Medicam materiam, nullis olim non seculis celebrem, medicorum, qui nos præcellerunt, incuria, segnitieque obsoletam, intentatam & incultam iacere, adeo vt per pauci reperirentur Medici, qui alias fere plantas, quam olera, quorum frequentior est in cibis usus, cognoscerent, humanum genus miserati, strenuam nauarunt operam, vt discussa superioris seculi caligine, Medicam materiam è tenebris eriperent, & suæ præstinæ luci restituerent. Quos equidem eo quo potui maiori studio, atque industria imitatus, cum multis iam annis animaduertissem in vniuersis Italæ pharmacopoliis, cum à Pharmacopœis ipsis, tum maxime à medicis huiusce facultatis gnatis, quam plurimos errores, eosque graues, & deest. nos committi in humanæ vitæ discrimen, ac sæpe in eiusdem perniciem, vt eorum errores tollerentur, habita nostrorum Pharmacopœorum ratione, quorum pauci satis Latine sciunt, Dioscoridem Anazarbeum, & Græcum, & antiquissimum scriptorem, ac in simplicium medicamentorum hystoria, & viribus reddendis facile Principem in Italicam linguam vertendum, & Italicis ite commentariis, vt possem, illustrandum suscepi. In quos vtrique, quantum ingenio, quantum labore, ac cura, quantum denique iudicio consequi potui, contuli, vt legitimas, quas puro plantas proderent, meamque similiter de cæteris simplicibus medicamentis proferrem sententiam. Qua in re coacti fuimus, non modo Pharmacopœorum, & Medicorum superioris ætatis, qui hanc Medicinæ partem neglexisse videntur, errata passim explere, sed recentiorum quoque, qui tamen materiam hanc diligentissime tractarunt, opinioniones sæpenumero refellere. Nec certe mirum, quod viri alioqui doctissimi, & summa laude digni impigerint, lapsique fuerint, vel in tanto rerum discrimine vacillantes, vel interdum humana caligine excurrentes: quod quidem & nobis aliquando accidisse, hoc in opere magno, non dubitamus. Porro Plantarum, & Animalium hystoriam late, quantum res postulare visa est, complexus sum. In viribus autem recensendis, eas cuique plantæ ex Galeno in sine reddidi, eoq; fere semper contentus fui, nisi quando quid ipse præter misit. Præterea, cum plura sint plantarum, aromatum, & aliorum simplicium medicamentorum genera, quæ frequenter in Medicina vsu obrinent, partim à Mauritanis, partim ab aliis, qui per singulas ætates claruerunt inuenta, de quibus nusquam, quod extet, meminerunt Dioscorides, & Galenus, alique veterum Græcorum aut hores, ea omnia nostris commentariis inseruimus, ipsorumque hystoriam, & vires, ea, qua potuimus diligentia descripsimus. Hoc opus, vbi ad vmbilicum perduxissem, vel amicorum hortatu edidi, eo in primis animo, vt aliqua ex parte industria mea hominum vitæ prodessem, deque ea benemeritis existimarer. Assecutus hoc sim, necne, nostrum non est ferre iudicium. Nisi temere fortasse à nobis dictum videretur, me ex eo coniecisse, non ingratum opus Italis, neq; inuile fuisse, quod paucis post annis, tertio, quarto, quinto (ni fallor) fuerit excusum, & venditum. Adderemque non vulgare de eo doctorum virorum iudicium, ex quo etiam cognoui, me non oleum nec operam plante luisse. Id profecto me mouere debebat, vt si quid de exteris quoque gentibus promereri possem, tentarem, ne viderer in hoc Italis solis natus. Sed illud præterea huc accessit, quod ex illis etiam aliquos nostris commentariis, quamuis Italice conscriptis delectatos esse, ex iisque fructum aliquem cepisse intellexerim. Cuius rei illud mihi satis manifesto indicio fuit, quod ex recentioribus tam Germanis, quàm Gallis scriptoribus inuenerim, quibus placuit nostras qualiscunq; sententias interpretari, suisq; scriptis inserere, neq; eas tantum nobis ingenue acceptas referre, sed de nobis etiam (quæ eorum fuit humanitas) admodum honorifice loqui. Quorum erga nos voluntatem vt augerem, & studium omnium externorum, si possem, adiuuare, utq; illis gratiam aliquam rependerem, & cum aliis omnibus initem, nulla mihi commodior ratio visa est, quam vt Italicos nostros commentarios in Latinam linguam transferrem. Hos itaque, vt primum potui Latinos feci, in quibus tamen plurimam mutauimus (quod maxima rei difficultas tulit) pluram auxi, & omnia quodammodo illustraui. Adiecimus in superampliatas plantarum & animalium imagines in minori forma ad naturæ imitationem expressas, non alia, me hercle, ratione, quam vt iis, qui terras peragere non possunt, nec præceptores habent, quasi horatulum exhiberemus, in quo omni tempore, nulla adhibita cultura, viuas fere stirpium effigies spectare possent. Cæterum dum anno à I. S. V. CHRIS T O nato M. D. LVIII iterum recudi eadem commentaria curarem,

Clariss. hæc atato viri qui de re herbaria scripsero.

Commentaria Italice scripta. Medicorum superioris ætatis negligentia.

Methodus obseruata.

Comment. Italice quibus recedita.

Commentaria Latina cum minoribus figuris. Cæterum Latina secunda editio.

curarem,

Epistola

Matthiolus
Germania
& Bohemia
Herbaria
conscriptis.
Cum Latin.
tertia editio.

Autoris la-
bores ac su-
pina in hac
opere cu-
dendo.

Principum
Germania
in Matthio-
lum libera-
litat.

Matthioli
Mecenas.

Ioannis Na-
uilani, &
liberalit.

Optimorum
Virorum co-
mmemoratio.

curarem, multas adhuc adiecimus imagines, quæ partim plantas, partim vero animalia nonnulla refe-
runt, de quibus præterea, quæ à Dioscoride tradita sunt, in hisce commentariis peculiariter disseruimus,
quinetiam vel ipsa commentaria permultis in locis auximus. Atqui nunc cum annis continuis decem
in Aula Serenissimi Principis Ferdinandi Archiducis Austriae &c. viuam, & eius Celsitudinis Medicum
agam, id ocii, quod suffurari licuit, Medicæ materiz adhuc diligentius excolendæ, contulimus. Vbi non so-
lum Germanis, & Bohemis in eorum sermone Herbaria peculiaria scripsimus, & Typis excudenda cura-
uimus, sed hæc eadem commentaria nostra Latina locis plus mille auximus, & imagines omnes in for-
ma longe maiori, diligentiorique artificum studio elaboratas, vna cum illis excudi curauimus, additis
aliquot nouarum, peregrinarumque plantarum centuriis, ad viuum expressis, quæ antea nunquam à me,
neque à quopiam editæ sunt. Ex enim (vt res ipsa fatetur) adeo artificiose (sic hoc citra crimen iactan-
tiæ dictum) diligenterque expressæ sunt, tamque ad amissum delineatæ, vt sine coloribus vllis additis, fa-
cile ab omnibus rei herbariæ studiosis dignosci possint. Atque ita sit, vt vbi hæctenus Matthioli hortulo
vsi sunt rei Plantariæ studiosi, nunc amplissimo eiusdem viridario, cuius intrantibus omnibus patent fo-
res, sese oblectari valeant. Tanta enim nobis semper fuit iuuandæ in vniuersum Reipublicæ promptitu-
do, vt nec sumptibus ingentissimis, quos in pingendis, sculpendisque tot imaginum tabellis contulimus,
neque vigiliis, nec laboribus pepercerimus vnquam. Quæ quidem qualia & quanta attulerint vitæ no-
stræ incommoda, silere potius consilium est, quam multis explicare, ne his enumeratis, captandis potius
legentium animis, quam iuuandæ posteritati, occupatus esse videar, præsertim cum sciam hæc ante hæc
quam plurimos haud latere, qui ea omnia, & viderunt, & intellexerunt: quin etiam multos futuros spe-
ro, qui operis magnitudinem scrutati, recte perpenderit, quantum oneris, quantum laboris, curæque, quan-
tum denique temporis, sedulitatis, & diligentiz, in hoc cudendo plantarum volumine exantlauerim.
Tacebo quoque peregrinationum, & itinerum labores, ad montes, valles, sylvas, colles, prata, maria, lacus,
flumina, paludes, & fontes diuersarum prouinciarum, & regionum, quin etiam ad clarissimarum vrbium
viridaria, ad rudera, collapsas magnorum ædificiorum ruinas, ad speluncas, & longos terræ meatus in sub-
terraneis diuersorum metallorum fodinis, & ad eorum fornaces, vbi cadmia, pompholyx, spodium, flos
æris, argenti spuma, & alia plura metallica medicamenta fiunt. Silebo quoque, quam diu inuadauerim, quam-
que sedulus fuerim in numerosis peregrinis plantis mihi comparandis, ex Asia, Græcia, Syria, Aegypto
Arabia, Num diæque allatis. Id quod facile intelligere poterunt, qui volumen hoc nostrum in Diocori-
dem, diligenter intuebuntur. Nec me certe labores, aut pericula deterruissent à magnis, longisque iti-
neribus, quod Galeni exemplo mare traiecissem, & Cyprum, Cretam, Lemnum, Syriam, Aegyptum, alias-
que regiones peragraissem, vt multa præclara simplicia, quæ hodie desiderantur, essem conuolutus, ad
mortalium cognitionem, & vsum transferenda, nisi meæ animi propensione obstuissent negotia dome-
stica, ægros curandi pietas, & corporis imbecilla satis constitutio, quæ hæc quidem maris, & longæ pete-
grinationis incommoda, ferre non diu permisissent. Itaque hæc in conficiendo volumine si id mihi non
licuit, quod libuit, id saltem, quod potui omni studio, industriaque mea præstare conatus sum. Adeo e-
nim huiusce operis conficiendi cupidus semper fui, vt potius ab ipso etiam principio beneficium hoc in v-
niuersam Rempublicam, & in futuram posteritatem conferre statuerim, quam vt cogitarem, quo pacto
tam magnis sumptibus non succumberem. Atqui succubissem profecto, ni Dei Opt. Max. nutu, me, da-
to cumulatus auro, iuuissem, cum Cesar Ferdinandus, felicitis recordationis, & Cesareæ Maiestatis tua, tum
Celsitudines vestrz: (Cesar inuictissime, & Serenissimi & Illustrissimi Princeps) Siquidem Imperator
ipse Ferdinandus auro, & argento sane non modico, hosce meos iuuat conatus. Quem imitatus Cesareæ
Maiestas tua, & serenissimi Principes Ferdinandus, & Carolus, Austriae Archiduces, suas quoque opes
non exiguas liberaliter contulerunt, adeo vt his potius quam mihi beneficium hoc acceptum referre pos-
sit vniuersa Respublica. His accessit non mediocri liberalitas quorundam Germaniæ Principum, qui ad
hoc volumen consummandum, sua contribuere auxilia: Nam inter Illustrissimos Sac. Rom. Imperii E-
lectores primus, qui suppetias amplissimas tulit, mihi recensendus est Illustrissimus Princeps Augustus,
Saxoniz Dux, qui peculiarem suæ Aulae Veredarium, et plurimo instructum, ad me misit: cuius libera-
litatem, & erga me munificentiam, nunquam satis collaudare possum. Quem postea secutus Illustrissi-
mus Fridericus, Comes Palatinus Rheni, & Illustrissimus Ioachimus Marchio Brandeburgensis, sua etiam
contulere auxilia. Id quod inter ceteros Germaniæ Principes fecere Illustrissimus, & Reuerendissimus,
Cardinalis, & Princeps Tridentinus, Christophorus Madruis, & Illustrissimus, & Reuerendissimus
Ioannes Iacobus Archiepiscopus, & Princeps Saltzpurgenis: quinetiam Illustrissimi, Albertus Dux Ba-
uariz, Gulielmus Dux Cleuenfis, & Ioannes Albertus Dux Megapolensis, & Vandalorum Princeps: at-
que Magnificentissima Norimbergensis Respublica. Quorum omnium liberalitatem non solum mihi sed
omnibus celebrandam, ac diuulgandam censeo. Lætor autem plurimum, quod Mecenas habuerim Impe-
ratores, Reges, Sac. Roman. Imperii Electores, Archiduces, Cardinales, Episcopos, Duces, ac Princi-
pes, quod hoc longe plus splendoris nostris conatibus addat, quam cetera de quibus diximus. Sed quid
nunc commemorem de clarissimo viro Ioanne Nauio, Illustrissimi Electoris Ducis Saxoniz Medico
quibus ego illum præconiis efferam? innumeris, si tantum possem, quod is non solum Principem suum
hortatus sit, vt tam copiosas mihi mitteret suppetias, sed quod ex propria sua pecunia (quæ ingens fuit
eius in me liberalitas, & in rei herbariæ studiosos pietas) aliquot obsignati argenti pondo, sua spon-
te ad constandum hoc opus contribuerit. O virum multiplici calamo celebrandum cum ob pietatem,
humanitatemque, quibus totus redundat, tum quoque ob in signem doctrinam, & Medicæ facultatis
scientiam, in quibus adeo præcellit, vt è longinquis regionibus, spe recuperandæ tuendæque sanitatis,
plurimi ad eum confluant homines, adeo vt à Cesare Ferdinando ad se curandum, quoque vocatus fue-
rit. Non defuerunt etiam alii, qui hisce nostris conatibus magnam opem tulerunt, & non solum his
postremis, sed aliis antea editis, quorum alii plantarum missione, alii consilio, alii rerum inuentarum
communicatione, mihi multum profuerunt. Inter quos potissimum non grauarer hoc loco commemo-
rare, si possem illis ex beneficii accepti commemoratione aliquam referre gratiam, Lucam Ghinum Fo-
rocorne-

Nuncupatoria.

rocorneliensem, Medicum ingenii, & doctrinae singularis, qui Pisis magna cum omnium laude Medicam materiam multis iam annis professus est: nec non Doctissimum Vlysem Aldrouandum Bononiensem, honestissimi generis, probatę doctrinae, & magnę expectationis cum Philosophum, tum etiam Medicum. Quibus eo magis me deuinctum esse intelligo, quod ii pro sua rãrum humanitate ac liberalitate, me quem non nouerunt, nec viderunt vnquam, amore & officio semper sint profecuti. Non defuerunt etiam amicitia, & affinitate nobis coniuncti, quorum studio, ac diligentia, mihi licuit hoc tempore non aliter peragranti, ex diuersis locis plures consequi plantas, earumque picturas edere, sed praesertim in hoc pro nobis assiduam nauauit operam Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus Medicus spectatae eruditionis, qui me in patris loco semper habuit, & qui ob suam praecelaram eruditionem à Serenissima Imperatrice Maria Caesaris Maximiliani coniuge, in sui, & Aulæ suæ commodum in Medicum honorifice ascitus est. Sane is rum Patavio, tũ Venetiis, complures stirpes non vulgares ad nos perferri curauit. Est praeterea summa probitate, & vitæ integritate vir, Franciscus Parthinus Roboreranus, cuius egregiæ doctrinae & in re Medica singularis experientia, tanta est apud multos huius ætatis Principes opinio, vt eorum nonnulli, praecipue vero Cardinales, Tridentinus, & Augustanus, cuius aliquot annis Medicum egit: magnæ sibi laudi duxerint, quod talem hunc virum amplissimis muneribus, variisque ornamentis decorauerint. Quo postea factum est, vt nunc in Iouctissimi, Potentissimique Romanorum Imperatoris Maximiliani secundi, Medicum merito euectus fuerit. Est etiam Hieronymus Donzellinus Brixianus, vtraque lingua, eruditione, & iudicio summo clarissimus Medicus, qui quidem modis quam plurimis labores hosce nostros adiuuantes, maximo nobis fuerunt ornamento. Cæterum postremis hisce nostris conatibus auxilii plurimum contulit vir Clarissimus Augerius de Busbecke Flandrus, qui Constantinopoli pro Cesare Ferdinando apud Turcarum Imperatorem, Oratorem egit, quippe qui non solum is multas peregrinas rarisque plantas, mihi transmisit, sed vetustissima Dioscoridis exemplaria, mei tantum causa, secum tulit: quorum auxilio splendoris plurimum toti operi accessit, vt latius, in sequenti præfatione ad lectorem dicemus. Quinetiam operam maximam præstitit, & assiduam, multis annis nauauit operam Clarissimus, Doctissimusque Iacobus Antonius Cortusius Patavinus, à quo (quæ sua fuit liberalitas, & beneficentia) complura ad me missa sunt plantarum genera, ipsaque rara, peregrina, & paucis admodum nota. Hunc secutus est Doctissimus Medicus Bernardinus Teruisanus, qui in Academia Patavina, Materiam Medicam magna cum laude proficetur. Namque is tum plantarum missione, tum etiam consilio non parum nos iuuuit. Nec minus mihi celebrandus est vir optimus, & rei plantariae indagator acerrimus Franciscus Galceolatus pharmacopœus Veronensis vna cum eius filio Angelo, qui ne dum in rei herbariae scientia patrem æquat, sed fere superat. Quinetiam nec Cecchinus Martinellus Rauennas, quod hic Damasco Syriae, ille vero Verona, non paucas ad me raras miserint plantas, quæ nusquam antea à me vitæ sunt, sicuti nec à quoquam, qui ante nos hoc tempore de Medica materia scripserit. Adiuuit nos quoque mirum in modum Georgius Liberalis homo artis pingendi peritissimus, & post ipsum Volfgangus Meiserpeck Misnensis, qui dum assidue plantarum, & animalium imagines delinearent, nulli quidem labori, ac diligentia pepercerunt. Potuissem equidem hæc omnia facile dissimulare, & mihi soli laudem vniuersam vendicare, sed absit omnis inanis gloriae cupiditas. Etenim benignum est (vt scite Plinius in epistola ad Vespasianum inquit) & plenum ingenui pudoris, fateri per quos proficimus. Cæterum quandoquidem Dioscorides non modo quinque libris tradidit vniuersam Medicam materiam, quæ plantis, animalibus, & metallicis comprehenditur, sed his etiam sextum attexit, in quo ad humani generis vsu de antidotis disseruit, quibus venena omnia arcentur, ac omnium venenolorum animalium morsus ictusue curantur, ideo nos ipsum secuti, in hunc quoque commentarios scripsimus, in quo plura rogesimus, quæ vitæ hominum profutura speramus. Nam praeterquam quod improborum veneficorum insidiis pateant cum vniuersum genus humanum, tum maxime Reges, ac Principes, non desunt etiam quamplurima animalium genera, quæ morsu, vel ictu homines ex tempore interimunt. Quippe Scorpiones, Stelliones, Phalangia, nostris in domibus viuunt, oberrant quoque, quæ animalia cum nullam habeant personarum, aut locorum rationem, vbique sese recipiunt, & latebras, nidosque parant, quo fit vt interdum à domesticis inscientibus molestata ictu venenum inferant, & ictos in perniciem agant. Latent praeterea modo in hortis, ac vicidariis, modo in vineis, & pratis, aliisque in locis inter flores, & herbas, aspides, & viperæ, & alla venenosa reptilia, quæ vel si tantillum quidem pede premantur, aut excitentur, illico exitiosum vulnus infligunt: ex quo statim vel paulo post icti commoriuntur, nisi eis quam primum antidotis succurratur. Est & Canis, qui etsi homini familiaris sit, tamen cum in rabiem agitur, quos momorderit, in horrendum mortis genus plerumque deducit. Quæ cum diligenter examinasset, recteque expendissent veterum sapientum complures, quorum superius meminimus, plantarum, aromatam, & aliorum quorumcunque simplicium medicamentorum vires altius perscrutati, varia aduersus venena & virulentorum animalium morsus antidota composuerunt. Quorum vestigia secutus Mithridates magnus ille Ponti, & diuersarum gentium Rex, cuius etiam ante mentionem fecimus, cum non magnam satis sibi gloriam ex eo comparasse iudicasset, quod mortalium solus (vt testis est Plinius) duabus & viginti linguis loqueretur, adeo, vt de subiectis gentibus, nullum hominem per interpretem commpellaret, nec quod plurimis potitus esset victoriis, ad maiorem adhuc, immortalemque suam gloriam, Medicinæ peculiariter curiosus fuit, & rei herbariae percipiendæ, maximum studium impendit. Quorum vtrunque plane assecutus videtur: nam ex herbarum cognitione antidoti genera inuenit, ex quibus vnum composuit, quod nomen etiam eius ad nostra vsque tempora retinet, & suum autorem famæ immortalitati consecrat. Huius antidoti vsu adeo corpus suum Rex ille firmauerat, tutumque à venenis reddiderat, vt cum ipse vitam finire mallet, quam Romanorum seruitutem pati, id sæpius fertur frustra veneno tentasse. Mithridatem imitatus est Andromachus, doctissimus pariter & elegantissimus Neronis Imperatoris Medicus. Is siquidem Theriaces compositionem adiuuenit, quæ Galeni testimonio à venenis seruauit non solum plurimos Romanorum Imperatores, ac Principes, sed & alios quosque, qui eam opportune sumpserunt. Qua propter Galeni tempore ab ipso magnifice, ac splendide, ita iubentibus Imperatoribus, hæc parabatur Antidotus. Præteribo Attalum Peigami Regem, de quo etiam nobis antea dictum est, quem

Epistola

*Nostrum
potius Anti-
dota anti-
quorum anti-
dota dete-
riora sunt.*

quem quoniam idem studium tenuit antidota conficiendi, ideo is ab ipso Galeno maximis laudibus cele-
bratur. Veruntamen nostra hęc ætas ex horum antidotorum usu non eum fructum, neque utilitatem capit,
sentitque, quam sensit antiquitas. Nam etsi eorum nomina monumentis tradita habeamus, atque etiam
antidota ipsa in officinis parata reperiantur, nõ eos tamen effectus, viresq; hęc præstant, quas suis nomi-
bus pollicentur, qualque illa præstare veteres memoriæ prodiderunt. Cuius discriminis illud nimirum
in causa est, quod plura à nobis desiderantur generosa & preciosa aromata, quæ legitima, & omnium præ-
stantissima, suis antidotis immiscebant Mithridates, Artalus, Andromachus, Galenus, & alii complures
veterum, quæque ingenti pecunia, summo studio ac labore, ab Arabum, Aethiopum, Troglodytarum, a-
liarumq; diuersarum gentium regionibus, illius florentissimæ ætatis Imperatores Romæ afferri curabant.
Vbi tamen nemini præterquam Cæsareis Medicis (quod fatetur Galenus) licebat verã ac legitimam con-
ficere Theriacem, nisi quis forte potentiorum favore ab Imperatoribus esset iis præclaris donatus aromati-
bus. Id quod maxime facit, ne miremur, si Theriacæ nostri vsus, itemque Antidotus Mithridatica, non pe-
rinde pollent viribus, atq; eorum nomina pollicentur, & veterum scripta testantur. At certe in hoc satis in-
feliciter actum esse constat cum vita hominis, utpote quæ iacturam fecerit maximorum remediõrum ad-
uersus venena, aliq; grauissima incommoda, quibus obnoxia est, ac sæpe affligitur. Quam ob rem hac nõ-
stra ætate, in qua quidem reliqua fere omnia in pristinum candorem reduci, & suæ integritati restitui vi-
dentur, gloriosus, & vere fortunatissimus dici posset summus ille Pontifex, Inuictissimus ille Cæsar, Se-
renissimus ille Rex, Magnanimus ille Princeps, Sapientissimus ille cuiusque Reipublicæ Senatus, qui pro-
priis animidõribus Romanos illos Imperatores, & alios potentissimos Reges imitatus, nullus sineret se vel
sumptibus, vel laboribus grauari, sed omne studium, omnem operam, omnem deniq; suam facultatem ad-
hiberet, ut iam diu deperdita aromata, quæ omnino nobis desunt ad Antidota conficiendã, in lucem reuo-
carentur. Enimvero si horum aliquis id faceret, vel si omnes id facere contenderent, non suæ tantum, & a-
liorum mortalium vitæ consularent, deque posteris præclare mererentur, sed præterea hinc famam asse-
querentur æternam. Siquidem beneficium id posteris summa cum laude propriis autoribus perpetuo
acceptum referrent. Equidem si id mihi non licuit, id saltem quod potui omni studio, industriaque
mea præstare conatus sum. Nam cum viderem nostræ huiusce ætatis homines in iisdem in quibus præcæ,
atque etiam in maioribus vitæ periculis versari, nobis tamen deesse vera illa, ac generosa veterum anti-
dota, ob ea, quæ hodie in hisce desiderantur, legitima, ac præclara simplicia medicamenta, tentare volui,
possent ne ex legitimis, quæ habemus, antidota parari, quæ illorum vicem pensarent. Feci id quidem ma-
gno meo labore, longo quærerem usu, & experientia: sed assecutus sim, necne, quod contenderam, igno-
ro. Illud cotto fieri possem, ea semper mihi visa esse longe felicitus Theriacæ, & Mithridaticæ antidoti
vires præstare, quam quæ passim (paucis exceptis) hac tempestate earundem nomine conficiuntur. Ve-
rum non omisi, quin in hoc, sicut in reliquis aliorum potius esset iudicium, quam meum: quando quidem
eo promerendi animo, quem semper habui, in nostris Commentariis in sextum Dioscoridis librum, non
solum Dioscoridem ipsum, quantum potui illustravi, sed quædam etiam secuta antidota nobis in-
uenta descripsi. Verum non ob hoc velim nonnullos esse, qui putent hoc tempore ab usu cuiusq; Theria-
cæ, Mithridaticæque Antidoti esse abstinendum: siquidem ab his tantum abstinendum intelligo, quæ pas-
sim ubiq; veniunt, & de quarum compositione nullum extra probatissimorum medicorum testimonium,
quarumque ingens habetur quantitas apud Impostores. Etenim scio non deesse in Italia in famosis ciui-
tatibus Pharmacopœos honoris, & humanæ salutis cupidos, qui nullis sumptibus, aut laboribus parcen-
tibus, omnem suam nauant operam, omneque studium impendant, ut legitima omnia simplicia medica-
menta, quibus hęc antidota parari solent, sibi comparent. Inter quos (seruata semper cæterorum phar-
macopœotû fama, ac fide) mihi maxime laudandus venit Franciscus Calceolarius pharmacopœus Veronen-
sis ad aureæ Campanæ signum, quippe qui Theriacam optimam & Mithridaticam parare soleat, astipulan-
tibus Clarissimis medicis omnibus, & præsertim qui primas in ciuitate tenent. Id quod præ cæteris is præ-
stare potest, quod nõ solum Medicæ materiæ sit indagator maximus, sed quod ubiq; terrarû amicos habeat
quisquam antea visum. Sed de his hæcenus satis superque diximus. Cæterum cum veterum studiosorum
morem sequutus, de promotoribus defensoribusque cogitarem, qui labores hosce nostros ab inuidoruth,
vitiligatorumque moribus protegerent, ac tuerentur, quorum item amplitudine, authoritate, gloriæq;
splendore, iidem illustriores, ac clariotes redderentur, prima illico mihi sese obtulit Sac. Cæs. Maiestas
Tua, utpote quæ pro summa, & innata virtute sua, atq; clementia, neminem vnquã iniue depressum nõ
extulerit, aut iniuria affectum non defenderit, nec quempiam nõ iuuerit bonarum artium studiosum, qui
ad eius patrocinium confugerit. Præterea mihi condecens admodum visum est, ut hoc opus Cæs. Maiest.
tuz potissimum consecrarem, non solum quod Romani Imperii Diademate refulgeat, & Vniuersæ Chri-
stianæ Reipublicæ imperet, & præsit, sed quod mihi peculiariter (quæ sua fuit in me Pietas, Benignitas ac
Beneficentia) semper clementissima fuerit: Illud quoque me adduxit, ut Cæs. Maiest. tuæ hoc volumen
dedicarem, quod in ipso ea describatur Materia, cuius studio (ut superius commemoravi) complures o-
lim Imperatores, ac Reges sunt magnopere delectati. Ideoq; eo libentius id faciendum mihi proposui, quod
certior sum Cæs. Maiestatem tuam ex naturalis Philosophiæ lectione plurimum capere voluptatis. Huc
accedit immensa erga studiosos quosque Cæsareæ Maiestatis tuæ benignitas, quæ eos perpetuo promouet,
iuuat, & fouet, eosq; præcipue quos de Republica literaria benemeritos esse agnoscit, præsertimq; Medi-
cos, utpote qui diuinam potius quam humanam excolant facultatem. Id quod apud Hebræos testamini
reliquit sapientissimus ille Iesus Syrach, diuino spiritu afflatus, dum sic inquit: Ab Altissimo orta est Medi-
cina, & à Rege accipiet munera. Medicamenta de terra creauit Dominus, & vir prudens non contemnit
illa. Disciplina Medici exaltabit caput eius, & in conspectu Magnatum collaudabitur. Hęc ille. Potro & il-
lud mirum videri posset, quod Cæs. Maiestas tua, & si in grauissimis negociis, sui que Romani Imperii, ac
Regnorum suorum functionibus, & continuis curis, dies, noctesque versetur, nunquam tamen præter-
mittere solet, quia succisuis quibusdam horis variis scientiarum studiis vacet. Quare non parum mihi spo-
randum

*Antidota
quæ suis effe-
debent &
quæ non.*

*Theriacæ à
Francisco
Calceolario
parata præ-
ceteris lau-
datur.*

*Dedicatio
opini.*

Nuncupatoria.

randum est, lucubrations hanc meas apud Cæs. Maieſt. tuam non minimum authoritatis labituras, tum quod ante hac eius erga me ſingularem clementiã, liberalitatemque longe lateque fluentem, iterum, atq; iterum ſim conſequutus: tum quod omnia quantũvis exigua manuſcula, hilari admodum vultu, ſummaq; humanitate ab omnibus ſuis fidelibus ſuſcipere ſoleat. Cæſarex ergo Maieſtatis tuæ beneficia in me ſunt ampliffima, Sereniſſima Auſtriaca Domus denique tota me ſemper omnibus modis aluit, promouit, & decorauit. Quo fit, vt certa omnino ſpe ductus, mihi perſuadeam de Cæs. Maieſt. tuæ clementia plurimum perpetuo conſidere poſſe. Facit enim tua ſummi generis dignitas, Cæſareorumque ornamentoꝝ amplitudo, vt quotquot ab ea inuari petant, omnes promouendos ſuſcipiat. Cæteravero virtutum decora in Cæſarea Maieſtate tuã ſic vigent & eluceſcunt, vt vniuerſæ gentes eã magnopere admirentur & colant. Quis enim non admiretur Cæſaream Maieſtatem tuam? Quis non prudentiam, magnanimitatem, & ingentem animi ſplendorem? Quis non ſuſpiciat iuſtitiam, pietatem, clementiam, religionem, beneficentiam, & generoſitatem tuam? quæ tanquam ex vberriſſimo fonte è tota Maieſtate tua ſcatpuriunt, emanant, & diffunduntur. Quæ quidem animi Maieſt. tuæ Cæſarex dotes, proculdubio efficiunt (Dei Opt. Max. auxilio) vt ſuperatis, ac debellatis Sac. Rom. Imperii & Regnoꝝ ſuorum inimicis, omnia nobis pacata reſtituat. Poſtremo vt Illuſtriſſ. Sac. Romani Imperii Electoꝝibus, Sereniſſimis Auſtriæ Archiducibus dominis meis clementiſſimis, ac cæteris vniuerſæ Germaniæ Principibus, labores hoſce in eos dicatem, in cauſa fuit, vt omnes ſimul coniuñcti ex hoc intelligant ingentem animi mei erga eos omnes propenſionem, vtq; hac dedicatione, eorum erga me liberalitatem apud omnes gentes teſtatam relinquerem. Quin etiam quod mihi perſuaſum habeam, non minus hæc noſtra latina commentaria, vniuerſis (vt ſpero) profutura, defendenda, promouendaq; ſuſcipiant vna cum Cæſarea Maieſtate tua, quam ab iis antea factum ſit de Herbario Germanico noſtro illis dicato. Idq; præſertim faciendum ad me ſpectaſſe cognoui, quod non minora auxilia in hoc cudendo volumine, quam in illo nobis præſtiterint. Interim me totum Cæſarex Maieſt. tuæ dedico, dono, ac voueo. Cui Deus Opt. Max. felicia omnia concedat. Prægæ, Vltima Ianuarii, MDLXV.

E. Cæs. Maieſt. tuæ, Veſtarumque Ceſtudinum.


Humilis Seruitor

Petrus Andreas Matthiolus.

Petrus

PETRI ANDREAE MATTHIOLI

AD MEDICÆ MATERIÆ STUDIOŒ, P R Æ F A T I O.



IVELLE Meorum morem sequi, qui antequam opus sumus aggrediantur, illud in primis proficiant, nihil sibi maiori cura ac studio esse, quam ut vita, vsuique mortaliis consulant, hoc ipse quoque ingenue facere possem. Nam ea animi propensione ab ipsa iuventute, quantum mihi ocia a medendis agris, & cura familiari impetrare licuit, id totum ad bonorum Autorum libros enolendos, ad simplicium medicamentorum cognitionem assequendam, ac demum ad scribendum contuli. Qua in re, ut certe apud omnes testatum relinquerem, me hac mente animoque elaborasse, ut quantum studio, labore, atque industria, consequi possem, humana vita prodessem; de qua optime meritis existimarer. Dioscoridum

operam meam operam, ac diligentiam adhibui, ut quantum in me esset, illustrior redderetur, atque omnium manibus teneretur. Ad quod ea mihi visa est ratio commodissima, ut ipsam Dioscoridem in nostram italicam linguam transferrem, in eamque commentarios, a nobis italicè scriptos, adicerem: quod tunc nos privatim studium, maiorque cura subiret, Italos iuvandi, quam ceteros. Etenim pauci admodum sunt in Italia Pharma-

Autor Italicæ Cōmentaria primū edidit.

copole, ad quos tamen potissimum hæc de Medica materia tractatio spectat, qui Latinam linguam exacte norunt. Hoc opus, quod summa animi alacritate susceperam, ubi absoluissem, emisit, vel hortantibus amicis, ut quem seculum antea ex multis laboribus mihi proposueram, cum postea mortalitatis percipiendum, ac omnibus aestimandum exhiberem. Verum an is talis fuerit, qualis ut esset, contenderam, malum aliorum esse iudicium, quam meum. Illud certo scio (si tamen id absque vitio nobis testari licet) a multis in Italia, quorum iudicium ceteris antepono, eo animi candore scripta nostra aestimata, ac cōmendata fuisse, quo ipsi illa scripsimus, atque et Italis non inutilia, neque incunda accidisse. Quorum sane exemplo, disquis nostris commentariis iudicio, non potuit non mihi ipsi gratulari, ac omnibus, quibus illos legendos tradidimus. Accessit interea mihi non minor inde cupiditas externos quoque demerendi, eamque cupiditatem illud auxit, quod intellexerim is per gratiam fore, si nostri commentarii Latini fierent. Hæc

Cur Italicæ Cōmentaria in latinam linguam cōuersa fuerint ab Autore.

igitur ratione adductus, ut etiam ab externis gratiam aliquam inire, utque omnibus in uniuersum studio, cura industriaque mea prodessem (quod ego quidem antiquum semper habui, & præcipuum) nostros commentarios ex parno, quod nobis superest, ocio, Launos reddendos, atque illustrandos suscepi. Verum cum tractu temporis au-

Autor cōscripsit herbaria Germanicæ Bohemicae.

mauerterem, me non omnia in uniuersum exteros Latina editione inuisse, cum longe plura habeantur in unaquaque natione Latini sermonis ignari, quam periti, Germanis, & Bohemis, herbis uia peculiaris conscripsi, & in eorum linguis edita in lucem protuli, additis maioribus plantarum imaginibus. Quæ omnia (ut audio) uis haud ingrata fuere. Id quod apud omnes perpetuo testatum relinquet, Matthiolum ad omnes iuvandas nationes esse factum. Hæc expeditis, dum interpretem querebam, qui idem herbarium nostrum Gallicum faceret, allatus est mi-

Matthioli Dioscorides in Gallicam linguam translatus est.

hi Francofurtio Dioscorides meus in Gallicum idioma traductus, quo factum est, ut a suscipiendo hoc labore amicum auerterem, ac interpreti illi me non parum debere cognouerim, quod me eo onere subleuasset. Curassem præterea, ut idem, Hispanico quoque sermone exiret, nisi Andreas a Lucina me prauertisset. Sed fortasse quoque fiet, si uita nostra cursum fortunet præpotens Deus, ut in us quoque linguis ex Matthioli officina hæc exulgentur herbaria. Scripseram antea in hac eadem præfatione, me absoluta Latina commentaria in Dioscoridem, in multorum gratiam in lucem misisse, mihi uero hætenus non satis concocta. Quo fit, ut nunc locis plus mihi aucta, cum pluribus castigata, & maioribus admodum numerosioribus elegantioribusque imaginibus illustrata uobis inspicienda legendaque emiserim: sed quid hucusque præstiterim, uos in quorum gratiam tantum laboris insumpsi, & tam ingentis feci sumptus, de his aequi eritis indices. Neque aliud ab omnibus petiui uelim, quam ut hos nostros Cōmentarios ea animi sinceritate, & æquitate aestimatis, qua suos ab aliis aestimari, & perpendi uellent: uel qua ipsi aggressi sumus illos conscribere. Nam etsi multorum eruditorum sententias resellere ausus sum, atque non pauca fortassis nimis acriter insequi, corrupta scilicet, qua indoctorum pertinacia nunquam satis explodi possunt, id tamen eo consilio feci, ut quantum ingenio proficere, quantum mente elaborare, quantum denique iudicii in re Medica, ex studio, laboribus, ac uigiliis mihi comparare potui, libere in publicum ad mortaliis fructum, & utilitatem præferrem. Sed certe in hoc longius, quam statueram, digressa est oratio nostra: eo enim nescio quomodo irrepit, ut partem aliquam aperirem nostri scribendi instituti. Quod tamen non per se ausum fuisse, nisi eius consilii ratio cum alibi, tum præsertim, erius in Epistola nuncupatoria a nobis latius exposita esset, atque a pluribus opinor, comprobata, quam ut hoc loco paucis attingi debuisset. Quare iam ad id nobis accedendum est, quod in primis Medica materia studiosos admonendos esse putamus, utpote quod non nihil priuatim ad rem presentis operis facere uideatur. Cum enim ab eo tri potissimum comprehendant, Dioscoridis contextus, nostri in eum Cōmentarii, & plantarum imagines, de singulis nobis reddenda ratio est, ut qualem me in uno quoque gesserim, quod confitemur dum sit, non dissimulem. De contextu itaque Diosc. quem ne quaquam prætermittendum censuimus, ob plures pretationem prætulimus, dignamque existimauerim, que præ ceteris in nostris commentariis legatur, citamen duobus aliis uiri summi pariter, & doctissimi Hermolani Barbarus, & Marcellus Vergilius Florentinus, in idem studium gnauiter incubuerint. Pateor ego ingenue, me Ruellii uersionem sequentum esse, sed non propterea aliorum præclaros conatus cōtempnisse unquam: quin potius utriusque studium semper admiratum: quippe quod uterque in eo maximam laudem promeruerit. Illud autem me magis mouit, ut Ruellium admiserim, quod eius conuersio omnibus facta sit uulgatior, ac frequentior in studiosorum manibus uersetur. Adde etiam, quod de communi omnium fere, meo dicorum præsertim, iudicio præferatur. Cui nimirum nobis quoque libuit subscribere. Non tamen illud me certe latuit, Ruellium nimirum forte religiosum fuisse, quippe qui interdum maluerit Dioscoridem deserere, quam Plinium, modo

Operis auctio.

Latini

Auoris excusatio in aliorum carpendis erroribus.

Admonitio ad lectores.

Cur Ruellii uersionem præ ceteris probauerit Autor.

Præfatio.

Latini sermonis nitore captus, modo etiam rei cognitione incertus, Theodorū sequutus, qui in convertendo Theophrasto idem sapissime fecisse videtur. Quare a nobis perspecta, Ruelli quidem interpretationem recepimus, ita tamen, ut nonnunquam ausus sim ab eo desciscere, vel vetustissimorum probatissimorumq; exemplarium, & vniuersi Orisbasi fidem secutus, vel certa rei experientia fretus. Eorum autem, qua immutari, nonnulla obelisco adnotata reliquis, nonnulla etiam signum suppressimus, eo in exemplari, quod postremo loco excusum dedimus. Atqui nunc ad hoc munus latius obeundum me summopere inuit Clarissimus Vir Augerius de Busbeke Belga, qui annis continuis septem apud Solsmanum Turcarum Imperatorem, pro Casare Ferdinando Oratorem egit: Siquidem ex duo Dioscoridis exemplaria antiquissima Constantinopoli secum tulit, quorum alterum Antonio Cateuzeno patrisso Constantinopolitano, alterum cuidam Imperatoris Interpreti (Dragomanum Turce vocant) meo tantum iuuandi causa, mutuo acceptos referebat. Quorum exemplarū auxilio non solum permultis in locis Dioscoridis exemplar, quod publice circumsertur, sed etiam Ruelli ipsius versionem castigauimus, ut ex quam plurimis adnotationibus ad marginem dispositis vniquisq; facile intelliget. Vt autem omnibus perspicuum esset, unde illas acceperimus, Cateuzeni, Dragomani, meiq; exemplaris nomen omnib; & singulis annotationib; addidimus. Id quod doctis viris, & rei plantarie studiosis non dubitamus gratissimum futurum. Itaque hinc factum est, ut Ruelli nomen contextui describendum non duxerim, ne videret cum eo, nomine conuenire, re autem sepe ab eo dissentire. Satis enim fore putavi, si hic studiosos certiores facerem, me Reuello Dioscoridis conuersionem acceptam referre: si prater ea rationem reddidissim, cur illi non semper addictus esse voluerim. Quod quia abunde (ut arbitror) prestauimus, iam ad alterum nobis propositum, quod de nostri commentariis eras progrediamur. De quibus profecto mihi satis fuerit tacere, quam pauca dicere, si velle nasutulis, & vitiligatoribus occurrere. Frequens namq; hodie est in diesq; magis pullulat huiusmodi genus hominū, qui nullum in toto vita sua cursu fructum sementis proferunt, alienos tamen ante carpunt, mox lacerant, & pedibus obterunt: Sed ij omnes Sycophanta sunt, temerarij, impudentes: quippe qui tantum bonis & doctis viris subsanandis student. Scimus iam dudum non deesse huiusce atræ farina nonnullos, qui libellis contra nos scriptis, conatus nostros obscurare nituntur, nixi tantum sophismatibus, fucatis mendacijs, iurgijs, & conuicijs. Ego autem cum hos verius Asinos quam homines existimem, in plateis lasciuientes, pedere sinam ad sanguinem usq;. Interim garriant, agant, scribant, & contra me latrent: hi perditissimi nebulones, lacerent, flagellent, vulnerent, & Calumnias, contumelias, omniaq; malorum genere, quibus tantum nituntur, labores nostros oppugnent, & si quid etiam us grauius in mentem venerit, contra nos proferant, non tamen ob id a studijs, & laboribus iuuanda Reipublica, propagandaq; veritatis, me auertent, nec unquam suis venenatis morsibus scripta mea adeo dilacerabunt, labefactabuntq; (ut ipsi sibi persuadent) quin ea contra inuicem eorum malignitatem continuo in medio bonorum, doctorumq; virorum emergant, & auri purissimi modo elucescant. Nam apud bonos, & sanctos viros, vituperari mihi videret, si sceleratissimi atq; perditissimi homines me laudarent. Immo vero si ab isde vituperentur studiosi, & de reipublica bene meriti, maximo id illis esse honori semper existimant, cum huiuscemodi insidiatorum consilia nil aliud moliantur, quam virtutem opprimere, veritatemq; confundere: vitium vero (si tantum possent) extollere, & mendacium ubiq; alere, ut praeter cetera hęc diabolice illusionibus, miraculi aliquid in medio afferre videantur. Graeci calumniatorem appellant δεισιδαιμον, qua voce etiam tam Graeci, quā Latini cacodamonem execrabile illum teterrimumq; humani generis hostem, nūciant, nimirum calumniarum summum architectum, mendaciorum patrem, & discordia magistrum. Ex cuius sc. hola prodeunt atra illa ingenia, inuicem, virulentiam, fucos & mendacia, utpote Tartarę discipulę materiam spirantia. Proinde qui mendacis malunt conuicere, quam pro veritate libere dicere, non ex Deo, sed ex diabolo sunt. Semper enim legitimum aliquam referunt ex parentibus notam. Nostra Commentaria (Dei Opt. Max. munere) ab annis propemodum viginti, magna cum laude, in omnium manibus, non in Europa solum, sed in alijs orbis partibus versantur, adeo ut in Italia magno sibi dedecori esse existiment, qui Matthiolum domi sua non habeant. Atqui horum vitiligatorum fudissima soba, quod omni ex parte pestilentem atram spirant, & Stygio tincta sint veneno, non dubio quin merito igni breui coburenda tradantur; siquidē Salsamentarij balteib; & sarcinib; inuoluendis; olfactu virulentia, ea haud quaquam admittent. Nostri commentarijs, scriptis, conatib; ac studijs (ut Deo Opt. Max. placet) subsidijs, & auxilijs plurimum contulerunt Imperatores, Reges, ac alij complures Serenissimi, & Illustr. Principes, & Heroes, & nostros modis omnib; inuenerunt labores: sed horum cōmentitijs vanitates, qua calumnias captiuiculis, maledictis, atq; etiam blasphemis nituntur, comites, assecles, & promotores tantū habebunt, Blaterones, Vitiligatores, Sophistas, Maledicos, Sycophantas, Suffrones, Nebulones, Inuidos, Detractores, Impostores, Impudētes, Temerarios, Thrasones, Gnatones, & alios, quotquot habentur, huiusce diabolice factionis homines. Ad hac tanta apud doctos & bonos viros (sit etiam hoc citra inuidiā dictum) est auctōritas nostra, tantaq; in uniuersa Republica nobis amicorū est copia, ut certo mihi sperandum sit, hos suis iniquis, ac virulentis scriptis, longe plures inimicos sibi cōparaturos, quam in omni eorum opere dicitur characteres. Sed tantum potest inuidia, atq; malignitas, ut vesanos reddat homines, a quo morbi genere nec Apollinis numen, cuius nomen nonus quidā impudentissimus sibi vendicauit, nec ipsius filius Aesculapius eos liberare queat. Atqui inter cetera, id mihi solatii plurimū affert, quod rabidorum canū (ut Itali dicunt) nusquam ulantur greges. Nā ubi forte fortuna insectantū hominum manus euaserint, postridie sua ipsorum rabie extinguuntur. Porro facis in praesentia horū nebulonum mentio, ut hic quoq; & si prater rei ordinē esse videatur, Ioannem Iacobū cognomine Vucker furem appellare ausim. Si quidem is tabulas medicinales nostras, vigilijs, & studijs non paucis elaboratas, quas Bononia a Balihassare Burger Labacensi sub Matthioli nomine accepit, in librū, cuius se auctorē fecit, congesit, & me laborib; meis exspoliavit. Cum autē res ita habeat sciant optimi quiq; Medici volumē illud, cui Medica Syn-taxeos est titulus vīq; ad partē radorū esse continuatū Matthioli opus, vna cū cōplurib; tabulis de euacuandi ratione, quas impudentissimus ille Plagiarius in Neapoli in transportauit. Cetera vero partim ex Iacobi Sylui libris, partim ex recentiorib; in Academia Patauina professorum scriptis ablatae sunt adeo ut iam vanus ille Medicus, qui se p̄aonispennis ornauerat, cū Aesopi crocitet coruo. Sed nolim Candide Lector, dū hac legis, Matthiolum maledicentiae accusas, orem & bruta animalia vnguib; & dentib; aduersus insidiatores, suos partus tueantur, vitamq; suam amore prolis, quibus suis obsuciant periculis. Non sum ego auctor iniuriarum sed propulsator. Armis vtor (ut leges iniqui) non qua offendere, sed qua defendere possunt. Iustissima causa est, veritatem ab iniuria vindicare, eque iusta, & laudata famam, existimationem, & dignitatem suam tueri, & defendere. Nam & si his affe-

Emendatio
cōtextus ex
diuersis ex-
emplaribus
iisq; vetu-
stissimis.

Contra ob-
tractatores.

Præfatio

Etis forte ardentius sese exerant, id virtus facit, non vitium, honestissimus est Zelus inuehi in alieni stultis, & resu-
re calumnias. Vbi ergo & nos asperius fortasse, quam etas, & animi nostri in ceteris moderatio ferat, calamum in hos
male feratos Aethiops strinxisse videbimur, id nostra defendenda innocentia ascribant lectores queso. Nam ma-
nifestum est eos, quos dixi obrectatores, nulla alia de causa, quam ex mera invidia contra me scribere. At qui ubi
Invidia & Odium in consilio est, ibi cæcum est iudicium. Sed hos nunc missos faciam, nunquam post hac cum illis
verba facturum, ne in eis castigandis temporis iacturam faciam, in Republica detrimentum. Eluxabunt tandem ipsos,
(ut de fungis quibusdam proverbium est apud Hetruscos) suo ipsorum iure. Verum ad candidos, & equos, quibus hæc
scribimus, nostra se conuertat oratio. Neminem velim moneat, lectores optimi, nec id a nobis factum quisquam admiretur,
si nostris hæc commentarius, plura quam mille plantarum, & animalium imagines non appinximus: cum infinitus
fere sit stirpium numerus. Hoc (si veritatem fateri debeam) factum est, non quod deessent adhuc planta, sed ob ma-
gnos ingentesque sumptus, quos diutius tolerare non poteram. His accessit magna negociorum moles, qua studia no-
stra adeo impediunt, ut nullus fere fuerit reliquus lucubrandi locus. Siquidem posteaquam ab Imperatore Ferdina-
do in eius Serenissimi filii Ferdinandi Archiducis Austria Medicum ascitus sum, cum non solum quotidie præter opi-
nionem multa emergant negocia, ut Medicis Aulicis fere quibuscumque plurimum euenire solet, & longa quandoque iti-
nera sese offerant, & bella, quo Medicos suos oporteat sequi Principes, factum sane est, cum hac omnia exequi me oport-
tuerit, ut hæc negotiis impeditus, non potuerim per omnia, & vobis, & mihi satisfacere. Atqui nobis non parum fe-
cisse videmur, si inter tot Aulica, bellorumque, incōmoda, & in tanta negociorum mole, ingravescente admodum etiam
etate, Cōmentarios nostros vobis nunc damus, non solum (ut diximus) plus mille locis auctos, sed trecentis, ac et-
iam pluribus stirpium, & animalium Iconibus additis, quæ in prioribus editionibus non habentur. Selegimus tamen me-
liora ac preciosiora, optimos gemmarios imitati, quippe qui relictis infima plebecula vilioribus Gemmis, Impe-
ratorum, ac regum Coronis ac monilibus ornatis, Carbunculos, Smaragdos, Sapphyros, Adamantes ac splendidi-
simas Margaritas seligunt. Nam & nos pretiosioribus plantis offerendis intenti, quam plurimas nouo hoc in viridario
nostro conseruimus plantas ingenti sumptu & labore ex longinquis regionibus allatas, & a nemine hætenus editas,
& a paucissimis fortasse visui: quæ proculdubio ad sese contemplantas, multorum doctorum, bonorumque viro-
rum oculos allicient. Sed profecto molestissimum mihi accidit, quod non desint qui nostras plantarum imagines cor-
rumpant, mutant, ac destruant. Siquidem Andreas a Lacuna superioribus annis, non solum in suos in Dioscoride Cōmen-
tarios, Hispanico idiomate conscriptos, maiorem nostrorum laborum partem transtulit, sed imagines omnes antea a nobis e-
ditas, artificum negligentia, & illius parsimonia, adeo deformes reddidas, ut nihil natui splendoris, qui in nostris mi-
noribus elucet, in eis conspici possit. Sed magis etiam acerbe accusandus est Coterius Typographus Lugdunensis, quippe qui
caute imagines recudi curauit, & in Dioscoride nostro, in Gallia sermone conuerso, appinxit. Namque is longe ma-
gu lucro addidit, quæ sua gentis iuuanda audis, imagines ipsas, in tam exiguam formam redegit, ut nihil inde
frugis capi possit, cum nec foliorum, nec florum, nec fructuum, nec radicum aperta sit facies, sed omnia confusa,
inmiscata, mutila, & confusurata appareant: Adeo ut me quandoque pœniteat tantum suscepisse laboris, & præ-
sertim cum videam hosce impostores, impune alienos corrumpere, & occupare conatur. Ceterum ut de imagini-
bus quoque seorsim aliquid aliud dicam, equidem alias abhorruim, ab eis excudendis, rotuoneminem unquam
posse ex Iconibus, tam veram, & exactam simplicium medicamentorum peritiam assequi, ut eorum varietatem possit
vna pictura comprehendere. Siquidem non ea est pulcherrima herba facies, quæ adulta, neque adulta, quæ iam senes-
centi. Quod si eiusmodi herbarum mutationes omnes singulis picturis deberent representari, quis dubitet id opus
futurum infiniti laboris, ac immensi sumptus? Verum enimvero cum vidissem tales aliorum conatus ab omnibus præ-
peditum commendari, ac in dies crescere studium vitorum, rerum effigies in publicum edentium, ne solum vi-
deret in diuersam ire sententiam, re ipsa tandem melius perpensa, & aliter comperta, ac aliud docente ipsa expe-
rientia, nolui huic optimo & minime infrugifero deesse studio. Huc accedebat, quod non mediocriter ad hoc me
incitaret Typographi cuiusdam Mantuani vanitas, qui nostris operibus Italianè prius editis, furis quasdam inse-
ruerat imagines, minime a nobis adiunctas, quæ quoduis potius, quæ rem ipsam referret. Gaudēbam id adhuc me su-
perstite, contigisse, ut turpem notam falso mihi iniustam ipse deleterem. Ideo, ut & aliorum conatum adinuare & ma-
litosi huic Calcographi temeritati occurrerem, ipse quoque experiri volui, si quid hac in re præstare possem, non
tantum ut mea in medium proferrem, sed & ut de vobis studiosis, si possem, bene mererer. Sed quæ res hac nobis difficil-
lis fuerit, non est quod pluribus explicem. Omnes enim sciunt, quam difficilime inueniantur homines, qui res ipsas, ut
ut sunt, ad vitium depingant, & qui depictas diligenter insculpant: quorum maior adhuc inopia est. Id quod etiam
facile diiudicabit studiosi, qui in hoc opere nonnullas fortasse effigies affabre satum, nonnullas vero haud satis soler-
ter sculptas offenderit. Sane quod in rom cōmuniem nauare potius, licet illud exiguum esse intelligam, in eo tamen non
commissi, ut meum studium, opera, aut diligentia a nobis desideretur. Quid autem profecerim nescio: vestrum de
omnibus erit iudicium. Sed longe aliter, quam nos, videtur fecisse Cornarius, alioqui in utraque lingua doctissi-
mus, sed qui inter omnes natos forte singularis haberi velit. Is enim in suo Dioscoride, quem nunc primum in La-
tinum vertit, emblematicis quibusdam additis, non solum nullas appinxit imagines, sed eos etiam acriter dānat,
qui eas in suis inseruerint commentariis. Sed an timore potius, vel ratione ductus, id fecerit, vos iudices esse velim,
si quandoque illius boni viri legeritis præfationem, & eius animam diligenter explorabitis. Nam tamen si Galenus dis-
sit, (id quod & nos ante Cornarium scripsimus) plantarum imagines parum conferre ad earum indagandam co-
gnitionem, non tamen ob hoc accusandi sunt, qui plantarum, & animalium Icones in suos conferunt libros. Quippe
quoniam usquam inuenierim damnasse Galenum plantarum imagines, quæ in libros appingi solent, sed eos
qui existimant se rei plantarum peritissimos euadere posse, non solum imaginum inspectione, sed & librorum que-
rumcunque lectione, licet fuerint in summis, grauissimisque autoribus conscripti. Quamobrem non parum mira-
re subit Cornarium alioqui virum apprime doctum, Galeni verba non modo non intellexisse, sed in reprobum quocumque di-
straxisse sensum. Quo sit, ut hinc facile suspicari quis possit, quod cum animaduertens Cornarius omnium postremus
Dioscoridis interpres, nullum sibi reliquum iam esse locum, quo noui aliquid de plantarum imaginibus offerre potue-
rit, id sibi consiliu ascivisse, ut eos admodum detestaretur, qui plantarum picturas in suis libris habent: ratus for-
tasse hoc detestandi genere, non solum laus plurimum sibi comparaturum, sed etiam suum oblecturum infortunium,
suamque (quod eius pace dicam) in plantarum historia imperitiam. Quæ, si alia ratio, cur aliorum dānat indu-
striam? Quasi posteris non sit id licitum, ut & ipsi aliquid suo ingenio, & studio excogitent, quod ab antiquis ante non sit
animad-


Cetera cor-
ruptores, &
raptores i-
maginum,
ex Matthio-
li commen-
tariis.
contra Co-
terium ty-
pographum.

De Imagi-
nibus plan-
tarum.

Cornarii o-
pinio de I-
conibus non
edendis co-
fuita.

ad Lectorem.

*an: ma aduersum. At non damnaſſe Galenum plantarum imagines, nec libros de plantarum historia conſcriptos, ſed homines, qui horum harum ve tantum inspectione poſſe quenquam rei plantaria fieri peritum, crediderunt, ſed ma-
riſto fuerit argumento, quod ipſemet Galenus libro primo de alimentorum facultatibus, poſteritatis memoria
prodiit, cum inquit: Comparatos nobis ſe hoſce libros, ut nobis ſint eorum, que ante didicimus, monumenta, non ut
rudes, & ignari per illam perfectam doctrinam aſſequantur. Quod ſi qui ſint, qui preceptoribus careant, ve: in que iis,
que lucul. nec ac copioſe ſunt ſcripta, diligenter incumbere, magnum inde fructum eos accepturos teſtatur idem Ga-
lenus, preſertim ſi a relegere non grauentur. Quibus palam eſt longe magis deteſtandos eſſe eos, qui clariffimorum
hominum laboribus inuidentes, niſi aliud quam blaterare, ac carpere ſciunt, quam eos, qui Republicam omnimodis
ſemper prodeſſe cupientes, nil aliud agunt, quam ut boni ſemper aliquid, & non in publicum uſum promant. At
quod are imagines, & non libros damnauerit Cornarius, cum non minus ex Galeni ſententia, eorum lectio, quam i-
maginum inspectione, quis ne: tiquam proſi: ere valeat, non ſatis animaduerto. Cur tantum laboris, ſi niſi il profue-
rit in uertendo Dioſcoride, adiectis que que emblematicis, in caſſum ſuſcepit? Hic ne ei erat ſtudium, hunc ne ca-
pi: bat animum, ut in uanum labora: et? Porro nil aliud uobis dandum, dicendumque ſuper eſt. Spero tamen ab iis,
que grati ſunt (ingratos, maleuolos, ac inuidos mihi ſane moror) me gratiam initurum: quando quidem mihi commu-
nis utilitatis cupidiffimo, hoc opus non aggrediendi uoluntas defuerit, ſed perficiendi facultas, quam tamen omni
ſtudio conſequi aſſidue conamur. Bene ualeto, & noſtra boni conſulite.*



PRÆFATIO AD LECTOREM

CASPARI BAVHINI.



VI D opera in hoc volumine præſtiterim, CANDIDE LECTOR, paucis aperiam. Cum Petri Andreæ Matthioli in Dioſcoridem Commentaria, ſæpius Venetiis apud Valgriffos edita, toties fere mutata, maxime poſtrema anni 1583. quæ cum uiltima ab auctore ipſo data editione non conuenit, cum multa non ſolum uerba, ſed lineæ, imo ſententiæ ſint omiſſæ, ut in capite de Malabathro, Cinamomo, Coſto, Iunco odorato, Baſſamo, Aſpalatho, Manna, aliisque uidere eſt: nunquam uero in Germania Latine excuſa, ſerio uero expetita, Typographus prælo eſſet commiſſurus, à clariffimo & excellentiffimo Viro D. Io. Hartmanno Beyero, Reipub. Francofurtianæ Archiatro, ipſius Typographi nomine ſummopere rogatus, ut ſucciffiuis horis in Matthioli lectione, me, qui totus eſſem in uniuerſali historia noua conſcribenda, oblectarem, noſque ubi opus foret, illuſtrarem: ſane laborem hunc in gratiam Medicinæ ſtudioſorum, eorumdemque commodum, denegare nec uolui, nec debui: mihique cordi fuere: Primo ut omnia opera à Matthiolo edita, in unum corpus congeſta, prodirent: cuiusmodi ſunt, Commentaria in Dioſcoridem, que Italice quinq; & Latine toties, quater in Italia, ſemel in Gallia que Germanice bis primo Opera Georgij Handſchij, dein, Opera Clariffimi Ioachimi Camerarij (qui inſignem operam præſtitit, multiſque nouis figuris auxit) prodire: que etiam Bohemice bis, & toties Gallice, ſemel quidem ſtudio Antonij Pinzi fuere excuſa. Compendium ipſius ab auctore primum in Italia, dein Lugduni in 16. Opera Pinzi: tum in Germania, labore D. Camerarij. Apologia & Cenſuræ in Amatum, Commentariis addite aliquoties, tandem in ſecundum Epiftolarum librum reiectæ: Diſputatio aduerſus uiginti problemata Guilandini anno 1562. edita, que in libro tertio Epiftolarum nunc habetur. Epiftolæ medicinales in folio & octauo editæ: Dialogus de lue uenerea, ſeparatim & coniunctim cum aliis eiusdem materie excuſus: & ſimilia. Dein diuerſas Commentariorum editiones contuli, & que in aliquibus deerant, compleui: fuere enim ad manus editiones annorum 1554. 1559. 1561. 1563. quo anno tres diuerſæ editiones prodire. 1565. 1568. 1570. 1571. 1572. 1583. 1586. Bohemicam uero editionem anni præcedentis habere non licuit. Tum, quia in Commentariis non ſollicitus fui circa deſcriptiones, quas tamen Compendio à ſe anno 1571. edito, inſeruit, eas omnes inde in Commentaria ſuis locis inſerui, & quidem iſſdem auctoris uerbis ſetuatis. Quarto cum multarum plantarum ſæpius meminerit, figuris non aſpoſitis, eas adieci, & quidem ex omnibus editionibus tam ab ipſo auctore datis quam ab aliis (maxime D. Camerarij, qui elegantiffimis figuris Matthiolum illuſtriorum reddidit, cuius nomine non parua illi debetur gratia) & quidem numero trecentas, ut ſubſequens docebit Catalogus. Quo uero auctiora eſſent hæc Commentaria, placuit ex meo Theſauro Botanico ſatis magno plantas multas (neutiquam omnes) a nemine ante me proſi: tas deſcri-

Præfatio ad Lectorem.

descriptas, & iconibus viuis expressas adiicere. De quibus omnibus tamen & plurimis aliis, suo tempore & plenius & clarius, cum hunc meum laborem non pauci Viri Clarissimi & Doctissimi hætenus iuverint, & quidem inter cæteros, Iohannes Bauhinus frater meus, eiusque gener Io. Henricus Cherberus: Iacobus Antonius Cortusus Patricius Patavinus: Ferdinandus Imperatus, & Fabius Columna, Neapolitani: Hieronymus Belli ex Creta: Ioachimus Camerarius, Leonhardus Doldius, & Ioan. Neudorffer, Norinbergenses: Paschalis Gallus & Theodorus Collado, Galli: Nicolaus Agerius & Ioan. Rudolphus Saltzmannus, Argentinenfes: Philippus Sprengerus Electoralis Pharmacopœus, & eius filius Sigismundus Stephanus aliique plures: quod vt porro faciant, boni publici causa, rogo: & vt ipsorum exemplo moti idem faciant, Prosperu Alpinum, Botanicum Patavinum: Io. Richerum Professore Mispeliensem: Iacobum Cargillum: Io. Purmannum: Iohan. Bierdumphelium Philosophiæ & Medicinæ Doctores (vt iam polliciti sunt) Iacobum Israel Brunnerum Ratisponensem, aliosq; obsecro & obtestor, omnium debito modo suo & loco & tempore (quemadmodum in nostri Phytopinacis parte prima factitatum) mentionem factururus. Suam etiam operam contulere Ioan. Rudolphus Saltzmannus, Ioan. Purmannus Medicinæ Doctores, vt qui animi causa plurimas plantas deliniauere tam pro hoc, quam pro futuro nostro opere: quos imitantur Io. Fridericus Exius, & Io. Henricus Frclech, Medicinæ studiosi: nec tu mihi prætereundus mi Io. Henrice Ryhinere, qui vt totius artis, ita huius studij studiosissimus es, qui mihi hætenus plurimum (vt scis) auxilio fuisti, & porro eris. Tandem cum nominum varietas apud auctores qui de re herbaria scripserunt, studium hoc obscurum, difficileque reddat, ad finem cuiuslibet capituli post Matthioli Commentaria, Synonymias plantarum ex clâsificis desumptas, subieci: & quidem alio caractere, quo à Matthioli scriptis distinguantur: aspersi nonnunquam notas & correctiones, cum humanum sit errare, vbi opus videbatur: nonnunquam à quorundam immaturis calumniis, vbi veritas requirebat, Matthiolum tueri sum conatus: ita tamen vt in neminem, quod honestum decet, essem iniurius. Quod denique Matthiolum attinet, cuius patrocinium semel suscepi, hoc vnum addam, sua laude dignum esse, cum inter eos qui glaciem in hoc studio fregere, sit referendus & recensendus: is seipsum laudauit suis scriptis maxime Commentariis toties cufis, & porro, apud æquiores laudabit. Hæc est CANDIDE LECTOR instituti ratio, quæ si abs te probata cognouerimus, ad Botanica nostra absoluenda nos accingemus, alteramque Phytopinacis partem absoluemus. Vale, & viue, & faue exptis, eademque moue & promoue.

CATALOGVS FIGVRARVM. HVIC EDITIONI A CASPARO BAVHINO ADDITARVM

LIBRO PRIMO.

C *Hemarris.*
Acorns cum solo.
Galanga maior, minor.
Mentha sparsa.
Mutellina.
Curcuma.
Hirculus.
Nardus montana altera.
Valeriana rubra dicta.
Valeriana peregrina purpurea.
Cubeba.
Beteljen Tembul.
Felcus Officinis.
Cinnamonum Officinis.
Zolocassa.
Xilocassa subnigra.
Cassa Monspeliensis { Indica.
Rosa Hiericonensis { Arida.
Amomum.
Amomum Officinarium { amarum
Cassia { Iridem rediens { Dubis
Arabicum.
Calamum odoratus Libani.
Balsamum ex Alpino.
Xilobalsamum.
Carpobalsamum.
Aspalathus Rhodius.
Santalum { album
{ citrinum
{ rubrum.
Lignum aloes.
Bacca.
Gelsuminum grandiflorum.
Thus & eius folium.
Milium Maris.
Lentiscus Peruvianus.
Juniperus maior.
Muscus terrestris clavatus alter.
Arbor Vita.
Laurus { latifolia.
{ sylvestris.
Alnus hirsuta.
Myrtus maxima latifolia.
Carpini & Vlmi flores.
Canna fistularis.
Papyrus Nilotica.
Arundo maxima.
Tamarix Narbonensis.
Aquifolii Varietas.
Oxyacantha pyrastris folio Diase.
Ligustrum Aegyptiacum ex Alpino.
China.
Smilax aspera.
Phillyrea secunda & tertia.
Rosa sylvestris.
Acacia Aegyptiaca ex Alpino.
Arbor Iuda.
Vitex latifolia.
Salix { latifolia rotunda.
{ humilis repens.
Quercus { latifolia.
{ florens.
Vina Quercina.
Ilex latifolia spinosa.
Tamarinda.
Ralaustia.
Malus fructu oblongo.
Cotonea oblonga.
{ cerea.
Prunus { sylvestris florens.
Nux Vomica.
Nux metel.
Nuci metel congener.
Anicardium.
Morus alba.
Cycomorus seu Ficus Cypria.

Opuntia maxima Chamaefera.
Persea Plum.

LIBRO SECVNDO.

Triticum { Itibericum arista carens,
{ multiplex spica.
Zea dicoccos.
Triticum amyllum.
Fanicum minore panicula.
Linum sylvestre tenuifolium.
Lupinus { sylvestris luteus.
{ curuleo flore angustifolius.
Rapunculus alpinus spicatus.
Lapathum rubens.
Acetosa cretica.
Rapistrum monosperma.
Blitum polyspermon.
Malva rosea flore pleno.
Spinachia semine non spinoso.
Asioplex { angusto centinodia folio.
{ sylvestris lappulas habens.
Kali cochlearium.
Dracica { gongyloides.
{ cauliflora.
{ spinosa.
{ maritima maior.
Soldanella alpina.
Beta Cretica.
Asparagus sylvestris aculeatus.
Plantago rosea.
Nasturtium aquaticum minus.
Cochlearia folio subrotundo.
Sonchus lauis caruleus.
Cichorium spinosum.
Cyanus multiplex.
Lactuca { crispata capitata.
{ folio endivia.
Scandix { Italica.
{ Cretica.
Caucalis echinata admodum.
Eruca carulea.
Ocimum latifolium maculatum.
Tragopogon laciniatum.
Ornithogalum spicatum.
Medica.
Ampeloprasum.
Nasturtium { crispum.
{ hortense latifolium.
{ vulgatum serrato folio
Thlaspi { villosum.
{ saxatile.
Draba lutea.
Erysimum simile.
Macropiper.
Vua piperis.
Piper Indicum triplex.
Caryophylli aromatici.
Gingiber ex Labelo.
Zedoaria longa & rotunda.
Saponaria.
Cyclamenur radice oblonga.
Ophioglossum { ramosum.
{ abortivum.
Asphodelus luteus.
Scilla { Hispanica.
{ maior radice rubra.
Capparis { acuminato folio.
{ leguminosa.
Ranunculus multiformis albus.
Anemone variis.
Pulsatilla lutea rubra aquatica.
Anagallis { aquatica.
{ aquatica folio rotunda.

Hedera terrestris montana.
Chelidonium strengitium.
Aquilegia multiplex.
Caryophyllus Indicus minor fl. simplic.
Myosotis scorpioides.
Telephium purpureum.

LIBRO TERTIO.

Rhaphaniticum { folio Heleni.
{ Verum Officinarium.
Rhabarbari radix.
Gentiana maior purpurea.
Aristolochia longa Vera, pistilochia dicta.
Centaureum spicatum luteum, persulcatum
non persulcatum.
Epina Arabica.
Chamaeleon Monspeliensis.
Anonis non spinosa purpurea lutea.
Carduus stellatus.
Aloe America.
Absinthium { montanum
{ maritimum folio laciniato.
{ seriphium & latifolium
{ gallicum.
Veronica mai sapina.
Hyssopus carulea folio dissecto rubro flore.
Gratiola minor.
Origanum Monspeliacum.
Pulegium angustifolium.
Salvia Cretica.
Mentha crispata Verticillata.
Calamintha magna flore.
Thymus vulgaris tenuiore folio.
Malilothus Italica folliculis rotundis.
Acinus Columna.
Ruta sylvestris tenuifolia.
Panax Asclepium alterum Choremum dictum.
Seseli Massiliense nonnullorum.
Creticum maius, minus.
Sisium.
Consolida regalis peregrina.
Ammi utrius.
Hieracium falcatum.
Apium crispum maximum.
Imperatoria alpina.
Daucus Creticus.
Seua Orientalis.
Colutea scorpioides.
Rosmarinum sylvestre minus.
Nigella Cretica.
Laserpitium Gallicum.
Euphorbium.
Anteuphorbium.
Vitium polycaccon.
Asclepias nigra.
Chamadryi spinosa.
Molucca aspera.
Phalangium ramosum.
Trifolium { acetosum luteum.
{ pratense luteum.
{ peltatum Creticum.
{ spinosum Creticum.
Petasites alba.
Thysilago altera plena flore.
Geranium tuberosum maius myrrhinum
erectum cicuta folio, repens cicuta folio.
Gnaphalium vulgare Americum.
Phyllen testiculatum.
Testiculus quartus & quintus ex magnif
guris ipsius Matthioli.
Satyrion basilicum pratense maculatum.
Horminum Syriacum.
Lunaria minor ramosa.
Chamaelum fatidum seu Cotula sativa
multipliciflora
Bupthalmum alterum. Bellis alpina.
Pachysanmina flore pleno.

Lithospermum { *herundinaceum.*
frutescens angustifolium.
Carumense radice rubra.
Rubia maritima.
Androsammum fatidum.
Chamaepytis Monspeliaca foliis serratis.

LIBRO QUARTO.

Betonica flore albo.
Bistorta minor.
Polygonum { *maritimum latifolium.*
Polonicum cocciferum.
Clematis Daphnoides flore pleno.
Coris carulea maritima.
Symphytum maius tuberosa radice.
Consolida media carulea alpina.
Holostium hirsutum, albicans maius.
Pilosella maior repens, minus hirsuta.
Scabiosa { *Officinaria.*
argentea angustifolia.
Iacea in rava laciniata.
Periclymenum Germanicum.
Satureia montana.
Caryophyllata aquatica.
Epimedium.
Arundo Indica latifolia.
Echium flore albo.
Lycium silyvestris alba multiflora.
Gramen { *Caryophylla arvensis glabra*
simile.
monophyllum.
Sideritis vulgaris hirsuta.
Virga aurea latifolia serrata.
Quinquefolium { *erectum incanum.*
palustre rubra.

Fragaria fructu albo.
Dianthus montana rotundi folia minor.
Fua marina minor.
Ilex coccifera.
Pimpinella minor.
Helichrysum Orientale.
Amaranthus panicula incurva.
Bellis { *lutea maior.*
lutea minor.
Verbena nodiflora.
Hyacinthus Trepeticanus.
Papaver { *polyanthos.*
spinosum.
Hyoscyamus Creticus luteus.
Nicotiana minor latifolia.
Solanum { *tuberosum esculentum.*
spinosum, fructu rotundo
mollis.
Solanum tuberosi radix & fructus.
Aconitum Sinifolium.
Thora minor.
Antorradices varia.
Taxus glandifera.
Dioscorea primum.
Hermodactylus Officinarius radice.
Alfina altissima.
Lenis palustris tertia.
Eneborum.
Millefolium aquaticum pennatum, spicatum.
Millefolium aquat. cornutum.
Myagrum { *salsum.*
Monospermum.
Onagra.
Aster Atticus caruleus alpinus.
Aster luteo flore.
Hypophyllum alpinum sericeum.

Viola Martia multiplici flore.
Cacalia.
Turpetum Officinarium.
Adiantum Syriacum.
Astragalus alpinus.
Sesamoides parvum flore magis completo.
Spartium Hispanicum.
Genista angulosa.
Glans Sanguentaria.
Myrobalaus { *Chebuli*
Citrini.
Indi.
Hellerici.
Emblici.
recentes.
siccis.
Dibenzylum Officinarium.
Chamaefice.
Scammonia Monspeliaca.
Sambucus aquatica polyanthos.
Helebum Indicum { *maximum.*
Zamosum.
Cynocrambe { *Dioscoridi*
serena.
Helsotropium Nicotini.
Scrophularia { *palustris*
flore lutea.
Alga Veneta.
EquisetumOLIDUM.
Verbascum hortense multiplex.

LIBRO QUINTO.

Vuapassa.
Alcyonium.
Spongia marina.
Corallium nigrum.
Corallium album & rubrum.

PLANTÆ, in Phytopinace CASPARI BAVHINI primum descriptæ, quarum Icones in hoc opere proponuntur.

A *Cetosa Cretica.*
Alnus hirsuta.
Androsammum fatidum.
Apium maximum.
Atriplex silyvestris lappula habens.
Bellis alpina.
Beta Cretica spinosa.
Brassica spinosa.
Caucalis echinata ad nodos.
Centaurium spicatum.
Chamaedrys spinosa.
Chelidonium Sprengerianum.
Cichorium spinosum.
Consolida regalis peregrina.
Consolida media alpina.
Cynocrambe Dioscoridi.
Equisetum fatidum.

Eruca carulea.
Erysimo similis.
Gnaphalium Americanum primum non pilatum.
Horminum Syriacum.
Hyoscyamus Creticus.
Hyssopus caruleus folio dissecto.
Iacea alba.
Lenis palustris tertia.
Lentiscus Peruvianus.
Lithospermum frutescens angustifolium.
Millefolium pennatum.
Millefolium cornutum.
Myagrum monospermum.
Nasturtium crispum latifolium.
Nasturtium crispum angustifolium.
Nigella Cretica.
Ocimum latifolium maculatum.


Opuntia marina.
Papaver spinosum.
Rapistrum monospermum.
Rapunculus alpinus spicatus.
Scabiosa argentea.
Scandix Italica.
Scandix Cretica.
Scrophularia lutea.
Solanum tuberosum esculentum.
Spinachia semine non spinoso, hactenus non pl-
ta.
Taxus cum glandibus.
Thlaspi villosum.
Trifolium peltatum Creticum.
Trifolium spinosum Creticum.
Valeriana peregrina.
Verbena nodiflora.

NOTAS, QUIBUS UTITUR D. CASPARVS BAVHINVS, in Synonymis, ita intelligito.

Acust. Christophorus Acusta de plantis In-
dia.
Alpin. Prosper Alpinus de plantis Egypti.
Anguil. Aloysius Anguillexa
Apul. Apulianus de herbis.
Brunf. Otho Brunfelsius.
Camer. Ioachimi Camerarij editio Matthio-
li, & sicut hortus Medicus.
Cast. Castor Durantes.
C.B. Casparus Bauhinus.
Casal. Andreas Casalpini de plantis.
Clas. hist. Hisp. Pan. Caroli Clusii histria Hi-
spanica & Pannonica.
Colum. Fabius Columna in suo Phytobasano.

Card. in Dios. hist. Valerij Cordi commenta-
ria in Dioscoridem, & eius de Historia
plantarum libri.
Dalech. Ioannis Dalechampij nota in Pl-
inium.
Dod. gal. & fol. Remberti Dodonai editio gal-
lica, & eius postrema latina in folio.
Fuch. Leonardi Fuchsij historia & Icones.
Ges. Conradus Gesners liber de hortis Germa-
nia.
Garz. Garzias ab Orto de animalibus.
Hermol. Hermolai Barbari corollaria in Dio-
scoridem.
Lac. Andrea Lacuna historia Hispanica.

Lch. Matthia de Lobel observationes & her-
nes.
Lon. Adami Loniceri historia postrema.
Lugd. Lugdunense herbarium.
Monard. Nicolaus Monardis.
Pena Petri Pena Aduersaria.
Rau & Wolf. Leonhardi Rau & Wolfij Hodo-
ricum.
Scalig. Iulij Casarii Scaligeri Exercitationes.
Tabern. Iacobi Theodori Tabernamontani
Historia & Icones.
Thal. Ioannes Thalyus in sua Herbaria Sa-
xonothuringica.
Trag. Hieronymus Tragus.



IN EFFIGIEM CL. D. CA-
SPARI BAVHINI BASILIENSIS
PRACTICI FOELICIS, ANATO-
mici solertis, Botanici indefessi, Præcepto-
ris obseruandi

*Pinge mihi, vitam cui debet Virbius, umbra
Factus, Crateuam, Pergameumq, decus.
Geryoni huic inspira animam, qua triplice non sit
Inferior. quod si non potis vlla graphis,
Non cælum, scalprumue vllum, quanam arte BOHINVM
Tergeminum tandem pingere posse putas?*

IDEM

IN PET. ANDREAE MATTHIOLI
BOTANICA A CASPARO BAVHINO EMA-
CULATA ET AVCTA.

*Jam pridem fasees melior, sceptrumq, superbum
Hetrusca Flora Belgica Flora tulit.
Damnatumque caput tenebris misisset ad orcum,
Nec autum, libri nescio quo genio.
O factum bene, quod bigas agitante triumpho
Spes superest vita quantulaeunque breuis!
Supremam moribunda animam legit acrior vltrix
Heluetica, & Tuscam restituit folio.
Fallor ego, aut spoliis vtriusque erectior olim
Intexet propriam perpete fronde comam.*

*Jacobus Cargillus Scotus
Philosoph. & Medicina Doctor.*






SIMPLICIUM MEDICAMENTO- RUM FACULTATES SECVNDVM LOCOS ex Dioscoride, & Matthioli commentarijs.

CAPITIS:

DIOSCORIDIS:

Ad capitis dolores et frigiditate.



IRS Illyrica cum aceto, & ro-
saceo illita.
Oleum sylvestris olivae inun-
ctum.
Oleum amygdalinum illitum.
Vitici semen emplastri modo
adhibitum.

Amygdale amara cum aceto, vel rosaceo, fronti, uel
temporibus illita.

Torpedo marina uina admota.

Lana succida cum aceto, & rosaceo, imposita.

Sisymbrium fronti, & temporibus adalligatum.

Hederacei corymbi, uel foliorum hederaceorum suc-
cus, cum aceto, & rosaceo persusus.

Aloe temporibus, fronti, & ex aceto, rosaceo, & illita.

Mentha fronti adalligata.

Serpyllum coctum, rosaceo, acetoque madefactum &
adhibitum.

Melilotus cum rosaceo, & aceto subactus.

Baccharis folia per se illita.

Ruta ex rosaceo & aceto.

Scammonia ex aceto & rosaceo persusa.

Anisum per se potum.

Sphondylium cum ruta illitum.

Aqua marina vapor aperto capite perceptus.

Peucedanum ex rosaceo, & aceto.

Melanthium fronti adalligatum.

Conyza minor adalligata.

Anagyris tenera folia drachma pondere ex uino pota.

Rhodia radix recens cum rosaceo momento imposita.

Hippoglossum coronamenti modo adhibitum.

Chamedaphnes folia trita, & illita.

Elaterium ex lacte naribus infusum.

Rusci folia, & bacca in uino pota.

MATTHIOLI

Galanga naribus indita.

Nardum Italicum.

Lavendula.

Phu vivens, cum radicibus confusum, & illitum.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Cabeza deuorata.

Balsamum factitium & eius aqua illita.

CAPITIS.

Moschus.

Zibetum.

Ambarum.

Laurinum oleum.

Momia ex amaraci aqua naribus infusa, aut ex ca-
storeo, caphura, & oleo balanino.

Mastiche mansa cum odorata uera.

Dictamni albi florentis aqua naribus infusa.

Persicorum nucleorum cremor ex aqua uerbenace
paratus, fronti, temporibus, & illitus.

Amygdalarum amararum lacteus cremor eodem mo-
do paratus.

Mustellarum combustarum cinis aqua subactus, &
illitus.

Cepa squama feruenti cinere tosta, & calida in dolen-
tis lateris aurem introducta, additis rosaceo, lauri-
no, & succida lana.

Flores Caryophylli uocati sacch. afferuati, & deuorati.

Cyclamini succus in errhinis additus.

Hedera folia septem, totidemq; ossium persicorum
nuclei a cortice delibrati, ex oleo, & aceto cocta, &
temporibus & fronti illita.

Agaricum in potu sumptum.

Graminis genus septem internodijs distinctum capiti
accommodatum.

Rhodia Radix recens confusa, ex amaraci aqua fron-
ti, & temporibus illita.

Verbenace aqua, aut oleum capiti adhibitum.

Verbasci stillatitia aqua fronti illita.

Fungi qui ad imam sambuci sedem oriuntur in aqua
rosacea macerati, & illiti.

Agaricum in potu sumptum, aut in catapotijs additum.

Colocynthis in catapotijs addita.

Quinta essentia nostra lib. v. capite de uino descripta
tum pota, tum exterius fronti illita.

MATTHIOLI

Ad diuturnum capitis dolorem.

Ligni Guaiaci

China radice

Sarza parilla

Punica arboris folia, aut eorum succus illitus.

Hedera folia septem, totidem ossium persicorum nu-
clei a cortice delibrati ex oleo, & aceto cocta, &
fronti & temporibus illita.

Agaricum in potionibus, aut catapotijs additum.

Colocynthis in catapotijs, aut potione usurpata.

CAPITIS.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores à calida causa genitos.

- Oleum sylvestris oliua inunctum.
- Vnguentum rosaceum illitum.
- Ligustri flores fronti ex rosacea illiti.
- Rosarum aridarum ex vino dilutum adhibitum.
- Viticis semen appositum.
- Portulaca per se imposita.
- Melilotus cum aceto, aut rosaceo aspersa & adhibita.
- Nymphae radix pota, & naribus indita.
- Rhodia radix cum rosaceo, & fronti & temporibus adalligata.
- Papaveris liquor fronti cum rosaceo illitus.
- Psyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua impositum.
- Hippoglossi sertum capite gestatum.
- Sedum maius cum rosaceo illitum.
- Solani hortulani folia adalligata.
- Vinifera vitis folia & capreoli adhibita.
- Ophites lapis adalligatus.

MATTHIOLI.

- Arboreus, lapideusue muscus retens, rosacea imbutus & impositus.
- Populneum vnguentum toti capiti inunctum.
- Betula aqua que per se è pforata candice fluxit illita.
- Ligustrinum oleum illitum.
- Rosa, & præsertim purpurea austero vino incocta & illita.
- Pomorum acidorum succus cum Santalis adhibitum.
- Cochlearum viuentium mucus fronti ex rosaceo illitus.
- Punicorum acidorum vinum potum & impositum.
- Anguim senecta ex aceto decocta.
- Ovis recentis vitellus, albumq; ex rosaceo, & rosacea aqua.
- Mica triticea panis amygdalino, papauerinoq; oleo imbuta, & fronti adalligata.
- Portulaca contusa, & fronti imposita.
- Plantaginis succus ex rosaceo illitus.
- Cucurbita, & cucumeris recentis ramenta fronti adalligata.
- Lactuca succus cum rosaceo, & aceto impositus.
- Fabaria contusa ex aceto.
- Nymphae recentia folia capiti superposita.
- Polygoni maioris succus illitus.
- Hyoscyami recentia folia fronti adalligata.
- Psyllij seminis mucago fronti ex rosaceo adhibita.
- Solani hortulani succus fronti impositus.
- Mandragora recentia folia capiti superposita.
- Alfene contusa & adhibita.
- Sedi cuiuscunque succus, aut herba ipsa cõtusa & illita.
- Cotyledonis utriusque succus impositus.
- Cymbalaria vulgaris contusa & illita.
- Momordica fructus amygdalino oleo insolatus, contusus, & illitus.
- Santalum album cum aqua rosacea adhibitum.
- Caphura ex rosacea aqua imposita.
- Rosaceum oleum tepidum.
- Sylvestris oliua oleum inunctum.
- Punica folia contrita, aut eorum succus cum rosaceo illitus.
- Amygdala dulces ex aqua rosacea contrita, & illita.
- Oleum in quo cucurbitae flores insolati fuerint illitum.

CAPITIS.

- Musselorum exstarum cinis aqua subactus, et illitus.
- Sena decoctum, vel dilutum potum.
- Eiusdem folia in lotionibus addita.

MATTHIOLI.

Ad hemicraniam.

- Thuris & Myrrha puluis omni albo exceptus, & fronti & temporibus illitus.
- Mumia ex amaraci aqua naribus immissa.
- Sagapenum ex Betonica decocto potum.
- Cucumeris sylvestris radix in aqua elixa, tusa & oleo subacta, & cum absinthio applicata.

DIOSCORIDIS.

Ad purgandum caput.

- Brassica succus
- Anemonis succus
- Beta succus
- Chelidoni mai. succus
- Cyclamini mai. succus
- Capa succus
- Pyrethrum
- Staphysagria
- Colocynthis in catapotys deuorata.
- Vua passa cum pipere manducata.
- Atramentum sutorium lanis naribus inditum.

} naribus infusus.

} diu mansa.

MATTHIOLI.

- Iridis radices succus naribus infusus.
- Cabeba cum mastiche mansa.
- Mastiche una cum cera odorata commansa.
- Gattaria succus naribus infusus.
- Amaraci succus naribus inditus.
- Imperatoria radix commansa.
- Sena decoctum vel dilutum potum.
- Sagapenum in catapotys deuoratum.
- Sinapi & nasturtij semen commansum.
- Cyclamini succus naribus infusus.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores faciunt.

- Styracinum oleum olfactum.
- Oliua flaua
- Glandes
- Palmule Phenicia
- Iuglandes nuces
- Arbuti fructus
- Ferula caules
- Mei radices largius sumpta.
- Absinthij liquamentum haustum.

MATTHIOLI.

- Vinum generosum largius sumptum.
- Sinapis in cibis usurpata.
- Pontica nuces largius deuorate.
- Lac abunde potum.

DIOSCORIDIS.

Ad veterinosos.

- Viticis semen cum rosaceo & aceto perfusum.
- Castoreum ex aceto & rosaceo naribus infusum.
- Capa decocta, & in cibum sumpta.
- Sinapi derafo capiti appositum.
- Spondilium suffitum & ex oleo capiti illitum.
- Peucedanum cum aceto, & rosaceo inunctum.

MATTHIOLI.

- Nardus Italica
- Lauendula

} cum pota, tum illita.

CAPITIS

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.
 Balsami faciliy aqua, secundarius liquor & oleum
 inunctum.
 Sisymbrij succus ex aceto illitus.
 Caryophylli flores saccharo conditi & deuorati.
 Agaricum potum cum purgante in medicamento.
 Oleum e floribus & folijs hyssopi paratum & illitum.
 Stechas addita scilla, aut eius aceto pota.
 Dictamnus albus quomodolibet adhibitus.
 Salvia tam in potionibus, quam in fomentis usurpata.
 Saccarum e salvia floribus paratum.
 Gattaria & bibita & fotu adhibita.
 Amaracus introrsum, & extrorsum accepta.
 Imperatorie radix quoquomodo usurpata.
 Rosmarinum, vel saccharum ex eius floribus paratum.
 Euphorbium occipiti affricatum.
 Chamadrys in potionibus addita, & occipitio adalli-
 gata.
 Quinta essentia nostra li. 5. commet. de vino descri-
 pta, tum pota, tum naribus iniecta.

DIOSCORIDIS.
 Ad somnum conciliandum.

Iris illyrica pota.
 Amomum fronti illitum.
 Amygdala amara deuorata.
 Viticis semen potum.
 Lactuca in cibum sumpta.
 Aloë illita per sese, vel ex rosaceo.
 Baccharis odorata.
 Iunci Aethiopici semen potum.
 Papaueris erratici quinq. sexue capita in vini cy-
 this tribus ad dimidium decocta, & potui data.
 Hyoscyami semen potum, ac appositum.
 Solani somnifici radicum cortex drachma pondere in
 vino potus.
 Mandragora radicis ex vino decoctum, cyathi vnius
 mensura potum.
 Mandragora poma olfacta naribus.
 Mandragora liquor sedi pro balano subditus.

MATTHIOLI

Arborei, lapideine musci dilutum ex vino paratum
 potum.
 Salicis recentia folia in lotionibus addita.
 Persicorum nucleorum cremor fronti & temporibus
 adhibitus.
 Amygdala dulces cum rosacea aqua illita.
 Lactuca succus ex rosacea fronti & temporibus il-
 litus.
 Corallium potum.

DIOSCORIDIS.
 Somnia terribilia faciunt.

Faba } in cibum accepta.
 Lentis }
 Pycnocomi semen coma drachma pondere potum.
 Smilacis lauis semen cum dorycnio potum ternis sin-
 gulorum obulis.

MATTHIOLI

Phasioli in cibum sumpti.
 DIOSCORIDIS.
 Sturnutamenta cient.
 Sinapi semen tritum & naribus admotum.
 Ptarmica flores admoti.

CAPITIS

Struthij radix trita & admota.
 Ranunculi radix sicca & in puluerem trita, naribus
 indita.
 Daphnoides naribus indita.
 Veratri albi radix trita & imposta.
 MATTHIOLI.
 Piper tritum naribus inditum.
 Cyclamini radix indita.
 DIOSCORIDIS.
 Ad vertiginosos.
 Balsami semen per se potum.
 Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum.
 Galbanum olfactum.
 Bryonia radix pota per continuum annum quotidie
 drachma pondere.
 Vitis nigra viticula prima recentes decocta, & in ci-
 bus accepta.

Vinum } Scillinum potum.
 Acetum }

MATTHIOLI

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.
 Balsami faciliy primus, secundus & tertius liquor
 inunctus.
 Mumia ex amaraci aqua naribus immissa.
 Cochlea cum suis testis trita ex aceto pota.
 Scorzonera radix, aut succus potus.
 Caryophyllorum flores saccharo asseruati, & frequen-
 ter deuorati.
 Combebarum grana quinque quotidie sumpta.
 Agaricum potioni infricatum, & pro sapone usurpatum.
 Salvia tam in potu quam in fomentis sumpta.
 Saccharum salvia floribus paratum.
 Gattaria potui data, & forinsecus illita.
 Amaracus tum pota tum illita.
 Imperatoria radix in potiones & localia medicame-
 ta addita.
 Sena decoctum, vel dilutum potum.
 Rosmarinum quocunque modo usurpatum.
 Saccharum e floribus rosismarini paratum.
 Sagapenum in potu sumptum, & exterius inditum.
 Chamadrys quoquo modo usurpata.

DIOSCORIDIS

Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.
 Cancamum per se potum.
 Balsami semen haustum.
 Bitumen Naphtha suffitum comitiales deprehendit.
 Populi nigra in cibum accepta.
 Ficus sicca in cibum accepta.
 Conchula Indica suffita excitant.
 Coagulum leporinum potum.
 Mustela ventriculus coriandro infarctus, inuetera-
 tusque deuoratus.
 Mustela eiusdem sanguis potus.
 Asininum iecur tostum in ieiuno sumptum.
 Ungula asini combusta pota.
 Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.
 Lapis in hirundinum pullorum prima fetura ventricu-
 lo inuentus, pro amuleto in cerui aluta suspensus.
 Serum lactis potum quousque alnam citet.
 Phoca coagulum bibitum.
 Ursinum fel ad lingendum datum.

CAPITIS.

Testudinis fel naribus inditum.
 Testudinis terrestris sanguis potus.
 Ciconia finum ex aqua potum.
 Plantago cum lenticula decocta in cibis sumpta.
 Sinapi tritum naribus inditum.
 Piper diu mansum.
 Scilla hausta.
 Agaricus drachma pondere cum oxymelite haustus.
 Eryngij radix ex dulci aqua ebibita.
 Ruta sylvestris semen potum.
 Seselis Massiliensis radix & semen potum.
 Peucedanum ex aceto & rosaceo capiti inunctum.
 Sagapenum potum.
 Laserpitij liquor cum aceto mulso bibitus.
 Ladanum olfactum.
 Ammoniacum in eclegmate cum melle datum.
 Trifolij semen & folia pota.
 Coryza cum aceto bibita.
 Anthyllis altera ex oxymelite pota.
 Betonica folia hausta.
 Quinquifolium triginta diebus haustum.
 Papaneris spumei semen cum mulsa aqua potum.
 Veratrum nigrum potum.
 Hippophasti succus trium obolorum pondere haustus.
 Vitis alba drach. pondere anno toto quotidie hausta.
 Vitishigra viticula prima virentes cocta, & in cibis sumpta.
 Acetum mulsum potum.
 Vinum & acetum scillinum potum.
 Selenites lapis tritus ebibitus.
 Aetites lapis cum Cyprino unguento, aut glencino, vel alio excalfaciente illitus.
 Coles naxia pota.

MATTHIOLI

Nardus Italica.
 Lauendula.
 Asarina & eius decoctum potum.
 Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.
 Balsami factitij liquor omnis illitus.
 Mumia ex amaraci aqua naribus inmissa.
 Cranium humanum potum.
 Castoreum ex oxycrato potum.
 Leporis coagulum cum aceto bibitum.
 Lapis in felle bubulo inuentus tritus lentis quantitate, & in errhinis additus.
 Aqua stillatitia humani stercoris pota.
 Scorzonera radix, aut eius succus potus.
 Caryophyllorum flores ex betonica, aut amaraci decocto poti.
 Iidem saccharo asseruati frequenter deuorati.
 Cyclaminus in potione, vel clysmate infusus, aut eius succus in errhinis additus.
 Agaricum potioni ingestum.
 Aristolochia rotunda.
 Hyssopum quoquo modo sumptum.
 Stachas cum Scilla, aut eius aceto usurpata.
 Dictamnus albus.
 Salvia tam pota, quam trita adhibita.
 Amracus quouis modo usu ventat.

CAPITIS.

Galega succus sefenucia pondere potus.
 Imperatoria radix in potionibus addita.
 Sena dilutum vel decoctum potum.
 Rosmarinū, vel saccharum ex eius floribus paratum.
 Sagapenum deuoratum.
 Quercini visci lignum in tenuissimum puluerem reductum & diebus quadraginta potum.
 Vincetoxici radices trita vna cum pœonia semine.
 Cardui benedicti decoctum, aut stillatitia aqua pota.
 Chamadrys in potionibus addita.
 Filipendula radices puluis cibis inspersus.
 Palma Christi seminis puluis drachma pondere ex vino potus.
 Eiusdem radicem decoctum diutius vino mistum potum.
 Pœonia Galeni collo suspensa.
 Pœonia semina filo traiecta, & collo circumligata.
 Hyperici florentis aqua stillatitia pota.
 Chamapitys decoctum ex rhodomelle, & oxymelite diebus pluribus potum.
 Ellebori nigri dilutum potum.
 Colocynthidis in catapotis addita, aut in potionibus.
 Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta, hausta.
 Acetum scillinum frequenter haustum.
 Stibium nostram proprio comment. descriptum.
 Corallium tam suspensum, quam potum.

MATTHIOLI

Ad obliuiofas & deperditam memoriam.

Anacardia.
 Quinta essentia nostra comment. de vino lib. 5. descripta, frequenter usurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad apoplexiam.

Vitis alba radix continuo anno quotidie drachma pondere hausta.

MATTHIOLI

Nardi Italica } stillatitia aqua pota.
 Lauendula }
 Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia pota.
 Balsami factitij liquor primus, secundus, tertius illitus.
 Agaricu in potu sumptu, aut in catapotis deuoratum.
 Quinta essentia nostra libr. 5. comment. de vino descripta, pota.

DIOSCORIDIS.

Ad Phrenesim.

Vnguentum Crocinum perfusum aut naribus illitum.
 Kitec aceto & oleo instillatus.
 Asparagus in vino albo potus.
 Serpyllum cum aceto & rosaceo impositum.
 Sphondilium suffitum, impositum, & capiti ex oleo inunctum.

Peucedanum ex oleo & rosaceo inunctum.

MATTHIOLI

Malua succus octo unciarum pondere potus.
 Solani hortensis, tum foliorum, tum baccarum succus syncipiti cum linteolis superpositus.
 Borraginis, aut buglossi stillatitia aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad cerebri inflammationes, quas syniasim vocant.

Cucurbita ramenta syncipiti apposita.
 Peponis ramenta syncipiti adhibita.
 Heliotropij folia fronti adhibita.

Acetum

CAPITIS.

Acetum fronti illitum.

MATTHIOLI

Agaricum potui datum.

Santala omnia ex rosacco aceto & caphura momento illita.

DIOSCORIDIS.

Ad melancholiam.

Ocimi semen potum.

Veratrum nigrum potum.

Betonica folia pota.

Epithymum potum.

MATTHIOLI

Poma dulcia.

Citria mala.

Santalum omne.

Malua succus unciarum sex pondere potus.

Scorzoneræ radix, aut eius succus bibitus.

Agaricum sumptum.

Thymus drachmarum duarum pondere ex oxymelite potus.

Sena decoctum vel dilutum potum.

Vincetoxici radices trita cum ocimi semine, aut cum citrei mali cortice, aut cum margaritis hausta.

Melyssophyllum quocunque modo frequenter potum.

Aspleni decoctum haustum.

Borraginis aut buglossi decoctum ex vino, aut ex aqua paratum potum.

Ellebori nigri dilutum.

Syrupus e polypodio, & praesertim ad hypochondriacâ: vide lib. 4. comm. de Polypodio.

Acetum scillinum haustum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comm. de vino descripta.

Stibium nostrum quatuor granorum pondere haustum.

Argentum viuum precipitatum octo granorum pondere ebibitum.

Aurum.

Corallium.

Margarita.

Oleum e lapide gagate tum potum, tum illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad crapulam ebrietatemque tollendam.

Crocum ex passo praesumptum.

Punicorum malorum succus } haustus.

Myrti baccarum succus }

Brassica summo cibo sumpta.

Absinthium praesumptum.

MATTHIOLI

Acetum testiculis cum linteolis adhibitum.

Croci florum stillatitia aqua pota.

Amygdala amara sex ante potum deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis fluxiones.

Vnguentum irinum naribus illitum.

Styrax illita, suffitaque.

Bitumen naphtha suffitum.

Cinnamomum potum.

Mei radices trita cum melle in eclegmate deuorata, ubi fluxio pectus afficiat.

Nuces auellanae tosta, & cum exiguo piperis pota.

Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa deuorata.

Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.

Hysopum cum fico, ruta, melleque, ex aqua decoctum potum.

CAPITIS.

Helichrysi coma trium obolorum pondere in vino diluto pota.

Hyoscyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.

MATTHIOLI

Iuniperinum gummi suffitum & capiti inspersum.

Santalum rubrum capiti inspersum.

Caryophylli aromatici suffiti fumo naribus excepto.

Agaricum in potionibus additum.

Rosmarinum.

DIOSCORIDIS.

Ad cerebrum roborandum.

Agallochum potum.

MATTHIOLI

Cubeba deuorata.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.

Balsami factitij unusquisque liquor illitus.

Moschus.

Zibetum.

Ambarum.

Caryophyllorum puluis capiti inspersus.

Caryophylli flores saccharo coditi frequenter deuorati.

Stæchas.

Mentha Græca.

Salvia.

Sena in capitis perfusionibus addita.

Rosmarinum atque saccharum ex eius floribus paratum.

Caryophyllata radix olfacta.

Rhodia radix olfacta, vel quomodolibet usurpata.

Quinta essentia nostra comsento de vino descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis vlcera manantia.

Tbus cum nitro confricatum.

Fici & caprifici lacteus succus cum polenta appositus.

Vrina inueterata apposita.

Fænum graecum appositum.

Cicer adhibitum.

Malua ex urina humana emplastrata.

Ally cinis ex melle inunctus.

Cyclamini decoctum fomenti modo adhibitum.

Bulbi cum cremato nitro adhibiti.

Melilotus ex aqua cum creta chia, vinoque, aut galla inuncta.

Rubi folia imposita.

Lily cremata radix ex melle adhibita.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Acida muria inspersa.

MATTHIOLI

Hedera helicis folia in pileum costata, et capiti imposita.

Centaurij minoris succus illitus.

Mentha illita.

NERVORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad conuulsionem.

Iris Illyrica ex aceto pota.

Acori decoctum bibitum.

Cardamomum ex aqua potum.

Iunci odorati radicis drachma una cum pari pondere piperis per dies aliquot data.

Costus ex vino, & absinthio exhibitus.

Balsamum ex aqua haustum.

Helenium ex melle eclegmate exhibitum.

NERVORVM

Vnguentū sampſuchinū more cataplaſmatis appoſitū.
 Vnguentum metopium illitum.
 Bdellium illitum.
 Iuniperi baccæ bibita.
 Cedrides deuorata.
 Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulſa hauſta.
 Ficulneus cinis ex oleo illitus.
 Erinacei terreſtris caro in cibum ſumpta.
 Caſtoreum inunctum & potum.
 Serpyllum potum.
 Fimum caprinum cum aceto bibitum.
 Dracunculi radix toſta & elixa deuorata cum melle.
 Aſphodeli radix drachmæ pondere pota.
 Capparis ſemen potum.
 Capparis cortex pariter hauſtus.
 Argemone emplaſtrata.
 Agaricus ſumptus trium obolorū pondere cū mulſo.
 Rhaponticum potum.
 Galbanum deglutitum.
 Gentiana radix drachmæ pondere pota.
 Ariſtolochia rotunda bibita.
 Centaurij maioris radix ex vino pota.
 Spina alba ſemen potum.
 Acanthij radices pota.
 Abrotani ſemen cum aqua potum.
 Leucacantha radicis ex vino decoctam exhaustum.
 Origanum eſtum cum ſico.
 Eryngij radix pota cum aqua mulſa.
 Pulegium cum poſca potum.
 Calamintha decoctum hauſtum.
 Baccharis radix in aqua decocta, & pota.
 Panaces herculeum linitum.
 Libanotis radices cum loliacea farina emplaſtrata.
 Peucedanum ex aceto, & roſaceo inunctum.
 Clinopodium bibitum.
 Chamadryi decoctum potum.
 Laſer oboli pondere datum & deuoratum.
 Sagapenum potum.
 Galbanum deuoratum.
 Betonica folia denarij pondere cū hydromelite data.
 Xyridis radix ex paſſo bibita.
 Symphytum ex aceto mulſo bibitum.
 Pſyllium illitum.
 Serpyllum potum aut illitum.
 Verbasci decoctum bibitum.
 Bryonia eclegma ex melle.
 Vinum ſcillinum hauſtum.
 Vinum chamadrytes bibitum.
 Vinum tragoriganites bibitum.
 Satyrj radix ex vino nigro aſtero bibita.
 Coris ex vino pota.

MATTHIOLI

Oleum irinum inunctum.
 Nardus Italica.
 Lauendula.
 Cinnamomi vulgaris ſtillatitia aqua pota.
 Balsami factitij liquores omnes.
 Helenij radicis farina.
 Oleum nucem inunctum.
 Mumia tum ſoris, tum intus uſurpata.

NERVORVM

Oleum ex ſemine lini illitum.
 Cyclaminus in potionē ſumptus, vel clyſtere inſuſus,
 aut in errhinis additus.
 Agaricum potum uſurpatum.
 Oleum è folijs & floribus hyſſopi paratum.
 Stæchas in balneis, fomentis, & laconicis addita.
 Pulegij decoctum tum potum, tum ſotu adhibitum.
 Salvia tam pota, quam ſotu uſurpata.
 Gattaria.
 Amaracus.
 Imperatoria radix.
 Euphorbium ex leucioj oleo illitum.
 Vnguentum è viſci in pyro ſylueſtri naſcentis folijs, &
 recenti capi pinguedine paratum: vide viſci com.
 Chamadrys in fomentis & vnguentis addita.
 Liliorum alborum oleum illitum.
 Cannabis radix decocta, & deinde tuſa & illita.
 Colocynthis in catapotijs addita.
 Stibium noſtrū quatuor granorum pondere ſumptū.
 Oleum è lapide zagate illitum.

MATTHIOLI

Ad ſtuporem.

Cinnamomi vulgaris aqua ſtillatitia pota.
 Balsami factitij liquores omnes.
 Oleum ſinapinum.
 Nuclei pinei frequenter deuorati.
 Oleum è floribus & folijs hyſſopi illitum.
 Stæchas in balneis laconicis & fomentis addita.
 Pulegij decoctum.
 Salvia tam intus ſumpta quam exterius admota.
 Amaracus.
 Imperatoria radix.
 Roſmarinum.
 Euphorbium ex leucioj oleo exterius illitum.
 Chamadrys.
 Chamapitys decoctum ex rhodemelle potum.
 Quinta eſſentia noſtra comment. de vino deſcripta,
 tam pota, quam illita.

DIOSCORIDIS

Ad paralyſin.

Peucedanum ex aceto & roſaceo inunctum.
 Capparis ſemen & cortex potus.
 Sagapenum potum.
 Rubie radix hauſta.
 Colocynthis clyſtere perſuſa.
 Vitis nigra viticule prima recentes cocta, comestaf.
 Vinum ſcillinum hauſtum.

MATTHIOLI

Iridis radices condita, deuorata.
 Nardus Italica.
 Lauendula.
 Aſarina per ſe, aut eius decoctum potum.
 Cinnamomi vulgaris ſtillatitia aqua pota.
 Balsami factitij liquores omnes illiti.
 Helenij radicis farina bibita.
 Oleum ſinapinum inunctum.
 Nuclei pinei frequenter deuorati.
 Mumia ex amaraci aqua illita.
 Iuglandium oleum illitum cum calce lota.
 Anacardia.
 Caſtoreum cum mulſa potum.

NERVORVM.

Flores caryophylli ex betonica aut amaraci decocto poti.

Iidem saccharo asseruati, & frequenter deuorati.

Cyclaminus in potione, vel clystere sumptus, aut eius succus in errhinis additus.

Agaricum in catapotijs, aut potione sumptum.

Oleum e folijs, & floribus hyssopi paratum inunctum.

Stachas in balneis laconicis, & fomentis addita.

Pulegij decoctum, cum haustum, tum fotum.

Salua tam potione quam fomentis usurpata.

Gattaria.

Amaracus.

Imperatorie radix.

Zena decoctum, vel dilutum.

Euphorbium ex leucij oleo exterius illitum.

Chamedrys.

Oleum liliorum alborum.

Bellidis genera omnia.

Hyperici florentis stillatitia aqua pota.

Chamapitys decoctum ex rhodomelle, & oxymelite potum pluribus diebus.

Conditum & pilula contra neruorum resolutionem: vide chamapitys commentarium.

Colocynth in catapotijs addita.

Quinta essentia nostra lib. s. comment. de vino descripta, pota & illita.

Stribium nostrum quatuor granorū pondere sumptum.

Oleum e gagate lapide inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestum.

Castoreum potum & inunctum.

Brassica in cibo sumpta.

Althae decoctum potum.

MATTHIOLI.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia pota.

Balsami factitij liquor & oleum.

Nuclei pinei frequenter deuorati.

Salua tum potu, tum fotu usurpata.

Amaracus.

Imperatorie radix.

Chamedrys.

Chamapitys decoctum cum rhodomelle haustum.

Quinta essentia nostra tam pota, quam illita: parandirationem habes lib. s. comment. de vino.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxiones.

Farina tritici cum Apollinaris herba succo apposita.

Farina hordei ex aceto adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad aegritudines, & dolores.

Oleum sicyonium inunctum.

Oleum laurinum illitum.

Eleomeli illitum.

Vnguentum Cyprinum

Vnguentum Gleucinum

Vnguentum Metopium

Vnguentum Amaracinum

Bdellium malagmati insertum.

Lixiuum ex cinere ficus ex oleo illitum.

Castoreum potum, & illitum.

Erinacei terrestris caro deuorata in cibis.

NERVORVM.

Viperina carnes decocta, & esui data.

Poterij radice decoctum potum.

Peucedanum ex aceto & rosaceo inunctum.

Lascer oboli pondere deuoratum.

Centaurium minus ebibitum.

Lilij radix inassata, melleq. excepta imposita.

Satyrij radix ex vino nigro austero pota.

Althae radix per se, vel decocta in vino, aut aqua mulsa emplastri modo imposita.

Coccu infectoriu cu aceto illitu precisos inuat neruos.

Senecij folia ad eadem prestant illita.

Narcissi radix illita ad eadem utiliter imponitur.

Hippophasti succus trium obolorum pondere potus.

Aqua marina perfusa.

Acetum scillinum potum.

Vinum de stachade haustum.

Vinum de thymo potum.

Sesamum illitum crassitiem iuuat.

MATTHIOLI.

Oleum larigna resina, vel terebintina illitum.

Nuclei pinei frequenter in cibis usurpati.

Terebintina resina

Larigna resina

Abiegna resina

Nucis Indica

Nucis Myristica

Fabulum caulium, & siliquarum cinis cum vetere

axungia illitis.

Stachas in balneis fomentis, & laconicis addita.

Pulegium.

Amaracus.

Aiuga.

Cortusa herbae flores in amygdalino oleo receter presso & rosaceo completo, pari pondere commisti, diu insolati, & illiti.

DIOSCORIDIS.

Ad neruorum vulnera.

Cochlea terrestres tusa & imposita.

Terreni vermes tusi, & illiti.

Butyrum illitum.

Senecionis folia emplastri modo imposita cum thuris manna.

Dracunculi minoris folia illita.

Poterij radix tusa & imposita.

Lilij radix ex melle subacta & illita.

Coccum infectorium cum aceto illitum.

Narcissi radix illita.

MATTHIOLI.

Balsamum factitium impositum.

Terebintina

Laricea

Abiegna

Abiegna lachryma.

Iuglandium oleum.

Cochlearum caro cum farina polline imposita.

Oleum e terrenis vermibus, addito praesertim factitio balsamo, aut oleo e terebintina confecto.

Hyperici oleum.

Oleum e fructu momordic. e illitum.

MATTHIOLI.

Ad contractionem & duritiem.

NERVORVM

Muris montani pinguedo illita.
 Taxi pinguedo inuncta.
 Oleum ex ouorum vitellis perunctum.
 Ceruina & vitulina medulla.
 Oleum ex lini semine.

MATTHIOLI
 Ad contusiones.

Cochlearum terrestrium caro cum farina polline
 imposita.

Farina fabarum cum oxymelite subacta.

Dracunculi radix cum melle & caprino fimo illita.

DIOSCORIDIS.
 Ad neruorum crassitiem.

Sesamum emplastri modo impositum.

Sarmentitius cinis cum axungia, vel oleo illitus.

OCVLORVM.
 DIOSCORIDIS.
 Ad palpebrarum destitutum.

Nardi indica decoctum fotu adhibitum.

Cochlea terrestres acu traiciuntur ut effluat humor,
 quo postea palpebrae illinantur.

Oesipus illitus.

Chondrilla gummi, ac pariter lac impositum.

Lapis armenius illitus.

DIOSCORIDIS.
 Ad palpebrarum, oculorumque scabritiem.

Thuris cortex tostus, & appositus.

Picis fuligo illita.

Licium appositum.

Sepie os laeuigatum, & illitum.

Fel	}	Marini scorpionis	} illitum.
		Marina testudinis	
		Perdicis	
		Aquila	
		Gallinae albae	
		Syluestris capra	

Sinapi tritum ex melle inunctum.

Omphacium impositum.

Squama aris illita.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis inuncta.

Hematites lapis melle exceptus adhibitus.

DIOSCORIDIS.
 Ad palpebrarum fluxiones.

Amaraci folia cum polenta illita.

Alsine cum polenta imposita.

Ricini folia cum polenta trita, & emplastri modo
 adhibita.

DIOSCORIDIS.
 Ad palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus, & illitus.

Conchule Indica cinis inunctus.

DIOSCORIDIS.
 Ad palpebrarum scabiem.

Caprae succus cum pari spodio impositus.

Aloe illita.

Fici lac inunctum.

MATTHIOLI

Tragacantha lachryma lacte macerata & illita.

Sagapenum cum aceto superpositum.

MATTHIOLI

Ad palpebrarum inflammationes.

Ouum gallinaceum crudum admisto rosaceo impositum.

OCVLORVM.

Solani Halicacabi bacca musto diluta, & imposita.

Lentis palustris stillatitia aqua illita.

Borraginis, vulgarisq; buglossi stillatitia aqua.

DIOSCORIDIS.
 Ad oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatumq;

Cancamum vino maceratum, & impositum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha impositum.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.

Conchule Indica cinis oculis inditus.

Cochlearum putaminum cinis melle exceptus linitus.

Marini scorpionis fel instillatum.

Idemq; praestat fel testudinis, perdicis, aquila, gallina
 alba, & syluestris capra.

Vrina humana areo vase decocta illita.

Lactuca syluestris lacteus succus instillatus.

Dracunculi succus immixtus.

Ceparum succus persusus.

Gingiber illitus.

Chamaesyces succus cum melle inunctus.

Argemones folia imposita.

Ammoniacum impositum.

Horminum ex melle impositum.

Loti domestici succus ex melle illitus.

Sal impositum.

Salis flos eodem modo adhibitus.

Sapphyrus lapis appositus.

Aeris squama imposita.

MATTHIOLI

Mosebus impositus.

Radix eburi trita, & cum aqua instillata.

Mustelarum crematarum cinis oculis iniectus.

Chamaeleontis dexter oculus, vino animali erutus, &
 cum caprino lacte mistus.

Centaury minoris succus cum melle illitus.

Hieracii succus iniectus.

Sagapenum ruta succo, & animum rapacium felle diu-
 tius maceratum, & in collyrijs additum.

Sarcocolla in cratere vitreo asinino lacte quinq; die-
 bus macerata, & deinde instillata.

Scabiosa succus cum chrysocolle & caphura momen-
 to illitus.

Antirrhinum fronti adalligatum.

Corallij cinis in collyrijs additus.

DIOSCORIDIS.
 Ad oculorum cicatrices delendas.

Cancamum vino maceratum & infusum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha instillatum.

Cedria illita.

Cochlearum terrestrium cinis cum melle impositus.

Vrina humana areo vase decocta, infusa.

Feni graeci oleum cum myrteo impositum.

Sagapenum inditum.

Chamaesyces succus cum melle illitus.

Aerugo immixta.

Vini fex adusta imposita.

Corallium tritum inditum.

Hematites lapis immixtus.

Sapphyrus lapis adhibitus.

O C V L O R V M
M A T T H I O L I

Hieracij succus instillatus.
Sarcocolla a sinino lacte macerata & instillata.

D I O S C O R I D I S.
Ad oculorum nūbeculas.

Acori succus instillatus.
Casia alijs medicamentis ocularib. excepta et iniecta.
Cinnamomum impositum.
Cerasi gummi inditum.
Acacalis dilutum ad collyria additur, que oculis claritatem faciunt.

Acacia succus elotus & infusus.
Punicorum malorum cytini tres quātumuis minimi, denorati anno, ab omni lippitudine præservant.

Thus immissum.

Crocomagnum illitum.

Ebeni tenuissima ramenta vino optimo macerata, & in collyria addita.

Lycium inditum.

Cedria inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Vipera caro decocta, & in cibis desumpta.

Hirundines ficedularum modo in cibis denorata.

Cinis hirundinum collyrijs adhibitus.

Adeps piscium inunctus.

Feniculi succus infusus.

Fel	}	Marini scorpionis	}	infusum.
		Testudinis marina		
		Perdicis		
		Aquila		
		Gallina alba		
Sylvestris capra				

Vrina humana aereo vase decocta instillata.

Lactuca sylvestris lacteus succus illitus.

Dracunculi maioris rad. succus inunctus.

Caparum succus inditus.

Loti domestici succus infusus.

Hirundinaria maioris suc. aereo vase cum melle decoctus, inunctus.

Othonna succus instillatus.

Centaurij minoris succus impositus.

Ruta in cibis sumpta.

Omphacium instillatum.

Panaces Heracleum inunctum.

Libanotis foliorum & radice succus infusus cū melle.

Lasex melle inunctus.

Apiastri succus cum melle inditus.

Marrubij succus ex melle illitus.

Pumex indita.

Salis flos immisus.

Vini sex cremata imposita.

Pyrites lapis inditus.

Thyites lapis impositus.

Geodes lapis impositus.

Sapphyrus lapis impositus.

M A T T H I O L I.

Vipera totius cum thure & succo feniculi combusta cinis per se inspersus, aut alijs collyrijs additus.

Leporinum fel saccharo exceptum & illitum.

Mustelarum fel cum feniculi succo instillatum.

O C V L O R V M

Stecoris humani stillatitia aqua imposita.

Scorzoneræ radice lac instillatum.

Caryophylli in tenuissimum pulverem triti, & inditi.

Chelidony maioris succus cū lacte muliebri instillat^o.

Hieracij succus instillatus.

Sagapenum ruta succo, & auium rapacium felle diutius maceratum, & in collyrijs additum.

Sarcocolla in cratere vitreo a sinino lacte diebus quinque macerata, & instillata.

Vinum e fragis instillatum.

Euphrasia quouis modo intus sumpta.

D I O S C O R I D I S.

Ad oculorum vngulas.

Sepia piscis os tritum & impositum.

Glycyrrhizæ radice puluis inspersus.

M A T T H I O L I.

Tragacantha lachryma lacte macerata & illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad oculorum ictus, & vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.

Sanguis	}	Palumbi	}	illitus.
		Columba		
		Turturis		
		Perdicis		

Stæbis folia emplastri modo imposita.

Hematites lapis cum lacte iniectus.

D I O S C O R I D I S

Ad oculorum vlcera.

Fuligo	}	Thuris	}	illita.
		Terebinthina		
		Butyri		

Thuris cortex impositus.

Myrrha iniecta.

Cornu ceruinum vstum impositum lotum.

Anylum linitum, & peculiariter cauis vlceribus.

Stimmi iniectum.

Lapis	}	Galactites	}	cum lacte infusus.
		Sapphyrus		
		Samus		

D I O S C O R I D I S.

Ad erosos oculorum angulos.

Oesypum inunctum.

Omphacium illitum.

M A T T H I O L I

Picis fuligo imposita.

D I O S C O R I D I S

Ad ægilopas, & sinus.

Iuglandium veterum nuclei triti & illiti.

Myrti decoctum infusum.

Malua cruda commaducata cū exiguo sale adhibita.

Plantago emplastri modo imposita.

Auricula muris altera illita.

Baccharis folia emplastri modo in principio indita.

Anthemis illita.

Solani hortulani concisa folia imposita.

Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.

Ægilops adhibita.

Oenanthe vel labrusca flos impositus.

Cadmia illita.

Aeris squama indita.

Stimmi inditum.

D I O S C O R I D I S.

Ad procidentes oculos & vuas.

O C V L O R V M.

Fabarum farina cum rosis, ouorum albo & thure
emplastri modo imposita.
Rubi folia trita, & imposita.
Sapphyrus lapis adhibitus.

D I O S C O R I D I S.
Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex uua passa illitum.
Fuligo { Thuris } illita.
 { Picis }
Cupressi pilula cum polenta illita.
Myrti bacca cum polline polenta imposita.
Cotoneorum malorum flores emplastri modo.
Cascus illitus.
Saccharum infusum.
Sesame herba ex uino decocta, & imposita.
Portulaca cum polenta illita.
Intybus per se, & cum polenta adhibita.
Cucurbita ramenta imposita.
Anemones radix illita.
Auricula muris cu polenta emplastri modo adhibita.
Gentiana succus inunctus.
Abrotanum cum cydonio malo decoctum, aut pane
& emplastri modo adhibendum.
Melilotus cataplasmatis addita.
Baccharis folia illita.
Sedi maioris folia imposita.
Apium cum pane, aut polenta impositum.
Rubi Idæi flos ex melle inunctus.
Elatina folia cum polenta apposita.
Papaueris liquor cum tosto oui vitello, & croco im-
positus.
Hyoscyami semen & folia cum farina, polentae im-
posita.
Mandragora folia recentia cum polenta adhibita.
Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.
Aster atticus illitus.
Viola purpurea folia illita.
Ricini folia cum polenta illita.

M A T T H I O L L

Lac muliebre unā cum aqua rosacea, in qua accensū
thus trigesies extinctum fuerit, oculis instillatum.
Caphura in collyrijs addita.
Cochlea in nitido mortario tusa una cū ouo gallina-
ceo incocto & ex succida lana fronti adalligata.
Cyani succus instillatus.
Hieracij succus cum muliebri lacte instillatus.
Betonica folia contrita & fronti adalligata.
Consolida regalis flores triti & ex rosacea aqua illiti.
Vinum e fragis adhibendum.
Solani hortensis tum foliorum, tum baccarum suc-
cus illitus linteolis fronti superpositus.
Solani halicacabi bacca musto diluta & imposita.
Lentis palustris stillatitia aqua, illita.
Borraginis, & Buglossi vulgaris stillatitia aqua, tam
extra quam intus imposita.
Lapis Achates inspectus.

D I O S C O R I D I S.
Ad oculorum dolores.

Oui vitellus tostus addito rosaceo & croco illitus.
Sesame herba in uino decocta, & illita.
Oeimi succus infusus.

O C V L O R V M

Absinthium ex passo decoctum adhibendum.
Ruta cum polenta emplastri modo imposita.
Aconiti pardalianches radix permiscetur ocularijs
medicamentis, qua doloribus oculorū auxiliatur.

M A T T H I O L L

Lac muliebre & aqua rosacea, in qua accensum thus
trigesies extinctum fuerit, oculis instillata.
Caphura in collyrijs addita.
Cochlea in nitido mortario tusa una cum ouo galli-
naceo incocto, ex succida lana fronti adalligata.
Cyani succus instillatus.
Consolida Regalis flores triti & ex rosacea aqua illiti.
Solani hortensis cum foliorum, tum baccarum succus
illitus linteolis fronti adhibitus.
Solani halicacabi rubentes bacca musto diluta, &
imposita.
Lentis palustris stillatitia aqua imposita.
Lapis achates inspectus.

D I O S C O R I D I S
Ad lusciosos.

Iecoris { Caprini } zemanās succus dū assant iniectus.
 { Hircini }
Caprinum iecur tostum in cibis sumptum.
Syluestrium caprarum fel inunctum.

Sanguis { Palumbi } illitus.
 { Columba }
 { Turturis }
 { Perdici }

D I O S C O R I D I S.
Ad suffusiones.

Fel marini scorpionis inditum.
Vipera adeps admixto cedrino liquore, Attico melle,
& vetere oleo. Galenus vero non probat.
Fel { Testudinis marina } illitus.
 { Perdici }
 { Aquila }
 { Gallina alba }
 { Capra syluestris }

Fabarum farina uino macerata & illita.
Caprarum succus instillatus.
Cyclamini succus infusus.
Sagapenum impositum.
Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

M A T T H I O L L

Hieracij succus instillatus.
Polium fronti adalligatum.
D I O S C O R I D I S.
Ad lippitudines.
Portulaca & eius succus impositus.
Plantaginis succus infusus.
Sedi maioris folia illita.
Chalcitis inditus, cum cautela tamen.
Spongiarum crematarum cinis illitus, & praesertim
in arida lippitudine.
Hematites lapis tritus cum lacte iniectus.

M A T T H I O L L

Aqua rosacea in qua thus incensum trigesies extin-
ctum fuerit instillata.
Crispini baccarum succus cum pompholige & aqua
rosacea instillatus.
Margarita in collyrijs addita.

O C U L O R U M.

A V R I V M.

Bubuli fellis lapis naribus inditus.
 Fanugraci decoctum fronti illitum.
 Runicis sylvestris radix lana decrescente effossa gestata.
 Ophioglossi ex vino austero decoctum ablatione adhibendum.
 Hieracy succus instillatus.
 Euphrasia quoque modo usurpata.
 Vinum Euphrasiatum, vide lib. 4. cap. 38.

D I O S C O R I D I S

Ad oculorum caliginem.

Chamadrys trita inaspera, aut ex oleo inuncta.
 Loti domestici succus cum melle impositus.
 Veratrum nigrum in ocularibus collyrijs additum.
 Flos aris inditus.

M A T T H I O L I

Pbu ex vino albo decoctum, & oculis instillatum.
 Vinum ex Helenio paratum frequenter potum.
 Lentiscinum oleum in cibus additum.
 Erucæ succus oculis infusus.
 Ebenum ad cotem tritum, & cum passo inditum.
 Salicis florentis succus, qui inciso cortice fluxerit, instillatus.
 Nux myristica commansa.
 Margarite in collyrijs addita.
 Lapis ex felle bubulo naribus inditus.
 Brassica succus ex melle coctus, & oculorum angulis illitus.
 Asparagi in cibus sumpti.
 Sium in cibus devoratum.
 Scorzonera radice lac instillatus.

Caryophyllorum pulvis tenuissime tritus oculis inasperus.
 Hieracy succus instillatus.
 Rosmarini flores recentes decerpti, & cum sale & pane quotidie devorati, toto tempore quo floret planta.
 Sagapenum ruta succo, & felle animum rapacium diutius maceratum, & in collyrijs additum.
 Selarea seminis granum in oculo delatum.

D I O S C O R I D I S.

Ad oculorum hebetudinem.

Cancamum ex vino maceratum infusum.
 Populi alba pilule, quæ primo foliorum exortu exiliunt, ex melle illita.
 Marini scorpionis fel inunctum.
 Brassica in cibo sumpta.
 Sinapi cum melle inunctum.
 Anagallidis succus naribus exceptus.
 Absinthium cum melle impositum.
 Thymus in cibo sumptus.
 Thymbra obsonijs addita.
 Ruta succus in malicorio feruefactus, addito feniculi succo & melle infusus.
 Ruta sylvestris succus cum vino, melle, gallinaceorum felle, & feniculi succo iniectus.
 Solani somnifici succus inunctus.
 Flos salis inditus.

D I O S C O R I D I S.

Ad oculorum fluxiones.

Crocum illitum cum humano lacte.
 Thus ex oui vitello impositum, vel eiusdem albo.
 Thuris fuligo imposita.

Picis fuligo illita.
 Platani tenerissima folia in vino decocta & illita.
 Ebenamenta tenuissime trita indita.
 Olea sylvestris foliorum succus iniectus.
 Cornu ceruinum vstum lotum & iniectum.
 Butyri fuligo illita.
 Amylam impositam.
 Pompholix elota iniecta.
 Faba sine cortice commanducata, & fronti imposita.
 Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.
 Elatina folia cum polenta imposita.
 Squama aris elota iniecta.
 Plumbum elotum iniectum.
 Galactites
 Atorochthus } lapis cum lacte iniectus.
 Samius }
 Hyoscyami seminis cremor expressus infusus.
 Sarcocolla infusa.
 Alumen impositum.
 Corallium iniectum.
 Pumex impositus.
 Hematites lapis iniectus.

M A T T H I O L I

Aloechus in pulcrem tritus & impositus.
 Aqua florum liustri instillata.
 Tragacantha lacryma in collyrijs addita.

A V R I V M

D I O S C O R I D I S

Ad aurium dolores.

Lauri baccarum succus vino vetere, & rosaceo exceptus instillatus.
 Populneorum foliorum succus infusus.
 Ladanum ex vino illitum.
 Rosarum aridarum decoctum ex vino infusum.
 Salicis foliorum & corticis succus cum rosaceo in malicorio feruefactus illitus.
 Malorum acidorum puniceorum succus cum melle coctus infusus.
 Opium cum amygdalino oleo, croco, myrrha, iniectum.
 Anguium senecta in vino decocta instillata.
 Millepeda siue onisci concisi, & cum rosaceo in malicorio calefacti infusi.
 Vulpini pulmonis adeps instillatus.
 Vermes terreni cum anserino adipe elixi inditi.
 Anserinus
 Gallinaceus } adeps instillatus.
 Vulpinus }

Vrina } Tauri } cum myrrha cocta instillata.
 } Apri }

Mel cum trito fossili sale infusum.
 Sesami semen ex rosaceo iniectum.
 Beta succus inditus.
 Plantaginis succus immisus in calida materia.
 Cucurbitæ ramentorum succus cum rosaceo infusus.
 Dracunculi utriusque succus instillatus.
 Porri succus cum aceto, thure & lacte iniectus.
 Sinapis succus vel eius decoctum instillatus.
 Hedera & eius corymborum succus cum oleo inditus.
 Absinthium suffitum & cum melle impositum.

Origani virentis succus cum lacte infusus.
 Mentha succus inditus.
 Meliloti succus cum passo iniectus.
 Ruta succus in malicorio seruefactus infusus.
 Peucedani succus cum rosaceo inditus.
 Aparina succus iniectus.
 Marrubij succus in rosaceo instillatus.
 Cannabis domestica succus impositus.
 Polygoni maris succus infusus.
 Helxina succus inditus.
 Ocimi aquatici succus e sulphure, & nitro iniectus.
 Hyoscyami seminis cremor instillatus.
 Solani hortensis succus impositus.
 Alina succus infusus.
 Cucumeris asinini foliorum succus inditus.
 Salcum aceto iniectum.

M A T T H I O L I

Oleum Irinum instillatum.
 Oleum Hyoscyaminū, cū castoreo, aut croco impositū.
 Mumia ex Leucoy oleo, aut Hyoscyamino infusa.
 Oleum e nucleis persicorum instillatum.
 Oleum scorpionum immissum.
 Castoreum cum maconio infusum.
 Baccarum sambuci succus, cum melle coctus & instillatus.
 Oleum ex ouorum vitellis.
 Oleum e colocynthide infusum.
 Gliris caro melle subacta, & denorata.
 Malua succus instillatus.
 Sonchi lacteus succus e caule manans, & praesertim in Malicorio cum oleo coctus instillatus.
 Ari semen tritum, vel baccarū succus ex rosaceo impositus.

Amaraci succus instillatus.

D I O S C O R I D I S

Ad internas auriū inflammationes.

Crocum iniectum.

Sesamum cum rosaceo impositum.

M A T T H I O L I

Ouum gallinaceum crudum ex rosaceo impositum.
 Oleum ex ouorum vitellis inditum.
 Cucurbita ramentorum succus ex rosaceo instillatus.

D I O S C O R I D I S

Ad parotidas.

Oesypum impositum.

Caprarum montanarum fimus, vino vel aceto decoctus illitus.

Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.

Fabarum farina cum melle, & feno graco illita.

Rumex decoctus adhibitus.

Plantago emplastri modo adhibita.

Irionis semen tusum, decoctumque appositum.

Hyssopum suffitu incensum, & impositum.

Viscum cum parivesina, ac cera commistū adhibitu.

Althea decocta illita.

Psyllium ex rosaceo, acetoque aut aqua impositum.

Solani hortulani folia cum sale illita.

Galiopsis ex aceto adhibita.

Cimolia terra imposita.

M A T T H I O L I

Iridis radices recentes decocta, tusaque ex hordeacea farina illita.

Fanograti farina in hydromelite decocta, & cum axungia imposita.

Asphodeli radix decocta, & illita.

Eryngij radix decocta, & emplastri modo adhibita.

D I O S C O R I D I S

Ad tinnitum & incertos sonos.

Cedria infusa.

Lauri baccarum succus cum vino vetere & rosaceo instillatus.

Ficus sicca trita cum sinapi, & liquore aliqua excepta iniecta.

Taurinum fel infusum.

Mel cum trito fossili sale inditum.

Porri succus cum thure, aceto, lacteque instillatus.

Cepae succus impositus.

Sinapi tritum & cum fico iniectum.

Acetū calidum suffitum per traiectoriū instrumentū.

M A T T H I O L I

Lauri et nardi in vino decocti vapor per infundibulū immisus.

Cyclamini cocise radices in rosaceo, amygdalino, chamamelino, & vini modico calefacta, auribus instillata, oleo prius immisso.

Cyclamini item contusarum radicum cum persicorū, amararūque amygdalarum nucleis, & deinde tri-duo aqua vite maceratarum expressus succus & auribus infusus.

Oleum e colocynthide instillatum.

D I O S C O R I D I S

Ad purulentas aures.

Myrrha cum Maconio, castoreo & glaucio iniecta.

Thus ex vino dulci infusum.

Therebintina

Resina $\left\{ \begin{array}{l} \text{Larigna} \\ \text{Abiegna} \\ \text{Picea} \end{array} \right\}$ ex melle & oleo indita.

Lycium infusum.

Rhois decoctum iniectum.

Myrti baccarum succus instillatus.

Olea sylvestris foliorum succus ex vino infusus.

Taurinū fel cum caprillo, humano ve lacte instillatū.

Vrina infusa.

Vmbilicus veneris cum medulla ceruina iniectus.

Asphodeli radicū succus per se, & additis thure, melle, uino, & mirrha instillatus.

Cepae succus impositus.

Absinthium cum melle inditum.

Anisum cum rosaceo instillatum.

Sphondylii florum succus instillatus.

Polygoni succus infusus.

Stæbis decoctum iniectum.

Psyllij succus inditus.

Omphacinum cum melle impositum.

Alumen sanguinalis herba succo exceptum infusum.

Flos salis iniectus.

M A T T H I O L I

Persici foliorum succus instillatus.

Oleum e vitellis ouorum.

Bursa pastoris succus infusus.

D I O S C O R I D I S

Ad contusas aures.

Bulbi cum polenta impositi.

A V R I V M.

Sulphur cum vino & melle illitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad exulceratas aures.

Oesophum impositum.

Suillum fel instillatum.

M A T T H I O L I

*Porrum non transplantatum cum terrenis vermi-
bus in oleo decoctum.*

D I O S C O R I D I S.

Ad surditatem.

Hastula regiz radicum ex oleo decoctum iniectum.

Capra succus instillatus.

*Veratrum nigrum immixtum, & relictum usque in
diem tertium.*

Bryonia succus cum melle instillatus.

Flos aris conditus per fistulam statu impulsus.

Sulphur rapim per fistulam suffitum.

M A T T H I O L I

Oleum resina laricea, aut stillatitia eiusdem aqua infusa.

*Fraxini spuma e viridi ligno in igne posito emanans,
instillata.*

*Raphani radice succus una cum oleo dulcium, & a-
mararum amygdalarum, vino albo & colocynthi-
dis momento calefactus & infusus.*

*Ecipa excauata & cumini pulvere repleta, & sub fer-
uenti cinere cocta, expressus tremor instillatus.*

Oleum e colocynthide infusum.

D I O S C O R I D I S.

Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.

Vrina humana in malicorio decocta instillata.

Capparis radice succus iniectus.

Calamintia succus instillatus.

Psyllij succus inditus.

Acetum infusum.

M A T T H I O L I

*Oleum e laricea resina destillatum, aut eiusdem aqua
infusa.*

Foliorum persici succus instillatus.

Ficulneum lac infusum.

Persicaria succus inditus.

Centaurij minoris succus infusus.

Menthastris succus instillatus.

Trissaginis succus impositus.

Cannabis decoctum, aut eius succus infusus.

N A R I V M.

D I O S C O R I D I S.

Ad sanguinis profluuium.

Thus in puluerem tritum iniectum.

Cochlea terrestres cu suo putamine trita, & imposita.

Porri succus cum thuris polline instillatus.

Ruta trita indita.

Vrtica utriusq; folia cum succo imposita.

Cuminum ex aceto impositum.

Ferula medulla intronissa.

Lysimachia imposita.

Clymeni succus inditus.

Galyopsis flos impositus.

Equiseti succus infusus.

Acetum tum potum, tum iniectum.

Stratiotes adhibita.

Chalcitis succo porri instillata.

M A T T H I O L I

Thus cum tela aranea, oleo & oui unius albo mistu.

N A R I V M.

& cum licinio naribus introductum.

*Pannus in annosis laricam caudicibus repertus in-
tromissus.*

*Mastiche cu thure, sanguine draconis, leporinis pilis
combustis oui albo excepta, fronti, applicata.*

*Caphura cum vrtica semine immissa, aut fronti ex
sedi aut plantaginis succo illita.*

*Sandaracha pulvis ex oui albo fronti, temporibusque
illitus.*

Suberis cortex ex aqua calida potus.

Galla combusta indita.

Pili e ventre viui leporis euulsi & vsti intronissi.

*Plantaginis stillatitia aqua cum equali acerrimi ace-
ti portione, manuum volis, pedum plantis, & ioci-
nori applicata.*

Capra succus ex aceto perquam acerrimo infusus.

Cyclamini stillatitia aqua naribus sursum tracta.

*Mentha florētis stillatitia aqua balneo calentis aqua
destillata, unciarum quatuor pondere pota.*

*Betonica folia cum salis momento contusa naribus
immissa.*

Clematis recens collo guleq; circumducta.

Consolida minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pyrola.

Millefolij sicci farina naribus indita.

Exusta sambuci folia & in puluerem trita.

Gypsum tritum, & oui albo exceptum, & fronti illitu.

Iaspis lapis suspensus, & in manu gestatus.

D I O S C O R I D I S.

Ad sanguinem e naribus eliciendum.

Crocodilij radice decoctum bibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad polypum.

Cupressi pilula cum fico trita, & imposita.

Dracunculi maioris radix imposita.

*Laserpitij liquor cum chalcantio, aut rasili argentine
illitus, forcipe prius exciso polypo.*

Flos aris inditus.

Sandaracha cum rosaceo immissa.

M A T T H I O L I

Ari radice succus.

Ari folia combusta.

D I O S C O R I D I S.

Ad narium vlcera & Carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.

Hedera succus infusus.

Sandaracha cum rosaceo iniecta.

D I O S C O R I D I S.

Ad narium tædia.

Aurantiorum florum aqua infusa.

D I O S C O R I D I S.

Ad narium destillationes.

*Melanthij semen tritum, & in linteolo colligatum
sape ac sepius olfactum.*

D I O S C O R I D I S.

Ad sternutamenta cienda.

Fibrorum testiculi iniecti.

Ocymi semen, aut succus naribus infusus.

Sinapi tritum inditum.

Ranunculi radix sicca, tritaq; iniecta.

Ptarmica flores olfacti.

ORIS, ET LINGVÆ.

Struthij radix imposita.

MATTHIOLI.

Betæ succus infusus.

ORIS, ET LINGVÆ.

MATTHIOLI.

Ad fectorem oris.

Iridis radix mansa.

Acorum deuoratum.

Galanga in ore detenta.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.

Moschus in ore contentus.

Moschardina ita vulgò vocata in ore seruata.

Caryophylli mansi.

Angelica radix mansa.

Aurura in ore contentum.

MATTHIOLI.

Ad pustulas.

Bellidis folia commansa.

DIOSCORIDIS.

Ad erodentia vlcera.

Cyperis radicis farina in os indita, etiamsi vlcera de-
pascantur, vorentq̃.

Aspalathi ex vino decoctum ore collutum ad tetra-
oris vlcera.

Acacia indita.

Plantaginis succus in ore detentus.

Capparis in aceto decocta in collutione.

Glycyrrhizæ succus in ore detentus.

Origani succus in ore contentus.

Leucosij flores ex melle impositi.

Testiculus serapias impositus.

Anthemis mansa.

Britanica succus infusus.

Tribuli succus ex melle delinctus.

Rubi decoctum in ore contentum.

Quinquefolij radicis decoctum ore collutum.

Verbenacæ altera ex vino affusa.

Staphysagria cum melle indita.

Labruscæ flos ore inspersus.

Alumen cum melle impositum.

Salcum potentilla tatum & iniectum.

MATTHIOLI.

Aqua, qua è perforato Betula caudice distillat in ore
contenta.

Lignstri folia commansa.

Aurum in ore contentum.

Atalarum panicorum vinum cum aqua plantaginis
collutum.

Oleum è chalcantbo illitum.

Diphryges.

Corallium.

Achates lapis in ore detentus.

Fagi folia esitata.

Pruni sylvestris baccarum, & radicum decoctum in
ore contentum.

Mororum succus in collutionibus, aut gargarismati-
bus additum.

Portulaca commansa.

Cyani maioris succus in ore detentus.

Flos salis in vino decoctus.

Bellidis folia commansa.

Consolidæ mediæ, minorisq̃ folia, vel eorum succus.

Sanicula.

ORIS, ET LINGVÆ.

Auricula vrsi.

Virga aurea decoctum.

Pilosella.

Potentilla.

DIOSCORIDIS.

Ad halitum commendandum.

Resina lentiscina manducata.

Myrrha mansa.

Mala medica manducata.

Anisum mansum.

Bromus cum siccis rosis decocta, in ore retenta.

MATTHIOLI.

Citri decoctum collutum.

Nux myristica commanducata.

Sonchi folia commansa.

Caryophylli mansi.

Anethum commansum.

Imperatorie radix commanducata.

Rosmarinum mansum.

DIOSCORIDIS.

Ad linguæ scabritiem.

Mentha confricata.

Rhois semen cum melle fricatum.

MATTHIOLI.

Mucago seminis cydoniorum illita.

Sebestena delibrata & superposita.

Tamarindorum pulpa confricata.

Saccharum candi in ore detentum.

Cucumeris recentis segmina imposita.

Anguria pulpa admota.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Solidaginis minoris decoctum.

MATTHIOLI.

Ad linguæ inflammationem.

Cucumeris recentis, vel Anguria segmina imposita.

Anguria pulpa adhibita.

Lentiscinum oleum.

Trinitas herba in vino austero decocta.

MATTHIOLI.

Ad paralyin linguæ.

Mumia tum bibita tum confricata.

Cinnamomi stillatitia aqua in ore detenta.

Pyrethri & longi piperis decoctum, addito Amaranthi
succo & in ore retentum.

Sagapenum.

Pæonia seminis triginta grana à putamine repurga-
ta, contritaq̃, & ex vino pota.

MATTHIOLI.

Ad impeditam loquelam.

Nardi Italica, aut lauendule stillatitia aqua pota.

Cinnamomi stillatitia aqua tū pota tū in ore cõtenta.

MATTHIOLI.

Ad pustulas.

Malorum puniceorum vinū ex Rhodomelle & aqua
plantaginis adhibitum.

Plantaginis succus illitus.

DENTIVM ET GINGIVARVM.

DIOSCORIDIS.

Ad dentes purgandos.

Carpure

Buccine

Mitilorum

Cinis

Conchule

Cochlearū terrestriū

Sepia piscis

Ceruini cornu

dentib. affricatis.

Plantæ.

DENTIVM ET GINGIVARVM.

Plantaginis radice decoctum in collutionibus.

Aristolochia rotunda confricata.

Alcyonium quintum.

Pumex

Samius lapis

Arabicus lapis

} dentibus affricata.

MATTHIOLI.

Gammarorum lapilli in puluerem triti & affricati.

Malua radix sub cineribus decocta madida papyro circumuoluta, deinde siccata & pro dentifricio usurpata.

Cyclamini succus cum melle illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad dentium dolores.

Picea & pini folia trita ex aceto decocta frequenti collutione.

Cedria dentium cauis indita.

Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.

Tamaricis foliorum ex vino decoctum in ore detentum.

Olei amurca in cupreo vase ad mellis crassitiam decocta ex aceto, aut vino, aut mulso colluta.

Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collutionibus adhibitum.

Ficulneum lac lana exceptum & cauis dentibus inditum.

Anguim senecha ex aceto decocta in collutionibus.

Pastinaca piscis aculeus in eius cauda prominens dentibus adhibitus.

Ranarum ex aqua & aceto decoctum in collutionibus.

Lacerta iecur cauis dentium impositus.

Vermes terreni oleo elixi, & in contrariam aurem instillati.

Rumicis decoctum in collutionibus.

Asparagi radicum decoctum in ore contentum.

Asphodeli radicum succus in contrariam aurem infusus.

Allij, teda, thurisq. simul decoctum in ore contentum.

Ononis radice ex posca decoctum in collutionibus.

Capparis seminis decoctum in collutionibus.

Idem praestat capparis cortex, quin & radix commanducata.

Lepidy (ut aiunt) radix collo suspensa.

Ranunculi radix imposita.

Anagallidis succus in contrariam narium partem infusus.

Hedera corymborum acini quinque cum rosaceo in malicorio feruesfacti, in contrariam aurem instillati.

Chamaleonis nigri decoctum in ore contentum.

Spina alba decoctum in collutionibus.

Leucacantha radix commanducata.

Absinthij decoctum suffitum.

Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.

Panaces haracleum dentium cauis inditum.

Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.

Peucedani succus cauis dentium inditus.

Nigelle decoctum, una cum teda ex aceto in ore detentum.

Laserpitij liquor cauis dentium impositus.

Galbanum illitum & eorum cauis inditum.

Apiastri decoctum in collutionibus.

Althaea decoctum ex aceto in ore detentum.

Betonica decoctum ex vino, vel aceto.

Clematis prima commanducata.

DENTIVM

Polemonij radix commanducata.

Quinquefolij radice decoctum in ore retentum.

Hyoscyami radice ex aceto decoctum in collutionibus.

Solani somnifici ex vino decoctum in ore retentum.

Ephemerij radice decoctum in collutionibus.

Verbasci decoctum collutum.

Arction ex vino decocta, & in ore detenta.

Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum.

Colocynthidis decoctum in collutionibus.

Staphisagria decoctum ex aceto in ore contentum.

Tithymali taracia lac dentium cauernis inditum, dente prius cera munito, ne lac in fauces incidat.

Acetum calefactum in collutionibus.

Sory dentium cauis inditum.

MATTHIOLI.

Mastiche cum cera odorata mansa.

Cupressi conorum decoctum ex aceto collutum.

Sandaraca suffitus per infundibulum exceptus.

Iuniperinum oleum calidum ore contentum.

Quinta essentia nostra lib. 5. commen. de vino descripta, in ore contenta.

Betonica decoctum ex vetere vino paratum, in ore detentum.

Iuniperinarum baccarum ex vino albo decoctum, additis cupressi pilulis & myrti folijs, & aqua vita momento saepe collutum.

Myrica decoctum ore versatum.

Castoreum ex oleo auri dolentis lateris infusum.

Calli equorum cruribus innati triti, & per aurem ex oleo infusi.

Plantaginis radix commanduca, quinetiam dentium collutionibus incocta.

Sinapis semen mansum.

Nasturtij succus calidus in aurem dolentis lateris instillatus.

Cyclamini succus cum melle in ore detentus.

Iridis radix mansa, & eius decoctum collutum.

Nardi Italica, aut lauendula decoctum ore contentum.

Hyoscyaminum oleum ore contentum tepidum.

Imperatorij radicum decoctum ex vino austero paratum.

Rosmarini decoctum ex vino austero & aceto.

Bisorta radicum puluis, cum aluminis & pyrethri momento cauis dentium inditus.

Potentilla decoctum ore collutum.

Millefolij folia commanducata.

Angelica radix mansa, & dentium cauis imposita.

Caltha arida puluis dentium cauis inditus.

DIOSCORIDIS.

Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria eorum cauitatibus indita.

Amurca olei cum omphacio recocta ad mellis crassitudinem & imposita.

Pastinaca piscis aculeus impositus.

Ranunculi radix iniecta eorum cauitatibus.

Chamaleonis nigri radix cauernis dentium indita.

MATTHIOLI.

Cyclamini succus cum melle in ore detentus.

Chelidony maioris succus inditus.

DIOSCORIDIS.

Ad firmandos commotos dentes.

Lentisci decoctum in ore contentum.

DENTIVM ET GINGIVARVM.

Colymbadum muria in collutionibus adhibita.
 Syluestris olea oleum in ore contentum.
 Sory in collutionibus.
 Alumen cum aceto & melle solutum & adhibendum.

MATTHIOLI.

Crispini baccarum succus in ore detentus.
 Viburni foliorum ex posca decoctum collutum.
 Messilorum decoctum ore contentum.
 Virga sanguinea bacca admota.
 Cornorum, & sorborum decoctum.
 Gammarorum lapilli contriti & leuiter affricati.
 Portulaca commansa.
 Helenium à ieiunis commanducatum, sed illud esse oportet, quod erutum terram non contingat.
 Virga aurea decoctum.
 Potentilla.

Fragaria, & eius radicum decoctum ex vino austero.
 Corally puluis affricatus.

MATTHIOLI.

Ad dentitionem facilitandam.

Lapis è capite limaciarum sine testis existentium ademptus, & adalligatus.

DIOSCORIDIS.

Ad dentitium torporem.

Portulaca commanducata.

DIOSCORIDIS.

Ad fluidas gingiuas.

Cyperi farina imposita.
 Rosarum aridarum ex vino decoctarum expressus liquor, in collutionibus impositus.
 Colymbadum muria in ore contenta.
 Oleum syluestris olea in ore detentum.
 Galle quoquo modo adhibita.
 Mali punici florentis cytini in decoctis macerati & in collutionibus additi.
 Prunorum foliorum decoctum in ore retentum.
 Lac asinum in collutionibus.
 Pulegium siccatum, crematumq; & in puluerem tritum appositum.
 Rubi decoctum in ore detentum.
 Staphisagria decoctum in collutionibus.
 Omphacium cum melle impositum.
 Acetum in collutionibus adhibendum.
 Rubigo ferri adhibita.
 Alumen quocunque modo adhibendum.
 Sal tostum cum polenta impositum.

Alabastris } Lapis tritus impositus.
 Smyris }

DIOSCORIDIS.

Ad erosas putridasq; gingiuas.

Cancanum impositum.
 Lycium attritum impositum.
 Plantaginis succus in ore detentus.
 Aloe ex vino & melle illita.
 Tribuli utriusque fructus ex melle impositus.
 Labrusca florum combustorum cinis cum melle illitus.
 Acetum in collutionibus.

Chalcitis } trita & imposita.
 Alumen }
 Pumex }
 Aerugo }

MATTHIOLI.

Cochlearum putaminum exustorum cinis infricatus.

GUTTURIS ET GVLAE.

Cicer columbinum aqua maceratum, & deinde contusum, & illitum.

Potentilla quouis modo usurpata.
 Fragaria herba, & radicum decoctum.
 Punicorum malorum vinum ex Rhodomelle, & plantaginis aqua.
 Corally puluis illitus.

GUTTURIS ET GVLAE.

DIOSCORIDIS.

Ad Anginam.

Pix liquida peruncta.
 Mori fructus succus in aereo vase decoctus, insolatusq; cum mellis exiguo illitus.
 Multipeda sine Onoscij ex melle inuncti.
 Cinis crematarum hirundinum ex melle more emplastri adhibitus.
 Hirundines sale inueterata drachmae vnus pondere cum aqua pota.
 Fel taurinum cum melle inunctum.
 Fel testudinis illitum.

Acetum gargarizatum.
 Mel gargarizatum.
 Capa succus inunctus.
 Absinthium cum melle & nitro illitum.
 Piper cum melle inunctum.
 Raphani semen ex aceto mulso gargarizatum.
 Hyssopi cum fico decoctum gargarizatum.
 Laserpitij liquor cum mulsa aqua gargarizatus.
 Viola purpurea ex aqua cocta, & pota.
 Elaterium efficacissime illinitur cum melle, vetere oleo, aut felle taurino.
 Salex melle, oleo & aceto illitum.
 Spartij succus è ramis in aqua maceratis, & mox tris extractus, & illitus.

Mumia cum oxymelite gargarizata.
 Mororum succus illitus.
 Succinum suffitum & eius fumus per infundibulum in os receptum.
 Cochlea cum acu vulnerata succus cum penna illitus.
 Vipera caput in linteolo colligatus collo suspensus.
 Caninum stercus fistula insufflatum.
 Virga aurea decoctum gargarizatum.
 Ebuli radicum succus circa gulam calidus cū linteolis illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad Gutturis inflammationes.

Cinis crematarum hirundinum ex melle more emplastri applicitus.
 Lac gargarizatum.
 Rana oleo elixa ceruicis & colli abscessibus illita.
 Mel illitum.
 Origanii virentis succus gargarizatus.
 Helxine succus gargarizatus, forisq; inunctus.
 Vrtica utriusque succus gargarizatus.
 Chalcitis imposita.
 Alumen illitum.
 Sal tostum cum melle inunctum.
 Acetum gargarizatum.
 Aloe cum vino aut melle imposita.
 Britannica succus illitus.
 Tribuli fructus ex melle impositus.

Rubi

GUTTURI ET GVLAE

Rubi mororum succus gargarizatus.
Ficum siccarum decoctum gargarizatum.
 MATTHIOLI
Cassia solutiva pulpa insumpta.
Cressini baccarum succus gargarizatus.
Vna spina succus.
Ribis vulgaris succus.
Lactuca succus cum punici mali succo gargarizatus.
Trinitas herba in vino austero decocta.
Virga aurea decoctum gargarizatum.
Ebuli radicum succus circa gulam calidus cum lin-
teolis illitus.
Malorum punicorum vinum ex rosarum aut plan-
taginis aqua gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

Ad prolapsam columellam.

Laserpitij liquor cum melle inunctus.
Pruni foliorum ex vino decoctum gargarizatum.
Omphacium impositum.
Acetum gargarizatum.
Flos aris in puluerem subtilissimum impositus.

MATTHIOLI.

Pix liquida calefacta vna cum thure, & massiche de-
raso occipitio adhibita.
Lauri bacca cum cumino, hyssopo, origano, & euphor-
bio melle excepta, & summo capiti calide ap-
plicata.
Viburni decoctum gargarizatum.
Cochlea putamen vstum, & inspersum.
Phyllitidis stillatitia aqua gargarizata.
Virga aurea decoctum gargarizatum.
Consolida minor, & media.
Sanicula.
Auricula vrsi.
Pilosella.
Potentilla.
Pyrola.
Punicorum malorum vinum cum aqua plantaginis
gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

Ad gulæ destillationes.

Papaueris vasculorum decoctum ex melle in eclegmatis
formam redactum, sapiusq; linctum.
Acetum gargarizatum.
Bdellium cum ieiuna salina dilutum & illitum.
Verbenaca altera ex vino gargarizata.
Omphacium impositum.
Flos aris puluerizatus, & impositus.
Alumen impositum.

MATTHIOLI.

Cressini baccarum succus
Mespilorum decoctum } *in gargarismatibus.*
Pruni sylvestris bacca, & eius radices in gargaris ad-
ditæ.
Tragacantha lachryma delincta.
Punicorum acidorum malorum vinum gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

Ad faucium & tracheæ asperitates.

Myrrha lingue subdita, ibiq; liquata.
Pisana hordeacea gargarizata.
Amylum delinctum.
Sinapis succus gargarizatus.
Glycyrrhiza succus lingue subditus.

PECTORIS, ET PVLMONIS.

Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.
Laserpitij liquor aqua dilutus in delinctu.
Symphytum petraum commanducatum.
Quinquefolij radicis decoctum gargarizatum.
Aethiopsis cum melle in eclegmate.
Lac gargarizatum.
Licium attritum & delinctum.
 MATTHIOLI
Cassia solutiva pulpa insumpta.
Oleum amygdalarum dulcium.
Oleum sesaminum.
Cochlea illota cocta, trita, & ex passo pota.
Oui album insumptum crudum.
Malua cum foliorum, tum radicum decoctum gar-
garizatum.
Atriplex coctum deuoratum.
Phyllitidis stillatitia aqua.
Solidago minor ex aceto, & aqua rosacea decocta, &
in ore colluta.

PECTORIS, ET PVLMONIS.

DIOSCORIDIS.

Ad cruenta sputa & sanguinis reiectiones.

Ouum tepidum bibitum.
Cornu ceruini cinis lotus & ebibitus cū tragacantha.
Clymenum potum.
Serpylli succus drachmarum duarum pondere cum
aceto potus.
Fimum caprinum tritum in vino, aquarū potum.
Triticea farina glutinis modo elixa in delinctu data.
Amylum potum.
Ferula viridis medulla pota.
Portulaca ad summum cocta deuorata.
Plantago quoquo modo exhibita, presertim succus.
Eiusdem semen potum.
Porri semen drachmarum duarum pondere cum pa-
ribus myrti baccis.
Agaricus triū obolorum pondere cū aquamulsa potum.
Rhaponticum haustum.
Lysimachia succus haustus, & perfusus.
Centaurij maioris radix pota.
Spina alba radix hausta.
Arabica spina radix pota.
Aloe cochlearium duorum pondere cum frigida aqua
vel sero pota.
Polygoni maris succus potus.
Salvia succus in orbiculos cōcretus cū melle sumptus.
Symphytum petraum cum aqua potum.
Mentha succus cum aceto potus.
Althea decoctum potum.
Betonica folia trium obolorum pondere in diluta vi-
ni portione hausta.
Symphyti alterius radix pota.
Achillea hausta.
Tragi cacumina decem in vino bibita.
Personata radix cum pineis nucibus pota.
Isopyri semen potum.
Adiantum potum.
Trichomanes pota.
Vitis vinifera foliorū & capreolorum succus haustus.
Labrusca flores poti.
Omphacium parce potum.
Corallium haustum.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Hematites lapis. }
Morachibus lapis } cum mali punici succo pota.
Samia terra }

MATTHIOLI.

Thus potum.
Mastiche in potu.
Mumia hausta.
Juniperi gummi haustum.
Succinei pastilli exhibiti.
Ligustri florum aqua pota.
Cressimi baccarum succus haustus.
Hypocistis potus data.
Rhodosaccharum.
Quercus foliorum stillatitia aqua pota.
Glandes & galla in potionibus data.
Suberis corticis cinis haustus.
Castanearum tenuior tunica in puluerem hausta.
Persici lachryma ex aqua plantaginis, aut portulacae pota.
Mespili folia in puluerem trita, & potui data.
Virga sanguinea bacca.
Corna.
Sorba.
Cochlea elixir & pro cibo sumpta.
Plataginis succus addito armenio bolo, aut hematite.
Bursa pastoris & plantaginis decoctum ex pluuiali aqua, addito armenio bolo.
Cyclamini radice stillatitia aqua fenarum vnciarum pondere, una cum sacchari albiissimi vncia pota.
Ophioglosson ex aqua equiseti potum.
Rhabarbarum drachma pondere cum mumia momento potum.
Tragacantha lachryma insumpta.
Salvia succus potus.
Flos solis una cum radicibus contusus & potus.
Hyperici seminis farina e polygoni succo hausta.

Pilosella
Consolida minor
Consolida media
Sanicula
Auricula vrsi
Caryophyllata radix
Lagopi semen
Virga aurea
Potentilla
Pyrola

quouis modo hausta.

Pulmonaria succus potus, & herba ipsa quocunque modo usurpata.
Amaranthi purpurei flos potus.
Millefolij succus, aut sicci farina ex symphyti maioris aut plantaginis aqua pota.
Punicorum malorum vinum ex aqua portulacae, aut rosarum pota.
Corallium sumptum.
Iaspis lapis suspensus, aut iocinori admodus.

DIOSCORIDIS.

Ad phthisin.

Pistacia }
Pinea nuce } per se aut ex melle sumpta.
Terebinthina resina per se, vel ex melle more eclegmatis deuorata.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi mensura deuorata.

Juniperi bacca hausta.
Lauri bacca trita cum melle, & cum passo deuorata.
Ficus sicca cum hyssopo feruifaceta, & pota.
Cancris fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.
Lac humanum ex ubere suctum.
Ius esculentum omnium adipum datum.
Plantago in potu exhibita.
Porrum cum melle decoctum.
Agaricus drachma pondere sumptus cum passo.
Acanthi radices pota.
Marrubij folia sine expressu succus potus.
Betonica folia cum melle data.
Myrrhis in sorbitione pota.
Asij lapidis flos ex melle delinctus.

MATTHIOLI.

Larigna resina in eclegmate delincta.
Pinei nuclei cum melle, aut saccharo exhibiti.
Cochlea nemorales a mucagine repurgata, & ex lacte bubulo decocta, una cum tussilagine, & cibi loco propinata.
Rana ex capi, aut gallina iure decocta, deuorata.
Gallorum iuuenum testes in cibo usurpati.
Brassica percocta frequenter deuorata.
Atelopenum seminum cremor haustus.
Glycyrrhiza radix, & eius succus.
Veronica mas.
Salvia catapotia: vide salvia commentarium.
Gerany primi radix ex vino pota.
Pulmonaria succus frequenter potus, aut herba ipsa quocunque modo usurpata.
Vua passa in cibis deuorata.
Armenia terra quoquo modo sumpta.
Corallium potum.
Hematites lapis sumptus.

DIOSCORIDIS.

Ad pulmonis abscessus.

Semen cyclamini secunda speciei quadraginta diebus potum.
Tragoriganum cum melle in eclegmate exhibitum.
Tussilaginis sicca, incensa q² fumus ore haustus apostemata interna pectoris rumpit.

MATTHIOLI.

Mustelarum pulmo deuoratus.
Vulpinus item pulmo in puluerem tritus.
Fenugraci decoctum potum.
Pulmonaria frequenter sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad suspiriosos.

Lauri bacca trita cum melle, vel passo & exhibita.
Ficus sicca cum hyssopo decocta & pota.
Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.
Ius senum gallorum potum.
Vinum hyssopites bibitum.
Plantago cum lenticula decocta comesta.
Rhaponticum bibitum.
Aqua mulsa pota.
Aristolochia rotunda bibita.
Centaurij maioris radix pota.
Hyssopu decoctu cum fico, aqua, melle, rutag² potum.
Stechas ex aqua decocta pota.

PECTORIS ET PULMONIS

Pulegium cum melle & aloe potum.
Scylla ex melle trium obalorum pondere delincta.
Thymi cum melle decoctum potum.
Saturia eodem modo pota.
Baccharis radice decoctum potum.
Rata pota.
Peucedani succus in ovo sumptus.
Nigella in vino pota.
Galbanum deglutitum.
Marrubij decoctum, siue expressus succus potus.
Parthenium ex oxymelite sumptum.
Anagris folia cum passo bibita.
Perichlymeni semen potum cum vino.
Adiantum potum decoctum.
Fidicula, siue trichomanes hausta.
Elaterium optima suspensio est purgatio.
Thapsia succus exhibitus.
Bryonia cum melle in eclegmate sumpta.
Sandaracha non resina in catapotys data.
Sulphur in ovo sumptum, vel suffitum.
Agaricum drachma unius pondere datum.
Cancanum haustum ex aqua vel mulso.

MATTHIOLI

Iridis radice decoctum potum.
Iridis radices saccharo condite asservate.
*Pbu, siue valeriana, praesertim cum dulci radice, vni
passis & anisi semine cocta.*
Cubeba deuorata.
Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.
Cassia solutina pulpa cum decocto hyssopi pota.
Balsami facti liquor, & oleum.
Helenium conditum sepe deuoratum.
Oleum amygdalinum.
Oleum cucinum.
Pinei nuclei melle, aut saccharo excepti, & deuorati.
Larigna, aut terebinthina resina epota.
Pix ex melle lineta.
*Persici lachryma ex mulso, aut bechy decocto pota ad
dito croci momento.*
Amygdala.
Nuclei pinei.
Oleum de nucibus Indicis.
*Cochlea magna semicocta deuorata, primo die vna,
sequenti dua, tertio tres, quarto dua, quinto vna.*
*Brassica caulium medulla ex cremore amygdalino
decocta & cum melle in eclegmate parata.*
Sonchi lacteus succus in potu sumptus.
Trasorum cremor e carniuum iure paratus, potus.
Porrum coctum, & ex melle delinctum.
*Capa elixa, aut sub prunis tosta, & cum saccharo de
uorata, & butyri recentis momento.*
Sinapis semen in cibo vel potione exhibitum.
Ari radice decocta, melle, excepta deuorata.
Eade cineribus tosta, & ex amygdalino oleo exhibit.
Agaricum in potionibus additum.
Gentiana & eius aqua stillatitia.
Aristolochia rotunda.
Glycyrrhiza radice & eius succus.
Veronica mas.
Salua.
Gattaria.

PECTORIS ET PULMONIS

Hyssopum.
Menthastrum.
Calamintha.
Amaraci decoctum.
Imperatoria radix.
Sena decoctum vel dilutum potum.
Sagapenum ex Helenij, aut hyssopi decocto potum.
*Botrys decoctum, aut ipsa herba, ex daleis radice de
cocto pota.*
Armenia terra delincta.
*Vtriusque securidaca semen ex melle, aut defruto de
linctum.*
Stibium nostrum potum.
Scabiosa quoquo modo usurpata.
*Cnici seminis medulla saccharo eclegmatis modo ex
cepta.*
*Quinta essentia nostra cum iulapio violaceo frequen
ter pota.*

DIOSCORIDIS

Ad cullum.

Iris illyrica assumpta.
Cardamomum ex aqua potum.
Cinnamomum deuoratum vel potum.
*Calamus odoratus suffitus per se, vel ex resina tere
binthina.*
Helenij eclegma ex melle deglutitum.
Myrrha ad quantitatem fabae deuorata.
Styrax
Bdellium } data in eclegmate.
*Terebinthina resina ex se, vel ex melle eclegma de
linctum.*
Mastix pota.
Iuniperi bacca bibita.
Cedri fructus deuorati.
Paliuri semen potum.
Ladanum in medicamentis, & malagmatibus insertum.
Cerasi gummi cum vino diluto exhaustum.
Amygdala amara cum melle, & lacte in illinctu data.
Gummi amygdalarum amararum cum vino diluto potum.
Nuces auellana cum aqua mulsa pota.
Ficus sicca deuorata.
Chamaedryos decoctum potum.
Scordium potum.
Tussilago sicca sumpta, siue incensa, accepto fumo per os.
Propolis suffita.
Mel deglutitum.
*Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lingendum cu
mentha, & butyro data.*
Farina auena cremor in sorbitione receptus.
Semen lini cum melle, & pipere sumptum.
Faba in cibis accepta.
Raphan^o elix^o maducatus, praesertim in vetere tussi.
Dracunculi maioris radice tosta, & elixa deuorata.
Asphodeli radice trium drachmarum pondere pota.
Allium crudum & coctum assumptum in veteri tussi.
Irionis semen cum melle linctum.
Piper delinctu acceptum.
Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tussibus.
Centaurij maioris radice hausta, in antiqua.
Tragacantha in eclegmate cum melle.
Hyssopum cum melle, fico, rutaq, ex aqua decoctum.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Stæchas eodem modo parata.
 Origanum in eclegmate cum melle linctum.
 Tragoriganum eodem modo paratum.
 Baccharis radicum decoctum potum, in diutina.
 Panaces cum vino dulci potum.
 Sefelis Massiliensis radix, & semen haustum.
 Smyrny radix comesta.
 Dauci semen potum in diutina.
 Pencedani succus in ouo sumptus.
 Laserpitij liquor in forbili ouo datus.
 Marruby decoctum, sine expressus succus bibitus.
 Galbanum deglutitum, in vetere.
 Helxina succus cyathi pondere bibitus in diutina.
 Equiseti radix, & herba pota.
 Iunci decoctum bibitum.
 Papaneris vascula in aqua ad dimidium decocta, decoctoq; addito melle, vt eclegma fiat ad lingendū.
 Hyoscyami semen potum.
 Verbasci decoctum potum, in antiqua.
 Cacalia radix vino madesacta comesta.
 Bryonia cum melle in eclegmate delincta.
 Vna passa alba caro exiccata deuorata.
 Aqua mulsa pota.
 Thapsia illita.
 Vinum hyssopites bibitum.
 Sandaracha suffita cum resina, accepto vapore per fistulam vel traiectorium.
 Sulphur in ouo sumptum, vel suffitum.
 MATTHIOLI
 Acori decocti vapor hianti ore exceptus.
 Phu radix cum dulci radice, vnis passis & semine amiscata.
 Cassia solutina pulpa cum decocto hyssopi sumpta.
 Helenium conditum deuoratum.
 Eiusdem sicci farina sumpta.
 Oleum dulcium amygdalarum potum.
 Catapotia. X. ex thuris drachma, & agarici scrupulis quaternis cum hyssopi succo formata, & ex ys vnum ad introitum lecti sumptum.
 Larigna resina in eclegmate delincta.
 Nuclei pinei melle & saccharo excepti & deuorati.
 Mumia ex rixyphar. hordei, & myxor. decoct. epota.
 Cupressini coni impari numero minutissime triti, & ex vino vetere hausti.
 Siliquarum decoctum potum.
 Persici lachryma ex mulsa, aut bechij decocto pota.
 Sebestena.
 Zizypha.
 Saccharum candi vocatum.
 Fenugraci decoctum potum.
 Melopeponum seminum cremor.
 Eruca cocta & cum saccharo sumpta.
 Trasorum cremor haustus.
 Porrum coctum ex melle delinctum.
 Cepa elixa, aut cineribus tosta ex saccharo & butyro deuorata.
 Ari radix cocta ex amygdalino oleo sumpta.
 Lac potum, in quo Ari radix fuerit incocta.
 Agaricum in potionibus additum.
 Glycyrrhiza radix, & eius succus.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Veronica mas in sua ipsius stillatitia aqua hausta.
 Salua.
 Botrys herba ex dulcis radicis decocto pota, aut eius decoctum.
 Consolida Regalis flores poti.
 Vna passa quoquo modo vsurpata.
 DIOSCORIDIS.
 Ad pectoris asperitates.
 Glycyrrhiza succ^o in ore retent^o quousq; colliquefeat.
 Radix cacalia in vino madesacta & delincta.
 MATTHIOLI
 Cassia solutina pulpa hausta, & deuorata.
 Amygdalinum oleum.
 Sesaminum oleum.
 Persici arboris lachryma ex mulsa, aut bechij aqua hausta.
 Porrum coctum ex melle delinctum.
 Tragacantha lachryma.
 DIOSCORIDIS.
 Ad vocem expediendam.
 Myrrha lingua subdita, quousque tota liquefeat.
 Tragacantha ex melle in delinctu adbibita.
 Laser aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.
 Styrax delinctus.
 Brassica commanducata.
 Vinum hyssopites.
 MATTHIOLI
 Iridis radicis decoctum potum.
 Iridis radices condita deuorata.
 Amygdalinum oleum }
 Sesaminum oleum } potum.
 Cnicinum oleum }
 Styrax hausta.
 Persici arboris lachryma ex mulsa pota.
 Oleum e nucibus Indicis.
 Malua cocta & in cibis apposita.
 Porrum coctum cum melle sumptum.
 Glycyrrhiza radix, & eius succus.
 Vna passa in cibis deuorata.
 DIOSCORIDIS.
 Ad pleuritim.
 Snillus adeps ex vino lotus, & cū cinere & calce coctus impositus.
 Pastinaca erratica semen potum.
 Sagapenum emplastri modo illitum.
 MATTHIOLI
 Terebintina resina hausta.
 Pomū dulce cineribus incoctum, & glycyrrhiza succo amylo & saccharo conspersum deuoratum.
 Amygdala & earum lacteus cremor cum saccharo.
 Cochlea testis exuta ex ptisana hordeacea absorpta.
 Eadem contusa, & loco dolenti adalligata.
 Seminis lini oleum recens potum selibra pondere.
 Glycyrrhiza radix, & eius succus.
 Cardui benedicti stillatitia aqua pota vna cum seminis semidrachma.
 Antemidis decoctum potum, vel eiusdem florum stillatitia aqua.
 Syrupus deiectorius ex violarum diluto paratus.
 DIOSCORIDIS.
 Ad lateris dolores.
 Fimum caprillum cum cera & oleo subactum, impositum.

PECTORIS, ET PVLMONIS.

Hordeacea farina una cum meliloto & papauerum
vasculis ex mulso elixa illita.
Brassica caules virides cremati & suillo adipe exce-
pti & impositi.
Leucacanthae radice ex vino decoctum haustum.
Asphodeli radix drachma pondere ex vino pota.
Gentiana radicū succus drachma pondere sumptus.
Aristolochia rotunda ex aqua bibita.
Centaurij maioris radix pota.
Laser in sorbitionibus datum.
Galbanum illitum.
Marrubij folia ex melle adhibita.
Trifolij bituminosi folia, semen ve potum.
Aethiopsis pota.
Acori decoctum potum.
Costus cum absinthio, & vino potus.
Agallochum ex aqua potum.
Myrrha faba pondere deuorata.
Bdellium haustum.
Resina terebinthina illita, appositae.
Bryonia ex melleo eclegmate delincta.
DIOSCORIDIS.
Ad pulmonis inflammationes.
Ocimum cum polenta illitum.
Vrtice utriusque semen cum melle delinctum.
Tragoriganum ex melle in eclegmate sumptum.
Chrysocome pota.
Aqua mulsa hausta.
Pulmonaria.
Lentis palustris stillatitia aqua pota.
DIOSCORIDIS.
Ad purulentas excreationes.
Iriionis semen cum melle delinctum.
Betonica folia drachmarum duarum pondere in aqua
mulsa cyathis quatuor pota.
Personata radix cum pineis nucibus sumpta.
Aethiopsis hausta.
Vinum hyssopites.
Sandaracha ex mulso data (hoc medicamentum ego
nunquam probauerim.)
Sulphur in ouo potum, vel suffitum.
MATTHIOLI.
Larigna resina, & terebinthina in eclegmate delinēt.
Pinei nuclei melle, aut saccharo excepti, & deuorati.
Terebinthina resina deuorata.
Pix liquida cum melle mista, & deuorata.
Vlmi folia, qua orientem spectant, impari numero
decerpta & cum totidem piperis granis contrita,
ex vino cretico hausta.
Amygdala & earum lacteus cremor.
Nuclei pinei.
Tragacantha lachryma delinēt.
Glycyrrhiza succus.
Veronica mas in sua ipsius aqua propinata.
Botrys decoctum diebus pluribus potum, aut herba ex
glycyrrhiza decocto hausta.
Scabiosa farina pota, aut recentis herba succus cum
melle delinētus, & totius planta decoctum pluri-
bus diebus haustum.
Pulmonaria quomodolibet usurpata.
DIOSCORIDIS.
Ad asthmaticos.
Lauri bacca ex melle vel passo accepta.

PECTORIS, ET PVLMONIS.

Ficus sicca cum hyssopo feruefacta & pota.
Vrina impubis pota.
Ruta epota.
Cyclamini alterius semen potum.
Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle
in eclegmate sumpta.
Aqua mulsa pota.
Sphondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.
Equiseti radix, & folia hausta.
Cnici seminis medulla ex saccharo eclegmatis modo
sumpta.
Scabiosa, & eius succus, atque decoctum quomodo li-
bet usurpata.
Abrotoni utriusque semen tritum, & cū aqua potū.
Hyssopū cū fico, melle, rutaq, ex aqua decoctū potum.
Calamintina decoctum potum.
Vinum hyssopites haustum.
Thymi cum melle decoctum potum.
Satureia cum melle hausta.
Seseli Massiliense potum.
Fidicula sine trichomanis decoctum bibitum.
Cuminum cum posca sumptum.
Smyrniij radix comesta.
Thapsia illita.
Ammoniacum bibitum.
Melissophylli folia in eclegmate delinēt.
Tussilago sicca, & suffita, adeo vt fumus in os ingre-
diatur.
Hippophaesti succus trium obolorum pondere haustum.
Botrys pota vel in eclegmate data.
Periclymeni semen potum.
Adianthi decoctum bibitum.
MATTHIOLI.
Iridis radices condita.
Phu radix cum dulci radice, & semine anisi decocta.
Cubeba deuorata.
Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.
Cassia solutina pulpa cum hyssopi decocto pota.
Balsami factitij liquores, & oleum haustum.
Amygdalarum amararum oleum potum.
Cnicinum oleum bibitum.
Myrrha hausta.
Styrax deuorata.
Terebinthina sine larigna resina insumpta.
Pix liquida ex melle pota.
Carica dua, aut tres in aqua vite macerata deuorata.
Erui farina melle excepta & delinēt.
Sonchi lacteus succus potui datus.
Porrum coctum ex melle delinētum.
Cepa elixa, aut cineribus tosta addito melle, & buty-
ro, deuorata.
Sinapis, aut nasturtij semen in cibo aut potione ex-
hibitum.
Ari radix cocta & ex melle delinēt, aut ex amygda-
lino oleo.
Agaricum in potitionibus additum.
Gentiana & eius aqua stillatitia.
Aristolochia rotunda hausta.
Centaurij magni radix.
Veronica mas.
Hyssopum.
Salvia.

PECTORIS, ET PVLMONIS.

Salvia.
 Menthastrum.
 Gattaria.
 Amaracus.
 Senæ decoctum vel dilutum.
 Sapagenum ex helenij, vel hyssopi decocto potum.
 Botrys herbe decoctum, addito violaceo melle, aut
 herba ipsa & glycyrrhizæ decocto.
 Securidacæ utriusq; semen ex melle, aut de fruto de-
 linctum.
 Quinta essentia nostra com. de vino descripta pota.
 Stibium nostrum quatuor granorum pondere potum.

DIOSCORIDIS.
 Ad tenitentes excreationes.

Iris illyrica pota.
 Coagulum fere omne potum.
 Raphanus elixus deuoratus.
 Porrum cum ptisana coctum esui datum.
 Nasturtium coctum in sorbitione datum.
 Bulbi breui coctura elixi, & in cibum sumpti.
 Ammoniacum in eclegmate datum.
 Scordium potum.
 Thapsia limita.
 Lini semen in eclegmate delinctum.
 Scilla sicca oboli tres ex melle in eclegmate exhibiti.
 Marrubium siccum potum cum iridis farina.
 Vinum hyssopites haustum.

MATTHIOLI

Iridis radices decoctum potum.
 Oleum amygdalinum.
 Pinei nuclei melle, aut saccharo excepti & deuorati.
 Terebinthina resina in eclegmate delincta.
 Erui farina melle excepta & delincta.

Agaricum.
 Veronica mas.
 Hyssopum.
 Pulmonaria quoquo modo sumpta.
 Salvia.
 Scabiosa puluis quinetiæ succus atq; decoctum hausta.

MATTHIOLI
 Ad purgandum pectus.

Terebinthina resina deuorata.
 Agaricum in potionibus additum.
 Hyssopum.
 Salvia.
 Senæ decoctum vel dilutum.
 Scabiosa in puluerem trita, tum eius succus cum melle
 delinctus, aut herbe decoctum pluribus diebus
 haustum.

DIOSCORIDIS.
 Ad pectoris destillationes.

Irionis semen cum melle delinctum.

MATTHIOLI

Agaricum.
 Veronica mas.
 Salvia.
 Armenia terra ex rhodosaccharo delincta.

DIOSCORIDIS.
 Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comestum.
 Glycyrrhizæ succus bibitus.
 Thymus mellis mistus in delinctu sumptus.
 Thymbra eodem modo parata.

PECTORIS, ET PVLMONIS.

Tordilij radix in eclegmate cum melle sumpta.
 Libanotis radices pota.
 Symphytum petraeum in mulso decoctum bibitum.
 Quinquifolij radices succus potus.

MATTHIOLI

Iridis radices decoctum potum.
 Iridis radices condita.
 Terebinthina deuorata.
 Veronica mas.
 Glycyrrhiza.
 Vna passa quomodo libet usurpata.

MATTHIOLI
 Ad empyematicos.

Pulmonaria & eius succus ex melle deuorata.
 Scabiosa puluis, succus atque etiam decoctum potum.

DIOSCORIDIS.
 Ad pectoris vulnera.

Caryophyllata
 Potentilla
 Alchimilla
 Bistorta
 Tormetilla } radices. } in vino decocta, & deinde de-
 } } coctum ipsum potui datum.
 Solidagine omnes
 Sanicula
 Auricula vrsi
 Pilosella
 Amarant hi purpurei stes potus.
 Pyrola in potionibus addita, potionem eius vulnera-
 riam admirabilis operationis reperies libr. 4. cap.
 16. comment. de Limonio.

Vna passa deuorata.

CORDIS.
 DIOSCORIDIS.
 Ad deliquium animi.

Cucumis olfactus.
 Pulegium ex aceto naribus admotum.
 Buglossum potum.

MATTHIOLI

Nardi Italica, aut lauedula aqua pota & arterijs illita.
 Cinnamomi stillatitia aqua pota.
 Santalum omne potum & olfactum.
 Moschus potus & illitus.
 Confectio e moscho deuorata.
 Zibetum illitum.
 Ambarum potum & impositum, aut olfactum.
 Ocimum ex aceto naribus admotum.
 Storzoneræ radix, aut eius succus potus.
 Caryophylli commansi, vel naribus admoti.
 Caryophylli flores quocunq; modo sumpti.
 Zedoaria commansa.
 Mentha olfacta.
 Melissophyllon & eius stillatitia aqua.
 Phyllitidis stillatitia aqua.
 Caryophyllata radices olfacta.
 Angelica radix pota.

Borraginis atque etiam vulgaris buglossi decoctum
 potum, aut vino admistum & haustum.
 Vinum odoratum, generosumq; in faciem proiectum,
 ac etiam potum.

Quinta essentia nostra lib. 5. commen. de vino descri-
 pta, tam pota, quam arterijs, & naribus illita, &
 in faciem proiecta.

C O R D I S.
D I O S C O R I D I S.
Ad cardiaca.

Intybus per se, & cum polenta illita.
Absinthium in passo decoctum & appositum.
Rubi folia illita.

M A T T H I O L L

Nardi Italica aut lauendula stillatitia aqua pota.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Santalum omne potum, & epithematibus additum.
Moschus potus & illitus.
Ambarum potum.
Agallochum.
Mumia ex aqua mentha pota granorum quatuor
pondere.
Rosarum succus & dilutum potum.
Caryophyllata olfacta.
Vinum in quo gagates lapis ignitus extinctus fuerit
potum.

Cardiaca herba pota.
Angelica radix hausta.
Borrago, aut vulgare buglossum quouis modo sumptum.
Rhodosaccharum deuoratum.
Myrti bacca quoquo modo hausta.
Aurarij, limonumq; florum stillatitia aqua pota.
Citria mala.

Aurantia mala.
Limonia mala.
Pama Adami.
Pyræ cocta deuorata.
Sericum in antidotis additum.

Margarita pota.
Cervi cordis os potum.
Scorzoneræ radix, aut succus potus.
Caryophylli in cibis usurpati.
Caryophyllorum flores ex Melissa phylli decocto poti.
Zedoaria commansa, aut in potionibus addita.
Eryngij radix ex buglossi Melissa phylli uel decocto pota.
Saccharum è roris marini floribus paratum.
Vincetoxici radix cum citrei mali semine, & buglossi
aqua hausta.

Phyllitidis stillatitia aqua.
Trifolium acetosum.
Melissophyllon quocumq; modo haustum.

M A T T H I O L L
Ad tremorem cordis.

Galanga è succo plantagininis pota.
Cinnamomi aqua stillatitia.
Myrti bacca quoquo modo hausta, aut deuorata.
Scorzoneræ radix, aut eius succus potus.
Vincetoxici radix cū citrii mali semine ex aqua oxalidis pota.

Melissophyllum.
Phyllitidis stillatitia aqua.
Caryophyllata olfacta.
Quinta essentia nostra, lib. s. commen. de vino descripta, unciâ pondere pota.

Aurum haustum.
Corallium ebibitum.
Margarita deuorata.

M A T T H I O L L
Ad pulsam cordis.

Scorzoneræ radix, aut eius succus potus.

M A M M A R V M.

Vincetoxici radix cum citrei mali semine ex buglossi
aqua hausta.
Melissophyllum.
Phyllitidis stillatitia aqua.
Quinta essentia nostra, lib. s. commen. de vino descripta, unciâ pondere pota.
Aurum haustum.
Corallium in potu sumptum.
Margarita in potionibus addita.

M A T T H I O L L
Ad cordis dolorem.

Viridis pintus acicula cōtrita, & ex vino optimo pota.
Scorzoneræ radix, aut eius succus potus.
Melissophyllum.
Phyllitidis stillatitia aqua.
Quinta essentia nostra, descripta lib. quint. commēt. de vino, pota.
Aurum tritum & ebibitum cum corallio, & Margaritis.

D I O S C O R I D I S.
Ad præcordiorum duritiem.

Rhaponticum potum.
Vinum absinthites potum.

M A T T H I O L L
Ad vetustas præcordiorum inflammationes.

Scordium cum cera coactum impositum.

M A M M A R V M.
D I O S C O R I D I S.
Ad mammarum inflammationes.

Thus cum cimolia & rosaceo inunctum.
Cydonia mala cataplasmatibus adiecta & illita.
Nuces iuglandes cum ruta & exiguo melle imposita.
Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.
Asphodeli radices & folia ex vino exhibita.
Iriionis semen illitum.
Hemerocallis radix emplastri modo imposita.
Althæa decocta & superposita.
Vuarum vinacei cum sale illiti.
Ostracites lapis cum melle impositus.
Geodes lapis cum aqua illitus.
Terra Samia ex rosaceo, & aqua imposita.

M A T T H I O L L

Hyoscyaminum oleum illitum.
Ouum gallinaceum crudum ex rosaceo impositum.
Oryzæ farina decocta & emplastri modo adhibita.
Portulaca contusa & illita.
Trifolium acetosum impositum.
Lenticula palustris aqua tum pota tum illita.
Oleum è fructu momordicæ illitum.
Vnguent. ex oleo in mortario plumbeo & pistillo paratum.

D I O S C O R I D I S.
Ad rigentes à partu mammas.

Triticæ surfures ex ruta decocto elixi & appositi.
Baccharis folia emplastri modo adhibita.
Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus addita.
Hyoscyami semen tritum ex vino illitum.
Ricini folia imposita.
Vuarum vinacei cum sale illiti.

M A T T H I O L L

Cancri crudi triti & illiti.
Marrubium cum vetere acingia tritum & illitum.

M A M M A R V M.
D I O S C O R I D I S.

Ad induratas mammas.

Erui farina emplastri modo imposita.

Chamaepitys prima ex melle illita.

Vuarum vinacei cum sale triti & impositi.

D I O S C O R I D I S.

Ad mammas exulceratas.

Conchula Indica cinis illitus.

Asclepiadis herba radices imposita.

M A T T H I O L L

Aparina farina inspersa.

Vnguentum ex oleo cum mortario & pistillo plumbeo paratum.

M A T T H I O L L

Ad Papillarum rimas.

Oleum è luteis ouorum illitum.

Pomata illita.

Aparina succus illitus.

D I O S C O R I D I S.

Ad lac in Mammis concretum.

Cera grumi decem granorum milij magnitudine sumpti.

Fabarum lomentum per se, & cum polenta impositum.

Lentium farina illita.

Apium & eius succus illitus.

M A T T H I O L L

Mentha recens mammis illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad extinguendum lac.

Cicuta imposita mammis.

M A T T H I O L L

Cucurbita recentia folia imposita.

D I O S C O R I D I S.

Ad Lactis vbertatem praestandam.

Halimi folia in cibis sumpta.

Viticis semen potum.

Ptisana hordeacea cum feniculi semine cocta & in cibum sumpta.

Malua decoctum potum.

Sonchi succus haustus.

Lactuca in cibis recepta.

Ocimum deuoratum.

Eruca comesta.

Anemone & eius caules cum ptisana hordeacea deuorati.

Anisum potum.

Anethi aridi seminis, & coma decoctum haustum.

Feniculum in cibo sumptum.

Nigella pluribus diebus pota.

Circea semen in sorbitione potum.

Clematis prima in cibis accepta.

Echij radix in sorbitione, vel cum vino hausta.

Glaux cum hordeacea farina, sale & oleo cocta & deuorata in sorbitione.

Bryonia succus cum tritico coctus, in cibum sumptus. sed hic prudentia opus est.

M A T T H I O L L

Vngularum asini aut vaccarum cinis potus ex ptisana.

Cicerum decoctum potum.

Brassica cocta & longo pipere aspersa, una cum iure deuorata.

Cardui benedicti radice puluis addito feniculi semine, & longi piperis momento ex ptisana haustus.

Crystallum in tenuissimum puluerem tritum potum.

D I O S C O R I D I S.

Ne lac in mammis concreseat.

V E N T R I C V L L

Mentha cum polenta imposita.

Vini fax cum aceto peruncta.

M A T T H I O L L

Fabarum farina illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad mammas prohibendas ne nimis crescant.

Cicuta contrita & imposita.

Cotes naxia illita.

M A T T H I O L L

Aqua è nucibus pineis immaturis destillata & imposita cum linteolis.

Alchimilla seu stellaria stillatitia aqua, aut succus, aut decoctum, cum linteolis adhibita, admixtis hypocistide, equisetis, rosis & alumine.

V E N T R I C V L L

D I O S C O R I D I S.

Ad vomitiones, & nauream.

Cotoneorum malorum maceratorum liquor haustus.

Nardus Indica

Nardus Celtica } ex aqua pota.

Palmula in cibo sumpta.

Palmularum inuolucrum cataplasmatibus conferentibus adiectum.

Gallinaceorum ventriculi interior folliculus siccus, tritusq; cum vino potus.

Succinum haustum.

Faba in posca decocta, & in cibum sumpta.

Lentis XX. grana sine cortice deuorata.

Phaseolus in cibo acceptus.

Sisymbrium haustum.

Rubi folia exterius illita.

Lactuca illota deuorata.

Lens syluestris esui data.

Scilla sicca pota.

Agaricus trium drachmarum pondere per se absq; liquore sumptus.

Gentiana radice succus cum aqua potus.

Alba spina radix hausta.

Mentha duo, tresve rami cum acida punice succo poti.

Paeonia semen ex vino nigro potum.

Betonica commanducata, moxq; vino aqua misto superbibito.

Vitis vinifera foliorum, capreolorumq; succus potus.

Myrtites vinum potum.

Vini fax illita.

Scillinum vinum potum.

M A T T H I O L L

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Musci arborei dilutum ex vino paratum potum.

Pseuoberberi bacca.

Ribes vulgare.

Vua spina.

Poma austera cineribus incocta deuorata.

Cydoniorum pomorum vinum, oleum, caro, confectum.

Indem succus, in quo conferbuerint corallium, rosarum semen, rhabarbarum, hypocistis, acacia.

Mespilorum siccorum puluis, rosarum rubearum succo exceptus, additis corallio, caryophyllis & nucis myristica.

Malua

V E N T R I C V L L

Malua semen ex rubro vino potum.
*Caryophylli ex vino austero, aut malorum cydonio-
rum succo poti.*
*Iidem cum mastiche, rhoe, corallijs, & balaustris ven-
triculo illiti.*
Punicorum malorum vinum potum.
Iaspis viridis lapis super os ventriculi gestatus.
Mentha sicca e mali punici vino sumpta.
Mentha graeca succus tam potus quam illitus.
*Rosmarinum in puluerem contritum cum pane de-
uoratum, aut meraco potum.*
*Lagopi folia, panicula, ac semen ex vino austero, aut
punici mali pota.*
Sanguisorba siue sorba strella hausta.
Pulmonaria altera.

D I O S C O R I D I S.

Ad celiacos.

Lycium potum & inditum.
Cotonea mala cruda comesta.
Mora immatura siccata, & usaq; obsonijs immista.
Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathi exhibitum.
Myrica in potu data.
Galle cum aqua aut vino trita, & illita.
Rhois semen obsonijs inspersum.
Myrti folia trita & ex aqua illita.
Olea syluestris folia cum polenta illita.
*Coagulum leporinum, & equinum trium obolorum
pondere ex vino potum.*
Faba in posca decocta, & deuorata.
*Aegyptiae fabae farina, & corticis ipsius decoctum ex
mulso datum.*
Oxylapathi, aut oxalidis semē in aqua, aut vino potū.
Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.
Hyacinthi semen potum.
Coronopus decoctus in cibo sumptus.
Rhaponticum potum.
Spinae albae radix pota.
Ferula viridis medulla bibita.
Lasertij liquor in vna acino sumptus.
Nymphaeae radix siccata, & in vino bibita.
Clymeni succus potus.
*Limonij herba semen acetabuli pondere ex vino
sumptum.*
Tragi herba acini decem ex vino bibiti.
*Papaueris vasculorum decoctum ex melle in ecleg-
mate redactum in delinctu. Si vero efficacius red-
dere velis adiungito hypocistidis, & acaciae succū.*
Vuarum vinaceorum decoctum potum.
Vinaceorum nuclei in farinam polentae modo inspersi.
Aqua vel vinū, in quibus ferrū extinctū fuerit pota.
Morochthus lapis potus.
Vinum myrtites potum.
Adiantum ex vino bibitum.
Trichomanes ex vino pota.

M A T T H I O L L

Galanga ex succo Plantaginis pota.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Musci arborei dilutū in vino austero paratū haustū.
Thus tam potum quam illitum.
*Mali punica e floribus paratum saccharum ex vino
austriusculo sumptum.*
Myrticum condimentum.

V E N T R I C V L L

Cydoniorum vinum, mīna & oleum.
Cydoniorum confectio.
Mespila. Sorba.
Pyra syluestris.
Pruna syluestris.
Nux myristica.
Mora immatura.
*Cochlea dua vna cum testis contrita, & ouis gallina-
ceis duobus exceptis, ex vino passo, & aqua prius
calesacta pota.*
Anguium senecta rosaceo incocta, & imposita.
*Oryza prius torrefacta & in lacte, in quo calculi fue-
rint extincti, decocta in cibum sumpta.*
Sonchi decoctum ex vino potum.
*Caryophylli ex vino, aut malorum cydoniorum succo
hausti.*
Mentha sicca cum amylo, & aqua pota.
Anethum tostum cum mentha exhibitum.
Coriandri semen ex aqua.
*Rosmarini puluis cum pane deuoratus, aut ex mero
haustus.*
Amaranthi purpurei flos potus.
Malorum punicorum vinum potum.

D I O S C O R I D I S.

Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.
Cochlea vepribus inherentes deuorata.
Peponis radix sicca dra. pondere ex hydromelite pota.
Bulbus vomitorius deuoratus.
*Origanum cum rhois semine & capis in cupreo vase
diebus quadraginta, dum canicula sydus flagrat,
insolatum potum.*
Lemnia terra pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.
Bulbi comesti.
Rhaponticum bibitum.
Absinthium in passo decoctum potum.
Melilotum ex vino decoctum haustum.
*Artemisia tenuia folia ex oleo contusa emplastri mo-
do imposita.*
Nymphaeae radix illita.
Senecionis caulis in passo decoctus, deuoratus vel potus.
Alabastrites lapis cum cerato impositus.

M A T T H I O L L

Cassiae solutivae pulpa.
Ricininum oleum illitum, potum & infusum.
Amygdalinum oleum potum.
Laurinum oleum illitum.
Mastiches grumi tres deuorati abeuntibus cubitum.
*Myristica nucis decoctum ex rhodomelle & aqua vi-
ta potum.*
*Sisymbrium calesactū & vino cretico aspersum im-
positum.*
Aloe deuorata aut pota.
*Quinta essentia nostra, libr. s. cap. de vino descripta,
pota vbi a frigiditate prouenit dolor.*

D I O S C O R I D I S.

Ad ventriculi erosiones.

Nardus Indica } ex aqua pota.
Nardus Celtica }

VENTRICULI

Iuncus odoratus potus.
Sycomori succus potus.
Pinea nuce deorata.
Lac humanum potum.
Sonchi succus bibitus.
Pulegium cum posca sumptum.
Hieracij utriusque succus haustus.
Scordium duarum drachmarum pondere cum mulla potum.
Paeonia semen ex vino nigro potum.

MATTHIOLI

Amygdalarum dulcium oleum potum.
Sesaminum oleum potum.
Pinei nuclei melle, aut saccharo excepti, & cum succo portulacae hausti.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.
Sonchus emplastri modo impositus.
Umbilici Veneris succus illitus.
Intybus utraque ex aceto deorata.
Glycyrrhiza succus potus.
Apium ebibitum.
Feniculum cum frigida aqua potum.
Polygonum illitum.
Solani hortulani folia apposita.
Chamadaphnes folia hausta.
Vitis vinifera folia, & capreoli emplastri modo adhibiti.
Labrusca flos illitus.

MATTHIOLI

Cassia solutiva pulpa sumpta.
Santala pota vel aqua rosacea foris illita.
Cressini, vna spina, ribisq; vulgaris bacca deorata.
Rhodofaccharum.
Quercus recentia folia in ore contenta.

Citria
Aurantia } mala.
Limonia }

Melopeponum seminum lacteus cremor potus.
Glycyrrhiza radix & eius succus.
Phyllitidis pulvis sua ipsius aqua exceptus & illitus.
Trifolium acetosum deoratum.
Consolida regalis flores poti.
Fraga deorata.

Lenticule palustris stillatitia aqua pota.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi flatum.

Mei radices ex aqua feruefacta, vel citra coctionem trite pota.
Nardi Indica & Celtica ex aqua pota.
Castoreum bibitum.
Gallinaceorum senescentium ius potum.
Absinthium cum seseli, aut Gallica nardo potum.
Ligustici semen, & radix pota.
Smyrny semen haustum.

MATTHIOLI

Cubeba deorata.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Calamus odoratus vulgaris haustus.
Oleum ricinivum illitum, potum & infusum.
Balsami factitij aqua cum carniuum iure sumpta.

VENTRICULI

Cnicinum oleum potum.
Laurinum oleum illitum.
Mumia ex cumini, ammi & cari decocto sumpta.
Oleum nostrum descorpionibus illitum.
Castoreum ex oxycrato potum.
Milium torrefactum cum sale mistum, & antihemide in sacculo impositum.
Mentha tam illita, quam pota.
Menthastrum.
Mentha Graca.
Salvia.
Gattaria.
Imperatoria.
Tanacetum.
Quinta essentia nostra, lib. s. c. de vino descripta, pota.

DIOSCORIDIS.

Ad singulum.

Sisymbrij semen in vino potum.
Rhaponticum haustum.
Aristolochia rotunda bibita.
Mentha duo, tresve rami cu acide punice succo poti.
Anethi coma, & seminis decoctum potum.
Cuminum erraticum cum aceto potum.
Alysson potu, siue manib. gestatu, vel narib. infusum.
Aspleni decoctum potum.
Periclymeni semen potum.
Saxifraga bibita.

MATTHIOLI

Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Mumia hausta ex cumini aut apij decocto.
Castoreum cum mulla potum.
Rhabarbarum ex vino haustum.
Anethum cum haustum, tum olfactum.
Phyllitidis stillatitia aqua pota.
Quinta essentia nostra, lib. s. cap. de vino descripta, vncia pondere pota, ubi ex repletionem fuerit singultus.

DIOSCORIDIS.

Ad acidum ructus.

Agaricus drachma pondere sumptus.
Tragoriganum potum.
Betonica folia faba podere ex despumato melle sumpta.

MATTHIOLI

Coriandrum cochlearij mensura exhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem & lac in ventriculo concreta.

Ficulnei cineris lixiuum potum.

Coagula	{	Equinum	} trium obolorum pondere ex vino potum.
		Leporinum	
		Agninum	
		Hadinum	
		Hinnulinum	
		Vitulinum	
		Bubalinum	

Helichrysi coma cum mulso pota.

Lasfer potum.

MATTHIOLI

Cyclamini radices stillatitia aqua senis vncijs pota, cum sacchari vncia vna.
Consolida media succus epotus.
Auricula vrsi.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi inflammationem.

VENTRICULI

Hieracii maius & minus emplastri modo impositum.
Vitis vinifera folia & capreoli cum polenta impositi.
Viola purpurea ex polenta illita.

MATTHIOLI

Cassia solutina pulpa sumpta.
Santala omnia tam sumpta quam illita.
Rosa illita.

Consolida regalis flores illiti.
Lentis palustris stillatitia aqua pota.

MATTHIOLI

Ad famem caninam.

Glirium pinguium caro assa deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad appetentiam ciendam.

Piper comestum.

Acetum in obsonijs additum.

Absinthium potum.

MATTHIOLI.

Cressini bacca.

Vua spina.

Ribes vulgare.

Sinapisimum.

DIOSCORIDIS.

Ad concoctionem iuuandam.

Eruca in cibo comesta.

Piper omne comestum.

Gingiberis vsus.

Scilla cum melle cocta & deuorata.

Absinthium haustum, vel ventriculo adhibendum.

Tragoriganum potum.

Pulegium potum.

Ligustici semen, & radix pota.

Seselis Massiliensis semen cum vino potum.

Garum potum.

Betonica folia post cenam sumpta, addito melle de-
spumato fabae magnitudine.

Vinum absinthie.

MATTHIOLI.

Acori radices & cinnamomi drachm. ex vino absinth.

Galanga.

Nardus Italica.

Lauendula.

Cubebe.

Cinnamomi stillatitia aqua hausta.

Caryophylli hausti.

Crocum.

Ladanum drachma pondere duabus horis a cena de-
uoratum.

Pyrum vel cydonium cineribus tosta & deuorata.

Pistacia.

Citria condita.

Iuglandes condite.

Nax myristica.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi fluxiones.

Adiantum potum cum vino.

Persici mali sicci decoctum & bibitum.

Cotonci mali macerati liquor potus.

MATTHIOLI.

Myrteum condimentum.

MATTHIOLI

Ad restinguendam sitim.

Cressini bacca.

Vua spina.

IECINORIS.

Ribes vulgare.

Citria

Limonia } mala.

Aurantia }

Pyra:

Portulacae folia lingua subdita.

Melopeponum seminum lacteus cremor.

Angurie pulpa.

Glycyrrhiza radix, & eius succus.

Trifolium acetosum.

Fraga matura deuorata.

Punicorum malorum vinum ex intybi stillatitia aqua,
aut hordei decocto potum.

IECINORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris obstructiones.

Nardus Indica } ex aqua frigida hausta.

Nardus Celtica

Lauri cortex tribus obolis in vino odorato potus.

Picea folia drachma pondere in aqua, aut mulsu pota.

Amygdala amara cum melle, & lacte in illinctu da-
ta nucis auellanae magnitudine.

Gentiana radices succus cum aqua potus.

Agaricum potum.

Rhaponticum exhaustum.

Eryngium ex vino assumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Chamaepityos folia septem diebus in vino pota.

Betonica in aceto mulsu drachma pondere bibita.

Eupatorij herba, aut semen in vino potum.

Papaueris corniculati radix pota.

Rubrica Sinopica hausta.

Glycyrrhiza succus delinctus.

MATTHIOLI.

Nardus Italica & lauendula in decoctis addita.

Asari decoctum.

Carpestium.

Cinnamomi aqua stillatitia pota.

Cassia solutina.

Acorum quocumque modo sumptum.

Amygdalarum amararum oleum potum.

Cnicinum oleum potum.

Rosarum succus & dilutum.

Tamarindorum pulpa.

Amygdala.

Pistacia.

Cicer nigrum & rubrum decoctum & potum.

Ciceris farina ex Intybi stillat. aqua decocta, & illita.

Lupini cocti & cum ruta & pipere deuorati.

Napi semen drachma pondere ex marrubij decocto,
frequenter potum.

Brassica decocta vis.

Beta cum sinapi, aut aceto deuorata.

Cichorium ex vino albo tenui potum.

Cyclamini succus duarum drachmarum pondere potus
cum oxymelite.

Rhabbarum quocumque modo potum.

Gentiana stillatitia aqua pota.

Centaurij magni radix tu pota tu in vino macerata.

Centaurij minoris decoctum & succus.

Cardui radicum decoctum haustum.

Eryngij radicum decoctum potum.

IECINORIS.

Aloe quocunque modo sumpta.
 Veronica mas.
 Mentha græca.
 Amarus.
 Imperatoria radix.
 Senæ decoctum, aut dilutum haustum.
 Rosmarinum frequenter usurpatum.
 Marrubium.
 Eupatorij vulgaris decoctum, aut succus epotus.
 Lupuli flores in potionibus sumpti.
 Frangula corticum decoctum potum: parandi rationem inuenies lib. 4. cap. de sambuco.
 Cuscutæ decoctum potum.
 Quinta essentia ferri, descripta lib. 5. in comm. de ferri scoria, siue stercore, drachma pondere quotidie pota.

DIOSCORIDIS.

Ad morbum regium.

Nardus Indica } hausta.
 Nardus Celtica }
 Ceruinum cornu vstum, ac lotum, potumque.
 Millepedæ, siue onisci ex vino poti.
 Cicer cum roremarino decoctum, comestum.
 Rumicis radices in vino decoctæ & bibitæ.
 Atriplicis semen bibitum cum mulsæ aqua.
 Asparagi radicem decoctum potum cum ficis & cicerib.
 Crithmi et eius radicem seminumq; decoctum potum.
 Iriæ cum melle linctæ.
 Scilla cum melle in eclegmate pondere trium obolorum pota.
 Hirundinaria radix cum aniso, & vino pota.
 Sphondilij semen potum.
 Agaricus drachma pondere sumpta.
 Rhabarbaricum haustum.
 Absinthij decoctum, dilutumve trium cyathorum pondere quotidie haustum.
 Aloe drachma pondere pota.
 Origani decoctum corpori persusum.
 Calamintha cum vino pota.
 Feniculum erraticum potum.
 Libanotis radices pota cum vino & pipere.
 Rarismarini decoctum potum.
 Nigella trita cum Irino unguento, naribus appositæ.
 Chelidoniij radix cum aniso & vino albo pota.
 Laser cum caricis datum.
 Marrubij succus naribus infusus.
 Polij utriusque decoctum bibitum.
 Conyze folia & flores poti.
 Aspleni decoctum potum.
 Lichen ex melle inunctus.
 Adianti decoctum potum.
 Trichomanis decoctum haustum.
 Anthemidis decoctum potum.
 Buphtalmum potum statim à balneo.
 Pæoniæ radix bibita.
 Hyacinthi semen cum vino potum.
 Rubiæ radix cum mulsæ aqua bibita.
 Chamæpityos folia septem diebus in vino pota.
 Betonicæ folia cum dulci aqua pota.
 Elaterium potum.
 Anchusæ radicis decoctum potum.
 Quinque folij succus cum trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.

IECINORIS.

Osyris decoctum potum.
 Chrysanthemum decoctum balnei more adhibitum.
 Vinum scillinum potum.
 Verbenacæ supinæ folia drachma pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina una, ieiunia quadraginta diebus pota.
 Lycij herba in aceto decoctæ & bibita.
 Myrica decoctum potum.
 Halicacabi fructus poti.
 Chamæcissi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.
 Rusci folia & bacca in vino pota.
 Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.
 Sulphur sorbili ovo sumptum.
 MATTHIOLI
 Iridis radicis decoctum potum.
 Nardi Italica, lauendulæve decoctum additis cinnamomo, asparagi & feniculi radicibus.
 Asari dilutum ex vino paratum.
 Asarina, aut eius decoctum.
 Cassia solutina pulpa.
 Rosarum succus & dilutum.
 Tamarindorum pulpa.
 Castoris anteriores dentes in poculo contenti, è quo vinum biberit affectus.
 Terrenorum vermium cinis ex absinthij decocto potus.
 Bubuli fellis lapis ex vino potus.
 Napi semen ex marrubij decocto potum.
 Oxylapathi ex vino decoctum potum.
 Cichoriij radices saccharo condita.
 Cichoriij & eius radicem decoctum potum.
 Melopeponum lacteus cremor haustus.
 Erucæ syluestris tria folia lauam manu decerpta, illicoque deuorata.
 Cyclamini succus cum saccharo haustus addita mastiche, aut myristica nuce, aut rhabarbari scrupulo.
 Asphodeli radix ex vino sumpta.
 Chelidoniij maius in calceis sub nudis pedibus gestatū.
 Aquilegiæ semen ex cretico vino & croci momento potum.
 Rhabarbarum in potionibus additum.
 Agaricum in potionibus additum.
 Centaurij magni radix quoquo modo usurpata.
 Centaurium minus.
 Carduorum radicem decoctum.
 Eryngij radicem decoctum.
 Aloe quouis modo usurpata.
 Pulegij.
 Menthastrij } decoctum haustum.
 Marrubij.
 Cuminum illico à balneo exhibitum.
 Senæ decoctum vel dilutum.
 Radicum Vincetoxici decoctum in potu propinatū.
 Chamædryos semen drachma pondere ex meraco.
 Eupatorij vulgaris decoctum potum.
 Lupulorum florum decoctum, haustum ex vino albo.
 Frangula corticum decoctum. Parandi rationem habes lib. 4. commen. de sambuco & ebulo.
 Cuscutæ decoctum potum.
 MATTHIOLI
 Ad fluxum hepaticum.
 Quernorum foliorum tenellorum stillatisia aqua pota.
 Lupinum

IECINORIS.

*Lupinum iecur sicum in pulvere sumptum.**Rhabarbarum tritum & propinatum.*

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris dolores.

*Acori decoctum potum.**Absinthij decoctum ex passo appositum.**Perichlymeni semen potum cum vino.*

MATTHIOLI

*Irinum oleum e floribus paratum illitum.**Amygdalinum oleum.**Laurinum oleum.**Eupatorij vulgaris decoctum aut eius succus potus.*

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris duriciem.

Ammoniacum illitum, & ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad refrigeratum iecur.

*Nardus Indica ebibita.**Nardus Celtica**Amomi decoctum potum.**Pinorum & picea folia ex aqua, vel mulso pota.*

MATTHIOLI

*Acori axymel potum.**Cinnamomi aqua stillatitia hausta.**Acorum quocumq; modo sumptum.**Balsamum factitium cum potum, tum illitum.**Caryophylli in potu, aut in cibo sumpti.**Rhabarbarum tritum et cum uuis passis deuoratum.**Mentha Græca.**Imperatoria radix.**Eupatorij vulgaris succus, aut eius decoctum potum.*

MATTHIOLI

Ad iecinoris icterum.

*Asarum.**Amygdalinum oleum.**Sesaminum oleum.**Mastiche cum imposita, tum intus sumpta.**Centaurij minoris decoctum haustum.**Frangula radicum decoctum potum. Parandi modum inuenies lib. 4. comment. de sambuco.**Scillinum acetum potum.*

MATTHIOLI

Ad cachexiam. i. malum habitum.

*Cinnamomi aqua stillatitia pota.**Acorus, quæ calamū odoratū vulgo vocant, sumptū.**Balsami factitij liquores omnes.**Nux myristica intro sumpta.**Iecur leporinum arefactum potioni infriectum.**Sium in cibus sumptum.**Cichorium quoquo modo acceptum.**Rhabarbarum quauis ratione haustum, et cum passis uuis comestum.**Agaricum.**Absinthij potici coma saccharo asseruata & deuorata: parandi rationē habes cōmentario de absinthio.**Pulegij decoctum potum.**Mentha græca.**Imperatoria radix.**Sagapenum exhibitum flauis myrobalanis duplicato pondere additis.**Marrubij decoctum potum.**Eupatorij vulgaris succus, aut decoctum potum.**Frangula radicum decoctum haustum. Parandi rati-*

IECINORIS.

onem habes lib. 4. comment. de sambuco.

DIOSCORIDIS.

Ad hydropem.

*Asarum potum.**Cinnamomum ebibitum.**Calami odorati decoctum cum semine apij potum.**Erinacci terrestris caro.**Cochlearum terrestrium operimentum, et caro simul contrita, tumoribus hydropicorum imposita.**Amurca in villosa pelle peruncta & imposita.**Vrina humana sui ipsius bibita.**Vrina caprae quotidie cum spica pota.**Cicer cum roremarino decoctum.**Raphanus emplastri modo impositus.**Plantago cum lenticula decocta.**Ebuli radix in vino decocta, & pota.**Allium decoctum manducatum.**Bulbi cū melle et trito pipere emplastri modo impositi.**Scilla preparata sumpta.**Anagallidis succus vino potus.**Chamaeleonis alba radix cum vino pota.**Absinthium bibitum cum ficibus, nitro & loliacea farina.**Adianti decoctum potum.**Trichomanes decoctum potum.**Hyssopum cum fico, nitroq; emplastri modo impositū.**Fidicula decoctum potum.**Origanum cum fico decoctum.**Sampsuchi decoctum potum.**Ruta cum fico emplastrata, & eius decoctum ex vinorum potum, tum corpori perfusum.**Pastinaca erratica semen potum.**Anisum potum.**Smyrnijs semen potum.**Lasertij liquor cum caricis datus.**Chamedrij decoctum potum.**Polyj utriusque decoctum bibitum.**Androsaces in vino pota duarum drachma. pondere.**Betonica folia cum aqua dulci pota.**Cucumeris asinini radices succus sesquioboli pondere, & cortex eius acetabuli quarta parte.**Aqua marina balneum.**Vitis syluestris radix in aqua feruesfacta, & in vini cyathis duobus marina aqua diluti, pota.**Vinum scillinum potum.**Viticis semen potum.**Ficus sicca in vino cum polenta, & absinthio decocta & illita.**Sal.**Alcyonium tertium.**Arena e littoribus sole feruesfacta capite tenuis hydropicis obruta.*

MATTHIOLI

*Electuarium de succo iridis, in cap proprio de iride.**Iridis radices condita.**Cyperij radicum, et baccarū lauri puluis pari pondere ex impubis pueri vrina exceptus, et vetrici adhibitus.**Asari dilutum ex vino paratum potum.**Asarina & eius decoctum.**Cinnamomi stillatitia aqua pota.**Balsami factitij liquores omnes.*

Cnicinum

IECINORIS.

Cnicinum oleum potum.
 Lixiuum ex vino albo, & iuniperino cinere potum.
 Fraxini semen cum vino assumptum.
 Officula acinorum sylvestris mali punici trita et pota.
 Humani stercoris stillatitia aqua pota.
 Bubulū caprillum vè sterc^o emplastri modo impositū.
 Napi semen drachma pondere ex marrubij decocto
 in diebus pluribus potum.
 Brassica marina decoctum potum et presertim addi-
 to rhabarbaro.
 Brassica marina puluis, additis rhabarbaro & cube-
 bis, pluries ex vino potus.
 Sinapis ex impubis pueri urina illitus.
 Caryophylli in cibo, vel potione usurpati.
 Cyclamini succus cū saccharo potus addita mastiche,
 aut myristica nuce, aut rhabarbari scrupulo.
 Asphodeli radix ex vino pota.
 Rhabarbarum frequenter usurpatum.
 Agaricum in potionibus additum.
 Gentiana.
 Centaurij magni radix tum vino macerata tum pota.
 Cardui radicum decoctum }
 Cardui benedicti decoctum } haustum.
 Eryngij radicum decoctum. }
 Zuccharam ex pontici absinthij coma paratum: mo-
 dum parandi habes commento de absinthio.
 Pulegij decoctum bibitum.
 Mentha græca.
 Imperatorie radix.
 Sagapenum cum duplicato pondere myrobalanorum
 flauorum potum.
 Euphorbium haustum.
 Vincetoxici radicum ex vino albo decoctum bibitum.
 Marrubij decoctum potum.
 Eupatorij vulgaris decoctum haustum.
 Ricini semen ex caprino lacte maceratū & haustum.
 Sambuci, aut ebuli radicum stillatitia aqua pota: hac
 binis, illa quaternis uncijis simul mista, & diebus
 xxx. pota.
 Frangule corticum decoctum potum: parandi ratio-
 nem inuenies lib. 4. commen. de sambuco.
 Colosynthis cum pota, tam elysmate infusa.
 Stibium nostrum granorum quatuor pondere haustū.

LIENIS.

MATTHIOLI

Ad inflammationem.

Cassie solutivæ pulpa deuorata.
 Caphura illita.
 Crespini baccarum succus potus.
 Rosa & earum succus, seu dilutum.
 Cichory radices condita.
 Cichory flores saccharo asseruati, & saepe deuorati.
 Melopeponum lacteus tremor potus.
 Phyllitidis farina sua ipsius aqua subacta, & illita.
 Trifolium acetosum deuoratum.
 Consolide regalis flores poti.
 Fragarie & radicum decoctum ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos lienes.

Cotonea mala eruda cataplasmatibus addita & impo-
 Sycomori liquor haustus, & illitus. (ita.
 Raphanus emplastri modo impositus.

LIENIS.

Brassica folia cum aceto deuorata.

Chamadrys decoctum potum.

Lupinorum farina illita.

MATTHIOLI

Helenij radice farina denarij pondere diebus aliquot
 ex vino pota.

Amygdalinum oleum.

Terebintina deuorata.

Sesaminum oleum.

Myrica ex vino decocta.

Cochlearum maiorum cinis cum lini, & urtica semi-
 ne ex melle potus.

Stercus caprillum illitum.

Dracunculi radix contusa, & illita.

Cyclamini succus unguentibus additus.

Centaurij minoris decoctum & succus tam interius,
 quam exterius usurpatus.

Mentha græca ex oleo irino illita.

Oleum liliorum alborum inunctum.

Phyllitis quocumque modo sumpta.

Oxymel ex floribus genista paratum.

Saccharum e genista floribus paratum saepe sumptū.

Frangule corticum decoctum potum: parandi ratio-
 nem habes lib. 4. comm. de sambuco.

Scillinum acetum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis obstructions.

Nardus celtica ex vino pota.

Adiantum bibitum.

Trichomanes hausta.

MATTHIOLI

Nardus Italica, lauendulaq.

Asari decoctum haustum.

Cubeba.

Carpesium.

Helenij radice farina frequenter ex vino vetere

Amygdalarum amararum oleum. (sumpta.

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Mumia ex cari decocto pota.

Tamarindorum pulpa.

Amygdala.

Ciceris rubri decoctum potum.

Lupini cocti & cum ruta, & pipere comesti.

Brassica decocta ius potum.

Beta cum sinapi aut aceto deuorata.

Sium in cibis sumptum.

Cyclamini succ^o binis drachmis ex oxymelite sumpt^o.

Rhabarbarum potioni infriatum.

Agaricum in potionibus sumptum.

Gentiana & eius aqua stillatitia.

Centaurij minoris decoctum & succus.

Eryngij radicum decoctum potum.

Veronica mas.

Mentha græca ex oleo irino illita.

Amaracus.

Imperatorie radix.

Sena decoctum vel dilutum haustum.

Rosmarinum cum pane deuoratum.

Phyllitis quoquo modo sumpta.

Eupatorij vulgaris decoctum potum.

Lupuli flores in potionibus addit.

Fragaria

LIENIS.

Fragaria tum folia, tum radices.
Frangula corticum decoctum haustum. Parandi rationem habes lib. 4. comment. de sambuco.
Cuscuta, & eius decoctum.
Quinta essentia ferri, descripta in quinto libro capite de scoria seu stercore ferri, diebus pluribus continuis drachma pondere pota, ex adianti, aut aspleni, aut myrica decocto.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis inflammationes.

Iris illyrica ex aceto pota.
Acorum potum.
Nardus celtica ex vino pota.
Nardus montana ex vino hausta.
Sarmentitius cinis ex aceto, rosaceo & ruta illitus.
Myrica ex vino decoctum potum.
Viticis semen potum.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis dolores.

Dictamnium potum & illitum.
MATTHIOLI
Irinum oleum è floribus paratum & illitum.
Laurinum oleum inunctum.
Oleum liliorum albarum inunctum.
Phyllitis quouis modo sumpta.

MATTHIOLI

Ad refrigeratos lienet.

Acori oxymel sumptum.
Cubeba.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Balsami factitij liquores omnes.
Amygdalarum amararum oleum cum potum tum illitum.
Laurinum oleum.
Rhabarbarum intro sumptum.
Agaricum potum.
Mentha graca ex irino oleo inuncta.
Imperatoria radix deuorata.
Rosmarinum cum pane usurpatum.
Phyllitis.

DIOSCORIDIS.

Ad minuendos extuberantes lienet.

Iris illyrica ex aceto pota.
Acorum potum.
Nardus { Celtica } ex vino bibita.
{ Montana }
Myrica ex vino decoctum haustum.
Viticis semen potum.
Cyclamini secunda semē quadraginta diebus haustum.
Sagapenum ebibitum.
Ammoniacum drachma pondere ex aceto sumptum.
Chamedrys ex aceto pota.
Nasturtium haustum.
Piperis radix illita.
Palij utriusque decoctum cum aceto potum.
Cyclamini succus inunctus.
Capparis semen drachmarum duarum pondere quadraginta diebus ex vino bibitum.
Eiusdem radix ex vino bibita eodem pondere.
Lepidium cum helenij radice impositum.
Hedera tenella folia ex vino decocta, vel arida ex pane cocta imposita.
Ifatis syluestris tum pota tum illita.

LIENIS.

Agaricum drachma pondere cum aceto mulso datū.
Rhaponticum potum.
Smirnij radix comesta.
Gentiana radix duarum drachmarum pondere pota.
Aristolochia rotunda pota.
Crocodylij radice decoctum potum presentaneo remedio prodest.
Hyssopum cum ficis, nitroque illitum.
Tragoriganum cum aceto potum.
Pulegium cum sale illitum.
Sison potum.
Peucedani succus haustus.
Viscum cum calce, gagateve lapide decoctum.
Teucrium cum posca potum, vel cum ficis appositum.
Leucoy radices cum aceto illita.
Nymphaea radix ex vino bibita.
Aspleni folia pota, vel eius decoctum cum aceto quadraginta diebus haustum, vel folia ipsa ex aceto illita.
Bani semen potum.
Hemionitis cum aceto pota.
Rubia semen ex aceto mulso potum.
Lonchitis alterius folia cum aceto hausta.
Betonica folia ex oxymelite ebibita.
Polemonij radix ex aqua sumpta.
Periclymeni semen quadraginta diebus in vino potū.
Xyridis semen ex aceto sumptum.
Anchusa radix cum mulsa aqua pota.
Vrtica utraque cum ceruo imposita.
Trichomanes pota.
Vini scillini usus.
Glans unguetaria cum erui farina pota ex mulsa aqua.
Bryonia trium obolorum pondere triginta diebus ex aceto hausta, aut cum ficis illita.
Vitis nigra viticulae primae recentes cocta, ac comesta.
Filicis maris radix hausta.
Aqua vel vinum, in quibus chalybs, aut ferrum restinctum fuerit in potu.
Alcyonium tertium bibitum.
Corallium ex aqua bibitum.
Asius lapis ex aceto, & uina calce illitus.
Cotis naxia delimitata à ferro scobes ex aceto bibita.
MATTHIOLI
Helenij radice farina è vino vetere frequenter denarii pondere pota.
Terebinthina, lariceaq, resina frequenter deuorata.
Fraxini corticis decoctum potum.
Myrica rami ex aceto illiti.
Nux myristica.
Eruum à ieiunis deuoratum.
Eruca semen potum.
Hedera helicis foliorum succus ex vino austero potus.
Rhabarbarum quoquo modo sumptum.
Mentha graca ex oleo irino illita.
Phyllitis quouis modo sumpta.
Eupatory vulgaris decoctum potum.
Lupuli flores in potionibus decocti.
Frangula corticum decoctum haustum. Parandi rationem habes lib. 4. capite de sambuco.
Cuscuta & eius decoctum.
Corallium frequenter potum.

INTESTINORVM

DIOSCORIDIS.

Ad colicos affectus.

- Amygdala amara* illinctu adhibita.
Cochlea terrestres cum suo putamine tusa, addita
 pauca myrrha, ex vino bibita.
Alauda avis testis in cibo sumpta.
Suillus talus crematus ad albedinem usque, potus,
 ubi flatus excreuerit.
Butyrum infusum, ubi colon exulceratum fuerit.
Gallina finum cum aceto vel vino haustum.
Ruta decoctum ex oleo infusum.
Petroselinum potum.
Colocynthis infusa clysmatibus.
Cnici decoctum infusum.

MATTHIOLI.

- Galanga pota*.
Cubeba.
Cinnamomi stillatitia aqua.
Balsami factitij liquores omnes poti & illiti.
Oleum cum pari portione cretici vini sumptum, aut
 clystere infusum.
Ricininum oleum potum, illitum & infusum.
Amygdalinum oleum utrumque.
Cnicinum oleum.
Laurinum oleum.
Succinum ex tepenti aqua potum.
Persicorum nucleorum oleum tam potum quam infusum.
Amygdalinum oleum potum.
Nucum inglandium oleum haustum.
Oleum e scorpionibus nostrum illitum.
Aqua in qua ceruinum genitale elotum fuerit pota.
Cernorum tenerrima cornua in taleolis concisa sicca
 g, & in puluerem trita, & cum pipere, & myrrha
 hausta.
Lupinum finum, quod terram non attigerit ex vino albo
 vel aqua potum, & forinsecus ventri adalligatum.
Brassica semen crassiuscule contusum, & in carniuum
 iure feruefactum, potumq; una cum ipso iure.
Ius decocta brassica cum vetere gallo potum.
Cyclamini succus trium drach. pondere in clysteribus
Imperatoria ex calido meraco pota. (additus.
Sagapenum bibitum, aut clysteribus inditum.
Verbasciflores in puluerem triti, & poti.
Trinitatis herba in puluerem trita & pota.
Ricini semen ex iure veteris galli decoctum et potum.
Colocynthis clysteribus infusa.
Momordica puluis haustus.
Quinta essentia nostra pota, & in clysteribus addita.
Stibium nostrum, commentario proprio descriptum,
 sumptum quinque granorum pondere.
Gagates lapis in puluerem tritus drachma pondere
 diebus septem potus.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum dolores.

- Tria illyrica pota*.
Acori decoctum bibitum.
Mei radices trita cum melle in eclegmate sumpta.
Cardamomum ex aqua potum.
Agallochum ex aqua haustum.
Nuces inglandes cum suo putamine perusta, & umbi-
 lico ad mota.
Ficum cum ruta decoctum clysmate infusum.
Halimi folia drachma pondere in aqua mulsa pota.

INTESTINORVM

- Crocum in potionibus bibitum*.
Dauci semen potum.
Libanotidis radices hausta.
Ferula semen in potu sumptum.
Pencedani succus in ouo haustus.
Melissophylli decoctum clystere infusum.
Castoreum potum.
Butyrum clysmatibus infusum.
Serpillum ebibitum.
Calamintha decoctum haustum.
Eryngium ad potandum datum.
Cera in sorbitionibus data.
Ammi ex vino sumptum.
Triticeifurfures ex decocto ruta elixi, & illiti.
Milium calefactum in sacculis adhibitum.
Orobi farina aceto macerata imposita.
Sisymbrij semen in vino potum.
Piper cum lauri tenellis folijs haustum.
Scilla in eclegmate cum melle.
Rhaponticum potum.
Sampsuchi decoctum ebibitum.
Centaurij maioris radix epota.
Ruta una cum siccato anetho elixa in potu sumpta.
Panaces cum vino haustum.
Anethi corna & seminis decoctum potum.
Ligustici semen & radix pota.
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.
Phalangij folia, flores, ac semen haustum.
Centunculum austero vino potum.
Conyza folia & flores poti.
Paeonia radix in vino pota.
Pseudobunium ebibitum.
Aqua marina fotu adhibita.
Chamaepitys hausta.
Graminis decoctum ebibitum.
Chamadaphnes folia in potu data.
Sal calefactum in sacculis adhibitum.
Nitrum cum cumino ex hydromelite haustum.
Seselis Massiliensis semen ex vino potum.
Asclepiadis radices ex vino pota.
Alisma per se, aut cum pari pondere seminis dauci,
 haustum.
Suillus talus combustus ad albedinem usque, ebibitus.
Lini seminis decoctum per sedem infusum.
Agaricum duorum obolorum pondere sumptum.

MATTHIOLI.

- (Oliuarum cum vino cretico potum, et infusum.
 Oleum Amygdalarum dulcium ebibitum.
 Laurinum inunctum.
Erica florum decoctum potum.
Persici nuclei deuorati.
Cochlearum elixarum ius potum.
Milium cum sale, & anthemidis floribus misum
 & calidum cum sacculis adhibitum.
Brassica ius cum vetere gallo paratum potum.
Cyclamini succus in clysteribus additus.
Chelidonium maius una cum radice tusa, & oleo
 chamamelino feruefactum, & umbilico adhibitum.
Dictamnium album ex meraco potum.
Menthastrum.
Imperatoria.
 Vincetoxici

INTESTINORVM.

Vincetoxiciradix ex meraco.
 Verbasci flores in puluerem triti & epoti.
 Herba trinitatis, aut stillatitia eius aqua pota.
 Momordica farina potui data.
 MATTHIOLI.
 Ad Dyfentericos.
 Aspalathi decoctum clystere infusum.
 Myrrha faba magnitudine deuorata.
 Lentiscus ebibita.
 Picea cortex potus.
 Maceris cortex in potu sumptus.
 Paliuri folia & radix hausta.
 Acute spine fructus deuorati, nel poti.
 Rubi canini fructus deuoratus.
 Cisti folia & cytini in potu data.
 Hypocistis hausta.
 Ladanum cum vino vetere potum.
 Rosarum fructus cum potu sumptus.
 Lycium potui datum.
 Acacia succus haustus.
 Glandium interior, tenuiorq; tunica decocta pota.
 Castanearum interior pariter tunica ebibita.
 Galla omphacitis ex vino, aut aqua trita illita, aut hausta.
 Rhois foliorum decoctum clystere infusum, vel potu acceptum.
 Eiusdem semina pro sale cibis, obsonijsq; aspersa.
 Palma inuolucris decoctum tum infusum, tum bibitum.
 Panicorum acidorum nuclei siccati & ebibiti, vel in defessionibus additi.
 Myrti semen & folia pota.
 Cotonea mala comesa cruda, vel cocta, vel eorum succus potus.
 Pyra tam domestica, quam syluestria deuorata.
 Mespila in cibum accepta.
 Loti arboris bacca comesta, vel hausta.
 Corni arboris bacca, siue in edulijs, siue in defruto asumpta.
 Sorba sicca quoquo modo sumpta.
 Prunorum syluestrium bacca deuorata.
 Siliqua siccata deuorata.
 Cochlea terrestres suis cum putaminibus usta (ut Galenus inquit) esui data.
 Siluri piscis falsamentum fomento adhibitum.
 Leporinus sanguis frixus deuoratus.
 Garum piscium clysmate infusum.
 Ceruinum cornu potum duorum cochlearium mensura.
 Cera in sorbitionibus data.
 Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere infusum.
 Leporinum ?
 Equinum coagulum triu obolo. potere ex vino potum.
 Asparagus altilis elixus, vel assus in cibo sumptus mitigat.
 Idea radix bibita.
 Althea decocta succus ex vino haustus.
 Alcea radices cum vino, aut aqua pota.
 Phyllitis pota.
 Portulaca ad summum cocta in cibis sumpta.
 Plantago per sedem infusa.
 Equiseti succus potus.
 Caprillus adeps cum polenta, & rhoe datus, vel clystere infusus.

INTESTINORVM.

Melissophyllum bibitum.
 Tragi scolopendra simile elixum, & sumptum in cibo.
 Faba in posca decocta & comesa.
 Alismatis radix, cum pari pondere seminis syluestris pastinaca bibita.
 Oxylapathi aut oxalidis semen in aqua, aut vino
 Lysimachia potui data. (bibitum.)
 Tragi cacumina decem in vino pota.
 Clematis folia cum vino hausta.
 Staebis decoctum clystere infusum.
 Limonij semen in vino potum.
 Elatine elixa pota.
 Polemonij radix ex vino sumpta.
 Eupatorij semen & folia in vino hausta.
 Nymphae siccata radix ex vino bibita.
 Sedum maius cum vino potum.
 Sanguis { Hirci }
 { Capra } in sartagine frixus in cibo
 { Leporis } sumptus.
 { Cerui }
 Vitis vinifera foliorum, & capreolorum succus potus.
 Vinaceorum decoctum ebibitum.
 Vinaceorum nuclei in farinam polenta modo illiti.
 Vua passa alba comesa per se cum suis nucleis.
 Omphaciam clystere infusum.
 Vinum ananthinum }
 Vinum cydonites } potum.
 Vinum rhoites. }
 Terra lemina ebibita.
 Muria clysmatibus infusa, ubi diutina dyfenteris intestina exulcerata extiterint,
 Scordium duarum drach. pondere cum aqua dulci potum.
 Hederae flores trium digitorum, carpta bis in die ex vino hausti.
 MATTHIOLI
 Lentiscinum oleum infusum.
 Rosaceum oleum potum.
 Thus potum & clystere infusum.
 Armenium lutum unum cum corallio, mastiche, cornu ceruino & hamatite potum.
 Pinorum nucum cortices ex aceto acerrimo decocti & suffiti.
 Mastiches pota.
 Millefolij succus clysteribus infusus: quin etiam sicca farina cum epota, tum infusa.
 Potentilla pota, aut viridis in calceis imposta sub nudis pedibus.
 Succinei pastilli hausti.
 Crespini uuarum succus in potu sumptus.
 Vua spina.
 Ribes vulgaris.
 Ligustrinorum florum aqua.
 Cisti flores.
 Rosaceum saccharum.
 Rosarum ungues.
 Rosarum calyx.
 Rosarum semen & lanugo circumstant.
 Licium infusum.
 Quernorum foliorum stillatitia aqua pota.
 Querna folia, glandes & galle.
 Faginea glandes & galle.
 Punicum malum in furno tostum tritumq; potui datum.
 Punice

INTESTINORVM.

Punica mali florum saccharum rosacei modo paratum sumptum.
Myrteum condimentum.
Cerasia austera saccharo condita.
Poma acerba sub calidis cineribus assa.
Cydonia mala tosta à ieiunis deuorata.
Cydoniorum vinum, miua, oleum, hoc illitum, illa hausta.
Diacydonites confectio.
Cydoniorum pomorum succus, in quo conserbuerint rubrum corallium, rubearum rosarum semen, rhababarum, hypocistis, acacia.
Corna cum cruda, tum saccharo condita.
Mora immatura arida.
Cochleæ cum testis vsta, admistis galla omphacitide & pipere albo, & cibus inspersa, aut ex vino austero pota.
Leporina caro assa deuorata.
Leporinus sanguis adhuc calens cum hordeacea farina decoctus, & deuoratus.
Leporinus simus potus.
Cerui genitale ex vino austero sumptum.
Ouum gallinaceum in aceto coctum deuoratum durum.
Ceruinus sanguis clysteribus infusus.
Caninum stercus album ex lacte potum, in quo igniti calculi extincti sint.
Oryza decoctum potum, aut infusum.
Oryza in lacte cocta, in quo igniti calculi extincti fuerint, deuorata.
Milij indici panicularum flores intra sumpti.
Milij granorum putamen oui vitello exceptum, & probe decoctum sumptum.
Amylum in cibo usurpatum.
Bistorta } radices, in potionibus addita.
*Tormentilla }
*Caryophyllata }
Lagopi panicula pro sedis absterfario usurpata.
Virga aurea pota, & clysteribus infusa.
Plantaginis utriusque semen ouo exceptum, tegulisq; inassatum deuoratum.
Traforum lacteus cremor ex aqua, in quo candēs ferrum extinctum fuerit, paratus potus.
Bursa pastoris cum plantagine, luto armeno ex pluviali aqua cocta & pota.
Rhabarbarum igne torrefactum ex vino austero & plantaginis succo potum.
Tragacantha lachryma tosta, & ex vino cydoniorum pota, tum clysmate infusa.
Flos solis una cum radicibus ex vino austero potus.
Aparina stillatitia aqua pota.
Gnaphalium ex vino austero.
Conyza media puluis drachma pōdere quotidie sumptus ex austero vino.
Palma Christi florum puluis ex aqua plantaginis, aut in qua ferrum ignitum extinctum fuerit.
Lunaria minor quoquo modo sumpta.
Cannabis foliorū puluis oui vitello exceptus, deuoratus.
Hyperici oleum ventri illitum.
*Pyrola }
Pilosella } ex vino austero pota.
*Fragaria }****

INTESTINORVM.

Amaranthi purpurei flos epotus.
Punicorum malorū vinū ex aqua plantaginis potum.
Armenia terra pota aut in clysteribus addita.
Corallium rubrum in pollinem tritum bibitum.
Crystallum tenuissime leuigatum potui datum.

MATHIOLI
Ad tormina.

Oleum { Oliuarū cum vino cretico potū & infusum.
 Amygdalinum haustum.
 Laurinum illitum.

Erica florum decoctum potum.
Persici nuclei deuorati.
Cochlearum ius potum.
Milium cum sale mistum, & in sacculis calidum appositum ventri.
Brassica ius cum vetere gallo decoctum bibitum.
Cyclamini succus clysteribus additus.
Chelidoniū maius una cum radice iusum, & oleo chamamelino feruefactum, & umbilico illitum.
Dictamnus albus ex meraco potus.
Menthastrum.
Imperatoria.
Vincetoxici radix ex meraco.
Verbasci flores in puluere triti, & potionibus inspersi.
Herba trinitatis, aut stillatitia eius aqua pota.
Momordica farina hausta.

DIOSCORIDIS.
Ad cohibendam aluum, & diarrhoeam.

Coagulum leporinum potum.
Lac omne, in quo igniti calculi marini extincti fuerint.
Cascus elixus, & ab elixatione statim sepositus, moxq; inassatus in cibo sumptus.
Fimus caninus ardente syrio acceptus, & in aqua bibitus.
Panis triticus siccus inueteratus comestus.
Hordeacea farina cum myrti baccis, aut syluestribus pyris, aut malicorio ex vino illita.

Puls ex { Zea }
 { Avena } in cibum sumpta.
 { Milio }

Oryza in cibum accepta.
Lentes cum suo cortice decoctæ deuorata, praesertim si decoquantur ex aceto cum adstringentibus alijs.
Oxylapathi aut oxalidis semē in vino, aut aqua potū.
Brassica percocta cibus.
Beta nigra cum sua radice & lente decocta, esui data.
Plantago ex aceto elixa cum sale comesa, quin & eius semen ex vino potum. Præterea clysteribus infusa.
Intybus tam hortensis, quā erratica in cibū accepta.
Chondrylla succus coctus potus.
Lens syluestris quoquo modo sumpta.
Acinos pota.
Anisum ebibitum.
Anethum, quinetiam eius coma & semen haustum.
Apium in cibo sumptum.
Phyllitis potui data.
Acanthi radices bibita.
Feniculum erraticum potum.
Ruta in cibo, vel potu sumpta.
Orchis Serapias ex vino potus.
Pæonia radix ex vino decocta hausta.
Althæa decoctum bibitum.

Alismatic

INTESTINORVM.

Alismatis radix pota.
 Polygoni succus potus.
 Clematis prima in vino bibita.
 Lagopus ex vino, vel ex aqua sumpta, ubi febris sit.
 Xyridis radix in mulso pota.
 Anchuse folia ex vino sumpta.
 Rubi ramorum decoctum potui datum.
 Quinquefolij radicis decoctum bibitum.
 Phœnix in vino austero hausta.
 Idea radix bibita.
 Iunci præsertim marini semen frixum, & in diluto vino potum.
 Astragali radix ex vino hausta.
 Hyacynthi radix ebibita.
 Papaneris nigri semen ex vino haustum.
 Verbasci radix, & flores potui dati.
 Labruscæ flores poti.
 Punicorum acidorum vinum potui datum.
 Rubrica sinopica in ovo hausta, aut clystere infusa.
 Vini fax illita.
 Sedum maius ex vino haustum.
 Adianti decoctum potum.
 Trichomanis decoctum bibitum.
 Acetum cibus incoctum.

MATTHIOLI.

Arborei musci dilutum ex vino paratum potum.
 Thus potum & clystere infusum.
 Mespila
 Sorba
 Corna } denorata.
 Pyra sylvestria }
 Nux myristica & præsertim tosta.
 Auellanarum putamina trita, et ex vino austero pota.
 Oryza torrefacta, & in lacte decocta, in quo igniti calculi extincti sint.
 Miliij putamen oui vitello exceptum, deinde in assatum & deuoratum.
 Caryophylli prius igni tosti, et in potu, aut cibo sumpti.
 Coriandri semen ex aqua potum.
 Lagopi folia, panicula, & semen, ex vino austero, aut punici mali hausta.
 Virga aurea pota, & in clysteribus addita.
 Potentilla pota, aut viridis in calceis nudis pedibus supposita.
 Fragaria folia, atq; radices.
 Solbastrella, siue sanguisorba quouis modo usurpata.
 Pulmonaria altera ebibita.
 Punicorum acidorum malorum vinum potum.
 Armenia terra tam pota, quam clysmate infusa.

MATTHIOLI.

Ad henteriam.

Arborei musci dilutum ex vino paratum.
 Lycium.
 Saccharum è punicorum floribus paratum ex austero vino sumptum.
 Myrteum condimentum.
 Siliqua sicca deuorata.
 Nux myristica, præsertim calido cinere in assata.
 Miliij Indici panicularum flores hausti.
 Miliij putamen oui vitello exceptum, deinde in assatum, & deuoratum.
 Oxylapathi semen potum.

INTESTINORVM.

Caryophylli tosti in potione, vel in cibo sumpti.
 Rhabarbarum tostum, & vino austero, aut plantaginis succo haustum.
 Coriandri semen ex aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas alui fluxiones.

{ Hircinus }
 { Caprillus }
 Sanguis { Leporinus } infartagine frixus et comesus.
 { Ceruinus }

MATTHIOLI.

Mastiches pota.
 Nux myristica.
 Myrica ramorum cortex.
 Oxylapathi semen potum.
 Miliij Indici flores intro sumpti.
 Miliij putamen vitello oui exceptum, et deinde in assatum deuoratum.
 Caryophylli tosti in potu, aut cibo sumpti.
 Lagopi folia, semen & panicula, ex vino austero, aut punici mali pota.
 Virga aurea tum pota, tum infusa.
 Pyrola }
 Pilosella } quomodo libet usurpata.
 Potentilla pota vel viridis in calceis nudis pedibus supposita.
 Fragaria folia & radices.

DIOSCORIDIS.

Ad emolliendam aluum.

Cerasia comesta.
 Melimela esui data.
 Persica in cibum sumpta.
 Mora matura comesta.
 Ficus matura deuorata.
 Marinus echinus in cibus.
 Tellinarum, chamarumq; ius cum sale haustum.
 Sepia in cibo sumpta.
 Silurus piscis in cibus.
 Gobij ius bibitum.
 Piscium in uniuersum ius per se, aut ex vino bibitum.
 Gallinacearum ueterum ius coctum.
 Lac haustum.
 Serum lactis potum.
 Caseus recens in cibo sumptus.
 Butyrum comestum, uel bibitum.
 Medulla ossium deuorata.
 Ciccr in cibo sumptum.
 Rumex }
 Blitum }
 Malua }
 Atriplex } decocta & in cibus sumpta.
 Beta candida }
 Asparagus }
 Lactuca }
 Brassica leuiter seruesfacta esui data.
 Tragoriganum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum inflationes.

Farina tritici cum hyoscyami succo illita.
 Farina hordei cum lini, et fenugracisemine imposita.
 Ocimi semen potum.
 Rhaponticum bibitum.

INTESTINORVM.

Anethi coma & seminis decoctum potum.
 Cumini decoctum cum oleo clysterè infusum, vel eius
 semen cum polenta, & hydraleo maceratum &
 illitum.
 Peucedani liquor in ovo ebbitus.
 Antkemedis decoctum potum.

MATTHIOLI

Cubebæ quocunq; modo sumpta.
 Cinnamomi aqua stillatitia pota.
 Acorum, quod falso calamum odoratum vocant.
 Balsami scabitiij liquores omnes.
 Ricininum oleum.
 Mumia ex ammi & cari decocto sumpta.
 Milium torrefactum cum sale mistum, & calidum
 in sacculis impositum.
 Sisybrium quocunq; modo haustum.
 Quinta essentia nostra, cap. de vino descripta, pota.

DIOSCORIDIS.

Ad latus intestinorum tincas.

Cardamomum potum.
 Malipunica radicum decoctum bibitum.
 Noces iuglandes largius estata.
 Mori radice corticum decoctum haustum.
 Allium potui datum, vel comestum.
 Chamæleonis albi radix acetabuli pondere ex casto-
 rei & origani decocto pota.
 Filicis femina radix trium drachmarum pondere ex
 melle hausta.
 Melanthij semen potum, vel ex aqua umbilico illitum.
 Atramentum sutorium drachma pondere sumptum,
 vel cum melle delinctum.
 Heliotropij maioris tum folia, tum semina cum hyf-
 sopo, nitro, & nasturtio pota.

DIOSCORIDIS.

Ad teretes intestinorum tincas.

Lupinorum farina cum melle linctæ, vel cum aceto,
 pipere, & ruta pota.
 Brassica semen potum.
 Portulacæ succus potui datus. Præstat idem & semen.
 Nasturtium bibitum.
 Absinthium marinum per se, vel cum oryza decoctum
 cum melle sumptum.
 Absinthium santonicum, aut marinum haustum.
 Hyssopum cum melle linctum.
 Mentha bibita.
 Calamintha decoctum cum sale, & melle sumptum.
 Thymum haustum.
 Thymbra potui data.
 Ruta decoctum ex oleo bibitum.
 Coriandrum cum passo sumptum.
 Anhusa terria cum hyssopo, & nasturtio pota.
 Vinum absinthites potui datum.
 Sedum maius ex vino haustum.
 Filicis femina radix drachmarum trium pondere
 cum vino pota, sed qui sumunt prægustare allia
 debent.

MATTHIOLI

Iridis radice decoctum potum.
 Asarina quoquo modo hausta.
 Helenij radicum succus, aut decoctum potum.
 Amygdalarum amararum oleum potum.
 Myrrha hausta.

INTESTINORVM.

Iuniperi gummi haustum.
 Lauri cima cum calamintha, & sale trita, & ex te-
 pida aqua pota.
 Cressini acinorum succus cum aqua graminis aut por-
 tulacæ potus.
 Persici folia contusa, & ventri ex aceto illita.
 Aqua stillatitia è limoniorum succa pota.
 Limonij immaturi succus haustus.
 Pruni sylvestris aqua è floribus, s. distillata.
 Sebestena deuorata.
 Brassica semen haustum.
 Beta candida cum allio sumpta.
 Sisybrium potum.
 Erucæ semen sumptum.
 Nucum Indicarum oleum.
 Mori arboris radix pota.
 Oleum scorpionum nostrum cum potum, tum illitum.
 Cornu ceruinum ex melle haustum.
 Apri vrina oleo in sua ipsius vesica commista, diuq; in
 fumo suspensa, naribus & arterijs manuum, &
 temporum illita.
 Secalæ vulgaris decoctum cum coriandro potum.
 Lupinus tum illitus, tum potus.
 Napi semen ex limoniorum, aut aurantiorum succo
 potum.
 Caryophylli flores ita vocati, saccharo asseruati de-
 uorati.
 Succisæ radice puluis potioni iniectus.
 Gentiana stillatitia aqua pota.
 Cruciatæ radice trita, & ventri imposita.
 Agaricum.
 Rhabarbarum.
 Centaurium minus drachma pondere ex melle potum.
 Aloe ex lacte vel melle sumpta, aut bubulo felle, &
 aceto excepta, & umbilico tenuis illita.
 Abrotonum.
 Absinthium.
 Hyssopum ex melle & nitri momento.
 Dictamnus albus drachma pondere bibitus.
 Menthastrum ex aceto potum.
 Mentha græca succus potui datus.
 Galega succus, siue herba ipsa recens ex oleo amygda-
 larum amararum calefacta & ventri adalligata.
 Pseudomelanthij semen tam potum, quam ex bubu-
 lo felle, & aceto illitum.
 Vincetoxici radices cum albo dictamno hausta.
 Cardui benedicti decoctum, aut stillatitia aqua pota.
 Chamædrys succus vel vinum, in quo florescens plan-
 ta fuerit macerata.
 Marrubij puluis insumptus.
 Securidaca utriusque semen ex dulci lixiuio potum.
 Tanacetum.
 Cannabis decoctum bibitum.
 Hyperici florum oleum, cochlearis mensura potum.
 Tormentilla, Bistorta vè radicum decoctum potum.
 Eupatory vulgaris succus in catapotijs deuoratus.
 Muscus marin^{us} drachma pondere haust^{us}: & electua-
 rium ex ipsomet musco, vide lib. 4. eius comment.
 Lupuli semen tritum & potui datum.
 Oleum è colocynthide cum felle bubulo umbilico in-
 unctum.

INTESTINORVM

Argentum vivum semisrupuli pondere haustum.
Oleum e chalcatho sex granoru pondere ex vino datu.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxum alui ex epoto medicamento.

Gallorum gallinaceorum seuum ventriculus sale in-
ueteratus; & in umbra siccatus potus.

MATTHIOLI.

Ad illiam passionem.

Iridis Illyrica puluis drachma pondere ex passo haust.

Oleum senarum vnciarum pondere ex vino cretico
potum, aut infusum.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum vulnera.

Equiseti radix, & folia cum aqua pota.

MATTHIOLI.

Leporinus sim⁹, atq; pili, q sub vetre habetur ex mel-
le decocti, & faba quantitate frequenter deuorati.

Terrenorum vermium oleum, addito factitio balsa-
mo illitum.

Cyclamini radicem stillatitia aqua sex vnciaru pon-
dere hausta, addito selectissimi sacchari puluere.

Ophioglossum ex equiseti aqua potum.

Terrestres hederæ decoctum, vide eius commentarium.

Solidago minor, & media

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

Pyrola de qua vulnerariam potionem habes lib. 4.
comment. de Limonio.

Virga aurea

Potentilla

Alchimilla, sine stellaria

Momordica sicca puluis cochlearis mensura ex plan-
taginis, aut equiseti decocto potus.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum vlcera.

Lac omne ignitis calculis calefactum infusum.

Saphyrus lapis bibitus.

MATTHIOLI.

Solidago minor & media

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

Pyrola

} in potionibus hausta.

} in potionibus hausta.

} tum pota, tum infusa
per clystres.

SEDIS.

DIOSCORIDIS.

Ad sedisumas.

Pix liquida illita.

Amurca in cupreo vase ad mellis spissitudinem deco-
cta illita.

Viticis semen cum aqua illitum.

Cancris fluuiatiles combusti cum melle cocto illiti.

Labri veneris radix in vino decocta, & subinde tusa
imposita.

Leucioj flores cera decepti, & emplastri modo adhi-
biti.

Labrusca flores illiti.

Plumbum elotum impositum.

MATTHIOLI.

Iuniperinum gummi cum rosaceo, aut Myrteo illitum.

Cancris fluuiatiles triti & inspersi.

Oleum ex luteis ouorum illitum.

Plantaginis recentia folia trita & illita.

Verbasci genera omnia.

SEDIS.

Vnguentum ex mortario & pistillo plumbeo atque
oleo paratum.

Diphryges in vnguentis additum aut inspersum.

DIOSCORIDIS.

Ad sedis vlcera.

Thus tritum cum lacte, et linamento exceptum impositum.

Punicorum acidorum succus cum melle decoctus illitus.

Oesypus impositus explet & emollit.

Plumbam elotum illitum.

MATTHIOLI.

Aloe inspersa.

Solidago minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pyrola.

Verbasci genera omnia.

Vnguentum ex oleo mortario & pistillo plumbeo pa-
ratum.

Diphryges.

DIOSCORIDIS.

Ad condylomata.

Cotonea mala cruda cataplasmatibus adiecta.

Oui vitellus assatus, & ex rosaceo & croco illitus.

Aloe cum passo adhibita.

Anethi cremati seminis cinis illitus.

Libanotis emplastri modo imposita.

Ballotes folia in feruenti cinere cocta imposita.

Rubi folia adhibita.

Helsine imposita.

Quinquefolij radix illita.

Sarmentitius cinis, quin & vinaceorum ex aceto il-

Rubigo ferri illita.

(litus.

Plumbum elotum impositum.

Sandaracha cum rosaceo inuncta.

Suillus adeps illitus.

Crocum cataplasmatibus inditum.

MATTHIOLI.

Lini seminis oleum illitum.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Verbasci genera omnia.

DIOSCORIDIS.

Ad sedis inflammationes.

Lens cum fertula campana, siccis rosis, cydonio malo,
malicorio & rosaceo illita.

Sonchi succus illitus.

Melilotus cum fenigraci farina, & lini semine ex
passo impositus.

Libanotis adhibita.

Althæa radix decocta illita.

Symphyti maioris radix cum folijs senecionis cata-
plasmatis modo.

Senecionis flores, & folia ex modico vino illita.

MATTHIOLI.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Verbasci genera omnia.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos sedis tumores.

Pix liquida illita.

DIOSCORIDIS.

Ad procidentem sedem.

Lentisci succus, & folia illita.

SEDIS.

Malorum cydoniorum decoctum in defensionibus.
 Torpedo marina apposita.
 Ciclamini succus aut mellis spissitudinem decoctum
 illitus.
 Carule anagallidis flores appositi.
 Aster articiis illitus.
 Acetum illitum et fotu adhibitum.
 Acida muria in defensionibus.

MATTHIOLI

Mastiche aspersum.
 Cochlea putamen vstum & aspersum.
 Plantaginis recentia folia trita & illita.
 Verbasci florum & seminum puluis larigna resina
 exceptus & suffitus, addita Anthemidis florum
 farina.
 Ebuli radicem succus illitus.

MATTHIOLI

Ad hæmorrhoidarum dolorem.

Nucum Indicarum oleum illitum.
 Persicarum nucleorum oleum.
 Lini seminis oleum.
 Plantaginis recentia folia trita & illita.
 Porri folia decocta & illita.
 Dracunculi radix cineribus calidis tosta, et imposita.
 Ari radix oleo subacta, & imposita.
 Scrophularie unguentum, cuius parandi rationem
 habes lib. 4. cap. 90.

Verbasci genera omnia.

Oleum de momordica ex amygdalino, aut lini semine
 paratum: vide lib. 4. comment. vitis nigrae.

DIOSCORIDIS.

Ad hæmorrhoidas curandas.

Cepa confricata.

MATTHIOLI

Ficulnea folia affricata.
 Capa cruda imposita, aut ex aceto illita.
 Cyclamini radix recens affricata, aut eius succus ex la-
 na impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad hæmorrhoidarum defluxiones.

Aloe cum passo illita.
 Libanotis emplastri modo imposita.
 Rubi folia adhibita.
 Palmula illita.

MATTHIOLI

Iuniperinum gummi ex oleo rosaceo, aut myrteo illi-
 tum.
 Plantaginis recentia folia trita & illita.
 Lagopi panicularum cinis inspersus.
 Verbasci flores una cum oui vitello, & clematide pri-
 mo, & porri folijs illiti.
 Eiusdem verbasci folia suffita ex molari lapide accenso.

DIOSCORIDIS.

Ad hæmorrhoidas sanandas.

Rhois semen illitum.
 Palmule illita.
 Ononis decoctum (vt quidam aiunt) potum.
 Plumbum elotum impositum.
 Arabicus lapis illitus.
 Portulaca ad summum cocta imposita.

MATTHIOLI

Iridis radicis decoctum fotum.

SEDIS.

DIOSCORIDIS.

Ad renalem.

(Ouillum) }
 Lac Caprillam dignitis calculis calefactum, clyste.
 (Bubulum) } in infusum.
 Fœnigraci seminis decoctum infusum.
 Lini semen quoquo modo appositum.
 Erui farina vino macerata illita.

MATTHIOLI

Thus suffitum addita presertim colophonia resina.
 Verbasci florum & seminum puluis una cum Anthemidis
 florum farina, resina larigna receptus & suffitus.

DIOSCORIDIS.

Ad peniles thymos.

Capra sylvestris fel illitum.
 Finum ouillum ex aceto inunctum.
 Laser in malicorio cum aceto seruefactum.
 Acetum illitum.

MATTHIOLI

Plantaginis recentia folia trita & illita.

MATTHIOLI,

Ad inflammationes.

Caphura.
 Oleum e cucurbitarum vulgarium floribus paratum
 illitum.
 Lentis palustris stillatitia aqua tum pota, tum illita.

RENUM.

DIOSCORIDIS.

Ad renum dolores.

Cardamomum ex vino potum.
 Nardum celticum potum, ac linitum.
 Amomi decoctum bibitum.
 Arundinis radix lumborum doloribus proficit cum
 aceto illita.
 Tragacantha drachma pōdere in passo dissoluta cum
 adusto, elotoꝝ, cerui cornu, & scissilis aluminis
 tantillo potum.
 Peucedani succus potus.
 Vua passa alba in cibum sumpta.
 Alcyonium tertium potum.
 Fœniculi coma decoctum subditum.
 Anagallis pota.
 Agarici drachma pota.
 Glycyrrhizæ succus cum passo potus.
 Tordilium bibitum.
 Anthyllis pota.
 Pœonia radix ex vino pota.
 Symphytum patreum ex aqua potum.
 Anchusa decoctum ex aqua haustum.
 Vinum melitites ebibitum.

MATTHIOLI

Cassia solutiva pulpa cum Glycyrrhizæ puluere
 hausta.
 Oleum laurinum illitum.
 Amygdalinum oleum potum.
 Filipendule radix pota.
 Althea alterius semen ebibitum.

MATTHIOLI

Ad lumborum dolorem.

Helenij folia ex vino illita.
 Agaricum in potionibus additum.

RENVM.

DIOSCORIDIS.

Ad renum calculos & arenulas.

Nardus { *Indica* } potui data. Verum *Celtica*
 { *Celtica* } cateris prestat.
 { *Montana* }
Lauri folia pota, quin & radicis cortex, qui longè po-
 tentior est potus.
Cerasi gummi ex vino haustum.
Amygdala amara gummi ex passo sumptum.
Anonis radicis cortex cum vino potui datus.
Anisum potum.
Cumini alterius sylvestris semen potum.
Artemisia decoctum in defensionibus adhibitum.
Chamemeli decoctum potum, vel fotu adhibitum.
Parthenij folia hausta.
Althea decoctum bibitum.
Alismatis decoctum potui datum.
Tribuli utriusque fructuum succus haustus.
Rubi radix pota.
Papaveris corniculati radicis decoctum haustum.
Vmbilici Veneris folia cum radice pota.
Vinum absinthites bibitum.
Adiantum potui datum.
Trichomanes potui data.
Vuapassa alba comesa.
Melitites vinum assidue potum.
Alcyonium tertium potum.
 MATHIOLI.
Iridis radicis decoctum potum.
Iridis radices condite frequenter deuorata.
Phu radices ex inre sumpta.
Carpesium.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Cassia solutiua pulpa ex glycyrrhyza decocto, aut pul-
 vere sumpta.
Balsami factitij liquores omnes poti.
Terrestres musci ex vino decoctum potum.
Oleum cum pari portione vini Cretici calidum po-
 tum aut infusum.
Amygdalinu oleum, & presertim ex amaris nucibus.
Bdellium in potu datum.
 { *Larigna* }
Resina { *Terebinthina* } deuorata uncia pondere.
 { *Abiegna* }
Os humani capitis haustum.
Fraxini semen ex vino vetere potum.
Aqua defluens ex perforato betula candice hausta.
Quernorum folioru stillatitia aqua in potu sumpta.
Glandis faginee cinis ex posca illitus.
Persici lachryma cum succo raphani, aut limonum
 sumpta.
Persicorum nucleorum oleum potum quin etiam nu-
 clei ipsi in potu hausti.
Persicorum nucleorum, & alioru nonnulloru stillati-
 tia aqua: vide in commentario persici, libro primo.
Limoniorum succus ex vino Cretico propinatus.
Mespilorum ossicula cochlearis mensura ex vino al-
 bo hausta.
Cochlea putamen casu inuentum tritum potu datu.
Cammarorum lapilli ex vini albi portione sumpti.
Canceri fluiatilis putamen ex vino subdulci potum.
Scorpionum cinis ex vino datus.

RENVM.

Scorpionum oleum pubi illitum.
Leporis integri combusti cinis in potu sumptus.
Leporini renes tum crudi, tum cocii deuorati.
Calli, qui equorum interna crurum parte in nascun-
 tur, triti, & ex vino propinati.
Humani stercoris stillatitia aqua pota.
Ciceris cum nigri, tum quoque rubri, ius haustum.
Brassicae ius potum.
Hippolapathi radix trita ex vino sumpta.
Anonidis radix trita ex vino sumpta: item eiusdem
 stillatitia aqua, cuius parandi rationem habes in
 commentario.
Veronica mas.
Dictamnus albus ex vino meraco ebibitus duarum
 drachmarum.
Filipendule radices hausta.
Tanacetum quouis modo usurpatum.
Hyperici semen ex vino.
Polygoni minoris puluis ex vino haustus.
Oleum e flammula illitum. Parandi rationem habes
 lib. 4. commen. de clematide altera.
Consolidae regalis flores poti.
Saxifragia alba decoctum potum, vel alba radicum
 circumstantia grana contusa & deuorata.
Saxifragia magna drachma pondere ex vino hausta.
Pimpinella saxifragia radices pota.
Vinum e calcatis halitacabi solani baccis potum un-
 ciarum quatuor pondere.
Primula veris radicum decoctum potum.
Genista semen aut iuncis eius rami cum folijs in poti-
 onibus.
Genista florum stillatitia aqua pota libra pondere, &
 eorunde conserua ex saccharo parata & deuorata.
Oleum e chalcantio scrupuli pondere ex vino potu.

DIOSCORIDIS.

Ad renum vlcera,

Lac omne potum.
Plantaginis radices & folia ex passo sumpta.
Vuapassa alba comesa.
Melitites vinum assidue potum.
 MATHIOLI.
Pinej nuclei ex melle, aut saccharo deuorati.
Tragacantha lachryma intus sumpta.
Equiseti cuiusq; decoctum, aut aqua stillatitia pota.

DIOSCORIDIS.

Ad renum obstructions.

Rhaponticum haustum.
Vinum absinthites }
Vinum Melitites } potum.
 MATHIOLI.
Iridis radicis decoctum potum.
Cinnamomi stillatitia aqua hausta.
Cassia solutiua pulpa deuorata.
Terebinthina laricea ve resina sumpta uncia pondere.
Zizypha.
Agaricum.
Anonis & eius aqua stillatitia.
Ciceris decoctum potum.
Nuclei pinei.
Hippolapathi radix contrita ex mero.
Dracunculi radicis farina ex vuarum passarum cre-
 more, & mastiches momento sumpta.

V E S I C A E.

Cardui benedicti radicum decoctum potum.
 Eryngii radix.
 Veronica mas.
 Fragariae radicem, & foliorum decoctum potum.
 Vinum e calcatis solani halicacabi baccis quatuor
 unciarum pondere potum.
 Olenm e chalcantuo ex vino potum.

V E S I C A E.
 D I O S C O R I D I S.

Ad sciendam remorantem urinam.

Acori decoctum potum.
 Mei radices ex aqua decoctae, vel trita citra coctione
 & potae.

Nardus

}	Indica	}	potui data.
}	Celtica		
}	Montana		

Cardamomum ex vino haustum.
 Asarum bibitum.
 Phu sicca pota.
 Malabathrum potum.
 Cassia in potu hausta.
 Cinnamomum potum.
 Costus ebibitus.
 Iuncus odoratus in potu sumptus.
 Calamus odoratus cum graminis, aut apij sem. sum-
 Aspalathi decoctum haustum. (ptus.
 Crocum ebibitum.
 Helenij radicem decoctum potui datum.
 Crocomagma potum.
 Pineae nucis repurgata comese, aut cum passo, vel cu-
 cumeris semine pota.
 Lentisci decoctum haustum.
 Terebinthi fructus comestus.
 Resina omnis, praesertimq; Terebinthina hausta.
 Cupressi folia ex passo, & exiguo myrrha pota.
 Cedrides deuorata, vel pota.
 Lauri foliorum decoctum in desessionibus.
 Albe populi cortex uncia pondere haustus.
 Paliuri foliorum & radicem decoctum in potu sum-
 Phillyrea folia pota. (ptum
 Ladanum ex vetere vino haustum.
 Olea aethyopica, ac nostratis lachryma potui data.
 Glandes in potu sumptae.
 Palmae inuolucris decoctum bibitum.
 Pupice acida succus potus.
 Cerasi gummi haustum.
 Amygdala amara lachryma bibita.
 Erinaceus marinus in cibum sumptus.
 Erinacei terrestris caro inueterata ex aceto mulso po-
 Vermes terreni triti, & cum passo poti. (ta.
 Mel haustum.
 Ptisana hordeacea deuorata.
 Zythum ex hordeo paratum potum.
 Cicerum decoctum potui datum.
 Erui decoctum haustum.
 Lupinorum radicem decoctum bibitum.
 Raporum cauliculus elixus & in cibum sumptus.
 Raphanus comestus, quin & eiusdem semen potum.
 Siferis radix in cibum accepta.
 Asparagi breui coctura elixi, & in cibum propinati.
 Sion quoquomodo sumptum.
 Cucumeris semen potum.
 Erucae utriusque semen bibitum.

V E S I C A E.

Dracunculus minor haustus.
 Hortensis similacis siliqua cum semine elixa, & in ci-
 bum data.
 Asphodeli radix pota.
 Bulbus vomitorius in cibum sumptus, vel eius deco-
 ctum potum.
 Porrum domesticum, & syluestre comestum.
 Cepa decocta & in cibum sumpta.
 Allium in cibum sumptum.
 Capparis fructus quadraginta diebus potus.
 Anagallidis succus bibitus.
 Calamintha decoctum potum.
 Salvia decoctum haustum.
 Crocodilij semen potum.
 Thymi decoctum potui datum.
 Thymbra decoctum bibitum.
 Serpillum in potu sumptum.
 Ruta quoquo modo sumpta.
 Spinae alba radix pota.
 Acanthi radices pota.
 Ononis radicis cortex ex vino haustus.
 Eryngii radix pota.
 Absinthii potui datum, vel eiusdem decoctum bibitum.
 Hyssopi decoctum in potu sumptum.
 Origanum haustum.
 Tragorigani decoctum ebibitum.
 Ruta sylvestris pabi illita.
 Ligustici semen, & radix pota.
 Pastinacae erraticae semen haustum.
 Cari semen potum.
 Anethi coma & feminis, decoctum bibitum.
 Apium crudum, coctum ve in cibum sumptum.
 Petroselinum in potu haustum.
 Foeniculi decoctum potum.
 Nigella pluribus diebus bibita.
 Polij montani decoctum potui datum.
 Artemisia decoctum in desessionibus adhibitum.
 Anthemidis decoctum haustum, vel in desessionibus
 additum.
 Lithospermi semen ex vino albo sumptum.
 Rubiae radix pota.
 Lonchitis radix ex vino sumpta.
 Hypericum bibitum.
 Betonica folia pota.
 Periclymeni semen haustum. Est enim valentissi-
 mum medicamentum.
 Saxifragia potui data.
 Xyridis radix trium obolorum pondere bibita, sed se-
 mini vis longe maior.
 Iunci marini semen srixum.
 Ageratum suffitum.
 Vesicariae, siue halicacabi rubentes acini folliculis
 inclusi deuorati.
 Solani somnifici semen potum.
 Rusci folia, bacca, asparagi, radices ve in vino pota.
 Spartij semen deuoratum.
 Vitis alba cauliculi teneri decocti, & deuorati.
 Cytisi decoctum potum.
 Dauci semen haustum.
 Coris semen in potu sumptum.
 Equiseti succus potus.

V E S I C A E.

Umbilici veneris folia cum radicibus manducata.
Bunij, & Pseudobunij semen potum.
Astragaliradix ex vino sumpta.
Hyacinthi radix bibita.
Vitis nigra viticula prima cocta, comestaque.
Chamadaphnes foliorum succus ex vino sumptus.

Vinum { *Cydonites*
Hyssopites
Scillinum
Absinthites } *potum.*

Aqua mulsa in potum accepta.

M A T T H I O L L

Nardi Italica, aut lauendula flores ex vino feruefacti & pubi impositi.
Asarina decoctum potum.
Carpesium haustum.
Cinnamomi stillatitia aqua.
Calamus odoratus vulgaris in potu sumptus.
Bdellium haustum.
Iuniperinus cinis ex lixiuio & vino albo potus.
Sabina quocunque modo deuorata.
Fraxini semen potum.
Arundinis radix.
Cochlea putamen casu inuentum tritum, & ex albo vino potum.
Scorpionum exustorum cinis potus.
Eorundem oleum pubi illitum.
Sepia oua in cibis sumpta.
Cimices viui in penis foramen immisi.
Aqua in qua ceruinum genitale elotū fuerit, hausta.
Sisymbrium aquaticum, cum raphano omni, & petroselini radicibus ex albo meraco, butyroque calefactum, pubi illitum.
Melopeponum seminum lacteus cremor potus.
Pectinis veneris planta tota, albo meraco & butyro calefacta, & pubi imposita.
Porri semen ex passo potum.
Sinapi potum.
Gentiana.
Anonidis radicem stillatitia aqua. Parandi modum habes commento de Anonide lib. 3.
Cardui benedicti radicem decoctum potum.
Veronica mas ebibita.
Hyssopum } potum.
Pulegium }
Mentha Graca ex vino feruefacta, pubi illita.
Imperatoria hausta.
Vincetoxicum sumptum.
Filipendula radices ex vino.
Tanacetum feruefactum & illitum.
Polygoni minoris puluis ex vino haustus.
Oleum flammula inunctū pubi, aut clystere infusum.
Consolida regalis flores aut eorum decoctum potum.
Saxifragia alba ex vino decocta, & pota: vel granula que in radice sunt contusa & deuorata.
Saxifragia magna.
Fragaria folia et radices, siue earundem decoctum ex Pimpinella saxifragia. (vino.
Trichomanes in puluerem trita, & drachma pondere ex albo meraco pota.
Lupuli semen tritum & potui datum.
Genista quoquomodo sumpta.

V E S I C A E.

Genista florū ex vino decoctum, aut stillatitia aqua: quin etiam conserua ex iisdem & saccharo parata.
Oleum è chalcantio ex vino potum scrupuli pondere.

D I O S C O R I D I S.

Ad vinnæ angustias.

Cimices lectularij triti, et urinaria fistula impositi.
Millepeda ex vino pota.
Cicada inassata mansa.
Locusta suffita, praesertim in feminis.
Ceruini cornu cinis elotus binis ligulis epotus.
Malua decoctum in sessione adhibitum.
Portulaca in cibum sumpta.
Asparagi radicem decoctum haustum.
Crithami radix, semen & folia ex vino decocta pota.
Sandicis decoctum potui datum.
Caucalis olerum modo in cibo sumpta.
Amaraci decoctum potum.
Baccharis radicem decoctum haustum.
Ocimum semen bibitum.
Smyrni radix pota.
Agaricum drachma pondere datum.
Peucedani succus potus.
Rhaponticum potum.
Phalaridis succus ex aqua, aut vino haustus.
Lotus sylvestris trita per se, aut cum malua semine ex vino, aut passo pota.
Chamaepitys potui data.
Chamaeleonis albi radicis decoctum bibitum.
Abrotani semen tritum, et ex aqua calefactum potū.
Pastinaca sylvestris semen potum, vel pubi illitum.
Tordilij semen in potu sumptum.
Polemonij radix ex aqua pota.
Sisonis semen haustum.
Ammi cum vino sumptum.
Petroselini semen potum.
Galbanum bibitum.
Chamadrios decoctum potui datum.
Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua hausta.
Scordij decoctum ex vino, vel ex aqua paratum potū.
Anthyllis altera drachmarum duarū pondere bibita.
Paeonia potui data.
Althaea decocta succus ex vino potus.
Graminis radicem decoctum potui datum.
Arctij radix cum semine decocta in potu sumpta.
Adiantum potum.
Trichomanes hausta.
Alcyonium tertium potum.
Lapis { Hamatites ex vino } bibitus.
{ Morochibus ex aqua }
{ Iudaicus ciceris magnitudine ex aqua calida potus.
Lapis { Spangia ex vino haustus.

M A T T H I O L L

Cassia solutina pulpa deuorata, aut cum diureticis hausta.
Amygdalinum oleum potum, aut per penis meatum infusum.
Terebinthina resina hausta.
Lauri bacca cum triticeo fursure, iuniperi baccis, & allio contrita, & vino super calenti tegula aspersa, & pubi superposita.
Napi semen cochlearis mensura, addita lini seminis drachma

V E S I C A E.

drachma ex vino potum.
 Raphani rustici radix minutim concisa, una cum
 petroselini vulgaris radicibus, ex oleo vel butyro
 & vino calefacta, & pabi adalligata.
 Raphani hortensis radix eodem modo usurpata.
 Raphani utriusque dilutum ex vino paratum hau-
 stum, vel eorum succus unciarum duarum ponde-
 re ex cretico vino sumptum.
 Anonidis radicem stillatitia aqua pota: parandi mo-
 dum habes lib. 3. cap. 8.

D I O S C O R I D I S.

Ad yrinæ stillicidium.

Acori decoctum potum.
 Silybrii semen in vino bibitum.
 Panaces heractium ex vino haustum.
 Sefeli Massiliense potui datum.
 Cumini sylvestris alterius semen in potu sumptum.
 Olusatris radix cum semine ex mulso pota.
 Polycnemum ex vino bibitum.
 Clinopodium haustum.
 Oenanthes radix cum vino epota.
 Conyza folia & flores in potu.
 Aspleni decoctum potui datum.
 Capa cum asparagi radicibus decoctum in potu sum-
 ptum.
 Onobrychis bibita.
 Polygoni succus haustus.
 Saxifragia in vino decocta potui data.
 Xyridis radix ex mulso pota.
 Tragij liquor, semen, & folia in potu sumpta.
 Rusci folia, radices, & bacca bibita.
 Lauri Alexandrina radix sex drachmarum pondere
 potui data.
 Elichrysi coma ex vino hausta.

M A T T H I O L I

Pbu decoctum potum.
 Cassia solutiva pulpa cum dulci radice sumpta.
 Nuclei pinei saccharo, aut melle excepti.
 Sebestena.
 Zizypha.
 Cochlea cum suo putamine contrita, ex passis diebus
 septem continuis pota.
 Leporini testiculi in cibo sumpti.
 Cicerum rubeorum decoctum paratum, ut in cicero
 commento.
 Sonchi lacteus succus e caule manans cyathi mensura.
 Amarago, siue dens leonis ex aceto decoctum potum.
 Melopeponi lacteus cremor, additis halicacabi pa-
 stillis & glycyrrhizæ succo, mumiæq; momento, &
 gummi arabici & tragacantha nonnihil.
 Lactuca semine papaverini seminis cremore haustum.
 Traforum lacteus cremor e carniū iure absque sale
 paratum.
 Glycyrrhiza.
 Cuminum ex dulci vino potum.
 Eryngij radix.
 Filipendula radices, aut earum decoctum potum.
 Veronica mas.
 Lagopi decoctum cum malva folijs, & dulci vino pa-
 ratum.
 Agrimonia ex vino albo decoctum cum saccharo
 haustum.
 Solani halicacabi baccarum succus ex papaveris albi

V E S I C A E.

cremore, aut melopeponum, aut cucurbita, aut cu-
 cumeris haustus.
 Lupulorum flores in defensionibus additi.

D I O S C O R I D I S.

Ad vesicæ ulcera.

Myrti folia & semen pota.
 Lac omne bibitum.
 Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.
 Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.
 Vna passa alba tomesa.

M A T T H I O L I

Nuclei pinei ex melle, aut saccharo deuorati.
 Mumia ex caprillo lacte pota.
 Amyli semuncia cum ouo, & uuis passis subferuefa-
 eta & à balneo sumpta.
 Equiseti cuiusque decoctum, aut aqua stillatitia cum
 herba puluere pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad vesicæ vulnera.

Butyrum infusum.
 Equiseti folia ex aqua pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad eijciendos vesicæ calculos.

Ossifragi auis ventriculus paulatim in potu haustus.
 Muris qui muserta dicitur, simus cum mulso & thu-
 re potus.
 Vrina apri potui data.
 Rumicis radicum ex vino decoctum bibitum.
 Sion crudum, coctum uel haustum, vel comestum.
 Silybrii semen potum.
 Baccharis decoctum haustum.
 Apij semen vel radix vino bibita.
 Faniculum erraticum potum.
 Sagapenum potui datum.
 Adianthi decoctum bibitum.
 Trichomanes decoctum in potu sumptum.
 Vitis vinifera lachryma in caudice concreta ex vino
 pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad vesicæ calculos frangendos educendosque.

Cardamomi cū corticis radices lauri drachma potū.
 Bdellium potum.
 Cerasi arboris gummi bibitum.
 Aspleni decoctum haustum.
 Lithospermum ex vino albo potui datum.
 Saxifragia ebibita.
 Graminis decoctum haustum.
 Tragij semina pota.
 Rusci radices, ac bacca in potu sumpta.
 Iudaicus lapis coti delimatus, ex aqua calida potus.
 Lapis spongia potui datus.

M A T T H I O L I

Balsami factitij liquores omnes poti.
 Betule aqua, qua e perforato caudice destillauit, pota.
 Erica decoctum tum potum, tū balneum ex eo paratum.
 Scorpionum cinis potioni inspersus.
 Scorpionum oleum pabi illitum.
 Leporis integri cinis in potione sumptus.
 Murium stercus potum.
 Bubuli fellis lapis in potione sumptus.
 Humani stercoris aqua stillatitia pota.
 Polygoni minoris puluis ex vino potus.

Saxifragia

VESICAE.

Saxifragia alba ex vino decoctum potum, sine albican-
tia grana radicibus in herentia contusa, et deuorata.
Saxifragia magna drachma pondere ex vino.
Primula veris radicem decoctum haustum.
Genista florum decoctum potum.
Corallium vstum bibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad vrinæ incontinentiam.

Ruta sylvestris semen frictum, & in cibis sumptum.
Phoenix in vino austero bibita.
Mamia ex caprillo lacte pota.
Echini terrestris combusti cinis cum agrimonia, &
interna membrana ventriculi gallinae sumptus.
Tormentilla radices ex plantaginis aqua pota.
Bistorta.

MATTHIOLI

Ad vesicæ scabiem.

Cassia solutiva pulpa cum puluere dulcis radicis pota.
Nuclei pinei deuorati ex melle, aut saccharo.
Amygdalinum oleum potum.
Sesaminum oleum haustum.
Glycyrrhiza radix & eius succus.

DIOSCORIDIS.

Ad crucentos mictus.

Cumini sylvestris alterius semen potum,
Elicbrysi coma in mulso pota.
Acidamaria infusa.

MATTHIOLI

Dactylorum ossa cum crudo serico coacta intus sumpta.
Plantaginis et millefolij succus potus, addita philonij
Persici drachma.
Millefolij farina vncia pondere, vna cum boli armen-
ij drachma ex lacte bubulo propinata.
Millefolij succus vncia pondere cum syr. myrtino
haustus.

VIRILIVM, ET PVDENDORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad venerem ciendam stimulantamque.

Costus ex mulso bibitus.
Crocum potum.
Semen lini cum melle & pipere deuoratum.
Rapum decoctum in cibo sumptum.
Eruca largius in cibis comesta.
Eruca semen haustum.
Dracunculi maio radix tosta, vel elixa ex vino bibi-
ta.
Asphodeli radix assumpta.
Nasturtium potum, vel comestum.
Porri semen potui datum.
Bulbus decoctus manducatus.
Allium cum coriandro tritum in cibis.
Vrtica semen ex passo potum.
Gallij radix assumpta.
Menthe succus potus.
Pastinacæ erraticæ radix comesta.
Anisum potum.
Testiculi canis radix, quæ vegetior est, bibita vel co-
mesta.
Satyrij radix esitata.
Horminium in vino potum.
Gladioli superior radix ex vino sumpta.
Scincorum renes drachma pondere ex vino hausti.
Lac omne haustum.

VIRILIVM, ET PVDENDORVM.

MATTHIOLI

Galanga pota, & in cibis addita.
Moschus ex ricino oleo peni illitus.
Zibetum eodem modo inunctum.
Pistaceorum oleum vna cum oleo sinapino, benzoino,
& moscho genitalibus illitum.
Fraxini semen cum pistacijs, & nucibus pineis deuo-
ratum addito saccharo.
Nux Indica.
Myristica nucis oleum genitalibus illitum.
Sepia pisces cum nucibus & allio parata & deuorata.
Genitale cerui in puluerem tritum, et ex ovo sumptum.
Caryophylli quatuor drachma pondere ex lacte poti.
Phasioli in lacte bubulo decocti, & longo pipere, &
galanga aspersi.
Dauci semen.
Mala insana elixa, & deinde in butyro frixa, & cum
longo pipere deuorata.
Vitis nigra radix sub feruentibus cineribus decocta,
& cum pipere & sale deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad augendam genituram.

Coriandrum bibitum.
Omnia medicamenta, quæ venerem excitant, præter
ea, quæ in calore, & siccitate excellunt.

MATTHIOLI

Sesaminum oleum potum, aut in cibis additum.
Cephiliones cum pipere & sale.
Nuclei pinei.
Pistacia.
Nux Indica.
Gallinaceorum testes frequenter deuorati.
Oryza in bubulo lacte decocta addito croco & cin-
namomo.
Cicera cibo data.
Phasioli in lacte bubulo decocti, longoq; pipere, galan-
ga, & saccharo aspersi.
Rapum in lacte decoctum.
Napi ex pinguium carniū iure decocti addito pipere.
Sifer coctum & cum pipere deuoratum.
Asparagi in cibo sumpti.
Traforum cremor ex carniū iure paratus.
Caryophylli quatuor drachma. pondere ex lacte poti.
Cinara echinus ex pipere deuoratus.
Ferule corculum sub cineribus decoctum cum sale &
pipere deuoratum.
Mala insana cocta, & in butyro frixa, & cum pipere
deuorata.
Vitis nigra radix sub cineribus feruentibus probe de-
cocta, & cum pipere deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad venerem inhibendam & nocturnas pollutiones.

Vitici semen potum, & folia testibus illita.
Portulaca manducata, puandisq; inuncta.
Lactuca semen potum, nocturnas veneris imagina-
tiones arceat.
Anethi seminis & coma decoctum assidue potum.
Ruta in cibo, potuque sumpta.
Canini testiculi herba, languida flaccidaq; radix po-
tui data.
Cannabis sativa semen in cibum largius sumptum.
Gladioli inferior radix pota.

VIRILIVM, ET PVDENDORVM.

Cicutā cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentiſſimum medicamentum.

MATTHIOLI

Caphura renibus & teſtibus illita.

Vinum, in quo nullus piſcis fuerit immerſus, potum.

Lactuca ſuccus cū caphura momento teſtibus illitus.

Lactuca ſemen ex papauerini ſeminis cremore potū.

Siſymbrij ſuccus teſtibus illitus.

Cannabis ſatiua ſemen largius ſumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad feminis profluuium.

Nymphaea radix bibita.

Iridis illyrica radix ex aceto pota.

MATTHIOLI

Hyoſcyaminum oleum renibus & teſtibus illitum.

Thuſ drachma pondere cum aqua nymphaea bibitū.

Larigna aut terebinthina reſina ex aqua plantaginis lota, additis ſuccino, vel aſpleno, & caphura momento.

Caphura cum ſuccino ex aqua nymphae hauſta, exteriusque illita.

Rofarū baccarū ſemē, et lanugo in vino aſtiero pota.

Rofarum crocei floſculi, capilli vè e poti.

Saccharum e punice floribus paratū ex vino aſtiero ſumptum.

Cichorij ſuccus potus.

Menthaſtri ſuccus potus, & teſtibus illitus.

Aſpleni aurigo drachma pōdere, cū albi ſuccini ſemi-drachma ex portulacæ, aut plantaginis ſucco pota.

Lithoſpermi vtriuſq; ſemen, ſeſquidrachma pōdere, addita pari aſpleni quantitate, et ſuccini ſcrupulis duobus, ex ſucco portulacæ pluribus diebus potum.

Millefoliū cui candida ineſt umbella, vna cum floribus tuſum, & cum ſua ipſius aqua ſtillatitia, aut caprino lacte potum, vel cum corallio, ſuccino & eboris ſcobe propinatam.

Vnguentum ex roſaceo in mortario plumbeo paratū.

Diphryges illitum ex roſaceo vnguento.

Corallium potum.

DIOSCORIDIS.

Ad pudendorum vlcera.

Oeſſypus illitus.

Aloe illita, & in puluerem impoſita.

Polygoni ſuccus in vino decoctus cū melle adhibitus.

Alumen quocunq; modo adhibitur.

Floſ ſalis inſperſus.

MATTHIOLI

Mumia ex caprillo lacte pota.

Malicorium cum marina ſpongia exiccata cum additis oleo & alumine.

Cucurbita exuſta cinis.

Gammarorum lapilli cum tartaro triti & aſperſi.

Abrotanum vſtum in puluerem admotum.

Floris ſolis decoctum fotum.

Anethum vſtum & aſperſum.

Solidaginis media folia, aut eorum ſuccus adhibitus.

Sanicula

Auricula vrfi

Piloſella

Potentilla

Pulmonaria altera

DIOSCORIDIS.

Ad uſſum inflammationes, & tumores,

VIRILIVM, ET PVDENDORVM,

Cicer cum eruo decoctum appoſitum.

Faba in vino decocta cataplaſmatis adhibita.

Senecionis folia cū floribus emplaſtri modo impoſita.

Aſphodeli radix & folia illita.

Cimolia illita.

Melilotum emplaſtri modo adhibitur.

Geodes lapis illitus.

Ruta illita cum lauri folijs.

Salcum origano, & fermento illitum.

Cuminum cum paſſa vua, fabaque lomento, aut cera impoſitum.

Coriandrum cum vua paſſa, & melle illitum.

Lilij concifa radix cum apollinari herba, & triticea farina cataplaſmatis modo.

Samia terra ex roſaceo, & aqua illita.

Hyoſcyami ſemen tritum ex vino impoſitum.

MATTHIOLI

Iridis Illyrica farina cum alijs quibuſdam medicamentis, vt in commento de iride diximus.

Hyoſcyaminum oleum illitum.

Fœnuſgraci farina ex hydromelite decocta, & addita axungia, impoſita.

Cicerum farina, aut fabarum, aut erui ex aqua decocta & illita.

Bellidis folia tuſa, & illita.

Lentis paluſtris ſtillatitia aqua illita.

Vnguentum ex mortario et piſtillo plumbeo cum roſaceo paratum.

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium pruritiū.

Salvia decoctum ex vino illitum.

Reſina omnes præfertimque terebinthina illita.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos teſtes.

Iriſonis ſemen impoſitum.

MATTHIOLI

Irinum oleum illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad eos, qui natura præputio carent.

Thapſie ſuccus circumlinitus, tumorem enim excitat, qui deinde pinguium ſotu emollitus, præputij iacturam reſarcit.

Mel triginta diebus a balneo illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium phagædenas exulcerationes.

Taurinum fel ex melle illitum.

Labruſcæ floſ tritus cum melle, croco, myrrha, & roſaceo impoſitus.

MATTHIOLI

Piloſella

Potentilla

Solidago minor & media

Sanicula

Auricula vrfi

Pyrola

quouis modo uſurpata in topicis auxilijs.

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium thymos.

Smaridis ſalſe crematum caput illitum.

Fel ſylueſtris capra inunctum.

Fimum ouillum ex aceto impoſitum.

Thymus emplaſtri modo adhibitus.

Thymbra appoſita.

V T E R I.

Ruta cum pipere, nitroque confricata.
Tithymali caracia lac inunctum.
Chamaefyces rami triti, & impositi.
Mercurialis succus illitus.
Heliotropij semen illitum.
Oleum e chalcantuo illitum.
Oleum nostrum de antimonio cum cautela adhibitum.

V T E R I.
D I O S C O R I D I S.

Ad vteri strangulatus.

Mei radices trita, & cum melle in eclegmate deuora-
Juniperi bacca pota. (ta.)
Vngues odorati suffiti.
Cimices lectularij naribus illiti.
Bitumen olfactum, suffitum & admotum.
Phoca coagulum potum.
Vrina cum ligustrino oleo seruesacta infusa.
Plantaginis succus potus.
Sinapi tritum naribus illitum.
Agaricum drachma pondere sumptum.
Ruta trita excepta melle, pudendis & sedi illita.
Pantacis herculei semen cum vino bibitum.
Seselis Massiliensis radix, & semen potum.
Peucedanum olfactum.
Sagapenum naribus ad olfaciendum illitum.
Trifolij bituminosi semen, & folia pota.
Paeonia nigri seminis grana xv. bibita.
Alismatis radix pota.
Betonica folia drachma pondere in aqua dulci hausta.
Gagates lapis suffitum.

M A T T H I O L I.

Zibetum cauernula umbilici illitum.
Iuglandium iuli in puluerem contriti, & ex vino ab-
bo poti.
Castoreum incensum naribus admatum.
Castoreum semioboli pondere cum pari assa foetida in
catapotys deuoratum.
Imperatoriae radix ex vino.
Sagapenum cum olfactum, tum catapotys deuoratum.
Alliaria semen suppositum.
Tussilaginis maioris radix duarum drachmarum
pondere ex mero pota.
Hippoglossi radicem, aut foliorum puluis cochlearis
mensura ex vino, vel iure haustus.
Antirrhini flores folia, et semen, cum rosaceo, & mel-
le umbilico adhibita.
Vitis alba radix ex vino pota.
Quinta essentia nostra, in comment. de vino descri-
pta, hausta, & in faciem proiecta.

D I O S C O R I D I S.

Ad menses ducendos.

Iris Illyrica ex vino sumpta, & fotu adhibita.
Mei radicem decoctum defessionibus adhibitum.
Acori decoctum in sessionibus.
Cyperi radicem decoctum fotu adhibitum.
Asari radices senis drachmis ex aqua bibita.
Phu decoctum potui datum.
Cassia odorata in potu sumpta.
Cinnamomum haustum, vel ex myrrha suppositum.
Amomum pessis, aut sessionibus additum.
Costus ebibitus.
Odoratus iuncus potui datus.
Calamus odoratus haustus, & suppositus fotu.

V T E R I.

Cancamum ex aqua malsa potum.
Helenij radicem decoctum potum.
Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, vel
ruta succo admota.
Styrax pota & apposita.
Bitumen ex vino, & castoreo bibitum.
Cedrides ex polline piperis hausta.
Eauri foliorum decoctum fotu admotum.
Phyllirex folia potui data.
Viticis semen drachma pondere ex vino haustum.
Olea Aethyopica, ac nostratis lachryma pota.
Amygdala amara deuorata.
Ficulneum lac cum detrita nuce graeca ebibitum.
Cochlea terrestres cum suo experimento tusa, & fami-
neis locis admota.
Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.
Cepae succus pudendis illitus.
Oesypum in lana suppositum.
Anserinus & gallinaceus adeps illitus.
Caprarum montanarum finum ex odoramento ali-
quo potum.
Standulaceum bibitum.
Seminis lini decoctum fotu admotum. (situm.)
Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle suppo-
Raphanus in cibum sumptus vel eius succus haustus.
Asphodeli radix potui data.
Eryngij decoctum haustum.
Brasidae succus ex loliacea farina suppositus, vel eius-
dem decoctum bibitum.
Sium pro olere sumptum.
Crithmum, vel eius decoctum in potu sumptum.
Centaurij maioris radix bibita vel eiusdem succus
suppositus.
Chondryllae gummi ex myrrha subditum.
Lactuca sylvestris lacteus succus bibitus.
Porrum domesticum, & sylvestre comestum.
Allij comarum decoctum in defessionibus additum.
Cyclaminus tunc pota, tum supposita.
Abrotani semen ex aqua haustum.
Capparis cortex & semen potui datum.
Anemones radix ex vellere apposita.
Hederæ corymbi triti subditi.
Pulegium bibitum.
Agarisum cum oxymelle drachma pondere haustum.
Origanum potum.
Absinthium haustum, vel ex melle subditum.
Tragoriganum potui datum.
Salvia decoctum potum.
Ammi ex vino haustum.
Thymi, thymbrag, decoctum in potu sumptum.
Serpyllum potui datum.
Smyrnyj semen ebibitum.
Amaraci decoctum haustum, vel pudendis illitum.
Baccharis radicis decoctum potum.
Ruta utraq, tum pota, tum subdita.
Panaces herculeum ex vino haustum.
Ligustici radix & semen potum, & illitum.
Pastinace erraticæ semen potum.
Seselis Massiliensis radix & semen haustum.
Tordilium potui datum.
Feniculum ex vino sumptum.

Sison bibitum.
Libanotis radices pota.
Pucedani succus potus.
Petroselinum potui datum.
Daucum haustum.
Hammoniacum in potu sumptum.
Nigella pluribus diebus hausta.
Sagapenum potum.
Laserpitij liquor cum pipere & myrrha bibitus.
Galbanum suppositum & suffitum.
Clinopodium haustum.
Chamaedrios decoctum potui datum.
Lilij cremati radix ex rosaceo subdita.
Melissophylli decoctum in defessionibus.
Trifolij semen & folia pota.
Polij utriusque decoctum haustum.
Scordij succus bibitus vel herba ipsa subdita.
Artemisia decoctum sessionibus additum.
Myrrhis bibita.
Conyzae folia & flores poti.
Hemerocallis radix cum vellere subdita.
Rusci folia & baccæ ex vino sumpta.
Leucorj decoctum folum, & sessionibus admotum.
Eiusdem semen drachmarum duarum pondere ex vino sumptum.
Anthemidis decoctum tum potum, tum folum adhibitum.
Paeonia radix amygdala quantitate hausta.
Rubia radix supposita.
Adianti decoctum bibitum.
Trichmanes potui data.
Anagyris tria folia ex passo sumpta.
Hypericum tam bibitum, quam suppositum.
Corisemen potui datum.
Vrtice utriusque folia trita, & cum myrrha subdita.
Betonica folia drachma pondere cum vino sumpta.
Medij semen haustum.
Chamaedaphnes foliorum succus ex vino bibitus.
Gladioli superior radix supposita.
Tragy liquor bibitus, quinetiam semen & folia pota drachma pondere.
Chrysoconiæ ex melicrato sumpta.
Elaterium in pefso subditum.
Helichrysi coma ex mulso potui data.
Mandragora liquor semioboli pondere subditus.
Eiusdem semen bibitum.
Daphnoides hausta.
*Veratrum { Nigrum }
 { Album } suppositum.*
Vitis nigra tenella viticula in cibum sumpta decocta oleorum vel asparagorum more.
Heliotropij folia supposita.
*Vinum { Scillinum bibitum.
 { Absinthites haustum.
 { Hyssopites potum.*

M A T T H I O L I

Nardus Italica & lauendula cum in potionibus, tum in fomentis.
Asarina decoctum potum.
Phu quoquomodo sumptum.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Calamici odorati vulgaris.
Crocum ex iure sumptum.

Iuniperinarum baccarum decoctum potum.
Sabina decoctum haustum.
Arundinis radix.
Cicerum rubeorum, nigrorum ve ius.
Lupini decoctum cum myrrha & melle impositum.
Sinapi in potione sumptum.
Dracunculi radix supposita.
Arisemen drachmarum duarum pondere haustum.
Gentiana quouis modo sumpta.
Aristolochia longa folum adhibita.
Centaurij magni radix ebibita.
Centaurij minoris succus suppositus.
Cardui benedicti decoctum tam haustum, quam folum adhibitum.
*Hyssopum } quoquomodo usurpatum.
 Pulegium }*
Dictamnus albus tum suppositus, tum cum pulegio suffitus, tum ex mero potus duarum drachmarum pondere.
Gattaria tam pota, quam defessionibus addita.
Calamintha tum pota, tum supposita.
Imperatoria quouis modo usurpata.
Vincetoxici radices in defessionibus addita.
Artemisia recentia folia, cum myrrha & oleo irino trita, & apposita.
Botrys suffitu usurpata.
Matricaria quoquo modo adhibita.
Lupuli semen tritum, & potui datum.
Quinta essentia nostra frequenter pota seiscuncia pondere.

M A T T H I O L I.

Ad alba vteri profluvia.

Hyoscyaminum oleum pubi & lumbis illitum, & suppositum cum lana.
Caphura cum succino, & aqua nymphæa hausta, aut pubi, aut imo ventri illita.
Flosculi medij rosarum cum suis capillis accepti.
Quernorū foliorū tenellorū stillatitia aqua hausta.
Castanearum interior rubens membrana cum eboris scobe & nymphæa albæ stillatitia aqua.
Saccharum e floribus punice arboris paratum.
Dactylorum ossa in pulverem trita, & cum sanguinis draconis lachryma & aqua portulacæ pota.
Ossicula mali punice acidi cum thuris polline ex stillatitia rosarum aqua.
Auellanarum putamina ex vino austero hausta.
Ebur in tenuissimum pulverem tritum, et ex cremore seminis lactuca potum, quod prius in aqua, in qua ferrum candens extinctum fuerit, sit maceratum.
Milij Indici panicularū flores ex vino austero hausti.
Ophioglossum ex quernorum foliorum aqua potum.
Salvia arida folia suffita.
Rosmarinum quotidie, idque diutius sumptum.
Lunaria minor ebibita.
Alchimilla lunariæ appellata stillatitia aqua pota, aut in uterum infusa, aut eius decoctum in defessionibus usurpatum.
Caryophyllata radices hausta.
Potentilla sicca farina ex sua ipsius aqua stillatitia, additis corallio & eboris scobe, pota.
Solbastrella, & eius semen.
Pulmonaria altera.

Amaranthi purpurei flos.
Ailifolium recens comusum, et suppositum, pubique
illitum: vel cum corallio, succino & eboris ramentis
ex sua ipsius aqua potum.
Malorum puniceorum acidorum vinum potum.
Cymbalaria herba in acetariis decorata.

DIOSCORIDIS

Ad menses cohibendos.

Nardus Indica.
Muscus arboribus innascens in seffionibus additus.
Thuris cortex in passo subditus.
Oxyacantha bacca in potu, vel in cibo sumpta.
Hypocistis tum pota tum indita.
Olea syluestris succus pudendis admotus.
Rhois semen potum, alba profluua sistit.
Palmula immatura manducata.
Palmularum involucrium potui datum.
Puniceorum acinorum nuclei siccati in sole, et obsonijs
inpersi, concoctive sumpti.
Galla in decoctis addita ad in seffiones parata.
Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in passo
suppositus.
Myrti semen fotu subditum, vel de seffionibus additum.
Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibendum.
Acacia tum pota, tum indita.
Lycium subditum.
Loti ligni decoctum haustum, aut fotu admotum.
Leutisci folia tam pota, quam subdita.

Coagulum	}	Leporinum	} potum ac etiam subditum.
		Hediuum,	
		Agninum	
		Ceruinum	
		Hinnulianum	
		Vitulinum	

Ceruinum cornu vssum, lotum ex adstringenti li-
quore aliquo haustum.
Caprarum montanarum finum siccatum tritum ve-
cum thure in lana suppositum.
Rumicis radices subdita.
Plantago tum bibita, tum fotu adhibita.
Barba hircina succus ex vino sumptus, vel suppositus.
Porri coma decoctum ex aqua marina, & aceto in de-
seffionibus.
Rubri ramorum decoctum potum.
Arabica spiraea radix manducata.
Phœnix ex vino austero bibita.
Papaueris nigri semen potum.
Achillea subdita.
Idea radix hausta.
Equiseti folia bibita.
Mentha fotu subdita.
Iunci marini semen frixum, et ex vino diluto potum.
Ocimastrum potum ex vino.
Anisum haustum, presertim ad alba profluua.
Cuminum ex aceto impositum.
Nymphaeae flore lutea radix, & semen ex vino nigro
potum.
Paeonia seminis grana xij. ex vino austero sumpta.
Lysimachiae succus subditus.
Noly herba cum loliacea farina indita.
Polygoni succus suppositus.
Symphiti petraei ex vino decoctum haustum.

Clymeni saccus bibitus.
Limonij semen acetabuli pondere ex vino bibitum.
Medij radix elixa, & ex melie in eclegmate sumpta.
Tragi ricini numero x. ex vino hausti.
Hyoisyami semen oboli pondere in mulla aqua potum.
Solani hortensis succus in lana inditus.
Mandragora semen cum sulphure, et vino suppositum.
Semperuianum maius in vellere subditum.
Vuarum vinaceorum decoctum haustum, & fotu ap-
positum.
Labruscae flos pessula inditus.
Omphacium inditum.
Rubigo ferri subdita.
Chalcitis cum succo porri indita.
Vini fax ima ventris, ac pudendis illita.
Hematites lapis ex vino haustus.
Morochthus lapis in vellere inditus.
Ostracites lapis drachma pondere ex vino sumptus.
Samia terra cum syluestris punicea floribus hausta.

MATTHIOLI

Hyoisyaminum oleum pubi & lumbis illitum, aut
suppositum.
Rosaceum unguentum.
Mastiches.
Iuniperinum gummi.
Cressini baccarum vinum.
Hypocistis saepe ex vino austero hausta.
Rosacearum baccarum semen, & tanugo ex vino austero.
Quercus folia, Glandes, & galla.
Suberis cortex tritus, & ex aqua calida potus.
Saccharum ex mali punicea floribus paratum, & ex
vino austero potum.
Myrteum condimentum pro intinctu usurpatum.
Cydoniorum vinum, Miua, oleum, confectio.
Mespilorum decoctum, & Mespila ipsa saepe esitata.
Corna saccharo condita decorata.
Virga sanguinea bacca.
Pruni syluestris decoctum in de seffionibus.
Leporinum steruus suppositum.
Mily Indici panicularum flores ex vino rubro.
Portulaca quoquo modo sumpta.
Bursa pastoris tum decorata, tum in de seffionibus addita.
Persicaria maculosa in de seffionibus ac etiam intus
sumpta.
Chelidonium maius mammis adhibendum.
Salvia arida suffita.
Flos solis cum radicibus contritus, & ex aqua planta-
rum sumptus.
Lunaria minor ex vino puniceorum hausta.
Clematis prima femoribus adalligata.
Bistorta & tormentilla radicum decoctum in de seffio-
nibus usurpatum.
Pilosella tam in corpus sumpta, quam exterius usurpata.
Caryophyllatae radices pota.
Pyrola
Potentilla
Sanicula
Auricula vrsi
Fragaria folia & radices.
Solbastrella, seu sanguisorba.
Pulmonaria altera.
Amaranthi purpurei flos potus.

V T E R I.

Millefolium recens infusum, et suppositum, pubiq, illitum.
Punicorum malorum acidorum vinum potum.
Corallium tam potum, quam suspensum.

D I O S C O R I D I S.

Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarum duarum pondere, cum pulegio bibitum.
Cyclamini alterius semen haustum.
Allij coma decoctum fotu impositum.
Aristolochia longa cum myrrha et pipere sumpta, vel pessulo indita.
Pulegium bibitum.
Thymi decoctum potui datum.
Thymbra decoctum haustum.
Apj semen in potu sumptum.
Marrubij decoctum bibitum.
Stachyos decoctum potui datum.
Artemisia decoctum in defessionibus adhibitum.
Circea radix quatuor librarum pondere contusa, & in septem dulcis vini heminis macerata per nocte diemq, tribus diebus pota.
Oenanthes semen, caulis & folia ex mulso bibita.
Leucosj semen drachmarum duarum pondere ex vino haustum.
Rubia radix supposita.
Anagyris trita folia ex passo bibita.
Chamapitys ex melle subdita.
Chrysocome ex aqua mulsa pota.
Trichomanes hausta.
Bryonia supposita.
Myrrha pota.
Peucedani succus potus.
Buny semen potum.
Smyrnij semen potui datum.
Adianthi decoctum bibitum.

M A T T H I O L L

Nardus Italica, aut lavendula pota.
Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.
Balsamum factitium potum.
Ari semen duabus drachmis potum.
Dictamni albi radices cu pulegio fotu adhibita, aut ex meraco pota duarum drachmarum pondere.
Liliorum alborum stillatitia aqua bibita.
Artemisia recens cum myrrha & irino oleo trita, & supposita.

D I O S C O R I D I S.

Ad expellendum factum.

Castoreum duarum drachmarum pondere cum pulegio sumptum.
Caricula lac prima fetura haustu, mortuum pellit.
Oesypus in lana suppositus.
Caprarum montanarum finum cum aliquo odora-mento potum.
Vulturis finum suffitum.
Ciceris decoctum bibitum.
Lupinorum decoctum cum myrrha & melle fotu adhibitum.
Sium pro olere in cibo sumptum.
Dracunculi maioris decoctum infusum.
Piper haustum.
Cyclamini radix femori adalligata.
Hedera foliorum pediculi melle illiti subditi,

V T E R I.

Gentiana radix subdita.
Centaurij maioris radix indita.
Centaurij minoris succus infusus.
Pulegium potum.
Dictamnium bibitum, inditum, incensumque.
Thymi decoctum haustum.
Thymbra decoctum potui datum.
Baccharis recentissima radix supposita.
Panacis Herculei acuminata radix indita.
Pastinaca erraticum radix subdita.
Seselis Massiliensis radix pota, quinetiam et semen.
Galbanum cum myrrha et vino potum suffitumque.
Clinopodium potum.
Chamadryos decoctum potum.
Scordij succus drachma pondere sumptus.
Artemisia decoctum in defessionibus adhibitum.
Conyza folia, & flores bibita.
Leucosj semen duarum drachmarum pondere ex vino potum.
Onosmatis folia ex vino hausta.
Rubia radix supposita.
Anagyris trita folia cum passo pota, quin & adalligata, sed statim post partum auferantur.
Anchusa radix apposita.
Mandragora liquor infusus.
Myrrhis pota.
Heliotropij folia indita.
Sulphuris fumus in uterum permeans.
Dauci semen bibitum.
Ammoniacum haustum.
Periclymeni semen drachma pondere in vino potum.
Lauri Alexandrina radix sex drachmarum pondere ex dulci vino sumpta.
Alumen subditum.
Iaspis lapis femori adalligatus.
Aetites lapis pro amuleto femori suspensus.
Samius lapis adalligatus.

M A T T H I O L L

Balsami factitij liquores omnes hausti.
Sabina hausta.
Dictamni albi radices cum pulegio fotu adhibita, aut ex meraco drachmarum duarum pondere hausta.
Calamintha seu pota, seu admota.
Artemisia radix pota.
Botryos suffitus per muliebria exceptus.
Chamapitys altera recens in aceto decocta, & pota.
Chrysocolla mineralis ex sabina succo drachma pondere pota.

M A T T H I O L L

Ad alleviationem partus.

Iuniperina, et laurina bacca cum cinnamomo in turturis ventre assata, & alternis diebus deuorata.
Lauri bacca septem deuorata.
Cochlea ante partum diebus aliquot comesta.
Malua cum radice ad lentorem usque decocta, & potui data.
Eiusdem succus potus.
Cardiaca herba sicca farina cochlearis mensura ex vino albo pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad presentem difficultatem partus.

Suffitus ex cancri aridis in vuluam exceptus.

V T E R I

Lingua chamaeleonis adalligata.
 Raphani cortex cum alijs nonnullis suppositus: lege
 raphani commentarium.
 Dictamnium Cretense in potu propinatum cum suo
 ipsius decocto.
 Dictamni albi radices cum pulegio suffita, aut ex
 meraco pota duarum drachmarum pondere.
 Liliorum alborum stillatitia aqua pota, additis croco
 & casia odorata.
 Lithospermii minoris seminis drachma dua ex lacte
 muliebri pota.
 Cardiacae herba in puluerem trita, pota ex vino albo
 calido cochlearis mensura.
 Chrysocolle fossitia drachma pondere pota. Atqui
 dari non debet nisi in magno discrimine vite.
 Argentum vivum semisrupuli pondere deuoratum.

D I O S C O R I D I S.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per se, & cum aqua sumpta.
 Leporinum coagulatum post triduum a purgatione
 menstrua sumptum.
 Sanguis menstruus illitus.
 Brassicae flores a puerperia in pessulo subditi.
 Asparagi radix suspensa.
 Piper a coitu illico subditum.
 Hederae corymbi drach. pondere a purgatione hausti.
 Hedy sarum ante coitum feminis subditum.
 Cedria virili membro illita.
 Ostracites lapis sicilici pondere 4. diebus a purgatione
 potus.
 Asplenium (ut quidam credunt) silente luna nocturno
 tempore decerptum, cum muli liene ventri adalli-
 gatum.
 Periclymeni semina & folia diebus triginta sex pota.
 Epimedij folia trita illico a purgatione quinq; diebus
 continuis bibita.
 Gladioli inferior radix hausta.
 Filicis femina radix potui data.
 Heliotropium adalligatum.
 Rubigo ferri pota.
 Mentha ante coitum vulua admota.

M A T T H I O L I

Leporinum stercus suspensum.
 Vinum in quo viuus nullus piscis immersus fuerit,
 Mula unguarum cinis haustus. (potum.)

D I O S C O R I D I S.

Ad conceptionem iuuandam.

Leporinum coagulatum cum butyro subditum statim a
 mensium purgatione.
 Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumine, & cro-
 co suffita.
 Pastinaca erratica semen potum.

M A T T H I O L I

Salvia succus hemina mensura, addito salis modico
 quaternis diebus potus.
 Cuminum suppositum.
 Imperatoria radix ex vino pota.
 Alchimilla, seu stellaria puluis ex vino aut iure, quin-
 decim aut viginti diebus continuis potus cochlea-
 ris mensura.
 Oleum e momordica vteri osculo inunctum, ante ve-
 neris congressum.

V T E R I

Oleum e gagate lapide illitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad foetum mortuum educendum.

Dictamnium tum potum, tum subditum.
 Salvia decoctum bibitum.
 Galbanum cum myrrha ex vino potum.
 Marrubij decoctum haustum.
 Tussilaginis decoctum potui datum.

M A T T H I O L I

Balsami factitij liquores omnes hausti.
 Centaurij magni radix.
 Centaurij minoris succus suppositus.
 Pulegij decoctum haustum.
 Calamintha tam pota quam supposita.
 Botrys cocta ac suffita.
 Chamapityos ex aceto decoctum haustum.
 Chrysocolle fossitia drachma pondere ex succo saba-
 na pota; sed ubi tantum vite periculum adsit.

D I O S C O R I D I S.

Ad prohibendum abortum.

Actites lapis sinistro brachio adalligatus.
 Samius lapis pro amuleto suspensus.

M A T T H I O L I

Daelyli recentes cu infectory cocci puluere deuorati.
 Cydonia mala frequenter esitata.
 Salvia saepe deuorata, vel saccharum ex eius floribus
 paratum.
 Bistorta vel tormentilla radices bibita & ventri,
 lumbisque ex aceto illita.
 Coccum infectorium quotidie in ovo serbati propina-
 tum, thure modico addito aut mastiche. Puluerem
 praestantissimum ad hoc habes lib. 4. cap. 43.
 Iaspis lapis gestatus.

D I O S C O R I D I S.

Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.
 Baccharis radices decoctum fotu adhibitum.
 Faniculum erraticum potum.
 Peucedani succus haustus.
 Præonia siccata radix potui data.
 Althea decoctum infusum.

M A T T H I O L I

Balsami factitij liquores omnes poti.
 Dictamni albi radices supposita, aut cum pulegio suf-
 fita: quin etiam ex meraco pota duarum drach-
 marum pondere.
 Menthastrum bibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad prægnantium malacia.

Vitis vinifera foliorum, capreolorumq; succus potus.

D I O S C O R I D I S.

Ad vteri inflammationes.

Nardi Indica decoctum fotu adhibitum.
 Iunci odorati decoctum in defensionibus adhibitum.
 Viticis foliorum, & seminum decoctum fotu appo-
 situm.
 Butyrum recens illitum.
 Sonchi succus inunctus.
 Agaricum drachma pondere cum oxymelite potum.
 Pulegij decoctum fotu subditum.
 Melilotus cum passo emplastri modo impositus.
 Panacis herculei lachryma ex melle indita.

Artemisia decoctum in defensionibus adhibitum.
Leucocy decoctum fotu appositum.
Anthyllidis radix ex rosaceo, lacteque indita.
Parthenij decoctum in defensionibus additum.
Althaa decocta, aut subinde anserino, suillove adipe,
aut resina terebinthina subacta, subdita.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum illitum.
Consolida regalis flores poti.
Oleum de momordica illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad exulceratos locos.

Aspalathi ex vino decoctum infusum.
Lac in quo igniti calculi extincti fuerint infusum.
Oesypum inditum, explet enim & emollit.
Fenograci folia ex aceto illita.
Asclepiadis folia adhibita.

MATTHIOLI.

Malicorium cum marina spongia exiccata, additis
aloe & alumine.
Solidaginis media, et minoris farina inspersa, aut suc-
cus illitus, aut infusus.

Sanicula
Auricula ursi
Pilosella
Pyrola
Potentilla

} adhibita.

Oleum de momordica siphone iniectum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos locos.

Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, vel ru-
ta admota.
Styrax illita.
Anserinus & gallinaceus adeps illitus.
Bdellium inunctum.
Malua decoctum inditum.
Ladanum pessis inmissum.
Panaces herculeum ex melle inditum.
Ebuli, sambuciq; decoctum fotu admotum.
Parthenij decoctum in defensionibus.
Fenigraci ex aqua expressus succus, cum anserino a-
dipe in pessulo subditus.
Lily radix admota.
Ageratum suffitum.

MATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.
Sesaminum oleum.
Oleum ex ouorum vitellis.
Ceruina & vitulina medulla.
Lini seminis oleum.
Oleum liliorum alborum.
Lupuli florum decoctum in defensionibus usurpatum.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri inflationes.

Ruta ex oleo decoctum clystere perfusum.
Geranium & eius radix drachma pondere pota.

MATTHIOLI.

Galanga.
Cubeba.
Cinnamomi stillatitia aqua.
Balsami factitij liquores, & oleum in potionibus.
Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.
Scorpionum oleum in potu datum, aut exterius illi-
tum.
Castoreum cum pipere albo, & melicrato potum.
Milium cum sale impositum.
Sisymbrium in calenti tegula calefactum, & odorato
meraco aspersum, ventrig; applicatum.
Dictamni albi radices duarum drachmarum ponde-
re ex meraco pota.
Mentha graeca in placentis addita, aut eius folia te-
nui pulticula illita, & deinde in oleo, aut butyro
frixa & deuorata.

Carum quouis modo usurpatum.
Imperatoria radix hausta ex meraco.
Matricaria quoquomodo adhibita.

MATTHIOLI.

Ad molam expellendam.

Balsamum factitium potum.
Dictamni albi radices supposita, aut cum pulegio
suffita, aut ex meraco duarum drachmarum pon-
dere bibita.

MATTHIOLI.

Ad vteri frigiditatem.

Nardus Italica.
Lauendula.
Cubeba.
Cinnamomi stillatitia aqua.
Balsamum factitium, & eius liquores omnes.
Nux myristica.
Scorpionum oleum in vini portione sumptum, & fo-
rinfecus applicatum.
Dictamni albi radices, aut cum pulegio suffita, aut ex
vino meraco pota duarum drachmarum pon-
dere.

Mentha graeca tam fotu, quam potu usurpata.
Carum quouis modo sumptum.
Imperatoria radix ex vino pota.
Matricaria quomodolibet usurpata.

MATTHIOLI.

Ad vuluam cohibendam.

Nucum siue viridium conorum pini stillatitia aqua
cum linteolis in ea madefactis admota.

MATTHIOLI.

Ad delectandas feminas in coitu.

Fel { *Aurata* }
 { *Lucy* } *coli virilis inunctus.*
 { *Perdicis* }
 { *Gallinacei.* }

Zibettum pensillitum.

DIOSCORIDIS.

Ad procidentem vterum.

Casia fotu, vel suffitu adhibita.
Myri baccarum succus in defensionibus.
Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.
Gallarum decoctum in defensionibus additum.
Acacia subdita.
Hypocistis subdita.
Vrtica utriusq; folia imposita.
Acetum fotu adhibitum.

MATTHIOLI.

Mastiche aspersa.

V T E R I
D I O S C O R I D I S
Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps { Anserinus } illitus.
{ Gallinaceus }

Vrina cum ligustrino oleo seruesacta imposita.
Lini seminis decoctum infusum.
Malua decoctum fotu adhibitum.
Portulaca decoctum chysmate inditum, proprie facit
ad erosiones.
Rhaponticum potum.
Centaurij maioris radix bibita.
Anethi decoctum in desessionibus.
Verbenaca recta folia ex recenti suillo adipe, vel ex
rosacco subdita.
Hyoscyami seminis cremor inditus.
Mandragora liquor pessulis impositus.

M A T T H I O L I

Irinum oleum illitum.
Cinnamomi stillatitia aqua pota.
Amygdalinum oleum haustum.
Laurinum oleum inunctum.
Balsami factitij liquores omnes.
Nucis myristica decoctum ex rhodomelite, & aqua
vite potum.
Nucis myristica cum matricaria radicibus ex vino
albo cocta, & potui data.
Scorpionum oleum in potione sumptum, aut foris ad-
motum.
Castoreum cum pipere albo ex melicrato.
Sisymbrium cum Parthenio in calenti tegula calefa-
ctum, et odorato meraco aspersum, et impositum vteri.
Succisa radicum decoctum ex vino paratum.
Chelidonium maius cum radice tusum, & oleo chama-
melino seruesactum, & imo ventri admotum.
Dictamni albi radices ex meraco vino pota.
Mentha grata in placentis addita.
Imperatoria quouis modo bibita.
Vincetoxici radices in desessionibus addita.
Oleum liliorum alborum, & lini semine calidum
cum succida lana ventri adhibitum.
Botrys recens in tegula calefacta, & cretico vino a-
spersa & imposita.
Aliud simile medicamentum, sed praestantius vide
lib. 3. cap. II3.

Matricaria quoquomodo adhibita.

E X T R E M O R V M M E M B R O R V M

D I O S C O R I D I S

Ad podagram.

Amomum illitum.
Alei radices imposita.
Populi nigra folia ex aceto illita.
Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.
Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impositum.
Ficulneum lac cum farina fenigraci, & aceto cata-
plasmatis additum.
Cochlea terrestres suo cum operimento tusa imposita.
Mustela cremata cinis ex aceto inunctus.
Marinus recens pulmo concisus impositus.
Lac humanum cum opio, & cera illitum.
Adeps ouillus, caprillus, hircinusve ex eiusdem ani-
malis fimo coactus inunctus.
Sanguis menstruus inunctus.

E X T R E M O R V M M E M B R O R V M

Caprarum montanarum fimo ex earum adipe il-
litus.
Hordei farina cum cotoneis malis imposita.
Lens cum polenta decocta, et emplastri modo adhibita.
Raporum decoctum fomentis additum.
Brassica cum feno graco & aceto in cataplasmate.
Intybus per se, & cum polenta illitus.
Cucurbita ramenta imposita.
Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.
Asphodeli radix drachma pondere ex vino pota.
Cyclamini decoctum fotu adhibitum.
Bulbi per se, & cum melle impositi.
Panaces herculeum cum passa vna illitum.
Libanotis cum loliacea farina, & aceto cataplasma-
tis addita.
Scordium ex aceto, aut aqua impositum.
Lencoium ex aceto illitum.
Androsaces imposita.
Helxines succus cera, & hircino adipe exceptus.
Hyoscyami semen, & folia cum polenta cataplasma-
tis adhibita.
Sempernium inunctum, ubi calor exuperat.
Vrtica emplastri modo illita.
Muscus marinus impositus.
Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.
Thapsia succus illitus.
Glans unguentaria illita.
Sambuci & ebuli folia cum seuo taurino, aut hircino
imposita.
Bryonia cum caprino stercore cataplasmatibus addita.
Heliotropij folia illita.
Vna passa a nucleis repurgata, & cum panacis succo
inuncta.
Acetum calido fotu cum sulphure adhibitum.
Rubigo ferri illita.
Sulphur cum aqua & nitro inunctum.
Sal cum aceto impositum.
Asius lapis cum fabarum lomento illitus.
Gagates lapis inunctus.
Fornacea testa exusta imposita.

M A T T H I O L I

Oleum irinum e floribus paratum.
Asarina, aut eius decoctum potum.
Santalum rubrum e sedi succo, aut solani, aut portu-
lace illitum.
Muscus terrestris ex aqua decoctus & admotus.
Terebinthina resina, aut larygna cum chamapity de-
uorata.
Iuniperini ligni decoctum pro balneo usurpatum: vi-
de Iuniperi commentarium.
Oleum e luteis ouorum illitum.
Oleum e terrenis vermibus.
Faba fresca cocta, & cum adipe suillo subacta & im-
posita.
Plantago trita & illita.
Dracunculi radix cum melle, & caprino fimo illita.
Ari folia calenti fimo bubulo illita & imposita.
Aristolochia rotunda.
Thymi aridi semuncia cum oxymelle hausta.
Canabis sativa radix in aqua decocta & illita.
Chamapity decoctum cum rhodomelle, & oxymeli-
te pluribus diebus potum.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Cortusa florum oleum illitum: Parandi rationem habes lib. 4. commen. de lagopo.
 Primula veris illita ac deuorata.
 Verbasci minoris folia in aqua decocta, & illita.
 Eiusdem florum oleum inunctum.
 Genista florum conferva ex saccharo parata frequenter deuorata.
 Ricini semen ex iure veteris galli decoctum et potum.
 Sambuci tenerrima folia primo germinata prodeuntia, cum pari pondere radicum plantaginis, suille, & axungia veteris contrita, & illita.
 Colocynthis in catapotijs deuorata, & clysteribus addita.

DIOSCORIDIS.

Ad coxendicos affectus.

Mei radices imposita.
 Helenij folia ex vino cocta imposita.
 Iridis Illyrica decoctum clysmate infusum.
 Cardamomum ex aqua potum.
 Asarum potum, vel clystere infusum.
 Populi alba cortex vncia pondere haustus.
 Iberis contusa & emplastri modo imposita.
 Siluri piscis salsamentum clysteribus infusum.
 Piscium garum clysteribus iniectum.
 Smyrni semen potum.
 Bubulum finum ex bobus in pascuis degentibus illitum.
 Loli farina ex aqua malsa decocta imposita.
 Lupinorum farina ex aceto illita.
 Ammoniacum bibitum.
 Ascyri semen ex aqua potum.
 Asparagi radicem decoctum bibitum.
 Althae decoctum potui datum.
 Sinapi cum fico tritum impositum, donec ruborem excitat.
 Nasturtium clysmate infusum.
 Irionis semen clystere iniectum.
 Bulbi per se & cum melle impositi.
 Capparis semen potum.
 Lepidij folia & radices cum heleny radice trita & imposita.
 Agaricum trium obolorum pondere in aceto mulsio potum.
 Rhaponticum potum.
 Androsami semen bibitum, sed a purgatione aquam exorbere oportet.
 Centaurij maioris decoctum clystere infusum.
 Leucacantha radicis ex vino decoctum bibitum.
 Abrotani semen cum aqua potum.
 Rubia radix pota.
 Pulegium illitum quousque rubescat cutis.
 Calamintha imposita recens, tritaque donec exurat locus.
 Thymus ex fimo cum potentilla impositus. Idem praestat & Thymbra.
 Ruta sylvestris semen quadraginta diebus potum.
 Panaces Herculeum ex melle inunctum.
 Laser cera, ligustrino & Irino oleo subactum illitum.
 Euphorbium in odorata portione sumptum.
 Leontopetalum clysteribus infusum.
 Hyperici semen quadraginta diebus potum.
 Chamapityos folia 40. diebus ex dulci aqua bibita.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Betonica folia ex aqua bibita.
 Polemonia radix ex aqua sumpta.
 Xyridis radix ex mulsio pota.
 Ocimastri semen cum vino, myrrha, et pipere sumptum.
 Quinquefolij radicis decoctum potum.
 Heliochrysi coma ex vino hausta.
 Papaueris corniculati radicis decoctum potum.
 Aethiopidis decoctum bibitum.
 Arction ex vino haustum & illitum.
 Chamacissi folia trium obolorum pondere in aqua cyathis tribus, tricenis, quadragenisve diebus pota.
 Colocynthis clystere infusa, et recens loco confricata.
 Cucumeris sylvestris radix clysmate infusa.
 Stammaonia ex aceto decocta, & cum bordeacea farina imposita.
 Acetum mulsio haustum.
 Sory ex vino clystere infusum.
 Muria clystere indita.
 Adarces illitus.

MATTHIOLI.

Asari decoctum, siue dilatum ex caprino sero paratum potum.
 Balsami factitij liquor secundus, tum haustus tum illitus.
 Abiegna lachryma deuorata.
 Nuclei pinei frequenter sumpti.
 Terebinthina, aut larigna resina sumpta vncia pondere, addito chamapityos, aut stachadis puluere.
 Castoreum drachma pondere potum, cum tribus opopanacis obolis.
 Ibicis stercoris admirabile medicamentum: vide li. 2. commentarium de stercore.
 Fabatum caulium & siliquarum cinis cum vetere axungia illitus.
 Lupinorum farina cocta, & cataplasmatibus modo illita.
 Siliquastri recentia, corniculata tusa & illita.
 Agaricum in potionibus additum.
 Thymij aridi semuncia cum oxymelite hausta.
 Sagapenum quoquo modo adhibitum.
 Euphorbium ex leucioy oleo illitum.
 Artemisia arida puluis trium drachmarum pondere ex vino haustus.
 Bellidis genera omnia quouis modo usurpata.
 Chamapityos in puluerem cum radicibus trita, & cum terebinthi lachryma drachmis quatuor excepta, & quotidie diebus quadraginta deuorata.
 Oleum flammula calidum inunctum, aut infusum clysteribus.
 Consolida regalis flores poti.
 Daphnoidis recentia folia contusa, & illita donec rubescat locus.
 Saccharum e genista floribus paratum.
 Ricini semen ex iure veteris galli decoctum potum.
 Colocynthis in catapotijs deuorata, & in clysteribus addita.

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum dolores.

Gallorum senescentium ius potum.
 Brassica cum fenogracio, & aceto illita.
 Ruta tum hausta, tum cataplasmatibus adhibita.
 Agaricum drachma pondere ex aceto mulsio sumptum.
 Melissophyllum ex sale impositum.
 Quinquefolij radicis decoctum bibitum.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Psyllium ex rosacco & aceto, aut aqua illitum.
Mandragora radix cum polenta imposita.
Urtica cataplasmatibus modo adhibita.
Veratrum nigrum posum.
Ficus marinus recens impositus.
Thapsia succus inunctus.
Nigri radice trita, & ex melle imposita.
Acetum mulsum potum.
Vinum melitice frequentius potum.

MATTHIOLI

Irinum oleum inunctum.
Balsanum factitium illitum.
Oleum flammule inunctum, & clysteribus additum.
Cortusa herba oleum: vide lib. 4. comment. de lagopo, primula veris herba.
Abiegna, lentifera, scrobintina, larginaque lachryma, unaqueq. per se deuorata.
Mastiche cum cumino pulegio satua, lauri baccis, & sabina, omnia melle excepta & imposita.
Cochlea cum testis trita, & imposita.
Oleum e terrenis vermibus.
Sagapenum quomodo libet adhibendum.
Oleum liliorum alborum illitum.
Cannabis radix in aqua decocta & adhibita.
Chamæpytis decoctum cum Rhodomelle & oxymelite pluribus diebus potum.

MATTHIOLI

Ad articulos articulorum dolores.

Ligni Guaiaci.

Radix China } decoctum diebus xl potum.
Zarzaparilla }

MATTHIOLI

Ad genuum dolores.

Oleum e nucibus Indicis.

DIOSCORIDIS

Ad articulorum collisiones.

Sarcocolla cinis cum axungia vel oleo illitus.

DIOSCORIDIS

Ad articulorum tephos.

Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.

Ochra inuncta.

MATTHIOLI

Oleum Indice nucis illitum.

Taxi pinguedo.

Muris montani pinguedo.

Sagapenum emplastri modo impositum, addito aceto & capparum succo.

Oleum liliorum alborum.

DIOSCORIDIS

Ad perniones,

Thus cum sullo adipe, aut anserino impositum.

Pix liquida inuncta.

Acacia illita.

Myrti seminis decoctum fotu adhibendum.

Ficus cremata cum cerato imposita.

Cancrorum fluuiatiliu cinis cum decocto melle illitus.

Pulmo marinus recens concisus, & impositus.

Asinine ungula cinis oleo maceratus illitus.

Vrsinus adeps inunctus.

Vmbilici veneris succus impositus.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonio malo & rosaceo adhibita.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Orobi decoctum fotu impositum.

Raporum decoctum fomenti modo.

Beta decoctum impositum.

Dracunculi maioris folia ex vino decocta & imposita.

Oleum ex incauata asphodeli radice decoctum illitum.

Cyclamini decoctum fotu adhibendum, quinetiam oleum cum pauca cera in eius excauata radice feruesfactum illitum.

Scilla cremata imposita.

Ranunculi decoctum inunctum.

Arction ex vino illitum.

Alumen aqua aspersum.

MATTHIOLI

Malicorium ex vino decoctum, & impositum.

Cancrorum exustorum cinis oleo subactus, & impositus.

MATTHIOLI

Ad pedum tumores.

Tilia folia ex aqua aspersa.

DIOSCORIDIS

Ad pedum inflammationes ex calceosum attritu.

[Agninus]

Pulmo Vrsinus } impositus.

[Swillus]

Calceamentorum veterum sola combusta, & illita.

Caprae succus cum adipe gallinaceo impositus.

MATTHIOLI

Leporinus pulmo impositus.

Vnguentum ex rosaceo in mortario plumbo paratum.

DIOSCORIDIS

Ad pedum tunc.

Cancrorum fluuiatiliu cinis cum decocto melle illitus.

Scilla oleo feruesfacta, & cum resina imposita.

MATTHIOLI

Oleum ex ouorum vitellis.

Oleum ex tritico.

Vnguentum e rosaceo in mortario plumbeo diu circumductum, ut habes lib. 5. com. de plumbo.

DIOSCORIDIS

Ad digitorum reduuias.

Punicorum malorum succus illitus.

Myrti folia trita & inspersa.

Olea sylvestris folia trita & imposita.

Eboris ramenta in puluerem adhibita.

Aloe cum passo imposita.

Paronychia concisa & illita.

Bryonia oleo decocta, quousque liquefcat inuncta.

Labrusca cremati flores ex melle impositi.

Rubigo ferri illita.

Acacia illita.

Rhois folia ex aceto, aut melle illita.

Marrubij folia ex melle imposita.

Quinquefolij radix illita.

Tithymali characia lac illitum.

Acetum illitum.

Alumen aqua inspersum.

Sal impositum.

MATTHIOLI

Plantaginis folia recentia trita, & illita.

DIOSCORIDIS

Ad paronychia

Thus cum melle illitum.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Eboris scobes inspersus.

Paronychia folia illita.

DIOSCORIDIS.

Ad scabras ungues auferendos.

Pix liquida illita.

Lini semen cum pari nasturtio & melle.

Cupressi pilula imposita.

Lapathi cuiusque radix in aceto decocta illita.

Ranunculi folia & radices admota.

Chelidonium minus illitum.

Viscum cum trito auripigmento appositum.

Alumen cum aqua aspersum.

Sulphur cum resina terebinthina inunctum.

Sandaracha cum pice imposita.

Fax vini cremata ex resina.

MATTHIOLI.

Ranunculus tritus impositus.

Chelidonium minus tritum & illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad mobiles ungues extrahendos.

Vua passa illita.

DIOSCORIDIS.

Ad conulos ungues.

Bulbi cum potentia impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad clauos, & callos.

Fermentum triticeum illitum.

MATTHIOLI.

Saligni corticis cinis ex aceto maceratus impositus.

Blitum illitum.

Lily radix axungia excepta & illita.

MATTHIOLI.

Ad verrucas.

Cichorium verrucarium in acetario deuoratum.

Eiusdem herba semen drachma pondere tribus diebus potum, ante nocturnum decubitum.

DIOSCORIDIS.

Ad varices.

Cirsij radix dolenti loco adalligata.

DIOSCORIDIS.

Ad lumborum dolores.

Echy radix pota.

Chameleuce illita.

DIOSCORIDIS.

Ad inguinum inflammationes.

Leporinus pes herba imposita.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Aster atticus recens illitus.

MATTHIOLI.

Cochlea minores trita, & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad enterocelas.

Cupressi pilula illita.

Punicorum cytini cataplasmatibus additi.

Symphytum petreum emplastri modo impositum.

Quinquefolium haustum.

Equiseti radix & folia imposita.

Alae emplastri modo illita.

MATTHIOLI.

Edellium salina matutina subactum emplastri modo impositum.

Cupressini conii virides ex vino vetere decocti, et epoti, interim tamen cupressinis folijs affecto loco adalligatis.

Vlmi folliculorum liquor impositus.

Cupressi item folia contusa & affecto loco illita.

Leporinus finus & pili, qui sub ventre habentur cum melle decocti, & faba quantitate frequenter deuorati.

Ophioglossum in potione sumptum, & extrinsecus impositum.

Trinitatus herba puluis dimidij cochlearis mensura ex vino austero pluribus diebus potus.

Lunaria minor in potu usurpata.

Polygonum minus in potionibus sumptum.

Sanicula quouis modo sumpta.

Auricula vrsi ebibita.

Pilosella farina hausta.

Caryophyllata radices ebibita.

Potentilla tam in cibis, quam in potionibus usurpata.

Personata in vino decocta, aut trita & epota.

Alchimilla arida puluis ex sua ipsius aqua stillatitia sumptus.

Hippoglossi radicem, aut foliorum puluis sesquidrachma pondere ex maioris symphyti decocto potus.

DIOSCORIDIS.

Ad farcocelas.

Cinis sarmentitius illitus.

MATTHIOLI.

Anonidis radix trita, & mensibus pluribus hausta.

SIMPLE

SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM
FACULTATES SECVNDVM GENERA,
Ex Dioscoride.

FEBRIVM.

DIOSCORIDIS.
Ad tertianas.



ARANEVS, plagella confriatus, lin-
teolove illitus, mox fronti, & tem-
poribus impositus.

Vermes terreni, cum anserino adipe
decocti & illiti.

Plantaginis radices integra tres, cum vini cyathis
tribus, & pari aqua pota.

Trifolij bituminosi tria folia trita, totidemque semi-
na epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenaca supina tertius a terra geniculus, cū adia-
centibus folijs bibitus.

Heliotropij seminis grana quatuor, pota ante febris
accessionem.

Portulaca succus haustus.

DIOSCORIDIS.

Asari ex vino decoctum potum, addito melle, maci,
& cinnamomo.

Rosarum succus, & dilutum potum.

Tamarindi hausti.

Sebestena.

Lapis inuentus in capite nude limacis suspensus.

Caninum stercus album in accessione cochlearis men-
sura ex vino potum.

Agaricum in portione sumptum.

Rhabarbarum potui datum.

Gentiana stillatitia aqua pota.

Centaurij minoris decoctum potum.

Chamaedryos decoctum aliquot diebus potum.

Iaspis lapis gestatus.

DIOSCORIDIS.

Ad quartanas.

Cimices lectularij septem, cauis fabarum inclusi, &
poti.

Plantaginis radices integra quatuor, cum vini cya-
this quatuor, & pari aqua bibita.

Vermiculi qui in dipsaci echino internis partibus con-
clusi reperiuntur, in aluta collo, brachiove adalli-
gati.

Ruta syluestris cum vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinquefolij rami quatuor sumpti.

Verbenaca supina quartus a terra geniculus una
cum adiacentibus folijs haustus.

Heliotropij seminis grana quatuor, hora una ante
accessionem pota.

MATTHIOLI.

Asari ex vino albo decoctum addito melle, maci, &
cinnamomo.

FEBRIVM.

Asarinum oleum pedum plantis, & spina dorsi illitū.
Myrrha drachma ex vino Cretico calido pota hora
una ante accessionem, sed agros subinde in lecto
sudare oportet, et potionem tribus in accessionibus
replicare.

Eadem in catapotijs cum theriaca conformatis.

Gentiana stillatitia aqua pota.

Eryngij tenellorum foliorum stillatitia aqua.

Imperatoria radice drachma, ex mero calido hora
una ante accessionem pota.

Cardui benedicti decoctum, aut herba ipsa in pulue-
rem pota.

Palme Christi radices per portiones sumptae.

Flammula & eius aqua pota.

Verbasci feminera radice succ^o duarū drachmarū pon-
dere, ex Cretico vino haustus, ipsa hora accessionis.

Ellebori nigri dilutum potum.

Sibium nostrum quatuor granorū pondere sumptū.

DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas febres.

Galli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.

Agaricum haustum.

Vinum melitites haustum, ubi ventriculus magna
imbecillitate laboret.

MATTHIOLI.

Asari decoctum potum.

Agaricum in portionibus additum.

Rhabarbarum frequenter potum, & eius dilutum.

Gentiana aqua pota.

Anthemidis florum pastilli, in suo ipsius oleo dissolu-
ti, & febrientibus a vertice capitis vsque ad pedes
illiti. Parandi modū habes lib 3. ca. de anthemide.

Eupatorij decoctum potum.

Foliorum, & folliculorum lupuli decoctum.

Ellebori nigri decoctum.

Sibium nostrū quatuor granorum pondere sumptū.

MATTHIOLI.

Ad continuas.

Cassia solutina pulpa sumpta.

Santala omnia pota, vel ex aqua rosacea ventriculo
illita.

Melopeponum seminum cremor ex hordeacea ptisa.

Trifolij acetosi stillatitia aqua.

Anguria pulpa deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad hepialas.

Hyoscyami tria, vel quatuor folia pota.

MATTHIOLI.

Acori

Feniculi

Asparagi

Agarici

} decoctum potum.

f 4

Eupatorium

Eupatorium quocunque modo usurpatum.

MATTHIOLI

Ad quotidianas.

Agaricum in potionibus additum.

Rhabarbarum, & eius dilutum frequenter potum.

Genista stillatitia aqua potui data.

Eryngij stillatitia aqua pota, q̄e tenellis paratur folijs.

MATTHIOLI

Ad compositas febres.

Gentiana stillatitia aqua pota.

Agaricum & eorum dilutum potum.

Rhabarbarum

DIOSCORIDIS.

Ad caufum.

Cressini baccarum succus cum violaceo iulapio propinatus.

Vua spina in sculis incocta.

Ribes vulgare.

Salicum & arundinum folia circa lectulum sparsa.

Cerasia acetosa saccharo condita.

Melopeponum, cucumerum, cucurbitarumq; seminum lacteus cremor potus.

Anguria pulpa deuorata.

Potentilla pedum plantis manuumq; volis, admota.

DIOSCORIDIS.

Ad hecticam.

Portulaca tum ventriculi osculo, tum hypochondrijs illita.

MATTHIOLI

Amygdalinum oleum.

Pistacia quoquomodo sumpta.

Nuclei pinei.

Stibium nostrum quatuor granorū pondere sumptū.

DIOSCORIDIS.

Ad febrium circuitus.

Sinapi cibus inspersum.

Smyrnyj semen potum.

Piper bibitum.

Ruta pota.

Sagapenum haustum.

Anthemis clysmate infusa.

Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.

Quinquefolij folia ex dulci aqua, aut diluto vino, cum exiguo pipere bibita.

DIOSCORIDIS.

Ad febrium algores.

Piper haustum.

Agaricum drachma pondere sumptum.

Aristolochia rotunda ante accessionem bibita.

Abrotonum ex oleo inunctum.

Calaminthe decoctum potum.

Panaces herculeum illitum.

Smyrnyj semen, & radix ex mulso pota.

Pyrethrum inunctum.

Lascer cum pipere, & thure ex vino haustum.

Grossi cocta & illita.

Vipera carnes cocta, & in cibum sumpta.

Mustela sanguis inunctus.

Asinini unguis cinis, ex oleo maceratus illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex vino pota.

MATTHIOLI

Phu decoctum potum, & ipsa quoque radix hausta.

Myrrha.

Caphura.

Dictamnus albus.

Cressini baccarum succus.

Vua spina succus.

Ribes vulgare succus.

Quernorum foliorum stillatitia aqua.

Citry mali succus.

Limonij & aurantij florum stillatitia aqua.

Auarantia acida.

E limoniorum succo stillatitia aqua.

Cyanus herba & eius flores.

Galega & radicū decoctū, addito armenio bolo.

Tormentilla

Cardui benedicti decoctum, & ipsa herba pota.

Scordium quouis modo usurpatum.

Tussilaginis maioris radix.

Tormentilla radicū decoctum, vel aqua stillatitia, vel puluis.

Scabiosa quouis modo hausta.

Sanguisorba decoctum haustum.

Eentis palustris stillatitia aqua.

Punicorum malorum vinum ex oxalidis, aut intybi aut borraginis aqua potum.

Armenia terra ex oxalidis aqua sumpta.

Antidotum nostrum magnum descriptum in praefatione sexti libri.

MATTHIOLI

Ad pestem, & pestilens contagium.

Citry pomi semen.

Scorpionum oleum nostrum, cordi, & arterijs temporum, manuum, pedumq; frigidum quotidie illitū.

Ceruini, cordis os.

Scorzonera radix, aut eius succus.

Cepa excauata, theriaca, & citry succo repleta, & calentibus cinerib. cocta expressus cremor potus.

Caryophylli tam deuorati, quam suffiti.

Saccharum e caryophyllorum floribus paratum.

Caryophyllorum florum succus, ex tota planta expressus & haustus.

E caryophyllis floribus paratum insolatūq; acetum manibus & arterijs illitum.

Zedoaria commansa, vel in potione sumpta.

Succisa radix viridis, recensq; carbunculis imposita.

Eiusdem ex vino dilutum potum.

Cruciata vtriusque radices quoquo modo sumpta.

Aristolochia longa pota.

Veronica mas drac. duabus vnā cum theriaca drachma ex vino meraco pota, ad ciendum sudorem.

Dictamni albi radices.

Galega siue ruta capraria quouis modo usurpata quotidie.

Eiusdem succus, addita theriaca, trium unciarum pondere potus.

Agaricum in potionibus.

Gentiana.

Abrotonum.

Calamintha intus sumpta, & foris cum oleo feruesceta illita.

Imperatoria radix pota.

Saccharum

TVMORVM PRAETER NATVRAM.

Saccharum è roris marini floribus paratum.
 Vincetoxici radices ex vino pota.
 Carduus benedictus.
 Chamadrys à ieiunis quotidie in acetarijs sumpta.
 Scordium quomodo libet sumptum.
 Tussilaginis maioris radix duarum drachmarum
 pondere ex vino calido pota, ad sudandum.
 Scabiosa succus quatuor unciarum pondere cum the-
 riaca drachma pota, ad citandum sudorem.
 Pimpinella radices quoquomodo sumpta.
 Sanguisorba, & eius aqua stillatitia.
 Angelica radices semidrachma cum theriaca drach-
 ma & sua ipsius aqua pota, ad citandum sudorem.
 Stibium nostrum quinque granorum pondere sum-
 ptum, cum electuario liberantis in principio morbi.
 Armenia terra in antidotis addita.
 Argentum viuum precipitatum ex rhodosaccharo
 sumptum.
 Oleum è chalcantio scripuli pondere sumptum, cita-
 to subinde sudore.
 Antidotum nostrum magnum in praefatione 6. libri
 descriptum, tam ad infectos curandos, quam ad
 praeseruandos sanos.

TVMORVM PRAETER NATVRAM.

MATTHIOLI.

Ad exanthemata & morbillos.

Napi rapivè semen ex adianti decocto potum.
 Cancanum ex caricarum decocto haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad inflammationes.

Arundinum virentia folia tusa illita.
 Glandes intrita, & illita apposita.
 Rhois semen ex aqua illitum.
 Lupinorum farina, cum polenta, & aqua imposita.
 Umbilici veneris succus circumlitus.
 Plantago emplastri modo imposita.
 Asphodeli radix cum polenta adhibita.
 Acetum cum succidis lanis, aut spongijs impositum.
 Rhaponticum cum aceto illitum ubi diutius perse-
 uerauerit inflammatio.
 Pulegium cum polenta illitum.
 Tussilaginis folia contrita, & ex melle imposita.
 Parthenium emplastri modo impositum.
 Lonchitis altera imposita.
 Cannabis sylvestris radix emplastri modo adhibita.
 Polygonon illitum.
 Tribuli fructus cataplasmatibus additus.
 Xiridis ex aceto imposita.
 Achillea illita.
 Helxine cataplasmatibus addita.
 Lichen herba adhibita.
 Verbenaca supina folia illita ubi inflammatio diuti-
 us perseverat.
 Papaveris folia, una cum calycibus illita, vel calyces
 tantum cum polenta adhibiti.
 Hyoscyami semen, & folia imposita.
 Mandragora recentia folia cum polenta illita.
 Bryonia radix ex vino decocta adhibita.
 Sambuci, ebulli, praterea folia cum polenta illita.
 Indicum illitum rumpit.
 Triticeae furfures acerrimo aceto elixi impositi.
 Tritici pollen ex hydrelao, vel aqua mulsa illitum.

Triticeus panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad
 idem conferentibus additus, & impositus.
 Sesamum illitum.

MATTHIOLI.

Caphura.
 Alni recentia folia.
 Ligustri foliorum decoctum.
 Glandes omnes recentes illita.
 Myrti foliorum, & baccarum decoctum.
 Cydoniorum seminis mucago.
 Cochlea tam cruda quam cocta, cum testis, aut sine
 contrita & locis affectis agglutinata.
 Ovi album.
 Tritici farina, oleo rosaceo, aut chamamelino subacta.
 Indici frumenti farina.
 Secale farina.
 Foenograci farina.
 Lini seminis farina.
 Lini seminis oleum.
 Maluae folia cum salicis frondibus.
 Brassica.
 Portulaca.
 Cucumis sectus, & impositus recens.
 Angurie pulpa illita.
 Bursa pastoris adhibita.
 Cassia solutivae pulpa illita.
 Santalum rubrum ex frigidis plantarum succis illitum.
 Muscus terrestris ex aqua decoctus, & admotus.
 Hyoscyaminum oleum.
 Rosaceum unguentum.
 Lilia diu in oleo macerata, & illita.
 Trifolij acetosi succus.

DIOSCORIDIS.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita.
 Pix liquida ex melle & vna passa illita, emarginat
 disrumpitque.
 Cupressi folia trita, & imposita.
 Sabina folia ex vino illita carbunculos circumscribit.
 Oliua matura arefacta illita emarginat.
 Nucum iuglandium veterum nuclei peruncti.
 Columbinum simum cum melle, et lini semine subactum.
 Erui farina emplastri modo imposita.
 Lupinorum farina ex aceto adhibita.
 Brassica cum sale illita rumpit.
 Nasturtium impositum.
 Porrum cum sale appositum.
 Panaces herculeum illitum.
 Coriandrum cum passa vna ex melle impositum.
 Lascerpitij liquor inunctus.
 Tithymali caracia lac illitum.
 Vna passa à nucleis repurgata, & cum ruta imposita.

MATTHIOLI.

Ligustri foliorum decoctum.
 Iuglandium oleum.
 Bursa pastoris trita imposita.
 Scabiosa folia applicata.
 Galega illita.

DIOSCORIDIS.

Ad furunculos.

Fermentum triticeum impositum.
 Helxine illita.

Sal cum vna passa, aut suillo adipe, aut melle impositum.
 Hastulae regiae radix in face vini decocta illita.
 Ephemeris folia ex vino cocta, & imposita.
 Vtriusque urticae illita folia.
 Leontopodii radix suspensa.
 Cucumeris sylvestris radix cum terebinthina resina
 imposita.
 Scammoneae succus cum melle, aut oleo illitus.
 Mori radice liquor illitus.
 Thapsiae succus ex melle illitus.
 Pycnocomi folia inuncta.
 Sandaracha cum adipe imposita.
 Asiis lapis liquida pice aut resina terebinthina ex-
 ceptus illitus.
 Cimolia terra ex aceto illita.

MATTHIOLI

Triticum commansum impositum.
 Lilij radix elixa, & cum adipe & oleo adhibita.
 Selariae folia ex aceto imposita, aut ex melle. (ta.
 Triticea farina ex hydrelao subacta, et calide imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad gangranas, & sphacelum.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.
 Puniceorum succus inunctus.
 Nucum iuglandium veterum nuclei peruncti.
 Ficulnei cineris lixiuum spongiis exceptum & im-
 positum.
 Loliacea farina cum sale, & raphanae cataplasmatibus
 addita.
 Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.
 Lentescum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, ma-
 licorio, & salsa aqua illita.
 Erui farina illita.
 Brassica elixa cum melle, cataplasmatibus addita.
 Bulbi per se, & cum melle impositi.
 Laserpitij liquor illitus, loco prius scalpello exciso.
 Galiopsis folia, semen, succus, & caulis, ex aceto im-
 posita.
 Verbasci florem aureum ferentis folia adhibita.
 Tithymali characix lac impositum.
 Bryoniae radix, fructus, & folia cum sale illita.
 Vna passa à nucleis repurgata, & cum sale imposita.

MATTHIOLI

Iuglandium nucum oleum.
 Lupinorum farina, ex vino, & oleo incocta, addito
 croco & emplastri modo adalligata.
 Arrugo cum melle, alumine, & aceto incocta & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.
 Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.
 Rhamni folia illita.
 Ligustri folia adhibita.
 Rose illita.
 Acaciae succus inunctus.
 Olea sylvestris folia contrita, & imposita.
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo,
 & vino illita.
 Menstruus mulierum sanguis circumlitus.
 Caprarum montanarum stercus ex vino, vel aceto
 decoctum impositum.
 Vrina humana sedimen inunctum.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, & malicorio
 adhibita.
 Malua ex oleo decocta & illita.
 Brassica utraque incisa, & cum polenta emplastri
 modo imposita.
 Portulaca cum polenta cataplasmatibus addita.
 Plantago illita cum cimolia, & cerussa.
 Intybi radix, & folia cum polenta imposita.
 Asari folia illita.
 Acinos cataplasmatibus addita.
 Ruta succus cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus.
 Coriandrum cum pane, polenta & illitum.
 Lilij folia ex aceto illita.
 Tussilaginis folia trita, ex melle imposita.
 Parturientum cum floribus emplastri modo impositum.
 Polygonum illitum.
 Anchusae radix cum polenta adhibita.
 Lycopsis radix cum polenta imposita.
 Rubi Idaei flos illitus.
 Helxine imposita.
 Quinquefolij radix decocta cataplasmatibus indita.
 Verbenaca recta ex aceto inuncta.
 Papaneris vascula concisa cum polenta imposita.
 Solani hortensis folia cum polline polentae illita.
 Quin & eiusdem succus inunctus.
 Mandragorae radix ex aceto illita.
 Cicuta succus inunctus.
 Umbilici veneris succus circumlitus.
 Psyllium, & eius spissamentum inunctum.
 Lens palustris illita.
 Ricini folia ex aceto illita.
 Semperuiuum maius inunctum.
 Stratiotes imposita.
 Acetum circumlitum.
 Rubigo ferri illita.
 Chalcitis inuncta.
 Sal cum aceto, & hyssopo illitum.

MATTHIOLI

Caphura.
 Portulacae succus illitus.
 Plantaginis succus.
 Solanum hortense, & eius succus.
 Cassiae solutivae pulpa illita exterius.
 Anguria pulpa.
 Cucumeris recentis ramenta.
 Bursa pastoris.
 Trifolij acetosi succus.
 Solani maioris succus illitus.
 Verbasci florum stillatitia aqua imposita.
 DIOSCORIDIS.
 Ad herpetas.
 Acaciae succus inunctus.
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo
 ex vino imposita.
 Olea sylvestris folia contrita, & imposita.
 Caprarum montanarum simus ex vino, vel aceto de-
 coctus illitus.
 Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis rosis, &
 malicorio cataplasmatibus indita.
 Helxines succus cum cerussa inunctus.
 Plantago imposita.
 Chelidonium maius ex vino illitum.

Rubi folia illita.

Solani hortulani succus cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma illitus.

MATTHIOLI

Pompholyx

Diphryges } in unguentis addita.

Cerussa

Cadmia

Ligustri folia contusa & imposita.

Rhou recentia folia & uua contusa & imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad epiniectidas.

Onillum caprillum uè stercus ex aceto illitum.

Brassica contusa cum polenta imposita.

Plantago quoquo modo adhibita.

Cucumeris folia cum melle inuncta.

Porri folia cum rhoë obsonioru cataplasmatibus indita.

Absinthium cum aqua illitum.

Coriandrum cum passa uua, & melle impositum.

Viscum in splenio adhibitum.

Heliotropij semen inunctum.

Vua passa à nucleis repurgata, cum ruta imposita.

MATTHIOLI

Lac caprillum, bubulum uè cum linteolis adhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad strumas.

Iridis Illyrica radix cocta, & illita.

Pix liquida cum hordeacea farina, & pueri impubis urina decocta illita.

Ficus sicca cocta, & imposita.

Viperina carnes cocta, & in cibum sumpta.

Mustella sanguis inunctus.

Asinini unguis cinis ex oleo maceratus illitus.

Bubulus finis è bobus herbas pascentibus sumptum illitus.

Hordei farina cum pice, & impubis pueri urina excepta imposita.

Loliacea farina cum fimo columbino ex vino decocta adhibita.

Fabarum farina cum melle, & feno graco illita.

Lens in aceto cum meliloto decocta, illita.

Lupinorum farina ex aceto inuncta.

Rumex decoctus circumlitus.

Plantago cum sale imposita, vel radix collo suspensa.

Sinapi cum sulphure illitum.

Nasturtium ex muria inunctum.

Piper cum pice impositum.

Coriandrum cum faba lomento adhibitum.

Galbanum illitum.

Aparine cum axungia inuncta.

Melissophylli folia cum sale cataplasmatibus addita.

Althæa ex vino, vel aqua mulsa decocta, imposita.

Quinquefolij radix decocta, ac concisa adhibita.

Laserpitij liquor ex cera illitus.

Umbilici ueneris succus circumlitus.

Mandragora recentia folia cum polenta imposita.

Semperuiuum tertium impositum.

Galiopsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatibus indita.

Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti illiti.

Adiantum impositum.

Fornacea testa tosta ex cerato illita.

Capparis radix & folia trita, & imposita.

MATTHIOLI

Cochlea, qua salinis inhaerent cum putamine tusa & illita.

Cancris fluiatiles combusti, tritique ex melle illiti.

Mustelarum finis melle exceptus addita lupinorum, aut feno graci farina, & illitus.

Milij Indici arundinum medulla, cum alijs nonnullis: uide panici commentarium.

Cyclamini radices contusa, & illita.

Dracunculi radix contusa, & imposita.

Cruciatæ minoris radix recens contusa, & emplastri modo adhibita.

Eryngij radix decocta, & illita.

Menthastrum illitum.

Lilij radix cocta ex adipe & oleo, adhibita.

Arthemisia radix ex axungia.

Bellidis genera omnia.

Scrophularia ex butyro illita.

Verbasci folia ex aceto imposita.

Personata emplastri modo adhibita.

Genista flores contriti, & ex rhodomelle, aut sorbilo oïo deuorati.

Vitis nigra radices succus, cum uini, & mellis aequali portione haustus.

Eiusdem radix tusa, melleque excepta, & illita.

MATTHIOLI

Ad ganglium.

Plumbea lamina tenuis probe adalligata.

DIOSCORIDIS.

Ad panos.

Olea syluestris folia cum melle inuncta.

Ficus sicca decocta, & illita.

Bubulum stercus ex pasenis sumptum, impositum.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.

Plantago cum sale imposita.

Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe illiti.

Isatidis folia imposita.

Eryngium adalligatum.

Abrotanum cum farina hordeacea, & hydræleo subactum illitum.

Acinos herba imposita.

Panaces asclepij flores & semē cataplasmatibus indita.

Coriandrum cum faba lomento appositum.

Ammoniacum inunctum.

Onobrychis concisa, & emplastri modo imposita.

Gladioli superior radix, cum loliacea farina, & dulci aqua illita.

Psyllium ex rosaceo, aceto uè, aut aqua impositum.

Mandragora folia recentia adhibita.

Galiopsis folia, caulis, succus, & semen illita.

Personata radix cū axungia suo super folio imposita.

Pycnocomum adhibitum.

Conyza emplastri modo imposita.

Vini fax illita.

MATTHIOLI

Eryngij radix decocta, & emplastri modo imposita.

Sclarea ex aceto aut melle subacta.

Folia verbasci tusa cineribusq; calefacta et imposita.

Malua decocta tusaq; ex hordeacea farina illita.

Lilij radix cocta, & ex lini seminis farina adhibita.

TUMORVM PRAETER NATURAM.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores discutiendos.

Cancris fluuiatiles impositi.
 Lini semen illitum.
 Foenigraci farina cataplasmatibus addita.
 Capparis radix, & contusa folia imposita.
 Smyrny radix illita.
 Ammoniacum inunctum.
 Buphtalmi folia, & flores cera excepta, et imposita.
 Mandragorae recentia folia cum polenta illita.
 Galiopsis folia, caulis, succus, & semen adhibita.
 Aegilops imposita.
 Diphryges cum resina terebinthina, aut cerato.
 Pyrites lapis illitus.
 Alabastrites lapis crematus, resina, aut pice exceptus.
 Cimolia terra illita.

MATTHIOLI

Juglandium oleum.
 Carica pingues cum lily, Iridis, & althaea radicibus decocta.

MATTHIOLI

Ad chæradas. i. scrophulas.

Mustelarum finus melle exceptus, addita lupinorum aut fœnograci farina, & illitus.
 Cruciatæ radix recens contusa, & emplastris modo imposita.
 Cyclamini radices contusa, & illita.
 Cruciatæ minoris radix imposita in puluerem trita.
 Scrophularia contusa & illita.
 Verbasci folia ex aceto imposita.
 Personata contusa, & adhibita. (ti.)
 Genistæ flores ex Rhodomelle, aut sorbilio uno deuora-
 Vitis nigra radicis succus ex vino & melle haustus.
 Eiusdem radix tusa, & ex melle illita.

DIOSCORIDIS.

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus.
 Bubulus finus ex pascuis assumptus, ex aceto illitus.
 Lolidaea farina cum fimo columbino in vino decocta.
 Lini semen cum nitro, & lixiuio ficulnei cineris decoctum.
 Hydropiper illitum.
 Cannabis syluestris radix imposita.

MATTHIOLI

Amygdalinum oleum.
 Sesaminum oleum.
 Pix liquida.
 Bubulum } stercus ex aceto impositum.
 Caprinum }
 Cyclamini radices contusa illita.
 Dracunculi radix tusa & imposita.
 Oleum liliorum alborum.

DIOSCORIDIS.

Ad carcinomata.

Cancrorum fluuiatiliu[m] cinis cum melle decoctus, et illitus.
 Irionis semen tritum, & impositum.
 Vtraque urtica adhibita.
 Galiopsis folia, caulis, succus & semen imposita.

MATTHIOLI

Humani stercoreis stillatitia aqua illita.

Fœnigraci farina, ex vino subacta, & imposita.
 Sanguisorba, & eius succus illitus.
 Vnguentum ex mortario, & pistillo plumbeo, & rosaceo confectum.

Plumbum vstum, & lotum.

Oleum de antimonio nostrum adhibendum.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores in vniuersum.

Suillus adeps.
 Brassica vtraque concisa cum polenta imposita.
 Cucurbita imposita.
 Xanthi semen illitum.
 Bulbi elixi cum polenta, & adipe suillo illiti.
 Lini semen cataplasmatibus inditum.
 Fœnigraci semen illitum.
 Cepa decocta, & cum passa vna & ficu adhibita.
 Narcissi radix illita.
 Bryonia radix ex vino decocta & imposita.
 Isatidis folia applicata.
 Smyrny radix illita.
 Tragoriganum cum polenta impositum.
 Mentha cum polenta cataplasmatibus addita.
 Amaraci folia cum cera cocta, & illita.
 Daucum illitum.
 Libanotis radices emplastris modo imposita.
 Nigella ex aceto inuncta.
 Horminum ex aqua illitum.
 Buphtalmi flores cera subacti.
 Althæa decocta imposita.
 Cannabis syluestris radix emplastris modo adhibita.
 Anagyris folia illita.
 Polygonon cataplasmatibus inditum.
 Xyridis radix ex aceto inuncta.
 Helxine imposita.
 Quinquefolij radix decocta emplastris modo.
 Verbenacæ supina folia imposita.
 Psyllium ex rosaceo, aceto v[er]o, aut aqua illitum.
 Ephemeris folia ex vino decocta, illita.
 Cytisi folia cum pane inter initia imposita.
 Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.
 Chamæsyces rami triti, & impositi.
 Pycnocomi semen cum polenta illitum.
 Indicum inunctum.
 Vini fax cruda per se, vel cum myrto illita.

DIOSCORIDIS.

Ad steatomata.

Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad meliceridas.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.
 Melilotus ex aqua inuncta.
 Vna passa a nucleis repurgata trita, cū ruta imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores ex icteru.

Brassica concisa cum polenta imposita.
 Cucurbita emplastris modo illita.
 Hydropiper impositum.
 Thymus, Thymbraquæ illita.

MATTHIOLI

Absinthium in tegula calefactum, & vino aspersum adalligatum. (posita.)
 Cari seminis farina ex melle, aut sapa decocta, & im-
 Fabarum

TVMORVM PRAETER NATVRAM.

Fabrum farina una cum anthemide, & betonica ex defruto decocta & illita.

DIOSCORIDIS

Ad fugillata.

Casus recens illitus.
 Succida lana oleo, aceto ve perfusa.
 Fabrum farina ex melle, & fenogreco.
 Lupinorum farina imposita.
 Raphanus ex melle.
 Allij cinis ex melle.
 Sinapi illitum.
 Hydropiper impositum.
 Ptarmica cum floribus illita.
 Bulbi per se, aut ex oui vitello.
 Rhaponticum ex aceto.
 Aloe ex melle.
 Laserpitij liquor.
 Absinthium ex melle.
 Aqua maris calida fotu adhibita.
 Hyssopum ex feruenti aqua.
 Calamintha ex vino.
 Amaraci siccata folia ex melle.
 Cuminum erraticum commansum ex melle, & passa
 uua illitum.
 Ammi ex melle.
 Acetum ex melle.
 Thapsia succus, & radix cum thuris, & cera equali
 portione, duabus tani um horis imposita, & subin-
 de marina aqua fotu adhibita.
 Bryonia ex oleo decocta quousque liquefcat.
 Sal ex melle inunctum.

MATTHIOLI.

Triticum cum radice commansum, & impositum.
 Lupini ex aceto decocti, & impositi.
 Ari radix cum fabacea farina ex defruto subacta.
 Succisa trita & illita.

VVLNERVM.

DIOSCORIDIS.

Ad vulneca conglutinanda.

Cupressi folia trita.
 Vlmi folia, sed multo magis corticis tilia, si fascia lo-
 co intorqueatur.
 Sycomori liquor illitus.
 Amurca in cupreo vase decocta illita.
 Palmula immatura illita.
 Viticis folia, & semen imposita.
 Punicorum cytini impositi.
 Thus inspersum.
 Lana cinis impositus.
 Sylvestris brassica folia imposita.
 Argemone illita.
 Glycyrrhizae succus illitus.
 Centaurij maioris recens radix imposita.
 Centaurij minoris folia trita, & illita.
 Achillea imposita.
 Poterij radix imposita.
 Alae in puluerem inspersa.
 Sarcocolla imposita.
 Polycnemum ex aqua impositum.
 Polium emplastri modo impositum.
 Scordium impositum.
 Equiseti folia inspersa.

VVLNERVM.

Lonchitis folia imposita.
 Alibea in vino, aut mulsâ aqua decocta, imposita.
 Sideritis folia imposita.
 Chamapitys ex melle adhibita.
 Polygonum emplastri modo adhibitum.
 Polygonatum emplastri modo admotum.
 Symphytum petraeum inditum.
 Symphytum alterum emplastri modo impositum.
 Clymeni succus impositus.
 Sideritis qualibet illita.
 Lycopsis radix cataplasmatibus indita.
 Ocimi semen illitum.
 Graminis radix concisa, & adhibita.
 Conyza illita.
 Quinquefolium adhibitum.
 Coccum insectorium tritum, & inspersum.
 Verbenaca illita.
 Erigeri folia, & flores cum thuris manna adhibita.
 Verbasci folia ex aceto.
 Spongia recentes sine pinguedine, ex aqua, vel posca.
 Succida lana vino, aceto, oleo ve infusa.
 Dracunculi folia ex vino decocta.
 Isatidis folia illita.
 Stratiotes millefolium impositum.
 Morochthus lapis inspersus.

MATTHIOLI.

Oleum stillatitium è larigna resina aut abiegna.
 Abiegna lachryma.
 Terebinthina resina.
 Pix arida.
 Cupressi folia, germina, coni recentes, & molles.
 Vlmi folliculorum conclusus liquor illitus.
 Papyrus oxycrato, vino ve macerata.
 Tilia cortex commansus & deinde illitus.
 Cisti folia imposita.
 Hypocistis.
 Ilicis rubentes pilule cum aceto trita & imposita.
 Querna folia adalligata.
 Mespili folia sicca, & in puluerem aspersa.
 Corni folia eodem modo adhibita.
 Oleum è terrenis vermibus addito balsamo factitio,
 aut oleo terebinthino.
 Cyani maioris folia, & succus.
 Tragopogoni succus, aut stillatitia aqua.
 Bursa pastoris succus.
 Ophioglossum impositum, aut eius oleum illitum.
 Omphacinum oleum in quo ophioglossum diu fuerit
 insolatum, addita lachryma abiegna.
 Chelidony maioris puluis inspersus.
 Centaurij magni radix.
 Veronica mas.
 Gratiola trita & illita.
 Flos solis.
 Rosmarini sicci farina inspersa, post ablutionem è suo
 ipsius decocto.
 Aparine succus, aut sicca puluis.
 Trinitas herba tam hausta, quam exterius vsurpata.
 Lunaria minor.
 Hyperici flores, & semen vel oleum.
 Consolida maior, minor, & media.

VVLNERVM

Sanicula.
 Auricula vrsi.
 Pilosella.
 Pyrola, de qua praestantissimam potionem vulnerari-
 am habes lib. 4. cap. 16.
 Virga aurea.
 Potentilla.
 Eupatorij vulgaris flores illiti.
 Fragaria folia, & radix.
 Sanguisorba.
 Pulmonaria.
 Alchimilla.
 Ophris.
 Bistorta & tormentilla radices cum vulneribus illi-
 ta, tum etiam in potionibus hausta.
 Oleum balsaminae, seu momordicae.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxum sanguinis.

Sylvestris olea foliorum succus admotus. (sa.)
 Galle cremata vino, aceto, aut muria extincta insper-
 sata.
 Punctorum cytini impositi.
 Persea arida folia illita.
 Capressi pilula cum arboris coma trita & admota.
 Thus inspersum.
 Ranarum crematarum cinis illitus.
 Araneorum tela adhibita.
 Caprarum montanarum fimus ex aceto.
 Asini stercus cum crudum tum crematum ex aceto.
 Stævis folia imposita.
 Portulaca illita.
 Plantago admota.
 Idea radix adhibita.
 Isatidis folia inuncta.
 Salvia adhibita.
 Galij flos inditus.
 Androsamifolia illita.
 Quinquefolium admotum.
 Phœnix herba cum punicea lana corpori alligata.
 Lichen herba adhibita.
 Astragali radix indita.
 Hyoscyami semen oboli pondere in mulla aqua potum.
 Stratiotes millefolium admotum.
 Cinnabaris, & sanguis draconis inditus.
 Alumen admotum.
 Sulphur impositum.
 Gypsum inspersum.
 Spongia sicca recentes, & vacua imposita.
 Spongiarum crematarum cinis ex pice.
 Eretria terra inspersa.
 Stibium inspersum.

MATTHIOLI.

Pannus in annosis laricum caudicibus prope medul-
 lam repertus, impositus.
 Suberis cortex tritus, & ex aqua calida potus.
 Messili sicca folia in puluerem aspersa.
 Pili leporini vsti & viui ventre enulsi.
 Bursa pastoris tenui pulicula circumlita, & in oleo
 frixa.
 Centaurij magni radix.
 Flos solis.
 Lanugo xylis combusta, & illita.

VVLNERVM

Bistorta, vel tormentilla puluis vulneribus inspersus.
 Consolida minor, & media imposita.
 Sanicula quoquo modo adhibita.
 Auricula vrsi.
 Pilosella.
 Pyrola, de qua praestantissimam potionem vulnerari-
 am habes lib. 4. cap. 16.
 Potentilla quoquomodo adalligata.
 Gypsum inspersum.
 Iaspis lapis nuda manu comprehensus.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.

Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.
 Stibium tritum inspersum.

MATTHIOLI.

Pyrica communis semen tritum & inspersum.
 Xylum combustum.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinis grumos.

Thymus impositus.
 Thymbra illita.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera telis venenatis illata.

Dictamni succus tum potus, tum instillatus.

MATTHIOLI.

Ceruinus sanguis ex vino sumptus.
 Cydonia mala deuorata.
 Scorzoneræ succus potus, tum vulnere infusus.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa nuda carne restitenda.

Iris Illyrica illita.
 Panacis Herculei radix imposita.
 Myrrha cum cochlea carnis peruncta.

MATTHIOLI.

Thuris cortex inspersus.
 Myrrha cum thure, aloe, & sarcocolla.
 Peucedani radix in puluerem trita, & inspersa.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera membranarum cerebri.

Butyrum admotum.

MATTHIOLI.

Oleum rosaceum.
 Abiegna lacryma.
 Oleum ex ouorum vitellis.
 Bellidis genera omnia.
 Betonica tusa, & illita, & in unguentis addita.
 Matrisylua eodem modo adhibita.
 Sanguisorba succus in unguentis additus.
 Gummi elemi
 Pilosella
 Quinquefolium
 Alchimilla

MATTHIOLI.

Ad vulnera carnis replenda.

Iridis radice farina.
 Thus
 Myrrha
 Aloe
 Sanguis draconis
 Sarcocolla
 Panacis radicis cortex

rhodomelle et laricea resina
 excepta, aut per se in-
 spersa.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnere inflammationes.

VVLNERVM.

Babulus recens firmis ex pascuis sumptus, ac subinde in folijs inuolutus, & in feruenti cinere calefactus impositus.

Pinorum & picearum folia trita, & illita.

Fabarum farina cataplasmatidis indita.

Lupinorum farina admota.

Stratiotes imposita.

Millefolium ex aceto illitum.

Labrusca flores cataplasmatidis inditi.

Aerugo illita.

MATTHIOLI

Rosaceum unguentum.

Caphura illita.

Ligustrinum oleum.

Malua folia cum salignis frondibus trita & illita.

Ophioglossum recens, succum vè ex gallinaceo adipe illitum.

Cynoglossa vulgaris recentia folia circumligata & quotidie bis repetita.

DIOSCORIDIS

Ad infixa vulneribus extrahenda.

Cochlea terrestres cum suo operimento tusa, & apposita.

Siluri falsi caro admota.

Lacerta concisum caput impositum.

Bulbi cataplasmatidis inditi.

Horminum ex aqua illitum.

Anagallis adhibita.

Narcissi radix cum lolij farina imposita.

Aristolochia rotunda imposita.

Dictamnnum admotum.

Gladioli radix superior ex vino, & thure illita.

Xyridis radix admota.

Tragij folia, semen, & liquor illita.

Pycnocomi semen cum polenta impositum.

Acute spina radix admota.

Harundinis radix admota.

Sinapi impositum.

MATTHIOLI

Calami phragmitis radix cum bulbis apposita.

Pectinis veneris radix, cū malua tusa, & adalligata.

Aristolochia rotunda illita.

Eryngij radix ex melle.

Verbasci semen, & folia in vino decocta & imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad carnis excrecentias.

Galla trita, & inspersa.

Palmarum nuclei exusti, lotiq; illiti.

Erinacei marini operimenti cinis admotus.

Cremata purpura cinis inditus.

Conchula Indica cinis illitus.

Smaridis piscis exustum caput impositum.

Lana cremata cinis inunctus.

Scordium siccatum inspersum.

Aesustum impositum, quinetiam aeris flos admotus.

Plumbum elotum

Sibium

Argenti spuma

Cerussa

Chrysocolle

Ochra

Diphryges

trita inspersa, illita, vel quoquo modo admota.

VVLNERVM

Auripigmentum

Pumex

Corallium

Asij lapidis flos siccatus

Pyrites lapis cum resina impositus.

MATTHIOLI

Alumen combustum.

Chalcantum.

Mercurius precipitatus.

Mercurius sublimatus.

Ellebori nigri farina.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa vel illita.

Plumbum elotum impositum.

Argenti spuma.

MATTHIOLI

Alumenustum.

Corallium.

Pompholyx.

Sandix ex plumba parata.

Aerugo exusta.

Charta combusta.

Linteorum combustorum cinis.

Cucurbita sicca & combusta.

Vini fax combusta vna cum siccis plantaginis radicibus.

MATTHIOLI

Ad vulnera interna.

Phu in potionibus vulnerarijs additum.

Dictamni albi radices in potionibus addita.

Flos solis potus.

Trinitas & eius decoctum haustum.

Lunaria minor potionibus addita.

Bellidis genera omnia.

Equisetum

Solidago omnis

Sanicula

Pyrola

Alchimilla

Pilosella

Virga aurea

Bistorta

Tormentilla

Dictamni albi

Fragaria

Caryophyllata

in vino decocta & pota.

radices in potionibus addita.

Potio nostra de Pyrola, in limonij comment. descripta.

VLCERVM

DIOSCORIDIS

Ad depascentia vlcera quae Graeci φαρδανα vocant.

Pini piceae cortex cum chalcantio tritus, illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibitum.

Cupressi folia trita inuncta.

Sabinae utriusq; folia trita & admota.

Rhamni cuiusq; folia imposita.

Cisti flores per se illiti.

Olea syluestris folia trita, & adhibita.

Lignorum marcor illitus.

Oliua matura exusta, trita, & inspersa.

Palma cortex suae in volucrum admotum.

VLCERVVM.

Myrti folia trita, cum omphacina oleo, aut exiguo ro-
 faces ex vino imposita.
 Amygdala amara ex vino inuncta.
 Smaragdus piscis crematum caput, tritum & illitum.
 Garum piscium admotum.
 Testudinis fel inunctum.
 Loliacea farina cum sale, & raphano illita.
 Lini semen ex vino decoctum.
 Erui farina admota.
 Raphanus tritus inunctus.
 Beta folia imposita.
 Plantago quoquomodo indita.
 Dracunculi maioris radix concisa, ex melle, bryonia
 addita.
 Asphodeli radix & folia ex vino.
 Anagallis trita adhibita.
 Hedera decocta folia ex vino.
 Chelidonijs maioris radix ex vino.
 Isatidis folia superposita.
 Aristolochia rotunda adhibita.
 Chamaleonis nigri radix cataplasmatibus addita.
 Pulegium vivens appositum.
 Marum admotum.
 Panacis asclepij flores & semen illitum.
 Pastinaca erratica folia contusa, ex melle.
 Ceriandrum cum pane polenta ve illitum.
 Marrubij folia ex melle.
 Tithymali characia lac illitum.
 Omphacium ex aceto inunctum.
 Cicuta succus illitus.
 Sedum maius impositum.
 Spondylium cum ruta admotum.
 Polygonum superpositum.
 Verbenaca ex aceto.
 Solani hortulani folia cum polenta polline illita.
 Acetum fatu adhibitum.
 Acida muria fotu imposita.
 Petasites admota.
 Aeris squama inspersa.
 Aerugo illita.
 Sal tostum cum polenta adhibitum.
 Salis flos inspersus.
 Chalcitis illita.
 Diphryges inunctum.
 Asius lapis tritus ex aceto.
 Alumen cum galla cremata pari potere ex aceti face.

MATTHIOLI

Coehlea contrita, & illita.
 Humani stercoris aqua stillatitia, & oleum.
 Lupini decoctum adhibitum.
 Caninum stercus inspersum.
 Plantaginis succus.
 Ari radicum succus.
 Oleum è chalcantio.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera diurna.

Cisti flores per se illiti.
 Centaurium minus illitum.
 Panacis Herculei acuminata radix imposita.
 Viscum cum thure inunctum.
 Chamadrys ex melle.
 Lili foliorum succus in aereo vase decoctus ex aceto,

VLCERVVM.

& melle.

Stordium tritum ex melle.
 Anchusa radix oleo incocta ex cera.
 Verbenaca trita ex melle.
 Astragali radix illita.
 Thalictri radix inuncta.
 Personata folia imposita.
 Omphacium ex aceto.
 Spongia recentes sicca, & vacua imposita.
 Asij lapidis flos siccatu illitus.
 Terebintina.
 Carisforum lignorum vermes.
 Crespini baccarum succus.
 Bursa pastoris trita.
 Hypocistis.
 Ladanum emplastri modo impositum.
 Sylvestris olina oleum.
 Aqua in marcescentibus quercuum canitatibus re-
 perta.
 Oleum è tritico.
 Brassica imposita.
 Chelidonijs maioris pulvis.
 Aristolochia rotunda.
 Aloe cum sanguine draconis, & myrrha.
 Veronica mas.
 Flos solis.
 Abrotonum vstum.
 Aparina sicca farina.
 Vtriusq. securidaca farina.
 Consolida media, vel minoris folia, aut eorum succus
 Sanicula.
 Auricula vrsi.
 Pilosella.
 Pyrola.
 Caryophyllata succus admista argine.
 Potentilla.
 Eupatorij vulgaris flores illiti.
 Fragaria folia.
 Sanguisorba.
 Filicis farina inspersa.
 Oleum è chalcantio.
 Oleum nostrum de antimonio.
 Mercurius precipitatus.
 Mercurius sublimatus.

DIOSCORIDIS.

Ad malicia dolosaque vlcera.

Plantago quoquomodo imposita.
 Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.
 Petasites illita.
 Psyllium tritum ex melle.
 Bryonia folia, fructus, radix cum sale imposita.
 Filicis femina radix trita & illita.
 Cadmia pulvis inspersus.
 Salis flos illitus.
 Asij lapidis flos ex melle.
 Ostracites lapis.

MATTHIOLI.

Querna suberina, glandes cum salsa axungia illita.
 Humani stercoris stillatitia aqua, & oleum stillati-
 tium.
 Caninum stercus inspersum.

VLCERVVM.

Lupini cum suo decocto admoti.
 Bursa pastoris.
 Ari radice succum.
 Carduus benedictus tam potus, quam admotus.
 Unguentum ex mortario, & pistillo plumbeo, & rosa-
 ceo paratum.
 Plumbum vstum & lotum.
 Chrysocholla factitia inspersa.
 Oleum de chalcantio.
 Oleum de antimonio.
 Mercurius precipitatus.

DIOSCORIDIS.

Ad sinus & fistulas.

Iridis Illyrica radicum decoctum infusum.
 Suillus adeps infusus.
 Mel infusum.
 Plantaginis succus inditus.
 Dracunculi maioris radice succus ex melle.
 Aristolochia rotunda cum iride ex melle.
 Sphondylii ramenta circumligata sinuum callos ero-
 Quinquifolium cum sale ex melle. (dunt
 Stratiotes millefolium infusum.
 Tithymali characia lacteus succus inditus.
 Oimphacium cum aceto.
 Chalcitis collyrij modo infusa.
 Cadmia illita.
 Spongia recens sine pinguitudine ex decocto melle im-
 Gentiana quoquomodo adhibita. (posita.

MATTHIOLI.

Aqua stillatitia Laricea lacryma siue abiegnia infu-
 Oleum e tritico. (sa.
 Plantaginis succus.
 Bursa pastoris & eius succus.
 Hederæ terrestris succus cum arugine infusus.
 Caryophyllata succus admista arugine.
 Alchimilla.
 Oleum de chalcantio.
 Oleum de antimonio.
 Mercurius precipitatus.
 Mercurius sublimatus.
 Chalcantii stillatitia aqua infusa.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera in callum indurata.

Capparis radix exiccata imposita.
 Aerugo cum ammoniaco collyrij modo imposita.
 Spogia arida lino ligata, et penicilli modo imposita.

MATTHIOLI.

Anonidis radix trita & inspersa.
 Mercurius sublimatus in unguentis additus.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera ab erodentibus facta.

Lac omne, & presertim bubulum, illitum.

MATTHIOLI.

Oleum e luteis ouorum.
 Cerussa elota }
 Argenti spuma } in unguentis addita.
 Calx pluries lota }

DIOSCORIDIS.

Ad phthyriam.

Staphysagria trita, & ex oleo illita.

MATTHIOLI.

Argentum vivum illitum.
 Piper ex salvia inunctum.

VLCERVVM.

DIOSCORIDIS.

Ad sordida vlcera.

Olea sylvestris folia tusa ex melle.
 Iris Illyrica ex melle.
 Colymbades trita & imposita.
 Resina terebinthina illita.
 Pix liquida cum melle indita.
 Erinacci marini operimentum exustum impositum.
 Purpura cremata cinis illitus.
 Conchule Indica cinis inspersus.
 Orobi farina admota.
 Brassica cum fenograceo, & aceto illita.
 Asphodeli folia, & radices imposita.
 Capparis cortex siccatus, & adhibitus.
 Anemones radix illita.
 Hederæ decocta folia ex vino.
 Chelidonium maius cum axungia admotum.
 Aristolochia rotunda imposita.
 Libanotidis radices siccata ex melle.
 Ballote ex melle.
 Marrubij folia ex melle.
 Verbenacæ supina folia illita.
 Narcissi radix cum erai farina ex melle.
 Bryonia radix, fructusq. cum sale admota.
 Aerugo ex melle cocta, & imposita.
 Aes vstum inspersum.
 Vrtica vtrag. illita.
 Peucedani radix trita inspersa.
 Cadmia indita.
 Mel illitum.
 Pompholyx admota.
 Muria indita.
 Alumen quoquomodo adhibendum.
 Asy lapidis flos exiccatus, & illitus.

MATTHIOLI.

Terebinthina resina.

DIOSCORIDIS.

Ad ambusta.

Platani pilule adipe excepta illita.
 Ligustri foliorum decoctum fotu adhibendum.
 Cisti flores cum cerato impositi.
 Acacia gummi ex ovo illitum pustulas prohibet.
 Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.
 Mori folia trita ex aceto illita.
 Thus ex suillo adipe vel anserino exceptum.
 Buccina cinis illitus.
 Mitulorum combustorum cinis admotus.
 Conchule Indica cinis inunctus.
 Calceamentorum veterum cinis impositus.
 Suillus adeps inunctus.
 { Ouillus cera & rosaceo subactus.
 Fimus { Columbinus } cum lini semine ex oleo.
 { Gallinaceus }
 Sesamum ex rosaceo.
 Malua decocta ex oleo.
 Beta virentia folia illita.
 Brassica cinis ex ovi albo.
 Lactuce sylvestris lacteus succus ex humano lacte.
 Hederæ flores ex cera. Quin & decocta folia ex
 vino.

VLCERVVM.

Acanthi radix illita.
Rutæ sylvestris semen, & folia admota.
Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas
prohibet.
Typha flos veteris suillo adipe eloto exceptus.
Hemerocallis radix illita.
Althææ folia ex exiguo oleo admota.
Hyperici semen, & folia imposita.
Ascyri semen & folia adhibita.
Androsami folia imposita.
Anchusæ radix in oleo decocta ex cera.
Helxine admota.
Papaveris corniculati folia ex oleo.
Verbasci sylvestris folia cataplasmatibus addita.
Stimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.
Alumen ex aqua
Sal ex oleo } pustulas prohibet.
Cimolia terra illita }
Phrygius lapis cerato exceptus.
Atramentum scriptorium ex aqua.
Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.
Galij flos inunctus.
Lily radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.
Cynoglossæ folia ex veteri suillo adipe.
Sambuci prætenera folia inuncta.
Narcissi radix ex exiguo melle.
Oleum ex canatis asphodeli radicibus decoctum illi-
tum.

MATTHIOLI

Ligustri foliorum decoctum.
Ovi album per se, aut cum vitello impositum, addito
rosaceo.
Oleum ex ouorum vitellis.
Hordei combusti cinis inspersus.
Lini seminis oleum ex aqua rosarum elotum, et illitum.
Cucurbitæ cinis.
Sambuci secundarius cortex.
Cannabis radix in aqua decocta, & imposita.
Eadem recens cum recenti butyro trita, & illita.
Verbasci florum stillatitia aqua illita.
Unguentum è sambuci cortice inunctum: cuius parâ-
dirationem habes lib. 4. cap de sambuco.
Oleum è fructu momordicæ illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad fanos.

Peponis radix ex melle.
Nasturtium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum caputum manarum cine-
re impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad intertrigines.

Calceamentorum crematorum solea illita.

MATTHIOLI

Lithargyrium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera inflammationes.

Aranei tela imposita.

MATTHIOLI

Cynoglossi vulgaris succus una cum cerussa, & ca-
phura illitus.

VLCERVVM.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera ticarice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.
Mitalorum } cinis illitus.
Conchula Indica }
Aloe inuncta.
Eupatorij folia concisa ex suillo adipe.
Filicis femina radix sicca in puluerem aspersa.
Cadmia admota.
Aes vstum impositum.
Squamma aris inspersa.
Aerugo ex oleo & cera.
Stimmi
Molybdæna
Argentij spuma
Cerussa
Chalcitis
Pumex
Fax vini cremata
Calx lota
Corallium
Asij lapidis flos
Fornacea testa testa

quoquomodo adhibita.

MATTHIOLI

Plumbum vstum elotum.
Corallij cinis impositus.
Diphryges illitum.
Alumen vstum.
Aerugo vsta.
Calx pluries lota.

MATTHIOLI

Ad vlcera morbi gallici.

Argentum viuum in unguentis additum.
Argentum viuum præcipitatum inspersum.
Argentum viuum sublimatum.
Oleum nostrum de antimonio.
Calx lota.
Cinnabaris vulgaris.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera caua explenda.

Thus inditum.
Pix liquida cum melle.
Pix arida imposita.
Medulla ossium quadrupedum qualibet inuncta.
Mel infusum.
Cadmia inspersa.
Corallium inditum.
Asij lapidis flos ex melle.
Eretria terra illita.
Pumex inspersus.

MATTHIOLI

Plumbum vstum elotum.
Corallij cinis impositus.
Thus.
Myrrha.
Aloe.
Iridis radix.
Thuris cortex.

LUXATIONVM ET FRACTVRARVM.

DIOSCORIDIS.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.

Personata

LUXATIONVM, ET FRACTVRARVM.

Personata radix trita illita, dolores articularum à contorsionibus sedat.

Acacia decoctum fotu adhibitum.

Viticis semen cum folijs cataplasmatibus additum.

Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.

Asparagi radix ex aceto, vel vino adhibita.

Cyclamini decoctum fomenti modo.

Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.

Acanthi radices impositae.

Sampsuchi folia cum cera cocta imposita.

Anchusa folia cum melle, & farina adhibita.

Vrtica utraq; imposita.

Narcissi radix cum melle trita.

Vitis nigra folia cum vino imposita.

Filicula imposita.

Heliotropij folia linita.

Sarmentorum vitis & vinaceorum cinis ex aceto li-

sal cum farina & melle. (nitus.

MATTHIOLI

Fenograci farina cum hydromelite decocta, addita axungia.

Plantaginis folia ex sale modico illita.

Primula veris succus tum potus, tum illitus.

Thus cum armenia terra & sanguine draconis, oui albo subactum & emplastri more illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta.

Myrti foliorum decoctum fotu adhibitum.

Succida lana oleo, vino, acetog, perfusa.

Verbasci decoctum potum.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.

Vlmi foliorum, aut corticis radicum decoctum perfrictum.

MATTHIOLI

Primula veris succus tam potus, quam illitus.

Lapis ad ossium fracturas, descriptus lib. quinto com. de lapide morochtho.

Symphyti maioris radix contusa & circumligata.

Geranij florem caeruleū gerentis, radix contusa cum axungia & imposita.

Oua recentia rude agitata, additis thure, aloe, sanguine draconis, & armenio bolo.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatibus more imposita.

Peucedani radix in puluerem imposita.

Euphorbium impositum.

Xyridis radix addito flore aris.

Bryonia trita & imposita.

Vitis nigra radix.

MATTHIOLI

Iridis radix trita & imposita.

Dictamnium tum potum, tum illitum.

Mercurius precipitatus impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentiane radices succus drachma pondere haustus.

Baccharis radices decoctum potum.

Millefolium cum aqua, & sale potum.

Lixiuum ex cinere sarmentitio factum cum aceto, sale, & melle.

MATTHIOLI

Mumia cum cassia solutiua pulpa, lemnia sphragides & rubia radice sumpta.

Gammatorum lapilli cum tilia carbonibus sumpti.

Plantaginis folia non solum illita, sed & deuorata.

Cyani maioris puluis, ex aqua plantaginis aut symphyti.

Cyclamini stillatitia aqua, cum saccharo pota.

Rhabarbarum cum mumia, & erithrodani radice haustum.

Aristolochia rotunda.

Vincetoxici radices, ex vino aut symphyti maioris decocto pota.

Lunaria minor ebibita.

Bistorta, vel tormentilla succus, aut puluis ex symphyti maioris aqua potus.

Consolida minor, & media in potionibus vulnerarijs addita.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Virga aurea.

Potentilla.

Alchimilla.

Ophris.

DIOSCORIDIS.

Ad ruptos.

Acorum decoctum potum.

Cardamomum ex aqua potum.

Calami odorati decoctum cum graminis, aut apij semine potum.

Helenij radices in eclegmate cum melle deuorata.

Edellium haustum.

Iuniperi bacca bibita.

Cedrides deuorata.

Halimi radix drachma pondere in aqua mulsa pota.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.

Asphodeli radix drachma pondere in vino pota.

Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti. (mulso.

Agaricum trium obolorum pondere deuoratum cum

Gentiane radices succus drachma pondere haustus.

Aristolochia rotunda bibita.

Serpyllum potum.

Centaurij maioris radix hausta cum vino.

Acanthi radices pota.

Smyrniij radix comesta, vel pota.

Leucacantha radices ex vino decoctum potum.

Abrotoni semen ex aqua potum.

Origanum cum fico deuoratum.

Equiseti radix & folia pota.

Calamintha decoctum haustum.

Baccharis radices decoctum bibitum.

Libanotis radices pota.

Sagapenum bibitum.

Laserpitij liquor cum lixiuo potus.

Galbanum deglutitum.

Polycnemon bibitum cum vino.

Scordium additis masturtio, melle, resinaq; deuoratum.

Althea decoctum potum.

Alcea radix in vino, vel aqua pota.

VENENORVM.

Betonice folia drachma pondere in dulci aqua bibita.
 Symphytum petraeum cum aceto mulso potum.
 Symphyti radix pota.
 Xyridis radix ex mulso pota.
 Helichrysi coma in vino pota.
 Verbasci decoctum potum.
 Bryonia cum melle in eclegmate deuorata.
 Schistus lapis potus.

MATTHIOLI.

Ophioglossum ex equiseti aqua potum.
 Rhabarbarum, cum mumia & rubia radice potum.
 Vincetoxici radices ex vino aut maioris symphyti decocto hausta.
 Lunaria minor ebibita.
 Bistorta & tormentilla radicum puluis, ex symphyti maioris aqua potus.
 Sanicula
 Auricula arsi
 Pilosella
 Virga aurea } quomodolibet sumpta.
 Potentilla
 Alchimilla
 Ophris
 Perfoliata in vino decocta, aut in puluerem trita, & pota.

MATTHIOLI.

Ad caluarie fracturam.

Gummi elemi.
 Pilosella & eius succus in unguentis additus.
 Ophris quoquo modo illita.

VENENORVM
 DIOSCORIDIS.

Ad omnium venenorum morsum, aut ictum.

Iridis Illyrica radix ex aceto pota.
 Cardamomum ex vino potum.
 Nardus Celtica cum absinthij decocto hausta.
 Phu antidotis inseritur, quae venenatis resistunt mor.
 Cinnamomum bibitum. (sibus)
 Cassia potui data.
 Helenij radices decoctum potum.
 Bdellium potui datum.
 Platani pilulae ex vino hausta.
 Erica flores poti: quin etiam coma.
 Viticis semen in potu sumptum.
 Glandes esitatae.
 Noces comese.
 Sycomori lacryma illita.
 Ficulneum lac plagis inditum.
 Pix liquida cum trito sale illita.
 Paliuri foliorum, & radices decoctum potum.
 Gallinaceorum cerebrum cum vino potui datum.
 Eruca, quae in oleribus reperiuntur ex oleo illita.

	Leporinum	
	Agninum	
	Hinnulinum	
	Aprinum	
Coagulum	Ceruinum	} potum ex vino trium obolorum pondere.
	Vitulinum	
	Bubalinum	
	Haedinum	
	Caprea	
	Laticornis	

Marina testudinis sanguis cum leporino coagulo &

VENENORVM.

cumino potus.
 Melex calido rosaceo bibitum.
 Triticea farina, ex aceto & vino imposita.
 Porri succus ex melle sumptus: quin & coma illita.
 Porrum syluestre esitatum.
 Piper quoquomodo sumptum.
 Eryngium ex vino haustum.
 Teucrium ex aceto inunctum.
 Argemone ex vino epota.
 Agaricum trium obolorum pondere ex vino haustum.
 Rhaponticum potui datum.
 Chamedrys ex vino bibita.
 Gentiana radix drachma pondere cum pipere, & ruta ex vino pota.
 Aristolochia longa drachma pondere potui data, & etiam plaga admota.
 Origani decoctum haustum.
 Leucas ex vino sumpta, vel cataplasmatibus addita.
 Pulegium ex vino potui datum.
 Dictamni succus ex vino potui.
 Baccharis radix ex vino bibita.
 Panacis herculei semen, cum aristolochia sumptum.
 Ligustici tum radix, tum semen haustum.
 Pastinaca erraticae semen potui datum.
 Anisum potum.
 Asclepiadis radices ex vino sumpta.
 Cuminum ex vino haustum.
 Ammi cum vino potui datum.
 Delphinium morsui admotum.
 Laserpitij liquor tum inunctus, tum bibitus.
 Galbanum inunctum homines tutos reddit.
 Clinopodium haustum.
 Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta.
 Poly decoctum potum.
 Betonice folia trium drachmarum pondere ex vini sextarijs hausta, vel admota.
 Polygoni succus bibitus.
 Clematis prima illita.
 Sparganii radix ex vino pota.
 Acida muria plaga indita.
 Terra Lemnia hausta.
 Salcum origano, melle, & hyssopo illitum.

MATTHIOLI.

Phu radix non modo hausta, sed & olfacta.
 Cinnamomi stillatitia aqua pota.
 Myrrha ex vino hausta.
 Caphura epota.
 Dictamni albi radices sumpta.
 Oleum nostrum e scorpionibus, cordi & arterijs illitu.
 Humani stercoris aqua stillatitia pota.
 Scorzonera foliorum, & radicum succus potus.
 Porri folia melle subacta & illita.
 Caryophyllorum flores saccharo conditi, & deuorati.
 Zedoaria cum pota, tum exterius illita.
 Boni henrici succus haustus.
 Agaricum tum foris illitum, tum haustum, drachma pondere cum vino diluto.
 Cruciate radices.
 Dictamnus albus.
 Menthastris folia tam pota, quam illita.
 Galega confusa, & vulneri adalligata, seu eius succus potus.
 Imperatoria

VENENORVM

Imperatorie radix.
 Vincetoxicum.
 Carduus benedictus tam intro sumptus, quam iecto loco adhibitus.
 Securidaca vtriusque semen potum.
 Hypericum cum intus sumptum, tum exterius demorso loco illitum.
 Bistorta.
 Tormentilla.
 Angelica.
 Borraginis } succus potus.
 Vulgaris buglossi }
 Quinta essentia nostra, in praefatione lib. 6. descripta, semiuncia pondere.
 Galli vel gallinae pedes deplumatus, & vulnere superpositus, repetitis tot gallis quousque, sat sint ad reuocandum venenum.

Theriaca.
 Mithridatis antidotum.
 Calx viva oleo & melle subacta, & illita.
 Ellebori nigri radix vulnere infixa.
 Cypripedium }
 Allium } elixa, & contusa, & morsibus
 Asphodeli radix } illita.
 Dracunculi radix }
 Iridis }
 Ari }
 Phu }
 Chamaleonis }
 Liliij }
 Hemero callis }
 Helenij }
 Foeniculi }
 Smyrni }
 Gladioli }
 Scilla }
 Sparganii }
 Cyclamini }
 Bryonia }
 Raphani }
 Bulbaceorum omnium }
 Radices } concisa ac decocta, & vulneribus illita.

Citria mala deuorata.
 Serpentina siue syluestris coronopi radix pota.
 Theriaca Andromachi.
 Superstitiosum remedium eremita cuiusdam, vide lib. 6. commento communis curationis in omnes virulentos ictus.
 Lapis bezahar duodecim granorum pondere haustus, & vulnere illitus.
 Sordes in ceruorum oculorum angulis reperta pota & illita.
 Melitea terra ex vino pota.
 Antidotum nostrum, lib. 5. in praefatione descriptum, ex vino.
 Potio ex antidoto nostro, & aqua vita eodem in loco descripta.

DIOSCORIDIS.
 Ad viperarum morsum.

Costus semiuncia pondere potus.
 Cassia potui data.
 Pix liquida illita.
 Iuniperi folia, & foliorum succus potui datus.

VENENORVM

Fraxini folia, vel eorum succus haustus.
 Lauri folia admota.
 Abrotonum illitum.
 Galbanum splenij loco super iectum locum adhibitori.
 Origanum virens inditum.
 Palli gallinarum discerpti, & confestim admoti.
 Anthemis detrita cum hordeacea farina, & mulso aceto cataplasmatico modo admota: sed locus antea aceto mulso calido foueatur.
 Rubi folia ex vino illita.
 Porri succus ex meri hemina haustus.
 Apiastris succus ex vino potus.
 Leporis coagulum potui datum.
 Omotarichi piscis salita carnes in cibum sumpta, hausto deinde copioso vino: quin etiam admota.
 Cerui genitale tritum, & ex vino sumptum.
 Vrina ipsiusmet demorsi bibita.
 Furfures tritici in decocto ruta elixi, admoti.
 Erui farina ex vino macerata illita.
 Raphanus inunctus.
 Brassica succus cum nitro & iride potus.
 Chondrilla manducata.
 Allium ex vino sumptum, & illitum.
 Scilla decocta in aceto, & imposita.
 Anagallidis succus ex vino sumptus.
 Ferula medulla in vini potione hausta.
 Aparina succus ex vino potui datus.
 Rubia radice succus cum folijs potus.
 Tribuli terrestris succus drachma pondere potus, plagaeq; admotus.
 Anchusa Alcibiadis nomine, folia, radicesque tum comesta, tum bibita, tum adalligata.
 Ocimastris semen ex vino haustum.
 Sambuci, ebulique radix ex vino cocta, potui data.
 Bryonia radix duarum drachmarum pondere hausta.
 Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI

Lapis bezahar tam potus, quam illitus.
 Sordes in angulis oculorum cerui reperta, cum potui tum etiam illita.
 Antidotum nostrum in lib. 6. praefatione descriptum, potum.
 Potio ex antidoto nostro & aqua vita, ibidem descripta.
 Viperei pastilli poti.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arterijs illitum.
 Theriaca Andromachi cum vino pota.
 Allium plurimum deuoratum ante cruentam urinam.
 Vinum meracum copiose bibitum, excitatis vomitibus.
 Vipera ipsa excoriata rescissis capite & cauda, interioribusq; exemptis & anguillarum more cocta, & deuorata.
 Vipera viua caput amputatum mollicula prehensum, & morsui adalligatum ea parte adhuc calente, qua a reliquo corpore abscissa est.
 Gallina viua dissecta, & calens morsui imposita.
 Cucurbitula loco demorso imposita.
 Fraxini foliorum succus potus post appositam cucurbitulam, & expressa a succo folia vulnere illita.
 Melissophylli folia, & succus, tum ex vino potus, tum exterius illitus.
 Melanthij

VENENORVM

Melanthij drachma quatuor pota.
 Cancri fluuiatiles cum lacte triti, & poti, ac vulnere
 quoque illiti.
 Rana cocta, & in cibum sumpta, epoto deinde earum
 iure.
 Testudinis sanguis exsiccat, cum syluestri cumino
 potus.
 Anchusae radix in potionibus addita.
 Hematites lapis haustus.
 Heliotropium cum vino ebibitum.
 Raphani in cibo accepti, & deinde in vomitione reie-
 cti, exhibita statim Andromachi theriaca.
 Trifolij bituminosi decoctum fotu adhibitum.
 Porrum cum pane, & sale illitum.
 Allium cum aceto, aut suo ipsius, aut fraxini cinere
 cum pane illitum.
 Hastula regia radices trusa, & illita.
 Sycomori folia cum pane imposita.
 Lauri tenella folia cocta, & oleo subacta, & illita.
 Vipera tota contusa, & vulnere adalligata.
 Echij epotus succus, & herba ipsa imposita.

DIOSCORIDIS

Ad serpentium & aspidum morsum.

Cancris fluuiatiles crudi tritique cum asinino lacte
 potui dati.
 Equi fluuiatilis testiculus potus.
 Castorium bibitum.
 Mustela salita, & in umbra exsiccata puluis, drach-
 marum duarum pondere ex vino sumptus.
 Rana cum sale in oleo decocta, comesta.
 Gobius piscis deuoratus.
 Cimices lectularij septem quoquomodo hausti.
 Aprinum iecur, & recens, et siccu ex vino sumptum.
 Gallinaceorum carnes dissecta, ita ut tepebunt appo-
 sita, crebroq; mutata.
 Butyrum illitum.
 Caprarum montanarum simus in vino, vel aceto de-
 coctus illitus.
 Mel ex calido rosaceo bibitum.
 Asphodeli radix trium drachmaru pondere sumpta.
 Quin & folia, flores, & radices in cataplasmaticis
 addita.
 Nasturtium haustum.
 Spina alba semen potum.
 Abrotonum sumptum, ex vino.
 Hyssopum tritum cum melle, sale, et cumino impositu.
 Nepeta pota, vel cataplasmaticis indita.
 Panacis asclepij semen cum floribus haustum, & in-
 unctum.
 Panaces chironium bibitum, & illitum.
 Hieracij succus ex vino potus.
 Elaphobosci semen in vini portione sumptum.
 Euphorbium incisa capitis cute ad os usque, in vul-
 nus impositum statimque contusum.
 Leontopetalum bibitum illico dolorem aufert.
 Lily folia illita.
 Melissophyllum ex vino haustum, & plaga admotu.
 Marrubij folia hausta.
 Serpyllum tum potum, tum impositum.
 Ruta cum nucibus iuglandibus, & caricis sumpta.
 Phyllitis ex vino hausta.
 Smyrny radix illita.

VENENORVM

Faniculum ex vino sumptum.
 Sagapenum ex vino potui datum.
 Libanotis radices cum vino bibita.
 Scordium siccatum ex vino sumptum.
 Conyza illita.
 Clematis in aceto bibita.
 Echij radix ex vino pota. Praepota vero demorderi
 prohibet, id quod praestant semen, & folia.
 Ocimastri semen potum.
 Eupatorij semen, & folia in vino sumpta.
 Helichrysi coma ex vino bibita.
 Verbenace supina radix, & folia ex vino hausta, tum
 etiam admotu.
 Mandragora radix ex melle, aut oleo illita.
 Nerij radix ex vino sumpta.
 Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illatum vene-
 num frigidum sit: frigidum vero ubi calidum.
 Adianti decoctum bibitum.
 Aqua maris fotu adhibita.
 Sal cum origano, melle, & hyssopo inunctum.
 Sarmentitius cinis ex aceto illitus.
 Samia terra ex aqua pota.
 Ophites lapis pro amuleto gestatus.
 MATTHIOLI
 Myrica fructus potus.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arterijs il-
 litum.
 Gallinaceorum deplumatus podex plaga appositus.
 Sordes ex angulis oculorum cernuorum exempta, hau-
 sta & illita.
 Cicerum farina cum hyperico decocta & imposita.
 Maluae folia cum porris & capis illita.
 Beta nigra succus cum potus, tum illitus.
 Serpentina radix, ex vino sumpta.
 Scorzonera foliorum, & radicum succus haustus.
 Potri folia melle subacta, & illita.
 Sinapis farina ex aceto imposita.
 Caryophylloru syluestriu radices ex meraco sumpta.
 Centaurij magni radices succus uncia pondere hau-
 stus, ac etiam vulnere illitus.
 Hyssopum cum sale, & cumino tritum, & ex melle
 vulnere illitum.
 Mentha graeca.
 Hieracij succus ex vino potus.
 Eiusdem folia tosta, thyrsg, triti, et ex aceto hausti.
 Paeonia radix, vel semen, tam potum, quam admotu.
 Bistorta & tormentilla radices pota & exterius illi-
 Scabiosa trusa recensque illita. (ta.
 Angelica radix cum ruta imposita.
 Saphydis agriae flores, & folia tum pota, tum illita.
 Melitea terra ex vino pota.
 Antidotum nostrum, in praefatione lib. 6. descriptum.
 Potio ex antidoto nostra & aqua vite, ibidem de-
 scripta.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, & arterijs il-
 litum.
 Allium cum Zito tritum ad nauseam usque potum.
 & vomitione reiectum.
 Opopanax potum cum vino, et vomitione redditum.
 Origanum cum vino haustum.
 Centaurium minus cum myrrha, & opij momento,
 plaga impositum.
 Rumex

VENENORVM.

Rumex contrita & cataplasmati modo adhibita.
Theriaca tum pota, tum illita.
Quinta essentia nostra, in praefatione sexti libri de-
scripta, pota.

MATTHIOLI

Ad Dipladii morsum.

Antidota omnia quae viperis moribus succurrunt.
Oleum potum, & vomitione redditum.
Emplastrum attractoriae plagae imposita.

DIOSCORIDIS

Ad Hemorrhoidi morsum.

Allium bibitum, & illitum.
Merum copiosius haustum.
Vinum viniferarum folia decocta, & ex melle suba-
cta imposita.

MATTHIOLI

Allium copiose deuoratum, } anteaquam cruenta sit
Vinum dilutum liberalius potum } urina, & deinde vo-
Theriaca deuorata } mitione reddita.
Pisces copiose allio, & oleo perfusi in cibis sumpti.

DIOSCORIDIS

Ad Cerastrae morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.
Raphani semen ex vino bibitum.
Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

MATTHIOLI

Antidota omnia, quae viperis moribus conueniunt.

MATTHIOLI

Ad Tamarulæ morsum.

Antidota omnia quae phalangiorum ictibus resistunt.
Musica instrumenta & continua tripudia, & salti-
tiones, ad lassitudinem usque.

DIOSCORIDIS

Ad Scolopendreae morsum.

Aphodeli radix & semen ex vino pota.
Sal ex melle, & aceto illitum.
Kua syluestris admota: quin, & bibita ex vino.
Muria acida, fotu adhibita.
Aristolochia ex vino pota.
Serpillum potui datum ex vino.
Calamintha ex mero sumpta.

MATTHIOLI

Cinis ex aceto subactus & vulnere illitus.
Scilla imposita.

Pulegium }
Ruta } ex vino pota.
Mentha }

DIOSCORIDIS

Ad Dryini morsum.

Aristolochia cum vino hausta.
Trifolij bituminosi folia in potu sumpta.
Aphodeli radix potui data.
Glandes quaecunque bibita.
Ilicis radices tusa, & icto loco illita.

MATTHIOLI

Antidota omnia quae viperis moribus conueniunt.
Quercus foliorum succus potus, aut stillatitia eorum
aqua.

DIOSCORIDIS

Ad Natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex lixiuio, &
oleo inditum.
Aristolochia cortex minutim contritus cum querna

VENENORVM.

radice, & hordei farina ex melle illita.
Aristolochia bina drachma in potione postea pota.
Marrubij succus ex vino haustus.
Fanus recens ex aceto sumptus.

MATTHIOLI

Cupressi pilulae drachma pondere, una cum baccarum
myrti tantundem, ex rhodomelle, aut vino mulso
pota.
Calex vina ex oleo illita.

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, arterijs, et vul-
neri illitum.

DIOSCORIDIS

Ad Cenchri morsum.

Lactuca semen cum lini semine illitum.
Satyria cum syluestri ruta, & serpyllo, & aphodeli
radice ex vino sumpta.

Gentiana potus data.

Cardamomum deuoratum.

DIOSCORIDIS

Ad muris aranei morsum.

Atus araneus ipse discerptus & impositus.
Allium cum ficulneis folijs, & cumino illitum.
Absinthium ex vino bibitum.
Chrysogoni radix concisa, & ex aceto imposita.

Galbanum in splenio admotum.

Hordeacea farina ex aceto mulso illita.

Panica dulcis acini decocti, & inuncti.

Portum contritum impositum.

Abrotani decoctum ex vino haustum.

Serpillum ex vino potum.

Ernea ex vino sumpta.

Cupressi recentes pilulae ex aceto potui data.

Cyclaminus ex aceto mulso sumptus.

Pyrethrum ex vino potum.

Chamaeleonia radix bibita.

MATTHIOLI

Ernea semen tritum, & impositum.

Cuminum cum allio simul cum putamine tuso adhi-
bitum.

Mus ipse araneus laceratus, & impositus.

Radix } Gentiana } ex vino pota, & vulnere illita.
Panacis }

Capparis cortex, tam potus, quam illitus.

Verbenaca recte succus potus.

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum insumptum.

DIOSCORIDIS

Ad pastinacæ & draconis marini ictum.

Salvia decoctum potum.

Simplicia omnia, quae viperinis moribus conueniunt.

Absinthij, aut sulphuris ex aceto decocti potio.

Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ictui admota.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confricatum.

Sulphur admotum.

MATTHIOLI

Furfures aceto incocti, & impositi.

Acetum calido fotu adhibitum.

Fermentum acidum ex liquida pice impositum.

Lauri decoctum foliorum haustum.

Marrubium

VENENORVM.

Marrubium cum lauri folijs, & echio potum.
 Panacis radix cum salvia deuorata.
 Fici lactis guttae quinq; cū trib. serpylli granis pota.
 Salvia decoctum potum pluribus diebus.
 Scordium ex suo ipsius decocto potum.
 Theriaca deuorata.
 Atitridatis antidotum.
 Quinta essentia nostra cum antidoto nostra parata.
 Anchusa folia
 Quinquefolium
 Rubi flores
 Arctium
 Oxalis
 Lycopsis
 Terditium
 Chamapitys
 Fagi cortex
 Pastinaca agreffis semen
 Terebinthi fructus
 Ficus marinus.
 Smyrnum
 Eryngium
 Libanotis

plagis illita et intus sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad mustelæ morsum.

Eruca comesta, & post eam bibitū vinum odoriferū.

MATTHIOLI.

Vincetoxici radices pota.

DIOSCORIDIS.

Ad basilici morsum.

Castoreum drachmæ pondere ex vino potum.

Papaueris succus haustus.

DIOSCORIDIS.

Ad calcidicæ lacertæ morsum.

Portulaca percocta deuorata & illita.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quæ vipereis moribus succurrunt.

Portulaca plurima in cibo deuorata.

Vinum myrtite, meracius bibitum.

Acetum calidum cum spongia fotum.

MATTHIOLI.

Ad ammodicæ morsum.

Mentha ex aqua mulsa pota.

Cassia odorata } ex frigida pota.

Castoreum

Artemisia succus cum aqua potus.

Theriaca Andromachi tum deuorata tum illita.

Medicamenta quæ trahendi vim habent imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad canis rabidi morsum.

Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bibitum.

Cancrorum fluuiatiliū cinis cochlearium duorum pondere ex gentiana radice vino, per triduum in vino potus.

Smaridis piscis salsa caro.

Omotarichi piscis salita carnes illita.

Garum omnium piscium fomento adhibitum.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sumptum à metu aqua præseruat.

Caninus sanguis bibitus.

Canina vrina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calido.

Triticum commanducatum, & appositum.

VENENORVM.

Cape cum ruta, sale & melle mixta.

Allium cum vino potum, & cataplasmati inditum.

Panaces herculeum piei mistum & cataplasmati additum.

Feniculi radices concisa, & ex melle imposita.

Laser impositum.

Ballote cataplasmati modo cum sale illita.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmati inditum.

Alyssum in edulco contusum.

Allium syluestre in cibo sumptum, & illitum.

Salsamentum inditum.

Succus syrenicus.

MATTHIOLI.

Cancrorum fluuiatiliū cinis quadraginta diebus cum gentiana, & thure potus.

Pix brutia cum opopanace & aceto imposita.

Humani stercoris stillatitia aqua pota.

Oxylapathi decoctū fotu adhibitum, herbaque ipsa illita, atq; vnà cum radicibus hausta.

Scorzonera radix deuorata, aut eius succus haustus.

Hippolapathi radix quadraginta diebus pota, atque etiam illita.

Vincetoxici radices quotidie sesquidrachmæ pondere pota ex cardui benedicti decocto continuis quadraginta diebus.

Angelica radix exterius cum ruta imposita, & nitro in corpus sumpta.

Bitumen Asphaltite drachmæ pondere diebus pluribus continuis ex aqua potum.

Hippocampus marinus ex aceto nigro, & melle subactus tam potus, quàm illitus.

Rumex fotu adhibita.

Theriaca Andromachi deuorata, & vulneri illita.

Potamogetum cum sale exterius illitum.

Artemisia

Absinthium

Allium

Centaurium mi.

Aristolochia

Scordium

Chamedrys

Bryonia

Pulegium

Caprifici cortex contusus & ex aqua potus.

Cauterium actuale inustum.

Mercurius præcipitatus vulneri inspersus.

MATTHIOLI.

Ad hydrophobiam, id est aquæ timorem.

Veratri albi, aut nigri potiones.

Epithymum

Fumaria

Sena

Myrobalana

Elaterium

Agaricum

Rhabarbarum

Centaurium mi.

Genista semen

Thapsia

Armenius lapis

} tam intus sumpta, quam exterius illita.

} in potionibus purgantibus propria nata.

VENENORVM.

Bitumen iudaicum frequenter ex aqua potum.

{ Leporis }
Coagulum { Vulpis } potum.
{ Capreoli }

Catuli coagulum semel potum.

Ciceris nigri decoctum copiose haustum.

Mithridatis Antidotum.

Theriaca Andromachi.

DIOSCORIDIS.

Ad canis non rabidi morsum.

Amigdala amara ex melle excepta.

Mitularum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina vino macerata indita.

Plantago cataplasmatibus modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasmatibus more impositi.

Mentha imposita.

Vrtica utraque cum sale adhibita.

Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe veteri imposita.

Sambuci, & ebuli folia illita.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Hippolapathi radix trita, et ex meraco vulnere illita.

Marrubij folia cum veteri axungia trita & imposita.

Canis qui memorderit pili excisi et vulnere adalligati.

DIOSCORIDIS.

Ad phalangiorum morsum.

Myrica fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura potus.

Lixiuu sculnei cineris potu, adiecto sale trito et vino.

Cancris fluuiatiles crudi, tritiq, cum asinino lacte poti.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Malua decoctum impositum.

Myrrhis ex vino pota.

Asparagi radicum decoctum haustum ex vino.

Lactuca sylvestris bibita.

Coris semen potum in vino.

Hedera succus cum aceto potus.

Abrotanum cum vino bibitum.

Dauci semen ex vino assumptum.

Nigella drachma pondere cum aqua pota.

Aparine ex vino pota.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmatibus more additum.

Phalangij folia, flores semenque potum.

Iunci marini tenella folia prope radicem erumpentia imposita.

Hyacinthi radix pota.

Semperuium maius in potu datum.

Aqua maris fotu adhibita.

Punica sylvestris radix, quam tenuissime trita, aut aristolochia cum hordei farina, & aceto subacta.

Apiastri decoctum fotu admotum, aut eius folia.

Abrotani

Anisi

Cumini aethiopicum

Cedrides trita admota, vel bibita.

Platani cortex potus.

{ semē propinatu } Binarū drach-
{ marū pōde. cū }
{ hemina vini. }

VENENORVM.

Cupressi viridum pilularum admisso vino decoctū.

Chamapytios decoctum bibitum.

Trifolij semen propinatum.

MATTHIOLI.

Atriplicis succus potus.

Cyani utriusq, folia siue semen ex vino hausta.

Porri folia melle subacta & illita.

Hyeracium ex commisso vino, & aceto potum.

Trifolij bituminosi decoctum fotum.

Acetum calidum cum spongijs vulnere adhibitum.

Sanguinaria trita & illita.

Porum cum surfuribus, & aceto incoctum, et illitū.

Hordeacea farina ex vino & melle cocta & imposita.

Lauri folia cum ruta adhibita.

Caprillum stercus cum vino impositum.

Amaracus cum sylvestri ruta, & cypero ex aceto.

Theriaca Andromachi.

Mithridatis antidotum.

MATTHIOLI.

Ad acontia morsum.

Antidota omnia, qua vipereis morsibus resistunt.

Oleum nostrum de scorpionibus, plaga, cordi, & arterijs illitum.

Potio ex aqua vita, & antidoto nostro parata, lege li. 6. praefationem.

DIOSCORIDIS.

Ad scellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

MATTHIOLI.

Mithridatis antidotum.

Scorpiones contriti.

Oleum nostrum de scorpionibus inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad crocodilorum morsum.

Sal impositum.

MATTHIOLI.

Crocodili corij cinis ex aceto illitus.

Hastula regia radices elixa & illita.

Hypericum recens tritum & morsui adalligatum.

DIOSCORIDIS.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens tum siccum bibitum.

MATTHIOLI.

Phaseoli commanducati & vulnere adalligati.

Fabarum & erui farina melle subacta, & illita.

Abiegna resina calens, cum rosaceo adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad scorpionis ictus.

Cyperus impositus.

Cardamomum ex vino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri bacca ex vino bibita.

Myrti succus ex mero haustus.

Ficus sativa lacteus succus plaga instillatus.

Cancris fluuiatiles crudi, tritiq, cum asinino lacte poti.

Scorpius ipse tritus, et impositus, vel tostus denotatus.

Delphinium appositum.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis salita caro, apposita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.

Mures domestici dissecti, & impositi.

Fimus { Asini } herbas pascedis vino dilutus haustus.
{ Equi }

V E N E N O R V M.

Vrina humana pota.
 Farina triticea ex aceto, & vino imposita.
 Lychnidis semen cum vino potum.
 Oxylapathi, & oxalidis semen vino, aut aqua potum.
 Sonchis succus comestus, & cataplasmatibus more impositus.
 Intybus more cataplasmatibus adhibitus.
 Phalangium herba pota.
 Lactuca sylvestris bibita.
 Ocimum cum polenta impositum.
 Asphodeli semen & flores in vino poti.
 Abrotonum in vino potum.
 Sampsuchum ex aceto & sale impositum.
 Hieracium maius, & minus cataplasmatibus more appositum.
 Laser oleo dilutum impositum.
 Colus rustica cum vino pipereq; bibita, et manibus gestata dolorem puncturae omnino fugat.
 Melissophylli folia adhibita.
 Polemonij radix alligata.
 Rubi flos, & mora.
 Verbasci aureum floribus ferentis folia imposita.
 Chamæfycæ succus illitus.
 Scorpioides illita.
 Heliotropium potum cum vino, & illitum.
 Aqua maris fortis imposita.
 Sulphur ignem non expertum, cum resina terebinthina exceptum admotum.
 Calamintha trita illita, vel cum posca fota.
 Galbanum splenij more ductum impositum.
 Hordei farina cum vino parata.
 Ruta decoctum fortis adhibitur.
 Trifolium tritum iniectum.
 Cupressus cum vino & ruta.
 Peucedani succus haustus.
 Pulegij } decoctum potum.
 Gentiana }
 Aristolochia praesertim cortex drachmarum duarum pondere.
 Sal cum lini semine.
 Sapphirus lapis illitus.

M A T T H I O L L

Mumia ex mero hausta, quin et illita, cum recenti Civrij semen potum & appositum. (butyro.
 Pontica nuxes in cibis sumptae, tum quoque in cingulo gestatae.
 Pastinaca semen potum.
 Oleum nostrum de scorpionibus, vulnere, cordi, & arterijs illitum.
 Serpillum }
 Althæa radix } pota.
 Elaphoboscum }
 Blitum ex vino sumptum.
 Atriplicis succus potus, & ipsa herba illita.
 Cyani utriusq; folia siue semen ex vino decocta, & Porri folia melle subacta, & illita. (pota.
 Sinapis farina aceto subacta, & illita.
 Asphodeli radix decocta & plaga admota.
 Gentiana hausta.
 Achates lapis gestatus, ut carnem tangat.
 Cochlea hortulana contusa, & illita.

V E N E N O R V M.

Terreni vermes triti, & impositi.
 Cancer fluviatilis tritus, & potus ex vino.
 Verbenaca recta tum pota, tum illita.
 Cuminum cum melanthij, & viticis semine drachma pondere potum ex vino.

D I O S C O R I D I S.

Ad vesparum, & apum ictus.

Lauri folia trita, & illita.
 Malua concisa ex oleo imposita.
 Sisymbrij folia imposita.
 Althæa decoctum ex posca bibitur.
 Sal cum seuo vitulino adhibitur.

M A T T H I O L L

Asparagus tritus, & cum melle illitus.
 Bubulum stercus cum posca illitum.
 Sesamum cum posca.
 Musca contrita, & illita.
 Thymbra }
 Melissa phyllum } illita.
 Sisymbrium }
 Momordica oleum inunctum.
 Ferrum in quo Strombi conchylij imago exculpta fuerit, icto loco superposito.

D I O S C O R I D I S.

Ad fuganda animalia venenosa.

Iniperi accensa simus.
 Cedrides peruncto corpore adipe, vel medulla cervina excepta.
 Viticis folia suffita, vel substrata.
 Cancri fluviatiles crudi cum otimo triti, scorpionibus admoti.
 Cervinum cornu crudum incensum, suffitumq;
 Cerui, & Elephantis adeps inunctus.
 Cervina medulla.
 Nasturtium suffumigatum.
 Abrotanum stratum, suffitumq; incensum.
 Origani folia stratis subacta.
 Dictamnium olfactum, omnia quae ictu aut morsu venenum relinquunt, enecat.
 Calamintha suffitus.
 Peucedani suffitus.
 Lysimachia incensa fugat serpentes, & muscas.
 Nigella suffitus.
 Polium utrumq; incensum, stratumq;
 Coryza suffitus.
 Gagates lapis suffitus.

M A T T H I O L L

Veteramentorum suffitus.
 Scordium substratum & suffitum.
 Bitumen suffitum.
 Succinum suffitum.
 Assa foetida suffita.
 Castoreum suffitum.
 Cervina ungula suffita.
 Cerui corium in terra stratum.
 D I O S C O R I D I S.
 Ad venena omnia.
 Phu antidotis insertum.
 Cinnamomum potum.
 Pix liquida cyathi mensura in eclegmate ex melle data.
 Cedrides antidotis imposita.
 Nuxes inglandes cum ruta, & ficis praesumptae.

Quinguesola

VENENORVM.

Quinquefolij radicis succus bibitus.
 Coagulum leporinum potum.
 Epipactis hausta.
 Castoreum bibitum.
 Calamintha prapota.
 Mustela salita, & in umbra exiccata & puluis cū vino.
 Mustela ventriculus coriandro factus, & inuetera-
 Canicula lac primi partus potum. (tus.
 Eryngium cum vino potum.
 Butyrum deficiente oleo haustum.
 Sanguis { Anseris { antidotis commistus.
 { Anatis {
 { Hædi {
 Vrina ipsiusmet infirmi pota.
 Semen raparum haustum.
 Ruta semen acetabuli pondere cum vino potum.
 Napi semen potum.
 Malua decoctum cum suis radicibus frequenter po-
 tum, crebroque reiectum.
 Brassica semen antidotis impositum.
 Irionis semen haustum.
 Laserpitium potum.
 Agaricum drach. pondere cum diluto vino sumptū.
 Chamaleonis alba radix pota cum vino.
 Spina alba in amuleto congesta, colloq. suspensa.
 Abrotani semen cum vino potum.
 Ruta cum iuglandibus nucibus, & caricis sumpta.
 Apij decoctum potum.
 Marrubij folia bibita.
 Betonica folia drachma pondere in vino bibita.
 Tribuli terrestris succus haustus cum vino.
 Polemonia radix in vino bibita.
 Smilais aspera acini prius, post ve sumpti.
 Actum tepidum bibitum.

Terra { Lemnia } ex aqua hausta.
 { Samia }

MATTHIOLI

Iridis radix pota.
 Imperatoria herba radix sumpta.
 Phuradix hausta.
 Cinnamomi stillatitia aqua.
 Balsami factitij liquores.
 Helenium.
 Myrrha. Caphura.
 Mumia cum tribulo marino, & assa fetida sumpta.
 Dictamni albi radices quoquo modo sumpta.
 Quernarum glandium decoctum in potu sumptum.
 Citriorum malorum semen haustum.
 Oleum nostrum de scorpionib. cordi, & arterijs illitū.
 Castoris vrina.
 Ceruini cordis os.
 Napi semen haustum.
 Cyani utriusq. folia, sine semen hausta ex vino.
 Scorzonera radix, aut eius & foliorū succus haustus.
 Caryophyllorū flores saccharo assernati, intus sumpti.
 Zedoaria deuorata, vel in potu hausta.
 Dictamnus albus }
 Imperatoria }
 Vincetoxicum }
 Scordium }
 Carduus benedictus }
 Hypericum }
 quouis modo insumpta.

VENENORVM.

Bistorta & Tormentilla decoctum potum.
 Consolida regalis flores.
 Angelica.
 Quinta essentia nostra hausta.
 Lapis bezahar octo granorum pondere sumptus.
 Melitea terra pota.
 Antidotum nostrum magnum, in prefatione lib.
 sexti descriptum.
 Potio ex antidoto nostro, & aqua vita, eodem in loco
 descripta.

MATTHIOLI

Ad veneficia.

Herba paradisi semen drachma pondere quotidie po-
 tum ad vigesimum diem vsque.
 Argentum viuum pro amuleto suspensum.
 Lapis aetites gestatus.
 Vpupa auis cor suspensum.
 Leporis cor in aluta gestatum.
 Lupinus oculus dexter gestatus.
 Scilla super limine ianua suspensa.

DIOSCORIDIS.

Ad leporem marinum.

Cedria contrita cum vino hausta.
 Cancru fluiatiles cum suo iure elixi, & comesti.
 Lac asininum }
 Passum } continuè datum.
 Malua radicum decoctum haustum.
 Cyclamini radix cum vino bibita.
 Veratrum nigrum } drachma pondere data cū mul-
 Scammonij succus } sa, & mali punici acinis.
 Anserinus sanguis tepidus haustus.
 Alismatis drachma vna, vel altera adhibita.

MATTHIOLI

Humanus sanguis calens potus.
 Humanum lac ab ipsis mammis exuctum,
 Vulpis caro inassata, & deuorata.
 Theriaca diateffaron, tribus diebus pota.

DIOSCORIDIS.

Ad rubetam ranam.

Testudinis marinae sanguis cum leporis coagulo, &
 cymino bibitus.
 Alismatis radix vnius, vel duarum drachmarum
 pondere in vino pota.
 Merum largius potum, & vomitu redditum.
 Arundinis }
 Cyperi } radicis bina drachma pota.

MATTHIOLI

Eryngij radix ex ranarum comestibilitum iure pota.
 Antidotum nostrum magnum, in prefatione lib.
 sexti descriptum.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arterijs il-
 litum.
 Theriaca Andromachi.
 Mithridatis antidotum.
 Testudinis marinae sanguis, additis cumino, leporis
 coagulo, & vino.
 Potio ex antidoto nostro, & aqua vita, in lib. 6. pra-
 fatione descripta.
 Smaragdi puluis, scrupuli pondere ex vino potus, &
 subinde intret ager nudus in mulum, aut equum

VENENORVM

recenter exenteratum, ibiq; conclusus moretur donec deferveſcat cadauer.

Rhabarbarum }
 Diacurcuma } pota.
 Dialacca }
 Lapis in rubeta ipſius capite inuentus potus.

DIOSCORIDIS.

Ad bupreſtes, & pinorum erucas.

Oleum { Irinum }
 Melinum } potum.

Carica comeſa, & earum decoctum ex vino.
 Palmula in cibo ſumpta, vel trita ex mulſo, aut lacte pota.

Pyra omne genus in cibum ſumpta.

Humanum lac bibitum copioſe.

MATTHIOLI

Antidota omnia, qua cantharidum noxa ſubueniunt.

DIOSCORIDIS.

Ad epotas hirudines.

Muria in ſorbtionibus data.

Cyrenaicus ſuccus potus.

Laſerpitij folia ex aceto haſta: quin & ſuccus ex aceto gargarizatus.

Beta folia cum aceto bibita.

Niuis glebula cum aceto ſumpta.

Cimices ex vino aceto ve poti.

Acetum cum ſale potum.

Nitrum ex aqua gargarizatum.

Atramentum ſutorium aceto dilutū & gargarizatiū.

MATTHIOLI

Salicis decoctum, aut lixiuium ex ipſius cinere paratum potum.

Alumen in lixiuio diſſolutum gargarizatum.

Sal ammoniacum aqua dilutum & gargarizatum.

Quinta eſſentia noſtra pota.

Oleum e chalcantro ſemiſcrupuli pondere haſtum.

DIOSCORIDIS.

Ad epotas cantharidas.

Halica }
 Oryza }
 Tragi } decoctum elyſmate inſuſum.
 Malua }
 Sem. lini }
 Semen ſcni-graci }
 Althaa }

Nitrum ex hydromelite potum.

Nuclei pinei ex vino ſumpti.

Cucumeris ſemen contritū, ex mulſo, aut lacte haſtū.

Anſerinus adeps ex paſſo potus.

Samia terra, qua aſter appellatur ex defruto haſta.

Pulegium tritum ex aqua poti datum.

Lac potum.

Vinum dulce liberalius bibitum.

Thuris cortex ex paſſo ſumptus.

Rofaceum cum Irino ex ruta decocto ſumptum.

Vitis recentis ramuli detriti, & ex paſſo haſti.

Iuſ eſculentum omnium adipum.

MATTHIOLI

Lac humanum ex vberibus ipſis exuctum.

Butyrum crudum recens, ecligmatiſ modo delinctū.

Pſillij, cydoniorum malorum, maluaq; ſeminis ſpiſſamentum.

VENENORVM

Lactuca

Portulaca

Cucumeris } ſuccus potus.

Cucurbita }

Papaueris }

Lactuca }

Peponum }

Cucumeris }

Cucurbita }

Anguria }

Halicacabi bacca decem aut duodecim conſracta, & ex aqua portulaca, aut hordeacea piſſana pota.

Amygdalinum dulce ſelibra pondere potum.

Oleum e pineis nucleis }

Oleum e papaueris ſemine }

Malua }

Althaa }

Cucurbita }

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum.

Antidotum e pineis nucleis, comm. de cantharidibus deſcriptum.

Antidotum e lemnia terra.

Oleum e momordica, ſyphone in penis meatū inſuſū.

Balneum ex ibiſci, malua, violarum, pſillij, ſcni-graci, hordei, & hyoſcyami folijs & ſeminibus paratum.

Oni album cum ſuccis frigidis iniectum.

DIOSCORIDIS.

Ad ſanguinem & lac in ventriculo concretum.

Coagulum leporinum epotum.

Acetum tepidum potum, & vomitu redditum.

Groſſi lacteo ſucco turgentes ex poſca ſumpti.

Nitrum per ſeſe potum.

Coagulum omne ex aceto, & laſerpitij radice, aut laſere haſtum.

Brasica ſemen ex lixiuio ſiculnei cineris potum.

Conyza ſemen cum pipere ex aceto haſtum.

Rubi ſuccus ex aceto poti datum.

Hordeacea farina ventriculo, & alio ex aqua mulſa inuncta.

Thymum ex vino haſtum.

Calamintha folia arida pota.

MATTHIOLI

Capriſci lac potum.

Chelidonij maioris ſuccus haſtus.

Napi ſemen ex aceto bibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ſalamandram.

Reſina pinea in delinctū.

Galbanum ex melle deglutitum.

Nuclei pinei contriti, ex aiuga decocto poti.

Vrtica cum lilijs ex oleo decocta, & pota.

Teſtudinis marina, et terreſtris oua, cocta, et deuorata

Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit cocta, potum.

MATTHIOLI

Theriaca }

Mithridatis antidotum }

Terebinthina reſina }

Vrtica ſemen }

Cupreſſi folia }

VENENORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad colchicum ephemerum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.
 Bubulum lac haustum, quin & asininū largius potū.
 Quercus foliorum, aut glandium decoctum potum.
 Malicorium haustum.
 Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.
 Sanguinalis herba succus potui datus.
 Vitis recentium viticularum succus bibitus.
 Rubi succus in potu sumptus.
 Ferula recentis medulla ex vino sumpta.
 Myrti bacca trita, & aqua macerata, & in liquorem soluta, pota.
 Castanearum media tunica trita, & cum sanguinaria succo epota.
 Origanum cum lixivio bibitum.
 Simplicia omnia, qua fungus aduersantur.

MATTHIOLI

Lac } Humanum }
 Bubulum } potum.
 Asininum }

Dictamnus duarum drachmarum pondere haustu.

DIOSCORIDIS.

Ad solanum fomicum & manicum, & Dorichnium.

Aqua mulsa copiose sumpta.
 Laccapillum }
 Lac asininum } potum.
 Amygdala amara deuorata.
 Conchyliia omnia, tam cruda quam tosta deuorata.
 Locusta marina, quin & Gammari in cibum sumpti, & eorum in scula pota.

MATTHIOLI

Antidota omnia qua opio aduersantur.
 Quinta essentia nostra, comm. de vino descripta.
 Potio ex antidoto nostro, & aqua vite, in praefatione libri sexti descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad hyoscyamam.

Mori cortex potus.
 Aqua mulsa largius ebibita.
 Lac omne praesertim asininum potum.
 Ficuum aridarum decoctum bibitum.
 Nuclei pinei deuorati.
 Cucumeris semen passo potui datum.
 Vinum falsum cum suillo recenti adipe, & passo potū.
 Vrtica semen ex aqua sumptum.
 Nitrum ex aqua haustum.
 Cichorium deuoratum.
 Sinapis quoque modo sumpta.
 Nasturtium
 Raphanus }
 Cepa } ex vino sumpta.
 Allium }

MATTHIOLI

Theriaca.
 Mithridatis antidotum.
 Antidotum nostrum magnum.
 Piper longum.
 Pistacea largius deuorata.
 Meracama vomitu potum.
 Absinthium. Castoreum.

VENENORVM

Ruta
 Lauri bacca, & folia }
 Defrutum } ex meraco hausta.
 Vrtica semen }
 Cardamomum }

DIOSCORIDIS

Ad aconicum.

Leporinum }
 Haedinum } coagulum ex vino potum.
 Vitulinum }
 Chamapityos decoctum haustum.
 Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.
 Origanum }
 Ruta } decoctum cum vino absinthite potum.
 Marrubij }
 Absinthij }
 Sedum maius }
 Abrotanum } ex vino absinthite pota.
 Chamelaea }
 Aiuga }
 Opopalsamum drachma pondere ex melle, vel lacte cum castoreo, pipere, & ruta aquis ponderibus ex vino potum.

Vinum, in quo aurum, argentum, ferrum ve candens restinctum fuerit, potum.

Gallina ius ex lixivio & vino paratum potum.

Bubularū carniū praepinguia iura cum vino sumpta.

MATTHIOLI

Eryngij radix ex ranarum comestibilium, vel Anserino iure pota.
 Lemnia sphaeragis duarum drachmarum pondere ex calida aqua pota & vomitione reddita.
 Theriaca Andromachi à vomitu hausta ex vino in quo gentiana decocta fuerit.
 Antidotum nostrum magnum, in praefatione sexti libri descriptum, deuoratum, aut ex vino haustum.

MATTHIOLI

Ad napellum.

Lapidis BeZahardici septem grana ex albo meraco:
 Napi, aut rapi semen potum.
 Butyrum bubulum coctum, & saepe ac large cum vino sumptum.
 Glandium putaminum decoctum ex vino paratum.
 Diambari, diamoschiq, puluis potus.
 Moschus ambarumq, per sese, & cum Lemnia terra ex vino pota.
 Capparis radices contrita, & hausta.
 Mus qui napelli ipsius radices depascitur, siccatus & ebibitus.
 Antidotum è muscus napelli flores depascentibus: vide lib. 6. Napelli commentarium.
 Smaragdus in puluerem tritus duarum drachmarum pondere haustus.
 Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, arterijs, atque nucibus replicatis saepe vicibus inunctum.
 Puluis serui, principis Ferdinandi Archiducis Austriae, quo nonnullos qui Napellum sumpserunt sanatos vidimus.

DIOSCORIDIS.

Ad taxum.

Acetum calidum potum, & vomitu redditum.
 Simplicia omnia, qua cicutae resistunt.

VENENORVM

MATTHIOLI.

Medicamenta omnia ad cicutam facientia.

Theriaca Andromachi.

Antidotum nostrum magnum, in praefatione sexti lib. descriptum.

DIOSCORIDIS.

Ad toxicum.

Sanguis { Hircinus }
 { Caprillus }
 { Leporinus } } frigus, & in cibis sumptus.
 { Cervinus }
 { Caninus }

Galbanum cum myrrha ex vino haustum.

Quinquifolij radix pota.

Roboru

Fagi } cortex tritus ex lacte haustus.
 Ilicis }

Coronea mala deuorata, aut cum pulegio, & aqua bibita.

Amomum

Carpobalsamum } ex vino haustum.

MATTHIOLI.

Lapis bezahar octo granorū pondere ex vino haustus.

Napi, aut rapi semen potum.

Tormentilla radix hausta.

Glandiū omphacides siue putamina ex lacte hausta.

Malorum cydoniorum vinum potum.

Cubeba deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite haustum.

Alismatis radix duarum drachmarum pondere ex vino pota.

Acetum bibitum, & vomitu reddatum.

Sal cum oxymelite sumptum.

Meracum vinū cum absinthio, & cinnamo. haustū.

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum luxiuo, aut passo potum.

Ruta syluestris semen cum pipere, & panace ex vino sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso, vel cum saturia, aut origani decocto ex vino bibitum.

Pingua iura in potu sumpta cum vino, aut passo.

Osium medulla ex oleo pota.

MATTHIOLI.

Artemisa recens deuorata, aut foliorū succus haustus.

Quinta essentia nostra, cap. de vino descripta.

Lascepitij lachryma pota.

Castoreum ebibitum.

Theriaca sagzanea deuorata.

Mithridatis antidotum ex vino potum.

Moschum } olfactum.

Ambarum }

Ellebori albi puluis naribus inditus.

Sulphuris suffitans.

DIOSCORIDIS.

Ad cicutam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

Acetum bibitum, & vomitu reiectum.

Meracum vinum largius epotum, & per interualla repetitum.

VENENORVM.

Lac cum bubulum, tum ashinum potum.

Castorium cum ruta, & mentha ex vino sumptum.

Amomi

Cardamomi } uncia pota.

Styracis }

Piper cum vrtica semine ex vino haustum.

Lauri folia potui data.

Lasfer ex oleo, vel passo potum.

Passum per se largius ebibitum.

MATTHIOLI.

Apij semen ex vino potum.

Iridis radix potui data.

Seseli Massiliense ebibitum.

Nitrum ex copiosiore aqua potum.

DIOSCORIDIS.

Ad ixiam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum ex vino sumptum.

Acetum potum, vomitūq; reiectum.

Ruta syluestris semen } pota.

Lascepitij radix }

Tragorigani decoctum haustum.

Resina terebinthina deuorata.

Nardus Indica potui data.

Castorium

Lascepitium } oboli pondere sumpta.

Nuces iuglandes cum resina, castorio, & ruta trita, ita vt singula drach. pōdus aquet ex vino hausta.

Chamelea

Thapsia } succus scillici pōdere ex aqua mulsa ha-

Absinthij } stus.

MATTHIOLI.

Theriaca Andromachi } ex absinthij pontici deco-

Mithridatis antidotū } octo, pota.

Saccharum ē floribus borraginis buglossi ue paratum,

additis cor allio, margaritis, moscho, ambaro, & pretiosorum lapidum fragmentis.

Rosaceum cum aceto sincipiti illitum.

Thlasi semen potum.

Beta succus ebibitus.

Triticea ptissana cremor ex passo potus.

Absinthij diluatum potum.

Nitrum ex mulso haustum.

Lac recenter mulsum à vomitu copiose potum.

DIOSCORIDIS.

Ad coriandrum.

Merum per sese, velle: absinthio potum.

Oleum potum.

Oua in oleo exinamita, & ex muria liquefacta deuorata.

Muria epota.

Passum ex luxiuo assumptum.

Gallarum, & anserum ius copiose salsum, haustum.

MATTHIOLI.

Theriaca ex mero pota.

Vincetoxici radices potui data.

Diamoschum } in potionibus,

Diambarum }

DIOSCORIDIS.

Ad pillium.

Simplicitia omnia qua coriandro aduersantur.

VENENORVM
MATHIOLI

Theriacal hausta.

Vinctoxicum ebibitum.

DIOSCORIDIS

Ad herbam sardoniam.

Aqua mulsa liberalius pota.

Lac affatim bibitum.

Aqua calida foeta adhibita: quin etiam & oleum.

MATHIOLI

Vinum dulce potum ad ebrietatem vsque, ut inde dormiant affecti.

Castorium e dulci vino potum.

Melissophylli succus ex aceto sumptus.

Oleum de

Lilio	} occipitio, ceruici, & spinali medulla illitum.
Castorio	
Vermibus	
Costo	
Hypericowe	

Vnguentum

Aragon	} eodem modo usurpatum.
Agrippa	

DIOSCORIDIS

Ad mandragoram.

Aqua mulsa copiose pota, & vomitu reiecta.

Nitrum cum absinthio ex dulci vino, aut passo sumptum.

Rosaceum cum aceto capiti perfusum.

Eupatorium	} ex aceto trita, & ad olfaciendum data.
Piper	
Sinapi	
Castorium	
Ruta	

Lucernarum extinetarum fumus olfactus.

MATHIOLI

Coriandri semen } ex aqua calida potum.

Pulegium.

Origanum ex frigida ebibitum.

Veratri albi puluis naribus inditus.

Cantharides ex fermento occipitio adalligata.

DIOSCORIDIS

Ad fungos malos.

Fimus gallinae cum aceto bibitus.

Mel ex rosaceo calido potum.

Raphanus denotatus, vel potui datus.

Absinthium cum aceto bibitum.

Melissophylli folia cum nitro bibita.

Lixiuum sarmentitij cineris ex acida muria potum.

Satureia seruesacta, haustaque.

Origani insculum potui datum.

Acetum calidum potum, & vomitu reiectum.

Atramentum sutorium ex aqua potum.

Sal cum oxymelite bibitum.

Pyrastrifolia pota, denotataque.

Qua gallinacea cum aristolochia drachma ex posta denotata.

Paracis radix, & semen ex vino pota.

Lax vini cremata ex aqua pota.

Sinapis bibita.

Nasturtium comestum.

MATHIOLI

Myrti frondes, cum baccarum semine trita, & insumpta.

Brassica succus potus.

Porrum sub cineribus coctum haustum, & comestum.

VENENORVM

Pyri syluestris cinis potus, quin & ligni ramenta.

Pyra syluestris denotata, aut cum ipsis fungis elixida.

Quinta essentia nostra pota.

Raphani domestici succus potus.

Ruta folia denotata.

Origanum. Mel.

Theriacal ex aceto acerrimo pota.

Vinum generosum in quo piper conferbuerit.

Allium erudum denotatum.

Murinum stercus ex vino potum.

Oleum cum anatis adipe clystere infusum.

Ricinum oleum ventri illitum.

Scammonium ultimo loco potum.

Diapipereos, aut diacyminum, aut diagalanga, aut diamoschum pota.

DIOSCORIDIS

Ad gypsum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

Malua decoctum potum: quin & toti corpori inspersum.

Oleum bibitum.

Aqua mulsa bibita.

Caricarum decoctum potum.

Lixiuum e ficulneo, aut sarmentitio cinere paratum, cum vino copiosiore haustum.

Origanum cum lixiuio, aut aceto, aut passo sumptum: quin etiam & thymum.

Simplicia omnia qua fungis resistunt.

MATHIOLI

Antidota omnia qua cerussa & fungorum noxa optulantur.

Malua, althaa, fenograci, & lini seminis decoctum potum.

Aqua egelida cum butyro pota, & vomitione reiecta.

Mithridatis antidotum ex meraco duarum drachmarum pondere a vomitu bibitum.

DIOSCORIDIS

Ad cerullam.

Amaractium } oleum potum.

Irinum

Elmi liquor potus.

Persicorum nuslei ex pissana pota.

Caricarum } decoctum haustum.

Maluarum

Lac calidum bibitum.

Sesamum tritum ex vino sumptum.

Lixiuum ex sarmentitio cinere haustum.

Columbina oua cum thure pota.

MATHIOLI

Scammonium ex mulsa aqua potum.

Medicamentum qua suapte natura urinam pellunt.

Oleum lilinum ex hydromelite potum, & vomitione redditum.

Atriplicis rapique semen ex malso potum, & vomitu reiectum.

Brassica decoctum absque sale cum oleo infusum.

Theriacal.

Mithridatis antidotum.

Vinum album meracum liberalius potum.

MATHIOLI

Ad arsenicum sublimatum.

Butyrum frequenter sumptum, frequenter reiectum.

Asininum

V E N E N O R V M

Afininum lac potum.
Rapi semen bibitam.
Mucago ex psillij, malua, & cydoniorum semine parata, & pota.
Amygdalinum oleum potum.
Pinguum gallinarum ius copiosè haustum.
Crystallum in tenuissimum puluerem tritum, drachma pondere ex dulci amygdalino oleo potum.

D I O S C O R I D I S.

Ad argenti spumam.

Hormini sylvestris semen potum.
Myrrha bibita
Absinthium
Hyssopus
Apij semen
Piper
Ligustri flores

ex vino pota.

Palumborum aridus simus cum nardo ex vino potus.

M A T T H I O L L

Butyrum cum malsa potum, & vomitione reiectum.
Gallarum & anatum adeps ex hydromelite potus, & vomitu redditus.
Amygdalinum oleum copiosè potum.
Hydromel clystere infusum.
Apij succus ventriculo inunctus.
Butyrum ventri illitum.
Lasbyris semè drachmaru duarum pòdere haustum.

D I O S C O R I D I S.

Ad argentum vivum.

Lac copiosè potum, & vomitu reiectum.
Simplicia omnia, qua faciunt ad argenti spumam.
M A T T H I O L L
Lac bubulum cum suo butyro potum.
Amygdalinum oleum ebibitum.
Aurum in puluerem subtiliter tritum potum.

M A T T H I O L L

Ad argentum vivum sublimatum precipitatumque, & cinnabarim.

Lac bubulum cum suo butyro potum, & vomitione redditum.
Antidota omnia qua ad cantharidū noxam faciunt.
D I O S C O R I D I S.
Ad calcem, sandaracham, & auripigmentum.
Lac ex aqua malsa potum, & vomitu reiectum.
Carnium iura pingua hausta.
Althaa
Malua

decoctum, ad spissitudinem redactū potū.

Tragi herba semen potum.
Seminis lini decoctum potui datum.
Oryze decoctum potum.

M A T T H I O L L

Lac abundè potum.
Butyrum
Ius carniū pinguiū
Animalium pinguedines
Medicamenta aluum lubricantia

copiosè pota.

Seminis
Malua
Althaa
Psillij
Lini
Fenugraci

nucagines.

Antidota omnia qua ad cantharidū noxam faciunt.

V E N E N O R V M

M A T T H I O L L

Ad anacardia.

Amygdalinum oleum dulce
Oleum è pineis nucibus
Oleum è nucibus Indicis
Oleum è papaveris semine
Butyrum crudum recens
Bubulum ouillum, lac
Violaceum oleum
Hordeacea prissana.
Pinguum carniū ius
Suillus & anserinus adeps
Cerebrū tā quadrupedū, quā volatiliū
Ossium medulla

glacie refrigerata, & pota.

copiosè sūpta.

M A T T H I O L L

Ad staphidem agriam.

Amygdalarum dulcium oleum, admisto copioso hydromelite.
Medicamenta omnia qua cantharidū noxa aduersantur.
Theriaca Andromachi pota.
Mithridatis antidotum.
Antidotum nostrū, in lib. 6. prefatione descriptū.

M A T T H I O L L

Ad scyllam malam.

Lac in quo calyx candens extinctus fuerit potum.
Ouorum vitelli in aceto decocti, deuorati.
Carnium pingua iura pota.
Butyrum crudum ac recens, copiosè sumptum.
Extrema iuuenum quadrupedum membra elixa & deuorata.

M A T T H I O L L

Ad flammulam.

Bubulum lac à vomitu, & clystere, potum.
Oleum
Amygdalinum dulce
Epineis nucleus
Papaveris semine
Ex Indica nuce

potum.

Semen
Lini
Malua
Althaa
Psillij
Cydoniorum

spissamenta pota.

Pingua carniū iura hausta.
Halicacabi bacca deuorata.

M A T T H I O L L

Ad viticæ semen.

Medicamenta omnia qua scylla noxa resistunt.
Malorum cydoniorum semina consusa, & ex calida aqua pota.

M A T T H I O L L

Ad dracunculi semen.

Butyrum crudum recens haustum.
Hordeacea farina pulicula additis saccharo, pentidys, amygdalino oleo, aut recenti butyro.
Pingua carniū iura hausta.

M A T T H I O L L

Ad rhododendrum.

Fenugraci decoctum potum.
Dactyli deuorati.
Viticæ semen, aut folia, aut eorum decoctum potum.
Carica ex melle, aut iulapio sumpta.
Defrutum potum.

Pinguis

VENENORVM.

Pingua omnia deuorata.
 Diacastoreum potum duarum drachmarum pōdere.
 Iuniperi bacca pari pondere pota.

MATTHIOLI
 Ad azadatchi.

Theriaca Andromachi
 Mithridatis antidotum } ex vino pota.
 Antidotum nostrum }
 Medicamenta omnia qua nerio conueniunt.

MATTHIOLI
 Ad vomicas nūces.

Butyrum copiose deuoratum à vomitu.
 Vinum meracum copiosum additis pipere, pyrethro,
 lauri baccis, cinnamomo, & castoreo à vomitu
 epotum.

Et omnia qua opij noxam superant.

MATTHIOLI
 Ad sanguinem menstruum.

Margarita drachma pondere ex aqua melissophylli
 pota.

Balneum tepentis aquae.

Theriaca Andromachi drachma pondere ex summa
 ria aqua quotidie pota.

Viperei pastilli scrupuli pondere hausti.

MATTHIOLI
 Ad fel Leopardi.

Antidota qua napello epota, et vipereis moribus au-
 xiliantur.

Antidotus Auicenna è lemnia terra. Vide libro 8.
 comm. de taurino sanguine.

MATTHIOLI
 Ad vipereum fel.

Butyrum decoctum potum.

Theriaca Andromachi

Mithridatis antidotus

Viperei pastilli

Antidotum nostrum

Moschum.

Ambarum

Diamoschum

Diambarum

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi, & arterijs sa-
 pe inunctum.

Quinta essentia nostra, lib. 6. in praefatione descripta.

MATTHIOLI
 Ad canis piscis fel.

Butyrum bubulum cum gentiana radice, cinnamo-
 mo, & leporis coagulo potum.

Oleum odoratum quodlibet corpori uniuerso illitum.

MATTHIOLI
 Ad cati cerebrum.

Terra lemnia ex oleo pota, & vomitione reiecta se-
 mel in septimana.

Diamoschum quotidie sumptum horis quatuor ante
 cibum.

Moschum per sese semiscrupuli pondere ex vino plu-
 ries potum.

MATTHIOLI
 Ad venenum caudæ cerni.

Butyrum bubulum potum & vomitione reiectum.

Smaragdi puluis semiscrupuli pondere à vomitu ex
 vino potus.

VENENORVM.

Pistacia & pontica nuges in cibis largius deuorata.

Oleum è citri semine pressum, toti corpori illitum.

Theriaca Andromachi duarum drachmarum pon-
 dere ex vino pota.

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arterijs in-
 unctum.

Antidotum nostrum magnum, in praefatione. 6. lib.
 descriptum.

MATTHIOLI.

Ad quadrupedum quorundam sudorem.

Butyrum siue oleum potum, & vomitione reiectum.

Vinum cum rosaceo à citata vomitione potum.

Rhabbarum semidrachma pondere sumptum, ad-
 dito fossitij salis momento.

Theriaca ex terra lemnia Auicenna.

MATTHIOLI.

Ad castoreum malum.

Butyrum bubulum. } pota, & vomitione reiecta.

Aqua mulsa

Diamoron

Limonum succus } à vomitu cum saccharo potus.

Citri mali succus

Coriandri semen tostū duarum drac. pondere haustū.

DIOSCORIDIS

Ad plumbi scobem.

Antidota omnia qua ad argenti spumam faciunt.

MATTHIOLI.

Ad ferri scobem, & scoriam.

Lac recenter mulsum potum.

Medicamenta valenter aluum soluentia ab epoto la-
 cte sumpta.

Butyrum tam diu potum quousque intestinorum do-
 lores cedant.

MATTHIOLI.

Ad lapidem magnerem.

Auri scobes in tenuissimum puluerem trita & pota.

Smaragdi puluis potus nouem diebus.

Lac, & amygdalinum oleum clystere infusum.

MATTHIOLI.

Ad aris squamam.

Mulsa pota, & vomitione reiecta.

Balneum ex hircorum capitum, & cochlearum inter
 paratum.

Mentha succus potus datus.

Rosaceum calidum ventriculo inunctum.

Acori radices trium drachmarum pondere pota.

Lemnia terra drachma pondere ex vino albo hausta.

Corallium rubrum drachmarum duarum pondere
 ex vino ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad zruiginem.

Medicamenta, & antidota omnia qua ad aris squa-
 mam conferunt.

MATTHIOLI.

Ad risagallum.

Medicamenta, & antidota omnia qua argenti viui
 sublimati, arsenici, & aruginis noxa aduersatur.

Amygdalinum oleum toti corpori illitum.

Violaceum iulapium ex ptissana hordeacea potum.

Oleum è pineis nucleis et Indica nuce pressum, selibra
 pondere potum.

Antidota omnia qua cantbaridibus conueniunt.

MAT

VENENORVM

MATTHIOLI

Ad elleborum albam:

Mulsa cum butyro pota, & vomitione reiecta.

Nymphaea flores duarum drachmarum pondere poti.

Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad elleborum nigrum.

Absinthium in vino potum.

Anisi semen bibitum.

Nardus Indica una cum castoreo pota.

Caseus recens

Mel

Butyrum

Pingua

Passum

Lemnia terra ebibita.

Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI

Ad euphorbium.

Butyrum potum.

Oleum amygdalinum.

Pingua omnia.

Aqua

Solani hortensis

Violarum

Nymphaeae

Semina

Maluae

Albae

Psyllij

Cydoniorum malorum

Lini

Lac acidum.

Caphura ex aqua rosacea bibita.

Panicorum malorum vinum

Anguria Cucumis

Cucurbita.

Malorum acidorum succus

Ptissana hordeacea.

Citri semen ex vino helenij potum

MATTHIOLI

Ad turpetum & iuliyalos.

Antidota omnia qua ad euphorbium faciunt.

Theriaca Andromachi ex vino pota, in quo Cretense dictamnum incoctum fuerit.

Mumia sepulchrorum drach. pondere ex merato hausta.

MATTHIOLI

Ad scamonium.

Lac à quo demptum fuerit butyrum potum.

Catoncorum malorum succus bibitus.

VENENORVM

Rhois succus potus.

Ribis vulgaris, vinum haustum.

MATTHIOLI

Ad colocyntidem.

Antidota omnia ad euphorbium facientia.

Babulam lac, & butyrum recens potum.

Lemnia terra frequenter pota.

Smaragdi puluis pluries haustus.

Theriaca Andromachi deuorata.

MATTHIOLI

Ad cyclaminum.

Lauri bacca duarum drachmarum pondere pota.

Gentiana hausta.

Nigrum piper in potu sumptum.

Theriaca.

Lemnia terra.

MATTHIOLI

Ad thymelaeam & chameleam.

Antidota omnia qua ad euphorbium faciunt.

Theriaca Andromachi.

Lemnia terra.

Rosaceum serapium ex hordei ptissana potum.

Origanum tostum potum.

MATTHIOLI

Ad byoniam.

Antidota omnia qua ad euphorbium conueniunt.

Theriaca ex vino hausta in quo helenium incoctum fuerit.

MATTHIOLI

Ad elaterium.

Theriaca Andromachi ex baccarum lauri decocto, aut melle drachmarum duarum pondere pota.

Mentha succus ebibitus.

MATTHIOLI

Ad aquam frigidam.

Piper potum.

Creticum vinum potum.

Antidotum nostrum.

Quinta essentia nostra.

MATTHIOLI

Ad vini lationes.

Vomitus excitatio.

Brassica succus potus.

Acetum testiculis adhibitum.

MATTHIOLI

Ad carnes & pisces refrigeratos.

Es qua ad maleficos fungos valent.

Vini optimi & odorati potus admisto cydoniorum succo.

Lemnia terra cum agallocho, & mastiche hausta.

**SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM
FACVLTATES, QVAE CORPORI DECOREM
praestant, ex Dioscoride.**

DECORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad alopectam.

MYRRHA cum ladano, & vino myrteo
illita.
Harundinum corticum cinis ex aceto
inunctus.
Ladanum cum vino, myrrha, & myr-
teo oleo admotum.

Myrti baccarum succus illitus.
Nucum iuglandium putamen combustum, tritum
& impositum.
Nucum auellandarum crematarum cinis ex urfino a-
dipe perunctus.
Erinacei terrestris corij cinis ex liquida pice illitus.
Leporinum caput crematum ex urfino adipe.
Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.
Murium stercus combustum ex aceto.

Ursinus adeps illitus.
Caprarum simus ex aceto.
Raphanus tritius ex loliacea farina admotus.

Brassica cum sale confricata.
Beta recensia folia cruda illita,
Asphodeli radicum cinis impositus.

Capa confricata.
Allij cinis ex melle illitus.

Sinapi illitum.
Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.
Ranunculi folia, & radices illita paruo tempore
spatio.

Aloe ex vino.
Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino oleo.

Laserpitij liquor cum pipere ex aceto.
Nymphae radix ex pice.

Cynoglossa folia ex vetere suillo adipe.

Adiantum illitum cum susino, aut myrtino oleo, aut
hyssopo aut vino.

Thapsie succus inunctus.

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tertium exustum inunctum.

Cotesmaxia illita.

Hippotampi cremati cinis ex liquida pice, aut acun-
gia, aut amaracino unguento.

Caprinarum unguularum cinis ex aceto inunctus.

MATTHIOLI

Conorum cupressi, & mularum unguium cinis oleo
myrtino exceptus illitus.

Ulni radicum decoctarum mucago illita.

Persici nuclei contusi.

Abrotoni cinis cum oleo raphanino, aut sicyonio
illitus.

DECORIS.

Lilij radix ex adipe, & oleo.

Oleum e colocynthide illitum.

MATTHIOLI

Ad capillorum defluuium.

Conorum cupressi, & mularum unguium cinis, ex
myrtino oleo illitus.

Ulmorum radicum mucago illita.

Humor defluens e medulla dissecta tiliae.

Ladanum inunctum.

Sylvestris oliuae oleum.

Rhois foliorum decoctum ex lixiuio paratum.

Viperina senecta cinis inspersus.

Murinum stercus ex aceto illitum.

Capa affricata.

Abrotoni cinis cum oleo veteri, aut lentiscino illitum.

Oleum e colocynthide illitum.

Myrti baccarum vinum illitum.

Myrobalana omnia, & praesertim flava, quouis modo
vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra marina in-
unctum.

Lepus marinus per se, & cum marina urtica tritius,
& appositus.

Salamandra cinis ex oleo.

Hedera lachryma illita.

Dryopteris radix trita, & post sudorem inuncta.

Aqua e viridibus vitium sarmensis igne incensis
emanans, admota.

Auripigmentum illitum.

Cyperus babilonicus illitus.

MATTHIOLI

Ad pilos recitandos.

Oleum hyoscyaminum.

Cicutae succus illitus.

Hyoscyami succus inunctus.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & decoctum corticis in lotionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia inunctum.

Humana vrina inueterata admota.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Fahum gratum in lotionibus.

Malua ex vrina humana.

Beta decoctum admotum.

Allij cinis ex melle.

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilij cremati radix ex melle.

DECORIS.

Alumen cum eruo ex pise.

MATTHIOLI.

Euonymi bacca in lixivio decocta.

Sylvestris oliua oleum.

Pomata illita.

Oleum amygdalarum amararum.

Lupini farina confriata.

DIOSCORIDIS.

Ad rufandos capillos.

Ligustri folia trita, & in radícula succo macerata & illita.

Lycium illitum.

Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.

Vini fax cremata, ex lentiscino oleo tota nocte illita.

DIOSCORIDIS.

Ad crispandos capillos.

Asphodeli radices de raso capiti affricata.

Castanearum echinorum cinis de raso capiti ex melle illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad denigrandos capillos.

Cupressi folia trita ex aceto.

Rhois decoctum admotum.

Mori folia trita ex aceto.

Galla aceto, aut aqua macerata illita.

Palma corticis decoctum admotum, & subinde deterfum.

Myrti foliorum decoctum in lotionibus.

Acacia succus illitus.

Ilignea radicis cortex ex aqua coctus, donec mollitus contabescat, tota nocte illitus.

Hedera corymbi illiti.

Salvia decoctum sapinus in persum.

Rubi folia admota.

Sory illitum.

MATTHIOLI.

Eruiua siliqua priusquam indurescant cū sale suisq; folijs contrita, & illita.

Oleum e colocynthidis fructu illitum.

Ophris in capitis perfusionibus addita.

DIOSCORIDIS.

Ad pediculos, & lendes necandos.

Tedria illita.

Myrica decoctum perfusum.

Mel inunctum capiti.

Beta decoctum perfusum.

Allium cum origani decocto potum.

Hedera lachryma illita.

Staphys agria admota.

Sandaracha ex oleo inuncta.

Alumen ex aqua.

MATTHIOLI.

Euonymi bacca in lixivio decocta.

Hedera gummi illitum.

Hyssopum cum oleo inunctum.

Albi veratri radix in lixivio decocta.

Argentum viuum extinctū, & cum butyro inunctū.

Piper in puluerem tritum, & ex salina illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad prohibendam folis adustionem.

Albumen oui inunctum.

Cyclamini succus inunctus.

DECORIS.

MATTHIOLI.

Melopeponis pulpa illita.

Anguria.

Seminis malua, alibea, psyllij, & cydoniorum malorum mucago illita ex recenti butyro.

Vlmi folliculorum liquor inunctus.

Vua prematura succus illitus.

MATTHIOLI.

Ad remorandam canitiem.

Sylvestris oliua oleum inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad faciei nitorem.

Vlmi liquor in folliculis contentus illitus.

Mastiche illita.

Lupinorum farina illita.

Raparum sylvestrium semen admotum.

Peponis succus cum eius semine, & farina in sale siccatus & inunctus.

Polygonatum illitum.

Glans unguentaria ex urina illita.

Ricini semen impositum.

Vitis sylvestris acini illiti.

Argenti spuma elota, inuncta.

Alcyonium primum, & secundum admotum.

Chia terra imposita.

Crocodili terrestres finus illitus.

MATTHIOLI.

Caphura circumlitionibus addita.

Eadem cum chrysocolle trita ex melle.

Elimaniorum succo stillatitia aqua.

Cochlearum terrestrium stillatitia aqua.

Fabacea farina.

Aqua stillatitia ex phasiolis, & quibusdam alijs, vide in phasiolorum commentario lib. 2. cap. 101.

Lupini decoctum perfusum.

Aqua stillatitia ex melopeponibus & alijs multis: vide lib. 2. cap. 128. in comment.

Ari radicum stillatitia aqua, vel earum succus insolatus, & cum eiusdem ari stillatitia aqua illitus.

Primula veris florum succus illitus.

Verbasci florum, & polygonati radicum dilatum per alembicum destillatum.

DIOSCORIDIS.

Ad colorem conciliandum.

Cicer in cibus sumptum.

Agaricum drachma pondere potum.

Hyssopum in aducatum, bibitum vè.

Chia terra illita.

Cerasi gummi illitum.

Carica in cibus sumpta.

MATTHIOLI.

Ad pustulas sanguineas.

Caphura unca pondere cum pari sulphuris portione trita, additis myrrha, thurisq; cuiusque quaternis drachmis, & aqua rosarum libra in vitreo vase per dies decem insolata & deinde illita.

Fraxini stillatitia aqua.

Tamarindorum pulpa deuorata frequenter.

Vinum e fragis illitum.

Verbasci florum stillatitia aqua, addito caphura momento.

DECORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad faciem derugandam.

*Cacalia grana post excussum florem prodeuntia, trita,
& cum cerato illita.**Bryonia radix cum eruo, creta Chia, & feno graco
illita.**Chia terra admota.*

MATTHIOLI.

*Myrrha oleum frequenter illitum.**Myrrha suffita ex candenti patella.**Conorum pineorum recentium stillatitia aqua faciei
admota.**Ari radicem stillatitia aqua illita, vel insolatus ex
radicibus succus.**Primula veris florum succus illitus.**Verbasci florum & polygonati radicem stillatitia aqua,
addito limonio succo.*

DIOSCORIDIS.

Ad cutis vitia in facie.

*Sabina decoctum perfusum.**Conchula Indica cinis admotus.**Glans unguentaria trita ex urina.**Cancrorum fluxuatiolum cinis illitus.**Narcissi radix cum semine urtica ex aceto.**Ricini semen admotum.**Vitis sylvestris acini illiti.**Cinnamomum ex melle.**Costi radix cum aqua, vel melle illita.**Bryonia radix per se, et cum eruo, creta Chia, & feno
graco admota.**Alcyonium primum, & secundum impositum.*

MATTHIOLI.

*Resina laricea aut terebinthina stillatitia aqua, addi-
to oleo è vini fece parato.**Pomata illita.**Aqua è succo limoniorum parata vitreo alembico.**Oleum ex ouorum vitellis.**Oleum è tritico.**Avena farina in aceto decocta.**Fabacea farina.**Lupini decoctum affusum.**Rapi sylvestris semen illitum.**Lapathi acuti aqua stillatitia, & quorundam aliorum:
vide lib. 2. cap. 108. in comment.**Eruca semen cum melle inunctum.**Sinapi aqua subactum, & cuti affricatum.**Dracunculi radix contusa & illita.**Boni Henrici succus cum aceto illitus.**Ari radice stillatitia aqua, vel insolatus earum succus
illitus.**Gentiana stillatitia aqua illita.**Pseudomelanthij semen in farina tritum & melle illi-
tum.**Scabiosa succus cum chrysocolle farina, & caphura
momento illitus.**Vinum quod è fragis elicitur.**Primula veris florum succus illitus.**Verbasci florum stillatitia aqua.**Lupuli florum, & folliculorum decoctum potum.*

DIOSCORIDIS.

Ad ianthos, & viros.

Myrrha illita cum melle, & cassia odorata.

DECORIS.

*Porri folia cum Rhoë obsoniorum admota.**Capa succus cum sale appositus.**Bulbi per se, & ex oui vitello.**Pulegium ex cera.**Sory ex aqua.**Alcyonium primum, & secundum admotum.*

MATTHIOLI.

*Aqua è succo limoniorum vitreo alembico parata.**Aqua è lapathi acuti radicibus, & alijs nonnullis pa-
rata: vide lib. 2. cap. 108. in comment.**Centaurij minoris decoctum adhibitum.**Scabiosa succus cum chrysocolle farina, & caphura
momento illitus.*

DIOSCORIDIS.

Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

*Iridis Illyrica radix cum elleboro admota.**Cinnamomum ex melle.**Costi radix cum aqua, vel melle illita.**Amygdala amara radicem tritarum decoctum ad-
motum.**Fici lac inunctum.**Cochlearum tum caro, tum testa simul cremata ex melle.**Leporinus sanguis inunctus.**Sepia cremata cinis admotus.**Lini semen illitum.**Orobi farina imposita.**Sisymbrium inunctum.**Bulbi cremati cum alcyonio impositi.**Hedera decocta folia ex vino.**Chamaeleonis nigri radix.**Alyssum concisum ex melle.**Melia terra inuncta.**Cyclamini succus illitus.*

MATTHIOLI.

*Thus cum lacte illitum.**Melopeponum } pulpa illita.**Anguria**Vua immatura succus ex lacte humano illitus.*

DIOSCORIDIS.

Ad lentigines delendas.

*Iridis Illyrica radix cum albo veratro admota.**Casia ex melle illita.**Costus ex aqua, & melle.**Sanguis leporinus calens inunctus.**Tritici farina ex aceto mulsa.**Raphanus cum loliacea farina admotus.**Brassica semen inspersum.**Sisymbrium tritum, & impositum.**Allij cinis ex melle.**Dracunculi maioris radix ex melle.**Bulbi ex melle, & aceto.**Nigella confricata.**Galbanum cum nitro ex aceto.**Alyssum concisum ex melle.**Narcissi radix cum urtica semine ex aceto.**Ricini semen illitum.**Vitis sylvestris acini liniti.**Bryonia radix cum eruo, feno graco, & creta Chia.**Adarces imposita.*

MATTHIOLI.

*Laricea resina stillatitia aqua, addito oleo ex vini fece
parato.*

DECORIS.

Nux myristica illita.
 Mustela fel ex melle, & ari farina illitum.
 Oleum ex ouorum vitellis.
 Rapi sylvestris semen.
 Hordei farina, ex aceto, & melle subacta.
 Avena farina in aceto decocta, & illita.
 Fœnogræci farina, cum sulphure, & nitro apposita.
 Fabacea farina.
 Lupinorum decoctum affusum.
 Sij succus illitus.
 Aqua stillatitia è lapathi acuti radicibus & aliorum nonnullis: vide lib. 2. cap. 108. in commentario.
 Melopeponum pulpa affricata.
 Draconculi radix illita.
 Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta.
 Gentiana stillatitia aqua illita.
 Centaurij minoris succus, aut decoctum.
 Mentha græca succus illitus.
 Pseudomelanthij seminis farina ex melle illita.
 Securidæa utriusq; seminis farina ex melle.
 Scabiosa succus cum chrysocolla farina, & caphura momento.
 Xyridis succus illitus.
 Verbasci florum stillatitia aqua.
 Lupul. florum decoctum potum.
 Scrophalæc perfusum & plena manu illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad paruos.

Alcyonium illitum.

MATTHIOLI

Avena farina in aceto decocta, & illita.
 Lupinorum decoctum affusum.
 Centaurij minoris decoctum.
 Argenti spuma ex aceto decocta & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad totius corporis nitorem.

Mastiche inspersa.
 Ulmi liquor in folliculis conclusus illitus.
 Butyrum inunctum.
 Crocodili terrestris simum illitum.
 Peponis succus cum eius semine, & farina in sole siccatus ex aqua.
 Bryonia radix inuncta.
 Cyclamini succus inunctus.
 MATTHIOLI
 Caphura illita.
 Fabacea farina.
 Aqua è vulnérato Betule candice distillans illita.
 Aqua è limoniorum succo parata vitro alembico.
 Fabarum stillatitia aqua: vide libro 2. cap. 101. in comm.
 Sinapi aqua subactum, & cuti affricatum.
 Ari radecū stillatitia aqua, vel insolatus earū succus.
 Gentiana aqua stillatitia.
 Verbasci florum stillatitia aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad cicatrices delendas.

Asininus adipis inunctus.
 Fabarum farina cataplasmatibus in dita.
 Ranunculi folia, & radices illite.
 Calamintha ex vino decocta admota.
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.

DECORIS.

Glans unguentaria cocta in aceto cum nitro adhibita.
 Bryonia radix cum eruo, creta Chia, & fœnogræco admota.
 Chrysocolla illita.
 Alcyonium primum, & secundum inunctum.
 MATTHIOLI
 Eruca semen tritum cum felle bubulo illitum.
 Ceruina medulla.
 Opobalsamum.
 Oleum Myrrha.
 Ovi recentis dum assatur sudor.
 Caphura cum chrysocolla trita & medulla bubula illita.

DIOSCORIDIS.

Ad vitiligines.

Cochlearum terrestrium testa cremata, & illita.
 Leporinus sanguis inunctus.
 Sepia cremata cinis admotus.
 Fabarum farina inspersa.
 Lupinorum farina imposita.
 Beta cruda folia illita. (aqua.
 Chondrilla radix, & folia ex melle, & nitro trita ex
 Draconculi maioris radix ex melle.
 Asphodeli radice succus inunctus, confricata prius
 sub sole rate.
 Capa succus in sole inunctus.
 Ally cinis ex melle.
 Piper cum nitro impositum.
 Capparidis radix trita ex aceto.
 Argemone siccata, insaq; cum nitro, & vino sulphure
 admota.
 Telephij folia cum hordeacea farina ex hydrelas sex
 horis admota.
 Gentiana radice succus inunctus.
 Chamæleonis nigri radix cum sulphure illita.
 Ruta cum vino, pipere, nitroque confricata.
 Libanotidis semen ex acerrimo aceto.
 Lily cremata radix ex melle.
 Nymphae radix ex aqua.
 Rubia radix ex aceto.
 Althea semen tum recens, tum siccum tritum ex aceto,
 in sole inunctum.
 Anchuse radix ex aceto.
 Narcissi radix cum urtica semine ex aceto.
 Bryonia cum eruo, creta Chia, & fœnogræco illita.
 Glans unguentaria in aceto decocta cū nitro imposita.
 Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.
 Ricini semen illitum.
 Veratrum nigrum ex aceto.
 Sulphur quoquo modo admotum.
 Alcyonium primum, & secundum inunctum.
 MATTHIOLI
 Conorum cupressi decoctum affusum.
 Tamarindorum pulpa in potionibus addita.
 Aqua è limoniorum succo parata vitro alembico.
 Oleum ex ouorum vitellis.
 Lupinorum decoctum.
 Rapi sylvestris semen.
 Aqua è lapathi acuti radicibus & alijs nonnullis: vi
 de lib. 2. cap. 108. in comment.
 Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta
 illita.
 Mentha

DECORIS.

Mentha Græca adhibita.
Chamaeleonis nigri radix cum aceto trita & illita.
Securidaca utriusque seminis farina melle excepta.
Scabiosa succus addito chryfocolle, & caphura momento.
Xyridis succus illitus.
Verbasci florum stillatitia aqua.
Lupuli florum decoctum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad lychenas, & impetigines.

Pini, & *piceæ* cortex illitus.
Lentisci foliorum decoctum fotu adhibitum.
Cupressi folia cum polenta illita.
Rhamni folia admota.
Lignorum marcor inspersus.
Nasturtij semen admotum.
Rhaponticum ex aceto illitum.
Veratrum nigrum ex aceto illitum.
Glans unguentaria cum lotio imposita.
Vitis vinifera gummi cum nitro illitum, loco tamen prius perfricato.
Sulphur ex terebinthina resina.
Sal ex oleo, & aceto perfrictum.
Alcyonium primum, & secundum impositum.
Adarces illita.
Pix liquida inuncta.
Thus inspersum.
Aethyopica olea lachryma inuncta.
Pruni arboris gummi illitum.
Ficulaenæ lac cum polenta illitum.
Mel cum alumine decoctum illitum.
Propolis inuncta.
Triticæ recens panis ex muria.
Loliaceæ farina cum sulphure ex vino.
Cicer cum hordeo ex melle.
Lapathi cuiusq; radices in aceto decoctæ, loco prius scarificato, & nitro confricato, apposita.
Nasturtium ex melle impositum.
Allij cinis ex melle illitus.
Sinapi ex aceto linitum.
Chamaeleonis nigri radix ex aceto coctæ, & inuncta.
Ruta cum alumine ex melle.
Laserpitij liquor ex aceto.
Glutinum in aceto solutum inunctum.
Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.
Tithymali characia lac illitum.
Bryonia radix cum Eruo, creta Chia, & fenograceo illita.

Aqua maris fotu adhibita.

MATTHIOLI.

Pix cum melle, illita.
Tamarindorum pulpa frequenter deuorata.
Oleum ex onorum vitellis inunctum.
Rapi sylvestris semen.
Salua humana affricta à ieiunis.
Aqua è lapathi radicibus & alijs nonnullis: vide lib. 2. cap. 108. in comment.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.
Asphodeli radix ex aceto decoctæ, & imposita.
Gentiana stillatitia aqua fotu usurpata.
Mentha illita.

Mentha Græca succus impositus.

DECORIS.

Marrubij folia ex aceto.
Securidaca utriusq; seminis farina ex melle illita.
Scabiosa maioris radices decoctæ, & pota quadraginta diebus, & earundem radicum puluis, quotidie drachma pondere ex sero haustus.
Xyridis succus illitus.
Lupulorum decoctum potum.
Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, & exiguo sale.
Serum lactis potum.
Acetum applicatum.
Butyrum illitum.
Vrina humana inueterata adhibita.
Lupinorum farina admota.
Cyclamini succus adhibitus.
Pulegij decoctum corpori perfrictum.
Ruta cum cera & myrteo oleo cataplasmati indita.
Staphis agria illita.
Glans unguentaria cum lotio linita.
Rubigo ferri illita.
Alumen cum melle adhibitum.
Cinnabaris, id est sanguis draconis adhibitus.
Fornacæ testa tosta admota.

DIOSCORIDIS.

Ad alphas & cutis maculas.

Thapsia succus cum melle illitus.
Glans unguentaria cum lotio linita.
Narcissi radix cum semine urtica ex aceto.
Lotus sylvestris cum melle perunctus.
Cucumeris sylvestris pulverizata radix imposita.
Ricini semen illitum.
Vitis sylvestris acini liniti.
Bryonia cum eruo, creta Chia, & fenograceo illita.

MATTHIOLI.

Lupinorum decoctum fotu adhibitum.
Rapi sylvestris semen.
Aqua è lapathi, & aliorum nonnullorum radicibus, vide lib. 2. cap. 108. in comment.
Melopeponum pulpa affricta.
Capa cruda affricta.
Ari radix elixa, et cū farina fabacea defruto subacta.
Boni Henrici succus ex aceto illitus.
Centaurij minoris decoctum fotu adhibitum.
Verbasci florum stillatitia aqua illita.
Lupuli florum decoctum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad pforam.

Staphis agria trita ex oleo illita.
Bryonia semen inunctum.
Aqua marina fotu adhibita.
Glans unguentaria in aceto coctæ.
Sal illitum.

MATTHIOLI.

Lupinorum decoctum affusum.
Rapi sylvestris semen illitum.
Florum, & folliculorum lupuli decoctum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.

DECORII.

Olea virentis, & accense sudor manans illitus.
 Ficulneum lac illitum.
 Erinacei marini testa cruda, tostata ve cum alijs mista
 & illita.
 Hippocampi marina cremati cinis liquida pice, aut
 axungia, aut amaracino unguento coactus, & ca-
 piti inunctus.
 Urina humana inueterata.
 Serum lactis potum
 Cicer cum hordeo & melle.
 Lupinorum farina.
 Argemone siccat a, tusaque cum nitro in balneo con-
 fricata.
 Hirundinaria minor confricata.
 Chamaleonis nigri radix addito exiguo atramento
 sutorio, cedri noq, liquore, & axungia pauco lini-
 ta: quin etiam sulphure, & alamine mistis.
 Glans unguentaria cum lotio linita.
 Origani decoctum corpori perfusum.
 Quinquefolij radix decocta, linitaq.
 Potamogeton valet pruritusi imposita.
 Lotus sylvestris cum melle peruncta.
 Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino
 oleo.
 Stimmi cum cera, & exigua cerussa.
 Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum.

MATTHIOLI.

Terebinthina resina illita.
 Iuniperi cineris luxiuum e vino paratum.
 Oliua sylvestris oleum.
 Aqua in marcescentiu quercuu cavitatibus reperta.
 Tamarindorum pulpa frequenter deuorata.
 Poma Adami per medium secta, sulphuris puluere
 aspersa, subq, calenti cinere calefacta, & scabiosis
 membris affricata.
 Nucem iuglandium oleum vetus.
 Fenograci farina, cu nasturtij semine aceto excepta.
 Aphodeli radices ex aceto elixa, & illita.
 Sena decoctum, vel dilutum potum.
 Scabiosa decoctu, & eius succus in unguentis additus.
 Xyridis succus illitus.
 Eupatorii vulgaris, & fumaris e caprino sero deco-
 ctum potum.
 Eupatorii eiusdem succus cum aceto & sale.
 Borriginis vulgarisq, buglosi decoctum ex vino, aut
 aqua paratum haustum.
 Buglosi vulgaris radix trita & ex aceto illita.
 Lupulorum florum, & folliculorum decoctum potu.
 Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad leptam Græcorum.

Felt aurinum cum nitro, & cinolia terra.
 Urina humana addito nitro fota.
 Iuniperi cortex crematus ex aqua illitus.
 Fraxini cortex crematus ex aqua.
 Vlmi folia concisa ex aceto.
 Aethiopica olea lachryma illita.
 Resina { Terebinthina } cum arugine, chalcantuo,
 { Larigna } & nitro illita.
 { Abiegna }
 Ficulneum lac cum polenta.
 Tritici fursures ex acerrimo aceto elixi.

DEORIS.

Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydrela.
 Lolij farina cum sulphure ex vino & aceto.
 Lapatii cuiusq, radices, loco prius scarificato, et nitro
 confricato admota.
 Brassica concisa cum polenta adhibita.
 Veratrum nigrum ex aceto.
 Ally cinis ex melle.
 Sinapi ex aceto.
 Bryonia semen illitum.
 Nasturtium ex melle.
 Anchusa radix ex aceto.
 Ranunculi folia & radices apposita.
 Melanthij semen admotum.
 Cucumeris agrestis radix in puluerem aspersa.
 Glans unguentaria cocta in aceto, cum nitro.
 Thapsia succus inunctus.
 Scammonia in aceto decocta illita.
 Vitis vinifera gummi admotum, loco tamen prius
 nitro perfricto.
 Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.
 Alumen cum brassica, & melle coctum.
 Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.
 Sal ex oleo, & aceto seruesactum.
 Alcyonium primum, & secundum illitum.
 Adarces imposita.
 Melia terra illita.

MATTHIOLI.

Tamarindorum pulpa frequenter deuorata.
 Chamaleonis nigri radix ex aceto trita, & illita.
 Ellebori nigri dilutum bibitum.
 Sena foliorum dilutum potum.
 Polypody radicum decoctum haustum.
 Fumaria succus ex sero caprino diutius potus.
 Viperi pastilli, ex melissophylli succo poti.
 Myrobalanorum nigrorum, chebulorumq, decoctum
 pluribus diebus haustum.

MATTHIOLI.

Ad morbum gallicum.

Myrica radicum decoctum potum.
 Guaiacum lignum, & eius decoctum.
 Guaiaci vinum: quare lib. i. comment. de ebena.
 Radicis { China } decoctum potum.
 { Zarze parilla }
 Buxi ligni decoctum.
 Pruni sylvestris rad. decoctum & nonnulloru alioru
 ad eos qui oris exulceratione laborant: vide lib. i.
 comment. de pruno.
 Asarina decoctum potum.
 Eryngy nouellorum foliorum stillatitia aqua pota.
 Dictamni albi radices quotidie drachma pondere ex
 Guaiaci decocto pota.
 Aspleni decoctum bibitum.

MATTHIOLI.

Ad obesos extenuandos.

Cantamum potum.
 Fraxini semen.
 Acetum frequenter potum.
 DIOSCORIDIS.
 Ad prurium.
 Ficulneum lac admotum cum polenta.
 Sulphur ex nitro.
 Sal ex oleo, & aceto perfrictum.

Alumen

DECORIS.

Alumen cum aqua aspersum.

MATTHIOLI

*Beta nigra in aqua decocta & illita.**Boni Henrici succus ex aceto illitus.**Sena decoctum, vel dilutum potum.**Eupatorij vulgaris, & fumarie decoctum potum.**Lupuli florum & folliculorum decoctum potum.**Serum lactis haustum.*

DIOSCORIDI.

Ad elephantium.

*Erinacei terrestris exiccatum corpus in cibis sumptum.**Cedria inuncta.**Cochlearum terrestrium cinis illitus.**Salamandra alijs frequentibus medicamentis admixta.*Fet *Capra sylvestris* } inunctum.*Hircinum**Calamintha in cibis sero lactis superposito.*

MATTHIOLI

*Myrica radicum decoctum, & cum passu unis epotum.**Viperina caro deuorata.**Viperei pastilli insumpti.**Veronica mas.**Eupatorij vulgaris, & fumarie succus simul potus.**Ellebori nigri dilutum ebibitum.*

DIOSCORIDI.

Ad alarum tedia.

*Myrrha cum liquido alumine illita.**Myrti foliorum arenium farina inspersa.**Cardui radix cataplasmatibus more adhibita.**Alumen linitum.*

MATTHIOLI.

*Asphodeli radices cum hyoscyamo seruesacta, pice liquida excepta, & illita.**Alumen ex vino affricatum.**Absynthium recens appositum.*

DIOSCORIDI.

Ad clauos, callos, & verrucas.

*Salicis corticis cinis admisto aceto maceratus, & illitus.**Smaridis piscis saliti crematum caput.**Lacerta concisum caput.**Ouillum finum ex aceto.**Mel cum alumine decoctum.**Cicerum grana tot accipe, quot sunt porri, & singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, & post tergum projice, & hoc non fiat nisi noua luna.**Heliotropij semen linitum.**Scilla cremata peruncta.**Ranunculi folia, & radices.**Dipsaci radix in vino decocta, trita, & imposita.**Nigella ex vetere vrina imposita, loco prius scarificato.**Laserpitij liquor cera pramollitus impositus scarificatione prius facta.**Clinopodium diebus aliquot potum.**Chamaesyces rami triti, & impositi.**Vitis sarmentorum viridium incensorum emanans aqua illita.**Aerugo imposita.*

MATTHIOLI

Salicis corticis cinis, aceto maceratus, & impositus.

DECORIS.

*Cichorium verrucarium in acetario deuoratum.**Eiusdem semen tribus diebus drachma pondere insumptum, ante nocturnum decubitum.**Ranunculus tritus, & impositus.**Chelidonij maioris succus illitus.**Verbasci succus tam florum, quam foliorum illitus.**Cantharides trita, & ex fermento illita.*

DIOSCORIDI.

Ad atrochordonas, thymos, & myrmecias.

*Mali punici vinum adhibitum.**Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.**Thus ex aceto, & pice illitum.**Ruta cum pipere, vino, & nitro affricata.**Cicer cum hordeo, & melle.**Ranunculi folia, & radices.**Dipsaci radix trita in vino decocta.**Tithymali characia succus, & lac illitum.**Chamaesyces rami triti, & impositi.**Holiotropij semen linitum: quin & heliotropium minus.**Vitium viniferarum sarmentorum viridium incensorum emanans aqua illita.**Salcum seuo vitulino illitum.*

MATTHIOLI.

*Salicis corticis cinis ex aceto impositus.**Cichorium verrucarium in acetario deuoratum.**Eiusdem semen drachma pondere potum ante nocturnum decubitum.**Ranunculus tritus & impositus.*

DIOSCORIDI.

Ad labiorum rimas.

Adeps *Anserinus* } illitus.*Gallinaceus**Lycium admotum.*

MATTHIOLI.

*Terebintina larignaq, resina.**Fagi folia.**Oleum ex ouorum vitellis.**Pomata illita.**Oleum è tritico.*

DIOSCORIDI.

Ad sudorem ciendum.

*Ferula semen ex oleo impositum.**Onobrychis ex oleo inuncta.**Mel heraclium quodam anni tempore deuoratum.**Fici matura comesa.**Sinapi in cibum sumptum.*

MATTHIOLI

*Succinum album ex vino potum.**Aurantiorum & limonum florum stillatitia aqua pota.**Quinta essentia nostra, in comment. de vino descripta unci pondere hausta.*

DIOSCORIDI.

Ad sudorem compescendum.

*Bulbi comesti.**Sulphur confricatum.**Gypsum.**Morochthus lapis* } admota.*Samia terra*

DECORIS.
MATHIOLI

Sylvestrium oliuarum oleum illucum toti corpori.

Myrteum oleum.

Cyperum radicem.

Nardi Indica

Rosarum sylvestrium

puluis affricus toti corpori.

DIOSCORIDIS.

DECORIS.

Ad extirpandam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

MATHIOLI.

Rapi sylvestris semen.

Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta.

Gentiana stillatitia aqua.

SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM

VIRE S, QVIBVS EXVBERANTES

IN CORPORE HVMORES, VOMITV,

& alui deiectione excernuntur,

ex Dioscoride.

EXPELLENTIVM MEDICAMENTORVM

DIOSCORIDI.

Ad bilem educendam.



IRIS Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite pota.

Thlaspi semen potum.

Alse hausta.

Absynthium potui datum.

Fragorigani decoctum bibitum.

Lychnidis sylvestris semen drachmarum duarum pondere potum.

Androsami semen duarum drachmarum pondere haustum.

Veratrum nigrum per se datum, aut ex scammonia cum salis drachma.

Cynocomi radix duarum drachmarum pondere ex aqua mulsata.

Centaurium minus decoctum deuoratum.

Parthenium siccatum cum aceto mulsato, aut sale.

Thapsia succus in aqua mulsata potus.

Clematidis alterius semen tritum potum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex sesquiboli pondere bibitus.

Hippophae succus oboli pondere potus.

Ricini triginta grana purgata trita hausta.

Tichymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.

Mercurialis ius potum.

Lathyris graua sex aut septem, cum ficis, aut palmulis in catapotio deuorata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammony succus drachma unus, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua mulsata vel pura.

Chameleae folia in catapotio deuorata, cum duabus absynthij partibus adiecta chameleae, unacum hydromelite.

Thymelae viginti granorum pars interna bibita.

Folia { Sambucus } olerum more cocta.

Apias, scilicet in se tota radicis pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite potum.

Filicula arida farina aqua mulsata inspersa bibita.

Cynocrambe decoctum haustum.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma una, vel altera, cum mulsata bibita.

Puzosa radix drachmarum duarum pondere cum mulsata hausta, seminis vero drachma, & succi chameleae farina subacta cochlearium in catapotio.

MATHIOLI.

Asarum & asarina.

Cassia solutiva pulpa.

Manna ex sena diluta pota.

Spina insectoria bacca, & syrupus ex earum succo paratus.

Tamarindorum pulpa.

Pinna.

Sebestena.

Zyzypha.

Nasturij semen denariorum decem pondere ex aqua potum.

Thlaspi semen acetabuli mensura haustum.

Rhabarbarum

Sena.

Gratiola

Myriobalani flans

Frangula

DIOSCORIDIS.

Ad pituitam eiecendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite.

Mandragora succus duorum obolorum pondere potus.

Veratrum nigrum per se datum, vel cum scammonia cum salis drachma.

Lyci Indici semen cyathi dimidij mensura potum.

Ulni crassior cortex in vino, aut aqua frigida unciatum potus.

Callinaceorum senescetium ius Dioscoridis modo paratum haustum.

Cyclamini

EXPULSIVUM

Cyclamini radix ex hydromelite pota.
 Scylla cum melle cocta pota.
 Hyssopi decoctum ex aqua, melle, & ruta potum.
 Thymum cum sale, & aceto haustum.
 Spondylii semen potum.
 Ammoniacum drachma pondere bibitum.
 Daphnoides folium recens, vel aridum potum.
 Hippophaesti succus trium obolorum pondere ebibitus.
 Epithymum potum cum melle.
 Bryonia succus cum aqua mulsa.
 Cnici seminis succus cum mulso, vel iure gallinaceo.
 Magnes potus trium obolorum pondere cum mulsa.
 Centaurii minoris decoctum deuoratum.
 Parthenium siccatum cum aceto mulso, aut sale potum.
 Clematidis alterius semen tritum potum.
 Sesamoides tritum datum.
 Cucumeris sylvestris radices succus, & cortex sesquiboli pondere bibitus.
 Hippophaesti succus oboli pondere potus.
 Ricini grana triginta trita epota.
 Thymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.
 Lathyrus grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.
 Peplum in hydromelite cyathis potus.
 Scammonij succus drachma unius, aut quaternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, vel mulsa.
 Chamelae folia in catapotio deuorata, cum duabus absinthij partibus, adiecta chamelae una cum hydromelite.
 Thymelae viginti granorum pars interior bibita.
 Folia { Sambuci } olerum more cocta.
 { Ebuli }
 Apij inferior pars deuorata.
 Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite.
 Filiculae aridae farina aqua mulsa inspersa hausta.
 Cynocrambes decoctum bibitum.
 Pitusa radix duarum drachmarum pondere cum mulsa, & seminis drachma, succi vero cum farina sabacti cochlearium in catapotio exhibita.
 Heliotropij decoctum ex aqua potum.
 Azarici drachma una, aut altera cum mulsa pota.
 MATTHIOLI
 Iridis radices succus potus.
 Asari decoctum aut dilutum potum, & praesertim ex capitulo sero paratum cum nardo & hydromelite.
 Asarina ex mulsa pota, aut oxymelite.
 Casti solutina pulpa.
 Cnicinum oleum potum.
 Adanna ex sena diluto pota.
 Spina insectoria haeca, & earum succus.
 Cyclaminus.
 Dracunculus.
 Azaricum.
 Rhabarbarum.
 Aristolochia utriusque radix.
 Centaurium minus.
 Aloe.
 Gratiola.
 Sena.
 Myrobalani, Chebuli, Embelici, & Bellerici.
 Franzula.

MEDICAMENTORVM

DIOSCORIDIS.

Ad atram bilem pellendam.

Mandragora succus potus duorum obolorum pondere ex mulso.
 Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis modo paratum haustum.
 Epithymum ex melle haustum.
 Serum lactis potum.
 Origanum siccu acetabuli mensura potum ex mulsa.
 Pulegium bibitum.
 Elleborum nigrum haustum.
 Spartium epotum.
 Alypum mensura epithymo pari cum sale, & aceto sumptum.

MATTHIOLI

Sena & eius decoctum, vel dilutum, & vinum ex ea paratum. Vide comment. eius lib. 3. cap. 70.
 Myrobalani nigri.
 Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS

Ad vomitum eiciendum.

Thlaspi potum bilem rubeam educit.
 Mandragora pota atram bilem.
 Thapsia lacteus succus in mulsa bibitus.
 Thymalorum succus cum aqua mulsa binis obolis potus.
 Apij superior pars deuorata.
 Spartij flores, & semina in mulsa pota.
 Anagris semen commanducatum.
 Betonica radices ex hydromelite pota, pituitam eiciunt.

Papaueris spumici semen in mulsa acetabuli mensura potum.
 Scaphidis agrae grana quindecim in mulsa data.
 Silybi radices drachma pota.
 Glans unguentaria cum hydromelite.
 Narcissi radix cocta, esta, seu bibita.
 Ricini grana triginta hausta.
 Raphani cortex ex aceto mulso potus.
 Thymalorum omnium succus potus.
 Aes vstum cum hydromelite bibitum.

MATTHIOLI

Napi semen ex oxymelite & repenti aqua potum.
 Atriplicis semen porum.
 Lathyrus semen haustum.
 Asari radicum puluis ex oxymelite potus.
 Stibium nostrum quinque granorum pondere ex tribus dosaccharo sumptum.

DIOSCORIDIS

Ad aquam intercutem educendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hausta.
 Polij decoctum bibitum.
 Hippophaesti succus trium obolorum pondere potus.
 Hippophaesti succus oboli pondere potus.
 Ricini grana triginta pota.
 Lathyrus cuiusque grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.
 Sambuci } folia olerum more cocta.
 Ebuli }
 Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite haustum.
 Cynocrambes decoctum potum.
 Asarum bibitum.

EXPELLENTIVM

Lactuca sylvestris succus in aceto mulso potus.
Trifolij radix drachmarum duarum pondere in vi-
no bibita.
Tithymalorum succus bibitus.
Thymelea viginti granorum pondere pars interna
bibita.
Vitis sylvestris radix feruesfacta in aqua in cyathis
duobus vini aqua marina diluti, pota.
Squama aris ex aqua mulsa hausta.
Mercurialis decocta ius potum.

MATTHIOLI

Iridis radicis succus potus.
Perfici flores in acetarijs deuorati.
Brassica marinae succus cum rhabarbaro sumptus.
Frangula.
Elaterium bibitum.
Rhabarbarum } in potionibus additum.
Agaricum }
Stibium nostrum deuoratum quinque granorum
pondere.
Turpetum in potionibus additum.

DIOSCORIDIS.

Ad alium emolliendam, citandamque.

Cerasifera recentia manducata.
Pruna in cibis sumpta.
Siliqua deuorata.
Fici matura deglutita.
Lac ficulneum potum.
Chamarum piscium ius potum.
Vnguis odoratus ebibitus.
Raphanus comestus.
Beta alba deuorata.
Blitum comestum.
Rumicis cuiusque decoctum potum: quin & ipsa her-
ba decocta deuorata.
Malua in cibo sumpta.

MEDICAMENTORVM

Atriplex manducatum.
Brassica leniter feruesfacta comesta.
Lentis decorticata decoctum primum haustum.
Asparagorum cauliculi in cibum accepti.
Cucurbita integra feruesfacta expressus succus potus.
Gingiber quoquo modo sumptum.
Peucedanum potum.
Scille sicca coctae unum, aut alterum ieiunis datū.
Androsami semen tritum potum.
Helxines foliorum succus haustus.
Papaueris erratici semina acetabuli pondere, ex mul-
sa aqua pota.
Cynoglossi decoctum haustum.
Chamaesyces rami decocti, & in cibum sumpti.
Bryonia cauliculi recentes cocti, & in cibum deuorati.

MATTHIOLI

Cassia solutina pulpa deuorata.
Amygdalinum oleum potum.
Manna ex iure sumpta.
Laricea resina deuorata.
Pruna Damascena, & Vngarica ex iure, aut vino
decocta.
Sebestena iure macerata, & deuorata.
Iuglandes cum garo à ieiunis sumpta.
Malua folia, vel teneri eius cauliculi decocti, & ex
oleo & aceto deuorati.
Beta alba & eius succus.
Beta alba succus libra pondere infusus.
Eiusdem decocta radix sale aspersa & supposita.
Hieracij succus ex posca duorum obolorum pondere.
Sena decoctum, vel dilutum, aut eiusdem vinum.
Parandirationem habes in comment. proprio lib.
3. cap. 70.
Bellis recens in catapotijs deuorata vel ex iure de-
cocta.
Vua passa ante prandium deuorata.

FINIS.

Mensurarum & ponderum Typi ad Dioscoridis mentem. Ex Galeno:

<i>In Ponderum ratione.</i>	}	<i>Pendet</i>	Siliqua	}	Chalcum unum.
			Aegyptia faba		Chalcum unum & semis
			Orobis		Chalcos duos
			Obolus		Chalcos tres
			Scrupulus		Obolos duos.
			Drachma		Scrupulos tres.
			Vncia		Drachmas octo
			Acetabulum		Drachmas quindecim
			Nux { Regia		Vncias septem
			{ Pontica		Vnciam unam
Libra	Vncias duodecim.				
Mina { Medicorum	Vncias sexdecim				
{ Italica	Vncias decem & octo				
{ Alexandina	Vncias viginti.				

DE ARIDORVM MENSVRIS.

<i>In Aridorum mensuris.</i>	}	<i>continet</i>	Artaba Aegyptia	}	Medios quinque
			Modius Aegyptius & Italicus		Chaenices octo
			Medimnus		Hemite tria duodecim
			Hemictum. i. semifextum		Congios duos
			Congius		Chaenices 4. i. drachmas 720.
			Chaenix		Heminas 3. Atticas. i. drach. 180
			Sextarius		Heminas duas. i. drach. 120
			Hemina		Cyathos sex, id est drach. 60.
			Cheme		Cyathi quarta part. i. drach. 2. et 1.
			Cochlear		Scrupulos tres

Ponderum & Mensurarum Liquidorum ratio.

<i>In Liquidorum mensuris</i>	}	<i>Pendat</i>	Vini	}	Ceramium lib. 80
			Aceti		Amphora lib. 80
			Aqua		Vrna lib. 40
					Congius lib. 10
					Sextarius lib. 1. & vncias 8
					Hemina vncias 10
					Cotyla vnc. 10
					Oxybaphus drach. 18
					Acetabulum drach. 18
					Cyathus drach. 11. & scrupulos 4
	Cheme drach. 3. & scrup. 1				
<i>In Liquidorum mensuris</i>	}	<i>Pendat</i>	Olei	}	Ceramium lib. 72
					Amphora lib. 72
					Vrna lib. 36
					Congius lib. 9
					Sextarius lib. 1
					Hemina vncias 9
					Cotyla vncias 9
					Acetabulum drachmas 18
					Oxybaphus drach. 18
					Cyathus drach. 18
	Cheme drach. 3.				
<i>In Liquidorum mensuris</i>	}	<i>Pendat</i>	Mellis	}	Ceramium lib. 120
					Amphora lib. 120
					Vrna lib. 60
					Congius lib. 15
					Sextarius lib. 1
					Hemina lib. 1
					Cotyla lib. 1
					Acetabulum drach. 27
					Oxybaphus drach. 27
					Cyathus drach. 20
	Cheme drach. 5.				

Τῷ ἐξοχοτάτῳ ἰατρῷ, καὶ φιλοσόφῳ
Πίττῳ Ἀδρίῳ Ματθίῳ Πίττῳ
Κορνηῳ.

Οὐδένα τῶν μερόπων γινῶσκει μοιῶν ἑαυτῷ,
ἐνθάδε καὶ ζῶειν, ἀλλ' ἄμμι καὶ πατρίδι.
Τοῖσι φίλοις, κεδνοῖς τε γονεῦσι, πόλιν, χρέεσσι
θρέψτρα, χάριν τε φέρειν ἡμῶν, ἔλεξε Πλάτων.
Δόγμα δὲ νῦν τε γρηῖε πλεῖς σύγε Ματθίολ' ἔργους,
ὡσπερ ἂν εἰ κείνῳ κλῆρον ἅπαντα λάχῃς.
Εὐπὶ τακῆσιν, πότερ' ἔρκευθαι κόσμον
αἶν' ἄγειν σπῆλαις, ἀμφοτέρωσιν φίλους.
Ὅτι πασὴν ἐπὶ πόντῳ σέο καλὸς ἀπασιν ἀνοίγων
τὴν βαθύην ἔραυίης κέλευθον ἀκεστῆς.
Ὅτι Διοσκορίδης Δία σὺ πάλιν Φαιδρὸς ἰδέσθαι,
καὶ περὶ τὴν πάντως ἀχλὺν ἀπώσασθαι.
(Κάγχε διαφραγῶσι μιμείδαι ὅσοι πᾶ καλὰ
ἔποτι, μιμείδαι δ' οἶδασιν ἔργα μόνον)
Εὐμείην δὲ τὴν μαρτύρομαι αὐτὸς, ἐκείνης
πολλάκις εἰληφῶς πείραν ἐτυμολάλον.
Μαρτυρέεσσι καὶ οἱ φιλαληθέες ἄνδρες ἔασσι,
γευσάμενοι Φιλίης σείο ποθεινοτάτης.
Τῆνκα τιθνήξῃ ἔπωπιτε, τὸσον ὀνήσας
Ματθίολε θνατῆς, θειοσιβῆς τε τῶσιν.
Οἶδεν ἄλλος γὰρ ἄπας σ' Ὀπεθία χερσῶν ὑπάρχων,
τῆτ' ἐκκλησίῃ κείνῳ ὑπηρετίδι.
Ἐστὶ χρεῖα δὲ μὴ αἰέσσι φίλτατε πλείστον ὀφείλειν
ἄμμι χαρίζομένῳ πολλά, καὶ αὐτομάτως.
Πῶς γὰρ ἴσθην ποτ' ἔχοιμι χάριν σὶ ἀνταποδοῦμαι,
ἔπερ ἰλασθῆμαι πάντα, κρατῶν δὲ πόσον.

Martini Cutheni Pragensis.

*Cedant Hesperidum, cedant & Adonidis horti,
Haecenus, & quotquot barbara Memphis habet.
Unicus hic cunctis multo est praestantior hortis,
Quempia Matthioli cura, laborq; dedit.
Illic non cuiuis transcendere septa licebat,
Omnibus hic aditus, & loca cuncta patent:
Illorum vanas abiit decor omnis in auras,
Huius at aeternum gratia viua manet.
Tot plantis, herbisq; suum reddendo nitorem,
Auctor natura contulit artis opus.
Huic igitur merito, debes Hetruria, quantum
Ipsa Dioscoridi Gracia docta suo.*



PETRI ANDREAE MATTHIOLI MEDICI

Senensis Commentarij,

IN LIB. PRIMVM PEDACII DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

Præfatio Dioscoridis,

IOANNE RVELLIO SVSSIONENSI INTERPRETE.



30 **Q**UANTVM, amicissime Arce, complures non veterum modò, sed recentiorum quoque, de medicamentorum compositione, viribus, atque probatione scripserunt: nobis tamen nec vanum, nec à ratione abhorrentem imperum animi ad hoc opus incessisse. tibi ostendere tentabimus: propterea quòd eorum nonnulli absolutum nihil ediderunt, alij plurima, vt ex narratione acceperant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas, & Heraclides Tarentinus, omiſſa prorsus herbarum tractatione, rem ipsam paucis perstrinxerunt: neque verò omnes illi de metallicis quicquam rebus, aut odoramentis memoriz prodiderunt. Crateus autem herbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte versati videntur, radices multas apprimè vtilis, herbasque aliquas haudquaquam adnotatas reliquerunt. Verum tamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. In iunioribus minus assentiendum: è quibus est Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, qui medicinalem materiam vernaculam, cognitamque vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & vt medicamentorum vires, probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani verò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia interdum pro alijs scriptitando, † rem in aceruum, congeriemque controuersiarum extulerunt. Siquidem qui inter
40 eos egregius habetur Niger, Euphorbium nascentis in Italia chamelææ succum esse contendit: Androsæmonque eandem herbam cum hyperico esse: quinetiam Aloen in Iudæa fossilem nasci: & pleraque his similia falsò exponit, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine præterea iidem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes, nullaque cognatione coniunctas vires colligentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quòd facilius memoriz mandarentur, genera & eorum affectus a sua cognatione disiungentes. Nos verò ab iuente, vt ita dicam, iuuenta iugi desiderio cognoscendæ materiæ allecti, multis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem vitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus. Quod opus tibi dicamus, Arce, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omnes eruditione exultos, tum verò in eos, quibuscum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquantò peculiaris. Enimvero non paruum præbeturæ probitatis argumentum, oprimi viri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam vnà nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter vos benevolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosque qui in hoc commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram æstimeris, sed potius adhibitam rebus cum peritia
50 curam. Etenim plurima visu ipsi exactissimè cognouimus: quædam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percurrationeque rerum apud singulos vernacularum, diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, vt differenti ab alijs ordine tradito, genera singularum medicinarum, viresque describantur. Quòd autem necessaria sit medicamentorum doctrina, nemo est ferme qui ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta sit, vniuersisque eius partibus efficax admi-
60 stret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones, atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam vernaculam, familiaremque materiam complectemur, vt perfecta sit, quæ à nobis relinquatur, doctrina. Verum in primis curam impendete oportet, vt suis temporibus singula & demetantur, & recondantur: certè pro horum ratione, medicamenta aut valent viribus, aut euanido nulloque munere funguntur. Serena igitur cæli constitutione demetenda sunt: magna siquidem refert inter colligendum, si vel squalores, vel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeant, tliuosa, & ventis exposita sint, & perflata, frigidaque & aquis carentia: in his enim locis vires eorum longè validiores ingenerant, & minus viribus valent: multoque magis, si non suo tempore, nec opportunè colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, hæc sæpe, pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius, aut serius adulescere: nonnulla propria vt hyeme florent, & folia pariunt: quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pulsantem herbæ duntaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, vt propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiare notas, nonnulli, qui olim has rerum varietates non perspexerunt, magno in errore versentur.

Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, granien, quinquefolium, & tussilaginem, emittere florem, fructum, & caulem negant. Ergo qui sapius ad visendas herbas, & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus Veratri genera, nigrum, inquam, & candidum, multis edurare annis: reliqua a trimatu inutilia. Quæ verò fruticosa sunt, sicut storchas, tussilago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidant, Fructus autem, vt maturi decerpantur, necesse est: & semina, vbi sicari ceperint, priusquam defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac, & lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ vigorem caule. Radices, & liquamenta, cortices vt recondantur, eximere conuenit, cum herbæ suis folijs exuuntur: siccantur etiam expurgatæ imbi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto, aut puluere sunt oblitæ. aqua elui debent. Flores & omnia, quæ iucundum odorem efflant, arcibus tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta, aut folijs semina, vt perennent, aptè inuoluntur. Liquefactis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo charta non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea vasa ocularijs medicamentis, liquidisque, & omnibus ijs, quæ aceta, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem, & medullas, stagnis vasis recondi conuenit.

COMMENTARIVS MATTHIOLI



VANTVM oporteat Medicos omnes, qui legitimum in arte nomen sibi comparare studet, simplicium quorumcunque medicamentorum, quæ medicina vsui competunt, cognitionem, ac facultatem sensibus exactè consequi, non modo hac præfatione declarat Dioscorides Anazarbem, in hac materia ceteris facile princeps: sed id quoque post Dioscoridem admirabili doctrina pluribus in locis memoria profudit grauius auctor Galenus: qui hac in re præ ceteris Dioscoridem secutus (vt eius luculentissima monumenta passim attestantur) in simplicium medicamentorum viribus, ac facultatibus indagandis, relicta (hoc etiam ipse fatetur) Dioscoridi historiæ palma, omnes, qui in hac materia scripserunt, longè admodum superauit. Quippe tanta animi propensione oblectationeque cognoscendorum simplicium captus fuit (sciebat enim non posse ritè se dici Medicum sine eorum scientia) vt nullo magni laboris metu, nullis periculis deterritus, in Lemuum, Cyprum, Syriam nauigauerit, atque alias plurimas peragrauerit regiones, ea demum causa, vt quæ legitima & sincera, quæque spuria & adulterata essent medicamenta, certò dignoscere posset. Quapropter lib. 111. de med. comp. per genera, ita scriptum reliquit. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum iri, vt medicamentorum materiam cognoscant, ipsimet inspicientes, non sene! aut bis, sed frequenter: quoniam sensibilibus rerum cognitio sedula inspectione perficitur: cuius rei euidentissimum est indicium, quod gemini per omnia similes esse nobis videantur, differentes autem is, qui ipsos inspicere consueuerunt. Itaque herbarum, fruticum, & arborum materiam, priusquam è terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus videlicet futuri sunt, dum eduntur, dum auferunt, & dum vigent. Hac siquidem continua eorum speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commodè decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias. Vos ergo admoneo, amici, vt in hoc quoque me sequamini, si artis opera pulchrè obire volueritis. Nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis mihi afferantur medicamenta, eo quod perditis illi omnigenarum rerum cõemptores (Græci *πρωτοπλάστεις* vocant) varijs modis ea contaminant. Præstiterat forsitan non hos solum, sed multò magis etiam mercatores, qui illa aduehunt, incusare, atque his multò magis ipsos herbarios: item nihil minus eos, qui radicum liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in vrbes conferunt: hi siquidem omnium primi in eis dolum exercent. Quisquis igitur auxiliorum vndique copiam habere volet, omnis materia stirpium, animalium, & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad medicinae vsum ducimus, expertus esto, vt ex eis & exacta, & notha cognoscat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia veniat, verbotenus quidem medendi methodum sciet, opus verò nullum ipsa dignum perficiet. Et primo de antidotis: Medicus autem (inquit) omnium stirpium, si fieri potest, peritiam habeat, consulo: sin minus plurium saltem, quibus frequenter vrimur. Earum genera quisquis toto ætatis illarum decursu nouerit, multis in partibus orbis terrarum reperiet, vt ego in Italia multis in locis inueni: quæ nec quando pullulant, nec quando crescunt, nouerunt isti, qui siccas stirpes tantummodo cognoscunt. Hac Galenus. Ex quibus satis Medicis omnibus perspicuum est, non posse quenquam sine certa simplicium medicamentorum cognitione, nec morbis ratione mederi, neque artem recta methodo exercere, nec nisi fortuna quadam, vel natura ipsius robore agros sanare. Neque enim villo pacto eis ad stipulandum censeo (vt Medicorum plerique faciunt, & vix sapè, qui primas sibi deferri existimant) qui compositis tantum officinarum medicamentis, ipsiq; admodum vulgaribus contenti sunt. Nam cum satis sibi fore persuadeant, scire Diacatholicum omnes in vniuersum humores deicere, Deiectorium è sacco rosarum flauam bilem, Diacnicum pituitam, Diasenam, & Catapotia ex ceruleo atram bilem, Coccia caput & cerebrum expurgare: sicuti, quæ Lucida nuncupant, oculis, & quæ ex Hermodactylis dicuntur, ac quæ Færida vocantur, arthriticis esse peridonea, nihil ultra requirunt: quin potius scire negligunt, è quibus ea simplicibus componantur medicamenta, & an is ea insint vires, quæ suis nominibus pollicentur: an simplicia, quibus constantur, legitima sint an spuria, sincera an adulterata, recentia an exoleta, sicca an humore vel situ corrupta, an suo tempore, & opportunè decerpata, sole siccata an vmbra, an igne, vt sapius in temporis angustia officinis fieri solet. Neque vnquam animaduertunt, quod deiectorium medicamentum, quæ nostro æuo parantur ad bilem deiciendam, sæpe Scammonium lacte tithymalorum, ac pityusa adulteratum, magno agrorum detrimento immiscent. Ius verò, quæ pituitam ducunt, sæpe legitimi Turpeti loco, modò pityusa, modò thapsia, modo peonia radicum cortices imponunt, quæ impostorum mangonio ita Turpetum referunt, vt non seplasiatigustu, & legitimi Turpeti scrutinio & collatione deprehendantur. In Catapotis deinde, quæ ex Hermodactylis vocantur, trunque mortiferum est medicamentum, omnes inijciunt. Adde præter hæc, quod sæpenumero medicamenta ex iis simplicibus componunt, quæ ætate exoleta, nihil viribus præstant, quo sit, vt penitus euanida, ac inualida reperiantur. Quod etiam imperitia: nam pauci, vel potius nulli habentur pharmacopole (eos semper excipio, qui simplicium historias amplexantur) qui supposititijs, ipsiq; innumeris non vtantur simplicibus. Namque Asaro vtuntur pro baccharè: vrbana

Galeni nauigationes, vt legitima cognosceret simplicia.

Medicamenta adulterata sunt etiam Galeni tempore.

Sine simplicium cognitione manca est medendi ratio Medicorum quorundam opinio exprobrata.

Officinarum lapsus.

Loto, pro fertula Campana: Colutea, pro sena: acoro, odorati calami vice: cypero, pro galanga: hieracio, pro soncho: sphondylis, pro acantho: chondrilla, pro cichorio: agresti lactuca, pro intubo: ophioscorodo, pro scordio: quibusdam arborum lacrymis, pro succino: rapsia, pro turpeto: pice, pro pissasphalto: resina larigna, pro abiegna, & legitima therebinthina: phyllitide, pro aspleno: obscuris quibusdam radicibus, pro meo, peucedano, & costo. Ad hac laccam ex brasilio & cocco insectorio confectam, pro cancamo vsurpant. Rhodium oleastrum, pro agallocho, ossa & carnem humanam, pro mumia: macim, pro macere: chartam, pro papyro: cressinum (sic enim vulgò vocant aculeatam quandam plantam) pro oxyacantha: conuoluulum, siue leuem smilacem, pro ligustro: agrestium prunorum succum, pro acacia: succum verò baccarum ligustri, & periclymeni, pro lycio: caneros, pro gammatis: ranunculum, pro coronopo: saponariam vulgò dictam, pro struthio: carduum, quem benedictum nominant, pariterq; chamaeleonem album, pro leucacantha: parthenium, pro artemisia: cotulam fetidam appellatam, pro parthenio: canis testiculos (sic enim radices quadam nominantur) pro satyrio: polium, pro chamapity. Cadmia præterea officinis serè omnibus pompholygem genuinam mentitur, erugo eris flarem, eris squama stomomatis (quod chalybem dictum putamus) squamam, sandix minium: terra quadam mango- mixata sphragidem lemniam, salnitrum nitrum, & aphonitrum. Alia denique plura, ac diuersa simplicia medicamen- ta sunt, quae vbiq; locorum apud varias nationes, huius, vel illius vice nulla penitus ratione indifferenter subiiciun- tur, vbi cum prauum, tum spurium sibi iamdiu vendicant vsum. quae, ne verbosius rem hanc prosequi videamur, silentio præmittenda censemus. Hæc autem pluribus in locis non euenirent, si Medici omnes veram, & exquisitam simplicium rerum doctrinam consequerentur, quam maximè, & iure consequi deberent. Quippe materia huius peritiam assecuti, & errorum cognitionem nacti, ne seplasti in eiusmodi versarentur erroribus, obstarent: neque eis vlla vnquam medica- menta confici permitterent, nisi sibi prius perspectis, cognitis, ac probatis simplicibus, quae in ipsis componendis expetun- tur. Dent itaq; iam operam imperiti, vt huiusce materiae cognitionem exactè consequantur, quandoquidem artificii ni- bil quidem execrabilius, ac turpius esse potest, quam suae artis subiectum, & instrumenta ignorare. Quod sanè vnicuiq; Medico vsu euenire cõperimus, qui non modò alienis vtitur misturis, sed nec simplicia quidem, nec eorũ facultates nouit. Proinde scitè à Galeno dictum est lib. VII. & VIII. de composit. medic. secundum locos, quòd non poterit is, ex quo ordine eiusdè generis medicamentorũ compositum sit, cognoscere, num ex mollissimo, an vehementissimo, aut medio, aut alio aliquo inter hunc, & alios intermedio, qui singulorum simplicium potestatem exactè antea non perceperit. Veruntamè- nemo in hac materia se peritum euadere confidat asidua tantum librorum lectione, et si eos quidem grauissimi conscri- pserint auctores, nisi sapius ad visendas stirpes se contulerit, & quòd à præceptore in herbarum agnitione diu exercitato, digiti demonstratione prius fuerit doctus, ac oculorum sensu, gustatq; variis anni temporibus omnia hæc diligenter om- ni ex parte perpendat. Id enim, cum maximè perpendisset Galenus (vt sexti libri de simplicium med. facul. præfatio- ne legitur) inquit. Equidem non possem non accusare & illos quoque, qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati, cum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere, ac non adsimilari iis, qui ex libris procedunt gubernato- res: nam sic & verior, & manifestior esset doctrina, non herbarum modò, & fruticum, arborumq; sed & aliorum o- mnium medicaminum. Verum enimverò si omnino libris est opus, quis adeò miser est, vt præteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateua, & aliorum innumerorum, qui in arte ipsa consenuerunt, libros grammaticos scribentis in- tantationes, transformationes, & decanum, demoniorumq; herbas sacras perferat? Et libro primo de alimentorum facultatibus: Optima (inquit) illa doctrina est, quae viua voce traditur: neque enim quisquam ex libro nauclerus, aut alterius artis artifex euadit. In hoc namque comparati sunt libri, vt nobis sint eorum, quae ante didicimus, monumenta: non vt rudes & ignari per illos doctrinam perfectam assequamur. Quòd si qui sint, qui præceptorum careant, velint- que iis, quae luculentè, ac copiosè sunt scripta (qui nobis scribendi mos est) diligenter incumbere, magnum ñ fructum capient, præsertim si eadem relegere identidem non grauentur. Es primo de antidotis: Quòd si nullo (ait) monstrante ex libri alicuius lectione, quales sunt commentarij Heraclidis, Crateua, Dioscoridis, aliorumq; quorundam in simplicium medicaminum cognitionem peruenire aliquis velit, longè maiore ipsi opus est inspectione, vt exactè singularum medi- cinarum virtutes, ac vitia diiudicare sciat. Nam qui simplices medicinas diuendunt, tam callidè illarum quasdam concinnant adulterantq; vt etiam exercitatissimos in eis decipiant. Quare idem Galenus lib. IX. de simplic. medic. facultatibus, in Diphrygis mentione ita scriptum reliquit. Adiciam huic, qui de illo habetur, sermoni, rem non modò de Diphryge scitu vtilem, sed & de Lemnia sphragide, & Pompholyge, & Opopalsamo, & Lycio Indico. Nam etiam- num adolescens didici hæc ita præparare, vt à veris natiuisq; nihil differre viderentur. Erat autem qui me docebat in- genti mercede, homo curiosissimus, non in his tantum, sed & alijs similibus. Itaque in Lemnum, in Cyprum, in Pala- stinam Syriam eo studio nauigauit, vt medicamentorum istorum cuiusque multam copiam, quae in omnem vitam me- am satis foret, reponerem. Sed & Lycium Indicum cum Aloe Indica id temporis commodum accipere contigit, cum à Palestina iter reflecterem: cum persuasum haberem, eo quòd à camelis cum tota sarcina aduectum esset, proculdubio id esse Indicum: quòdq; adulteratum haud nosci ab iis, qui portassent, posset, propterea quòd materia, ex qua id præpara- tur, illis in locis haud nasceretur. Porro satius visum est mihi illegitimarum compositiones haud quaquam adscribere, vt pote cum homines scelerati in lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cum verorum ac germano- rum notis ac iudicijs, adulterandorum nosse compositiones, cum nihil ad ea discernenda conferant: imò optem, si queam, quae à maioribus me perperam conficiendorum atque adulterandorum medicaminum prodita sunt compositio- nes, omnes prorsum delere atque extirpare: hæcenus Galenus. Ex cuius verbis manifestè percipi potest, ex libris duntaxat non posse in simplicium agnitione peritum fieri quenquam, etiamsi in ipsis stirpium imagines virentibus persimiles omni exquisito artificio fuerint adiecta. Siquidem (vt in hac præfatione scribit Dioscorides, & locum iam citatis asserit Galenus) qui in stirpium historia peritissimus euadere cupit, illum quidem viuas omnium plantas non semel tantum, sed diuersis anni temporibus inspicere oportet. Quandoquidem planta ipsa folia alias exhibent, cum prima germinatione emergunt, alias cum adolescunt, & caulem edunt, alias vbi flores erumpunt, & alias vbi sicces- centes maturum gestant semen. Videmus enim aperte Populum nigram, sicuti Ricinum, per initia folia explicare ro- tunda, quae tamen post tempus huic platani, illi verò triangulati sectione laciniata visuntur. Sed contra Hedera euenit, quippe huic prima statim iuuenta triquetra folia insunt, quae vetustiora iam facta quadantenus rotundantur. Sissym- brij aquatici folium cum primùm erumpit, rotundum est, cum verò adoleuit, in cruce modum laciniatur. Lepidio, &

Officinarum ignorantia & abusus.

Medicorum munus negle- ctum.

Simplicium peritiam nemo potest ad- dicipi ex li- brorum le- ctione.

Herbarum formæ descri- ptæ parum conferunt.

Scripta quo- rum commen- dex Galenus Simplicium peritia à præ- ceptoribus, non ex libris comparatur.

Impostores quandoque etiam peritos decipiunt.

Galeni pere- grinationis.

Stirpes folia immutantes dum adole- scunt.

Nassurtio folia primo exorta trinitata, ac circumquaque apperere modo locumata emergunt, ac tam pubescent, pre-
 longa oleaceis similia euadunt. Quo etiam modo hortense nostrum vulgo Petroselinum vocatur cum suis ludere cer-
 nimus. Lathyrus amygdalinus folijs canlem vestit, qua in cacumine ita prioris forme obliuiscuntur, vt in Aristolochia
 aut hedera folia degenerent. Nouellus Acanthus folia lactuca longiore virefcit eruca incisuris diuiso: ac senior effectus
 quaedam circa totum caulem folia promit tam crebra, acuta, triplicata, densa, ac minuta, vt nucamenti speciem
 quandam referant. Sunt & alia nonnulla, que has foliorum mutationes per tempora ostendant, quarum nomina
 breuitati consulentes nunc pratercunda censemus. At fieri quidem nequit, vt huiuscemodi stirpium variationes ex
 libri, in quibus figura expressa, atque etiam coleribus exornata habentur, omnes obseruari possint: quandoquidem
 planta ipsa appicta, ex tot variisq; vnam nobis duntaxat imaginem representant. Hac etiam illud accedit, quod ea
 que pictura artificio fiunt, et si ex optimi artificis penicillo emergant, nunquam tamen naturalium rerum lineamenta
 au vnguem referre, ac exprimere queunt, quomodo etiam naturam exactissime imitentur. Eadem ratione putauerim
 ex cuiuslibet grauisimi auctoris commentariis, qui stirpium historiam continent, neminem absolutam earum
 notionem vnquam adepturum esse, qua maxime Medicis requiritur: quippe quod in suis simplicium monumen-
 tis, ac foliorum, caulium, & reliquarum partium historiis, non nisi vna lineamentorum, ac similitudinum
 enarrationem tradiderint. Que tamen si vera sint, nullum tamen prabent mutationis exemplum, vt saepe ac sepi-
 us plantis compluribus variis totius anni curricula tum in folijs, tum in caulibus, reliquisq; particulis eueire con-
 perimus. Quo fit vt hae variandi series nullo alio pacto addisci possit, quam longa oculorum exercitatione, dum a-
 tate tota planta ipsa solo educata virefcunt. Caterum vbi scriptores in suis historiis stirpium notas explicant, illi
 quidem sepe semper similitudinibus vtuntur, acorum exempli gratia, xrydem, gladiolumq; iridi similem reddent-
 tes: Meon praterca anetho, cyperum porro, asarum hedera, phu silyrio, & bacili. Et illud huic sepiissime com-
 parantes. Vnde fieri non potest, quin aliquis non prius perspectis vna cum doctissimi ac exercitissimis praecepto-
 ribus plantis quibuslibet, cum quibus alia inesse tum similitudinem, tum etiam cognationem narrant auctores; &
 non habita hoc modo earum ratione, possit vnquam ex solis libris cum stirpium imaginibus, vel sine eis edis, in-
 sumum & perfectum herbarium euadere. Quamobrem etsi stirpium imagines, que magno tam pictorum, tum ty-
 pographorum studio libris excuduntur, insipientium oculos blande admodum detineant, atq; illas prius a nobis cogni-
 tas in memoriam reuocent, magni tamen eas esse emolumenti is non crediderim, qui visu & praecepto auxilia nu-
 merosam earundem partem non acceperint prius: quanquam fortasse secus vulgus existimet. Adhibeant igitur curam
 q; quibus in animo est re herbaria peritiā adipisci, vt in primis viros huius rei non imperitos sibi praeceptores asiscant:
 deinde vt assuescant per diuersa temporis interstitia, montes adire, valles, sylvas, ac cetera terra loca, vbi oculis, reli-
 quisq; sensibus simplicia medicamenta inspicere, & cognoscere valeant. Quos nec pigeat se conferre ad fodinas, vbi me-
 tallica & fossilia medicamenta tam diligenter contemplantur, vt legitima quaq; deinde ab adulterinis discernere sci-
 ant. Neq; solum in fodinis ipsis versari debent, sed etiam in fornacibus, vbi metalla funduntur: nam ibi & diphrigem
 & pompholigem, & spodium, & cadmiam, & argenti spumam, & alia nonnulla dignoscere poterunt: qua hac nostra
 etate facticia, spuria, & adulterata in myropoliis sepe omnibus habentur. Quin & ad magna emporia, luculentissi-
 masq; ciuitates se conferant, vbi peregrina vndique importata veneunt. At certe ridiculi sunt qui inter legendum tum
 herbas, tum etiam radices, vana ducti religione, quibusdam verborum, carminum, & suffimentorum superstitionibus
 vri praecipunt, quasi vires, & facultates medicamentorum verba, & carminum incantationes infundere, augere, &
 diminuere valeant: vt stulti, & superstitiosi falso credere, & affirmare non erubescunt. Quos tamen lib. vi. de simp-
 med. facul. superius citato acerrime damnauit Galenus, sic inquit. Et Pamphilus eum in modum tractatum de her-
 bis composuit, verum is ad fabulas versus aniles est. simulq; praestigiaturus quasdam, iunctis nonnullis incantationi-
 bus, quas, cum herbas colligunt, admurmurant. Et sane vtiur is τὸς πρὸς πρὸς αἰδῶν id est, ad qua suspenduntur, & ad alias
 manganeias non solum curiosas, & a medicina alienas, sed etiam falsas vniuersas. Ex hac Galeni sententia omnib;
 palam fit, quod si modò commentarios aliquos admittamus, omnis omni ex parte superstitiosis, eos tantum legere de-
 beamus, atque in is nauare operam, in quibus vera, & exulta simplicium doctrina nitet. Quos praesertim posteritati
 donarunt is, qui exactam eorum peritiā indefessis laboribus sunt consecuti: inter quos omnium primus est Dioscori-
 des. Ideoq; iure quidem eodem loco ceteris a Galeno praesertur, cum inquit. At Pamphilus, is scilicet, qui libros de herbis
 composuit, plane ex iis, que vel ipse scribit, pra se fert Grammaticum, indicatq; se nec conspexisse herbas, quas exponit,
 nec vires earum expertum, sed iis, qui ante ipsum scripsere, fidem habuisse citra vllam explorationem. Illi scilicet libri
 exscripti frustra annexo ad vnamquamq; herbam nominum aceruo: deinde etiam exponens, si qua in huiusmodi serbia
 tur transformatio: tum incantamenta, & libationes, atq; thymiamata, qua in colligendis illis adhibebantur, adscri-
 bens: nec non & alias eiusmodi praestigiaturas nugaces. At Dioscorides Anazarbensis quinq; libris materiam omnem
 vtilem absoluit, non herbarum tantum, sed & arborum, & fruticum, & succorum, & liquorum: memorans insuper
 & met. allia omnia, & partes animalium. Et mihi vtiq; videtur omnium perfectissime tractatum de materia medi-
 camentorum consecisse. Nam licet a maioribus multa de illis bene scripta extant, tamen a nemine omnium aequae deo-
 omnibus. Caterum que scripta reliquit Heraclides Tarentinus, & Crateuas, & Manteias, non in ordinem digesta, nec
 in vnum omnia collecta visuntur, quemadmodum illa, que scripsit Dioscorides. Et primo de antidotis volumine: Ac de
 omni quidem (inquit) medica materia sufficienter a Dioscoride quinq; libris traditum est, a quo tibi discere licet cum
 aliis omnes notas, tum gustu, olfactuq; perceptas, quibus maxime probatiora medicamenta a deterioribus cogno-
 scuntur & discernuntur. Hinc ergo auctoritate Galeni satis perspicuum esse potest omnibus Medicis, itemq; seplasia-
 ris, ad quos potissimum spectat rei Medica cognitio, in ea simp. medicamentorum facultate Dioscoridem ceteros ex-
 cellere, & facile primas tenere. Quapropter ab iis praclarissime ageretur, si eius scripta tantisper legerent ac perlege-
 rent, perpetuoq; in sinu gestarent, donec eum plane sibi familiarem redderent, & hoc quidem eo praesertim tempore fa-
 cerent, quo a peritissimis praeceptoribus vera, ac legitima simplicia tum oculorum, tum gustus, tum olfactus (sensibus
 offeruntur. Quod ea citius ducet illos ad optatum finem, quo magis Dioscoridis praclara scripta castigatissima, & a
 mendis quam plurimis expurgata reperient. Quinetiam nostris commentariis, qui praterea Galeno referunt acceptum
 sepe quicquid ipse scripsit de simplicium medicamentorum materia, ita dilucidata & illustrata, vt maximam (ni fallor)
 secum

Stirpium ima-
 gines parum,
 vel nihil pro-
 sunt ad sim-
 plicia digno-
 scenda.

Notandum.

Vana & su-
 perstitiosa
 incantatio-
 nibus vri, dū
 planta effo-
 diuntur.

Dioscorides a
 Galeno ma-
 xime com-
 mendantur.

Dioscorides
 in simplicium
 medica ma-
 teria primas
 tenet.

secum adferant claritatem. Huic igitur soli se dedant, hunc solum sequantur ob iam dictas rationes omnes ii, qui non modo stirpium, sed & reliquorum simplicium medicamentorum doctrinam & facultatem consequi volunt. Ac contra tum vulgo semper ignaro, tum ius etiam, qui coaxantium ranarum instar, è sordido palustrum aquarum limo caput exere nequeunt, nugaces, ac penitus detestabiles quorundam libros vbi simplicium & compositorum materia ab his tractatur, qui vix lactucam nouissent, nisi eorum coenis frequentissima exstitisset: pariterq; vriticam, nisi acerrime tangentes pupugisset. Quorum inscitiam animaduersus Galenus, contra eos locutus esse videtur lib. 6. de simplic. medic. facultat. prefatione breuiter & scite, sic inquit. Verum abstinendum est a multis mendacibus, multoque etiam magis fugiendus est Pamphilus, qui ne per somnium quidem herbas vidit, quarum aggreditur singulas prescribere. Nam id genus hominum (quomodo assimilat eos Heraclides Tarentinus) simillimum est praconibus, qui formam ac notas fugitiui mancipii, licet ipsi non viderint vnquam, praconio tamen publicant, notas enim ab aliis, qui norunt, accipiunt, & ceu cantilenam eas proferunt, vt si forte is, quem praconio indicant, adfuerit, agnoscere tamen non possent. Hucusque Galeni verba. Quae longè satis sufficere possunt ad eorum monitionem, qui ad simplicium materiam noscendam per rectum ostium introire cupiunt, & securo totius itineris gressu progredi. Verum in primis, vt opportunè singula demetantur, nosse oportet tempora, quibus maxime planta viribus valeant. Quapropter à radicibus initium sumentes, dicimus harum vires, sicut etiam aliarum stirpium partium, non eodem anni tempore aequè in omnibus reperiri, quandoquidem aliae hoc tempore, aliae verò illo humore praegnantibus deprehenduntur. Tametsi non desint, qui haud quaquam infirmis rationibus innixi, radices è terra eruendas asserant semper autumno, cum scilicet folia decidunt, & caules contabescunt: alii verò ineunte vere, priusquam folia concreuant: siquidem hisce temporibus radicibus maior vis inest, quam ceteris partibus. Sed vt ingenuè in hac re fatear quid sentiam, crediderim ego omnino maiorem succi vbertatem inueniri in his, quae vere effodiuntur: quippe quod planta nondum caules, folia, neque flores emisserint, à quibus omnis radicum succus exhauritur. Sed & rationi consonum mihi videtur, autumnales radices omnes tum paucioris, tum imbecillioris esse succi, quam vnales, quod scilicet paucos ante tempore & caules, & folia, & fructus ediderint. Non tamen inficiari velim, quod quae vere leguntur, copiosiore, quam par sit, humore redundantes, illoque longè minus concocto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini & corruptioni non sint magis obnoxiae, praesertimque si longo asseruentur tempore. Quae re à Dioscoride animaduersa, is sanè iussit stirpium radices effodiendas esse, cum stirpes ipsa foliis exuuntur. Quod cum variis anni temporibus eueniat pro natura diuersarum plantarum, curam impendere oportet, vt suo tempore vnaqueque radix integre, si fieri potest, cum omnibus suis adnatis euellatur, & in iis locis, atque sub ea caeli constitutione, quam maxime familiarem habet. Porro radices abunde nutrita sint oportet, ac omni putredine, & tate vacantes: non ita tamen, vt praenimio alimento ex pingui solo, vbi nascuntur, accepto, debitam & humoris copiam, & corpulentiam metant excedant, neque vt eiusdem alimenti inopia inanes, & rugosa reddantur. Quod cum maxime perspexisset Galenus de iridis radicibus differens libro primo de antidotis: In vniuersam (inquit) ex omni medicinarum genere illae radices inutiles habentur, quae inanes sunt, & rugosae. Atque illae quidem deteriores sunt mediocriter nutritis, & medicamentum magnitudinem nactis, quae crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quam illis vsu veniat. Haec Galenus. Ceterum vbi radices è terra fuerint exemptae, primum quidem tamdiu aqua clara elui debent, donec omnium vndique terra vel limo penitus abstergantur: mox deorsum à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus vniuersum ferè omnes comantur: postremo sicari eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fuerint quales fœniculi, apii, asparagi, rusci, polipodii, rubiae, intubi, & consimilium, in umbra, vbi orientales venti respirent, diligenter siccentur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potior earum pars ab eis proculdubio euanesceret, vt potius & tenuibus. Verum enimvero si ex eis fuerint, quae natura crassae sunt, veluti gentiana, helenii, mandragora, bryonia, & id genus aliae, & aer sit nubilus, & hyems, ne in umbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac vento tuto sicari possunt. Quod commodius fieri potest, si frustatim dissecta ita tenui funiculo trahantur, vt partes non se contingant, aut cratibus imposita quotidie sapius manibus reuoluantur. Atqui curandum est, ante quam siccentur, vt lignea matrix, quae omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum scissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamque vim obtinet: etsi gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphaea, aliaeque complures absque matrice suas praeseferant radices. Siccatis radicibus, quod plane constet eas sine tate, & teredine per tempora adseruari posse, iis reponantur in locis, ad quae solares radii non penetrent, neque fumo pateat aditus, & quae neque vliginosa sint, neque puluerulenta. Sit igitur locus eminens, & fissus, ad septentrionem vergens, vel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipsae non prorsus exicatae reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austri humidissimi status admittantur. Ita denique recondi, ac seruari possunt tot annis, quot ab inanitate, teredine, & tate vindicari valeant. Nam etsi quae tenues sunt, vt asari, phi, asparagi, rusci, & id genus aliae, anno duntaxat perennent: veratrum tamen vtrunque, quamuis radicibus constet tenuibus, ad trigesimum annum vsque perdurat. Ceterum demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus, non modo in radicibus obseruandus, sed & in ceteris tum stirpium, tum etiam animalium partibus, vt in hirci sanguine, lupi iocinore, intestino, ac etiam stercore, vulpis pulmone, apri vesica, anguium senecta, aliisque consimilibus. Assumantur igitur haec omnia eo demum anni tempore, quo magis suis viribus sunt praedita, nullo plane modo neglecta temporum ratione, quibus singula decerpi postulant. Neque enim damnandi sunt, qui in quibusdam plantis colligendis quadam decreta tempora, nonnullosque errantium siderum aspectus obseruant: quippe quod apud graues auctores scriptum inuenerint, paonia radices contra comitiales non esse euellendas, nisi decresciente luna. Quae quidem opinio non prorsus reprobanda videtur, nec ad ineptias incantationum, aliarumq; vanitatum, quas stultè (vt Galenus inquit) prodidit Pamphilus, comparanda. Nam cum inferiora terrestria à superioribus caelestibus gubernetur & regantur, fieri maxime potest, vt luna, vt quae ceteris errantibus sideribus est nobis magis proxima, motu velocissima, maximam cum platis omnibus, ac rebus quibusuis aliis habeat rationem, tum cum augetur, tum etiam cum minuitur singulis mensibus. Quamobrem non temerè à Galeno proditum est, Alyssum herbam tantum seris ardente ac canum rabiosorum morsus esse euellendam, sicuti etiam fluuiatiles caneros ad idem peridoneos. Quo etiam tempore caeamus scorpiones: atque Anchusa radice constat sanguineo succo madente. Quomodo & stirpes, quibus sacras

Libri explo-
dendi.

Galeni verba
notanda.

Tēpus, quo
stirpiū partes
legendae sint.

Radices quā
do effodiendae.

Radiciū opti-
marū notae.

Radices quo-
modo munda-
ndae, sicca-
ndae, ac obser-
uandae sint.

Radices quibus
in locis
exiccatae sint
ponendae.

Veratrum v-
trunque tri-
ginta edurat
annis.

Non est ab re
certis tempo-
ribus herbas
colligere.

Quibus in
locis plantas
colligi debe-
ant.

excalsfaciens insit, perpetuo in locis calidis, ac siccis demerere conuenit. Quocirca Hippocrates ad Cratenam scribens: Admitere (inquit) quantum potes, ut nobis montanas maxime, & in altis collibus nascentes herbas à radicibus resecas: quandoquidem hæc firmiores, atque acriores sunt iis, quæ aquosioribus nascuntur locis: idque, quod in montibus terra sit densior, & aer tenuior: nam quod attrahunt plus virium sortitur. Quinetiam dabis operam, ut flores ex his herbis etiamnum decerpas, quæ circa stagnantes aquas, paludes, fluuios, & fontes prodeunt, quas sandebiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio. Omnia autem medicamenta, quæ succi, & liquoris fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur, quæ verò folia, aut flores, aut radices sunt, in scilicet nouis probe obturatis, ut ne ventis per-

Herba quo pacto legendæ siccandæque sint.

Plantæ, quæ colligi postulant floribus ornata.

Officinarum lapsus in herbis siccis reponendis.

Flores quo tempore sint decerpendi, siccandi, ac recondendi.

Fructus quædo decerpendi, & quomodo conseruandi.

flata, medicamenti vigorem, veluti in animi deliquium collapsa, amittant. Hæc Hippocrates. Herba similiter, atque radices, legenda sunt, siccandæ, ac asseruanda, his tamen demptis, quæ tum in medicina vsu, tum in cibis, tum etiam in obsoniorum condimentis quotidie videntes vsurpantur, veluti lactuca, intubus tam domestica, quàm agrestis (cichorium appellant) portulaca, buglossum, beta, atriplex, blitum, brassica, viola nigra, malua, helxine, linosyris, ocimum, apium, hyoscyamus, sedum, plantago, asparagus, acanthus, & alia complures. Atque non solum refrigerantibus herbis, verum etiam excalsfacientibus recentibus vtimur: plerumque enim ex calida potestate præditæ, virides siccis præponimus, præsertim vbi minus calefacere sit opus: siquidem humor in viventibus exuberans earum calorificam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur amaracus, eruca, nasturtium, mentha, absinthium, thymus, satureia, ruta, calamintha, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta. Sunt præterea, & alia, quæ demerere expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaurium minus, viola purpurea, origanum, symphytum petraeum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamædrys, chamæpitys, anthemis, chrysanthemum, stæchas, hyssopum, fumaria, aliaque consimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse videar, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cæli constitutione, non nubibus, non imbris infestis in primis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atque aliis aduentitiis excrementis amotis, diligenter in vmbra siccantur. Nisi ex eo genere habeantur, quæ caulibus crassitudine, ut in acantho, vel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino in solari expetant: quandoquidem si eiusmodi herba in vmbra siccanda reponantur, dubio procul situ obducentur, & putrescent. Caterum cum rectè siccata fuerint, decusso puluere, in sacculis ex corio, vel ligneis capsulis recondantur, ac diligenter claudantur, ne earum vires euanescent. Quæ re errant seplastiæ plerique, qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinarum laquearia suspendunt, vbi non solum breui viribus destituntur, aeris ambientis exuclione, ac ventorum perflatu, sed etiam puluere, & aranearum telis obsiduntur: quin etiam muscarum stercore, quæ illis die, nocturne insident, labefactata nigricant. Neque verò planè laudibus esseferendi sunt ii, qui in linteis sacculis, ipsisque textura admodum raris eas trabibus appendere consueuerunt: quippe astius aer in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absumit, & abolet: quinetiam puluere obsita corrumpuntur, & contabescunt. Idcirco ut tam herba, quàm radices suas integras asseruent facultates, nihil quidem præstantius, quàm eas capsulis tiliaceis, vel piceis, vel scilicet diligenter clausis reponere, ut docet Hippocrates ad Cratenam his verbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi, & liquoris fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur, quæ verò folia, aut flores, aut radices sunt, in scilicet nouis probe obturatis, ut ne ventis perflata, medicamenti vigorem, veluti in animi deliquium collapsa, amittant. Quod si Hippocrates in recentibus obseruandum præcipit, id maxime in siccis fieri operæpretium erit. Flores insuper non secus, atque reliqua plantarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in vigore consistunt, non autem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi, antea quàm se explicent, decerpuntur. Rosarum verò cum non planè explicati visuntur: ceteri deinde cum omnino expansis foliis patent. Verum maior ex parte omnes serè flores sint herbis fragiliores, molliores, & tenuiores: idcirco tantum abest, ut in sole siccandi sint, ut ne quidem in vmbra, si calida, vel eminentia fuerint loca: quippe, ut solis feruore, sic & aeris calore nimio exoluuntur. Siccantur igitur in locis temperatis, quo tempore sepius reuoluuntur, ne situm contrahant, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem deperdant: quandoquidem certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vsus. Itaque perbellè siccantur super linteis extensi, vel aminibusque contacti. Siccantur autem probe vbi substratis linteaminibus sparguntur, & iisdem lenibus operiuntur. Flores itaque in vniuersum sicci ad annum duntaxat edurant, etsi anthemidis, centaurii, chrysanthemi, millefolii, spartii, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arculis optimè inclusi diligenter recondantur. Non minori etiam studio sunt colligenda semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, ut lithospermi, fœniculi, anethi, & cari: vel vasculis, aut capitulis inclusa, ut papaueris, nymphaeæ, melanthii, hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis tecta, ut faba, ciceris, paboli, dolichi, & lupini: aut corniculis recondita, ut fœni greci, ferrula campanæ, sinapis, & eruca: aut variis inuolucris contenta, ut ea, quæ circa medullam quorundam fructuum intus conduntur, quale est mali medici semen, aurantii, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum, & melopeponum, cucurbita, & cucumeris. Verum tamen hæc assumere oportet, cum fructus, à quibus eximuntur, suam maturitatem planè senserint: illa verò, vbi herba iam sicca, non amplius vident. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas asseruent vires, ea tamen quotannis renouare satius, ac tutius erit: siquidem pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant, quo fit, ut colorem nanciscantur extraneum, & sibi non congenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina, arculis ligneis reponantur in locis siccis: facile enim contrahunt locorum humores. Caterum fructus, quemadmodum pruna, serica, myrti batca, cydonia mala, cerasa, quæ vulgò mareasas vocant, corna, sorba, ficus, punica mala, & alia id genus, quæ in medicina vsam reponuntur, operæpretium est, ut maturi ex arboribus decerpantur: quanquam sorba, ut siccantur, immatures ut paululum potius immaturi, quàm secus, demerantur oportet. Porro iuglandes, amygdale, pistacia, nuclei pinei, & auellana non prius ex arboribus excutiantur, quàm planè vltimum maturitatis gradum senserint. Id autem rectè cognoscitur, cum extrema inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vnà cum fructibus decidunt, alioquin in solata contrahuntur, & sidentur. Ex his igitur, qui siccati asseruantur, capsulis ligneis potius, quàm sacculis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui verò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis minime asperginem redolentibus appendantur, ut assolet de vuis, pyræ, malis cydoniis, & punicis: aut super paleas expandantur, ut sit cum in aliis, sorbis, ac messilibus: aut bordeo, vel milio sepeliantur, quemad-

modum medica, & aurantia mala. Cortices præterea, qui fructibus auferuntur, ut cytris, punicis, & cucurbitis: quique arboribus decerpuntur, veluti thuri, ligno guaiaco, sambuco, ac fraxino: qui item herbarum radicibus detrahuntur, ut capparum, mandragora, thapsia, alypia, pityusa, ac aliarum, non secus sunt siccandi, atque radices: quin etiam similiter reponendi. Succique quoque, utpote in medicina admodum necessarii, omni prorsus diligentia, ac ratione sunt conficiendi, atque ita asseruandi, ut toto anni curriculo putredinem non sentiant. Igitur non solum ab herbis eliciantur oportet, sed etiam a radicibus, ac fructibus. Qui a radicibus exprimuntur, ut glycyrrhiza, vere quidem parandi sunt, cum primum folia emergunt. Ex foliis vero, ante quam stirpes flores edant, & earum caules lignosi fiant. Ex fructibus denique, quidam cum ipsi ultimam maturitatem senserint, cuiusmodi esse debet malorum punicorum, citriorum limonum, & ex myrti baccis: quidam vero antequam ad plenum maturuerint, ut ex iuglandibus, moris, pyxantha, ligustri baccis, & acacia: quidam ex immaturis adhuc visis, ut omphacium. Horum omnium nonnulli diu insolati, aut lento igne siccati reponuntur, ut aloes, sylvestris cucumeris, absinthii, eupatorii, hypocistidis, glycyrrhizæ, & huiusmodi generis: aliqui vero humidi, fluxibilesque, reconduntur. At qui non omnibus eadem est conseruandi ratio: quippe alii paululum primum ad ignem seruesacti, moxque diligenter defecati, ut fieri solet de succo rosarum, intubi, buglosi, oxalidis, lupulorum, apii, & fœniculi. Alii vero ignem non experti tantum subsidere permittuntur, ac deinde vasis tandiu transferuntur, donec defecati pelluceant. Quod sit de succo malorum punicorum, citriorum, limonum, cydoniorum, & mororum. Veruntamen diligenti admodum animaduersione opus est (ut Galenus inquit lib. 6. de medicamentorum compositione secundum locos) in succu liquidis conseruandis: quandoquidem facile corrumpuntur, nisi seruesactis prius, & mox a facibus omnibus percolatis, olei parum superponatur, ut optime norunt solertissimi pharmacopola. Adhuc habentur varia liquorum genera, quæ quæ plurimis ex plantis distillant, ac desluunt, quorum alii gummi, alii resina, alii lacryma vocantur. In gummi genere sunt opopanax, laser, ammoniacum, sagapenum, euphorbium, galbanum, bdellium, myrrha, thus, opocalpasum, sarcocolla, styrax, & id genus alia. In resinarum vero censu sunt terebinthina lentiscina, strobilina, pinea, picea, larigna, & abiegna. In lacrymarum denique numero sunt lac, quod ex papauerum vasculis excipitur, proprie opium appellatum, scammonium, quodque ex thapsia fluit, rithymalorum omnium lac, cancamum, tragacantha lacryma, quique desluit è vitibus liquor, ex pruno, amygdalo, & ceraso. Quin & illud, quod vulgus Arabicum vocat gummi, quanquam non desunt, qui tam hoc, quam prunorum, cerasorum, & amygdalorum lacrymas malint in gummi potius referre, quam in lacrymas. Sed quoquo modo res habeat, eò tantum summa harum rerum spectat, ut exacta scilicet earum notitia habeatur, quippe non desunt mangones, & impostores, qui eas adulterent, quemadmodum & medicamenta metallica. Postremo si forsitan cuiuspiam nasuto videretur Dioscorides non parua erroris culpa suspectus esse, quod in hac præfatione absolute pronuntiauerit, ex omni herbarum genere solum Veratrum multis edurare annis, reliqua vero à trimatu inutilia esse, cum tamen in pluribus locis eius sententia reclamet Theophrastus antiquissimus plantarum scriptor: dicimus, ut hos ab huiusmodi opinione distrahamus, quod cum Dioscorides exiit in hac facultate peritissimus, consummatissimus, & omnium facile princeps, grauissimo quoque Galeni testimonio, non modo non credendum videtur, sed ne cogitandum quidem, quod non calluerit is omnes stirpium proprietates, quodque haud studiosè legerit ea, quæ ante ipsum trecentis, aut pluribus annis posteritatis memoria mandauerat Theophrastus, & aliorum veterum plerique: præsertim cum nobis perspicuum sit, quantum in his rebus describendis fuerit ipse apprime fidelis, & diligens. Verum omnibus persuasum esse debet, quod sicuti in quibusdam locis huius voluminis scriptura deficit, in aliis spuris additionibus redundat, in aliisque quandoque scaturit mendis, scriptorum culpa, atque etiam eorum, qui in scribendis, vel excudendis auctorum voluminibus plus, minusue cura impenderunt, quam sua interesset, ita etiam in hac præfatione euenisse facile potuit. Quare pro certo crediderim, longe plura hic desiderari, quam ea, quæ hac in re tradiderit Theophrastus, qui veratrum ait triginta perdurare annis, aristolochiam quinque, vel sex, chamaeleonta nigrum quadraginta, centaurium maius decem, vel duodecim, peucedanum quinque, aut sex, vitem sylvestrem vnico duntaxat anno, elaterium centenis annis, ita ut repertum esse attestetur elaterium ducentorum annorum, quod optimum erat, & pretiosum. Harum itaque rerum historias omnes tantum absit, ut credamus non legisse, notasse ac monumentis tradidisse Dioscoridem, ut ne imaginemur quidem, etsi scriptis suis non extent: quin potius locus iste nobis suspectus & deprauatus habeatur. Idcirco non Dioscoridi, sed scriptorum, & librariorum incuria id vitii adscribendum est: quemadmodum additionum redundantia accusantur ii, qui, ut earum auctores essent, ab re hoc opus augere, atque illustrare existimarunt, quales sunt spurie additiones illæ, quæ plura & Græcorum, & Hebræorum, & Arabum, & Chaldeorum, & Aegyptiorum, & Magorum, & Latinorum, aliarumque linguarum nomina coaceruant, atque in omni ferè plantarum historia in pluribus voluminibus Græcis statim occurrunt singulis capitibus. Quæ facile ex Pamphilo deprompta fuerunt: argumento quod (ut superius dictum est) ei rem hanc vitio vertat Galenus, atque sine vlla ratione sint in hoc Dioscoridis volumine importata. Cuius rei nobis postea præbuit testimonium, quod in quibusdam antiquis bibliothecis legitima Dioscoridis volumina reperta sint Græcè pluribus centenis annis scripta, in quibus nullum prorsus ex his spuris nominibus legebatur. Quorum vetustam auctoritatem simul cum doctissimo Ruellio fecutus, in meis versionibus Italica lingua conscriptis omnia illa nomina adulterina ab opere abdicavi, quemadmodum facturum sum in hoc Latino Dioscoride: etsi Hermolaus, & Marcellus vulgatis exemplaribus decepti, nomina illa suis interpretationibus reliquerint, tanquam Dioscoridi legitima. Sed quoniam non minus vtile, quam necessarium duximus, ut omnes ii, quibus in animo est plantarum peritiam assequi, sciant ad vnguem quo arbores a fruticibus distideant, frutices ipsi a suffruticibus, & suffrutices ab herbis, dixerim ego Theophrasti auctoritate, omnes illas stirpes Arbores appellari debere, quæ ab radice statim simplici caudice surculofo, dissolutaque contumaci assurgunt, a quo per interualla tanquam brachia, exorti rami latius diffunduntur, uti olea, ficus, malus, pyrus, quercus, ilex, & id genus alia. Frutices vero, quæ ab radice caudice multiplici, ramosoque sese attollunt, in quorum classe sunt rubus, rosa, paliurus. Suffrutices, qui inter herbarum genera annumerantur, ab radice caulem emittunt, lignosis adnascantibus ramulis, foliisque minutis, quæ non velut aliarum herbarum folia quotannis arefcunt, & decidunt, sed perpetuis foliis toto anno virefcunt, ut stœchas, ladanum, ruta, hyssopum, saluia, & eiusdem generis alia. Herbarum denique generi subscribuntur reliquæ planta, quæ inter initia folia tantum sine caule pãdunt, ac deinde in caulem erecta, flores, & semina ferunt, ut cerealium omnia genera, olera, quæ in hortis ad cibos feruntur, & syluestrium ferè innumera, quæ sponte sua in pratis, campis

Cortices quomodo siccandi, & reponendi. Succique quomodo exprimendi, conseruandi que sint.

Gummi las chrymæ, & resina.

Dioscorides defenditur à calumnia.

Simplicium nomina varia Dioscoridi adulterina.

Arbores.

Frutices.

Suffrutices.

Herbarum.

Plantarum degeneratio.

campis, ac aliis compluribus locis proueniunt: tamen ex eis nonnulla habeantur, qua neque caulem, neque flores, neque semina gignunt, vt phyllitis, asplenium, cynoglossum, hemionitis, onosma. His ita determinatis, sciendum praterea est, herbas assiduo quodam cultu, ac diligentia nonnunquam arborescere, quod maxime malua accidit. Hanc enim pluries vidi senis, septenisve mensibus cultam, tanta caudicis longitudine, crassitudine, & duritie proficere, vt hasta instar grandesceret. Frutices quoque aut temporis diuturnitate, aut cultorum mangonio in arbores non pumilas exeunt, vt vitex, hedera, myrica, paliurus. Contra similiter fit, vt arbuscula quaedam, si desit alimentum, aut si nullo cultu adhibito dimittantur syluescere, a sua natura ita recedant, vt in frutices degenerent. Quandoquidem hi tum per adultam etatem, tum per cultus rationem, vendicato sibi robore, crassos pradurosque, fundunt caudices ac ramos. Ille vero tamquam indomita furculis, stolonibus, ac germinibus, qui circa caudicem & radices adnascuntur, luxuriantes, solidos ita ramos debilitant, & infirmant, subrepto illis humore, vt in frutices sensim elanguescant, vt myrto, lentisco, & corylo

Stirpiu mutatio.

quandoque euenisse comperimus. Tantum enim in plantis natura germanitas potest, vt non solum saepe praedictos praestet effectus, sed etiam vt alteram in alteram stirpem facile vertat, vt cassia in cinnamomum, silybrium in mentham, triticum in lolium, hordeum in auenam, & ocymum in serpyllum. Porro ex his omnibus herbarum generibus quaedam satiuae sunt, quaedam agrestes. Has volunt nonnulli priores fuisse satiuas, cum earum permultas domita culta feritate mansuescere in hortis liquido constet: etsi in permultis quoque & syluestre, & satiuum genus inueniatur, quarum aliae saecunda sunt, aliae steriles: aliae florent, aliae floribus orbantur: aliae perpetua fronde virent, aliae folia amittunt. Quod non aliunde prouenire scribit Theophrastus, quam a loco ipso, vbi nascuntur, sicuti ab aere eas ambiente: tamen si

Plantae meliorescunt celi clementia, & loci amicitia.

id accidat interdum particulari radicum vitio. Magni quippe refert, vt saecunda, florida, & perpetua virentes planta conseruentur, si clemens caeli constitutio, situsque germanitas adsit. Quare nil mirum, si circa Memphim, & in Elephantio agro sicubus, ac etiam vitibus folia nunquam decidant, quodque in insulis, aliisque regionibus nuper in Indiis occidentibus a Lusitanis, & Hispanis repertis, nulla spectetur arbor, qua sempiterna coma non vireat. Neque item admirandum, quod reperiantur arbores proceriores, virentiores, aspectu pulchriores, & magis frondibus & fructibus exornatae

Plantarum situs naturales, vbi late nascuntur.

in hoc loco, quam in illo: namque aliae hoc situ latantur, aliae illo, pro sua quaque natura ratione. Proinde videmus, quod quaedam motes amant, vt cedrus, larix, abies, pinus, picea, terebinthus, buxus, iuniperus, fagus, carpinus, ibi procerae admodum, formaeque insigni profiliunt. Quemadmodum in planities & collium nemoribus quercus, cernuus, suber, ilex, lotus, vlinus, acer, fraxinus, corylus maxime proficiunt. Iuxta flumina, & in aquosis latiores proueniunt platanus, alnus, populus v-

In Montibus. In planitie. Iuxta flumina.

traque, myrica, salix, harundo: etsi harum permulta non aequae late in montibus, vallibus, planis, & syluis exultent. Id quoque discriminis in herbis, & fruticibus visitur, quaedam enim paludibus enascuntur: aliae in lacubus, & stagnantibus aquis exiliunt: aliae litora, & flumina ripas desiderant: quaedam humidos, aquosos, vliginososque, amant tractus: quaedam aquas odere, & ob id arida & saxosa sequuntur. Nec etiam desunt quae in humidis & siccis locis vitam ancipitem agant. Sunt deinde quae in campestribus degere cupiant, quae vinetis latentur, quae pratis gaudeant: praterea quae valles, quae colles, quae denique editos querant situs. Aliae quoque vrbianioribus locis alleceta iuxta vrbium, & oppidorum moenia in maceris, & ruderibus prodeunt. In palustribus, & humentibus locis, ac secus magnarum scrobium aggeres feliciter enascuntur platago, coronopus, poterium, scordium, ranunculum, cleofelinum, sphodylium, lysimachia, alisma, chelidonium minus, epimedium, petaphyllum, erinus, equisetum, limonium, heliotropium paruum, verbenaca, tusilago, hydropiper, onobrychis, conyza tertii generis, eupatorium commune. Et magis palustribus gaudent cyperus, typha, sparganium, iuncus. At tam lacunosis, quae admodum palustribus innatae, nymphaea, potamogeton, lotus Aegyptia, colocasia, foliis & in aquis conditis, & extra eminentibus. Malabathrum similiter in India paludibus nascitur, atque nobis in Italia oryza, hippolapathon, ac millefolium stratiotes. Tribulus aequae in lacubus, paludibus, fluminibus nascitur, atque in mari: quorum litoribus ac ripis familiare spectatur nerium. Adiantum, itemque, trichomanes vliginosis specubus gaudent, praesertim si secundum amnes existant: aut asperginosas sequuntur ripas: quae praeruptis locis inherant. Vitex deinde, elichryson, boniam, botrys, rha, fluminum ripas accolunt. Crithamum vero, brassica marina, androsaces, corniculatum papauer, dorynium, solanum somniferum, glaux, hipophaes, hippophaestum, tragium, tithymalus paralius, peplus, alypon, absinthium seriphum in maritimis tum in litoribus, tum scopulis, tum etiam collibus emergunt. Tripoliu etiam in maritimis exurgit, vbi scilicet alludit vnda, iterumque recedit, modo in mari, modo in sicco degens. Non nisi aquis proueniunt bryothalassio, corallium, & alga. At in riguis fontium, praesertim quae hyeme tepescunt, sicut, atque aquaticum silybrium vna innatae, vt quasi inuicem fraternam videantur iniisse amicitiam. Ceterum ex his, quae in continenti nascuntur, arida, & siccis loca petunt eryngium, satureia, lythospermum, lycium, salua, stachys, onosma, lachitis, cynoglossum, echiu, buglossum, chamapitys, verastrum nigrum.

In palustribus locis.

In lacunosis.

In vliginosis locis.

In litoribus & scopulis.

In fontium riguis.

In aridis & siccis locis.

In opacis. In humidis. In collibus.

In cultis. In incultis. In pratis.

In vinetis. Intra & extra oppida.

In campestribus.

Circa sepes. In Montibus.

Aridisimisque, & saxosis exurgunt capparis, libanotis, symphytum petraeum, saxifragum, helxine, hemionitis, sedi vtrumque genus, coryledon, cymbalium, polytrichon, paronychia, asplenium, clinopodium, circa, lichetum, ita vt harum pleraque saepius in adificiorum ruinis, ac saxosis admodum locis vireant. In opacis autem nascuntur chrysocome, asarum, viola purpurea, asfragalus, & cyclaminus. In humidis clematis prima, quae & secus aggeres inuenitur: item phyllitis, hemionitis, althea, helenium, paludapium. Collium amoenitate capiuntur spartium, nepeta, syluestre cuminum, chamadrys, etsi non odedit etiam aspera, & saxosa: item phalangium, thymum, quod etiam petroso solo nasci videmus: quin & holostium. Culta deinde virent lagopode, elatine, ornithogalo, coriandro, hyacintho, hypocoo, chamacisso, aglyope, osyride, aphaca, orbancha, melanthio, bupthhalmo, anthemide, syluestri papauere, xyphio, leontopetalo, phoenice, hyperico, cyano. Inculta vero virent psyllio, hieracio. Pratis latentur trifolium, lotus syluestris & vrbana, anonis, daucus, carum, tragopogon, oxylapathum, centaurium minus, hemerocallis, colchicum, betonica: quanquam hac & colles, & montes abunde scaeteant. In vinetis aluntur telephium, portulaca syluestris, peplus, helxine hederacea, ampeloprasmus, capnos. Tam intra, quam extra oppida, & vrbes in plateis, monumentis, parietinis, ruderibus, propter muros, & hortorum sepimenta visuntur verbascum, blattaria, thlaspi, iberis, malua, chelidonium maius, vrtica, ebulus, sambucus, erysimum, aristolochia longa, marrubium, chrysanthemum, galiopsis, senecio, terrestri tribulus, fideritium, eupatorium, hyoscyamus, cicuta, personata, xanthium, syluestris cucumis. Campestris carduorum omni genere horrent, attractyli, ferulis, syluestri faniculo, gramine, thalictro, bunio. Agrorum, & pratorum sepibus haerent ruscum, asparagus, rubus, rhamnus, ligustrum, rubia. Ephemero autem, hippoglossum, filice, planities syluae vireant. Montes adamant nardum tam iudicum, & Syriacum, quam Celticum, & montanum, centaurium maius, mandragoras, basula,

basilicaria, satyrium, testiculus, gentiana, ligusticum, alysson, smyrnium, veratrum album, ruta sylvestris, potentilla, polygonatum, tithymalus characias, polium, ptarmica, thymela, chamaelea, glycyrrhiza, asclepias, r. arctifolia, thapsia, peonia, ethiopia, clymenum, onagra, cacalia, acenitum, daphnoides, byssopum agreste, peucedanum, thamadaphne, tormentilla, bistorta, chamaeleo albus, angelica, libanotis. In sylvis montanis emicat leuca-
 10 *gambra, atque inibi in praeceptis locis petroselinum, & Rhodia radix.* Sunt praeterea, qua arboribus innasci velint, In montanis
 In arboribus.
 In quibus resident, atque ab iisdem suscipiunt alimentum, vt agaricum, viscum, sphagnos, polypodium, dryo-
 poteris, lichen. alia quidem in arboribus conspiciuntur, alia vero prius e terra exorta, per arbores repunt, quemad-
 modum lalrusca, vitis nigra, bryonia, hedera, clematis altera, smilax tam lauis, quam aspera, lupus salictarius,
 canudiuulus, periclymenum. Non desunt etiam herbae, qua sine radicibus in aliis herbis proficiant, neque alibi,
 quam in illis reperiantur, vt cuscuta, epithymum, epithymbrium, & epistaba. Veruntamen illud scire conuenit, In aliis platis.
 quod etsi harum omnium quaeque sua natura feliciter proueniant in praedictis locis, suosq; vnaquaeque sequatur situs:
 nihil tamen obstat, quin eadem modo in montibus, modo in planis, nunc in collibus, saepe in vallibus, nonnun-
 quam in agris, & pratis, ac etiam in aliis variis locis nullo discrimine inueniri possint. Et hac satis sint quantum
 ad utilitatem plantarum situm. Ceterum vt, quantum per me fieri potest, harum rerum non minus utilis, quam necessa-
 ris doctrina exerceatur, augeaturq; iam ad singulas herbas, um partes noster se conuertet sermo, & de radicibus, foliis,
 caulis, floribus, ac seminibus differemus, primo a radicibus, veluti a basi aliarum partium, rem ipsam exordientes. Plantarum in
 radicibus va-
 rietas:
 Primum itaque omnia multis nituntur radicibus, iusq; tenuibus. Legumina vero singulas habent radices praeter fa-
 lica, easq; surculosas, & duras. Sic & olera sepe omnia singulari radice coherent, vt lactuca, apium, beta, buglossum,
 rutabrus, cichorium. Quinctiam radice singulari sustinentur, sylvestris ruta, quam hamaalam vocant, peplos, crate-
 geomum, ephemerum, & saepius verbenaca. Contra numerosis radicibus donantur, asarum, phu, baccharis, veratri
 nigrum, veratrum album, capparis, cithamum, hastula regia, chelidonium minus, asclepias, cyroca, alcea, ethiopia, gra-
 minum, filix femina, muris auricula altera, plantago, chrysome, asparagus, ruscus, hippoglossum, panaces Heracle-
 um, henionitis, peonia femina, alisma. At nardi Indici, & Celtici radix in spica modum capillatur. Praegrandi
 firmiq; radice exurgunt helenium, bryonia, mandragoras, scammonium, sylvestris cucumis, vitis nigra, rapum,
 nymphaea, colocasia, radix Rhodia, & China nuper ex Indis occidentalibus importata, dracunculus, aloë, centaury
 maior, maius, libanotis, sphondylium, ananthe, symphytum secundum, papauer corniculatum, raphanus, cardus
 periclymenum, solanum somniferum, smilax aspera, thapsia, hippophaes, hippophastrum, tithymalus characias,
 ptyusa, Rhabarbarum, Rhaponticum. Contra exiguam tenuemq; radicem gignunt hydropiper, catanances genus
 secundum, ranunculus, panaces Asclepium, & thionium, phalangium, trifolium, anthyllus, bechium, onobrychis,
 holostium, britanica, epimedium, onagra, tragum secundum, leontopodium, verbenasa supina, phytocoma, pan-
 30 *cratium, aconiti tertium genus, chamacissos, asarum, vtrunque veratrum, plantago minor, coronopus, sesa-*
moides, origanum sylvestre, alypon, attractylis, heliotropium maius, onosma, rubia, cepaea, alisma, betonica,
chamaefyce, gingidium, centaury minus. Radices in lignum durefcunt ethiopia, smilaci aspera, poterio, lenca-
 rache, astragalo, tithymalo characia, cypero, rhododendro. At molli, lentaq; radice constant althaea, acan-
 40 *thus, alcea, malua, symphytum maius.* Geniculatae veluti arundinibus, sunt iridi, acoro, polygonato, rusca,
nymphae, xyridi, hippoglossi, gramini, lauro Alexandrina, colocasia, galanga, gingiberi, radice China nuper
inuenta, & Rhodia. Radicem digiti crassitudine fundunt orobanche, eryngium, polygonatum, peonia mas, py-
 50 *rethrum, daucus, pastinaca sylvestris, symphytum petraeum, dorycnium, ebulus, echium, cithamum, elaphobo-*
scum. Bulbosa autem insunt ceparum modo, lilio, hemerocallidi, capio, bulbis, hastula regia, allio, porro, croca-
narcisso, xiphio, testiculorum omni generi, satyrio, ornithogalo, ephemero, arisarum, hyacintho, dracunculo, an-
pelopraso, scorodopraso, moly. In globum extuberant radices aristolochiae rotunda, cyclamini, apij vomitorij, leon-
 60 *topetali, ananthes, peonia femina, rapi, chrysoconi, periclymeni, cyperi, argemones, catanances secunda, pycno-*
comi, geranii vnius, pseudoapij, antora. Insuper radices inter se disident, tum colore, tum odore, tum sapore: qua
 discrimina si recte cognoscantur ab his, qui breui hanc facultatem assequi desiderant, non parum inde hauri-
 ent utilitatis. Sicuti & maxime confert scire, qua sint radices magna vel parua, qua dura vel molles, qua
 numerosa vel pauca, qua ceparum vel tuberculorum effigie, qua denique geniculatae, de quibus hucusq; abunde
 differuimus. Sed iam de coloribus agamus. Nigricat foris chrysoconi radix, etsi canticet intus: item papaueris
 70 *cornuti, nardi montani, helenij secundi, cyclamini, chamaeleonis, cardui, hastula regia, libanotidis, rhapontici,*
quonquam huius interna rubescant, peucedani, leontopetali, epimedij, nymphae, eryngij, symphyti secundi,
smyrnij, echij, veratri nigri, astragali, anemones, mandragora, aconiti tertij generis, thapsiae, personatae, filicis maris,
vitis nigrae, aristolochiae vtriusque, quarum tamen interna buxco colore pallent, peonia femina, tametsi huic, sicut
 80 *etiam thapsia, & mandragora delibrata exalbeat.* Contra e candida proueniunt radice plantago, polygonatum, dra-
 cunculus, arum, arisarum, ranunculus, veratrum album, anonis, ligusticum, asparagus, ruscus, hippoglossum, elapho-
 90 *phoboscum, libanotis, sphondylium, rapum, radix, circaa, alcea, holostium, tragum, trifolium, narcissus, allium, por-*
rum, gingidium, iberus, hipposelinum, tripolium, iris, panaces Heracleum, tragum, somniferum solanum, arctium, on-
agra, chamacissos, scammoniam, althaea, ptyusa. At non prorsus albae, sed subalbidae radices tributa sunt aro- palemo-
 100 *niae, helenio primo.* Rubet rubia, centaureo magno, rhabarbaro, tametsi tria haec exterius nonnihil nigricet.
 Quae rubent.
 Quae subru-
 bent.
 Quae intus
 flauescunt.
 Quae virefcus
 Quae bene q-
 lent.
 Dulces.
 he petaphyllo, heptaphyllo, beta tertij generis, blitum, carota, anchusa, lycopsi, onosmati, chrysocono, quaequae exteri nigri-
 cat. Non plane rubra, sed subrubra radice sunt acathus, phu, satyrium erythronium, xyris, radix Rhodia, solanum somni-
 ferum, alypum, costus. Ex atro rubescunt filicis femina, cypero, pycnocomo, ephemero Colchico. Rubro colore purpu-
 110 *rascunt radices symphyti petrae, ceparum, setilla, pancreatij.* Flaua intus radice sunt aristolochia rotunda, glycyrrhiza,
 lapathum, hippolapathum, cyperus Babylonicus, argemone, chelidonium maius, gentiana. At herbaceo colore insunt po-
 120 *lypodio, phalangio, smyrnio, & imperatoria.* Odorata radice fragrant, iris, acorus, meon, cyperus, galaga, Zedoaria, nar-
 130 *du ta Gallicum, quam Indicum, asarum, phu, caryophyllata, baccharis, ligusticum, pastinaca, angelica, feseli Masiliense, hippo-*
selinum, smyrnium, libanotis, asclepias, circaa, alisma, tripolium: quin & radix Rhodia odore expirat non iniucudu. Dulcedine
 gustui praeber glycyrrhiza, tragopogonis radix, centaury maioris, chamaeleonis albi, elaphobosci, geranii, arctij, polipodij.
 140

Amaræ.

Acorus.

Foliorum in
plantis com-
paratio, & si-
militudo in-
ter se.Foliorum in
coloribus di-
scrimen.

Amaritudinem verò gentiana, ranunculi, beleni, dictami candidi, leucacantha, panacis Heraclei hippophaei, panacis, scilla, cichorii, asparagi, ruscii, centaurii minoris, chelidony maioris, asphodeli, cyclamini. Acri autem radice deprehenduntur ginger, acorus, galanga, Zedoaria, Imperatoria, crocodylium, angelica, panaces Chironium, smyrnium, pyrethrum, alisma, tripolium, raphanus tum sativus, tum sylvestris, vtraque iberis, nasturtium, thlaspi, argemone, hydropiper, arum, dracunculus, crysimum, opbioscorodon, ampeloprasum, scorodoprasum, capa, allium, porrum, scandix. Quo sit, ut si exacta notitia differentiarum habeatur, quæ in radicibus forma, numero, colore, odore, ac sapore notantur, maximum inde percipiant emolumentum, qui magna animi delectatione in hac simplicium medicamentorum facultate operam impenderint. Ac præterea plurimum eisdem contulerit, si omnes stirpium delineationes, similitudinesq; (de ijs intellige, quæ scriptis tradi possunt) eam eam pariter & odores, & sapes assequantur, eo inquam modo, ac ratione, quo hic à nobis adnotata reperiuntur. In primis igitur a similitudine, quam inter se ineunt plantæ, exorsus, pro viribus enitatur, ut quæ plurimis ignota sunt, ijs, quæ omnibus sanè vulgares apparent, recte comparentur, quæ propter abbedera primum, ut quæ neminem lateat, rem ipsam auspicabor. Hederam igitur folijs emulantur, et si quedam maiora, quedam verò minora cernantur, scammonium, asarum, vterque cyclaminus, simlax aspera, leuis, & her-tensis, vitis nigra, marina brassica, Acthiopicum seseli, periclymenon, aristolochia vtraque, asclepias, epimedium, gramen parnasi, apocynum, viola purpurea, chamacissos, helxine cognomento cassampelos, cinocrambe, hortense solanum, halicacabum, circea, cucumis tam sylvestris, quam sativus, vtraque clematis. Vitigineum folium representant platanus, acer, lupinus, ricinus, bryonia, veratrum nigrum, balsamina, colocythis, cucumis, quem Veneti anguriam vocant. Alba spina, & acanthium simili virent folio: sicuti abrotanum scamina, & absinthium seriphium vocatum folijs se invicem imitantur. Vitex & anagyris, & folijs & ramis conveniunt. Apij folia referunt caucalis, secundum dauci genus, laferpitium, smyrnium, bunium. Amygdala fronde vestiuntur, persicus, rhododendrum, ebulus, sambucus, staphylo-dendron, lathyrus, quam officina cataputiam nominant. Anisum deinde isopyro folijs adstipulatur, anagallis antyrrhino, atriplex xanthio. Vtriusque rubie folia imitatur aparine, ac galium: quanquam illis maiora, huic verò minora spectentur. Porri bulbique folia præferant hyacinthis, narcissus, allium, colchicum, cyperus, hastula regia, ampeloprasum, scorodoprasum, canini testiculi, lonchitis. Buxus, & lycium consimili comantur fronde. Vitis alba amomo folijs correspondet, pyrethrum sylvestri dauco, hemionitis dracunculo, coris erica. Fœniculi folia emittunt altius asparagus, panaces, asclepium, seseli, daucum Creticum, anthemis, libanotis, buphtalmos, anethum, thapsia. Anethi folijs assurgit mecon. Plantagini non dissimilia sunt folia candidi veratri, gentiana, alismatis, & clymeni. Phœnij folium geranium exprimit, Filicem folio emulantur sideritidis secundum genus, polypodium, dryopteris. Ferula cicutam foliorum imagine refert, hac verò myrrhidem. Buglossum, & cirsium consimili modo foliantur. Graminis folium proferunt moly, bolostium, gramen arundinaceum, coronopus. Huius verò folia habet catanance, psyllium. Cichorium, chondrylla vtrunq; genus, & quibusdā dens caninus dicitur, consimili sunt folio. Cnico atractylis folio assimilatur, chamaleoni nigro crocodilii, chamaleoni albo silybii. Glasto tripoliū simile est. Coriandri folijs comatur partheniū, adiantū, sideritis tertia, omnia ranunculi genera (quorū tamen quedam propius, quedam longius eius specie sequuntur) vterque daucus, thalicttrum, capnos. Helxines folia produnt anagallis, alsine, muris auricula, cannabis, aut quinque folii eupatorium, sed quæ quadrupertito diuidantur. Cotonei mali frontem exhibent capparis, solanum somniferum. Smyrni folium præstant pba, lauer. Cupressi effigiem promit sabina: iuniperi cedrus minor quæ phœnicia dicitur. Hypericum, androsamum, ascyrum, folio non discrepant. Cistus, & ladanus sicuti in specie, ita & in folijs conveniunt. Cyclamini folium pandit aconitum primum: ciceris teucium, securidaca: cumini sylvestris stratiotes millefolium: cucurbitæ personata: lolij phœnix: iuglandis centaurium maius, peonia mas, gentiana: et si huic magis cum plantagine convenias. Iris folia reddunt, acorum, medion, sylvestris iris: item gladiolus, nisi hic breviora, angustioraq; folia sibi vendicasset. In iunci specie collocandum esset vtrunque equisetum, sed inani caule assurgit. Lenticula folium simulant aphaca, onobrychis, chamaefœ, belonium alterum, anonis, trichomanes, polygala, glaux. Laureæ fronde virent polygonatum, clematis prima, daphnoides, nerium, chamadaphne. Lili folia spargunt hemerocallis, panacium, satyrium, martagon (sic enim appellant liliū quoddam agreste) ephemerum, onagra. Lentiscum referunt glycyrrhiza, tragus. Nec lepidium arabis dissimulat. Lactuca effigie folia ferunt dipsacus, sylvestris lactuca, lycopsis, anchusa, sylvestre glastum, mandragoras scamina. Lingua bubula similia sunt symphyti alterius folia. Myrti folia ruscus habet, tithymalus scamina, & caritubus. Mentham sativam folio exprimiunt sisymbrium, hydropiper, pentaphyllon. Marrubij effigie assurgit apiastrum, ballote, hormanum, sideritis prima. Mercurialis folio est cinocrambe: Helxine & elatine folio simili comantur. Nasturtij folijs iberis non refragatur nec thlaspi. Oleam emula foliorum facie representant halimus, ptarmica, phyllyrea, ligustrum, vitex, conyza, thelygonum, caninus testiculus, lithospermum, dorycnium, hippophaes. Platanum folio imitantur ricinus, nigrum veratrum, sphondylium, aconitum cinocotum. Verbasci folia fundunt helenium, ethiopi, arctium, buglossum, & tithymali genus latifolium. Pastinaca, & gingidium folijs inter se non dissident. Portulaca folio assimilantur telephium, cepæa, crithamum, terrestris tribulus, tithymalus helioscopius. Trifolio correspondent lotus sylvestris, medica, citisus, fertula campana. Thimum, stœchadem, satureiam simile comat folium. Acuta spina, & mespili primum genus simili virent folio. Nec dissimili pulegio dictamnium & calamintha comantur. Mirice sabina, & cupressi: serpilli clinopodium: salvia sideritis prima, hormanum, verbascum sylvestre, folijs vestiuntur. Piceæ folium ferant polygonum, & pityusa: quercus verò chamedrys, teucium, scordium, betonica, sideritis prima. Neque à rusa folijs dissident acacia altera, centaurium minus, serpillum sylvestre, ambrosia, polygonum primum, androsamum, polemonia, peplus, paronychia, hypericum, apios. Aloa, & scilla similia tributa sunt folia. Sampsuchi folium ostendunt marum, & panaces chironium. Solani folio germinant Circea, halicacabus. Rumicis folia emulantur arum, phyllitis, britanica, & quæ vulgo bistorta dicitur. Foliorum similitudine inter se certant ruscus, hippoglossum, laurus Alexandrina. Aspleni imaginem præbent muris auricula altera, & altera lonchitis, sicuti semperivi minoris tertia ainge species, aristolochia clematis. Salicis fronde provenit lysimachia, fertula Campana ligusticum. Silybus, chamaleo albus, carduus, alba spina, sese folijs imitantur. Ex his igitur facile quisque barbarum germanitatem, cognationem, similitudinemq; perdiscere poterit, quæ omnia in dignoscendis stirpibus non parvam adferunt utilitatem. Ceterū plantarum omnium folia non modicam in coloribus differentiam habent, tamen si folia ipsa coloribus adeo perspicuis, uti flores laudquaquam splendent.

de his. Nigri sunt color in nullis reperitur herbis, neque arboribus, quamuis nonnulla atro quodam virore sint suffuse; ita ut paululum nigricent, sicut piblyraa, buxus, lignustrum, hortense solanum, nigra viola, osyris, hyoscyamus, vtraque elenacis. Contra nec folia habentur, que niuem candorem exprimant: verum pleraque, que incana sunt, subalbicant, ut crithamo, echis, ranunculo, abrotano, absinthio, salvia, calamintha, maro, periclymeno, corniculato papaveri, stachy, menthaastro, althaea, polio, verbasco, vtrig, lychnidi, & mandragora mari: qua omnibus supernè candicant, quemadmodum infernè rosmarino coronario, beebio, olea, populo, artemisia, & aliis multis. Rubent punica malo, amygdalo, lentisco, terebintbo, rhoi, cyclamino, botry, cori, androsamo, ascyro, lonchiti, osyri, blite, amarantbo, phyco marino, sesame, irioni, arriplici, alypo, Celtico narao, & cuidam beta generi. Folia, que lanugine pubent, insunt dictamno, verbasco, lychni, gnaphalio, acanthio, althaea, menthaastro. Aspera sunt symphyto alteri, marrubio, fico, salvia, ballota, & bituminio. Aculeus horrent folia buglossi, echis, vrtice, eryngij, rusci, attractylis, sonchi, chameleonis vtriusque, dipsaci, quinquifolij, cardui omne genus, aquifolij, & ilici. Humi iacent panacis folia, coronopi, anchusa, mandragora, vtriusque, amallidis, cynoglossi, glauci, catananea secundi generis. Reptant etiam humi lithospermi, graminis, onosmati, canis testiculi, albiq, chameleonis. In vniuersum planta omnes, que caule & floribus orbantur, folia per terram spargunt. Acuta folia, ut que olfactu nares feriant, data sunt allio, cepis, nasturtio vtrig, tam aquatico, quam terrestri, sinapi, eruca, lepidio, giugidio, hydropiperi, crysuic, tlematidi secunda, thlaspi, serpyllo, thymo, thymbra, sifymbrio, pulegio, calamintha, dictamno, dracunculo, atro, flammula, origano: qua omnia non modò olfactu, sed magis etiam gustu acrimoniam præbent. At miratitatem possident chondrylla, cithorium, gentiana, ruta, absinthium, aphaca, abrotanum, partiberrum, scandax, aloë, santonicum, seriphum, chamedrys, marrubium, scordium, glaucium, chameleaa, empetrum, & quæ vniuerso gratis Dei delectorie facultatis herba dicitur. Olorata folia sunt asaro, sio, sifymbrio, menthe, menthaastro, calamintha, pulegio, salvia, ladano, hyssopo, sampsocho, origano, thymo, serpyllo, satyria, symphyto petreo, rosmarino, ligustico, stachy, malabathro. Nec insuauem essant odorem betonica, chamedrys, baccharis, artemisia minor, & herba illa, qua aliqui selaream, nonnulli herbam sancti Ioannis, & plerique matrisalviam nuncupant. Nec desunt stirpium folia, que ab aliis tum plantis, tum liquoribus odorem emendicasse videntur, ut scordium ab allio, trifolium à ruta, & bituminis, cytisus ab eruca, apiastrum à citreo malo, chamedrys à pino, xanthium à nasturtio: ita denique hydropiper à pipere mutuatur odor. Grauius olent absinthium, abrotanum, seriphum, ballota, polium, ebulus, botrys, aristolochia, canabis, anagyris, galiopsis, cicutia, mandragora, apocynum, glaucium. Non parum quoque discriminis in plantarum tum caulibus, tum stolonibus reperitur: quandoquidè ex eadem quædam singularem, simplicemque, caulem proferunt: alie numerosos cauliculos edunt: quibusdam crassi caules insunt: alie tenues assurgunt: alie inanes, & vacui eriguntur, fistularum, & arundinum instar: alie pleni conspiciuntur: quibusdam item longus profilit caulis, quibusdam verò breuior, nonnullis caules geniculati sunt: alie enodes exeunt, alie laeure, alie scabritie, alie duritie, alie lentore notantur. Nec desunt, qui lanugine vestiuntur, & qui spinis, & aculeis rigeant. Quibusdam plantis teretes sunt, nonnullis quadranguli, & aliquibus striati. Alij denique sursum eriguntur, alij per terram serpunt, ac repunt. Disident præterea inter se stirpium caule: colore, rectitudine, & curuitate: tanta fuit natura in plantis ferendis varietas, atque solertia. Plures igitur caules ab vna tantum radice exiliunt glasto syluestri, ptarmica, plantagini, maris, aureale, xelephio, aristolochia vtrique, ruta syluestri, hyperico, elatina, phœnici, trago, solano, jonnisero, & manico, vniuerso sedo, chamecisso, glauci, osyri, tithymalo parali, helioscopio & thymelæa. Ramoso, ac pariter furculoso caule fruticant salvia, satyria, thymum maius, origanum, hyssopum, absinthium, abrotanum, ruta, stachas, ocimum, amaracum, symphytum petraeum: & ut summum rem complectar, omnes denique planta, que suffrutices appellantur. Crassum caulem mistunt dracunculus, chameleo niger, cyanthe, helenium, symphytum alterum, hyoscyamus, personata, sedum maius. Contra proditur tenuis ornithogalo, thlaspi, polemonia, ranunculo, limonio, anemone, ligustico, panaci Asclepio, peucedano, artemisia, phyllo, cynocramba, buphtalino, alismati, betonica, eicio, eupatorio, plantagini, chelidonio maiori, vniuerso auricula, aristolochia vtrique, seripho, tragorigano, menthe, sifymbrio, lysimachia, ruta syluestri, delphinio, melanthio, agresticuminio, aparina, chamedry, scordio, teucro, trifolio, hyperico, sideritidi secunda, elatina, pentaphyllo, veneris umbilico, chamedaphna, tithymalo helioscopio, thymelæa, alypo. Inanes in vniuersum, ac fistulosos caules habent frumenta, legumina, & olera. Particulatim verò cauis emicant colliculus phu, apium montanum, sonchus, veratrum album, gentiana, equisetum, narcissus, ricinus, cicutia, lathyrus, hieracium maius, symphytum secundum, spina alba, cepe, porrum, hipposelinum, thapsia, ferula omne genus, omnesque planta ferulacea, qualis cicutia, panaces, laserpitium, seseli Peloponense, & que guttatim stillant sagapenum, galbanum, & ammoniacum. Geniculatum culmum gerunt cerealia omnia: quin & ebulus, sambucus, phu, cyclaminus secundus, gentiana, panaces Asclepium, polycnemon, crateogonium, polygonum, equisetum, ferula, cicutia, meon, odoratus iuncus, pityusa, arundinum omne genus, hydropiper, ligusticum, xyphium, & omnes denique planta, que feniculaceo caule assurgunt, ut elaphoboscum, anethum, seseli Massiliense, pyrethrum, sphondylium, peucedanum. Leui constant caule dracunculus, hastula regia, typha, nymphæa, sideritidis tertium genus, chrysanthemum, aconitum lycoctonum, gentiana, acanthus, aloë, iberis, hyacinthus, millefolium, chamedaphne. Dodrantali caule exeunt chameleo niger, tripolium, hyacinthus, arum, sesamoides, dauca Creticum, caucalis, caninus testiculus, epimedium, hypericum, sideritidis tertium genus, centaurium minus, & minus, syluestre cuminum, tusilago, cyanthe, anthyllis, anthemis, coris, ocimoides, achillea, elatine, pentaphyllum, tragus, ageratum, papauer spumeum, psyllium, aconitum primum, colchicum, semperuiuum minus, umbilicus veneris, stratiotes millefolium, chamecissos, glaux, polygala, laurus Alexandrina, tithymalus myrsinites, paralius, helioscopius, & cyparissias: item chameleaa, & verbenaca. Duum verò palmorum longitudine caules extollunt phalaris, thlaspi, melanthium, pzonia, veratrum album, cynocrambe. Caulis cubiti altitudine adolescit petasita, plantagini minori, ranunculo, phu, rosmarino, chelidonio maiori, baccharis, panaci Asclepio, sphondyllo, satyrio, alsina, betonica, saba Aegyptia, crithamo, arabidi, asphodelo, lepidio, xyridi, eupatorio, syluestri papaveri, aconito tertio, semperuiuo maiori, fenecioni, verbasco femina, cytiso, xanthio, rusco, daphnoidi, chamedaphna, lathyrus, primo silicis generi, cnico, gladio, ascyro, lysimachia. Interdum cubiti longitudinè caule excedunt alisma, cyperus, tithymalus characias, pityusa. At horinum semicubitali caule contentum est. Binum cubitorum longitudinem caule equant dracunculus, gentiana, spina alba, acanthus, coniza maior, althaea, symphytum secundum, helenium, glastum, glycyrrhiza, centaurium maius, dipsacum.

Caulium in plantis differentia.

Florum in
plantis var
ricas.

dipsacum, carduus, fefeli Aethiopicum, lycopsis, sideritis fetanda, manicum solarum, sylvestris lotus, cirsiium. Quater-
nam cubitorum caulis exit moly: tricubitalis vero medio. Davis lignosisque nituntur cauliculis hypericum, chamadrys,
teucrium, symphytum petraeum, androsimum, ascyrum, satureia, thymum, origanum, millefolium, eupatorium, aster
Articus, hyssopum, stachas. Lentore & mollitia caules languescunt irioni, poterio, malua, smilacibus omnibus, cucur-
bitis, peponibus, & melopeponibus, cucumeribus, lupino, periclymeno, bryonia, viti nigra, vicia, helxina, quam cissam-
pelon cognominant, scammonio, iunco, typha, althaea, alcea, solano somnifero, ofyri, rusco, daphnoidi. Spinis horridum
gerunt caulem dipsacum, poterium, agriacantha, scolymos, paliurus, rubus, canirabus, hieracium maius, stæbe, rosa.
Spinosa prorsus lanugine obducuntur urtica caules, echij, anchusa, lycopsis, buglossi. Hirsutus caulis uisitur menthastro,
erobancha, helenio, ocimoidi, eupatorio, herba quam pilosellam vocant, secundo symphyti generi. Lanuginosa caulem
nutriunt acanthium, gnaphalium, verbascum, lychnis utraque, tussilago, althaea, anemone, panaces Heracium. Sea-
britia & asperitate caulium sunt pastinaca, rubia utraque, lupus salictarius, aparine, baccaris, sylvestris cnicus, ethi-
opis, equisetum, veratrum nigrum, papauer sylvestre, & corniculatum. Humi cauliculis repunt polygonum, litho-
spermum, anagallis, clematis prima, holostium, tribulus terrestris, peplos. Caules edunt quadrangulos sideritis prima,
apiastrum, marrubium, ballote, cyperus, centaurium minus, mentha, calamintha, baccharis, horminum, aparine, ru-
bia, chamadrys, stachys, scordium, teucrium, betonica, symphytum secundum, clymenum, uerbenaca, urtica, galiopsis,
ethiopsis, lotus Aegyptia, buniium, xanthium, ebulus, pycnocomum. Triangulares insunt cirsiio, & quandoque etiam cy-
pero. Caterum caules albicant moly, utriusque iberidi, nasturtio, cnico, cacalia, cynocramba. Rubescunt minori hieracio,
soncho, artemisia, hyperico, ascyro, phu, virga aurea, helxina, senecioni, myriophyllo, erobancha. Caule destituuntur
chamaleo albus, phyllitis, filix, cynoglossum, dryopteris, polypodium, onosma, trichomanes, asplenium, hemionitium, lichen,
paronychia, adiantum, hippopbestum, chamasyce. Ad haec non parum quoque in stirpibus dignoscendis utilitatis praestat
florum tum coloris, tum forma cognitio: quippe cum nulla sit earum pars, qua prius nostris sese offerat oculis vere &
estate, quam flores, varia colorum pictura, qua in eis resulget. Quapropter non ab re fuerit, horum differentias edocere,
qua in coloribus ita se habent. Planta igitur, qua flore candido decorantur, sunt ut oxycantha, ligustrum, orneoglos-
sum, fraxinus, rose, quibus tum ruber, tum etiam purpureus erumpit. Item olea, myrtus, cerasus, malus, pyrus, melli-
lus, prunus, arbutus, iberis, raphanus, fiser, cucurbita, caucalis, eruca, ocimum, ornithogalum, cyclamini secunda species,
hastula regia, capparis, poterium, thymus, moly, aparine, phalangium, tripolium, sed cui flos quandoque rubescat, peli-
um, ananthe, alba viola, nymphaea prima, althaea, polygonatum, clematis altera, ocimastrium, erinus, achillea, helxina
cissampelos dicta, conuoluulus, dorycnium, ephemerum secundum, stratiotes millefolium, lotus Aegyptia, chamasyce,
sesamoides magnum, narcissus, scammonia, thymelaea, sambucus, ebulus, angelica, filipendula, uiburnum, flammula,
fragaria, imperatoria, liliium conuallium dictum, & vincetoxicum. Rubri flores emicant rosas, in quibus tamen variant, na-
alij candidi, alij purpurei, alij lutei reperiuntur. ite malis puniceis, faba Aegyptia, rumici, oxylapatho, oxalidi, bliso, aphaca,
ephioscordo, anemone primo generi, argemone, anagallidi mascula, papaueri sylvestri, solano somnifero, onagra, &
caryophyllis vocatis, quem florem recentiores quidam, nescio qua auctoritate ducti, vetonicum appellant, quanquam
& hi purpurei emergant, & quandoque varia colorum mixtura insciantur. Flores mentha, sisymbrij & hydropiperis
colore subrubro apparent. In purpura albicantes insunt phu, rosas, persico, amygdalo, eruo, bacchari, trifolio, alcea, peri-
clymeno, rhododendro, paonia. Purpurei exeunt asaro, croco, vitici, vicia, cyclamini primo, larici, centaurio minori,
alba spina, origano, pulegio, salvia, calamintha, thymo satureia simili, thymbra, serpyllo, sed qui in album quandoque
variant, pseudomelanthio, chamadry, lychnidi, scordio, viola purpurea, canis testiculo, onobrychi, betonica, symphyto
utriusque: etsi secundum modum candido, modum luteo flore latetur. Item medio, gladiolo, anchusa, lycopsi, echio, sideritidi
tertia, uerbenaca, astragalo, hyacintho, cirsiio, capno, bubonio, sed cuius interna flauescant, antirrhino, acanthio, glauci,
ueratro nigro: tamen si quandoque huic puniceis, herbaceis, candidi, & in purpuram albicantes flores reperiantur. Item
sesamoidi maiori, ricino, amarantio, galega, personata, xanthio, hormino, martago (sic uocant recentiores liliium
quoddam) scrofularia maiori, geranio. At in purpura nigricantes insunt uiolis, leontopodio, delphinio, napello, pulsa-
tilla. Aureis floribus coronantur helenium, cornus, rapum, napus, lamsana, brassica, crithamum, sonchus, aphaca ci-
chorij genus, tragopogon, cucumis tam erraticus, quam satiuus, pepo, lactuca, irio, ranunculus, anemone secunda, aconi-
tum lycoctonon, chelidonium utrunque, fertula Campana, ruta, hieracium, atrachylis, tussilago, conyza, hemerocallis,
viola aurea, nymphaea secunda, anagyris, alisma, hypericum, ascyrum, androsimum, chamapitys, spartium, lysimachia,
eupatorium, pentaphyllum, chrysocome, chrysogonon, chrysanthemum, ageratum, papauer corniculatum, hyosciamus,
galium, senecio, verbascum, lotus urbana, & sylvestris, buniium, ofyris, colocynthis, cnicus, virga aurea, balsamina,
blattaria, caltha, colutea, ranacetum, & quam falso oxycantham recentiores nuncupant, abrotonum foemina, pilo-
sella, potentilla, sena, sinapi. Anthemidi flores exoriuntur in medio lutei, circinato orbe candidi, sicuti & parthenio,
buphtalmo, bellidi, & corula fetida. Caruleum florem edunt linum, intubus, cichorium, chondrilla, anagallis foemi-
na, muris auricula, clematis prima, buglossum, melanthium, eryngium, scabiosa, & qua a vulgaribus morsus diaboli
appellatur: item cyanus, & qua trinitas recentioribus dicitur. Hyacinthino colore placent flores centaurij maiori, cha-
maleonis nigri, cinara: quin & varia cardui genera. Vario colore insciantur iridi, tripolio, malua, euphrasia. Spicati
insident blizo, plantagini, hyssopo, mentha, menthastro, sisymbrij, hydropiperi, salvia, sampsucho, stachy, betonica, a-
marantio, virga aurea, stachadi, ladano, lauendula utriusque. Floris effigie lilium amulantur hemerocallis, martagon,
ornithogalum, nymphaea alba, helxine cognomento cissampelos, lotus Aegyptia, narcissus, crocus, conuoluulus,
epheperum primum. Flores, qui rose referant similitudinem, prosiliunt malo cydonia, mespilo, althaea, rhododen-
dro, paonia veratro nigro, colocasia, corniculato papaueri. Echinatis capitulis flores condunt uterque chamaleo,
centaurium maius, crocodilium, spina alba, dipsacus, spina Arabica, poterium, acanthium, cinara, leucacantha,
atrachylis, cnicus, & reliqua carduorum genera. Muscosos gestant flores laurus, labrusca, myrica, erica, ligustrum,
olea, quercus, castanea, cornus, galium. Flores in umbellas radiantes, vel muscarijs emicantes insunt meo,
sifaro, crithamo, caucalidi, origano, panaci, ligustico, pastinaca, fefeli omni, sifoni, aniso, caro, anetho,
cumino, ammi, coriandro, apio, smyrnio, elaphobosco, faeniculo, dauco, pyrethro, libanotidi, sphondylis, fe-
rularum omni generi, peucedano, laserpisio, sagapeno, galbano, panaci, ammoniaco, achillea, chrysocoma,
agera-

agerato, cicutæ, stratiotæ millefolio, myrrhidi, thapsiæ, sambuco, ebulo, angelicæ, filipendulæ, viburno, imperatorie, etq; pimpinella generi, quæ nonnullis hircinum saxifragum vocatur, quod hircum maxime oleat. Cytini imaginem representant flores asari, byoscyami, cisti, arbuti. Corymbis similes racematim coherent botry, ambrosiæ, anagryi, vrticæ, lunaria minori, bippophaei. Lanugine quadam obducuntur, atq; in pappos euanescent flores omnium carduorum, sonchi, tragopogoni, centaurii maioris, vtriusque chamaleonis, vtriusque hieracii, senecionis, cirsi. Stellatum, solisque flore imaginem referunt eryngium, aster Atticus, anthemus, parthenium, buphthalmus, bellis, hypericum, pentaphyllum, intubus vtraque, cyannus. Præterea exquisitam prorsus plantarum cognitionem quis assequi poterit, si seminis, fructusque, quos planta ferunt, delineationes habeat: quare non inutile fuerit earum tum figuras, tum discrimina, tum etiam similitudines prosequi. Fructus itaque racemosos proferunt therebinthus, lentiscus, populus vtraque, oxyacantha, vitis nigra, vitis alba, cyclaminus secunda. Corymbaceos verò hedera, periclymenus, solanum hortense, & manicum, smilax aspera, polycnemum, bippophaes. Semina autem racematim coherent artemisia, ambrosiæ, botry, vrticæ nostrati, mercuriali femina, hydropiperi, ricino. Acinosa sunt asaro, taxo, vesicaria, asparago, rusco, lauro Alexandrina. Semen folliculari specie inest fraxino, thamno, sed quod verticilli referat imaginem, nasturtio, thlaspi, androsaca. At in squamosis folliculis occluditur gentiana, cumino sylvestri, atriplici, sphodylio, ænanthæ, ferula, & thapsiæ. Pineam nucem imitantur, & veluti nucamenta sunt fructus piceæ, laticis, & cupressi. Baccas gerunt olea, laurus, Zizyphus, cornus, rosa, caparis. Oblonga, & quæ magnitudine cedant oliuis, visuntur myrtho, thymelææ, polygonato. Rotundæ sunt ligustro, iunipero, hedera, periclymeno, lycio, cedro, oxyacantha, sabina. Caterum fructum semenque siliquis includunt acacia, anagryus, genista, siliqua arbor, casia nigra, dorycnium, apocynum, staphis agria, delphinium, cicer, faba, lens, phasiolus, lupinus, pisum, eruum, sena, smilax hortensis, medica, aphaca, vicia, pæonia, leontopetalò, xyris, solanum somniferum, & tertium aconiti genus. In folliculis verò abditur halicacabo, colutea, colchico, & staphylo dendro, suumq; in corniculis modo aduncis, modo rectis feruant delphinium, fœnum græcum, lotas sylvestris, rapa, napus, raphanus, lampisana, brassica, cruca, sinapi, erysimum, circaea, leucoium, hedyсарum, papauer corniculatum. Capitibus semina condunt colocasina, anemone, argemone, melanthium, ocimoides, papauer tam satiuum, quàm erraticum, byoscyamus, lotus Aegyptia, xyris, nymphaea. At capitulu paruis concipiuntur lino, ptarmica, cumino sylvestri, sparganio, psyllio, verbasco, scrofularia, isopyro, ricino, tithymalo paralio, & helioscopio. Semina in stocci modum conclusa afferunt porrum, ampeloprasum, scorodoprasum, capa, allium: et si prius folliculo quodam claudantur. Umbellis nuda resident semina omnibus panacis generibus: itemque seseli, ligustico, apii omni generi, aniso, anetho, cumino satiuo, ammi, elaphobosco, dauco, sphondyllo, peucedano, elichryso, cicutæ, myrrhidi, angelicæ, imperatorie, thapsiæ, coriandro, smyrnio, fœniculo, pyretro, ferulis omnibus, achilleæ, agerato, stratiotæ millefolio, sambuco, ebulo. Semen veluti spicis cõtinetur origano tam satiuo, quàm sylvestri: quin & sumpsi cho. Papaueris imaginem semine representant phyllum, nymphaea alba, byoscyamus, lotus Aegyptia, peplos, chamaesyce. Piperis similitudinem exhibent semina tum lycii, tum etiam viticis. Compresso, atq; rotundo semine habentur malua, althæa, alcea, smilax lauis. Neque seminis effigie ab epithymo dissidet alypon: a lolio phoenix: a viola alba chamacisso: a saluia horminum. Hirsuto semine, ac aspero, adeo vt ul tactum vestibus adbareat, sunt personata, eupatorium, apatine, helxine, xanthium, & vulgare cynoglossum. Capiti viperarum simile fert echium, & vituli non dissimile antirrhinum. Mucronatum ostendunt tragos, spinachium sic vulgo vocatum, tribulus tam aquaticus, quàm terrestris. A fœnigraci semine non desciscit semen myagri, item & loti sylvestris. Semen fœnicali modo ferunt ligusticum, sison, cicutæ, cuminum, carum. Anisi verò semina, apii, & ammi consimilem nacta sunt formam. Cnici semen suam impartitur imaginem minori centaurio, vtrique chamaleoni, spina alba, & Arabica, atracyli, cynara, medio, nigro veratro, & omnibus fere cardui generibus. Milii semine constant circaea, crateogonum, panicum, sesamum, lithospermum, phalaris, lotus Aegyptia, sesamoides. Erui semen possident catanance, tithymalus paralius, aphaca. Semine marrubium emulantur ballote, clinopodium, sideritis prima, pycnocomum. Consimile nascuntur semine libanotis, & crithamum: vt etiam semine conueniunt linum, satyrium erythronium, & quoddam vrticæ genus. Semine caudæ scorpionis effigie cernitur scorpioides: & verrucarum modo pendet minori heliotropio. Semina quæ fructibus carnosus tam arborum, quàm herbarum delitescent, gestant aluo mala cotonea, pyra, citria, limonia, aurantia, punica, mestrila, cucurbita, pepones, melopepones, cucumeres, colocynthis: item balsamina vulgò vocata fructus, mandragora, aristolochia, halicacabi: quin & mala insana consimili modo suum recondunt semen. Minutum habent semen ruta, iberis, cupressus, circaea, psyllium, mandragoras, apios, cynocrambe, papauer, byoscyamus, ocimum. Disscunt etiãnum colore inter se semina, siquidem albicant dauco, rosmarino, circaea, lactuca, papaueri satiuo, & spumeo, cucurbita, peponi, cucumeri, sesama, lithospermo. Vt fructu rubent oxyacantha, terebinthus, cedrus, cornus, zizyphus, rosa, punica, arbutus, taxus, cerasus. Ita similiter semine rubescunt asparagus, halicacabus, ruscus, bippoglossum, rumex, dracunculus, arum, acanthium, pæonia, rubia, tragus, iuncus, coccum insectorium, aspera smilax, chamedaphne, sesamoides. Succo sanguineo manant ascyri, androsami, & hyperici grana. Nigrum inest ligustro, lycio, myrto, olea. Quin & semina nigricant ocimo, hirci barbula, porro, allio, capis, ampelopraso, byacyntho, scorodopraso, ophioscorodo, saluia, ruta, hormino, ligustico, seseli Aethiopico, sisoni, hipposelino, smyrnio, melanthio, phalangio, rubia, sideritis prima, verbasco, Laureola, narcisso, sylvestri cucumeri. In longum verò protensum proferunt semen seseli Massiliense, ligusticum, sison, hipposelinum, cuminum, narcissus, fœniculum. Quadratum spectatur seseli Massiliensi, & libanotidi: triquetrum verò staphidi agrie, & lathyri. Geminatum semen ferunt tordylium, alysson, aethiopis, mercurialis altera. Dissident etiam sapore semina: nanque acre id proferunt porrum, cape, allium, ampeloprasum, scorodoprasum, sinapis, nasturtium, erysimum, struthium, cyclaminus altera, dracunculus, origanum, panax Herculeum, seseli Massiliense, tordylium, anisum, hipposelinum, fœniculum, pyretbrum, peucedanum, cardamomum, clematis secunda, smilax aspera, thlaspi, hydropiper, ptarmica, arum, lepidium, ligusticum, & siliquastrum, quod Indicum appellant piper. Odorato semine pollet omnia cardamomi Arabici genera, panaces Herculeum, meon, carum, panaces Asclepium, elaphoboscam, ligusticum, Sympactia, hipposelinum, smyrnium, fœniculum, daucus, passinaca sylvestris, melanthium, isopyrum, baxiam, origanum, ammi, & antipathia retu quarorundam pro simplicium materia. & libanotis. Amarum semen inest Aethiopico seseli, omni absinthiorum generi, abrotano, chamacisso, gentiana, sesamoidi. In magnam denique duritiem semen coalescit asparago, periclymeno, & rusco. Harum itaq; rerum, qui exactam cognitionem fuerit adeptus, is in hac præstantissima facultate absq; vlllo impedimento poterit peritissimus enadere: verum tamen animuero ne quid int actû relinquatur, quod in hac facultate sum vtile, tum necessarium existimari possit, ob id scire conuenit,

Seminum, & fructuum in plantis discrimina.

Sympactia, & antipathia retu quarorundam pro simplicium materia.

conuenit, quod permulta creauit natura rerum omnium parens, qua inter se vel maximè consentiunt, vel admodum dissentiunt. Quò sit, vt nihil hac re admirabilius sit in tota natura, nihilq; scitu exoptatius. Quapropter nec ab re quidem fuerit, hac etiam ceteris adnectere, paucisq; perstringere, & de his praesertim agere, qua ad simplicium medicamentorum materiam spectant. Tam igitur pertinaci odio sese prosequuntur quercus, & olea, vt non solum non uiuant, neq; germinent, si altera effossa, in eius scrobe altera inplantetur: sed etiam altera alteram interficiat, si forte prope oriatur. Nec minor inter brassicam, & vitem antipathia cernitur: quandoquidem obseruatum sit, vitem, ad cuius radices asstita fuerit brassica, non paruo intervallo sponte sua refugere. Ideo nil mirum, si tantum brassicam contra temulentiam polere credant, quodq; Germani quotidianis mēsis id olus semper apponant, vt vini noxam effugiant. Nec secus brassicam viderunt origanum, ruta, & cyclaminus, atque illa vites: quippe perspectum est, quòd si feratur brassica iuxta quamlibet explicatarum, confestim cadit, totaq; contabescit. Scilla adeo veneficius, & admurmurantium incantationibus aduersatur, vt in limine ianua domus integra suspensa, ab omni eorum noxa eos, qui inhabitant, vindicet. Quocirca nō temere à doctissimis rerum naturalium inuestigatoribus memoria proditum est, omnes in vniversum stirpes, quibus scilla adfita profiliat, non modò asseruari ab omni aëris intemperie, animaliumque noxa: sed etiam latiores, feracioresq; euadere. Ferula in pabulo asinis gratissima est, eosq; mirifice alit: qua tamen, si ab equis, vel bobus edatur, veneni praesentanei modo eos interficit: tamen si nulla prorsus noxa ea quoque ab hominibus edatur prima foliorum germinatione. Rhododendri flores, & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus verò contra serpentum morsus praesidia. Cicutae esitata homines enecat: item & quadrupedes: nihilominus sturni innocuè eius semine vescuntur. Cucumeres aquam ita diligunt, vt si vas aqua plenum, dum plantis inhaerent, illis subiiciatur, admodum longiores effecti, mirè in illam descendant. Contra oleum suppositum sic refugiunt, vt in hamos recuruentur: quandoquidem in vniversum oleum omnibus, qua feruntur plantis, inimicum est. Quo sit, vt planta quaelibet, qua fuerit eo peruncta, facile perarescat, & moriatur. Ob id enim admirandum non est, si arbores, qua oleum ferunt, ac resnam mittunt, ceterarum insitiones aspernantur: quemadmodum eas non respuunt aliarum nonnulla, qua nec oleam nec resnam fundunt, siquidem saepe conspècta est quercus pyra ferre, platanae poma, myrtus punica mala, oxyacantha messila. At nunquam vise sunt pinus, larix, picea, abies, olea, insitionis adminiculo, alios ferre fructus, quam proprios. Grandinis impetum, item & fulminis ictum arcet pellis hyena, crocodili, hippopotami, & vituli marini: neque fulmine ictiuntur ficus & laurus. Caprificorum grossi domesticis ficis appensi, non solum eorum fructus decidere prohibet, sed etiam caducos ad maturitatem vsque remorantur. Apium tanto celerius adolescit in hortis, quanto magis atteritur, & calcatur: cum tamen secus, & contra eueniat de reliquis plantis. Tenerescunt galli, esuiq; aptiores redduntur, qui iugulati prius in arbore fici pependunt. Carnes putredine diutius illaesa asseruantur, quibus aeneus clauus fuerit infixus. Corpora icta fulmine, etsi exiccantur, nunquam tamen putrescunt. Quare non immeritò poeta ille damnatur, qui Phaëtonem cecidit de coelo tactum quibusdam in vallibus computruisse. Sed maiore miraculo nobis illud sese offert, quòd scilicet fulminis icta è loculis aurum adimatur illis illaesis, ac ne confuso quidem cera signo: pariterq; ex dolio vinum euanescat, dolio nullibi fracto. Quid enim hoc mirabilius? Martia princeps Romanorum grauida icta fulmine, partu exanimato, ipsa citra vllum aliud incommodum vixit. Mentha lacti imposita densari ipsum in caseum non sinit. Murena pisces ferula tacta statim moriuntur, Scorpiones item admota delphinio herba, aut lychnide syluestri, aut aconiti radice, quod pardalianches vocant, ad eò torpescunt, & stupidi redduntur, vt potius mortui, quam viui existimentur: veruntamen alibi veratri contactu mirifice excitantur, viresq; deperditas recuperant. Succo cotula manus illitae apam, vesparumque aculeo non infestantur. Quod item malua praestat oleo cotusa, corporisq; mēbris illita. Qui polemonia radicem gestauerit, à scorpionibus nō ictur: et si ictus sit, nulla neque molestia, neque noxa afficitur. Fortò tanta est arundinis, & silicis discordia, vt arundine romeri annexa, silices in agro enatae penitus deperdantur. At cōtra magnā inter se incunt amicitia arundines, & asparagi: quippe in arundinetis sati lōge latiores, quā alibi adolescunt: quemadmodum & vites, qua vltimos, populosque scādunt. Magna insuper conueniunt amicitia myrtus, & olea: item haec, & ficus. Orobanche sola praesentia legumina strangulat. Cimices lectularii si viui deuoretur, nō solū quartanis febribus remedio sunt, sed etiam percussus ab aspidē profunt. Martyres, feles, & mustela gallinas non attingunt, qua ruta succo fuerint peruncta: neque vulpes eas inuadūt, qua pulmonē vulpinū comederint. Viperæ sagi ramulo obuia facta gressū sistit, & veluti attonita manet: quod itē facit arundine et leuiter percussa. Furens elephas ariete tantū conspècto mansuescit: nec est taurus tam ferox, qui fico arbori adalligatus non mitescat. Magnes lapis mirè ferrum ad se trahit: at si allio cōfricetur, id neutiquam agit, nisi sanguine hircino lotum vim ab allio obsessam redimat. Succinum paleas, & festucas ad se trahit, nihilominus oleo illitum, eas respuit. Equi, quos lupus momorderit, & pernici cursu, & prolifica probitate pollebunt: at si luporum vestigia calcauerint, cruribus obstruuntur, ac cōuelluntur. Carnes ouilla à luporū morsibus dilaniata. ceteris teneriores, & gustatu suauiores existunt: at earū lana vestibus cōtexta, pediculos creat. Leo animal ferocissimū praesentē gallū mirū in modū veretur, ac magis terrore cōcutitur audito eius cātu. Gallinacei pulli elephantē, bouē, & equū minimè metuūt: at qui si vmbra tantū milui in aère volantis cōspexerint, ad matrē maximè perterriti cōfugiunt. Nec secus agunt oues & agni, lupo cōspècto. Idem lupus scilla bulbo cōtacto quā primū fideratur. Hyena vmbra contacti canes obmutescunt: itē hyena ipsius lingua à latratu, ac morsu canum et mordacissimorum ferentē vindicat. Polypodium herba cancro animali admota efficit, vt is paruo temporis tractu tum integentes crustas, tum vngues è pedibus abiciat. Ciconia platani foliis nidos implent, vt inde vespertiones abigant, quibus cum ingens odium gerant. Hirundines apium comportant, vt tineas, & blattas nidis inimicas arceat: itē & chelidonium maius, quòd obcecatis pullis visum restituat. Ceterum lauri folia nidulis importat palumbes, accipitres hieracium, corui arum, vpupa adiantum, cornices supinā verbenacā, turdus myrtū, perdix arundinē, ardeola carum, aquila callitrichum, galerita gramen, cygni viticem, vt à diuersis animalium iniuriis se vindicet, aut ab alio quocūque, quod noxā adferre possit: tam admirabilis in volatilibus, & quadrupedibus habetur ipsius natura instinctus, circa rerum vires absconditas. Catus quadā herba adeo gaudet, vt illi cataria nomen recentiores indiderint: quin etiam phu minoris radicibus maxime delectatur. Rana iuncum, ranunculum, & storbē diligunt. Testudines, & ciconia origanum adamant. Serpentes fomiculi affricatu visum recuperant. Leo deuorata simia febrem efficacissimè discutit. Cerua, & fera capra non modò dictami pabulo illata vulnera in Creta insula sanant, sed & infixa tela venatoribus reiciunt. Vsi fornicas deuorant, vbi mandragoram degustauerint, quibus mirifice sanantur. Elephantē deuorato chamaeleonte animali oleastri frondes depascuntur, quibus incolumes euadunt. Anseres, anates, ac reliqua aquatica

Brassica mirabilis vis ad temulentos.

Arbores aliarum arborum fructuum feraces.

Corpora icta fulmine non putrescunt. Admirabilis fulminum factas.

Gallinarum tutela contra Mustelas.

aves siderite tantum verba suis incommodis medentur: sicuti gallina belxinem deuorant, grues iuncos, panthera humana stercus, apri hederam, & cinaram ceruæ. Prætere a rhubarbaro flaua bilis è corpore deicitur, itemq; manna, & scamonio: pituita colocynthide, & turpeto: bilis verò atra belloboro, & Armenio lapide: sicuti & venena theriaca superantur. Oculorum agritudines curant solo contactu sapphiri & anthraces. Ebrietas ametysto lapide arcetur. Sanguinis defluxus iaspide sistitur. Topasio appenso venus infirma redditur: item & vitice lecto cubantibus strata. Formicae alis vesperilionis, & vrpæ corde fugantur. Quin & serpentes veterum calciamentorum suffitu abiguntur, vt blatta, & papiliones hircino iocinore incenso. Torpedo piscis non modo manu, sed & longiori hasta contacta tangentis brachium stupidum reddit, quamuis validissimis musculis constet. Catablepha quemcunque oculo conspexerit, enecat, etsi per mille passus distet. Nec inter homines desunt, qui laudibus, & oculorum intuitu conspectos effascinent. Caterum si cæterarum volatilium penna aquilinis permisceantur, breui carie contabescunt: quemadmodum testudinum chorde contacta dirumpuntur, si vna tantum ex lupi intestino parata inter eas resonet. Eodem pariter modo tympana ouina pelle constructa franguntur, si tympanum lupina membrana contactum inter alia pulsatur. Tanta musicis, tibiis, caterisque id genus instrumentis facultas aduersus tarantula venenum inest, vt languentes etiam inuitos non modo ad choreas, saltationesq; alluciat, sed etiam persanet. Quinetiam tanta vi pollent Marfi, ac Pphyli contra serpentes, vt eos solo contactu enecent. Taurus perunctis rosaceo naribus statim vertigine corripitur. Lapis Thracius aqua madens igni admotus præter rerum naturam flammam statim concipit, nec restinguitur, nisi affuso oleo. Sed de his hæcenus: quandoquidem breuitati studentes plura adhuc silentio prætereunda duximus.

† Hic locus (vt mihi retulit excellentiss. Medicus Augustinus Gadaldinus) in antiquo codice ita legebatur: εἰς ὄγκου διαφορά; ἢ καὶ ὅτι αὐτῶν ἀναφορὰς. Id est: in tumorum differentias vnumquodque ipsorum referentes. Quæ lectio non solum ob id magis probari posset, quam vulgata, quod dogmatica sit, illudq; dogma innuat, quod facultatum medicamentorum causam in tumores, & meatus referebat: sed quod etiam eius dogmatis meminerit Galenus lib. primo de simpl. medicamentorum facultate cap. primo, his verbis. τινὲς μὲν γὰρ εἶσι τὰ μυσίδη, καὶ τὰ σχήματα, καὶ τὰς διαφ. τῶν ὄγκων τὴν καὶ πέρας ἀναφορῶν. Hoc est: Quidam enim in magnitudines, figuras, & situs tumorum & meatuum referunt.



METHODVS, QVA DIOSCORIDES IN SVO OPERE VSVS EST, ET SECVNDVM QVAM OMNES AB AVCTORIBVS propositæ plantæ ad Dioscoridis capita referri possunt, a CASPARO BAVHINO proposita.

MDIOSCORIDES de MATERIA MEDICA perfectum opus se scripsisse in Præfatione testetur: & Galenus 6. de facult. simpl. medic. i. idē statuat, his verbis: Quinque libris materiam omnem vtilem Dioscorides absoluit: & i. de Antidotis, sufficienter de omni materia medica in quinque libris à Dioscoride scriptum est, operæpretium est intelligere, quam in suo opere Methodo fiet vsus. Dioscorides cum duos esse Medicinæ scopos animaduertet, Sanitatis conseruationem, & Morbi curationem: materiam Medicam pertractaturus, censuit præstantius esse valetudinem conseruare, quam amissam recuperare: quare ab illis exorsus est. At cum nihil sit, quod tam valetudinem cōseruet, quam Spirituum calorisque natiui resectio, ea quæ citò hæc præstare queant, præponit: eiusmodi autem cum sint aromatica, ab Aromatibus principium facit. Sunt autem Aromatica, quæ plenum, gratum, & perseverantem verbi gratia, per annos circiter decem, odorem spirant. Quare ea quæ facultate conueniebant, primum iunxit, & quantum licuit etiam facierum similitudinem obseruauit, cum facies seu forma externa ipsius plantæ, faciliè sub sensum cadat. Vbi verò facultas à forma externa esset seiuncta, potius facultate, quam forma similes coniunxit, inque classes & capita digessit: quod probatur ipsius Auctoris verbis, vt qui in fine præfationis libri secundi hæc habeat: idèd ne cognatorum vires disiunxisse videamur, & quæ sequuntur: sic & in libro tertio inquit, quæ vernacula sunt & cognata censentur. Aliquando vbi nulla neque facultatis neque faciei similitudo intercedebat, Nominis similitudine obseruata, diuersa in eandem classem retulit: sic enim infinitum chaos in pauca reducitur, memoriâque & artem plurimum iuuat. Primo ergo loco aromata, quæ spiritus reficiunt, caloremque innatum fouent, Libro primo proposuit: mox his subiunxit, quæ ex Aromatibus componuntur, vt vnguenta & olea, eò quod apud veteres in magno forent pretio, & ad sanitatem conseruandam plurimum conferrent, propter quotidianum Balneorum vsu, è quibus egredientes se vnguebant, vt Galenus plenius in libris de sanitate tuenda, docuit. Hæc verò cum ab arboribus perantur, arbores, à quibus vnguentorum & oleorum materia defumuntur, subiunxit. Tum in fine libri, de alimentis agere incipit: & quia verisimile est primos parentes potius arborum fructibus, quam frugibus victitasse, idèd antequam ad Cerealiam, quæ magis nutriunt, accederet, arbores quarum fructus edules sunt, descripsit: vt quæ finem imposuissent

aromaticis, etiam alimentorum genus inciperent: accedente etiam facierum similitudine: & quia magis nota sunt & familiares, quam herbae cereales: de his libro primo. Vnde liquet, caput vltimum libri primi, quod est de Iberide, licet Marcellus Virgilius, Hermolaus Barbarus, Ioan. Ruellius, Franciscus Afulanus, & Matthiolus (qui idem cum Lepidio dicit) in suis Codicibus reseruauit, expungendum esse, & in librum secundum post caput de Lepidio reiciendum esse, non solum ratione ea, quod locum iustum inter arbores non habeat, ut loquitur Ianus Cornarius: sed quia nec facultate, nec facie, nec nominis similitudine cum iis quae à Dioscoride libro primo proponuntur, conueniat. Eandem ob causam caput de Halicacabo, quod in quibusdam exemplaribus Iberidi subiungitur, expungendum venit, & in librum quartum ad Solani genera referendum est. Secundo libro, cum non solum Aromaticis reficiamur, sed & Esculentis spiritus & calor innatus conseruetur, humoresque augeantur, quibus librum primum concluderat, nunc quae succedunt, proponit, utpote carnes, pisces, cerealia, olera: ab Animalibus incipiens, à quibus non solum alimenta, sed etiam remediorum copia educitur: Cerealia subiungit, tum olera: & si ab his medicamenta quaedam vel colligantur, vel conficiantur, breuiter admonet. Hæc enim Dioscoridis est methodus, ut primum propriam vim, dein communem alicuius plantae enumeret: id est, id quod illi peculiare est & præcipuum, & quod præstantissime facit: postea id quod etiam aliorum auxilio agit: quod ut in particularibus capitibus obseruat, sic etiam in vniuersalibus tractatibus idem persequitur. Exempli gratia: inter oleraceas ea connumerat primo, quæ magis in vsum sunt ut Triticum, Hordeum &c: dein ea quæ minus nutriunt: quare Alimentorum oleraceorum genus acris terminatur. Acris autem cum alia sint Alimentosa, alia medicamentosa, alia mixta: ab alimentosis orditur, ut à Sinapi, Ceba, Nasturtio: quæ quamuis parum nutriant, appetitum tamen excitant: hæc sequuntur, quæ non nutriunt, sed medicamentosa tantum sunt, vereque acris. Tertio libro, ut in iis quæ medicamentosa sunt, progrediatur, Radices subiungit: mox succos, qui ex Corollariis eliciuntur: Dicitur autem Corollariæ herbae, quæ vulgò odoratæ plantæ appellantur, & potissimum odore grato dignoscuntur: subiicit Umbelliferas, quarum præcipue semina in vsum sunt. Quartum librum Herbaceum genus incipit: Herbacea dicuntur, quia potissimum herbacea pars (siue intelligas folia ipsa, vel ex iis elicium succum) in vsum est (sub qua specie ea quæ Cosmetica sunt, & ad capillorum tincturam faciunt, & ad cutis ornatum pertinent) de Radicibus etiam egit purgantibus, at in finem libri reiecit ea quæ potenter purgant, quod hæc, nisi alia profint, vltimo loco experiamur, & in vsum reuocemus. At in purgantibus primum ad morbos internos, tunc ad externos respexit: & rursus primum ad vniuersales, tum ad particulares: & potius & prius ad periculosos, quam ad salutes. Nec omisit quæ vulnera & continui solutionem curant: imò & de venenis quoque in sequentibus egit. Quinto libro de Vino agit: licet namque sint, qui vinum inter Aromatica reponendum censeant, ut & omnia ea quæ ex eo eliciuntur, ut Aquam vitæ, Omphacium, Sapam: ast quia magis antidotum est, & eo potius ad medicamenta miscenda & antidota conficienda opus habemus, quàm ad victum, in hunc locum eius historiã reiecit: & librum integrum dicauit, quo etiam vinorum factitiorum, quæ partim aromatica sunt, partim verò purgantia, modum conficiendi, doceret. Liber sextus: quoniam venenum præcipuus est vitæ nostræ hostis, nec satis sit sanitatem tueri, idèd sexto libro de his agit: quem aliqui diuidunt, & alterum, De Bestiis venenum eiaculantibus: alterum de Lethalibus Medicamentis inscribunt: alii in tres, alii in plures diuisere libros. Ex his ergo patet Dioscoridem magis Facultatem plantarum (quas in Arbores, Frutices & Herbas distinxit) respexisse, cum hoc magis intrinsecum sit, neque adeo mutabile. Secundum hanc Methodum, Angelica non inter Apiastra connumeranda, sed cum sit aromatica, venenis, pesti ac putredini aduersa, statim post Iridem vel Meum collocari debet. Sic Flos solis Peruvianus, quem auctor noster edit. postrema post præfationem locauit: Dodoneus ad Chrysanthemum: Cæsalpinus ad Helenium, retulit: licet antiquis indictus videatur, tamen non ex solius stipitis, neque floris aut seminis forma in aliquam classem referri debet, sed omnibus simul consideratis, & maxime facultate ipsa, qua cum Carthamo conuenit, ad Carthamum referri debet. In adprobatione remediorum & vsum, hæc tria potissimum obseruat: ut vel sibi experta dicat: vel communi vsum & experientia adeo probata, ut nullus inficiari possit: vel quæ à magno aliquo viro sibi exposita asserit. Hæc vniuersalis est Methodus, nunc ad Particularem. Particularis methodus est in capitibus: in initio capituli nomen proponit, dein regionem in qua frequentius vel optima prouenit, quæ Geographia est: tum Chorographiam subiicit, eius regionis locum, vel niuosum & altum: vel umbrosum: vel hortensum, vel alium aliquem explicando. Postmodum ab his incipit, quæ maxime oculis patent: hinc ea quæ non tam facile videntur, ut sunt radices & semina: mox particulares & minimas differentias: tandem facultates & proprietates & primum vniuersales & antidotarias, quæ Cordi, vitæ fonti opitulantur: dein quæ spiritibus animalibus: tum quæ ad morbos totius corporis, dein partium & communiter quæ ad capitis morbos valent primò exponit. Verum in vitium enarratione aliquando simpliciter ponit, valet, prodest: aliquando legitur, ferunt, prædicant. Cum scribit valere, prodesse, videtur experientiam eius rei habere: quod verò nunc non semper iidem effectus obseruantur, id ad plantarum varietatem, quæ aliorum loco substituuntur, referendum est: non verò ad ignorantiam & fallendi voluntatem. Ast cum habet ferunt, prædicant, non necessarium est argumentum certitudinis alicuius facultatis. Tandem licet quaedam interposuerit, non tamen contra propositam methodum fecit, sed quod nullus commodior locus videretur: sic Confectionem Cyphi inter aromata recensuit, quia ex odoratis constat: sic Picem & bitumen terrestre inter gummata. Hactenus de vniuersali & particulari methodo librorum Dioscoridis de materia medica, eorundemque capitibus.

Libro secundo quæ continentur.

Materia libri Tertii.

Lib. quartus.

Lib. quintus.

Lib. sextus.

I. IRIS DOMESTICA.

II. IRIS SYLVESTRIS.



III. IRIS SYLV. ALTERA.

IV. CHAMAEIRIS.



Iris à caelestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores in summitate cuiusque caulis, aequalibus inter se spatii distant, incurui, varij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei † & caerulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quædam caelestis arcus imago representari videtur. Radices subiacent geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur: & trajectæ lino reconduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ † mutila ferè, & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colore † gustu amaro, odore perquam grato, & sincero, in vt nullum prius situm redoleat: quæ dum tunditur, sterutamenta mouet. Secundum locum habet † Africana, candicans, gustuque amara. Teredines in vetustate sentiunt: tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excafactoria, extenuans, contra tussim efficac: humorum, qui agrè reiciuntur, crassitiem digerunt: bilem, crassamque pituitam ex hydromelyte drachmis septem epotæ purgant: somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horribus, & quibus genitura effluit: menses ex vino potæ pellunt. Decoctum earum, fœminarum fotibus vtiliter imponitur, ad emolliendos lotos, laxandaque in eis venarum spiracula: ischiadicis infunditur: fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt, quinetiam coctæ & illitæ, strumas veteresque duritias emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis cum aceto, & rosaceo magna vtilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie à Sole contracta emaculant. Pessis, malagmatis, & acopis inseruntur. In vniuersum magni ad omnia vsus.

Iridis genera eiusque consideratio.

Improbatur opinio asserentium Iridem nullum ferre semen. Iridis syluestris genera.

Opinio reprobata eorum qui Iridem domesticam reperiri negant.

Syluestris vtraque vbi plurima oritur.

Iris candida. Iris aurea.

Iris in vniuersum satua est, & syluestris, illius tres numerantur species, versicolor, lutea, candida. Huius tantum duæ maior & minor. Satua passim in hortis & viridariis habetur, folio gladii formam referente, striato, acuminatoque: caulem præfert lauem, cubitalem, rotundum, geniculatum, à quo ramuli in summitate exeunt, è quibus flores prodeunt violacei coloris, aequalibus inter se spatii distantes, & variis in medio coloribus sese immiscentibus Iridis caelestis modo. Capitula edit oblonga, gladioli modo, crassiora tamen, in quibus semen concluditur rotundum, sesama magnitudine. Quo fit vt ii manifesto ducantur errore, qui Iridem nullum ferre semen contendunt. Radix inest Iridi candicans, solida, geniculataque, à cuius infima sede, copiose funduntur fibrae, vt in maiori phu, odorata, gustu acres, & subamara, perinde ac radix. SYLVESTRIS duum est generum. Altera, quæ plurimum saxosis collibus & asperis nascitur locis, satua per omnia similis, minoribus tamen foliis, & floribus, radicibus gracilioribus, ac & caulibus. ALTERA foliis gladioli paulo longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrufo, inodorata, & graminis ferè modo repente: caule breui: flore ceteris longè minori, odore Armeniaci mali. Cõstat hæc foliis nouem purpureis, quorum extrema, superiore tantum parte, aureis pinguntur lineis. Sunt qui hæc legitimam Illyricam putent, Illyricam ab Italica differre existimantes, in quorum sententiam etsi iam pridem deuenirem, tamen longè aliter rem se habere postmodum comperi. Quandoquidem præferri Illyricam nouerim, non quod genere, vel specie à nostrate differat, sed quod cœli, solique illius convenientia, præstantioribus polleat facultatibus: vt absinthium, quod in Ponto nascitur: acorum, quod in Colchide, & Galatia: cyperus, qui in Syria, & Cycladibus insulis: costus, qui in Arabia: crocus, qui in Coryco monte: myrrha, quæ apud Trogloditas, & Minoa legitur: & alia quàm plurima præferuntur à locis, quorum dote selectissima, præstantissimaque proueniunt. Id enim aperte testatur grauisimus auctor Galenus lib. primo de antidotis, his verbis. Omnes itaque herbarii vniuersi scripserunt Irim in Illyrio natam optimam esse: petroselinum verò, quod in Macedonia prouenit: bitumen è Iudæa aduectum, item & opobalsamum. Idem & in reliquis fecerunt, quorum dotes à regionibus acceptas, cum priuatim de vnoquoque loquimur, non omittimus: hæc Galenus. Docuit id etiam ante Galenum Theophrastus lib. ix. cap. vii. de historia plantarum, sic inquit. In Europa nihil præter Irim inuenieris, quæ optima apud Illyrios exit, non tamen parte maritima, sed mediterranea, magisque ad septentrionem sita. Verum loci à locis differunt, ita vt producere meliorem possint. Quibus palam est, Illyricam Irim non genere, & facie, sed viribus tantum à nostrate disungi. Satua (vt arbitror) ex agresti originem duxit, quemadmodum plantarum aliarum pleraque, cultu tamen vegetior grandiorque efficitur. Seritur iam & altera, quæ flore & foliis minorem esse diximus, quæ etiam in hortis frequens est, tum ipsius floris amœnitate, tum odoris præstantia, tum etiam quod nouis floribus delectentur homines, aded vt iam tot satua, quot syluestris habeantur genera. Sunt tamen, qui putent nullam Irim domesticam reperiri, quod scripserit Theophrastus loco antè citato, nullum Iridi cultum accommodari. Sed ii, meo quidem iudicio, decipiuntur: quandoquidem Theophrastus eo in loco non de omni in vniuersum Iride differit, sed de Illyrica tantum, quæ cum loci ac cœli clementia in Illyrico tractu optima spontè proueniat, non est necesse, vt colatur. Præterea cum hodie Iris domestica passim in Italia hortis lata, virens, pulchraque spectetur: syluestris autem in plurimis montibus sponte nascatur, floribus & foliis satua longè minoribus, radice tenuiore, breuiore & aridiore: nulli quidem absurdum videri debet, si nos vtrunque depingi curauimus. Quinetiam compertum habeo, veteres quoque Iridis syluestris mentionem fecisse, non solum Marcelli medici auctoritate cap. 24. qui præterea Irim domesticam cultamque illi fuisse ostendit: sed Galeni quidem testimonio, is enim Iridis syluestris meminit lib. 10. de com. medic. secundum locos, dum nephriticas compositiones ab Asclepiade conscriptas recenset. Quin etiam Plinius lib. 27. cap. 11. Medii folia Iridis satua foliis comparat. Syluestris vtriusque generis plurima oritur in Goritiensi agro Saluatino monte, & Iapidia collibus inter saxa, odore non ingrato: quamuis etiam ambas viderim in campestribus non longè à Sontii ripis. Est præterea in satuarum genere, quæ flores niuei candoris, quæque aureos proferat. Hanc in Bohemia passim colunt in hortis. Illam pluribus in locis in Hætruria vidimus, cuius radix odoris fragrantia, & virium robore Illyricam ferè æquat. Nec putes velim eam quæ flore est audis meminit Plinius lib. 21. cap. 7. sic inquit. Iris radice tantum commendatur, vnguentis, & medicina nascens. Latissima in Illyrico: & ibi quoque non in maritimis, sed in syluestribus Drilonis, & Narona, quod à Nicandro transcripsit.

esse videtur. Proxima in Macedonia: longissima hac, & candidans, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplif-
 sima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est: raphanitis à similitudine, quæ & melior:
 rhizotomos subrufa. Et cap. 20. eiusdem libri, Iris rufa (inquit) melior est, quam candida. Quibus in locis sibi manifestè
 repugnare videtur Plinius: quod superius raphanitem, quæ candidat, rhizotomo, quæ rufescit, anteposuerit, hic verò cō- Plinii cōtra-
 tra. Dioscoridi præstat, quæ subrufo constat colore, qualis Plinio rhizotomos. Ceterum (si Theophrasto & Plinio creda- dictio.
 mus) non omnis Illyrica præstat, sed quæ tantum in sylvestribus nascitur: siquidem quæ in maritimis foditur, humore
 prægnans improbat, quod subinde staccescens contrahatur in rugas. Succus hydropicus propinandus, quoniam recenti
 Illyrica destituitur, è nostrate elicitur, ducitq; abundè aquas. Excalfacit Iris ordine secundo completo, vel tertio incho- Iridis vires
 ante, & pariter siccatur. Atque præter vires, quas illi adscribit Dioscorides, aliis pluribus pollet, quandoquidem comper- præter tradi-
 tum est, mansam oris halitum commendare: dentium dolores mulcere si radicis decocto iudem foueantur: coquit item tas à Diosco-
 abstergit, digerit, resoluit, lenit, reserat, expurgat, & deicit: vulnerariis medicamentis immixta sarcotica est. Radicis
 expressus succus bilem flavam, pituitam, & aquas cutem subeuntes pellit, hæmorrhoidas fotu elicit. Fit quoque electua- Elect. ex Iri-
 rium ex succi radicum Iridis drachmis tribus, Galanga, Zedoaria cuiusque drachmis duabus, Cinnamomi, Caryophyllo- de ad hydro-
 rum cuiusque sesquidrachma, marina brassica semuncia, & mellis quantum sat fuerit ad excipiendum: quo maximè picos.
 inuuantur aqua intercute laborantes, vbi quotidie semunciam ieiuni deuorauerint. Quin etiam Iridis radicum farina, Irid. rad. vi-
 drachmarum quatuor pondere, additis cinnamomi, & anethi cuiusque drach. duabus, & croci scrupulo, dolores, & tu- res.
 mores testiculorum, mirifice tollit, si panni coccinei frusto, albo meraco perfuso, hæc omnia in puluerem contrita excipi-
 antur, & calida apponantur. Eiusdem radices vestibis interposita, eas à tinearum erosionibus tuentur, & odoris fra-
 grantia commendant. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus aduersatur veneniis. Succus radicis naribus infu-
 sus cerebrum à pituita mirifice purgat: ventriculo tamen nocet cum per se tantum bibitur: ideoq; à peritu Medicis exhi-
bui non solet, nisi aduixta melle, & Indica uando. Potum radicis decoctum obstructiones aperit, præsertim vbi crassa fue-
 rit impacta materia, & ventris tinea pellit, vrinas ciet, & renum calculos eicit. Datur potadū vtiliter ictericis, quippe
 sudores mouet, & auriginem exterit. Pulmones, & thoracem expurgat, & locinoris inflammationibus auxiliatur. Re-
 centes Iridis radices saccharo aut melle condita, dantur vtiliter deuoranda vicia pondere calculo affectis, & anhelantis
 difficultate laborantibus, quin etiam hydropicis, ac resolutis: eadem in passo decocta, contusaq; addita bordeacea farina,
 & illita, parotidas belle discutunt. Illyrica puluis sesquidrachma pondere, datur ex passo calido, perquam vtiliter ad i-
 liacos affectus. Oleum, quod è floribus, & radicum succo paratur resoluit, emollit, concoquit, frigidos dolores mulcet, at-
 tenuat, & mirifice cōfert locinoris, & lienis doloribus: Podagricos iuuat, lenitq; articulorū duritiē, ac ceterarū corporis
 partium: præstat & ad frigidos vteri dolores, ad conuulsos, & aurium cruciatu. Vfus apud veteres est radicum tantum, Iridis oleū
 ad quos vsus
 præter.
 quamuis nunc non desunt recentiores, qui flores quoq; in medicum vertant vsu. Iris sylvestris maior excalfacit & sic-
 eat valentius tamen quam domestica. Easdem cum domestica vires habet, sed actiores ac etiam valentiores. At sylvestris Iris cogno-
 minor, excalfacit & extenuat ordine primo aut secundo inchoante. Præstat eadem quæ cetera Iridis genera, minori ta- mento astrag-
 men efficacia. Fit è floribus oleum, quo quidam vtiliter vtuntur ad tumentes ex partu mammæ, & ad testium inflam- galitis.
 mationes. Reperio quoddam esse Iridis genus, quæ Astragalitis cognomine dicitur. Id. n. ostendit Galenus lib. 1. de comp. me-
 dicament. secundū locos cap. 1. ex Sotano transscribens: itē Aetius lib. 13. cap. 3. qui quibusdam in emplastris Irim astragali-
 tidē imponunt. Veruntamen cum antiquorū, vel recentiorū repererim neminem, qui in simpl. medic. libris huiusce Iri-
 dis meminerit, quid certi de hac re præferā, sanè non habeo. Ceterum Cornarius, qui in prædictos Galeni libros cōmen- Cornarius
 tarios edidit, Irim astragalitem, & Astragalū idē esse existimat: hoc argumento ductus, quod Plinius Iridem duplicē esse notatur.
 tradiderit: alteram, quæ raphanitis à similitudine: alteram, quæ rhizotomos dicitur. At cum astragalus radicem rapha-
 ni modo ferat, inde Iridem astragalitem Astragalum esse conuicit: quin & Plinio per Iridem raphanitem, astragalum
 intelligi censet. Sed mea quidem sententia rectius fortasse rem hæc explicasset, si per eam Iridem, quæ à similitudine Iridis mentio
 raphanitis vocatur, astragalitem ideo designari dixisset, quod vt astragalus, raphani modo radicem gerat: siquidem Pli- ex Galeno.
 nio Iris raphanitis astragalus non est, sed altera Iridis Illyrica species. Quamobrem ita Iridem astragalitē à Galeno co-
 gnouerat esse putauerim, quod radice referat astragalum: quemadmodum raphanitis à Plinio dicta est, quod radice
 raphanum representet. Iridem memoria proditam fuisse Galeno in libris simplicium medicamentorum, sanè nusquam
 reperi: tamen si libro primo de antidotis eius postmodum meminerit his verbis. Andromachus rosis Iridem Illyricam ad-
 iungit: quæ verba non frustra, negligentēq; excipienda sunt, veluti nec cum aliis medicinis patria nomen apponit, de
 quibus paulo pōs. differentes, quid quoque in genere optimum sit, demonstrabimus. Polium ergo, & chamædrys Romani
 afferuntur, natis in Italia paulo meliora: in aliquot siquidem Italia locis haud multo deteriora proueniunt illis annis,
 quibus ver totum hum. idum non fuerit, sed sicuti sepe contingit, astiuo tempore simile. Quod si veris constitutio siccior
 obuenerit, multa, quæ in Italia nascuntur, pluribus Creta allatis paria erunt, aut non multo inferiora, veluti chama-
 drys, chamæpitys, hypericum, gentiana, thlaspi, veratrum nigrum, & id genus alia. At verò, quod ad Irim pertinet, secu-
 seres habet: si enim Iris Lybica, quæ plurima ex Africa Romam affertur, Illyrica comparetur, tantum ipsi cedit, quan-
 tum cadauer viuo corpori: non tam. n. aliis in gentibus ortatam multum ab Illyrica degenerare Iris videtur. Irim igitur, Iridis delo-
 velat & reliquis medicinis, odoratio em eligito: nam vnunquodque optimum est, quod proprium sui generis odorem
vehementissimum habet, qui quidem ex multorum inspectione manifestus vniciuique sit. Ac de gustu quidem perceptis
 qualitatibus eodem modo censendum est: id enim optimum medicamentum esse constat, in quo id, quod suo generi pro-
prium est, exuperat: pessimum verò quod sui generis aliis & tenuius, & exilius est. Meliora nanque sunt omni in specie,
 quecunque nec rugosa, nec exilia fuerint: sicut quæ convenientem sibi magnitudinem excessere, peiora sunt illis, quæ be-
 nè nutritam, & adstrictam habent substantiam. Quamobrem, vt dixi, multa sæpius inspexisse operæ pretium est, & ma-
 xime optima, & quæ longo iam tempore sui experientiam ipsis nascendis initiis præbuere, quæq; vno ore à peritu medi-
 ca materia sunt commendata. Omnes igitur herbarii vnanimis scripserunt, Irim in Illyrio natam optimam esse: hæc
 Galenus. Planta, quæ Græcis Ἰρις, Latinis item Iris nominatur: Arabibus, Asmeni iuni, siue Aiersa: Italis, Iride, Giglio
 azurro, aut Giglio cæleste: & Giglio pauonazzo: Germanici Blauwgilgē, Blauwshwertel, veielwur, & Himmel
 schwertel: Hispanis, Lirio Cardeno: Gallis, Glayend & Flambe: Bohemis, Kosatec: & Polonis, Iris sylvestris maior Græcis
 Ἰρις ἄγρια µείρα: Italis Giglio azurro saluatico: Germanis, Wild blauw gilgen: Gallis, Flambe sauage. Iris sylue-
 stris minor. Græcis, Ἰρις ἄγρια µικρά: Italis, Giglio azurro piccolo: at quidam falso Iridem Illyricam vocant.

† Malui hoc in loco Marcelli interpretationem sequi, quemadmodum alibi quandoque facturus sum, quam Ruellii, cui non semper addictus ero: quod in aliquot Græcis codicibus legatur ἐπιμαυλα, quæ vox in summitate cuiusque caulis significare videtur: quodque natura in planta ipsa illud manifestè demonstrat.

ADDITIONES CASPARI BAVHINI.

I Heophrasto 6. de causis plant. 13. Iris odorata est, & à gratia palati nomen accepit, quæ in Illyride, vt habetur 6. de caus. 28. melior est quàm in Macedonia: in Thracia verò ceterisq; frigidioribus locis odore penitus caret: sed plura 4. hist. plât. 16. vbi Iridis vocè Gaza cōsecraticè vertit, fortè quoniam in quibusdã tũ Theophrasti, tũ Athenèi codicibus legitur: quod in sacrificiis purificationibusque suis antiquitas Iride sit vsa. Aliis ἄρνια cœlestis, quod cœlestis arcus specie & modo floreat: aliis ἄρνια admirabilis, eadem ratione qua à poëtis ille cœlestis arcus Thaumantias dicitur, genus originemque illi ex admiratione nouæ rei, rudi adhuc sæculo, vt primus Plato indicauit, assignantibus antiquis. Diuidimus Iridem in satiuâ & syluestrem: quæ rursus variat, vel formæ, vel loci ratione. Ratione formæ, vel foliorum, vel radicum, vel ob colorem floris. Ratione foliorum, alia latifolia, alia angustifolia: illa vel maior, quæ Caulifera: vel minor quæ ἀνυλας. Ratione radicum, quod alius sit bulbosa (& hæc fortè Hyacinthus Virgilij, Columellæ & Palladij, non autem vulgata) aliis geniculata: vtraque vel latifolia, vel angustifolia. Color aliis candidus, aliis pallidus, luteus, niger, purpureus, cæruleus, aliis denique mixtus. Quam coloris diuersitatem Lacuna in vno flore reperiri existimauit, quæ tamen Dioscoridis mens non est: probatur ex eo quod de Illyrica maximè loquatur: iam verò Brassauolus in suo examine testatur se in Illyricis flores plerosq; candidos, alios pallidos, nonnullos luteos, quosdam purpureos conspexisse. Ratione denique loci natalis, Illyrica, Macedonica, Africana, Carthaginensis, Lusitanica, Florentina, Septentrionalis, maritima, saxatilis. Sicque Iridis non bulbosæ, de qua hoc loco, species viginti tres reperiuntur, quemadmodum in nostro Phytopinace ordine recensuimus: de singulis plenius in VNIVERSALI HISTORIA nostra Deo iuuante, acturi.

I. Iris vulgaris cærulea C. B. Iris Brunf. Trago (cui nouem foliis & totidem coloribus flos constat) Fuch. Cord. in Dios. Dodon. Loni. Cæs. Tab. Iris nostra satiuæ Cord. hist. Iris vulgaris Lob. Iris domestica Lac. Lug. Iris satiuæ cæruleis floribus Ges. hort. Iris maior cærulea Cam. hort. Variat colore floris cæruleo, purpureo, cæruleo obsoleto, cinereoue & variegato.

II. Iris syluestris maior, quæ satiuæ vulgari similis C. B. Gladiolus cæruleus maior Trag. Iris syluestris Lac. Lug. Cord. hist. Tab. Iris sylue. maior Ges. hort. Cast. Iris sylu. prima Penæ.

III. Chamæiris prunum redolens C. B. Iris syl. minor Matth. ed. ital. & icon. Cast. Iris syl. altera Ges. hort. Lug. Chamæiris Dodo. Cam. Iris angustifolia minor, vel 12. Clus. Pan. Iris perpusilla syl. angustifolia Lob. ob. Chamæiris angustifolia Lob. icon. Iris peregrina Cæs. Iris angustifolia Cam. hort. Chamæiris angustifolia minor Tab. Hanc Illyricam censet Hermolaus, sed ab ea differre Ant. Musa ostendit. Aliquibus Illyricam legitimam censeri, quæ ab Italica differat, licet nec genere nec specie Italica ab Illyrica differat, auctor Gesnerus. An potius Rhizotomos Plinij lib. 21. cap. 7? Duum est generum, alterius enim flos cauli longiori, alterius cauli breuiori, & penè nullo infidet, cuius iconem iv. nota uimus.

v. Iris Florentina alba C. B. Iris Illyrica Cord. in Dios. Iris Florentina Gesn. hort. (qui fœminam dicit) Dodo. gal. Tab. Iris flore ex toto candido Cæs. Iris alba Illyrica vulgo, vel potius Florentina Cam. hort. An hæc Macedonica Plinij? Etsi vulgata albo quoque flore reperitur, hæc tamen radices minores habet, & quæ siccata non corrugantur, vt nec Illyricæ: & licet Illyricam præferant omnes, & ipse Galenus, tamen cum idem i. de Antidotis statuerit, quodlibet simplex medicamentum in suo genere quod sit fragrantius, eo esse præstantius, ex eius sententia Florentinam merito, tanquam odore suauiorum Illyrica, candidiorem item & elegantiorum aspectu, quis præferat: dein Illyricam, à cuius bonitate tantum abest Africana, quantum animal vegetum a suo cadauere, vt auctor est Galenus.

Ακορι.

ACORVM CAP. II.

Meum
spoi lama
rum. ἀβρωτι
i. non cario
sim.
ἐν χαλκίδι
i. in Chalcide.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est † densum, candidum, † plenum, carie non exesum, odoratum: cuiusmodi † Colchidicum, & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici vis calfactoria. Decoctum potu vrinam cit: prodest lateris doloribus, & icciõnis, atque thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: lienem absorbet: vrinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur: insidentibus ad muliebres affectus, iridis modo, vtiliter imponitur: oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno vsu commiscetur.

Acori consi-
deratio.

Acorum legitimum, quod falsò calamum aromaticum vocant, foliis prouenit Iridi angustioribus, longioribusque, odoratis, ac gustu feruidis: radicibus Iridi amulis, frequenter geniculatis, firmis, subcandidis, innumeris in inferiore parte adnatis fibris, odoratis, gustu acris, ac subamaro, complicatis, haud in rectum descendentibus, sed in obliquum actis, & summa tellure sese diffundentibus. Caule est laui, è quo ramuli prodeunt, in quorum cacuminibus, (vt Gulielmus Quacelbenus Medicus se vidisse affirmabat) nucamenta quadam exoriuntur, mihi hætenus non visa, nucis Pontica iulis, aut longo piperi similia. Tales sane fuere legitima Acori planta, cuius hic imaginem damus, quas Constantinopoli ad me misit Clarissimus Cæsaris Ferdinandi ad Turcarum Imperatorem Orator Augustinus de Tumbercht vna cum ipso Quacelbeno.

I. ACORVM.

ACORVM CVM IVLO.



Acorum Galienus, in steno.

Quacelbena, e Nicomedia a quodam vasta magnitudinis lacu petita, vbi copiosissimum prouenit Acorum: est enim Nicomedia Bithynia ciuitas, Galatis, ac Colchis vicina, vbi nasci Acorum omnium optimum scribit Dioscorides. Sed fecit diuturna rei herbarie ignorantia, vt hactenus non in Italia solum, sed in quocunq; terrarum loco, vbi seplasiarij

II. PSEUDOACORVS.



Iris pseudoacorus steno.

& medici habeantur, in legitimi Acori locum rufa que Pseudoacor-
dam radix successerit, qua passim in palustribus, & vlti- rum.
nolis locis inutilis, & inodora plurima nascitur: eo sane ar-
gumento, quod folijs sit Iridis, sed longioribus, quemadma-
dum & caulibus & floribus, qui tamen haud versicolores,
sed lutei spectantur: differunt tamen facie, quippe quod
minores sunt & angustioribus folijs, & radices iridis profe-
rat, quamuis haec colore rufa, inodora, maiores durioresque,
illa vero iridis longiora spectentur. Hac itaq; radix apud om-
nes, qui plantarum historias neglexerunt, in hoc vsq; aenum
legitimi Acori munere functa est, a qua quatum tum qua-
litate, tum facultate recedat, ex Dioscoride patet:
quandoquidem palustris haec nec candicans, nec gustu sit a-
cris, nec villo prorsus commendetur odore. Radix, cuius tan-
tum est vsus, exiccat, sed non nisi parum excalfacit: atte-
nuat, roborat, resoluit. Constat multorum experimento,
valere Pseudoacorum, propria sua ipsius vi, ad omnes ner-
uorum & cerebri affectus. At quamuis hac tempestate a
peritis rei herbarie medicis non parum improbentur ii, qui
non in hac tantum stirpe, sed etiam in aliis quam plurimis
desecere, cum tamen ipsi probatissimos auctores nusquam
legerint, potius excusandi sunt, quam quidam fortasse a-
tatis nostra scriptores, tam Graeca, quam Latina lingua pe-
ritissimi, quibus res sole clariores propositae sunt, quiq; in
simplicium medicamentorum cognitione ceteris prestan-
tiores haberi volunt, & ii logius nihilominus (vt arbitror)
aberrant, quam ceteri. E quorum numero est Brasauolus
Ferrariensis, vir sane doctrina, & fama clarissimus: qui
dum innumera simplicia medicamenta declarare, explica-
re, & palam facere in suo simplicium examine studium im-
pendit, etsi id in plurimis assecutus fuerit, in hoc tamen, a-
liisque nonnullis (vt suis locis in his nostris commentariis
ostenduntur


Brasauoli er-
ror, Acorum
Galangam
esse statu-
is.

ostendunt: in tanto illustriam authorum lumine mihi magis cacutire videtur, quā qui ante ipsum in tenebris errauerūt. Is enim constanter asserit, Acorū à Dioscoride descriptum aliud non esse, quam eam acerrimam, & odoratam radicem quam officina Mauritanos secuta Galangam vocant, adeo ut maluerit cum Leoniceno errare, tantum fuit preceptoris suo addictus, quam cum Manardo bene sentire. Sed quantum eius opinio à veritate, quantumq; ab Acori historia recesserit, perquam facile probari potest. Quippe galangam folia iridis proferre apud Syrios nullo nobis testimonio constat: verum quia cum cypero adeo conuenit, ut is syluestri Galanga nonnullis dicatur: ideo non ab re credendum fuerit, galangam potius cyperi, quam iridis folio provenire. Præterea quod galanga radices habeat iridis, nec mihi quidem videtur, nec vllum id affirmare existimo: neq; illud etiam videre possum, quod eadem aliqua ex parte subalbicent, ut de Acori radicibus scribit Dioscorides: quin potius tam intus, quam extra non obscure rufescunt. Quod autem gustu sint acri, atque mordaci, qui neget, nullus est. Sed non tamen ob id dicendum erit, galangam esse Acorum, aliis non concurrentibus notis: præsertim cum Dioscoridis testimonio Acorum esse debeat acre, non autem acerrimum, nec galanga modo linguam aduens. Brasauolum secutus est Fuchsius medicus clarissimus: is, cum sibi nimis punila videretur prioris galanga radices, quam ut Acori radices referrent, atque propterea Brasauoli sententiam non probandam duceret, in suis de stirpibus commentariis, alteram crassioiorem galangam, quæ iam pridem in Italia fertur, Acorum esse contēdit. Verum si animadvertatur, quod ea non sit iridi similis, multoq; magis rufescat, quam quod hac dictio *ἰριδοειδής* designet, quæ albicantes, & non rubentes denotat, facile palam fiet, quod vna cum Brasauolo ipse quoque aberrauerit. Sed præter hæc iis etiam refragatur Galenus lib. 6. de simpl. med. facult. quod asserat Acori radicem gustui non modo acrem esse, sed etiam subamarā: quæ tamen modica amaritudo neque in hac, neque in illa reperitur galanga: etsi inualidis quibusdam argumentis suo ultimo examine contendat Brasauolus, quod galanga præter acerrimam facultatem etiam sit amara: sed vereor, ne in tunc bile persusus suam degustauerit galangam. Amatum quoque esse Acorum, facile quispiam ex lectione antiqui nostri exemplaris intelliget, qui legerit ea quæ in margine adnotauimus: quæ quidem lectio mihi maxime probatur, quod cum Galeno Acorum amarum faciat. Comprobatur præterea aliud esse Acorum, & aliud esse galangam Serapionis testimonio: qui, cum sciret non parum discriminis inter has radices esse, de iis seorsum egit per propria capita, utpote de rebus genera & facultate diuersis. Hoc idem probatur ex Actuarii etiam monumentis, siquidem is in compositione aurea Alexandrina, & Acorum, & Galangam imponit, quemadmodum & Nicolaus Myrepsicus, tanquam inter se genere diuersa. His itaq; tum rationibus, tum auctoritatibus adductis, à Brasauolo, & Fuchσιο diuersus esse cogor. Nec equidem intellexerim vnquam, quomodo factum sit, quod galanga maior, quæ à minore non genere, & facultate, sed tantum specie differt, cum primum hæc à Syria aduecta est, in Acorum se commutauerit: sed qui hæc intelligunt, diiudicent. Ceterum, ut dicam quid hæc in re sentio, crediderim ego vnā cum Manardo Ferrariensi, aliisq; nonnullis huius ætatis in simplicium medicamentorum facultate doctissimis viris, id omnino legitimum esse Acorum, quod non modo seplasia, sed omnes in vniuersum falso Calamum odoratum vocant, quanquam non desint noui quidam herbarii, qui nostram sententiam destruere nitantur, Leonicenum, Brasauolumq; sequuti. Sed ridiculum satis, meo quidem iudicio, eorum est argumentum, quippe ut probent à loco, crassioiorem Galangam legitimum esse Acorum, illam in Syria montibus eriri contēdunt. Nam cum scribat Serapio in Syria nasci Galangam, nec est qui dixerit vnquam ibi provenire Acorum, nil aliud probant, quā Galangam esse Galangam: quam quidem in Ponto nasci apud Colchos, aut in Galatia, Bithyniæ, vbi Acorum oriri scribunt auctores, nemo est qui asserat. Nec minus infirma ac leuis eorundem ratio est, vbi volunt vno tantum inspecto Galanga folio, Iridi (ut aiunt) emulo à Syria allato, Galangam hanc esse Acorum. Etenim, tametsi concedam ego facile folium illud fuisse Galanga, quod sciam hanc folio esse Cyperi latiore vegetioreq; Iridi non omnino absimili, concedam tamen nunquam ex illius tantum folii inspectione, recte affirmare posse quenquam Galangam crassioiorem esse Acorum, ceteris latentibus partibus ac notis. Folia enim Iridis, Acori, Pseudoacori, Xyphii, Xyridis, Galanga, Cyperi, similem ferè faciem referunt. Quo fit, ut ex solo folio, nihil certi quis affirmare queat. Fabulatur iidem præterea, imo potius veritati se opponunt, cum dicunt Calami aromatici radices Iridi non esse similes, cum tamen geniculata, solida odorataq; vbiq; spectentur. Nam non secus se habent Iridis radices, si Dioscoridi credimus, ita de iis differenti. Πίζα ὑπεροί, γοατὸ δὲ εὐεπταί, ἰώδ' ἐστ. Radices subsunt geniculatae, solida, odorata. At qui non solum fabulantur, sed potius delirant, cum tam aperte insaniunt, cum dicunt recentes Calami ipsius radices omni prorsus sapore, & odore destitui, & paulo post affirmant easdem recenter effossas, esse amarissimas, & odore admodum ingrato? Furor sanè hic est non verbis, neque rationibus, sed antidotis coercendus. Credamne hoc ego illis? Profecitò minimè, quod recentissimas hæc radices, degustauerim, tum etiam, quod Tartaros compertum habeam eas sapidissimè pro obsonio cum pane deuorare. Sunt enim tunc nil minus odorata, & acuta, quam quæ sicca ad nos deferuntur. Ceteras horum ineptias prætermitto, ne nimis seuerus censor tanta oscitantia videar. Ceterum qui plura audire cupit, legat Anguillarii Italicum libellum, de suis in plantaginoscere crassioiorem Galangam arundinis potius quam Iridis, vel acori referre radicem, & subinde mecum affirmare Calamum vulgaris vsus legitimum procul dubio esse Acorum. Siquidem radices illi primū iridi persimiles sunt, geniculatae, reflexa, subalbida, acres, odore præstantes, & (ut inquit Galenus) etiam subamara: in super & folia, quæ enim ferè iridis. Ad hæc ut Oeniponti (Germani Ispruck dicunt) retulit mihi clarissimus medicus Ioannes Merlino, qui pluribus annis degit apud Lituanos, quod passim Calamum aromaticum vocant, frequentissimum in Lituania, & circa Tartarorum fines, nascitur, foliis iridi emulis: caule iridis longiore, gracilioreq; à quo tamen nullus exoritur calamius: vocaturq; ab incolis suo idiomate Tartarschi zelii, id est, herba Tartarica, quod fortasse à vicinis Tartaris in Lituania primū fuerit allata. Ideoq; Plinio memoria rectè proditum est lib. 25. cap. 13. optimum id esse Acorum, quod ex Ponto aduehitur. Pontus enim his Tartaris ferè iungitur, qui vltra Lituania inhabitant, vbi apud probatissimos auctores nusquam legitur, odoratum calamum oriri. Quamobrem non potui non maxime Brasauolum admirari, quod sibi tam facile persuaserit, vulgarem Calamum legitimum, & odoratum calamum esse, à Dioscoride, Theophrasto, Galeno, & Plinio non in radicem, sed in arundinum genere descriptum: nam (ut suo loco de calamo odorato agentes latius explicabimus) is arundinea est fistula, non autem radix: sed de his hæcenus. Acorum pōticum à ieiunis deuoratum, optimè facit ad fetorem, anbelitus. Præstat quoque Acori ex aqua decocti vapor per infundibulum hianti ore exceptus ma-

ximo inamento ad rufum, eiusdem quoq; radice, & cinnamomi drachma in vini absinthitis haustu sumpta, frigidū infirmūq; ventriculum roborat. Fit quoque ex Acoro oxymel, quod mirum in modum prestat, ad refrigeratos lienes, Oxymel et
& refrigerat. Ita locinora hoc modo: teritur Acori radicum libra crassiuscule, & dein tribus diebus maceratur in aceto, Acoro.
postea coquitur ad medias, & linteolo percolatur, demum aceto adiungitur mel, quod sufficit, & coquitur, quousque acetū euanescat: de quo datur quotidie mane vncia, cum eiusdem Acori decocto. Affertur Acori radix saccharo vel melle Acori radix
asseruat. recēs, à locis in quibus prouenit: quin etiam in Italia & Germania paratur è sicca radice, sed non vt genuina condita.
illa utilis. Acori meminit Galenus lib. 6. de simpl. med. facul. sic inquit. Acori vtimur radice, que gustu acris est, & mo- Acori vires
dice amara, odore non iniucunda. Vnde constat, quòd facultatis calida est, & consistentia tenuis. Huic cōsentaneum est, ex Galeno.
vt vrimam moueat, & lienes induratos inuet, tum ceratoidis crassitiem detergeat, simulq; extenuet: sed ad hoc melior
est ipsius succus: omnino verò siccisum esse clarum est. Et sanè ordinis esto tertii in vtroque, in calfaciendo scilicet & de-
siccando: hac Galenus. Sed quando hic aliquid dicere de Galanga occurrerit, cum à Dioscoride, alijsq; antiquioribus
Grecis nihil de ea memoria proditum sit, disseram ego de hac, que à Mauritanis, & alijs sum consecutus. Est itaque

III. GALANGA MAIOR.

IV. GALANGA MINOR.



GALANGA duplex, maior altera, altera minor. Minor
tenuis est radix, interius & exterius in purpura rufescent,
geniculata, internodijs quibusdā reflexa, odorata, sapore ad-
modū acri, aded vt māsa piperis, & gingiberis modo lingua
& fauces exurat, odore, formaq; cypero similis: quapropter
quibusdā Cyperus Babylonicus dicitur. In Italia nāq; tā ex
Mephi, quā ex Syria transfertur. Optima qua fuerit grauis,
densa, saturate rufa, odorata, & gustu acerrima. Nō desunt

Galanga cō- sideratio et historia.

tamē impostores, qui cyperi radices cōtorquentes, aceto, & pipere macerēt, & pro Galāga vēditēt: verū frātis facile depre-
henditur, quippe abrafo exteriori cortice, nulla in radice substantia acedinis nota, nullusq; galāge sapor percipitur. At
maior, tametsi lōge crassior sit radix, ignauior tamē est, & virib. infirmior, colore etiā dilutior, minusq; odorata. Galāga
calfacit, & siccāt ordine tertio. Proinde vētriculū roborat, & eius dolores tollit, si tamē à frigore, vel flatu proueniāt. Na-
rib. adnota frige factō cerebro utilis est: ore retēta anhelitū cōmēdat. Facit & ad cordis palpitationē, si è plāt aginis succo
bibatur: coli. ucos sanat, & coli dolores mulcet, qui à flatu oriuntur. Prodest flatuosis vteri affectibus: venerē roborat: re-
nes refrigeratos calefacit, in summa frigidis morbis omnib. succurrit. Caterū omnino exploāda est Monachorū in Mesue
scribentiū opinio, qui cōtr. Brasauolū & Fuchsiū quasi velle videntur, Galangā potius odoratū iuncū esse, quā Acorū
quod tamen planē falsum omnibus iā cōpertū esse non dubitamus. Quod Gracē Α χορον, Latine etiā Acorū appellatur: A-
rabice, Vage, seu Vgi: Italicē, Acoro: Vulgo medicorū & seplasiariorum perperā Calamus aromaticus. Germanicē Kal-
mus: Bohemicē prustnuorec: Polonicē, Tatarski, ziele. Pseudoacorū verò appellant Graci ψευδοαχορον: Itali, Acoro falso
Acoro bastardo & Giglio giallo: Germani Gelb wasser wurtel: Galli Flambe bastarde, Flambe de riuieres: Bohemi, Ko-
satac z luti falešni: Poloni, Mieczki konne, Korzenie.

Galanga vi- res.

Monachorū opinio falsa. Nomina.

ACORVS dicitur, quia ἄχος aciei oculorū caliginosæ medeatur: huius Plinius l. 25. c. 13. meminit,
cuius radices nigras dicit, at Dioscorides albicātes, candidāq; cōmēdat: quare dubiū an Plinius hāc
intellegerit, an verò in ipsius cōtextu mēdū fiet: tales sunt Calami aromatici officinarū radices, quas A-
corū Dioscoridis statuimus, licet alii Iridi cognatā: alii Iuncis magis cōuenientē: alii deniq; Costi Arabi-
ci apud Diosc. lib. 1. c. 15. descriptionē cōpetere statuunt, Galangā maiorē, Acorū Dioscoridis facientes.
1. Acorus Diosco. siue officinarum Calamus aromaticus. C. B. Cam. hor. Acorus vulgo Calamus a-
romaticus Cord. hist. & in Diosc. Acorus Diosc. Loni. Lob. Acorum Cast. & Tab. Acorum legitimum
Clus. hist. & pan. Calamus aromaticus vulgo Cæs. Acorum verum Lugdunensi historiz.
11. Hanc aliqui Iridem in maritimis nascentem à Theoph. & Plinio improbatam credunt: alii Bu-
tomon Theoph. 1. hist. 8. 4. hist. 9. & 11. quod à bobus libenter edatur & proscindatur, esse volunt: ve-
rum cū radici vis sit adstrictoria, Acoro aut Galangæ similior quā Iridi. Acorus adulterinus seu Iridi
palustris lunga C. B. Acorus offic. Brun. 4. Acorum adulterinum offic. Trag. Gladiolus luteus vel acorus

vulgaris Fuch. icon. Iris lutea Dod. gal. Pseudoiris eidem fol. Pseudoacorus Cord. hist. Lon. Acorum Lac. Acorus falsa Geshor. Acorum falsum Cast. Matth. Ital. & 4. Acorus nostras palustris Lob. Acorus, Iris palustris Cæs. Iris palustris lutea Tabernamontano.

III. Galangam veteribus Græcis ignotam, & Arabibus non satis perspectam, sunt qui Acori, alij qui iridis speciem velint, rectius tamen ad Cyperi genera, potissimum minorem retulerimus: quare recentiores Græci Cyperum Babylonicam vocauerunt. An hanc Dioscoridis lib. 2. cap. 153. per piperis radicem, ob saporis similitudinem, intelligit? A maiore & minore, cuius icones adiecimus, diuersum ex Christ. à Costæ historia Lug. lib. 18. cap. 127. expressit. Galanga maior quæ Iauanensis à regione dici potest: maior nominatur à Cordo. Dios. & hist. Lob. Clus. in Garc. Loni. Lugd. Tab. Cæs. At minor quæ Chinenensis, cum ex Chinarum regione in Indiam deferatur, dici potest, appellatur minor à Cordo. hist. 10 Lob. Lon. Tab. Lugd. Galanga in offic. Cæs. de his vide caput 40. lib. 1. apud Garziam, qui Rusco congeneres facit.


I. MEON.

II. MEVM ADVLTERINVM.



Meon

MEON.



CAP. III.

Orbasius nō legit conclu. fa.

MEON, [quod] Athamanticum [vocat], in Macedonia, & [Hispania] plurimum gignitur, anetho foliis & caule simile [sed eo crassius:] binum † ferme cubitorū altitudine attollitur: sparsis in ob- † Nō feruē, liquum, rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ feruefacta sed ex aqua, vel trita citra coctionem, præclusorum renum, vesicæque factæ vitia potu leniunt: vrinæ dif- 50
ficulitati medentur: stomachi inflationes discutunt, torminibus, affectæ vuluæ, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita cum melle in eclegmate auxiliantur. Sanguinem per menstrua pellunt, defensionibus feruefactæ: infantibus autem illita imo ventri, vrinæ mouent. Quod si plus quā deceat, ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Mei confide- ratio.

Credidimus superioribus annis, legitimum Meon non oriri in Italia, nec eō aliunde aduchi: primū quod Mei vice vterentur seplasiarii quibusdam albicantibus radicibus, sapore pastinacæ simili: deinde quod etiam Plinii tempore rarum esset in Italia, quippe qui scripserit non feri in Italia Meon, nisi à Medicis, iisque admodum paucis. Quod procul dubio indicare videtur, vsque ad Plinii æuū peregrinum in Italia fuisse Meon. Sed cum herbariorum quorundam diligentiā, quædam nuper reperta sit planta, cuius hic primo loco imaginem damus, quæque foliis constat anethi, caule, bi- 60
cubit. ali, radicibus nigricantibus, longis, & in obliquum, rectumque sparsis, grauitè odoratis, acribusque, quam legitimum esse Meum, omnes ferè rei herbaria periti vnanimè affirmant, ne videar mordicus tenere opinionem, facere equi- dem non possum, quin in eorum sententiam deueniam: tametsi in contrarium aliqua sese offerat ratio, quod scilicet hu- iusce plantæ radices odorem non vsq; adeo gratum spirent, sed quadantenus grauitè oleant, nec tenues cernantur, vt Dioscorides inquit, nec folia anetho similia, sed asparago potius ferat. Hanc Apuli Imperatricē vocant, & ad venenosorum serpentiū morsus præferūt, Plinius Meo folia aniso similia reddidit, vocū fortasse similitudine deceptus: siquidē Dioscorides anethi foliis Meū oriri tradidit. Nobiliss quod Athamaticū vocat, ita dictū, quod ab Athamātē Acoli filio inuentū sit, vel

fit, vel quod prestantissimū in Athamante Pbtrotidis proueniat. Quod ad nos affertur, nascitur in Italia montibus apri- cis. (Radices tantum eius in vsum medicū venere: et si semen viribus non careat suis. * Sunt qui plantam, quam secundo lo- co appinximus, pro Meo vsurpent, quod magis Anethum quam altera referat, quorum sententia non mihi omnino im- probanda videtur, siquidē vt diximus, priori potius Asparagi, quam Anethifolia insunt, *) nō solum in Gargano Apulia monte, sed etiam in aliis & apricis collibus. Meminit Mei Galenus lib. VII. simplicium medicamentorum, his verbis. Mei radices peruriles sunt, calida tertio ordine, sicca secundo: proinde vrinam, mensesq; ciete volentes hoc vtantur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem mouet, vtpote cum plusculum sit calidum, quam siccum: quippe quod eius cali- ditas humiditatem crudiores eti. unū, & flatuosiores ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat ladarq;. Mōv ita Gra- cis vocatū, Latinis Meum dicitur. Arabibus, Mu. Italis, Meo: Germanis W̄rtwur̄ seu Hergwur̄: Hispanis Pinillo.

10 Mei Plinius lib. 20. cap. 23. duo fecit genera, nobilius Athamanticum pronunciauit. Plures licet sint species, tres hoc loco proponuntur, duæ quidem a Matthiolo, quibus etiam adiecimus, cum & in D. Camerarij Matthiolo habeatur I. Meum folijs Anethi, seu Meum Dioscoridis & Plinii B C. Daucus Creticus, Trag. Fuch. fol. Eric. Cordo, Lob. icon. Sefeli

MEVM ALPINVM VMBEL- la purpurea.

Creticum, Fuch. icon. Lon. Libanotidis primum genus, & Foeniculus porcinus officinarum, Dod. gal. Tordylion, Cord. hist. Tordylum & Tordylion: Nicandro, Hordylon: Aeginetæ, Tor- gylon: quibusdam Meum, Cord. in Dioscor. Meum, Ges. hor. An- guil. Lob. obs. Dodo. Cast. Lugd. Taber. Cam. hor. Lac. cui & A- nethum syluestre: & Ruellio, qui etiam Anethum tortuosum in Gallia vocari auctor est. Meum, Imperatoria quibusdam, Cx- salpino. II. Meum adulterinum, C. B. Matthiols in secunda Cō- mentariorū editione, vt & postrema anno 1583. edita, plan- tam aliam a quibusdam pro Meo vsurpari scripsit, eò quod ma- gis Anethum, quam altera referat, sed in omnibus editionibus pictura omilla: ne quid ergo deesset huic editioni, verba ipsius duobus asteriscis inclusa adiecimus, & figuram ex Lobelo & Lug- dūnensi historia adposuimus, qui Meum alterum spurium Ita- licū nominant. III. Meum alpinum umbella purpurea. C. B. Ex radice simplici oblonga, nigra, parum fibrosa, aliquando mini- mum digitorum crassitie æquante, circa caput barbata, Mei fe- re figura, sed infirmiore, odorata & acri, folia prodeunt Mei fo- lijs latiora: caulis item vnus vel alter leuis, striatus, umbellam sustinens florum purpureorum, veleriam ex albo purpurascen- tium: quibus succedunt semina oblonga satisque magna. Nasce- tur in Heluetiorum & Valesianorum alpijs. Dicitur vulgo in alpijs Muttry, vel Mutteren, hinc Muttellinæ nomen apud Gesnerum in descriptione hortorum Germaniæ, & montis tra- cti (cui Caros vel Daucus aliquis alpinus censetur) & Camerario in Matthiolum. Radix cum sit aromatica & Meiferē sapore, ex- calfacit, qua Dauci Cretici loco vsū esse posse, Gesnerus censet, & ea efficaciorē censet. Eius pabulo (vt ex pastoribus Bernēsi- bus cognouimus) in montib. vacca plurimū & optimū lac red- dunt, sicut & Mei pabulo in Apulia. Ea etiam lactarij condiunt colostrā & recoctam suam Glaronenses & Valesij.



Κύπερος CYPERVVS. CAP. IIII.

Cyperus (quem aliqui crysiceptrum, vt aspalathum appel- lant, folia fert porraceis proxima, sed longiora, & exilio- ra: a caulem b odorati iunci, cubitalem, aut maiorem c angulosum: in cuius cacumine minuta folia cum semine exori- untur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter se, lacunosas, palustribus, & cultis enascitur.)


a Addit Ca- tac. κρησικλην ρότερα, κρησιωτρεα I. asperiora & angustiora. b Odorati, deest in o- mnibus ex- emplaribus. c Aliqua ex- emplaria le- gūt γονιδον. d Meum ex- emplar habet tantum ex- matoson e Meū exer- plar ad p. x aliud vero ad p. e Includa a quem vsque ad Optima non legit O- ribasius.

Optima est grauisima, densa, fractu contumax e plena, & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi: qualis est Cili- cia, Syriaca, & quæ a Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula laxat: vrinam ciet: ad calculos a- quamque subter cutem vtilissimè bibitur: aduersus scorpionum ictus remedio est: perfrictionibus vuluæ, & præcusionibus totu prodest: pellit menses. Contra vlcera oris, etiamli depascant vorentque, farina eius efficax est. Malagmatis calfacien- tibus, & vnguentorum spissamentis benè adlici solet. Aliud Cyperi genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie: quod manducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illicitum præsentem psi lothri vim exhibet.

10 T Ametsi vnum tantum Cyperi genus memoria prodiderit Dioscorides, cuius radices inter se coherentes oblongas refe- runt oleas, aut omnino rotundæ sunt, visitur tamen Cyperus in pluribus Italia locis, qui radicibus constat longis geniculatis, summo cespite vagantibus, colore in purpurâ nigricante. Ego hunc illū esse crediderim, quem Plin. Cyperida vo- cat. Nasceitur hoc Cyperi genus laudatissimum prope Timauī fontes, circumstantibus palustribus locis in Iapidia sinibus galanga vocata (vt paulo ante diximus) persimile, non tantum facie, sed etiam odore. Commendatur etiamnum odore is, qui in Hetruria prouenit, radicibus serē filipendula æmulis, sed non ob id illi fuerit præferendus, quem Syria mittit: quan- do quidem hic longè odoratior est, & subamarus. Cyperi meminit Plin. lib. XXII. cap. XVIIII vbi de iuncis egit, sic inquit. Quidam etiamnum vnum genus faciunt iunci trianguli, cyperon vocant. Et paulo inferius: Cyperus, ait, iuncus est, vt di- ximus, angulosus, iuxta terram candidus, cacumine niger, pinguisq; folia in a porraceis exiliora, in cacumine vniata in- ter qua est semen: radix oliuæ nigra simili, quam, cum oblonga est, cyperida vocant, magni in medicina vsus. Repetitur 60 Cyperus quandoque etiam quadrangulati caule, vnde non mirum, si quadratum iuncum eum vocauerit Cornelius Cel- sus lib. III. cap. XXI. At Dioscorides in hac facultate præclarissimus, vtranque differentiam colligens, nec triangulum, nec quadrangulum Cyperum dixit, sed angulosum. Nos autem Cyperum plantam esse dicimus, qua porraceis sermē prouenit folijs, longioribus tamen & exilioribus. Caulem edit cubitalem, & nonnunquam maiorem, angulosum, alba intus me- dulla vt in iunco, in cuius cacumine folia sunt minora, stellarum modo radiantia, inter qua semen prodit spicatum her- bacei coloris. Radices illi sunt subnigra, coherentes, oblongis oleis similes, aut rotundæ, aliquando etiam longæ, galanga modo, quo fit vt hoc cyperi genus, a nonnullis apelletur syluestris Galanga. Nasceitur in palustribus, & humectō solo, quin etiam locis cultis: vtimur eius radicibus, vbi Indica vel Celtica Nardus non sit ad manus earum loco. Optimus deferretur ad nos ex Syria, & Alexandria Aegypti, in cuius defectu Italicum supponunt officina. Non desunt, qui differentiam ponant

C inter

I. CYPERVS ROTVNDVS.

CYPERVS ROTVNDVS
Orientalis.

II. CYPERVS LONGVS.







Curcuma cy-
perigenus-

lectio Sera-
pionis depra-
uata

inter Cyperum & Cypirum, Plinium secuti, qui libro, & ca-
pitate citati, Cypirum gladiolam esse affirmat, Cyperum vero
angulosum odoratum iuncum. Sunt tamen Dioscoridis in-
terpretes, qui utroque vocabulo pro eodem indifferenter v-
tantur, eo quod (ut recte Hermolatus adnotauit) penultimam
Cyperum quandoque diphthongo longam, quandoque vocali
breuem Graeci scribant. Est apud Plinium & Cypirus arbor
cysime crescens, & pseudocypirus frutex, ut lib. xvii. cap. xiii.
ipse scriptum reliquit. Caterum id CYPERI genus, gingi-
beris effigie, quod India mittit, eam esse radicem peritiores
medici putant, quam officina Mauritanos secuta CURCUMAM
vocat. Nempe pra se fert hac notas sane omnes
quas Indico Cypero reddidit Dioscorides, quandoquidem gin-
giberi similis est, eius odorem ferme redolet, gustu subama-
rescit, & mansa croci modo inficit: quibus illud etiam acce-
dit, quod depilatorijs medicamentis quibusdam immiscetur.
Veruntamen sciendum est, hanc non esse Curcumam a Sera-
pionis interprete pro chelidonio descriptam: ipse enim nil al-
liud pro curcuma intelligit, quam Dioscoridis chelidonium:
quo fit, ut non desit suspicio erroris vel interpretis, vel scri-
ptoris, cum curcuma neque Mauritanum, neque Graecum sit
vocabulum: Aphri enim chelidonium Kautoch appellant.
Vnde palam est Curcuma pro Kautoch in Serapione depra-
uatè legi: quo factum est, ut priores tum medici, tum seplasia-
rii, qui nunquam hac perpenderunt, fuerint hallucinati:
quippe cum eos lateret, cuiusnam planta radicem Indica Cy-
perus referret, chelidonijs maioris radicem esse crediderunt, ob
croci succi similitudinè. Itaque Serapionis deprauatè lectio-
nem secuti, Indicum Cyperum curcumam vocauerunt. Indicum Cyperum
meminit Serapio Dioscoridè secutus, proprio capite de Cypero.

Ex quo

III. CURCUMA.




Ex quo aperte constat, curcumam Serapioni depravatè in-
scriptam, seplafiarum curcumam, qua procul dubio Indi-
cus est Cyperus, esse nequaquam. Cyperi radicem farina,
addita baccarum lauri eadem mensura, vrina impubis pueri
excepta, & illit a hydropicos mirificè iuuat. Cyperum re-
censuit Gal. lib. VII. simplicium med. vbi sic inquit. Cyperi Cyperi vires
radices maxime vsui sunt, excalescentes pariter & exic- ex Galeno.
cantes absque mordacitate. Itaque vlcibus, qua pra nimia
humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirificè pro-
sunt: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter
vlcibus item oris conueniunt. Quin & incidendi vim
quampiam illis inesse testificandum, qua & calculo vexatis
congruunt, & vrinam mensesq; prouocant. Planta, qua
Graeca voce *κάρδαμος*, Latina Cyperus nuncupatur: Arabi-
ca, Sabarade: Italia, Cipro: Germanica, Wilder galgan/ Nomina.
Hispanica, Iuncia de olor, & Iuncia auellanada: Gallica,
Souchet: Bohemica, Galgan planey.

K *κάρδαμος* aut *κάρδαμος* à radicis effigie, qua pixidulam
aut poculum, vasculumue pusillum imitatur, di-
ctus videtur, siquidem apud Theophrastum follicu-
lus vlini *κάρδαμος* *κάρδαμος* *κάρδαμος* legatur. Theophr. 4. hist.
II. Cypirū (Gladiolū Gaza vertit) dixit, radice inæqua-
li, partim crassa carnosaq; partim gracili & surcu-
losa. Matthiolus vna figura vtramq; nos duabus ex-
pressimus. Decē Cyperi species Phytopinax propo-
nit, hic de quatuor sermo. I. Cyperus odorata radice
rotunda, seu Diosc. & veterū C.B. cyper^o radice carno-
sa crassa, Theoph. Cyperos & Cypirus Plinio. Cype-
rus Trago. Lugd. Lob. ob. cui & Iuncus quadratus
Celsi. Iuncus angulosus & triangularis Plinij. Cype-

rus rotundus Ges. hor. Lob. icon. Dodo. Camer. Tab. Cyperus radice rotunda Lon. Cord. in Diosc.
cui offic. Cyperus rotundus & Germanorum syl. Galanga. Cyperus alter radice oliuari Cæsalp. Non
multum ab similem pingit Rauwolfius in suo itineraio, Cyperi rotundi Orientalis maioris vel Ba-
bylonici nomine; sic & apud Alpinum cap. 37. Cyperi rotundi figura, cuius radices quasi sibi inuicem
incumbunt. II. Cyperus odoratus radice longa, seu Cyperus officinarum (quando enim simpliciter
Cyperus scribitur, tum Cyperum longum assumunt) C.B. Cyperus radice gracili & surculosa Theo.
Cyperida Plinio. Cyperus radicibus longis geniculatis multis. Galanga syl. Matth. Cyperus Fuchs.
Dodo. gall. Lat. Cyperus longus, Ges. hor. Dodo. Tab. Cam. hor. Cyperus longus odoratior Lob. Lug.
Cyperus radice Galangæ Cast. Cyperus radice longa Loni. Cord. in Diosc. cui etiam Cyperus Roma-
nus vel longus off. Cyperus primus & maior Casalpino. III. Cyperus Indicus Diosc. C.B. Cyperi se-
cunda species Diosc. qua Curcuma Matth. Lac. Cyperus Indicus Diosc. & Curcuma off. Cordo in
Diosc. Lonic. Cæf. Curcuma off. Cyperus Indicus Cord. hist. Clus. in corol. ad Dod. gal. Lob. obser. Tab.
Terra merita Lob. icon. Lugd. Cyperus altera radice lutea dictus Curcuma Cast. Hic radice longa &
rotunda, vt rectè Cordus in hist. lib. 4. cap. 71. reperitur. An ab eo, qui radice est rotunda, differt ipsius
à Cost. cap. 35. (ex quo Lugd. in appendice) Crocus Indicus, de quo & Garzias lib. 1. arom. cap. 39.
cuius & Auicenna libr. 2. cap. 200. sub Chalidunio meminisse videtur. Maior est curcumæ cum
Zingibere, quam cum Cypero similitudo, & ratione formæ & virium, licet enim ipso Gingibere sit
gustu ignauiore & ingratiore, facultate tamen qua viscerum obstructions tollit, est potiore.

CARDAMOMI SPECIES. *Καρδάμωνος* CARDAMOMVM. CAP. V.

1. CARDAMOMVM MAIVS.




Cardamomum optimum est, quod ex Comage-
ne, Armenia, Bosphoroq; deuehitur: in India
quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet plenum,
frangenti contumax & occlusum, fractumq; (quod
enim huiusmodi nō est, exoletum iudicatur) & gu-
stu acre, subamarum, & odore caput & tentans. Ex-
calfactoriam vim habet: potumque ex aqua facit
ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorum re-
solutionem: item ad rupta, vulsa, tormina: latas
ventris tineas excutit. Ex vino autem potum, re-
nibus, difficultati vrinæ, à scorpione ictis, neque
non omnibus venenum vibrantibus, auxilio est.
Cum cortice radicis lauri epota drachma, calcul-
los com-

κάρδαμος
meum, aliud
κάρδαμος
Tentans
κάρδαμος
i. scien.


Amomum angustifolium, L.
sterile.

II. CARDAMOMVM MEDIVM.



Cardamomū
maius.

III. CARDAMOMVM MINVS.



Grana para-
dyfi.

Cardamomū
mediū.

Cardamomū
minū.

Cardamomū
veterū.

Cardamomū
Græcorū
& Arabū
diferentū.
Saccola du-
plex.

Monachi re-
prehendun-
tur.

Ruellij &
Fuchij error.
Piperis Indi-
ci mentio.

Cardamomi
genera qua-
tuor ex Pli-
nio.

los comminuit: partus suffitu enecat: scabiem & aceto illicitum adimit. Et ad vnguentorum spissamenta additur.

TRIA sunt cardamomi genera, quæ passim ad nos afferuntur, nempe maius, medium, & minus, & omnia suis in folliculis conclusa. Maioris inuolucrum Fici, [seu pyri] faciem refert, materia compactum tenaci, lentæq; ac lani Indica nuci inuolucro aut palma elates, non absimili, staminibus nonnullis secundum longitudinem discurrentibus. Hoc intus semine vbiq; factum est, subrubro colore, granis inæqualibus, multis intercarsantibus membranis albicantibus, quibus ipsa semina conteguntur, quæ Melegetas appellauere quidam, quod Miliū Indicum referant; Italis Melegam appellatum, saporis acuti, & odoris incundi, ac suauis: quo factum est, vt grana paradysi quibusdam vocitentur. Mediū folliculo contegitur oblongo, triquetro, striatoq; retuso in summitate cacumine, in quo

semen reconditur membranis pariter obuolutum, oblongum, pressum, canaliculo quodam altera parte diuisum, pluribus transversim intersectantibus lineis, colore ex albo rufescente. Minus capitulo constat breui, facie triangulari, faciei ferè nuclei effigie, crassioribus tamen angulis, colore subcandicante, media intus intercarsante membrana, in quo vring, semen, altera parte caua linea diuisum, subrotundum, & tactu subasperum. Omnibus semen inest fractu facile, acre, quadam accedente odoris saporisq; suauitate, & omnis amaritudinis expers. Maius tamen acrius est, & aromaticum quid magis respiciens. Minus, vt medium acridinis uehementia superat, ita & odoris fragrantia. Afferitur in Europam ex Alexandria Aegypti, ac etiam à Lusitanis ex India orientali. Sed an horum aliquod Græcorum sit Cardamomum, hæcenus affirmare non libuit. Concederem tamen ego faciliè maius Cardamomum legitimum illud esse quo vsi sunt veteres, quod suo è cardamomo, secundo de antidotis apud Galenum folliculos abiiciat Zeno. Quin etiam, quod in Thriaca carmine descripta libro primo antidotorum post Damocratis inscriptionem, folliculorum Cardamomi mentio fit. Et de comp. med. sec. locos cap. 3. Galenus ex Pamphilo miropola transcribens Cardamomi delibrati meminerit: sed vetat ne concedam in primis sapor, in quo nulla prorsus reperitur amaritudo, qua Galeno aded conspicua est, vt teretes intestinorum necare Cardamomum is affirmarit. Deinde Cardamomi vulgaris odor suauis est, & caput minime tentat, nec frangenti contumax est, sed dentibus facillimè cedit, aded, vt malleo ferreo nobis opus nõ sit. Hac itaq; in causa sunt, vt dubius adhuc sim an vulgare cardamomū legitimum sit quo vsi sunt antiqui. Hoc dixerim ego nunquam, quod mordicus meam velim tueri opinionem, nec quod alius, qui aliter sentiunt contradicere velim, sed vt meã tantū sententiã palam facia. Ad hæc nec Arabum Cardamomū, hoc representare videtur, quandoquidē aliud Græci, aliud verò Afri pro Cardamomo intelligunt, vt apertissimè testatur Serapio, qui quàm plurima simplicia medicamenta ex Dioscoride, & Galeno transcripsit. Is enim (vt sua declarant monuimenta) Dioscoridis Cardamomū, Cordumenū appellat, deinde auctore Isach Arabe sui Cardamomi peculiare caput instituit: idq; Saccolā sua lingua nominat: quin & duum esse generū tradit, alterū maius, alterū verò minus: quorum nullū non modò Dioscoridis Cardamomo responderet, sed nec etiam vlli eorū, quibus officina indifferenter vtuntur. Probatur præterea officinarū Cardamomum Arabicum nullum esse, quod Serapioni maius Cardamomū semen sit planta, quod oblongis quibusdā concluditur capitibus, iis sanè similibus, quæ è rosis prodeunt, granis obnigris, rotundis, pipere longè maioribus, in quibus minuta semina concluduntur, angulosa, faveola, & odorata: minus verò nullo contegitur capitulo maioris modo, quanquã colore conueniant. Quod planè indicat omne officinarū Cardamomū haud Arabū esse, sed potius ab eo maxime differre. Quare putauerim, illud falsò sibi persuasisse Monachos, qui in Mesuem scripsere, & Arabū Cardamomū minus illud semen sit, quod seplasia Meleghetta vocant, Andrea Bellunenſis, qui Auicennā mendis expurgauit, auctoritate freti. Sed cū Bellunenſis id asserat vulgari tantum opinione ductus: cumq; nota minime eorū sententia adstipulentur, errasse Monachi faciliè deprehenduntur. Semina enim qua Meleghetta appellunt (vt omnibus planè cõstat) capitulis excepta suboriuntur, quod minori Serapionis Cardamomo non euenit. Crediderūt, Ruellius in suis de natura stirpiū libris, & Fuchs in sua methode, id omnino Mauritianorū esse Cardamomū, quod nos PIPER INDICVM, alij siliquastrū appellant: verum cū planta hæc foliis exeat hortensi solano similibus, floribus luteolis, fructu longo corniculorū instar, qui primo exortu virescat, maturus verò aded rufescat, ac leuore quodã ita pelluceat, vt coralliū referat, & in quo concludatur pumilū semen, lentū modo compressum, vsq; adeo acre, vt ori tantum admotum maxime linguã, & palatum exurat, exulceretq; ambo hac in re lapsi deprehenduntur. Nã etsi Indicū piper in hisce corniculis rosarū ferè modo suū includat semen, reliqua tamen Serapionis Cardamomo nullis notis correspondet: hoc enim suis in vasculis globulos quosdã concludit, nõ lenticulis similes, sed rotundos, & pipere crassiores, qui intra se minutū quoddã semen continet. Huc etiã accedit, quod cū hoc piper corniculatū, tū semine, tū corniculis ipsis tanta sit acrimonia præditū, vt nõ modo mansum, sed tantum admotū statim quasi ignis exurat, absurdū vtiq; fuerit credere Serapionis Cardamomū esse, cū dixerit ipse magis adstrictoria facultate pollere quàm acri. Ceterū scribit Auicenna maius Cardamomum grana cicerib. atris, minus verò lentibus minora proferre. Quod cū fortasse Ruell. haud rectè percepisset, ei errandi ansã præbuit: quippe minori Cardamomo, nõ autē maiori semina lentium modo nasci ait Auicenna: quanquam Ruellius, vt suam tueatur sententiã, secus sorte legerit Auicennam. Plinius lib. XII. cap. XIII. quadruplex esse Cardamomi genus scribit, sic inquit. Simile est amomo Cardamomum & nomine, & frutice, semine oblongo. Metitur eodem modo & in Arabia. Quatuor eius genera: viridissimum ac pingue, acutis angulis, contumax fricanti, quod maxime laudatur: proximum è rufo candicans: tertium breuius, atque nigrius: peius tamen varium, & facile tritu, odorisq; prauis, quod verius costo vicinius esse debet: hoc & apud Medos nascitur: hæcenus Plinius. Sed nescio quos auctores sit secutus, quandoquidem tam Dioscoridi, quàm ceteris Græcis, vnum tantum extet Cardamomi genus. In cuius defectu supponis Galenus aut myrrum, aut

cyperum. Qui præterea Cardamomi meminit libr. VII. simplicium medic. his verbis. Cardamomum est sanè fa- Cardamomi
cultatis admodum calida, non tamen vsque adèd, vt nasturtium: sed quantò succuius, magisq; fragrans est nastur- vires ex Ga-
tio, tantò & imbecillior ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneum est vel ipsum per se illitum. Porro adiun- leno.
ctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter psoras detergit. Carda-
momum, καρδάμωμον, quod non secus Latinè atque Græcè vocatur: Arabibus, Cardameni, seu Cordumeni: Ita- Nomina.
licè Cardamomo: Germanis, Cardomömlin: Hispanis, Grana de parayso, [officinis Melegeta & grana paradyfi.]

Kαρδάμωμον dicitur quasi Nasturtium suaue. Verùm an officinarum Cardamomum sit idem cum
Dioscoridis Cardamomo, ambigitur: cum nullas Dioscorides notas proponat, ex Galeno &
Paulo id elici debet: quod si ergo ea perpendamus, quæ Galenus lib. 2. de Antid. in compositione
Zenonis habet, καρδάμωμον τῶν λοβῶν χωρὶς, τῆς ἐψηριώννης: & in versibus Damocratis, Cardamomum
10 semen esse quod sit inclusum folliculo: Dein si color albicans ex Aegineta addatur: tum ex Dioscori-
de, quod eligendum sit plenum, frangenti contumax (intellige dum adhuc in folliculo est) oclusum,
quod odore caput tentet, gustu acre sit & amarum. Hæc si cum nostro conferantur minore Carda-
momomo, omnes in eo notæ, vt arbitror, apparebunt, licet Manardus & Brassauolus astruant, vero nos
Cardamomo carere. Verùm Dioscorides & Serapio integros vtriculos granis refertos, vt olim affe-
rebantur, describere: hodie verò vt plurimum sola grana adferuntur, cum Græci vt videre est apud
Galenum 7. de Compos. medicament. secundum loc. 3. in confectione Pamphilij. καρδάμωμον
ἰψηριώννης ἐξέντερον, & aliquando τὴν ἐψηριώννην ex vtriculis exempta grana requirant. Sunt alij
qui nostrum Cardamomum veteribus tum Græcis tum Latinis indictum, & Dioscoridis Cardamo-
momum idè esse cum Arabum Cordumeni velint: at officinarum Cardamomum esse Arabum Saccolaa
20 aut Saccule Auicennæ: alij maius Heyl & minus Helbane vocitant. Cæsalpinus ex genere Afari Car-
damomum esse dicit: sed de his agemus Deo auxiliante in tractatu nostro, quem de materia Medica
in officinis vsitata inscribemus. Genera plura videtur Dioscorides agnouisse, cum ex Comagine, Ar-
menia, Bosphoroq; deuchi scribat, & subiungat in India quoq; (vnde ad nos etiam adfertur) & Arabia
peruenire. Hoc ex Galeno probari posse videtur, qui in Theriaca Andromachi 1. de antid. & 1. de
Theriaca ad Pisonem, Indæum requirit Cardamomum. Tria proponit genera Matthiolus: at recen-
tiores quinq; agnoscunt, his nominibus. I. Cardamomum maius Matthiolus vocat ea grana, quæ offi-
cinis & vulgo Grana paradyfi dicuntur, qua voce Lon. & Lac. vtuntur, hic verò Cardamomum quoq;
hortense nominat. Grana paradyfi, aliàs Melligeta, quæ Cardamomum maius vocant malè. Cord. in
Diosc. Melligetta seu Cardamomum piperatum, Cord. hist. Milleguetta, Grana paradyfi, Lob. Carda-
momum alterum, Cæsalp. Cardamomum primum. Cam. 1. Cardamomum Arabū maius. Tab. II. Car-
damomum mediū Matthioli: Cardamomū maius, Heyl Arabibus, Cord. in Diosc. & hist. Cardamomū
30 mediū, Lon. Cast. Cardamomū maius vulgare, Lob. Clus. in Gar. Tab. Cardamomū 2. Camerario. III.
Cardamomū minus q̄ vocat Matthiolus, a recentioribus in tres species distrahitur: a notatum dicitur
Cardamomū mediocre, Cord. hist. Cardamomū mediū, Lob. Tab. Cardamomum 3. Cam. 4. b Carda-
momum minus propriè Matth. & Lac. cui & Cardamomū sylv. Cardamomū minus, quod simpliciter
Cardamomum dicitur, Helbane Arabibus, Cord. in Diosc. Cardamomum minus, Eid. hist. Tab. Carda-
momum minus vulgare, Lob. & Clus. in Gar. Cardamomum primum, Cæsalp. Verùm quemadmodū
Matthiolus cum præcedenti iunxit: sic & Camerarius cum priori, Cardamomi tertij nomine pingit.
c Cardamomum minimum, Lob. Taber. Cardamomum quartum, Camer. 1. Lugdunense herbari-
um ad imitationem Matthioli, Cardamomi omnes species vna icone proposuit.

L. NARDVS INDICA. Νάρδος. NARDVM. CAP. VI.

Valeriana jatamansi *Strub.*



DVO Nardi genera: vnum Indicum, alterum Sy-
riacum appellatur, nō quòd in Syria proueniat,
sed quòd montis in quo oritur, pars vna ad Syrios,
pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere,
præcipuū est recens, & leue, largā gerens comam, fla-
uum colore, perquam odoratū, ac cyperū redolens,
† breui spica, amaro sapore, linguā siccante, q̄ diu in † Breui. Ma-
sua odoris gratia permaneat. Ex Indico autē Nardo ^{usq; i. parus}
quoddā Gangitis vocatur, à fluuio Gange, apud quem
enascitur, montē præterfluente: quod genus ob mul-
tam loci, in quo prodit, viginē, viribus infirmius est,
atq; procerius adolescit, plures ferens spicas, ab vnica
radice comosas, vnaq; conuolutas, ac grauitè olen-
tes Montanū autem odoratius, spica breui ac murti-
la, odore cypero vicino, cæteras habens Syriaci do-
tes. Est & genus quoddā, cui Sampharitico nomen
locus indidit, frutice breui, in magnas se spargēs spi-
cas, candidiore interim medio caule, hircorum virus
supra modū redolente: quod improbat: madefactū
vendi solet, q̄ vitiū ex eo deprehenditur, quod candi-
da sit spica, & squalida, suaq; careat lanugine. Adulteratur stibio cū aqua, aut palmeo vino, inspissatio-
nis ponderisq; causa inspirato. Intueri autē oportet, si lutū radicibus infideat, & in cerniculo puluerem
excutere, eluendis manibus vtilem. Vim habent excafactoriā, & exiccantem. Vrinam mouent: alium
C 3 potu

da sit spica, & squalida, suaq; careat lanugine. Adulteratur stibio cū aqua, aut palmeo vino, inspissatio-
nis ponderisq; causa inspirato. Intueri autē oportet, si lutū radicibus infideat, & in cerniculo puluerem
excutere, eluendis manibus vtilem. Vim habent excafactoriā, & exiccantem. Vrinam mouent: alium

potu sistunt: vuluæ profluua, faciemque apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rofionibus, inflationi, iecinori, regio morbo, renum vitiiis. Aquæ auté incoctæ fotu ad infellum, vuluæ inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas valent, siquidem eas ad densiorem pilâ reducunt: perfufis humore corporibus insperguntur. Milcentur antidotis, & in fictili nouo nopicato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nardi Indicae
& Syriacae
consideratio.

Manardi er-
ror, officii
nardum, nec
Indicam, nec
Syriacâ esse.

Spica nardi
est nardi ra-
dix.

Brasauoli er-
ror, nardi ra-
dicem nullius
vius existi-
mantis.

Brasauolus i-
gnorauit spi-
cam esse nar-
di radicem.

NARDVM officina Nardi spicam appellant: Spica non est, quæ in culmorum summitate oritur, sed radix quæ spica figuram habet. Complures enim ab vna basi oriuntur spica, perinde ac in lilij aut allij radice, verum capillata & comosa, colore ferrugineo, pluribus vna parte capillamentis, odore haud iniucundo. Sed non desunt, qui credant Indicam nardum in Italiâ non aduehi ob regionis distantiam, Syriacâ opinantes esse, quæ nostro æuo seplasiarum vitur: tam etsi (vt inquit Dioscor.) in Syria non oriatur, verum ideo Syriacâ dici, quod ea montis parte proueniat, quæ flectitur ad Syrios. At cum inter Indos, & Syrios amplissima interponantur regiones, nempe deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, aliæque nonnulla, quæ ultra quatuor millia miliariorum continent, nesciuerim profecto, quoniam pacto fieri possit, vt mons ille ad Gangem positus, altera parte Syriam tam facile respiciat, vt Nardus ea parte proueniens Syriacâ dici mereatur. Quo fit, vt quandoque, mecum disquirere licuerit, eam potius à Syraſtene regione, quæ ad Indicum fluium est, Syriam nomen sibi ascinisse, quâ à Syria: quandoquidem, si Ptolemaus vera refert, mons in India visitur, qui à Gange fluuio ad Syraſtenem extenditur. Absurdum enim esset credere, Nardum ad nos non deferri ex India, cum in Syria nardum proueniat, cumque multa India aromata, nulla distantia habitare ratione, per Carouanas (vt vocant) in Alexandria Aegypti conuehantur: cum quibus nec temere credendum est, quin Nardum etiam conuehant mercatores: praesertim cum certo sciam, Nardum Venetias ex Alexandria afferri: nec eam alibi, quam in India nasci, Dioscoridis testimonio satis aperte monstretur: etsi Plinius contra scribat nasci in Syria Nardum, praeter eam quam India mittit Syriacam Dioscoridi appellatam. Caterum Manardus Ferrariensis, officinarum nardum nec Indicam, nec Syriacam esse censet. In cuius sententiam non equidem pedibus eo, etsi medica materia is clarissimus fuerit indagator, quippe quoniam Venetiis pluribus in locis Nardi ingentem copiam vidi, lauis, comosa, perquam odorata, cyperum redolentis, flaua, subamarâ, & mansa non modo linguam exiccantis, sed odorem etiam non iniucundum per os aspergentis, nulliusque deficientibus notis, quibus optima nardus ex Dioscoridis sententia explorari potest. Sed plerumque accidit, dum per Indicum, & Arabicum mare in Alexandriam deferretur, & inde Venetias, vt ascito sibi maris humore (id namque facile fit, quod Nardus sit siccissima) vel situm contrahat, vel subputrescat: vnde postea amissa sua uolentia, grauius oleat. Quo fit, vt hac in re Manardum longè hallucinatum crediderim, qui si rectè perpenderit, quæ Nardi pars sit spica, atque in emporiis, vbi numerosa praestantissimaque visitur, accuratius ipsam expendisset, non equidem vercor, quin aliter de ea scripsisset. Verum enim uero cum planè ignorasset, quæ nardi pars spica esset, selectamque, & incorruptam Nardum minime nouisset, lib. VI. epist. III. scribit, Galenum de nardi spica, quæ antidotis admiscetur, loquentem, radicem quidem, non spicam intelligere. Et vtinam, inquit, quæ nobis assertur legitima esset: sed quod ea ipsa non sit, cognoscitur, quod nulla odoris suauitate commendetur. Et lib. VIII. epist. I. inquit, Galenus lib. I. de antidotis in theriaca compositione Nardi radicem tantummodo admiscet, eo quod viribus ipsa praestantior sit: spicam verò parumpendit, & pro nihilo habet. Quod sane declarat, Manardum hanc Galeni sententiam perperam accepisse, atque etiam Nardi historiam ignorasse, quandoquidem nardi radix nil aliud est, quam spica, vt ipsemet testatur Galenus eodem de antidotis libro, sic inquit. Iubet Andromachus adiciere nardum indicam: ea verò est, quæ spicam vocant, non quod spica sit, radix etenim est, sed quod spica formam referat. Quibus palam est, idè esse nardi spicam, & nardi radicem, vt etiam nunc declarat idè Galenus lib. IX. de compositione medicamentorum secundum locos, in Philonis antidotum scribens, dum inquit. Quin & nardi ipsius drachmam vnam coniiciendam censet, quæ falsi nominis radicem dixit, quandoquidem spica nardi nominatur. Quapropter idè lib. VIII. simp. medic. de Nardo caput facturum, illud inscripsit, Nardi spica, utpote quæ pars sit in tota stirpe praestantior, minimè quidem ignorans, se radicem nardi describere. Nã si sensisset, spicam à radice differre, eam planè silentio praeteriisset tanquam inutilem, & capiti nomen indidisset aut generaliter ab ipsa Nardo, aut à radice tantum, vt viribus praestantior. Manardo subscribit, & quidem malè, nouus quidam rei plantaria censor, Nardum inquit, quod ad nos assertur, nec Indicum, nec Syriacum est, sed Gangiticum. Quo argumento quis facile nosse potest, quam diligenter hic peritus herbarius perlegerit Dioscoridem, quamque in Geographorum libris fuerit versatus. Sed nescio quis tam fuerit amens, qui dixerit plantas, quæ circa Tyberim nascuntur, non esse Italicas. Atqui Gangiticum Nardum Indicam esse apertissime testatur Dioscorides sic inquit. τῆς δὲ ἰνδίωνος ἢ ἰνδίωνος λέγεται γαγγίτιος δασύτινος πάλαι παρὰ πέρωντος ἔσπου γὰρ καλουμένη. Id est ex Indico autem Nardo quoddam Gangitis vocatur à Fluuio Gange, apud quem nascitur montem praeterfluente. Sed an Gangitis nostrum sit, vel quod in monte nascitur, difficile quidem ob eas, quas diximus rationes, quempiam affirmare posse censet. In hoc, ac longè maiori versatur errore Brasauolus, siquidem suo de simplicium examine, Nardi spicam non modò non esse radicem censet, sed nullius vsus eam existimat, sic inquit. Venetiis spicam, caulem, & radicem emes, quamuis & ipsi adulterent. Iubeo autem radicem, & caulem emere, quoniam hac apud antiquos auctores, vt Dioscoridem, & Galenum magis in vsu medico sunt, quam spica: quippe folia abiicit Dioscorides: ad nos tamen spica non deferretur, sed radix: hac ille. Sed mehercule quantum ex Dioscoridis scriptis percipere potui, nunquam hactenus sum consecutus, quod ipse ex omnibus nardi partibus aliam praeferat, quam spicam. Quod autem crediderit ipse spicam in Nardo viribus magis praestare, quam caetera eius partes, quodque cum de Nardo scribit, tantum de spica intelligat, apertè ostendit, cum inquit. Ex nardo Syriacâ dicta melior est recens, & leuis, largam gerens comam, &c. Quippe leuitas, ac comae magnitudo, nullis nardi partibus, praeter quam spica competunt, praesertimque cum ipsa non vacet caeteris notis, quas illi tribuit Dioscorides. Ad hæc nulli sanè incompertum existimo, Dioscoridem huius libri initio in probandis tantum radicibus, quæ odore commendantur, operam impendere, nempe iridis, acoque caulium summitatibus innascantur. Quo fit, vt etiam fateri liceat, Brasauolum ignorasse spicam ipsam esse nardum: quin potius pro certo credidisse in planta ipsius nardi cacumine, non in radice oriri spicam, quæ tamen Galeno teste radix est, & caeteris nardi partibus praestantior, quandoquidem si aliter res se haberet, commoda

Admoda longè plura radicibus ex more redderet Dioscorides, quàm spica. Quod præterea Galenus plus laudauerit Nardi caules, quàm spicam (vt asserit Brasauolus) nusquam compertum habeo. Caterùm quanta sententia inconstan-
 tia Nardi historiam idem descripserit, ex suo posteriori simplicium examine, in quo vltimam manum imposuisse fate-
 tur, facillè conicitur, dum senem secum colloquentem instruit, his verbis. Ne igitur in his montibus Nardum queras,
 sed Venetis spicam, caulem, & radicem emes. At sui ipsius statim oblitus videtur non multis post lineis, cum inquit. A-
 liud verò sunt spica, & flos, quæ ad nos non afferuntur. Ex quo facillè crediderim, ipsum non modò Nardi historiam cõ-
 fadisse, atque etiam, quod peius est, corrupisse, sed etiam sibi ipsi, vel potius seni verba dedisse: primum namque ait Ve-
 netis spicam, caulem, & radicem reperiri: mox spicam ad nos aduehi negat. Sed ante hos hac in re Plinium quoq; gra-
 uiter hallucinatum inuenio: quippe qui libro 6 cap. xii. in Nardi ipsius historia longè dissideat à Dioscoride & Gale-
 no, quin & à cæteris materia medica auctoribus, dum ita scribit. Nardum frutex est graui, & crassa radice, sed breui, ac
 nigra, fragiliq; quamuis pingui, situm redolente, cyperi odore, aspero sapore: folio paruo, densiq;. Cacumina in aristas se-
 spargunt: ideo gemina dote Nardi spicas, ac folia celebrant: hæc Plinius. Cuius doctrinam secuti, non modò Ferrarienses
 illi, sed Hermolans, & Ruellius, ipsi quoq; pariter aberrarunt: siquidem Ruellius (vt puto) nulla alia de causa asserit, se
 in officinis Nardum vidisse, cui inerant dotes omnes illi à Plinio redditæ, quàm vt Plinianam tueretur lectionem: quod
 tamen falsum esse arbitramur. Ego enim tametsi Nardi quàm plurimum in Venetis officinis diligenter examinaue-
 rim, ac selegim, aliud tamen, quàm spicam videre mihi non licuit. Quapropter nullum inueniri Nardum existimo,
 quod in caulium cacumine spicas proferat, quem admodum tradidit Plinius, asserit Ruellius, & contendit Brasauolus,
 contra Galeni, & Dioscoridis sententiam. Qui Nardum describit plures ferre spicas, non quidem à caulibus, sed ab vna
 tantum radice prouenientes: non tamen quod alia radix viribus præstans spicis ipsis subsit, sed quoniam, cum plures in
 radice sint spica, necesse est, vt basi, vel firmamento aliquo consistant, à quo originem trahant, vt in allio & lilij radici-
 bus conspicitur. Quod pro explorato confiteri possum, cum sæpenumero Venetis Nardi spica cespites viderim, tum figu-
 rata tum etiam spicarum connexu alium referentes, vt vnusquisq; pro arbitrio experiri poterit. Verum enimvero vt pro-
 bè responsum sit omnibus serè obiectionibus, dicimus, quod si fortè reperirentur, qui assererent illas esse proprias Nardi
 radices, quæ capillaceis fibris à spicarum basi oriuntur, vt in allio, capis, ac bulbaceis omnibus visitur, & eapropter spi-
 cas ips annexas non esse Nardi radices, sed per se partes ab his admodum differentes, potest eorum obiectio facillè dilui
 Theophrasti testimonio. Siquidem in lib. primo cap. x. de plantarum historia aperte declarat, in allio, capis, bulbis, lilij,
 ac aliis eius generis, & per consequens in spica, non solam dici radices ea capillamenta, quæ bulbaceis illarum planta-
 rum capitibus subiiciuntur, sed etiam id bulbaceum totum, quod terra reconditur. Et vt res ipsa clarior omnibus sit, ge-
 nerali regula expressum voluit, quod totum id in quauis planta, quod sub terra obruitur, radix commodissimè dicatur.
 Prinde videtur Nardum ipsam inter radices idem memorasse Theophrastus lib. i. x. cap. vii. de plantarum historia, his
 verbis. Quibus ad vnguenta vtuntur, hæc serè sunt, castia, cinnamomum, cardamomum, nardus, narum, balsamum,
 asphaltus, styrax, iris, narta, costus, panaces, crocum, myrrha, cyperus, iuncus, calamus, sampsuchum, lotus, anethum.
 Horum alia radices, alia cortices, alia rami, alia ligna, alia semina, alia lacryma, alia flores. Quibus palam est, non
 posse Nardum nisi inter radices recenseri, cum nec corticis, nec ligni, nec rami, nec floris, nec seminis, nec tandem lachry-
 ma speciem præferat. Quod cum rectè sciuisset Galenus tum libro. i. de antidotis, tum. i. x. de compositione medicam.
 secundum locos, Nardi spicam radicem esse declarauit. Verum longè ab omni Nardo distat NARDVS ITALICA,

Plinius hallu-
cinatur.

Hermolai &
Ruellij error.

Dilatio cu-
iusdam obie-
ctionis.

Nardus Italia
ca.

Nardi Itali-
cae historiam

Nardi Italia
ca.

Florum nardi
vires.

II. NARDVS ITALICA.

qua nostris vulgò vocatur Spigo. Cuius etiam generis ea est
 planta, quam aliqui vulgò appellant Lauanda, alij verò
 Lauendula, aded vt hæc femina, illa verò mas in eo genere
 à quàm plurimis vocitentur. Mas folio constat latiore, la-
 giore, crassiore, robustiore, albidiorq; quàm femina. Sed
 vtraq; plãta fruticosa, ac lignosa, stachadis aut rosmarini
 modo, innumeris referta est foliis longiusculis angustiuscu-
 lisq; è quorũ medio iuncea exeunt cauliculi, quadranguli,
 tenues, dodrantalè longitudinè excedentes: in quorum ca-
 cumine flores exeunt spicati, colore purpureo, (quamuis in
 femina dilutiores, patientiores, & mitiore satis odore, ac
 magis grato odore fragrant, verum vsq; aded acuto, vt
 nares feriat. Nascitur in collibus & locis saxosis, à sole illu-
 stratis, & feritur in hortis. Excalfaciunt, & exiccant ambo
 ordine secundo completo, vel tertio inchoante; viribus à vites.
 Nardis omnibus nõ longè recedentibus. Aperiunt, attenu-
 ant, resoluunt, concoquunt. Conferunt omnibus cerebri e-
 gritudinibus à frigido prouenientibus: Epilepticis, apople-
 tictis, veteriosis, conuulsis, resolutisq; auxiliantur: ventri-
 culum roborant, & iecur ab infarctu liberant: quin &
 obstructos lienes iuuant: vterum calefaciunt, & menses
 & secundas educunt. Flores ex vino seruesacti vrinã pel-
 lunt, & status dissolunt illiti. Datur decoctũ è floribus pa-
 ratũ vtiliter morbo regio affectu ab infarctu iocinoris, &
 præsertim si cũ Marrubio, cinnamomo, & feniculi, & a-
 sparagi radicibus incoquatur: colluuntur itẽ eodẽ decocto
 vtiliter in dolore dentes, rheumatismis præsertim obtortis.
 Stillatitia florũ aqua potũ duorũ cochleariorũ mēsurã, de-
 perditã reddit loquelã, & cardiacã sanat: præstat quoque
 ad animi deliquia nõ solũ potã, sed etiã naribus illita, &
 arteriis admota. Fit è floribus stillatitiã vitreã




Lauandula spica
 Slem.

Oleum Spicæ

III. LAVENDULA.

Nardi Indicæ
vires ex Gal.

Nomina.



organis, quod proprie vnguentarij vulgò vocant olio de Spi-
go, odoris adeò acerrimi, vt cetera odoramenta superet: quo
fit, vt extra officinas illud afferuent, ne moschi, ambari, Li-
betti, aliorumq; vnguentorum, & aromatum suauitatem
intercipiat, quod illinitur vbi excalfacere sit opus. Femina
etsi idem possit qua mas, at peculiariter vesibus interposi-
ta, eas à tinearum rosione vendicat, & odoratas reddit.
Nardi Indica vires scripsit Galenus lib. VIII. de simplicium
medicamentorum facultate, sic inquit. Nardi spica ex-
calfacit excessu primo, & desiccet secundo iam completa.
Composita est ex adstringente sufficienter substantia, &
acri calida non multa, & quadam leuiter amara. Ex his
constans facultatibus radix & ad iecur, & ad stomachum
rationabiliter conuenit tum pota, tum extrinsecus imposi-
ta. Vrinam ciet, morsus stomachi sanat: in ventre, ac inte-
stinis consistentes fluxiones desiccet, adhuc & eas, quæ in
capite, & thorace. Valentior est vocata Indica, nigriorq;
quam Syriaca vocata. Νάρδος & νάρδος ἄγρος sic Græci
dicitur, vt Latinis Nardum, & Nardus, seu Nardi spica:
Mauritanis, Stumbel, aut Senbel: Italis Spico & spigo nar-
do, Germanis Edelstrembd / Woltriecherdt. Spicken
Narde: Hispanis, Azumbar, aut Espiga sil: Gallis, assie
& oultremer. Bohemis Nardus indyanski. At vulgaris nar-
dus qui pseudonardus, seu Nardus Italica, Italis spigo. Ger-
manis gemetne Spicker: Narde: Boemis spica nardomaci:
Gallis lauande masle. Lauendula verò seu Pseudonardus
femina. Italis lauanda: Germanis Lauendel: Bohemis La-
uendula: Gallis lauande femelle.

Nardus forte à Naardo vrbe Syriaca Euphrati
contermina: alijs νάρδος ἄγρος: quam inter aro-
mata Dioscorides, inter odorata Theophrastus 9. hist. 7. recensuit. Nardus Indica quæ Spica officina-
rum, & à Syriaca & Gangite natalibus tantum differre videntur, & hodie ad nos indistinctæ iisdem sac-
cis adferuntur: qua de re in vniuersali nostra historia. Nardus Indica siue Spica Nardi, Matth. Ital. & 4.
Cast. Nardus & Spica Cord. in Dios. Nardus Indica, Cord. hist. Loni. Tab. Nardus Gangitis, Anguill.
Spica Nardi, Aduers. Lob. icon. Garzia, A costæ. Lugd. Casal. cui ex algarum genere esse videtur. Nar-
dus, Lac. Lob. ob. Clus. in Garz. Spica Nardi Indica, Lugd. Quando simpliciter Nardus habetur, Indica
vel Syriaca intelligenda: sic & quando simpliciter Spica scribitur, hæc Spica Indica, vel Nardus intelli-
genda. II. Lauendula quia lauacris expetitur, à Plinio lib. 8. cap. 12. Pseudonardus: à Mesuæo sta-
chys Arabica dicitur: quam aliqui ad Stachadem veterum, alij ad Libanotidem coronariam, vt Leoni-
cenus, Manardus & Ericius Cordus: alij ad Casiam Vergilij referunt: alij ad Casiam albam Theoph. alij
Cercorum albam eiusdem censent: quibusdam Spica seu Nardus Celtica malè statuitur, cum & Nar-
dus Celtica & Lauendula sui generis sit planta. Hæc triplex, latifolia, angustifolia & dissecto folio. La-
uendula latifolia C. B. libanotidis Coronariæ species, Leoniceno & Manardo: Spica, Nardus Germa-
nica, Trago, Pseudonardus, Matth. 4. & Castori. Pseudonardus femina, Fuch. icon. Lauandula femi-
na, Dodo. gal. Lauandula maior, Cord. in Dios. & hist. Lauandula vulgò dicta stachadi veterum cogna-
ta, Ges. hor. Nardus Germanica: Spica recentiorum, Lob. obs. Nardus Italica, Lob. icon. Lauandula,
Ericio Cord. Dodo. Lauandula mas, Lugd. Lauandula vulgaris altera spica longiore, Clus. hisp. Lauen-
dula folijs latioribus, Cam. hor. Lauendula prima, Taber. Flore variat, vt & sequens, qui communiter
caeruleus, est & purpureo & albo. III. Lauendula angusti folia C. B. Lauendula, Casia Germanica, so
Trago Pseudonardus femina siue Lauandula, Matth. 4. Cast. Pseudonardus mas, Fuch. icon. Lauandu-
la mas, Dodo. gall. Lauendula vulgaris, Cord. in Dios. Lauendula minor, Cord. hist. Lauandula, Lac.
Lon. Cam. hor. Nardus vulgò dicta, Ges. hor. stachys, August. Spica Lauendula, Lob. Lauandula altera,
Dod. Lauendula breuiore folio & Spica, Clus. hisp. Lauandula femina, Lugd. Spica Italica, Cæs. Spica
alba Tabernæmontano.

Νάρδος κελτικη

NARDVM CELTICVM. CAP. VII.

• βαμνίσκος
κεκρόσ. i. par-
tus frutex.
b ὑπομήκη.
i. sublonga
legit vulgata
editio, Ori-
basius vero
ἑπιμήκη
c Omnia etc.
ὑπόζαθα.
i. subnisa.

Celticum Nardum nascitur in Liguria alpibus, aliungia patrio nomine appellatum: prouenitq; in
Istria. a Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet b oblon-
ga, colore in c flauum languido: florem luteum. Caulium, & radicem duntaxat vsus est, & odoris suauis
tas: vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra, pauito solo atque humenti, subiecta
charta reponere, postridie repurgare, siquidem vtile, cum aceroso alienoq; propter humoris vim, non
excuitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ Hirculus vocatur, ab odoris grauitate. Sed facilis co-
gnitio: nanq; herba candidior est, sine caule, minus oblongis folijs, radice neq; amara, neq; odorata, vt
verum Nardum est. Itaq; radices, atq; cauliculi, abiectis folijs, triti secernuntur, vino excipiuntur, dige-
runturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè, recens,
iucundi odoris, radice numerosa cohærens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum, pollet: sed
vehe-

vehementius urinam cit, & stomacho vtilius est. Inflammationibus iecinoris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos iclus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

NARDVS CELTICA.



Tanta fuit veterum, qui nos precesserunt, negligentia, ne dicam ignorantia, vt non modò in veram simpliciū medicamentorum cognitionē, quæ peregrina ex longinquis terrarum partibus aduehantur, probatissimorum auctorum ope, venire non elaborauerint, sed ne minima quidem curam adhibuerint, communi reipublica beneficio, vt de his saltē qua inquam plurimis Italia locis, ac aliis non longè distantibus inueniuntur, quicquam lucis assequeretur, ac posteris relinqueret: quin potius in suis multò videntur negligentiores, quàm in alienis. Nascitur Celtica nardus in Liguria alpibus, nascitur & in Istria, pariterq; in montibus non longè à Villaco Carinthia oppido, & Iudemburgio Stiria: attamen non ob id legitima in multis videntur officinis: nec fortasse in iis videretur, nisi his nostris lucubrationibus annis superioribus Italico sermone editis, pharmacopola plures diligentiores redditi, medicā materiam accuratius expendere cœpissent. Sed id magis detestandū videtur, quòd iis in regionibus, vbi Celtica nardus nascitur, magis hallucinentur homines, quàm alibi: siquidem Genue, quæ Liguria est ciuitas (nisi iam admoniti respiciant) alijsq; finitimis locis, vbi Celtica nardus facile haberi potest, tã Medici, quàm seplasiarj aliorum ignorantiam secuti, illius loco, Lauanda sic vocata, vel nostrate Nardo passim vtuntur. Quæ quantum in historia omnibus notis, non dicã viribus, à Celtica nardo discrepent, quicunq; primum rem optimè perpenderit, ac deinde notas, & qualitates illi à Dioscoride redditas, cū Lauanda, nostratisq; Nardi notis comparauerit, manifestū eorum lapsum facile incusare poterit, quippe Celtica nardus in breuem, exiguamq; plantam consurgit caule tenui, & imbecilli, radice squamosa, spica facie referete, è qua tenues & numerose pro-

Nardi Celticae consideratio.

Vbi nascatur nardus Celtica.

Comparatio Nardi Celticae cum Lauanda.

deunt fibra: Lauanda verò, & socia Nardus magno exoriuntur cespite, ramusculis proceris, densissimisq; comantibus folijs. Illa folia fert subrubea, & flores flaua colore: ha autem folijs consurgunt incanis, floribus spicatis, & colore purpurascens. Illius caule & radicibus vtimur, quòd hisce partibus maxime polleat: harum verò tantum flores commendantur. Quod satis clarè demonstrat, quàm facile decipiantur, qui tam leuibus & falsis feruntur opinionibus. Verum quanquam (vt in superioris Nardi mentione diximus) communi omnium sententia compertum sit, Lauanda, spicaq; nostratis facultas ad omnia Nardi genera propius accedere, hoc tamen eos ab errore non vindicat, qui Lauanda Celticam nardum esse contēdunt. Præterea non desunt pharmacopola rei herbarie penitus ignari, qui pro Celtica nardo plantam quandam incognitam emant humi repentem, caule longo reflexoq; cuius folia, quæ colore subflauo constant, adeo densa ac minuta sunt, vt potius muscosam arborum, & lapidum materiam, quàm aliud representent. At quòd in vestigandis caulibus ipsius ramusculis, eos tam dense circundat, vt ferè spica effigiem præ se ferat, pro Celtica nardo ab impostoribus venditur: sed hæc haud amarescit, nec vlla odoris præstantia commēdatur. Huius imaginē dabimus inferius, vbi de arborco musco differemus. Ceterum ingens legitima nardi Celticae proventus habetur in Istria, Austria & Carinthia contermina, vbi Iudemburgensia rura suis è montibus quotannis innumeros comportant fasciculos, quibus magnos admodum replent saccos, & mercatoribus vendunt, qui in Syria, & Aegyptū mercimonia conuehant. Siquidē (vt ferunt) Syriis, & Aegyptiis Celtica nardus maxime expetitur, vt balneis eam imponant, quibus frequenter vtuntur. Celticam nardum ad me primum misit Petrus Salicetus clarissimus Medicus ex Graecia Stiria oppido: in cuius plantis & spica in radicibus, & folijs, & flores in caule (vt appicta figura demonstrat) nullo impedimento cernebantur, adeo vt à Dioscoridis historia nulla ex parte recederent: nec vlla tamen spica in eius cacumine videbatur, vt Ruellius & Brasauolus in Indica nasci scripserunt. Quamobrē nobis quoq; iam liceat literis memoriæq; mandare Celticā nardum nō modò in Liguria, & Istria prouenire: sed etiā in Stiria, Carinthia, ac etiā aliis fortasse locis: quippe superiore anno ego huius Nardi nonnullas inueni plantas in quodam Vipaci monte, qui tantum viginti millia passuū à Goritia distat. Verum si cōdesituantur Medici, cōmodè Indicā supponere poterunt. An verò Celtica nardus sit Saliunca, aut nō, de qua Vergilius, & Plinius scripsere, etsi hæc inter se nullā habere cognationē pluribus comprobare possem: cū tamen ea parū, vel nihil rei medica conferant, silentio inuoluenda duximus: quanquā eruditissimus Leonicensis non animaduertens Dioscoridem Aliungia, non Saliuncā, Celticā nardum appellasse, Pliniū accusat, quæ in re ipse potius deceptus fuisse videtur: quemadmodū & Fuchsius, vir alioqui nostra ætatis clarissimus. Is quidē in suo libro de componendis medicamentis, quò ultimo loco auctum edidit, vbi Diathamaron expēdit, Celticā nardum à Saliunca nihil differre existimat. Plinius tamen locis separatim de vtraque, tanquam herbis inter se differentibus tractauit: neq; ea notis tantum dissident apud antiquos auctores, sed etiā natali solo. Dioscoridi enim Celtica nardus in Liguria alpibus, atq; in Istria prouenit: Plinio verò Saliunca in Pannonia, & Noricis nascitur. Itaq; Fuchsius vt Ruellii sententiam secutus, qui Celticam nardum Dioscoridi Saliuncam appellari affirmat, ita mihi & à veritate defecisse, & vnā cum illo errasse creditur, quando quidē de qua Vergilius meminit in Bucolicis, vt Anguillarius contendit, non ita facile consentiam, tum quòd Seruii auctoritas in simplicium censura perinde ac in Grammatica mihi probanda non sit, tum quòd nullo auctorem testimonio probare

Seplasiariorum quorundam error.


Leonicensi, & Fuchsi optinio improbat, qui voluerunt, Celticā nardum à Saliunca non differre.

Anguillarij opinio repro-
bata in Sali-
unca, & Hir-
culo.

probare nitatur Anguillarius, nil aliud Vergilio esse Saliuncam, quam Anemonem, Grammatici tantum illius authori-
tate fretus, qui nec Lactuc. recte fortasse nouit. Scribit quidem Seruius Saliuncam vulgo vocari Orcitunicam, cum ta-
men nec illam (ni fallor) nouerit vnquam. Sed qua ratione aut authoritate, Orcitunicam, de qua, nemo est, qui memi-
nerit, Anemonem fecerit Anguillarius, nec ipse dicit, nec ego conuicere possum, miror tamen hominem hunc rei herbaria
peritura, in re tam graui, tam leuibus, tamq. vulgaribus niti argumentis, sed is fortasse conducibilis sibi fore putat, no-
ui aliquid in medium asserre, quam de his grauiori iudicio differere. Ego sane etsi parum in hac facultate sum versatus,
haudquaquam tamen dixerim Anemonem, proceram satis plantam, vocari Vergilio humilem: nam & ipsa Vergilii
comparatio, nostra astipulatur sententia, quippe qui, vt Mopsim plurimum laudaret, ei tantum cedere dicit Amyn-
tam, quantum Saliunca humillima herba, puniceis cedit rosetis, facta comparatione a pumila planta ad roseta. Nec

Hirculus.

HIRCVLVS.



Nardi Celri-
ca vires ex
Galeno.
Nomina.

præterea placet Anguillarij ipsius opinio de HIRCULO herba, 10
quam à Samphoritico Nardo, quod in India nascitur, nihil dif-
ferre putat. Siquidem Hirculus herba est, Celtica nardo similis,
non quidem nardi genus, vt Samphoriticum, ita à loco in quo
prouenit, denominatum, & in magnas se spicas diffundens: sed
fortasse, quod hircum redoleat, hirculum id esse censet Anguillari-
us, cum quo Celticam Nardum adulterari scribit Dioscorides. Sed
non omnes herba, qua hircino sunt odore, hirculi sunt appellanda.
Atqui si quis plura de Saliunca videre cupit, nostras legat epistolas
Ioanni Cratoni inscriptas. Meminit Celtica nardi Galenus lib.
VIII. de simp. med. fac. his verbis. Nardus Celtica iam dictis nardo 20
similis quadantenus in genere facultatis est: ceterum ad etiam
imbecillior, præterquam ad prouocandam vrinam, siquidem cal-
dior illis est, sed minus adstringit. Quæ planta Græcis Νάρδος Νε-
ρτινή, Latinis item Nardus Celtica, seu Nardum Celticum, seu
Spica Celtica appellatur: Italiis verò Nardo Celtico. Sine Spica
Celtica Germanis, Celtischer Nardus: Gallis, Nardus Gaulois:
Bohemis, Celticea Nardus.

Nardus Celtica à loco fortè natali nomen haber:
Celtarum autem appellatione tam Germani, (apud 30
quos vt in Austria, Styria, Parnonia, Norica & alpidis
Heluetiorum prouenit) quam Galli (cuius nomine Nardus Gallica Plinio lib. & cap. 12. dicitur) vocan-
tur. Addit Dioscorides, & patrio nomine appellari Νάρδος γαλι-
& Cæsalpinus legunt, at Goupylius in notis Νάρδος γαλι-
putant. Rectè videtur Saliunca legi, qua voce & Plinius (non tamen cum Vergilij Saliunca idem dici-
mus) loco citato, & Scribonius, cui & Nardus syluestris, vsus est, sic & Germani plerique eandem her-
bam adhuc proprio veterique nomine Saliunca, quasi animam iuuenilem reddens, appellant, apud
Galenum, Nardum Celticam interpres posuit Gallicam. Nardus Celtica Dioscoridis, C. B. sic & Lac.
Gef. hort. (qui Valerianæ cognatam dicit) Cord. hist. & in Diosc. (cui & Spica Romana officii.) Lob.
Cast. Lugd. Tab. Saliunca, Gef. hort. Nardus Gallica & Saliunca Plinij, Cæs. Nardus Alpina seu Celtica, 40
Valerianæ syluestris species, Clus. Pan. Verum notare conuenit differre eam quæ in monte Baldo cre-
scit, ab ea quæ in altissimis Valesianorum montibus prouenit, quod cauliculi non sunt glabri, nec flosculi
in umbellam congesti: huius ionem Camerarius in suo Matth. nomine Spicæ Celticæ fastigiato flo-
sculorum ordine proposuit. HIRCVLVS similis est Nardo, sed candidior, ex viridi cinereus, folio
minore, odore graui, vnde nomen, radice villosa ac nigricante, nec odorata nec amara, sic & folia præ-
mansa nullum aromaticum saporem reddunt: sed lenta & viscida sunt, cuius figuram adposuimus: &
Hirculus, Cæs. Cam. Tab. Hirculus veterum, Clus. in Garz. Lugd. & Hirculus, Nardo Celticæ similis
herbula, Aduers. & Lob. dicitur.

Νάρδος ὄρεων NARDVS MONTANA. CAP. VIII. 50

Oribasius non legit conclusa.

Montanum Nardum (quod ab aliquibus thylacitis, & niris appellatur) in Cilicia, & Syria nascitur:
Embitar legit Νάρδος, caule & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis, aspe-
risque. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regie, sed longè gracilioribus,
† & longè minoribus. † Neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Ad eadem, ad quæ
Celticum efficax.

Nardi mon-
tanz confi-
deratio.

Videtur in hoc capite Dioscorides non parum à se ipso dissentire, quòd scripserit primum montanam Nardum cau-
le, & foliis esse eryngio similibus: mox prope capituli calcem eam scribat neque caulem, neque fructum, neque florem 60
proferre. Quapropter existimant cum Ruellius, tum etiam Marcellus id facile accidisse scriptorum incuria, qui vocum
vicinitate decepti Νάρδος pro Νάρδος, vel Νάρδος scripserunt. Verum cum hæc dictiones ramos, vel furculos designent,
quæ nomina potius arboribus conueniunt quam herbis, sint q. idem rami in arboribus, quod caules in herbis: idcirco non
videtur hic locus, vt illi fortasse putant, à mendis vindicatus. Ceterum non crediderim ego, Dioscoridem, qui est hac in
facultate facile princeps, & quem antiqua, & secuta ætas tantopere commendat, in tam paucis sui oblitum, adeoque
turpiter lapsum fuisse: quinimmo nobis relinquatur suspicio, quòd omnino in altera capituli parte vitium aliquod ac-
cesserit, non harum vocum vicinitate, sed potius scriptorum dormitantium negligentia, vel vigilantium temeritate.
Quo factum est, vt hæcenus incertus dubiusq. fuerim, an hæc planta in Italia proueniat, vel aliunde ad asseratur.
Nardi

I. NARDVS MONTANA.

II. NARDVS MONTANA

altera



Nardi montanae imaginem, quam hic excudi curauimus, misit ad me Clariss. Medicus, & rei plantaria indagator maximus Vlysses Aldroandus Bononiensis, quae [folia habet maioris Phu, sed minora, caulem spithamae longitudine, umbellam puniceo colore: radices duas Antora, aut testiculi modo subnigricantes ac fibratas, odore Phu, aut Asari,] et folia Eryngii non habeat, cum tamen cetera correspondeant, & in hoc capite plures habeantur menda, haudquaquam a buluarum quoniam credam montanam esse Nardum, praesertim cum radices perquam belle correspondeant, tum facie, tum odoris fragrantia, quae a ceteris nardi generibus non dissentit. Brasauolus Ferrariensis, Indica nardi vice montana plurimum ad nos affertur à Cilicia scribit, eamque proprie montanam existimat, cuius passim in officinis est usus. Sed qua ratione ductus nouam hanc protulerit opinionem, ipse certe nescio: Nardus enim montana radices habet asphodelo
 40 similes, non utique spicatas, leues, comosas, quemadmodum ea, quae utimur ex India aduecta: nisi fortasse Brasauo-
 lus voluerit Indicam nardum ideo montanam appellare, quod in montibus oriatur, ita quidem eius sententiam veram esse putarem, non tamen à rei herbaria peritis acceptam iri. Nardi montana vires scripsit Galen. lib. 8. simpl. med. sic in-
 50 quens. Nardus Montana, quae & thylacitis, & pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur, sed predictis debilior est. Nā δ' οὐκ ἐπεὶ τῆς Γραεῖς, Nardus montana, siue Nardum montanum Latinis: Nardo montano Italis nominatur.

Brasauolus arguitur.

Nardi montana vires ex Gal. Nomina.

† In Orisilio, qui simplicium descriptiones Dioscoridi acceptas refert, legitur λευκότερας, hoc est, candidiores, quod Nardus montana constet radicibus asphodelo non solum minoribus, & gracilioribus, sed etiam candidioribus.

† Nulla quidem dissimulanda est ratio, quae probatissimi quique scriptores veteres à mendis, quae eorum scripta temporum iniuria, & multorum imperitia contraxerunt, vindicari possint. In hoc capite Dioscoridem deprauatum esse, ita ut etiam à seipso dissideat, manifestum est: in qua autem parte vitium lateat, quodque illud sit, dubia feruntur opiniones. Verum etsi nos quoque eius rei incertos esse antea scripsimus, nunc tamen inclinatus animus, ut in hoc loco mendam subesse, illudque ex malo vnius vocis Graecae intellectu ortum esse arbitremur. Siquidem verbum φῆπει non profert, sed προσυμφέπει, id est confert, accipiendum fuit. Itaque non ἔτε ἡ καυλόν, ἔτε καρπὸν, ἔτε ἄνθος φέπει, ut vulgati codices habent, & legerunt interpretes, sed, ἔτε ἡ καυλός, ἔτε καρπός, ἔτε ἄνθος συμφέπει, hoc est: Neque caulis, neque fructus, neque flos confert, prodestve, legendum esse iudicamus. Etenim radices, utpote odoratae, vsu praecipue commendatur, non aliarum partium, quae ut odore carent, ita etiam inutiles habenda sunt. Et certe facilis potuit esse error librarii Graeci imperiti, vel potius temerarii, casus nominum matantis ad ineptam ac incongruam huic loco verbi illius significationem. Subscribunt huic nostrae castigationi cum alii rei herbariae studiosi, tum Gabriel Fallopius Mutinensis, vir & ingenio & doctrina celebris, tum etiam Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus, medicus non vulgaris eruditionis.

60 Nardus montana radice oliuari C.B. Theophrastus Nerum appellat inter odorata, quibus ad vniuersa vtiuntur: dicitur & θυλακίτις Dioscoridi, quoniam olim ex Cilicia coriaceis sacculis, quos θυλάκια vocat, ad externos ferebatur, partim ad medicum usum, partim ut ignibus propter odorem in sacrificiis iniiceretur, vnde & Pyrites vocatur. Haec illa est Spica (licet aliqui Crocum esse velint) cuius Ouidius in Fastis meminit. Et sonat accenso Spica Cylissa foco. Dicitur Nardus montana Anguill. Adu. Lob. C. 1. hor. Lugd. Tab. C. 1. Huius duae sunt species radice potissimum differentes: altera radice est oliuari orchidis instar, non tantum gemina, sed pluribus: altera radice est oblonga, cuius iconem Nardi montanae longius radicatae nomine ex D. Camerarii Matthiolo proponimus.

† Addit Ca-
tac. botan
ευωδης εφ
ναματικη
i. herba odo-
rata corona-
ria. Meum ve-
ro habet
οιδι ναματικη
α

αριανκαλυσι
ποια ευωδης
εφαναματικη

legisse μικροτερα
α Meum exemp. leg. ανθος μεταξυ των φυλλων προς τη ριζη κυανεν
radicem cyaneus
Meum exerp. πολλω Catac. vero πολλαι
g. Ista dicuntur

ASarum † (quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant) hederæ foliis † minoribus multo, rotundioribusque a floribus cytino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, b odoratis: in quibus c semen acinosum. † Cauliculos habet angulosos, asperos, & molles: radices numerosas, geniculas, tenues, obliquas, gramini non dissimiles, a longè tamen graciliores, odoratas, excalfacientes, & quæ linguam vehementer mordent. c Excalfactoriam vim habet: vrinam cit: hydropicis, & vetusto coxendicum dolori f prodest. g Radices senis drachmis ex aqua mulla potz, 10 menses trahunt: & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur. Umbrosis montibus prouenit: sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italia Iustinienfi agro.

Asarum & Bacchar differunt.

Plinii tutela aduersus Brasauolum.

I. ASARVM.




Nullam nostris temporibus officina ponunt differenti-
am inter Asarum & Baccharem: quinimò vno ore
serè omnes Asarum Baccharam appellat, adeò vt & nomi-
na hæc corrumpant, & res ipsas confundant. At quantum
notis, & viribus inter se differant, is rectè iudicet, qui hæ-
rum stirpium historias accuratius perpenderit: differant
enim inter se admodum Asarum & Baccharis, vt diffusus
libro tertio discreuius. Asarum itaque procul dubio illa
fuerit planta, quæ vulgò Bacchara falso appellatur, cum
nulli ab historia dissideat notis. Caterum Brasauolus im-
meritò in Plinium spiculum contorsit, cum dicat ipsum eo
etiam in errore versari, vt Asarum Baccharem esse existi-
mauerit. Sed profectò nesciuerim ego, quæ ratione illud
Brasauolus in Plinium scripserit: quippe qui libro 21. cap.
6. eos acerrimè arguat, qui Baccharem, & syluestrem
nardum idem esse contendunt, his verbis: Sed eorum quoq;
error corrigendus est, qui Bacchar rusticum nardum ap-
pellauere: est enim alia herba sic cognominata, quam Gre-
ci Asaron vocant, cuius speciem, figuramq; diximus in nar-
di generibus: hæc Plinius. Quibus palàm est, Plinium sci-
psum à Brasauolo defendisse. Porro si etiam Plinii etate nõ
deerant, qui Asaron Baccharem vocitarent, non mirum
fuerit, si in hunc vsque diem protracta hæc sit appellatio. In
qua fortasse perseverantes veterum nonnulli, Dioscoridis
Asaro eas serè omnes facultates reddidere, præter auctoris
mentem, quas ipse libro tertio Bacchari adscripsit: quod
facilius ad credendum vulgus allexit, Asarum & Baccha-
rem nomine tantum differre. Verum cum recètorum quo-
rundam diligentia ac doctrina id totù Dioscoridi additum
deprebensum sit, eo quòd diuersis tum libris, tum capitibus
ipse de his disseruerit, cumq; Oribasium, & Serapionem vi-
derint de Asaro ex Dioscoride scribentes, adulterinam hanc lectionem non admittere, id totum, quod eò accesserat præ-
ter auctoris sententiam, tanquam illegitimum abdicarunt. Asari vires scripsit Mesues inter deiectoria medicamenta,
ubi sic habet: Excalfacit asarum ordine secundo, & siccac tertio. Attenuat, reseras, resoluit & prouocat, adstrictione
tamen non vacat. Bibitum non modo vomitiones ciet, sed & per aluum ducit, & per vrinam, pituita, & bilem deiecit.
Roboratur tamen admisso caprino sero, aut nardo, aut hydromelite. At manifestius pituitam, quam bilem educit, quæ
fit, vt coxendicum cater. arumq; compaginum dolore vexatis non obscure opituletur: præsertim si sero maceretur, vel de-
coquatur. Facit mirum in modum ad iocinoris & lienis infarctus, scirrhososq; tumores. Quamobrè subeuntibus utem
aquis fellisq; suffusionibus, datur maximo iuuamento vino maceratum. Confert idem diuturnis febribus, iisq; præser-
tim, quæ ex contumaci infarctu proueniunt. Oleum macerationis ipsius admisso ladano, dorso sphondylis inunctum
sudorem commouet: leuiter tamen coqui debet, nam si diu serueat, vim serè omnem deperdit, neque etiam diuturna in-
diget contritione: diutius enim contritum facilius vomitiones, quam aluum ciet: hæc Mesues. A quo edocti fortasse, in
Germania rustici tertianam febrem, & quartanam curant, epoto Asari, ex vino, decocto, Melle Macci, cinnamomo, &
id genus aromatibus additis. Bibunt enim huius decocti calidi cyathum vnum, alii quotidie, alii alternis diebus, ita-
que aluum subducunt: & quandoque bilem, aut pituitam vomitionibus reddunt. Accedente autem paroxysmo, dorso
spinam, & plantas pedum inungunt oleo calido, in quo Asarum diu fuerit insolatum, & deinde in lecto se compo-
nunt calido: sic enim horror minuitur, & sudor copiosus funditur. Est & planta in montibus, nascens in Bohemia.

Asari vires ex Mesue.

Oleum Asari.

II. ASARINA.



cuius hic imaginem damus, quam ASARINAM vocare libuit, quod Asaro congener videatur. Repit hac humi folio Asaro rotundiore, ac scabriore, leuiter circumferrato, cauliculis pilosis, floribus melinis anthemidis modo, sed longe minoribus, haud inodoris. Radices habet tenues, longasq, summa tellure repentes, acuto gustu, quadam cum leuiscula amaritudine, id quod calidum, siccumq, temperamentum indicat. Vim habet abstergendi modicam, sed attenuandi, incidendi, aperiendiq, magis praestantem. Herba ipsa cum radicibus per drachma pondere ex malsa siue oxymelite, aluum exoluit, ducitq, crassam pituitam & atros humores. Ideoq, hanc noui quidam herbarij praferunt ad Morbi Gallici dolores, & articulares morbos. Datur quoq, vtiliter hydropicis, & morbo regio laborantibus. Sunt qui ad comitiales, & resolutos eam propinandam consulant, nempe aut herbam per sese, aut eius decoctum. Cit vrinam, & menses: & vermes intestinorum necat. Legitur Autumno, & siccat in vmbra, vna cum radicibus. Asari meminit Galenus lib. v. i. simp. med. sic inquit. Asari radices vtilis sunt, facultate similes radicibus acori, intensiores tamen: itaq, ex ijs, qua de illis prodita sunt, hic facienda coniectura: haecenus Galenus. A cuius sententia (sit tamen cum venia dictum) maxime dissentio, siquidem cum nulla in acoro deiectoria sit facultas, & Asarum, vt Dioscorides inquit, Mesues fatetur, & nobis experimento compertum est, veratri modo expurget, & bilem, pituitamq, & supernè, & infernè propellas, non video sanè, cur acoro in omnibus suis facultatibus tam facile comparari possit. Planta Graecis ασάρον ac etiam ρεπόσ ἀγρία vocata: Latinis Asarum, & Nardum syluestre appellatur: Arabibus, Asaron: Italis Asaro, & Bacchara: Germanis Sa-

Asarinae consideratio.

Asari vires ex Galeno.

Nomina.

30 selwurtz: Hispani, Asara bacchara: Galli, Cabaret: Bohemi, ac pariter Poloni, Kopyrnick Asarina, Graeci, Ασάρον: Italis, Asarina.

† Hac verba vt in Ruellio inuenimus, ita reliquimus. Sed admonendum esse lectorem duximus, ea non legi in Graecis nostris codicibus, neque à Serapione referri: quod argumento est illa Dioscoridi accreuisse. Suspicionem augere, vel potius ita esse confirmare potest Oribasius, qui Dioscoridem transcripsit, & hac verba non habet. Sunt tamen Graecè sic scripta: ἔχον καυλίαι γωνίους ἢ, ἔποτραχέα, ἀπρία. Id est: Habens cauliculos angulosos, subasperos, rãros.

40 Asarum quoniam in coronas non addatur Plinio lib. 21. cap. 6. & Nardus syluestris, quod Nardum vim, eodem auctore, habeat: vel quod odore, nardum æmuletur: nullam enim cum Nardo formam communem habet. Dicitur herbarijs Asarum, Brunf. Trag. Lac. (cui & Asara Baccara) Fuch. Cord. hist. Gesn. hist. Lob. ob. Loni. Lugd. Tab. Dodo. fol. & gal. cui & Perpenfa & Vulgago. Asarum Nardus Syluest. Cord. in Dios. Asarum Nardus rustica, Castori. Asarum Baccaris siue baccarus, Lob. icon. Asarum, Bacchara vulgo, Cæsalpino. II. Asarina folijs Asari C. B. ad differentiam Asarinae Lobelij, quæ folijs est hederæ terrestri, quam Hederam saxatilem vocamus: Asarina, Matthioli, Castori, Lugd. & Taber.

PHV.

CAP. X.

PHV, quod & aliqui syluestrem nardum appellant, nascitur in Ponto, folio olufatri, aut elaphobosci: caule cubitali, aut altiore, læui, a cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto: floribus narcisso proximis, maioribus, b tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo c villosa in nigri veratri, aut iunci d odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus. Excalfacit: vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest, ad lateris etiam dolorem efficax: menses cit: antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci admista: sed maleficium deprehenditur, quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

a Meumi μεσοκοιλῶ. in medio concavum. b Oribasius non legit, nec vllum exeni. c Oribasius non legit villosa, sed ἔποππίγια ἔχον. l subangulatas radículas habet. d Omnia exempl. ἔχοντες tantum habent. Phu maius & eius historia.

PHV trium habetur generum. Maius, minus, & exiguum. Maius folio est Scabiosa, maiori tamen, nec tot sectionibus diuiso, caule cubitali aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, in cuius summitate florida extat umbella, flosculis in purpuram albicantibus. Radicem habet minimi digiti crassitudine, agnatis ex obliquo multis prodeuntibus Iridis, Acoriue modo, capillamentisq, inuicem contextis, flauescens, odoratis, quadam cum odoris grauitate Nardum æmulantibus. Nascitur in montibus, vlginoso solo: ac etiam in campestribus, vnde hoc tempore in hortos & viridaria transfertur. Minus, omnibus cognitum, folijs est Fraxini vel Sorbi, lanibus, nigricantibus, humi accubantibus: caulem, sed longiorem, & umbellam gerit, vt maius, sed magis habetur exiguum in omnibus suis partibus: radices habet numerosas, albicantes, inuicem complicatas, succisa vocata amulas, odore

Phu minus.

I. PHU MAGNUM.

II. PHU PARVUM.



Phu exiguum.

cum quadam grauitate iucundo, Nardi modo. Nascitur humecto solo. Exiguum, folio est maioris effigie, sed admodum paruo, caule anguloso, dodrantali, foliis vtrinque per intervalla emergentibus, in cuius summitate umbella exit exigua, colore, vt in aliis generibus dictum est, subpurpureo: radix illi parua, praelonga tamen, albicans, e qua numerosa oriuntur capillamenta iucundi odoris. Nascitur in montibus, aquoso solo, & in pratis palustribus. Hanc non desunt qui putent Nardum esse montanum, sed decipiuntur. Leguntur in autumnno omnium radices. Caterum non possum non fateri, eos omnes bene sentire, qui maiorem Valerianam sic vocatam legitimum esse Phu asserunt: quippe radices primum forma, odore, colore, ac ceteris in vniuersum notis ab ijs, qua sibi Phu ipsum adsciscit, haudquaquam recedunt. Indicant idem & folia, & caules: illa enim olusatro non sunt dissimilia: hi vero adolefcunt cubitali mensura proceriores, leues, inanes, molles, geniculati, & in purpuram vergentes. Flores tamen obstare videtur, qui in Phu lily, vel narcissi effigiem pra se ferunt, non autem umbella, vel muscarij speciem, vt in maiori Valeriana visuntur: quanquam sic sculi per se omnes, qui umbellam conficiunt, forma narcissinos referant, in purpuram albicantes. Quo fit, vt cum Ruellio existimandum putauerim, hac de floribus verba esse a scriptoribus in Dioscoride deprauata. Namque videtur nostras Valeriana, omnibus tum notis, tum qualitatibus aded cum Phu conuenire, vt reuera dici possit, non aliud, quam ipsum Phu ad vnguem referre. Et si non desint (vt audio) qui profiteantur Phu alterum a Valeriana se inuenisse, quod floribus narcissi proueniat: at quia id pro certo compertum non habeo, & quia non desunt, qui talia fabulentur, non est, quid hac in re certi affirmare possim. Phu minus, excalfacit & siccatur valentius quam maius. Radix viribus omnibus praedita est, quibus & maior, gustu tamen acrior est: quo fit, vt maiori aperiendi, attenuandi, sit facultate. Nam & venenis magis resistit. Peculiariter autem valent eius radices ad testium tumores a frigida aere, vt flatu genitas, si in vino decoquantur, & in aqua sumi sufficiantur testis.

Phu vires
Matthiolo.

Phu minoris radicibus mirum in modum delectantur catti, aded, vt a longinquo is olfactis, adueniant, at que inuentas deuorent, continuo dum eos erodunt, atque delingunt, praesolatio murmurantes, tanta est huius planta cum catis sympathia. Omnia genera odore commendantur: proinde eas vestibibus quidam interponunt. Praestat Phu [Antidotis miscetur] ad venenosorum ictus, ex vino potum, & aduersus pestilentiam non modo haustum, sed etiam olfactum: valet ad stranguriam eius decoctum potum. Datur quoque vtiliter anbelosis, & tussitibus, praesertim si coquatur cum dulci radice, vuis passis, & semine anisi. Deuorata radix flatu pellit. Tota planta

Phu vires ex
Galeno.

virens vna cum radicibus confusa, & capiti dolenti illita, dolores, & punctiones mulcet. Facit & ad oculorum vitia, & claritatem adiuuat vbi albo vino decoquatur, & deinde vinum in oculum guttatim instilletur: additur in potionibus vlnarum intrinsecorum magno iuamento. Phu minimum excalfacit & siccatur, sed ceteris minus. Vires sunt illi, qua ceteris eadem, sed longe imbecilliores. Phu (vt scriptum reliquit Gal. lib. viii. simp. med.) odoratum quodammodo est. Huius herbe radix nardo viribus similis, sed tamen ad pleraque infirmior. Vrinam plus mouet quam aut Indica, aut Syriaca Nardus: similiter autem vt Celtrica. Simile Phu asserit ipse Gal. esse Carpesium, cuius cum nullius vires & forma describa: is enim lib. 7 simp. med. sic habet. Carpesium simile est vocato Phu, no gustu tantum sed & facultate: sed plus habet tenuitatis, proinde magis eo et viscerum obstructions extergit, & vrinam mouet, renesq; calculis degumatos expurgat. Non tamen est tenuis, vt liceat loco cinnamonum vsurpare, sicuti faciebat

Carpesium.
Carpesij con
sideratio.

IILPHV MINIMUM.



Quintus. Praestantius est Carpesium Ponticum Laertio: non tamen vel ipsum cinnamomi viribus vicinum est, immo non paruo deterius optima castia. Nuncupatur vtrunquē a montibus quibusdam Pamphiliae, in quibus nascitur: ingensq; eius proventus est in Syria. Et primo libro de antidotis inquit. Quintus (vt aique) quoties cinnamomum decrat, Carpesium, vt quod viribus nihil ab optima castia differret, in theriaca compositione imponebat. Ego idcirco eius plurimum mecum attuli ex ea peregrinatione, qua orientis prouincias adij, diligenterq; repositum nunc vsque multum seruo, quod odorem etiamnum & saporem, si non qualem prius habebat, certē nondum exoletum retinet. Est autem Carpesium herba pbu appellato genere similis, valentior tamen, atque odoratum quiddam spirans. Plurimum hoc in Sida Pamphiliae nascitur, emiturq; propterea illic vilissimo pretio: quocirca si quis vestrū illuc accesserit, Carpesij plurimum emat, cum id sibi longo tempore duraturum nouerit. Tenuia autem sunt sarmenta, cinnamomi virgultis similia. Eius duo reperiuntur genera, vñ quod Laertium: alterum, quod Ponticum cognominatur, a monte, in quo nascuntur, vtraque nomen adepta, sed Ponticum melius est. Quod cum eius non paruum haberem, permultis medicamentis admiscui, in quibus pbu vocata imponi debuerat. Est enim Carpesium pbu simile, valentius tamen, & in quo (vt dixi) nonnihil odorata qualitatis gustu odoratuq; sentitur: haecenus Galenus. Verum quid hac tempestate sit Carpesium, arduum sanē fuerit explicare & mihi, & ceteris materiae Medicae scriptoribus: tametsi Hermolaus, Ruellius, Fuchsius, ac etiam Monachi Mesuem exponentes pro certo exploratum habeant, Auicenna, Serapionis, & Actuarij auctoritatibus innixi, fru-

Quorundam doctorum virorum opinio reprobata, qui Carpesium. Cubebas esse statuunt.


Cubebae Arabum ab offic. differunt.

Leoniceus & Fuchsi calumnia defenditur. Syluij error.

Serapionis error. Cubebarum vulgariū consideratio.

Et piperi similes, qui vulgo Cubeba vocantur, legitimum esse carpesium. Siquidem Serapio, quod Galeno carpesium vocatur, sub cubeba nomine ipsius Galeni testimonio, sic describit. Cubebe est medicina facultate, & sapore Pbu non absimilis, quamuis longē tenuior: quare obstructions totius corporis aperit, vrinam ciet, & calculos renum pellit. In hac fere sententia versatur & Auicenna cubebas carpesium appellans. quemadmodum & Actuarius, qui Mauritanorum nomina secutus, in quibusdam medicamentis Carpesium imponit, quod a barbaris κομβίβα, vocari ait. Quibus auctoritatibus luce clarius patet, quod Galeni carpesium, & Arabum cubeba nulla ex parte differant. Veruntamen illud animaduertendum est, quod eos in errore versari existimem, qui credunt (vt Hermolaus, Ruellius, & Fuchsius) vulgares seplasiariorum Cubebas illas referre, de quibus scripsere Serapio, Auicenna, & Actuarius: quandoquidem qui dixerit Cubebas plantae fructum, vel semen esse, eorum reperio neminem: nec minus probari posse putem, id vsquam dixisse Galenum, qui carpesium describit his verbis. λεπλά δ' ἐστὶ τὰ κάρφη, παραπλησία τοῖς ἀρίμοσι τῷ κιννάμωμῳ. hoc est. Sunt autem tenuia sarmenta, cinnamomi virgultis similia: ipsumq; Pbu & odore, & facultatibus adsimilat. Quapropter cum tantum Pbu radices in vsum medicum veniant, facile dici potest, carpesium Galeno potius radicem esse sarmenta, quam caulium: & praecipue cum asserat diu asseruari posse, quandoquidem solidiores sunt radices, quam caules, qui facile in omni herbarum genere flaccescunt, & pereunt. Praeterea cum Galenus alias cinnamomi virgulta ellebori radicibus comparauerit, hic mirum videri non debet, quod idem contra sarmentosus carpesii radices cinnamomi virgultis similes fecerit: Adde etiam, quod in plantis non solum caules sarmentosi, verum etiam radices plures sarmentosa Dioscoridi appellantur. Quo fit, vt crediderim Fuchsiū in suis Paradoxis immeritō impugnasse Leoniceum. Ad hac gustantibus nobis vulgares officinarum Cubebas, nullum prorsus Pbu saporem deprehendimus: quod manifeste indicat vulgares cubebas, nec Arabum cubebas esse, nec Galeni carpesium. Ob id igitur, vbi & apud Gracos carpesium medicamentis admistum reperitur, & cubeba apud Mauritanos, pbu eorum vice, cum sit carpesio in omnibus persimile, vel castia, potius quam cubeba vulgaris vsus, erunt subiicienda. Iacobus Syluius inter recentiores apprimē doctus, quamquam nouit cubebas nostrates carpesium non esse, non tamen animaduertit, nec etiam Serapionis, aliorumq; Arabum esse cubebas. Aberrauit in cubebarum historia etiam Serapio, quippe quicquid Dioscorides de rusco scriptum reliquit, in cubebis perperam reddidit. Cuius autem stirpis fructus vulgares

VII. CVBEBAE VVLGARES.



CVBEBAE sint: quid affirmare possum non habeo, cum ex orientali plaga nobis peregrina afferantur. Esti eas dixerim odoratas esse baccas, racematis coherentes, corymborum hedera modo, qui gustui praeter odoris gratiam, acrimoniam & amaroris tantillum relinquunt. Quibus constat, quod excolescere valeant tertij ordinis initio, & siccent in fine eius: quamobrem languentem ex pituita ventriculū, vel etiam ex flatu roborant: pectus a lentis crasisq; humoribus expurgant. Lienem iuuant, flatu discutiunt, & frigidis vteri affectibus auxiliantur: diu cum mastiche mansa, pituitam a capite trahunt, & cerebrum roborant.

Quod quæ Græcis omnibus, aliquibus etiam à γρη νάρδος dicitur: Latini, Phu, & sylvestris Nardus: Arabibus, Fu: Ita-
 lus, Valeriana: Germanis, Baldria: Hispanis, herba benedicta: Gallis, Valeriene: Bohemis Koflyk: Polonis, Koflek, Phu
 minus, Græcè φη μινυο v. Italis, Valeriana minore: Germanis gemein Baldrian: Gallis, Valeriene des prez: Bohemis
 kopitnik, Phu minimum, siue Valeriana montana: Italis, Valeriana minima: Germanis, Klein Baldrian.

VALERIANA Nardus quoque sylvestris dicitur, partim ob radices, quæ cum quadam odoris¹⁰
 grauitate nardum æmulantur, partim ob vires Nardo (auctoribus Galeno & Aegineta) similes.
 Dioscorides videtur vna descriptione duo genera proposuisse: folia namque olusatris & radice forma,
 horrensi: at folia Elaphobosci & floris color sylvestri maiori conueniunt. Duodecim autem species in
 nostro Phytopinace recensuimus, Matthiolus verò trium tantum meminit, de quibus hoc loco: cui &
 rubram, cum in D. Camerarij editione habeatur, adijciemus: & purpuream peregrinam.

I. Valeriana hortensis C. B. Valeriana vera seu Nardus agrestis, Trag. Phu magnum. Fuch. fol. Lon.²⁰
 Lugd. Phu. verum, Fuch. icon. Cord. in Dios. Taber. fol. Phu maius. Cord. hist. Cast. Phu hortense. Gef.
 hor. Valeriana hortensis, domestica, genicularis, herba Benedicta, Dodo. gal. & fol. Valeriana maior,
 Lob. Cam. hor. Valeriana optima & Carpesium Galeni. Cæs. Phu ponticum & Valeriana pontica,
 Tab. in iconibus. II. Valeriana sylvestris maior, C. B. Phu Dioscoridis, Brun. 4. & Fabio Columnæ
 Valeriana vulgaris, vel secunda, & Serpyllum maius, Trago. Phu Germanicum, Fuch. fol. Phu vulgare,
 Fuch. icon. Valeriana syl. maior, Dod. gal. Lug. Thal. Tab. fol. Phu paruum, Lac. Phu minus, Matth. 4.
 Cast. Phu maius commune, Gefn. hor. Valeriana vulgaris, Cor. in Dios. Lon. Valeriana syl. Lob. Dod.
 Cam. hor. cui & Valeriana palustris maior. Valeriana altera, Cæs. Valeriana maior & herba benedicta,
 Tab. icon. Variat hæc foliis, quæ aliquando vulgari decuplo maiora sunt, aliquando minora & cinerea
 in syluis cædis, quam Tragus tertiam fecit. III. Valeriana sylvestris minor, C. B. & Lugd. Valeriana
 exigua vel quarta, Trag. Phu paruum, Dod. gal. Phu minus. Gefn. hort. Lon. Tab. Phu minimum, Cast.
 Lugd. Matth. 4. cui & Valeriana montana. Valeriana minor sylvestris, Lob. Valeriana sylvestris, siue
 palustris minor, Cam. hort. Valeriana minor seu palustris, Thalyo. Valeriana minima, Dodo. Duū est³⁰
 generum, altera minore, altera maiore est flore. IV. Valeriana rubra dicta. Ex radice candida
 odorata, mediocriter crassa longaque caules aliquot duorum dodrantum aut longiores rotundi laues
 geniculati exurgunt, quos folia viridia, lata, oblonga in acutum desinentia cingunt, in caulium
 fastigiis flores copiosi, oblongi, eleganti purpura rubentes, caudati, quasi racemati disponun-
 tur: quibus semina oblonga, plumosa, succedunt. AEstiuis mensibus floret. In rudibus Pisa-
 nis spontè, apud Germanos in hortis prouenit. Radix, cum odorata & dulcis sit cum leui-
 cula amaritudine & aliqua acrimonia, calida in secundo, sicca in primo compluribus censetur.

IV. Valeriana Rubra dicta.

V. Valeriana Peregrina Purpurea.



V. Comm. spec. 1.
 620.87
 Huius

Huius habetur & altera species oblongo & angusto folio. Sunt qui Narcissum Virgilij & Columellæ in hortis cenſeant: alij Condurdum Plinij lib. 26. cap. 5. alij Struthij, alij Behen rubri: alij Polemonij speciem: alij denique Limonium. Polemonij altera species, Dod. gal. Limonium Montpellienſium, Polemonium alterum & Polemonij genus Fontanoni, Gef. hor. & app. Ocymaſtrum Valerianthon, Behen rubrū Belgarum, Saponaria altera & Struthion Aldroandi, Lob. Valeriana rubra, Dod. Taber. Cam. hor. Phu peregrinum Pariſienſibus, Phu latifolium, Cam. 4. Polemonij species, Dod. Lugd. Valeriana inodora tertia, Centaurea media quibuſdam, Cæſalpino. V. Valeriana P E R E G R I N A purpurea. Ex radice parua, fibroſa, albicante, caulis prodit pedalis, viridis, rotundus, canus, ſtratus, quem folia pallidè virentia, pauca, oblonga, Nardi montanæ ſimilia, integra, ſine pediculis cingunt: quorum tamè ſuperiora ad exortum in crenas diuiduntur. Caulis in ramos brachiat, qui quaſi umbellam (cui duo folia ſubiiciuntur) floribus elegantiffimis purpureis oblongis referant, ſuſtinet: quibus ſuccedunt vaſcula oblonga calyces referentia, in quibus ſemen, altero tamen vaſculo incluſum, continetur. Spontè in Latio prouenit, in loco quodam Siculo dicto (vnde Valeriana Sicula) vt & in Sabinis: vbi & flore albo reperiri aiunt: nunc in hortis Italiae habetur, & in horto Illuſtriſſimi Principis D. Friderici Ducis Wirtenbergici, & Teccij, Comitum Montibelgard. Domini mei clementiſſimi, quem Ioh. Bauhinus, eius Ceſtitudinis Archiater, frater chariſſ. Montembelgardi colit, nomine Nardi Creticæ culram legimus. A forma Valerianam peregrinam purpuream nominamus, licet Nobiliſſ. Cortuſus Patrius Patavinus, hori que Medici præfectus, noſtri amantiſſimus, Tripolium eſſe cenſeat, cuius opiniononi fauet icon Tripolij in manuſcripto Codice Dioſcorideo, quæ Nobiliſſimus Pinellus, Patavij in ſua Bibliotheca habet. Hanc cum pictam Valerianæ Indicæ Imperati nomine à Doctore Paſchali Gallo, Piſtauienſium Medico, rei herbariæ ſtudioſiſſimo, ex Italia accepiffemus, nec deſcriptam inueniremus, & deſcripſimus in noſtro Phytopinace, & iconem adiecimus: quo loci circiter centum & ſexaginta hæcenus non deſcriptarum plantarum breues deſcriptiones legere licet, plenius Deo duce, in vniuerſali noſtra hiſtoria hæc tractaturi, omnium que icones addituri. VI. Carpeſium, Cæſalpinus Valerianam maiorem eſſe cenſet: quare Caſtor in ſuo herbario ſub Carpeſij titulo Valerianæ maioris figuram, quæ Matth. in ſecund. edit. & Lac. habet, poſuit. Cenſuerunt Arabum aliqui Ruſci fructū Cubebas vocari, & apud Galenum 7. ſimpl. & 1. de Antid. Carpeſium eſſe: quia de Carpeſio nil inueniatur apud Dioſcoridem, vt de Ruſco nil apud Galenum. Sed falluntur, cum Ruſci fructus & à Cubebis Arabum, & à Cubebis offic. differant. Cordus in ſua hiſtoria Carpeſium nominat, id quod Matthiolus & Lobelius pro pipere Æthyopico pinxere. VII. CVBEBÆ officinarum quid ſint ambigitur: alij ex genere piperis, & nigro piperi congeneres, Theophraſto que piper rotundum dici volunt: alij viticis fructum (at facultates diuerſæ) exiſtimant: Syluaticus, Ruſci fructum: alij Carpeſium Galeni ſtatuunt: at Cæſalpinus, Amomi legitimi fructum pronunciat. Verum hunc fructum Actuarius *καυβίβας* vocat. Medicis Arabibus hoc ſeculo, Cubebe vel Quabebe. Arbor malo vulgari ſimilis, folijs piperis ſed anguſtioribus, ramis per arbores Piperis modo repentibus, cuius fructus racematim coherent. Duum generum adferuntur, partim maturæ, partim immaturæ ab incolis collectæ: immaturæ leues, rugoſæ, nucleo exiguo, flaccido: maturæ, æquali ſuperficie, nucleo intus diſtento, quare illis ponderoſiores. Cubebas vocant, Cord. hiſt. Caſt. à Coſta, Taber. Cubebas offic. Lac. Cubebas Actuarij & Græcorum *καυβίβας*, Lonicerus.

40 *Μαλαβάριον.* MALABATHRVM. CAP. XI.

Malabathrum [arbitrantur aliqui eſſe Indici nardi folium, falſi quadam odoris cognatione: per multa enim nardum olent, quemadmodum phu, aſarum, niris. Secus autem res ſe habet: namque Malabathrum folium ſui generis eſt, quod Indicæ gignunt paludes, lentis paluſtris modo innatans aquis, ſine radice. Id collectum ſtatim lino tranſiit, & ſiccatum reconditur. Tradunt ſiccatis æſtuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vri: quod vbi non euenerit, ne amplius quidem renaſci.] Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum nec fragile, odore caput feriens, quod diu in ſua vi odore permaneat, & nardum ſapore imitetur, nullo ſalis gultu. Infirmum verò, & minutim contruſum præſertim ſi carioſum virus olet, vitioſum eſt. Eaſdem nardo ſortitur vires: ſed efficacius omnia præſtat. Vrinam vehementius ciet, ac ſtomacho magis prodeſt Malabathri vis. Lipitudinibus, inflammationibus que tritum, & in vino feruefactum commodè illinitur. Subditum linguæ, oris halitum, & ſuauiſſimam commendat. Veſtium quoque odorem interpoſitum ſeruat & ab eroſione tuctur.

Oribalius nō legit incluſa. Vid. Spig. ſag. in rē Corbaria lib. 1. c. 4. 5. q. Elic. 5 ad Elib. Fida.

Malabathrum, quod plerique folium Indicum vocant, qui hac ætate viderit, habes neminem. Naſcitur (vt Dioſcorides inquit) in India paluſtribus tantum locis, aquis abſque radice innatans, lenticula aquatica modo. Sed nec inde amplius ad nos aduehitur, quod forte indigenarum culpa perierit in India, quemadmodum & baſamum in Syria. Etenim Dioſcorides refert, Malabathrum non renaſci, niſi ſiccatis æſtuo feruore aquis, humus aridis fruticibus peruratur: quod cum iam diu forte non fit à natura factum, vel potius fit ab indigenis omiſſum, ob eorum negligentiam, facile poſtea euenire potuit, vt Malabathri genus omnino deperditum ſit. Plinius lib. XII. cap. XXVI. duorum meminit generum, quorum alterum arboris cuiuſdam Syriacæ folium eſſe ait, huius verbis. Dat & Malabathrum Syria, arborem folio conuoluta, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad vnguenta: fertilior eſt eiſdem Aegyptus: laudatiuſ tamen ex India venit. In paludibus ibi gigni tradunt lentis modo, odoratiuſ croco, nigricans, ſcabrumque, quodam ſalis gultu. Minus probatur candidum: celerrimè ſitum in vetuſtate ſentit. Sapor eiſ nardo ſimilis eſſe debet ſub lingua. Odor verò in vino ſubferuefacti antecedit alios: hæcenus

Malabathri conſideratio Plinij Malabathrum

Folij mentio
apud Iure-
consultos.
Malabathri-
ni, & foliati
vnguenti ex-
plicatio.

Locus dige-
storum Iure-
consultorū
emendatus.

Non pentas-
pharum, sed
Hadrospha-
rum aut Me-
sospharum le-
gendū in ff.

Plinius in
nardi histo-
ria deceptus.

Malabathi
historia ex
Arriano.

Hadrospha-
rum.
Mesospharū.
Microspha-
rū.

Plinius. Qui tamē prater Dioscoridis sententiam praestantius Malabathrum duxit, quod falsum est, non quod insulsum. Sed non desunt recentiores rei plantariae professores, qui sibi persuadent alia quoque haberi folij genera prater Indicū Malabathrum, Galeni primum testimonio freti, quod is in vno, & eodem medicamento Malabathrini, & Foliati vnguenti meminerit in libris de comp. med. secundū locos, tum de sanitate tuenda. Deinde, quod apud Iureconsultos trium Foliorum fiat mentio, lib. Digestorum trigesimo nono, Titulo quarto de publicanis, & vectigalibus. Ego verò longē aliter rem hanc se habere crediderim, quod (quantum viderim legerimque) non scripserint tractauerintque, Dioscorides, & Galenus nisi de vno tantū Folio, nempe de Malabathrino, nec vllus inueniatur autor, qui de pluribus scripserit inter Graecos: id quod affirmat vnum tantū Folium fuisse apud antiquos. Nec obstat quod Galenus Malabathrini & Foliati vnguenti meminerit in vno & eodem medicamento, quemadmodum Nardini & Spicati: siquidem mihi quidem perpetuō persuasi, Malabathrinum apud Galenum non differre à Foliato, quōd Folium, & Malabathrum diuersa sint medicamenta, sed quod diuersa fuerit parandi eiusmodi vnguentorum ratio, alterum Foliatum, alterum Malabathrinum vocatit antiquitas, differentia tantum causa. Quemadmodum eadem de causa alterum Sampsuchinum, alterum Amaratium appellat Dioscorides, quum tamen nil aliud sit Sampsuchum quam Amaratium. Atqui illi vendanda est, quōd primis in viridarijs detenti, ad intima & secreta Galeni loca non penetrauerint. Idem quoque sentio de Spicato, & Nardino, apud Galenum, cum nihil à Spica differat Nardus: nec aliter, mea quidem sententia, res se habere potest. Namque si Malabathrum & Folium, Spica & Nardus diuersa essent planta, haud dubium est, quin Galenus amborum meminisset in libris de simp. med. facultatibus: Id quod etiam non praetermisisset Dioscorides. Quantum verò ad Iureconsultorum auctoritatem attinet, negauerim ego nunquam trium Foliorum ibi fieri mentionem, nempe Malabathrini, Barbarici, & Pentasphari. Atqui non tamē affirmauerim titulo illi Digestorū esse credendum, quōd pluribus ibi scateat mendis. Nam Cassamum (ita ibi legitur) Thuriāna, Aroma Indicū, Alchelusia, Sargogalla, Omerabium, Carpasum, opus Busicum, Ferrum Indicū, Folium pentaspharū, de quo nullus antiquorum meminit, & alia nonnulla, quae ibi deprauatē leguntur, & legi debebant, Cancamum, Thymiana, Ammoniacum, Agallochum, Sarcocolla, Gummi Arabicum, Carpesium, opus Bysinum, Ebenum Indicū, affirmant quidem nihil solidi, verū, de Folio Pentasphero ibi haberi: quin etiam, nec fortasse de barbarico, de quibus nihil apud Theophrastum, Dioscoridem, Galenum, Plinium, posteritatis memoria traditum est. Ceterum demus nos haec tria reperiri Folia apud Iureconsultos, & concedamus haec omnia olim comportasse ad nos mercimoniorum negotiatores: probabunt ne ob id qui tria faciunt Foliorum genera, tria illa apud Iureconsultos genere, aut specie inter se differre? Minime gentiū, sed cognomine tantum discant oportet, à regionibus in quibus prouenit folium, aut à foliorum latitudine, angustiaue, sibi comparato. Quemadmodum enim cognomine tantum à locis imposto differunt Rha Indicū, à Rhabarbato: Costum Indicū, ab Arabico & Syriaco: Iris Illyrica, à Macedonica, & Africana: Indica Nardus, à Syriaca: Amomum Armeniacum, à Medico: Crocum Coryceum, à Lycio & Cyrenaeo: Styrax Cabalites, à Pisidica, & Cilica: Thus Arabicū, ab Indico: Chia massiche, à Cretica: Lacca Cambaitis, à Sumatrina: Manna Orientalis, à Calabrina, & alia plura medicamenta ab aliis eadem profecto ratione tenendum est Folium Barbaricum, à Malabathrino Indico, cognomine tantum differre. Cum enim scribat Strabo lib. vigesimo quinto sua Geographia, ea omnia in aromatum & plantarum genere oriri in Arabia & Aethiopia, sub qua Barbariam Geographi ponunt, qua in India Australi proueniunt, nihil sanē vetat, quin in Barbaria Malabathrum quoque nascatur, & praesertim cum scribat Arrianus antiquissimus auctor, se magnam Malabathri copiam reperisse in quibusdam Rubri maris insulis, quarum oras & littora legebat. Sed iam ad pentaspharum me confero, quod non Pentaspharum legi debere censeo, sed potius Hadrospharum, aut Mesospharum, aut microspharum. Si quidem Plinius de Nardi folijs scribens lib. & cap. XII. trium horum meminit, non quōd specie aut genere differant, sed amplitudine tantum, & angustia foliorum, quae in vna & eadem planta, alia maiora, alia minora, alia minima habeantur. Nec alia de causa selegisse ea negotiatores censendū est, quam quōd hac pluri, illa minoris viderentur. Id quod manifesto indicare videtur Plinius eodem loco his verbis: Folia diuisere annonam ab amplitudine: Hadrospharum vocatur maioribus folijs, pretio xxx. Quod minore est Mesospharum appellatur, emitur denarijs sexaginta. Laudatissimum Microspharum, è minimis folium, pretium eius x. lxxv. Hac ille. Sed vereor ne hic Plinius deceptus sit, quemadmodum in vniuersa ipsius Nardi historia, in qua plura fabulosa deprehenduntur, imò, & ne vna cum alijs quibusdam crediderit Malabathrum esse Indici Nardi folium, falsus odoris cognatione, vt recte libro primo de Malabathro scribens adnotauit Dioscorides, quod non deessent suo tempore, qui falsa hac opinione ducerentur. Namque non reperio apud ipsum, nec apud Galenum, aliosque antiquos Graecos, qui de Nardi folijs vsquam meminerit, nec ea in medicum, aut alium vsus verterit: imò ea silentio praeterierunt omnes tanquam superuacua, & nullius vsus. Quam sententia confirmat me Arrianus, quippe qui scribat in Periplus tres ferè similes Malabathri differentias, sic inquit: Post hanc autem regionem, sub ipso Boreā extrinsecus in quodam loco, vbi mare definit, mediterranea quadam maxima ciuitas est, qua Thina dicitur: ex hac lava, cum rudis, tum elaborata, tum in serica lintea contexta, Barigazam per Baetra, terrestri itinere primum, atque inde in Lymiricam per Gangem fluiuium deportantur. In Thinam autem hanc non facile peruenitur: raro enim illinc homines, quos pauci exeunt. Locus autem sub ipsa Vr̄sa minore situs est. Dicitur autem conterminus esse his partibus, quae deducta auersaque sunt à Ponto & Caspio mari, vbi palus Meotica, quae proxima est, in mare sese exonerat. Quotannis autē in confinia Thina gens quadā ventitas, corporibus breues, sed horridi, & lata facie aliqui (& vt paucis dicam, hi Sefata nuncupari dicuntur) qui adductis secum vxoribus, & liberis vagantur ad tempus, & confluunt, ferentes magna onera, & culcitrae, his quae ex cruda vitis folijs fieri solent, non dissimiles. Haerent autem vno aliquo in loco, & ipsorum regioni, & Thina incolis confini, ac predae agunt ad aliquot dies, culcitrae, quae diximus sibi substernentes: tandem domum in interiores sua regionis sedes se recipiunt. Qui autem de eorum discessu certi fiunt, in ea loca confluunt, & stragula colligant, & eneruantes calamos, quos petros vocant, duplicantes folia, rotundantesque, ea calamorum villis consuunt: hinc tria genera efficiuntur. E maiore enim folio, quod Hadrospharum Malabathrum dicitur: è minore Mesospharum, ex minimo verò Microspharum: atque hinc sunt tria genera Malabathri quae in Indiam postea deportantur: hac ad litteram Arrianus. Quibus facile adducor ad credendum Pentaspharum non esse per se genus, & deprauatē legi in Iureconsultorum digestis, ita vt censeam vnicum tantum esse Folium, nempe Malabathrum: & Syriacū. Pliny Malabathrū, potius fabulosum esse, quam verum. Ceterum ex praescriptis Arriani verbis facile quisquam intelliget quam

quidam fraudulenter, ne dicā infideliter citauerit ex eodem Arriano Malabathri historiam nouus quidam rei plantaria Sycophanta cuiusdam calumnia depulsa
 dum necū, imo potius secum, de Malabathro cōtendit. Quippe qui scribat gloriari Arrianū se reperisse Malabathricopiam (quod falsissimum est, nec vsquā apud Arrianū extat) dum littora, & oras rubri maris legeret: at-
 qui ne solo hoc mendacio suam ornaret in nos calumniam, corollarium addidit, nempe, quod scribat idem, Thimam vr-
 bem sitam esse in fine Erythraei maris, ad quam quotannis gens ex Arabia proficiscatur: taceo alias fabulas quas e-
 dem auctore sibi fingit, vt tantum vicisse videatur. Porro fortasse censebat sycophanta ille, qui misellum hunc locum,
 non alibi fortasse reperiri Arriani Periplum, quā in sua bibliotheca: sed quid plura de his, qui meretricum modo fron-
 tem perficiere, quique dolis tantum, & imposturis aliorum labores insectantur? Errant praeterea recentiorum nonnul-
 li, in censendo TEMBVL (quidam hoc quoque Folij genus faciunt) quod putant hoc differe ab Indorum Betel: nihil
 enim inter se differunt. Siquidem, quod Indi Betel vocant, Arabes & Persae Tembul, & Tember appellant. Id illi conti-
 nuē mandunt, tam in orio, quā in negotio, quod petunt secunda valetudini multum conferre, corporibus vires adde-
 re, venerem augere, cor & cerebrum roborare: vbi autem copiosius edatur mentem mouet. Itcirco mulieres Tarnasari
 in defuncti mariti rogum se ipsas iniectura, tantum illius vorant, vt amentes efficiantur. Id aqua aspergunt, qua soluta
 fit calx ē conchis parata, ac tunc demum vescuntur eo: sed hac perperam transcripsit nouus quidam herbaria rei indaga-
 tor, quippe qui haec folia calce vel cinere circumuoluta, ab Indis deuorari scribit, sed tam suauē obsonium mihi non
 videt. Est Betel foliam planta, qua Hedera, Similacinae modo arbores scandit, neq; per se consistere potest absq; peda-
 mento. Floret nunquam, nunquamq; fructum profert: foli-
 is est haec planta Citrio emulis, neruis quibusdam secun-
 dum longitudinem discurrentibus, vt in plantagine. Haec
 Alexandria Aegypti ad nos pluribus ante annis comportan-
 tur: nec desunt, qui loco Malabathri vs vtantur: Sed vide-
 ant illi an recte, mihi verō Malabathri vicem nunquam
 praestabunt. Vbi enim Malabathro opus sit, Cassiam odora-
 tam, vel Indicam nardum supponendam putamus, Gale-
 num secuti, qui ita decreuit tum in succedaneis, tum etiam
 lib. VII. & VIII. simplicium medicamentorum. Quan-
 quam Fuchsius in libro quem de compositione medica-
 mentorum nouissime edidit, dum ea perpendit qua Auream A-
 lexandrinam conficiunt, Malabathri loco Attractylim sta-
 tuit subiiciendam, Galenum (vt inquit) in libello de substi-
 tutis medicamentis secutus. Sed certe non satis possum mira-
 ri Fuchsiū virum alioqui doctrina & iudicio clarum, in
 hac re (vt mihi quidem videtur) manifesta, minus recte
 fuisse. Nam vt omittam, in libro illo de medicamentis, qua
 inter se commutari possunt, qui tamen liber Galeno adscri-
 ptus censetur, me nusquam legisse, quod Attractylis Mala-
 bathri vicem suppleat, sed Cassia odorata & Nardi spica:
 est Dioscorides hoc loco, est Galenus locus ante citatus in sim-
 plicium censu: qui vno quasi ore fatentur, eandem vim ha-
 bere Malabathrum, quam Nardum. Quorum equidem au-
 thoritati grauisima longē satius adherendum existimo,
 quā vt temere fortasse sit Attractylis in Malabathri lo-
 cum substituenda: praesertim cum nobis nō desit copia Nar-
 di & Cassia odorata: Attractylis autem vera, haecenus
 mea opinione, desideratur, vt libro tertio suo loco latius o-
 stendemus. Quod etsi concedamus, hanc aliquibus comper-
 tam esse, tamen quis audebit ea vti pro Malabathro, etenim
 nullus, quod sciam, Attractylim odore commendauit: vt
 Malabathrum Dioscorides non solum odoratum fecit, sed
 etiam id ipsum in vna & eadē, hoc est in odoris bonitate permanere affirmat. Excalfacit Malabathrum (vt auctor est
 Auicenna) siccaturq; ordine secundo. Μαλαβαθρον καὶ φύλλον Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν
 tur: Italicē, Malabathro, & Folio Indiano.

Quorundam error qui Tembul & Betel distin- guunt. Tembul.

Betel histo- ria.

Fuchsi opi- nio explosa.

I. BETEL SEV TEMBVL.



is est haec planta Citrio emulis, neruis quibusdam secun-
 dum longitudinem discurrentibus, vt in plantagine. Haec
 Alexandria Aegypti ad nos pluribus ante annis comportan-
 tur: nec desunt, qui loco Malabathri vs vtantur: Sed vide-
 ant illi an recte, mihi verō Malabathri vicem nunquam
 praestabunt. Vbi enim Malabathro opus sit, Cassiam odora-
 tam, vel Indicam nardum supponendam putamus, Gale-
 num secuti, qui ita decreuit tum in succedaneis, tum etiam
 lib. VII. & VIII. simplicium medicamentorum. Quan-
 quam Fuchsius in libro quem de compositione medica-
 mentorum nouissime edidit, dum ea perpendit qua Auream A-
 lexandrinam conficiunt, Malabathri loco Attractylim sta-
 tuit subiiciendam, Galenum (vt inquit) in libello de substi-
 tutis medicamentis secutus. Sed certe non satis possum mira-
 ri Fuchsiū virum alioqui doctrina & iudicio clarum, in
 hac re (vt mihi quidem videtur) manifesta, minus recte
 fuisse. Nam vt omittam, in libro illo de medicamentis, qua
 inter se commutari possunt, qui tamen liber Galeno adscri-
 ptus censetur, me nusquam legisse, quod Attractylis Mala-
 bathri vicem suppleat, sed Cassia odorata & Nardi spica:
 est Dioscorides hoc loco, est Galenus locus ante citatus in sim-
 plicium censu: qui vno quasi ore fatentur, eandem vim ha-
 bere Malabathrum, quam Nardum. Quorum equidem au-
 thoritati grauisima longē satius adherendum existimo,
 quā vt temere fortasse sit Attractylis in Malabathri lo-
 cum substituenda: praesertim cum nobis nō desit copia Nar-
 di & Cassia odorata: Attractylis autem vera, haecenus
 mea opinione, desideratur, vt libro tertio suo loco latius o-
 stendemus. Quod etsi concedamus, hanc aliquibus comper-
 tam esse, tamen quis audebit ea vti pro Malabathro, etenim
 nullus, quod sciam, Attractylim odore commendauit: vt
 Malabathrum Dioscorides non solum odoratum fecit, sed

etiam id ipsum in vna & eadē, hoc est in odoris bonitate permanere affirmat. Excalfacit Malabathrum (vt auctor est
 Auicenna) siccaturq; ordine secundo. Μαλαβαθρον καὶ φύλλον Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν ἢ Ἰνδικόν
 tur: Italicē, Malabathro, & Folio Indiano.

Nomen

I.

Hoc folio Indo aded simile, vt idem esse multi credant, & misceant, vt Lusitanus fecit, quod Tam-
 bul Arabes & Persas vocare, Odoardus Barbosa auctor est: dicitur Tembul Auicennae, Betre,
 Garz. Betel, Cast. Betre siue Betle, Lugd. & Taber. II. Malabathrum triplex est: primum Dioscoridis,
 quod apud Plinium secundum est: alterum est, quod Plinius pro primo recensuit: tertium officina-
 rum est Malabathrum, cuius iconem vt & Betel adposuimus. Est autem officinarum Malabathrum
 quibusdam folium Caryophyllorum: aliis Cassia folium: alij canellam (cuius figuram sequenti capiti
 adiecimus) putant. Folium officinarum seu folium Indum (quod ex India adferatur) est arboris pro-
 cetera procul ab aqua nascentis folium, mali Medicæ folio simile, per extremum tamen angustius, co-
 stis tribus per longitudinem excurrentibus, colore viridi, odore quodammodo Caryophyllorum, non
 aded vehemēti vt Nardus, aut Macis, neque tam acuto ut Canella: qua de re Ludouicus Romanus,
 Aloysius Cadamustus & alij. Vocatur ab Auicenna Cadegi Indi, & à Betre seu Tembul, quae apud Au-
 cennam

II. FOLIUM OFFICIN.



a Meum ἀρωματοφόρον. i. aromatifera.
 b Cat. ὄσπριον. i. in Iridis.
 c Meū στενωλείαν. i. angustam lauem.
 d Omnia ἐπέπαχέα τῶν σπυγγίσις πλήρη. i. crassam, & fistulis plenam.
 e Mc. & Drag. μὲν πολλῆς αὐραστίας. i. cum multo feruore.
 f Meum εὐρύτης. i. ramosa.
 g Meum καὶ πλεῖν μὴ ἔχονσαν. i. πλεῖν σπυγγα παχέα, ἢ ἄλλῃ πλεῖν. i. & quæ non habet fistulâ crassam, seu scabram & tenuem. Sic item Catecuz.

cans, scabra, hircinum virus redolens, & g quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, vrinam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorū, quæ præstandæ claritatis gratia cōcinnantur, & ad malagmata: lentigines tollit cum melle illita: menses trahit contra viperarū iētus pota auxiliatur; aduersus intestinorū inflammationes omnes, & renum vitia, pota proficit: foeminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem vuluæ. Et duplo pondere medicamentis mista, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eisdem effectus præbet. Ad plurima perquàm utilis est.

Κιννάμωμον CINNAMOMVM. CAP. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamen Mosylyticum, quoddam cassiæ, cui mosylyti nomen est, aliquam referat effigiem: sed in eo genere recens, nigrum, ex vino in cinereum vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus a nodis cinctum, perquàm iucundè olens. Optimi fere indicium, iucundi odoris proprietate constat: inuenitur enim cum optimo, eoquæ quod peculiare est, odor rutæ, aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadantenus falsum, b quod non citò conficitur asperum; aut frianti lanuginosum, læuibibus tamen c internodiis appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice d furculum, facilis est huiusmodi probatio: namq; fragmenta miscellanea quædam esse videntur. Quæ autem melius spirant, suo halitu, cum nares primum consuluntur, olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylytico, perquàm suauiter olet, nigrum, e fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum fungosum, candidans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè representat. Quintum genus odore nares feriens, subrufum, & cortice fuluæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum densa radice firmatum. Iis, quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: g at læue, & lignosum circa radicem, vt inutile, reiicito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris, solutumque virium. Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomū, præbens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta h longa robustaque ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomum omne exalfacit, emollit, & concoquit: vrinam ciendam menses, quàm partus potum, aut ex myrrha impositum pellit: contra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaque conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit: crassitiem extenuat: lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tusses, defluxiones, aquam subtercutem fusam, renū vitia, & vrinæ difficultatem efficacis est. Vnguentis pretiosis inseri solet. Et in summa,

g Meum & Dra. καὶ ῥυτίον, καὶ λείον, καὶ ξυλόμορον, ὅτι καὶ πλεῖν ῥίζαν ὡς ἀχρεῖαν παραίτη. i. virgis rugosum, at læue & lignosum ad radicem, vt inutile reiicito. h Meum ῥαβδόου, μικρῆς. i. virgulta breuia.

cennam eadem sunt, differt. Foliū Indum seplasiariorum, Trago Malabathrum, Lac. Lob. Cal. Tab. Casia aromatica, Cord. hist. Tamalapatra Garzia, Clus. Lugd. Folium Indianum; à Costæ. Fructus verò qui adpinguntur, Lob. fructus Tembul vocat: fructus Canelle quorundam sententia. Lugd. & sanè fructus Canelle nomine, ad nos etiam ex Italia missi, meminit & Cordus in Diosc. Cinnamomum fructum ferre paruum glandibus similem.

Κασσία CASSIA. CAP. XII.

Cassia, cuius cōplura sunt genera, iuxta a odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, foliis b piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corallij æmula, c perquàm angusta, longa d crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum aliquanto feruore adstringens, aromatica, vinoso odore: cuiusmodi est, quæ ab incolis achy appellatur, ab Alexandria negotiatoribus daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, zigit cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locū tenet antedicta. Tertia, cui Mosylytico blasto, id est, germi cogno- men est. Reliquæ viles, vt quæ asyphemum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quàm vt explicari possit, quæ gustu coarguitur, cū nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, fluctuosa: antedictæ præfertur. Damnatur candi-

magni ad omnia usus. Tritum vino excipitur, umbraque; siccatum, quo diutius eduret seconditur.

† Addunt Meum exemp. & Drag. ἐστὶ δὲ λεγόμενον, ὃ ἐστὶν ψευδοκιννάμωμον καλῶσι, εὐίπρος σπόδρα καὶ παχυράβυττοι, καὶ πολὺ μᾶλλον ἐστὶν κιννάμωμον, καὶ ὁ μὲν καὶ καὶ γίνονται.

Natura omnium rerum parens, in hoc terrarum orbe quaedam stirpium genera adeo inexorabilia procreavit, ut ne quam plurimis quidem deliciis, blanditiis, officiis, obsequiisque, ea apud nos quissimum retinere potuerit. Siquidem stirpes ipsa vivere coacta in hortis, viridariis, mitioribusque, Italia locis, ceu Tempe, omni amantate repletis, quemadmodum alpini homines delicias urbium & maiestatem aspernantes, politici moribus omnino neglectis, non alibi, quam in suis mapaliis hilariter, ac iucunde vivere possunt: ita & ipsa relicta celi clementia, horumque amenitate, spreto item fontium oblectamento, omniumque, urbanarum ac familiarium stirpium consortio, in desertis, solitudinesque, suas, a quibus primam duxerunt originem, se tandem recepere, tantum patria natalisque soli amor in rerum natura potest. In quarum genere Cassia connumeranda venit: quae tametsi in maiore illa Romana gentis fortuna multis ac variis horum locis consira habebatur: nullibi tamen hac etate (quod nouerim) in Italia, ne in tota dicam Europa inuenitur. Sed haec de Cassia dixisse volumus simplicium medicamentorum peritissimos secuti, qui (ut eorum testantur volumina) nihil inuicem differre censent, Cassiam quae in arborum genere Dioscoridi & Galeno recensetur, & eam, quae antiquis inter coronarias numerabatur herbas, quaeque olim passim circa apum aluearia ferebatur in Italia, quod ea maxime apes delectentur, & in hortis & viridariis coronis maxime expetita. Verum enimvero longè aliter haec res intelligi postulat, quod aliam repererim fuisse Cassiam (ut Dioscorides inquit) è felici Arabia allatam, ex arbore (auctore Theophrasto) viticis magnitudine, ab hac longè diuersam, quam apibus, & coronariis distulit. Haec ferebat antiquitas, quandoquidem fuerit haec herba, illa verò arbor: praesertim cum nullus (quod sciam) extet auctor, qui posteritatis memoria mandauerit, Cassiam adeo copiosam in Romanorum triumphis ex Arabia conuechi solitam, ut inde vulgaris facta, ubique passim & reperiretur, & sereretur ab omnibus. Quod si forte euenisset, nunquam tamen mihi persuaserim, quod Galenus hac in scientia, & facultate omnium diligentissimus, & qui Roma diu vitam duxit, Italica Cassia historiam silentio inuoluisset. Plinius lib. xxi. cap. ix. nonnullas memorans herbas, quorum folia odoris gratia in usum coronarum venerant, inquit. Ergo in coronamentis folia venere malothron, spireon, trigonon, cneoron, quod cassiam Higinus vocat. Id quod ante ipsum palam fecerat Virgilius, Cassiam inter coronarias herbas recolens in Bucolicis ecloga ij. his versibus

Cassiae odoratz, & coronariae distulit.

Tum cassia, atque aliis intexens suauibus herbis,
Mollia luteola pingit vaccinia caltha.
Vix humiles apibus cassias, roremque ministrat.
Nec circum cassia virides, & olentia late
Serpilla, & grauius spirant copia thymbra
Floreat, irriguamque bibat violaria fontem.

Et in Georgicis lib. ii.
Item Georgicorum lib. i. i. i.

Haec Maro. Quibus palam est, Cassiam coronariam, & quae tantopere delectantur apes, herbam, non arborem fuisse. Quod etiam testatur Plinius libro superius citato cap. xij. Verum horum coronamentisque, maxime aluearia, & apum conueniunt, res praecipui questus, compendiique, cum fauit. Harum ergo causa oportet serere thymum, apiastrum, rosam, violas, liliu, cytisum, fabam, eruiliu, cunilam, papauer, conyza, cassiam, melilotum, melissophyllum (lego myriophyllum) cerinthem: haecenus Plinius. His itaque rationibus, auctorumque, veterum testimoniis iunxit Theodorus, Cneoron Theophrasto, Cassiam appellat. Quamobrem potius fuerit credendum Cneoro Graecis vocatum antiquis coronariam fuisse Cassiam apibus gratissimam, quam eam, quae in India & felici Arabia prouenit, cinnamomo persimilis, odoramenti & antidoti expetita, & qua per longas etates cinnamomi vice usi sunt medici. Neque tamen propterea opinioni nostra refragari putamus Columellam lib. i. i. i. cap. v. i. i. de re rustica, ubi ita scriptum reliquit. Iudaam & Arabiam pretiosis odoribus illustrem haberi, sed nec nostram ciuitatem praedictis egere stirpibus: quippe cum pluribus locis urbis iam cassiam frondentem conspicimus, iam thuream plantam, florentesque, hortos myrrhae & croco. Nam quamuis concedi possit Columella Cassiam ex Arabia allatam, urbis illustranda gratis Roma suo tempore conspicuam fuisse in hortis procerum & Imperatorum, hoc tamen non prohibet, quin Cassia, quam prope apum aluearia passim seuit antiquitas, alia fuerit planta: praesertim cum haec inter herbas coronarias, illa verò inter arbores odoratas recensetur. CNERON autem describit Theophrastus lib. 6. cap. 2. de plantarum historia, his verbis. Cneori duo genera, aliud enim candidum, aliud nigrum. Candido folium cutaneum, oblongum, figura quasi oleagineum: nigro quale tamarisci (sunt qui legant μυρτοιν. i. Myrto) carnosum. Candidum magis se humi spargit, odoratumque, est nigrum odore caret. Radix ambobus, quae alte descendit, grandis: ramique, permulti, crassi furculosique, ab ipsa protinus tellure, aut paulo superius sparsi, lenti admodum constant: quamobrem hisce ad colligandum iunci modo vtuntur. Germinant, florentque, post aequinoctium autumnii, & multum denique temporis florent: haec Theophrastus. Sed quamam planta oriantur in Italia, vel aliunde afferantur, quae Cneorum referant, quid veri reseram sanè non habeo. Halucinatur profecto Anguillarius, quippe qui nulli dubitatione sibi persuadet Lauendulam vulgo vocatam, Cneorum esse album: Nigrum verò, Rosmarinum coronarium. Nam praeter id quod Rosmarinum & Lauendula tantum inter se habent cognationis, quantum Laurus & Ilex, quod apertissime eius errorem accusat, sunt & alia nota quae illi omnino repugnant. Siquidem Cneorum vtrumque (ut Theophrastus testis est) floret tantum post aequinoctium autumnii. At qui Rosmarinum bis in anno florere scimus, nempe post aequinoctium vernali, & ante aequinoctium autumnii: in Lauendula verò est aetatantum. Praeterea Theophrasto vtrique Cneoro radix est grandis & alte descendens: id quod nec in Lauendula, nec in Rosmarino quissimum vidit vnquam, cum haec per summa ferè cespitem mediocres radices fundant, & ob id frigoris impatientes planta. Adhaec Cneori vtriusque, rami flexiles lentique, habentur, colligandis aliarum plantarum fasciculis apti: sed cum Rosmarini rami tales non sint, nec etiam Lauendula, cadit peritque Anguillarij sententia. Praeter id Cneorū nigrū nullo esse odore scribit Theophrastus: siquidem non εὐοσμος, ut legit Anguillarius, sed ἀοσμος, cū Gaza & Plinio legendum est, qui album tantum Cneorū ex Theophrasto odoratum habet ad quod ipsa Theoph. lectio manifestè indicat, ique sic habet. ὁ λευκὸς ἐστὶ εὐοσμῶδες, ὁ δὲ μέλας ἀοσμος. Non ὁδὲ μέλας εὐοσμῶδες, ut perperam legit Anguillarius: ea enim aduersatiua est oratio, nec vilo pacto vocem εὐοσμος admittere potest.

Columella Cassia.

Cneori descriptio.

Anguillarij sententia confutata dum Lauendulam, Cneorum album, & Rosmarinum Cneorum nigrum censet.

Parrida

Puerilis enim efforatio, non grauisimi auctoris Theophrasti, si locus hic Anguillarij modo legeretur: sed admodum

Cneorum, chamalexia non est.

I. CNEORVM MATTHIOLI.

Cneori noui-terreperiti cōsideratio.



Medicorum & seplasiariorum error, in Cassia succedaneo.

nulli etatis nostra doctissimi viri, stirpium historias diligenter examinarunt, detecta fraude, mercatores ex Alex-

II. CINAMOMVM OF-
ficin.

Pseudocassia.

Cassia legiti-
ma est cinna-
momum vul-
gō dictum.



*Laurus cinnamomum
Stamh.*


*quidem miror quod hac non nouerit Anguillarius, cum ta-
men is plus Græcæ (vt audio) quàm Latinæ linguæ professore
rem se dicat. Postremò de Coronario Rosmarino scribens Di-
oscorides, nihil ibi Cneori meminit, quem tamen totum lo-
gisse Theophrastum non ambigo. Aberrant etiam qui con-
tendunt Theophrasti Cneorum chamalexiam esse, vel Thyma-
leam, vt in Epistolis nostris satis superq; à nobis comproba-
tum est. Inuenimus nos hoc anno in Bohemia syluis plantã,
cuius hic imaginem datus, qua omnibus suis partibus
CNEORVM candidum refert, siquidem cutaneum illi
folium est, & oblongum, rami flexiles, ac lenti, multi, sur-
culosiq; ab ipsa protinus tellure, aut paulò superius emer-
gentes, & humi sese diffundentes. Flores illi sunt in surculo-
rum cacuminibus purpurei, odorati testiculi odorem refe-
rentes: radice nititur altè descendente, non tenui, qua nota
albo Cneoro bellè correspondent. Atqui floret hac (quantũ
viderim) verno tempore, verum non ob hanc tantum repu-
gnantem notam adducar, vt credam hanc plantam Cne-
orum aut eius speciem esse, & præsertim cum à rusticis
intelligam, florere etiam Autumnò. Approximus hęc
imaginem, & eius historiam descripsimus, non tam tu-
enda opinionis nostra causa, quàm vt ceteri rei planta-
ria periti de hac planta suum quoque iudicium ferant.
Nam vbi q; Theophrasti Cneorum ipsam esse negauerint,
erit mihi satis superq; satisfactum, si Matthioli Cne-
orum ipsam appellauerint. Sed iam ad Cassiam odoratam
redeamus, ob cuius cognitionem postmodum factum est,
vt recentioribus medicis, in ea recuperanda, inuestigandãq;
multum negocij accesserit. Namq; hæcenus tum medici, tu
seplasiarij (etsi plures iã respiciant) odorata cassia loco qua-
dam incognita arboris segmenta, nec odore, nec viribus præ-
dicata semper capesserunt. Veruntamen postquam non-*

*andria mercimonia Venetias comportantes, cum suam
imposturam deprehensam cernerent, à negotio desiscen-
tes, in aliud nouum Cassia genus segmenta illa commuta-
runt: qua sanè præter odorem, pariterq; saporem, quibus
ferè penitus exoleta sentitur, Cassia à Dioscoride descri-
pta admodum habetur consimilis. Quapropter nec esse er-
rasse crediderim, qui dicerent, hanc Dioscoridis Pseudo-
cassiam esse, quippe & crasso cortice constat, & in eiusca-
uitate lignosa etiã visitur materies, paululũq; est odora-
ta, minimeq; acru. Nonnulli hac nõ contenti, quadã vo-
cati cinnamomi fragmina Cassia vice vsurpant, que cum
nullo odore saporeq; cõmendantur, potius quercũ, vel sa-
gum, quàm Cassiam referunt. Ceterum, vt dicam quid
ego sentio, si quis fistulam, quã cinnamomum perpetuã ap-
pellamus, & vulgò Cannella, Cassia generibus rectè com-
parauerit, facile nouerit vulgaris vsus cinnamomum legi-
timã Cassiam procul dubio referre: quinimò diligenter
inquisiturus, iudicijq; trutina examinaturus huiusmodi
cinnamomi ingentem copiam, qua magnis sacis Venetiis
in mercatorum repositorijs asseruatur, nimirum omnia
illa cassia genera, qua à Dioscoride describuntur, facile
sese offerent, quandoquidem mercatores (vt semper asso-
lent) ad expediendas deteriores merces bonarum lenoci-
nio, quas illis admiscerent, pro virili vtuntur. Galenus itaq;
libro primo de antidotijs multa Cassia genera recensuit,
vbi sanè Dioscoridem secutus, eam ceteris præstare fasetur
qua Zigi cognomine dicitur, hancq; asserit cinnamo-
mum vsque ad eò emulari, vt essent, qui suo quo eam
cinnamomi loco venderent. Quo fit, vt admirari non li-
ceat, si hodie quoq; tot annis hac deducta, protractãq; con-
suetudine, vbiq; cassia pro cinnamomo venundetur. Nec
quidem longè aberrarent, si modò optimam seligerent,
quandoqui-*

Quandoquidem Galenus eodem loco pabam prodit, Cassiam saepenumero in cinnamomum transmutari, fateturque se Cassiam transmutatur in cinnamomum. Cassiam vidisse eximia Cassia ramulos omni ex parte cinnamomum referentes. Contra pariter inspexisse cinnamomi surculos Cassia prorsus perfimiles, aded vt asserat pro qualibet cinnamomi parte in componendis medicamentis, duas electa Cassia adhiberi posse. Describit item Galenus quoddam aliud deterioris Cassia genus, quod tradit iuniorem Andromachum Cassiam fistulam nominasse, cum fistularum modo inanis canaque sit, & crassi corticis: cuiusmodi in vulgari cinnamomo frequentissima conspicitur. Huius sane ea videtur esse generis, qua in suo consiciendorum pharmacorum libello praefert Cordus, quod velis cassiam, prater Dioscoridis & Galeni sententiam, labrii esse gustus. Porro Cassia odorata frustulum cum cortice & ligno suo interiore, nuper dono mihi dedit Serenissimus Princeps Ferdinandus Archidux Austriae, Dominus mihi clementissimus, ab integro ramulo abscissum, quae ille inter plures alias res non minus pretiosus quam araras, reconditum habet. Huius cortex colore quidem cinereo a nostro vulgari cinnamomo disidet, non tamen odore ac gustu: quandoquidem mansus id ipsum, quod vulgus Canellam vocat, ori plane repraesentat: at lignum, quod cortice contegitur, fragili constat materie, neque vlla prorsus odore, saporeque commendatur. Quare hinc facile colligi potest, corticis tantum eius usum esse, atque etiam Theophrastum non ab re memoria prodidisse, huius virgas in frustra secari, recentique, bonis corio hac consui, vt vermiculis, qui ex eo nascuntur, lignum illud inutile erodatur. Ceterum odorata Cassia meminit etiam Virgilius prater coronariam lib. II, Georg. vbi cecinit hoc carmine. Nec Cassia liquidum corrumpitur vsus oliui. Quin & Plinius Cassia meminit lib. XII, cap. XXIX, his verbis. Frutex & Cassia est, iuxtaque cinnamomi campos nascitur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui cute, verius quam cortice: quae contra atque in cinnamomo leuari, & exinaniri pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum. Color triplex: cum primum emicat, candidus pedali mensura: deinde rubescit addito semipede, ultra nigricans. Hac pars maxime laudatur, ac deinde proxima: damnatur vero candida. Consecant surculos longitudine binum cubitorum: mox praeuunt recentibus corijs quadrupedum ob id interemptarum, vt ipsi putrescentibus, vermiculi lignum erodant, & excauent corticem tutum acrimoniam, & amaritudinem. Probatum recens maxime, & qua sit odoris mollissimi, gustuue quam maxime feruens, potius quam lento tempore leuiter mordens, colore purpureo, quaeque plurima minimu ponderis faciat, breui tunicarum fistula, & non fragili. Hac Plinius: quorum plura a Theophrasto transcribit, qui Cassia historiam tradidit lib. IX, cap. V, de historia plantarum, eamque fruticem esse amerina magnitudine scribit: qua cum nullo pacto decorticari possit a ligno, cortexque tantu vtilis sit, ob id hominum industria inuentum esse ait, vt corijs quadrupedum consuata, Cassiae historia ex Plinio.

III. XYLOCASSIA.

IV. XYLOCASSIA SVBNIGRA.



interius lignum vermiculis deuoretur. Ceterum plane halucinantur ij, qui Cassia fistula loco, siliquam Aegyptiam, siue Cassiam solutiua vulgo dictam, atra medulla, semine duro, lignosisque membranis confarctam, medicamentis admiscunt Mauritanos secuti: siquidem Serapio, Auicenna pariterque Mesues, siue sit ipsorum, siue interpretum lapsus, pari consensu Cassiam nigram, Cassiam fistulam vocauerunt: legitimam vero Cassiam, de qua hic differit Dioscorides, Cassiam ligneam. Quamobrem certo crediderim, quod citra omnem censuram dici possit, in

Error quorundam, qui Cassiae fistulae loco, Cassiam solutiua fumunt.

omnibus ijs medicamentis a Mauritanis inuentis, qua Cassiam fistulam expetunt, solutiua illam esse inserendam. Si vero in Graecorum monumentis (excipio Actuarium, & Nicolaum Myrepsicum, qui a Mauritanis multa acceperunt) Cassia fistula inuenta fuerit, vel in Mauritanorum compositionibus a Graecis transcriptis, Cassiam odoratam, a Dioscoride & Galeno descriptam, semper adhibendam existimo. Nisi medici secus intelligentes in eum errorem labi velint, in quem Leonicensis quosdam aetatis nostrae medicos (qua profecto imperitia multorum est) temere incurrisse testatur, qui ad commouendos menses, difficiles partus, remorantesque secundas Cassia deiectione corticibus, odorata loco vsquequaue vtebantur. CINNAMOMVM vero, quod legitimum sit, quanquam diu multumque, tum Venetijs, tum Neapoli, & apud mercatores, qui serè quotannis in Alexandriam nauigant, diligenter conquisierim, nusquam id tamen mihi videre licuit, neque etiam percipere potui, num hoc tempore apud magnos negociatores, qui a Lusitania Indiam, & felicem Arabiam classe paratissima petunt, vel apud quempiam principem, regem, vel imperatorem legitimum reperi possit: qua de re minime demiror, cum & Galeni tempore

Cinnamomi consideratio

Cinnam. hist.
ex Galeno.

Cinnamomū
cognitū facil.
limum.
Optima cas-
sia parum di-
stat ab opti-
mo cinna-
momo.

Cinnamomū
ē barbarorū
terra Romā
allatū.

Cinnamomū
optimi notā.

Longitudo
ramorū cin-
namomi.

Cinnamomi
penuria vnde
fit.

Cinnamomū
in India,
Straboni.

Cinnamomū
avis Aristot.

huius magna in Italia fuerit penuria, adeo ut Cinnamomum nullibi reperiretur, nisi apud Imperatores, qui admirabili custodia inter alia pretiosa illud asseruari curabant. Cuius rei historiam in medium asserit Galenus lib. i. de antidoti, sic inquit. De Cinnamomo contraria ijs, quae de opobalsamo narrauimus, compertum habeo: persuasum namque mihi est, ipsum omnium cognitū facillimum esse illis, qui saepe optimum cinnamomum viderint. Optimum verò consequi nemo potest, nisi repositum ab imperatoribus intueatur, sex generibus quodammodo distributum: siquidem & in hoc ipso, velut & in cassia, optimi ad deterrimum tam magna differentia est, ut optima cassia a pessimo cinnamomo parū distet. Neque verò Cinnamomi virtus ad usum apta longo tempore durat: ad triginta siquidem annos, quam a principio vim habuit, integram non conseruat: nugantur autem, qui Cinnamomum ex hisce medicinis esse dicunt, quae senectutem non sentiant. At qui ego non centum, neque ducentum annorum interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantū numerū conferat, iam aliquam mutationem vetustiori Cinnamomo factam obseruauit. Quo tempore siquidem Antonino Imperatori theriacam parauit, vasa lignea, in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa conspexi, alia Traiani, quaedam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianum imperator fuit, etate reposita: omniaque, haec sese & saporis, & odoris imbecillitate, vehementiaque, tantum planè superabant, quantum & tempore differebant. Olim è barbarorum terris arca cubitos quatuor & medium longa, Romam perlata cum fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoq; Marco Antonino Imperatori antidotum quandam composuissent, ipsam cateris multum praestare deprehendi, adeo ut Imperator quoque, ea degustata medicinae concoctionem, velut in alijs fieri solet, expectare noluisset, sed statim ea usus sit nondum integrè duobus mensibus elapsis. Antonino subsecutus est Commodus, qui nec theriaca, nec cinnamomi curam ullam habuit, sub quo non solum arboris illius, quod superfuerat, omne dissipatum est, verum etiam quodcumque, post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, ut nunc Imperator noster Seuerus, cum me sibi antidotum eo modo conficere iussisset, quo Antonino confeceram, ex Cinnamomo Traiani, & Adriani tempore reposito sumere coactus sim, imbecillioraque, planè mihi visa sunt, & tamen nondum anni triginta intercesserant. Hic nos optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subiicere volumus, ipsum scilicet summo opere bene olere, inexplicabilemque praeter cetera bonum quendam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multum exhibere, non ita tamen ut mordicanda tristitiam palato inferat: colorem denique talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admiscerit, atque carulei, quem vocant, aliquantulum addat. Ex hoc igitur quantum volebam, ut mos mihi fuit, cum accepissem, ramusculos paucos apud me reposui in ea apotheca, in qua res meas omnes pretiosas seruabam: verum ipsa combusta, qua tempestate & delubrum pacis incensum est, & haec, & alia quinque Cinnamomi species, quas mihi conquiesceram, periere. Nunc itaque, cum Imperatori nostro Seuero theriacam componerem, ex Cinnamomo Adriani tempore reposito, quod optimum visum est elegi, de quo etiam vtile quiddam lecturus subdare cum possim, id facere non grauabor. Super sunt adhuc ibi multa vasa lignea, quae omnia habent plurimum radicum, vel plurimum ramorum, vel ut quispiam dicere velit, Cinnamomorum differentias: nullum tamen veluti truncus, in ramos plures diuisus attollitur, sed veratri vtriusque figuram praese fert, atque etiam magis damasonij vocati, quod è Creta ad nos adfertur. Quaeuis autem Cinnamomi species ab vna radice, seu frutice quidam paruus consurgit, emittitque, haec sex, illa septem virgulta, vel paulò plura, pauciorave, non equali tamen omnia longitudine sunt, verum quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem Cinnamomi natura similis est quodammodo optima cassia. Haecenus de Cinnamomo Galenus. Cuius verba hic recensere libuit, ut omnibus palam sit, quod cum sub ijs tam magnis Imperatoribus, qui toti ferè orbi imperabant, tanta esset Cinnamomi penuria, admirari non debeamus, si se nobis penitus incognitum, rarissimumque reddiderit. Sed potius id mirum fuerit, quod cum hac atate cassia plurimum asseratur, quae ut Theophrastus, & Plinius inquit, nascitur iuxta cinnamomi campos, sed in montibus, Cinnamomi tamen nihil importetur. Quare non deest suspicio, quin omne ferè Cinnamomi genus deperierit in Arabia, quemadmodum & balsamum in Iudea, quandoquidem scripserit Plinius lib. XII. cap. XIX. combustas iam esse plurimas Cinnamomi sylvas, his verbis. Cinnamomi pretia fuere quondam in libras denariorum mille: sed postea auctum id parte dimidia est, incensis (ut ferunt) syluis, ita ne barbarorum id acciderit, an ob iniquitatem praepotentium forte, non satis constat: Austros ibi tam ardentem flare, ut aestatibus sylvas accedant, inuenimus apud auctores. Quo fit, ut facile credi possit à Plinio eio id, quod Cinnamomi reliquum erat, pariter vel barbarorum bello, vel igneis flatibus deperuisse. Nam si aliter res se haberet, qui cassiam ad nos deferunt, cum multo plus lucri ex Cinnamomo, quam ex cassia se consecuturos sciant, Cinnamomum etiam vna cum cassia veherent. Haec autem dixisse volui, non ut hac in re certi aliquid, exploratim habeam, cum tantum coniecturis agam, sed ut alius vltius explorandi latius pateat iter. Ceterum Strabo non modo cum Theophrasto, Dioscoride, Galeno, Plinioque, cinnamomum in Arabia nasci scribit, sed etiam in India, ea scilicet parte, quae ad austrum vergit: quippe cum hac Arabia, & Aethiopia sole persimilis sit, ea omnia (ut ipse ait) gignit aromata, nempe cinnamomum, cassiam, & alia, perinde ac illa. At qui nasci in Arabia Cinnamomum testatur Aristoteles libro nono cap. decimoquarto de historia animalium his verbis. In Arabia Cinnamomus avis appellatur, quae surculos Cinnamomi portare, ac nidos ex his conficere aiunt: nidificat excelsis arboribus & ramis, sed incolae sagittis plumbatis nidum petunt, atque ita discussum in terra Cinnamomum legunt. Haec ille: quae quidem Iulio Solino pariter tradita sunt cap. XIII. de Arabia scribens, atque id etiam addit, Cinnamomum hoc pretiis vendi amplioribus, quod magis quam aliud mercatores probent, ac etiam auem ipsam non Cinnamomum, sed Cinnamulgum appellat. Veruntamen cur nec inde ad nos asseratur, an quod etiam ibi perierit, an aliam ob causam, manifestius referant, qui hoc tempore liburnicis ed ad aromata conquirenda quotidie nauigant. Sed videtur Galenus satis perplexè de Cinnamomo scriptitasse, quippe primum arcam Romam delatam prodidit è barbarorum regione longitudine cubitorum quatuor cum dimidio, in qua integra cinnamomi arbor erat, quibus omnino denotat Cinnamomum esse arborem. Deinde verò vnamquamque Cinnamomi speciem scribit, ab vna radice, seu frutice quidam paruus, consurgere, adeo ut maior eius virgulta dimidium Romanum pedem non excedant: quibus proculdubio fatetur, Cinnamomum esse in partium fruticum genere. Vnde certe nesciuerim ego explicari, quid sibi hac in historia voluerit Galenus, praesertimque cum tam tenui ipsum sarmento esse tradiderit, ut veratri, vel damasonij radicibus comparauerit. Sed illud etiam mirum mihi videtur, quod ex cassia (ut ipse ait) Cinnamomum oriatur, spectenturque nonnunquam cassiae arbores inter se sint planta. Nisi fortasse inter vtriusque tanta sit generis cognatio, ut aliquando inuenta sint cassiae virgulta tanta

odoris saporisq; fragrantia, ut omni ex parte Cinnamomum referrent, etsi legitima fuerit cassia. Præterea non desunt, qui putauerint hac Galeni auctoritate freti, cassiam & cinnamomum ex vna, & eadem arbore prouenire, quæ dum pumila sit, cinnamomum edat, dum verò adoleuerit, cassiam: sed cum dicat Galenus, cassiam mutari in cinnamomum, non autem cinnamomum in cassiam, cadit eorum sententia. Quibus etiam refragatur Theophrastus lib. 9. de plantarum historia cap. 5. ubi cassiam, & cinnamomum ostendit diuersas esse plantas: licet de earum forma, & proceritate nihil certi explorari que affirmet. Quandoquidem initio capitum, non ex sua, sed aliorum sententia scribit, cinnamomum & cassiam frutices esse magnitudine amerina: deinde verò alios etiam secutus auctores, cinnamomum fruticosum facit. Ceterum cum scribat Strabo Arabes cinnamomo, & cassia vti ad ignem parandum, ceterorum lignorum loco, videntur hæc planta non esse admodum pumila, ut quidam scribunt. Quod de cassia facile dici potest, siquidem Venetiis cassia canella vocata fistula visuntur tanta crassitudinis, longitudinisque, ut facile quisque iudicare possit eas è ramis, seu virgultis non sanè breuibus fuisse decerptas. Cinnamomi denique sex genera esse produntur à Dioscoride, & Galeno: sed is nullibi (quod sciuerim) præterquam in libro de siberiaca ad Pisonem, quem tamen librum spurium putamus, ea per genera descripsit, fortasse (ut solet) Dioscoridis sc remittens, qui etiam tantum à locis, ubi nascuntur, plus minusve præstantia huic, quam illi reddidit. At Theophrastus citato nuper loco longè aliter cinnamomi differentias haberi ait, his verbis: Cinnamomum decerptum in quinas partes discerni narrat, & esse præcipue bonitatis, quod germinibus proximum fuerit: idq; palmi longitudine cadi, aut paulò maius. Secundum quod sequitur, quod etiam minus casura est. Tertium deinde, & quartum notatur. Vltimum verò, quod deterrimum, proximumq; radici: hoc enim minimum corticis habet, in quo summa gratia est, non in ligno, qua de causa præferri cacumina solent, quod corticis plurimum habeant: quidam sic aiunt. Alii verò Cinnamomum fruticosum enarrant, eiusq; genera duo, alterum nigrum, alterum candidum: hæc Theophrastus. Veruntamen cum nec in hac in historia aliquid constanter, affirmantemq; scribat, Imperatorem, Regemue quempiam desiderarem, qui humanam Rempublicam miseratus, explorandi Cinnamomi gratia in Arabiam, & Indiam mitteret, magnanimosq; illos imitaretur Imperatores, qui ipsius Galeni ex eisdem regionibus sibi Cinnamomum comparabant. Id enim Cæsar noster Carolus quintus, si illi Deus opt. max. Christianam temp. pacatam redderet, commodè consequi posset: vel fortasse commodius Rex Lusitanus, qui in orientalem Indiam sæpe ad aromata conquirenda suas liburnicas mittit, quo in itinere vniuersas felicis Arabia oras explorare posset, quemadmodum & vniuersam India partem, quæ ad austrum spectat, ubi inquit Strabo Cinnamomum pariter nasci. Sed à clarissimi Lusitania medici, si res medica vobis cordi est, si nostram cupitis ditare facultatem, medicumq; nomen extolletis, si charitas vos tenet, si naturalis humani generis iuuandi amor vobis insitus est, iam iam prouinciã hanc suscipite. Quippe si princeps vester hinc sibi immortale nomen, vniuersæ verò reipublica commodum per quã maximè comparere posse à vobis intellexeris, cum omni pietate ac magnanimitate (ut audio) præditus sit, nulli dubium est, quin omne studium, auxiliūq; impendat, ut non modò Cinnamomum ipsum reuocetur in lucem, sed & alia fortasse pleraque medicamenta, quibus antiqua medicorum familia suas illustravit antidotos. Porro tamen si hactenus illud mihi abundè probatum esse videatur, quod cassiam veram habeamus, desideremus autem optimum & legitimum cinnamomum, sunt tamen hæc ætate scriptores, qui non cassiam solùm, sed etiam cinnamomi genera inueniri tradunt, inter quos extat Fuchsius, qui libro illo de compositione medicamentorum, quem locupletatum postremò edidit, de cinnamomo differens, ita scribit. Sed haud dubiè in cassia cannella refertis, & cassia, & cinnamomi genera reperiuntur, quare delectu opus erit, qui illa distinguere velit: distinguet autem notis vtriusque diligenter expensis. His nimirum verbis Fuchsius cinnamomum nobis verum non deesse asseuerat. Sed quibus id rationibus, aut auctoritatibus comprobet, non video: nisi hoc acceptum referat Amato Lusitano, qui ad amentia deuenisse videtur in suis enarrationibus, quas in Dioscoridem scripsit, ut apud nos cinnamomi genera inueniri, atque etiam illud aroma notissimum esse contendat. Verum huius ineptias ac vanitates plurimas alibi persequimur, ubi nos ab eius calumniis defendimus: hic enim quod de materia medica sentimus, & ingenuè profiteri possumus, libenter scribimus. Quare ea sit nostra de Cinnamomo sententia, quæ à nobis antea suscipi probata est, quàm modo oporteat pluribus Fuchsiū refellere, quem tamen doleo maiorem fidem præstitisse Lusitani illius ineptiis & mendaciis, quam virum peritū deceat. Ceterum illud tantum addam, quod nobis, qui Cinnamomum lignum non corticem esse ostendimus, mirari quidem subit Fuchsiū, qui libro supra citato eodem loco paulò post, contrarium scripsit, ut eius verba, quæ subiiciam, aperte testentur. Cinnamomum, inquit, quod nobis Zeilam insula mittit, cortex est arboris quatuor ferè cubitorum alta, crassitudinis brachialis, sex vel septem è trunco mittentis ramulos, qui singulis annis amputantur, atque iterum pullulant: quorum cortex, qui cinnamomum est, sit tenuis, odoratissimus, gustatu acris, & valde mordax, non tamen admodum moleste rodatur, mæsum rutam oleat, &c. In hanc, meo quidem iudicio, vanam opinionem Fuchsius non secus atq; in superiorem venisse deprehenditur, secutus Amatum Lusitanum, qui eandem ferè prius, quam ille post cinnamomo effigiem reddidit, quanquam eã à quodam accepisse fatetur. Cinnamomi vires scribit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cinnamomum summè tenuium est partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem aquè desiccatur eorum, quæ pari sunt excalfaciendi facultate propter tenuitatem scilicet essentia. At Cinnamomis est velut imbecillum cinnamomum, nonnulli ipsam pseudocinnamomum nuncupant. Meminit & cassia eodem libro citato, ubi sic habet: Cassia exiccatur, & excalfacit tertio quodammodo ordine, sed & tenuium admodum est partium, gustu verò plurimum in se acris deprehenditur, leniter quoque nonnihil adstringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit, simulque digerit, quæ in corpore sunt recrementa & ad hæc robur etiam instrumentis addit. Idoneum verò etiam suppressis mensibus cum videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum, quod sufficiat, cuacuari nequit: hactenus Galenus. Ceterum ex vulgari cinnamomo fit aqua stillatitia, quæ & odore & sapore id ipsum pulchrè representat, eam autem extrahendi ratio hæc est. Sumito dicti cinnamomi quantum licet optimi libram, idque leuiter contusum in vas vitreum vel aneum, quod rotule formam rece-
 rat, conicito: dein aquæ rosarum stillatitiæ libras quatuor, & vini albi odorati sesquilibrium insundito, vas illud in balneum aquæ tepentis & non feruentis imponito, atque inibi ore vasis prius obturato, vigintiquatuor horis macerari finito: post id tempus vitreo organo rostrato, quod ab effectu galorum vocant, vas antedictum cooperto, & igne fornaci succenso, per balneum aquæ feruentis aquam stillatitiã elicito, (verum canna stagnæa vel vitrea, quæ duorum circiter cubitorum longitudinem expleat, organi vitrei rostro admoenda inserendaque est) illi postremò vas vitreum subiucito, quod manantem aquam excipiat: insuper prouidendum est, ut omnia vasorum orificia diligenter obstruantur, ne quid expirare possit. Hæc aqua contra omnes agritudines, quas frigus excitauerit, efficax est: vitæque pituitam humorumque lentitiã digerat, incidat, & absumat, statimque discutiat. Priuatim verò ventriculum, iecur, lienem, cerebrum, neruosque iuuat & roborat: animi deliquio, cardiacisque affectibus præsentaneo remedio succurrit: venenis, venenosorumque animalium moribus aduersatur: menses pellit, & vrinam ciet: cæliaci axilia-

Quorundam error, cassiam & Cinnamomum eiusdem arboris existimantium.

Cinnamomi sex genera Galeni. Cinnamomi differentia ex Theophr.

Exhortatio ad Lusitanos Medicos.

Fuchsi opinio reprobatæ volentis & Cassia & Cinnam. genera inueniri. Amati opinio cinnamomum notit. refutatur.

Fuchsius sibi contrarius.

Cinnamomi vires ex Gal. Cinnamomis quid. Cassia vires ex eodem.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia ut conficienda.

Vires aquæ Cinnamomi vulgaris.

VI. CASSIA SOLVTIVA.



Cassie soluti-
uae confide-
ratio.

Aegyptiae si-
liquae histor.

Cassia soluti-
uae, quae pra-
stantior.

Cassie soluti-
uae virtus.

Nomina.

quapropter securissime datur à medicis inchoantibus febribus, aliisque calidis morbis ante vena sectionem, quod tantum ventriculum repurget, & aluum emolliat. Nocet tamen intestinorum imbecillitate affectis, & his, qui admodum lubrici sunt, alias omnino habetur innoxia: tollitur id noxa admixtis myrobalanis, rhabarbaro, nardo, & mastiche. Constipatus si datur, augenda est eius facultas iis, qua magis eadem vi pollent: proinde sunt, qui addant amygdalinum oleum, & psyllii sissamentum: vrina difficultatibus mirifice auxiliatur, si cum vrinam cientibus medicamentis hauriatur, vel deuoretur. Aegre aluum excernit, eaque propter nonnulli roborant eius vires, addito hyssopo, vel caprino sero. Bilem, & pituitam ex-
cernit, nullo sanè incommodo: pectus, & fauces mulcet, & eorum inflammationes resoluit: renes à calculis, & sabulo ex-
pedis: praesertim si cum glycyrrhiza decocto, aliisve medicamentis vrinam cientibus bibatur: quinetiam frequenter deuo-
rata calculos renasci prohibet: quinimo sunt, qui affirmant, si quis quotidie ante prandium ternas pulpa cassiae drachmas
deuorauerit, is nunquam calculos in renibus gignet, & à ventriculi doloribus, & apostematibus se perpetuo tuebitur: ad-
modum praeter haec calidis confert febribus. Ceterum exterius illita erysipelas extinguit, ceterasque inflammationes, qua
cutetenu emergunt. Sunt è recentioribus medicis, qui eam nunquam sui agrotantibus exhibeant, nisi picta puluerem
admisceant, quod consulto factum existimo, praesertim vbi ventriculi, & intestinorum imbecillitas adsit. Quae Graeci
ναορία, Latini item Cassia nominatur: Arabibus, Selicha, Selche, aut Selibacha: Italis, Cassia, atque etiam Italarum
vulgo Cannella: Germanis, Zimmet, seu Zimmet röllein: Hispanis, Canela: Gallis, Canelle. Quod verò Graeci κιννάμω-
μον, Latini quoque Cinnamomum dicunt: Arabes, Darzeni: Itali, Cinnamomo. Germani Zimmetrind: Bobemi, so
skorice. Cassia solutina, siue Aegyptia siliqua: officinis simpliciter Cassia: Italis, Cassia: Gallis, Cassie laxative: Bobemis,
Cassia.

CNEORVM Matthioli, Clus. Pann. Cam. hor. Cneorum album Matthioli, & Oleander Sylvestris
Aucennae, Lugd. Cassia Matthioli, Chamælaez species, Taber. hanc fortè Thymelæz minoris no-
mine, Cordus in sua historia exprimere voluit. II. Cassia κασσία, quasi κοσμῶσαν διὰ τὴν ἰσορροπία
τῆς αἰσθητικῆς, quod sensibus fragrantiam largiatur. Quam veteres Cassiam vocarunt, credimus officina-
rum esse Cinnamomum, quod vulgo Canella. Est autem Cinnamomum cortex arboris lauro non ab-
similis, praesertim foliis, cuius bacca lauro similes sed minutiores, albicantes: huius rami singulo trien-
nio ab incolis inciduntur, (truncus enim quo novos stiones proferat, asseruatur) qui delibrantur: 60
cortex detractus fistulam representans (vnde vulgo Canella) Cinnamomum vocatur: qui post tres men-
ses à delibratione odoratissimus suauisque redditur. Cuius, ratione crassitiei & bonitatis, differentiae
verò fistula maior & asperior, iis pro dulcedine astrictio linguam exsiccans inest, & minor odoris fra-
grantia. Adfertur ex India, eius namque maxima copia in Zeilan insula Indici maris prope Equino-
ctium. Plura, qui volet, legat Ludovicum Romanum & alios. Dicitur Cinnamomum, Cord. in
Dioscorid. Cast. Tab. Lonic. (cui & Cassia odorata) Czfalp. cui & Cinnamum. Canella, Clus. in
Garz. Lugd. cui & Cassia lignea Graecorum. Cassia, Lob. Garz. & Theueto, cui & Cinnamomum & Ca-
nella. Quod verò officinae communiter pro Cassia exhibent, nil aliud esse videtur quam Pseudocassia
Dioscoridi

tur: nauisam sedat, & fastidium abigit: vteri morbis perquam
utilis est: prodest suspiriosis, resolutis, conuulsis, & comitiali
morbo laborantibus: gustui gratissima est, atque ori hali-
tuum commendat. In summa vbi excalfacere, aperire, incide-
re, digerere, & roborare sit opus, huius aqua vsus maximam
praestat utilitatem.

Veruntamen quoniam nec Dioscorides, nec veterum Gra-
ecorum quisquam meminit CASSIAE SOLVTIVAE
dicta, qua hoc tempore ad citandam aluum frequentissime
vtuntur medici, quamque Aegyptiam siliquam recentiorum
quidam appellant, ne haec nostra lucubrationes tam nobili,
tam praestanti, tamque humana saluti necessario medica-
mento destituantur, differam hic de eo, quicquid ex Mauri-
tania compertum habeo. Aegyptia itaque siliqua arbor inter
valde proceras annumerari potest. Huius materies solida,
compactaque visitur, corticetenuis buxeo colore, medullitus
verò nigra, non secus ac ebenum, siue quaiacum, radicibus
magnis, recens grauiter olet, siccatamen minimè. Folio con-
stat siliqua, sed magis in acutum tendente, cortice cineritio,
radicibus magnis iuglandis modo: à ramis siliqua pendent,
sesquicubitales, praelonga, teretes, dense, ligneo putamine, sed
tenui ac fragili, & cum maturitatem senserint, colore in ru-
brum nigricante: haec nigra, dulcique replentur medulla, leni
ac lento cremori simili, non tamen vt in osibus continua, sed
crebris lignosisq; membranis distincta. Inhaeret vnicuique
membranae semen durum, siliquarum semini aded simile, vt
alterum ab altero discerni non possit, ex quo eum non erras-
se putauerini, qui crediderit, has plantas esse congeneres. Eli-
genda est, qua ex Memphi, & Alexandria Aegypti conuehi-
tur, non admodum crassa, pellucens, recens, grauis, sarcta, &
qua concussa, inclusis seminibus minime constrepit. Pulpa
excalfacit, & humectat ordine primo. Eadem lenit, resoluit,
sanguinem mundat, bilisq; feruorem extinguit: aluum item
commodissime citat, eiusq; vis ventricularum non pertransit:

Dioscoridis & forte Cassia fistula Andromachi iunioris apud Galenum i. de Antidotis, licet alii corticem Cassie Monspeliacæ, cuius iconem addidimus, esse velint. Verum cum Gal. i. de Antid. testetur Cassiam in Cinamomum, & Cinamomum in Cassiam transire, habeatque nostrum cinamomum officinarum vires Cassie veterum, eius loco usurpari potest & debet. Loco vero cinamomi veterum, imitati Dioscoridem & Galenum, duplum nostri cinamomi optimi substituamus: sic compositionibus xylocassiam, siue cassiam ligneam, siue odoratam postulantiibus, cinamomum nostrum in pari dosi immisceatur, qua de re plenius in tractatu de materia medica in officinis vsitata agemus.

III. Xylocassia posita figura, siquidem Matthiolus moneat odoratæ cassiæ loco multos segmentis incognitæ arboris vlos esse. Huius, Xylocassie nomine, meminere Cordus in Dioscoridem, Lobelus & Lugdunensis historia: forte Pseudocinamomum Dioscoridis. IV. Xylocassia subnigra Lobelodicta, ea est cuius Matthiolus meminit cassiæ fistulæ Andromachi nomine: quam & Cordus in Diosco. Cassiæ syringitis nomine expressisse viderur. V. Cassia Monspeliaca frutex parvus est, ex radice dura lignola, subrufo crassoque cortice valde adstringente tecta, virgas emittit cubitales, nonnunquam altiores, tenues, lentas, striatas, ex vitore nigricantes, per quas folia lini rariora, at succulenta, gustu amato

V. CASIA MONSPELLIACA.



iparguntur: flores muscosi ex herbaceo flauescetes comi æmuli, ad foliorum exortum prodeunt: quibus succedunt fructus pedicellis insidentes singuli, myrti æmuli, virentes primò, at maturi Asparagi fructui similes, in quibus osseus nucleus, medullâ candidam dulcem continens, ipsa vero pulpa lenta, subdulcis primùm, dein acrimoniæ aliquid exhibens. Hanc in agro Monspeliaco frequentem obseruauimus: quamuis & in agro Romano & Hispania vulgaris sit. Cassiam poeticam vocitabant. Censent aduersaria esse Cassiam Theophrasti, quæ in Dioscoride desit: verum nec Virgilii, nec Hygini est, quam odoratam dicunt. Osyridis Plinii notas aliquas habet. Dicitur Cassia Poetica Monspelliensium Aduer. Lob. icon. & Cam. Cassia quorundam, Clus. hisp. (cui & osyris quorundam & Polygonum Placcæ, Plinii) Tab. Cassia lignea officina. Cæs. Cassia lignea maritima, quibusdam Genistæ maritimæ species, Lugd. Radicis cortice sunt qui ad obstructions hepatis vtantur. VI. Cassia fistula purgatrix: cuius inuentionem Arabibus tribuunt, & ex recentioribus Græcis Actuarius s. de compos. med. κασία μέλαινα dicitur: an hæc intellexit Theophrastus cum siliquas quasdam Ficus Egyptias appellari scribit: Cassia fistula Arabum, Cassia nigra Græcis recentioribus, Faba Indica Aristobulo. Cord. in Diosco. Cassia fistula Dodo. gal. Lacu. Loni. Castori, Alpino, Taber. Siliqua Inda, Ges. hort. Cord. hist. Cassia purgatrix, Lob. ob. Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum Carrobiis similis, Lob. icon. Cassia nigra, Dod. Canna fistula, à Costæ. Cassia Egyptia siue purgans, Cam. hort. Cassia solutiua Monardis, Garziæ. Cassia, Cæsalp. siliqua siue Cassia Cathar-

tica, Lugd. Hæc Cassia cum non sit aromatica, secundum methodum Dioscoridis huc referri non debet, sed inter arbores, quæ fructum ferunt edulem, nimirum ad siliquæ Dioscoridis caput.

Αμομών. AMOMVM. CAP. XIII

Amomum [exiguè fruticat, ex ligno se conuoluens, in racemi modum: flore, ceu candida viola, paruo: foliis bryoniæ similibus.] Laudatur quàm maximè Armeniacum, colore ad aurum vergens, ligno subrufo, abunde odorato. Medicum, quoniam in campestribus, & aquosis enascitur, infirmius esse constat: est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, odore origani. Ponticum verò subrufum, a paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligitò recens, candidum, vel subrubrum, quod nec adstrictum cohæreat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur, semine plenum, vis paruis simile, graue, valde odoratum, modò cariem non contraxerit, acre gustu, mordens simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi: Somnum allicit, & illitum fronti, doloris sensum aufert: inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitque: ituat quos febris perculsit, ex ocimo illitum: & podagricis confert: inflammationes oculorum, viscerumque lenit ex vna passa: ad vuluarum vitia in pessis, aut in sessionibus vtile est. Decoctum iocinori, renibus, podagra, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis vnguentis. Adulteratur Amomum herba simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiuscemodi rerum probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab vna radice suos integros surculos emittunt.

Tanta medicorum, qui nos praceperunt, in simplicium medicamentorum historia, & facultatibus ignorantia, se-

Conclusa nõ legit Orbanus.
a Meum
longum
Amomi con- sideratio.

qui prater id, quod vniuersam medicam facultatem ab erroribus sanè innumeris expurgauerint, eandemq; illustrauerint, vera quidem simplicia medicamenta inuestigarunt: minimè profecto verendum fuerat, quin paruo temporis tractu ar medica penitus subuersa, extinctaq; remansisset. Et certè si longiori tempore res ita se habuisset, nulli dubium est, quin huius facultatis cognitio in auram euolasset, quandoquidem hac pestis radices tam in altum fixerat, ac tam late se diffuderat, vt tametsi nonnulli ingenio & doctrina praestantes plurimum insudauerint, omneq; studium, & operam quam diligentissime impenderint, quo errores, qui ignauia & negligentia emerferant, à re medica excluderentur, eos tamen hactenus radicibus euellere nequinerunt. Siquidem non desunt, qui (quamuis huiusce percipiant rationes) malint suos prosequi abusus, omni ex parte detestandos, quam candidissima inherere veritati. Quo fit, vt vnà cum aliis innumeris simplicibus medicamentis etiam legitimo Amomo careamus: cuius vice quidam stirpium impostores ex Gargano Apulia monte profecti, pumilum quoddam semen supponunt, colore nigro, odore melanthii. Quod cum tantillum aromatis respiciat, & gustu acri deprehendatur, excogitauerunt, vt facilius ipsum corradere, in hominum animis inducere, id proculdubio legitimum esse Amomum: quod tamen (si Dioscoridi fides est adhibenda) semen edit vuarum racemis simile, non autem minutum, quale illud visitur. Insuper mihi sanè non constat, Dioscoridem semen in Amomo approbasse, sed potius ligneam arbuscula materiem, vt in cinnamomo & castia videre est, quo fit, vt legitimum Amomum lignum potius, quam semen existimauerim. Sed & turpiter aberrant, qui Serapionis interprete decepti, herbam Pedem columbinum quibusdam vocatam, que geranii pra se fert speciem, Amomum esse contendunt, & in Amomi locum substituunt, nullam de his historiam inquirentes. Caterum Amomum, quod iure probari possit, nullibi (quod sciuerim) in Italia prouenit, nec ed aliunde translatum hactenus videre potui, prater quam illud vna modo racemosum, baccis piperi aequalibus, quod à Francisco Calceolario superiori anno sum consecutus, dum ille suam theriacam, iure optimo pra ceteris extollendam, parabat. Atqui cum omnibus haud concessum sit vt legitimum Amomum consequi queant, acorum (vt Galenus docuit) in eius loco substituendum e-

Amomū spu-
rium.

Serapionis
interpretis
lapis, in Pe-
de columbi-
no.

ROSA HIERICYNTEA VIRIDIS. ROSA HIERIC. ARIDA.



Error quorū-
dam qui Hieric-
ontea ro-
sam, Amomū
censent.
Cordus tatar-
tur.

Fuchsi opi-
nio reproba-
ta, qui Bot-
rym theria-
ca miscet.


nit. Porro & hi omnino explodendi sunt, qui pro certo asserere non verentur, eam stirpem esse Amomum, quam Hiericuntia à Hierico Palestina oppido appellant: plantam hanc plerumq; ad nos è Hierico deferunt ii, qui ad sanctissimum REDEMPTORIS nostri sepulchrum peregre proficiscuntur. Ea enim est, quam nostrates mulieres rosam diua Maria vocant. Cōstat hanc amomum non esse, quod folia alba vitis non proferat, nec vlllo spiret odore. Legitimum enim valde odoratum est, adeo vt nares feriat primo statim occurso, origanumq; respiciat. Cordus libello de conficiendis pharmacis satis inconstanter de Amomo disseruit, quippe in compositione aurea Alexandrina pro certo asserit Amomum verum esse rosam Hiericuntis: in compositione verò theriaca, sui ipsius oblitus, habere nos Amomum negat. Vtuntur Hiericuntea nostrates mulieres tempore partus ad inuestigandam patendi horam, quādoquidem (vt ipse fatentur) in aquam demissa non prius sat hiscit, quā per locupletatum edidit, dum ea simplicia examinat, qua Theriacam ingrediuntur, cō productus, vbi Amomi racemosi carmine meminit Andromachus senior, omnes Galeni interpretes insimulat his verbis: Botryos, Grace est Βότρυος. In hac voce interpretanda omnes Galeni, qui hanc compositionem tradidit, interpretes hallucinati sunt, siquidè Andernacus libro primo de antidoto, vna conuertit: alii omnes, & cum iis Cordus, racemosi, Βότρυος vocem cum Amomi dictione, qua praecedit, cōiūgetes, quasi verò Andromachus de Amomo racemoso locutus sit: quod certe Dioscorides nō Βότρυος sed Βότρυος appellat. Separanda igitur haec dua dictiones per interiectum cōma erunt, hoc nimirum modo, αμύμου, Βότρυος, vt nos conuertimus: vt intelli-

ut intelligamus Andromachum de duabus inter se differentibus herbis esse locutum, nempe Amomo, & botry: hoc ille. Ex quibus utique abunde liquet Fuchsum sensisse, botryn quoque herbam, de qua Dioscorides agit libro tertio, in theriacam addendam esse. Veruntamen in hoc nos a Fuchso, viro alioqui doctissimo, plane dissentimus: quandoquidem Andromachum non botryn, sed amomum racemosum intellexisse putamus, idque non sine rationibus, & coniectura. Et ne longe progrediamur, in primis Andromachus ipse senior Fuchso aperte refragatur: illum enim non inuenio in suis carminibus, qua libro primo de antidotis in Galeno leguntur, aliter de amomo cecinisse, quam καὶ βοτρυόεντος ἀμώμου: quae quidem duae dictiones non ita separari possunt, ut Fuchsius opinatur: neque prior illud unquam significabit, quod idem perperam accipit. Ad hoc non minus, quam senior, nostra sententia ad stipulari deprehenditur iunior Andromachus: utpote qui in tradenda theriaca compositione, quam soluta oratione descripsit, nusquam (quod equidem legerim) botryn commemorat, sed amomum tantum. Quid etsi Damocrates in eadem antidoto describenda carminibus, quae loco citato a Galeno referuntur, cecinerit βοτρυόεντος ἀμώμου, haec tamen duae dictiones non sunt temere, meo iudicio, separanda: nam eas auctor consilio coniunxisse videtur. Quid praeterea de Galeno dicemus? etenim is quanquam libro ante dicto sigillatim enumerat, ac diligenter expendit simplicia medicamenta, quae in theriacam adduntur, tamen nusquam (quantum inuenerim) botryos mentionem facit: neque etiam eius meminit de theriaca ad Parnipilianum scribens: quid, si eandem plantam apud Galenum in simplicium medicamentorum censu desiderari omnibus notum est. Adde illud postremo quoddam inter recentiores Graecos Paulus, & inter Arabes Auicenna botryn herbam theriacis non inserunt suis. Quae sane omnia nostram augent, & confirmant opinionem: cui si illud obiciat Fuchsius, quod Nicolaus Myrepsicus in sua theriaca botryn Gallicam habeat, respondebo ego, quod Nicolai codex Graecus deprauatus est, & innumeris scaturit mendis: id quod ipse Fuchsius non negabit, quod idem de Nicolai codice saepenumero pollicetur. Ex his itaque satis manifestum fieri arbitror, quod ut Fuchsius sententia, quae theriaca botryn a iucere contendit, refellenda est, ita Galeni interpretes, qui Amomum racemosum vertunt, probandi sunt, ut qui sint cum Andromacho Dioscoridem secuti: u enim Amomi Pontici notas perstringens, ipsum racemosum fecit, ut supra in eius mentione legitur. Amomi meminit Galenus lib. 6. simpl. med. sic inquit. Amomum acoro simi-
lem facultatem obrinet, nisi quoddam acorum siccius sit, maiore autem concoquendi facultate Amomum. Hoc Graeco nomine ἀμώμου dicitur: Latino item Amomum: Arabico, Hamam, aut Hamama: Italico, Amomo.

Amomi vires
ex Galeno.
Nomina.

AMOMI nomine diuersa proponuntur plantae: alii pedem columbinum, Geranii speciem, male alii ut Ericius Cordus, Val. Cordus & Lonic. Rosam Hiericoteam: alii cubebas amomum dicunt, ut Cels.

III. Amomum, Amomus.



Amomum



Amomis

alp. alii ut Anguillara, piper aethiopicum, quod piper caudatum est: alii ut officinae, semen Sisonis allumunt: alia denique in notis in Garziam proponitur, quae pedem columbinum refert. I. Officinariam Amomum semen est plantae, quam Dioscorides lib. 3. cap. 55. nominat: quae Ammomum Germanicum, & Sison hortense Trago, Petroselinum Macedonicum Fuch. Dod. gal. & fol. Lonic. Sison Taber. Cam. hor. Lugd. figuram lib. 3. cap. 55. inuenies.

II. Rosam Hiericoteam, Ericius Cordus in suo Botanologico, Val. Cordus Amomum Dioscorid. Hiericonthidam Rosam & S. Mariae rosam vocant. Rosa Hiericotea, Lob. Cast. Garz. Amomis Diosc. & Plinii & Rosa Hierici, Cels. Huius duae species, altera lignosa tota, fractu contumax, insipida & inodora, altera lignosa quidem sed fragilior, aromatica valde odora, intus racematim concreto semine plena: & illud Amomis, hoc verò Amomum Cordo statuitur.

III. Has binas Clusius adiecit suis notis in Garziam: quae ex Ormus Arabiae emporio Valerando sub his nominibus (quae & Lugd. & Taber. reseruarunt) sint missae, verum neutrum addit Dioscoridis & Plinii descriptionibus conuenire, constant enim (auctore Clusio) haec fragmenta aliquot ramulis, foliis quibusdam aded frequentibus onustis, ut ex folis constare videantur, quae in extremo tali ordine sunt distributa, ut rosulam efforment. Ramuli isti simul compacti non inepte pedem columbinum (quale earum est, quae pedes hirsutos, seu plumatos habent) referre videntur, nullo tamen singulari odore aut sapore praedita sunt.

Κόστος.

COSTVS.


CAP. XV.

PRaeclit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, a teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excafactoria: vrinam ciet, menses pellit, vitiis, quae vuluam male habent, tam imposito, quam fotu, & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus peccatoris dolores, conuulsa, inflationesque ex vino & absinthio: venter ex mullo stimulat: latus ventris

Omnia
empl. ad p
ων καὶ μέλας
καὶ κίχρος. αἴε
καρδία. id est
qui plenus e
& niger, & le
uis ut ferula.

tineas ex aqua pellit: horribus ex oleo ante febrium accessiones, & nervorum resolutionibus oblin-
tur: vitia cutis in facie, cum aqua, vel melle illitus, emendat. Additur in antidota, & malagmata. Sum
qui, admittis helenii Comageni præduris radicibus, adulterent, quod deprehensu facile est: siquidem ne-
que gustu feruet helenium, neque validum odorem vibrat, ut caput tentare possit.

I. COSTVS OFFICIN. AMARVS.



II. COSTVS OFFICIN. DVLCIS.



III. PSEVDOCOSTVS.



Costi costi-
decatio.

Costus, quo vsa sunt officina per longas etates, in amarum, & dulcem diuidi solet: tamen si tum Dioscorides,
tum etiam Plinius nec dulcis, nec amari meminerint, sed nigri duntaxat & albi. Galenus quidem scribit leuiculam
Casto inesse amaritudinem: sed qui inter Grecos scripserit Costum inueniri dulcem, hactenus compertum non habeo: quã-
uis Mauritanii, & eos secuti, dulcis, & amari quandoque mentionem fecerint. Qui in myropoliis passum habetur, a-
dulterinus est: quippe nec vlla odoris suauitate commedatur, nec gustu aded acri deprehenditur, ut admotus exulceret, ut
Galenus inquit. Proinde medicamentis, quæ Costum excipiunt, nõ erit, meo iudicio, imponendus, cum præterea nos pla-
ne lateat, cuiusnam planta sit radix. Porro non desunt hodie impostores, qui ex Gargano Apulia monte, quotannis ad
nos conuehunt Pseudocosti cuiusdam radices, amari saporis, quæ facie quadantenus Rhodiam radicem representant. Est
autem pro legitimo costo vendunt nostratibus pharmacopæis, iis præsertim, qui in rei herbaria cognitionem negli-
gentius incumbunt. Plantam nos habere, atque etiam depingi curauimus, ut ex eius imagine, quam hic damus, dis-
cant imperiti, cuius planta sint radices illa qua pro legitimo costo circumferuntur: videtur tamen Pseudocosti planta
quandam præ se ferre maiestatem, & ideo non vulgaris iudicanda. Foliis est pastinaca domesticis maioribus, densiori-
bus, crispis, & asperioribus, humi accubantibus, caule rotundo feniculaceo, geniculatoque, bicubitali. E geniculis ramuli so-
aruntur in vniuerso caule, in quorum summitatibus umbella spectantur melino colore, nudo semine, subrotundoq-
Radice nititur vegeta, crasso cortice, carnosq-, vestita colore cinereo splendente. Excalfacit & siccit ordine secundo com-
pleto. Aperit, abstergit, incidit, attenuat. Amara est & acris. Præferunt hanc herbarii, qui eam ex Apulia ad nos compor-
tant, ad omnes capitis, nervorumque affectus frigidos, quinetiam ad pectoris vitia, ad ventriculi cruciatus: & viscerum
omnium obstructions, & ad renum, vesicæ, & vteri morbos. Ideoque diutino capitis dolore affectis, vertiginosis, comitia-
libus, stupidis, veteriosis, conuulsis, resolutis, asthmaticis, anhelatoribus, tussientibus, ictericis, hydropicis, plurimum con-
ferre Pseudocosti radicem affirmant: quoniam etiam flatum expellere, vermes necare, vrinas, & calculos eiicere, menses, se-
cundas, & partus ducere, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius, aut si in fomentis, balneis, & desensionibus adda-
tur. Præferunt eandem ad coli cruciatus, vbi decoctum clystere infundatur, & aduersus articulorum morbos, & coxæ-
dicum dolores. Nam cum amara sit, nonnihil odorata, & nonnulla sit acredine prædita, hæc omnia Pseudocostum præ-
stare posse, facile concedam. Sunt insuper, qui Costi loco Angelicam recentioribus vocatam supponendam existiment,
quorum sententiam magis probandam censerem, quam eorum, qui pseudocostis vtuntur: Costum enim hæc radix non
obscurè refert, quandoquidem eximia illa odoris suauitate tam iucundè spirat, ut angelica nomen sibi meritò ven-
dicasse videatur: acris præterea est, nec amatoris omnino expers. Quapropter eos haudquaquam damnandos
putauerim, qui Angelicam Costi genus esse crediderint: contra verò eorum opinionem haud vnquam probatum.
qui Zedoariam legitimum esse Costum contendunt. Siquidem his nec Dioscorides astipulatur, nec etiam Gale-
nus. Ille quidem quod Helenii radicibus, qua vegeta magna que sunt, costum adulterari scribit: hic verò quod plu-
ribus in locis asserat costum ex discussoria, & adstringente constare facultate: adeoque eximia fragrantisque esse o-
doris, ut non minus ad vnguentis odorata paranda etiam apud antiquos inuenerit vsu, quam Malabathri, Amomi.

Pseudocostus
à Costo dif-
ferentia.

Pseudocostum
quale melius
est quibus pol-
leat viribus.

Angelica, Co-
stus quibus-
dam.

Zedoaria co-
stus quibus-
dam.

*Costis, atque Myrrha. Quibus tamen cum notis, tum facultatibus prorsus Zedoaria destituitur, quam potius graui-
ter, quam suauiter oleat. Adde quod Costo Galenus leuiculam planè amaritudinem, & validam tribuit acredinem, sed
hac in Zedoaria contrario modo se habent, cum in ea validior amaritudo, & acredo remissior deprehendatur. Nec prater-
ea sunt calumniatores, qui dicunt, ut nobis insidiantur, Zedoariam non Indicum esse costum, sed Syriacum. Sed quis
has non ridebit, quam nusquam auditum sit in Syria nasci Zedoariam? Indica enim radix zedoaria est, quæ per mare ru-
brum affertur Alexandriam Aegypti: verum non ob id negauerim pro Costo substitui posse Zedoariam, ut alias diximus in
Epistolis. Arabici Costi radices, omnibus astipulantibus notis, misit ad me iam diu Franciscus Calceolarius, pharmacopæus*

Costus Ara-
bicus.

IV. COSTVS ARABICVS.

V. COSTVS IRIDEM
redolens.



Costus Indi-
cus.

Costi vires
ex Galeno.

Veronensis, materia medica studiosissimus, quas pluribus de
causis, tanquam pretiosas, inter mea selectiora simplicia ser-
uandis duxi. Indici autem Costi frustum deinde à Cecchino
Martinello Rauennate mihi missum est, quod secum ex In-
dia attulit, vbi vulgò Costi ab Indis vocari dicit. Caterum
etsi duo hæc Costi genera cum forma, tum substantia nõ pa-
rum inter se differre videantur, id tamen mihi nullam dubi-
tandi suspensionem affert, cum videam ex Dioscoridis lectio-
ne, Arabicum ab Indico non parum differre, & hic quoque
à Syriaco. Atque cum Arabicus Costus ceteros præcellat, il-
lum à Calceolario mihi missum, præ ceteris magnificè. Co-
sti vires scribit Gal. lib. 7. de simpl. medic. facultatibus, sic in-
quit. Costus leuiculam planè amarum, plurimam autem
acrem, & calidam in se qualitatem simul & facultatem con-
tinet, adeo ut etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant
corpus ante accessionem in rigoribus per circuitus redeuntibus.
Sic verò etiam in resolutis, & ischiaditis, atque in sum-
ma in quibus exalfacere partem quamuis, aut ex alto in su-
persiciem extrahere aliquem humorem est opus, ad costum
confugitur. Eadem de causa urinas, mensisq; prouocat: & ad-
rupta, conuulsa, ac læterum dolores conuenit. Però ob ama-
ritatem, quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem &
ad contractas velut ex sole maculas, quæ Græci vocant, cum aqua, aut melle vsurpant. Inest item flatuosa quedam illi
temperiei humiditas, per quam & venerem excitat cum vino mulso. Κόστος ita Græce nominatur, quem admodum Latine
Costus, Arabicè Κόστος, siue Chast, & Italicè Costo. Pseudocostus, Costus vulgaris: Italis, Costo bastardo, & Costo
di Puglia.

Nomina.

Costi Arabici, Indici, & Syriaci: seu albi, nigri, & buxei meminere Dioscorides: at Plinius lib. 8. cap. 11.
tantum nigrum, & quod melius sit candicans, houi: & Theophrastus 9. hist. 7. costum inter ea quæ ad vn-
guenta apta sunt, nominat. Nec quem moueat officinarum sententia, quæ in dulcem & amarum diuise-
re, siquidem omnis costum Galeno amarus sit, & solum recentiores Græci (inter quos est Actuarius) qui
Arabes sunt secuti, costi dulcis meminere: imò is quem dulcem vocant, amarus, & quem amarum nomi-
nant, dulciore gustu sentitur. I. Verum quem costum amarum nominant, ut & Lon. & Tab. Helenij
Comageni radix est, apud Dioscoridem, quo costum adulterari monet: quare Inula Comaginea Cord-
hist. & Costus Comagineus adulterinus officinarum, Lob. icon. Quæ sanè radix adfertur, vel per transuer-
sum incisa (quæ nostrum Helenium orbiculato rugarum habitu refert) vel per longum secta. II. Ar-
costus officinarum dulcis, quo nomine Lon. & Tab. vtuntur, Costi pharmacopolarum maior species, Ca-
mer. in Matth. D. notatus, dicitur. Notare conuenit, sæpe costi vice in officinis vsurpari radicem per tran-
uersum in taleolos sectam, foris fusco, intus candidate colore, cortice crasso, substantia rara, gustu admo-
dum acri & odore cum teritur rancidam pinguedinem olens: quæ sanè Thapsiæ maioris radix est, & non
sine periculo intra corpus sumitur. In hac ergo radicem incertitudine, suaserim Zedoariam Costi loco
assumendam: maximè cum non desint, qui Costum Arabicum, alii qui Syriacum, statuam ipsam Zedo-
riam. III. Pseudocostus Matth. & Lugd. Panacem costinum nominamus: Costus vulgaris Cast. Her-
ba costa Cæf. Panax chironium Theoph. Cam. hor. cui & ferula sagapenifera quorundam. IV. Costus
Arabicus Dioscoridis. C. B. & Cam. Zingiberis effigie costum Arabicus & Syriacus, Adu. & Lob. Costi
quoddam genus Zingiberis radicibus simile, Clus. in Garz. Costus Arabicus vel Syrius, Tab. Costus Sy-
riacus & Arabicus Lugd. V. Costus Iridem redolens, an Indicus Dioscoridis: C. B. Costus Indicus,
Clus. in Garz. Lugd. Tab. Costus facie radicis centaurii maioris, Lobelo.

IUNCUS ODORATUS.

Σχάϊνος ἀρωματικὸς.

CAP. XVI.

Meum. λι-
βικη.

Σχάϊνος
Σμαζοκ.
id est graue-
olentibus
stomachis
Antiquus
codex.

Iūci odorati
consideratio.



Iunci odor.
descript.

Monithorū
opinio explo-
sa, dum Iun-
cum odoratū
effic. spurium
censent.

Fuch. lapsus.
Anguilla. re-
prehenditur.

Odoratus Iuncus in a Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alii teuchitan: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisque est vsus. Vm vrinæ ciunda habet: menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modice adstringit, comminuit, excoquit ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reiicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocinoris, & renum: miscetur antidotis. Radix adstringitior est: ideo [fastidiis stomachi,] hydropicis, conuulsis, drachma vna cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidendum foris, vtile est.

Iuncus odoratus, officinis Squinanthum vocatur: quæ vox, quamuis deprauatè, ex planta, & floris nomine componitur, in vnam vtrisque iunctis dictionibus. Namque squinanthum s̄ ad rectam etymologiam referatur, non aliud inferet, quam duas hæcæ Grecas dictiones σχάϊνος & άνθος, quæ Latine florem iunci significant: σχάϊνος enim iuncum, άνθος vero florem Grecis designat. Veruntamen flos ad nos non importatur, quod tamen mirum non est, cum etiam Galeni tempore non haberetur. Proinde inquit libro primo de antidotis: his præterea Iuncum odoratum ex Arabia allatum immitti præcipit, quæm nescio quomodo schæni anthos, id est, iunci odorati florem multi vocent, cum nobis floris copia non aded suppeditet. Nam etsi tota aduchatur herba, sunt tamen eius superiores partes à camelis sæpe depasta: vescun-

tur enim ea, & delectantur maximè: hæc Galenus. Quæ (si licet nobis dicere quod sentimus) potius ridenda quam probanda videntur. Arduum quippe fuerit credere, tam ingentem esse camelorum numerum, qui locustarum modo in vniuersum schæni flores depascantur, vt nulla penitus supersit planta, cui flos non deuoretur. Ego enim eorundem florum plenam habeo arculam, quorum partem Venetiis ad me misit Albertus Martinellus pharmacopæus ad Angeli Myropolium, partem vero Verona Franciscus Calceolarius materia medica admodum studiosus, qui odoris suauitate atque fragrantia, quin etiam ceteris qualitatibus omnibus, quæ in Schæni antho requiruntur, ita præditi sunt, vt quispiam sana mentis eos hallucinari manifestè deprehendat, qui communis vsus odoratum Iuncum adulterinum esse contendunt. Hos itaque flores Syria, primus in Italiam misit Cecchinus Martinellus, Alberti præscripti frater, qui non paruo labore ex Arabia sibi affertur curauit. Planta est Iuncus odoratus peregrina, quæ ex Alexandria Aegypti ad nos conuehitur. Nascitur in Arabia, Syria, cum in campestribus & pascuis, tum etiam vbi lacus quodam tempore siccantur. Folia habet Caricis vel zea, robustiora tamen, sursum spectantia, & sese stipantia, è quibus culmi exeunt zea modo geniculati, in quorum summitate flores habentur odorati. Radix est illi ima parte villosa odoratæque, sed odor tractu temporis deperditur. Referunt quidam nasci odoratum Iuncum etiam in Apulia: quin & in Campania prouenit, vt Brasauolus inquit Plinii auctoritate. Sed vereor, ne hallucinentur, quod nec inde flores afferantur, nec palea: neque etiam id Plinius affirmanter asserat. Is, quo Seplasiarum passim vtuntur, non asseritur aliunde, quam ex Alexandria. Ceterum non parua quidem diligentia, dum emittur, est adhibenda: quandoquidem non desunt impostores, qui ad merces augendas, schænum palearum & herbarum quibusdam fuscis adulterent. Præterea videndum est, ne vetustate exoleuerit: facile enim (vt in libro de antidotis docuit Galenus) ab hoc vis omnis euanescit. Scribunt Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, odoratum Iuncum, quo passim officina vtuntur, spurium & illegitimum esse, cum hæc palea (vt eorum verbis vtar) Dioscoridis schænum minime referant. Siquidem radices primùm medicina vsui congruas illi inesse contendunt, sed capillorum modo tenues: deinde paleas ipsas nullam gustantibus acrimoniam relinquere, nulloq; rosarum odore fragrare, si manibus confricentur: nec postremo iuncum aliquem proferre, sed calamos geniculis interceptos tritici vel hordei modo. Quæ in re (pace eorum dixerim) duplici errore notantur, primùm quod Dioscoridem oscitanter legerint: deinde quod illud affirmant, quod experimento proculdubio falsum esse deprehenditur. Quod autem Dioscoridem oscitanter legerint, cum dicunt schænum iuncum proferre, non calamum, facile patet, quandoquidem contrarium scribit Dioscorides, vbi schæni vsum reddit his verbis. σχάϊνος δ̄ τῆς ἀρωματικῆς καὶ ἀμύγδαλον, καὶ τῆς ἰσχυρῆς: id est. Vsus est floris, calamorum, & radicis. Præterea quod communis vsus schænos acrimoniam non habet, pariter falsum est, quippe, vt experimento quotidie comprobari potest, qui non longo tempore cõsenuerit, linguam mansu vellicat. Quibus palam est, Monachos vel nunquam schænum degustasse, vel si degustarunt, illum aded vetustate exoletum fuisse, vt (quemadmodum Galenus inquit) omnem acrimoniam, odorèmq; amiserit. Quod autem nostri schæni radices tenues sint, nihil ad historiam refert: siue enim tenues sint, siue crasse, eas non descripsit Dioscorides. Schæni flores ex Alexandria vna cum integra planta allatos ego in manibus habui, qui digitis attriti rosarum odorem emittebant. Quamobrem non temerè contra Monachorum sententiam affirmandum putauerim, communis vsus schænum legitimum, & probatissimum esse. Sed si quidem adhuc magis reprehendendi videntur (non tamen vt eorum dignitati aliquid derogetur) quod in Diagalanga compositione scripserint, radicem galangam vocatam legitimum esse schænum, ipsamque galangam ad nos affertur, quod prorsus à veritate alienum deprehenditur. Ceteram & in hoc pariter Fachsum errasse crediderim, quippe qui scripserit sua in methodo, schæni anthi stipites nullam acrimoniam mansu relinquere. Est etiam Anguillarum, qui Monachorum fortasse sententiam sequitur, pluribus con-

transfert sibi in hunc communem usum, esse adulterinum. Primum quod caulem non habeat Cyperi, ut Dioscorides in Cypero testatur: deinde quod eius radices similes nostro vocato Pbu haudquaquam conspiciantur: praeterea, quod antiquis vsus fuerit florum, caulium, radicum, non foliorum, quibus tantum nobis est vsus. Ad haec quod in nostratis tum caule, tum radice nullus prorsus odor percipitur, nec sapor, sed tantum in foliis, quibus non videtur Dioscorides. Haec itaque sunt Anguillariorum argumenta, quae non parum fortasse valere putaret, qui aliorum sententiam non audierit. Ego vero hisce argumentis ne minimo quidem vngue a priori mea opinione amoueri possum: siquidem ante Orbasium nulla Dioscoridi erat Cyperi descriptio, id est, nec foliorum, nec caulium, nec seminis, nec radicum: quo fit ut illa omnia in Dioscoride addita crediderim: adde quod in omnibus exemplaribus Dioscoridis, quae ad manus sunt, non legitur Cyperum odorati iunci modo calamum proferre, sed iunci simpliciter, etsi odorati perpetui addiderit Ruellius, id quod ipse videtur aperte satis demonstrare Dioscorides cum dicit: *χρῆσις δὲ τῶν ἰνκῶν καὶ τῶν καλάμων.* Siquidem Cyperi caulis nullam prorsus calami faciem refert, cum rotundus non sit, sed angulosus, alba factus medulla, non inanis, nec vlla in parte geniculatus, ut calamus: ideoq; Schoenanthum, rotundum odoratum Iuncum vocat Galenus lib. 6. de compos. medicament. secundum locos. Ad haec non reperio scripsisse vsquam Dioscoridem, Pbu radicem habere Schoenantho similem: sed quod Pbu superior radix, quae digiti minimi crassitudinem aequat, ex obliquo adnatas habeat fibras, siue exiguas radices is ferè similes, quae in Iunci & Ellebori nigri radicibus visuntur. Nam ita habent Dioscoridis verba: *ρίζα δὲ ἢ μὲν ἀνωτέρω, καὶ δακτύλου μικρῶς τὸ πῶχος, πλάγια δὲ ἐπιπίπτουσα ἔχει καθάπερ σχίνος ἢ μέλας ἰλλίβορος:* quibus linguae Graeca peritis facile palam fiet fibras tantum, quae in Pbu radice habentur, Iunci simpliciter, non odorati Iunci fibris (ut hic quoque somniauit Ruellius) comparasse Dioscoridem. Quod vero nostratis odorati iunci non veniant in vsu caules & radices, sed tantum folia, praeter Dioscoridis sententiam, quod nulla odoris saporisq; vis in hisce partibus reperitur, id euenire crediderim, non quod sit verum Anguillariorum argumentum, (sunt enim omnes eius partes odoratae) sed quod ita post Dioscoridis tempora inualuerit vsus, quandoquidem Galen. vniuersa vititur planta lib. 8. de simpl. medic. facultat. Ego quidem mihi testis esse possum, habere me nunc ad manus aliquot odorati Iunci plantas, quarum calami ac radices non minus sunt acres quam folia: quo fit ut putem rotundum, odoratum Iuncum, qui non fuerit exoletus, nunquam degustasse Anguillariorum, ut nec Fuchsium. Postremo si natale solum ac vires nostri Schoenanthi rectè quidem examinentur, id proculdubio ex Arabia Alexandriam Aegypti importari nos facile negociatores certiores reddent: & legitimi odorati Iunci viribus praeditum esse omnes testabuntur Medici, qui curandis agris sese totos dedere. Schoeni vires prodidit Galenus lib. 8. simpl. medic. ubi sic habet: *Schenianthos modicè cassat modicèq; etiam adstringit, nec planè a tenuitate sua natura alienus est. Aperit, digerit, pellit, incidit, excoquit, modicè adstringit. Quocirca his de causis vrinam mouet, mensesque ciet adhibitum siue in fomentationem, siue in potionem: prodest & iecori, & stomachi, ac ventris inflammationibus: magis eo adstringit radix: quod verò flore vocant, calidius est. Porro in omnibus sui partibus, in aliis magis, aliis minus, gustantibus apparet adstrictio: proinde medicinis, quae haemoptoicis, siue sanguinem reiciuntibus exhibentur, commiscetur: Decoquitur ex gallinaceo iure tota planta, fitq; hinc potus admodum utilis feminis, quae vteri doloribus in puerperis laborant. Miscetur Antidotis.* *Σχίνος ἀρωματικὸς, Graecis: Iuncus odoratus, Latinis: Adcher, Arabibus: Giunco odorato, & Squinātho, Italis: Camelfi heuto, Germanic: Pava de la Mequa, siue Pava de chamellios, Hispanis: Pasture de chaméaulx, Gallis nominatur: Bobemis, Sirii Vuanne.*

Iunci odorati vires ex Gal.

Nomina

IUNCUM odoratum hoc loco proponit Dioscorides, quia aromaticus est, idcirco de eo inter aromata legit: at palustrem, cum non sit aromaticus, in quartum librum reiecit. Licet Graeci plerunque, ut Hippoc. de nat. mulieb. *σχίνον* absolute scribant, tamen idem demorbis mulieb. *σχίνον ἢ δὲ ὄσμον, καὶ εὐόσμον, καὶ ἰνκὸν* vocat: quibusdā *σχίνος μυρικήος*, quod in vngueta recipiatur. Celsus, ut à Iūco palustri, & à Cypero seu iunco anguloso odorato distinguatur, iuncum rotundum nominavit: quare Iuncus rotundus odoratus nominari poterit, Iuncus quintus & odoratus, Dodo. gal. Iuncus odoratus, Lob. Clus. in Garz. Lac. Castor. à Costæ. Cæs. Lugd. Schœnus, id est, teres odoratus Iuncus, Cord. hist. & in Diosc. Schoenanthū, Lon. Tab. Cam. cui & iuncus floridus seu aromaticus.

Κάλαμος ἀρωματικὸς CALAMVS ODORATVS. CAP. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, cum aliquata acrimonia. Vriam potu ciet: quare cum graminis, aut apii semine coctus, in aquae subter cutem fulae morbo, renum vitiis, stillicidio vrinæ ruptisque commode bibitur: menses & potu, & appositu pellit: tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infensus decoquitur, & clysteribus imponitur. Malagmatis, & suffitionibus odoris gratia commiscetur.

Calamus, & Iuncus odoratus (ut Theophrastus est auctor lib. 9. cap. 17. de historia plantarum) trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem paruum valle minima exeunt (non, ut quidam dixerunt, inter Libanum, atque Antilibanum) inter quos campus amplissimus, & pulcherrimus est, quem Aulonem appellant. Quae vna calamus, & iuncus proueniunt, lacus in amplius spatiat, iuxtaq; eum palustribus siccatis isti assurgunt: occupant locum plusquam triginta stadia. Virides nequaquam esse videntur, sed sicci: forma verò nihil ab aliis differunt. Locum ingredienti protinus odor aspirat, non tamen longius spirat, ut quidam referunt: hic enim locus à mari plus est, quam stadia centū quinquaginta. Sed in Arabia aspiratione agrum odoratissimam esse inter omnes constat: haec de Calamo Theophrastus. Cui etiā subscribit Plinius lib. 12. cap. 22. ubi sic habet. Calamus quoque odoratus in Arabia nascens communis Indis, atq; Syria est: in qua vincit omnis à nostro mari centū quinquaginta stadiis. Inter Libanum montem, aliumq; ignobilem, non (ut quidam existimauerunt) Antilibanum, in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria aestate siccantur, tricenis ab eo stadiis calamus & iuncus odorati gignuntur: nihil ergo à ceteris sui generis differunt aspectu. Sed Calamus praestantior odore statim è longinquo inuitat, mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis, & qui assulose frangitur. Inest fistula araneū, quod vocant flore: praestantior est, cui numerosius: reliqua probatio, ut integer sit, damnatur alibi. Melior quo breuior, & crassior, lentusq; in frangendo: haec Plinius. Sed certè satis palā esse arbitror (ut in acori commentariis diximus) quam magnè dicitur errore Brasauolus Ferrariensis, quod tam facile sibi persuaserit, legitimum odoratum Calamum illam esse radicem, quae temerè omnibus in phar-


Calamifloro, Calamifloro, Calamifloro

Ex Plinio,

Brasauoliorum, Calamifloro, Calamifloro, Acori officinalis, credentium

topelis

CALAMVS ODORATVS. CALAMVS ODORATVS LIBANI.



Calamus odoratus non est radix.

Fuch. opinio improbata.

Calami odorati vires ex Galeno.

Calamo odorato destitutum.

Muscus arborum male Calamo substituitur.

Nomina.

capulis illius vicem explet, quamque verum esse acorum superius pluribus rationibus comprobauimus. Quandoquidem primum ex ipsa Calami appellatione, deinde ex eo, quod dixerint Theophrastus & Plinius, non differre hunc forma à reliquis sui generis, id est, ab omni arundinum genere, utiq; constat odoratum Calamum genere, & forma arundinem pra se ferre, odoratam tamen, non autem esse radicem. Quocirca Plinius Dioscoridem fortasse secutus, dixit. Fistula (hoc est cavitatis) inest araneum, quod vocant storem: non autem radici, ut falso contendit Brasauolus, araneum illud inueniri in vulgari illo officinarum. Ad hoc Plinius lib. 24. cap. 11. dum plura arundinum genera, & vires recenset, idem apertissime ostendit, his verbis. Arundinis genera 29. demonstrauimus, non aliter euidentiore illa natura, quam continuis iis voluminibus tractauimus. Et quoniam plura genera fecimus, illa, quae in India Syriaeque nascitur, odorum vnguentorumque causa, vrinam mouet cum gramine, aut apii semine decocta: cit & menstrua admotu: medetur conuulsis duobus obolis pota, iocinori, renibus, hydropi, tussi etiam suffitu, magisque cum resina: haec Plinius. Sed praeterea vulgares calami radices, quas acori esse censemus, assulose nequaquam frangi possunt, sed transversim, quem admodum & iridis. Quo fit, ut eorum innotescat lapsus, qui Calamum odoratum radicem esse contendunt, qui tamen (ut aperte ostendimus) nil aliud est quam arundo. Caterum si quispiam dixerit, has radices, quarum est vsus, esse calami odorati proprias, non acori, illud sanè argumentum destruit, quod istuentibus euidenter apparet: quandoquidem etsi complures illius acori radices habeantur, quae sicca gerunt in cacumine solia, iridi omni ex parte similia, nulla tamen vsquam inuenta est, quae secum arundinis trunculum cacumini annexum deferat: nempe acori proprium, non odorati calami est, iridis folia ferre. His itaque rationibus Fuchsi quoque sententia improbanda mihi videtur, quippe qui putauerit in sua methode, vulgarem officinarum calamum veri odorati calami esse radicem. Porro minimè quidem compertum habeo Dioscoridem, nedum Galenum, qui ex odoribus, ac saporibus vires eque, ac qualitates omnium simplicium medicamentorum accuratissime inuestigauit, dixisse aliquid odorato Calamo inesse amaritudinis, quam tamen in acoro haberi Galenus prodidit, qui calami odorati vires pluribus descripsit, lib. 8. simplicium medicamentorum sic inquit: Calamus odoratus leuiculam quandam adstrictionem, ac minimam acrimoniam possidet: magna ex parte essentia eius terrena est & aërea, in caliditate frigiditateque coniugatione temperata. Quamobrem moderate vrinam mouet, & facultatibus, quae icori, & stomacho imponuntur, misceri potest: tum in fomenta quoque veteri quae phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, vtiliter admiscetur. Ponatur itaq; habeaturq; secundi ordinis eorum, quae excalesciunt, & desiccant, valētius tamē desiccet quā excalesciat. Inest quoque ei quadam partium tenuitas, velut aliis omnibus odoratis. Caterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest: haec Galenus. Quibus facile patet, Calamum officinis vocatum, legitimum esse nequaquam, maior enim illi inest acrimonia, quam suo referat Galenus. Ea q; propter legitimum calamo odorato nos esse hoc duo destitutos fateri non dubitauerim, id quod etiam aliquibus satis persuasum esse puto. Nam propterea sunt qui libellum secuti de substitutis medicamentis falso (ut mea quidem fert opinio) Galeno adscriptum, sphagnum, id est, muscum arboreum, calami odorati loco supponendum esse velint: quam eundem sententiam ut haecenus probaueram, ita etiam literis mandaueram. Nunc autem quoniam illud mihi absurdum videtur, quod ea medicamenta inter se commutari debeant, quae contrariam facultatem sortiti sunt, cuiusmodi esse deprehenduntur calamus odoratus & sphagnos, idē non temerè cogor mutare sententiam, atque ab illis desistere: sed quid pro calamo odorato recte substitui posse credamus, alibi, Deo concedente, explicabimus. Eius nomen Graecum est Κάλαμος ἀρωματικός: Latinum, Calamus odoratus: Arabicum, Hasabel, aut Casab aldatira: Italicum Calamo odorato, Calamo aromatico.

CALAMI duo prima genera sunt, alter vulgaris seu palustris, & alter odoratus aromaticus, hic Hippocr. de natu. muliebri καλαμος, Calamus odoratus Plinio, Dod. gal. Cast. Calamus Arabicus, Plutarcho Alexandrinus, Celso: Calamus aromaticus, Theoph. & Galeno dicitur: vt & Lac. Lon. Tab. At Lobelus calamum odoratum Libani proponit, cui similem Camer. in Matth. habet. (cuius frusta à Cl. viro Bernhardo Paludano Frisio vna cum aliis accepimus) qui an cum Matthioli conueniat consideratione dignū. Verum cum officinae vero destituantur Calamo aromatico (ipsarum enim Acorus est) substitui poterit cum Galeno, Cardamomum, vel huius loco Squinanthum ipsorum, cum sapore & odore penè conueniant Calamus & Iuncus: si & hoc exolerum sit, Calamus aromaticus officinarum sit succedaneum, sed in minori dosi, cum in caliditate & siccitate gradu vno Calamus aromaticus officinarum, Calamum Dioscoridis superet.

Balsamum

BALSAMVM.

CAP. XVIII.

Balsamum arbor albæ violæ, lycii, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Foliū rufa proximiū, longè candidius, perpetuò virens. In Iudæa solum quadam valle, & Aegypto nascitur: his differēs modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui, & capillacea coma est, theristum vocant, quasi demessile: fortasse quoniam ob gracilitatem facile demetur. Aestiuus sub ortu canis ardoribus, arbor vnguibz ferreis inciditur, manatque è plaga b succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidem, quàm seni septeniue congii cogantur: inibi que pondus duplo rependitur argento. c Succus probatio est, vt sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilius, lauis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè vitiatum misto ab aliquibus terebinthi, cypri, lēnisci, balani vnguento: item fusino, metopio, melle, aut d Cypria cera liquida. Quod maleficium facile apprehenditur: namq; merus in laneam vestem fusus, e neq; maculam facit, neq; si eluatur, notam relinquit: vitiatum autem inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua, aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescit: vitiatum verò olei modo innatat, se cōoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorque redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima sidere arbitrantur: postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod Xylobalsamum vocant, probatur recens, f sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadantenus opobalsamū spirans. Necessarius etiam seminis erumpit vsus: quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & quàm maximè calfaciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt: medetur perfrictionibus vuluæ cum rosacco cerato appositus: menses quoque, secundas, & partus extrahit: horrores illitu discutit: vlcera sordida expurgat, & cruda concoquit: vrinam potu ciet: ægrè spirantibus prodest: datur in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium ictus. Miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa præcipua authoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen comitmodè potui datur doloribus lateris, pulmonum vitis, ruffi, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus, ac serpentium moribus: ad muliebres suffitus perquam vtile est: vuluam aperit in defessionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum eadem habet vires, aliquantò minores. Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, vullis, venenatorum ictibus opitulatur: vrinam cit, ad capitis vulnera cum sicca Iri conuenit: squamas ossium extrahit, & ad vnguentorum spissamenta additur.

Antiquitus Balsamum (vt Plinius libro 12. cap. 25. est auctor) in duobus tantum hortis, vtroq; regio, altero iugerum viginti non amplius, altero pauciorum, vni terrarum Iudææ concessum erat: sed postea propagata admodum fuit species, cum Iudæa ipsa simul cum Balsamo Romani potiti sunt, qui veluti politicarum pretiosarumq; rerum propagatores, tam dignam, claramq; stirpem raram esse non rulerunt: itaq; eam malleolis serendo, atque iterando, non secus ac vites in collibus propagantur, latius accreuerunt. Quocirca Iustinus quoque hac de Balsamo memoria prodidit: Opes gentis Iudaicæ ex vectigalibus opobalsami creuere, quod in his tantum regionibus gignitur. Est namque vallis, quæ continuus montibus, velut muro quodam cincta, ad instar castrorum clauditur: spatium loci ducenta millia iugera, nomine Hierico dicitur, in ea valle sylua est & vbertate, & amenitate arborum insignis: siquidem palmeto, & opobalsamo distinguitur: quanquam species huius insignis, ac pretiose arboris plurimum adaucta sit: hac Iustinus. Scripsit Balsami historiam etiam Strabo lib. 16. sua geographiæ, vbi sic habet. Hiericus est campus à montana quadam circumdatus, quæ in theatri speciem ad ipsum declinat: hoc in loco est palmetum palmis abundans spatio stadiorum centum, & totum irriguum, & habitationibus planum, vbi & regia est, & Balsami viridarium. Quæ arbor odorata est, & fruticosa, & cyriso, & terebintho persimili: eius corticem vulnerantes, succum in vasis suscipiunt tenaci lacti persimilem. Sed alibi etiam, quàm in Iudæa nasci balsamum eodem libro idem testatur, præter Plinii, & Solini sententiam, cum inquit. Et apud Sabæos thus, & myrrha, & cinnamomum nascitur: in ora etiam Balsamum, & quadam alia planta valde odorata: hac ille. Oriri etiam Balsamum in Arabia testis est Pausanias in Beoticis, magnitudine fruticis myrti, foliis amaraci, sub cuius vmbra innumera apricantur vipera, & suauissimo eius liquore aluntur. Sed quonam modo sit factum (vt in Syriam peregrinantes vno ore fatentur) quod hoc tempore omnibus sanè Balsami plantis Iudæa sit penitus destituta, cum olim sola Balsami ferax à compluribus crederetur, quid certi dicam, & quibus auctoritatibus id comprobem, sanè non habeo. Verum cum certo sciam probatissimorum virorum testimonio, qui ex Italia soluentes pluries in Aegyptum nauigarunt, in vrbe quam Cairum vocant, Balsami viridarium extare, illud fortasse enenisse putandum est, quod è Iudæa ab Aegypti regibus, quibus vniuersa subiiciebatur Syria, omne in vniuersum Balsamum eò fuerit translatum, quod decoris inde plurimum regia accederet. Quanquam Balsamum in Aegypto quoque prouenire antiquorum monumentis mandatum est, vt ex ipso Dioscoride constat, atque etiam ex Galeno libro primo de antidotis, cap. 4. vbi de melle agit componendis antidotis idoneo. Veruntamen diu est, quod in Italiam, ne in totam dicam Europam, neque lachryma, neque semen, neque lignum, neque cortex importantur, nisi adulterius, & imposturis vitiatum. Ceterum non modo fuit id ætatis nostræ adulterium, sed & antiquorum, vt auctor est Theophrastus, qui hac de Balsamo lib. 9. cap. 6. de historia plantarum posteritatis memoria mandauit. Balsamum in valle Syria prouenit: Theophrasti de Balsamo. hinc duos tantum affirmant, alterum viginti iugerum, alterum multò minorem. Arboris magnitud, quæ malo pu-

a Meum, & Drag. non habent.

b Meū d' d' i. liquor.

c Meum & d' d' i. liquoris.

d Omnia exē. κροτλευ μυσ

e Omnia exē. κροτλευ μυσ

f λυτρίων αρ

g non facit, neque notam.

h i. habens ramos re-nues.

Balsami cōsideratio.

Balsami historia ex Iustino.

Ex Strabone.

Ex Pausania.

Iudæa Balsami plantis destituitur.

Balsamum in Aegypto.

Theophrasti de Balsamo.

nica magna: rami multi: folium ruti simile, candidum tamen, perpetuo vivens: fructus similis terebintho tam magnitudi-
ne, & figura, quam colore. Is quoque admodum odoratus est, & magis quam lachryma. Colligi lachrymam in caudice, &
parte superna tradunt, facta incisura vnguibus ferreis sub hydere, cum aestus maximè angit: collectum verò aestate fieri tota.
Sed quod manat, multum non esse, vix enim toto die concham posse impleri: odorem tamen inferri eximium, & copiosum,
adeo ut ex parvo spatium per longum odor valeat permeare. Verum sincerum ad nos nullum aduehi, sed quod mistum col-
ligitur: plurimis enim mistionibus vitari, quodq; Grecia venditur. Ideoq; Galenus lib. primo de antidotis narrabat, cum

BALSAMI ARBOR.

Xylobalsamum officinarum.



Opobalsa-
mum.

Carpobalsamum officinarum.



Cortex Balsa-
mi ut incida-
tur.

Carpobalsa-
mum non le-
gimum.

non ignoraret, opobalsamum diuersis modis adulterari posse, ita
ut difficulter ementi discerni queat, se proprio oculorum intuitu
cernere voluisse & quomodo cresceret Balsamum, & quomodo
lachrymam mitteret: voluitq; sincera eius lachryma partem ha-
bere, veluti regulam ad dignoscendum alios Balsami liquores, qui
per orbem ab impostoribus vitati circumferebantur. Legitimum
autem opobalsamum notis omnibus comprobatum, vidi tamen
ego apud Imperatorem Ferdinandum Primum, Dominum meum
clementissimum, à Solimano Turcarum Imperatore dono missum,
quibusdam cum nonnullis aliis muneribus. Cui simile omnino mi-
hi visum est illud quod anno superiore detulit ad me Tridentum
Franciscus Calceolarius Veronensis, rei medica admodum peritus:
id ille acceptum referebat Reuerendissimo Danieli Barbaro Ele-
cto Aquileiensi Patriarcha, ad suam parandam Theriacam: itaq;
mirari desinant inuidi, si eam præ ceteris iure optimo laudare-
rim, atque prætulerim. Modus autem incidendi corticis, ut inde li-
quor effluat, apud auctores sanè varius est: quandoquidem Theo-
phrastus, & Dioscorides arborem dixerunt vnguibus ferreis scal-
pi, ut inde vulnerato cortice fluat lachryma. Plinius verò contra,
si ferro incidatur, statim ficcari, atque emori scribit: ob idque qui
opobalsamum colligunt, inquit, vitro, lapide, osseisque cultellis
ad corticem vulnerandum vtuntur, deinde succum lana excipie-
tes in corniculis colligunt. Caterùm cum mecum sæpius cogitauerim
à tot imposturis, que indies fiunt, nos cauere non posse, non alienum fore duximus illud in hominum memoriam reuo-
care, quod si vnquam opobalsamum venale inueniatur (tametsi in Italia per longas atates non amplius ipsum venturum
putem) non ematur, nisi prius de eo omne fiat periculum, quò clarè cognoscatur omnibus iis præstare tum notis, tum facul-
tatibus, que illi ab auctoribus tribuuntur. Ad hæc Balsami fructus, siue semen, quod CARPOBALSAMVM vocant,
ab eo quidem longè differt, quod his temporibus ex Alexandria comportatur. Siquidem optimum legitimumque flauum sit
odoris, quale, quod circumfertur, deprehenditur. Quo fit, ut non aliud suspicandum sit, quam quoddam hoc idem sit semen
hyperico

Hyperico simile, quod etiam Dioscoridis auro à Petra Palestina oppido deferretur. Hoc idem ligno euenit, quod Xylobalsamum vocant officinae Graecos secuta, quippe quod passim in his habetur, potius myrtum, quam Balsamum refert. Corruis non meminit Dioscorides, quamuis dixerit Plinius libro 6 cap. superius citatis, ipsum quoque in usu medentium esse. Balsamum memoriae prodidit Galenus lib. vi. de simplicium medicamentorum facultatibus sic inueniens. Balsamum desecat, & excalfacit secundo excessu. Est autem tenuium partium, adeo ut odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est, quam ipsa planta, non tamen adeo calidus, ut quidam existimant tenuitate partium falsi. Porro fructus eius persimilis genere facultatis est, ceterum longe in subtilitate partium inferior. Placet eidem Galeno (ut in libello de supposititiis medicamentis illi adscripto legitur) ut Balsami vice stacte myrrha, aut oleum, in compositis medicamentis commodè inferi possit: xylobalsami verò loco leucioi radix. Porro quid carpobalsami vice supponendum sit, nullibi apud eundem repperi, tametsi in quodam incerti auctoris libello, quem seplasiarii Quid pro quo nuncupant, pro opobalsamo oleum terebintbinum, vel laurinum, vel gummi hederae subiiciatur, pro carpobalsamo hederae corymbus: & pro xylobalsamo hederae ipsius lignum tantam ille hederae tribuit auctoritatem. Sed alia est opinio nostra: Nam ipse libentius pro opobalsamo oleum myristica nucis, vel styracium supposuerim, quam terebintbinum, vel laurinum: pro xylobalsamo agallochum: & pro carpobalsamo vulgares cubebas. Quod autem Carpobalsami locum cubeba rectè supplere possint, plerique rei medicae studiosi id mecum sentiunt. Sed adda praeterea, quod si ea mandantur, dentibusve conficiantur, mordent gustum, feruentes in ore percipiuntur, & aromatis non modicum respiciunt, quas nimirum qualitates Balsami fructui inesse Dioscorides testatur. Hinc igitur sit ut in hoc à Fuchsi viro alioqui doctissimo planè dissentiamus, namque in libro, quem de compositione medicamentorum nuper auctum edidit, Carpobalsami loco leucioi radicem supponendam censet: eo quidem argumento (ut inquit) quod ita scriptum repererit in eo Galeni libro, cui titulus est de substitutis medicamentis. Verum cum ipse nusquam (quod quidem legerim) in legitimis Galeni libris inuenerim, hunc auctorem, si desit Carpobalsamum, substituere, vel viribus proximam facere leucioi radicem, cui nulla prorsus inest qualitas, neque facultas, quae Carpobalsamo respondeat, non est, cur in hoc Fuchsi probem sententiã. Ceterum assertur iam (ut audio) ex occidentalibus Indijs liquor odoratissimus liquido styraci admodum similis, quem qui deserunt, appellant Balsamum, quod notas nonnullas Balsami praesentat. Veruntamen cum teste Strabone Balsami lachryma lacteo colore sit, crediderim potius nouum liquorem hunc veram esse stactem, vel styracis liquorem, quam Balsami: ob idq; non esse penitus ab re, si quispiam eo Balsami loco vteretur. Quidam recentiores cum se Opobalsamo destitutos conspicerent, illud artificioso quodam non sanè damnando componunt. Faciendi modum sic habeto: ego enim hac ratione pluries ipsum mihi confeci. Sumito resinae terebintbinae, abiegnae, cuiusque libram: thuris albi, ladani, cuiusq; vnc. sex: nardi Indicae drac. duas: radicem pbi, iridis, acori, asari, cyperi, singul. drachmam: mastiches, galanga, caryophyllorum, castia odorata, zedaria, cuiusq; drach. sex: nucum myristicarum vnc. quatuor, macis vnc. vnam: agallochi vnc. duas: gummi elemi vnc. sex: aloes hepatica, myrrha, cuiusque vnc. vnam & semis: castorei drach. decem: osium cariotarum, styracis calamitae pinguis, laferis odorati, sing. vnciam: lachrymae sanguinis draconis succiniam: storum lauendulae vnc. quatuor, olei vnguetariae glandis vnc. sex. Quae ex his atterenda sunt, in puluerem conterito, liquoribusq; admisceto, & vitreo organo (si nescis, Chymistas consulito) diligentissime vi commensurati ignis oleum elicito. Primum enim clarissima tenuissimaq; emanat aqua, tenuissimarum vtrique partium, quae igni adnota modo quodam admirabili flagrat: hac aqua Balsami dicitur. Deinde defluit oleum colore aureo, & substantia inter tenuem, & crassam, quod oleum Balsami vocant. Postremo verò id manat, quod Balsamum vocant, rufo colore. Aqua quae prius fluxit, ventriculi imbecillitate affectos hausta mirum in modum iuuat: siquidem tum pituitam, tum flatum valenter consumit: sed quod acerrima sit, dari sanè per se nequit, nisi vino, aut iure aliquo admista. Liquor deinde, qui secundo stillicidio fluxit, quem quidam ceteris praeserunt, mirifice neruorum vulneribus, compaginum, cruciatibus, conuulsis, resolutis, comitialibusq; succurrit. Vltimè verò oleum hac omnia similiter praestat, verum debilius. Pollent hi liquores & ad alia innumera corporis incommoda, quae breuitati consulentes silentio inuoluenda duximus. Balsamum sic Graeci dicitur, ut Latine etiam Balsamum: Arabicè, Balesem, Bolefma, aut Belsan: Italicè, Balsamo.

Xylobalsam.
Balsami vires ex Galeo.
Succedaneu balsami.
Cubebae pro Carpobalsamo.
Fuchsi opinio improbara de succedaneo Carpobalsami.
Balsamum Indicum nouum.
Balsami factiij conficiendi ratio.
Balsami factiij vires.
Nomina.
Balsamum Iudaicum.
Balsamum Indicum.
Balsamum Americanum.

Balsamum duplex est, naturale & artificiale: naturale aliud veterum, aliud recentiorum: veterum est Iudaicum, de quo Dioscorides, Theophrast. Galenus, Plinius, Pausanias, Strabo, Iustinus multa: arbutu- la foliis ruta proximis, floribus albae violae similibus (ut figura hic ex Prospero Alpino adposita, qui eleganter de eo scripsit, exprimit) fructu Terebintho magnitudine, figura & colore facto ponderoso, gustu in ore feruente: quod in India & Aegypto prouenit. Ex quo tria in usum assumuntur medicum, succus, fructus & lignum arboris. Succus Opobalsamum ex inciso caudicis cortice parte superna sub canicula colligebatur: huius succedaneum Galenus stactem fecit: potest substitui Balsamum Peruvianum, vel in huius quoque defectu, Terebinthi genuini liquor lymphidissimus, cum viribus opobalsamo respondeant: alii sumunt oleum Caryophyllorum: alii oleum nucis moscatae. Fructus Carpobalsamum dicitur, & quod officinae habent adpinximus, quos veros Balsami fructus esse, statuit Alpinus: at quia exoleti & carioli habentur, sunt qui semen Terebinthi, vel Lentisci immaturi, cum horum vires Carpobalsamo respondeant, substituunt: alii nucem moscatam, alii Caryophyllos: Cubebae etiam sed in minori dosi, cum gradu vno caliditatis & siccitatis Balsamum superent, antibalomenon esse possunt. Lignum ipsius Xylobalsamum offic. dicitur, cuius figuram adposuimus, ut apud eos inuenitur: huic fortè Lentisci surculi, modò non carioli sint, sed recentes, nec odore amiserint, succedere possunt, cum ii sint temperie modicè calfacientes & exsiccantes, moderatè quin & astringant & aromatica sint: alii tamè Maceris & Cyperi aequales partes: alii Santalum flauum: alii Cubebas substituunt. Balsamum recentiorum quadruplex est: Indicum, Americanum, nouum ex Hispaniola & Tolutanum. I. Indicum seu occidentale, quod ex occidentali India in Hispaniam adfertur, liquor est arboris Indis Xilo dictae punica malo maioris, foliis vrtice similibus feratis & tenuibus: cuius cortice, qui tenuis est, vulnerato liquor tenax, subalbidus, paucus, quem incolae sibi reseruât, effluit. Sed ex ramis & truncis assulatim & minutim concisis, & cum aqua in lebete deccelis, ubi refrixerit, cochis oleum supernatans colligunt, quod ex nigro rubet, odoris suauiss. gustus acuti & aliquantum amari, cuius libra in Hispania nunc tribus aut quatuor ducatis valet, cum olei vnc. vna decem aut viginti venderetur. Calidum & siccum est gradu secundo: sumitur in corpus, foris illinitur, & chirurgicis remediis permiscetur. Plura apud Nicolaum Monardem lib. de simplic. Indiae Occidentalis. II. Balsamum Americanum, quod ex America, siue noui orbis continente adfertur, seu Peruvianum, liquor est arboris uastae magnitudinis, ad radicem ramosis, dupliciq; cortice, quo vulnerato ex medio spacio alta, lymphidissima, & odoratissima lachryma effluit, cuius gutta libram praedicti per decoctionem collecti, ut autor est

Balsamum ex
Hispaniola.

Balsamum
Tolutanum.

Monardis, præstat. Huius fructus ciceris aut pisi grano non maior, aliquantulum amarus, siliqua angusta digitum longa, alba, tenui, includitur. III. Balsamum nouum, quod ex insula Hispaniola adfertur, succus est plantæ sponte nascentis, arboris magnitudine, ad duorum hominum proceritatem interdum assurgente, caulibus cinereis, foliis supernè viridioribus, acutis, costa per medium diuisis, foliis sex digitorum longis, quatuor cum dimidio latis, pediculis rubescentibus, fructu racemoso longo, acinis rubentibus: ex asparagis & summitatibus, vt etiã racemis, expressus succus in aqua ad medias coquitur ad mellis crassitudinem: quo ad vlcera & vulnera vtuntur, Balsamo efficacius: Plura apud auctore generalis Indiarum historiarum. IV. Tolutanum, quod ex continentis quadam prouincia inter Chartaginem & Nomen Dei sita, Tolu ab Indis appellata, liquor est arboris pumilæ pino similis, ramosa, foliis instar Ceratiæ perpetuo virentibus: cuius cortice inciso, arbori veluti quibusdam cochlearibus, è cera nigra confectis, adnexis, liquor colligitur ex rubro ad aureum tendens, dulcis, odore Limonũ fragrantiam referens, quod præstantius est quod ex noua Hispania adfertur, & ad omnia ad quæ & Balsamum Aegyptium efficax: plura in appendice historiarum Lugdunensis.

Ἀσπλάθος.

ASPALATHVS.



CAP. XIX.

a Meū & Cat.
ξυλῶδες i. li
gnosus.
b Meū μω-
ρε-ῶδες i. vn-
guentarij.
c Meū ὀξεί-
ας i. fordi-
da narium
vlcera.

Aspalathus, aliis erysiceptron, frutex est a surculosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria & Rhodiorum insula: quo ad vnguentorum spissamenta & pigmentarii vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut in purpuram vergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum eius genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet. Vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & c fordida vlcera infunditur: subiectum in pefso, partum extrahit. Aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet: vrinæ difficultatem, inflationesque discutit.

I. ASPALATHVS RHODIVS.

II. ASPALATHVS ROSEVS.



Aspalathi cõ-
sideratio: nõ
esse Santalũ
rubrum.

Ruellius er-
rore notatur
quod Rhodi-
um oleas-
trum, Aspa-
lathum cen-
suerit.
Rhodium ole-
aster.

Aspalathus quidem ex Creta, Rhodo vel Syria ad nos (quod ego sciam) non aduehitur: quare errant (mea quidem sententia) qui putant Santalum rubrum legitimum esse Dioscoridis & antiquorum Aspalathum. Quorum errorem Serapio manifestè prodidit: quandoquidem de santalo agens, nullũ (vt assolet) assertit Dioscoridis testimonium, sed tantum sua gentis auctoritatibus. Quod maximo argumento est, santalum rubrum nihil cum Aspalatho habere cognationis, & præsertim cum plures in eo desiderentur Aspalathi nota. Meminit tamen Serapio Aspalathi sub Arabico nomine Darfisahan, vbi leguntur omnia, quæ de ipso tradidit Dioscorides. Huic alia validior accedit ratio, siquidem Aloisius Cadamustus, Columbus, & Pinzonus in suis nauigationibus ad orientales Indias aliasq; ignotas terras, continuas santalorum recta proceritate sylvas vnanimiter vidisse narrant. Quod longe abest ab Aspalatho, qui frutex humilis est suauiter odoratus, amarulento gustu: quæ in rubro santalo nõ deprehenduntur, rubrũ enim santalum odoratũ non est. Quod si quandoque odoratum sentitur, id (vt optimè norit periti myropola) nõ euenit, quod ex se tale sit, sed quod, dũ vnã cum albo & flauo importatur, quæ odorata sunt, ex illis sibi odorem ascuerit, qui tamen tractu temporis facillè euanescit. Porro Ruellius (ni fallor) medicari censura non vacat, quod pro certo asserat, id legitimum esse aspalathum, quod Rhodium oleastrum nonnulli vocant: quo item quondam agallochi vice utebantur moropolla. Cuius materiam cum & in seplasis, & apud artifices, qui precatorias (vt ita dicam) coronas ad Deipara virginis salutationes torno conficiunt, diligentissimè sim perscrutatus, sane nigra partim, partim verò ex nigro flauoq; venosa mihi sese obrulit: rubram autem, & subrubram (vt Ruellius in-

quit) nusquam me vidisse ingenuè fateri possum. Adde etiãnum, quòd sit (quemadmodum Rhodij narrant) hac planta ex olearum genere Rhodio tractu abundè proueniens, quæ oliuas etiam proferat, sed nec multis spinis horrens, nec detractò cortice rabescens. Quamobrem (vt mea fert opinio) Aspalathus non erit Rhodium oleastrum, quanquam sententia nostra non subscribat Anguillarius. Ille Constantinum Myropolam quendam Rhodium testem adducit, ego Rhodios alios à qui-
 bus de his omnibus diligenter sum percontatus, qui plantam hanc oleastrum, non Aspalathum vocari dicunt. Itaque cum nobis Aspalathus desit, qui tamen facile ex Rhodiorum insula afferi posset, suppleat eius locum viticis semen: sic enim in Galeni succedaneis scriptum reperio. Atqui manifestò hallucinatos esse cum Ruellium ipsum, tum Anguillarium, palàm fatit Aspalathus, quem mihi primus superiori anno dono dedit Franciscus Calceolarius Veronensis, rei plantaria peritissimus, & deinde eiusdem Aspalathi truncus humani brachij crassitudine à Bartholomæo Rolleo Medico, & rei medica peritissimus, & à Constantino Syluestrio pharmacopæo Ariminesi ex Cypro Insula ad me missus: cum huic, qui eiusdem generis est, cum altero à Calceolario misso, nihil penitus desit, quod in legitimo Aspalatho comprobando desiderari possit, & præsertim cum non solum detractò cortice, purpureo colore rufescat, gustu sit amaro, & materia densitate grauis, sed quòd Castoreū non obscure respiciat, vt Plin. inquit lib. duodecimo, ca. vigesimoquarto. Caterum & illud quidē mirū videri debet, (quod Cyprj referunt rei plantaria periti) ex centum Aspalathi plantis, vix reperiri duas, aut tres, quæ odorata habeantur. Porro quoniã non ignoro nō defuturos calūniatores, qui (vt eorū est natura) testimoniū hoc nostrū impugnabunt, Aspalathi huiusce truncū mihi seruo, vt si fortasse eorū aliqui illū videndi, examinandiq; causa ad me concederent, possint suam ipsi accusare proteruitiã, & mentis amarorem abstergere, si fortasse cōtigerit, vt ipsis olfacientibus, ego nasum ligno sursum impulso ita protrudā vt inde sanguis profluat & emergat, ita enim puto, futurū mihi negotiū ad eorum castigandā temeritatem. Meminit Aspalathi Galenus lib. vi. simpl. medic. sic inquit: Aspalathus gustu quidem acris simul & adstringens est: facultate verò ex dissimilibus constat, nempe partibus suis acris excalfaciens, partibus verò aliis, austeris scilicet, refrigerans. Itaque vtriusque ratione desiccatur, & proinde ad putredines, & fluxiones est utilis: hæcenus Galenus. Caterum quòd etiam hi nostri commentary Santala redoleant, posteaquàm antiquiores Græci eorum non meminerunt, de his hic differere non alicnum duximus. SANTALVM itaque in vtraque India syluis densissimis, ingentissimiq; nascitur. Cuius

Anguillata notatur.

Aspalathum verum è Cypro allatum.

Aspalathi vires ex Gal.

Santalorum consideratio & vires.

III. SANTALVM ALBVM & citrinum.

SANTALVM RUBRVM.

Syrium myrtifolium

Carolinensis



tria numerantur genera: quorum præfertur pallidum, secundum locum habet album, postremo rubrum, quòd nullo commendetur odore: priora duo suauiter spirent. Quapropter Mauritanorum sententiam minimè probandam putauerim, qui Santalum tertio ordine frigesacere, siccare verò secundo memoria prodiderunt. Rubrum (vt ipsi asserunt) priuatim defluxiones prohibet: incandescentibus inflammationibus, podagrisq; ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ utiliter illinitur. Candidum ac pallidum, ex rosarum aqua fronti imposta, capitis dolores mulcent. Aduersantur omnia calidis febribus: epota astuanti ventriculo mirificè auxiliantur. Fiunt ex iis, & aqua rosarum epithemata, quæ ventriculo illita eius feruorem in ardentissimis febribus extinguunt. Ad hæc (vt auctor est Auicenna libro de viribus cordis) santalum non modo cordi efficacissimè latitiam asserit, sed & robur non paruum addit: quare his immiscetur medicamentis, quæ cordi, & cordis palpitationi maximam opem præstant. Quod ἀσάλανδος Græcis Latinis item Aspalathus vocatur: Arabibus, Dar-
 fahban: Italis, Aspalatho.

Nomina

Aspalathus dicitur *ασπάλαθος* τὸ μὴ ῥαδίως ἐκ τῆς ἀληθείας ἀποσπάσθαι ἢ τοὶ ἀφαιρεῖσθαι: quod non facile uelli sine eximi queat e corpore eorum, qui in eam impegerunt: quare Plato 10. de Repub. refert Tyranos Aspalathi spinis apud inferos lanari. Hippocrates 2. de nat. mulieb. *μέλαιναν ῥίζαν* radicem nigram cum aliis in vino ad fluxum uteri bibendam exhibet, quam Galenus in lexico Hippocrateo dicit esse radicem Aspalathi aromatici appellari. Plinius meminit li. 12. fruticis Aspalathi, qui sit spinosus, nec ubique odoratus, ubi videtur alterum Dioscoridis Aspalathum intelligere: at lib. 24. meminit spinæ syluestris in Oriente, quo loci videtur Dioscoridis Aspalathum voluisse exprimere. Sed hac de re plenius in vniuersali nostra historia. Vfus erat corticis ex radice, vt ex lib. de Theriaca ad Pisonem cap. 13. & de Theriaca ad Pamphylium in magmate Hedychroo, qui Theriacam Andromachi senioris ingrediuntur, colligere est: requirit enim *ἀσπάλαθος ῥίζη φλοιὸν*: cuius etiam vsus in Trochiscis Cyphi Damocratis, qui Mythridatium ingrediuntur, de quibus Galenus 2. de Antidotis. Quare cum eo destituantur officinae nostræ, de antiballomeno cogitandum. Galenus in succedaneis (modò ipsius sit) Ericas fructuum, aut semen Agni casti substituit: sumi potest aut lignum aloes, aut santalum citrinum odoratissimum, aut agni casti seu viticis semen. II. Rhodius Oleaster, dicitur Rhodium lignum Cord. in Diosc. cui & olea æthyopica videtur. Aspalathi tertia species Penæ & Lugd. quod pro Agallocho sæpè venditur, quare Agallochum & Xyloaloe solida & pöderosa, Cord. hist. cuius duæ species, altera albicat & torulo est cinereo: altera rubet, & hoc Aspalathi 2. genus est Penæ & Lugd. Rhodium lignum rubescens. Cord. in Diosc. Aspalathus roseus, Lobelo in iconibus. III. Sandal Arabes vocant: veteribus Græcis indictum, ex recentioribus Actuariis meminit Arabes imitatus, qui flauum *λίτερον* vocat. Album & pallidum Garzia autore, in his iuglandis magnitudinem attollitur, foliis virentibus lentisci æmulis, flos ex cæruleo nigricans, fructus cerasi magnitudine, viridis, mox niger, insipidus & facile decidens. Arbor inodora, nisi iam detracto cortice exsiccata, odor enim in medulla est, quare id quod multum medullæ & parum ligni habet, præfertur: vtraque arbor ligni tantum colore differt. Santalum pallidum, officinae citrinum vocant, aliisque præfertur quia odoratius, sed minore copia aduehitur: hoc videtur esse santalum Machoziri apud Mesuem, quam vocem Monachi odoriferi reddunt: Cordus citrini speciem odoratissimam quæ rarius cum albo & citrino vulgari adfertur, censet: quare Franciscus Alexander in suo Appolline, quartum santalorum genus esse voluit: aut Garzias existimat dictum Machazari, quasi è Malaca petatum: aut Mazafrani legendum, quod pallidum aut croceo colore infectum sonat. In defectu citrini candidum substituemus, non albi & rubri partes æquales, vt Sepulueda fecit. Censet Cæsalpinus flauum quod habemus, candidi medullam esse. At rubrum (Lotum veterum censuit Cord. in Diosc.) quod decorticatum affertur ligno Brasilio dicto sæpè adulteratur: verum licet vtrumque sit inodorum, attamen santalum rubrum neque dulce est, neque inficere debet. Brasilium & dulce est & inficit: ponderosior quim etiam & solidior santali materia: idco aqua iniectum statim fundum petit. IV. Verum & Brasilii (quod ex Brassilia adferatur) ligni duo genera sunt, alterum ruffum, alterum citrinum: ruffum, aliud ruberrimum, aliud in ruffo candidat. Similitudinem quandam habet cum Acere, crassitudine Guaiaco æquiparatur, fibras rectas habens: hoc tinctoribus ob rubedinem quam decoctione deponit, expetitur. Citrinum verò Bugia vocatur, baculi longi sunt, crassitudine ferè qua manum impleant, rectis etiam fibris, tenues assulæ in aqua decoctæ luteum vel citrinum colorem, quo fullones vtuntur, remittunt.

Sandali historia.

Brasilium duplex.

Bugia.

Bryon.

MVSCVS. CAP. XX

Conclusa nō legit Orib. & Meū addit *μύσκη δριμύτην ἢ ξυρρον* Drag. *μύσκη δριμύτην ἢ ξυρρον* *χρῆσθαι* i. medium in caliditate, & frigiditate. Musci arborum historia. Musci nominibus.



Bryon, [id est, Muscus, à quibusdam splachnon appellatur. In cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur.] Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum & odoratius præstat: nigricans improbat. Adstringendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis vtile. Vnguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur: thymiamatū, acoporumq; compositionibus cōueniens. **G**alenus lib. vi. de simplicium medicamentorum facultate, & post ipsum Paulus non modo Muscum, qui cedri in nascitur, intactum non reliquere, sed præterquam quod populnei, & querni meminerint, de eo etiam mnum, qui in picea arbore abieti cognata oritur, tradiderunt. A qua ipse quidem in vallis Anania montibus supra Tridentum muscum admodum villosum propriis manibus quamplurimes decerpsi, multo sanè odoratiorem pulchrioremq;, quam qui in populo, & quercu prouenit. Nec minus piceo suauiter olet abiegnus, quo in eorundem montium syluis, abietes innumeras adeo villosas, incanasq; mihi videre sapius contigit, vt prima statim facie crediderim villos frondium loco iis in arboribus genitos esse. Sortitur arboreus Muscus varia ac diuersa nomina: quippe & muscus, & bryon, & sphagnos, & splachnon, & hypnon appellatur. Meminit huius Plinius lib. XII. cap. XXIII. sic inquitens. Sphagnos in Cyrenæica prouincia maxime probatur: alij bryon vocant, secundum locum obrinet Cyprius, tertium Phœnicæus. Fertur & in Aegypto nasci: quin & in Gallia nō dubitauerim. Sunt enim hoc nomine cani arborum villi ex annosis plerumq; arboribus dependentes, colore sub albicante ac incano quales in quercu maxime videmus, sed odore præstantes. Laus prima candidissima, atque altissima: secunda rutilis: nulla nigra. Et in insulis, petriug, nati improbantur, omnesq;, quibus palmarū, atque non suus odor inest: hæcenus Plinius. Ceterum in eo genere, quod in Italia prouenit, is & nobilior, & odoratior apparet, qui in larice nascitur: quapropter & viribus fortasse præstantior erit. Nimirum recorder me non parum eo quandoque fuisse oblectatum, dum nocturno tempore quibusdam in montibus super saxo recumberem, ex conquistis plantis defatigatus, vbi larices innumera erant omni ex parte villosi musco incana. Quandoquidem pastores, vt nos veluti re noua & voluptuosa resicerent, quodam paruo ignis lumine hos villos incendebant, qui tanto flagrabant impetu, & crepitu, vt nobis quidem viderentur tormentorum puluerem facile superare. Quippe flamma vna cum ingenti sauillarum copia, in obscura noctis silentio ad astra tolli videbantur, relicto sui odoris oblectamento. Vnde illud existimauerim, quod Galenus, cum bryon in quercubus, & piceis inueniri simpl. medic. citato, ita de eo scriptum reliquit: Bryon, quidam verò splachnon: inuenitur autem in quercubus, & piceis & populis albis. Vim habet adstringentem, inualidam: nec enim multum est frigidum, sed propinquum sermè medijs: quia viles secuta vsneam vocant: inter quos Serapio epotum vinum retulit, in quo diebus aliquot vsnea maduerit, altū somnum dolores à calore exortos mirifice mulcet. Sanguinem è vulneribus manantem compescit impositus arteque adalligatus. Expetitur quercubus, laricem, ac etiam abiegnus vnguentarijs ad pulueres odoratos parandos, quos Cyprius vocant Adhes

Lariceus muscino nobilio r.

Musci arbori vites ex Gal. & Arabibus. Vinea.

I. MUSCVS ARBOREVS.

II. MUSCVS TERRESTRIS.



30 Ad hoc Muscus (ut Auicenna inquit) utiliter inter cordis medicamenta inseritur, quod odoris fragrantia animi defectus inuict. Est & planta, cuius superius in celtica nardo meminimus, quam recentiorum quidam TERRESTREM MUSCVM appellant. Hac longas viticulas vbiq; oblongis numerosissimisq; foliulis circumuestitas, funiculi instar habet, quae saepe ad septem, octoq; vlnarum longitudinem protenduntur, compluribus vtrinque adnatis ramulis, pariter foliulis circumseptis, vt picea arboris summitates. Totam plantam tactu sicca est, & subaspera, colore ex viridi pallescente. Serpit humi, & inter saxa musco scatentia, nititurq; radicibus plurimis capillaribus ex ipsis viticulis prodeuntibus vt in hedera. Emittit Iunio mense, in ramusculorum summitate iulos corylaceis ferè similes, subflauo colore. Nascitur in syluis sabulosis, & inuiis locis, & praesertim inter muscosos lapides. Hanc plantam pro celtica nardo, adhuc aliqui vsurpant Myropola, qui vulgares sequuntur errores. Praestat tota planta ad calculosos affectus: nam si vino albo incoquatur, eo epoto, renum calculi franguntur, pellunturq; certissimo experimento. Idem contusus, & deinde ex aqua decoctus, inflammationes, & calidos dolores admotus mulcet, ob idq; hoc auxilium à multis usurpatur ad podagram à calore prouenientem. In vinum pendulum impositus breui restituit illud. Sed quoniam arboreus muscus odoratissimum Moschon mihi in memoriam redegit, qui ab oriente & occidente, quibusdam pilosis viticulis conclusus defertur, etsi Dioscoridis Galeniq; eam hunc silentio praeterierit, nos tamen haud quaquam dissimulanda putauimus, quae ad hanc rem pertinere arbitramur. Siquidem hi nostri commentarii merito de me conqueri potuissent, si eos tanta odoris suauitate destitutos reliquissim, praesertim cum omnibus palam sit vbiq; terrarum Moschi inter pretiosa odoramenta primam sibi comparasse sedem. Quippe non modo collo, auribusq; suspensus, vestimentis interpositus, chirothecis illitus, crumenis conclusus, ore retentus, & barba & superciliis inunctus defertur Moschus, quo alarum, nariumq; tedia, sudoris graucolentia, & insuauis corporis halitus occulantur, lasciuie oblectameta augeantur, molliorq; politia fiat: sed etiam vt odoris suauitate Deiparam virginem conciliens, ne dicam, vt hac fucata hypocriti lasciuiam dissimulent (eò enim vanitatis peruentum est) Moschum ipsum in orbiculos componunt, quibus funiculo traiectis angelicas salutationes in caelum eructant: omnia denique, quibus miscetur Moschus sua odoris iucunditate commendat. Quod si haec lucubrantes eo fortè caruissent, verendum quidem erat, ne cum illis gratiam iniissent, qui mira vndique odoramentorum fragrantia redolent. Quamobrem vt & ii sibi vnguenta granium praestantissima, odoratissimaq; comparare valeant, Moschi primum, deinde verò liquoris Zibetti vocati, & Ambri denique historiæ, & facultates describam. MOSCHVS itaque (vt Ruellius ex Actio, transcribit, si tamen ea Aetii legitime sunt, cum potius Simeonis Sethi esse videantur) plura habet genera. Praesertur qui in municipio quodam nascitur, quod magis, quam Choras civitas ad orientem vergit: hoc barbaro nomine Pat dicitur, colore subflauo. Secundam sibi sedem arrogat, qui ab India defertur, priori bonitate cedens, colore subnigro. Eo infirmior censetur qui à Sinarum agro mittitur. At Moschus omnis in umbilico cuiusdam animalis gignitur, quod caprea simile est, vnico armatum cornu, praegrandi corpore. Haic cum in venerem agitur, furoris vehementia umbilicus intumescit, fitq; vomica praegnans congesto inibi crassiore sanguine: quo tempore & pabulo, & potu ferum animal abstinet, humique crebro voluitur: qua versatione umbilicum lutofo, saculentog; sanguine turgentem exprimit. Ceterum emissa sanies post aliquod tempus sibi magnam odoris suauitatem adsciscit. De Moscho inter Arabes scripsit diligenter accurateq; Serapio, his verbis. Animalia capreis non ab similia, quae Moschum gignunt, in Tumbascorum, & Sinarum agro potissimum habentur, loca inuicem contermina. Tumbascinus Sinico longe praestantior est, quod caprea Moschum gignentes & nardum, & alias odoratissimas plantas depascantur, quod Sinus non euenit: nam etsi haec quoque odoratis vescantur herbis, ea tamen odoris & facultatis praestantia, nardum, & ceteras Tumbasci plantas non aequant. Quinetiam in causa est demetendi ratio: quippe Tumbascini è vomica folliculo

Musci terrestris consideratio.


Musci terrestris vires.

Moschi odorati historia ex Ruellio.

Serapio de Moscho.

sanem nunquam eruant, quo adulteria permisceant, & non nisi sereno caelo sincerum legunt. Sinici vero vomica viticulum exprimunt, & exclusa sanie imposturas quasdam admiscunt, nubilo parumque aridente caelo, & alabastris recondunt. Is ceteris praestat, qui maiore odoris fragrantia redolet, & qui e vomica maxime matura eruitur. Sunt & inter haec animalia, quae ab aliis Moschum ferentibus nullo discrimine differunt, praeterquam caninis vocatus dentibus: quippe haec verrius modo exertos palmi longitudine dentes habent, & pariter Moschum praestantissimum gignunt. Moschus praeterea tetra, & insuavi odore displicet, verum venatores immaturi folliculos excutientes, tantisper eum libero aere suspendunt, dum abacto prorsus fœtore maturuerit: is enim aëris coctione perfecta, miram sibi conciliat odoris suauitatem. Verumtamen precipuus habetur, qui suapte natura in animalis vtriculo sibi maturitatem comparauerit. Hunc incola per saxa metunt, & arborum truncos, namque animal cum vomica maturam esse praesentit, & saxis & truncis sese magno oblectamento affricat, donec facta vomica emissario tota saniei vis effundatur. Hic ceteros sanie antecellit, tantquam solis coctione, & calis benignitate maturitatem ultimam consecutus. Hunc itaque Moschum inde venatores colligentes eorum animalium vtriculo afferunt, quae alias venatione captauerant: isque ille Moschus est, quo reges & donantur, & vtuntur. Moschus excaesat ordine secundo, siccatur vero tertio. Cor frigidum, ac tremulum roborat, & omnibus ipsius afflictiis opem praestat potius, atque illius. Detergit tenues oculorum albugines, & humiditas defluxiones exiccat: cerebrum roborat, & diurnum capitis dolorem mulcet, si tamen pituita redundantiâ proueniat. Coles ex eo cicino oleo macerato perunctus, promptius in venerem excitatur. Fit e Moscho confectio suavis in exiguas particulas digesta, quam Itali appellant Moschardini, hoc modo. Fragacantha gummi vncia, vna cum sanguinis draconis lachryma binis drachmâ, stillaritia aqua rosarum, duobus diebus maceratur, deinde in mortarium coniciuntur: his adduntur sacchari albissimi drachmae sex, amyli drachmae quinque, moschi ex aqua rosarum dissoluti scrupulus: atteruntur deinde pistillo quousque simul misceantur, postremo digeruntur in particulas hordei granis haud maiores, & siccantur in umbra. Praestat ad oris graueolentiam, si vna, aut altera portio in ore contineatur. Probat nonnulli an Moschus legitimus sit, hoc modo. Pons librae examinatum in labellum humore perfusum immittunt, tum paulo post iterum equa lente ponderant, quod si superferatur, sincerum & legitimum existimant: sin cedat, spurium, & adulteratum putant. Hinc simile aliud quoddam habemus, sed praeterquam quod nigrum in modum oleat, primo statim occurso odoris vehementia nares admodum ferit: hoc vulgari sermone vocamus ZIBETTO, vnguentariis maxime expetitur ad ea odoramenta componenda, quae proprie misturas appellant. Gignitur id in exteriori testiculorum vtriculo cuiusdam animalis, feli, qui veteribus adificiorum ruinis oberrat, non absimilis. Catos haec animalia vocant, quos saepius Venetiis vidi ex Syria delatos. Est autem Zibettum tanquam sudor inter huiusce animalis testiculos concrevens, calida, humidaque facultatis. Id in uernula umbilici impostum vuluae strangulationibus mirifice prodest: proinde nec mirum est, si eo viri peni circumdoto magnum mulieribus in coitu afferant solatium. Adulteratur Zibettum ab impostoribus felle bubulo antiquo, 30

ANIMAL ZIBETTI.



Ambari hi- alio, aqua rosarum, caryophyllis, & Moscho, sed fraus gustatu facile deprehenditur. Porro ex quo AMBARVM aliud
notia. odoramenti genus gignatur, quod nos vulgò vocamus Ambracane, variis variè opinantur. Alii namque tradunt ipsum in
maris alueo, non secus atque in terra fungos oriri, ac deinde sauientibus procellis, e profundo elici, & in litus expui. Non-
nulli vero referunt piscem Azelum nomine, Ambarum hoc anidissime prosequi, cuius esu necem sibi statim consciscere:
quod cum sciant piscatores huius rei periti piscem hunc mortuum, vndisque fluctuantem coniectis vnicuique & funibus extra-
hant, & Ambarum scisso animalis ventre eruant. Quod vero (vt perhibent) proximè dorsum spinam inuenitur, id ma-
ximè praesertur alio. Quidam praeterea in fontibus quibusdam Ambarum natate scribant, qui bituminis modo illude-
ructant. Huius sententia e recentioribus Graecis inuenio Simeonem Sethi, qui Ambarum describit his verbis. Ambar
quod & Ambar appellatur, in diuersis locis scaturit: sunt enim eius fontes vt bituminis, & sulphuris, & rerum similitum.
Tria Ambari faciunt genera: praesertur colore fuluum e: elachito India petitur. Aliud subalbidum, quod e Sinchrio fe-
licis Arabia oppido aduehitur. Tertium atrum, & ceteris viribus imbecillius. Excaesat Ambarum, & siccatur: cerebrum,
& cor olfactu roborat. Senibus, & natura frigidis opem mirifice praestat: quare iisdem potius, quam inuenibus chirothe-
ca Ambaro imbuta concedi deberent. Vno infusum temulentos efficit. Ceterum ex antedictis quae sit Ambari historia
vt verior accipienda, non equidem ausum decernere, quod nihil adhuc certi atque explorari habeam. Neque etiam libet
subscribere sententia Fuchsi, quamuis viri eruditissimi: qui in libro de componendis medicamentis, quem vltimo loco au-
ctum edidit, Ambarum nostri vsus factitium esse censet, atque legitimum Ambarum, de quo scripserunt Mauriani, quae-
que ipse succini generi adscribit, desiderari. Siquidem non video, quibus rationibus, vel auctororum testimoniis hanc suam
comprobet sententiam. Muscus arboreus βύσσιον, ἢ ἀπλάγιον Graecis appellatur: Muscus, Latinis: Axnech, aut V sinee, Arabi-
bus: Mosco, Italis: Müsch, Germanis: Bohemis, Mech & Polonis. Muscus terrestris: Italis, Mosco terrestris: Germanis, Beet-
lag. At Moschus odoratus μόσχος Graecis recentioribus nominatur: Moschus, Latinis: Misch, seu Mese, Arabibus: Muschio,
Italis. Byssem, Germanis: Pützmo, Bohemis. Ambarum autem vocant Itali Ambra: Germani Amber: Bohemi Ambora
Hispani Ambar.

Musci vox quæcumque villosam canitiem annosis caudicibus, aut saxi madidis, aut aquis palustribus aut maritimis adnascens significat: idem quod Græcis βύον: Arabibus, Vinea: Sphagnum & Hippocrius, Sphagnon Plinio. Triplex est, arboreus, terrestris, & maritimus: hic de arboreo, quia aliquando odoratus est, cuius nomine primas tenet, & a Galeno βύον ἀρωματικόν dicitur, eo quod antiquitas crebro in odoratis unguentis & suffragibus vsa sit, ut is qui è cedro, robore, pinu, picea, abiete, & larice dependet, quem priuatim Splachnon vocant: aliquando inodorus, ut est populi, vlni, betulae, pomi, pyri & aliarum arborum. Omnium ferè color viridis, vel albicans, quibusdam fulcior, nonnullis flauescens, aliis subrubens, rarissimè niger: sic alter tenuior, crassior alter: quidam breuior, alter proluxior: vilissimus qui ex quercu dependet. Imitatur autem muscus naturam parentis & loci natalitii. Muscum & Muscum arboreum communiter herbarii nominant. II. Muscus hic in quartum librum fuit reiciendus, qui dicitur Muscus terrestris, Trago. Lon. Cast. Dod. Lugd. Permonaria, Anguil, Lycopodium seu pes lupi, officinis quibusdam. spica celtica magno errore, Dod. Gal. Muscus clauatus, Lob. Muscus vrsinus, Ges. in fracto. Musci genus, Carl. Lycopodium, Tab. Selaginis species altera & Muscus reptilis, Thal. Chamæpeuce, scholiasti Cordi.

Ἄγαλλοχον

AGALLOCHVM CAP. XXI

A GALLOCHVM lignum est, quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens cum quadam amaritudine: a cute verius quam cortice vestitur, aliquantum versicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia: b sudores arceat toto corpori inspersum: pro thure ad suffragia substituitur. Radix epota drachmæ vnus pondere, humida stomachi vitia, & imbecillitatem, feruoremque mulcet: si lateris, iocinorisue dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

a Ita leg. Cas
rac. & Drag.
sed meum
βύον.
sed vereor ne
falso.
bγαλ
μα δὲ ἄλλο
χον
ἐπιμαρτυροῦν
i. ficcum tri-
tumque in-
spersum toti
corpori.
Agallochi
consideratio.

LIGNVM ALOES.



A Gallochum a Græcis, & Latinis recentioribus, sicuti ab Aptris, Lignum aloes appellatur. Optimum à Lusitania è Calecut India emporio ad nos conuehitur. Etsi etiam Venetias hac ætate ex Alexandria Aegypti præstantissimum afferatur: siquidem igni accensum suavissimum, ac periculandum spirat odorem. Nec ob id putandum hoc illegitimum esse, quod βύον id est punctis maculatum nō sit: quoniam Oribasius non legit βύον βύον μεν ἔρ εὐωδῆς, id est: Est igitur odoratum &c. Quemadmodum nec id etiam legit Serapio, qui nec punctorum, nec maculatum meminit: sicuti nec Paulus. Ceterum non diu est, quod legitimum importari cepit: nam licet antea quibusdam non deesset Agallochum verum, nihilominus, quod rarissimum esset, officina ferè omnes eius loco, ut superius diximus, oleastrum Rhodium suppeditebant: quem falso existimavit Ruellius asphaltum esse. Nascitur Agallochum (ut Lusitani per meridiem in orientem nauigantes testantur) in insula Taprobana, alijsq; consinibus locis, cuius integros truncos in Lusitaniam, & Hispaniam iudem secum attulere, qui non modo incensi, sed manuum tantum attritu suaviter (ut aiunt) redolent. Porro vbique pretiosum Agallochum est: nam & in locis, ubi nascitur, plurimi penditur. Verum Agallochum, quod tantopere præstet, hætenus mihi videre nō licuit. Sunt, qui somniantes dixerint, Agallochi arborem vidisse neminem, cum terrestri tantum paradiso proueniat: illudque ferri fabulantur fluminibus, quæ (ut sacra testantur monumenta) ex eo manant. At qui pro comperto habetur (ut patet innuit Serapio) Gangem India amplissimum fluium quam plurima secum Agallochi fragmina vehere, quæ tamen in ipsum duruntur aliorum fluminum cursu, qui in eum confluunt. Quippe cum fluii transfluant loca, ubi Agallochum prouenit, aquarum inundationibus turgentibus, huius truncos, fragmina, ac ramenta rapiunt vnà cum alijs

Agalloch. fa-
bulosa op-
tio.

uarii generis lignis, & in Gangem transferunt, quemadmodum in nostris etiam fluminibus sæpe ac sæpius visitur. Cuius rei indicium affert illud, quod Venetis venditur, utpote quod longo aquarum discursu omni ex parte laceratum, exesum, comminutumq; spectetur. Quamobrem mirum non est, si dum manibus tractatur, id odoris nō præstet, quo illud fragrare prædicant ex natali solo in Lusitaniam aduectum. Eius plura numerantur genera, si Serapioni fides est adhibenda, qui ex Abohanisa Arabe ita transcribit. Dicunt Agallochum in Arabia nunquam oriri, tamen si quadam ibi crescat planta Neug vocata, quæ quadantenus Agallochum refert. Veram præstantissimum India mittit: & quamuis hoc genere differat (plura enim Indis Agallochi sunt genera) id tamen quod viribus cætera præcellit per excellentiam Indum peculiariter vocant, quemadmodum nigra myrobalana, quod cæteris præstent, Inda pariter appellant. Indum in quadam India insula inuenitur, quæ Fimua nominatur. Selectissimum est nigrum, quod varium ostendit colorem,

Agallochi
historia, et
Serapione

facti

succi plenum, ponderosum, duritie compactum, crassum, non albicans, & quod accensum agerrimè flagret. Secunda bonitatis est Mondunum à Mondel India vrbe denominatum. Tertium est Seisicum, quod non obscura bonitatis praesumitur, quod sua praestanti vi, ac grauedine in aqua coniectum, non innatet, sed statim subsidat: porro ex hoc genere id magis praestat, quod crassum est, & plurimo humore pragnans. Postremam sedem habet Alcumericum Seisico bonitate cedens: tamen si Alcumeri non longius à Seisi distet, quam itinere triduo. Praestat in Alcumerici genere nigrum nulla albedine varium, graue, ignis flammis diu resistens, verum tamen viribus Seisico infirmius est. Item ex auctoritate Cbealfetebeii idem ita scribit. Ferunt praeterea, quod incola Agallochum statim ab arbore dissectum integro anno sepeliunt, vt ita terra obrutum marcescat cortex, lignumq; tantum purum remaneat, adeò, vt è ligno nihil erodatur. Ferunt in super illis in regionibus collabentes ex Agallochi arboribus ramos, raptos à fluminum inundationibus per circumstantes regiones deferri. **Ex Simeone Sethi.** hac et apio. Cui subscribit è recentioribus Graecis Simeon ethi, causam etiam reddens, cur annua sepultura dissectum Agallochum recondatur, cum inquit. Non alia odoratiùs futurum existimant, nisi prius marcorem aliquem & teredinem senserit: proinde harum regionum incola dissectum sub terra condunt, suoq; tempore eximunt, & negotiatoribus vendunt. Nicolaus Myrepticus sapius in suis componendis medicamentis Agallochi crudi meminit, vbi Fuchsius prima de antidotis sectione, sic adnotauit. Sape Agallochi crudi mentionem facit Nicolaus, ideoq; hoc loco, qua nostra de illo sit sententia, exponemus. Per crudum itaque lignum intelligo, quod non putruit: nam (vt testis est Simeon Sethi) eius regionis, in qua prouenit, incola id ipsum concidunt, & sub terra multo puluere obruunt, & post aliquod temporis spatium, quantum scilicet sufficere videtur, ligni partes educunt, & mercatoribus vendunt: crudum itaque erit, quod terra non obruitur, sed statim ab arbore excisum ad usum rapitur: hac Fuchsi sententia. A quo tamen nos pace sua, dissentimus, nam si in componendis medicamentis praestantiora simplicia semper exposcimus, sitq; Agallochum illud praestantius, odoratiùs, (vt etiam Simeon ille refert) quod terra, vel puluere fuerit sepultum, non video, cur potius in sepultum, & statim ab ipsa arbore excisum (id enim ob locorum distantiam recens habere nequimus) crudum vocauerit Nicolaus, praestantiùs, existimauerit. Puluere enim vel terra conditum coqui non potest, quod nullus ibi sit ignis, neque calor, sed potius recrementicia humiditate exui, qua fortasse odorem eius obtundit. Verum crediderim potius, per crudum Agallochum Nicolao illud designari, quod non fuerit antea elixum: quod inde fortassis odoratissima lauacra ex Agallochi decocto sibi conficiant Indi, aliaq; odoramenta in regales praeparant vsus, vt etiam cum rhabarbaro fieri narrant. Vel forte per crudum illud intelligit Nicolaus, quod impetu fluminum, longoq; eorum ductu per regiones non defertur: in his namque calorificis regionibus aequè à solibus non obscure calefacta non modo illud omni ex parte diluunt, sed etiam elixant. Illud praeterea addiderim, quod cum non modo crudum, sed etiam bonum addiderit Nicolaus, nullum aliud expetere videtur, quam quod sepultum praestantissimum euaserit. Caterum Agallochi omne genus excalfacit, & exiccat ordine secundo. Facit, vt Auicenna scribit, ad cordis affectus: ob idq; inter ea medicamenta, qua cordi praesidio sunt, Agallochum recensuit. Huius non reperio meminisse Galenum alibi, quam in succedaneis, vbi centaureum supplet pro Agallocho. Lignum, quod Graecis ἀγάλλοχον Latini similiter Agallochum dicunt. Verum recentioribus Graecis ζυλάλον nominatur, vt officinis Lignum aloes: Mauritania, Hoad, Agabian, Agalugin, aut Agalugen: Italis, Agallocho, & Legno aloes: Germanis, Aloes Holz / seu Creus Holz: Hispanis, Lin aloes.

A Gallochum ex recentioribus Graecis primus Aetius, (quem sequuntur Actuarius & Simeon Sethi) Xyloaloen, forte à nonnulla similitudine coloris aloes appellauit: vnde officinis lignum aloes, vt & Lon. Cas. Tab. & Lignum Paradyfi, quibusdam lignum aquilae, vel S. Crucis: at Cord. in Diosc. Lac. Lob. Cast. Lugd. Agallochus. Videntur & veterum nonnulli per Aloem, Agallochum intellexisse. Nam diapsama illud quo lectulum suum odoris gratia, conspererat muliercula, de qua apud Salomonem legitur, Myrrham, Aloem & Cinamomum recipit, quo loco minimè succus ille herbae Aloes intelligendus, cum inter odorata non referatur. Est enim Agallochum arboris oleae instar, fructu piperis modo rotundo & rubente, ligno thuiæ simili, maculato, odorato, quod cortice crasso, aliquantulum versicolore, vestitur: cuius licet Serapio plura genera, Sethi differentias decem, Ruellius quatuor, Ludouicus Romanus triplicem arborem faciat, duo constituimus summa genera, aliud legitimum, aliud syluestre: legitimum aliud solidum & ponderosum, nimirum Agallochum: aliud fissile, leue & aromaticum, quod Tarrum dicendum. Sed de duplici Taro videatur Cordus in sua historia.

Νάρκαθορ.

NARCAPHTHVM: CAP. XXII.

N Arcaphthum ex India defertur, corticosum, simile a sycomori libro: quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis. Constrictionibus vuluae suffitu prodest.

T Am breuiter, tamq; parca de Narcaphtho scripsit Dioscorides, vt nimirum mihi perdifficile sit explicare, quidnam hac etate ad nos ex India afferatur, quod legitimum Narcaphthum referat. Eoq; magis quod nihil de hoc (quod equidem sciam) Theophrastus, & Plinius suis monumentis posteritatis memoriae prodiderunt. Attamen non desunt indicia, qua praesentant (si modo ad nos deferatur) id omnino esse Narcaphthum, quod vulgò officinae vocant Tigname: nam Tigname non aliud integrat, quam thymiana apud Graecos, quod apud Latinos suffimentum significat. Proinde cum huius in suffimentis frequentissimus sit vsus, nil mirum si nouum ex vsu sibi vendicauerit nomen, quod est thymiana. Id quod corrumpentes posteritatis tigname pro thymiamate dixerit. Ad hac (vt Dioscorides inquit) iucundi odoris gratia per se suffitur, ac etiam alijs suffimentis inseritur. Quod in Tigname facile probatur: quippe id tantum vsu venit in compositis odoramentis, qua ad suffiendum parantur, ita vt praeterquam quod per se id muneris praestet, rara quoque sicut suffimentorum compositiones, qua ipsum non recipiant. Quare admirari sinamus, si relicto proprio sua arboris nomine, sibi ascriptam nomenclaturam ex suffimentis usurpauerit. Serapio Narcaphthum Lasabaten vocat: & illud odorati calami vice supponi posse autumat. Νάρκαθορ Graecè, sicut Narcaphthum Latine appellatur: Arabicè, Nabach, siue Lasabaten: Italicè, Agallocho, atque etiam Tigname, veluti seplasiarum vulgo.

C Vm nec Theophrastus, nec Plinius Narcaphthi, seu Nascaphthi, vt multa exemplaria habent, vt & ipse Aegineta legit, meminerit, sed solus Dioscorides cum Aegineta, & quidem adeò succincte, dubium est, an legitimum hoc sit caput, maximè cum Marcellus in antiquissimo & probatissimo codice

dicē non legi testetur: imò & antiquiora exemplaria, quæ hoc caput habent, in eius tamen lectione variant. Ast Hermolaus censet consultò à Plinio Nascaphthum prætermisum, quia eius natura incerta sit & nomine tantum orbi nostro cognitum: idem ex Hermolao, Ruellius refert.


Κάγκαμος.

CANCA M V M

CAP. XXIII.

CANCA M V M Arabici ligni lachryma est, myrrha quodammodo similis, virosi gustus, quam ad suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cum aqua multa pellit: oculorum cicatrices confestim emendat: vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus: aduersus gingiuas humore prægnantes, doloresque dentium, non aliud efficacius.

LACCA



Cancamum, quod notis omnibus Dioscoridis historiam referat (vt recentiorum fere omnium medica materia studiosorum fert opinio) nec ex Arabia, nec aliunde ad nos aduehitur. Quidam tamen pro Cancamo gummi quoddam rufum, ac pellucens ostendunt, quod surculos incognita arboris vndiq; circumuestit, myrrha quadantenus simile. Veruntamen quod nulla (vt Dioscorides inquit) in eo manso saporis virositas deprehendatur, alii id potius mentiri, quam esse legitimum Cancamum volunt. Expetitur hoc gummi genus hoc tempore maxime insectoribus ad inficienda serica stammina, idq; vulgari sermone quidam in Italia appellant Lacca, quidam diminute Lacchetta. Cuius duo habetur genera, quantum (vt opinor) bonitate differunt. Præstantius vulgò appellant Lacca sumetri: quod verò deterius est, Lacca comberti cognomentis fortasse à locis Arabum à quib; deferuntur, acceptò. Primum sarculis perpetuo obualutum visitur: alterum absq; sarculis in glebas concretum myrrha modo, quod etiam viliori pretio vendunt. Hinc itaque factum est, vt crediderint illi Serapionis auctoritate freti, hoc legitimum esse Cancamum, nempe quod is Cancamum Laccam appellet, & quod arboris sit gummi, vel lachryma myrrham quadantenus referent: quodq; etiam eius meminerit Serapio, postquam de Dioscori-

Cancami consideratio.

Lacca Arabi opinio variat.

Lacca vires & lotio.

Lacca tinctorum est & Arabum, differens à Cancamo.

Cancamum & lacca quòd idē sint, probatur.

Lacca facti- tuz genera. NATINA

di & Pauli Cancamo egit, his verbis. LACCA (vt inquit Isac amran) res quadam est rubea, qua tenuibus lignorum surculis inhaeret, sapore non ingrato. Coquitur hac, & inficiuntur inde panni rubeo colore, quam insecturam thermes appellant: quod verò post insecturam subsidet, & insectoribus remanet, pariter Laccam vocant. Ceterum Lacca ex Armenia defertur, exiccans & excalfaciens ordine secundo. Ventriculum & iecur roborat, eorumq; infarctus expedit, ictericos iuuat, & aquas pellit. Eluitur ad medicamenta hac ratione. Ramuli, qui hoc ferant gummi, diligenter franguntur, ac subinde aqua perfunduntur, in qua odoratus iuncus aristolochiaq; inferbuerint: deinde pistillo agitantur: cum autem ab agitatione resederint, aqua leuiter abicitur, quod si vna tantum lotione non pelluceat, secundo item repurgetur, demum sicetur in umbra, & recondatur in vase vitreo: hac Serapio. Quibus palam est, gummi, quod insectoribus vulgò Lacca dicitur, Laccam esse Arabum, & à Græcorum Cancamo differre: quod Dioscoridi Cancamum lachryma sit Arabica arboris, virosi gustus: Serapioni verò res quadam rubea, ex Armenia, non ex Arabia allata, tenuibus lignorum surculis inhaerens, sapore non ingrato. Item Dioscoridi Cancamum obesos extenuat, lienosos iuuat, suspiriosis & comitialibus prodest, menses pellit, oculorum cicatrices delet, & hebetudinem curat, tumentes gingiuas cohibet, & dentium dolores tollit. Serapioni autem tantum obstructions aperit, viscera imbecilla roborat, iecoris dolores mulcet, & regium morbum, & hydropem sanat: qua omnia medicamentorum diuersitatem præ se ferunt. Quo fit, vt non ab re existimaauerint peritiores medici, nos omnino Dioscoridis Cancamo esse destitutos. Veruntamen non desunt rationes, nec probatissimorum auctorum testimonia, quibus etiam probari possit, Græcorum Cancamum, & Arabum Laccam idem esse. Nam etsi hæc, quæ allata sunt, omni ex parte vera videantur, si quis tamen Dioscoridis codicem hoc capite scâtere mendis animaduernerit, & rem omnem accuratius, diligentiusque perpenderit, certior fortasse fiet, nos Cancamo non omnino destitui. Ego enim cum Paulum, qui in omni simplicium censu omnia ex Dioscoride transcripsit, accuratius perlegerem, inuenissenq; illi Cancamum lachrymam esse Arabica arboris, myrrha similem, odore grato, & quod nullius virosi gustus meminerit, illuc orta est suspicio, quod ea particula Dioscoridi illegitimè accesserit. Auxit deinde suspensionem hanc Serapio: quippe qui capite de Lacca de Cancamo agens, dum (vt assolet) ex Dioscoride transcribit, nusquam huius particula mentionem fecerit: quod fortasse Dioscoridis codex, à quo transcripsit, hac menda facile vacarit. Sed illud adhuc magis rem ita se habere mihi persuasit, quod primum legatur in Dioscoride, Cancamum virosi esse gustus, quod fætoris, non suauolentia indicium est: mox cum styrace, & myrrha ad suffiendas vestes expeti, vt grato commendentur odore: quæ vt inter se maxime repugnant, ita etiam deprauata lectionis præbent suspensionem. His itaque rationibus, & auctoritatibus non ab re adductus esse videor, vt quasi crediderim Dioscoridis codicem hoc in loco vitiatum fuisse: vnde postea factum sit, vt eius Cancamum ab Arabico diuersum sese ostenderit. Neque sanè huic opinioni illud obstare videtur, quod plura in morbis curandis Cancamo assignauerit Dioscorides, quam Serapio: siquidem nulli dubium est, quia ea medicamenta, quæ obesos extenuant, lienosos iuuant, & menses cient, possint pariter ventriculum & iecur roborare, eorumque infarctus expedit, & cutem subeuntes aquas, & felle suffusos sanare. Hac autem silentio inuoluenda non duximus, non vt nostra hac probetur, vel improbetur opinio, sed vt alius veritatis inuestiganda pateat aditus. Sunt etiam factitia Lacca plura genera, quæ ex diuersarum insectorum sedimento pictoribus tantum parantur. Alia namque conficitur ex pimpinella bacca, quam vulgò vocant Cremese, & Cremesino: ex insectorio cocco alia: alia ex

Chermesinū
quid fiet.

Fuchsi opi-
nio improba-
ta, chermes
laccam existi-
mantis.
Pharmaco-
polarum er-
ror in dialac-
ca.
Monachorū
lapsus, sangui-
nem draco-
nis, Cancamū
substituenti-
um.

Nomina.

nativa Serapionis lacca: alia denique ex ligno, quod brasiliū vocant, omnium deterrima: quarum nulla ad medicamen-
ta admittitur. Non tamen desunt, qui credant, chermesinum insectoribus vocatum esse arboris gummi: imò illud idem,
quod Serapio, auctore Isaac, rem rubeam (vt paulò ante diximus) esse ait, quæ tenuibus lignorum surculis inhaereat, & quod
ea inficiantur panni rubeo colore, quem chermes appellant, quando quidem huius sententia reperio fuisse Fuchsiū. Sed meo
iudicio non exactè rem explorasse videtur, quippe chermesinum, quo puniceo, & purpureo colore serica stamina inficiun-
tur, est (vt Itali optimè norunt) pilula, vel bacca exigua pimpinella radicibus in orientabilibus regionibus adnascens, non
autem gummi, vel roscidum, vel aliud per se manans, ab eo perquam longè diuersum. Siquidem hoc nihil aliud est, quam
nativa Serapionis lacca, quam propriè Itali vocant vulgò lacca & lacchetta, insectoribus tantum expetita iis inficiendis
sericis, quæ viliori veneunt pretio. Nec obstat, quod dixerit Serapio, quem hic secutus est Fuchsius, huiusce lacca insecturam
vocari chermes: quippe proprio capite de chermes, nil sanè aliud per chermes intelligit, quam coccum insectorium Diosco-
ridis: quo fit, vt existimauerim in eo capite de lacca omnino subesse mendum, vel auctoris, vel interpretis: & fortè melior
hac esset lectio. Coquitur hac, & inficiuntur inde panni rubeo colore, aded vt coccinei videantur: vel aded vt iis similes sint,
quorum insecturis iniicitur chermes. Aberrant præterea pharmacopolarum quam plurimi, Dialaccam antidotum compo-
nentes, quod legitima Armeniaca lacca loco, quam Arabes prodidere, factitias, & pictoribus tantum dicatas immisceant.
Sed caueant, quæso, ne hunc errorem corrigentes in alterum non minus detestandum incidant: id namque iis facilè con-
tinget, si Monachis, qui in Mesuem scripserunt, morem gerent. Hi enim iam rei medica professores asserere non dubitarunt,
immiscendam esse loco Cancami, seu lacca in magnam dialacca antidotum eam Aprica arboris lachrymam, quam sepla-
sia sanguinem draconis appellant, quæque Dioscoridii cinnabaris ab omnibus esse censetur. Sed certè n̄ magis hallucinan-
tur, quam vt refelli debeant, quod ea lachryma in compluribus facultatibus Cancamo aduersetur. Quippe Arabicum Can-
camum, quod potissimè antidotus illa exposcit, tanquam à Mauritanis inuentum, præterquam quod ventriculum, & ie-
cur roborat, aded eorum infarctus, & obstructions expedit, vt ictericos quidem, & aqua intercute laborantes iuuat: con-
trà verò draconis lachryma propria vi efficaciter adstringit, ita vt scriptum reliquerit Dioscorides, eam lachrymam iisdem
pollere viribus, quibus hematites lapis: cuius tamen vis est, vt mensium profluvia sistat, non autem vt eliciat, Cancami
modo, præsertim vbi vasorum infarctu remorentur, ob idq; maximè expetitur ad sanguinis emanationes, ad vulnera cobi-
benda, & osium fracturas ferruminandas. Sed monachos missos faciamus: & seplasiarios admoneamus, vt si nostro consi-
lio vti velint, non aliud pro lacca in eam antidotum imponant, quam laccam ipsam Serapionis, quæ natia ex Armenia
ad sericorum vellera insectum copiosissima ad nos defertur, siquidem de hac intellexerunt Mauritanii: quos secutus Ni-
colaus Myrepsicus in sua Dialacca confectioe, laccam insectorum immiscuit. Quod καρυκαμω Græci, Latini item Cancamum
vocat: Arabes, Sach, siue lach: Itali, Cancamo: vulgus officinarum, Lacca.

Cancamum Dioscorides & Aegineta ex Græcis proposuere: at Galenus in classe simplicium non me-
minit: & Plinius li. 12. c. 20. nomē solum habet: at recēiores Græcos, vt Actuarium, secuti Arabes καρυκαμω
vocat: cur autem dicatur Lac, Loc, & Luc (Serapio habet Sac, apud incolas quibus nascitur Trec, vnde
apud Pandectarium Aec) causam putat Garzias quod in Loc seu mellis crassitudinem dissoluatur, cum
ad inficiendum, vel etiam in medicina eius vsus est. Verum Anguillara & Montanus Cancamum Græ-
corum censent esse id, quod in officinis Benioinum dicitur: sic Garzias Cancamum vult idem esse cum
eo gummate, quod nunc Anime nomine adfertur: qua de re plenius in Commentariis nostris in librum
primum Dioscoridis agemus. Reuēra Arabum Lacca descriptio, cum Cancami Dioscoridis & Pauli de-
scriptione conuenit. Est autem Lacca lachryma adhærens lignosis quibusdam surculis, qui vastæ sunt ar-
boris, foliis quodammodo pruni (vel arboris, quæ iuglādibus nostris similis Ludouico Romano) in cuius
surculis formicæ magnæ materiam ex arbore exsugentes Laccam elaborant, quæ colore ruffo, odore vi-
roso si accendatur: præstantior quæ surculis adhæret, quam Laccam Sumetri vocant, quia ex Sumetria
insula, id est, Taprobana habeatur: vilior quæ in glebis siue surculis affertur, quæ Lacca Comberti dici-
tur. Cancamum Græcis veteribus, recentioribus Græcis & Arabibus Lacha Cord. in Diosc. & hist. Syl-
uio, Amato, Cronenburgio Arabum Lacca & offic. Lob. Lacca Clus. in Garz. Cæs. Tab. & Lugd. qui Can-
camum Dioscorid. & Pauli esse negat: eò quod Lacca minimè sit odorata: eandem ob causam Lobelius
cum Hermolao, an Lacca Arabum & offic. sit Cancamum, dubitat.

Κυφί.

CYPHI.

CAP. XXIII.

CYPHI odorati suffimenti compositio est, dicata diis, qua abunde Ægyptii sacerdotes vtuntur. In an-
tidota misceri solet: suspiriosis datur in potu. Per multæ componendi rationes, quarum vna hæc est.
Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: vix passæ pinguis, exem-
ptis vinaceis, minas duodecim: resinæ purgatæ minas quinque: calami, & iunci odoratorum, & aspalathi,
singulorum minam: myrrhæ duodecim: vini veteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis. Vuam
passam, deductis vinaceis, tusam cum vino, & myrrhā subigito: cætera tusa, & cibrata adiucito: die vno
humorem combibere finito: dein mel coquito, dum sibi glutinis adsciscat crassitudinem: cliquatam resi-
nam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

Cyphi caput
adscitium.

Non omnes sanè Dioscoridis codices, præsertimq; vetustiores hoc Cyphi caput recipiunt. Quo fit, vt crediderim cum
plerisque rei medica peritis, id illegitimè huc accessisse: siquidem non rationi consentaneum esse videtur, Dioscoridem
hic de simplicium materia scribentem, composita medicamenta tam inconsultè, ac præter rem simplicibus inseruisse: præ-
sertim cum id nulli superiorum commodè adnecti possit, quemadmodum est de multis aliis compositionibus. Vt καρυκαμω
ita etiam Latini, & Itali, Cyphi appellatur.

Quod Dioscorides hoc loco Cypheos compositionem posuerit, ratio est, quia velut simplex quoddam
in multas compositiones recipitur, maximeque veteres ad suffitus vtēbantur, quamuis & in Medicamē-
tis eius fuerit vsus, vt videre est apud Galenum 8. de compos. medic. secundum loca, in malagmate Ascle-
piadeo, vbi habetur Cypheos hieratici, id est, sacrificulorum, eò quod Ægyptii sacerdotes eo vtērentur,
vt eo

vt eodem lib. cap. 7. & 2. de antid. 2. ostendit Galenus: qua de re plenius Plutarchus commentario de Iside & olyride: vide & Hermolaum. Non tamen compositio ipsius Cyphi cum Cyphoide commisceri debet, cum diuersa sint medicamenta: de hac namque antidoto ad hepaticos & thoracis vitia agit Galenus libro citato cap. 7. & Aegineta lib. 7. cap. 11. Dioscorides permultas dicit fuisse compositiones, & rectè: apud Ægyptios certus rerum exigebatur numerus, qui sexdecim erat, quadratus & pariter par: aded autem religiosè conficiebant, vt Sacerdotes ex scripto vnguentariis præirent. At Aegineta lib. 7. cap. 22. duplicem habet compositionem, alteram Cyphi magnam ἡλιακὸν ex triginta sex ingredientibus, cuius & Posidonius & Trallianus lib. 1. cap. 15. meminere: alteram σεληνιακὸν lunarem, ex viginti octo simplicibus compositam: qua de re & Myrepsius Antidoto 298. & Actius lib. 13. cap. 116. Nec admodum dissimile medicamentum Aegineta sequenti cap. proponit, quod Masucha, Ægyptia voce, quibusdam Masnaphium vocatur.

Κρόκος.

CROCVM.

CAP. XXV.

CROCVM optimum in medendi vsu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi getens in capite, oblongum, b omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, a quo detractum est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subatre: sin huius generis nõ est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripinum inter Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleracea: Italia tamen ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortariis dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, c atque etiam sapa sublitu: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine. Sed maleficium declarat infidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alii exitio- lum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: vrinam cit: elegantem colorem præstat: qui ex passo biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte cohibet: additur in potiones, quæ interancorum causa temperantur: ad vuluæ etiam, sedisque cataplasmata vtiliter inditur: venerem stimulat: yergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet: auriculariis collectionibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili † sole siccati oportet, celeriterque versari. Vrinam mouet radix ex passo pota.

^a Meum ἡ τῆς ἐλικῶ-
i. in circuitu.
b Ruel. ἡλο-
κλίρος. Car.
εὐρέως ad-
di. sed meum-
ὀλομελῆς.
c Non habet
Orib.

† Nouo ad-
dit Orib.

Κροκόμαγμα.

CROCOMAGMA.

CAP. XXVI.

CROCOMAGMA fit expressis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, leue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumque vehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis: quale est quod à Syria defertur. Habet suas vires ad delenda, quæ caliginem oculis obuersione: vrinam cit, calfacit, concoquit, & emollit. Vires croci proportionè quadantenus repræsentat: quandoquidem plurimam croci partem sibi Crocomagma vendicat.

CROCVM FLORENS.

CROCVM NON FLORENS.



Crocus caluus
Stemb.

Crocus

Croci confi-
deratio,

Crocum quidem vbique terrarum cognoscitur. Planta est comosis foliis longis, angustis, capillaceis, planis, tamen non rotundis, tragopogoni modo, sed angustioribus & numerosioribus, humi accubantibus, densis ac mollibus. Floret post æquinoctium Autumni anteaquam folia proueniant, floribus Colchico Ephemero similibus, purpureis, ac aspectu iucundis. E medio rubra prodeunt stamina in crassiusculum cacumen desinentia, quibuscum ex eadem serè origine, quidam ex- eunt processus exigua lingua figura, aurei coloris, iis similibus, qui in colchici flore habentur. Floret Crocum continuo serè mense. A floribus prodeunt subinde folia, quæ tota hyeme virescunt, spretis algoribus: arefcunt hæc, ac prorsus deperduntur vere, & nunquam per æstatem apparent. Radicem habet Crocum bulbosam, pluribus contextam tunicis, ipsisq; subflauescentibus, Gladioli modo. Eruuntur Bulbi quarto anno, verno tantum tempore, seruanturq; æstate tota in horreis: & feruntur deinde appetente autumno, in tenui solo, nam & stercora odere, & solidam humum, in campis & hortis, bulbi tantum transpositis. Crocum in Italia, & præsertim in Hetruria, Mauritanorum modo vulgò vocatur Zaffarano: quam-¹⁰quam non desunt rura in agro nostro Senensi, quæ corrupto à Croco vocabulo ipsum appellant Gruogo. Ceterum crocum Coryceum, & Lycium in Olympo monte decerptum (quod sciam) ad nos non aduebitur: quapropter quod ab Aquila Vessi- norum vrbe affertur, primum sibi locum vendicat in Italia. Constat optimum esse, & Aquilano longè præstantius, quod in Germania oritur, è Vienna Austria metropoli deuectum: sed huiuscemodi sanè perexiguum est, idq; difficulter transiit ad Italos, ob eius frequentissimum in cibis vsum apud Pannonios, & Germanos. Floret Crocum (vt Theophrastus audivit est) vergiliarum occasu, paucisq; diebus: confestim verò cum folio florem quoque expellit. Gaudet calcari, & melius ita euadit. Croci meminit Galenus lib. 7. simpl. med. inquit: Crocus paululum etiam adstringens quid obtinet, quod terreum, frigidumq; ostendimus: sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, vt tota eius essentia secundi sit ordinis ex- calfacientium & primi exiccantium, proinde concoquendi quoque vim quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum exalfaciant, paucula adest adstrictio, ea parem faculta-¹⁰tem habent essentiis emplasticis vocatis, quas cum iunctas esse caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse ostendimus. Et lib. 2. de comp. med. secundum locos: Crocum, ait, suo odore caput ferit, & mentem tentat, pencedani, & fructu- sum lentisci modo. Latitiam assert, ob id additur vtiliter medicamentis ad cor facientibus. Κρόκος, Græcè: Crocus, siue Cro- cum Latine nominatur: Zabafaran, aut Zafaran, Arabicè: Zaffarano, Italicè: Saffran, Germanicè: Azaffran, Hispanicè: Saffran, Gallicè. Bohemicè, Sfran. Polonicè, Szafra. Κροκόμαζμα idè nomen retinet apud Græcos, Latinos & Itali.

Crocū quod
optimum.

Croci vires
ex Galeno.

Nomina.

In Croci floris medio plerunque tria, nonnunquam etiam plura stamina (κροκίδες vocantur) obseru- tur, quæ cum sola in vsum veniant, propter excellentiam croci nomine donantur. Duum generum est Crocus Theophrasto: Satiuus, de quo 1. hist. 6. & 6. eiusdem 6. item 7. hist. 9. & 10. & montanus, de quo 6. ³⁰ hist. 7. Sic Syluestrem alium dicimus maiorem, alium minorem: alium vernum, alium autumnalem, qui rursus colore floris & foliorum variat: quare in nostro Phytopinace quindècim differentias posuimus. Dicitur herbariis Crocus, Crocus vulgaris, Crocus satiuus. Callimachi Scholiastes deducit τὸ ἐν κρόκῳ βάλανος, quòd bruma vireat: at Galenus 9. de comp. med. fabulam de Croco puero, cuius sanguis in huc florem versus sit, refert: aliter tamen quàm Ouidius 4. Metam. qui ob amorem Smilacis virginis in hunc florem mutatum scribit. Subiungit Dioscorides Cro- comagma, quod fex est olei Crocini, seu Crocini vnguenti, ex croco & Myrrha parati, sedimentum in pastillos efformatum. Hippocrates libro de Steri- libus, ἐκ κροκομαζμα appellat. Celsus libr. 5. recrementum: ⁴⁰ Plinius, vnguenti fecem nominauit. Verùm Gale- nus 2. de Antidotis aliam Crocomagmatis descri- ptionem proposuit, quam Damocrates versibus cõ- scripsit: quam & Aetius lib. 2. cap. 196. & libr. 6. cap. 50. & lib. 14. cap. 50. habet. Aegineta lib. 7. cap. 12. et- iam compositionem, sed Galeni & Aetii pleniorẽ proponit: habet & Mesues suos Trochiscos Croco- magmatis, qua de re alias.

HELENIVM.



a Ita Cat. Sed
Meu & Drag.
simpliciter
κρόκος ἢ κί-
ροσον
b deest in
meo & pro
subrufa ha-
bet κίρρον.
i. fuluam.
c Cat. de
meian. i. acrc.
d deest in
omnibus ex-
emplaribus.
e Ita Meum
& Drag. Sed
Cat. κίρρον.
i. cinara: id-
que rectius
meo iudicio.
f Meum arix
meis, i. ficis
sed Cat. κίρ-
ρον. i. hume-
ant: idque
rectius.

HELLENIVM folia habet verbasci angustioris folii asperiora, oblonga: caulem a quibusdam in locis non emittit: radicem b subalbidam, interdum subrufam, odoratam, c subacrem, vegetam, magnam: ex qua agnatæ propagines d liliorum, aut e ari modo feruntur. Montanis, vmbrosis, & f siccis locis prouenit. Foditur æstate radix, particulatim- que dissecta siccatur. Potum radice decoctum men-⁶⁰ ses, & vrinas ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnææ, ruptis, conuulsis, in- flationibus, & serpentium moribus. In summa ex- calfaciens est. Folia eius ex vîno cocta vtiliter il- chiadicis illinuntur. Helenii radix & stomacho vî- lis est in passo condita: siquidem salgamarii paulu- lum siccatam eam, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam coniiciunt, & ad vsus recon- dunt. Trita, potaque ad cruentas excreationes effi-
cax est.

HELENIVM. CAP. XXVII ⁵⁰

ca est Alcerum Helenij genus in Aegypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repentibus, foliis lenticulae circa ramos, sed longioribus crebrisque, radice pallida, & digiti minoris crassitudine, per ima tenui supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis, collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

g Car. addit.
καμαρα I.
& longa.

Helenium, quod Latini etiam Inula dicitur, planta est vulgaris notitia. Folia habet verbasci latifolij latiora, longioraq; hirsuta & in acutum desinentia, dorso prominente. Caulem profert bicubitalem, & aliquando maiorem, crassum, hirsutum, in quo flores exeunt aurei, Chrysanthemum modo, sed maiores. Semen edit verbasco simile, tactu prurientum faciens. Radice nititur grandi, vegeta, tortuosaq; exterius nigricans, interius vero albicans, sapore amaro & subacti, ex qua agnatae propagines feruntur: loca amat vliginosa, quanquam & in montibus quandoque nascitur. Quod autem in Italia provenit, folio est longe maiore, quam tradiderit Dioscorides. Quippe non solum verbasco angustifolio Inula Italica maiora insunt folia, verum etiam ea magnitudine longè superant, qua latifolio exoriuntur: quod tamen si pro locorum varietate eucnirè facile possit, crediderim tamen hoc in loco Dioscoridis codicem pluribus scateere mendis. Siquidem testatur Marcellus Florentinus vir quidem apprime doctus, se habuisse Dioscoridis vetustissimum & probatissimum codicem, in quo longè plura legebantur, quam in ceteris ferè cunctis Graecis exemplaribus. Sed praesertim in hoc capite hac de caule, toribus, & semine habebantur. Caulem ex se mittit Helenium crassum, hirsutum, cubitalem, & aliquando maiorem, angulosumq; flores luteos: & in his semen verbasco simile, tactu prurientum faciens. Quare mirum non est, si etiam alicubi hic desiderari possint, cum non facile adducatur, ut credam, Dioscoridem Helenij radicis, cuius tantum est in medicamentis usus, tum amaritudinem, tum formam subtraxisse. Meminit Inula Plinius lib. XIX. cap. V. ubi sic habet. Sifer his sermibus, Februario, Martio, Aprili, Augusto, Septembri, Octobri: breuior his est, sed torosior amariorq; Inula, per se stomacho inimicissima: eadem dulcibus mista saluberrima. Illustrata maxime Iulia Augusta quotidiano cibo. Superacuum eius semen, quoniam oculis ex radice excisis, ut arundo feritur. Item lib. XX. cap. V. Inula quoque inquit, à ieiuniis commanducata dentes confirmat, si ut eruta est, terram non attingat. Condit a tussim emendat. Radici vero decoctio succus tincas pellit. Siccata autem in umbra farina, tussi, & conuulsis, & inflationibus, & arterijs medetur. Venenatorum morsus abigit. Folia ex vino lumborum dolori illinuntur haecenus Plinius. Vinum, quod Helenij radicibus passim vbiq; in Germania paratur, frequenter in potu sumptum mirifice visum acuit. Arridet radicis farina denarij pondere, diebus aliquot ex vino vetere hausta, spleneticos iuuat. Ceterum Aegyptium helenium, quod Crateua auctoritate memoria prodidit Dioscorides ad nos (quod ego sciam) non defertur, nec in Italia provenit: hoc à nostrate non distinxit Auicenna, sed utrunque simul confudit. Meminit huius etiam Plinius lib. XXI. cap. X. his verbis. Helenium è lachrymis Helena dicitur natum, & ideo in Helena insula laudatissimum: est autem frutex humi se spargens, dodrantalibus ramulis, folio simili serpyllo. Item lib. eodem cap. XXI. Helenium, inquit, ab Helena lachrymis (ut diximus) natum, fauete creditur formae: cutem mulierum in facie, reliquoq; corpore nutrire incorruptam. Praeterea putant usu eius quandam gratiam ijs, veneremq; conciliari. Attribuunt & hilaritatis effectum eidem pota in vino, eumq; quem habuerit nepenthes illud predicatum ab Homero, quod tristitia omnis aboleatur: est autem succi praedulcis. Prodest & orthopnoicis radix eius in aqua ieiunio pota. Est autem candida intus, & dulcis. Bibitur & contra serpentium ictus ex vino. Mures quoq; contrita dicitur necare haec Plinius. Quibus satis constat, non modo in Aegypto hoc Helenij genus provenire, sed etiam in Helena Aegaei insula praesentissimum haberi. Helenij radicem succum, cum pari hyssopi succi portione, & aqua stillatitiae Tusilaginibus triplicato pondere, sacchariq; quantum sat fuerit, ad mellis spissitudinem decoctus, mirifice asthmaticos iuuat, si eo frequenter utantur. Helenij vires scripsit Galenus lib. VI. simpl. medic. sic inquit: Helenij herba radix maxime utilis est, non primo statim occursum excalfaciens: ac proinde non dicenda est calida, & sicca exactè, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementitio humore. Quapropter ecligmatu, qua faciunt ad educendos ex thorace, & pulmone crassos lentosq; humores, idoneè commiscetur. Rubrificant quoq; ea partes frigidis, ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnulla coxarum passiones, ischiadas vocant, & exigua aspiduaq; articularum quorundam pra humiditate procidentiae ac luxationes: haec ille. Aperit, prouocat, concoquit, incidit. Aqua à radicibus destillata maculas in facie delet, & cutis nitorem conciliat. Ceterum sunt, qui dicunt (ut etiam testatur liber de theriaca ad Pisonem, Galeno ascriptus) quod si Helenij succo tela venatoria inficiantur, venenata efficiuntur, idq; in Dalmatia fieri narrant, ut feras omnino perdant: quod tamen potius fabulosum, quam historicum crediderim. Nam cum plura sint in eo libro, qua fabulosa habentur, ut latius in nostris scripsimus epistolis, nihil est quod me adducat ad credendum, ex Helenio parari venenum. Crederem potius illius operis authorem ex aliquo codice hac transscripsisse, ubi ἐλέγιον ἀνὰ τὰ ἰλλυρία deprauatè legebatur. Idq; eo magis adducor ut credam, quod sciam in Hispania ex albo veratro parari vnguentum pro illinendis sagittis, adeo venenosum, quod ubi sanguini se commiscuerit, ante horam animal interficit, nec alio medicamento sanari posse vulneratos, quam deuorari cydoniis malis, vel succo eorum ebibito. Hac enim antidoto ijs mirificè succurritur. Planta, qua Graeco nomine ἐλέγιον, Latino Helenium & Inula dicitur: Arabico, lasim, siue Rasen: Italico, Iella, Enoa, aut Enola: Germanico, Alantvour; Hispanico, Raiz de alla: Gallico, Aulned: Bohemico Vuoman. Polonico, Oman: vulgo officinis Enula campana.

Helenii consideratio, & historia.

Plinius de Inula.

Vinum helenium.

Helenii Aegypti confectio.

Helenii vires ex Gal.

Fabulosum, Helenii succum venenatum esse.

Vnguentum venenatum ex Eleb.

Nomina.

Helenium quidam ab Helena dictum volunt, quod, ut habet Plinius lib. 21. cap. 10. fabulentur, ex eius lachrymis in Helena Insula, in qua Paris primum adulterium commiserit, natum sit: quam fabulam eleganter Nicander in Theriacis descripsit: alii quod contra serpentes ex eo primum remedium ab Helena inuentum sit: vel quod in Helena insula longe optimum luxuriet. Quibusdam dicitur Nectarium, qui à Mercurio inuentum & Vlyssi traditum volunt. Tria genera agnouit Dioscorides, hoc enim capite duo proposuit, alterum foliis similibus verbasco, & ενοφύλλω, ubi καλυφύλλω legendum censemus: alterum Aegyptiacum: & tertium Helenii Comagenii nomine, superius capite de Costo. Quod Helenium vulgare vocamus, vulgo Enula campana, quod alicubi in campis proueniat, dicitur, apud Theophrastum 9. histor. 10. Panax chironium censetur Anguill. quibusdam panaces centaurium: Inula Plinio. Inula Campana, Apuleio: Enula, Lon. Cæs. Elenium, Trago. Fuchs. Helenium, Dod. Ges. hor. Cord. in Diosc. Lac. Cast. Lob. Tab. Cam. Helenium maius Cord. in histo.

Ὀμφάκινον, καὶ πᾶν ἔλαιον. OMPHACINVM, ET OMNE OLEVVM. CAP. XXVIII.

Oleum quod ex a immaturis oliuis exprimitur, ad multos vsus recte valentibus accommodatissimum est, omphacinum id appellatur. Praestat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentum

à Meum
Ὀμφορέτιο
1. cratum.

torum

vocant, nos drupas. Ceterum quod omotribes, & omphacinum nuncupant, id quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est, & magis discus-
 10 sorium. Quod verò ex immaturo, id dum reliquum quippiam seruaerit adstrictionis, mista permanet facultas, ubi
 verò illam prorsum abiecerit, reliquo sit simile. Quinetiam quicumque, in preparando germina inijciunt, ij & ipsi ompha-
 cino simile oleum efficiunt. Ceterum rogandum non est, quo pacto sit preparatum, sed gustandum est potius: ac si praese-
 ras adstrictionis quippiam, eatenus etiam frigidum esse existimandum, seu illud, quod ab Iberia portatur, quod Spanum,
 id est Hispanicum nominant. Quod si nequaquam gustantibus adstringere appareat, sed admissim videatur dulce, id
 modicè esse calidum putandum. Porro si tenue quoque cernatur (tale est, quod purum est, quodque intuenti translucidum vi-
 detur) ac modicum eius latissimè per cutem extensum sibi maneat continuum, celeriterque a cute combibatur, id utique pro
 20 optimo ducendum, ac olei virtute quam maximè pollere, quale est Sabinum. Porro quod oleum lotum maximè expers sit
 mordacitatis, supra positum est. Ceterum quo potissimum modo id probissimè laues, in sequenti tradam opere, quod in-
 scribetur de medicaminum compositione, ubi & de Sicyonio, & si quod eius generis praeterea oleum est, agetur: nunc sim-
 plicia prosequor, adijciamque & de aliis olei speciebus sermonem. Iam quod ex agresti oliua oleum exprimitur, non simpli-
 tem temperaturam obtinet, sed extergit, simulque adstringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, & post Istricum
 quoque: deinceps illis est Hispanum. Pinguissimum est Libycum, & Cilicium: simul autem pingue, & tenue Sabinum: in
 medio comprehensorum omnium sunt tum id, quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Graciam, Asiamque. Por-
 30 ro oleum pingue estimatur, iudicaturque viscositate: tenue verò si perluceat, si purum sit, si plurimum à minima eius por-
 tione inungatur, si facile a cute combibatur. Ex dictis cognoscere iam liceat & de aliis olei generibus, quae equiuocè ipsis
 dicuntur vnguenta, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quaecunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo ma-
 40 ceratis conficiuntur. Horum quodque ubi vna cum aromatibus preparatur, vnguentum efficitur: pro cuiusque iniectorum
 natura oleum variari contingit. Ex his ergo, quae in toto hoc opere de quoque iniiciendorum generatim discas, sigillatim quo-
 que confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur. Quod Graeci ελαιον, Latini Oleum dicunt, id Arabibus Cair, seu Zait Nomina
 nominatur: Italia, Olio: Germanis, Del: Hispanis, Azeyte: Gallis, Huyle.

Oleum syl-
uestre.

Oleum aliud natiuum est, seu proprie vocatum oleum, quo in genere continentur ex cuiuscunque
 Olea aut oleastri baccis facta olea: aliud factitium. Natiuum, aut ex fatiuis premitur oliuis, aut ex sylue-
 50 stribus: si ex fatiuis, vel ex baccis maturis, vel immaturis. Si ex maturis, tunc nationum & regionum qui-
 bus nascitur diuersitate, in plures species distinguitur, vt Italicum, Gallicum, Hispanicum: hocque Oleum
 commune est. Hoc rursus secundum praeparandi modum variat, aut est simplex & impermixtum, fa-
 lisque expers: aut cum sale praeparatum: vel illotum, vel lotum, idque vel vt fiat candidum, vel vt fiat
 60 morsus expers: rursus vel recens & velut mustum, vel antiquatum: & denique secundum inductam
 arte alterationem variat, aut enim seruat quomodo ab initio praeparatum fuit, aut candidum effici-
 tur. Candidum si efficiatur, vel fit simplici affusa & refusa aqua: eaque rursus vel simplici, vel artifica-
 li, vel etiam additis odoramentis. Si ex immaturis baccis prematur, quod acerbum oleum, vel Om-
 phacinum dicitur: cuius differentiae sunt vt & olei communis: ex hoc etiam fit oleum Sicyonium. Si ex
 Syluestris baccis prematur, vel fit ex baccis vulgaris oleastri, vel aethiopici oleastri, vel oleastelli. Facti-
 70 tium in duo etiam genera diuiditur, alterum enim simplex est, alterum compositum. Simplicia olea di-
 cuntur Galeno 6. simplic. omnia ea quae à folis fructuum & seminum nucleis, quae pinguem in nucleo,
 vel semine, seu medullam habent, exprimuntur: dicta simplicia, quod illis educendis ac exprimendis, a-
 liud misceri non consuevit, praeterquam quibusdam paucis aquae. Haec rursus duplicia, alia chim-
 80 tantum exprimuntur: alia verò ignis vehementia extrahuntur, vt ex liquoribus, succis, gummatibus, re-
 sinis, cera, melle, lignis resinosis, aromatibus. Composita fiunt ex simplicibus, vt arborum, fruticum
 & herbarum folijs, floribus, seminibus, aut aliis partibus medica vi pollentibus, oleo natiuo macera-
 90 tis, vt est Myrtinum, Laurinum, Lentiscinum, Mastichinum & reliqua eiusmodi. Haec rursus variant,
 aliqua enim macerantur, aliqua insolantur, aliqua incoquantur: & quidem vel in oleo natiuo, vel alio
 oleo. Variant etiam ratione partium plantarum: aliqua enim ex floribus oleo inditis conficiuntur,
 idque insolatu, coctionem enim flores non tollent: sic quidam diu, quidam paucis tempore insolantur:
 vt meliloti, cheiri, sambuci & similes. Quidam validam vim odoris & pluribus diebus constantem
 100 edunt oleo mersi, vt ex rosis, violis, chamemelo, &c. talia olea insolatu tenuiora & utiliora redduntur.
 Quaedam antequam colentur duplici vase incoquantur: vt anethinum, nardinum, myrteum, & id ge-
 nus. Aliqua denique ex germinibus surculisque: aliqua ex fructibus integris oleo iniectis fiunt. Haec de
 oleo: particulatim de oleis à Dioscoride propositis, vt & de diuersa auctoris lectione, egimus in Com-
 mentarijs nostris in librum primum Dioscoridis, quae suo tempore publici iuris faciemus, hic enim gu-
 stum tantum damus.

Oleum du-
plex.
Natiuum ol.

Factitium o-
leum duplex.

Composita
olea.

Ελαιόμελι.

ELAEOMELI.

CAP. XXXII.

IN Palmyris Syriae, quod elaeomeli vocant, ex quodam cauce manat, oleum melle crassius, sapore dul-
 60 ci. Bilem, cruditatesque detrahit sextario cum vna aquae hemina dato. Sed qui sumpserit, torpescunt, &
 viribus deficiuntur, quod minimè vereri oportet, verum crebro excitare, ne veterno pressi somnos ca-
 pent. Fit & oleum è pinguitudine surculorum. Optimum vetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfa-
 cit: priuatim caliginibus oculorum illinitur, lepras, neruorumque dolores illitum emendat.

Quaenam quotidie plura, variaque mercimoniorum genera nobis ex Syria conuehantur, Elaeomeli tamen (quod sci-
 am) non modo non conuehitur, sed ne vllum quidem vnquam audiui, qui ipsum viderit, vel nouerit. Ceterum
 Hermolai vir quidem praestantissimus dubitat, vtrum elaeomeli sit manna, elaeomelitis, & aeromelitis, quod mel aëris si-
 70 gnificat, vicinitate deceptus. Quapropter non possum non admirari, doctissimum virum hac in re dubitasse, cum tum
 Dioscorides, tum etiam Plinius, quibuscum longam contraxerat consuetudinem, communis sententia scribant, elaeomeli
 oleum esse è quodam arboris caudice manans in Syria Palmyris, non mel aëreum, neque rorem, qui ab aethere ca-
 80 cententis.

Hermolai
lapsus elaeo-
meli, Manna
cententis.

dat. Eoq; magis, cum addiderit Dioscorides, non modo elzomeli per se ex arbore manare, sed & factitium haberi, tñsi, ex-
pressuq; arboris furculis.

Κίρινον ἔλαιον.

CICINVM OLEV. CAP. XXXIII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur, Maturi ricini, qua voles quantitate, torrido sole flaccescunt, & aliorum more cratibus instrati tantisper insolantur, dum vestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subiectoq; igni feruescunt: & vbi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni vase, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Ægypto, vbi largior increbuit vsus, longè secus fieri solet: nam repurgatos ricinos mola mandant, & accuratè mollitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Cicinum oleum ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis, atq; præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum: potu aquam aluo extrahit: ventris animalia pellit.

Ricini olei
consideratio.

Ricinus ani-
malculum.
Ol. e semine
Ebuli.

Ricinum, siue Cicinum oleum, Cherua oleum officinis dicitur, quamuis rarioris sit vsus. Namque semen planta, quam Dioscorides ricinum appellat, Arabum esse cheruam, nemo est qui ignoret: quod etiam Serapio pent adactylum vocat, vt diffusius suo loco libro quarto explicabitur. Caterum ricinus animalculum est sædum, liuidum, & sanguine plenum, quod Italis Zecca vocatur, suibus, canibus, capellis, & id genus animalibus infestissimum. Cui cum hoc semen forma, & colore sit quàm simillimum, idcirco Ricini nomen sibi comparauit. Meminit huius olei etiam Mesues, qui præter vires ei à Dioscoride redditas, addidit, id valide crassas coercere inflationes. Proinde ventriculi, laterum, coliq; doloribus prædesse illitum, potum, & infusum. Simili ferè modo conficitur oleum è semine ebuli repurgato, ad quosuis dolores mitigandos efficacissimum, quod ad rem medicam ornandam & locupletandam nunc edam in publicum, licet diu inter arcana mea id primum habuerim. Semen fruticis siccatum in pila ligneo pilo tunditur in offas, aqua calida adiecta per noctem maceratur, & tandem in lebetem oris lati stanno inductum, positum leui igne coquitur leniter mouendo: at vbi assiduo feruore itaq; agitur respumat, & substrato igne refrixit, innatans oleum concha excipitur, & prorsus oleum reddiderit, quod nulla alia ratione, nullove artificio acquiri potest. Idq; oleum ob virorem, à me Smaragdinum appellatum, quod hæcenus thesauri loco continui, neque cuiquam aperire volui, pio in omnes medicina studiosos animo iam effluere sino, hortante Pbedrone Rhodocheo, quem ob morum, vitæq; probitatem, insigni doctrina, ac multarum rerum experientia conditam, diligo maximè, dum apud Serenissimas D.D. Magdalenam & Helenam, natas Vngaria, & Boëmia Reginae, magna laude medicinam facit.

Αμυγδαλίνον ἔλαιον.

AMYGDALINVM OLEV. CAP. XXXIIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccatisque, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ, quæ ferbuerit, sextarius adiicitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quàm antea tunditur: mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum: singulas heminas reddunt singuli modii. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vitis renum, calculosis, difficili vrinæ, suspitiosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie: & eam erugat cum melle, radice lili, & Cypria cera, aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat: vlcera capitis manantia, & furfures cum vino abstergit.

Amygdalini
dulcis paran-
di ratio.

Myropolaru
ignauia, & la-
pius.

Mesues.

Amygdalini
dulcis vires.

Amygdalini
amari vires.

Cum amarum omnino dulci sit temperandum, delinquere sanè existimarem, si oleum ex dulcibus amygdalis expressum (et si illud Dioscorides silentio inuoluerit) ex amaris confecto non adicerem, rectumq; consiciendi modum non explicarem: præsertim cum nostra ætatis medicis maximo sit vsui, & pauci sint myropola, qui ipsum rectè probeq; conficiant. Parandi igitur rationem (vt Mesues tradidit) sic habeto. Præstantiores, dulcioresq; amygdala, qua lubet quantitate, ab vtriusq; corticibus repurgata, optimè in lapideo mortario tunduntur, & in loco calido reponuntur, quinque horarum spatio: dein parum iterum contunduntur: mox prælo tamdiu premuntur, quousq; omne, quod continent, effluat oleum. Elicitur etiam hoc modo. Collocantur delibrata, contusaq; amygdala in vitreo, vel stanno vase, infunditurq; vas in balneo calentis aquæ: eximitur deinde tribus peractis horis, extrahunturq; amygdala, & statim prælo calentes subiiciuntur: itaq; oleum copiosius excipitur. Trita rursus amygdala, & repurgata, in sacculis panno duplicato inuolutis, sub arena cinereve calido reconduntur, & postquam efferbuerint, prælo oleum elicitur. Sed nostrates seplasiarj plurimum negligentia segnitiaq; indulgentes, non modo amygdalas non repurgant, neq; delibrant, sed & amaras, & rancidas commiscunt, & omnes simul conterentes, in aream cacabum iniiciunt, igniq; admouent affuso aqua tantillo, ne penitus torreantur: deinde in sacculum coniiciunt, & prælo summittunt, & quod inde fuit oleum excipiunt: quod plerunq; exustionis nidorem tantum obolet, vt haurientibus illico euomendi pariat nauseam. Qui autem sic parant oleum amygdalinum, eius lenientem facultatem peruertunt, ac destruunt: siquidem contusis amygdalis non delibratis, oleum inde confectum corticum vires asseruat; proinde & constipat, & exasperat, & si abritiem inducit: id quod etiam adauget ignis violentia, dum in lebetibus amygdala torrentur. Hoc itaq; diligenter animaduertens optimus Mesues, Amygdalini faciendi rationem prodidit, vt videlicet, cum purgata contusaq; essent amygdala, calore quodam suauis ac lento leniter calefierent, sicut diximus, non autem carbonibus ardentibus, quemadmodum hodie j faciunt miropola, qui etiam alia pleraq; confundunt. Amygdalinum igitur, si rectè probeq; conficiatur, mirificè lenit: quare potu ad libra dimidiu, aluum leniter deicit: aspera arteria, pulmonis, ac pectoris scabritias tollit: duritias omnes eniollit: & compaginum, & membroru omniu siccitates humectat, quocirca hectici plurimum conducit. Contra vuluarum dolores illitum & potum facile præstat: sicuti vesica crudiatib. est efficax, si argentea fistula coniectu impulsorio instrumeto injiciatur. Quod autè ex amari amygdalis exprimitur, dulcis

dulci in omnibus efficacius habetur: idcirco in prouocandis lapillis, conciliandisq; viscerum cruciatibus à flatu crassiore genitū, dulci longè præstantius reperitur. Nimirum & obstructiones aperit, & interaneorum tineas enecat.

Βαλανίνου έλαιον. BALANINVM OLEVVM CAP. XXXV.

Simili modo fit Balaninum oleum. Quod reputat maculas, lentigines, varos, & cicatrices nigras: alium soluit, stomacho aduersatur: contra aurium dolorem, fonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesaminum ex sesamo conficiendi ratio. Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinum vocant: eandem vim habet, quam balaninum.

Antiq. cod. separat ab inuicem hæc tria capita.

Oleum vnguentariae glandis, quod Balaninum vocant, à pharmacopolis & vnguentariis oleum de Ben appellatur: quoniam myrobalanum, quod Latini vnguentariam nucem dicunt, ex qua hoc conficitur oleum, Mauritanii Ben appellant, vt latius libro quarto differemus. Consimili modo id Mesues fieri tradit. Et (vt idem etiam est auctor) abstergit, mundat, & obstructiones aperit: illitum strumas dissoluit, duosq; tumores. Frigidis tum iocinoris, tum lienis affectibus opem mirificè præstat: facit & ad frigidas neruorum conuulsiones, & compaginum cruciatus. Sed illud sibi peculiariter adscriuit, quod etiam si diu veterescat, haudquaquam rancidum euadit: ideoq; vnguentarijs expetitur ad suauissima odoramenta excipienda, præsertim cum moscho, & ambra chirothecas illinunt: quo fit, vt nullo temporis tractu rancorem nunquam respiciant, vt facillè eueniret, si alio quouis oleo eo in opere vterentur. Quamobrem mirari non licet, si veteres fructum, à quo elicitur hoc oleum, glandem vnguentariam nominauerint. Sesaminum verò (vt Mesues inquit) an ygdalini modo exprimitur. Quippe sesami repurgatum semen primò contunditur, deinde eodem artificio calefactum prælo supponitur, tandiuq; premitur, quousque oleum reddat. Id (vt idem testatur) pingue ministrat alimentum: semen adauget, asperitates quasquaq; lenit, sed præcipuè gula: vocem expedit, & dura apostemata mollit. Adijcitur Sesaminum pleriq; vnguentorum compositionibus, quorum in officinis est vsus. Verum quod è iuglandibus nucibus elicitur, nullius in medicina vsus esse reperio, etsi lucernis, & lampadibus, qui parsimonia student, id maximopere expetant, quippe ignis funiculo non tam citò consumitur, quam id, quod ex oliuis paratur. Præfertur etiam pictoribus eo, quod è Lini semine exprimitur: siquidem hoc cerussa admixtum tractu temporis colorem inmutat, illud verò incorruptum perpetuo asseruat.

Balanini consideratio.

Balanini facultates.

Sesaminū, & eius vires.

Oleum è nucibus iuglandibus.

Ήυοσκυαμίνου έλαιον. HYOSCYAMINVM OLEVVM CAP. XXXVI.

HYoscyaminum sic fit. Semen candidum recens ac ficcum tunditur, & calida aspergitur aqua, vt in amygdalino diximus: dumq; insolatur, siccatur, quæ sub manu sunt, partes cum reliqua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet, dum nigrescat, & grauitè oleat: mox pressum, atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficacis est: pessis miscetur, ad emolliendū vtile. Fit & è grano gnidio purgato, & tuso. Vis ei aluum soluere potu. Non secus enicinum oleum temperatur, cui facultas eadem est, quæ factò è gnidio grano, verum inualidiór. Raphaninum è raphani semine fieri solet, cæterorum more. Phthiriales mala valetudine contractas tollit: scabritias cutis in facie emendat. Ad obsonia vtuntur Ægyptii. Melanthinum idem, quod raphaninum potest, eodemq; modo paratur. Tritum sinapis semen, [& calida aqua] madefactum, adiecto postea oleo exprimitur. Illud diurnos dolores efficacis est: transfert humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Id est aqua frigida leg. antiq. cod.

Tametsi perpauci reperiantur medici, qui Hyoscyaminum oleum nouerint, ne dum in vsum receperint nunquam, ego tamen id ipsum pluries confeci. Siquidem ad tollendos omne genus dolores, vbi cætera præsidia non inuenerint, efficacissimum est medicamentum, præsertimq; inflammationibus pudendorum vtriusque sexus. Item acutissimis aurium doloribus medetur cum castoreo, vel croco instillatum. Prohibet præterea gonorrhœam, renibus & testibus illitum. Mensum exuperantiam cohibet, & albicantia vteri profluvia, tum pubi & lumbis perunctum, tum pessis infusum. Maxime à partu inflammatis vtiliter illinitur. Dentium dolores mirificè mulcet, si tepidum in ore contineatur. Pilorum exitum admodum retardat, aliis quibusdam additis: ita vt euulsi pili integro anno non renascantur, si eodem depilata loca sæpius perungantur. At ipse in eo faciundo Dioscoridem minimè secutus sum, sed aliam parandi rationem adinueni, quæ hæc est. Sumito nouum, ficcumq; hyoscyami semen, tundito deinde, ponitoq; in stanneo, vel vitreo vase, ardenti aqua, quæ è vino fit, parumper prius affusum. His factis ponito vas in calentis aquæ balneo die ac nocte, demum adhuc feruens satulis imponito, & prælo subijcito, sicq; oleum habeto. Quod autem è grano Gnidio, quod rustici Ananienses montanum piper appellant, paratur, recessit hoc auro à medicorum vsu, eo quòd in deicienda aluo violentissimum sit medicamentum, rustici tamen aptissimum, cum sæpius, ne medicos consulant, coccum Gnidium deuorent, quo etiam sæpius morte occumbant. Porro Cnicinum (vt Mesues inquit) potum aqua intercute laborantibus, viscerum obstructionibus, ventriculi, & coli cruciatibus à flatuositate genitis, efficacis est. Suspiriosis mirificè prodest, & vocem clarificat. Epotum pituitatam tum vomitionibus elicit, tum per inferna ducit. Raphaninum præterea, & Melanthinum aboleuerunt, sicuti etiam Sinapinum, etsi vbi ad summum excalfacere opus fuerit, maximam opem præstare valeant. Sinapinum verò non nisi collachrymantibus oculis exprimi potest: tanta enim est vaporis acrimonia, vt concepto vapore, illico prodeant lachryma. Miscetur quoadq; cum eo, quod è pistaceis nucibus elicitur: perungunturq; eo genitalia in frigidis, vt feliciter coeant, addito lasere, & moscho.

Hyoscyami vires.

Hyoscyam. parandi ratio.

Gnidinum.

Cnicinum.

Raphaninū, Melanthinū, Sinapinum.

Μυρτίου έλαιον. MYRTEVM OLEVVM CAP. XXXVII.

Myrtei faciendi ratio hæc est. E myrto nigra, syluestri, aut satiuæ, foliorum mollissima quæque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur: innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio. Tenera folia contusa coquantur in oleo & aqua, & quod innatat, eximitur. Priuatim alii deiecta in oleum folia in sole macerant: alii prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypero, & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu, & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum. Astringit, & indurat: ideo medicamentis miscetur, quæ cicatricem obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum

rum eruptionibus. Facit ad attrita, & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos: corporis sudores compescit: & ad omnia valet, quæ astrictionem, inspillationemq; desiderant.

In myrteo officinarum lapsus.

Olei omnis generis parandi ratio.

Myrtei parandi ratio.

Myrteum myropola ferè omnes non quidem ex tenellis myrri frondibus, Dioscoridis more, conficiunt, sed è fructibus tantum, nulla seruatà parandi ratione. Quandoquidem myrri baccas contundentes, oleo nigro, vino immiscens, & in aneum cacabum transferunt, subduntq; (vt citius opus expediant) ignitos carbones, ibiq; tamdiu inferuescere sinunt, donec vinum totum absumatur; mox ab igne tollunt, percolant, & asseruant. Neq; animaduertunt consiciendi regulam à Mesue explicatam, siquidem in calentis aqua balneo, non quidem violento carbonum igne Myrteum parari iubet: ex oleoq; omphacino fieri, non (vt ipsi parant) ex maturis oliuis expresso. Namque, vt balnei humenti, ac leni calore olei compositio mirifice digeritur, ac eius omnes conseruantur partes: sic contra violèto igne subdito peruertitur, & destruitur tota rei compositio. Sed quoniam reipublica beneficio (vt etiam ab ipso exordio pollicitus sum) decreui non pratermittere quicquam, quo errores, qui indies contingunt, e medio tollantur, dico, oleum omne quod officina ad medicamenta versurpant (illud excipio, quod ab arborum resinis stirpiumq; aliarum gummi, vitreis organis per sublimationem, vt chymiska vocant, elicitur) vase vitreo, vel saltem stanneo in balneo calentis aqua fieri debere: & inibi primum impositis imponendis tribus diebus macerari: post tertium verò diem expressis cunctis prius impositis, & recentibus infusis pari temporis spatio, eodem in balneo, eadem macerari. Itaque tamdiu opus prosequendum, donec sibi oleum amplissimas exceptorum medicaminum comparauerit vires. Verùm ingens hominum lucri auiditas, aurigq; ingluuies, vt admodum superlucrentur, atq; auro ad summum vsque impleant, non patitur myropolas necessarium tempus impendere ad medicamenta exactè paranda: eos, inquam, qui continue magis crumenis intendunt & inbiant, quam vt vite egrotantium satagant. Probitamen, & diligentes hac mea verba boni consulant, his verò mali errores emendent suos. Idcirco Myrteum oleum, quod 20 myrri præstantiam ad plenum referat, hoc modo temperatur. Sumito fructuum myrri libram, foliorum eius recentium vncias decem, vini nigri adstringentis libras duas, olei omphacini libras quinque: deinde contusis baccis ac folijs omnia oleo excipito, & vase vitreo, vel stanneo reposito, tectoq; vasis ore in balneo calentis aqua immergito, & post tres dies extrahito, ac percolato: rursus assumptis recenter baccis, folijs, & vino, vt antea oleo exceptis, in eodem balneo omnia recondito ad tertium vsq; diem. At postremo vasis ore detecto, tamdiu id apertum finito, donec balnei feruore vinum totum exiliat, & oleum tantum remaneat. Nec audiendi sunt ij, qui Dioscoridis testimonio, aneo cacabo (vt supra dictum est) substratis carbonibus Myrtinum conficiunt: quippe Dioscoridis tempore ars medica non adè exulta erat, quin nec seplasiaria, vt nostra hac ætate esse visitur. Quamobrem putandum, quod si huius balnei artificium Dioscoridi innotuisset, ipsum haudquam silentio præterisset, veluti nec illud Mesues, nec alij complures præterierunt, qui summo studio & diligentia medicam facultatem excoluerunt & in ordinem redegerunt.

Δάφνιν ἔλαιον.

LAVRINVM OLEVVM.

CAP. XXXVIII.

Laurinum fit hoc modo. Lauri baccæ cum maturæ sunt in aqua coquantur: siquidem ex obductione cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta, concha excipitur. Alii omphacinum prius oleum cypero, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquant: alii etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit: alii styracem, & myrtum addunt. Optima lauris ad id latifolia, & montana. Oleum laurinum vtilius, quod recentius, quoq; viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excafactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit: omnibus neruorum vitis, algoribus, destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum, non aliud iuuantius: attamen potum nauseam parit.

Laurini consideratio.

Laurini vires ex Mesue.

Laurini consiciendi rationem aliter à Mesue institutam legimus, sed tamen ab hac parum recedentem, ideoque quod id parum vel nihil referat, rem ipsam silentio prætereundam duximus: præsertimq; quod non me latet, Laurinum, cuius est vsus in officinis, à seplasiarijs nequaquam fieri, sed ab alijs confectum emi, qui lecta magna lauri baccarum quantitate ipsum eliciendi artem exercent. Mesues præter facultates à Dioscoride traditas, id summè laudauit & ad iocineris dolores, & ad hemicraniam, quæ frigidis contrahitur succis: quin & ad ventriculi dolores, coli, vulua, & lienis efficacæ esse tradidit.

Ἐλαιο ἔλαιον.

LENTISCINVM OLEVVM.

CAP. XXXIX.

Similis Lentiscini ratio: nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis: vt in laurino diximus. Hoc scabiem iumentorum, canumq; sanat: vtilissimum pessis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus Terebinthinum fieri solet: quod † refrigerat, & astringit.

Lentiscini parandi ratio.

Lentiscini vires.

Terebinthini consideratio & vires.

Lentiscinum pluribus in locis Hetruriae conficitur, sed præsertim in agro nostro Senensi, Ilua, & Gilsio Tyrrheni insulis, non longè à continenti nostra distantibus. Fit autem ab incolis hoc modo. Racemosas lentisci baccas assumunt, & à putaminibus cunctis expurgant, permittuntq; aliquot diebus simul flaccescere: deinde magnum in abenum collocant, affusa aqua: & igni tamdiu seruent, donec bacca dehiscant: demum eas extrahunt, & saccis includunt præloq; subiiciunt, expressumq; asseruant oleum. Quod & quibusdam Adriatici insulis hac similiter ratione confici audio, absq; alterius cuiusvis olei adminiculo: siquidem fructus us per se olei satis emittit. Incola (vt exprimento comprobatum affirmant) ad acundam oculorum aciem, caliginesq; delendas, illud cibi commiscens. At ego eo sæpius vsus sum magno sanè iuuamento in dysentericis, non quidem potu exhibito, sed clysteribus infuso. Lentiscinum summis laudibus extulit Galenus libr. v. de comp. medic. secundum locos, ad gingiuarum, & lingua inflammationes, si eo colluatur. Quod autem sit è fructibus terebinthi, quos Mauritanii grana viridia nuncupant, non sit in Italia, neque ad nos (quod equidem sciam) aliunde conueniat, neruorumq; durities, & reberrimè cataplasmatibus admiscetur.

† In his verbis mendum subesse putamus, vt etiam doctissimè adnotauit Manardus Ferrariensis lib. viii. epist. prima. Alias siquidem sibi ipsi repugnasset Dioscorides, cum scripserit in Terebinthi mentione, eius suæ excalfacere, hic verò dica-

dicatur oleo ex eisdem parato inesse refrigerandi facultatem. Huic depravata lectioni illud quoque refragatur, quod sint nobis Græci Dioscoridis codices, in quibus verba illa de Terebinthini olei facultatibus non leguntur, sed de eius tantum conficiendi ratione mentio habetur.

Μαστιχίνιον ἔλαιον. MASTICHINVM OLEV. CAP. XL.

Mastichinum è trita fit mastiche. Quod contra omnia vuluæ mala efficax est: mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, cœliacorum, dysentericorumq; cruciatus utile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit: optimum in Chio insula componitur.

Mastichini parandi rationem, sanè quàm paucis Dioscorides perstrinxit, quippe è trita tantum Mastiche fieri tradidit, nulla alia explicata conficiendi ratione. Sepplasiarj autem nonnulli prorsus obliti, scripsisse Musuem in balneo calentis aqua Mastichinum confici debere, communi oleo, albo vino permixto, mastichen admiscere, & areo vase carbonum igni admovent, ibiq; tanto tempore efferuescere sinunt, quoad vinum prorsus exiliat, ac inde vsui asseruant. At ipse veteru organo è purissimo tantum mastiche illud sapius confeci.

Seplasiariorū lapsus.

Μύρον συνθέν. VNGVENTORVM COMPOSITIO. CAP. XLI.

De ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidem ea in nonnullis corporum vitiis, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum profunt: in quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiuscemodi iudicium, quod tamen in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea, quæ admiscuntur, odore cæteris præualentia: vt in amaracino & crocino, telino, & plerisq; aliis, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Vnguenta, ab vtendi modo, Græcis *μύρα* fortè à Myrrha: quo nomine veteres pretiosa vnguenta ex odoramentis confecta appellabant: hodie verò quæ ex oleis, speciebus quibuscunque & cera componuntur, ita vocantur: at hæc non simpliciter *μύρα*, sed myracopa dicenda, quoniam similia sint à copis. Primus censetur Archilochus *μύρον* nomen vnguentis imposuisse, siquidem vetustissimus Homerus licet vntionum frequenter meminerit, attamen oleum, non Myron appellauit: sic quo vngebantur à Moysè sacerdotes, non vnguentum sed oleum sanctum vocant. Et licet opinio sit, primum vnguentum ex Bryo seu musco & balanino oleo confectum fuisse, attamen oleum sanctum, de quo Exodi 30. & apud Iosephum lib. antiquit. 3. cap. 13. primum statuendum, quod ex præstantissimis odoramentis conficiebatur, utpote ex myrrhæ sponte fluentis, quingentis siclis: cinnamomi aromatici, 250. & calami aromatici tantundem, calicæ verò quingentis, secundum solum sanctuarij: & olei de olea Hin, id est duobus cois Atticis, vnguentum opere vnguentarii conficiebatur: quo & sacerdotes, & tentorium conuentionis, etca testimonii, mensa & omnia instrumenta eius ac reliqua vasculata purgabantur. Vnguentorum licet duo constituerit genera Icesius libello de odoribus, alterum deliciarum quod *χέλμα* seu *χέλμα* dicitur: alterum promiscuum & ferè palæstris dicatum, quod *ἀλειμμα* cognominatur: tria tamen constituemus summa genera: vnum ad luxuriam: alterum ad necessitatem: tertium ad salubritatem. Ad luxuriam, apud Græcos, Persas & alios cultiores Orientis populos, quotidianus erat in conuiujs vsus, quare cum bellarijs & corollis, secundis mensis inferebantur: quibus conuiuatum capilli & barbæ vngebantur, de quibus Athenæum consule. Et licet Solon, cum hæc ad lasciuiam veneris facere animaduerneret, vnguenta Athenis diuendi vetuerit: sic Socrates apud Xenophontem vt meretricium accusarit: sic Lacedæmonij vnguentarios ciuitate expulerint, eos oleum corrumpere dicitantes, attamen hæc ætate plurimi & ambram & moschum ad fastidium olent. Ad necessitatem erant ea quibus cæcantes utebantur & palæstrarum corpora inungebantur. Ad valetudinem tertium genus facit. Dioscorides auctor est, ea aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, in quibusdam corporum vitiis plurimum conferre. Hæc autem nunc vsitata ex tribus conficiuntur, oleo, speciebus & cera: oleis adiciuntur adipos, butyrum & mucilagines: nonnunquam gummata & lachrimæ his quoq; miscuntur. Species seu pulueres pro affectuum diuersitate variant. Cera additur, vt conuenientem consistentiam vnguenta nanciscantur: ita tamen pleriq; conficiunt vt ad oleorū 3. specierum 31. ceræ 3. ij admisceant: At cum vnguenta æstate plus ceræ, hyeme minus requirant: sic interdum firmius & diutius, interdum contra, corporib. adhærere velimus, consultius vt componentis iudicio liberum relinquatur. Galenus 4. de sanitate tuenda, ceræ quartæ parti, resinæ duodecimam immiscet, sic enim non solum pulcherrimum sed etiam quod bene adhæreat vnguentum fieri: idem habent Oribasius in vnguento ex Euphorbio, & Aegineta lib. 7. cap. 17. Concludentes dicimus vnguenta quæ in Pharmacopolijs habentur, assumpta antiqua vnguenti significatione, vnguenti nomen non mereri, sed potius esse apud veteres olea composita, cum plerunque nullam odore fragrantiam habeant. Dioscorides verò ea proponit quibus corpora irri-gantur & ex quorum olfactu vires animales (hic rursus ipsius Methodus notanda) recreantur, & quod alijs medicamentis hæc misceri soleant. Vnguenta verò quæ ad voluptatem & luxum faciunt, in totum Dioscorides omittit, tanquam indigna quæ inter remedia salutaria proponantur: de quibus multa Plinius lib. 13.

Vnguenti primi confectio.

Vnguentorū genera tria.

Vnguenta vsitata ex quibus conficiuntur.

Olea composita veterum.

Ρόδινον. ROSACEVM. CAP. XLII.

Rosaceum sic fit. Iunci odorati quinque libras & bessem tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincunce, subinde mouendo, coquito: dumque percolaueris, in olei libras viginti, & quincuncem, aduicito rosas non madefactas numero mille, & manib. melle perunctis identidè moueto, in tertium.

† epulcor. l. rubras. Anti. codex habet.

a Meum
 ἰμβόλιον .i.
 iniectionem.
 b Meum
 αἰθρόχρον .i.
 faccarum.

tertia premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & vbi recementum pessum ierit, mutato vase, in craterem melle illitum recondito. Caterum rosas, quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissari olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsque, quarta vsve perfusiones infundens exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si verò secundam a infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo b humore imbutas iniicito: manibus melle præmadefactis agitans premito: & iterum tertio, aut quarto simili modo exprimens facito, totiesque recentes rosas detractis vnguibus immittito: fiet enim ita oleum multò validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet, nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alii autem detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo. Rosæ, quæ se libram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & vsque ad tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alii calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alii coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim astringendi, & refrigerandi obtinet: fomentis, & cataplasmatibus vtile. Potum soluit aluum: stomachi ardorem restinguit: vlcera caua replet, & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur: dentes inter initia doloris collui prodest: ad genarum duritias illitum efficax est: ad lacessita interanea, & concitatas vulnas vtilissimè subicitur.

Vnguentorū
 confid.

Rosacei con-
 sideratio.

Rosaceū om-
 phacinum.

Rosacei om-
 phacinivites.

Hoc sub olei nomine comprehendit Dioscorides, oleum omne, quod per se tantum, nulla alterius olei admistione, aut Hex arborum fructibus, aut herbarum diuersorum generum seminibus, aut stirpium resinis elicitor. Sed vnguenti appellatione intelligit oleum omne genus, cui & odoramenta, & alia simplicia medicamenta admiscuntur, vt in præsentia de Rosaceo agens, & deinde in sequentibus manifestè ostendit. Quo fit, vt apud Dioscoridem oleum vocetur, quod simpliciter expressum sit: vnguentum verò oleum quodlibet, cuius componendi ratio pluribus constat medicamentis. Quapropter Galenus lib. vi. simp. medicamentorum de oleo agens, sic inquit. Ex dictis cognoscere iam liceat, & de alijs olei generibus, quæ æquinoce ipsis dicuntur, vnguentis, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quacunque id genus floribus, fructibus, germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque vbi vna cum aromatis preparantur, vnguentum efficitur. Caterum oleum rosaceum, quod hoc tempore officina completū appellant, à Dioscoridis rosaceo longè distat, quod etiam eo præstantius existimandum est, summum ob artificium, quod in ipsa parandi ratione diligentiores adhibent myrtos. Quod eorum tamen perpauci (ita vt ingenium est multorum à labore procliuè ad ignauiam) illud secundum suam temperant, tametsi plures ab eo optimi rosacei conficiendi modum sint consecuti. Fit etiam nū rosaceum rosis non asfatim debiscens in omphacinum demissis, modo calentis balnei viribus (vt in quibusdam alijs superius adnotauimus) modo insolatu perquam longo. Sunt & qui, vt magis viribus præstet, oleum prius ex aqua rosacea lauent, deinde plusculo temporis spatio ter, aut quater rosas infundant, quæ haud penitus fatiscant: demum expressione peracta, immaturarū rosarum succum adijciunt, ac inde diu insolant. Postremò oleum à succo secernunt, & diligenter asseruant. Hoc inflammationes discutit, roborat, adstringit, fluxionesq; cohibet, ne ad agras desfluant partes. Potum torminibus dysentericis medetur. Capitis vulneribus aptissimum est, quò roborat, siccet, resoluat, inflammationesq; non modo prohibeat, sed etiam extinguat. Quocirca hac in re maximè probatur Galeno lib. 2. de comp. med. secundum locos, vbi de dolore capitis scribit, qui vel ex vulnere, vel casu excitatur: cuius etiam meminit lib. x. simp. med. de sanguine agens.

Ελάτινον.

ELATINVM.

CAP. XLIIII.

Fracta elate, tusa, & sacrificata, in labellum deiicitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusq; portiones, dein mundo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionè respondet: aluum tamen non mollit.

Elatinum, quod ex dactylis inuolucris antiquitus parabatur, hac nostra tempestate obsoleuit.

Μελινον.

MELINVM.

CAP. XLIIII.

Melinum hoc modo temperatur: Olei congius decem aque sextariis admiscetur. Adijcitur elata palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut rara tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea decem dierum spatio operimentis inuoluunt, vt contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumq; reconditur. Id vim refrigeratorem, & adstringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet: exulceratis vultus infunditur: citatam vrinam sistit infusum: sudores cohibet: contra cantharides, buprestim, pinorum crucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mala olet.

Melini con-
 sideratio.

Melinum oleum ad hodiernum officinarum vsus hoc modo conficitur. Cotonea nondum planè matura in taleolos dissecta omphacino oleo macerantur, & vino ex eis expresso superaddito insolantur. Deinde in calentis aqua balneo iterum, atque iterum perfunduntur, & extrahuntur, vt in alijs superius ostendimus.

Οιρανθινον.

OE NANTHINVM.

CAP. XLV.

Oenanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximū rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore œnanthen refert.

Οιρανθινον.

OEnanthium nullam à nobis requirit explanationem: quoniam à Dioscoride tam aperte proditur eius parandi ratio, ut non sit opus, illud pluribus explicare.

Τέλινον.

TELINVM.

CAP. XLVI.

FOeni græci libræ quinque, calami libra vna, cyperi libræ duæ, olei libris nouem septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituunt, & cyperi loco xylobalsamum macerant. Alii oleo antea his odoribus spissato fœnum græcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit: omnibus vuluarum duritiis magnopere conuenit, fœminis difficile parientibus subiicitur, vbi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt: sedis inflammationes lenit, tenesmo subditum prodest: vlcera capitis manantia, sarfuresque expurgat: ambustis, & pernionibus addita cera proficit: vitia cutis in facie emendat: pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod non vehementer fœni græci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum indicatur.

Officinarum Luminaria ex Rhafis auctoritate aliam, quamuis exoletam, Telini componendi rationem tradunt, in quo calamo odorato, & cypero elaterij bessem adijciunt.

Σαμψυχίνον.

SAMPSVCHINVM.

CAP. XLVII.

SErpylli, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrii, frondium myrti, sampfuchi singulæ portiones, quadam pro viribus ipsorum coniectatione, vnâ tunduntur, atque is omphacini olei modus adiicitur, qui mamentium vires non euincat: hæc post quadriduum exprimuntur: denuo noua alia simili mensura, & æquali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet sampfuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem: aduersus vuluæ præclusiones, conuersionesque efficax est: menses, & secundas, & partus extrahit, vuluæ stragulus recreat: lumborum, inguinumque dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi astrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit: in opisthotonicorum, vultorumque cataplasmata vtilissime additur.

Quanquam ex Theophrasti, Dioscoridis, & Plinij sententia idem esse constat sampfuchum, & amaracum: cum tamen Galenus, & Paulus de his diuersis capitibus seorsum scripserint, eorumque temperamenta per gradus dissidere tradiderint, non ab re credere nonnulli aliud esse sampfuchum, aliud verò amaracum. Quorum opinionem auxit etiam Dioscorides, quod in his vnguentorum compositionibus Sampfuchinum, & Amaracinum diuersis capitibus digesserit. Quod facile plerisque ad credendum induxit, has stirpes tum facie, tum viribus differre, hac ratione freti, quod si alterum ab altero non distaret, omnino præter rationem de his variis in locis scripsisset Dioscorides, alterum vnguentum Amaracinum alterum verò Sampfuchinum appellans. Porro vt huiusmodi controuersia tollatur, sciendum est, stirpem eam, qua Galenus, & Paulo amaracum appellatur, id sanè amaracum non esse, quod Theophrastus, Diosc. & Plinius sampfuchum vocauerunt, sed potius (vt ego existimo) Marum, id quod etiam sentiunt clariores nostri seculi simplicium indagatores. Namque Mari, nec Galenus, nec item Paulus quicquam prorsus in simplicium medicamentorum libris meminerunt. Quare non deest suspicio, quin librariorum culpa, in Galeno Mari titulus in amaracum abierit: quandoquidem in eius tum gradibus, tum facultatibus assignandis Galenus à Dioscoridis Maro non longè recesserit. Sunt & qui velint apud Paulum, & Galenum id amaracum dici, quod Dioscorides parthenium vocat: quippe & hoc quibusdam amaracum vocatur. Cuius rei indicium esse existimant, quod tam Galenus, quam Paulus nullibi in simp. medic. libris aliquid de parthenio posteritatis memoria prodiderunt: quorum opinio non omnino reprobanda videtur. Ceterum licet Dioscorides Sampfuchini, & Amaracini diuersis per se capitibus meminerit, non obstat propterea, quod minus idem esse possint sampfuchum, & Amaracum. Si quidem duabus de causis vt alterum ab altero distingueret, Dioscorides facile impulsus fuit: quarum altera est, quod si diligenter animaduertantur vtrorumque compositiones, vtiq; Amaracinum tum multo odoratius, tum Sampfuchino prætiosius indicabitur. Ideoque auctor, eo quod nolebat vnguentum hoc apprimè nobile intactum relinquere, quodq; ob eius claritatem id particulari descriptione dignum censebat, vt præstantia discrimen faceret, vtq; etiam minus probatum à probatissimo dignoscatur, homonymiam immutauit, ipsumque non quidem Sampfuchinum, sed Amaracinum appellare voluit: nam si id non fecisset, quodnam altero præstantius esset, discerni non potuisset. Huc accedit alia ratio, qua alterum Sampfuchinum, alterum verò Amaracinum Dioscorides appellauerit: quod (vt libro tertio proprio capite legitur) in Cyzico sampfuchum amaracum appellabatur, vnde hoc vnguentum in signe petitur. Et quoniam à Cyzicenis claris illius compositoribus ex eorum more Amaracinum vocabatur, talem nomenclaturam Dioscorides haudquaquam permutandam censuit: quare ipsum in eadem reliquit appellatione, quam secum ex Cyzico tulerat.

Sampfuchini consideratio.

Solutio controuersie de Sampsucho & Amaraco.

Opinio quorundam Amaracum esse Parthenium.

Οκίμνον.

OCIMINVM.

CAP. XLVIII.

OCimum oleum fit vt cyprinum. Ocimi folia decerpta librarum vndecim, & bessis pondo, die noctuque viginti olei libris macerato, premito, colato: cumque exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, vt in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur: quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampfuchinum potest, sed inefficacius.

Αβροτόνον.

ABROTONINVM.

CAP. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleum velis asseruari, eiectionibus prioribus foliis, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit: ad vuluæ duritias, præclusionesq; efficax est: menstrua, & secundas pellit.

Ανθίνον.

ANETHINVM.

CAP. L.

† αλαις i. antiqui. leg. Orib. Conclufa leg. Orib. τὸ αὐτὸ. i. tantundem.

Olei † libris octo & dodrante florum anethi [libras vndecim & bessem,] maceratas in oleo die vna, manibus premito, & recondito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur: calfacit enim & lassitudines discutit: prodest articuloꝝ doloribus.

Συσίνον.

SVSINVM.

CAP. LI.

Svinum, quod alii liliinum appellant, sic temperatur. Olei libras nouem cum quincunce, calami libras quinque & quadrans, myrrhæ vnciæ quinque, permisto odorifero vino decoquantur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti libras tres & semis macerantur premunturq; , tres libras cum semisse spissati olei assumuntur: mille lilia deceptis foliis, in latum, non tamen profundum labellum demittuntur: iniectum oleum manibus melle perunctis agitur: die noctuq; conuiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: non enim, vt rosaceum moram tolerat; nam concalfactum feruet, & putrefcit; quare sapius decapulandum. Vasa melle illinenda, tenuis sal inspergendus, & si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem coniiciuntur. Hæc manibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profuit, repurgatur. Tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimum erit, quod prius exprimitur: secundum, quod sequitur: tertium locum sibi vendicat, quod nouissimum prodit. Denuo in mille lilia euulsis foliis expressum primò oleum infunditur: tum eadem ratione profequendum, idemq; faciendum, vt prius: addito cardamomo, dein expresso, fac eadem in secundo, & tertio, vt dictum est: & quò frequentius recentia lilia maceraueris, eò validius vnguentum efficies. Denique cum factum abunde videbitur, singulis compositionibus miscere cõuenit mirrhæ quàm optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta. Croci verò, & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribrata in lutram cum aqua demittuntur, expressumq; primò vnguentum infunditur, & paulò post excipiuntur vasculis siccis, myrrha, aut gummi antea perfusis, & croco, & melle, & aqua madefactis. Eadem fiunt in altera, aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balanino, alioue oleo, & liliis componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Ægypto factum, sed cum primis laudatur, quod lilia redolet. Calfacit, emollit: vuluæ præclusiones, & collectiones aperit: vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emendat: vibices, cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat: potum, bilem per aluum extrahit, vrinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Antiq. cod. legi. χαζέων και φλεγμονω. i. frigiditates & inflammationes.

Hoc, quod ex liliis temperatur: illud item, quod ex ocimo, abrotono, anethoq; conficitur oleum, cum vniuscuiusq; parandi ratio per se clara sit, ideo nostris explanationibus non indigent. Ceterum Susini compositio mihi quidem pluribus in locis librorum potius, quàm auctoris incuria deprauata videtur.

Ναρκισίνον.

NARCISSINVM.

CAP. LII.

Narcissini spissamenta ita fiunt. Sex libras aspalathi cum sextante tunduntur: olei eloti libras septuaginta cum vnciis quinque assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris & besse adicitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataque ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum iis efferbuerit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniiciuntur, qui bidui spatio (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duritias, præclusionesque: sed capitis dolores facit.

Narcissinum, quod ego sciam, non paratur nostratibus myropolis, quod mirum non est, cum id etiam Plinii ætate parari desisset, vt ipse libro XIIII. cap. primo memoria prodidit.

Κρόκινον.

CROCINVM.

CAP. LIII.

Cum Crocinum componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras tres & semissem, croci vnciam vnam assumes: identidem quotidie moueto, & sexta die, quàm hoc assiduò peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adicito: moue triduo, dein contusa myrrhæ, atque cribrata drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitarum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abunde crocum spirat, in medendi vsu expetitum. Proximum quod myrrham

myrrham refert. Calfacit, somnum allicit, quare per se pe phreneticis subuenit perfusum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, vlcera purgat: contra vuluæ duritias, atq; præclusiones, & vlcera, quæ cacœthe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: cōcoquit enim, emolliet, humectat, & permulcet, ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur: huic autem proportione respōdent butyram, onychinum, & styracinum: quæ et si nominibus distant, viribus, & compositione cognata sunt.

ΚΥΠΡΙΝΟΝ.

CYPRINVM

CAP. LIIII

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœlestis tantundem cum semisse, cuius vna parte oleum diluitur, altera adiiciendis odoramentis admiscetur. Dein assumptis aspalathi libris quinque & semisse, calami libris sex & semisse, mitrhæ libra vna, cardamomi libris tribus & dodrante, olei libris nouem, & vaciis quinq; aspalathus tulus, & aqua affusus decoquitur in oleo, donec conferuescat: myrrha autem vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur, & vbi efferbuerint, sublato ahenō oleum percolatur. Cardamomum tulum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitatur, nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recantium florum pondus iniectum simili modo prematur: & iterum aut tertio, si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat: aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emolliet: ora venarum aperit: vuluæ, neruorumq; vitiis conuenit, pleuriticis, fractisq; per se, vel cerato immittum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulatur: item in acopa adiicitur.

ΙΡΙΝΟΝ.

IRINVM

CAP. LV.

Spathæ quarum minutissimæ contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincuncæ olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatis imbuto oleo, irinum primo temperatur, iride ex oleo inspissato macerata, vt scripsimus. Sed alia est componendi ratio. In olei septuaginta libris & quincuncæ, xylobalsami (vt dictum est) contusi libras quinq; & sextantem excoquito: postea detracto xylobalsamo, tusi odorati calami nouem libras & sextantem adiicito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tusa iridis, binis diebus ac noctibus madefacito strenue, & vehementer dstringito. Quod si vis validius fieri, par pondus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est, quod solam irim olet, quale illud est, quod in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaïæ componitur. Vim habet calfactoriam, atq; emollientem, crustas adimit, sordida vlcera & putrida purgat: confert feminis vuluæ causariis: item inflammationibus eiusdem, atque præclusionibus: partus eiicit, hæmorrhoidas recludit: contra aurium sonitus ex aceto, ruta, & amaris amygdalis, prodest: diurnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum vlcera, quas ozænas vocant, auxiliatur: aluum purgat cyathus epotus: facit ad ilei cruciatus vrinam mouet: difficiles vomitiones adiuuat, perunctis eo digitis & immixtis, vel iis, quæ ad vomitum ciendum induuntur: angina etiam illinitur, aut ex aqua mulla gargarizatur: item contra arteriæ scabritiam: datur etiam iis, qui cicutam, coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.

Quamquam Irini præparatio (est enim per se clara satis) non magis, quam Crocini, & Ligustrini explanari exposulatio: illud tamen silentio minime prætereundum videtur, quod non Iridis flores, sed radices, cum hæc odore fragrant, illi vero male oleant, in hoc olei spissamento imponi debent. Quod etsi Dioscorides non explicauerit, cum tamen vnguenta odorum iucunditate commendentur, de Iridis radice, non de floribus intellexisse Dioscoridem existimandum: quippe quæ & suauiter oleant, & ad vnguentorum spissamenta floribus præstantiores habeantur.

Iridis consideratio.

50

ΓΛΕΥΚΙΝΟΝ.

GLEVCINVM

CAP. LVI.

Gleucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardo, spatha, aspalatho, fertula campana, costo, & musto: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum, & oleum conceperat. Tricenis dieb. bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emolliet, remittit: horroribus, & neruorum vuluæq; vitiis auxiliatur: omni acopo iuuantius, quippe q̄ emolliat.

Minimè quidem mirari licet, quod Gleucini parandi rationem simplicem appellauerit Dioscorides. Siquidem alia habentur vnguentorum compositiones, quæ multo pluribus simplicibus constant odoramentis, sicuti Columella lib. XIII. capite 1. aperte indicat. Caterum non potest Gleucinum (si rectè admixta simplicia considerentur) non vehementer excalescere: tunc et si Plinius lib. XXIII. cap. IIII. id tum adstringere, tum refrigerare scripserit. Quod euidenti argumentum est, aut Plinij gleucinum, siue mustum, ab hoc Dioscoridis, & Columella diuersum esse, aut Plinium non exactè illius temperamentum perpendisse. Verùm cum is lib. XV. cap. VII. scribat, gleucino mustum incoqui in vapore lento, non vt alia admoto igne, sed circumdatis vinaceis per se calentibus, videtur non parum cum Dioscoride conuenire. Quamobrem crediderim potius Plinium, cum dixit gleucinum refrigerare, lapsum fuisse, quàm secus. Nam et si oleum omphacinum, cum quo mustum conficitur, tantum (vt Galenus inquit) frigiditatis, quantum adstrictionis habeat: cum tamen sit aliarum qualitatatum susceptiuum, fieri quidem non potest, quin admixtis calidis odoramentis, puta cypero, calamo odorato, Celtica nardo, dactylorum operimento, aspalatho, meliloto, & costo, valde calidum euadat. Quippe eadem ratione aqua, cum frigida admodum sit, temperamentum permutat (vt Galenus asseruit, & experimento comprobatur) cum calida in ea macerantur medicamenta: quando quidem & ipsa facile alias recipit qualitates.

Gleucini consideratio.

Plinij lapsus.

Αμαράκινον

AMARACINVM.

CAP. LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino oleo, & balanino: spissamentis è xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis: conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassia, carpobalsami, & mirrhæ odoribus: aliqui, quò pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem, & vinum affumuntur: hoc in vasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vinam cit: putrilaginibus, ac fistulis perquam vtile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinæ illata sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit: vuluæ subditum menstruos cursus euocat: duritias, ac vuluæ tumores discutit: vulneratis neruis, & musculis cõfert, laneo centunculo modice madefactũ & impositum.

Amaracini
consideratio.

Superius in sampsuchini commentario abunde de Amaracino à nobis dictum est, quo fit, vt hic de eo plura scribere non sit opus. Huius meminit Galenus libro primo de antidotis, dum hedychroam explicat, quod theriacæ admiscetur, vbi diffusius de eo agens scribit, quod sui temporis vnguentarij amaraci loco, ex quo in Cyzico antiquitus parabatur. Maxime imponebant, vt maiorem expiraret odorem. Ceterum se iussisse ait, vt legitimum experiretur amaracinum, id sibi ex solo amaraco preparari, quod et si odoris fragrantia videretur inferius, non tamen viribus imbecillius fuisse testatur.

Μεγαλίονον.

MEGALINVM.

CAP. LVIII.

Factitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit, & profus obliterata est, cuius ad historie complementũ meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hæc tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguentis, neq; tutelæ, neq; voluptatis gratia adijcitur, sed coloris, crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, cum de resina differemus.

Ηδύχρονον.

HEDYCHROVM.

CAP. LIX.

Quod Hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditum vitibus, & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

Hedychroi
compositio
ex Galeno.

Hedychroi compositionis meminit Galenus libro primo de antidotis, cum omnia, quæ continet, odoramenta vno subacta Andromachi theriacæ recipiat. Ceterum et si hedychroi parandi rationes plures dicat reperiri, vnã tamen elegit, quam hoc modo descripsit. Hedychroam habet in ari drachmas duas: asari, amaraci, aspalathi, schœni, calami odorati, phu pontici totidem: xylobalsami vero, & opobalsami, cinnamomi, costi, singulorũ drachmas tres: myrrha drachmas sex, totidem folij malabathrini, nardi Indica, croci, cassia: duplo autem plus amomi, aduecta vero ex Chio abundante plurimis fontibus insula, mastiches drachmam vnã: vino salerno omnia excipe. Cum igitur hæc misceueris, fac trochiscos similes theriacis, & scillinis, quos exiccabis eo modo, quo diximus. Productus fuit Galenus, vt hunc parandi modum describeret, tum quod Andromachus hedychroam (vt inquit) nullibi literis mandauerit: tum etiam vt rei medicæ imperitos doceret, quidnam esset hedychroam in theriacæ preparatione, ne in eorum errorem caderent, in quem sua ætate medicum quendam Romæ lapsum fuisse commemorat: qui compositurus antidotum, quarebat apud myropolas Hedychroam, existimans esse herbam, aut radicem, aut quodpiam simplex medicamentum, id quod etiam hæc nostra tempestate quàm plurimum euenisse comperimus. Auicenna, & ceteri Arabica familia scriptores in sua theriacæ compositione hedychroam trochiscos Alindaracaron appellauerunt: tradentes varias eorum compositiones, in simplicibus medicamentis, pondere, & mensura à Galeni doctrina plurimum differentes. Quare mirari non licet, si iamdiu legitima Theriacæ compositio infelicitate successerit, cum & ab Arabibus, & à myropolis, adulterinis medicamentis fuerit deprauata.

Alindaraca-
ron Auicena.
Theriacæ
deprauatio.

Μετοπίονον.

METOPIVM.

CAP. LX.

Fit in Agypto vnguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mitionem: nam lignum, in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amygdalis amaris, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano, & resina. Probat pingue, graui odore, quod magis cardamomum, & mirrhã, quàm galbanum respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atq; extrahit: ora venarum aperit: vlcera purgat, extrahitq;: ad præcisos neruos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis, & malagmatis inferitur: horroribus, conuulsisque, præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur: sudores ciet, vuluæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat. In summa molliendi naturam habet.

Μενδηςιονον.

MENDESIVM.

CAP. LXI.

Mendesium constat balanino oleo, mirrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Στάκτη.

STACTE.

CAP. LXII.

στακτ, valde
non leg. Ori.

Stacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tusæ, & organo expressæ. Ea perquam odorata ac pretiosa est, atq; vnguentum per se facit, quod Stacte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam

nullam olei mitionem admittit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfactoriam, myrrhae, & calidis vnguentis respondentem habet.

Stacte Serapioni, quemadmodum & reliquis Mauritanis, pariterq; officinis, Styrax liquidus appellatur, cuius copia non solum Venetijs ubique venalis habetur, sed & in omnib. ferè officinis reperitur, qua medicamentorum componendorum artem exercent. Quod autem Stacte myrrha sit liquidus vocatus Styrax facile probat Serapio, quippe qui capite de Styrace calamita, liquidum styracem ex myrrha primum aqua conspersa, ac deinde expressa, fieri tradidit: qua in re Dioscoridè ad vnguem imitatur. Cui quidem sententia illud adstipulatur, quod liquidus styrax (de legitimo sanè liquor) sit perquam odoratus, & gustui non obscure amarus. Porro animaduertendum est, quod hoc auo syncerum haud facile inuenias, vt ferè me euenit cum ceteris medicamentis, que ex Alexandria Aegypti, vel Syria ad nos conuehuntur. Siquidem cum omnia hac per Mauritanorum, Turcarum, Iudaorumq; manus transeant, qui nobis Christicolis semper dolos, fraudesq; moluntur, Diu sacrificium facere sibi persuadent, cum nos aliqua in re fallere possunt. Ceterum, vt redeam, vnde diuerteram, mea quidem fert opinio, si synceram stacten nancisci possemus, non alienum fore, ipsam in myrrha locum substituere. Sed certè perquam difficile erit legitimam inueniri, nisi forte vera stacte sit liquor ille, de quo superius in balsami commentatione diximus.

Stactes consideratio.

Styrax liquidus. Medicam. peregrina cur adulterentur.

Stacte à stillando dicta: licet sint qui non tantum Myrrhae propriam vocem esse velint, sed aliorum etiam liquorum ex arborum truncis distillantium, idque ex Plinio lib. 17. cap. 11. colligentes: attamen cum Galenus stacten myrrhae, Aegineta stillatitiam myrrham, & Plinius lib. 12. cap. 16. Myrrhae arbores sponte priusquam incidantur stacten fundere scribat, stacten Myrrhae liquorem dicimus, qui in Mecha Arabia ex myrrha exprimitur: quod tamen à Styrace diuersum, cum styracis & Myrrhae arbores sint diuersae: huius lachryma in aqua resoluitur: illius verò in oleo: stacte magno, styrax paruo emitur: item stacte amara, styrax non item. Casalpinus Asam dulcem, Stacten credidit: Athenæus vult appellatione vnguenti Aegyptiaci, stacten venire.

Κινναμόμινον.

CINNAMOMINVM. CAP. LXIII.

CINNAMOMINVM confit è balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis: atque cinnamomi, & feminis balsamini suauitate conditur, quadruplaque myrrhae ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque vllam odoris gratiam adiicit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit: humores & spiritus attrahit, caput aggrauat: contra vuluæ vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimoniae exolescit, & quædam emolliendi vis contrahitur: alioqui adurit, & præ omnibus crassis vnguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas, & vlcera, quæ putredinis vitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, gangrænasq; cum cardamomo: quin & ad febrium horrores, & tremores aduersus serpentium morsus illinitur: scorpionum, & phalangiorum ictibus, cum tritis grossis imponitur.

2 Drag. δεινμον ἢ δειντό δειμύ. i. probatur quod acre est.

Νάρδιον.

NARDINVM. CAP. LXIII.

RATIO Nardini faciendi euariat: nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunque autem balanino oleo, aut omphacino. Iuncus odoratus spissamenti gratia adiicitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ, aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, calfacit, abstergit humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, & nardo.

Μαλαβάρθρινον.

MALABATHRINVM. CAP. LXV.

MALABATHRINVM spissamenta nardi habet: in super myrrhae plusculum additur. Qua de causa calfacit, crocino, aut amaracino viribus respondens.

Ιάσμινον.

IASMINVM. CAP. LXVI.

APVD Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ, quorum sextans in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, vt in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum vsurpatur odoris causa. Quinetiam toti corpori conuenit, præsertim cum in balnea descensum est. Sed iis opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemque desiderant: grauius tamen spirat, quam vt libenter à plerisque recipiatur.

Ex meis Dra. & Car Exemplaribus nullū habet hoc caput.

Iasminum vnguentum non eo quidem silentio prætereundum duximus, quo aliqua in præcedentibus à nobis omissa sunt: in illis enim nihil sanè, in hoc verò aliquid nobis sese offert declarandum. Itaq; primum scire conuenit, quod Iasme vocabulum apud Græcos, aliorum etiam testimonio, nil aliud significat, quam violaceum. Et certè cum scribat Dioscorides, vnguentum hoc fieri ἐκ τῶν ἀρωγῶν τῶν λευκῶν ἴσιν, hoc est verbum verbo reddendo, ex floribus albis viola, id violaceum merito appellari debet. Sunt tamen è recentioribus, qui pro certo sibi persuadeant, vocabulorum fortasse vicinitate decepti, illud ex floribus iis perquam odoratus fieri, quos in Italia Gelsomini vulgò appellamus. Quorum opinioni non parum suffragantur tum Hermolaus Barbarus, tum Marcellus Florentinus. Qui præcipue, vt suam comprobet sententiam, veteres asserit, præsertimq; Dioscoridem, inter leucoidi genera nostratem gelsiminum comprehendisse, illudq; speciatim gelsiminum intellexisse.

Iasmini consideratio.

Hermolai, & Marcelli opinio improbat.

lexisse, quod floribus caeruleis prouenire nonnulli pro certo asserunt. Cuius sententiam non modo non probandam censet, sed omnino refellendam existimo: siquidem nullo pacto cogitandum est, nedum credendum, quod Dioscorides, qui in simplicium historia, & in eorum declarandis separandisque generibus, omnium diligentissimus fuit, adeo imprudenter nullo discrimine existimauerit caeruleam leucoium gelsiminum esse: cum id foliis viticuloso caule, radicibus, ramis, floribus, ceterisque, notis ab omni leucoio distideat. ed hoc verum esse Marcello concedamus, etsi minus concedendum sit, quam ratione dicet vnquam, Iasminum vnguentum fieri ex floribus gelsimini, quod caeruleum Dioscoridis leucoium esse asserit, si Dioscorides ipse palam prodit, Iasminum ex albis violis temperari? Ad hac differre Gelsiminum a leucoio abunde ostendit Serapio, qui non modo fuit Dioscoridis imitator, sed etiam interpret, cum alterum ab altero diuersis capitibus distinxerit, & de vtrisque, tanquam de rebus diuersis differuerit. Quinimo de gelsimino agens capite centesimo septuagesimo sexto nullam Dioscoridis, nec Galeni auctoritatem affert, sed tantum sua gentis monumentis inhaeret, asseritque gelsiminum floribus tum albis, tum luteis, tum caeruleis reperiri, quale etiam atate nostra visitur. Quod nobis maximo argumento esse potest, vt credamus, gelsiminum Dioscoridi caterisque veteribus incognitum fuisse. Caterum cur Arabes stirpem hanc IESEMIN

Iesemin vnde dictum.

Iesemini vires ex Serapio.

GELSIMINUM.



Ioannis de Vigo lapsus.

Gelsimini descriptio.

nam semen edit, lapino simile, quod a Doctissimo viro Iacobo Antonio Cortusa Patavino mihi missum est. Amat amara & calidos tractus, passimque habetur in hortis & viridariis. Oleum quod ex eius paratur floribus in eo insolatis, liliis facultatibus equiparari potest ad omnes frigidos dolores, excalfacit enim & laxat. Illinitur quoque vtiliter mulieribus, ad frigidos uteri cruciatus, frigidisque quoscunque neruorum, & articularum affectus. Fit etiam iisdem ex floribus oleum aliud ab vnguentariis tantum ad odoramenta, recentibus floribus, delibratis dulcibus amygdalis commixtis, pluribus replicans vicibus, quousque nubes humorem odoratum combiberint. Tunduntur deinde in lapideo mortario, & calida sacculis conclusa premuntur. Reddunt enim oleum perquam odoratum, quod etiam in medicum usum venit, quod viribus iis polleat omnibus, quibus suum pollere scribit Dioscorides. Gelsiminum, Italicè appellatur Gelsimino: Arabice Iesemin, & Zambach, siue Sambach.

Oleum è Iasmino.

Nomina.

Iasminum, quasi violaceum, a violis quas ita vocant: vel Iasme quasi violæ odor: aut Iasme quasi medicatus odor. Zambach & Sambach Arabibus: quibusdam Apiaria, quod apes eius floribus plurimum delectentur: an Smilax leuis Dioscoridis, & Smilax redolens Homero? quibusdam Pothon album Theophrasti. I. Iasminum album C.B. Lugd. Tab. Viola perfica, Parthica & peregrina, Hermolao: Iesiminum Marcello: Iasminum primum, Anguill. Iasminum, Dod. Cord. in Diosc. Clus. Iasme & Sambac, Gels. hort. Gelsiminum vulgatius, Lob. Gelsiminum, Cast. Cæf. Cam. II. Iasminum Hispanicum grandiflorum C.B. Hoc ex radice, caudice recto, fungoso, leui, non admodum crasso fruticat, cuius rami cubitum vel sesquicubitum longi, virides & tenues, cortice vna parte rugoso vestiti: è quibus prodeunt folia, quam in Iasmino albo breuiora, nigriora & rotundiora: in virgarum summitatibus flores, qui antequam dehiscant subpurpurei apparent, aperti intus candicant, foris purpurascunt, ex quinque foliis compositi, quadruplo aliis latiores, ampliores & venosiores, sed rariores, odore acriori & suauiori: floret autumno & penè tota hyeme: Hæc à Græcis & Turcis in multis Peloponesi locis studiosè colitur: quæ primum è Chio insula Genuam, & inde in alia loca aduecta, nam Patavii, Lugduni, & Basileæ in vrcis pensilibus cultam obseruauimus: vt autem propagetur in vulgari inseritur. Dicitur Iasminum tertium, Anguill. Chamægelsiminum grandiflorum, Lobel. Gelsiminum Catalonicum, Cam. in Marth. Gelsiminum

LASMINVM HISPANICVM
grandiflorum.

minum humiliter primum, Cæs. lasminum puniceū, Lugd. lasminum candidiflorum, Tab. Habetur & flore luteo, & caeruleo, quam Clematidem alteram faciunt: quaedam folio capillaceo, flore rubro, quod Geliemum alterum rubrum, Cæsalp. & Quamochit. Cam. dicitur. Habetur etiam lasminum Indicum Clus. Cam. quod rubrum Cæsalp. & Lugd. vocatur, quod potius ad Solanum, vel Mandragoram referendum videtur.



Σμύρα MYRRHA. CAP. LXVII.

MYRRHA lachryma est arboris, quae in Arabia ^{α τὸ ὄριον} gignitur, ^{Ελεχε} Egyptiae ^{ειπηγυμέ} Ipinae non dissimilis: cuius ^{τοῦ κάλλιου} vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes: alia ^{ειπηγυμέ} circum caudicem cōcrescit. Dicitur ex his aliqua ^{τοῦ κάλλιου} per diaphanos praepinguis, quae expressa, lacte emittitur. i. alia vero Alia gabirea pinguis, laro & pingui solo nascens: quae in caule ea copiosam ludad stacten. Omnium prima est, quae ^{concresecit} Trogodytica appellatur, accepto cognomine a loco, in quo provenit, splendens, subviridis b ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quaedam, quae a Troglodytica secunda est, bdellii modo mollis, verum o ^{melior est} dore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis ^{leg. Orib.} cognominatur praeter modum exoleta, nigra, & retortida. Omnium deterrima quae ergasima dicitur, pingui carens, c cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex iis pastilli fiunt, sed e pinguis pingues, & odorati: c sicciorebus haudquaquam pingues, & inodorati. Minus odore pollet, quae

oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maderit. Eligenda est recens, d fragilis, leuis, vndique concolor, quae confracta venas vnguium modo candidas & laeues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: superuacua, & inutilis est ponderosa, coloris piceae. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccit, astringit, vuluam emollit, & praclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum absinthio, lupinorum cremore, vel succo rutae admixta: tuberculo fabae deuoratur in vetere russi, orthopnoea, in laterum pectorisque doloribus, in atui profluo, & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones, fabae magnitudine pota cum pipere & aqua: subdita linguae liquataque, scabritiem arteriae expolit: obtusam vocem expedit, ventris teneas enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiuas, & dentes stabilit colluto cum vino, & oleo ore: vulnera capitis illitum glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleae carnibus: item purulentis auribus, inflammatisque cum meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum cassia, & melle illinitur: impetigines ex acetone purgat: defluentes capillos cum ladano, & vino myrteo illita, firmat: diurnas destillationes lenit, † illitis penna naribus: oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem laeuigat. Fit e myrrha, perinde atque thure, fuligo: & vt postea ostendemus, ad eadem conueniens. Bœotica myrrha dilecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est, quae myrrham odoris suauitate representat. Vis ei calfactoria inest, emollit, discutitque: suffimentis commodissime inseritur.

MYRRHA quae ex Alexandria Aegypti hac atate ad nos affertur, admodum sanè ab ea differt, quam inter praestantissimas Myrrha species recensuit Dioscorides. Quippe vniuersa ferè myrrha, quae in officinarum usu habetur, iis omnibus ^{Myrrhae consideratio.} qualitatibus, ac notis destituitur, quibus optima commendatur. Namque ea (vt videre est) minime virescit, pinguis non est, non odorata, non vndique concolor, nec confracta venas vnguium figura leues intus ostendit, nec sapore acri deprehenditur, tametsi gustui amaritudinem relinquat. Verum si fortasse cuiquam videretur & hac inter Myrrha species esse recipienda (quod tamen non satis compertum habeo) aut cacalim, aut ergasimam, esse crediderim, aut potius quam Plinij ex India deferri ait, cum haec ceteris deteriores habeantur, certo sciamus ex India in Alexandriam myrrham importari. Nam ea, quae plurima ad nos affertur, non modo sicca, nigraque est, sed etiam retortida, macilenta, & cano quodam situ obducta: & quanquam inter huiuscemodi globulos aliquod quandoque reperiat fragmentum, quod & clarum sit, & pellucens, confractum tamen diuersicolor apparet. Ecquid magis? nec gustui insigniter amarum, nec myrrha odore praeditum sentitur. Quo fit, vt credere liceat, eiusmodi Myrrham aut e deterioribus esse, aut gummi alicuius, aliarumque mistionum adulterio minime vacare: hac enim impostura (vt Dioscorides inquit) myrrha adulterari solet: sed hac ita de illa cōticimus, quae passim vulgaris habetur. Ceterum electam Myrrham iam ad nos aduehi scimus, quae & legitima, & probatissima esse censetur: verum ea haecenus tam rara est, vt non nisi ad ostentationem asseruetur, & ad aliarum dignoscendarum regulam. Habebatur myrrha Galeni tempore in opocalpasum, quod calpasi lethalis, venenosaque est lachryma, conuersa, vt Cassia in cinnamomum, & Galbanum in Sagapenum. Idcirco libro primo de antidotis, Opocalpasum (inquit) exitiale est, multoque nos sorte quadam vidimus nostra atatis decursu mori, quod inscii myrrham, cui opocalpasum admixtum erat, assumpsissent. De industria namque nonnulli eorum, qui antidotos preparant, vt laudatissima imponebant, eo quod viderent collyriis inditam optimum esse medicamentum. Quippe quae pus citra mordicationem discutiat: & interdum in-

Braſanoli opinio impro-
bata, volentis
Myrrham of-
fic. eſſe Bdellium.

Myrrhæ hiſt.
ex Plinio.

Myrrhæ hiſt.
ex Theophr.

Myrrhæ vires
in febr.

Ol. Myrrhæ.

Fucus ex
Myrr. ad ru-
gas.

Myrrhæ vires
ex Galeno.

cipientem oculorum ſuſſuſinem ſubſtantia tenent: ſive autem in emplaftrum, ſive in ceratum, ſive in aliquod digiti-
mentum, quod extrinſecus imponitur, huiusmodi myrrham iniicias, vim ipſius augebis: at intra corpus aſſumptum
letale eſt medicamentum. Hæc igitur ſuſius dicta ſunt, tum quod orationis ſeries ita expoſtularet, tum etiam quia hæc
ſeculari non eſt inutile: hæcenus Galenus. Adhibenda itaque diligentiſſima eſt, ne & nos Myrrham quandoque opocalpaſo
adulteratam emamus. Ad hæc Braſanolo Ferrarienſi animus inclinare videtur, vt exiſtmet Myrrham officinis vulgarem,
bdellium eſſe. Cui hæc quaſquam aſſentiendum putauerim: ſiquidem myrrha hæc pellucens aded non eſt, nec taurino gla-
tino ſimilis, vt bdellium eſſe tradidit Dioſcorides. Et licet quadam noſtratis myrrha fruſtra quandoque translucida repe-
riantur, ſunt tamen potius hæc (vt dictum eſt) gummi adulteria, quam myrrha, vel bdellium: nempe guſtu maleficium de-
legitur. Præterea bdellium incoſum (Dioſcoridis teſtimonio) odorem vnguibus odoratis ſimilem ſpirat, quod in noſtrate
myrrha nunquam, factò periculo, ſum conſecutus. Huius etiam alia accedit ratio, quæ magis ac magis Braſanoli animum
inuenire poterit: quod ſcilicet bdellium diu digitis ductum, tractatumq; facile lentefcat, & conſtractum pingue ſpectetur:
myrrha verd, quæ officinis venditur, digitorum attritu conteritur, & ſi frangatur perquam aridã ſeſe offert. Caterum im-
probant Dioſcorides, omniumq; Myrrhæ ſpecierum deterrimam iudicauit, quæ aliquibus minea, aliis aminnea vocatur:
quam cum Galenus probauerit libro primo de antidotis, omnibuſq; Troglodyticis prætulit, factum eſt, vt exiſtimauerint
quidam, in hoc loco Dioſcoridis codici mendam ſubefſe. Sed cum in Dioſcoride Græco legatur aminnea, & in Galeno mi-
nea, ego potius crediderim, eos non idem myrrhæ genus intellexiſſe. Plinius lib. 12. cap. 15. myrrhæ arboris faciem diligenter
expreſſit, his verbis. Myrrham in iſſdem ſyluis, vbi & thus, permixtam arborem naſci tradidere aliqui: plures ſeparatim,
quippe multis in locis Arabia gignitur. Conuehitur & ex ſyluis laudata, petuntq; eam etiam à Troglodytis Sabæi tranſi-
tu maris. Satiua quoque prouenit multum ſylueſtris præalata. Gaudet raſtris, & ablaqueationibus: melior radice refrigerata.
Arbori altitudo ad quinque cubita, nec ſine ſpina, caudice duro, & intorto, craſſiore quam thuris, & ab radice etiam,
quam aliqua ſui parte: corticem lauem, ſimilem q; vnedoni: ſcabrum alii ſpinoſumq; dixerunt: folium oliua, verum criſpius,
& aculeatum: iuba oliuæ ſari. Aliqui ſimilem iuniperi, ſcabriorem tantum, ſpiniſq; horridam, folio rotundiore, ſed ſapore
iuniperi. Necnon ſuere qui è thuris arbore vtrumque naſci mentirentur. Inciduntur hiſ & ipſa thuris modo, iſſdemq; tem-
poribus, ſed à radice vſque ad ramos, qui valent. Sudant autem ſpontè priuſquam incidantur, ſtaçten dictam, cui nulla
praefertur. Ab hac ſatiua, & in ſylueſtri quoque melior aſtiua. Non dant ex myrrhæ portiones Deo, quoniam & apud alios
naſcitur. Et ſequenti capite inquit. Adulteratur myrrhæ leniſſi glebis, & gummi: item cucumeris ſucco amaritudinis cau-
ſa, ſicut ponderis argenti ſpuma. Reliqua vitia deprehenduntur ſapore gummi dente lentefcentis. Faciliſſimè autem adulte-
ratur Indica myrrhæ, quæ ibi de quadam ſpina colligitur. Hoc ſolum peius India aſſert, faciſſi diſtinctione, tantò deterior
eſt: hæc Plinius. Quo ſit, vt facile crediderim noſtri vſus myrrham Indicam eſſe: namque per mare rubrum, & inde per Ca-
rouanas (vt dicunt) Alexandriam importatur. Myrrhæ quoque hiſtoriam non iniucunde ſcripſit Theophraſtus lib. 9. cap. 4.
de plantarum hiſtoria, ſic inquit. Gignitur thus & myrrhæ regione Atabum media circa Saba, & Adramyſſa, & Citi-
bana, & Mamali: & exeunt thuris, myrrhæq; arbores alia ſuper montem, alia in pede mōtis culturis propriis: quamobrem
alia coluntur, alia vitam agunt inculta. Montem iſtum præaltum aſſerunt, & ningi ſolitum: amnes quoque de eo in
plana fluere. Myrrhæ arborem thure altitudine minorem, fruticoſioremq; narrant: caudice duro, contortoq; iuxta terram
craſſiori q; ſura hominis, cortice laui adrachma ſimili. Alii verd, qui ſe vidiffe aſſerunt, de magnitudine ſerè conſentiunt:
neutram earum arborum magnam referunt, & minorem myrrhæ humilioremq;. Sed thuris folium laurinum, laueq;
myrrhæ aculeatum, non laue, ulmeo ſimile, criſpum tamen, extremo ſpina horridulum, ilignei modo. Idem ea nauigatione,
qua ex ſinu heroum vehementer egreſſos ſeſe aquam in monte quaſiſſe dixerunt, atque ita vidiffe hæc arbores, & lectionem
notaſſe hoc modo ambarum: & caudices, & ramos incifos quidem, ſed alios veluti ſecuri percuffos videri, alios tenuiores
incifuras habere: & lachrymam aliam decidere, aliam arbori inharere: nonnuſquam etiam ſubiectas tegetes ex pabnis
contextas, alibi ſolum tantummodo circumpauimentatum. Montem autem vniuerſum Sabæis diuiſum dixerunt: hos enim
locus illius dominos eſſe, iuſſitq; mutua degere, quamobrem nullum ſuas arbores cuſtodire: vnde & thus, myrrhamq; ſeſe
largè ad naues ſolitudine deportaſſe narrauerunt. Illud quoque ſe audiuiſſe dixerunt, myrrham, thusq; collectum vndique ad
Solis delubrum conuehi: quod Sabæorum eſſe ſanctiſſimum inter omnia regionis illius, cuſtodeſq; Arabes armatos habere,
quibus ſingulos ſuum thus aceruatum, & myrrham eodem modo relinquere, poſita ſuper aceruum tabella, literis ſigni-
ficante numerum menſurarum, & pretium, quod pro ſingulis menſuris ponendum ſit: mercatores verd, qui venerint, tabel-
las aduertere, eiſq; quod placuerit, acta menſura pretium in eodem ponere loco, vnde merces acceperint: ſacerdotem de-
inde venire, parteq; tertia pretii Deo accepta, reliquum ibidem relinquere: idque ſeruari tutiſſimè dominis, donec acceptum
venerint. Alii myrrhæ arborem terebintho ſimile reddidere, ſed ſcabriorem, ſpinoſioremq;: folium paulò rotundius, guſta-
tu proximè terebintho: earum quoque veteres præſtantioreſ haberi. Naſci verd hanc, & thus in eodem loco terra ſubar-
gilia, & ſabuloſa: & aquas fonte fluentes raras admodum comperiri. Hæc ergo illis repugnant, videlicet ningi, & imbribus
perluui, & omnibus locum illum exhilarari. Sed hi quidem altera quoque longè maiore ignorantia laborauerunt: thus enim
& myrrham naſci ex eadem arbore putauerunt. Quamobrem veriſimilius ipſi narrauerunt, quos ex heroum oppido
proſectos nauis retulimus. Myrrhæ aliud ſtillatitium, aliud ſcittitium conſtat. Probatur melior guſtu, eiſq; norma concolo-
rem accipiunt: hæcenus Theophraſtus. Myrrhæ drachma ex vino Cretico calido pota, hora vna ante paroxyſmum datur
vtiliter quartanariis, ſed ſudare eos in lecto ſtatim oportet, tribus replicatis potionibus, in ipſis acceſſionibus. Hoc medica-
mento ego ipſe curatus ſum. Valet quoque ad idem in Catapotis cum Theriaca conformatis, magnitudine ciceris. Horum
ſi vnum quotidie voretur, hora vna ante paroxyſmum, quartanarii bene habebunt. Myrrhæ ponitur in Antidotis, quæ ad
venena, venenorum animalium icthi, & aduerſus peſtilentiam parantur. Fit quoque è Myrrhæ oleum, quod ita paratur.
Decoquantur oua gallinarum, quouſque dura ſiant, deinde ſecantur ſecundum longitudinem in duas partes æquales, &
exemptis vitellis, replentur Myrrhæ puluere, condunturq; in humido loco, donec Myrrhæ liqueſcat in oleum. Huius vires
ſunt ad tollendas vulnerum cicatrices, & faciem erugendam, vbi frequenter illinatur. Caterum alio quoque myrrhæ ſu-
co mulieres nonnulla faciem abſque rugis præſeruant. Admovent igni ferream nouam patellam, quouſque cædeſcat, dein-
de vino albo cū impetu ore proiçto, patellam ipſam reſtingunt, mox capite linteo amplo contexto, vaporè facie excipiunt,
ſubinde in eandem patellam ruruſ igne candente Myrrhæ contritã proiçunt, eodemq; linteo contexto ſumum recipiunt,
dein ipſomet linteo faciem contegunt, & dormitum ſe conferunt. Fit eiſmodi ſuco, ſingulis octo diebus parato, vt ea per-
petuo erugata, iuuentutem etiam iam ſeneſcentes mentiantur. Myrrhæ meminit Gal. libr. 8. ſimplicium medicam. vbi ita
ſcriptum reliquit. Myrrhæ ſecundi ordinis eſt tum excalfacientium, tum deſiccantium. Itaque capitum vulneribus illiſ
glutinare ea poteſt. Ineſt & amaritas non pauca, per quam ſætum, & lumbricos tum enecat, tum elicit: adeſt hinc ei
& ab-

& abstergens potentia. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, vti que qua ad vlcera, & crassas cicatrices preparantur. Eadem de causa inditur & medicamentis, que ad tussim veterem, & asthma, siue anhelationem exhibentur: non tamen arteriam exasperat, sicut abstergentium nonnulla, verum adeo moderatam obtinet absterfionem, vt nonnulli eam arteriacu que vocant, medicamentis commisceant, tanquam sufficienter excalfaciens, & desiccans medicamen: scilicet absterfionem proficiscentem ab amaritudine nihil verentes: hac Gal. Porro vbi myrrha desit, Gal. in succedaneis (si tamen liber in Galeni est, nobis enim spurius censetur) odoratum calamum supplet. Constantinus vero amaras amygdalas eodem pondere. Sed equidem hic myropolas admonitos velim, vt nullo pacto eorum sequantur doctrinam, qui iubent, Auicenna auctoritate male intellecta, myrrha loco piper nigrum supponere. Namque Auicenna hanc sententiam omnino refellit, cum vtatur his verbis: pro myrrha substituendum piperis nigri dimidium aliqui perhibent: sed hoc falsum est. Postremo illud etiam notandum est, quod (vt Gal. inquit lib. 2. de comp. medic. per genera) myrrha semper medicamentis est commiscenda, cum ab igne tolluntur: quippe qua coqui minime patiuntur, veluti etiam thus, & aloë. De Bæotica autem myrrha, quid dicam non habeo, quod a tate nostra sit (vt arbitror) omnibus incognita. Σμύρα sic Grecis dicta, Myrrha Latinis appellatur: Ler Mur, seu Mor, Arabibus: Mirrha, Italis: Mirthen, Germanis: Mira, Hispanis: Myrrhe, Gallis: Myrrha, Bœotia.

Myrrhæ succedanea.

Bœotica myrrha. Nomina.

† Exemplaria Græca typis expressa habent, διαχειρομένη πρὸς τῆς μύρω τῆς ἰατρίας, id est, illa alæ narium. Quæ verba inunctionem ad partem nasi referre videntur, non autem ad instrumentum, quo debeat fieri inunctio. Siquidem, teste etiam Galeno lib. 11. de vsu partium, πρὸς seu πρὸς τὴν partem quadam nasi vocatur.

Myrrha, *μύρα* Hippocrati: communis opinio, nobis non esse veram Myrrham: aliqui tamen existimant Benloinum officinarum, veram esse Myrrham. Sic Beniouinum Amygdaloides, esse apud Dioscoridem Myrrham Troglodyticam, Gummi verò quod Lusitani Anime vocant, multi Myrrham Amineam Dioscoridis statuunt. Sic & Indicam Myrrham à Plinio vocatam eam esse, qua vera Myrrha adulterabatur. De Bæotica Myrrha quæ proponit Dioscorides, videntur non genuina, quod ex Serapione capite de Myrrha colligi posse videtur, qui non radicem arboris dicit, sed inquit, Myrrha quæ est ex terra, quæ dicitur Laptoteno, id est Bæotia, abscinditur ex radice arboris, quæ est in terris illis: vult ergo ex radice excindi, quemadmodum incisione elici solent reliqui liquores: at hæc hodie omnino non cognoscitur.

Στύραξ.

STYRAX

CAP. LXVIII.

STYRAX lachryma est arboris malo cotoneæ similis. Praefertur pinguis, flauus, resinofus, albicantibus grumis, quam plurimum in sua odoris gratia permanens, qui dum mollior, melleum liquorem reddit: qualis è a Catabalis, Pissidia, & b Cilicia deuchitur. Deterior niger, surfurosus, c friabilis, cano que situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummiu similitudine, perlucida, & myrrhæ æmula: verum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam aliis. Alii ceram, aut adipem odoribus imbutum, fragrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, vñundantque. Styracem hunc, † quoniam in vermiculorum speciem contrahatur, scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluæ præclusæ, duritiæ laboranti conuenit: cit menses potu, apposituque: aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisque. Adoletur autem, & igni torretur, vt fiat ex eo veluti ex thure, fuligo: ad eadem conueniens, ad quæ thuris fuligo. Ex coetiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calefacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, aggrauatque, & soporem adfert.

a Orib. leg. b γαβαλίτη λύκος. c Meum, habet tantum γαβαλίτη. i. friabilis.

STYRAX.



Styrax officinalis
Styrax
Sp.

Styracis planta proceritate, ac forma malo cotoneæ est similis. Folia tamen longè minora profert, auersa parte albicantia, solidaque, robusta, oblonga paulo, latiore tamen ambitu. Flos est illi albus, aurantiæ mali haud longè dissimili. Baccas profert longo pediculo appensas, & tenui quadam lanugine obductas, rotundas, & in acutum desinentes, nucis ferè Pontica magnitudine, in quibus aliquot concluduntur ossicula semen continentia. Habentur Styracis planta in Italia non solum in hortis nonnullis, ac viridariis, sed etiam sponte promerentes in Romano, ac Tyburtino agro: sed in Italia gummi non proferunt. Hanc plantam vidi ego primum Venetiæ, in viridario clarissimi medici Massei à Masseis, vbi alia planta & rara, diligenter coluntur. Gummi, quod è Styracis planta emanat, vocatur passim in Italicis officinis Styrax Calamita, quod

quod cognomen ex Galeno libro primo de antidotis acceptum crediderim. Namque ipse de simplicibus medicamentis agit, qua ad tberiacam compositionem faciunt, optimum iudicavit styracem, qui in calamus e Pamphilia ferebatur: vnde calamita cognomen sibi facile vendicavit. Itaque cum non alius habeatur styrax, qui sit hoc genere praestantior, in usu medentium est, vt dum pharmacopolis imperant fieri medicamenta, qua styracem excipiunt, calamita cognomen adiciant, quo inducent, se primum doriibus intelligere. Nec illud quidem ab re: quandoquidem Galenus eodem loco memoria prodiderit, hoc styracis genus tantum prestare cateris, quantum vinum salernum illud bonitate excellit, quod a cauponibus venditur. Quo argumento fretus Manardus Ferrariensis existimavit, vbi in Dioscoridis codice legitur τοῦτος ἔστιν ὁ καταβαλίτης, hoc est, talis est Catabalites, potius legendum esse, talis est calamites. Neque probat lectionem mutandam esse in Gabaliten, quemadmodum fecit Marcellus. Sed profecto hac in re (et si Manardus fuerit vir summa doctrina praeclitus) mihi magis Marcelli sententia probanda videtur, quippe qua Plinii testimonio comprobatur lib. 12. cap. 25. vbi sic inquit. Styracem Syria Iudaea proxima supra Phoenicem gignit circa Gabala, & Marathunta, & Casium Seleucia motem. Atque etiam ei

Manardi lectio non probata.

Fuchsii opinio styracem calamitem liquidum fuisse reprobata.

adstipulatur Oribasii codex manuscriptus, in quo lib. 12. legitur γαβαλίτης & non καταβαλίτης. Porro Fuchsius medicus nostra aetate clarissimus, in libro, quem de compositione medicamentorum secundo condidit, styracem calamitem liquidum fuisse censet, non alia (quantum equidem video) ratione fretus, quam quod in calamis adueheretur. Verum in hoc Fuchsio (pace eius dixerim) a veritate desiscit, quandoquidem Dioscoridis styrax lachryma est arboris malo cotoneae similis cuius ille praestat cateris, qui suauis est, resinofus, grumos habet albicantes, & dum molitur, melleum liquorem reddit. Ex quibus facile constare arbitror, styracem non fuisse liquidum, sed in grumos concretum. Neque certe mihi rationi consonum videtur, ex eo quod Galeni tempore styrax in calamis vehebatur, inferre ipsum fuisse liquidum. Nam (vt mea fert opinio) non alia de causa qui styracis lachrymam colligebant, eam statim in calamis includebant, quam vt suavis eius odor conferretur. Id quod etiam cum dictamno faciebant ii (vt memoria prodidit Theophrastus lib. 9. cap. 16. de historia plantarum) qui ipsum in Creta legebant: siquidem ii dictamni manipulos in ferula, aut arundine intercludebant, ne vis eius exspiraret. Praeterea cum apud veteres Graecos nulla (quod legerim) extet liquidum styracis mentio, haudquaquam possum huic Fuchsio sententiae adhaerere: quinimo cogor eam prorsus resellere, quod rectius sentire videar cum Arabibus, & recentioribus, qui per liquidum styracem non aliud intelligunt, quam stattem myrrha. Ceterum Plinio loco citato laudatur styrax post supradicta, ex Pisidia, Sidone, Cypro: e Creta vero minime. Reddidit Plinius causam, quare est, quod styrax plerumque puluerulentus existat, dicens, quod in eam circa canis ortum aduolant pennati vermiculi erodentes, ob idque ipsum in scobe sordescere. Adulteratur etiam styrax (vt idem scribit) cedri lachryma, vel gummi, melle, aut amari amygdalis: quocirca retinenda sunt nota, quibus Dioscoridis auctoritate praestantissimus cognosci potest. Paratur e Styrace oleum odoratum hoc modo: styrax biduo e rosatum aqua maceratur, deinde vna cum aqua in vitreo vase, luto circumlimito collocatur, hanc rostrato lambico superimposito & in fornace collocato, ignis sit moderatus, quousque aqua tota in recipiens vas destillauerit. Cum vero oleum fluere inceperit, fortiore igne opus est, donec totum effluerit. Praestabit hoc oleum non

Fuchsii opinio styracem calamitem liquidum fuisse reprobata.

Styracis adulteratio.

Oleum ex Styrace.

Styracis vites et Galeno.

Nomina.

solam ad odoramenta, sed etiam ad ea omnia ad qua styrax: est tamen longè ad omnia valentius. Huius meminit Galenus lib. 8. simpl. medic. sic inquit: Styrax exsalfacit, emollit, concoquit: quamobrem tussibus, catarrhis, pituita destillationibus, rancedinibusque, quas ἰσχυρὰ καὶ βραχὺ καὶ vocant, prodest. Tum menses seu potum, seu admotum proicit. Combusti eius fuligo, thuris fuligini quodammodo est similis. Στύραξ vt Graece, ita etiam Latine Styrax nuncupatur: Arabice vero Mebu, Mehaha, seu Astarach: Italicè, Storace: Officinis, Storaç calamita: Hispanicè, Estoraque.

¶ quoniam in vermiculorum speciem contrahatur. Hac verba non leguntur in Graecis codicibus: sed ea (vt arbitror) a Ruellio interprete adiecta sunt ob maiorem rei declarationem, qua hanc ob causam, lectore tamen admonito, nobis quoque relinquere placuit.

Styrax triplex in officinis.

Oleum quibusdam Styrax liquidambar quid.

Oleum de Liquidambar.

Onib. non leg. & meum habet Clusius ita etiã Drag. b ioumala- xter. i. quod facile mollescit.

e Meum clusius Non leg. Onib.

Styracis in officinis tres differentiae: styrax calamita, styrax liquida, & styrax rubra. Secuti fortasse Arabes, siquidem Serapio diuisit in liquidum & siccum: per liquidum intelligit modò oleum ex nucleis extractum, modò ipsam arboris lachrymam, modò stillatitium humorem e Myrrha quem Stattem vocat Dioscorides: per siccam verò corticem fructus, postquam expressum est oleum. Auicenna similiter humidum & siccum facit, humidum, vnum qui spontè ex arbore fluit, coloris citrini, quem Storacem calamitam vocant: alterum per decoctionem coloris nigri, quem Storacem liquidum: faeces autem Storacem siccum esse. Videtur sic distinguendum, vt alia sit Styrax calamita, seu rubra, alia styrax liquida, cuius veteres Graecos fecisse mentionem necdum inuenimus: haec censetur quibusdam Oleomeli Dioscoridis: hoc enim ex quorundam furculorum in aqua decoctione fieri tradunt: alia Styrax sicca, seu styracis cortex. Ad styracis genera reduci potest id quod Liquidambar nunc vocant, resina liquida odore styraci similis, quae ex arboris magnae (quam Americi Ocosol vocant) frequentibus ramis ac foliis hederæ, crasso & cinereo cortice inciso aut excauato emanat, cui indigenae corticem contractum (suauioris odoris gratia dum vritur) miscunt. In noua Hispania provenit, & ex India Occidentali adfertur. Cuius differentiae aliquot, aut ex vulnerata arbore effluit: aut ex recenti resina humido loco reposita oleum odoratius stillat, quod ol. de Liquidambar vocant: aut ex hoc oleum exprimitur, minus perfectum, quo chirothecae inficiuntur: aut ex ramis comminutis & coctis pinguedinem innatantem colligunt. Folia in fasciculos collecta cum summitatibus, odoris gratia, vestibibus Indi apponunt, a quibus Hispani emunt. Huius, styracis loco vsus, cum calidum sit in fine secundi & humidum gradu primo: sed oleum longè subtilius, & frigidis morbis vtilius. Haec summatim ex autore historiae Mexiocanae, & Nicolao Manarde desumpta: qua de re & Clusius in Garziam, Casalpinus & historia Lugdunensis, Liquidambar nomine.

ΒΔΕΛΛΙΟΝ BDELLIUM. CAP. LXIX.

BDELLIUM = [alii bolchon appellant, alii madelcon:] lachryma est Saracenicæ arboris. Probatu gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, intus pingue, bliquescent facile, ligni ac fordis expers, † suffitu odoratū, vngui simile. Est etiamnū bdellii genus sordidū, nigrū, vberioribus glebulis in offas cōuolutum, caspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam a Petra oppido d. sicci resinofum.

Tum, & liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec vsque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit, & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasq; hernias discutit cum ieiuna salina dilutum: vuluæ spiracula laxat appositum, & suffitu: & partus, humiditatesq; omnes extrahit: calculos potu comminuit, vrinam mouet: tulsientibus, & a serpente percussis vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus. Malagmaticis inferitur, quæ contra duritias, & neruorum nodos profunt. Contusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

εἰς πονηρίαν.
i. tubliuidum
Me.

10 **P**restantissimum Bdellium Dioscoridi translucidum est, taurini glutinis in morem, amarum, tactu liquefcens facile, & quod incensum odorem emittat vngui odorato similem. Quod si mediò nostro tempore in Italiam importatur, adeo rarum est, vt (quem admodum de myrrha diximus) ad ostentationem tantum afferuetur, vel ad adulterini, & reprobati dignoscendi normam. Credidere quidam, hoc vulgare Bdellium, cuius passim in officinis est vsus, constare partim ex nigro, quod India mittit, partim verò ex eo Arabici genere, quod siccum, resinofum, liuensq; ex Petra defertur, vtrisque à mercatoribus simul mixtum. Quod si ita res se haberet, non esset planè moleste ferendum, quod saltem mediocre impertiretur, postquam nobis optimo interdictum est. Verùm etsi hoc fieri possit, cum tamen in eo parum, vel nihil amaroris sentiatur, cumque ceteris fere omnibus tum notis, tum qualitatibus sit expers, quas ei Dioscorides tribuit, est potius opinandū factitium id & adulterinam esse, quàm legitimam. Hinc factum est, vt quidam recentiores simplicium indagatores, cum nobis persuadere vellent, Bdellium in officinis reperiri, licet non aduectum ex Saraca felicia Arabia ciuitate, vnde aduehi consueuerat, somniauerint communem myrrham legitimam esse bdelliam, vt eorum sententiam resellentes, in precedenti commentario scripsimus. Huius, quo passim vtimur, plura quidem habentur genera: siquidem aliquod quandoque vidi nigrum, re-

Bdellij consideratio.

20 **f**iosum, odore fatido laseri quadantenus proximo: aliud translucidum, vt pote taurinum glutinū, sed siccum, amaroris expers, nullog; odore preditum: quoddam verò adeo vulgari myrrha per simile, vt ab ea vix dignosci possit. Quæ omnia genera tametsi illegitima censeantur, officinis tamen tanquam legitima, & præstantissima in medicamentis passim temerè vsurpantur. Bdellium scriptis tradidit Plinius lib. XII. cap. IX. his verbis. Vicina est Bactriana, in qua Bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine olea, folio roboris, fructu carprifici natura. Gummi aliq; brochon appellant, aliq; malaebrom, aliq; maldacon. Nigrum verò, & in offas conuolutum, hadrobolon. Esse autem debet translucidum, simile cere, odoratum, & cum fricatur pingue, gustu amarum citra acorem. In sacris vino perfusum odoratum. Nascitur & in Arabia, Indiaque, & Media, ac Babylone. Aliqui Peraticum vocant ex Media aduectum, facilius hoc, & crustosius, amariusq;: at Indicum humidius, & gummosum. Adulteratur amygdala nuce: hac Plinius. Bdellij facultates prodidit Galenus lib. VI. simplicium medicamentorum, sic inquit: Bdellium quod Scythicum nominant, quod sanè & atrius est, & resinofum magis, emollientis admodum, & efficacis virtutis est. At alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur, quàm emolliat. Igitur recens, & humidum est, & contusum facile mollescit, ad omnia, ad quæ Scythicum, idoneum. At quod antiquius est, & admodum gustu amarum, & acre, & siccum, ab eorum, quæ indurata molliunt, mediocritate excidit. Vtrunq; autem quidam illis, & potissimum Arabico, & ad gutturi ramices, & hernias aquosas, salina maratima, ieiunataq; subigentes, vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos venum in potu sumptum frangere apparet, tum vrinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores, & rupturas per sanare: hætenus Galenus. Cæ-

Bdellij vulgaris genera.

Bdellij historia ex Plinio.

30 **t**erum inuenio Serapionem duobus capitibus Bdellij meminisse: quorum alterum appellauit Iudaicum, quod nimirum est ipsum Dioscoridis bdellium: alterum verò cuiusdam planta palma similis fructum esse tradidit. Hoc Neapoli frequentissimum vidimus, usq; in officinis accepimus, vbi sacchari arundines è Sicilia petita venundantur. Nam illic esse cum Bernardo Clesio Cardinali, & Principe Tridentino, qui apud Casarem Carolum V. inuictissimum Imperatorem agebat, multarum videndarum rerum, quæ ad medicam materiam spectant, fuit mihi facultas. Hoc igitur palma genus (vt ab incolis accepi) ex Sicilia cum folijs palmeis, ac radice defertur cubitali, vel paulò ampliori longitudine. Vocantur hæc planta

Bdellij vires ex Gal.

Bdellium alterum Serapioni, palma genus.

40 **N**ea'poli vulgò CEFAGLIONI, quarum quoddam duntaxat germiculum comedunt, tenerissimum, sapidum, & origanissimum. Includitur hoc mille quibusdam inuolucris, tanquam totius planta corculum. Hoc quidem tuberibus, & carduis, carduorumq; echinatis capitibus (carioffi & archichiochi Itali vulgò vocant) præferunt: quandoquidem id secundis mensis pro bellarijs cum pipere, & sale solenniter assumunt, tum quòd gustui is eibus admodum arrideat, tum etiam quòd venærem conciliet. Porro illa vulgaris Cefaglioni appellatio (quantum conijcere possumus) à Mauritani accepta est: siquidem Serapio sic inquit. Cefilio est cor istius palma: & natura eius est, sicut natura palmerij. Gal. insuper lib. VIII. simpl. med. de palma differens, eius medullam encephalos appellari tradidit: ex quo adducor, vt suspicer, inde Arabes Græca voce corrupta suum Cefilionis nomen accepisse. Quod ΒΔΕΛΛΙΟΥ Græci, Bdellium similiter Latini vocant: Mauritani, Molochil, Molochal, Mochol aut Mochel: Itali, Bdellio. Hispani, Bedelio.

Cefaglioni consideratio.

Nomina.

50 **†** Licet Saracenicæ arboris lectio admitti possit, quòd Saraca, vnde Saraceni dicti sunt, vrls sit in Arabia, non tamen improbanda videtur lectio Arabica arboris, quòd non solum Plinius scribat bdellium in Arabia nasci, & Galenus alterum Bdellij genus Arabicum faciat, sed etiam quòd Oribasius lib. XI. legat δάκρυον ἐστὶ δάκρυον ἀραβικόν: hoc est: lachryma est arboris Arabica.

60 **†** Hoc loco in vulgatis Græcis codicibus sic legitur: ἐν ὄσφραξι τῆς θυμίας ἐστὶν ὄσφραξι. hoc est, si verbū verbo reddamus: odoratum in suffitu, simile vngui. Eadem verba ex Dioscoride referunt inter Græcos Aetius & Oribasius. Cæterum in iis verbis illud dubiam sententiam facit, quòd nō facile colligi possit, quid per ὄσφραξι in telligat Dioscorides: nam cum hæc vox homonyma sit, & plura significet, cui potissimum rei conueniat, auctor non explicauit, vt hinc vel aliquid deesse suspicandum sit, vel hæc voce diuinandum de nota illa Bdellij optimi magis sit, quàm aliquid certi statuendum. Auget difficultatem, quòd interpretes omnes, viri doctissimi, verba illa in diuersum sensum trahant. Alii enim probatum Bdellium volunt bene odoratum esse semper, sed incensum, fieri vngui simile, vt Manardus libro suarum epist. octauo: alii dum incenditur, odore malum vngui assimilari, vt Hermolaus: quorum tamen vtrunq; constat de odorato vngue intellexisse. His adstipulari videtur Serapio inter Arabas, qui Bdellij descriptionem Dioscoridi acceptam ferens, verba illa interpretatur in hunc sensum: cum incenditur, bonum spirat odorē, odorū vnguis odorati similem. Sunt porro qui Bdellium suffitu odoratum faciunt, vngui simile, vt Ruellius, qui certè ea simplici verborum illorum versione non minus ambiguum reliquit illius nota sensum, quàm in Græco reperiatur. Marc. autē diuersam ab antedictis sententiā protulit, nā ita vertit illa verba: cum incenditur, odoratum, & humano vngui colore simile. Hæc vtrique Marcelli interpretatio plura habet, quàm in Græcis codic. legantur, ea fortasse ratione ab eo addita, vt nulla reliqua esset ambiguitas, quāquā in hoc à Manardo redarguitur.

Mihi quidem haecenus placuit Serapionis interpretationi subscribere, ut patet in principio huius commentationis: nunc vero quid mihi sentiendum sit, fere incertus sum. Videntur enim verba illa Dioscoridis ita distincta esse, ut duas Bdellij optimi notas faciant: quarum altera est, ut odoratum sit, cum sufficitur: altera, ut sit vngui simile. Sed relinquitur dubitatio an vnguis odoratus, aut humanus sit intelligendus: eò tamen inclinatur animus, ut putem humanum vnguem intelligi, quod Plin. lib. XII. cap. IX. de bdellio differens, Bactriano vngues reddat candidos, cum inquit. Bactriano nidor ficans, multaq; candidi vngues. Ex his nimirum verbis liquet, Bdellium illud albis maculis vngui humano similibus refertum esse. Id quod etiam videtur Bdellio assignasse Damocrates in suis carminibus, quibus cyphéos compositionem cecinit, & quæ à Gale. referuntur lib. II. de antidotis, dicit ita scribit. Σχοίρε β. καὶ κρόκον μαζα, ἑδ' ἄλλ' ὄνυχας & γ', ἀσπαλαθου β S. Hac duo carmina soluta oratione ad verbum sic vertemus: unci odorati duodecim, & croci unam, Bdellij vngues drachmas tres, aspalathi duas semis. Sanè quod Damocrates Bdellij vngues in cyphéos compositionem addat, me magis mouet, ut credam Bdellium notam peculiarem habere, quæ vnguium effigiem repræsentat: aut quod illud Bdellium sit præstantius, cui sint maculae humanis vnguibus similes. Sed hæc fortasse suspit, quam deceat, ut quid alii, & quid ego sentiam in illis Dioscoridi verbis, exponerem, ita tamen ut malim eruditiorum quoque iudicium esse.

Bdellium densata lachryma est ex arbore quadam, Ceraso simili cortice vestita, emanans, atque circa ramulos in magnos grumos concrefcens, qui tam integri, quàm contracti ex Arabia, India, & vicinis aliquot locis adferuntur, vna cum adhærente sæpè cortice & ramulis. Hoc myrrhæ concretionem & aspectu simile, quare censuit quidam Bdellium Myrrhæ speciem esse (quidam Anime esse voluit) à qua differt, non solum quod arbores sint differentes, sed in eo quod Myrrha sit fragilior, & in igne ut resina ardeat: at Bdellium magis naturam gummatum respicit, difficile enim ardet, & humore mollescit, odor non sine grauitate suauis. Sunt autem eius sex differentia: 1. Maioribus glebis ruffum, & cum frangitur in plurimos grumulos diffiliens, mediocriter splendens: 2. minoribus glebis subfuscum, intus ruffum, cum frangitur in duas partes quasi dissectum se diuidens, translucens, densum, lentum, glutinosum, pingue, & lachrymas albas calido in loco emittens. 3. nigrum, intus nigro ruffum, glutinolum, mediâ inter thus & gummi cerasorum qualitatem respiciens. 4. Nigrum quoque, sed intus fuluum, purpureo colore, maxime translucens, molle, glutinosum, cerasi gummi simile, eiusdemque saporis. 5. Colore & sapore priori simile, sed intus pallidis aut candicantibus maculis distinguitur. 6. pallidum aut candidum, grumis oblongis, mediocribus, multis, longis, guttis densatis concretum, amarum, ingratum, omnibus speciebus acerrimum. Eligendum est in quouis genere aspectu, cum frangitur, nitidum, cornu, aut taurino glutini simile, magis translucens, pinguius & mollius, cum hoc recentis indicium sit. Sunt qui Cuciopheram de qua inferius Matthioli ager, Bdellii fructus nomine allatam censeant, & vtrumque idem statuunt.

Albaros.

THVS.

CAP. LXX.

THUS in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculus stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem ¶ individuum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò a fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria factitant: nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus versant, donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum, aut syagrum appellant. Secundum locum habet ¶ Arabiæ, & in b Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocant, minus multò, & fuluius. Est & genus aliud, cui amomite cognomen est, alioqui candidum: quod dum mollitur, mastiches more digitis cedit. Adulteratur omne thus ¶ in itinere pini resina, & gummi: quod facile deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non eiacularur, & resina in fumum euanescit, thus verò statim ardet: idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum, & astringendum pollet: oculorum caliginem discutit, caua vlcera complet & ad cicatricem perducit: cruenta vulnera glutinat, infrenatque cunctas sanguinis eruptiones, etiamsi cerebri membranæ effluat: vlcera, quæ caeothæ vocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum: formicantes verrucas inter initia, impetiginesque ex aceto, & pice illitum tollit: ambusta igni, pernionesque cum suillo adipe, aut anserino, & vlcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat: paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino infunditur, inflammata a partu mammae, cum cimolia & rosaceo magna vtilitate perunguntur: additur ad arteriarum viscerumque medicamenta: prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda valetudine haustum insaniam mouet, & largius cum vino potu interficit, in fictili mundo thus crematur, flagrante glebula succensum a lucerna, donec exuratur: post perfectam vstionem operire oportet, vsquedum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alii crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo vivacibus prunis torretur, dum non amplius bulliat, aut pingitudinem vaporemve emitat: facile enim comminuitur, quod perustum non est.

Φλοιός Λιβανίου.

CORTEX THVRIS.

CAP. LXXI.

PRæfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, læuis, minimè scaber, sine membranæ. Adulteratur admisto d pini, aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est, siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem eiacularur. Thuris modo vritur: & vis eadem, quæ thuri, sed validior, adstringentiorque. Quare potu cruentis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pello confert: ad cicatrices ocalorum, & caua, sordesque efficax est: tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Μαννά Λιβανίου.

MANNA THVRIS.

CAP. LXXII.

MANNA thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem, quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui a cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant.

terant. Sed hæc igne deprehenduntur: neque enim æquè suffitu ærium vaporem, sed fuliginosum & unipurum expuit, & permittum suævolentia halitus virus habet.

Α' θάλια Καρότου.

FVLIGO THVRIS.

CAP. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito. Forcipicula lucernis accensas singulatim thuris glebas in nouam fictilem ollam concauam imposito: & aëreo vase in medio perforato, deterfa diligenter forde, obtegit: alteram admoueto, ex altera eius parte, aut vtraque, subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quòd facilius perspicere queat, si vrantur: & quâ locus capax fuerit, glebularum alias supponito, & antequam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem videaris coegisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta abstergantur: ita enim temperato aris feruore, fuligo omnis inhaerebit, quæ alioqui per lenitatem decidua thuris cineribus admiscetur. Deterfa itaq; fuliginis, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est: idem opus, quoad satisfactum tibi videbitur, obeundum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lachrymis fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

a ad pōi. in-
tegras Orb.
addit.

Cum thus, Thuris cortex, manna, & fuligo ab vna tantum arbore proueniant, non alienam duxi de his omnibus vniuerso commentario differere. Sed primum a thure exordians, cum Dioscorides in eius scribenda historia, non late se diffundat, ut eos voti compotes faciam, qui eam audire desiderant, hic referam, quæ ex Theophrasto lib. IX. cap. XIII. quæ ex Plinio libro XII. cap. XIII. diligenter excerpti. Gignitur itaque thus (ut illi prodiderunt) præter Arabiam nullis, ac ne Arabia quidem vniuersa, sed priuatim cuidam loco in medio ferè regionis post Atramitas pago Sabaorum, qui caput regni est: tractus is spectat ad orientem vndique rupibus inuius, & à dextra maris scopulis inaccessus. Sylvarum, quæ thus profert, longitudo est centum millia passuum, latitudo autem dimidium eius: quas & Minai attingunt alium pagum colentes, per quos thus euahitur vno tramite angusto, à quibus etiam thus Mineum olim dictum est. Siquidem hi primi fuere thuris repertores, eiusq; commercium primi fecere, maximeq; exercent. Ceteris interdictum est, his exceptis, videre thuris arbores: ac ne Minæorum quidem omnes (ut perhibent) ipsas arbores videre possunt. Ius enim in thus, ipsumq; legendi potest. tricentum tantum modo esse familiarum dicunt, quæ per successiones id sibi vendicant, quæ etiamnum ob id a propinquis populis sacra vocantur, quòd cum vulnerant arborem, quæ liquor defluat, aut cum metunt, nec feminatum, nec funerum congressu polluuntur: atque ita religione merces augentur: quidam promiscuum ius Minai omnibus esse tradunt, & vnoquoq; anno inter ipsos diuidi. Ceterum quanquam præsci Romani in Arabia bella gessere, thuris tamen arboris facies à nullo (quòd equidem legerim) Latinorum tradita est: neque Græcis etiamnum auctoribus (et si plures de ea conscripserint) de eius effigie satis inter se conuenit, licet dixerit Theophrastus, quòd arbor thuris, quæ super Sardes apud delubrum quoddam surrexit, fronde lauri constat: Thus duntaxat meti solebat inciso arboris cortice, canis ortu, flagrantissimis aestibus, quòd tunc esset humoribus maxime pragnas, quòd postea legebatur sequenti autumno. Verum dulcedo questus aliam viam attulit, quæ etiam primo vere ipsum legeretur, incisus per hyemem arboribus. Excipitur quòd ex arbore profilit, atque distillat palmea tegete, vbi loci natura poscit, alicubi area circum pauita. Purius & perlucidius illo modo, sed hoc ponderosius, minus pellucet, minusq; viribus pollet. Vindemia verna thus rusum emittit, nec comparandum priori: vires enim imbecilliores sibi sortitur. Creditur nouella arboris candidius esse, quam veteris: quòd hæsit in arbore, ferro depectitur, ideoq; corticosum. Tradidit Dioscorides præter Arabicum inueniri & Indicum, id tamen flouescere: quòd indicat, thus & in aliis regionibus nasci præter illud,

Thuris histo-
ex Theophr.
& Plin.

THVSE TVS FOLIVM



quod ex Arabia deuehitur. Quod cum Theophrastus, & Plinius satis compertum haberent, quamuis prius scripsissent, thus præter Arabiam nullis gigni, dixerunt tamen postea, quòd ex relatu acceperant, id etiam nasci in quibusdam insulis. Datur vtiliter potandum dysentericis, & diarrhæa laborantibus, & iisdem clystere quoque infunditur. Linitur cum lacte aduersus solis ardores. Cum aqua autem nymphææ bibitur drachma pondere ad gonorrhœam. Auget memoriâ bibitum oboli pondere: sugat tristitiam, & latificat cor, & conuenit omnibus eius affectibus, præsertim vbi misceatur cum medicamentis quæ cordi opem præstant. Fit è thure medicamentum, quo nihil præstantius, certiusq; vidi ad oculorum lippitudinem, & ruborem: & enim sæpe vna tantum nocte affectos iuuat. Accenditur Thuris grumus, acuto stilo affixus, cerea cadelâ, mox in aqua rosacea vncius quatuor restinguatur, repetuntur incensiones extinctionesq; trigiesies, & deinde percolata aqua linteolo mundo, oculorum angulis cum penna vesperi illinitur, dum cubitum affecti sese recipiunt. At qui si rubor, lachrymaq; vehementi cum dolore fuerint, additur tantundem lactis muliebris. Sistit Thus sanguinem è naribus manantem, si cum tella arenea & aloe, excipiatur oui vnus albo, & cum licinio introducat in nares: Thuris suffitu sanatur quoque tæasmus, addita præsertim colophonia resina. Fiunt ex Thuris drachma, & agarici scrupulis quaternis cum hyssopi succo catapotia decem admodum vtilia ad frigidâ rursim, si vnum tantum quotidie sumat æger vesperi iturus dormitum. Paratur ex Thure puluis quoque admodum vtilis ad dysenteriam hoc modo: Sumito Thuris, Mastiches, cuiusque drachmas duas, luti Armenij drachmam, coralliorum rubeorum, cornu ceruini vsti, singulorum drach. semis. Lapidis hamatitidis vsti scrup. duos: terito simul omnia: datur ex vino rubeo sesquidrach. horis duab. à cæna. Thuris & Myrrha puluis oui albo excipit. fieri temporibusq; illi-

Thuris vicia

Catapotia
Thuræ

40
50
60

Thuris facult.
ex Gal.

Galenus locus
restitutus.

Auicenn. lap.
lus.

Manna thur.
ni.

Manna cele.
stis historia,
& genera.

Fuchsi opi.
nio.

Manna Ara.
bam.

Brasauoli la.
pus.

tes, benedicentes dolores multos. Thuris (ut scribit Galenus lib. vii. simp. medicamentorum) extalfacit ordine secundo, de-
cat vero primo paulatimq; adstringit. Sed candido minimum adstrictio manifesta. Cortex eius euidenter adstringit: pro-
inde sane strenuo quoque desiccatur, alio vt ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem crassiorum partium,
quam ipsum Thuris, & minime particeps acrimonia. Ob has igitur tum facultates, tum qualitates multus est eius vsus apud
medicos in hamoptoicis, stomachicis, caeliacis, & dysentericis, non tantum ijs, quae extrinsecus applicantur, ipsum admis-
centes, sed & ijs, quae intro in corpus sumuntur. Ramus eius (lego fuligo eius, & infra rationem reddam) tum ficcioris, tum
calidioris est facultatis, quam ipsum thuris, aded vt ad tertium vsque excessum perueniat. Habet vero etiam absterforium
quiddam: itaque eo nomine expurgare, & implere, quae in oculis consistunt vlcera, videtur, velut & myrrha, & styracis.
hac Galenus. Verum, ne quispiam fortasse me perperam Galeni lectionem inmutasse existimet, illud sciendum est, quod in
Galenus loco citato non solum Gerardi Gaudani versio reprehendenda (quod tamen interpreti vitio minime dandum est) 10
sed etiam in Graecis tum ipsius Galeni, tum Pauli Aeginetae codicibus communis lectio deprauata videtur: quippe vbi in thu-
ris capite legitur apud Gal. ἡ δὲ θαλάσσιος ἀπὸ τοῦ ἔρποτος ἐστὶν ἡ δὲ θαλάσσιος ἡ κατὰ αὐτὸν τὸν ἀκατωτὸν οὐράμεως, hoc
est, vt vertit Gerardus, Ramus eius tum ficcioris, tum calidioris est facultatis, quam ipsum thuris, rectius legendum putau-
rim, ἡ δὲ δὲ θαλάσσιος ἀπὸ τοῦ, hoc est, Fuligo eius &c. Quae quidem lectio primò Dioscoridis testimonio comprobatur: qui pra-
terquam quod ramorum non meminit, ipsi thuris fuligini, non ramis, tum expurgandi, tum implendi, quae in oculis consi-
stunt vlcera, facultatem inesse testatur. Deinde id manifestè inuisse videtur Galenus in praedicti capitis calce illa compa-
ratione, cum inquit, veluti ex myrrha, & styrace. Nam lib. viii. simp. medic. de styrace agens: styracis combusti fuligo, in-
quit, thuris fuligini quodammodo est similis: & libro vii. de fuligine scribens: Primum enim, ait, thuris fuligine vtuntur,
in ocularias medicinas mista, eas videlicet, quae ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accomodantur, atque etiam flu-
xione tentantur, & vlcera habent: nam & illa expurgat, & carne replet. Ad hac vsurpant quoque eam ad facultates, quae 20
vocant calliblepharas. Praeterea terebinthina, myrrhaq; fuligo molestia caret, non aliter, quam thuris: sed styracis huius quo-
dammodo valerior est. His igitur rationibus asserere nō dubitauerim, hoc in loco vulgatos Graecos codices fortasse librariorū
incuria vocū similitudine deceptorum deprauatos esse: quodq; loco huius vocis θαλάσσιος quae Latine fuliginem reddit, succes-
serit θαλάσσιος quae ramum germenue significat. Quod etiam apertissime confirmat Serapio: qui cum hunc Galeni locum suo
tempore legitimum, & incorruptum haberet, quae hoc Galeni loco nostra aetate de thuris ramo leguntur, ea ipse Galeno ai-
cepta referens, de thuris sumo, seu fuligine legit. Quod item apud Aetium videre licet: quin etiam apud Auicennam cap. de
alibano legitur: sumus eius est vehementioris exiccationis & stipticitatis: tamen si Paulus hac menda non vacet, vel sui ipsi-
us fortasse, vel potius librariorū culpa. Nam alias non possem non admirari, quod in Galeno lectionem hanc deprauatam
esse non animaduertisset, quem admodum hac in re nostra aetatis interpretes mihi quidem admiratione digni videntur. Ca-
terum thuris (vt Galenus scribit lib. xiiii. de compositione medicamentorū per genera) concoquit, & pus mouet in temperati 30
corporibus, nam in humidis sarcoticū est. Praeterea cum dixerit Diosc. thuris in secunda valetudine haustum, insaniam face-
re, & largius cum vino sumptum interficere, hinc Auicennam errasse crediderim, qui & deprauatis sensibus, & abolita
memoria thuris opem prestare tradit. Porro credidere nonnulli thuris Mannam apud Graecos esse, quam nostra aetate è caelo
collapsam super arborum frondes colligimus, quamq; tanquam omni ex parte innocuum medicamentum, & vtero geren-
tibus mulieribus, & pueris, & delicatis deicienda alui gratia propinamus. Verum res quidem aliter se habet: namque Pli-
nius, & alij complures produnt, Mannam thuris esse micas eius concussu elisas, quod dum conuehitur, euenit: quod etiam
testatus est Galenus lib. xiiii. de compositione medicamentorum secundum locos. Sed quoniam thuris Manna mihi redegit
in mentem Mannam hanc purgatoriam calitus demissam, vt plenius legentibus satisfiat, cum huius nusquam meminerit
Dioscorides, de ea tradam, quae ex Arabum monumentis deprompsi, quaeq; ipse etiam in Calabria vidi, vbi laudatissima
colligitur. Est igitur MANNA quidam ros, siue liquor suavis, qui ex aere veniens sublucanis temporibus, arborum ramis, & 40
frondibus, herbis, lapidibus, & solo interdum inuenitur haerere: qui breui temporis curriculo coalescens, grumofus in gummi
morem efficitur. Huius duo tantum genera ipse in Italia vidi, quorum alterum ab orientali plaga, alterum verò à Calabria
desertur. Eius, quod ex oriente petitur, duplex habetur species: praestantissima altera, quam Mastichinam appellant, nomi-
ne à granorum mastiches similitudine sumpto: infirma verò, & vilis altera, quae Bombycina nuncupatur, quippe quae nil
aliud est, quam aut euanida, & senio ex hausta Mastichina, aut saccharo, alijsque imposturis adulterata. Calabriensis plu-
rimū penditur, quae stirpium frondibus insidens colligitur, proinde foliorum Manna cognominata, minutis granulis constas,
translucida, grauis, mastiches granulis similis, candida, gustu dulcis atque suavis. Secundas partes sibi adsciscit, quae ramis
insidat, tertias verò, quae lapidibus, & solo inheret: nimirum haec granulis constat crassioribus, & colore longè minus syn-
cero. Eius, quae nocte peracta è caelo ceciderat Cossentia, quae est Calabria ciuitas, mihi facta fuit copia super fraxineis fron-
dibus, quae in lapidibus perfectè cocti guttas prorsus referebat. Accepi inibi ab incolis, quod haec mane legitur, priusquam sol exor- 50
tus admodum extalfaciat: namq; postea sole liquefacta, absorptaq; facile euanescit. Quapropter plerique (vt à nonnullis
audiat) vbi in magna deciderit copia, summo mane arborum ramos praescindunt, & in opacis collocant, vbi concretam ma-
iori commodo legunt. Hinc verò sit, vt nesciuerim ego, quae ratione ductus Fuchsius vir eruditissimus, scripserit libro de com-
ponendis medicamentis, quem nuper auctum edidit, Mannam (vt suis verbis vtat) Calabrinam grano constare grandio-
ri, stoccorum lana & bombycis referente effigiem, candidiori, & ob id alio nomine Bombycinam vocari: quin & hanc vili-
ori pretio vendi. At qui cum is à nobis planè dissentiat in Manna, quae ex Calabria aduehitur, historia, ratus gnarusq; hanc
quam pauld antè reddidi, veram esse, non plura adiciam: sed relinquam in hoc fore iudicium eorum (sint vel medici, vel
pharmacopœi, vel mercatores) qui Manna illius naturam rectius norunt, atque eam satis exploratam habent. Duo Man-
na genera etiamnum à Mauritanijs diuersis capitibus prodita reperio: quorum alterum Mannam, alterum verò Tereniabin 60
bin appellant. Tamen non aliam inter ea specierum differentiam esse constat, quam quod alia liquefcens, melli similis, alia
in grumos concreta videatur: quae profectò illa est, quae ad nos aduehitur. Quam verò hanc Tereniabin vocant, Serapionis testi-
monio & ipsum esse Mannam manifestè ostenditur. Namque Abicis aucteritate, Tereniabin, inquit, febrium ardentium
inflammationes mulcet, sitim extinguit, aluum mediocriter emollit, pectori, & tussi opem praestat, nec aliud est, quam
Manna. Testatur Brasauolus Ferrariensis, Nicolaum quendam Ferrariae (vt arbitror) pharmacopolam emisse à quodam
Mauritano v. is plenum cuiusdam Manna melli similis, quae in medicamentis non satis laudari potuit. Hanc equidem ex eo
genere fuisse existimauerim, quod Mauritanij Tereniabin nominant: etsi Brasauolus ipse contrarium senserit, cum velit,
Tereniabin Mauritanorum eam esse Mannam, quae communiter vtimur: eorundem verò Mannam esse huiusce liquida
speciem. Quae tamen sententia Arabum scriptis prorsus refragatur, quandoquidem ipse inuenerim apud Serapionem, quod
Tereniabin quidam ros est è caelo cadens melli grumoso similis, & quod aliter mel roscidum appellatur. Auicenna verò de
Manna

Manna dicitur, inquit, tam gummi modo concrefcere: à quo Mesuem nihil dissentire comperio. Creditur Auerroes, & post eum alij quam plurimi, Mannam veteribus, praesertim Galeno, incognitam fuisse. Quibus illud reclamatur, quod ipse Galenus scriptis tradidit libro III. de alimentorum facultatibus, capite de melle, sic dicens. Memini aliquando cum aestate super arborum, ac fruticum, herbarumq; folia mel quam plurimum fuisset repertum, agricolas velut ludentes cecinisse, Jupiter melle pluit. Precesserat autem nox, ut per aestatem, satis frigida (nam tum tempus anni aestivum erat) pridieq; calida, & sicca fuerat aeris temperies. At qui peritis natura interpretibus, balitus è terra, & aquis prodeuntes, solis calore exacte arrenuati ac cocti, à frigore secuta noctis in unum coacti, ac densati fuisse videbantur: sed apud nos raro id accidit: in monte autem Libano quot annis per sepe. Itaque coria super terram extendentes, & arbores excutientes, quod ab eis defluit, excipiunt, & ollas ac siccilia melle implent, vocantq; id roscidum mel, & aerium. Hæc Galenus de Manna memoria prodidit.

10 Ex quibus eorum error deprehenditur, qui putant hanc ei fuisse incognitam. Existimandum igitur est, quod hinc Arabes suum deduxerunt Tereniabim, praesertimq; cum scribat Serapio, hoc ab eis mel aerium appellari. Huius etiam meminist Plinius. Plin. li. vndecimo cap. 12 his verbis. Venit mel hoc ex aere, & maxime sideru exortu, precipueq; ipso syrio explendente fit, nec omnino prius vergularum exortu sublucanis temporibus: itaque cum prima aurora, folia arborum melle roscida inveniuntur. At si qui matutino sub dio fuere, vinctas liquore vestes, capillumq; concretum sentiunt. Siue ille est calis sudor, siue quadam siderum salua, siue purgantis se aeris succus, utinam esset & purus, ac liquidus, & sua natura, qualis defluit primo: hæcenus Plinius. Sed tam antiqua Manna res est, ut ante Galenum, & Plinium, eius etiam meminisset Theophrastus. Hesiodi auctoritate, libro III. capite nono de plantarum historia, his verbis. Sin autem auctore Hesiodo, mella, apesq; quercu ferat, magis quopq; illud confirmatur. Ergo nascitur vel hic melleus humor è caelo cadens, in hac maxime insidens. Mannam vtriusq; consistentia è caelo demissam vidimus in Comitatu Goritienfi, vniuersoque Foroiuliensi agro, ac circumuicini locis. Anno à CHRISTO nato M. D. XLVI. Maio & Iunio mensibus: fuitq; mihi ambarum colligendarum amplissima facultas. Siquidem ea, qua fraxini, & orneoglossi frondib. inhaerant, gummi modo concreuerat, colore candida. At qua super amygdalo, persica ac quercus folia deciderat, mellis modo liquefcens ab arbore defluebat, flauo colore. Quo factum est, ut facile crediderim, quod non sui ipsius facultate gummi modo Manna concrefcet, sed foliorum, in quibus delapsa recumbit: qua re ab Arabibus diligentissime perspecta, vtriusq; Manna historiam diuersis per se capitibus monumentis prodidit. Cecidit quoq; è caelo Manna admodum copiosa, mastichesq; grumis similis, agro Tridentino, in Ananiensib. montibus, & praesertim super larices arbores, ut testari possunt Clariss. Medicus Iulius Alexandrinus & Petrus Spezzalancius pharmacopœus Ananiens: quippe qui huiusce Manna, quam ipsemet legerat, selibram fere mihi Goritiam misit, quo fit, ut hinc, & ex ceteris, qua praemisimus manifestò deprehenderim non parum aberrare Donatum Altamarum medicum insignem, cum is plurib. contendat verbis, Mannam qua in Apulia & Calabria è fraxineis legitur folijs, è caelo haud quaquam decidere, sed ex ipsa & planta exsudare. At qui tamen id illi verum esse videatur, ego tamen concedam nunquam, Mannam, qua è lariceis folijs legerunt Ananienses è larice ipsa exudasse, cum nihil prorsus resinosi resiperet: quin etiam quod non solum in arborum folijs spectetur, sed etiam in pratis, adeo, ut fœnifeca pra manna à Sole dissoluta, falces ab herbis acquiuerint explicare. Fuit itaq; hæc profecto Cælestis Manna, perinde ac illa, quam ego proprijs manib. legi in agro Goritienfi, & alij per plures legerunt in circumstantib. locis. Sed profecto non admittenda, quin potius explodenda videtur sententia Monachorum, qui in Mesuem commentarios scripsere, cum pro certo asserant, syrio ardente Mannam non solum rari modo super arborum & herbarum folia reperiri, aeris & caeli clementia: sed etiam arboribus fraxino, s. & orneoglossi absq; aliquo calis rore, gummi modo inciso earum cortice, in lachrymas concrefcere. Quod tamen ut à rei natura, ita etiam à ratione, & à veritate abhorre putauerim. Siquidem ea Manna, qua inciso harum arborum cortice in Apulia, & Calabriensi agro hac atate canicularibus dieb. collachrymare cepit, nullus quidem planta liquor est, sed ipsa eadem Manna, qua dieb. superiorib. easdem in arbores ab aere deciderat. Nam cum illis regionib. vsu veniat, quod pra ceteris predicta arbores eo mellisfluore affatim abundeq; madescant, sitq; cortex solis ardore nimio fitiens, ac rimosus; magnam liquoris quantitatem intra se absorbet. Quo fit, ut postmodum exurente canicula, inciso eodem cortice idem liquor exiliat, & in grumos concrefcet: qui tamen cum leues fungosiq; sunt ob arboris succi missionem, infeliciter operantur, nec alterius Manna virib. correspondent. Quod autem id tantum fraxino, orneoglossiq; eueniat, cum melleus ille ros in vniuersum omnes occupet plantas, in causa est harum arborum nobis occulta potestas, ut magnetis ad ferrum, & succini ad paleas: quippe omnib. clarum est, apud Calabros, & Apulos solam fraxinū & congenerem orneoglossum Mannā in se contrahere, retinere, densare, ac cohibere: ex alijs vero arborib. eandem statim defluere, & in subiectas herbas, petras, solumq; diffundi. Quare ab his duntaxat arboribus inciso cortice, non sanè primò, & secundum naturam, sed ex accidenti defluit Manna. Verum optimi illi patres contenti (ni fallor) cortice, internas illarum arborum partes penetrare neglexerunt: at incola, qui ex montiori huius liquoris prouentu, plus auri referunt, rei naturam diligentius inuestigarunt. Monachorum sententia astipulatur Altomarus, cum ipse sibi persuadeat communis vsus Mannam, nihil roscidi cælestiue liquoris continere, sed tantum esse: quod etsi multis conatur ipse comprobare, cum tamen plura sint qua non consentiunt, id ego examinandum sapientioribus relinquo. Ceterum ex his, qui thuris Mannam caelestem hanc esse crediderunt, vnum Crintum Florentinum fuisse comperio: in cuius censuram Manardus Ferrariensis libro 1. suarum epist. peculiarem epistolam conscripsit. Veruntamen venia illi danda est, cum & Serapio, qui Mauritanis omnib. in simpl. medic. historia praestitit, thuris Mannam cum caelesti inepte confundat. Meminit Manna inter alios Græcos etiam Actuarius lib. de medic. compositione, ibiq; de eius viribus ac facultatib. disseruit. Manna tam Auicenna quam Mesuis testimonio, equali ferè temperamento consistit, licet ad calidum paululum inclinet: at Auerrois calida, humidaq; habetur. Aluum deuorata, aut hausta ciet, per se tamen imbecilliter. Ideoq; tum fœminis vtero gerentib. tum pueris ipsis turò semper exhiberi potest. Alijs medicamentis addita vires eorum auget. Bilem facile educit: sitim extinguit: aperit, emollit, laeuigatq; gula, pectorisq; partes. Quæ ex Alexandria Aegypti adfertur Mastichina vocata, vno duntaxat anno in suis virib. persistit: sed qua in Italia prouenit, praesertimq; Calabriensi agro plurib. annis incorrupta perdurat. Enimvero Fuchsius medicus nostra atate & doctrina, & reru cognitione clarus, in li. de compositione medicamentorum, quem secundo auctum excudit, Mannam à medicorum vsu explodere conatur his verbis. Manna leuem certè, aut ferè nullam soluendi, aluumq; subducendi vim habet, quod is compertum est, qui iuxta Libanum fuerunt: nā referunt indigenas eius moris, cum abundè ea satiètur, nihil tamen ladi, aut aluū sibi quoquo pacto subduci sentire, sed ea tanquā obsonio nutrir. Quapropter cum melli quodammodo similem facultatem habere constet, facile ea carere liceret, modò peregrinorū admiratione nō ita duceremur, neq; stulti, contēptis nostratib. è lōginquis regionib. allatis vit potius, quā is, qua nostris in hortis proueniūt, mallemus: sed stultitia nostra, temero sumptus immodicos faciētes, cōdignat damus penas: hæc Fuch. Quibus nimirū verbis liquet eū velle vsu Mannæ prorsus adimi, atq; ipsum ad medicā deferri qua nostru

Mannæ historia ex Galen. Plin. & Theo.

Plinius.

Manna in comitatu Goritienfi, & foro Iulii.

Manna in agro Tridentino è caelo delapsa, contra Altomarus.

Monachorū opinio explorata.

Manna secta arborum cortice manans.

Petri Crinti error. Serap. lapsus.

Mannæ temperamentum & vires.

Fuchsii opinio reprobata, Mannam explodere conantis.

Peregrinis
medicamen-
tis etiã uten-
dam.

Nomina.

nostris in regionib. proueniunt: utinam equè commodè & tutè fieri posset ista commutatio, ut saltem, quod ipse rehem-
ter cupit, immodicis sumptib. parceremus. Sed quoniam rationes, quas affert, non sunt ea, quibus persuaderi possumus, idcir-
co cogor in hoc eius sententiæ refragari: namq. quod Manna aluū subducatur, & eam quidè innocue, non solum cõuenit inter
auctores, qui hæcenus de illa scripserunt, sed ita etiam quotidiana experientia docet: siquidem duarum & semis vnciarum
ponderè data aluum perbellè deicit, & priuatim bilem educit. Quod autem Libani montis indigena Manna non ut medi-
camento quod purget, sed ut obsonio, quod nutriat, utantur, quis tam facillè ut Fuchsius, referentibus credet? cum nos quo-
tidie contrarium experiamur, aut si credat, non aliquam facti illius rationem adinueniet, qua ut decet, experimentum
tueatur? certè nullus, si rectè iudico. Ut autem medicamenta peregrina aboleant, quæ mitissimam soluendi vim habent,
inter quæ iam dudum Manna principem ferè locum obtinet, utemur nostratibus, & fortasse lathyri, picyusa, tithymalis, bry-
nia, & aliis huiusmodi, quæ passim nascuntur in hortis & campestribus, atq. vim lethiferam ac perniciosam sortita sunt:
absit, in quo quidem iudicio. Malim ergo in hoc sequi exemplum Dioscoridis, Galeni, & aliorum tum Græcorum, tum Ara-
bum probatissimorum auctorum, quam alterius quicumq. sit, illi enim non contenti simplicib. medicamentis quæ suis in lo-
cis nascebantur, peregrinis etiã: n. uti voluerunt: quos tamen tatum abest, ut stultos dicamus, ut etiam sapientes iudicemus.
Quare non potui satius mirari Fuchsiū ita malè de Manna sensisse, quam omnib. eo excepto, perspicuum est sine molestia
ventrem purgare. Equidem optarem, ut n. qui alicui medicamento vsum abrogare student, vel id æquius & modestius ag-
rent, aut è nostratib. ea proferrent, quæ eandem vim prestare possent: neq. enim ego is sum, qui peregrina nostratib. prefer-
re velim, modo hæc cum illis virib. certare valeant. Λιβανός καὶ Λιβανώτης id Græcis dicitur, quod Latinis Thus: Arabibus,
Ronder, Conder, aut Kateth: Italis, Incenso: Germanis, Weirauch: Hispanis, Encienso: Gallicis, Encens: Bohemis, Kadidlo.

† ἄτομος. Hæc dictio hic, & paulo post legitur in vulgarib. Græcis codicibus: qua in primo loco thus natura rotun-
dum insignitur, in secundo verò arte tale factum cognominatur. Sed quia absurdum videbatur Marcello, Dioscoridem vsum
fuisse homonymia, idcirco mutauit lectionem, alterum. s. ἄτομον ἔντομον, ad rem nomen accommodans. Quam tamen lectio-
nis mutationem minimè probat Manardus, qui præterea dubitat quomodo atomos Latinis sit reddendus. Hæc difficultas
mibi quidem videntur ab Oribasio sublata lib. XII. vbi primò non ἄτομος, sed ἄτρυτος legitur, quæ vox sine controuersia
illa sum, atq. non scissum thus facit: secundò verò nihil legitur, quod argumento est, atomum secundum accreuisse Dioscori-
di. Legitur autem τύαρος, quæ vox ut est illius factitij thuris cognomentum, Oribasio teste legitimum, ita non mutanda
videtur.

† Hic vulgaris lectio habet, ὁ ἀραβίας, καὶ ὁ ἐν σμίλῃ, ὅν ἔντοι κοπίσκον καλοῦσι. id est: Arabias, & in Smilo nascentis
quod aliqui copiscum vocant. Marcellus non ἀραβίας, sed ὀρόβίας legit. Cui lectioni adspulatur Oribasius libro XII. vbi
ὁ ὀρόβιος tantum, reliqua verò ut additicia non leguntur.

† Exemplaria Græca vulgata hoc in loco legunt μεθοδωμένους: quæ vox, in itinere, à Ruellio, & artificiosè confor-
matum, vertitur à Marcello. Sed equidem eam aduentitiam putauerim, quòd non legatur ab Oribasio.

Thuris no-
men.

Thuris arbor

Thuris diffe-
rentiæ.

Manna Thu-
ris.

Fuligo thu-
ris.

Thus dictum aut à Græco θύος sacrificium notante, aut à tuis glebis, Λιβανός à Λίβω stillo: licet Græ-
ci fabulètur à iuvene Assyrio huius nominis, quòd Deos studiosissimè coleret, ab inuidis occise (hinc
nihil esse Diis thure gratius) in hanc fruticem conuerso dici. Arbor Galeno Λιβανός καὶ δένδρον Λιβανός: lac-
hryma verò Λιβανώτης, quæ Hippocrati Λιβανώτης κάρπος dicitur. Præter Theophrastum & Plinium, de thure
multa scriptis tradidere Diod. Siculus lib. 3. & 6. antiq. Solinus cap. 36. Strabo & alii antiquissimæ fidei
historiographi. Sed recentiores aliter arborem thuris descripserunt: Thenetus qui iconem ponit tomiz.
Cosmog. lib. 4. arborem thuriferam pinus resiniferas referre, succum (ipsum thus) fundere qui tempore
durefcit, cum quo granula reperiantur arenæ aut sabulo similia, quæ sint Manna thuris. Garzias arbor-
rem humilem scribit foliis Lentisci, alteram montanam, à qua laudatissimum thus: alteram in planis na-
scentem, quæ nigrum & improbum thus fundat. Verum ex aduersariis folium adposuimus quod ab imo
pediculo ad summum vsq. duplicatum, quasi ex geminis tenuibus tunicis confiatum, vagina sesquipal-
mum longa instar infundibuli hiantis, supernè galeata. Differentiæ plures, colore & magnitudine gra-
morum variantes mixtim adferuntur. I. Indicum maximis glebis constans, ex liuido nigricans, candican-
tibus aut flauis maculis nigricans. II. Mammosum, multis oblongis guttis densatis pendularum mamma-
rum figura compositum, quod flauum & stagonia cognominatur. III. Masculum, paruis rotundiscan-
dicantibus, aut flauis granis, partim singulis, partim geminis coherentibus cõstans: IV. Orobia, granulis
minimis, eruo æqualibus, globosis, colore masculino simili. Eligendum authore Gal. 5. Meth. magis tenax &
resinosius, hoc enim mollius & albidius: tum quod mansum, ritu aloes & mannæ non comminuitur, sed
velut mastiche partes habet coherentes. Mannam verò Thuris, Græci etiam ὑπόσπυμα à concussu di-
xerunt, & veteres Latini pollinem Thuris quoq. nominarunt, cum veterum Manna, sit lachrymæ thu-
ris pollen & farina, quæ crebro motu ac concussione atterentibus, ut loquitur Aetius, se glebis eliditur:
differe autem à Thure docuit Galenus 4. de compos. medic. secundum loca 4. sic 5. & 13. Meth. meden. vbi
Mannam magis ipso thure adstringere scribit: quod dubio procul ob corticis thuris admixtionem con-
tingit. Fuligo dicitur Gazæ fauilla: Galeno λυγγίς: sunt qui & ἡμισώματα semicorpora appellant, est te-
nuis fumus resolutus ex quacunq. re pingui incensa, imposito quodam concauo vale exceptus: qui ex om-
nibus resinosis & oleosis rebus fieri potest: modum conficiendi docuit Dioscorides, ostendit & Aetius
lib. 1. at plenius in liquidæ picis fuligine declaratur. Quæ sit in ipsis differentiæ, quæ speciatim ab vsta ma-
teria obuenit, & quis vsus, Galenus 7. simplicium explicauit.

Πεύον καὶ Πίτυς.

P I N V S, E T P I C E A.

CAP. LXXIIII.


P I N V S E T P I C E A generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierum distinctione arbores
vulgò cognitæ. Quarum cortex adstringit: prodest tritus, & illitus intertrigini, vlceribus summam
corpus ocupatibus, ambustisq. cum spuma argenti, & manna: vlcera delicatolorum acrimoniã recusantium
cerato myrino exceptus ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio atramento serpentina cohibet: suffi-
tu partus, & secundas eiicit: potus aluū sistit, vrinam mouet. Folia eorū trita, & illita inflammationes leniunt,
vulnera ab inflam. vindicant: trita aut, & decocta in aceto feruētī collutione dētū dolores mulcēt: hepaticis
vitiis

utilia sunt drachmæ pōdere in aqua, aut mulsâ pota. Piceæ nucis cortex, & folia potu idem præstant. Teda a appellatur carum particularim lecta, si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit pinorum, piceæque fructus, ita habent omnia exemplaria quæ vidi; sed locus est mihi suspectus, nam puto aliunde irrepisse in conte. *καὶ τῆς πεύκης.*

10 cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoq; humorum labem obtundunt. Pineæ nuce integræ recenter arboribus decerpæ in passio franguntur, & decoctæ, vetusti tulsis ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Nostre nimirum negligentia adscribendum foret, cum nos assidue habeant pinorum, abietum, picearum, & laricum filuæ, nisi harum omnium amplissimam, veramq; historiam traderemus: eoq; magis ad hoc teneri videor, cum animadvertitur Plinium, recentiorumq; nonnullos eum secutos, in huiuscemodi plantarum historia, quæ resinas fundunt,

PINVS SYLVESTRIS MONTANA. I. PINVS DOMESTICA.



1570. 87
1560. 76

longè ab eo dissentire, quod in Tridentinis montib. nostris oculis perspectū, apud alios etiā testatum relinquere possumus. Item *Pini histor. e. iusq; genera.*

50 itaque à Pinu exordiens, inuenio Theophrastum lib. III. cap. x. de plantarum historia, duas Pini species adnotasse, domesticam alteram, alteram verò sylvestrem: huiusq; in maritimam, & montanam distinctionem fecisse, discite verba. Pinorum aliam urbanam, aliam sylvestrem assignant. Sylvestris binum statuunt genus, quorum alteram Ideam, alteram maritimam vocant. Harum rectior, celsior, materieq; crassior Idea: folio imbecilliori, tenuiorq; maritima, & cortice leuati, vtiliq; ad coria, quod alteri minus. Nux maritima rotūda, breuiq; dehiscent: Idea oblongior, viridis minusq; hiscens tanquā sylvestrior: hætenus Theophr. Verum nō desunt, qui cōtendant Theophr. hæc de picea scripsisse, non autē de pinu: ea nimirum ratione freti, quod πεύκη de qua hic differit Theophr. Græci piceā, non pinum significet. Quamobrem Petrus Bellonius *Petri Bellonii opin. ex p. 162.*

60 Cenomanus communē Græcorum sententiam secutus, libro, quē arboribus coniferis dicauit, id totum piceæ arbori reddidit contra Theodori interpretationem, quod Theophr. καὶ πεύκη Græcè scriptum reliquit. Sed equidem hæc in re Bellonium (pace viri boni dixerim) hallucinatum arbitror, non quod propterea eum Græci sermonis imperitum iudicem, sed quod mihi videatur non diu versatus in Theophrasti & Galeni lectione, aut de plantis ijs scripsisse, quarum non certam habuit cognitionem: nam plura sunt, quæ eius opinioni refragantur. In primis mihi quidem non dubium est, quin veteres Græci πεύκη pro pinu, & πίτυν pro picea vsurpauerint. Neque certè verisimile est Theodorum, Theophrasti interpretem natione Græcum, & lingue tum Græcæ, tum Latine peritissimum, ignorasse quid per illa tam vsitata & trita vocabula intelligerent Græci scriptores. Deinde Theophrastus ipse τῆς πεύκης nucem σπέριλον vocat: ex quo palam sit, eum nomine πεύκη de pinu, non autem de picea scripsisse. Quandoquidem σπέριλον non aliud designat, quam nucem pineam, vt aperte declarat Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus his verbis. Nux pinæ boni ac crassi est succi, multumq; nutrit, non tamen facile coquitur. Appellant autem Græci ipsam non πεύκη sed σπέριλον.

I Idem

II. PINVS SYLVESTRIS

Montana.



Pinorum species, & consideratio. Pinorum hist.


caudicis summitate circumnavigantes, comosis ac firmis foliis, in cacumine aculeatis, & in longitudinem protensis, angustis. Naves edunt magnas, ponderosas compactas, solidas, in quibus nuclei concluduntur oblongis, ac duris putaminibus conclusi, nigra quadam fuligine obductis. Interior nucleus tenui tunica circumtegitur, flavo colore, quae digitorum attritu facile expellitur: sapor illi dulcis ac iucundus: substantia pinguis; oleosaque. Habetur copiosa domestica Pinus in agro Ravennate, non longe ab Adriatico maris littore: habetur & in aliis Italia locis, & praesertim in canobiorum hortis & viridarijs. Syl-

Idem libro de cibis boni & mali succi, ita scribit. His ipsis plus crassi, non autem mali succi habet nucleus pinus, qui καύρος vocatur, ipsum vero etiam σπόβιλον veteres appellant. Item lib. VII. de simplicium medicament. facultatibus sic inquit: Coni fructus, quem quidem & cottaion nominant & strobilum, &c. Ad hac commentario quarto de victus ratione in morbo acutis apud eundem haec scripta leguntur. Nempe κόκκαδος ab Hippocrate dictus, non ita, sed καύρος magis ab antiquis Graecis appellatur, veluti a recentioribus medicis propemodum omnibus σπόβιλον. Galeno denique ad stipulatur Simeon Setbi, utpote qui nucleos pinos καύρια του σπόβιλου etiam nominet. Ex quibus utiq; constare puto contra Bellonii opinionem, Theophrastum sub πείων vocabulo pinum descripsisse, non piceam. Nam si Theophrasto peuce strobilum profert, quem Galenus inter cibos connumerat, non video quomodo is picea fructu esse possit, cuius nuclei non sunt edendo, Bellonii etiam testimonio. Quod insuper hoc loco per πείων pinum intelligat Theophrastus, illud maximo esse potest argumento, quod nusquam picea visa sit urbana, nisi forte est sylvestris in semine ad spectaculum in hortis sata. Cuius tamen contrarium deprehenditur in pinu, quae domestica atq; urbana frequentissima conspicitur. Hinc porro factum est, ut Bellonius sua ductus opinione, ex hoc in alium quoq; errorem inciderit: quippe illud falsum est, quod ex teda picea fiat pix, ut Bellonius asserit, perperam, meo iudicio, Theophr. hoc loco interpretatus. Siquidem rara admodum est picea, quae tedam habeat: atque pix omnis, cuius est usus, ex pinea tantum teda conficitur in Italia, quemadmodum & in Bohemia, ubi ingentissima ac frequentissima sunt pinorum sylva. Sed iam ad legitimam, veramq; Pini historiam venio, quae sic habet. Pinorum duo genera. Alterum domesticum, alterum sylvestre. Domestica Pinus numerosos fundit ramos in proceri-


III. PINVS SYLVESTRIS MUGO. IV. PINVS SYLVESTRIS

Pinus Mugus.

Cembro.



Pinus mugus. Strob. Spr.



Pinus cembra. Strob. Spr. acutum

sylvestriū varia sunt genera, quae in alpina & maritima partiuntur. Alpinorū tria genera. Excelsus ceterū primū, quod copio-
 sissimū habetur, in omnib. Bohemia Silesia & Polonia syluis, ac etiam in Tridentino agro, cum in Ananiensibus, tum etiam in
 Flemenfibus montib., è quibus syluani homines picē perpetuū parāt. Pinus haec omnib. suis notis domestica ferē similis, coma
 tamē breuiori, foliis rudiorib. & acutiorib. est, sed minores edit nuce: sunt enim cupressinis paulo maiores, longiores tamen
 ac compactiores & in acutū desinentes, squamarū cōgerie domesticis nucib. per omnia similes, resinosa, ac odorata, autumnō
 debiles. Secundū genus Mugū Ananiensib. appellatum, quo Rouena mons in summitate abundat, caudicem nullum edit,
 sed humotenus ramos à radice fundit, qui humi perpetuū repunt, decem, quindecimve cubitorum spatio. Fructum profert
 praedictae similem, vel paulō vegetiorem, ac resina magis obductum, odoris non ingrati, nullo intus nucleo, qui mandi possit.
 Huiusce ramis vruntur incola ad vasa vinaria cingenda. Nam prater id quod longissimi habentur, flexiles, ac tenaces ad-
 modum sunt. Tertium quod Tridentini & Ananienses Cembro, & Cirmalo vulgò vocant, prouenit frequens in Tridenti-
 no agro, tum in Gaui Phœbeae vallis, tum in Flemenfibus, Vulturena, & Rhetinorum montibus, & in Comitatu Tyro-
 lenfi, non longè ab Oeniponte. Id speciosa satis prouenit proceritate, ita, vt ad tabulas parandas materiam non modo pul-
 cherrimam praebeat, sed etiam odoratam, attamen non tam procerum est, vt alterum genus, nec caudicis cortex, vt in cate-
 rā pinorum generibus, flauescit, spissiori tamen ac tenuiori coma. Huius fructus Piceo crassitudine aequē similis est, breui-
 or tamen, resinofus, colore subpurpurascēte, omniumq; fragilior. Concluduntur inter eius nucamenta nuce, domesticas
 longè minores, triquetra, breues, fractu faciles, vt qua dentibus facile cedant: inest his nucleus pusillus, dulcis, albicans sub
 rufa contextus membrana, non ingratus esui: sapore quadantenus domesticas referentes, nisi quod gustui quandā leuiculam
 relinquunt asperitatem, quod omnium syluestrium est proprium. Quo facile adducor, vt credam hanc plantam Pinam esse
 Tarentinam, de qua libro xv. cap. x. meminit Plinius, digitis (vt ille inquit) fragili putamine, cuiusq; expositum furto in
 arbore. Etenim ita ea nuce fragiles sunt, vt non difficulter ab auiibus rostro frangantur. Manat etiam ex hoc genere resina,
 tum alba, tum odorata, veluti ab alyis sui generis plantis. Tabula ex his parata ad extruenda adificia Germanis plurimi
 sunt, non modo quod pulchra materie, & venarum serie placeant, sed quod etiam vt diximus, odoris fragrantia praesent.
 Idem ad eorum hypocausta paranda, quibus maximè ob frigidissimam regionis temperiem, & indigent, & vtuntur,
 plurimum affert ornamentis, ac etiam ad alia adium ornamenta. Marinorum duplex obseruauit genus, nucum tantū
 magnitudine ac paruitate differens, vt ex appictis hic imaginibus quisque facile conijcere poterit. Primum genus folia ha-
 bet angusta, praelonga, rarāq; in capillamenti modum protensa, squamosis vbiq; ramis, iulis sursum spectantibus. Conos edit
 ceteris sylvestribus longiores, crassioresq; praeduros, nucamentis in acutum extuberantibus, in quibus inanes concluduntur
 nuce. Prouenit in maritimis Italia, agro cum Pisano, tum Senensi, & (vt audio) apud Calabros. Secundum genus, cono-
 sior huic opaciorq; quam alterius, sed breuioribus capillamentis. Strobilos profert maiores, longiores, duriores, ac pulchri-
 res, prominentibus vndiquaque nucamentis, vacuis intus nucibus, ac superuacuis. Nasctur haud longè à mari, iisdem ferē
 vt altera locis. Omnia in vniuersum genera resinam albam, & odoratam mittunt, in tedam vertuntur, & picem nigra
 fundunt. Ceterum his qua de syluestrium pinorum generibus scribit Theophrastus, in nostro climate refragatur, quae sensi-
 bus clarissime patet experientia: siquidem agrestes, quae plurima in maritimis nostris Senensibus proueniunt, fructum fe-
 runt spithama oblongum, pyramidalem, firmum, ac solidum, nec per se facile debiscentem. Quae verò numerosa virescunt
 in Ananijs, reliquiq; Tridentinis montibus, ac etiam in Bohemia, Morauia, Poloniaq; fructu constant paruo, breui, qui
 quam primū aruerit, affatim debiscit, & ex arbore decidit. Sed id euenire existimamus, climatū & regionum varieta-
 te, vel etiam quod maritima plura sint genera. Bellonius, cuius paulō antè meminimus, libro de arboribus resiniferis hoc
 pini genus (quantum ex eius verbis colligere potui) pinastrum esse censet. Sed non rectè, mea quidem sententia: namq; pina-
 ster, Plinio lib. xvi. cap. x. auctore, nihil aliud est, quam pinus sylvestris, mira altitudine, gigniturq; non modo in montibus,
 sed etiam in planis, Bellonio verò contra, pinaster pino humilior est: & plana, & montium supercilia prorsus respicit, nec
 alibi prouenit, praterquam in excelsissimis montium iugis. Huius profectò vt quis ad stipularetur, fortasse ex eo adduci posset,
 quod peregrinationi quā ille in Asiam, Graciam, Syriam, Aegyptū, aliasq; regiones se fecisse fatetur, plura tribuere vellet,
 quam probatissimorum authorum scriptis, quibus saepe Bellonius perperam refragatur, ita vt suam putet auctoritatem illi
 preferendam esse. Sed ego miror, quod mihi relatum sit virum hunc esse vulgaris peritia, neque tot loca peragrasse, quot e-
 ius scripta perbibent. Quod autem ad rem nostram attinet, Bellonius vbi pinastri historiam exorditur, hanc pinastri vo-
 cem ex versione Latina frequenter legisse ait apud Theophrastum, sed non propterea Theophrastum eam agnouisse plan-
 tam, quod non nascatur in Gracia, aut Asia montibus: atque ideo nullum esse ex Gracis authoribus, qui de pinastro, aut pi-
 nu sylvestri meminere. Sed quanta sit huius boni viri arrogantia, & in Gracorum authorum lectione negligentia, antea
 explicauimus, vbi ex Theophrasto scripsimus duo esse pini genera, vnum urbanum, alterum sylvestre. Veruntamen si
 mordicus suam tenuerit opinionem, quod scilicet Theophrasto πικρα piceam significet, non pinum, & quod ex consequen-
 ti idem hic de picea sylvestri sit locutus, demus illi ita esse, quid respondebit ad illa Theophrasti loca, in quibus πικρα ἀγρία le-
 gitur? mebercule nihil, quantum reor. Subijciamus ergo qua Theophrastus lib. xli. cap. xlii. de plantarum historia in censu
 arborum qua in montibus nascuntur, contra Bellonij sententiam posteritati memoriae prodidit, ijs verbis. Ἰδία δὲ τὰ τοῦ
 πικρὰ τῶν ὄρεων, αἶν τοῖς πεδίοις ὁ φέεται: πικρὰ Μακεδονίαν ἐλάτην, πικρὰ, πικρὰ ἀγρία. hoc est. Montibus autem propria
 sunt illa, quae in planis non proueniunt. Macedonia abies, picea, pinaster. Addamus praterea qua eodem capite, vbi planta-
 rum meminit, quae perpetuo virent, idem sic habet. αἰσφύλλα μὲν ἐν τῶν ἀγρίων, ἀ καὶ ὑπότερον ἐλέχθη. πικρὰ, πικρὰ
 ἀγρία. id est Ergo inter sylvestria perpetuū virent, quae primo volumine retulimus, abies, picea, pinaster. Ex his itaque ma-
 nifestum fieri arbitror, Bellonium multa in Theophrasto oscitanter legisse, plura etiam temere & falso scriptis tradidisse:
 vt hinc ipsum inanis gloria, vel alicuius dignitatis cupidum potius, quam veritatis studiosum fuisse facile iudicem. Nec
 minus hallucinatus in his censendis resiniferis arboribus videtur Anguillarius, quippe qui tantum sua ipsius ductus opinio-
 ne, nullis adductis rationibus, nec autorum testimonijs, Montanam sylvestremve Pinum, ac eam quam Mugum vocari A-
 naniensibus diximus, picearum generi ascribit, cum tamen haec à pinis alyis quibuscunque, nisi magnitudine, & conorum
 exiguitate differant, ceteris nihil dissentientibus. Nam omnibus eadem facies, eadem folia, ydem flores, eadem germina,
 eadem ligni materies, idem cortex, eadem resina, idem odor, idemq; sapor. Adde etiam quod haec omnia pinorum genera in
 tedam vertantur & picem copiosissimam fundant, quod omnium scriptorum consensu pinorum proprium est, non picea-
 rum. Nec minus decipitur in censenda Tarentina pinu, quam quibusdam vocari Cembro diximus. Quippe is hanc, su-
 tantum sententia ductus, Montanam pinum esse censet: sed cum inter cetera pinorum genera, tam sylvestrium, quam vr-
 banarum, nulla habeatur pinus, quae fragiliori sit fructu, quam haec, cadit, peritq; Anguillarij sententia: namque Theophra-
 sti testimonio sylvestris Montana pinus, nucem edit Maritima compactiorem, duriotemque, ac minus debiscentem, tan-

Syluestriū pi-
norum varia
genera.

Pinus Muga

Pinus Cem-
bro.



Pinus Taren-
tina.

Bellonii alia
opinio ex-
plofa

Anguillarij
lapius.

V. PINVS MARITIMA.

VI. PINVS MARITIMA II.



Plinij lapsus

Teda confici-
entio.

Plinij error,
qui Teda
propriam ar-
borem esse
censet.
Marcelli er-
ror Pinum
tedam inter-
pretantis.

Plinij error
tedam Laricis
morbum vo-
lentis.

quam syluestrior, ac robustior. Cetera quae plurimum huiusce hominis sententia refragatur, si quis audire desiderat, legat epi-
stolam priorē nostrā ad Clariss. Medicum Vlysem Aldrouandum: ibi enim plura sanē reperiet, quae ante à nemine de pino
& picea vsquam sunt explicata. Ceterum non potui non admirari dixisse Plinium, scandulas ē pino ad contendas domos
ex omnibus, quae resinam fundunt, arboribus aptissimas esse, cum laricem non ignoraret materiei praestantia, duritie, &
firmitate, nulli equiparandam esse. Praeterea scribit Theophrastus (nos id quotidie videmus) quod pini interitus est, ut te-
da fiat. Cuius verba sunt haec loco supra citato. Morbum pini accidere talem Idaei incolae narrant, cum non solum cor, sed et-
iam pars externa caudicis in tedam transierit, tunc strangulari quodammodo, quod sponte accidit vbertate arboris lar-
gissima, quo ad quae coniectare possit: teda enim totum efficitur. Ergo haec pini propria affectio est. Quare autem pinus teda
fiat, scribit idem Theophrastus libro VI. cap. XV. de causis plantarum, sic inquit. Pinus enim radicem agit teda totam re-
fertam, ut antè dictum est. Ratio eadem, quae in animalibus est, quod pars alimenti, quae serbuerit, excoctaq; sit, quoniam
purgatissima est asidet: & collecta, densatq; pinguedinem reddit. Reliquum verò sursum transmissum, partes, quae supra
terram eminent, nutrit: non per illam pinguedinem subiens, sed per alios quosdam meatus. Nam quae in tedam omni ex
parte mutata sunt, obesitate moriuntur, ut dictum est: cum enim nullum transitum habeant, spiritus strangulantur, sicut
animalibus accidit, quae ultra modum pinguerint: haec ille. Ceterum quod teda opus sit ad picem conficiendam, non desuit
sua ratio, quae etiam arte fieri possit, ita ut pinus non sua vtiq; sponte, sed artificio teda fiat. Id enim idem docuit Theo-
phrastus libro IX. cap. II. de historia plantarum, his verbis. Idaei vbi arboris caudicem cortice dispoliarint, quod parte solari,
binus, aut ternis à terra cubitis facere consueuerunt, confluxum istuc fieri non sine teda vno cum plurimum anno affirmant.
Idq; cum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleri: & tertio pari modo. Post haec ob eam paulatim in-
cisuram arborem extenuatam, putrefactamq; humi facile à statu prosterni, tum eius cor extrahi (hoc enim tedam maximè
praefert) nec non & radicem effodi: haec etiam ille. Quibus palam est contabescere pino, tam sponte, quam arte fieri oririq;
tedam. Quamobrem putauerim hac in re non parum cacuisse Plinium: quippe qui lib. XVI. cap. X. vbi resiniferas enumerat
arbores, tedam propriam, & per se esse arborem censet, cum inquit. Sextum genus est Teda proprie dicta, abundantior suc-
co, quam reliqua: parcior, liquidiorq; quam picea, flammis, ac lumini sacrorum etiā grata. Et lib. eodem cap. XVIII. Nunc
ait, celeberrimis arborum dictis quadam in vniuersum de cunctis indicanda sunt. Montes amant credus, larix, teda, & ca-
tera, e quibus resina gignitur: haec Plin. Verum si quis Plinij defensor diceret per teda ipsum hoc in loco non aliud intelligere
quam pinum, itaque eum tueri vellet, hanc tutelam illud (ut puto) vanam esse ostendit, quod cum eo capite Plin. resiniferas
arbores omnes per genera describat, & primum omnium genus pinum faciat nullo pacto pinum pro teda accepisse videtur,
cum sexto resinarum generi teda postea adscripserit. Hinc fortasse & Marcelli error defluxit qui in hoc Dioscoridi cap. pi-
num tedam interpretatur. In hoc etiam versatur errore Adamus Lonic. Ruellium secutus in suo de plantarū historia volumi-
ne, vbi fictam potius, quam veram arborem pro teda pinxisse videtur. Sed animaduertendum est, non ē pinu tantum fieri te-
dam, sed ex alijs etiā plātis resinam fundentibus, nempe larice, & picea: à quibus nos in Ananiensibus syluis pinguis-
simam excisimus. Sed in his rara admodum teda est. Quapropter dicebat Theophrastus libro quarto cap. quinto de historia plantarum,
quod in Ponto ex syluestribus desint pinaster, abies, atque picea, & omnino quae teda in sese gerunt. Quibus clare
pater, alias praeter pinum arbores esse, quae in teda contabescunt. Sed quod id morbi magis pino eueniat, quam ceteris,
propria pini affectio esse creditur. Quo sit, ut & in hoc Plinium errasse crediderim, qui non pini, sed laricis morbum esse
ait, ut

ait, ut teda fiat: ac eidem omnes attribuit tum vires, tum notas, tum qualitates, quas Theophrastus pino reddidit. Quare cum Ruellius cum sibi familiarissimum ab huiusmodi lapsu vindicare vellet, non mirum, inquit, quod in hoc Plinius æquiuocatione sit vsus, quando & perpetua fronde perinde ac pinus, sit Larix, & situs idem in montibus, eademq; facies, minime animaduertens, quam magno ipse quoque fuerit errore implicitus, quemadmodum & recentiorum alij. Quandoquidem pro certo attestari possum, Laricem me vidisse nunquam (et si centenas Laricum sylvas viderim) cui per hyemem folia non deciderent, & que tantam contraheret cum pino cognationem, quantam Ruellius tradidit. Itaque ut vera eius quæque promulgetur historia, hic ea de Larice differemus, qua & vidimus, & experientia comprobauimus. LARIX igitur arbore est eximia proceritate, materie æterna, cortice perquam crasso (non autem leuiori, quam picea, ut Adamus Lonicerus scribit) in rimas vndique debiscente, intusq; rubente: ramos gradatim circa stipitem totum emittens, adnatis compluribus salicis more lentis, colore luteo, odore non iniucundo: foliis gregatur circum ramulos prodeuntibus, densis, oblongis, mollibus, comosis, piceis angustioribus, minime aculeatis, qua aduentate hyeme pallida effecta ad caudicis radices decidunt, ibiq; marcescunt: ita ut sola Larix inter ceteras resinam fundentes arbores, spreta omni algoris immanitate, nuda per hyemem vitam transigat. Nouella cupressum prorsum amulatur, non autem piceam, ut Ruellio placet. Eius coni (quanquam credidit Plinius Laricem sterilem esse) cupressinis admodum similes sunt, molliores tamen, neque ingrati efflant odorem. Veruntamen

Ruellii error
Laricē perpe-
tua fronde
esse.
Laricis histo-
ria.

VII. LARIX.

flores longè odoratiores sunt, qui vere emergentes è ramusculorum cacuminibus, arborem vniuersam mirum in modum condecorant, quippè cum in purpura ardentè rubescant, comantibusq; foliis, miro quodam natura artificio annectantur, non parum viatorum oculos remorantur. Ligni materie durissima, præsertimq; rubescens & in caudicis medullis sita: ea, propter in edificis omnibus extruendis, ceteras longè præcellit. Vanum profectò est credere, (ut Plinius, Vitruuius, & recentiorum pleriq; perhibent) quod nec flagret Larix, nec in carbones vertatur, sed veluti calcarium saxum in fornace exuratur. Quin etiam huiusmodi proculdubio falluntur, qui horum autoritate freti, Laricem nostram legitimam haud esse contendunt, quod eam tam facile accendi cernant. Siquidem cum omnium tam antiquorum, quam recentiorum scriptorum consensu, præsertimq; ipsius Plinij, ac Vitruuij, Larix præpinguem, & copiosam resinam fundat, qua perinde ac bitumen igne admota, quam celerrimè accenditur, ignari sanè hominis est, credere Laricis resinofum, & pinguisimum lignum ignem respuere, quum lapides ipsi, qui propria sua natura flammis accendi nequeunt, vbi tamen bitumine redundent, perinde ac ligna exuruntur, editis continuo flammis, quousque vertantur in cineres. Quod facile testabuntur Flandri, Brabantii, & alij Aquilonares gentes, qua ob lignorum penuriam hisce tantum lapidibus suos fouent ignes. Si vero plura contra horum sententiam quissiam audire cupiat, legat secundam epistolam nostram ad Clarissimum Medicum Vlysses Aldrouandum. Ibi enim plura reperiet authorum testimonia, qua nulla dubitatione affirmant, nostratam & antiquorum Laricem eandem esse plantam. Male quidem cum fornacibus ageretur, in quibus sit ferrum in Tridentinis montibus, & in ea præsertim valle Ananys contermina,

Plinii error
volentis lari-
cem esse ste-
tilem.

Vana Vitru-
uii, & Plinii
de Larice
quod nõ fla-
gret, opinio.

Lapides qui
accenduntur.



*Pinus Larix
Sternb.*

quam Soli nuncupant, ac aliis mu... Canonica, & Eliotropia vallis fornacibus, in Brixienti agro, si Larigno carbone cauterent, cuius inibi maxima conflagratur copia. Namque (ut referunt in hac arte periti) nullo alio carbone in fornacem indito, rude ferri metallum tam celeriter colliquescit, quam Lariceo: quin & lignum eius siccum, cum abunde sit resinofum, impetu flagrat perquam vehementi. Quamobrem in Tridentinis montibus Laricinis tantum lignis furnos incendunt, tam eos, quibus panis coquitur, quam qui us hypocausta calefiunt. Ceterum selectissimum Agaricum in Larice prouenit: namque ipse quidem sæpius in Ananienfibus montibus præstantissimum agaricum parua quadam securi à Laricibus compluribus deici, emiq; sæpius ab his, qui resinas colligunt. Nascitur etiã agaricum (ut prodit Plinius) in Gallia, non in Larice duntaxat, sed in alijs arboribus, præsertim glandiferis. Dioscorides, sicuti & Galenus, non satis compertum habet, an Agaricum fungus sit, aut radix, licet afferat in cedro gigni. Brasauolus agaricum Comachij in ilicibus inuenisse fatetur, nec non per Galliam equitans, id vidisse ait quæcum caudicibus inherere. Enimvero ipse in tota Hetruria, in alijsq; quam plurimis Italia locis, denique in multis Germania, Carniola, Dalmatiaq; prouincijs, vbi sylva quercubus, cerris, ilicibus, suberibusq; referta conspiciuntur, non solum nunquam vidi, sed ne quidem audiui in his agaricum prouenire: tamen si illis inherere viderim fungos alios plurimos lignea materie concretos, duos, ac nigros: quibus vbiq; passim fomites sunt ad suscipiendum ignem, cum è silice chalybe excutitur: quinetiam iis ignitis ad machinulas exonerandas venatores frequentissimè videntur. Ad hac quamuis in Tridentinis montibus præsertimq; Ananienfibus, præter abietes, pinos, Larices, & piceas, innumera ab sint quercus, in nulla tamen agaricum, præterquam in Larice, nascitur. Porro ex Larice etiamnum præstantissima illa resina manat qua falsò officinis terebinthina vocatur, cum terebinthina ex terebintho proueniat. Verum cum mercatores præterito iam aeo terebinthinam ad nos minimè afferrent, ob idq; Larigna eius loco vterentur tum medici, tum Myropola, facile factum est, ut Larigna ex vsu sibi terebinthina nomen vendicauerit. Et quod Larigna terebinthina nomen & locum antea passim occupauerit, ut etiam hodie in officinis eiusdem, si desit, vicem suppleat, omnibus notissimum arbitror. At tamen Fuchsius vir alioqui doctissimus, in libro, quem secundò edidit de compositione medicamentorum, scribit Pharmacopæos legitima terebinthina vice abietinam supponere. Qua in re apertè fallitur, quod omnes (ut dixi) pro terebinthina Larignam vsurpent. At qui Galeni tempore liquida picea terebinthina loco vendebatur, ut ipse libro tertio de compositione medicam. per genera memoria prodidit, sic inquit, sic inquit, sic inquit. Ex harum genere est & Larigna vocata, prædictis planè humidis

Agaricum La-
rici innasces.

Brasauolus
in quercu-
bus Agaricum
vidit.

Fungi igni-
ti.


Resina lari-
gna, quæ offi-
cinis terebin-
thina dicitur.

Fuchsi error
circa terebin-
thinam resi-
nam.

or: substantia verò similis liquida picea, quã loco terebinth. institores vident ignorantib. eas discernere: est autẽ talis resina odore gustu, & facultate, quã terebinthina acrior. Cum hac igitur & terebinthina, Larigna vocata, per similes potentias obtinet, sed tenuiori substantia, maioreque discutiedì virtute prædita est. Hanc Tridentini, ac etiã qui h̄s cõtermini sunt,

VIII. PICEA.

IX. ABIES.



Larigna vernaculo sermone Larigna appellant, deslexa à Larice, à qua emanat, appellatione. Hac tamen sponte sua non destitit, sed qui ipsum colligunt, magno & longo terebro Larice caudicem ad medullam vsque per astatem perforant, & inde manentem resinam vasculis quibusdam è piceo cortice paratis excipiunt. Splendidiorum mittunt iuuentula arbores, sicuti de thure diximus: turbidiorum verò annosa. Cortex siccatur pini modo. Resina excalfacit, atqui minus quam pinea & abiegna. Hac ad quã plurima expetit medicamenta, & præsertim ad vulnere, vlcera, & auxilia paranda. Deuorata vnicuique pondere, purgat per inferna. Abstergit, prouocat, aperit, glutinat, attrahit. Renes & vesicam expurgat, calculos expellit, & urinam ciet, & præsertim, si cum Benedicta simp. sesquidrachma deuoretur: deuorata articulorum dolores lenit: præstat & ad Gonorrhœam, vbi absorbeat, pluries cum aqua plantaginis lota, aut nymphaea, addita selectissimi succini drachma, & corallij vel aspleni, & capura momento. Delineta in eclegmate commodissime auxiliatur tabidis, empiicis, ac diuturna tussi laborantibus, purulenta extrahit. Fit ex ea oleum & aqua, destillatorio vase, cum ad plura vtile, tum maxime ad recentia vulnera glutinanda plurimum præstans, quin etiam ad neruorum articulorumq. dolores à frigiditate prognatos. Ceterum aqua qua in primis distillat, si scrupulis tantum pondere ex vino albo bibatur, vbi ventriculus pituita repletus languet, paulo post eam per vomitum expellit, magno inuamento. Eadem lentigines, varos, albosq. abstergit: cum in facie tum in quacunque alia corporis parte, addito oleo, quod ex vini fase paratur. Præstat quoque ad sinuosa vlcera infusa, & ad vermiculosas aures, addito fellis bubuli momento: quin etiam ad surditatem, vna cum oleo suo infusa. Reperitur præterea in annosis Laricum caudicibus prope medullam ipsam, pannum quoddam albicans quauoque, cubiti amplitudine, corio, ex quo chirotheca conficiuntur, adeo persimile, vt vix alterum ab altero discerni possit. Vtuntur hoc incolæ ad vulnera glutinanda, & ad sanguinis fluores compescendos. Ceterum admodum inter se similes ex his, quæ resinam fundunt, arbores sunt PICEA, & ABIES, ita vt sæpe etiam lignarios fabros fallant. Siquidem eadem vtriq. proceritas, amba vñdem sunt folijs, oblongis, duris, ac densis: vtriusq. ramusculi produntur crucis in morem, à duorum duntaxat ramorum lateribus exeuntes: quod & folijs euenit. Veruntamen hoc tantum discrimini inter se habent, quod picea folia colore sint abiegnis longè nigriora, quin & paululum latiora, molliora, leuiora, minusq. pungentia, ac ramos circumquaque vestientia. Præterea picea cortex nigrescit, tenax est, lentus & lori modo flexilis, abieti verò albus, & si flectatur, facile perfringitur. Picea rami plerunque ad terram flectuntur: quod in abiegnis non visitur. Ligni deniq. materies picea multò speciosior, ac etiam vtilior: habet enim venas rectiores, minusq. nodosas. Amba conos ferunt spiribama longitudine, nucamentis quam plurimum inuicem subintrantibus compactos, in quibus semen est subalbum nulla intus medulla. Picea nascitur in montibus & syluis. Abies in altis montibus inter Larices & Piceas. Picea fert resinam inter corticem & lignum gummi modo concretam, licet nonnunquam ex ea destuat liquida, Larigna similis. Abies verò inter corticem & corticem præstantissimum liquorem illum concludit, quem vulgò LAGRIMO, quasi abietis lachrymam, appellant, de quo veteres nihil (quod equidem sciam) posteritatis memoria prodidere. Nisi quispiam dixerit per abietes lachrymam intellexisse Galenum li. iii. de comp. med. per genera paulo antè citato, piceam illam liquidam resinam quam pro terebinthina institores vendebant. Cuius rei illud indicium esse videtur, quod scribat ipse, hanc & gustu, & odore terebinthina esse persimilem, quod in abiegnis lachryma maxime notatur, & quod insuper sit quãdantenus terebinthina acrior: namque huiusmodi qualitates in liquida picea resina minime reperiuntur. Quo fit, vt suspicandam putauerim, in his Galeni verbis, libr. xii. non fuisse cul-

mali succi alimentis: altera probatio, ex libro de causis platarum Theophrasti desumitur, ubi $\pi\acute{\iota}\nu\alpha\varsigma$ duo constituuntur genera, sativa & sylvestris: iam verò Pinum coli, notissimum est, non autem picem: tum diuisit $\pi\acute{\iota}\nu\alpha\varsigma$ in Ideam & Maritimam: at Picea solum in frigidis & excelsis montibus prouenit: tandem $\epsilon\kappa\ \tau\eta\ \pi\acute{\iota}\nu\alpha\varsigma$ copiosam picem fieri scribit, earumque proprium ut in tedam abeant: iam verò ex pinorum assulis tedaque picis copiam colligi, norunt alpium incolæ. Subiiciamus nomina. I. Pinus Sativa C.B. & Dod. gal. Lugd. Pinus urbana folio perpetuo, Theoph. Pinus, Plinio: sic & Bruf. Trag. Cord. in Diosc. Lon. Gef. Dod. Bellon. Lac. Cast. Cæf. Pinus domestica Tab. Pinus vulgarissima Lobelo. In hoc genere datur mas & femina: illa enim nucem fert rotundior, hæc longior. Adferuntur nunc ex noua Hispania pinci nuclei cathartici, pineis nucleis similes, in strobilis magnis, at molliore & nigriore putamine: Indi quinque aut sex tritos, in vino loco cathartici assumunt: de quibus Monardis & ex eo Lugdunensis historia. II. Pinus sylvestris duplex est, alia fructifera, alia sterilis: fructifera alia est montana, alia maritima: montana triplex, sativæ similis, altera quæ Tubulus Plinii, & tertia quæ Teda arbor. Maritima duplex, maior & minor. Sterilis etiam duplex, maior & minor. Pinus sylvestris sativæ similis C.B. quando enim sponte prouenit pinus, tū Pinaster dicitur, Plinio auctore: hinc Pinaster, Brunf. Trago, Lob. (cui & Pinus sylu. montana Theop.) Cæf. Thal. Pinus sylvestris siue Pinaster, Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. Gef. hor. Pinus sylu. fructifera, Lug. Pinus sylu. montana, Taber. Hæc in multis Hispaniæ & Lusitaniæ montibus crescit ad eò fructuosa, ut inde copia nucum pinearum in Galliam adferatur.

III. Pinus sylvestris humilis seu repens. C.B. quia sine caudice rami in terram sparsi sunt tubulorum modo, quare Tubulus Plinio, licet quibusdam in exemplaribus legatur Tibulus, in aliis Strubulus. Pinus syluest. altera, Dodo. gal. & fol. quoad iconem, quoad descriptionem tertia. Pinus sylvestris Mugo, Lobel. Tab. Pinus tubulus, Lugd. Pinus syluest. repens, Matth. in iconibus. IV. Pinus sylu. montana tertia. C.B. an Teda arbor fructifera Plinio? Pinus sylu. tertia, Dod. gall. Pinus sylu. altera species, Italia Cembro, Dod. Pinaster, Bellonio: Teda arbor, Lugd. Pinus syluest. Cembro, Tab. Pinus Tarentina Plinii, Matth. icon. Nuclei parui trianguli forma, quos putant à Plinio Tarentinas nucas appellatas lib. 15. cap. 10. quo loci nucum pinearum genera recenset: non autem quod censuerit Pini genus aliquod Tarentinum, ut quidam existimant, sed quòd hæc nucas Tarento Romam ueherentur. V. Pinus maritima longioribus setis C.B. Pinus syl. quinta Dod. gal. Pinus maritima maior Dod. Pinus maritima Theoph. Lob. Pinus maritima Lugd. & Taber. cui prima. VI. Pinus maritima altera C.B. sic & Matth. Lugd. Taber. Pinus sylu. 4. & Pino Idææ Theophrasti similis, Dod. gal. Pinus Idæa Theophrasti, Lob. Hæc duo genera potissimum nucum magnitudine differunt. Pinus sylvestris sterilis dicitur, non quòd nullum edat fructum, cum conos ferat, sed quòd nuclei edules non sint: qua de re Clus. histor. Hispan. & ex eo Lobelus, Dodonæus, & Lugdunensis historia. Præter hæc Pini genera, Clusius histo. Pannonica, meminit Pinastri latifolii iulis virentibus aut pallefcentibus: dein tenuifolii iulo purpurascente: tum pumilionis qui conos sursum spectantes habet. VII. Laricem nusquam in Græcia nasci, idcirco Theophrasto ignotam, statuunt: attamen quidam Pinum urbanam folio deciduo apud Theophrastum censent dicitur Larix, Bruf. Lon. Lac. Bellon. Fuch. Dod. gall. & folio, Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hor. Lob. Cast. Lugd. Cam. hor. Taber. Abies tertia & Larix, Trag. Pini syluestre genus, cui hyeme folia decidunt, Cæf. huius lachryma seu resina liquida pro Terebinthina venditur: in hac etiam sola Agaricum utile nascitur, de quo libro tertio agitur. VIII. Piceæ vox ab aliquibus Abieti & contra tribuitur, $\pi\acute{\iota}\nu\alpha\varsigma$ Theophrasto, (quamuis Gaza aliquando Laricem vertat) & veteribus: sunt qui à $\pi\acute{\iota}\nu\alpha\varsigma$ deriuatam putent, quòd hæc arbor, præ cæteris picem stillantibus, magnam copiam fundat: siquidem inter corticem & lignum gummi resinæ modò concrefcat, ac nonnunquam etiam liquida effluit. Dicitur Picea, Brunf. Lac. Cord. in Diosc. Lob. Cast. Cæf. (qui Tedam Plinii statuit) Thal. Tab. Lugd. Abies prima & rubra Trag. Abies femina & sapinum, (eò quòd Gallis Sapin dicatur) Bellon. sequutus Lacuna, Sapini nomine proponit iconem Bellonii. Picea & Abies rubra, Gef. Lon. Picea Plinii, Abies mascula Theophrasti, Clus. Pannon. Habet ex Bellonio Dodonæus edit. gall. aliam Abietis figuram, cuius rami sursum spectant, quam editione Latina pro Abiete altera proposuit: à Bellonio de Coniferis & in iconibus, Abies legitima & mas, Lacuna Abies, & Abietes Pilari, du choul in descriptione Pilari nominat, & ex eo Lugd. Verùm de his & similibus plenius suo loco. Sic & Clusius historia Pannonica Piceam pumilam nucamentis nucis ponticæ magnitudine è squamulis imbricatim compositis, sed in pungens foliolum desinentibus, quæ maturata debilitata concavas cellulas ostendant, proponit. IX. Quam Abietem Plinius, Theophrastus $\epsilon\lambda\alpha\tau\eta\varsigma$ nominat, vulgò Abies dicitur, ut Brunf. Bellon. Lac. Cord. Cast. Lob. Cæf. Lugd. Taber. Abies Candida Trago: Abies femina Anguill. Picea, Dodon. Abies Plinii & Abies femina Theophrasti, Clus. Panno.

Larix

Picea

Abies

Σχῆμα

LENTISCVS

CAP. LXXV.

LENTISCVS nota arbor est, cui toti vis inest adstringendi: semini enim, folio, ramo, cortici radicibusque cognatæ insunt vires. Liquamentum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & radix in aqua coquantur, & ubi abunde cocta, refrigerataque sunt, folia abiiciuntur: aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profusio, & dysenterias in potu: item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem, aut sedis prociencia. In totum acaciæ, & hypocistidis vicem representat. Idem facit succus è tritis foliis. Decoctum foru cana explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinam pellit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum astringentiam vim habens: quòd prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Pota utilis est sanguiné reicientibus, & tussi veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum mouet, additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum: palpebras oculis incommodas replicat: manducata halitum oris commendat, gingiuas contrahit.

Optima

Optima, & copiosissima in insula Chio provenit. Praefertur, nitidula modo resplendescens, & candore a Graecè uno Tyrhenica cere similis, adulta, b[er]retorrída, friabilis, odorata, fridorem edens. Viridis autem inferior verbo λαρύνη. Adulteratur thuris, resinæque pinæ nuce mistura.

I. LENTISCVS.



Lentiscus in Italia frequentissima nascitur, praesertimq[ue] in Hetruria maritimis nostris Senensibus. Gignitur in collapsis Romanorum aedificiis, ac ruderibus: quinetiam in tractu Tyrheni ubique copiosa oritur, in Campania maxime. Caterum Lentisci nonnullae sunt plantae, quae in arbore media proceritate assurgunt: nonnulla vero humiles, quae nullo grandiore caudice a radicibus sublato, sed virgultis, stolonibusq[ue], innumeri corylorum sylvestriū modo disiliunt: verum tamen Lentiscus tum ramis, tum foliis densior constat, magisq[ue] virgultorum cacuminibus ad terram desceditur. Foliis utraq[ue] est Myrto amalis, octo ex uno pediculo prodeuntibus, pari v[er]o trunq[ue], exortu graueolentibus, pinguis, friabilibus, & in obscuram virentibus, in ambitu tamen rubent, sicuti & quibusdam venulis: perpetua fronde viret. Cortice est subroso, seto, tenaci, flexibiliq[ue]. Profert terebinthi modo, praeter facinorosos fructus rubentesq[ue] in vno modum, e quibus oleum elicitur, folliculos corniculi modo intortos, in quibus includitur liquor lymphidus: qui tandem veterascens vertitur in bestiolas is persimiles, quae ex ulmi, & terebinthi folliculis euolant. Tota planta grauitate olet: quapropter nonnulli, quod olfactu caput aggrauet, ipsam deuitat. Sed Lentiscum, quae roboris magnitudine proueniat, folio sorbi, acinis sylvestris punice rubentibus, ut Ruellius scribit, haecenus non vidi, nec id vnquam me legisse memini apud probatos auctores. Idcirco Ruellium haec in re hallucinatum crediderim, quemadmodum & Hermolau, qui ea esse lentisci folia existimat, quibus coriari Venetis pelles conficiunt, vulgo proprie appellatae sunt. Siquidem planta, a qua haec folia decerpantur, maxime a lentisco differt, est cum terebinthino aliquam habeat similitudinem. Fert etiam Lentiscus Italica mastichen, ut ipse attestari possum: sed rara admodum, nec Chia comparanda. Itaq[ue] immerito a nonnullis

ruel. & p[ro]pp[er]a.
Et fulua leg. Orib.
Lentisci con- sideratio, & historia
Lentiscus to- boris magni- tudine.
Ruel. & Her- molai lapsus.
Mastiches confuleratio.
Mastiche In- dica.
Mastiches cura.
Mastichis res.
Lentisci virtus ex Galeno.
Mastichem res ex Gal.
Mastiches nigra.
Caphura ut adulteratur.
Caphura historia, & genera.

notatur Aucenna, quod Mastichen Italicam memoria prodiderit. Quippe quod ij, qui maiori in errore versantur, existi- maauerint non alibi fortasse, quam in Chio nasci. Indicam mastichen e spinosa quadam planta manare, non solum Theo- phrastus, sed etiam alij tradidere, quemadmodum & Plinius, qui lib. 12. cap. 17. non modo Chia mastiches meminit, sed a- liorum quoque, quae in Arabia, Asia, Graecia, Pontog, proueniunt. Quae ad nos comportatur, & in vniuersam ferè Europā, in Chio tantum, Aegei maris insula, prouenit, ex domesticis solum lentisci plantis, vulnerato quotannis arboris trunco. Fluit enim inde Mastiche, & in terra circumpauit a concrefcit. Mastiches id omne quod in tota Insula prouenit, Reipubli- ca debetur, quo fit ut qui vindemia tempore propriis in agris Mastichen colligunt, id totum absque dolo in commune ferāt. Mulctantur secta manu, qui Lentiscum Mastichen fundentē in proprio, vel alieno agro exciderit, tanta est Mastiches cura, & reuerentia apud Chios. Nec ab re quidem, cum illis tantum Mundus ferè vniuersus tam necessarium ac salubre medica- mentum acceptum referat. Audio etiam in Creta lentiscum Mastichen fundere, sed flauam, amarā, & Chia longe dete- riorem. Restringit Mastiche sanguinentē naribus manantem, si vna cum Thure, sanguine draconis, & leporinis pilis com- bustis, excipiatur oui albo, & fronti applicetur, fascia superposita, quae arctē constringat. Manditur vna cum cera odora- ta ad dentium dolores, & ad pituitam a capite detrahendam. Tollit, mulcetq[ue] mastiche frigidis articularum dolores, si vna cum cumino, pulegio, salvia, lauri baccis, & sabina, melle excipiatur, & dolorifico loco applicetur: valet ad ventriculi do- lores, ubi affectus iturus dormitum tres mastiches grumos deuorauerit: non solum enim hoc medicamento tollitur dolor, sed fit quoque, ne post hac sentiat. Lentisci meminit Galenus lib. 8. de simpl. medic. facultatibus, sic inquit. Lentiscus facultate ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca compositus est, ob quam & moderatē adstringit. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditate, & frigiditate differentia quodammodo est mediū, & symmetrus. Similem omnibus sui partibus adstrictionem obtinet in radicibus ramis, extremis turionibus, ger- minibus, ac foliis, praetera fructu, & cortice: ac si succum ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderatē adstringens. Itaque bibitur & per se, & cum aliis medicamentis, quae dysenterias, & alui affectus sanant: quin & ad san- guinis exuptiones, sanguinisq[ue] ex utero eruptiones, tum sedis, vuluag, procidentias idoneus est, utpote ad hypocistida non- nihil propè accedens. Meminit idem & mastiches lib. 7. simpl. med. his verbis. Mastiche candida quidem, & Chia consueto more cognominata, quodammodo ex contrariis composita facultatibus est, adstringente videlicet, & emolliente. Proinde stomachi, ventris, intestinorum, iecorisq[ue], inflammationibus competit, utputa secundo ordine excalfaciens, & desiccans. Nigra verò, quae Aegyptia cognominatur, tum magis desiccatur, tum minus adstrictoria facultatis est particeps: quamobrem aptior est ad ea, quae validiorem digestionem per halitum exposcunt: haec igitur ratione & furunculus bonū est remedium. Porro oleum, vnguentumq[ue], mastichinum ex Chia conficitur, non admodū sanè ex Aegyptia: caterum similis est & ipsum mastiche facultatis. Haec de lentisco, & mastiche Galenus posteritati memoria prodidit. Sed cū mastiche mihi Caphuram in memoria redegerit, quod certò scia, eā mastiche, ardenti aqua, zedoariag, ab impostoribus adulterari, cumq[ue] Dioscorides, Galenus, & ceteri illius seculi scriptores ipsam non solum non adnotauerint, sed ne nouerint quidē, silentio minimè dissimulā- dū fore putauimus, quod magis legentibus satisfiat, quantū tū a Serapione, tū etiā ab his, qui meridionale plagam, & India ora hoc aeuo navigationibus perlustrarūt, memoria proditū est. CAPHURA igitur est gūmi arboris cuiusdā in India nascē- tis tāta magnitudine, ac proceritate, ut sub eius vmbra hominū ceterura recondi possint. Nascitur haec arbor in morib. mari propinquis.

propinqua: materie leni, ferulea, qua prodit Caphura. Huius largioris proventus augurium est, cum frequentibus caelum fulgetris corruscat, aut crebro tonitru constrepit, vel cum terra motu concutitur. Huius multa traduntur genera. Una in interuenis ligni, lamellarum modo impacta figitur. Alia foras emergit cortice abrupto, veluti resina, illisq; gummi modo inhaeret, maculis inter initia rubentibus, postmodum vel calore solis extosta, vel ignium vi candescit: hanc sumpto a rege quodam Riach illius loci nomine, indigena Riachinam appellant: quandoquidem is primus dealbanda Caphura rationem adinuenit. Hac ceteris & bonitate, & tenuitate praestat, longioriq; perdurat tempore. Alia crassior, nec pellucens, atro colore, proinde bonitate cedens. Tertia vilior reperitur, fusco colore. Succedit huic impurius alia, qua arboris scobe, ramantis, & assulis implicita, gummi more agglutinata lentescit, tuberculo amara nucis, aut faba, aut cicercis. Hanc pontificum, & sacerdotum suffimentis, sicut thuris, & myrrham, costumq; in templis dicant. Sed haec omnes in duo tantum fastigia rediguntur, in rudem, & elaboratam: siquidem rudis est Caphura omnis ignem non experta: elaborata vero, qua solis, vel

Fuch. opinio improbata, Caphuram bituminis generis statuetis.

Platearii error volentis Caphuram ex succo herbae fieri. Caphura terperamentum, & vices.

Aqua ad faciei roborem.

Caphura legitima que & quomodo asseruanda.

Caphura alba reddatur. Nomina.

Resina Lentiscae.

Mastiche duplex.

ignis ardore excocta, atque purgata album contraxit colorem, ut pote & cera. Fuchsius lib. primo de componendis medicamentis, putat Caphuram esse bituminis Indici genus, quod scripserit Serapio auctoritate Almazodi, largioris Caphurae proventus augurium esse, cum caelum crebris fulgetris corruscat, aut plurimis strepit tonitruis, vel cum regio, in qua prouenit, terramotu concutitur: argumento, quod similiter ex terra concussu magna tum sulphuris, tum bituminis copia profundi soleat. Sed dissentit ab eo opinio nostra, quandoquidem nec Serapionis, nec aliorum quorumcunque hanc fuisse sententiam existimem: cum tam ipse, quam ceteri, qui de Caphura scripserunt, arboris cuiusdam vastissima proceritatis gummi, vel resinam Caphuram esse scribant. His accedit quod ex omni bituminum genere per alembicum (ut Chimista vocant) oleum & aqua elici potest, id quod ex caphura, haudquaquam succedit. Siquidem ea hydrargyri modo ad vasis cacumen ascendit, ibiq; tota purior facta cohaeret. Nimum oscit anter de hac scripserit videtur Platearius Salernitanus: quippe qui Caphuram gummi arboris esse insiciatur, Dioscoridis & complurium testimonio, ex succo cuiusdam herbae fieri tradens. Quod profecto falsum est, cum nullibi Caphura meminerit Dioscorides. Eam autem esse gummi non solum Auicenna, & Serapionis testimonio probatur, sed & Lusitanorum, qui nostro aeuo per meridiem ad Calicut orientalis Indiae emporium nauigant. Credidere Serapio, & Auicenna, Caphuram tertio abscessu & ficcare, & refrigerare: qua tamen cum vehementer etiam in aquam proiecta conflagret, sit perquam odorata, & aded tenuium partium, ut saepe per se in auram euanescat, illis reclamare videtur. Quo sit, ut quis suspicari possit, aut legitimam Caphuram ad nos non aduehi, aut hoc loco Arabum monumenta (ut in aliis quam plurimis) esse vitia. Capitis dolores (si tamen in hac parte credendum est Mauritani) ex calore prouenientes, Caphura illita mulcet: incandescentes inflammationes restinguit, praesertimq; iocinoris. Renes, & seminaria vasa refrigerat, sanguinemq; cogit. Circumlitioibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas tam vulnerum, quam vlcera inflammationes. Erysipelas extinguit, & aduersus gonorrhoeam, & albas vuluae fluxiones efficax est cum succino, & aqua nymphae hausta. Idem praestat pubi, seu imo ventri, testibus, renibusq; illita: qua tamen antea psyllii seminis spissamento, aut omphacio, aut solani succo probe sit macerata. Sanguinem e naribus profluentem sistit, aut cum vrtica semine immissa, aut ex maioris sedi, & plantagine succo fronti circumlita. Collyrius ad calidas oculorum lippitudines vtiliter imponitur. Renibus ac testibus illita venerem extinguit. Corpora a putredine praeseruat: proinde commode antidotis admiscetur, qua contra venena, venenosorum animalium ictum, & pestilentes affectus conficiuntur. Caphura vna cum Chryfocolla, qua vtuntur aurifabri, trita, & cum melle illita, faciei cutim clariorem splendidioraq; reddit. Eadem trita vnicuique pondere cum sulphuris equali portione, additis myrrha, thurisq; cuiusque quaternis drachmis, & aquae rosarum libra, & vitreo vase exceptis omnibus diebusq; decem insolaris, remedium est praestantissimum ad faciei ruborem pustulis scatentem, si cum hac aqua saepe lauetur. In vniuersum viribus innumeris pollet, quas breuitati consulentes praetermittimus. Legitima probatio talis est. In calido pane e furno recentissime sublato, bipartitoq; manibus scisso, Caphura ponatur: quod si humore madeat, syncera est argumentum: sin contra perarescat, spuria ac factitia signum. Ceterum nisi diligenter asseruetur, ex operculatis etiam capsulis nonnunquam euanescit: itaq; saepe deluduntur seplasiarii. Asseruetur tamen secure vase marmoreo, aut alabastrino, lini & psyllii semine sepulta. Nec desunt, qui eam pipere feliciter asseruari putent, quod nec plane comprobandum videtur. Venetias Caphuram omnem rudem important, ibiq; igne, & arte vitreis organo elaboratur, sic ut candescat, atque pelluceat. $\Sigma\chi\iota\upsilon\varsigma$ Graecis, Lentiscus Latinis appellatur: Daru, Arabibus: Lentisco, Italis: Mata, aut Arueria, Hispanis: Lentisque, Gallis. Germanis, Mastixbaum. Huius resina $\mu\alpha\varsigma\tau\iota\chi\eta$ Graecis vocatur: Latine, Mastiche, aut Resina lentiscina: Arabicè, Mastech, Mastech, siue Mastoche: Italicè, Mastice: Germanicè ac Gallicè, Mastice: Hispanicè, Almafiga. Quod Arabibus Kaphor, seu Casur, recentioribus Graecis $\kappa\alpha\phi\upsilon\upsilon\alpha$, ut etiam Latini Caphura nominatur: Italis, Camphora: Germanis, Campher: Gallis, Camphre.

Lentiscus $\Sigma\chi\iota\upsilon\varsigma$ dicitur (non $\Sigma\chi\omicron\upsilon\varsigma$, quod est Iuncus aromaticus seu Squinanthum officinarum) quasi $\Sigma\chi\iota\varsigma$ fissilis, quod facile & frequenter findatur in dentiscalpia. At lentiscus, forte quod folia eius lentore quodam lentescant. Arbor mastiches, eod quod Mastichen ferat, dici posset: est enim ex resiniferarum genere, a quibus tamen foliis differt. Arbor, Lentiscus dicitur herbariis omnibus: at baccas siue fructus, Hippocrates libro de natura muliebri, appellat. Sic resina quae ex trunco vulnerato primum liquida destillat, dein paulatim in guttas densatur foris candida aut flauescens, propter inhaerentem puluerem, quo absterfo propemodum crystallina & translucens, dicitur Resina Lentiscina, Mastiche & officinis Mastix, Arabibus Gluten Romanum, quae optima in Chio prouenit: hinc factum, ut apud Graecos saepe chia simpliciter pro Mastiche scriptum reperiat. Duplex est, alia proprie Mastiche dicta, alia improprie. Proprie dicta est ea quae ex Lentisco effluit, haecque vel alba, vel viridis Dioscoridi: vel ut Galenus, alia alba, quae Chia, alia nigra, quae Aegyptia: habetur & Cretensis quae flaua est & amara: apud Italos exiguum fundunt. Improprie dicta est ea, quae ex spinosa planta emanat, ut habet Theophrastus 6. hist. 4. vel ut Plinius ex humili spina: quae planta Chamæleon albus Dioscoridi lib. 3. dicitur: qui scribit Ixion aliquibus ided vocari, quod quibusdam in locis viscum circa radicem eius reperiat, quo pro Mastiche vtantur mulieres: & Theophrastus Acanthicen Mastichen vocat, Gaza spinalem vertit. Est & altera arbor, quam LENTISCVM PERVVIANAM vocamus, quae Lentisco similis, ramosa, ramis obsequiosis deorsum spectantibus, cortice subruffo & rugoso tectis: foliis lentisci modo integris, sed acuminatioribus. vtrinque binis non tamen sibi ex opposito respodentibus. quindecim, septedecim & etiam nouendecim ab vno pediculo coherentibus, saturate virentibus, per quorum mediū linea subalbicans excurrit & ad latera venulae quasi rugosè discurrunt, quae inferna parte potissimum conspiciuntur, haec trita non ingrati spirant odorem. Flores qui in ramorum summitatibus conspiciuntur, ramulis palmaribus & longioribus

II. LENTISCVS PERVVIANA.

III. MOLLIS ARBOR.



ribus instar racemi sparsi insident, albicant & ex quinque foliis acuminatis cōponuntur: his succedunt fructus rotundi, vt Lentisci, paruis pediculis & pericarpis sustentati, qui racematim conglobantur, primum virides, mox rubei, dein subnigri, piperis instar acres & pingues, tenui tecti membrana, cui medulla acutissimi saporis & odoris subest. Semen ex America primum allatum, & Piperis nomine Romæ in horto Illustris. Cardinalis Columnæ, à quodam Pharmacopœo Septembri mense factū, & sequenti anno ad quinque cubitos excreuit, at semen ad maturitatem non peruenit, monente Doctore Edoardo Vorstio, qui nobis ramulum cum baccis (vnde delineari curauimus) obtulit. At nunc Lentiscum altitudine adæquat, vnde ramos cubitales floribus & tenellis baccis refertos, à Doctore Io. Neuderfero (vnà cū aliis elegantissimis) accepimus, vt & Gummi quod ex inciso cortice emanat. Etenim apud Americanos, ex cortice vulnerato gummi album mastici simile colligitur, quod in aqua vel decocto aliquo dissolutum ab incolis drachmæ vnus pondere pro cathartico sumitur, cum eo blande humores omnes vacuentur, & hydropicorum aquæ educantur. Ex foliorum libra, scrupulus vnus succi elicitor, quem Opobalsamo comparant. Verum cum hic Lentiscus Peruvianus, ab incolis Molle (quod molliat aluum fortè) dicatur, & in multis (nisi sit eadem) cum ea quam pro Molle, Carolus Clusius in Monardem proposuit, conueniat, & eius iconem proponere placuit, cuius hæc est apud Clusium historia, ex quo etiam Lugdunensis & Tabernæmontanus desumpserunt. Cæterum odor fœniculi mihi in memoriam reuocat arborem in Peru nascentem, Molle vocant, cuius ego pusillas duas plantas è semine natas, vidi ante aliquot annos Machliniæ in horto splendidissimo Illustris viri D. Ioan. de Brancion, sed quæ tertio anno perierunt hyemis iniuria. Erant autem eæ arbusculæ trunco (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis consperso veluti maculis cinereis, folia pennata vt fraxini, sed multo minora, ex viridi nigricantia, serrata, & sub extremū angustiora, quæ ab arbusculis reuulsa, lacteo succo, eoque lento & viscido & odorato manabant, & ipsa folia trita fœniculi odorem reddebant, gustata adstringentis facultatis non nihil habere videbantur. Fructus ex quo natæ sunt, piperis serè magnitudine, oleaginosus, pellicularubescente tectus, racematim coherens, vt ex eius iconem, quam ad viuum depingi tum temporis curauimus, conspiceret licet: florē quem habeat ignoramus, sed quibusdam auctoribus minutus est, viti similis. Hæc arbor abundanter nascitur in conuallibus & locis planis Peruanæ regionis, vt referunt omnes qui Occidentium Indiarum descriptionem dederunt. Sed Petrus Cieca maximè, qui eius descriptionem cap. 112. primæ partis Chronici dedit.

Τερεβινθος.

TEREBINTHVS.

CAP. LXXVI.

TEREBINTHVS cognita arbor est: cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem, ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo, sumptaque. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, vrinam mouet, venerem excitat: contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia petraea defertur. Prouenit etiã in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica, & a Cycladibus insulis. Sed præualet candida, perlucida, vitreo colore, b[& in cæruleū vergente,] terebinthū olens. Terebinthina resinas omnes antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea, & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi, & tibi conueniunt per se, aut in

a Meū addit
b Hæc non
leg Orib.

aut in ecclēmate ex melle: vitia pectoris expurgant, vrinam cient, cruda concoquunt, ventrem emolliat, palpebras commodissime replicant: lepras tollunt, cum arugine ac sutorio atramento, nitroque: auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium vtilis, malagmatis, acopisque admiscuntur. Laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Ρητιναί αλλαι.

RESINÆ ALIÆ.

CAP. LXXVII.

a Hæc delet
Onib.

b καθύπερ i.
liquida Meū.
c Meum &
Drag. πινύ-
νη, καί ελα-
τίνη. i. pinea
& abiegna.

LIQUIDA resina è pinu & picea, à Gallia & Hetturia conuehi solet, atque olim à Colophone petebatur: hinc Colophonix sibi cognomentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina: quam vernaculo nomine larica, hoc est, larignam appellant incolæ. Ea a [in linctu, & per se] magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ verò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, alia abiete, alia picea, & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neque b diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. c E picea, & abiete resinæ cæteras antecedunt: odorata enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis, & cupressomanarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur: veruntamen eorundem gratia, quorum & ille, sumi solent. Lentiscina terebinthinæ respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur: itaque resinæ cõgius in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Cæterum vbi refrigit, in fictile non picatum, quod aconitum vocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximii candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò sæculenta sordes excernatur. Vritur quoque sine aqua, primum lento igne, & vbi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & tri duo citra intermissionem discoquuntur, vsque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint: mox, vt dictum est, reponuntur. Aridas vnus diei spatio decorisse satis est. Vstæ odoratis malagmatibus, & acopis, & vnguentorum colorationibus magnopere vtilis sunt. E resina perinde atque thure, fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur: prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

TEREBINTHVS.

Terebinthi
descriptio.

Terebinthi
historia ex
Theophrast.



Terebinthus folio est straximi, crassiore, pinguioreq; & rotundiore, corimo proximo. Ligni materies lentisco similis quemadmodum & cortex. Radices valida, alte descendentes. Flos olea similis, sed rufescens, è quo fructus rubens recentatim prodit, vuarum modo, Iuniperi baccarum magnitudine, resinofus, durusq; Cornicula edit rubentia, carpino- rum similitudine, in quibus culices quidam concluduntur, vna cum liquore quodam, vt in lentisco. Resina è trunco manat, vt è reliquis plantis ipsam fundentibus, liquida & odorata, Larigna, aut Abiegna similis, caterisq; præstantior, lentiscina excepta. Terebinthorum (vt Theophrastus memoria prodidit lib. 3. cap. 15. de historia plantarum) alia mascula, alia femina. Masculula sterilis est, ob idq; sexui maris adoptatur. Fæminarum alia fructum protinus rufum promit, magnitudine lentis, qui concoqui nequit: alia viridem editum, rufum postmodum tingit, & cum vna maturentem, nigrum nouissime facit, magnitudine fabæ, resinofum, & sulphurosum. Circa Idam, & Macedoniam breuis, fruticosa, cõtortaq; nascitur: vt apud Damascum Syria magna, copiosa, decoraq; montem enim inibi Terebinthus refertur, vt nil aliud habeat, referunt. Materies ei lenta, radices valida in profundo, atque in totum incorrupta hæc arbor habetur. Flos oleæ, verum colore rufo. Folia circa vnum pediculum, pleraque specie laurinorum, coniugatim, quemadmodum sorbo, quodq; parte postrema acuminet, impar exit: verum minus angulata, quam sorbo, ambituq; laurino similia, & pingua cõ vniuerso fructu. Fert & ad nucis similitudinem quadam concava, vt vlmus: quibus bestiola tãquam culices innascuntur. Fit in hu resinofum quid, lentumq; sed resina tamen nõ hinc legitur, sed à ligno. Fructus resina copiam non mittit, sed manibus tantum adheret: et si non lauetur, postquam collectus est, inter se cohaerescit: cum verò lauatur, candidus, probeque non maturus supernat at, niger subsidit. Idem refert deinde li.

4. cap. 5. historia plantarum, Indicam etiamnum Terebinthum haberi: cui folia, rami, & reliqua omnia Terebintho similia: fructus autem diuersus, similis enim amygdalis. Nam & in Bactris Terebinthum hanc esse, ferreque, nuce amygdalarum magnitudine: quoniam non magnas, sed visu similes, & suauitate amygdalis præstantiores: & ideo loci illius incolæ huius potius vti: hæc Theophrastus. Quibus facile adducor ad credendum Indicam Theophrasti Terebinthum, nil aliud designare quam nostratam Pistaceam. Est enim hæc tota facie Terebintho similis, & nuce profert Amygdalis suauiores. Terebinthum vidi ego primum in colle vulgò cognomine Castel Trento, non procul à ciuitate Tridenti prope Athesim, à Theophrasti historia hand quaquam dissimilem, facta huius videndi mihi copia à clarissimo medico Iulio Alexandrino Tridentino: repe-

Indica Tere-
binthus pi-
stacearum
planta.

rique

rique ipsam deinde in aliis compluribus Hetruriz locis, videlicet in collapsis Romanorum adificiis ac ruderibus: sed frequē-
 tem admodum in lapidibus prope Pucinum castrum, Adriatico sinu non longè à Tergesto: saxosa enim & calida
 amat loca. Ab hac saepe, dum illac iter haberem, & fructus & folliculos c. prarum cornibus non absimiles, quibusdam in-
 tus bestiolis culicis figuram pra se ferentibus, & resinam decerpsi: qua et si omnium prastantissima sit, non tamen diu est,
 quod Venetias defertur ex Cypro. Antea coctam afferebant, vel quod esset aduectu aprior, vel quod impostoribus ad adul-
 terationem aditus hoc modo facilius fieret: verum liquida ut per se ex arbore manat, iam frequens facta est. Cateram
 quia terebinthina iamdiu in Italiam non aduehebatur (ut supra in larice mentione diximus) larigna non modo tere-
 binthina locum sibi vendicauerat, sed etiam cognomentum. At cum eodem loco à nobis de pinea, picea, larigna, abiegnaq;
 resina, & earum à quibus colliguntur arboribus, abunde scriptum sit, operapretium quidem non est, ut hic iterum ea repe-
 tamus. Scire tamen conuenit, rarissimas esse abietes in montibus Tridentinis, qua praeter fluentem lachrymam, aridam
 fundant resinam: sed si quadam inueniuntur, haec est (ut Plinius inquit) arboris morbus. Cuius rei manifestum argumen-
 tum est, quod omnis abies, qua resinam fundit, tabida sit, putris, & cariota. Brasauolus de resinis differens, Plinium in ea-
 rum historia à Dioscoride dissentire autumat, quod scilicet Plinius lib. 24. cap. 6. tradiderit summas resinae species duas, sic-
 cam & liquidam: siccam in pinu, & picea fieri: liquidam è terebintho, larice, lentisco, cupresso. Dioscorides vero ex pinu,
 & picea, & liquidam praeter siccam haberi scriptum reliquerit. Quos tamen melius erat sic conciliasse, quod quamuis as-
 serat Plinius, siccas resinas è pinu, & picea colligi: non propterea obstat, quominus ferant pariter huiuscemodi arbores &
 liquidas, & siccas resinas. Quandoquidem in Tridentino tractu pluribus variisq; locis, è pinu, piceaq; antea longo tempore
 caps. solisq; ardore astuantibus liquidas resinas exudare comperimus larigna non absimiles: quod etiam saepe euenit in as-
 scribis ex hisce arboribus paratis, & in tignis, vel trabibus, qua adificiis coaptantur. Verum enimvero malim dicere Pliniū
 errasse, quod liquidarum generi lentiscinam adscribat, qua est nostra mastiche, ceteris profecto durior. Ad haec scire etiam
 conuenit, quod qua in officinis Colophonia Hispanica, Graecaq; dicitur, illius species est quam coque re Dioscorides edocuit.
 Constat hac coloribus diuersis, utpote crystallina, hyacinthina, saturatoq; colore, pro resinarum ex quibus conficitur, va-
 rietate: quippe (ut Dioscorides ait) alia candida est, alia olei, alia mellis colore, qualis est larigna. Qua vero à Colophone
 Ionia vrbe sibi cognomentum comparauit, est (ut refert Plinius lib. 14. cap. 20.) praeter ceteras fulua: neq; alia de causa vo-
 catur & Hispanica, & Graeca, nisi quod ex usdem etiam regionibus aduehatur. Attamen animaduertendum est aliam ab
 hac, qua neque fricta, neque excocta est, haberi Colophoniam: siquidem scribit Dioscorides quod pinea, piceaq; liquida, ac
 pinguis resina ex Colophone afferebatur: ob idq; Colophonia per excellentiam vocabatur. Quod ite testatur Galenus li. 7. de
 compos. med. per genera, cum inquit. Quoniam vero piceam resinam & frictam, & colophoniam appellare consueuerunt,
 sciendum venit, aliam quandam esse colophoniam Chia masticha persimilem, molliens aliquid habens, quemadmodum
 illa, & thus. Et libro 2. eiusdem. Est, inquit, inter liquidas etiam colophonia thuris redolens, qua nonnullis sola vocatur
 colophonia, odoratu suauitatem quandam referens, ut abietina, & calore sicut illa mediocri praedita: nascitur admodum
 modica, atque ob id pretiosa est. Porro si quispiam diceret, non cognouisse Plinium, neque Dioscoridem, liquidam abie-
 gniam, quam aliqui lachrymam, nonnulli vero abietis oleum nuncupant, eum ne tantillum quidem à veritate desciscere
 putauerim: siquidem hi de liquidis abiegna (quod legerim) nihil memoriae prodiderunt. Terebinthina resina auxiliatur
 laterum doloribus, sanat cum labiorum, tum faciei rimas. Scabiem & impetiginem delet illita, vlcera expurgat, &
 vulnera recentia glutinat. Splenem attenuat saepe deuorata, valet ad articulorum dolores, nempe ad podagram, chira-
 gram, & ischiadicos affectus, vbi frequenter sumatur vncia pondere, addito chamapitys, aut saluia, aut stachadi
 puluere. Terebinthi & resinarum meminit Galenus lib. 8. de simplicium medicamentorum facultate, vbi ita scri-
 ptum reliquit; Terebinthi tum cortex, tum solia, tum fructus adstrictorium quiddam obtinent: sed & secundo ordine
 excafaciunt. Itaque quod etiā desiccant, manifestum est: recentes quidem etiamnum, humidisq; modicè: sicci vero, ordine
 secundo adstringunt, roborant, repellunt, contrahunt. Caterum fructus aridus propinquus est etiam tertio ordini desicc-
 antium: est enim adeo calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaque etiam vrinam prouocat, & lie-
 nibus prodest. Paulò superius de resinis differens, sic inquit. Resina omnes desiccant, & excafaciunt. Caterum inter se dis-
 crepant, quod plus, ac minus habeant in gustu quidem acrimonia, in facultate vero caliditatis: tum quod alia plus, alia mi-
 nus sortita sunt partium tenuitatis: praeterea quod nonnulla adstrictionis sunt participes, alia nequaquam. Primas meruit
 omnium non iniuria lentiscina: eam vocant mastichen. Nam praeterquam quod paucula ei adest adstrictio, adeo ut stoma-
 chi ventrisq; & iecoris imbecillitatibus, & phlegmonis conueniat, in super illi inest mordacitate vacans desiccatio: mini-
 mum enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem, non tamen
 similiter atque mastiche, adstrictionem possidens. Caterum adiunctam habet amaritudinem quandam, per quam magis
 etiam quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatē inest & abstersio, tanta quidem, ut & psoras sanet: quin etiam
 qua in profundo residet, ceteris resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Attamen
 picea, & hac etiam magis strobilina acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen digerunt, neque attrahunt. Media in-
 ter has sunt pinea, & abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen quam aut picea, aut strobilina. Habet
 porro etiam emolliens quiddam terebinthina: secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut & cyparissina aci-
 monia. Et lib. 3. de compositione medicamentorum per genera inquit. Etenim cera ad liquiditatem multo pingui indiget:
 at resina, qua quidem arida prorsus sunt, modico: liquida & siccam quandam substantiam ad emplastri crassitudinem
 assumere possulant. In ceru igitur non magna humiditatis, ac siccitatis differentia est: in resinis, sicut etiam in pice gene-
 re contra, arida ab humidis permultum differunt. Omnium ergo resinarum siccissima est, quam nonnulli frictam, alii co-
 lophoniam appellant. Huic succedit, qua ex fictilibus impura, nec fricta sumitur, quam si purges, in frictam mutabitur:
 his ambabus siccior est, qua dicitur πικρὸν φόνημα, ac si dicas pinea germinatio. Hanc sanè, ceu squalidam in praesenti
 emplastri compositionem non esse idoneam ratus, abiecti: vsus autem sum fricta, & liquidis. Iam vero ex his quoque non-
 nulla diutius liquida permanent, quemadmodum terebinthina, alia citò inarescunt, sicut strobilina: media vtriusque est
 abietina. Quinetiam facultate calidior est quidem strobilina, mox vero abietina, deinde terebinthina: cupressi resi-
 nam miscere non ausus sum, ut qua nonnihil adstringeret. Putabit forsitan aliquis nobiscum dissentire Dioscoridem Ana-
 zarbeum in sermone de resinis: haec verba scribentem, primo de medica materia commentario: Ex omnibus resinis princi-
 patum terebinthina datur, post eam lentiscina, tum ei, qua de pinu raditur, & abiete, post quas picea, strobilinaque nu-
 meratur: in his enim Dioscorides tanquam de infima strobilina, optima vero terebinthina sentire videtur. Verum ego ex
 his tribus resinis strobilina, abietina, terebinthina, principem certè strobilina calore, secundam abietinam, postremam
 terebinthinam esse dixi: haec tamen de resinis Galenus. Sed hac in re animaduertendum est, quod hac in loco ceteris
 strobi-

Resina tere-
binthina.

Brasa, opinio
reprobata.

Colophoniam
consideratio.

Abiegna li-
quida Dio-
& Plin. igau-
ta.
Terebinthi-
nae resina.

Terebinthi
vires ex Gal.

Resinarum
vires ex Gal.

Nomina,

strobilum non aliter praefert Galenus, nisi quod omnes caliditate tantum antecellat: siquidem in vniuersum in medicinae compositione a Dioscoride nequaquam dissentit, videlicet quod inter omnes terebinthina primas occupet sedes, paulo post declarat, dicens. Inter resinas optimam, tanquam medicamentum in multiplices vsus accommodatum, merito terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Excalfacit, extrahit, emollit, abstergit, deijcit. Arbor, quae Graece τέριμινθος, Latine Terebinthus appellatur: Arabicè, Baton, Boton, Botin, siue Albotin: Italice, Terebintho: Gallice, Terbentin. Resina verò ita Latinis vocata, Graecis πινθη nuncupatur: Arabibus, Raim, siue Natig: Italicè, Ragia: Germanis, Nark.

Resina duplex est.
Colophoniam
Diosc. à nostra differt.

Terebinthus, τέριμινθος Dioscoridi, Galeno & Paulo: τερπινθος Theophrasto: apud Nicandrum legitur τέριμινθος, quo loci scholiastes idem vult esse quod τερπινθος. Terebinthum herbarii vocant: cuius fructum Auicenna grana viridia nominat: ipsam verò resinam, Gluten albotin, Nicandro alexiph. τέριμινθος. Resina omnis duplex est, alia liquida, alia sicca, ad quas differentias omnia resinarum genera referri possunt. Colophoniam videtur Dioscorides à pinu vel picea sumere, quae non ea est, qua hodie vtimur: cum nostra resina sit siccissima, veterum fuerit liquida, quam aliqui cedri picem credunt, vulgò pix sicca Graeca, dicitur: frictam etiam vocant Colophoniam: & Graeci frictam resinam, simpliciter πινθη appellat, vt 4. de tuenda sanitate, & 6. methodi, apud Galenum legitur.

Πικρα υγρη.

PIX LIQUIDA. CAP. LXXVIII.

PIX liquida, quam alii conum vocant, è pinguisimis pini, piceaeque lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, lauis. Contra venena, phthisim, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato: tonsillarum & vuae inflammationes, anginaeque vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus: adiecta verò pari cera, scabros vngues extricat, impetiginisque emendat: vluarum duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinaeque hordeacea, & pueri impubis vrina decocta, strumas rumpit: cohibet vlcera, quae serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut sulfuribus illita. Caeterum cum thuris manna, & cerato profundos vlcerum sinus conglutinat: rimis sedis & pedum magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat, quin & cum vua passa, & melle carboniculos, & putrida vlcera emarginat, dirumpitque. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probe immiscetur.

Πικρα υγρη.

PICINVM OLEVVM. CAP. LXXIX.

CAP. LXXIX.

Orib. nō leg.

EPICE fit quod pisselaō appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum [lacti.] Nā expāsa, quandiu pix coquitur, supra cortinam vellera pura madescit, acceptoq; halitu eius exprimuntur in vas, idq; tandiu fiat, donec pix coquatur. Quas pix liquida praebet utilitates: alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus & liquida pix medetur: iumentorum vlcera, scabiemque emendat.

Αιγυπτια υγρη πικρα.

FVLIGO LIQVIDAE PICIS. CAP. LXXX.

CAP. LXXX.

FIT hoc modo è liquida pice fuligo: in lucerna noua, quae elychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamque fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisque. Vsui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & venustant, & ad circumlitiones. Item vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles, lachrymososque oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

Πικρα ξηρα.

PIX ARIDA. CAP. LXXXI.

CAP. LXXXI.

Conclusa nō legit Orib.

LIQVIDA pix decocta in spissam coit, [quam vocant aliqui palimpissam,] quo in genere quaedam visci modo lentescit, [boscas cognominata:] altera sicca est. Probatum pura, pinguis, & odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinaeque simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula panosque discutit, vlcera replet: vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur.

† Hoc loco non εὐωδῆς, id est, odorata, vt communis lectio habet, sed ἰσχυρῆς, hoc est, viscosa legitur in Oribasii codice manu scripto, libro 12. simplicium. Harum lectionum qua sit melior in probatione picis sicca, aliorum sit iudicium.

Ζοπίσσα.

ZOPISSA. CAP. LXXXII.

CAP. LXXXII.

ZOPISSAM aliqui aiunt de rasam nauibus resinam cum cera, quam alii apochyma appellant. Ea distillandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alii pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Picis conficienda, & parandi ratio.

TAMetsi de pluribus Picis generibus, de oleo, earumque fuligine diuersis, ac propriis capitibus differat Dioscorides: cum tamen horum omnium historia notior sit quam vt à nobis explicari debeat, operae pretium non est, vt de his pluribus agamus. Sed quoniam fortasse nonnullos delectabit audire, quoniam modo pix ipsa conficiatur, vt illis & mihi sit satisfactum, hic rem paucis aperiam, omniaque de ea referam, qua Tridentino tractu in Flemarum montibus coram clarè perspexi. Sic ergo picem, qua passim naualis dicitur, eo quod picandis nauigiis sit aptissima, artifices conficiunt. Veteres pinos, quae prorsus tecta confecta sint, in particulas securibus concidunt, vt ex aliarum arborum truncis ad carbonis opus fieri

feri solet. Deinde vero area ex creta pavitur in medio paululum elata, extremitatibus aequaliter dependentibus, ut liquor e tecta resudans in canalem totam aream ambientem facilius defluere possit. Itaque concisam tectam in area struis congerie locant, velut in carbonis artificio: mox hac primum abietum, picearumque frondosis ramis undique tecta circumdatam, tum demum terra septa, lutoque obstructa, ne quovis modo sumo ac flammis pateat exitus, per foramen in cacumine paratum ignem succendunt, eadem quoque ratione, qua & carbones coquuntur. Quare cum desit locus, per quem flamma erumpere possit, sentiatque ob id congesta moles maximum ignis ardorem, pix liquatur, & per area pavementum confluens in canalem circumpositum defluit, qui per alios canales iuvi artificiosè paratos picem fluentem convocat in fros ligneis asseribus circumdatos, ne terra defluxam picem combibat: unde postea dolia, & cadi, & vres implentur. Operis perfecti signum, si rogi decumbat, subsidatque, & liquor defluere desinat. Sic enim picem fieri vidimus à sylvicolis eam parantibus, qui quodammodo secuti videntur Theophrastum lib. 9. cap. 3. de historia plantarum, ubi eadem ferè ratione Macedones picem vrelatius tradidit. Pix liquida calefacta una cum Thure & Mastiche, de raso occipitio adhibita, prolapsam columellam reficit. **Picis facultates** memoria prodidit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit. Pix sicca quidem deficcatur, & excalfacit secundo à mediocribus, siue symmetris excessu: ac plus deficcare potest, quam excalfacere. Humida vero contra, plus videlicet calfacit, quam deficcet: habetque nonnullam partium tenuitatem, qua & asthmaticos, & purulentos adiuuat: satis est autem cyathi linxisse mensuram mellis mista. Sed & abstergendi quandam vim habent, atque concoquendi, digerendique: veluti & in gustu subamarum quid obtinent, & acre. Sic leprosos ungues eximunt mista cum cera: tybenaque, detergunt: concoquunt item duros & crudos tumores omnes cataplasmatibus indita. Ad ea omnia humida valentior est: arida vero pix tametsi ad hac quidem deterior est, glutinandis tamen vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, humida picis calidam humiditatem assatim esse admistam. Meminit item Galenus picis fuliginis lib. 7. eorundem simplicium ubi ita de omni fuligine scriptum reliquit. Fuligo omnis exicatoria est, ac proinde terrestris est essentia, habens quasdam etiam ignis, qui materiam combussit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota eius natura terrena est, tenuium partium. Sed quae speciatim in ea differentia sunt, ea pro vsta materia eueniunt: ex acriore, & calidior, tali etiam proueniente fuligine: ex dulciore simili quoque, & hinc fuligine proueniente. Primum enim thuris fuligine vtuntur, in ocularias medicinas mista, eas videlicet, quae ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atque etiamnum fluxione vexantur, & vlcera habent: nam & illa expurgat, & carne implet. Adhuc vsurpant quoque eam ad facultates, quas vocant calibepharas. Præterea terebinthina, myrrhaque, fuligo molestia caret, non aliter quam thuris: sed styracis his quodammodo valentior est: magis etiam picis liquida, quae etiam magis cedri. Porro acrioribus vtuntur ad vitia palpebrarum vocata ptila, & erosos oculorum angulos, humidisque, citra phlegmonem. At mollioribus, mitioribusque, tum ad haec, tum ad ea, ad qua competere paulo superius diximus thuris fuliginem. **Nomina:** Cest, Zest, aut Kir: Italis, Pece liquida: Germanis pix omnis, **Bech:** sicut etiam Hispanis, Pex negra: Gallis, Poix fondue, liquida tantum. **Πίσσα Ἐπρά, & Χαλίπεπτος** Graecè vocatur: Latine, Pix sicca: Italicè, Pece secca: Gallis, Poix seche. Quod Graeci **πικρίλαον**, Latini Picinum oleum dicunt: Arabes Kepsen, seu Kapse: Hispani, Azei de pez.

Picis facultates ex Gal.

Fuliginum vires ex Gal.

Ἄσφαλτος

BITUMEN.

CAP. LXXXIII.

BITUMEN Iudaicum ceteris antepositur: cuius probatio est, ut purpuræ modo splendeat, sitque poderosum, ac validum odorem vibret: nigrum autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. a Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliae, fontibus innatans: quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: namque liquidi bituminis genus esse constat.]

a Non habet Orib.

Πίσσα φάλτος

PISSASPHALTVM.

CAP. LXXXIII.

NASCITVR in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quae pissasphaltos appellatur. Ea Cerauniis montibus deuoluta impetu fluminis rapitur, astuque in litus expuitur, illic coacta in glebas mistam bitumini picem redolet.

Νάφθα

NAPHTHA.

CAP. LXXXV.

NAPHTHAM vocant Babyloni bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum [Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum & albugines utilis.] Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: vuluarum prociédias, strangulationesque olfactu, suffitu, imposito, emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagate lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit: tussim veterem, & anhelitum adiuuat: serpentium moribus, coxendicum, laterumque doloribus auxiliatur: datur coeliacis in catapotto deuorandum: cum aceto potum discutit sanguinem concretum: dysentericis cum pituana liquatum infunditur: destillationibus suffitione medetur: mitigat dentium dolores oblitum. Ceterum pilos incómodos siccum replicat, specillo impositum: concalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro, & cera illitum, podagris, articulozum doloribus, lechargicisque prodest. Pissasphaltos eadem, quae pix, & bitumen, si misceantur, potest.

a Ita omnia defunt in meo, & Drag.

Legitimum quidem Iudaicum Bitumen hoc auz (quod sciam) in Italiam non aduehitur: id namque, quo officina vtuntur, impostura quadam est, pice, petroleo, & aliis nonnullis parata. Igitur mirari non licet, si id Dioscoridis historia minime respondere videatur. Optimum in Iudæa prouenit in quodam lacu, quae Iordanis amnis insluit, qui ab vrbe Hierico quindecim tantum millia passuum distat, si Brocardo fides habenda est, qui Palestina topographiam edidit. Nil vero aliud bitumen est, quam pingue quoddam lacus illius aquis supernatans, quod vndis ventoque, agitato in litore concreuit, densatur, coit, tenacissimumque redditur. Nullum in hoc lacu (vt Galenus testatur lib. 4. cap. 20. simpl. medicamentorum) animal, nullaque stirps innaescitur, neque visitur, ob aquae ingentem (alsedinem. Iudæ enim duo ingentia flumina in

Bituminis consideratio, & historia:

eum confluant, in quibus pisces innumeri, praesertim in eo, quod prope Hierichontem fluit, quod Iordanem appellant, nullus omnino piscium fluminum ostia excedit. Quinimo eodem auctore, de his, quae in eum proiciunt, nihil mergitur, sed instat nauis, super aquam fertur. Quippe hoc esse verum probari facile potest experimento, quod sensibus patet: nam vnaeque nauis leuius admodum marinis, quam dulcibus fertur aquis. Proinde loco citato haec scite prodidit Galenus. At aqua, quae ex lacu Syriae Palaestina, quem alij quidem mare vocant mortuum, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salsa modo, sed & amara est. Salem vero etiam habet ex sese natum, perinde subamarum, primoq; statim aspectu vna cum vniuerso mari tum candidior, tum crassior apparet, salugini mera similis: in quam si salem iniicias, ne liquari quidem etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se emergat, continuo sale tenuissimo velut conspersus, vndiq; emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa, quam cetera marina grauior est, idq; tanto pondere, quanto fluminali marina. Itaque si volueris te ipsum deicere in profundum, ne sic quidem poteris deorsum ferri: ita attollit, eleuatq; aqua non sanè quia natura leuis sit, quod quidam veterum sophistarum prodidit, sed vt censuit Aristoteles, propter grauitatem instar luti, quae leuiores sunt, gestans. Proinde si hominem ligatis manibus, pedibusq; in stagni illius aquam conieceris, deorsum haud feretur: quin vero sicut naues in mari onera plura, quam in fluminis citra submersionem portare valent, eundem in modum in stagno mortuo multo plura, quam in mari. Tanto enim est, quia in illo est aqua, marina grauior, quanto marina lacustri, aut fluminali: inest enim ei salis substantia, quae terrea, grauisque est. Ipsique tibi marinam, si lubet, efficerelicer, sale in aqua fluminali colliquato, cognosceretque quanto grauior reddatur aqua eiusmodi, quam sit dulcis. Quis & modum iam inuenerunt, moderatam ad salendum consiciendi saluginem, si ouum in ea videatur natum: nam vbi etiam iam sedit, ac nondum super saluginis superficiem innatat, aquosa magis est, & dulcis: grauius vero salsa est, vbi tanta est salis copia indita, vt amplius liquari, qui postea adiicitur, nequeat: quam aquam si pendere non graueris, omnium aquarum comperies grauissimam. Itaque ego quandoque inanem esse diuitis cuiusdam ambitionem ostendi, qui tanta in Italiae maris mortui aquam deuexit, quae cisternam implere posset. Nam id ipsum ego expedite praestiti, sale plurimo in aquam potabilem coniecto: haec Galenus. Lacus iste, quem aliqui mare mortuum vocant, ille quidem est, quem sacra testantur monumenta exortum esse, vbi Sodoma, Gomorrha, aliaeque finitima ciuitates caelesti igne absorptae, subuersaeque fuere. Quod etiam Galeni auctoritate comprobatur, qui eodem loco citato lacum hunc Sodomeum appellari scribit. Eructat continuè u (vt quidam Patriarcha Hierosolymitanus suis scriptis perhibet) nebulosus quosdam vapores factorem intolerabilem vibrantes, qui postea ventorum flamine per conualles olim fertilissimas exagitati, perpetuam sterilitatem relinquunt, ita vt longo terrarum spatio nec herba, nec arbor, nec vllum denique germen proueniat, neque uirescat, nisi iuxta Hiericum, vbi ab Elisei fonte irrigantur horti. Tradit Plinius hunc lacum longitudine cetum millia passuum excedere, latitudine maxima viginti quinque millia passuum implere. Idem Pissasphaltum inter picis genera meminit lib. 24. cap. 7. sic inquit. Est & Pissasphaltos mista bitumini pice naturaliter ex Apolloniatarum agro: quidam autem ipsi miscent. Afferitur ex eodem agro etiamnum hoc euo: siquidem ex Apollonia Epiri, quam vulgò Valoniam nuncupant, Venetias pissasphaltum pro picandis nasigis copiosum importatur: quippe quod pineae picis commistum, valentissime id muneri praestet. Nuper ex Dalmatia afferri cepit, vbi prope Lesinam, non longe à Narenta foditur: cuius amicus quidam mihi copiam fecit. Foditur & in Pannonia, vbi id incolae fossitiam ceram esse existimant. Scribit Fuchsius lib. 1. de comp. med. pissasphaltum nunc etiam tribus fere milliariis ab Isbruck reperiri, vocariq; Germanico sermone Trischemblut, cuius portionem aliquam adhuc se habere fatetur, sibi à Georgio Collimitio transmissam, quae succensa bitumen ac picem verissime redoleat. Sed equidem vereor, ne ipse quoque decipiatur, vna cum Georgio illo. Is enim lapidem gagatem, qui fere tribus ab ea ciuitate Germanicis milliariis (vt Fuchsius inquit) in litore cuiusdam torrentis frequentissimus reperitur, pro pissasphalto ostendebat. Sed illius error, dum ego in Isbruck essem, à clarissimo Ioanne Petro Merendino medico Regio, & à me pariter deprehensus est: quod lapis Germanica lingua Trischemblut vocatus, etsi lapidis gagata modo conflaret, & bitumen redoleat accensus, nunquam tamen vt pix & asphaltus igne liquefit, sed ligni, vel tedi modo comburitur. Praeterea vltimum bituminis genus, quod Naphtham vocant, Plinius lib. 2. cap. 105. in Aufagenis Parthiae inueniri prodidit, tamq; esse huic ignium cognationem, vt transiliant protinus in ipsum vndecunque visum. Quod etsi in Italia aliunde (quod sciam) non inferatur, inibi tamè pluribus in locis id generis erumpit, quod eisdem cum igne praestat effectus: quale est, quod in agro Mutinensi & aliis quibusdam in locis in Insubria scaturit, petroleum, siue saxeum appellatum: Ceterum id quidem mirum admodum de petroleo omnibus videri debet, quod mihi narrauit Posonij Vngariae, Illustris comes Hercules à contrariis Ferrariensis, eo tempore, quo Maximilianus Romanorum & Bohemiae rex, Pannoniae coronam suscepit. Narrabat itaque Comes suo quodam in praedio se puteum habere, in quo vna cum aqua petroleum distillat à terra meatibus. At qui cum vna quadam in putei fundo hiantes exortae essent, è quibus petroleum sensim labebatur, cementarium fabrum se conduxisse, dicebat, qui rimas diligenter obstrueret: at cum artifex sine lumine id praestare nequirit, laeternam exoptulasse, eamq; illi in puteum demissam esse perquam diligenter occlusam, verum paulo post, euenisse affirmabat, vt petroleum ignium rapax accensus putei parietibus, & impetuoso admodum excitato vapore, non solum cementarium artificem illum, perinde ac è bombardae extinctum sursum extra puteum eiaculasset, sed etiam putei tectum totum in aëra exexisset, accensus lagenis nonnullis petroleo plenis extra putei ostium existentibus, quarum igne astantes quidam maxime laesi sunt. Hinc itaque adducor omnino ad credendam, nil aliud petroleum esse, quam Naphtham, bituminis colamen, de quo scripsere Dioscorides, & Plinius. Sed vt redeamus, vnde digressi sumus, bitumen Sodomeum non nisi fictitium vel impostoram malitia adulteratum, aduehitur. Proinde Brasauolus in sinceri defectu, Mumiam à Mauritanis vocatam substituit, quod certo crediderit, mumiam esse legitimum Palaestinum asphaltum. Quandoquidem existimauit sicca tum Arabum, tum aliarum gentium corpora, quae pro mumia ex Syria & Aegypto Venetias deferuntur, cum sint ex infima illius regionis plebecula, vice aloës, myrrhae, croci, & balsami ex more Iudaica, duntaxat asphaltum impleri, quod eorum pauperies aromatum sumtus non toleret. Hoc fundamentum hinc iecisse videtur, quod Strabo literis mandauerit Bitumen Sodomei lacus in usu esse ad tutanda hominum cadauera. Sed quantum ipse ex Arabum scriptis deprompsit, apud eos M V M I A potius est pissasphaltum, quam asphaltum: siquidem scribit Auicenna, mumiam eadem praestare, quae asphaltus pice commistus. Ex quo facile coniecere possumus, cadauera illa pissasphalto tantum impleri. Cui etiam subscribit Serapio, qui de Mumia disserens, ex Dioscoridis auctoritate, eadem, quae Dioscorides de pissasphalto tradidit, ipse verbotenus ad mumiam retulit, sic inquit. Mumia est in terris Apolloniae: descendit namque ex montibus, qui ducunt flumina cum aqua, & euicit eam aqua fluminis in ripis, & est coagulata, & fit sicut cera, & habet odorem picis mistae cum asphaltum cum aliquo fetore: & virtus eius est, sicut picis, & asphalti mistorum. Vnde potius asserendum putarim, nostram Mumiam esse pissasphaltum, quam asphaltum. Et quamuis dicat Strabo bituminis Iudaici usum fuisse ad

Sodomeus
lacus.

Pissasphaltum
consideratio.

Fuch. & quo-
rundā lapsus
circa pissas-
phaltum.

Naphthae
mentio.


Petrolei cu-
iusdam histo-
ria, & vis ad-
mirabilis.

Brasa opinio
improbata,
dum Mumiam
bitumini
substituit.

Mumiae con-
sideratio.

conservanda

M V M I A.



20 conseruanda cadauer. non tamen negat, quin bitumini picem admisceant, fiatq; pissasphaltum factitium. Verum Serapio, & Auicenna has misturas optime nouerant, utpote quibus non modo Syri, sed & sue gentis Mauritanii vterentur. Quo fit, ut Brasauoli sententiam non probandam existimem, quod scilicet vulgaris Mumia bituminis loco in componendis medicamentis substituatur. Namque Mumia praterquam quod est (ut puto) syncerum pissasphaltum, vel asphaltum pice mistum, concepit defluentem humorem, qui continuo à cadaueribus in sepulchris liquatur: ex quo credendum est, eam non parum suam immutasse naturam. Porro satius dicerem Galenum & Paulum consulere, qui in succedaneis, si desit asphaltus, picem liquidam subdunt. Caterum notare conuenit Serapionem Mumiam Dioscoridis pissasphalto adiecisse, ut quae aliquam inter se cognationem haberent, ab inuicem non disiungeret: non enim erat nescius, huiuscemodi cadauera pissasphalto impleri, quemadmodum myrrha, croco, aloe, ac etiam balsamo simul admistis implebantur: quae veram tractu temporis consuebant mumiā, cuius meminit eiusdem capituli initio, his verbis. Mumia sepulchrorum, fit è myrrha, aloe, alijsq; rebus his additis, & humiditate, quam exudant humana corpora. Veruntamen hac nostra tempestate in Italia haudquaquam aduehitur: quippe quod hac mistione nulla eorum regionum cadauera, prater nobilium, ac diuitem condiantur: & hi quidem sepulchra habent sibi constituta, diligenterq; occlusa. Idcirco non ita facile istorum corpora surripipi possunt à mercatoribus illuc profectis, ut minori tum difficultate, tum suspitione auferri possunt pauperum, & ignobilium, asphaltu pice misto, vel ipso pissasphalto consecrata. Ideoq; apertissime falluntur, qui pro legitima Mumia arefactam istiusmodi cadauerum carnem assumunt, non autem eorum insarctum, veluti seplasiariorum quam plurimi, qui carnes & ossa contundunt, eaq; medicamentis admiscunt, quae mumiā exposcunt. Necessum igitur esset legitimam mumiā expectantibus ut in hospitibus nostris cadauera obuentium aloe, myrrha, & croco repleti curarent, eamq; deinde suo tempore eximi. Hanc tamen nostram sententiam pluribus refellere contendit Petrus Bellonius Cenomanus, vir ex eo fortasse peritus iudicandus, quod profiteatur se Asiam, Graciam, Syriam, Aegyptum, & Arabiam peragrasse. Quippe qui putet, non a-
 40 liam esse Mumiam apud Gracos & Arabes, quam pissasphaltum. Sed quod eius argumenta non sint tanti momenti, ut oppositum nobis persuadere possint, & quod potius idem hallucinetur, in epistolis, quas conscribere institui, adiuuante Deo, latius ostendam: vbi etiam plurima eius errata attexemus, quae in libellis, quos tum de medicamentis cadauera seruanti-
 bus, tum de resiniferis arboribus, tum etiam de piscibus condidit, legendo adnotauimus. Quandoquidem nostrum in primis institutum non est in his commentariis nostras ad vnguem tueri sententias, atque ab erroribus, quibus notati erimus, nos vindicare, sed quantum possumus materiam medicam à mēdis expurgare, eamq; illustriorem reddere, & in pristinum candorem restituere conamur. Porro Mumia, de cuius viribus iam nobis differendum est, (ut Arabes tradunt) quam pluri-
 50 mus pollet facultatibus: siquidem secundo ordine tum siccatur, tum exsiccatur: capitis dolores frigiditate obortos absque humorum praesentia mulcet. Medetur hemigranea, paralyti, oris distractionibus, comitialibus, vertiginosisq; si ex amaraci-
 aqua naribus immittatur. Leucoij oleo, siue hyoscyamino grani pondere subacta, ad aurium dolores frigidus vtiliter in eorum concavitatem infunditur. Prodest quatuor granorum pondere ex thymbra decocto resoluta, gula cruciatis. Epota ex zizpharum, hordei, & myxorum decocto tribus diebus continuis, tussientibus opem non modicam praestat. Granorum item quatuor pondere sumpta ex aqua mētha, cordis affectus remouet: cum decocto verò cumini, ammi, & cari, tum ven-
 60 iculi, tum intestinorum flatus discutit. Bibitur vtiliter ab alto deuolutis ex siliqua Aegyptia medulla, additis Lemnia pbragide, & rubiae radice. Hausta trium, vel quatuor granorum pondere singultum inhibet, si tamen ex cumini, & apij decocto assumatur. Errhinis imposita, additis moscho, castore, capbura, & oleo balanino, naribus comode inditur ad diuturnos capitis dolores: praesertimq; cum adhibitis alijs, contumax morbus non soluitur. Gargarizatur cum oxymelite aduersus anginam: & ad lienis affectus ex cari decocto vtiliter bibitur: & contra lethalia venena ex decocto tribuli marini, & foetidi laserpitij gummi iuuamento non modico sumitur: item ex mero contra scorpionum ictus bibitur, ictisq; locis cum recentis bubulo butyro vtilissime imponitur. Adstringit mumia illita externa sanguinis profluvia, pota verò interna: proinde perutilis ad cruentas excreationes. Ex caprillo lacte pota opitulatur exulcerata vesica, internis penis desquamationibus, & vrinam agrè continentibus. Non desunt qui credant, humanorum cadauerum ossa in puluerem redacta, & in potu exhibita, variis corporis languoribus prodesse, os suum vniciuique membro tribuentes. Quod penitus refellendum non est: si-
 quidem ipse pluries vidi in comitiali morbo cranium humanum in puluerem redactum maximè profecisse, sicuti etiam calculosis renibus, & eorum doloribus. Sed ad Bitumen redeamus, à quo nos penè disunxerat mumia, ne à nostro instituto recedamus. Huius meminit Galenus lib. 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Bitumen, vnum & ipsum est ex iis, Bituminis ha-
 70 quae in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam, quae non est marina dissimilis, ut in Apollonia Epiri, & per alia id ex Gal-
 genus loca, multis aquis spontè nascentibus, ceu spuma quaedam innatans hoc medicamē reperitur, & molle quidem est, dum innatat, postea verò resiccaturum pice sicca durius efficitur. Optimū verò bitumen in mari, quod mortuum vocant, prouenit.

Bellonii opinio explosa.

Mumia vires.

Bituminis ha-
stor. & vires
ex Gal.

- Est autem id stagnum salsum in caele, hoc est caua, Syria. Caterum medicaminis ipsius vis est tum resicatoria, tum exca-*
factoria in secundo ordine. Merito itaque eo vtuntur & ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia, qua
exiccari debent cum modica excalfactione. Nomen eius Gracum est ἀσφαλτος: Latinum, Bitumen: Arabicum, Haphal
ieudi, siue Chefer alibeud: Italicum, bitume, & Asphaltum: Germanicum, Juden leim. Πιττασφαλτος vero sic Gracis dici-
tur, vt Latinis Pissasphaltum: Arabibus, Muanie, Muzniay, seu Mumia: Italis, Pissasphalto: Hispanis, Cera de minera.
- Nomina.** Bitumen, ἀσφαλτος, dici Suida innuit, ἡ δὲ τὸ ἀσφαλτεῖον, quamuis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare
vocat) vbi plurimum colligitur, deriuari possit. Germani Erdbeck quasi picem terrestrem, eo quod sub-
stantia & viribus cognatum sit, vocant. Est autem veluti pinguis terræ adeps, aëreæ & igneæ substantia,
ideoque flammam promptissime concipiens, Plinio lib. 35. cap. 15. Duplex vero est Bitumen, liquidum ac
densum: illud vario est colore, candidum, quod Babylonis Naphtha: aliud in cinereo candidum, quod to
concretum Arabes Ambra nominant: est & fuluum, nonnihil cæruleum, purpureo colore splendens:
est nigrum, est alio atque alio colore, pro locorum in quibus scaturit diuersitate. Sic hoc nostro seculo
ex Auuernia Gallia Bitumen adfertur & liquidum & nigricans, grauisque odoris, ad hystericas passio-
nes olfactu vtile. Et licet Asphaltum quamdiu innatat, molle sit, exemptum vero pice sicca sit durius, Ga-
leno auctore: attamen interdum ex fontibus ita crassum emanat, vt limus videri possit: quod fortassis
Plinium mouit, cur loco citato, alibi limum, alibi terram dixerit. Quod si bitumen tam durum fuerit vt
poliri queat, Gagates appellatur & Obsidianus lapis: sic in mare Germanicum bitumen effunditur can-
didum, quod Succinum album est. Nihil dicimus de Bitumine fossili, quod terra ampelitis & Bitumen
fossile terrenum, Germanis Sten foll, id est, Carbones lapidei dicuntur. Quod denique Dioscorides li-
quidum Bitumen in Sicilia fontibus innatate dicit, copiose etiam in Germania, maxime circa Brunsh- 20
weigum reperitur, quo ad axes vngendas, iumentorum scabiem & lucernarum lumina vtuntur, & aliqui
à fetore *Stenfalls drect*, id est, Satanæ stercus vocitant: at in Burgundia, ad axes vsus est picis albæ quam
Burgundiam vocitant. Simile etiam ex Betula arbore igne elicitur, quod Bitumen Betulæ arboris, Pli-
nius nominat. P I S S A S P H A L T V M idem ac si dicas picinum bitumen: Marcellus Empiricus dicit Latinis
Rubricam Scythicam appellari. Galenus, Aegineta, Aëtius Pissasphaltum ne mentionem quidem vllam fe-
cere, vt rei ad medicamenta inutilis: Theopompus de eo tanquam fossili agens, ea penè quæ Dioscori-
des refert: Arabibus est Mumia, quod Pissasphaltum Dioscorides vocat: duplex autem est Arabibus, na-
turale & factitium, quo mortuorum corpora condiebantur, ex Myrrha & Aloe. Sic & Mumia duplex, a-
lia Arabum, Pissasphaltum puta, quæ natia est: alia officinarum, quæ Bitumè iudaicum est, humani ca-
daveris tabo mixtum. Dicitur autem Mumia, cadaver conditum. Ex Dioscoride enim capite de Cedro, 30
hæc conditura *φίλαγμα νεκρῶν σώματων* dici potest: sic ex Galeno septimo simplicium *ἐπιράγειν ἐφίλαγμα*
μύριον τεθνήσκων appellare licet. Herodotus in Euterpe, cadaverum condituram *ταέχουσι* vocat: quem
Diodorus lib. 2. cap. 5. sequitur, & Strabo lib. 16. quod ea non aliter, quæ carnes sale condirentur. Plinio li.
11. cap. 37. Cadaver conditum, at Pomponio Melæ lib. 1. ca. 9. medicatum. Hodie non solum in Europa, sed vt
ferunt, etiã in Asia & Africa, Mumia dicitur. De condientibus & condiendi modo, Diodorus Siculus loco
citato eadem penè quæ & Herodotus habet. Tres enim hoc munus absoluunt. Primus Grammaticus di-
citur, qui posito humi corpore circa ilia describit, quatum à sinistra parte incidatur: Alter est Scissor, qui
æthiopico lapide latus aperit, subitoq; aufugit, ob astates qui cum exsecratione in eum lapides coniciunt:
tunc sequuntur corporis curatores, qui *ταέχουσι* salitores appellatur & polinctores, qui existimatione digni:
horum vnus scissuram per corporis interiora, præter renes & cor, ducit: alter vino phæniceo odoriferis im- 40
mixtis lauat, dein Cadaver lotum vnguentis ex cedro & aliis pretiosis per dies triginta vngit: Myrrha dein-
ceps & Cinnamomo liniunt, vt seruari & odoriferum reddi possit. Curatum cadaver cognatis traditur, etiam
superciliorum & palpebrarum pilis seruatis, vt dormienti sit similis. Triplicem condiendi modum Herodotus do-
cet. Primus, cerebro per nares hamo extracto, & lapide æthiopico visceribus ablatis, repurgat vino phœ-
niceo, & odoribus farciunt: tunc omenta myrrha, castia & odoribus, excepto thure, cotulsi, coplent & con-
suunt: dein per septuaginta dies saliant: tunc cadaver ablutum, & syndone inuolutum, gummi illiniunt. Tandem
in ligneam hominis effigiem induunt & reponunt. Alter modus: clystere repleto vnguentis cedrino, in aluum
iniiciunt, non resectis corporibus: dein diebus septuaginta saliant: vltimo die cedrinum vnguentis regerunt,
quod secum intestina educit. Tertius modus: pauperes dilutionibus ventrem abstergunt, per dies septuaginta,
sale arefaciunt, dein reponunt. Verum Iudæi, Strabone li. 16. attestante, Asphaltum siue Bitumine liqui- 50
do utebantur. Ast consuetudo condiendi corpora in Ægypto, longè ante Heliodi tempora, qui quadrin-
gentis ante Herodotum annis vixit, capit. Condiunt autem ob id, quod mortuorum resurrectionem exspe-
ctarent, quod Democriti sententia testatur, inquentis: Ægyptii, Iudæorum more mortuorum expectabant
resurrectionem, idem corpora condiebant, vt durarent, & ad aternitatem asseruarentur: ob id nefas illis vide-
batur ab igne comburi corpora, aut à vermibus absumi debere. Quam Democriti sententiam Plinius, vt E-
picureus li. 7. c. 55. irrisit his verbis: similis & de asseruandis corporibus hominum ac reuiuiscendi promissa
Democriti vanitas, qui non reuixit ipse. Herodotus in principio li. 3. Zoroastis rationem adferre conatus
est hæc, ne humatus à vermibus deuoraretur. Verum enimvero non solum hominum, sed etiam brutorum ani-
malium, permulta genera in Ægypto condiebantur. Ex quo colligi posse videtur, etiam sceleratorum cada-
uera quouis mortis genere affectorum condita fuisse, cum lib. 2. referat Apicem regem strangulatum & in 60
paternis monumentis sepultum: sic feminarum, non secus quam virorum funera condiebantur, ita tamen
vt feminae forma conspicua, monente Herodoto, demum tertio aut quarto à morte die salinariis & po-
linctoribus, ne cum eis concumberent, fuerint tradita. Tradebantur autem, vt Diodorus autor est, his
tantum, qui funera mortuorum curare soliti erant, eo exercitio à maioribus tradito. Bruta quoque con-
dita fuisse, sufficiat Herodoti testimonium, siquidem Ægyptii certa animalia diis sacra habuere, & etiam
post mortem coluere: quorum cum aliquod moriebatur, syndone contextum cum vlulatu pectus
percutientes sale aspergebant, ac cedri liquore, quo diutius seruaretur, ac vnguentis odoriferis
corpus vinctum, in sacris locis sepeliebant. Eiusmodi autem erant, crocodylus, felis, canis, mu-
res aranei, accipitres, vrsi, lupi, qua de re Herodotus lib. 2. Adhucantur ex Ægypto eiusmodi medicata
& condita
- Asphaltum no-** Bitumen, ἀσφαλτος, dici Suida innuit, ἡ δὲ τὸ ἀσφαλτεῖον, quamuis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare
mina. vocat) vbi plurimum colligitur, deriuari possit. Germani Erdbeck quasi picem terrestrem, eo quod sub-
stantia & viribus cognatum sit, vocant. Est autem veluti pinguis terræ adeps, aëreæ & igneæ substantia,
ideoque flammam promptissime concipiens, Plinio lib. 35. cap. 15. Duplex vero est Bitumen, liquidum ac
densum: illud vario est colore, candidum, quod Babylonis Naphtha: aliud in cinereo candidum, quod to
concretum Arabes Ambra nominant: est & fuluum, nonnihil cæruleum, purpureo colore splendens:
est nigrum, est alio atque alio colore, pro locorum in quibus scaturit diuersitate. Sic hoc nostro seculo
ex Auuernia Gallia Bitumen adfertur & liquidum & nigricans, grauisque odoris, ad hystericas passio-
nes olfactu vtile. Et licet Asphaltum quamdiu innatat, molle sit, exemptum vero pice sicca sit durius, Ga-
leno auctore: attamen interdum ex fontibus ita crassum emanat, vt limus videri possit: quod fortassis
Plinium mouit, cur loco citato, alibi limum, alibi terram dixerit. Quod si bitumen tam durum fuerit vt
poliri queat, Gagates appellatur & Obsidianus lapis: sic in mare Germanicum bitumen effunditur can-
didum, quod Succinum album est. Nihil dicimus de Bitumine fossili, quod terra ampelitis & Bitumen
fossile terrenum, Germanis Sten foll, id est, Carbones lapidei dicuntur. Quod denique Dioscorides li-
quidum Bitumen in Sicilia fontibus innatate dicit, copiose etiam in Germania, maxime circa Brunsh- 20
weigum reperitur, quo ad axes vngendas, iumentorum scabiem & lucernarum lumina vtuntur, & aliqui
à fetore *Stenfalls drect*, id est, Satanæ stercus vocitant: at in Burgundia, ad axes vsus est picis albæ quam
Burgundiam vocitant. Simile etiam ex Betula arbore igne elicitur, quod Bitumen Betulæ arboris, Pli-
nius nominat. P I S S A S P H A L T V M idem ac si dicas picinum bitumen: Marcellus Empiricus dicit Latinis
Rubricam Scythicam appellari. Galenus, Aegineta, Aëtius Pissasphaltum ne mentionem quidem vllam fe-
cere, vt rei ad medicamenta inutilis: Theopompus de eo tanquam fossili agens, ea penè quæ Dioscori-
des refert: Arabibus est Mumia, quod Pissasphaltum Dioscorides vocat: duplex autem est Arabibus, na-
turale & factitium, quo mortuorum corpora condiebantur, ex Myrrha & Aloe. Sic & Mumia duplex, a-
lia Arabum, Pissasphaltum puta, quæ natia est: alia officinarum, quæ Bitumè iudaicum est, humani ca-
daveris tabo mixtum. Dicitur autem Mumia, cadaver conditum. Ex Dioscoride enim capite de Cedro, 30
hæc conditura *φίλαγμα νεκρῶν σώματων* dici potest: sic ex Galeno septimo simplicium *ἐπιράγειν ἐφίλαγμα*
μύριον τεθνήσκων appellare licet. Herodotus in Euterpe, cadaverum condituram *ταέχουσι* vocat: quem
Diodorus lib. 2. cap. 5. sequitur, & Strabo lib. 16. quod ea non aliter, quæ carnes sale condirentur. Plinio li.
11. cap. 37. Cadaver conditum, at Pomponio Melæ lib. 1. ca. 9. medicatum. Hodie non solum in Europa, sed vt
ferunt, etiã in Asia & Africa, Mumia dicitur. De condientibus & condiendi modo, Diodorus Siculus loco
citato eadem penè quæ & Herodotus habet. Tres enim hoc munus absoluunt. Primus Grammaticus di-
citur, qui posito humi corpore circa ilia describit, quatum à sinistra parte incidatur: Alter est Scissor, qui
æthiopico lapide latus aperit, subitoq; aufugit, ob astates qui cum exsecratione in eum lapides coniciunt:
tunc sequuntur corporis curatores, qui *ταέχουσι* salitores appellatur & polinctores, qui existimatione digni:
horum vnus scissuram per corporis interiora, præter renes & cor, ducit: alter vino phæniceo odoriferis im- 40
mixtis lauat, dein Cadaver lotum vnguentis ex cedro & aliis pretiosis per dies triginta vngit: Myrrha dein-
ceps & Cinnamomo liniunt, vt seruari & odoriferum reddi possit. Curatum cadaver cognatis traditur, etiam
superciliorum & palpebrarum pilis seruatis, vt dormienti sit similis. Triplicem condiendi modum Herodotus do-
cet. Primus, cerebro per nares hamo extracto, & lapide æthiopico visceribus ablatis, repurgat vino phœ-
niceo, & odoribus farciunt: tunc omenta myrrha, castia & odoribus, excepto thure, cotulsi, coplent & con-
suunt: dein per septuaginta dies saliant: tunc cadaver ablutum, & syndone inuolutum, gummi illiniunt. Tandem
in ligneam hominis effigiem induunt & reponunt. Alter modus: clystere repleto vnguentis cedrino, in aluum
iniiciunt, non resectis corporibus: dein diebus septuaginta saliant: vltimo die cedrinum vnguentis regerunt,
quod secum intestina educit. Tertius modus: pauperes dilutionibus ventrem abstergunt, per dies septuaginta,
sale arefaciunt, dein reponunt. Verum Iudæi, Strabone li. 16. attestante, Asphaltum siue Bitumine liqui- 50
do utebantur. Ast consuetudo condiendi corpora in Ægypto, longè ante Heliodi tempora, qui quadrin-
gentis ante Herodotum annis vixit, capit. Condiunt autem ob id, quod mortuorum resurrectionem exspe-
ctarent, quod Democriti sententia testatur, inquentis: Ægyptii, Iudæorum more mortuorum expectabant
resurrectionem, idem corpora condiebant, vt durarent, & ad aternitatem asseruarentur: ob id nefas illis vide-
batur ab igne comburi corpora, aut à vermibus absumi debere. Quam Democriti sententiam Plinius, vt E-
picureus li. 7. c. 55. irrisit his verbis: similis & de asseruandis corporibus hominum ac reuiuiscendi promissa
Democriti vanitas, qui non reuixit ipse. Herodotus in principio li. 3. Zoroastis rationem adferre conatus
est hæc, ne humatus à vermibus deuoraretur. Verum enimvero non solum hominum, sed etiam brutorum ani-
malium, permulta genera in Ægypto condiebantur. Ex quo colligi posse videtur, etiam sceleratorum cada-
uera quouis mortis genere affectorum condita fuisse, cum lib. 2. referat Apicem regem strangulatum & in 60
paternis monumentis sepultum: sic feminarum, non secus quam virorum funera condiebantur, ita tamen
vt feminae forma conspicua, monente Herodoto, demum tertio aut quarto à morte die salinariis & po-
linctoribus, ne cum eis concumberent, fuerint tradita. Tradebantur autem, vt Diodorus autor est, his
tantum, qui funera mortuorum curare soliti erant, eo exercitio à maioribus tradito. Bruta quoque con-
dita fuisse, sufficiat Herodoti testimonium, siquidem Ægyptii certa animalia diis sacra habuere, & etiam
post mortem coluere: quorum cum aliquod moriebatur, syndone contextum cum vlulatu pectus
percutientes sale aspergebant, ac cedri liquore, quo diutius seruaretur, ac vnguentis odoriferis
corpus vinctum, in sacris locis sepeliebant. Eiusmodi autem erant, crocodylus, felis, canis, mu-
res aranei, accipitres, vrsi, lupi, qua de re Herodotus lib. 2. Adhucantur ex Ægypto eiusmodi medicata
& condita
- Birumen du-** Bitumen, ἀσφαλτος, dici Suida innuit, ἡ δὲ τὸ ἀσφαλτεῖον, quamuis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare
plex. vocat) vbi plurimum colligitur, deriuari possit. Germani Erdbeck quasi picem terrestrem, eo quod sub-
stantia & viribus cognatum sit, vocant. Est autem veluti pinguis terræ adeps, aëreæ & igneæ substantia,
ideoque flammam promptissime concipiens, Plinio lib. 35. cap. 15. Duplex vero est Bitumen, liquidum ac
densum: illud vario est colore, candidum, quod Babylonis Naphtha: aliud in cinereo candidum, quod to
concretum Arabes Ambra nominant: est & fuluum, nonnihil cæruleum, purpureo colore splendens:
est nigrum, est alio atque alio colore, pro locorum in quibus scaturit diuersitate. Sic hoc nostro seculo
ex Auuernia Gallia Bitumen adfertur & liquidum & nigricans, grauisque odoris, ad hystericas passio-
nes olfactu vtile. Et licet Asphaltum quamdiu innatat, molle sit, exemptum vero pice sicca sit durius, Ga-
leno auctore: attamen interdum ex fontibus ita crassum emanat, vt limus videri possit: quod fortassis
Plinium mouit, cur loco citato, alibi limum, alibi terram dixerit. Quod si bitumen tam durum fuerit vt
poliri queat, Gagates appellatur & Obsidianus lapis: sic in mare Germanicum bitumen effunditur can-
didum, quod Succinum album est. Nihil dicimus de Bitumine fossili, quod terra ampelitis & Bitumen
fossile terrenum, Germanis Sten foll, id est, Carbones lapidei dicuntur. Quod denique Dioscorides li-
quidum Bitumen in Sicilia fontibus innatate dicit, copiose etiam in Germania, maxime circa Brunsh- 20
weigum reperitur, quo ad axes vngendas, iumentorum scabiem & lucernarum lumina vtuntur, & aliqui
à fetore *Stenfalls drect*, id est, Satanæ stercus vocitant: at in Burgundia, ad axes vsus est picis albæ quam
Burgundiam vocitant. Simile etiam ex Betula arbore igne elicitur, quod Bitumen Betulæ arboris, Pli-
nius nominat. P I S S A S P H A L T V M idem ac si dicas picinum bitumen: Marcellus Empiricus dicit Latinis
Rubricam Scythicam appellari. Galenus, Aegineta, Aëtius Pissasphaltum ne mentionem quidem vllam fe-
cere, vt rei ad medicamenta inutilis: Theopompus de eo tanquam fossili agens, ea penè quæ Dioscori-
des refert: Arabibus est Mumia, quod Pissasphaltum Dioscorides vocat: duplex autem est Arabibus, na-
turale & factitium, quo mortuorum corpora condiebantur, ex Myrrha & Aloe. Sic & Mumia duplex, a-
lia Arabum, Pissasphaltum puta, quæ natia est: alia officinarum, quæ Bitumè iudaicum est, humani ca-
daveris tabo mixtum. Dicitur autem Mumia, cadaver conditum. Ex Dioscoride enim capite de Cedro, 30
hæc conditura *φίλαγμα νεκρῶν σώματων* dici potest: sic ex Galeno septimo simplicium *ἐπιράγειν ἐφίλαγμα*
μύριον τεθνήσκων appellare licet. Herodotus in Euterpe, cadaverum condituram *ταέχουσι* vocat: quem
Diodorus lib. 2. cap. 5. sequitur, & Strabo lib. 16. quod ea non aliter, quæ carnes sale condirentur. Plinio li.
11. cap. 37. Cadaver conditum, at Pomponio Melæ lib. 1. ca. 9. medicatum. Hodie non solum in Europa, sed vt
ferunt, etiã in Asia & Africa, Mumia dicitur. De condientibus & condiendi modo, Diodorus Siculus loco
citato eadem penè quæ & Herodotus habet. Tres enim hoc munus absoluunt. Primus Grammaticus di-
citur, qui posito humi corpore circa ilia describit, quatum à sinistra parte incidatur: Alter est Scissor, qui
æthiopico lapide latus aperit, subitoq; aufugit, ob astates qui cum exsecratione in eum lapides coniciunt:
tunc sequuntur corporis curatores, qui *ταέχουσι* salitores appellatur & polinctores, qui existimatione digni:
horum vnus scissuram per corporis interiora, præter renes & cor, ducit: alter vino phæniceo odoriferis im- 40
mixtis lauat, dein Cadaver lotum vnguentis ex cedro & aliis pretiosis per dies triginta vngit: Myrrha dein-
ceps & Cinnamomo liniunt, vt seruari & odoriferum reddi possit. Curatum cadaver cognatis traditur, etiam
superciliorum & palpebrarum pilis seruatis, vt dormienti sit similis. Triplicem condiendi modum Herodotus do-
cet. Primus, cerebro per nares hamo extracto, & lapide æthiopico visceribus ablatis, repurgat vino phœ-
niceo, & odoribus farciunt: tunc omenta myrrha, castia & odoribus, excepto thure, cotulsi, coplent & con-
suunt: dein per septuaginta dies saliant: tunc cadaver ablutum, & syndone inuolutum, gummi illiniunt. Tandem
in ligneam hominis effigiem induunt & reponunt. Alter modus: clystere repleto vnguentis cedrino, in aluum
iniiciunt, non resectis corporibus: dein diebus septuaginta saliant: vltimo die cedrinum vnguentis regerunt,
quod secum intestina educit. Tertius modus: pauperes dilutionibus ventrem abstergunt, per dies septuaginta,
sale arefaciunt, dein reponunt. Verum Iudæi, Strabone li. 16. attestante, Asphaltum siue Bitumine liqui- 50
do utebantur. Ast consuetudo condiendi corpora in Ægypto, longè ante Heliodi tempora, qui quadrin-
gentis ante Herodotum annis vixit, capit. Condiunt autem ob id, quod mortuorum resurrectionem exspe-
ctarent, quod Democriti sententia testatur, inquentis: Ægyptii, Iudæorum more mortuorum expectabant
resurrectionem, idem corpora condiebant, vt durarent, & ad aternitatem asseruarentur: ob id nefas illis vide-
batur ab igne comburi corpora, aut à vermibus absumi debere. Quam Democriti sententiam Plinius, vt E-
picureus li. 7. c. 55. irrisit his verbis: similis & de asseruandis corporibus hominum ac reuiuiscendi promissa
Democriti vanitas, qui non reuixit ipse. Herodotus in principio li. 3. Zoroastis rationem adferre conatus
est hæc, ne humatus à vermibus deuoraretur. Verum enimvero non solum hominum, sed etiam brutorum ani-
malium, permulta genera in Ægypto condiebantur. Ex quo colligi posse videtur, etiam sceleratorum cada-
uera quouis mortis genere affectorum condita fuisse, cum lib. 2. referat Apicem regem strangulatum & in 60
paternis monumentis sepultum: sic feminarum, non secus quam virorum funera condiebantur, ita tamen
vt feminae forma conspicua, monente Herodoto, demum tertio aut quarto à morte die salinariis & po-
linctoribus, ne cum eis concumberent, fuerint tradita. Tradebantur autem, vt Diodorus autor est, his
tantum, qui funera mortuorum curare soliti erant, eo exercitio à maioribus tradito. Bruta quoque con-
dita fuisse, sufficiat Herodoti testimonium, siquidem Ægyptii certa animalia diis sacra habuere, & etiam
post mortem coluere: quorum cum aliquod moriebatur, syndone contextum cum vlulatu pectus
percutientes sale aspergebant, ac cedri liquore, quo diutius seruaretur, ac vnguentis odoriferis
corpus vinctum, in sacris locis sepeliebant. Eiusmodi autem erant, crocodylus, felis, canis, mu-
res aranei, accipitres, vrsi, lupi, qua de re Herodotus lib. 2. Adhucantur ex Ægypto eiusmodi medicata
& condita
- Birumen ex** Bitumen, ἀσφαλτος, dici Suida innuit, ἡ δὲ τὸ ἀσφαλτεῖον, quamuis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare
Auuernia. vocat) vbi plurimum colligitur, deriuari possit. Germani Erdbeck quasi picem terrestrem, eo quod sub-
stantia & viribus cognatum sit, vocant. Est autem veluti pinguis terræ adeps, aëreæ & igneæ substantia,
ideoque flammam promptissime concipiens, Plinio lib. 35. cap. 15. Duplex vero est Bitumen, liquidum ac
densum: illud vario est colore, candidum, quod Babylonis Naphtha: aliud in cinereo candidum, quod to
concretum Arabes Ambra nominant: est & fuluum, nonnihil cæruleum, purpureo colore splendens:
est nigrum, est alio atque alio colore, pro locorum in quibus scaturit diuersitate. Sic hoc nostro seculo
ex Auuernia Gallia Bitumen adfertur & liquidum & nigricans, grauisque odoris, ad hystericas passio-
nes olfactu vtile. Et licet Asphaltum quamdiu innatat, molle sit, exemptum vero pice sicca sit durius, Ga-
leno auctore: attamen interdum ex fontibus ita crassum emanat, vt limus videri possit: quod fortassis
Plinium mouit, cur loco citato, alibi limum, alibi terram dixerit. Quod si bitumen tam durum fuerit vt
poliri queat, Gagates appellatur & Obsidianus lapis: sic in mare Germanicum bitumen effunditur can-
didum, quod Succinum album est. Nihil dicimus de Bitumine fossili, quod terra ampelitis & Bitumen
fossile terrenum, Germanis Sten foll, id est, Carbones lapidei dicuntur. Quod denique Dioscorides li-
quidum Bitumen in Sicilia fontibus innatate dicit, copiose etiam in Germania, maxime circa Brunsh- 20
weigum reperitur, quo ad axes vngendas, iumentorum scabiem & lucernarum lumina vtuntur, & aliqui
à fetore *Stenfalls drect*, id est, Satanæ stercus vocitant: at in Burgundia, ad axes vsus est picis albæ quam
Burgundiam vocitant. Simile etiam ex Betula arbore igne elicitur, quod Bitumen Betulæ arboris, Pli-
nius nominat. P I S S A S P H A L T V M idem ac si dicas picinum bitumen: Marcellus Empiricus dicit Latinis
Rubricam Scythicam appellari. Galenus, Aegineta, Aëtius Pissasphaltum ne mentionem quidem vllam fe-
cere, vt rei ad medicamenta inutilis: Theopompus de eo tanquam fossili agens, ea penè quæ Dioscori-
des refert: Arabibus est Mumia, quod Pissasphaltum Dioscorides vocat: duplex autem est Arabibus, na-
turale & factitium, quo mortuorum corpora condiebantur, ex Myrrha & Aloe. Sic & Mumia duplex, a-
lia Arabum, Pissasphaltum puta, quæ natia est: alia officinarum, quæ Bitumè iudaicum est, humani ca-
daveris tabo mixtum. Dicitur autem Mumia, cadaver conditum. Ex Dioscoride enim capite de Cedro, 30
hæc conditura *φίλαγμα νεκρῶν σώματων* dici potest: sic ex Galeno septimo simplicium *ἐπιράγειν ἐφίλαγμα*
μύριον τεθνήσκων appellare licet. Herodotus in Euterpe, cadaverum condituram *ταέχουσι* vocat: quem
Diodorus lib. 2. cap. 5. sequitur, & Strabo lib. 16. quod ea non aliter, quæ carnes sale condirentur. Plinio li.
11. cap. 37. Cadaver conditum, at Pomponio Melæ lib. 1. ca. 9. medicatum. Hodie non solum in Europa, sed vt
ferunt, etiã in Asia & Africa, Mumia dicitur. De condientibus & condiendi modo, Diodorus Siculus loco
citato eadem penè quæ & Herodotus habet. Tres enim hoc munus absoluunt. Primus Grammaticus di-
citur, qui posito humi corpore circa ilia describit, quatum à sinistra parte incidatur: Alter est Scissor, qui
æthiopico lapide latus aperit, subitoq; aufugit, ob astates qui cum exsecratione in eum lapides coniciunt:
tunc sequuntur corporis curatores, qui *ταέχουσι* salitores appellatur & polinctores, qui existimatione digni:
horum vnus scissuram per corporis interiora, præter renes & cor, ducit: alter vino phæniceo odoriferis im- 40
mixtis lauat, dein Cadaver lotum vnguentis ex cedro & aliis pretiosis per dies triginta vngit: Myrrha dein-
ceps & Cinnamomo liniunt, vt seruari & odoriferum reddi possit. Curatum cadaver cognatis traditur, etiam
superciliorum & palpebrarum pilis seruatis, vt dormienti sit similis. Triplicem condiendi modum Herodotus do-
cet. Primus, cerebro per nares hamo extracto, & lapide æthiopico visceribus ablatis, repurgat vino phœ-
niceo, & odoribus farciunt: tunc omenta myrrha, castia & odoribus, excepto thure, cotulsi, coplent & con-
suunt: dein per septuaginta dies saliant: tunc cadaver ablutum, & syndone inuolutum, gummi illiniunt. Tandem
in ligneam hominis effigiem induunt & reponunt. Alter modus: clystere repleto vnguentis cedrino, in aluum
iniiciunt, non resectis corporibus: dein diebus septuaginta saliant: vltimo die cedrinum vnguentis regerunt,
quod secum intestina educit. Tertius modus: pauperes dilutionibus ventrem abstergunt, per dies septuaginta,
sale arefaciunt, dein reponunt. Verum Iudæi, Strabone li. 16. attestante, Asphaltum siue Bitumine liqui- 50
do utebantur. Ast consuetudo condiendi corpora in Ægypto, longè ante Heliodi tempora, qui quadrin-
gentis ante Herodotum annis vixit, capit. Condiunt autem ob id, quod mortuorum resurrectionem exspe-
ctarent, quod Democriti sententia testatur, inquentis: Ægyptii, Iudæorum more mortuorum expectabant
resurrectionem, idem corpora condiebant, vt durarent, & ad aternitatem asseruarentur: ob id nefas illis vide-
batur ab igne comburi corpora, aut à vermibus absumi debere. Quam Democriti sententiam Plinius, vt E-
picureus li. 7. c. 55. irrisit his verbis: similis & de asseruandis corporibus hominum ac reuiuiscendi promissa
Democriti vanitas, qui non reuixit ipse. Herodotus in principio li. 3. Zoroastis rationem adferre conatus
est hæc, ne humatus à vermibus deuoraretur. Verum enimvero non solum hominum, sed etiam brutorum ani-
malium, permulta genera in Ægypto condiebantur. Ex quo colligi posse videtur, etiam sceleratorum cada-
uera quouis mortis genere affectorum condita fuisse, cum lib. 2. referat Apicem regem strangulatum & in 60
paternis monumentis sepultum: sic feminarum, non secus quam virorum funera condiebantur, ita tamen
vt feminae forma conspicua, monente Herodoto, demum tertio aut quarto à morte die salinariis & po-
linctoribus, ne cum eis concumberent, fuerint tradita. Tradebantur autem, vt Diodorus autor est, his
tantum, qui funera mortuorum curare soliti erant, eo exercitio à maioribus tradito. Bruta quoque con-
dita fuisse, sufficiat Herodoti testimonium, siquidem Ægyptii certa animalia diis sacra habuere, & etiam
post mortem coluere: quorum cum aliquod moriebatur, syndone contextum cum vlulatu pectus
percutientes sale aspergebant, ac cedri liquore, quo diutius seruaretur, ac vnguentis odoriferis
corpus vinctum, in sacris locis sepeliebant. Eiusmodi autem erant, crocodylus, felis, canis, mu-
res aranei, accipitres, vrsi, lupi, qua de re Herodotus lib. 2. Adhucantur ex Ægypto eiusmodi medicata
& condita
- Gagates.** Bitumen, ἀσφαλτος, dici Suida innuit, ἡ δὲ τὸ ἀσφαλτεῖον, quamuis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare
Bitumena fos- Bitumen, ἀσφαλτος, dici Suida innuit, ἡ δὲ τὸ ἀσφαλτεῖον, quamuis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare
sile. vocat) vbi plurimum colligitur, deriuari possit. Germani Erdbeck quasi picem terrestrem, eo quod sub-
stantia & viribus cognatum sit, vocant. Est autem veluti pinguis terræ adeps, aëreæ & igneæ substantia,
ideoque flammam promptissime concipiens, Plinio lib. 35. cap. 15. Duplex vero est Bitumen, liquidum ac
densum: illud vario est colore, candidum, quod Babylonis Naphtha: aliud in cinereo candidum, quod to
concretum Arabes Ambra nominant: est & fuluum, nonnihil cæruleum, purpureo colore splendens:
est nigrum, est alio atque alio colore, pro locorum in quibus scaturit diuersitate. Sic hoc nostro seculo
ex Auuernia Gallia Bitumen adfertur & liquidum & nigricans, grauisque odoris, ad hystericas passio-
nes olfactu vtile. Et licet Asphaltum quamdiu innatat, molle sit, exemptum vero pice sicca sit durius, Ga-
leno auctore: attamen interdum ex fontibus ita crassum emanat, vt limus videri possit: quod fortassis
Plinium mouit, cur loco citato, alibi limum, alibi terram dixerit. Quod si bitumen tam durum fuerit vt
poliri queat, Gagates appellatur & Obsidianus lapis: sic in mare Germanicum bitumen effunditur can-
didum, quod Succinum album est. Nihil dicimus de Bitumine fossili, quod terra ampelitis & Bitumen
fossile terrenum, Germanis Sten foll, id est, Carbones lapidei dicuntur. Quod denique Dioscorides li-
quidum Bitumen in Sicilia fontibus innatate dicit, copiose etiam in Germania, maxime circa Brunsh- 20
weigum reperitur, quo ad axes vngendas, iumentorum scabiem & lucernarum lumina vtuntur, & aliqui
à fetore *Stenfalls drect*, id est, Satanæ stercus vocitant: at in Burgundia, ad axes vsus est picis albæ quam
Burgundiam vocitant. Simile etiam ex Betula arbore igne elicitur, quod Bitumen Betulæ arboris, Pli-
nius nominat. P I S S A S P H A L T V M idem ac si dicas picinum bitumen: Marcellus Empiricus dicit Latinis
Rubricam Scythicam appellari. Galenus, Aegineta, Aëtius Pissasphaltum ne mentionem quidem vllam fe-
cere, vt rei ad medicamenta inutilis: Theopompus de eo tanquam fossili agens, ea penè quæ Dioscori-
des refert: Arabibus est Mumia, quod Pissasphaltum Dioscorides vocat: duplex autem est Arabibus, na-
turale & factitium, quo mortuorum corpora condiebantur, ex Myrrha & Aloe. Sic & Mumia duplex, a-
lia Arabum, Pissasphaltum puta, quæ natia est: alia officinarum, quæ Bitumè iudaicum est, humani ca-
daveris tabo mixtum. Dicitur autem Mumia, cadaver conditum. Ex Dioscoride enim capite de Cedro, 30
hæc conditura *φίλαγμα νεκρῶν σώματων* dici potest: sic ex Galeno septimo simplicium *ἐπιράγειν ἐφίλαγμα*
μύριον τεθνήσκων appellare licet. Herodotus in Euterpe, cadaverum condituram *ταέχουσι* vocat: quem
Diodorus lib. 2. cap. 5. sequitur, & Strabo lib. 16. quod ea non aliter, quæ carnes sale condirentur. Plinio li.
11. cap. 37. Cadaver conditum, at Pomponio Melæ lib. 1. ca. 9. medicatum. Hodie non solum in Europa, sed vt
ferunt, etiã in Asia & Africa, Mumia dicitur. De condientibus & condiendi modo, Diodorus Siculus loco
citato eadem penè quæ & Herodotus habet. Tres enim hoc munus absoluunt. Primus Grammaticus di-
citur, qui posito humi corpore circa ilia describit, quatum à sinistra parte incidatur: Alter est Scissor, qui
æthiopico lapide latus aperit, subitoq; aufugit, ob astates qui cum exsecratione in eum lapides coniciunt:
tunc sequuntur corporis curatores, qui *ταέχουσι* salitores appellatur & polinctores, qui existimatione digni:
horum vnus scissuram per corporis interiora, præter renes & cor, ducit: alter vino phæniceo odoriferis im- 40
mixtis lauat, dein Cadaver lotum vnguentis ex cedro & aliis pretiosis per dies triginta vngit: Myrrha dein-
ceps & Cinnamomo liniunt, vt seruari & odoriferum reddi possit. Curatum cadaver cognatis traditur, etiam
superciliorum & palpebrarum pilis seruatis, vt dormienti sit similis. Triplicem condiendi modum Herodotus do-
cet. Primus, cerebro per nares hamo extracto, & lapide æthiopico visceribus ablatis, repurgat vino phœ-
niceo, & odoribus farciunt: tunc omenta myrrha, castia & odoribus, excepto thure, cotulsi, coplent & con-
suunt: dein per septuaginta dies saliant: tunc cadaver ablutum, & syndone inuolutum, gummi illiniunt. Tandem
in ligneam hominis effigiem induunt & reponunt. Alter modus: clystere repleto vnguentis cedrino, in aluum
iniiciunt, non resectis corporibus: dein diebus septuaginta saliant: vltimo die cedrinum vnguentis regerunt,
quod secum intestina educit. Tertius modus: pauperes dilutionibus ventrem abstergunt, per dies septuaginta,
sale arefaciunt, dein reponunt. Verum Iudæi, Strabone li. 16. attestante, Asphaltum siue Bitumine


& condita cadavera (cuiusmodi duo Venetiis integra vidimus) quorum tamen venter non videtur concidisse: eo quod mos fuerit, ut quæ defunctus in vita dilexisset, una cum eo sepelirentur, & si fas esset condirent, quæ in alium indebant & rebus odoratis complebant, quare in Aegypto & Alexandria, in ventre & thorace etiam reperiuntur libri, idola, numismata, vasa. Meminit Rondetetus funeris conditi, quod integrum ex Memphite, navigio Massiliam fuit advectum, in cuius thorace inventa sunt viginti folia papyri antiquæ literis Arabicis inscripta, quod nemo legere potuerit, licet Iudæi Avinionenses historiam vitæ defuncti contineri aiebant. Sic Bellonius refert se vidisse libros antiquissimos, idola ex ære & orichalco, aliâq; per multa suppellectilia antiqua, in eorum thoracibus reperta. Vidimus nos ipsi idola

Cadaveribus
varia inclusa.

Idola in Ca-
daveribus.

palmum ferè longa, ex terra aliqua confecta forinsecus coloris ex viridi subcærulei, quæ vel viros vel mulieres referebant: quorum quedam hieroglyphicis litteris erant insignita, quedam notis: vnum habemus quod à D. Doctore Bernhardo Paludano, cum ex Aegypto rediret, Patavii dono accepimus, quod ex thorace cadaveris in Aegypto conditi se sumpsisse affirmabat, cuius iconem adiecimus: alterum hieroglyphicis notis insignitum apud Nobilissimum Cortusum, nunc horti Patavini præfectum, quod de collo gestabat, vidimus. Nunc de usu Cadaveris conditi paucis: Etsi Dioscorides, Galenus, Aegineta, Aetius, non minus quam historici, Diodorus Siculus & Herodotus, Cadaver conditum agnouerint, & cedria conditi voluerint, quo humiditates depalceretur, duræ carnes exsiccarentur, & à putredine asservarentur, tamen præcorum Græcorum ætas nusquam in suis monumentis vires medicas tribuisse legimus, cum hoc non fuerit ipsorum institutum, & à paucis annis advehi sit coeptum. Quare inquirunt recentiores, si cedria condiantur, cedriæ virium participia cadavera futura. Si asphalto, asphalti: idem de reliquis medicamentorum generibus dicendum: ex quibus perspicuum, Mumiam vocatam, rem esse compositam ex humana carne, admixto vel sale, vel bitumine, vel cedria: quare hoc conditum mixtam naturam habet cum nitro & cedria, vel pro ratione eorum, quibus conditur: divitum namq; cadavera in oriente, Aloë, Myrrha, & opobalsamum etiam condiebantur, pauperes verò, Bitumine conditi sepeliebantur. Hæc ratio cur nostro seculo, Mumia dicta, inter exotica medicamenta primum locum tribuerint: cuius apud Gallos tanta commendatio, ut optimates ea nunquam carere voluerint: referunt Franciscum primum ipsorum Regem, in baltheo semper gestasse, nullum casum pertimescentem, si vel minimum saltè apud se haberet. Vtuntur & hoc tempore Medici ad coagulatum vel grumosum sanguinem,

Cadaveris
conditi usus.



ex casu resoluendum. Ast in ea quæ ad nos adfertur, nec colore, nec odore, nec sapore percipias myrrham vel aloen, vel opobalsamum admixtum: quare videtur ea esse, quæ bitumine & humano tabo constat, at neq; hæc genuina, sed bitumine cadaverum ossibus infuso & circumfuso: hinc in officinis sæpè scapularum, costarum videbis ossa. Quod cum ita sit, malunt aliqui Bitumen, aut picem siccam accipere, cum hæc cum Asphaltis & vim & ordinis facultatem fortiatur: & sanè, tutius est rem cognitam & sinceram, quam peregrinam & multis abominabilem in usum vocare. Ex dictis facile colligere est, falsam esse eorum opinionem, qui dicunt Mumiam esse corpora eorum, qui in littore maris arena obruantur: vel, ut aliis placet, corpora in montibus frigore congelata, qua de re plenius alibi. Verum & hoc tempore magnatum condiuntur corpora, postquam enim omnia fuerint interanea ablata, ea quæ Cadavera à putredine conservare possunt, aspergunt, & induunt. Apud Gallos vñ status fuit pulvis, quem Myrrhaceum vocant, cuius plures licet sint compositiones, unam tamen addere libet. Assumunt salis multum, Alumen cum Myrrha & Aloe fusum, Absinthium, Cinnamomum, Caryophyllos, Piper, Cuminum, Siler montanum, & id genus aromatum, omnium partes convenientes, quæ in crassiore comminuunt pulverem, affundendo Aceti parum: hunc pulverem alio induunt: tum cera circumlitum (quod tamen non in omnibus observatur) & involutum feretro plumbeo includunt. Simile quid apud Herodotum lib 4. habetur. Patavii anno 78. vidimus hoc pacto cadaver conditi: inciso ventre intestinis cum reliquis visceribus exemptis, pectus ad costarum cartilagineas fuit incisum, visceraq; excisa: mox corpus aqua frigida ablutum, spongijsq; abstersum primò: dein aceto acerrimo, tum aqua vitæ, tandem post factam cum spongia sicca abstersionem, pulvis inspersus ac infricatus: quin & bombacem vel stupas aquæ vitæ immersas & expressas carni applicavit, totaq; & infimi & medii ventris cavitas pulvere impletur, cutisq; consuitur. Pari pacto & caput conditur, posteaquam cranio serra ablato aut perterebrato, cerebrum fuerit exemptum. Sic conditum cadaver linteo cerato adhuc calente involuitur, & denique pice navali illinitur: hoc pacto conditum in annos decem conservari potest. Pulveris hæc est compositio. Accipe herbarum Absinthii ficci, Salvia, Lauendulæ, florum Rosarum rubearum, Nucis cupressi, ana M. iij. Spicæ Germanicæ, calami aromatici, ana M. i. Aloes, Myrrhæ, Mastiches, ana ʒ. j. β. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucis moschatae, Macis, Croci, ana ʒ. i. Aluminis rochæ, Acatia, ʒ. ij. Salis marini, Cumini, Furfuris torrefacti, ana lb. i. Contusa omnia ruditer seruentur ad usum. Dein, accipe Aquæ vitæ lb. x. aceti acerrimi lb. xv. Stupæ canabinæ vel Bombacis lb. vii. Spongas magnas, N. iij. Hæc sunt quæ parata haberi debent.

Error quorundam,
Cadavera ut
nunc condi-
antur.

Pulvis descriptus.

Naphtha Græcis & Latinis, Arabibus & Turcis Nepht. Suidas medicum esse vocabulum scribit, & à Naphtha Græcis *μυρρεν ελαιον* vocari, eo quod Medea Creontis filiam pellicem cremaverit Naphthico oleo, qua de re & Plinius lib. 2. cap. 105. Quibusdam oleum Siculum, quod in Agrigentino Siciliae agro, eo olei vice ad lucernarum lumina utantur. Persæ, auctore Herodoto, oleum hoc Rhodium vocant. Officinis oleum Petroleum.

K iij Petra

Naphtha dup-
plex.
Petroleum
triplex.
Album.

Ruffum:

Nigrum.

Petræ siue petroleum: Mutinensibus, oleum montis Gibij. Differt ab alio quouis liquido bitumine: alia absq; igne, aut bitumine accenso, per se in terra gignuntur: hoc verò gignitur ex Bitumine in terra & montibus natura accenso, tenuissimis eius vaporibus sursum eleuatis, & ad frigidiora saxa in tenuem liquorem resolutis, qui dein per suos meatus è montibus fontium modo scaturit: verum ex crasso & restri bitumine, crassa: ex tenui & puro, pura etiam & tenuis gignitur. Duas quidem differentias Dioscorides agnouit, candidam & nigram: at cum Bellonio tres statuimus, nigram, candidam, & flauam: illa crassior, hæc verò aquæ modo liquidæ sunt. Variant etiam ratione loci: Italica namq; in suo fonte non flagrare dicitur, quod Babylonica facit, si Plutarcho in vita Alexandri credimus. Alba, quæ Babylonica est: licet etiam in Italia scaturiat in tractu Parmensi apud Meianam pagum, quo loci tres scaturigines sunt, vbi leui stillatu effluit, cum paulo maiori aquæ quantitate, parcius oleum fundens, quàm ruffa. Excipiunt autem singulo vel altero die: hoc pacto: aquam scopis quatiunt, sicq; oleum in angulum coactum vase quodam excipiunt in singulum diem libram semis, vel paulo plus: maximè æstiuo, sicco & sereno tempore: hocq; cæteris odore suauius & subtiliorum partium. Ruffa circa montem Zibitum, tredecim à Mutina miliaribus distantem, vbi duæ vel tres scaturigines, colligitur, & quidem hyberno tempore ad vncias quindecim, at æstate ad vncias quadraginta quinq;. Nigra in vico Allensi non longè à Mediolano colligitur, ex puteis qui non Naphthæ gratia, sed salis causa parati sunt: aquæ namq; quæ salis conficiendi causa hauritur oleum innatat, quod concha aufertur: alij tamen vellera immergunt & oleo supernatante imbuunt, eaq; postea exprimunt: & quantò magis aqua exhauritur, tanto amplius olei excipitur, ita vt aliquando in æstate ad 240. vncias colligi referant, maxime æstate siccissima, hyeme verò nihil aut parum. Quam sit Naphtha ἀππαλί κὴ τῆ πυρός, exempla diuersa legantur apud Plinium capite de Naphtha, Plutarchum in vita Alexandri, & Herodotum de scaturigine Naphthæ apud Persas: solent enim, vt auctor Ammianus, Persæ Naphtha tela illinire, ipsisq; accensis & latius emisissis hostium tecta cremare: qui vollet, plura inueniet & de Naphtha & Mumia apud Bellonium & alios. Inter has candida efficacissima, dein fulua, postremum locum nigra obtinet, quod Asphalti odorem plus cæteris refert, eiusq; pretium, propter magnū eius prouentū, vilius est. Hæc crassior est ruffa: ruffa paulò crassior alba, licet ruffa & alba sæpè pro eadē sumatur, quæ ambæ ad eò liquidæ, vt aquæ non valdè sint absimiles: quare si paulò obscuriorem videris, nigram largius affulam scias. Sunt qui loco olei petræ substituunt oleum Latericeum, quod quibusdam Petroleum artificiale, illud naturale, dicitur.

Κυπάρισσος.

CYPRESSVS.

CAP. LXXXVI.

a Celsus nō legit antiquū manu scriptū exemplar, sed mens, & Catalog. hæc omnia habeat.

Cupressi historia.

Cypressus refrigerat, & astringit: cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismi, & vrinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex vino tuscæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earum decoctum eisdem præbet effectus, [tuscæ cum fico duritias emolliunt, nariumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros vngues eijciunt: hernias intestinorum prolapsū erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant.] Pilulæ cum arboris coma suffitæ, cutices abigere existimantur. Folia trita, & imposita vulnera conglutinant, sanguinem supprimunt: trita ex aceto capitula tingunt: illinuntur per se, aut cum polëta ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus: admota cum cerato stomachum corroborant.

CYPRESSVS.

bus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus: admota cum cerato stomachum corroborant.

Cupressus sempervirens

Resina Cupressi.

Cupressi natalia.



Tamet si cupressus arbor notissima sit in Italia: quin est vulgaris sine notitia eius fructus, quos tam Greci, quam Latini conos appellant, arramen cum nihil de eius historia memoria tradiderit Dioscorides, vt lectorib. vndequis sit satisfactum, hic nobis de ea differendum est. CYPRESSVS itaque duum est generum: quorum alterum mas est, alterum feminam appellant. Hæc metam in fastigium acuminatam ducens, illa vero ramos in latum spargens: vtraque proceræ est planta, recta, candice glabro, ramos in summitate tantum habens. Folijs viret perpetuis & Sabina baccifera viridioribus, ac longioribus. Conos edit ter in anno, laricis similes, crassiores tamen, duriores, compactiores, speciosioresque, in quibus minutum concluditur semen. Fundit caudex resinam liquidam, sed medicam, odore haud ingrato, Terebinthina haud absimilem & facultatis ferè eiusdem. Ligni materies solida, compacta, spectabilis, suauiter odorata, sanctorum fere modo. Advena igitur quondam fuit Italia Cupressus, & difficilimè nascens, natuque morosa, vt quæ in educatione plurimum diligentia expetat, & præsertim in locis, vbi suapte natura non prouenit. Tradiderunt veteres cupressum Diti sacram: & ideo funebri signo eius ramos ante domos ponere solebant, vbi aliquis defunctus iaceret: ex quo more creditur eius vmbra infesta, nec quidem gratiosa. Cupressi patria, ac proprium natale solum Cræta insula est: namque inibi quocunq; loco terra moueatur, subactaq; sit, nisi ferantur alia, hæc sua sponte gignitur, atque protinus emigrat. In Ideis etiam montibus, qui ad Troadè spectant, non appellato solo, Cupressus numerosè sponte profilis. Quid admiratione non vacat, alibi nō nisi tempore, &

pare, & perquam diligenti cultura proniciens, & cultorem magnopere fastidians. Odere cupressi flumina, lacus, omnesq; aquosos tractus, quo sit, vt eiusmodi locis sat a confestim inarescant. Quod si rectè sciisset Adamus Lonic. non tam facile (vt puto) scripsisset, cupressum humidis gaudere locis. Aspernantur & simum, quo etiam, si circumfossura impleatur non multo post tempore pereunt. Mira est Cupressi fecunditas, etenim trisera est: colliguntur eius coni mensibus Ianuario, Maio, & Septembri. Semen ipsi innascitur, granis adeo pusillis ac minimis, vt atomis comparari possit: vb id enim agrè perspicitur. Non omitendum natura miraculum, ex tam parua semine gigni tam proceras arbores. Semen mirè formicus expetitur, ampliato etiam miraculo, tantuli animalis cibo absumi hatalem tantarum arborum: quo sit, vt fructifera Cupressi nunquam formicus sint destituta. Cupressus perpetua coma viret, eiusq; materies nec cariem, nec vetustatem sentit, vt etiam cedri, ebeni, loti, taxi, buxi, & olea. Proinde veteres non aliam ob causam ex cupressina materie simulacra sculpebant, nisi quod ad aeternam diuturnitatem permansura putarent, veluti Roma illud Iouis in arce. Fert & Cupressus liquidam resinam Larigna similem, sapore verò acerrimam. Reliqua semina tradunt, foliis cupressi infus si misceantur, à vermiculis quibuscuque non tangi, neque erodi. Lignum autem (vt aiunt) nulla temporis diuturnitate sua uolentiam exuit. Conorum decoctum ex aceto paratum dentium dolores mulcet, si eo sepe os colluatur, eorundem rheumatismos cohibet: idem quoq; praestat foliorum decoctum. Hoc quoque medicamento vitiligines curantur: eorundem & mulorum vnguium cinis oleo Myrtino exceptus, valet illitus ad capillorū desluuium. Idem (vt Marcellus inquit) impari numero minutissimè triti & ex vino vetere hausti, tussim potentissime leniunt. Recentes viridesq; coni berniosos magnopere iuuant, si eorum decoctum ex vino vetere paratum, quotidie affecti biberint trium vnciarum pondere: interim tamen folia cupressi trita testiculis illinenda sunt, est enim hoc auxilium multis experimentis comprobatum. Idem praestant tenera arboris germina commansa, ita vt eorum succus deglutiat. Sunt qui pusillam cupressum, nonnullis etiam Ciproso vulgo dictam, abrotonum feminam vocant, à similitudine, quam haec cum arbore in multis habet: idcirco nec fortasse aberraret, qui certo crederet, Pliniam libr. XXIV. cap. XV. de chamacyparisso herba differentem, de hac intellexisse: praesertim cum tradat, ipsam ex vino potam contra serpentium omnium venena, scorpionumq; ictus pollere: siquidem & nostra hac etate plerique abrotonum feminam ad idem vsurpant. Quod item ad alui tinea necandas bellarijs immiscunt, vt arte pueros ad comedendum alliciant. Hetrusci hanc Santolina vulgò nominant, de qua cum libro tertio in abrotoni mentione nobis latius sit differendū, hic plura dicere superuacaneum esset. Cupressi meminit Galenus libro VII. simplicium medicamentorum, sic inquit. Cupressi folia, germina, pilulae recentes, & molles magna vulnera conglutinant in duris corporibus: ex quo clarum est, quod resiccandi vim habeat absque insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certè & gustus testificatur. Apparet enim in ea leuis quidem acrimonia, sed plurima amaritudo, multoq; etiam plus acerbis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditasq; quanta satū sit deducenda in altum acerbis, vt nullam tamen mordicationem, aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis, putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie, tutoq; depascitur, atque absumit: cum qua excofaciant simul desiccantq; eas quidem qua contenta sunt, absumant, ceterum acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic enterocelicos iuuat: siquidem exiccat, roburq; addit corporis partibus pra humiditate laxis, vt pote cum adstrictio in altum subeat, deducente ipsa caliditate, qua admista est, eum seruante modum, vt deducere quidem valeat non tamen mordicare queat. Quidam ea vtuntur ad carbunculos, & herpes polenta miscetes, tanquam absumat citra excofactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad erysipelata vtuntur, admista nimirum polenta cum aqua, aut exyriato aquoso. Κυπρίστος Graecè vocatur. Latine, Cupressus: Arabicè, Sero, aut Sero: Italianè, Cipresso: Germanicè Cypressen: Hispanicè, Cipres: Gallicè, Cyprez. Bohemis, Cyprijs.

Adami Loniceri lapsus circa locum natalem cupressi.

Cupressina resina. Conorum vsus.

Cupressus pusilla.

Santolina, Cupressi vires ex Gal.

Nomina.

De Cupresso ex antiquis, nullus melius ipso Theophrasto, ex quo Plinius sua desumpsit, scripsit. Dicitur autem από τῆς κῆρυκος ἐν παρῖσι τοῖς ἀκρόμοις, à partu parilium ramorum: arborem Herbarij Cupressum vocant, cuius fructus, σφαιρῖα pilulæ dicuntur, aliis Coni, quibusdam galbulæ, officinis nuces: quemadmodum apud multos Taxus, apud Germanos Buxus, sic Cupressus apud Italos in cœmiteriis colitur, cum funebris arbor olim fuerit habita: plurimas videmus non longè Patauio in colle circa Eremitarum cœnobium: apud nos sæpè licet ex semine germinarit Iuniperinis folijs, non tamen ad aliquam altitudinem peruenit.

Antiquus codex habet ἡ δὲ Ἀριουθου μικρὰς capit.

ἡ δὲ Ἀριουθου μεγάλων in multis anti quis codicib. reperitur.

b Meum & Drag. τιμὴ τοῦ καρπῶν ὁ μὲν τις καὶ ῥύς πορτικῶν

a Ἀριουθῖς.

IUNIPERVS.

CAP. LXXXVII.

Iuniperi genera duo, altera maior altera minor: vtraq; acris est. Excofacit, & vrinā mouet: accēsa serpentes fugat. b Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grandescere, aliæ nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandēdo dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam id est, baccæ Iuniperi nominantur. Modicè calfaciunt, & adstringunt, stomacho vtilis: contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, & conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. c [Folia acrimoniam habent: ideo tam ipsa, quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit.] d.

τὸ μὲν ἄλλο, ἰορὶσκιτῶν, ὃ δὲ κυάμω ἴσος. Profert fructum magnitudine nucis ponticæ, reperitur & fabæ equalis. Sed Car. primo loco habet καρπὸν simpliciter. Secundo verò καρπὸν πορτικῶν.



c. Conclusa desunt in meo, sed Catacuz. habet. d Car. addit. τὸ δὲ ῥήνημα

τοῦ ξύλου ποδὲν ἀν αἰσῶν. ramenta verò ligni deuorata interficiunt: quin etiam addit alterum caput de Iunipero maiore, hunc in modum Ἀριουθῶν μεγάλων, ὃ κῦπάριος ἀρχαῖοι ἢ μνησθεὸς ῥωμαῖοι ἰνιπερῶν, ὅστις ἡ γὰρ αὐτῆς γινώσκωμεν τοῖς πλείστοις, ἐμπερὶς κυπάριος. ἡ γινώσκωμεν ἐν πρᾶξι καὶ ὁ ἀρχαῖος τοῖς ῥωμαῖοις ὅτι τὸ πλείστον ὄνομα ἔχει τὴν αὐτῆς τῆς πορτικῆς. Id est, Iuniperus magna quæ & Cupressus syluestris & mnesitheos dicitur, Romanis Iuniperus, plurimis cognita, similis est cupresso. Nascitur plerūque asperis & maritimis locis. Eadem habet vires cum prædicta.

Reperiuntur Graeci Dioscoridis codices (vt etiam adnotatum reliquit Marcellus) in quibus Iuniperi caput prorsus deprauatum legitur, quibusdam additis, quæ Dioscoridis doctrinam minimè sapiunt. Siquidem nec Galenum, nec Paulum Aeginetam, minusq; Serapionem, qui tamen verbotenus Dioscoridis scripta per capita singula refert, illud vsquam posteritatis memoriae prodidisse constat, quod scilicet ramenta ligni Iuniperi epota homines perdant, praesertim cum eius succo contra serpentium ictus efficacissimè deuorentur: bibaturque, ac illinatur foliorum expressus succus ad vipersarum

IVNIPERVS.

IVNIPERVS MAIOR.



Juniperus
Diosc. Cedrus Theo-
phr. non est.
Juniperus du-
plex.

Juniperi li-
gnum ad ce-
tenarios an-
nos perdurat.
Gummi Juni-
peri seu Ver-
nix.
Sandarachae
Graecorum
Sandarax A-
rabum.

Gummi Jun-
iperi vsus.
Vernix liqui-
da & sicca.

Sandaracha
alia Plinij a-
puncibus.

rarum morsus. Adde etiam quod factio periculo id omnino falsum esse deprehendatur. Quare non modo non credendum, sed ne cogitandum quidem, eiusmodi ineptias à Dioscoride scriptas: quin potius illi adscriptas esse existimandum. Siquidem cum Oribasius, qui plantarum historias perquam diligenter ex Dioscoride transcribit, Juniperi historiam praetermittat, id quidem manifeste indicat haec omnia esse Dioscoridi adulterina. Nam scripsisse Dioscoridem, maioris Juniperi fructum haberi nucis iuglandis magnitudine, alterius vero nucem ponticam equare, nihil est quod me adducat ad credendum, & praesertim cum de re hac tam variae sint lectiones. His ergo rationibus adductus, non temerè partem illam, utpote addititiam, ex hoc capite refecandam duxi. Sed non desunt recentiorum quidam, qui ut noui aliquid in medium asserere videantur, Dioscoridis Juniperum contendunt, nil aliud esse quam Theophrasti cedrum, & erroris in hoc Dioscoridem accusant. Sed si potius videntur somnia describere quam vera, ut facile cuiuspiam palam fiet, qui diligenter Theophrastum perlegerit. Habet enim is duo cedri genera, alterum lycium, alterum Phœnicium, de quibus in Junipero nihil meminit Dioscorides. Sed maiorem & minorem Juniperum describit: non lycium & Phœnicium ex Theophrasto, ut noui hi censores somniant. Maior, & minor Juniperi species in pluribus Italia locis reperitur. Tuscia urbanas alit, quae in proceram arborem assurgunt visunturq; haec frequentes in agro nostro Senensi: quarum fructus sylvestribus & crassior, & dulcior habetur. Folio utraque est aculeato, longiusculo, coronarij Rosmarini effigie, angustiore tamen. Ligni materies dura, compactaq; ac odorata, ad centenarios annos incorrupta perdurat: proinde iussit Hannibal (ut Plinius tradidit lib. 15. cap. 40.) templum Dianae Ephestiae Juniperinis trabibus extrui, quod per multas aetates esset duraturum. Igitur mirari non licet, si chymista asseuerant, carbonem Juniperinum accensum, & suo cinere obrutum ignem integro anno fouere. Baccas edit coeruleas copiosas, erui magnitudine, odore haud ingrato. Profert ex se Juniperus gummi masticha simile, quod & Sandaracham, & Vernicem appellant. Hoc primum cum metitur, candido splendescit colore, senescens vero in rusum abit. Porro haud ignorandum est, hanc Arabum sandaracham à Dioscoridis sandaracha perquam longè desiderare. Namque Graecis sandaracha est fossilis ad arsenici, siue auripigmenti genera referenda, erodens, & exitiale medicamentum, ut amplius in quinto libro, Deo duce, dicemus. Verum haec sandaracha nomenclatio in gummi Juniperi inuenta fuit à medicis, qui Mauritanos secuti sandarax Arabicam nomen (sic enim Arabes Juniperi gummi vocant) in sandaracham conuerterunt. Quamobrem illud adnotandum esse videtur, quod ubi Arabes sandaracham medicamentum inserendam esse praecipiant, gummi Juniperi immiscendum intelligunt: ubi vero à Graecis de sandaracha sit mentio, fossilis illa rufa, & auripigmento similis, est intelligenda. Non desunt tamen qui velint Mauritanorum Sandaracham non esse gummi Juniperi, sed Oxycedri. Quorum equidem iudicio animum facile subscribere: etenim pauci admodum sunt, qui non putent oxycedrum esse Juniperum maiorem: adeo ut pleriq; vulgarij illam ab hac nesciant distinguere. Tradit Plinius libro decimo tertio capite undecimo plura gummi genera, ubi gummi Juniperinum ad nihil esse vrile scribit. Cuius tamen frequens vsus in medicamentis contrarium indicat. Quippe hoc syncero, & oleo ex lini semine presso sit vernix liquidus: cuius est vsus ad illustrandas picturas & ad nitorem ferri conciliandum: utilis etiamnum ad ambusta, & praecipuus ad dolores, & tumores haemorrhoidum. Sicca vernix, hoc est gummi Juniperi (ut auctor est Serapio) suffusus aut aspersus destillationes suspendit: haustus mscium prostruua sistit, sinus exicat immistus, haustus vero pituitam, quae ventriculo, & intestinis haerit: tineas & cetera ventris animalia necat. Neruorum resolutionibus, quas humores frigidi contraxerint, opitulatur. Capitis distillationes suffitu distulit. Idem exceptus sanguinis excretionem supprimit, & haemorrhoidas fluentes illitus. Addito tum rosaceo, tum myrtino sedis rimas coarctet, & hiantibus frigore manuum, pedumq; scissuris illitus succurrit. In summa calfacit, & siccit primo recessu. Sandaracha igni adnotae fumus dentium dolores mulcet, ubi per infundibulum ad affectum dentem peruenerit: eiusdem puluis oui albo subactus, & fronti temporibusq; illitus sanguinem è naribus fluentem sistit. Est & Sandaracha ceraginosi mellis genus apud Plin. qui de ea li. xi. cap.

Vulgaris scribit. Præter hæc conuebitur Erithace, quam alij sandaracham, alij cerinthum vocant. Hic erit apum; dum operantur, cibis, qui sæpe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus: & ipse amari saporis, gignitur rore verno: hæcenus Plinius: de hac ante ipsum meminit etiam Aristoteles lib. IX. cap. XL. de historia animalium, Apes inqueis recondunt alteram quoque cibarij genus cui durities, cera proxima, quod Sandaracham nonnulli appellant. Cæterum oleum, quod ex Iuniperi materie (vt chymista dicunt) per descensorium duobus aduersis fittilibus, tum pariter vitreis instrumentis elicitur, calidum ore contentum dentium dolores mirificè mulcet, si tamen frigida defluxione afficiantur. Fit ex baccis hoc longè præstantius, odore perquam iucundo: foliorum & baccarum Iuniperi decoctum potum valentissimè pellit menses & vrinæ. Decoquuntur quoque iuniperinæ bacca ex vino albo prius contracta, vna cum rosis, cupressi pilulis, & myrti folijs, vtillissimè ad dentium dolores. Siquidem hoc decocto calido in ore contento facile inuantur affecti, & præsertim addito aqua vite momento, atque vbi dolor modum excesserit, addito etiam philonis antidoto. Lixiuum ex vino albo, & iuniperino cineribus præparatum, vnicuique quatuor aut quinque pondere potum, valentissimè pellit vrinam ita vt nonnullos viderim hydro-

10 picos hoc tantum auxilio sanatos. Item scabiem sanat vbi eo affecti sese perfundant. Paratur ex iuniperino ligno balneum admirabilis facultatis ad podagricos, hoc modo. Sumito ligni iuniperini concisi lib. XII. coquito in aqua in cortina magna, quousque tertia tantum pars supersit: dein de decoctum vna cum ligno in labrum proycito. In hoc vbi descenderit ager, se-
 20 deat umbilicatus, & membra languida foueat: atqui hunc præpurgatam esse oportet. Hoc enim balneo nonnullos podagricos in Bohemia vidimus in lectulo iacentes, perpetuoq; dolore vexatos, qui adeo reualuerunt, vt expeditiores facti, ad negotia redierint, quoquo libet ambulantes. Iuniperi & lauri cuiusque septena bacca, addita cassie lignee vulgaris semi dra-
 30 chma, & Guaiacomi drachma, si in Turturis ventre integra omnia coniiciantur, & Turtur deinde affatus, & gallinaceo adipe persusus, mulieri propediem paritura, vesperi alternis diebus, deuorandus præbeat, prægnans facillimè puerpera fiet. Iuniperi meminit Gal. lib. VI. simpl. medic. sic inquit. Iuniperus, valida & sicca vtrinque tertij ordinis. At fructus simili-
 40 ter quidè calidus est, sed non similiter siccus, verum in hoc primi fuerit ordinis. Attenuat, aperit, digerit, resoluit, adstringit, roborat. Arbor Græca voce ἀρκυβία dicta, Latina Iuniperus appellatur: Mauritana, Arconas, aut Archenas: Italica, Ginepro, Germanica Wachholter, & Krametbaum: Hispanica, Enebro: Gallica, Geneure: Bohemica Ialouec. Eius autem gymmi Græci vocant κόμμι ἀρκυβίως: Latini, Gummi Iuniperi: Mauritanici, Sandarach: Itali, Gomma di Ginepro: Germanici, Birnes, Hispani, Verrix: Galli, Vernix.

Sandaracha Aristotelis. Oleum Iuniperi.

Balneum ad Podagricos. Pulchrū experimentum.

Iuniperi vires ex Gal. Nomina.

Iuniperus cum resinam fundat mastichi per similem, inter resiniferas, at bacciferas, non autē coniferas connumerari potest. Græcis ἀρκυβός παρὰ τὸ ἴδιον ἀρκυβόειον, quod eius odorem omnia reptilia aduersentur: vel δὲ ἀρκυβόειον τὰς ἀρκυβόειας κερμυβίνας. Iuniperus verò, quod iuniores & nouellos fructus pariat antiquis maturefcentibus, vt qui pariat vsq; ad tertium annum, arbori suæ inhærente fructu. Florere Theophrastus & Plinius meminere, succedunt fructus ἀρκυβίως seu bacca, officinis Grana Iuniperi, quibus semen inclusum est. Iuniperum distinguimus in minorem & maiorem. Minorem alium vulgatum, alium alpinum: vulgatus duplex, fructu vel maiore, vel minore, quod videtur ratione fruticis euenire, siquidem humilis baccas maiores, arborefcens minores ferat: quod & à Gesnero libro de hortis, annotatum fuit: sic & aliæ baccæ obseruantur rotundæ, aliæ acuminatæ & oblongæ. De alpino seu minimo, qui cubitalem non excedit altitudinem, vide Gesnerum, & Clusium hist. Pan. alibi de eo dicturi: Maioris Iuniperi nomine tres ostenduntur plantæ, vt pote ea quam Cedrum phœniceam auctor vocat: dein altera quam pro Cedro Lycia auctoris posuimus: tum ea cuius figuram adiecimus. Et licet omnibus tribus hoc nomen tribui possit, vt in vniuersali ostendetur histotia, hic tamen de tertia sermo, cum Dioscoridis maior sit Iuniperus, aut saltem congener, quam Iuniperum maiorem bacca carulea appellamus: Lobelus, Iuniperi Maximi Illyrici: Lugdunensis historia Iuniperi maioris: Tabernæmontanus Iuniperi maioris Illyricæ nomine proposuere.

Epabus. SABINA. CAP. LXXXVIII.

Sabina duorum generū est. Vna folijs cupressi similis, spinis horridior, [grauiter olens, lacris & feruens: o arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit: huius folijs nonnulli pro situ vtantur. Altera tamaricis folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigritias, sordesq; repurgant, & carbunculos rumpunt: cum vino pota sanguinem per vrinam eliciunt: partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant. Vnguentis calfacientibus immiscentur, & priuatim c gleucino.

Capro marte por; grauius olens Orib. legit. b Meū mē pōv dē τὸ δ' ἴδ' ἄρ' id est est autem arbor robusta.

10 Sed Catecutz. κολοβόν δ' τὸ δ' ἴδ' ἄρ' i. est autem arbor cutta. dem nulla sit sabinæ mentio.

c. In gleucini compositione apud Dioscori.

Sabina, planta est densa in latitudinem potius, quam in longitudinem sese diffundens: ramos edit flexiles, & fractu contumaces, folijs, squamuisve circumquaque vestitos. Duum est generum, alterum quidem frugiferum, alterum sterile. Sterilis, vulgaris est notities: folijs exit hac cupressi ferè similibus, sed acuto, pungentiq; cacumine grauiter olentibus, acerbis, feruentibusq;. Nascitur in apricis, & feritur quoq; in hortis & viridarijs. Fructifera etsi non adeo vulgaris in Italia videtur, in Germania tamen frequens reperitur, sponte proueniens, folio tamarisci, crassiore tamen, minimè aculeato, nec adeo vt alterius, grauiter olente, acutiq;. Differt hac quoque baccarum colore, qua in altera rubentes, in altera carulea spectantur, sed odore, saporeq; similes. Seritur in apricis & collibus, in hortis & viridarijs, ac etiam sponte per se prouenit. Cæterum non desunt imperiti, qui pro Sabina quandam herbam dodrantalem sumunt, qua quibusdam in montibus plurima nascitur, folio tamaricis, licet nec odore, nec sapore sabinam referat. Hanc sapius existimaui esse Selaginem à Plinio lib. XXIII. cap. XI. commemoratam: namque inibi selaginem esse affirmauit, sabinam similem. Olim selaginem cōtra omnem perniciem habendam prodidit Druidæ Gallorū, & contra omnia oculorū vitia suffitā prodesse. At tanta extitit tunc temporu superstitionū magorumq; vanitas, veluti & hoc auo apud plerasq; gentiū turbas visitur, vt ij nunquā ad selaginem legendā accederent, nisi prius Djs sacra fecissent: quin & eam inualidā omnino censebāt, nisi dextra manu, & nudis pedib. legeretur. Cæterum non desunt qui bacciferam sabinā, haud sabinam esse contendāt, hoc ni fallor, argumēto, quod hac baccas proferat, quarū in sua Diosc. nō meminit. Vnde factū est, vt quidā putauerint, eā maiore iuniperū esse, alij verò sabinā, quā Theophr. memoria prodidit li. & c. v. de hist. plantarū. Verum vtriq; meo iudicio in errore versantur: illi quidem q; hæc plantā

Sabinæ conseruatio.



Herba que pro Sabina exhibetur. Selago Plinii. Opiniones quorundam reprobatæ qui bacciferā Sabinam negant esse Sabinam plantā

planta nec folio, nec flore, neque fructu, non materie, non odore, neque sapore, non cateris deniq, non iuniperum referat: hi vero, quod thuia, ut est auctor Theophrastus, nascatur apud Ammonis delubrum, atque in Cyrenensi agro, forma cupresso similis cum ramis, tum folijs, caudice, fructuque, vel potius ceu cupressus sylvestris: praterea quod, ut idem scribit, thuia materies omnino incorrupta perduret, nihil eius radice crispus sit, atque simulachra ex ea antiqui sculperunt sint soliti, quemadmodum ex cupresso, loto, & buxo. Hac autem arbor conos seu galbulos non fert cupressi modo, sed baccas: caudice non attollitur longo, sed eo breui contenta est: materie non constat incorrupta solidaq, sed caduca & fungosa: non ut thuia peculiaribus locis gaudet, sed ubiq, ferè locorum nascitur: ut hinc maius atque evidentius discrimen in his plantis appareat, quam ut illorum error, qui eas unam faciunt thuiam, pluribus explodi mereatur. Ideoque nostris antagonists mihi astipulandum non est, quod nostris non respondeant argumentis, sed frivolis admodum nitantur coniecturis, ubi bacciferam sabinam Thuiam facere nituntur. Sed dicant: si sapiunt, quomodo, & quo pacto Thuia ex Mauritania euolauerit in Germaniam, ubi in Tyrolensi comitatu plurime baccifera sabinam provenit. Hac profecto omnia sunt, sapientium indigna.

SABINA BACCIFERA.

III. MVSCVSTERRESTRIS

clauatus alter.



tio, risus posteritatis. Sed certè relinquitur, ut miremur eos, qui stirpem hanc, quam depictam exhibemus, veram Sabinam esse insuamur, cum nullis careat notis ex his, quas illi Dioscorides reddidit. At qui illud nobis obiiciunt, quod Dioscorides in describenda Sabina nullam baccarum mentionem fecerit: id mehercule, quod legatur, non fecit. Sed quid dicet is, si in quam plurimis plantis ex iis etiam, quae ab omnibus legitime habentur, plures nota, & ea quidem praecipua, nonnunquam desiderantur? quas nimirum Dioscoridem omisisse credendum est, vel quod planta ea essent alioqui vulgo cognita, vel quod omnes earum partes non satis exploratas haberet, vel alias ob causas, quas prosequi non est hic locus: quatum omnium aliqua facillè potuit esse, cur Sabina baccas non adnotatas reliquerit. Addam & id fortasse ex eo euenisse, quod Sabina frequentius sterilis occurrat, quam fructifera. At qui fructum proferre Sabinam testatur apertissime Auicenna, illum ad aurium surditatem preferens, & ad menses ducendos. Ex iis igitur merito colligendum esse arbitror: hanc nostram Sabinam esse legitimam, ut quae non solum notis Dioscoridi delineationi pulchrè respondeat, sed etiam facultatibus. Porro Petrus Bellonius de arboribus coniferis differens, in inepte satis, meo quidem iudicio, Sabinam admiscet, atque in ea describenda, quam secundo loco ponit Dioscorides, mihi non parum hallucinatus deprehenditur, quod constanter affirmauerit se vidisse frequentissimum hoc Sabina genus in Amano & Olympo Phrygia montibus tota facie iuniperum maiorem referens, magnitudine amygdala arboris maioris, folijs cupresso per omnia similibus, baccis per maturitatem in ceruleo nigricantibus, & caudice resinam ferente. Etenim Dioscorides non tradit quae sit huius plantae facies, & quae magnitudo, sed etiam in folijs tantum à priori variare scriptum reliquit. Quod non alia de causa auctorem hunc fecisse reor, quam quod sciret nullum vtriusque esse in reliquis notis discrimen. Quare quod alterum Sabina genus tota facie iuniperum maiorem referat, magnitudine amygdalum arborem aequet, cupressum folijs prorsus amuletur, & ex caudice resinam fundat, ut Bellonius suum depingit, mihi quidem planè absurdum videtur. Sed quod rem hanc turpiter confuderit Bellonius, vel ex eo manifestum esse puto, quod quam plantam nunc Dioscoridi alteram Sabinam asserit, eandem paulò post arborem illam constituit, quam Plinius libro duodecimo, capite decimo septimo Brutam appellat, quasi Plinius non meminerit vtriusque Sabina libro vigesimo quarto capite undecimo. Tantum quidam suis peragrationsibus tribuendum esse putant, ut eos non pudeat saepe absurda, & fabulosa, & quae cum summis & probatissimis authoribus pugnent, narrare ac scriptis tradere, ut nouus alius quidam impostor facere solet. Neque certè id propterea dico, quod peregrinationes damnem, quas semper, Galeni exemplo, vtilissimas duxi ad legitima simplicia medicamenta cognoscenda. Sed optarem, ut ij, qui multas regiones peragraverunt, illa tantum in medium proferrent, quae essent rationi, & veritati consona, & veterum scriptorum auctori-

Bellonij opinio absurda circa Sabinam bacciferam.

De Plinij

...probata. Quod si à Bellonio, qui tot terras se peragrasse proficitur, factum esset, nimirum eas laudes iure sibi comparasset, qua rei medica inquisitoribus maxime debentur. Atque hac obiter dicta sint. Quod autem idem Bellonius primam Sabina genus eam arborem suspicetur, quam Theophrastus thuiam nominat, non miror: nam & alij idem sentiunt. Verum quandoquidem hanc opinionem superius abunde (ni fallor) improbauimus, ideo hic non est ut plura addamus, atque idem reperere superuacuum esset. Sabina sterilis, non adeo multum differt à baccifera, verum tum acrior est, tum quoque graueolentior. Excalfacit & siccat tamen valentius. Digerit, resoluit, aperit, abstergit, prouocat, & perumpet adstringit. Praestat foliorum sabinae puluis cum adipe vaccini lactis mistus, magno iuuamento ad manantia infantium capitis ulcera: quin etiam incensa fumus gallinarum pituitam excutit, & grauedinem. Idem drachma pondere ex butyri vnciu tribus, & binis mellis sumptis mirifice asthmaticos iuuat. Dantur quoque magno auxilio bina succi sabinae drachma, additis ternis scrupulis Chrysocolle fofitica, & vini albi vncia, agrè parturientibus: verum dari non debet, nisi in maximis difficultatibus. Reliquum igitur est, ut Sabina suas vires reddamus, de quibus Galenus lib. vi. simplicium medicamentorum disseruit is verbis. Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idq. secundum tres qualitates, quas in gustu praese fert, similiter cupresso, nisi quod ea & acrior est, & vt sic dixerim, magis aromatica, seu odoratior. Igitur huius, quam modo dixi qualitas est particeps, nam acrimonia consistentis in temperamento calido, praeterea amaritudinis, & adstrictionis obscurioris, quam in cupresso. Siquidem quanto magis acrimonia superat, tanto etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit ob siccitatis, & caliditatis robur: nam vtriusque illi tantum inest, vt etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter cupresso accommodari potest, maxime vbi rebelliores fuerint, & diuturniores, non hac citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quae atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat: carbunculos item soluit. Porro essentia tenuitate menses quoque prouocat, vt si quid aliud, & sanguinem per vena mouet, factum etiam viuentem interficit, & mortuum eijcit. Esto autem hoc medicamen terij ordinis, tum excalfacientium, tum desiccantium ex numero eorum, quae vel maxime tenuium sunt partium. Et hoc vtique nomine vnguentis videtur, & maxime gleucino, & in multas antidotos inijcitur. Quidam vero etiam cinnamomi vice duplum eius subijciunt: est enim extenuandi, & digerendi facultatis si epotum fuerit.

Sabinae vires.

Sabinae vires ex Galeno.

Βράβυς Gracè, Sabina Latine vocatur: Arabicè, Abel, Abhel, seu Alhorar: Italicè Sabina & Sauina: Germanicè, Seuenbaum: Hispanicè, Sabina: Gallicè, Sauniere aut Saunier. Boberlicè Klasferska Chuuogka, Polonis, Szauina. Sabina Sterilis, Gracis, Βράβυς & σπάλυξ: Itali, Sauina sterile.

Nomina.

Sabina Romanis dicta à regione, in qua multum nasceretur, quae duplex altera vulgatio folio Tamarisci: altera folio Cupressi: in hoc tamen conueniunt, quod immortalis coma vireant, & vtraque baccas ferat nigras Iuniperinis similes: nulla enim est, quae sterilis omnino sit, licet ea quae furculis feritur rarius fructum proferat. I. Sabinam ergo primam Dioscoridis, sabinam folio cupressi vocamus, Sabina maior Gesn. Sabina altera Dodo. sabinam fructifera, Cast. Genuina sabinam baccifera atrocerulea. Lob. Sabina folio cupressi simili, Cord. in Diosc. Sabina cupresso similis, Lugd. Sabina baccifera, Cam. sauina femina maior, Tab. II. Sabina folio Tamarisci, C. B. Sabina, Brunf. Fuch. Dodo. Sabina sterilis, Cast. Sabina vulgatio, Lob. Sabina minor, Ges. hort. ap. sauina Lon. sauina mas, Lob. Sabina Tamarisci similis, Lugd. III. Meminit Matthiolus herbae quae pro Sabina exhibetur, idcirco eius iconem adiecimus, dicitur autem Muscus terrestris clauatus alter, qui toto genere à sabinam differt. C. B. sauina syluestris, Trag. (cui & selago) Lon. Ges. Muscus terrestris tertius, Lugd. sauina Tragi syluestris seu selago Pliniana, Thalia: Chamacyparissus, Turenro & Tabernamontano. Sed de hoc musco alibi.

Catacuz.

Κέδρος δένδρον ἐστὶ μέγα ἐξ ὧν ἡ λέγουμένη καρυάτις γέταται.

Καρπὸν ἔχει ὡσπερ κινναρίσου μακρότερον μὲν παρὰ πικρὸν λέγεται δὲ καὶ ἄλλη κέδρος μικρὰ ἀκαθάρτου ὡσπερ ἀρκυόσος φέρουσα καρπὸν μέγθος μύρτι περιφύει.

Id est. CEDRVS arbor magna est, ex qua cedria colligitur, fructum producit velut cupressus maiorem tamen vt plurimum. Reperitur & alibi cedrus parua aculeata, instar Iuniperi, ferens fructum magnitudine myrti rotundum.

CEDRVS. CAP. LXXXIX.


Cedrus arbor magna est, ex qua picem colligunt, quae cedria vocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris: quae dum effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea vis inest, vt defuncta corpora censeruet, & viua corrupat: quae ex causa mortuorum vitam aliqui eam appellauerunt. Vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi, & siccandi dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamenta vsus: quippe illita oculis claritatem affert, albugines cicatricesque detergit: instillata autem cum aceto, vermes aurium necat: cum hyssopti decocto infusa, sonitu sibilosque sedat, canis dentium indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali concipiendi vim adimit: anginae ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est: lentes, pediculosque illitu enecat: cerastae moribus cum sale imposita subuenit: contra hausta leporis marini venena in pallo sumpta, auxiliatur: in elephantia aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius absorbeatur, persanat: vermes, & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum à cedria separatim dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: priuatim vehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum, bouumque persanat: ijsque inhaerentes ricinos enecat, & ulcera, quae ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent: stomacho aduersantur: auxilio sunt tussi, couulsis, ruptis, stranguria: menses ciunt ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur: serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet: quae eandem, quam picea fuligo, vim praebet.

Fecit deprauata Dioscoridis lectio, & scriptorum negligentia, vt non solum is author multis in locis à recentioribus erroris reprehendatur, sed vt rei herbariae indagatoribus multum accesserit negotij in agnoscendis, demonstrandisque, ipsius Dioscoridis plantis. Id, quod in Cedro accidisse videmus, cum non desint recentiores, qui in describenda maiori Cedro toto caelo aberrasse Dioscoridem dicant: quippe qui scripserit magnam cedrum baccas edere iuniperi modo rotundas, baccarum myrti magnitudine. Hoc idem nobis quoque magnum facebat negotium, donec clarissimus vir Augerius Busbecke Flander qui septem annis, Caesaris Ferdinandi, apud Tutcarum Imperatorem, oratorem egit, ad nos redijt. Siquidem is antiquum Dioscoridis exemplar habuit ab Antonio Catacuzeno Constantinopolitano viro optimo acceptum, cuius testimonio mihi iam compertum est, ne minimum quidem vnguem in describenda Cedri historia à scopo aberrasse Dioscoridem. Id quod doctissimo Augerio vniuersa posteritas reseret acceptum. Exemplar enim illud sic habet Κέδρος δένδρον ἐστὶ μέγα ἐξ ὧν ἡ λέγουμένη καρυάτις γέταται. καρπὸν ἔχει ὡσπερ κινναρίσου μακρότερον μὲν παρὰ πικρὸν λέγεται δὲ καὶ ἄλλη κέδρος μικρὰ ἀκαθάρτου ὡσπερ ἀρκυόσος φέρουσα καρπὸν μέγθος μύρτι περιφύει. Id est, Cedrus arbor magna est, ex qua cedria colligitur.

Cedri historia Dioscoridi restituta.

I. CEDRVS.

II. CEDRVS PHOENICIA.



igitur, fructum producit velut Cupressus, maiorem tamen ut plurimum. Reperitur, & alibi Cedrus parua, aculeata instar
 Juniperi, ferens fructum magnitudine myrti, rotundum. Quibus manifestò palam est, vtriusque cedri historiam rectè scri-
 psisse Dioscoridem, quem admodum Theophrastus, & Plinius, qui maioris cedri duo genera facit lib. XIII. cap. V. vbi ita scri-
 bit. Et maioris cedri duo genera: quæ flores, fructum non fert: fructifera non floret, & in ea antecedentem fructum occupat
 nouus, semen eius cupresso simile. Quidam cedrelaten vocant. Ex hac resina laudatissima, materia verò ipsi aternitatis: itaq;
 & simulachra deorum ex ea factitauerunt. Et libro XXI. cap. V. idem inquit. Cedrus magna, quam cedrelaten vocant, de-
 picem, quæ cedria vocatur: hæcenus Plinius. Qui fortasse non ineptè magnam cedrum cedrelaten appellauit, quoniam ce-
 dri arbores, quæ in monte Libano proueniunt (vbi mihi retulerunt amici, qui vniuersam ferè Syriam peragrarunt) tota facie
 abietem referunt. Abies autem Græcis ἀβιανδριτικὴ: unde cedrelate poterit cedrabies Latine reddi. Arbor hæc (vbi idem
 mihi narrarunt) admodum magna & procera est, vti nusquam arborem se vidisse affirmant, quæ cedrelaten magnitudine excel-
 lat. Cortice vestitur lauis & glabro, ea parte excepta, quæ à terra ad primos vsque ramos attollitur: hæc enim aspera cerni-
 tur: corticis color est ceu loti arboris. Rami ab imo vsque ad cacumen ferè in rotam modum per intervalla caudicem cingunt,
 & spatiantur: qui tunc minoribus visuntur, quanto superius erumpunt: hinc est, quod eminens conspecta arbor pyramidi
 faciem representat. Folia illi capillata assignant, veluti Larici, vel pino, breuiora tamen, & minimè aculeata: id quod etiam
 testatur Plinius lib. XVI. cap. XXIV. Conos profert piceis æmulos, vtrum breuiores, crassiores, duriores, & vegetiores, ut ex
 imagine quispiam videre potest, pediculo pertinaciter inherentes: in quibus semen includitur cupresso simile, ut Plinius tra-
 dit. Caudex resinam fundit albam, & liquidam: sed tractu temporis, solis feruore in grumos concrefcit. Sunt qui afferant,
 hanc cedrum duplicem resinam ferre, atque alteram intra corticem vomica modo conaceruari, ut abiegnam lachrymam in
 abiete oriri superius diximus: alteram verò extra corticem emanare: vtranque ab arbore cedriam nominant. Hæc sunt,
 quæ de magna cedro à peregrinis accepi. Porro Cedrus cor habet durissimum, ac odoratum, colore perinde rubens, atque laci-
 guum. Tota cedri materies durissima: quam ob causam credere maiores, eam neque cariem, neque vetustatem sentire, sed
 aternam esse. Quæ etiamnum ratione ductus Salomon Hebræorum rex, Dei optimi maximi templum Hierosolymis ex cedri
 materie extruendum curauit. Ex ea quoque prisca simulachra factitauerunt, existimantes tantam illi inesse diuinitatem
 quantum marmoreis, aut metallicis. Cedri materies optima nauigiis non modò extruendis, sed & palatiis, & artium
 fabricis conueniens: quippe quoniam incorrupta quasi in perpetuum perdurat. Cedrus saxosus & frigidus locus gaudet, &
 montes amat præ cæteris tractibus. Perpetua coma viuet, quæ si castratur, decacuminata demoritur, nec vnquam inde re-
 germinat, utpote & cupressus, pinus, larix, & aliarum plures. In Aegypto ac Syria (vbi Theophrastus & Plinius narant)
 reges inopia abietis cedro ad classes feruntur vsq;. Maxima ea in Cypro traditur ad vndecimem Demetrii succisa, centum
 triginta pedum longitudinis, crassitudinis verò ad trium hominum complexum. Cedri huiusce maioris ramum vnà cum
 fructu à Libano monte allatum, cuius hic imaginem damus, misit ad me Verona Franciscus Calceolarius pharmacopem. ad
 Auream Campaniam, vir quidem rei plantaria studiosissimus: à cuius icone edocti, qui medicam materiam colunt, facile in-
 telligent, quam magno ducantur errore, qui nostratam laricem Cedrum hanc magnam esse contendunt. Cæterum minori
 Cedri bina itè species sunt (vbi prædicti auctores testantur) Lycia, & Phœnicia, iuniperi similitudine: differunt folio, nã Phœ-
 nicia foliū habet iuniperi, durū, spinosum, acutū, & ob id oxycedros appellatur. Lycia verò folio constat longè minore frequen-
 tiore, longè minus aculeato, ut ita iuniperū paruum quadantenus referat. Eadē si digitis atteratur non insuauē spirant odorem:
 talis enim habetur, qualis ferè in pineorū strobili percipitur, cortice caudex obducitur subrubro, & ramos emittit laci-
 guum instar: vtraq; omni tempore fructū gerit: verum in oxycedro maior & pulchrior spectatur, quadruplo maiorib; colore
 anteo rufescente, sapore dulci, esui hand ingrato. Lycia baccas gerit alterius minores, rubresq; amaro sapore, odore nõ ingra-
 tuo.

Cedri duo ge-
 nera Theo-
 phrast. & Pl-
 nio.
 Cedri maio-
 ris historia.

Cedri duplex
 resina.


Cedri mino-
 ris genera.

Cedrus Phœ-
 nicia.

in Phœnicia cedrus frequentissima nascitur in Iſtria, atq; etiã in nonnullis lapidea locis, iunipero admodũ ſimilis, nec niſi fructu differens, maiore, rubete, ac dulci: quo tamẽ eam incolæ a iunipero neſciunt ſecernere. At cum ipſe oxycedri ramuſculos eſſem donatus a Georg. Reſſingero primario prouincia Carniola medico, qui illũ ex Peſino Iſtriaz oppido ſecũ attulerat, rubetib. bacca vndiq; reſertum, eaq; in memoria haberẽ, qua apud Theoph. Galenum, ac veteres alios legeram, mihi quidẽ fructũ intuenti ſtatim inclinauit animus, hanc plantam minorem eſſe cedrum. Etenim (vt memorant ſtirpium ſcriptores tum veteres, tum recentiores) difficile admodum eſſet dignoſcere oxycedrum a iunipero, niſi huic caruleus pumilusq; illi verò ſtaurus rubensve, ac grandior fructus ineſſet. Eam igitur plantam, quam in Iſtria naſci diximus, & cuius hic eſt ſpeciem damus, non Cedrus Ly-
 maioris cedri genus vllum, ſed minoris ſpeciem eſſe cenſemus, nimirum Phœniciam, qua & oxycedros vocatur. De Lycia au-
 cia.

III. CEDRVS LYCIA.

IV. ARBOR VITAE.



Juniperus
 Lycia
 Spha.

tem cedro quid ſentirem, vel quam plantam pro ea in medium proferrem, haecenus non habui, vt qua mihi planè incom-
 perta eſſet: ſed hoc anno, dum Praga Bohemorum ago, plantam mihi oſtendit Adamus Leonorus ſpectata doctrina, & ma-
 gne ſpei iuuenis, ex quibuſdam Morauia montibus a quodam vulgari herbario pro Sabina allatam. Vt autem ille hanc ve-
 ram Cedrũ Lyciam adinuenit, & pro ea mihi demõſtrauit, ita mihi eius cognitionẽ illi acceptam referre iucundũ eſt: atque
 ideo ipſam pictura, quam hic damus, exprimere curauim. Huius planta folia ſi digitis atterantur, ſuauiſſimum ſpirant odo-
 rem, illi quadantenus ſimilem, qui in pinorum ſtrobilis percipitur. Ea baccas proferit, longè tamen minores quàm altera,
 qua in ramuſculorum tantum cacuminibus prodeunt: ha non ſecus ac illa primo exortu virent, mox ſtaueſcunt, denique
 rubent vbi plenè maturuerint: ſaporem habent ſubamarum, atque non obſcurè odorata ſentiuntur. Manat ab arbore ma-
 gni cedri (vt ſupra dictum eſt) etiam reſina, qua propriè Cedria dicitur, vtilis ad multos in medicina vſus. Sed hanc ad nos
 non adferunt Cyprii, neque mercatores, qui ex Syria mercimonia conuehunt: tametſi regiones illa plurimis (vt aiunt) ce-
 dri maioribus ſcateant. Petrus Bellonius lib. III. de medicato funere, item libro de coniferis arboribus, putat non modo ce-
 drium Cedriam fundere, ſed & piceam, tedam, laricem, cupreſſum, iuniperum & betulam. Quinetiam idem ſuis malè ex-
 cogitatis cedris eas omnes facultates aſſignauit, quas Dioſcorides, Galenus, & alij quàm plurimi auctores cedria duntaxat
 reddiderunt: adeo vt magno ac ridendo errore dixerit, ſuas haſce cedrias deſuncta corpora conſeruare, quemadmodum ea
 conſeruat legitima cedria: quaſi idem quoque velit, quod picea, pinus, larix, cupreſſus, iuniperus, & betula nullũ prorsus
 inter ſe facultatibus differant. Neque certè alia videtur mihi auctoritate vel ratione ductus, vt in hanc iuerit ſententiam,
 quàm hac, quod ſcripſerit Plinius lib. XVI. cap. XI. piceam in Syria cedrium vocari. Sed quod Bellonius maxime hallucinetur,
 vt pote qui Plinium non rectè intellexerit, ex verbis Plinij, qua modo ſubiiciam, ſatis, vt puto, manifeſtum fiet. Pix, inquit,
 liquidain Europa è teda coquitur naualibus muniendis, multoſq; ad alios vſus: lignum eius conciſum ſurnis vndique igni
 extra circumdato ſeruet. Primus ſudor aqua modo fluit in canali: hoc in Syria cedrium vocatur, cui tanta viſ ineſt, vt in
 Aegypto corpora hominum deſunctorum ea perſuſa ſeruentur. Ex ijs Plinij verbis non aliud (meo quidem iudicio) intel-
 ligi poteſt, quàm quod Syri liquorem illum cedrium vocauerint, quoniam olim ij ex cedro tantum piceam ſuam conſicie-
 bant, vt ea in Europa è teda fit. Quod autem pix ex cedro paretur, authores eſſe poſſunt Dioſcorides, Galenus, & Plinius.
 non tamen contra quod cedria ab alijs reſiniſeris plantis deſuat. Adde quod a veteribus, nempe Theophrasto, Dioſcoride &
 Galeno, nuſquam (quod equidem ſciam) memoria proditum eſt, reſinae, aut piceae genus vllum deſuncta corpora conſeruare,
 & viuẽtia corrumpere, praeter cedriam, de qua omnes illi id ſcriptis tradiderunt. Ex quo abunde conſtare arbitror, Pli-
 nium quidem loco citato de pice tantum cedri ſcripſiſſe: Bellonium vero in hoc ſimiliter hallucinatum fuiſſe, atque in alijs
 pluribus rebus, vt aliquando, Deo iuuante, latius oſtendemus. Ceterum variat in Dioſcoridis codicibus de cedria lectio: quip-
 pe vulgata ſapientia ty ismũ habet, id eſt grauis odore, cum tamen antiquiſſimus codex manu ſcriptus habeat eũt ovos ty

Cedria.

Bellonij opi-
 nio falſa cre-
 ca Cedriam.

Plinius picẽ
 Cedriam vo-
 cat.

Pix Cedro.

ὄσμη, id est vehementis odore, quod indicat cedriam esse vehementer odoratam, non autem graniter olere. Quod etiam maxime testatur Virgilius libro 7. Aeneidos his versibus de Circe canens.

Proxima Circea raduntur littora terra,
Diues inaccessos vbi solis filia lucos
Asiduo resonat cantu, tectisq; superbi
Vrit odoratam nocturna in lumina cedrum,
Arguto tenues pereurrens pectine telas.

Fuch. opinio
de Cedria.

Cedrus At-
lantica Plinij

Cedrus At-
lantica &
Thuia idem.

Anguillarius
notatur cir-
ca Thuiam.

Cedrez vires
ex Galeno.

Cedrides fru-
ctus Cedri.
Nomina.

Gummi cedri meminit Fuchsius libro illo de componendis medicamentis, quem postremo locupletatum excudit, in compo-
sitione antidoti Mitbridatis: pro quo, quando non possit inueniri, lachrymam abietis substituendam precipit, ratus vtrique
eandem vtrique facultatem inesse. At ego quidem Galenum secutus malim ladanum substitui, donec ab alijs aptiora pro-
ferantur, quorum meliori iudicio subscribendum sit. Est etiam (vt Plinius inquit lib. 13. cap. 15.) aliud cedri genus, quod
in atlante Mauritania monte, quadam in peculiari sylua prouenit. Arbor est cupresso femina, etiamnum syluestri simili,
folio, odore, caudice. Huius existimatio summa mensarum causa eburneis pedibus subiectis. Ex huiusce arboris materie
mensa due (vt idem inquit Plinius) altera M. Ciceronis, altera Galli Asinij, qua sestertium vndecies venundata sunt. Tra-
ditur & Iubas Rex duas vendidisse, quarum alteri pretium sestertium quindecies, alteri paulo minus. Sunt qui dicant, &
recte quidem, Cedrum hanc a Thuia siue Thya nihil differre, de qua meminit Theophrastus libro 5. de plant. hist.
Quamobrem Plinium redarguunt, quod simul ac de Cedro Atlantica differuit, illico caput proprium de Thuia scripserit,
tanquam de arbore diuersa. Verum longe aliter se habet sententia nostra: nam diligenter Plinij lectionem enucleantibus,
palam apertissime fit, Thuiam Plinio nul aliud designare, quam Atlanticam Cedrum, cum ibi sic habeat. De mensis tamen
tacuit Theophrastus: & alias nullius ante Ciceronianam vetustior memoria est, ex quo nouitia apparent. Etenim hac ver-
ba non solum Theophrastum excusant, quod eius auctore nulla cedrinarum mensarum extiterit memoria, sed manifesto sunt
argumento, haudquamquam ignorasse Plinium Thuiam & Cedrum eandem esse plantam, cum paulo superius Ciceronia-
nam mensam ex Atlantica cedro asseruerit fuisse paratam: Adde quod in antiquis Plinianis codicibus Thuia caput a Ma-
ritana Cedro separatam non sit, quod manifeste arguit Plinium adhuc Cedri illius historiam prosequi de Thuia agentem,
quemadmodum & ipsa verba clarissime indicant, quae in antiquis codicibus ita habent: nota etiam Homero fuit, Tro-
gete vocatur, ab alijs Thya. Id est, eadem Cedrus nota etiam fuit Homero, qua alijs Trogetem, alijs Thyam appellant. Ideoque
perperam egerunt, qui in Frobeniana editione Thuia siue Thya caput ab Atlantica Cedro diuiserunt, haud recte Ph-
nium intelligentes: ac praeter id lectionem eius corruerunt, vbi se emandasse crediderant. Ceterum Anguillarius de Sabina
agens, eam qua Cupressum exprimit faciem foliorum tantum similitudine, Thuiam nulla dubitatione esse censet. At qui
cum deinde Thuiam nihil ab Atlantica cedro differre existimet; sequitur, vt velit nihil a Cedro hac differre Sabinam. Sed
credam ne ego Anguillario Sabinam hanc esse Cedrum Atlanticam, vel Thuiam? Minimè omnium, quod hac nusquam
gentium proueniant nisi in Cyrenica regione apud Ammonis delubrum: & in ea Atlantis parte, vbi Anchorarius mor-
babetur, Plinij adusque tempora exhaustus, quodque caudice & odore, quin etiam fructu nullam habeat Sabina cum Cu-
presso cognationem. De Citris autem, quibus aurea totius ferè Italia viridaria exornantur, tam in Tyrrheni, quam Bena-
ci littoribus, in sequentibus, & capite de malis, vbi ipsorum mentionem facit Dioscorides, adiuuante Deo, plura dabuntur:
siquidem arbor illa ab hac, de qua nunc agitur, plurimum differt. Cedri meminit Galenus libro 7. simplicium medicamen-
torum his verbis. Cedrus specie duplex est, altera fruticosa iuniperis ad similia, altera arbor non exigua. Vtraque est calida,
ficcaque temperatura tertij quodammodo ordinis, secundum vtrumque. Ceterum Cedrea (vocatut ita cedrioleum) qua-
rum etiam ordinem videtur attingere: abunde calida simul, & tenuium partium. Molles itaque carnes promptè citraque
dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quae cum eiusdem sint in calfaciendo ordinis, adiunctam etiam habent substantiae re-
nitatem: at in duris plusculo tempore, & vix operatur. Porro talia omnia medicamenta septica vocantur, & septa: sed in-
ter sese maioris, minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo, & infirmissimo ordine ce-
drea: pleraque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque & mortuorum corporum carnes corrumpunt: at cedrea
exsiccat, simulque a corruptione tuetur corpora demortua, vt pote humiditates exum superfluas depascens, ceterum solida
corpora haud attingens. At in viventibus calor ipse, qui in corporibus est, cedrea vires adaugens, causa efficitur, vt tenere ab
ea carnes deuantur. Nec mirum videri debet, si cum tanta polleat potentia, lendes, pediculos, & tineas, & in auribus na-
tos vermes interficere valeat, tum solum appositum viuentem quidem interimat, mortuum autem eijciat, sicut sanè etiam
in coitu seuen, pudendo circumlita, proinde conceptum impediens est medicamentum, si sic vt aris, nulli secundam, aliaque
multa eiusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est, ipsum valenter ex calfacere, sicut vbi dentium foraminibus
instillatur: siquidem dolores eorum mitigat, sed & ipsos confringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices, & visus hebetu-
dini ab humorum crassitudine orta medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad vnguem oleosum, quod suspensum su-
pra eam dum coquitur, lanis excipitur, ac colligitur, tota cedrea tenuius quidem est, sed minus acre, quamquam non minus
excalfaciens. Eandem quippe rationem habet ad id quod reliquum est cedreae, crassius illud videlicet, quam oleum ad amur-
cam: proinde illud vt pote crassius, mordax est, & maiore aperiendi facultate praeditum. Itaque vlcera irritat, phlegmonemque
illis excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo clementibus est viribus, vt etiam plebey experientia docti vulnera ouibus occasione
tendendi a forfice facta, illa illis sanent, sicut etiam pice humida. Vtuntur autem ea & ad ouium scabiem, & ricinos, Graeci
ἰπὸ τρωας vocant. Porro cedrides (nam ita fructum cedri nuncupant) moderatiores vires obtinent, adeo vt concedi quoque
possint: attamen si liberalius vsutur, capiti dolorem inferent, ardoremque, ac morsum in ventre percipies.

Quae arbor Graecis κέδρος, Latinis item Cedrus nominatur: Arabibus, Serbin: Italis, Cedro. Eius autem liquor vt
Graeci κέδρα, ita etiam Latine Cedria dicitur: Arabice, Kitran, siue Alkitran: Italicè, Cedria. Cedra u phoenicea Graeci
ἰπὸ τρωας: Italis, Cedro minore. Cedrus Lycia, Graecis κέδρος λυκία: Italis Cedro Lycio.

Hic lectorem admonitum volumus, illa de fulgine Cedri verba non legi in Graecis tam vulgatis, cum etiam antiquis
omnibus codicibus quos legimus. Quare cum neque a Marcello vertantur, qui plura exemplaria Graeca habuisse fatetur, ea
potius addititia, quam legitima censenda videntur.

Cedrus maior est & minor: minor altera Iunipero, altera Sabinæ similis, seu Phoenicia & Lycia. L
Cedrus maior, cui competit nomen δειρολιβαρυ in Geoponicis, cuius coni sursum (licet hoc figura non
exprimat) spectant, quod huic vt & Abieti peculiare est. Cedrus in Syria, Theophrasto lib. 5. cap. 9. Cedre-
lare, Plinij, Cedrus maior, Bellon. Cast. Cedrus arbor conifera, Ges. hor. Cedrus maior conifera, Dod. Ce-
drus Libani & Palestinae praecelsi, Lob. Cedrus phoenicia, Lugd. Cedrus, Casal. & Taber. II. Cedrus mi-
nor

hoc Juniperi folio & oxycedrus Theophrasti, quam videtur intellexisse Galenus dum cedrum fruticosum Juniperis adsimilem scribit. C. B. Oxycedrus, Dod. Gal. Lugd. Clus. Hisp. cui etiam Cedrus Lycia Theophrast. & Plinij: Oxycedrus Phœnicea, Dodo. Cedrus Phœnicea, Cast. Tab. Cedrus, Lac. Lon. Cedrus magna, Cord. in Diosc. Cedrus minor, Ges. hor. Juniperus maior Monspeliensium, Lob. inter Juniperum montanum Cefalpinus recensuisse videtur. III. Cedri Lyciæ nomine hanc Matthiolus proponere videtur, quo nomine & Bellon. & Ges. hort. donarunt: Cedrus minor, Cord. in Diosc. Oxycedrus Lycia, Dod. Cedrus Phœnicea media, Lob. Juniperus maior, Clus. Hisp. Sabina baccata, Aduer. & Lob. in Iconibus. Thyiæ genus quartum, Lugd. Cedrus Phœnicea secunda, Tab. Oxycedrus folio cupressi, & sabina maior Monspellientibus dicebatur, aquod quos in monte Cetio ad mare collegimus. Equidem malim ad Juniperum referre, cuius nomine Juniperum maiorem folio Cupressi appellamus, & videtur Juniperus maior Dioscoridis, quem scribit aliquibus Cupressum sylvestrem appellari, quia Cupresso similis, asperis maritimisq; locis plerumq; nascitur: quæ Dioscoridis verba tanquã notha, à Dioscoridis interprete reiecta sunt. Huius est altera species, maioribus multo baccis, quam ex Ægypto accepimus, quam Cedrum phœniceam alteram Lobel. nominat, vt qui tres referat species, sola magnitudine differentes. IV. In hanc classem & Arbor vitæ referenda, cum Cedrus Lycia Lo b. dicatur, multis videatur esse Thuya Theop. 4. historiz i. qua in descriptione quædam sunt quæ nostræ conueniunt: alij ad Brutam Plinij lib. 12. ca. 17. referunt, licet paucissimæ notæ Plinianæ nostræ conueniant. Hæc vulgo Arbor vitæ dicitur, fortè ob odoris vehementiam: quo nomine donarunt Bellonius, Ges. hort. Dodo. Clus. Cast. Taber. Arbor filici similis Oniedo: Thuyæ tertium genus, Lugd. Thuya, Cam. Arbuscula est admodum odorata, perpetuo virens, altitudine virum longè superans, quæ ex radice vnicum caudicem eumq; rectum, cortice lento ex rubro nigricante rectum emittit, nodoso duroq; ligno: qui in varios ramos alarum modo expansos brachiatur, hiq; in alios planos alternatim diuiduntur, & ij denuo in alia atq; alia oblonga folia, è multis foliolis quaternis simul compositis constantia. Flores ex extremis folijs vernali tempore exeunt, vt in Cupresso pusilli flauescens, quorum aliqui in exiguum fructum pinei nuclei magnitudine conglobantur, conis ex squamulis sex compactis, qui primò virent, mox pallent, & vbi maturuere nigricant: in quibus semina quatuor pelleacea in medio continentur, quorum medulla acris & amariuscule. Hæc ex Canadas septentrionalis Americæ prouincia in Galliam primum illata, & Francisco regi arboris Paradyfi nomine donata: quam Luteciæ dum effemus ex Regio hortu quem Io. Robinus colit, in Illustrissimi Ducis Wirtenbergici D. Friderici hortum, quem Montembelgardi, frater Ioha. Bauhinus eius Celsitudinis Archiater colit, missimus, vnde plurimis alijs per Germaniã communicata ex transmissis furculis, qui facillè radices agunt.

LAVRVS.

LAVRVS LATIFOLIA.



Laurus nobilis
Laurus

Δάφνη

LAVRVS.

CAP. XC.

Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore: vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infessus additum, vuluæ, & vesicæ vitij conuenit. Virentia a folia sensim substringunt: illita quoque, ac trita vesparum apumque ictibus opitulatur: eadè cum polenta, & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri baccæ magis quàm folia calfaciunt: ergo in eclegmate tritæ cum melle vel passo, prosunt tabi, orthopnææ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur: vitiligines

alta Catac.
& Drag. At
meum exem.
plar legit 70
εχλαρα τω
εχλαρα. I. VIT
tia ligna
εχλαρα. I.
tonitru legit
antiq. con.

L ; gines

gines emaculant. Succus baccarum vtilissimè aurium dolori, [& grauitati] instillatur cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur, quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa vocant: & ad vnguenta, quæ calfaciunt, & discutunt. Cortex radice calculos rumpit, parcus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Lauri histor.

Laurus mas
& femina.Laurus Apol-
lini & Ioui
sacra.Laurus è co-
lo missa.

Lauri natura.

Lauri vires
Matthiolo.Laurus lapi-
dea.Lauri vires ex
Galeno.

Nomina.

Laurus tam tenuifolia, quàm latifolia, arbor est odoratissima, neminiq; in Italia non cognita, quod non solum in bor-
tis, viridarijsq; ac vineis sata vbique virecat, sed per se in syluis, locus præsertim maritimis, ac etiam in montibus, &
collibus apricis, qui lacus & maria respiciunt, spontè nascatur. Folia habet oblonga, & lata origine in acutum desinentia,
crassa, solida, & odorata, in vno quidè genere latiora, in altero angustiora: qua foliorū differētia alterā marem alterā fe-
minā censens. Flores mittit paruos muscosos, olea ferè similes, ex luteo albicantes, è quibus bacca prodeunt oleis similes, co-
lore primum viridi, & per maturitatem nigra, crasso intus nucleo, vt in Rusci baccis. Decerpuntur Lauri bacca in fine Autum-
ni, vel statim in ipso hyemis principio, vt etiam oliua. Et oleum ex ijs elicetur, quod Laurinum vocamus. Laurus planta est,
Appollini lucidissimo sacra: quin etiam à Ioue colitur. Vna quoque laurus Roma antiquitus imperatorum pontificumq;
domos exornare solebat. Quod similiter, atque alij complures gentiliū mores, in hunc vsq; diem apud nos perdurat. Nam-
que vbi dies festus aduenerit, laurus non modò templorum valuas decorat, sed & vbi dies geniales adfuerint, ingentium pa-
latorum est ianitrix. Quo fit, vt magnis aduentantibus principibus, lauri frondibus & columna & arcus in pacis signum
extruantur: siquidem pacifera laurus est, non secus ac olea. Ideo antiquitus etiam, si eius rami prætendebantur inter arma-
tos hostes, firmum quietis erat indicium. Qua obseruatione ductus Bernardus Clesius Cardinalis amplissimus Tridentinus,
tum pacis, tum quietis sectator maximus, lauri & palma florida ramū adnectebat, vt nitida marmor, præclara metalla, spe-
ciosa pictura, aurea & argentea vasa, ac reliqua admiranda demonstrant, quibus magna eius palatia fulgent. Romanis
laurus ferebatur latitiae victoriarumq; signo. Idcirco laurum in templis in Iouis gremio reponebant, quoties Roma letitiam
victoria noua attulerat. Quin etiam grata Apollini dona vnoquoq; anno mittere solebāt in Parnaso mōte, quod ibi laurus
spectatissima cresceret. Caterum quod laurus Roma à Ioue è cælo missa fuerit, vt ea imperatores coronarentur, facile per-
hiberi potest: namque Livia Drusilla, que postea Augusta matrimonij nomen accepit, cum pacta esset illa Casari, gallinam
conspicui candoris sedenti in hortis aquila ex alto abiicit in gremium illasam, intrepideq; miranti accessit miraculum,
quod teneret rostro laureum ramum suis baccis onustum. Quod audientes conseruari alitem & sobolem iussere aruspices,
vnumque eum feri, ac rite custodiri: quod factum est in villa Cesarum fluuio Tyberi imposta, iuxta nonnum lapidem sta-
minia via, que ob id vocatur ad gallinas. Porro tam creuit ramus laureus, tamque se propagauit (tamen si radicibus destitu-
tus) vt breui tempore ibi mirè sylua prouenerit: ex qua triumphans postea Casar laurum in manu tenuit, coronamque in
capite gessit. Ac deinde Imperatores Casares cuncti triumphantes lauro coronabantur: tenebantque in manu eiusdem ra-
mos: quos post triumphos traditus est mos ferendi in eminentioribus locis in celebratis Roma collibus. Quo factum est, vt
plures laurorum sylua Roma virescerent, quæ ob id laureta vocabantur: qualis erat, que in monte Auentino multo ante
alios tempore viguit. Nimirum indicat laurum dijs gratissimam esse arborem, quæ sui habetur ab impetu fulminum ratio:
siquidem nulla habita, cum è cælo ruunt, nec diuinitatū, nec principum amplitudinis ratione, plerunque templorum tur-
res icipiunt, superba mundi palatia dilacerant, ac sapius homines immaniter interimunt: hæc tamen sola arbor fulmine non
percutitur, nisi in futura calamitatis prodigium: ac ne quidem domus, in quibus adsint eius rami, de cælo tanguntur, pro
certo creditur. Proinde Tyberius Casar fulminibus perterritus, tonante cælo lauro coronabatur. Laurus ex sese vim habet
ignem producendi: quippe si exiccata ramus ramo frequentius confricetur, super asperso sulphuris puluere ignis statim exi-
liet. Eadem perpetua fronde viret, tantaq; pollet vi, vt eius ramis in aruo desicis, rubigo, maxima segetum pestis, abigatur,
transeatque in earum folia ex aruis. Poète perfectionis signo lauro coronantur, idque præmiū est Apollineorum musa
colentium. Coruus occiso chamaleonte, fronde lauri duorata infestum virus extinguit: quæ etiam palumbes, graculi, me-
rula, & alia per plures aues annum fastidum purgant. Lauri tenerrime summitates vnâ cum nardo in vino feruesceta,
aurium grauitatem, & sonos curant, si decocti calentur vaporem, per infundibulum in aures intromittant affecti. Restitu-
unt Lauri bacca prolapsam columellam, si cum equali pondere cumini, hyssopi, origani & euphorbij melle excipiantur, &
summo capiti calida applicentur. Eadem cum triticeo fursure, luniperi baccis, & allio contrita, & vino subinde super ca-
lenti tegula aspersa, pubique admota, vrinam suppressam prouocant. Septem Lauri bacca, à pregnantibus propediem pari-
turis, cum se dormitū recipiunt, deuorata felicitatemq; partū præstant. Tenerrima lauri cima, vna cum calamintha, &
sale contrita, ex tepida aqua sumpta, aluum concitant, pituitamq; & lumbricos celeriter eijciunt. Caterum lapideas lau-
ros oriri in mari rubro scribit Theophrast. lib. 4. capite 2. de planta sic disto, inquit. In sinu autem Heroo cognominato, ad
quem descendunt Aegyptij, laurus est, & olea, & thymum: verum non viridia, sed lapidis specie parte à mari eminente, si-
milia tamen viridibus tam folijs, quàm germinibus. Colos quoque floris in thymo, tanquam nondum perfectè floruerit, li-
quidò deprehenditur. longitudo arbuscularum cubitorum ternorum est: hæc ille. Laurum scripsit commendauit Galenus
lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit. Lauri arboris & folia, & fructus desiccant, & calfaciunt vehementer,
plusque etiam fructus, quàm folia. At radice cortex minus quidem acris est & calidus, plus tamen amarus, habetque etiam
adstrictionis non nihil. Quamobrem & calculos confringit, & icori prodest, bibitur ex vino fragrante trium obolorum
pondere. Laurus attenuat, aperit, prouocat, incidit, emollit, digerit, flatu pellit. Arbor Δάφνη sic Grecis vocata, Latinis Lau-
rus dicitur: Mauritanis, Gaur, seu Gar: Italis, Lauro: Germanis, Lorberbaum: Hispanis, Lauret, siue Laureiro: Galis, Lau-
rier: Bohemis, Bobeck. Huius fructus Græcè Δαφνίδες vocantur: Latine, Lauri bacca: Italicè, Bacche di lauro: Germanicè,
Lorbeer.

Lauri multa genera Plinius recensuit, vt Mustacæam, Delphicam, Cypriam, bæccaliam, triumphalem, taxam, spadoniam: qui & alia genera affert, quæ nomine potius quam generis societate conueniunt. At Theophrasto Laurus quædam flore est copioso & racemoso (Vuam vocat) quæ fructum non fert: altera fructum fert. Diuidimus in satiuam & syluestrem: satiuæ (quia vt plurimum in hortis colitur) alia latifolia, cuius species quædam adeò latis folijs, vt ad mali Medicæ folia accedant, quam Laurum Regiam amplissimam Plin. vocauit: alia tenuifolia: sic vtraq; mas, vel femina, eo quod alia sit sine fructu, alia verò baccifera. Variat & fructu, alterius enim rotundo modicè oblongus: alterius oblongus, gracilis & vtrinque ouato mucrone turbinatus. Syluestris trium generum est & Tini nomine Clusius hist. Hispanica proposuit. De Lauri syluestris specie vna, cum eius & in Matthiolo Camerarij addita sit icon, paucis

LAVRVS SYLVESTRIS
seu Tinus.

PLATANVS.



Hæc arbuscula est Lauro humilior in alas diuisa, ramis longiusculis articulatis: folia lauro vulgari latiora, nigricantia, inodora, ramos ordine quodam ambientia, leuiter lanuginosa: ramulorū summitatibus umbellæ florum (quinis foliis constantium) alborum, foris purpurascens, insident: quibus succedunt bacce seu fructus subcæralei, oblongi, tenui pericarpio semen continentes. Hanc in Italia hortis obseruamus, quam in Hetrurix syluis frequentem dicunt. Theoph. i. hist. 15. vbi Gaza simpliciter Laurum vertit, *διπλωσάνθη*, Cato Laurum syluaticam, Plinius lib. 15. c. 30. Laurum Tinnum appellauit. Anguillara Lauro syluatico Italis dici scribit. Bellonius, Lentagine nuncupat, Clusius & ex eo Lugd. pro Tinno tertio, at Tabernmontanus pro secundo, proposuere.

Πλάτανος.

PLATANVS.

CAP. XCI.

Tenerima Platanii folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt: tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potæ, serpentiu. u. morsibus auxiliantur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. Insidens foliorum, pilularumque lanugo, oculos, & aures offendit.

Platanus Italia aduena peregrinaq. est, quanquam regionem diluunt (vt Theophrastus est author) multi, iniquique Platanii confluuij. Verum enimuero si ibi nonnullæ virescunt Platanii planta, vt quas ipse Neapoli, & Patavij vidi, sunt quidem ex sideratio. Mira Platanii, vasta que amplitudo. In quibus regionibus allata, vt etiam antiquitus à Romanis per mare Ionium inuecta fuere, eorum duntaxat umbra gratia Rome expetita, vbi platanus tantum honoris increbuit, vt diu nutrita sint mero radicibus infuso. Namque hæc arbor plurimū viæ irrigatione gaudet: tametsi maiorem in modū fontes, & fluuios amet. Platanus ad amplissimam ramorum amplitudinem adsurgit, adeo vt Licinius Mutianus ciuis Romanus, Plinio teste, hoc prodendum etiam posteris putarit: qui in provincia Licia legatus affirmat, in ea fuisse platanum sociam gelidi fontis amœnitæ itineri appositam, cæloginta atque vniū pedum specu, numero vertice, se vastu protegentem ramis arborum instar, & agios longis obtinentē vmbri: ac ne quid desit spelunca imagini, saxea intus crepidinis corona, muscosos cõplexa pumices: intra quam se epulatum cum duodevigesimo comite, largè ipsa toros præbente fronde, ab omni afflatu securum, optantem imbrium per folia crepitus, latiorum quam marmorum nitore, pictura varietate, laquearium auro, cubuisse in eadem. In Creta insula ad Cortynam Platanus sterisse fertur apud fontem quendam, quæ folia hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Europam indigena fabulantur. In Asia longè maiores habentur: nã earū folia, quæ vna cum fructu ad me misit Constantinopoli Gulielmus Quacelbenus, eruditissimus Medicus, vinifera vitis maiora sunt. Pilula verd iuglandis magnitudinē equant, & hirsutiores spectantur, quæ quæ in Italia proueniunt. Scripsit quoq. de Platanorū vastitate Pausanias lib. 7. historiarum veteris Græciæ, his verbis. Præterfluit Pharensum agrum fluuius Pierus in cuius ripis Platanorū lucus est, tanta arborum magnitudine, ex ipsa vetustate, vt intra cauernas (multæ enim concavae sunt) qui velint, & epulari, & recubere possint. Fori area magna, & late patenti ambitu est, quo scilicet spatio esse cõsueuerunt priscorū fora. Quæ in Italiã inuecta fuerunt climatis inclemetia in magnã proceritate non adolescunt: attamē sunt cortice crasso, subalbicatæ, fronde viridinae aucta parte cædida, sed multo minore, lata, longo rubroq. pediculo, flosculo paruo ac pallido, baccis rotundis, scabris, & lanuginosis, longè a pediculo depēditibus: ex quibus oleū fieri prodidit Plin. li. 15. c. 7. Platanii vmbra vsq. eò delectatū Xerxē in terra Lydia scribit Asiæ, vt diē integrū sub ea cū maximo exercitu consumpserit, floccipēdēs tā breui voluptate tot copias remerari. Platanii

Platani vites
ex Gal.

Platani aduersantur vesperilionibus: earum pilule addito melle, & illita, lentiginem, veteresq; nigritias emendant. De platano differuit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit. Platani humidioris frigidiorisq; essentia est, non ita male quam symmetra. Proinde folia viridia trita & illita, prohibent, resoluunt, reprimunt, & non obscure pblegmonas nascentes adiuuant: Cortex autem, & pilule magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores: pilule vero cum adipe ad vlcera ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamē desiccatorum, & absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanat, per sese autem illitum, ob hamorem nimium, vetera & sordida. Vitandus est paluis foliis arboris insidens, alioqui si spiritu attrahatur, arteriam offendit, valenter desiccans, & exasperans, videritq; ledit, sicut sanē etiam visum & auditum, si in oculos, aut aures inciderit. Πλάτανος, ut Græcis, ita pariter Latini Platanus appellatur: Arabibus, Dulb: Italis, Platano. Gallis, Plan, sine Plane.

Nomina.

Platanus nomen habet ab amplitudine, ob latè diffusos ramos, amplaq; folia, de qua Plato in Phædrone, Theophrastus, Aelianus, aliiq; Platanum vocantes, ut & ex recentioribus Cord. Ges. Dodo. Lob. Laz. Cast. Catal. Lugd. Taber. Platanum Græcam vocabimus ad differentiam Gallicæ (relictâ sententia Cornari, qui Tiliam vulgarem Platanum autumat) quæ ob foliorum formam & nominis similitudinem, hæc quidem referri posset, quæ Acer maior dicitur: at quia Aceris in simpl. med. classe Dioscorides, Galenus, Aëgineta, Aëtius, aliiq; non meminerunt, & viribus cum Platano non conuenit, de eo, eiusque speciebus in vniuersali historia.

FRAXINVS. CAP. XCII.

Fraxini hist
ex Theophr.



FRAXINVS arbor nota est. Cuius foliorum succus, & ipsa ex vino pota, & illita viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemque potu perniciem afferre tradunt.

FRAXINVS arbor est notissima. Eius (ut Theophrastus memoria prodidit lib. 3. ca. 11.) duo reperiuntur genera: quorum alterum excelsum procerumq; est, lignum habens candidum, crassiusculum, neruatum, mollius, emodius, ac crispius: alterum humilius, minus acule, scabrius, durius, & flauius. Folia laurinis, lauri latifolia similia, in acutius tamē coacta, & ambitu leuiter serrata. Ramulus totus, quem folium vult putaueris, quod simul cuncta folia seras singulari pediculo, & singulis foliis coniugatum, veluti per genicula, pendens consistat: amplo interuallo coniugationibus distinctis, perinde atq; in sorbo. Fert fructum in siliquis linguis auicularum similem, subrubrum, & gustu subamarisculo ac medicato, minutū, nucosum, qualem amygdala, gustu subamarum. Fraxinus excalfacit & siccatur, adstringit, resoluit, abstergit, attenuat. Tradidit Plinius fraxini folia iumentis mortifera, ceteris ruminantium innocua: quæ de taxo, non de fraxino Theophrastus prodidit, inquit. Si iumenta (ut ferunt) taxi folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil incommodi patiuntur. Sed nominum vicinitate Plinium deceptum esse crediderim, nā Græcis fraxinus iudicatur, taxo vero quidam, & iudicatur appellatur: vnde vnum pro altero sumēs Plinius, facile (ut diximus) in errorem incidit. Rei fides fuerit in hoc Plinium lapsum fuisse, clara in Italia experientia, siquidem taxi foliis, non fraxini, iumenta nō ruminantia necantur. Quinimod hac

Plinii lapsus,
fraxini folia
mortifera et
se.

salutare præstant remedium lethalibus serpentium venenis: quibus adeo inimica est fraxinus, ut ne matutinas quidem occidente sive umbras quamlibet spatiosas serpens arboris huius attingat. Quapropter expertū proditur, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quam in fraxinum fugere serpentem. Mira natura benignitas, priusquam hæc prodeant, florere fraxinum: nec ante conditas folia dimittere. Quo argumento fretus, non vereor quin vnusquisque medica

Roberti Cō-
stantini hal-
lucinatio.

materia studiosus, facile deprehendet hallucinari proculdubio Robertum Constantinum, in annotationibus editis in Amathi Lusitani enarrationes in Dioscoridem, dum contra sententiam nostrā, hoc in loco Plinium defendere nititur. Atqui si suam ipsius ignorantiam & Plinij errorē cognoscere cupit, alat suum equum aut asinum fraxineis frondibus: id si fecerit sui erroris atque Plinij palinodiam recantabit. Quod si plura à nobis doceri non dedignabitur, sciat deuoratis à quadrupedibus fraxini foliis ea certò sanari, quæ taxum fuerint depasta. Humiliorem Fraxinum Ornum & orneoglossum vocare quidam, ab ipsius fructus figura, quæ lingua imaginem refert, quamobrem auis linguam illum vocant officinam. De quo differens Plinius lib. 24. cap. 8. mederi id iocinoris, & lateris doloribus in vino tradidit: aquam, quæ subit cutem, extrabe-

Fraxinus hu-
milior Or-
nus.

landam venerem. Fraxini spumā, quæ à viridi ligno igni exposito manat, additis succi cyclamini, scilla, rutæq; equalibus partibus, omnibus simul parumper seruesactis, plurimum valere ad surditatem scimus, si in aurem sanā hic liquor calidus infundatur, cū se cubitum receperit ager: atqui eum super affecta aure iacere oportet. Vbi verò vtrinq; aurē surditas occupauerit, in eam fundatur, quæ minus affecta fuerit, & super altera iaceat. Fit è viridi fraxini ligno tesseratim conciso per descensum, aqua simul & oleum, ut ex ligno Iuniperi: quæ quidem aqua, cū quarta parte aquæ violarū purpurearū faciat illita, ruborem, & pustulas cum eo erumpentes sanat. Ramorū cortex in aqua decoctus splenem absumit, vbi pluribus diebus eiusdem decoctum bibant splenetici. Semen, quod auis linguam vocant Myropola, datur vtiliter potandum in lateris dolore, & ad cicindam vrinam. Venereū idem excitat, & presertim, si vna cum pistaciis & nucibus pineis deuore-

Fraxini vites.

landam venerem. Fraxini spumā, quæ à viridi ligno igni exposito manat, additis succi cyclamini, scilla, rutæq; equalibus partibus, omnibus simul parumper seruesactis, plurimum valere ad surditatem scimus, si in aurem sanā hic liquor calidus infundatur, cū se cubitum receperit ager: atqui eum super affecta aure iacere oportet. Vbi verò vtrinq; aurē surditas occupauerit, in eam fundatur, quæ minus affecta fuerit, & super altera iaceat. Fit è viridi fraxini ligno tesseratim conciso per descensum, aqua simul & oleum, ut ex ligno Iuniperi: quæ quidem aqua, cū quarta parte aquæ violarū purpurearū faciat illita, ruborem, & pustulas cum eo erumpentes sanat. Ramorū cortex in aqua decoctus splenem absumit, vbi pluribus diebus eiusdem decoctum bibant splenetici. Semen, quod auis linguam vocant Myropola, datur vtiliter potandum in lateris dolore, & ad cicindam vrinam. Venereū idem excitat, & presertim, si vna cum pistaciis & nucibus pineis deuore-

Aqua & oleū
fraxini.

landam venerem. Fraxini spumā, quæ à viridi ligno igni exposito manat, additis succi cyclamini, scilla, rutæq; equalibus partibus, omnibus simul parumper seruesactis, plurimum valere ad surditatem scimus, si in aurem sanā hic liquor calidus infundatur, cū se cubitum receperit ager: atqui eum super affecta aure iacere oportet. Vbi verò vtrinq; aurē surditas occupauerit, in eam fundatur, quæ minus affecta fuerit, & super altera iaceat. Fit è viridi fraxini ligno tesseratim conciso per descensum, aqua simul & oleum, ut ex ligno Iuniperi: quæ quidem aqua, cū quarta parte aquæ violarū purpurearū faciat illita, ruborem, & pustulas cum eo erumpentes sanat. Ramorū cortex in aqua decoctus splenem absumit, vbi pluribus diebus eiusdem decoctum bibant splenetici. Semen, quod auis linguam vocant Myropola, datur vtiliter potandum in lateris dolore, & ad cicindam vrinam. Venereū idem excitat, & presertim, si vna cum pistaciis & nucibus pineis deuore-

Auis lingua.

landam venerem. Fraxini spumā, quæ à viridi ligno igni exposito manat, additis succi cyclamini, scilla, rutæq; equalibus partibus, omnibus simul parumper seruesactis, plurimum valere ad surditatem scimus, si in aurem sanā hic liquor calidus infundatur, cū se cubitum receperit ager: atqui eum super affecta aure iacere oportet. Vbi verò vtrinq; aurē surditas occupauerit, in eam fundatur, quæ minus affecta fuerit, & super altera iaceat. Fit è viridi fraxini ligno tesseratim conciso per descensum, aqua simul & oleum, ut ex ligno Iuniperi: quæ quidem aqua, cū quarta parte aquæ violarū purpurearū faciat illita, ruborem, & pustulas cum eo erumpentes sanat. Ramorū cortex in aqua decoctus splenem absumit, vbi pluribus diebus eiusdem decoctum bibant splenetici. Semen, quod auis linguam vocant Myropola, datur vtiliter potandum in lateris dolore, & ad cicindam vrinam. Venereū idem excitat, & presertim, si vna cum pistaciis & nucibus pineis deuore-

in alio saccharo: idem Semen in Nouembrio initio decerptum, & in furno siccatur, datur perquam vtiliter potandū
 calcolosis, ex veteri vino. Folia fraxineis similia fert stirps illa apprimè celebris, quam vulgò DICTAMVM ALBVM
 nuncupant, ob idq; à recentiorum nonnullis pumila fraxinus cognominatur. Hac nullis tā Græcorum, quam Arabum au-
 thoribus (quod equidem legerim) vsquam descripta est. Quare non possum non admirari, quomam pacto sibi dictami nomē
 vindicauerit. Ea est visu pulcherrima, speciosaq; floribus sermofis, impensè redolētibus, in purpura albicantibus, citrei ar-
 doris modo. Radix ei candida, odore hirci, amaro sapore: proinde mirum non est, si ventris tineas perimat. Tradunt etiam
 sapre vispollere aduersus lethalia venena, ac omnium venenosorum animalium morsum icturnq;, nec minus aduersus pe-
 stilentiam. Prodest stomachicis, & suspensiofis. Elicitur è floribus aqua, quæ naribus infusa capitis morbos frigiditate obortos
 mirifice propellit. Caterum non desunt antagonista, qui velint Dictamum hunc esse Dioscoridis Tragium. Sed cum rari-
 tum in Creta Dioscoridis, Galeni, Oribasi, Pauli, Pliniq;, testimonio proueniat Tragium, cadit peritq; horum sciolorum
 sententia, quos & illi perpetuò ridebant, qui haud ignorant quanto grandior sit, albo dictamno Lentiscus. Namque quis
 sane mentis dixerit dictamnum hunc herbam sesquicubitalem ramos habere lentisco arbore non infima, maiores, aut
 grandiores? sed ita sepe ducuntur inuidi ad stultitiam vsque: atqui plura de his in Epistolis scribenius. Quæ arbor Græcè
 Μόδις: Latine Fraxinus appellatur: Italicè, Fraxino: Germanicè, Eschern/ Escherbaum, Stegneschern: Hispanicè,
 Fraño, & Fraxo: Gallicè, Fraïsne. Bohemicè, Gelin: Polonis, Zefion.

Dictami albi
 consideratio

Tragium
 Diosc. non
 esse.

Nomina.

Fraxinus duum generum, altera latioribus, altera angustioribus foliis: quæ latioribus, alia sterilis, alia
 frugifera: ea est quam Theophrastus excelsam dicit, quamq; Macedones βουμυλίαν (Bubulum fraxinum
 Gaza reddidit) id est, grandem fraxinum vocitant: idem enim est, ac si diceret πολυμυλίαν, & particula
 magnitudine u significante προ πολέ, Plutarcho in Symposiis auctore: etsi ad bonum pabula quidam frō-
 des etiam reponant, ita vt & ob eam causam Bubula fraxinus fortè sit dicta: Hæc Plinio longa & campe-
 stris est. Recentioribus fraxinus. Sterilis seu mas solos flosculorum racemos seu globulos nigros fert, qui
 absq; fructu decidunt, quos Theophrastus αἶον ἐρύα, velut muscos, vocat: pilulas vocat auctor Herbarii Lu-
 gdunenſis, Muscos in globum coactos quoq; Casalp. & Camer. in Matth. hiq; partim fructui propinqui,
 partim longè remoti vernò tempore obseruatur. Frugifera seu femina, fructus fert siliquarum instar de-
 pendentibus, quos aliquis ὀρνιθόγλωσσον, alii rectius ὀρνιθόγλωσσον vocant. Officinis, ex Serapione & Auicenna,
 Lingua auis & Lingua passerina.

POPVLVS ALBA, ET NIGRA. CAP. XCIII.

POPVVS albæ populi cortex vnciæ vnius pondere, ischiadicis, ac vrinæ stillicidio prodest, sterilitatē in-
 ducere tradunt, si cū mulino rene bibatur. Folia quoq; cum vino post purgationes pota idē præstare
 produntur. Tepens foliorū succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulæ, quæ primo foliorū partu exi-
 unt, tritz & cū melle illitæ, oculorū hebetudini medentur. Memoria prodiderunt, corticem albæ po-
 puli, & nigrae patticulatim cæsum, & sulcis stercoreatis mandatum, omni tēpore anni edules fungos præ-
 ferre. Populi nigrae folia cum aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam po-
 pulus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lachrymā popu-
 lorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum vo-
 cant, alii christophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum, potumq;
 stomachi, ventrisque fluxiones sistit.

I. POPVLVS ALBA.

II. POPVLVS NIGRA.



Populus alba
 Steinh.

Populus nigra
 Steinh.


Populus

III. POPVLVS LYBICA.

Populorum
consideratio,
& historia.

Nigra.

Lybica.

Theophras-
tus de Popu-
lo.

Populus tres habet species: alba, nigra, & Lybica sive mon-
tana, quae Graeci Κεραϊε dicitur. Alba arbor est proceras,
crasso caudice, albicante cortice, ac leni. Folia illi sunt vitigi-
nea, auersa parte maximè albicantia Lenuginosaq; Bechy
herbe modo, quod à similitudine chamaeleucen vocauerunt Gra-
ci, unde illi nomen, λευκον. Nigra, procerior, rectiorq; habetur
folio hederaceo, non tamen ut in alba dissecto, sed integro,
paululum per ambitum serrato, longo tenuiq; appenso pedi-
culo, apice in acutum desinente: cortice est cineritio, non te-
nuis: materia alba ac contumaci ad adium & vtensiliam se-
bricas idonea, praesertimq; ad asseres parandos. Lybica in Bo-
hemia, & in vniuersa Germania frequentissima visitur, fo-
lio est ceteris rotundiore, tenuiore, anguloso, leniter in ambi-
tu serrato, punctis quibusdam albis consperso, longo tenuiq;
pediculo appenso, continuo ferè se mouente, etiam si nullus in
aere spiritus sentiatur. Caudice est ceteris breuiore, nigriorq;
cortice vestito, & materia imbecilliore, alba tamen, ac te-
naci, fructum nullum fert nec flores. Alba sterilis. Nigra verd
fructum fert racematim vna speciem representantem, bacca
orobi magnitudine, in quo plurima concluditur lanugo albi-
cans, quae, vbi maturuerint bacca, in pappos euolat. Amat v-
traque nasci in fluminum ripis, in scrobium aggeribus, & v-
liginosis tractibus. Lybica nascitur in montium syluis, & syl-
uestribus locis. Semen legitur anteaquam rumpatur; & sic-
catur in vmbra. Harum omnium meminit Theophrastus lib.
3. ca. 14. de historia plantarum, vbi sic habet. Populus alba,
nigraq; vniuersas habentur: amba natura erecta, sed excel-
sior, lauiorq; nigra: figura foliorum adsimilis, & ligni mate-
ries albedine similis visitur: vtraque ne florem quidem ha-
bere existimant. Κεραϊε (quam quidam Alpinam, quidam 30
Lybicum vertunt) populo alba non absimilis, cum magnitu-
dine, tum verd quod ramis albicantibus spargitur: folio hede-
ra, sed parte altera sine angulo, altera verd oblongo, inq; au-

Plinii plures
lappus circa
Populum.

gulum exeunte acutum: colore parte resupina, pronaq; ferè simili: pediculo prolixo, tenuiq; annexo, quamobrem non e-
recto, sed inflexo. Cortice asperiori, quam populus alba, scabriorq; vt pyrus syluestris: haec Theophrastus. Haec omnibus pas-
sim nota sunt. Lybica Plinio lib. 16. cap. 23. minima folio est, ac nigerrima, fungisq; enascentibus laudatissima. Alba folio
bicolor, supernè candicans, inferiore parte viridi. Sed hic Plinius aperte errore notatur, quod hac contra supernè vireat, in-
fernè vero albicet, candida efflorescente lanugine, quae tamen in nigra non visitur, vt Plinius existimat, cum indifferenter
inquit: Populorum foliis grandissima lanugo. Sed & tertio idem errasse deprehenditur: quippe qui scripserit eodem libro
cap. 26. populum nec fructum, nec semen ferre, cum tamen fructum ferat, vuarum speciem pra se ferentem, intus alba la-
nugine refertum: atque etiam scribat Dioscorides, semen ex aceto potum comitialibus prodesse. Sed quid opus est pluribus
si Plinius seipsum accusat? si quidem libro 24. cap. 8. populum & vvas & semen ferre fatetur, illas vtrique vnguentis, hoc
verd comitialibus praesertens. Sed caueant myropole, ne ob id communis vsus vnguentum populeum vocatum, ex populi v-
uis conficiant, vt Raellius credidit à Plinio deceptus, & quod iis ad vnguenta odorata vteretur antiquitas. Quandoquidem
Nicolaus Myrepsicus non vvas, sed germina, vere primo prodeuntia admiscet: odorata enim sunt, & ceraginosas, cum tamè
nullus prorsus vuis sit odor. Verùm enimvero an antiquitas populi vvas odoratis admiscuerit, dubitandum sanè est: nam
Plinio lib. 7. c. vlt. vbi de vnguentorum materia egit, nil aliud est populi vva, quam bryon, Larinis muscus vocatus. Quem
etiam praeter cedrinum, & quernum praetulere ad vnguenta Diosc. & Gal. & inter alia odorata recensuerunt. Quo fit, vt
facile credi possit, Plinium errore ductum existimasse, muscum in populo nascentem nihil ab eiusdem vuis differre, cum in-
nuis: eodem & bryon pertinet vva populi alba. Optima circa Gnidum, & Cariam, in sitientibus, aut siccis asperisq; locis.
Secunda in Lycia cedro: haec ille. Sed cum cedrus nullas ferat vvas, sed muscum perquam odoratum, hinc Plinij error mani-
feste deprehenditur. Populus vtraque frequentissima nascitur in agro Mantuano, ac Ferrariensi, non modò in Padis am-
plissimi fluminis littoribus, sed & per agros, & prata in fossarum aggeribus. Ideoq; fabulantur poeta, icli Phaëtonis sul-
mine sorores fletu mutatas in populos arbores iuxta Eridanum amnem, quem Padum vocant, ex corticis meatibus instar
auratae lachrymae, electrum, siue succinum fundere, vt adhuc viuentes lachrymas effundebant: quae nostro tempore in orbi-
culos, quibus Deipare virgini saemina salutationes enumerant, effinguntur, & vulgaribus & infimis mulierculis moniliū
vice, collo gestantur decoris gratia. Quare Dioscorides, qui poetarum fabellis adhibere fidem haud quaquam censebat, no-
luit pro comperto fabulosam succini historiam asserere, sed dubiam, & suspensam tenere. Ideoq; inquit: Lachrymam po-
pulorum commemorant, quae in Padum amnem defluit, durari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chryso-
phorum. Ex quo facile percipi potest, quod cum Dioscorides aliquid de succino suis monumentis mandare decreuisset, nul-
lum eius certam tenens historiam, ipsum populi generi vtrique adiunxit: ea tamen ratione id dyudicans, quod non alio in
huiusce operis loco aptius succinum accommodari posset. Quandoquidem in fabulis nactus esset poeta cecinisse carmini-
bus, succinum populos fundere: tamen si non ignoraret, succinum populorum gummi esse nequaquam, si quidem huic salu-
la datus est locus ob succini innumeros globulos, qui olim silo traieci ab Eridani accolis collo suspendebantur. Quippe cum
pleriq; ipsorum, praesertim verd saemina, ob nimis humidum regionis acere, in gula morbos, ac strumas incurrerent, hu existi-
mabant succinum aduersari. Quod fortasse non erat ab omni ratione alienum: namque cum facultatem habeat succinum
sistendi fluxiones, collo etiam gestatum, facile inhibere poterat, ne capitis destillationes in guttur desinerent. Quo fit, vt non
deuideret, si etiamnum Germani in oculorum destillationibus magno successu succineos globulos occipitio adnectant. Reperio
in enarranda Succini historia, auctores complures, sed re vera admodum varios: qui etsi graniter (vt historicos decet) hac de
re loquantur.

Raellii erra-
tū in vngue-
to populeo.Populi vva
quid.Poetarum
fabula circa
succinum.Succini varia
historia.

reliquenter, tamen cum ipsi succini originem nusquam viderint, & quicquid de eo scripserunt, alii acceptum referant, his nulla, aut sane pauca adhibetur fides. Philemon succinum fossile esse dixit, & in Scythia erui duobus in locis, vno candidum, altero vero croceum. Sudines, & Metrodorus succinum prodiderunt in Liguria arboribus effluere, quod Sotacuo creditur in Britannia euenire. Pythias tradidit esse locum in Britannia prope Gutones, vbi à fluctibus maris non procul ab Abalo insula succinum aduehitur: quo incolæ ad ignem pro ligno vtuntur, ipsumq; Teutonibus vendunt. Nicias historiam succinum solum radiorum succum esse voluit: hic enim credit radios vehementius actos in terram pinguem sudorem in ea parte relinquere, deinde estate siccare, & à fluctibus maris in Germanorum littora eici. Idem & Aegypto nasci simili modo dixit. Item in India, gratiusq; sbure esse Indis. Non desuerunt etiamnum, qui succinum nasci tradiderint iuxta mare Atlanticum in lacu Cephiside dicto, qui sole excalsfactus è limo fundat electrum. Non desunt præter hos plures, qui de succino differentes in diuersas iuerint sententias, quas nunc, vt pote non probandas, silentio inuoluam. Vnde iure dici potest, succinum apud eos vel cereum, vel sigulino luto simile haberi, cum ipsum in tot varias formas ac imagines transmūtauerit. Sed vt eandem referam, quod pro comperto habetur: gignitur succinum in insulis Septentrionalis oceanus, id olim à Germanis Glesum appellabatur: vnde à nonnullis, qui erant cum Germanico Casare, ibi clasibus rem gerente, vna insularum ob succini copiam, Glesaria fuit appellata, qua prius Austrauia à barbaris dicebatur. Hic nimirum (vt Plinius inquit) nascitur succinum arboribus pinei generis defluens in terram, vbi postea densatur. Cum verò intumescens astus fertur in proximis fyluas, ex iis in se rapiunt fluctus maris, & in Germanorum littora expuunt. Itaque Cornelius Tacitus rectè scriptum reliquit, Germanos huius maris accolæ solos omnium succinum habere, & legere. Quod succinum sit arboris ex pinorum genere Lachryma, olim Romanis testimonium perhibuit quidam eorum eques, illuc missus ad id comparandum à Iuliano currente gladiatorium munus Neronis principis, qui ea littora peragravit, ipsum vidit, veram eius originem didicit, & secum ingentem copiam Romam inuexit. Præterea succinum esse pineæ arboris gummi indicio est pineus in attritu odor, & quod accensum tædæ & resinatum modo deflagret. Liquorem esse copiosè stillantem, tenacem, ac lentum, argumeto sunt quadam intus implicita, vt formica, culices, ac etiam lacerta, festuca, ac palea, quæ transparentia inspicuntur. Cum enim hæc animalia, & alia stramenta humoris lentore facile implicentur, durefcence deinde materia, veluti carcere includuntur. Hæc partim ex Plinio, partim verò ex aliorum scriptis decerpimus. Atqui ego potius credam vna cum Georgio Agricola, succinum non aliud esse, quàm bituminis genus, quod à quibusdam scopulorum crepidinibus erumpens in mare defluit, vbi aquarum salsedine durefcit. Ita enim affirmant Borussæ medica materia haud ignari, ad quorum tantum littora maris fluctibus ducitur succinum. Nam, quod nigerrimum est, ex quo etiamnum globuli ad angelicas numerandus salutationes conficiuntur, aliquid cognationis cum pissasphalto habere videtur. Succinum incoctum adipe lactentis sui expolitur, & redditur translucidum, quemadmodum tradit Archelaus, qui rubeum corticibus arboris, ex qua defluit, inherens, se vidisse affirmat. Caterum, quantum video, plures de succino veteres narrauerunt fabulas. Atqui, compertum est, quod sicuti magnes ferrum respuit, si adsit adamas, vel si altio affricetur: ita nec succinum ad se paleas allicit, quæ sint oleo persuse. Verum eorum opinio vana est, qui succinum tradiderunt peculiari dote ocinum respicere: nam ipse sepe ac sepius huius rei periculum feci, & semper succinum ad se ocinum trahere comperi. Officina communi nomine succinum vocant Karabe Mauritanos secuta: licet Brasauolus Ferrariensis in suo de simplicium examine deceptus existimauerit, Arabum Karabe succinum esse nequaquam, sed verum populi alba gummi, Serapionis, & Auicenna testimonio: etsi eorum neuter, sicut nec Dioscorides, quem illi sequuntur, id quidem pro comperto assenerauerit. Namque Serapio (vt in eum libris adsolet) quicquid de Karabe notauit, verbotenus ex Dioscoride deprompsit, sic inquitens. Et dicitur, quod gummi Hauromi, quod nascitur iuxta fluiuium, qui dicitur Eridanus, quando distillat in flumine illo, coagulatur ibi, & est illud, quod dicitur Aliston, id est electrum, & sunt qui nominant ipsum Arsepodon, & est Karabe. Eadem sententia elicitur ex Auicenna, quippe qui capite de Haut, itemque capite de Karabe, non asserat eam esse populorum gummi, sed quod ita perhibetur. Nec alia ratione duobus capitibus de Karabe differuit, nisi vt ostenderet, Karabe per se à populorum gummi differre. Præterea comprobatur id esse Karabe apud Mauritanos, quod electrum apud Græcos, nominis significatum: quandoquidem Karabe lingua Persica, Auicenna auctore, non aliud designat, quàm rapiens paleas, quod sensu comprehenditur proprium esse succini, aut electri, non autem populorum gummi. Insuper adstringentes pastillos, quos Galenus lib. 7. de compositione medicamentorum secundum locos, Paulus sui voluminis etiam septimo, & Actuarius in suo de compositione medicamentorum, electri trochiscos vocant, Arabes de Karabe appellant, eisdem à Galeno, & Paulo assumentes: quo fit, vt bacure manifeste aberrasse Brasauolus deprehendatur. Itaque dicendum esse putauerim, electrum idem esse apud Græcos, quod succinum apud Latinos, & Karabe apud Arabes Neque etiam illud ideo populorum gummi esse crediderim, vt Brasauolus asserat, quod Paulus quoque dixerit: Electrum populi alba lachrymam dicunt, quæ iuxta Eridanum amnem defluit, & in spissitudinem coit, aureo colore: nam huius verbi non probat electrum esse alba populi gummi, sed id tantum refert ex aliorum opinione, quemadmodum fecit Dioscorides, quem secutus est Paulus. Ex his igitur satis patere arbitror, falsum esse, quod idem sint electrum, gummi populi, & Karabe: quin potius clarum, succinum, & gummi populneum esse inter se diuersa. Credidit Demonstratus fieri succinū ex lyncis vrina (quemadmodum credere pharmacopola, & vulgus medicorum ex eade fieri lapillos, quos lyncis appellant) succinum asserens, quod stauescit, fieri ex vrina maris, album verò ex vrina femina. Quibus refragatur Plinius: quandoquidē ipse manifestè dicat, hoc esse falsum. Quod cū & Diocles, & Theophrastus credidissent (non autem Dioscorides, vt ei falsò Brasauolus imponit de lapidibus lyncis agens) eos eiusdē criminis Plinius accusat. Quod autem Diocles, & non Dioscorides (vt Brasauolus putat) huius erroris accusetur, ostendit ipse Dioscorides libro secundo capite de vrina, vbi in eandem Plinij sententiam veniens, hæc verba protulit: Lyncis vrinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari, coireve in calculi duritiā, vulgo creditū est, quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophorū, ideo dictum, quod pennas ad se allicit. At cū Brasauolus minus fortasse accuratè Dioscoridis verba legendo percurrisset, dixit de Karabe agens, sensisse Dioscoridē electrū esse lapillū, in quem lyncis vrina concrefcit. Quod tamen falsum esse facile constat ex prædictis Dioscoridis verbis. Caterū cum non desint etiam poëta, qui Phætoniadas non in populos, sed in alnos mutatas fabulentur, Alni quoque historiam, & vires præcedentibus adnectere non ab re fore existimauimus. Est itaque ALNVS (vt Theophrastus est auctor libro 3. capite 14. de plantarum historia) sterilis & vnigena natura, caudice recto: ligno, medullaque nulli ex Theophrasto vt graciliores virga tota concauentur: folio pyri, sed ampliore, neruosioreq; cortice scabro, rufoq; intus, qua de causa coria tingit: radice summa, nec maiore quam laurus: nascitur in aquosis, alio nullo pacto: hætenus Theophrastus. Qui tamen eodem lib. cap. 15. non vtique pyri folio alnum virescere tradidit, sed pontica nucis. Nec eandem prodidit esse sterilem lib. eodem ca. 6. cum inquit. Terebinthus circa tritici messem, aut paulo serius semen reddit: fraxinus atq; acer assate:

Succinum lachryma arboris Pinorū.

Formicæ, culices in succino.

Succinum bituminis genus Agricole.

Succinum rubeum.

Brasauoli opinio reprobata, qui Karabe negat esse Succinū.

Auicenna de Karabe.

Karabe, i. rapiens paleas.

Demonstrato ex lyncis vrina succinum fit.

Brasauoli lapsus.

Succinū pterygophoron.

Alni historia ex Theophr.

alnus,

IV. ALNVS.

VI. BETVLA.



Alni desct.

alnus, nux iuglans, pyrorumq; syluestrium genus quoddam autumno. Quo sit, vt alterum omnino suspicandum videatur, aut sibi ipsi Theophrastum repugnare, aut eius codicem his locis mendis scaterere. Alnus in Italia nascens, folio est coryli crassiore neruosioreq;, cortice scabro, materie molli, rubente, in aquis ferè semper proueniens, secus flumina, & vliginosa tracta. Hetrusci vulgò appellant Onio: alij verò in Italia Auno. Italica fructum fert viridem, oblongum, moris forma similem, squamis quam plurimis in se compactis. Maturefcit autumno, minuto intus semine, colore in nigrum fuluo. Exsiccat manifestè, sed in frigiditate & caliditate parum à medijs abest. Praefertur lignum & pali ex alno parati ad edificiorum fundamenta, quae in fluminibus, lacubus, paludibusq; sunt, quod in aqua nunquam putrescat. Ob id enim expetitur maximè

Alni vites.

Venetis ad iacienda palatiorum, adiumq; fundamenta, quod crebrò fixa non modo ad aeternitatem permaneat immortalis, sed quod ingentes admodum ferat moles. Folia resoluunt, restringunt, de lassatoq; recreant. Recentia folia tumores imposita dissoluunt, & inflammationes restringunt: eadem nudis pedum plantis supposita viatoribus itinere defatigatis lenamentum praestant. Quin & rore matutino madentia cubiculis ad necandos pulices per aestatem vtiliter sparguntur. Praestat cortex, quod magis adstringat, galla vice tingendis coriis atro colore. Sunt etiam, qui iis & fructu viridi vtantur, gallarum vice ad scriptorium atramentum conficiendum, additis gummi, & chalcantio. Sed nec BETVLA omissenda videtur: quae cum cortice albo sit alba populo adsimilis, nunc nobis sese offert describenda. Hac Theophr. folio est carya sic Graeci vocata (quid autem sit carya compertū hactenus non habeo) praeterquam quod paulò angustiori, cortice autè versicolore, & materie leui non nisi ad baculos vtili. Plin. lib. 16. c. 18. Betula arbor est Gallica, mirabili candore atq; tenuitate: terribilis magistrarum virgis: eadem circulis flexilis: item corbiū sportis. Bitumen ex ea Gallia excoquant: hactenus Plinius. Betula in Tridentino agro frequentissima prouenit, materie adeo tenaci lentaq;, vt ad vasa vinaria cingenda circuli ex ea parati omnium praestantissimi habeantur. Anaxij è suis Betulis non modo optimos conficiunt carbones, ad coquenda liquandaque metalla, sed è delibrato contortoq; cortice, faces ad nocturna lumina parat, quae quoddam bituminosa pinguitudine reddunt, rede modo conflagrant, & resinofum quoddam picis colore reddunt. Nec fortasse alia de causa Betula dicitur, nisi quoddam bitumine scateat. Hanc Tridentini corrupta voce vulgò appellant Bedollo. Gaudet frigido tractu ac niuoso. & ideo in Bohemia frequentissima: folio est nigra populi haud absimili, sed parte prona asperiori, viridioriq;, per ambitum serrato. Sterilis hac nec fructum ferens, quanquam iulos, vt Corylus edit, cortex illi albus membranosusq;, bituminosus & pinguis. Materies caedida flexilis ac tenax. Huius caudex terebro perforatus ingentè aqua clarissima copia reddit, potu non ingrato, cui vim maximam inesse quidam asserunt ad comminuendos tarenum, quae vesica calculos si diutius bibatur. Eadem maculas in cute delet, nitoremq; conciliat: oris vlcera sanat collutione ex ea facta. Foliorum succus coagulo admixtus, caseos à carie, & vermibus vindicat. Folia excalfaciunt & siccant, resoluunt, attenuant, absterunt, aperiunt, & amara sunt. Cortex verò quod bituminosus sit, excalfacit & emollit. Sed iam ad Populos, & ad Succinū nostra reuertatur oratio, in quibus medicina nobis

Betulae confideratio, & historia ex Theophrasto & Plinio.

Betulae descriptio.

Aque Betulae vites.

Populorum vites.

Populorum vites ex Gal.

reddenda ratio est, vt in omnibus ferè facere consueuimus. Nigra populi prima erupentia germina odorata sunt & glutinosa: expetuntur ad capillorum nitorem conciliandū à mulieribus. Cotundunt enim ea cū recenti butyro, & deinde aliquot diebus insolata, à butyro percolant, quo postea capillos inungunt, abluto prius capite. Libyca autè populi folia, ad ea omnia praestant ad quae nigra populi valere diximus, sed longè inefficaciora creduntur. Primum igitur de virilis Populi nigra disseruit Galenus lib. 6. simpl. med. vbi sic inquit. Populi nigra flores calidi facultate quidem sunt in primo recessu à temperatis: sed in differentia, quae habetur in siccando & humectando, paulū à temperatis & medijs ad siccius deflexerunt: verum & subtiliorū potius quam crassiorū sunt partium. Et folia quidem ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quoddam omnia imbecilliora, minusq; efficacia. Sed & resina eius floribus similem facultatem obtinet, atq; etiam calidiorè. Porro semen tum resina, tum floribus & subtiliorum est partium, & exiccantius: non tamen est admodū calidū. Deinde li. 7. corundem sim-

10 *de similitudinibus, idē Galenus Populi albi vires describit his verbis: Populus alba arbor mista quodāmodo temperata est, ex aqua tepida, & terrena extenuata essentia, quam obrē & abstergetis facultatis est particeps: hactenus Galenus de vtriusq; Populi facultatibus. Atqui præterea quæ à Galeno de Populi facultatibus scripta sunt, sciunt hoc velim rei medicæ studiosi, populū albā humotenus sectā ad radicē vsq; & aqua calida, in qua fermentū fuerit dissolutū per fusam, infra quatrīduum fungos copiosos edere, esui quoq; gratissimos. Caterū non inuenio Galen. Succini meminisse in simpl. med. censu, qui tamē li. 7. c. 4. de comp. medic. secundū locos pastillū ex succino confectū ab Asclepiade transcripsit: quem quidē in hamoptoicis, longo tempore tussientibus, & recentē pthysicis, purulenta è pectore difficulter eijcientibus, suppuratis, cœliacis, dysentericis, & inflatis conferre tradidit. Atqui referunt Prutheni in quorum littora fluctus maris succini plurimum expuunt, eius genus quoddam reperiri quod planē crystallum representat, quod album succinum vocatur. Huic vim mirabilem inesse te-
 20 statur, quō scilicet femina deprehendatur an virgo sit & incorrupta necne. Nam si ex vino ieiuna exhibeatur, efficere aiunt, vt corrupta & vitia protinus vrinam reddere cogatur: id quod virgini euenire negant. Datur succinum magno auxilio tritum duorum cochleariorum mensura, colī dolore affectis, diebus tribus continuis ante cibum ex tepenti aqua potandum. Idem, & præcipue album, ex aqua frigida potum, sitim illico sedat, & sudorem valentissimē prouocat. Suffitur prænis impositum vtilissimē ad anginas, fumo per infundibulum hausto, est enim præstātissimum auxilium. Arbor λεύκη Græcis dicta, Latinis Populus alba vocatur: Arabibus, Haur: Italis, Popolo bianco: Germanis, Belleri: Poppelbaum: & Sarbaum: Hispanis, Alamo blanco: Gallis, Peuplier. Quæ verò ἄγριος Græco nomine, Latino, Populus nigra vocatur: Maritano, Haur romi: Italicō, Popolo nero: Germanico, Aspen aut Poppelweiden: Hispanico, Alamo nigro: Gallico Tremble, & Peuplier. Bohemicè, Topel. Populus Lybica siue alpina, Græcis, κερκίς: Italis Popolo montano. Quod Græcè ἄλνυς, ἄλνυς, ἄλνυς, Latine Electrum seu Succinum dicitur: Arabicè Karabe siue Kakabre: Italicè, Succino, & Ambra gialla: Germanicè, Agstein/aut Boernstein: Hispanicè, Esclarimente, aut Ambar: Gallicè, Ambre. Alnus verò Græcis dicitur ἄλνυς, ἄλνυς: Italis, Alno, Onio, Onizo & Auño: Gallis, Aulne: Germanis, Erlenbaum: Bohemis, vuolse: Polonijs, Olsa. Betula autem Græcis Σπυρίδα dicitur: Italis, Betula: Tridentinis, Bedollo: Germanis, Bircken: Bohemis, Brika: Gallis, Beuleare.*

Fungi ad populu albam. Succinum apud Galenū.

Succinum album.

Nomina.

Populus alba & nigra Dioscoridi, ob corticis & foliorum colorem sic distincta: quibus Theophrastus & Plinius tertiā addunt, & recentiores Americā. I. λεύκη ab albedine foliorū quæ est auersa parte: ἀχρῆσις a Homero Iliade 5. quod Hercules deuicto Cerbero, populū arborē ex Acherōte secū detulit, frondibus populneis coronatus: ad cuius exēplū certatores victores postmodū coronabantur. Farfarus Plauto, Populus alba Plinio & recentioribus scriptoribus, excepto Trago, cui Populus alba secunda dicitur. Quædā sterilis est, vt non floreat: quædā iulos salignis similes fert, quos vvas lanosas aliqui appellant. Est autē duplex, alia maioribus, alia minoribus foliis, quare rectē in Lobeliū Iconibus duæ proponuntur figura. II. Populus nigra, ἄγριος veteribus Græcis, Plinio Populus nigra, quem sequuntur Herbarii, excepto Trago, qui populū vulgare & albam primā nominat. Huius folia antecedunt gemina, quæ oculi vulgo dicuntur, alijs Gemmæ populi, Dioscorides videtur pilulas vocasse: ex quibus vnguentum populneū (non ex albæ germinibus, vt aliqui volunt) officinæ ex Nicolao Myrepsio conficiunt, quæ colliguntur, quando iulos producit. Quædā ante exortum foliorum floret, at fructum non fert, flos instar amenti, colore rubente aut candicante: quædā fructum fert, seu iulos, racematim compactos, multis rotundis & vitidibus granis constantes (vua populi aliquibus) in quibus lanugo candida, in pappos auolans, cui pauca semina valdē minuta adpensa sunt: Plinius Bryon seu Muscum esse vult. Fundit etiam resinā hæc populus: ferunt & populi folia guttam, ex qua apes Propolim faciunt. III. Populus Lybica, quæ κερκίς Theophrasto, Gaza alpinam, alii Lybicam vertunt, sic Plinio Lybica, quod nomen reseruarunt ex recentioribus

40 V. ALNVS HIRSVTA.



Dod. Cast. Lob. Thal. Lugd. & Taber. Populus nigra, Trago & Loni. Populi tertia species, Cord. in Diosc. Populo nigrae similis in alpibus, Cæs. Tremula latinis, quod semper ferè folia tremant. Huius iuli cæteris longiores, coloris ex cinereo fusci. Est & Populus America, de qua Aduersaria & Lobelus, nomine populi noui orbis & populi Americae Lugd. & Taber. de hac in nostra historia.

IV. Alnus, quod amne alatur, κλήδρα Theophrasto: Alnus. medianus Crescentio: Herbariis Alnus: iulos longos, Betulis similes, fusci coloris pro flore emittit, qui non decidunt vt in Fago, sed coguntur in formā oliuarum, hic fructus Alni est durus, viridis ex plurimis squamis compactus, in quibus semē colore in nigrum fusco, licet Plinius neq; fructum neq; semen Alnum ferre, & Theophrastus sterile dixerit, fortè Aristotelis moti sententia, qui inter naturæ miracula retulit, quod Alni in sola Creta non sint steriles: ast notare conuenit, Theophrastum aliquando steriles vocare eas quæ fructum non conspicuum, aut inutilem ferunt. Genera duo apud nos habentur, glabra & hirsuta. Glabra alia & glutinosa, quæ foliorum forma variat, altera folio rotundo, altera folio oblongo, prior ea est, quæ ab Herbariis descripta, quam Alnum rotundi foliam glutinosam appellamus, ex cuius ligno pali in aqua, ædificiorum fundamentis subacti lapidescunt. Altera Alnus est folio oblongo, quam locis aquosis inter Mutetam & Münchensteinum Basiliensis ditionis obseruauimus. Quæ verò hirsuta est, arbor est minor vulgari alno foliis longioribus, acuminatioribus & maioribus per ambitum incisuris, subnigris: quæ supernè glutinosa non sunt, sed mollia ob exiguam, vixque conspicuam lanuginem, quæ

Alnus.

M auersa

Alnus incana, L. hirsuta.

Betula.

auerfa parte copiofior, cuius nomine fubcinerens eorum color, qua etiam pediculi veltantur, in loca altinet vulgari breuiores, qui conglobati fructum non ita rotundum, fed oblongum conftituunt. Reperitur apud nos infra pagum Hünningen ad Rhenum. VI. Betula *αμύδα* Theophrasto, Betulla Plinio, Betula Trago (qui papyri fpeciem veterum cenfet) Dod. Lon. Lob. Caft. Lugd. Thal. Tab. populo alba fimilis in Alpibus, Cæfal. Hac fuis iulis vere floret, in quibus fermen continetur: duplici cortice eft, quorum interior tenuis, candidus chartæ inftar, cui veteres, ante repertum vsum chartæ, opera fua infcribebant.

Μάκρη

MACER.

CAP. XCIII.

MAcer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens. Qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones hibitur.

Maceris & Macis discrimen.

Nunquid officinarum Macis, quo myristica nuce prætexitur inftar conteguntur, Dioscoridis sit Macer, non modo dubitandum est, sed etiam credendum (vt ego arbitror) magnam inter vtrunq; esse differentiam. Cum enim Dioscorides dicit, Macer qui ex Barbaria aduehitur, est cortex crassus, flauescens, & gustu perquam adstringens: manifeste declarat, Macerem non esse officinarum macim, quod hoc tenue sit, gustu fœuens, acce, perquam odoratum, amariusculumq;. Adde quod dixerit Plinius lib. 12. cap. 8. Macis ex India aduehitur, cortex rubens, radice magna, nomine arboris sua: qualis sit ea, incompertum habeo. Hanc etiamnum differentiam non ignorauit Serapio: nam postquam tradidisset ex auctoritate Isach, macim esse nucis odorata operimentum, dixit se. is esse, de quo loquebatur Dioscorides: quippe quod scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem, siue corium. Quod cum compertam haberet Auicenna, de vtroque seorsum tractauit, & Macim odorata nucis inuolucrum ad caput 456. relegauit: Macerem vero radice corticem capite 694. sub titulo Thalifar descripsit. Præterea maximo est argumento, quod Macis & Macer vtrique inter se differant, quod Dioscorides, Galenus, & Paulus de odoratis nucibus, quorum Macis est tegumentum, nihil scriptis memoria reliquerint. Quippe si Macer, qui eis conuehebatur, Macis nobis vulgare extitisset, credendum sanè est, quod cum illo quoque aduecta essent myristica nuce: quarum illi historiam, & facultatem, cum sint & in viribus, & in odore admirabiles, nequaquam describere prætermisissent. De macere Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, hac scriptis tradidit. Macer cortex est, qui ex India conuehitur, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sanè redolens, vt pleraq; aromata siue odorata, qua ex India conuehuntur. Videtur itaque & ipse ex mista constare essentia, pleraq; terrena frigida, paucula vero calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter desiccatur, adstringitq;: proinde cæliacis, & dysentericis miscetur facultatibus: in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigorisq; differentia neutrum insigniter efficiens: hac Galenus. Ex quibus haud obscure colligi potest, quod Macer longè differat à Maci: namq; ipse gustu non reperio hoc esse adæquatum, nec tam leuiscula acrimonia, quin potius si degustetur, linguam, & fauces admodum vellicat: odorem iucundum perfundit, & leuisculum amarorem quadam cum siccitate relinquit. Quod facile ostendit, quod Macis tantum calidi, quantum sicci cõceperit, vel fortasse plus calidi, & quod pleraq; ipsius essentia sit tenuium partium. Idcirco errare non crediderim, qui dixerint Macim odoratum excalfacere, & pariter siccare in fine secundi, vel in principio tertij. Quamobrem id Macer esse non potest, cum dicat Galenus constare macerem essentia pleraq; frigida terrestri, paucula vero calida. Quibus facile concludi potest, quod Macer à Dioscoride & Galeno descriptus, hoc æuo ad nos non aduehatur: siquidem nullus in officinis reperitur cortex, qui possit maceris historiam explere. Et quamuis Monachi illi, qui in Mesuem commentarios scripsere, nullam inter macim, & macerem ponendam esse differentiam pro certo affirmant, nulla tamen auctoritate (quod equidem sciam) aut ratione nituntur. Ceterum haud ignorandum est nec Galeno, nec Plinio, quod dixerint ex India aduehi macerem, Dioscoridem repugnare, cum ex Barbaria ipse afferri dixerit: quoniam (vt Ptolomeus est auctor) quadam in Indo fluuio insula, vel vrbs sita est, qua Barbaria dicitur, ex qua facile comportabatur macer: vel quod afferatur ex Arabia eo maris sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur. Quandoquidem (vt inquit Strabo) omnia, que in India proueniunt, ea scilicet parte, qua ad austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Μακρη vt Græcis, ita Latinis Macer, atque etiam Machir appellatur: Arabibus, Thalifar: Italis, Masero. Quod Arabibus Bisbese, recentioribus Græcis Μακρη quemadmodum & Latinis, & Italis Macis nominatur: Germanis, Muscharen blumen: Hispanis, Macias, & Macas.

Maceris facultates ex Gal.

Monachorū opinio falsa.

Nomina.

Macer & Macis differunt.

Macer Græcorum veterum, vt & Plinii non est id, quod Macis officinæ vocant, sed cortex radice arboris Maceris, vt monet Plinius: à Costa, arborem Vlimo maiorem in prouincia Malabar prouenientem, cuius arboris cortex in vsu sit, descripsit & iconem adiecit: ex quo Lugdunensis historia in appedice, qua loca lector consulat, cum alibi hac de re acturi simus. Macis vero, quod recentioribus Græcis μάκρη, nucis moscata medium operimentum est, Græcis veteribus incognitum: Auicennæ vt & Serapioni notum vtrumque, illud nomine Thalifar: hoc pro nucis moscata inuolucro.

Πτελέα.

VLMVS.

CAP. XCV.

αμύδα
b μάλλον
δ φλοιός. μεν
habet ex ep.
& ita Cata
cra. Sed re
ams vertisse
viderur Ruel
liu.

Vlmi & folia, & cortex, & a rami vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur: vulnera glutinat, sed multo b magis corticis tilia, si fasciæ loco in torqueatur: nam in lori morem flecti potest. Crassior cortex in vino, aut aqua frigida vneiatim potus, pituitas trahit: fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis, aut radice foueantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, curi illitus nitorem inducit, faciemque splendidiorē præstat: qui dum siccat, in animalia abit, quæ culicem formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia vsurpantur.

Tamet si Vlimus notissima omnibus ferè sit arbor, non tamen ob hoc eius historiam silentio inuoluendam putamus. Vlimi itaq; duo sunt genera. Altera montana, altera campestris. Fruticosior hac, illa vero auctior. Foliū habet indiuiduum, leuiter circumferratum oblongumq;, crispum, scabrumq;. Folliculos profert multos, non paruos, subrotundos, ac crispes

I. VLMVS.

II. CARPINVS



III. CARPINI ET VLMI flores.

ac crispas humani scroti effigie, in quibus liquor concluditur lentus ac clarus, vna cum culicibus copulibus, vt in Terebinthi & letifici corniculis. Ligni materies nervosa, tenax, robustaq; deformis tamen: Motana iulos [siliquas] profert, & deinde semē, quod samaram vocant. Cortex illi superius asper, crustosusq; & inaequalis: sed interior, qui lignum ambit, contrario modo se habet, siquidem lentus, & lori moda flexilis habetur. Ideoq; Vlmus (dicebat Theophrastus lib. 3. cap. 14. de plantarum historia) duobus distinguitur generibus: cuius altera montana, quam Graeci *ἰπὲρ* vocant: altera campestris, vlmus proprie vocata: fruticosior hac, illa vero auctior: folium indiuiduum, leuiter circumferratum, oblongius quam pyro, scabrum, non laue. Praestat hac arbor & amplitudine, & celsitudine, non crebra circa Idam, sed rara, irriguis amica: materies flaua, robusta, nervosa, deformis, vt qua tota cor sit. Vtuntur ea ad fores lauriores: viridis facile caditur, sicca difficile: sterilis denique putatur: sed gummi in petiolis gignit, & animalia quaedam culicea, cachryes peculiare gerit autumnō multas, minutas, nigras: ceteris vero temporibus quid ferat, minus animaduersum est: haecenus Theophr. Plinius vero quatuor vlni genera statuit li. 16. c. 17. his verbis. Inter has, atq; frugiferas, materie vitiumq; amicitia accipitur vlmus. Graeci duo eius genera nouere, motosam, qua sit amplior: campestre, qua fruticosa: Italia attineas vocat, excelsissimas: & ex iis sicannas illi praefert, qua non sunt rigua: alterum genus Gallicas: tertium nostrates, densiore folio, & ab eodem pediculo numerosiore: quartum syluestre. Attinea non ferunt samaram, ita vocatur vlni semen, omnesq; e radicibus plantis proueniunt, reliqua vero semine: hac Plinius, qui tamen vna cum Theoph. errasse deprehenditur, quod hic vlmum cuiusvis generis sterilem esse scripserit, ille autem quod attineam sic Italis appellatam, semen nullum

Theophrast. de Vlmo.

Plinio Vlni quatuor genera.

Theophr. & Plinii error.

Columella: duo genera.

Carpini consideratio, & historia.



ferre prodiderit. Quandoquidem Theophr. prater id, quod experientia nobis compertum est, repugnat Plinij autoritas: quippe qui vlnos omnes prater attineam, semine prouenire scribit. Plinio deinde, qui attineam semen ferre negat, refragatur Columella lib. 5. cap. 6. cum inquit: Vlnorum duo esse genera conuenit, Gallicum, & vernaculum: illud attinia, hoc nostras dicitur. Attiniam vlnum Tremellius Scrofa nō ferre samaram (quod est semen eius arboris) falsō est opinatus. Nā rariorem sine dubio creat, & idcirco plerisq; & sterilis videtur, seminibus inter frondem, quā prima germinatione edit, latentibus itaq; nemo iā serit ex samara, sed ex sobolibus. Est autem vlmus longē latior, & procerior, quam nostras, frondemq; incundiorē bubus prabet. Vlni solius ferē adfirmiliū plāta est, quā Itali passim CARPINVM vocāt, omnib; notissima crescit

hæc passim omnibus ferè in syluis inter quercus, & cæteras syluestres arbores foliis (vt diximus) Vlmo proximis, sed tenuis-
ribus. Caudice assurgit procero, cortice subalbicate, modicè scabro. Ramos fundit copiosos, robustos, in latitudinem sese dif-
fundentes, foliosos vmbra tilesq;. Ex his per æstatem petioli quidam pendent, in quibus triquetra quedam folia, subpallida,
& crassa, folliculari specie, circumquaque racematim dependent, quorum medius apex cæteros longitudine superat: & in-
ter hos parua quædam capitula exeant, ciceris magnitudine, aut paulo maiora, in quibus semen concluditur: radicibus ni-
ditur firmis, crassisq; ligni materies alba, solida, tenaxq;, è qua iuga boum villici in Italia parant. Qualitates atque vires,
Carpinus Plin. nemo est (quod scierim viderimq;) qui describat. Cæterum an hæc Carpinus sit legitima, de qua Theophrastus, & Plinius
nu & Theop. scripsere, nõ parum mihi dubitandum relinquitur. Siquidem vtriq; ζυγία, quam Plinius Carpinum interpretatur, Aceris
genus est, à qua (ni fallor) nostra Carpinus omnibus ferè dissidet notis: si tamen arbor, quam passim Acerem appellant, le-
gitima fuerit Acer, de qua ydem scripserunt authores, cum enim illorum neuter Acerem (quod viderim legerimq;) descri-
pserit, quemadmodum nec Carpini, non habeo sanè quid de eorum Acere affirmare queam. Præterea Theophrasto Carpinus
materies est flaua, crassaq;, cortex verò paulò scabrior, quam Tilia, crassus, & spissior quam Picea, & flexui contumacior.
Atqui nostra carpinus alba constat materie, minimè crassa, cortice Tilia haud scabriore, Picea tenuiore, & qui detractus
facile inflectatur. Corticis tamen colore non differunt, cum in vtraq; cinereus habeatur, aut subalbicās. Ad hæc Theophra-
sto Carpinus tara inuentus est, & riguis tractibus gaudet. Nostra verò contra syluis ferè omnibus, mōtibusq; communis, &
numerosa habetur, & raro humectis reperitur locis: verum in hoc tantum conuenire videntur, quod è nostrate quoque in-
ga parentur. Atque ita tot aliis repugnantibus notis, affirmauerim ego nunquam, nostratem, & Theophrasti Carpinum,
eandem esse arborem, nisi compareat aliquis, qui hæc mihi dubia dissoluat: dixi sententiam meam, esto quoq; aliorum in-
diciam, sed hæctenus de Carpino. Vlmi autē facultates hæc sunt. Folia, & cortex, & rami vim habent spissandi, & vulnera
Vlmi facultates ex Plin. contrahendi. Corticis vtiq; interior tilia, lepras sedat, & folia ex aceto illita. Corticis denarij pondus potum in bemi-
aqua frigida aluum purgat, pituitasq; & aquas priuatim trahit. Imponitur & collectionibus lachryma: & vulneribus,
ambustisq; decocto fouere prodest. Humor in folliculis arboris huius nascens cuti nitorem inducit, faciemq; gratiorem præ-
stat. Cauliculi foliorum primi vino decocti tumores sanant, extrahuntq; per fistulas: idem præstante tilia cortice. Multi
corticem commanducatum vulneribus vtilissimum putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoq; è me-
Humor in folliculis ad entetocelas. dulla castrata arboris effluens capillum reddit capiti illitus, desluentisq; continet. Hæc Plinij verba de Vlmi facultatibus lib.
24. ca. 3. Cæterum humor in folliculo Vlmi contentus (vt ego experientia compertum habeo) medetur puerorum enteroce-
lis, si splenia siue linteola in eo madefacta saepe inguini partis rupta superimponantur, atque inibi sub femorali, quod Ita-
lis vulgo brachiere appellatur, subligentur, & constringantur. Idem liquor vitreo vase exceptus sepelitur in terra, aut fimo
equino calido, viginti quinque diebus, ore diligenter obturato, & collocato vasis fundo super salis communis strato: fit e-
nim hoc tempore vt fax subsidat, & liquor clarissimus supernatet. Is ad vulnera recentia conglutinanda adeo efficax est,
vt dictu mirum sit, quam belle celeriterq; id præstat, si cum spleniis, aut confractis linteolis applicetur. Quin & corticis ra-
dicum decoctum articulorum duritias emollit, & neruorum conuulsiones resoluit, si in fotus, vel balnei modum adhibea-
tur: item tumores discutit, quos iugi attritus in collo boum excitauit. Interiores Vlmi radices si diu decoquantur, & iuri
supernatans pinguedo colligatur, illinaturque ea saepe locus glaber, à quo pili defluerunt, breui repullulabunt. Eiusdem
cortex contusus, & muria vsque adeo subactus, vt malazmati similis sit, illitus, podagricos dolores mulcet. Folia Vlmi qua
ad orientem spectant, impari numero decerpta, & cum piperis granis totidem contrita, & ex vino Cretico pota à ieiuniis
Vlmi vires ex Galeno. purulentas tusses mirificè iuuant, vt Marcellus est author. Vlmi meminit Galenus lib. 8. simpl. med. sic inquit. Vlmi folium
quandoque recens vulnus glutinauimus, confidentes adstringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cer-
tè amplius etiam subamarus est, & adstrictorius: itaque cum aceto & lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si
vulneribus vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent: nam & decocto earum quidam
Nomina. perfundunt fracturas, qua tophe, siue callo inducto opus habent. Huius arboris nomē Græcum est πλεδία: Latinum, Vlmi:
Arabicum, Didar, Dirdar, seu Luzach: Italicum, Olmo: Germanicum, Blmen, Xustols, Lindbast, Vffenholz: Hispani-
cam, Vlmo: Gallicum, Orme: Bohemicum, Gilm. At Carpinus Græcis ζυγία vocatur: Italis, Carpino.

Vlmius nostra vulgaris, Vlmius est Dioscoridis, Vlmi alterum genus Theophrasto, Vlmius vernacula Co-
lumella: Herbarii Vlmius vocant. Quod si Vlmius, Aprili aut Maio Mense pluuiis, subito que calore solis
insequente infestetur, ipsius folia corrugantur protinus, & vesicæ seu folliculi, scroti hominis figura ge-
Gumi Vlmi. nerantur, quibus includitur humor, initio lentus, mox solis vi in gummi concretescens, quod Gummi Vlmi
recentioribus ex Theophrasto, quod dum siccatur, vermiculi qui cnipes, culices & muliones appellatur,
euolant. Galenus 2. de cōp. med. secundum genera 7. in Emplastro Melino quod Rustico adscribitur, re-
cipit πλεδίας ἢ ἐν θυλακίαις drachmas xvi: vbi interpretes vertit, vlmi in sacculis ex corio recoditi denarium
pondo: verum intelligendum Humoris Vlmi qui in folliculis continetur, vt ἢ ἰχθῦν, aut quid simile intel-
ligatur: nam apud Paulum habetur ἐν ἢ θυλακίαις ἰχθῶν. Ita vt τὸ θυλάκιον apud Galenum & Paulum, idem sit
quod κερυκός Theophrasto, & φίσσα Dioscoridi, id est, folliculus, vtriculus, vesicula. De altero Vlmi gene-
re & similibus, Deo adiuuante, in vniuersali nostra historia, quam adornamus, verba facturi. II. Fagus
Sepium C. B. quam Fraxino similem dixit Plinius: alii ad Vlmius, ad Fagum alii referunt: sunt qui Carpi-
num Plinii velint, quæ Aceris est species, alii Ostry seu Ostriam Theophrasti, quam aliquantum repre-
sentat: Dicitur Ornus Trago, Lon. Vlmi tertia species, Dod. gal. Vlmius atinia, Lugd. Fagus sepium, Vlmi
magis cognata, Ges. hor. Carpinus Dod. Lob. obs. Tab. Cam. Carpinus alba, Cast. Betulus, Lob. icon. Fago
similis altera, Cæs. Ostrya Cordi, Thálio. III. Figura addita Carpini & Vlmi flores & semina exprimit. 60

Σπορόντις ἔυλων.

LIGNORVM MARCOR.

CAP. XCVI.

EX caudicibus, lignisque veteribus caries congeritur, quæ farinz modo illita vlcera purgat, & ad cic-
atricem perducit: serpentina cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisque imposita illinatur.

Cariæ ligno- Non sanè prorsus negligenda est lignorum veterum, & contabefactorum caries, cum tanta facultate polleat, vt vlcera
rum confid. expurget, solidetq; & eadem serpentina sistat: quod ed præstat efficacius, si ex lignis arborum colligatur, qua cum ad-
stringendi, tum etiam abstergendi vim possident. Quo fit, vt ligni Guaiaci caries cæteris hæc in re facillè præstat: quippe
que

que non modo ulcera, qua contumacia non sunt, sanat, sed & qua cacoethe dicuntur, quæq; Gallica peste contracta sunt: quare pudendorum exedentibus ulceribus inspersa mirifice medetur. Caterum non modo lignorum marcor siue caries in medicum usum venit, sed & VERMES in cariosis lignorum caudicibus nascentes, si Plinio credimus, qui libro 30. cap. 13. de his sic scriptum reliquit. Cosses qui in ligno nascuntur, sanant ulcera omnia: nomas verò combusti, cum pari pondere a-nisi, & ex oleo illiti. Delicatiores fuisse hos olim & in cibus, idem posteritatis memoria tradidit lib. 17. cap. 24. cum inquit. Vermiculantur magis minusve quadam, omnes tamen ferè, idq; aues caui corticis sono experiuntur. Iam quidem & in hoc luxuria esse cepit, prae grandescq; roborum delicatiores sunt in cibo, cossos vocant: atque etiam farina saginati, hi quoque al-tiles sunt. Quapropter mirum non fuerit, si etiam antiquitas cicadas, qua nondum alas deprompserint, in cibus deuora-nerit, Aristotelis testimonio, qui etiam addidit gustantibus esse suauissimas. Sed cur illud admirandum fuerit, si nostris et-
 10 iam temporibus vermes, qui cariosis caseis innascuntur, magna admodum cum voluptate à compluribus deuorentur? Ga-
 lenus cum & ipse ad arborem, ex qua caries decidit, particularem scopum habuisset, lib. 8. simp. med. sic de illa scripsit. Ca-
 ries lignorum, & maximè, qua particeps est adstrictionis simul & absterfionis, velut vlmus, expurgat, impletq; ulcera hu-
 mida. Σαρπίτης ἔξυλον ita Græcè dicitur, quod Latine Lignorum marcor, siue caries: Arabicè, Nucharer veasab: Italicè,
 Talaruta de ligno: Germanicè, Wurmeel: Hispanicè, Carcoma.

Vermium li-
 gnorum vsus
 in cibus.

Cicadæ in ci-
 bo.

Caries viret
 ex Galeno.

Vermes vetustos arborum truncos, & intempestiuè caesa, atque ædificiis nimia vetustate corrupta li-
 gna arrodunt, ita vt è foraminibus puluis farinæ similis, qui caries seu marcor lignorum dicitur, excidat.
 Quæ sanè secundum lignorum diuersorum naturam variat. Quandoquidem verò caries lignorum ma-
 ximè adstringendi & extergendi vi præditorum, vt est vlmus, humentia ulcera exsiccat & replet, idè vl-
 20 mi historiz, arborum cariem subiungit.

Κάλυμος


ARVND.

CAP. XCVII

IN Arundinum genere quædam nastos, id est farctior vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia fo-
 mina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia, quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, cre-
 bris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens:
 quæ à quibusdam cypria, ab aliis donax appellatur. Alia phragmites, seu vallatoria, a gracilis, candicans, a Car. ἄβλα-
 30 vulgè cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosque corpore extrahit: luxa-
 ta, lumborumque dolores cum aceto mulcet. Virentia folia tusa, & imposita ignibus sacris medentur, & tulum tenuis
 ceteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur. Paniculæ lanugo, si
 aures intrauerit, exurdat. Eundem effectum implet arundo, quæ cypria dicitur.

I. ARVUNDO DOMESTICA.

II. ARVUNDO PALVSTRIS.



Arundinum quinque genera tantum, veluti notiora hoc in loco à Dioscoride produntur: licet Plinius lib. 16. ca. 36. & Arundinum
 lib. 24. cap. 11. viginti nouem arundinum species descripserit: inter quas (vt superius diximus) odoratam recēssit, qua
 Græcis κάλυμος ἀρωματιστὸς appellatur, in India, Syriaq; nascens, odoris iucunditate vnguentis accommodata. Quod a-
 30 petè indicat calamum odoratum esse inter arundinum genera reponendum, non autem inter radices, vt vulgus medico-
 rum, & Brasauolus Ferrariensis contendunt, acori radices pro legitima odorata arundine assumentes. Quæ in Italia sic-
 quentissima

Arund. fatiua
descrip.

quētissima in vinearum Arundinetis, vliginose praesertim solo, è radice geniculis seritur ad vitium palos, ad deũ cubitum altitudinẽ adolefcit, militaris hasta crassitudine, robusta, ac firma materie, inanis tamen intus, cõpactis per intervalla geniculis. Cortice vestitur squamoso, & qui facile auferatur, aspero ac subalbicante. Folia illi sunt longa, mili Indici exula, sed latiora, ac longiora, aspera vbiq, superficie, & acuta circũferẽtia: radix illi est alba, dura, tuberosa, cõtorta, in formam ac geniculata, vt in Iride, sed longẽ maior, ac robustior. Secatur Arũdines quotannis humotenus, sectaq, illico regerminant, crescutq, anno toto ad priorem altitudinem, crassitudinemq, Illa, quæ nastos dicitur, solida, sarctaq, quamuis gracilis & lenis, in communem sagittarum vsum à Syris accepta, non oritur, quod sciam, in Italia, nisi nascatur (vt tradidit Plinius) in Rheno Bononiensi amne. Illa etiam, quæ thelys, hoc est, femina appellatur, cuius tantum est vsus ad tiliarum ligulas, hactenus mihi incognita est. Namq, nostra tempestate sunt eiusmodi ligule ex communibus arundinibus, ex ea scilicet specie quam Dioscorides vallatoriam nuncupat, qua nostri in viridariis, ac hortis in topiariis extruendis vtuntur, ac palos vitibus aptissimos efficiunt. Quod autem vallatoria sit hæc nostra cõmunis, mihi aliquando dubitãdi præbuit ausam Dioscorides: quippe qui dicat, eam esse gracilem & candidam, cum tamen communis nostra sit crassior. Verum cum postea inuenerim Theophrastum scribentem li. 4. c. 12. de plantarũ historia, crassiorẽ, firmioremq, illam arũdinem esse, quæ vallatoria nominatur, facile sum ad credẽdũ inductus, hũc Dioscoridis locum esse deprauatũ: eoq, magis, quod septis, palis, & topiariis operibus crassa sunt tenuibus aptiores. Est autẽ arundo palustris calamo tenui, geniculato, leuibus internodiis, inani ac fragili, foliis longis, asperis, & per ambitum acutis, paniculis in summitate comosis, tactu mollibus, leuibusq, Prouenit sponte in paludibus, lacubus, & ceteris stagnãtibz aquis. Vires sunt illi eadẽ quæ & ceteris generibus. Illa verò quæ ad scribendum vsurpatur, cui authoritatẽ pennæ derogarunt, plurimis reperitur in locis, estq, omnibus notissima: veluti & ea, quæ Cypria vocatur, in paludibus nascẽs, & apud amnes. Traditur à pluribus rei agraria auctoribus, tum etiam à Plinio, inter arundinẽ & filicem herbari intestinum esse odium: proinde arũdinem vomeri alligatam filicem in agro destruere, ac enecare prodiderunt. At eo maior arundini cum asparagis intercedit amicitia: nam si serantur in arundinetis, inibi mirificè proueniunt. Quidam præterea prodiderunt, arundines in India ad tantam assurgere molem, vt singula internodia nauigiorum vicem præstent per fluuios & lacus, ternos homines capiente alueo. At si plura de arundinum generibus quis audite cupiat, Theophrastum legat, qui longiori sermone earum historiam literis memoriaq, mandauit. Potã arundinis radix vrinam, & menses ciet: eadem recens tusa scorpionum ictibus vtiliter imponitur. Non desunt impostores, qui Arundinum radices combustas pro spodio vsurpent. De arundine Galenus lib. 7. simp. med. hæc scripta reliquit. Calami phragmitũ radicem cum bulbo, aculeos & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quadam vis ei: nescit. Nos tamen eius rei periculum non fecimus: verum quantum gustu liceat conicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem. Ceterum folia ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex verò eius combustus admodum tenuium partium & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens abstersorium quiddam, vt exiccet, & exalfaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet, quàm exalfaciat. Vitandum autem est eius, id quod ambelen vocant: nã si in aures incidat, adeo tenaciter adhaerens affigitur, vt auelli non possit, auditumq, vitiat: quamobrem sapissimè exsurdat. Arundo sic Latina voce vocatur, vt Græca κάλαμος: Arabica, Casab: Italice, Canna: Germanica Rohr: Hispanica, Cannas: Gallica, Cannes siue roseau: Bobemica, Trest. Arundo palustris. Græcis κάλαμος ἑλεῖος: Italis, Cannella, & Cannuccia aquatica.

Nastos.

Vallatoria.

Scriptoria.

Arundinis, & filicis odium: cum asparago amicitia.

Arundinis vites ex Gal.

Nomina.

Arũdo κάλαμος, ὅθεν τὸ καλῶς ἀμῶδες etymologicè dicitur, quæ odorata, (de qua superius) & inodora, cuius genera quinque agnouit Diosc. at Theoph. 4. hist. 12. duo summa constituit genera, τὸν ἴ αὐλῆτικὸν ἔχον τὸν ἑτερον, inde in plures species subdiuisit. Plin. celsi lib. 16. c. 36. plures differentias agnouerit, at tamẽ li. 24. c. 11. viginti nouẽ genera se demõstrasse expresse monet: in phytopinace nostro duodecim Arundinis genera recẽsumimus, sed de commentatoris arundinibus.

III. Arundo scriptoria.

I. Papyrus Nilotica.



I. Arundo fatiua, quæ Donax Dioscoridi C. B. Arundo Cypria & sexta, Dod. gal. Arundo magna, Ges. hor. Arundo donax fatiua siue Cypria, Lob. Arundo domestica. Cast. Lugd. Tab. Calamus sine harundo crassa, Cæs. Arũdo Italica maior, Cã. II. Arundo vulgaris quæ phragmites Diosco. C. B. Arundo, Trag. Ges. Lõ. Harũdo vallatoria, Dod. gal. Lugd. (qui figurã habet Dodonzi & alterã Matthioli) Thal. Harũdo phragmites, Dod. Arundo palustris & Cãna sepiaria, Tab. Calamus vallatoria, Lob. Calamus siue arũdo alia gracilis, Cæs. III. Arundo scriptoria ouerzia, Diosc. C. B. Syringias fistularia, arundo tertia, Dod. gal. Fistula vel syringa. Lobel. Canna fistularis, Tab.

Πάπυρος. P APYRVS. CAP. XC VIII.

P APYRVS, qua charte fiunt, nullis non cognita, precipue in medicina vtilitatis ad laxandas

Cyperus Papyrus
Linn.

lucida fistula: madefacta lino inuoluitur, vsq; dū inaruerit: cōstricta enim atq; immissa in hiatū humore cōpletur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq; Aegyptij eā mandūt, succū tantū deuorantes, & mansam expuunt. Iphis radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis de pascentia vlcera cū omnium partium, tū oris maximè, cohibet: verum melius id cōbusta charta præstat.

Qualis Papyrus sit, Italia nescit: siquidem (vt Theophrastus est auctor lib. 3. cap. 9. de plantarum historia, & Plinius lib. 13. ca. 11.) Papyrus in Italia non nascitur, sed in Aegypto quibusdam in locis tantum prope Nilum fluum, quiescentibus Nilus aquis, vbi hæc enagata stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum: brachiali obliqua radice crassitudine, triangulis lateribus, de em non amplius cubitorum longitudine, in gracilitatem fastigiatum, thysi modo cacumen includens: semine nullo, aut vsu eius alio quam floris ad deos coronandos. Radicibus incola pro ligno vtuntur, nec ignis tantum gratia, sed ad alia quodque vtensilia vasorum. Ex ipso quidem papyro nauigia texunt: & è libro vela, tegetesq; necnon & vestem: etiam stragula, ac funem. Mandunt quoque crudum decoctumque, succum tantum deuorantes. Nascitur & in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Nuper & in Euphrate nascens circa Babylonem Papyrus intellectum est eundem vsam habere, quem charta: & tamen adhuc malunt Parthi literas vestibus intexere. Preparantur ex eo charta diuisa ac in prætenues, sed quam latissimas philuras. Hæc Plinius: qui deinde sequenti capite fusius docuit Papyri conficiendi rationem, his verbis. Post hanc papyrus est, extremumq; eius scirpo simile, ac ne funibus

Papyri conficiendi ratio ex Theoph. & Plinio.

IL ARVND
maxima.



quidem nisi in humore vtile. Texunturque omnes tabula madentes Nilus aqua. Turbidus liquor vim glutini præbet, cum primò supina tabula scheda adlinitur longitudine papyri, qua potuit esse, resegminibus vtrinque amputatis. Transuersa postea crates peragitur: premitur deinde pralis, & siccantur sole plagula, atque inter se iunguntur, proximarum semper bonitati diminutione ad deterrimas. Nunquam plures scapo, quam vicena, magna in latitudine earum differentia 13. digitorum optimis. Hactenus de papyro Plinius. Videntur & Papyri quoddam esse genus, tenuia lauiaque illa folia è iuncea quadam planta prodeuntia, qua ab insulis diui Thoma, Brasilijs, & Medera, ad nos conuehuntur, saccharcis vt vocant panibus inde delatis circūuoluta. Quandoquidem fragmentum retinemus à clarissimo medico Luca Ghino Pisas, ad nos missum, nigris rubrisque Arabicis characteribus manuscriptam. Quod clarissimum præbet indicium, earum insularum incolæ tenuissimis his folijs pro papyro passim vti. Veruntamen hoc non esse papyrus, è quo antiquitas suas confecit chartas, certò scimus, quod hoc arte (vt Plinius est auctor) fieret, illud vero tale à natura producat, & propriè in sua stirpe sit folium. Antiqui itaque ex Papyro chartam faciebant, quemadmodum nos ipsam ex contritis linteis conficimus: vnde hactenus antiquum retinens nomen, etiamnum Papyrus apud plerosque dicitur. Credidere nonnulli, veram esse Papyrus arundines illas, quas Indicas vocant, quibus imbecilles principes, atque hierarchæ, prælati vulgò dicti, ad egram senectutem fulciendam pro scipione vtuntur, materiem auro, vel argento succingentes. Quod tamen asserere non ausim, nec vtiq; reprobare, cum huius cerei certam cognitionem adhuc assequi non potuerim. Papyri meminit Galenus lib. 8. simpl. med. sic inquit. Papyrus ipsa quidem per se in vsu medicinale non venit, at macerata, aut vsa vtilis efficitur. Igitur oxycrato, vineve macerata, recentia vlcera glutinat, maxime in circulum circumposita. Verum hic quidem est, seu materia, qua medicamina sanantia accipiunt: at vbi vsa fuerit, medicame est exiccatorium, velut & charta combusta cinis, nisi quatenus infirmior est, quam papyri: hæc Galenus. Caterum animaduertendum est, quod ne sit vsus charta, qua ex veteribus conficitur linteis, vjdem non pollet facultatibus, quibus ea commendatur, quam veteres ex papyro arbore parabant. Quo fit, vt dubium mihi sit, quonam modo parari possit illud Galeni medicamentum, quod de charta combusta dicitur, vlceribus sordidus, & sinuosis vtilissimum itemq; passillus Faustini à Paulo li. 7. traditus. *Ἰαπερος* Græcis, Latinis pariter Papyrus appellatur: Arabibus, Burdi, seu Berdi: Italis: Papiro.

Papyri conficiendi ratio.

Papyri quoddam genus.

Indica arundine.

Papyri virtus ex Gal.

Papyri iconem ex Lobelo adiecimus, quæ Dioscoridis & Theophrasti esse videtur, & Papyrus Catalpæ & Alpino dicitur, Papyrus Nilotica, Adu. Lob. & Tab. Papyrus Aegyptia, Lugdu. Quemadmodum apud veteres ἰαπερος charta ex papyro fiebat, & chartæ papyriq; vox non eadem erat, qua ad scriptionem utebatur, cuius multa genera Plinius proposuit, sic charta nostra ex attritis linteaminibus paratur, eadem tamè est chartæ & papyri vox. Ast quemadmodum veteres & aliis rebus ad scriptionem vsi sunt, vt Betuleq; Tiliq; corticibus: sic recentiores varia habent. Sic Carolus Clu. Papyri ex Iacca meminit, liber est arboris tenuissimæ membranæ instar candidus, quo vt Papyro scriptione excipi potest: sic Scaliger exerc. 138. Palma humilia recenset, & foliorum pro chartis vsu scribit: sic Ouiedus li. 8. cap. 13. & 14. Guaiabara scribit Hispanis in insula Hispaniola papyri vsu præbere & atramenti. Idem & Copey in Hispaniola folio duplo maiore & crassiore refert, quibus pro chartis lusorij Hispani utebantur. Nicolaus Costinus in suo itineraio arboris meminit, cuius folia tenuia longitudinem & latitudinem sex brachiorum æquant, quibus chartæ vice vtantur, & folio extenso, tres quatuorve ita operiantur, vt pluuias non metuant. Tandem Lugd. hist. libro 18. cap. 86. Tal vocat arborem in prouincia Mangi, folio grandi, quod chartæ vsu præbeat in tota India, fructu magno Napy simili. Meminit Commentator Indicæ arundinis, cuius figuram adiecimus, quam Arundinem maximam vocamus, Nastos Dioscoridis & Toxicam Theophrasti censemus. Harundo prima Dioscoridis, Dod. Nastos vel farcta, Lob. Nastos tertia, Tabernæmontani.

Papyrus ex Iacca. Guaiabara. Copey.

Tal.

Mupia.

MYRICA.

CAP. XCIX.


MYrica, seu tamarix, [arbor vulgo cognita] est, cum apud pigras, & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage mucosum. Aegyptus, Syriaq; alteram gignunt mitiorem, habet syluestri cætera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu: quo conuenienter vtiuntur vice gallæ in medicaminibus oculorum, orisq; Datur crasse excretionem in potu, & coeliaci.

Oris. non habet.

& contra profluvia foeminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absument: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxione vulvae opportunis in defensionibus: phthirias lendibusque circumfusum prodest. Abundantiam foeminarum sistit impositus arboris cinis. Potioris calices e caudice lienosis moluntur, quod datus in his potus proficiat.

I. MYRICA.

II. TAMARIX NARBONENSIS.



Myricae con-
fideratio.

Vrbana Myrica, quod sciam, non nascitur in Italia: quanquam in Aegypto, & Syria gignitur. Qua verò alicubi reperitur in hortu, & in quibusdam viridarijs mitior reddita, non alia est, quam sylvestris, in locos mitiores translata, qua folia habet Sabina baccifera similia, tenuiora tamen, ac magis virentia, fructum quasi florem ferens compage muscosum. Cuius rei certo sunt indicio fructus & flores, quos omnino sylvestribus similes profert, non autem galla modo vt domestica. Umbra arboris insigni proceritate sepe per aestatem Roma me oblectatum fuisse recordor ad Tyberis ripas, in hortulo quodam hospitalis Sancti Spiritus: qua etsi domestica haberetur ab omnibus, florem tamen & fructum ferebat sylvestri similem. Hec in fluminum ripis frequentissima nascitur in Italia. Quare non potui non admirari Dioscoridem, quippe qui dicat tantum nasci Myricam apud paludes, ac resides aquas, cum oppositum sanè eneniat in Italia. Quod me saepius adduxit, vt crediderim, aut Dioscoridi codicem hoc loco deprauatum esse, aut in Graecia secus, quam in Italia myricam proximè stagna ac paludes oriri. Tamarici fruticem, qui fructum quasi florem profert compage muscosum παρακαρπία θάμνον Nicander in theriacis celebrat, tanquam diuinam, & omnib. modis colendam plantam ad serpentium morsus hisce Carminibus.

Καὶ μύρτινος λάζοιο νέον παρακαρπία θάμνον

Μάρτινιν ἐν ζωοῖσι παράσμιον ἢ ἐν δάπτλων

Μαρτοσίνας κοροπαῖος ἐθάκτο, καὶ θέμιν αὐ δρῶν.

Myricae me-
dicina.

Myrica trunco alui excanantur (vt Columella scribit) aquaeq. replentur, vt subinde postea bibant sues: nam hoc potus splenis incremento sanantur, quo morbo estate maxime torquentur, dum, qua eorum est pabuli insatiabilis auaritia, arborum fructus consecantur, qui plurimi eo tempore propter ariditatem in terram decidunt. Porro myrica cinerem omnino vltima ignis exustione contracta, efficaciter exiccare auctor est Serapio. Folia simul cum tota planta foru frigiditas collectiones inhibent, ac reprimunt. Rami concisi, ex aceto illiti lienem attenuant. Datur ramorum cortex ad diuturnas alui fluxiones. Fructus potus datus confert vipereis morsibus. Elephantiasim ex lienis vitio obortam myrica radicum decoctum, & cum passu vuis epotum sanare tradidit Alcanzizus Arabs: id quod se vidisse ait in duabus mulieribus, qua hac labe laborarunt. Ex quo mihi persuasum est, id non incongruum in Gallica peste fore medicamentum, Guaiaco forsitan ligno non absimile. Myrica radices, pro odorata casia venditabant impostores, sed postquam fraus à peritis medica materia viri deprehensa est, eius in officinis vsus penitus exoleuit. Meminit myrica Galenus lib. vii. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Myrica abstergentis est ac incidentis facultatis, absq. perspicua desiccatione: habet verò etiam adstrictionem nonnullam. Has ob qualitates facultatesq. admodum prodest lienem indurato decocta cum aceto, aut vino, siue radice, siue folijs, siue extremis ramulis: sanat porro dentium dolores. Caterum fructus & cortex non paucam sortita sunt adstrictionem, adeo vt galla omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas euidentis est in galla, sed myrica fructus temperatura inest inaequalis: immista est enim natura eius multa partium tenuitas, atque vis abstergendi: quod sanè galla non accidit. Attamen vbi galla forte ad manum non erit, eo vti liceat ad omnia, ad qua illa vtimur, in eisdem, & cortice. Porro Myrica combusta cinis admodum

Myricae vires
et Galeno.

admodum defecatorie facultatis est, plurimam habens abstergendi facultatem, paucillam adstringentis. Mupien arbor ita
Græci vocata, Latine Myrica, & Tamarix nuncupatur: Arabice, Tarfa, seu Carfa: Italicè, Tamarigio. Germanicè, Ta-
mariscus, aut Porstus Hispanicè, Tamariguera, & Tamaritz: Gallicè, Tamarisc.

Nomina.

Myrica Dioscoridi, Theophrasto & Galeno: Tamarix Corinthiis Hermolao teste, & quibusdam
Amarix, quæ duum generum, sativa Aegyptia, quæ arbor est: & sylvestris, quæ frutex est lignosus: Huius
duplex genus in Germania, alterum solidiore ligno, medulla exili, & foliis tenuioribus, circa Rhenum: al-
terum ampliore medulla, foliis latiusculis, ligno non vsq; ad eò solido, quæ in Danubij ripis frequens. Rur-
sus differt Narbonensis à Germanica, illa exiguos habet flosculos, non papposos sed retundos, ex albo pu-
nicantes, & acinulis subsilentibus à vermiculo intus orto agitato. Hæc verò flores habet tomentosos &
papposos purpureos, qui vnà cum semine diffuunt. Narbonensi similis ea quæ in Lio Venetorum insula
crecit. I. Tamarif. Germanica C. B. Lob. & Lugd. Tamarif. Brun. Lon. Tamarix. Dod. Tab. Fuch. cui & Ta-
marix sylvæ femina. Tamariscus femina, Cord. hist. Tamarix humilis, Cord. in Diosc. Myrica, Trag. Lac.
Gef hort. Myrica humilis, Dod. gal. Myrica altera in Germania, Cam. Myricæ sylvestri secundæ similis,
Clus. Hisp. & Myricæ Pannonicæ similis, Clus. Pan. II. Tamariscus Narbonensis C. B. & Lob. Tamarix Nar-
bonensis, Lugd. Tab. Tamarifci sylvæ genus, Alpino, Myrica circa Monspelium, Gef hort. Myrica sylvæ pri-
ma, Clus. Hisp. Myrica siue Tamariscus gallica Cam. Myrica, Casalp.

Tamaricis genera.

De Aegyptia in historia nostra,

Ερείκη.

ERICA.

CAP. C.

I. ERICA PRIMA.



ERICA fruticosa arbor, myricæ similis, longè mi-
nor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. Tam
flos, quã coma serpentium ictibus illitu medetur.

ERICA stirps fruticosa Asia, Græciq; fruticibus ascribitur.
Hæc (vt plantarum scriptores asserunt) bis anno floret,
quo sit, vt prima, & vltima habeatur, qua inter sylvestres stir-
pes floreat. Quæ de Erica Dioscorides prædidit, Nicander habet
in theriacis dum Ericam perpetuò virentem apes depasci ait, &
serpentium ictibus aduersari commemorat his versibus.

Erica consti- deratio.

Ἡ ἔρις ἀνθεμῖος ἐν ἄφαρτα ρυφύλλοις ἔρεικην.
Ἡ ὕτι μελιόσας περιβόσκειται οὐλαμὸς ἔριτων.

Plinius lib. 24. cap. 9. Ericam describens inquit. Ericen Græci
vocant fruticem non multum à myrice differentem, colore roris
marini, & penes folio. Hanc aduersari serpentibus tradunt: hæc
Plinij verba. Verum non ob id facile fuerit affirmare, quænam
plãta nobis legitimam Ericam præseferat, cum tam paucis no-
tis describatur ab omnibus: tametsi hæc, cuius hic figuram ap-
pinximus, nil aliud quàm Ericam designare videatur. Siqui-
dem fruticosa est planta, semicubitalis, colore roris marini, fo-
lijs ferè myrica, cui eam Dioscorides assimilat: vere primo & au-
tumno florescens, quod huius fruticis proprium est, si res herba-
ria scriptoribus est adhibenda fides. Adde, quod huiusce flores
autumno maxime depascantur apes, ea fortasse de causa, quod
non modo Erica prima sit, & vltima sylvestrium, quæ floreat,
sed quod etiam diutius floribus quam plurimis ornetur, nempe
autumno toto, & ad hyemem vsque. Vnde mel, quod ex ijs apes
faciunt, ericeum (vt Plinius est author) antiquis appellatur,
quod conuehi tradidit post primos autumnii imbres, cum erica
sola floret in syluis. Præterea cum lib. 3. scribat Dioscorides, co-
rim, hypericum aliquibus vocatam, fruticem esse folio erica,
minore tamen, sitq; hæc cori folio admodum similis, magis ad-

Mel ericeum.

huc inclinavit animus ad credendum, hanc esse Dioscoridis ericam. His ergo rationibus adductus non temerè factum puta-
ui, pro legitima erica huius effigiem expressam dare. Oritur hæc frequentissima in Goritiensi agro eo præsertim tractu, quã
à Dino Andrea (ita appellatur vicus) ad Vipacum fluuium itur: incola vernaculo sermone eam nominant Grione. Sed in
Hetruria longè magis adolescit, suntq; ex ea scopæ aptissima ad mundandas ades, & ob id vulgò hæc planta propriè voca-
tur Scopæ. Marcellus, nescio qua ratione ductus, ericam magno errore geniste speciem putat. Ericam aliam, cuius etiam hic
imaginem exhibemus, vt qua fortasse non minus, quàm antedicta, veram referat, misit ad me Gabriel Fallopius Mutinen-
sis Medicus singularis ingenij & eruditionis, dum Patavij honorificè humani corporis dissectionem & materiam medicam
profiteretur. Ramos edit tenues, folijs alterius lægioribus acutioribusq; angustis ac numerosioribus, quibus circumquaq; ramuli
stipantur. Flores edit paruos rubentesq;. Nascitur arido solo, & in collibus apricis & montibus non valde excelsis. An Erica
sit legitima hæc planta, aliorum iudicio relinquo. Est & planta in montibus nascens, qui Bohemiam à Silesia discerni-
unt, & à quorum fontibus Albiu fluuius originem ducit, humi procumbens, & lætas occupans areas, folio penè vulgaris E-
rica, quæ bacca edit purpureas in purpura nigricantes, iuniperinis baud minores, sed molliore pulpa, læta, & colore sub-
virescente vt in pruno. Ramis est lignosis, ex atro rufescentibus, flexibilibus, obsequiosisq;, flores videre non licuit, sed ipsati
tantam bacciferam mense Augusto. De qualitatibus & viribus, quid certi dicam, non habeo. Hanc Ericam bacciferam ap-
pellandã duximus: quã vnà cum altera à Fallopio mihi missam libèter depingi curauimus, atque in mediũ proferre libuit,
vt rei herbaria peritos in his, quemadmodum & in cæteris plantis, iudices constituamus: quorum sanè iudicio subscribent
studiosi, quibus nos quidem, quantũ labore atq; industria consequi possumus, non grauamur prodesse. Erica paucis perfrin-
xit Gal-

Scopæ. Erica altera.


Erica baccifera.

II. ERICA SECUNDA.

III. ERICA BACCIFERA.



Erica secunda
Scribis



Ericæ facultates ex Gal. Contra calculum.

Nomina.

xit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit. Erica digerendi per halitum facultatem obtinet. Flore eius potissimum, ac folijs utendum: hac Galen. Caterum aqua, in qua vulgaris Erica, folia eius & flores, decocta sit, sumpta tepida tam mane quam vesperi trīginta dies, quinque vnciarum pondere tribus horis ante cibum, valet ad vesicae calculos comminuendos & expellendos. Item felicius succedit, si post id tempus male affecti in balneum decoctionis eiusdem plantae ingredi, atque inibi dum morantur, super Ericam decoctam sedere debent: idque pluries repetendum est. Equidem noui aliquos, qui seruata recta victus ratione, hoc tantum potu vesicae calculum in minimas partes comminutum eiecerunt. Florum decoctum potum lumborum & ventris doloribus succurrit: foliorum succus oculorum imbecillitatem sanat, si guttatum instilletur. Planta hac, quae Graecis ἐπειρα, Latinis item Erica nominatur, pariter & Italis: Heyden, Germanis: Queiro, Hispanis: Bruyere Gallis.

Ericæ, quæ Tetralix Atheniensibus, Plinio auctore, Sifara Varroni, duo summa sunt genera: altera Myricæ similis, sed minor: altera Coridis folio, ut ex Dioscoride colligitur: Siquidem capite de Cori, corin Erica dixerit folio. Huius multæ sunt species magnitudine foliorum, & florum forma coloreque inter se differentes, cuius nomine Clusius historia Hispanica nouem species: Pannonica verò historia alias etiam proposuit, qua de re suo loco. I. Quam Ericam folio Tamarisci vocamus, Erica est Dioscoridis, Ericæ Fuch. Erica, Dodo. gal. Cord. in Diosc. Lonic. Cast. Tab. Erica vulgaris, Thal. Erica folio myricæ, Lob. Clus. Hisp. Erica prior, Dodo. Erica prima, Matth. Lugd. Erica vulgaris purpurea, Trago. Variat floris colore purpureo & candido: hæc etiam folijs tomentosis & incanis, flore diluore, monente Clusio, in Anglia reperitur. II. Erica secunda, altera Clus. hisp. Erica Iuniperifolia dense fruticans Narbonensis, Lob. Erica altera, Matth. Lugd. Cast. Taber. III. Erica baccifera Matthioli, Clus. hisp. Lugd. Thal. Erica prima vel Erica baccifera, Clus. Panno.

Ἀκακάλις.

ACACALIS.

CAP. CI.

a Meū exem. ἐπι κως κατὰ τὴν τὰ μύρι κας καρπῶ. I. quadantenus similis est myricæ fructui.

Acacalis fructus est nascentis in Ægypto fruticis a seminis myricæ quadantenus similis. Cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Acacalim Ægyptia arbuscula semen ad nos hac aetate conueni non equidem arbitror, quippe quod inter semina, quæ peregrina nobis importantur, nullum adhuc repererim, quod Acacalim legitime referat.

RHAMNVS.

CAP. CII.

Et aculeos, non legit Orb.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, [& aculeos] in acutæ spinæ modum: folijs paruis oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusq; folijs constat & quadantenus rubentibus: cuius rami quinum ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus, minusque rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuè, folliculari specie, verticillo similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus efficaciter illinuntur. Pars est ramos huius valuis, fenestrisve impositos, veneficia depellere.

I. RHAM-

I. RHAMNVS PRIMVS.

II. RHAMNVS SECVNDVS.



III. RHAMNVS GERMANICVS.



Rhamni tria genera facit Dioscorides, ac etiam cum ser-
 tus Orbasius. Primum, & tertium ubique in Hetruria
 fruticant. Illud priuatim in sepibus & frutetis nascitur, quo no-
 strates mulieres vtuntur ad insolandas ficos: siquidem eas adhuc
 recentes longis huiusce fruticis aculeis perforant, & ad solem ap-
 pendent. Tert. aculeos in acuta spina modum. folia oblonga,
 mollia, subpinguia, tenuia: corticem habet album, lauemque,
 baccas rubentes, pisi magnitudine, cortice albo & tenui. Secun-
 dus primo candidior est: folijs salicis, cuius a parte candida, vir-
 gis aculeatis albicantibus, & rubentibus inter folia baccas. Tertium
 quod nigrius est (vt etiam Dioscorides inquit) quibus sermo
 cubitarum altitudine attollitur, ceteris spinosius, in firmioribus
 aculeis, alijs longis & rectis, alijs vt Rabi incuruis, leni cortice
 obductis, fuluis colore: folijs latioribus, solidioribus, neri floribus
 muscosis, subroceis, fructu tenui, lato, candido folliculari specie
 rotundo, verticillo non ab simili: in cuius medio nucleus est do-
 rum ac rotundus, cicercis serè magnitudine, in quo semen conclu-
 ditur, lentis instar compressum, rubro cortice & alba intus me-
 dulla. Nascitur in maritimis, in campestribus, & locis incol-
 tis. Secundum vero genus, quod ceteris candidius est, ad nos misit
 clariss. medicus Lucas Ghinus, cuius etiã hic effigiem damus. Ve-
 rum non desunt recentiores quidam rei plantarie studiosi, qui
 censent tertium Rhamni genus, Dioscoridi esse adulterinum,
 quod (vt ipsi aiunt) in fructus descriptione non desit contradi-
 ctio. Namq; ipsi ita legunt. *ραρπός δ' ἔπλατύς λευκός, λεπτός ὡς
 βυλακώδης, ἐοικώς ἀσφοδῆλοι.* Id est fructum edit latum, candi-
 dum, tenuem veluti folliculum Asphodelo similem: que compa-

Rhamnorum
 confid. & hi-
 storia.

Dioscoridi
 locus restitu-
 tus.

ratis adeo absurda videtur (vt illi contendunt) vt nihil prorsus Dioscoridis lectionem respiciat, quippe quod Asphodeli fru-
 ctus, nullam penitus habeat folliculi speciem, nec latus aliqua ex parte videatur, nec tenuis, nec candidus, sed viridis, &
 globuli instar rotundus. Quae fortasse argumenta possent facile nonnullos in eorum trahere sententiam, quam nos minime
 probamus. Siquidem Orbasius qui plantarum historias perquam fideliter ex Dioscoride transcribit, non legit *εοικώς ἀσφο-*
δῆλοι, sed *εοικώς σφοδύλοι*, vt etiam legit antiquus Dioscoridi codex, cuiusmodi exemplar habuisse Ruellium haud am-
 bigo, quippe qui verterit: *Fructu edit latu, candidum, tenuē, folliculari specie, verticillo simile, quo scilicet vtuntur infusis mu-*
lieres. Quae quidē nota in 3. Rhamni fructu manifestò deprehenduntur. Fideliores codices habuere quoq; Marcel. Virg. & Cor-

IV. RHAMNVS TERTIVS.

V. SPINA INFECTORIA.



Opinio quo-
rundam im-
probata cir-
ca Paliurum.

narius: quippe qui vna cum Ruellio verterant verticillo similem: atque eorum impugnaverant opinionem, qui depravata
lectione decepti, antea longè à scopo aberrauerant. Nota enim, quibus Rhamni fructum describit Dioscorides, ad fusorum
verticillas manifeste pertinent, quorum figura, auctore Theophrasto, natura pluribus plantis semina dedit. Hos itaque, qui
tertium Rhamnum Dioscoridi adimunt, nullam aliam ob causam id moliri crediderim, quam ut hoc Rhamni tertium ge-
nus, Dioscoridi legitimum Paliurum consingerent. Sed hallucinari eos, vel potius eorum fallaciam à nobis deprehensam, in
facile conijciat, qui apud Theophrastum lib. 3. cap. 17. de histor. plantarum legerit paliurum ἐν λοφῶς proferre semen, id est in
siliqua praelonga faba instar, non autem in fructu rotundo, ac verticillato, qui non vere folliculus sit, sed follicularē quādam
referat speciem, & ut propriè Dioscorides inquit θυλακῶδες. Græcis enim scriptoribus λοφῶς longam, vel oblongam sili-
quam in plantis designat, Suida & Phauorino testibus, ut faba folliculi sunt, & Terebinthi cornicula, non autem rotundum
fructum verticilli faciem referentem. Quod verò Paliuri fructus siue folliculus oblongus sit, id quidem manifestè testa-
tur idem Theophrastus lib. 3. cap. 2. de plant. hist. de Acere scribens. Ibi enim Acerem fructum ferre ait oblongum, Paliuro si-
mitem. Obstat præterea ne tertium hoc Rhamni genus Paliurum esse possit, ipsum quoque semen, quod non ἐν λοφῶς, sed in
duro, ac rotundo concluditur osiculo, in ipsius verticilli centro latecente, fungosa quadam pulpa exterius obducto, triplici
intus cavitate diuiso, vbi semen ipsum se continet, ac latitat, lentis instar compressum, rufa ac laui cuticula contextum, al-
ba dulciq; intus medulla, non autem fuliginosum, & pingue, ut de Paliuri semine scribit Dioscorides. Quæ omnia maximo
sunt argumento, falli proculdubio, qui putant hoc tertium Rhamni genus Dioscoridi adulterinum esse, & plantam, quam
nos tertium Rhamnum esse non dubitamus, Paliurum esse contendunt. Caterum Ruellium deceptum esse crediderim, quip-
pe qui Rhamni genus eam esse stirpem arbitretur, quam nos vulgari sermone SPINO merlo, Longobardi Venetique Spin-
ceruino, Foroiulienfes verò Spin guerzo appellant. Hac enim arbuscula est non magna, folijs latis, pyri quadantenus mo-
do breuioribus & angustioribus. Ramos fundit numerosos, quorum fastigium in aculeum desinit: fructu copioso ligustri ef-
figie baccarum instar, quæ primum virides, & per maturitatem nigra spectantur, cuius succo vtuntur pictores, vbi colore vi-
ridi insicere sit opus. Ligni materies albicat exterius, medullitus verò rufescit, prouenit in sepibus & senticosis. Exoluit al-
uum baccarū succus, aperit & expellit, & caloris & siccitatis haud est expers. Quamobrem hanc plantam nobis SPINAM

Ruellij error
qui Spinam
infectoriam
Rhamnum
censuit.

Spinæ infe-
ctoriæ succus
& eius vires.

INFECTORIAM appellare libuit. Fit è baccarum huiusce arboris succo liquor aluum exoluens, qui diu asseruari potest.
hoc modo: Sumito succi baccarum probè maturatum (id namq; sit circa calendæ Octobris) libras duas (atqui anteaquam
succum praelo extrahas, baccas semicontusas quaternis diebus in fictili vitreato macerari per sese in calido loco permittito)
quibus addito sacchari optimi sesquilibram, vel mellis electi probè despumati tantundem: deinde lento igne decoquit ad
Iulapij vel syrapi spissitudinem: demū linteolo rariore colato, additoq; pulueris Cinnamomi selectissimi, Gingiberis, cuius-
que drach. quatuor, Caryophyllorum drach. duas, & mundo vase asseruato. Datur potandum vncia quantitate, & vsque
ad drach. decem. Educit enim facillè pituitam, & crassos, ac lentos humores: ideoq; podagricis, Ischiadicis, paralyticisq; bellè
confert. Aberrasse præterea Ruellius deprehenditur, quod Theophrasti testimonio ea de Rhamni fructu tradiderit, quæ sta-
tim Theophrast. absolutè rhamni histo. de paliuro disseruit. Sed in errore longe maiore versantur Monachi, qui in Mesurum
commentarios edidere, cum Rhamnum existimauerint rubum quendam, qui humi repens, incultiq; proueniens, mora, ca-
ruleo potius, quam nigro colore profert. Rhamni meminist Galenus li. 8. simplic. medic. sic inquit. Rhamnus desiccatur, & di-
gerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente: proinde herpes sanat, & erysipelata non magno-
pere calida. Caterum adhuc teneris vtendum est folijs. Huic planta nomen Græcum ῥάμνος. Latinum, Rhamnus: Maurita-
tanum, Nausig, siue Nauségi: Italicum, Rhamno, & Marruca: Hispanicum, Scambrones. Gallis, Burguespin, siue Neprun.
Rhamnus secundus, Italis, Marruca bianca. Rhamnus tertius Italis, Marruca nera. Spina autem Infectoria, Italis dicitur.
Spin merlo, Spin ceruino [siue spin guerzo]: Germanis Ereusbeer: Weqdorn: Bohemis Bodlak.

Monachorū
error.
Rhamni vi-
res ex Gal.
Nomina.

Rhamni

Rhamni tria genera proposuit Dioscorides: at Theophrastus duo, album & nigrum, quem sequutus est Plinius, Ruborum generi ascribens. Et sanè Rhamnum primum Dioscoridis, Rhamnum nigrum Theophrasti, & apud Plinium Rhamni alterum genus sylvestre nigrius, censemus. At secundum Dioscoridis, candidum Theophrasto, & candidiorem Plinio: Tum Rhamnum tertium Dioscoridis, Paliurum Theophrasti, cuius semen in siliquis contineri, historia scribit, credimus. Recentiores plures agnoscunt differentias, sed in præsens de cōmentatoris Rhamnis. I. Rhamnus primus, Matth. Lac. Lonic. Lugd. Cast. II. Rhamnus secundus Matth. Lac. Lon. Lugd. Hic multum cum Rhamno Germanico similitudinis habet (si non idem) cuius nomine iconem adiecimus. III. Rhamnus Germanicus, arbuscula est quatuor, quinque; aut sex cubitorum, nonnunquam procerior, quæ ex multifida lateq; diffusa radice, caudicem emittit intortum, rugoso spadiceoq; cortice vestitum, qui in plurimos ramos brachiatur: hiq; vndiq; aculeis longis, fescuncialibus, cinericeis armantur: ramos cingunt inordinatè folia oblonga, angusta salignis æmula, cædida, infernè tenuissima lanugine pubescètia, superne ex viridi cinerea, saporis modicè adstringentis. Flores herbacei ramulis compacti adnascuntur, quibus succedunt baccæ rotundæ Asparagi baccis similes, racematim quasi coherentes, tenui & rufescente, vel ex luteo rutilante cute tectæ, quib. præter pulpam mollem, luteam singulis semen vnicum ex rotunditate oblongatum, splendens, tunica foris fulca, intus candida involutum, includitur. In nostris aquis ad Rhenum infra Hunningen, ludit, quæ enim foliis latioribus est & longioribus, baccis est singulis vel binis stipiti annexis: quæ verò foliis est angustioribus & brevioribus, baccis est multis veluti conglobatis, quæ & hyeme frutici adhærent. Prouenit etiam ad Lycum Vindeliæ amnem & ad Danubium: sic & in Hollandiæ potissimū Flandriæ maritimis litorebus. Ex baccis paratur Rob quod acidum est, incidens & attenuans, & in Dysenteria cōmendatur: cum acinis vis quædā purgatrix à Belgis tribuatur, idcirco Schytbesien, id est Acini purgatrices ipsis dicuntur. Cordo in Diosc. & hist. Oleaster Germanicus, Dodonæo gal. & fol. Lugd. Rhamnus secundus: Camerario in Matthiolum Rhamni species nominatur. IV. Rhamnus tertius Dioscoridis. C. B. Rhamnus tertius, Dod. Gal. Lac. Lon. Cast. Ges. hor. Rhamnus niger, Cord. in Diosc. Paliurus, Dod. Lob. Lugd. Casto. Cam. Iuuba sylvestris, Cæsalp. V. Rhamnus solutius Dod. Gal. & fol. Thal. Cam. (licet pruno sylvestri sit similior, quàm Rhamno, à quo facultatibus discrepat) Rhamnus Catharticus, Lugd. Rhamni alia species, Trag. Cerui spina, Cor. hist. Spina Ceruina Marcello, Hermolao, Ges. hor. Spina infectoria, Lob. Clus. Pan. Cast. spina alba, Lon. spina Cerualis, Cæsalpino. Huius duas adhuc pumilas Clusius hist. pan. species proposuit.

Αλιμος

HALIMVS.

CAP. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, foliis oleæ, sed latioribus, nascitur in sepibus. † & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix conuulsa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulla pota: eadem lactis vbertatem facit.

† ἢ κρημονίης
addit Orib. i.
eminentibus.

I. HALIMVS VVLGVRIS.

anyus polulacoidis

II. HALIMVS LATIFOLIUS, erectus.

striperis halimus



Est profectò & Halimus planta, cuius varia sunt inter auctores sententia. Alij enim (vt Plinius auctor est libr. & cap. Halimi c. XII.) halimum fruticem esse dicunt, Dioscoridem secuti. Alij maritimum olus, salso sapore. Tertium quoq; genus addit Cræteus sub hedera tantum nasci, longioribus folijs hirsutioribusq; odore cupressi. Quæ autem à Dioscoride hoc loco descri-

Molochia
Mauritanis
quid.

Halimi vul-
garis descri-
ptio.

Halimi vires
ex Gal.

Nomina.

describitur, et si alicubi fortassis proveniat in Italia, tamen qui illam mihi ostenderet, adhuc reperi neminem. Verum si Ra-
ellio credimus frequens in Gallia nascitur in sepibus. Solimus plurimam in Creta nasci tradit, mirabili, si credamus, effectu,
quod ea tantum admorsa fames arceatur: unde si nomen adinvenisset, ea proculdubio sine aspiratione scribenda esset. Ha-
limus Mauritanis molochia, & atriplex marinus appellatur. Cuius historiam referens Serapio narrat, quod eam venalem
circumferentes in manuales fasciculos componunt, & per Babyloniā clamitant, molochia, molochia. Quod manifeste
indicat, Halimum apud Mauritanos herbam potius esse quam fruticem vel arborem, eamque fortasse, quam Plinius mari-
mā ac salsam prodidit. Quo fit, ut salsam quandam herbam (incolæ Bidone vulgò appellant) qua frequentissima in lit-
toribus Venetis provenit, hanc esse putaverim: quamvis non desint rationes, qua rem dubiam reddant: quippe quod ea in-
star oleris in ciborum usum recipiatur. Hec nimirum (ut eius pictura, quam hic damus, aperte demonstrat) folia fert oliva
similia, crassiora tamen, ac perinde ferè pingua, ut portulaca, subalbida, laeta, sapore falso. Caudes emittit plures à radice
albicantes, tenues & lentos, in quorum summitate semen profert minutum, racematim coherens. Nascitur frequens prope
Tergesti mœnia circa salinas, ubi etiam separatim, nec minus copiosa visitur atriplex marina, qua sylvestrem maxime a-
mulatur: quanquam apud Mauritanos atriplex marina, idem esse videtur cum halimo. Sed quod inter se differant, ma-
nifestum fiet libro secundo in atriplex commentatione. Halimi meminit Gal. lib. 6 simplicium medicamentorum, sic in-
quiens. Halimum, hæc planta frutex est plurimo in Cilicia præcipue provenit, ubi & germina eius recentia estant, & re-
ponunt quoque in posterum futura vsui. Semen pariter, & lac planta ipsa generat, estque gustus falsi, & subadstringentis. Ex
quibus omnibus palam est, ipsam esse dissimilem. Maior autem pars eius substantia calida est temperatè, cum humidita-
te inconfesta, & leniter flatuosa, & ut cætera salsa corroborat, adstringit & abstergit. Cocta ex iure, aut aqua addito oleo
aut butyro alium subducit. Idonea planta est Halimus ad sepiendos hortorum toros, quippe obsequiosa cum sit, facile quocumque
distribuitur. Quæ planta Græcè ἀδύπος, Latine similiter Halimus dicitur: Arab. Molochia: Italicè, Halimo: Venetis, Bidone.

Halimus id est, marinus, quod in maritimis proveniat: vel rectius, ut Plinius lib. & cap. 22. quod olus
sit maritimum salsum, cum & alibi quam in maritimis proveniat: apud Theophrastum Gaza Auronē ver-
tit 4. hist. 20. Halimi duo genera Plinio, mitius id est, sariuum, quod Tholosani in hortis habet & herbam
Colicam, ab usu, vocant: & sylvestre: tres habemus species, hæc verò dicitur Halimus tertius. Clus. Hispa.
Halimus primus tenuiore folio & Halimus sylvestris Plinii; Cæs. Portulaca marina, Dodo. gal. (cui vide-
tur secunda species Halimi apud Plinium) & fol. Lemnio (qui Halimum esse negat) Lugd. Lobeio, qui
an Crithmum sit Dioscoridis dubitat. II. Halimus latifolius erectus, C.B. frutex est omnino candidus, in
Rhamni altitudinem assurgens, qui ex radice dura, lignosa & ramosa multos protrudit ramos, crassos, li-
gnosos, at fragiles & leues: circa quos sine ordine nascuntur folia oleæ, sed latiora & breviora, interdum
rhomboidea candida, carnosa quasi splendens, acida gustu: flos in summis ramis muscosus, purpurascens
racematim coheret: cui succedit semen copiosum latum portulacæ marinæ simile. Æstate floret, semen
autumno maturefcit, qui Vlyssiponæ sponte provenit & Hispali in sepibus: in horto Montebelgardiano
legimus. Hic legitimus Diosc. Halimus & mitius genus Plinii, Auronem Gaza apud Theoph. vertit. Hali-
mus Lob. Halimus primus Clus. Hisp. Halimus alter latiore folio Cæsalp. Portulaca marina Dodo. fol.

Παλιυρος.

PALIURVS. CAP. CHII.

Paliurus frutex cognoscitur, aculeatus, durus: cuius semen pingue & fuliginosum inuenitur. Quod
potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium icibus aduersatur. Folia & radi. atri-
toriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium
morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita & imposita.

Paliuri confi-
deratio.

Paliuri histo-
ria ex Dioscor.

Paliuri Theo-
phrasto varia
historia.

Agrifolium.

Guilandinus
arguitur.

Paliuri histo-
ria Agatocle.

Paliuri descri-
ptio ex Plu-
tarcho.

Ades inter se quibusdam plantarum historiis discrepant scriptores, ut persæpe eorum mentes maxime perturbent, qui
rerum veritatem indagare student. Id autem discriminis nimirum euenit de Paliuro. Nam quæ huiusce stirpis a Dio-
scoride traditur historia, omnino differt ab ea, quam diuersis generibus protulit Theophrastus. Hæc autem non conuenit
cum ea; cuius Plutarchus est auctor, & hæc à prædictis omnibus, prorsus dissentire videtur. Paliurus Dioscoridis (ut ab ea pri-
mum exordiar) est frutex spinosus, durus, omnibus notus: cui semen pingue & fuliginosum. Paucis eius historiam persequi-
xit Dioscorides, nulla habita de foliis mentione, quæ superuacaneum existimauerit pluribus agræ de Paliuro, ut per se tanta
apud suas regiones notissima, quod nobis est impedimento, quod minus veram Paliurum, de qua ipse intellexit, cognoscere
valeamus. Theophrasto deinde lib. 3. cap. 17. de plantarum historia plura sunt Paliuri genera, quæ omnia in siliquis semina-
terna, aut quaterna proferunt, lentorem præ se ferentia, ut lini semen. Amat nasci locis aridis, quemadmodum & rubus,
nec minus quoque dilutis. Cæterum ab hac non parum differre videtur & illa, cuius idem meminit inferius lib. & cap. 4. si-
quidem hanc plurimam nasci testatur in Aphrica, folijs ei quæ in Græcia nascitur, non absimilem. Quæ quamvis forte Gre-
cam amuletur, fructu tamen diuerso provenit, ut qui non latus, neque folliculari specie, sed rotundus, ruberque sit, cui fructi-
bus magnitudine similis: cui & nucleus inest acinorum punici modo, qui non manditur. Fructus verò per se iucundus habe-
tur, atque si quis vinum infundat, tum ipsum suauiore, tum vinum suauius reddi aiunt. Ex quo aliquando mihi persuas-
si, eum non longè aberrare, qui dixerit, hanc illam esse stirpem, quam Plinius Agrifolium vocat: & nos AGRIFOLIUM
dicimus, quod folijs sit vndique aculeatis, loto maioribus, fructu cedri, rotundo, rubro, nucleum intus habente, iucundo & gu-
stui non ingrato: non tamen, quod pro certo hoc asserere velim, quod hæc propria sit Aphrica planta, sed quod aliquando
his notis persuasus putauerim, Paliurum hanc aut Agrifolium esse, aut omnino arborem sibi similem, non autem Zizyphum,
ut ille impudentissimus somniauit Guilandinus: siquidem zizyphi bacce rotunda non sunt, ut cedrides, sed oblongæ oliua-
rum modo, neque os intus habent punica malo simile, sed ut in Oliua longum, durumque. Plinius ex Theophrasto hanc i-
psam literis mandauit libr. 13. cap. 27. Sed cum de viribus eius differeret lib. 24. eam recensuit, quam & Dioscorides.
Nullam ego arborem hæcenus reperi, quæ Paliuro Aphricana similitudine respondeat, præter Agrifolium, ut dixi. Verum,
ut ad nostrum institutum redeamus, Agatocles Paliurum omnino, ab illis differentem tradit, quippe quoniam assurgat in
Alexandria (ut ipse inquit) ad Pinus, vlnique, proceritate, ramis frequentibus, & aculeatis, folijs virentibus, rotundo, tenui. Hæc
bisera est, nam tam Vere quam Autumno fructum profert oliua phaulis vocata, magnitudine. Crudus manditur
is, ac virens, ubi verò exaruit, in farinam molitur, atque ea ita estur nullo liquore subacta. Aliud Paliuri genus in mon-
te Coccygio nasci prodit Plutarchus ex Ctesiphontis auctoritate libro arboribus dicato, cui si auis, aut aliud animal vo-
lucrescidat, velut inuiscatum coheret, præter cuculum, cui soli parcat, si tamen his fides est adhibenda. Quare cum de Pa-
liuro res ac diuersæ serantur sententiæ, & habeantur historia, facile crediderim, Paliurum esse nomen ad nationem plantarum
variarum.

varijs ac diuersis aculeatis stirpibus impositum: etsi Iosephus Salandus medicus apprimè doctus, & in stirpium historia non imperitus, dum Veneta classe in Graciam traiecisset, Dioscoridis Paliurum se vidisse mihi pro certo affirmauerit, semi-
 ne fuliginoso, ac pingui: atq; ibi proprium adhuc nomen retinere. Sunt tamen è recentioribus, qui putent Paliurum Dio-
 scoridis eam esse arborem, quam nos sequenti capite oxyacantham esse pluribus comprobabimus. Sed profectò non placet
 eorum opinio, quòd planta, quam oxyacantham censemus, arbor sit, non frutex: quodq; fructum proferat: nymphi magnitu-
 dine, confertum, fragilem, rubrum, osiculos intus habentem, & in racemi modum coherentem. Paliurus verò non fructum
 sed semen ferat fuliginosum, pingue, & (vt Theophr. inquit lib. III. cap. XVII. de hist. plant.) in siliquis conclusum, lentum,
 pingueq; lini seminis instar. Verum qd fort. esse Theodorum Theophrasti interpretem sequentes, hac in re decipiuntur. Siqui-
 dem in libro primo cap. XVI. sic vertit: *Quaedam folia cum extremo, tum etiam lateribus sinuata concidunt, vt ilicis, robo-*
ru, smilacis (glandifera scilicet, & ilicis similis) rubi, paliuri, & aliorum. Vbi animaduertendum est, cum perperam vertis-
se Sarardi, & sinuata, cum ea dictio Gracæ nil aliud Latine significet, quàm spinis horridula. Error præterea, ex eo
manifeste deprehenditur, quod omnibus sensu pateat, ilicem, smilacem, rubum, folia non proferre aliqua parte sinuata,
vti ea esse cernuntur, quæ planta illi exeunt, quam nos acutam spinam arbitramur: sed longa, & per ambitum vbiq; te-
nuissimè, ac crebris aculeis circumsepta, vt in eiusdè capitis progressu idem ostendit Theophrastus, cum inquit. Simili mo-
do nonnulla ex his caulem primo nitent, post horridulam spinis gerunt, vt lactuca, & cuncta folia spinosa redduntur, atq;
etiam magis in fruticum genere, vt rubus, paliurus. Quibus palam sit, plantam, quam nos vulgò vocamus Bagaia, aliq; ve-
rò Amperlo, non esse Paliurum, sed potius acutam spinam hys turratationibus, tum auctoritatibus, quæ sequenti capite à
nobis adducentur. Caterum quoniam Paliurus AGRIFOLIUM siue AQUIFOLIUM (vt Plinius appellat) mihi

Recentio-
 rum opini-
 re probata, o-
 xyacantham
 paliurum sta-
 tuentium.


Gaza repre-
 henditur.

Aquifolii
 consideratio.

AQUIFOLII VA-
 rietas.

AQUIFOLIUM.

*Ille aquifolium
 Stans
 Spang. hiat*



in mentem reuocauit, non ab re factum esse putauit si de eius historia & viribus hic verba facerem. Est itaque Aquifolium
 planta arborescens, ad acute spinæ magnitudinem, folijs perpetuò virentibus, Lauri amulis, sed in toto ambitu per inter-
 ualla sinuatis, aculeatis, carnosis, solidisq; ac leuibus. Virgas eam virenti libro vestitas, lentas ac flexiles: baccas rotundas
 rubentem, Rusci emulas, & nucleo etiam simili, albo crassoq;. Arborefcit in syluis, & syluestribus locis. Radicum decoctio
 fontur: nullo articuli, qui prius luxati duritiem contraxerunt, nam emollit & resoluit, tumores discutit, & ossa fra-
 cta ferruminat. Id quod valentius præstat radicem ipsarum cortex excoctus & illitus. Folia suspenduntur circa funes, è
 quibus salte carnes sub tecto pendent, prohibent enim suis aculeis, ne mures accedant. Sunt qui è tuso radicem cortice arte
 quadam viscum parant ad aucupia. Sunt, qui etiam scopas ad verrendas domos è foliosis virgis parant. Ramis, quòd per-
 petuo virescat hac arbor, hyeme ornantur templorum fores, & ara, quos deinde in suas ades deportant rustici, putantes hi-
 sceramus fulgura inhibere, & fascino aduersari, gentilitatis superstitionem sectantes. à Plinio edocli: quippe qui scribit, A-
 quifolium arborem in domo aut in villa satam veneficia arcere. Eiusdem arboris flore (eodem auctore ex Pythagora) &
 quam gluciari legimus. Item baculum ex ea factum, in quoduis animal emissum, etiam si citta ceciderit defectu emitren-
 ti, ipsum per se se recubitu propius adlabi, tam præcipuam naturam inesse arbori. Censet idem Plinius lib. 27. cap. 8. Cra-
 teogonon, siue Crateogona Theophrasto eam arborem designare, quam Latini Aquifoliam appellant. Sed an is rectè senserit, ex
 Theophrasti lectione iudicare poterunt, rei plantaria studiosi: siquidem is ita habet lib. 3. cap. 15. de historia planta-
 rum. Crateogon, folio mespila, promisso scilicet est, verum maiori, latiori oblongioreq;, nec serrato, quemadmodum illa sit:
 hac non admodum magna neq; crassa. Materies ei versicolor, valida, fulua, cortex leuis, mespilo similis, radix singularis, a-
 cta in profundum. Magna ex parte fructus rotundus qui maturefcens siccat, nigrescitq;, gustu & succo mespilaccus, qua-
 propter veluti syluestri mespilus apparuerit, est specie simplex, & sine vilo discrimine. Hallucinantur qui hanc arborem
 Theophrasto Agriam, siue Ariam faciunt: atq; in eodem errore versantur, qui eandè existimant eiusdem esse crateogonon.

Aquifolii vi-
 rca.

Crateoga-
 non Theop.

Nomina.

Galenus Paliuri à Dioscoride descripti meminit lib. 8. simp. med. his verbis: Paliuri folia & radix aded non obsecram habent adstringendi facultatem, ut & ventrem fluentem cohibeant: aded digerunt, ut & phymata curent, quae quidem non admodum phlegmonode sunt & calida. Fructus porrò tantam obtinet incidendi vim ut & calculos vesicae comminuat: & pectoris pulmonisq; excretionibus auxiliatur. Πάλυρο; Graeci, Paliurus Latinis, Paliuro Italis pariter appellatur. Aquifolium autem vocant Itali Agrifoglio: Germani Walddisteln siue Stechpalmen.

Paliurus Dioscoridis idem fortè cum Rhamno tertio eiusdem, ita ut quae de Rhamno tertio dicuntur, ad hoc caput sint referenda. Theophrastus 3. hist. duo paliuri genera proposuit, alterum cuius semen in filiquis continetur, intelligens Dioscoridis Rhamnum tertium: alterum Paliurus Africanus fructu rotundo & rubicundo, ut Gaza vertit: Verum vox σπόγγυλον apud Theophrastum ex rotunditate oblongum significat: Hanc dicimus esse Iuiubas minores, quae de re inferius. Nunc de Agrifolio: aliquibus Paliurus Africanus Theophrasti: alius Crataegus eiusdem, cum quo tamen descriptio non conuenit, ut nec Paliuri apud Diosc. aliis hedera rigens apud Plinium: quibusdam Lauri species. Videtur Theophrastus 3. histo. 4. a γέρας vocasse, quo loci Gaza Aquifolium vertit: at 3. hist. 16. licet habeatur αειρά, αείρα legendum. Vocatur Aquifolia Trago (cui & laurus spinea, siue aculigera) Dod. Gal. (& Rufcus syluestris) Aquifolium Ruellio. Gef. hor. (& illicis aquifoliae genus, Paliurus aculeata) Lob. Cast. Thal. Lug. Tab. Agrifolium Dod. Cas. Cam. Ilex aquifolia, Lon. Paliurus secunda, Lac. Variat haec, quod aliquando in arborem excresecat, aliquando fruticosa sit: sic alia est cuius folia margine spinoso: alia folio non fimbriato, leui, extremitate tamen aliquando acuminata, aliquando non, ut figura adiecta exprimit.

O'ζάραδα

ACUTA SPINA.

CAP. CV.

Oris. hae non habet. b. & xpa. d. † Non legit Catacuz. c. & uylwa. i. nucleos leg. Oris.

Acuta spina confid. & historia.

Acuta spina non est offic. Berberis, siue Crespinus.

Crespini cum pyraastro & acuta spina collatio.

Acuta [spina, quam pyrinam, aut pityanthen aliqui vocant,] arbor est b. pyraastro similis, spinosa valde, & minor: baccas profert myrti, plenas, rubras, † fragiles, & intus c. nucleum: radicem multifidam, alte descendentem. Huius baccæ potu, aut cibo, alui profluuium, & abundantiam foeminarum sistunt. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice venter aut sensim feriat, aut perungatur.

Habet pro comperto tota recentiorum medicorum familia, quod arbor Dioscoridi O'ζάραδα, id est, acuta spina, vocata, quam Mauritanii Berberim dixerunt, ea sit nimirum arbuscula spinis horrens, quam rura Tridentina, ubi in septibus, syluis & conuallibus frequentissima nascitur, Crespino vulgò nominant: meduorum vero vulgus ac officina Arabes se acute Berberim appellant, ita esse certò credentes, ut opinione ducuntur. Veruntamen si rectè delineationes notaq; perpendantur, quas oxyacantha reddidit Dioscorides, crespini notis prorsus acuta spina reclamare constabit. Quae potissimum ratione adductus, quo magis veritas eluceat, errorisq; nebula tollatur, non dubitavi eorum opiniones resellere, qui inter recentiores medicos de stirpibus commentaria conscribentes, Crespinum vocatum legitimam oxyacantham esse assueverunt. Neq; me fugit, non parum suscepisse negotij, ut eos à concepta iamdiu opinione in sententiam nostram, quam veram putamus, venire compellam, cum magna admodum sit tum medicorum, tum seplasiariorum turba, quae hac in historia longo usu aberrat. Verum cum compertum habeam, quod veritas sit niue candidior, soleq; splendidior, & eorum tum vera, tum fidei comites, qui virtutibus ac probitate praestant, duxi meae rationis multiterum auctoritate comprobatae, nullam horum doctissimorum virorum auribus molestiam allaturus, qui nolentes aberrarunt: quinimo his, ut pote veri defensoribus, fore iucundissimas atq; gratissimas. Nam qui, ut sibi placeant, malunt errare quam veritati & aequo cedentes, errores cognoscere, eosq; corrigere, non sunt in philosophorum ac rationabilium hominum numero recipiendi. Sed ne apologeticis verbis tempus conteratur, rem institutam aggredior. Dioscorides acutam spinam arborem esse pyraastro similem scribit, minorem tamen, magisq; aculeatam, fructuumq; gerere myrti similitudine, plenum, fragilem, rubentem & intus nucleum, cui radices subsint multifidae, atq; descendentes. Ex quo palam est, ipsum non alias acuta spina notas expressisse, quam proceritate, crassitudineq; stipitis, ramorum, radicem ac fructuum, omissa foliorum, florum, & corticis historia. Folia apud hortensis modo diuisa, sed longiora: floribus racemosis ac candidis: cortice scabro, et materie pyraea. Quae omnia ipse accuratè perpendens, in primis Crespinum omnibus notis pyraastro reclamantem comperio, cui tamen prorsus ad stipulari acutam spinam Dioscorides est auctor. Siquidem syluestris pyrus, quemadmodum & oxyacantha, simplex è solo prosilit, atq; unico duntaxat caudice attollitur, ac inde tam in longum latumq; crescit, ut ad communem arborum proceritatem assurgat. Crespinus vero, cuius sanè innumera mihi pra oculis quotidie sese offerunt planta, nullum ab radicibus mittit caudicem, sed pluribus ac diuersis aculeatis stolonibus fruticat, qui virgarum modo in altum se attollunt, nec vnquam arboreseunt, nisi raro, & longo temporis tractu: quippe qui omnium maiores habentur, pollicarem crassitudine rarissime excedunt, nisi atate longa incrementum susceperint: quin & rara inveniuntur eius virgulae, quae hominis longitudinem aequent. Ad haec pyraaster cortice constat aspero, squamoso, inaequali, crasso, colore in nigro rufescente. Crespinus vero cortice vestitur albo, leui & admodum tenui: quo fit ut non adeo leniter ferro, vel lapide tangi possit, quin statim cortex frangatur, & crocea ligni materies detegatur. Praeterea pyraaster prunorum modo aculeata conspicitur, aculeis singulis ex eodem loco erumpentibus. licet rami frequentissimis horreat spinisq; nigris, validis, candidi rhamni modo mucronatis. At crespinus ternis per intervalla armatur aculeis, simul ex vno, eodemq; puncto prodeuntibus, adeo ut trifurcato ordine prodeant, duobus scilicet vtrinq; se pendentibus, tertio vero mediū occupante, albis, planis, non quidem rotundis, fragilibus, & admodum pungentibus. Illud in super discriminis addam, acuta spina fructum asferre myrti magnitudine. Crespinus vero racematim in vna modum, cuius oblongi acini tritico paulo maiores, viuidi ac rubentes, elegantiq; racemis adnexi, puniceos acinos quadantenus representant: quanquam minores, oblongiores, acidiores, & colore etiam multo viuaciores habeantur. Crespini deinde folia minimè pyrastrum referant, sed potius puniceum malum, quamuis latiora, nec adeo in mucrone desinentia, per ambitum spinis tenuissimis, frequentissimisque horrida. Radices etiam, quae pfecto aequè flaua sunt, ac si croco essent infecta, etsi plures sint, atq; exiles, nihilominus alte non descendunt, veluti acuta spina, sed in latus summo cespite vagantur. Flos deniq; pyraastro admodum refragatur: namq; melius ex racemo vna simili erumpit, sui fructus interno colore, a quo dum explicatur atq; debiscit, perquam suauè spirat odorem. Quibus euidentissimè colligi potest, & oxyacantham Graecis, & berberim Arabibus non esse crespinum, cuius communis est usus apud medicos & seplasiarios. Sed praeter haec illud etiam certò credendum est, quod si Dioscorides per acutam spinam crespinum intellexisset, nunquam silentio dissimulasset folia mirabili opere per ambitum aculeata: neq; fructum, quem rami pendulum gerit, acinum inter se racematim

namque coherentibus, myrti bacis assimilasset: nec scriptum reliquisset: radices in profundum agi: nec denique flauum eorum colorem unquam retinisset, quo insigniter natura infecta sunt. Non praetermisisset etiam spinarum historiam, ut patet quae terne suis virgibus innascentur, à pede ad verticem: non corticis candorem, non tenuitatem: non item, quod sepius sine candore, variis veluti stolonibus fructet: non denique ipsam pyraastro prorsus similem reddidisset, à qua profecto non minus distat, quam quercus ab olea. Ceterum si modo dicendum est, Oxyacantham nasci in Italia, eam equidem ac-

Legitima oxyacantha.

I. ACUTA SPINA.

II. OXYACANTHA DIOSCORIDIS.



leam arborem esse crediderim, stipite, cortice, ramis, floribus, proceritate ac ligni materie planè pyrastrum referentem, quam in Hetruria rura nostra Senensia Bagaia vulgò nominant. Ananienses, & ceteri Tridentinarum vallium incolae quidam Amperlo, quidam verò Pan d' orso vernaculis nominibus vocant, & Goritienses barazzo bianco vulgari sermone appellant, quippe qua omnibus notis ac lineis acutam spinam referat. Primum enim hac manifesto indicio esse possunt, arborum scilicet stipites, rami in qualibet parte acutissimis, firmisq; aculeis armati, ligni materies, subscaber squamosusq; cortex veluti pyraastro. Tum ita esse comprobant radices in profundum descendentes, & fructus, quem fert myrti crassitudine, visu incandus, rubescens, plenus, fractu facilis, ori subausterus, in quo modo vnus, modo plures concluduntur nuclei. Flos etiam, quem album edit, pyraastro admodum adstipulatur: quippe quòd sit illi haudquaquam absimilis. Porro folia dumtaxat à pyraastro distat videntur: nam dissecta sunt apij modo, paululumque longiora. Verum mihi quidem illud non videtur ob multas rationes aliqua ex parte nostra repugnare sententia: conuenientias enim pluribus ex partibus percipitur, non autem ex paucioribus. Quali ergo acuta spina vireas fronde, hic non explicauit Dioscorides, sed tantum dixit, eam esse arborem pyraastro similem, quemadmodum Arbutum Coronea malo, & ilicem & sagum Quercui, idem comparauit Dioscorides, quòd magis ad stipitis, ramorum, corticis, florum delineationem, & ligni materiem respicere, quam ad folia, qua nihilominus laciniata constant apij modo: tamen si hoc in loco id adnotare praetermiserit Dioscorides. Hoc autem probatur manifesto ipsius Dioscoridi, ac etiam Theophrasti testimonio. Nam Dioscorides, cum de mespilo dicit, duo mepilorum genera constituit, & relicta in capitis calce vulgata, qua frequens, & communis visitur in Italia, illam in praesens descripsit, qua Neapoli nostra tempestate vulgò Azarolo vocatur, & veteribus aronia dicta est, sic inquit. Μισπύλον τὸ δένδρον ὁ παρ' ἡμῶν ἀρονία καλεῖται, ἀκαρπία δ' ἐστίν, ὁμοίον ποτὶ φύλλον ὁ ξυανκάνθη. καρπὸν φέρον μισπύλον ὁμοίον ἰνδῶν: id est verbum ex verbo. Mespilus arbor, qua à nonnullis aronia vocatur, spinosa est, similis folijs oxyacanthae: fructum ferens exiguo malo similem, suauem. Quib. autem folijs constet illa mespilus Azarolo vocata, Theophrastus lib. III. cap. XII. demonstrauit his verbis. Huius folia dissecta sunt, extremitateq; apio similia. Ita fit, vt concludam oporteat, si mespilus aronia folio oxyacanthae prouenit, eòq; scisso (vt Theophrastus prodidit) apij instar, hanc spinosam arborem Bagaia vulgò dictam, esse proculdubio acutam spinam: quandoquidem eius folia in modum apij dissecta sunt mepili aronia modo. Theophrastus lib. VI. cap. vltimo de historia plantarum scribit, oxyacantha fructum fuisse antiquis in coronarum vsu, quòd etiam nò parus est argumento, illam legitimam esse oxyacantham, quam in medium attulimus: quandoquidem fructus eius, qui autumno toto, & ad mediam hyemem vsque perdurat, aded lenore quodam pellucet, ruboreq; decoratur, vt globulos è praestantiori corallio paratos referat: id quòd in coronis maximè praestasse crediderim. Hanc nostram de oxyacantha sententiam, duobus argumentis impugnant Antagonista. Primum sane est, quòd nostra folia decidunt, Theophrasto verò perpetuò acuta spina vireat. Secundum quòd ipsius etiam Theophrasti testimonio Acuta spina aculei ijs similes habeantur, qui in Medica malo proueniunt: qua tamen non magno quidem labore dissolui, ac conuinci possunt. Siquidem vt reperitur fabulosum apud Theophrastum lib. primo cap. xv. de hist. plantarum, Tiliam & Myricam perpetuo fronde virecere, & libro tertio cap. 16. Suber folio esse haud perpetuo, sed deciduo. ita pariter de Oxyacantha dicitur:

Mespili duo genera.


Antagonistarum arguta confirmata.

xerim: sed verendum est potius ne in hoc capite, quemadmodum in alijs plerumq; locis, plura deprauata legantur, quia quod in his aberrauerit Theophrastus. Quod autem ita sit, maximo est mihi argumento Plinius, qui plantas perpetua fronde videntes ex Theophrasto transcribens lib. 16. cap. 21. ibi nec Tilia, nec oxyacantha meminit. Id quod manifeste arguit in Theophrasti codice hac baudquaquam adinuenisse Plinium. Sed non desunt etiam Theophrasti exemplaria quae *αξάρδος*, non *ὄξυαξάρδος* legunt. Praeterea si Dioscoridis, & Galeni testimonio Oxyacantha fuerit pyraastro per omnia similibus, ut aduersarij contendunt, nusquam hanc perpetuo virescere dicam, sed vnà cum Pyraastro folia hyeme amittere. Quantum verò ad aculeos attinet, si quis Theophrasti verba diligentius, quàm illi fecerint, expendere, ea nihil prorsus pro eisdem affirmare comperiet. Inquit enim Theophrastus de mali Medica aculeis agens, *αξάρδος δ' ἐστὶν ἄπλοῦν ὄξυαξάρδος*. Id est spinas quales Pyri, aut Oxyacantha. Atqui cum domestica Pyrus nullis rigeat aculeis, de sylvestri intellexisse illum necesse est: verum quantum agrestis Pyri aculei, à mali Medici aculeis differant, quisquam per sese videre poterit. Quo sit in Theophrasti verba nil aliud exprimere putarim, quàm quòd Medica malus aculeata sit, ut Pyraaster, & Oxyacantha: non autem quòd harum arborum aculei sint omnino similes, ut perperam ille interpretatur. Postremo quòd bacca, quas nostra profert acuta spina, sint dulces, ut ultimo loco contendit illorum vnus, nec astringant, sed potius adstrictos muliebres locos ducant, id omnino iudicabunt, qui sapidiori gustu ac saniori à natura fuerint procreati, quiq; aliquando huiusce plantae fructus periculum fecerint. Reliquum igitur est, ut dicamus, Crespinum aliud esse ab Oxyacantha, plantamq; ideo fuisse veteribus incognitam, quòd eorum nullus, qui de plantarum historia scripserunt, huius aculeata stirpis (quod ego sciam) meminere. Porro CRESPINVS frutex potius, quàm arbor est, è terra virgultis plurimis siue aculeatis stolonibus assurgens.

Crespini forma & vires.

III. CRESPINVS.

IIII. VVA SPINA.



Berberis vulgaris
Sicuti



Rubus fruticosus
Sicuti

Vinum Berberis & eius vus.

Vus spinarum mentio.

veluti corylus: è quibus non desunt, quae quandoque longo temporis tractu, agrè tamen, arborecant. Haec ab imo ad summum spinis quibusdam acutissimis horret, longis, compressis, albicantibus, fractuq; minime contumacibus, quae (ut supra dictum est) per interualla terna ex eodem prodeunt puncto. Cortex toti planta candidus, lanis, ac tenuis: cui subest ligni materiae flaua, fragilis atq; fungosa. Numerosis tota virgultorum congeries nititur radicibus impensè flauis, quae per summam terram diuagantur: folijs ferè punice, tenuioribus tamen, latioribus, minusq; in mucronem extensis, per extremam ambitum minutissimis spinis circumseptis. Flores emittit ineunte Maio luteos, racematim coherentes in vna ferè modum, & odore non ingrato. Quibus postea succedit fructus acinis oblongis, racemo pendulis, qui maturitate maxime rubent, punice mali acinis baudquaquam ab similes, quanquam figura longiores, gustu acido, & subaustero, paruis reconditis intus nucleis. Nascitur in sepibus, fruticibus, ac senticosis locis. Bacca refrigerant & siccant, cohibent, roborant, & adstringunt. E fructu post vindemias intola vinum exprimunt, quod falso de Berberi vocat officina: cui austeritatis acidit atq; longè plus mellis, quam mali punice succo. Quod si in acutis, perniciosissiq; febribus, vti causus, & quae pestilens est, iulapio violaceo commistum, ac oxalidis aqua agrotantibus exhibeatur, non modo sitim restinguit, ex prisana haustum, sed biliosas, pestilentesq; exhalationes supprimit. Datur vtiliter cum myrrino & aqua plantaginis, coliacis, cibum reijcientibus, & dysentericis: ubi bilis à iocinore in ventriculum regurgitans cholericos excitauerit affectus. Non secus tam sumptum, quam inditum mensium profluvia cohibet. Tineas ventris enecat ac pellit, praesertim si bibatur ex aqua graminis, vel portulacae, vel abrotani, addito sacchari tantillo. Prodest cruentis excreationibus: firmat commotos dentes, si eo sapius soueantur: quinetiam gingiuas roborat, & gargarizatu faucium vnaq; inflammationes discutit, columellam proidentem reprimat atq; destillationes eo confluentem reprimat. Vulsura recentia in carnis superficie glutinat, & vlcera serpentina cohibet, & humida desiccant. Nihilominus nocet his, qui ex flatu, ac frigida laborant ventriculi doloribus, atq; etià agrè spirantibus: datur etià vtiliter ad iocinoris inflammationes. Confert oculorū destillationibus, lacrimasq; cohibet, vbi guttatim in oculorū angulis destilletur cum pompholyge, & aqua rosarū. Caterum postquā acuta spina historia eò me deduxit, ut de nonnullis alijs aculeatis stirpibus differerem, non erit ab re, ut plantarum facultas augeatur, si illam addiderim plantam, quae folio etiam apud constat, & vndiq; spinis riget, ab aliquibus VVA SPINA, à nonnullis Vva marina, & a pluribus Vva crespina vocata.

Plantae haec antiquae (ut puto) incognita, arbuscula est parua, fruticosa, folio apii, aut oxyacanthae: ramulis ac virgis
albicantibus, vbiq; aculeatis. Duorum est generum. Salsina altera, altera sylvestris ac sponte prouenies. Flos vtriusq; albus, & quan-
doq; ex viridi purpurascens. Vna profert non racematim coherentes, sed baccarum more dispositas: eadem facie sicut rotun-
da, pilosa, praesertimq; sylvestres: succo abundant plurimo, vinoso, sapore acido adstringente, adeo, ut prorsus omphacinum refe-
rant. Color illis ante maturitatem viridis, at qui maturefcentes colore vna cum sapore permutant, siquidem flavescent, & suc-
cum subdulce reddunt. Habent & nucleos, fragiles tamen, & imbecilles, adeo ut vna cum fructu mandantur. Leguntur ante
maturitatem. Maio mense, ac Iunio. Salsina in hortis, pomarijs & vineis feritur. Sylvestris in sepibus, & senticosis locis sponte
prouenit. Frigida sunt, & sicca astringentes, & in cibus omphacii loco grata: nam iusculis incocta appetitum excitant. Qua &
febricitantibus, iusculis incocta non sine utilitate exhibentur, sitim sedant: in summa mulieribus, utero gerentibus magnopere ex-
petuntur, grauidorum malicia succurrunt. Dantur demoranda coliacis, dysentericis, & cruenta exspuentibus. Huic accedit
& altera planta, veteribus, quantum reor, incognita, & siluetio innoluta, quam aliqui falso Mauritanorum RIBEM esse contem-
dunt. Duum est generum, domesticum & sylvestre. Parua vtriusq; est

Vua spina duplex.

Vua spina v- sus.

Ribes officin. confid.

V. RIBES VVLGARIS.

arbor. Ea fruticosa est, topiaria, folio paruo, vitigineo, perinde ac alba populo, sed longe viridior: ramuli sunt ei lenti, ac flexi-
biles, e quibus fructus paruarum vuarum modo, ut in cressino, racema-
tim dependet, rotundus, simulq; coherentibus, acinus magnitudine piperis, qui maturitate adepti maxime rubent, sapore subacido
& adstringenti, admixto et dulci: fleret mense Maio, floribus in lu-
tea candidantibus, & in stella modum radiantibus. Vulgaris est plan-
ta, in hortisq; frequens: quippe quoniam domestica ad sepiedos hor-
torum puluinos eleganter seratur: sylvestris nascitur sponte in Bo-
hemia, in syluestis collibus, & in alijs Germania locis. Verum eos
hallucinari abunde constat, qui putant, hanc arbusculam esse A-
rabum Ribem. Siquidem, ut posteritatis memoria prodidit Serapio,
Ribes est arbor, praefrens capreolos colore viridi rubescente, & so-
lia lata, magna & rotunda. Quas sane notas huic non respondere
satis notum est: neq; n. fert haec capreolos, neq; eiusmodi folia vi-
ret, tamen si fructus Ribis admodum referat, quod is gustus sit acidus
simul & dulcis, quale esse Ribis baccam auctor est Serapio, excusat,
adstringunt & roborant, quamobrem u ad ea, quae ille iure pote-
rit usurpari, utpote quod febribus acutus opituletur, aestuante ven-
tre culu refrigeret, sitim restinguat, nauseam & vomitiones sistat,
cibi appetentiam incitet, coliacos & hentericos mouet, & biliosis
defluxionibus, ves. etos sanguinis seruore demulceat, bilis acrimo-
nia retundat, impetuumq; domet. Quare non damnandi, quin po-
tius laudandi videtur seplasiary, qui ex huiusce arbuscula fru-
ctu vinum exprimit, & per annum asseruant, ut illud Ribis loco
medicamentis immisceant. Non desunt, qui id esse hanc plantam
arbitrentur, q Galenus lib. 7. de compositione medicamentorum se-
cundum locos vrsi vna appellat. Quorum error satis ab ipsomet Ga-
leno refellitur eodem loco: quandoquidem asserit huiusce vuae plan-
tae fructum designat lib. 7. de simplicium medicamentorum fac.

Error quorundam Ribes Arabum credentium.

Ribes officin. vsus.

Vua vrsi Gal.



tem memora. Yli folio v. rescere. Memacylum. n. Galeno, etsi Arbuti fructum designat lib. 7. de simplicium medicamentorum fac.
du. quando tamen ipsam quoq; Arbuti plantam designate videtur, ut loco superius citato, vbi Gal. continens pro contento ac-
cipiens, Arbutum Memacylum appellauit. Inquit. n. quae vrsi vua appellatur, in Ponto nascitur. Planta est humilis, & frutico-
sa. folio Memacyli. Ceterum cum magna differentia habeatur inter Ribis folia, quae vitiginea sunt, & Arbuti quae Laurina
emulantur, explodenda est omnino Dodonaei sententia, quippe qui nulla dubitatione censeat vulgarem Ribem vrsi vna esse
Galeni, sua tantum opinione falsus. Bellonio vero in libro de arboribus coniferis, Ribes Serapionis planta quadam censeatur, quam
seruasse scribit in monte Libano ad supremum cacumen, foliis oxylapathi, grandioribus, retusioribusq;: e quorum medio race-
mum exeunt bacca rubetes, ut in hippoglossis, rusco & lauro Alexandrina. At certe ego non audeo, nec possum Bellonii in-
ter subscribere, q plantam illam non respondeat notis, quibus Ribis tribuit Serapio. Ea. n. folia non fert rotunda, sed oxylapathi, non
habet capreolos, & baccas e medijs folijs exerit. Vnde facile adducor, ut putem eius Ribem falsam & adulterinam esse potius, quam
vram & legitimam. Oxyacanthae meminit Galen. lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit. Oxyacanthus, arbor ut pyro-
syluestri similem habet speciem, ita & vires non dissimiles: quin & ipsi fructus, pyri quidem syluestri absolute acerbis est, cate-
rum oxyacanthae, & tenuius est partium, & paulum quiddam incisuum obtinet. Porro arboris huius fructus pyri syluestri fru-
ctui similis non est, verum myrti, scilicet rubens & rarus. Habet vero & nucleos. Porro non esus tantum, sed & bibitus affectus o-
mnes fluxionum, quos foedus est Graeci vocant, cohibet. Hac planta Graeci oxyacantha nominatur: Latini, Acuta spina: Arabi,
Amirberu, seu Amyrbaris siue Berberis: Italis Hetruscis, Bagaria, & Ananiensibus. Amperlo: Hispanis, Pirlitero, & Pirliteras,
Germanis Hagdorn: Bohem. Hloc. Cresspinus vero officinis Berueris: Italis Cresspino: Germ. Saurach, Saurdorn vñ Paur-
selber, Bersich: Bohem. Drac siue Drifal: Gallice spine vinette dicitur. At Vua spina siue crispa, Ital. vocatur vua spina
siue vua spinella, vua marina: Germ. Klosterbeer siue Kreuzbeer: Bohem. Chlupate j. abody: Gallis Groiselier. Ceterum vul-
gari Ribes Italis vocatur vuetta rossa, & Ribes: Ger. S. Johans treuble: Bohem. vuyno S. lana: Gal. Groiselles d' outremier.

Dodonaei arguitur. Bellonii opinio impro- bata.

Oxyacanthae vites ex Gal.

Nomina

Oxyacantha à Dioscoride proponitur, at Galen. 8. simp. & clarius libro de facultatibus alimentorum, prae-
ter oxyacantham habet & oxyacanthum. Oxyacantha i. acuta spina Diosc. est oxyacanthus Galeni: à veteribus. La-
tinis simpliciter spina dicta, quae tribuitur ei quae vulgo oxyacantha nomine ostenditur, quam alii ad Cy-
nosbatum Theophrasti (non autem Diosc.) nec adeo male referunt: huius vulgo cognitae nomina lubiiciamus.
I. Oxyacantha apii folio. C. B. spina Callobrix Palladio: Spina candida Marcello, Anguil. Cynosbatos Trag.
Lon. Sorbus aculeata, Cor. hist. Oxyacantha seu pyracantha, Cor. in Diosc. Oxyacantha Diosc. Dod. gal. Gef.
hor. cui & spina appendix Plin. Oxyacantha, Lac. Lob. Lug. Tab. Cam. Cae. cui Anthemis Theoph. & Mespilii
tertiu genus apud Plinium videtur. Oxyacanthus siue spina acuta Dodo. Mespilus syluestris Castori. II. Ve-
rum cu Diosc. pyraestro & Galenus pyro syluestri similem dicat, alteram adiecit figuram, quae melius emulde-
scipione

scriptione conuenire videtur. Hæc ex radicibus crassis, multis, caudicem emittit rectum, firmum, cortice subcinereo rectum: qui in multos ramos longos latè diffusos brachiatur, quos inordinate cingant spinæ validè erectæ, atrociter pungentes, quib. superiores rami sæpè destituuntur: foliis est aliquando rotundioribus arbuti instar, aliquando ad modum pyrastrii oblongis, aliquando etiã acuminatis, in ambitu tamè dissectis, venosis: flosculi ex quatuor & quinque foliolis cõpositi, paruis pediculis insidentes, acervatim congesti, ex luteo subrubet; ex quorũ medio aliquot breuia stamina prodeunt: his succedunt fructus forma oxyacanthæ vulgaris, rotundi, umbilicati, densius coacervati, ex aureo ad cocciniũ vergentes, acidi gustus, in quib. granula aliquot continentur. Prouenit sponte in sepibus circa Bononiam, in agro item Senensi prope Alcinum montem: & in Alpinorum gentium Ebrodunensium saxosis conuallibus. Sunt qui pro schamno, alii qui pro Pyrocantha ostendant. Vuam vsũ Galeni 7. de compos. med. secundum loca, Lugdunensis herbarii auctor censet, Acutæ spinæ nomine Castor Durantes exhibet. Oxyacantham Dioscoridis censemus, & ad differentiam vulgatæ, oxyacantham pyrastrii folio nominare lubet. III. Crespinus Matthioli oxyacantha Dioscoridis non est sed Galeni (non autem oxyacanthus) id est spina acida, cum non solum fructus, sed & folia sint acida eius nomine ad ciborum condituram vsurpata: spina appendix Plinii lib. 24. cap. 13. Arabum est Amirberis fructu longo acido, non autem rotundo: vnde deprauata voce officinis dicitur Berberis, sic & Brus. (cui & spina acuta) Dod. Gal. Lac. Ges. hor. Lob. (spina sancta quorundam) Lugdun. (quibusdam Colytea Idæa secunda Theophrasti) Lon. Cast. Cam. Oxyacantha Diosc. Hermolao, Ruellio, Trag. Fuch. Comaro. Oxyacantha Galeni, Cord. in Diosc. Taber. Camer. Crespinus Cæsalpino, qui Ribes Serapionis suspicatur: Spina acida siue oxyacantha Dod. In hortis Italiæ nomine spinæ Christi colitur, cuius folia ratione culturæ, multò sunt longiora, spinis dein duplo maioribus flauescens, dimidiam stellam efformantibus. IV. Vua crispa (ab intortis & veluti crispis foliis) licet quibusdam Rhamni species, aliis Oeson Candidum Theophrasti, aliis Vritis precia Plinii censeatur, attamen Ceanothum spinam Theophrasti credimus. Vua crispa, Trag. Fuch. Dod. Gal. & fol. Lon. Ges. hor. Lob. Tab. Vua spina, Lac. Cast. Cæf. Crispina vua, Cord. in Diosc. Ceanothus asper, Ges. hor. Grossularia Thal. Grossularia alba (quod grossorum exiguorum imaginem referat) Lugd. Variat, quòd domestica frutescat & fructu sit cerasi magnitudine: sylvestris per omnia minor: fructus item maturus flauescit, nonnunquam subrubet. V. Ribes vulgaris. Ribes hortense, Trag. Ribes, Fuch. Lac. Lon. Ges. hor. Taber. Ribes Arabum, Lob. Ribesium fructu rubro & Ribes Serapioni, Dod. Vua vsũ Galeni, Dod. Gal. Ceanothus leuis, Ges. hor. Grossularia rubra, Lugd. Ribes vulgare baccis rubris, Cam. Hæc duplex, communiter in hortis colitur fructu subacido; in montosis tamen Bernensium & Marchionatus sylvestribus sed fructu per omnia minore, baccisq; rarioribus reperitur: habetur & fructu dulci, aliàs à vulgari nil differens: sic & illius species quædam rubro flore, foliis & fructu maioribus: in horto Illust. Ducis VVirttembergici Strugardiæ baccis habetur vnionum instar candidis. Est & fructu nigro, Ammomum quibusdam, maioribus quoque & minoribus baccis varians. Bellonius meminit & Ribes foliis oxylapathi: alia tamen est Rauvolhj figura.

Kuvio Calo.

RVBVS CANIS.

CAP. CVI.

Rutæ est arboris instar, rubo longè maior. Folia fert multò latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido: fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum fistit: seruefacti enim in vino, morpoti, arteriam infestant.

Rubum canis non esse rosam sylvestrè.

Non equidem putauerim esse Rubum canis illud rosarum sylvestrium genus, quæ rosas edunt ijs quadantenus similes, quas Moschette vulgò vocamus, quæq; rubentes baccas rosarum fructibus non absimiles, licet minores, proferunt: nec etiam quoduis aliud sylvestre rosarum genus, quemadmodum nonnulli existimant. Nam si ita res se haberet, sat erat Dioscoridi dicere, quod canis Rubus rose similis esset, non autem quod arboris instar assurgeret, rubo longè maior, quodq; folia ferret myrto latiora, à quibus sylvestris rosa profectò plurimum disidere videtur, fructumq; mittere non modò oliuarum nucleis, sed oliuis ipsis multo crassiores. In eam autem sententiam non modo me pluries deduxit, sed etiam confirmavit Plin. quandoquidem ipse lib. VIII. cap. XII. peculiari nomine rosam sylvestrem cynorrhodon appellat, id est, caninam rosam, non cynosbaton. s. caninum rubum, cuius radicem ad canis rabidi morsum miris laudibus extulit. Quod iterum asseruit lib. XXV. cap. II. vbi illud etiam addidit, quod apud veteres nil aliud cynorrhodon erat, quam spongiola illa, quæ mediis sylvestrium rosarum ramis oboritur. Ceterum cum de cynosbato, hoc est, canirubo idem differeret, eum à rosa sylvestri longè diuersum fecit, vt videre est libro XXIII. cap. XIII. vbi ait, cynosbaton folio esse vestigio hominis similem. Huc illud etiam accedit, quod postè scriptum reliquit Theophrastus lib. III. cap. XVIII. de plantarum historia, vbi sic inquit. Canirubi fructum subrubrum parit malo panico similem: est inter arborem & fruticem medius, & panica proximus, folio viticis. Ex quibus palàm est, non parum inter se habere discriminis canirubum, & sylvestrem rosam, de qua postea libro & cap. VI. particularem tradidit historiam. Vbi cum primùm satiuas rosas longa profectus fuisset oratione, de sylvestri ita paucis disseruit. Sylvestres rosa domesticis asperiores tum virgis, tum foliis constant, & florem minus odoratum minusq; coloratum, nec tanta magnitudine ferunt. Quare pro comperto habetur, aliud genus esse rosam sylvestrem à canirubo, quorum alterum κυνόρροdon, alterum κυνόσβαλον à Græcis appellatur. Quocirca manifesto in errore fuisse deprehenditur Marcellus Dioscoridis interpres, & commentator: quippe qui idem esse crediderit cynosbaton, & cynorrhodon, non animaduertens, quàm illa inter se dissimilia fecerit Plinius sibi familiarissimus. Hunc forsitan secuti Monachi in Mesuem scribentes, ipsi quoq; in eundem lapsum inciderunt, credentes sylvestrem rosam legitimum esse canirubum. Quibus præterea animo exciderat, Dioscoridem scripsisse rubi canis fructum oliuarum nucleis esse similem: quandoquidem ipsi illum pyræ compararunt: ex quo aliquis facile iudicabit, hos nullam canis rubi cognitionem habuisse. Ad hæc non reperio, quod dixerit Dioscorides, canis rubi fructum semen aliquod includere, quo tamen rosarum sylvestrium fructus refertus inuenitur: sed lanosum quoddam continere dixit. Accedit his Serapionis auctoritas, qui de canino rubo inter alia rubi genera egit, non autem inter rosas: quod omnino compertum haberet, hunc à rosis quam plurimum differre. Illud insuper addi-

Martelli & Monachorũ lapsus, cynosbaton & cynorrhodon idem credentes.

Serapio de canino rubo.

adhiberi, quod cum rose sylvestres ferè omnes non leuiter ex albo purpurecant, cynosbato verò flos perpetuò sit candidus, non est legitime asserendum, sylvestrem rosam esse cynosbaton. Ex his igitur omnibus satis (vt arbitror) liquet, canirubum à sylvestri rosa longè abesse, tantoq; magis, quod memoria prodiderit Theoph. lib. 9. de plantarum historia, canina flos fructum auerso flatu colligendum esse, alioqui periculum oculis imminere. Quod aperte demonstrat, super eo vel tenorem quandam lanuginem, vel quid puluerulenti insidere, quod si à ventò expellatur in colligentium oculos, facile his cecitatem inducat, quod tamen in sylvestrium rosarum fructibus nunquam visitur. Sed nescio quo iudicio quare auctoritate Cynosbati plantam nasci apud Pelignos & Etruscos scribat aduersarius quidam, eamq; arbores scandere, quum manifestò scribat Dioscorides fruticem esse arboris instar, & posteritatis memoria prodiderit Theophrastus Canirubum medum esse inter arborem & fruticem, malo punica proximum. Meminit Rubi canis Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum sic inueniens. Huius fruticis fructus non segniter adstringit, folia verò mediocriter: itaque particularis eius vsus haud ignotus est. Cauendum ab eo, quod in fructu eius lana speciem habet, ceu arteria infestum. Frutex is Grace *κυνόβατος* vocatur. Latine, Rubus caninus: Arabice, Sent: Italicè Rouo canino.

Rubi canis vires ex Gal. Nomina

LIGVSTRVM. CAP. CVII.

Ligustrum arbor est oleæ foliis circum ramos similibus, latioribus, mollioribus & colore viridioribus: flore candido, [muscoso,] odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope, & Alcalone. Folia astrictoriã vim habent: quare commanducata vlcerebus oris medentur: illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt: decocto eorundem igni ambusta fouentur: capillum rufant trita folia, quæ in radice succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum, quod ex eo fit, odoratum, excalfacit, emollitque neruos, si quæ feruenti natura prædicta sint, assumat.

Κορυμβόνη. F. racem oso leg. Orib.

I. LIGVSTRVM.



Ligustrum in Hetruria Guistrico corrupta voce vulgus nostrum appellare consuevit: quod inibi etiam aliqui Oliuetta, nonnulli Oliuella, quidam Chambrossene vulgò vocant. Mauritani verò Alcanna nominatur. Nascitur frequens in sepibus ac nemoribus, secus vias passim in Italia. Floret abeunte vere, & incunte æstate, flore muscoso, vel (quandò quidem Oribasius legit Κορυμβόνη) racemoso, candido, odore suauis, sed qui decerpens statim staccescat. Oriuntur ex eo bacca in cacumine racematim coherentes pyramidis modo, hederæ bacca minoribus, laxiores ac nigriores, sapore amaro ac iniucundo, purpurea intus succo: hæc sua in arbore hyeme ferè tota perdurant incorrupta, quibus aues vescuntur, præsertimq; merula ac turdi. Folia edit oleaginea, latiora, molliora tamen ac viridiora, adstringenti gustus. Virgas habet tenas, flexilesq; solida tamen materie, è quibus cauea fiunt ad canoras seruandas auiculas, ac virga ad instruendos equos. Sunt qui bacca à Virgilio vacinia vocari putent, sed meo quidem iudicio non rectè plane sentiunt. Quemadmodum nec Fuchsius qui rubi mora, quoniam Græcis βατρυα vacinia esse putat: siquidem vacinium florem, non fructum esse pluribus constat. Caterum in nothis Dioscoridis stirpium nomenclaturis legitur, Hyacinthum vaciniũ Romanis fuisse vocatum. Ex quo facile crediderim, vacinium Virgilio nil aliud designare quàm Hyacinthum. Neque mirum est, quod Virgilius Hyacinthum vacini nomine nigrum appellauerit: nam hyacinthus facile cum violis colore purpureo certat, purpureus autem color à compluribus niger intelligitur. Hanc nostram sententiam comprobatur Virgilius: quippe qui semper vacinia floribus admiscet, isdemq; comparat, non autem fructibus. Quod manifestè declarauit in Bucolicis, vbi de vacinio sic cecinit, primo Eclog. II.

Ligustri consideratio & historia.

Vacinia.

Fuchsiertor

Hyacinthus vacinium est.

Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur. Deinde in eadem:

Mollia luteola pingit vacinia caltha. Item in vltima:

Et nigra viola sunt, & vacinia nigra.

Nec placet præterea Marcelli opinio, qui pluribus comprobare nititur, vacinium esse Irim. Siquidem præterquam quod nunquam legerim Irim in coronas venisse, color non aque promptè correspondet, quod varius adeo sit, vt non aliunde sibi nomen comparauerit, quàm à caelestis arcus colorum varietate. Adde etiam, quod cum Iridis flos omnium fragilissimus caducissimusq; sit, poeta nullo pacto hunc ligustro prætulisset. Quidam Ligustrum eam conuoluuli speciem esse autumant, quæ sepibus, fruticibus & arbutis se circumuoluit, ac etiam sapius vitium palis in vinetis, flore candido, lili, seu calathi effigie, quam ego leuem esse smilacem nunquam dubitavi: è quorum numero fuit Seruius Grammaticus Virgilij commentator Ecloga secunda Bucolicorum. Nempe falsus (vt arbitror) quod neglexerit in hac historia Plinium consulere, Dioscoridem & alios de stirpium natura differentes. Non defuerunt etiam qui existimauerint ligustrum esse Mauritanorum caprifolium, q; sane nil aliud est, quàm Dioscoridis pyracantha seu lycium, non autè periclymenon, vt Ruellio placet: sed isti quoq; à veritate desciscunt. Nec in minori sane errore versatur quidã nouus Herbarius, quippe qui censeat Cyprum & Ligustrum diuersas esse stirpes: idq; tam friuolis argumentis ex Plinio desumptis, vt ea potius cõtra illum, q̃ pro illo faciant: halucinatur profectò qui nõ videt Ligustrum omnib. suis notis referre Cyprum. Prouenit. n. Ligustrum folijs circum ramos oleæ similibus, latioribus tamen, mollioribus ac viridioribus, gustu adstringenti: quinetiam & flores edit, candidos, muscosos,

Marcellus reprehenditur.

Ligustrum conuoluuli species Seruio Gram.

Herbarii eiusdem error cyprum & ligustrum diuersa censeantur.

VACINIO-

racemososq; & fructum nigrum, Sambuci baccis emulum. Præterea si Ligustri facultates expendatur, nullum reperiri posse medicum tam inexpertum crediderim, qui non nouerit ligustrum ijs omnibus præstare viribus, quib. pollere Cyprum scriptum reliquerunt Dioscorides, & Galenus. Atqui Herbario illi venia danda est, quod in noscendis tantum plantis, non autem earum facultatibus examinandis operam nauarit. Verum videat is quo pacto Plinij verbis suam tueatur sententiam, cum ipse lib. 24. cap. 10. affirmanter scribat, Ligustrum eandem esse arborem, quæ in Oriente Cypros appellatur. Paratur è Ligustri floribus oleum, ijs in oleo insolatis, quod plurimum præstat ad vulnerum inflammationes: valet idem & ad capitis dolorem à bile prouenientem. Fit etiam è floribus aqua non inodora, ad ea sanè utilis, quæ refrigerationem, & adstrictionem postulant. Eadem pota auxiliatur cœliacis, dysentericis, & cæteris alui fluxionibus affectis: vterinas quoq; fluxiones cohibet tam bibita, quam supposita. Datur eadem vtiliter potanda sanguinem reijcientibus, sicut oculorum fluxiones, per se, aut cum pompholyge adhibita. Ligustri meminit Galenus lib. vii. simp. med. sic inquit: Cypru seu ligustri folia, summaq; germiua in vsum veniunt, & facultatis, & temperamenti maxime misti: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modicè calida; habentq; etiam adstrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorum decocto quidam ambusta fouent. Vtuntur verò etiam aduersus igneas phlegmonas, & carbunculos: nam absque molestia & morsu desiccant. Quinetiam sponte prouenientibus in ore vlcibus, aphthodesi, & ipsis puerorum aphthis commansa accommoda sunt. *Kύπρoς*: arbor ita Græcis, Latinis verò Ligustrum appellatur. Mauritanijs, Kenne, Henne seu Ilanne: Officinis, Alcanna: Italis, Guisfrico, Oliuella, Oliuetta, & Chambrossene: Germanis, Rheintweiden / Bembölslein vund Wundholz: Hispanis, Alfena, sine Athena: Gallis, Du troefne siue Trezilhon: Bohemis Pracy Zob.

Ligustrinum oleum & eius vires.
Ligustrina aqua, & eius vires.
Ligustri vires ex Galeno.

Nomina.

Cyprus Dioscoridis; idem ne sit cum Ligustro nostro, & Henne Arabum, ampla est controuersia sibi tractanda: hoc in loco duas posuimus figuras: alteram vulgaris Ligustri, alteram Ægyptiaci. I. Ligustrum vulgare, C. B. Ligustrum, Brun. Fuch. Lac. Ges. hor. (cui & phillyrea) Lob. Thal. Tab. Ligustrum, Cyprus, Trag. Cord. in Diosc. Cost. Lugd. Cæs. Phillyrea, Dodo. Gal. (& ligustrum Plinii) & fol. Ligustrum maius & minus, Lon. Flore est albo, at subluteo reperiri aiunt. II. Ligustrum Ægyptiacum arbor est Ligustro similis, quæ in multos ramos brachiatur, quos folia Ligustrinis angustiora & candidiora, vt in Lentisco disposita cingunt: in ramulorum summitatibus flores racematim dispositi conspiciuntur, qui nõ albi sed cinericei, figura sambucinis proximi, at minores, odore Ligustrinis suauiores & acutiores: quibus succedunt fructus seu bæccæ instar coriandri rotunda, quæ tanquam in folliculo multa semina nigra parua concludunt (quæ ipsimet ex bæccis sumptissimus). Hæc copiosissima & rarissima in Ægypto, quæ & in Canope (Alpino monente) vbi Dioscorides suum Ligustrum notauit, prouenit. Folijs adstrictoria & exsiccat vis inest, qualè suo Ligustro Dioscorides, & sua Alcanna Auicenna tribuit. Quare Ægyptu, apud quos Elhennæ ac Tamarhendi nominatur, foliorum puluere ad vlcera oris, gingiuarum & pudendorum maxime vtuntur: eundem cum mulla miscentes & emplastri modo pedibus applicantes, fluxiones humidas pedum, eorundem sudores & fœtores, exsiccando tollunt. Mulieres puluerem foliorum aquæ miscentes auream reddunt, qua manus & pedes aureo colore ad ornatum inficiunt. Vtuntur & Ægyptii folijs in commercijs ad tingendum aureo colore. Flores quinetiam capiti dolenti (vt & Dioscorides monuit) applicant, sed sine aceto. Huius iconem Alpintus etiam proposuit: & similem historia Lugdunensis ex Rauwolfii itineraio, Cypru Græcorum & Ligustri Latinorum nomine.

II. LIGVSTRVM ÆGYPTIACVM.



Ligustrum minus

Phillyrea arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentisci, nigro, subdulci, racematim cohærente: asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem vtilia, ad quæ oleaster, cum astringente est opus: maxime ad oris vlcera commanducata, aut si decocto colluantur: pota vrinam, ac menses cient.

Φιλλύρεα PHILLYREA. CAP. CVIII.

Phillyrea arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lentisci, nigro, subdulci, racematim cohærente: asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem vtilia, ad quæ oleaster, cum astringente est opus: maxime ad oris vlcera commanducata, aut si decocto colluantur: pota vrinam, ac menses cient.

Recentiores Dioscoridis interpretes, vt Hermolaus, Ruellius, & Marcellus Florentinus, Phillyream hic descriptam à Dioscoride, eam esse arborem certò credidere, quæ Tilia dicitur, nimirum falsi nominis similitudine. Quandoquidem illia Græcis Φιλλύρα, non autem Φιλλυρία, dicatur. Quod cum nullus horum animaduertisset, alter alterum secuti con- cordes phillyream tiliam appellarunt, ita Græcum nomen male, meo quidem iudicio, in Latinum vertentes. Quo factum est, vt multu sit persuasum, vel quod Dioscorides tiliam nunquam viderit, vel quod illi à vulgari tilia alia esset longe di- uersa, vt pote quæ omnibus notis tilia refragatur. Sed quod Dioscorides tiliam scorsum à phillyrea cognouit, vel saltem in ijs plantis discrimen posuerit, satis perspicuum fieri arbitror in huius libri præfatione circa finem, vbi hæc verba leguntur. Flores, & omnia, quæ incundum odorem efflant, reponantur εν κισσῷ ἰσῆς Φιλλυρείοι. Quæ sanè voces Græca non solum quod rectè vertuntur ab interpretibus, in arculis tiliaceis, sed quod postrema quidem non à Φιλλυρία, sed à Φιλλύρα, quæ Latinis tilia est, deduci possit, abunde declarant, has plantas diuersas esse in hoc ipso auctore. Però hinc facile comprehendi potest, quod illi non solum nomina, sed etiam rem considerint: nam si tiliam cognouissent, nulli dubium est, quin phillyream Dioscoridis proprio nomine separassent à philyra, hoc est tilia Theophrasti, quæ eam lib. xxi. cap. x. de plantarum his- toria

Interpretum Diosc. lapsus.

I. PHILLYREA

P. latifolia Spreng. *h. latifolia* Mart.

II. PHILLYREA MEDIA

P. media Spreng. *h. media* Mart.




III. PHILLYREA ANGV-

atifolia
Phillyrea angustifolia Standl. *h. angustifolia* Mart.

IV. TILIA MAS.

Tilia europaea Steud.



floribus his verbis memoria prodidit. TILIA quadam mas est, quadam femina. Distant inter se tum materie, tum totius corporis forma, & quod altera sit fructifera, altera vero sterilis. Nam mas arbor est magna, patentibus ramis: materies tamen dura, flava, nodosior, spissiorque: femina candidior: & cortex m. r. crassior, detractusque inflexibilis propter duritiam est: femina candidior, flexibilior tenaxque, ex quo cistas faciunt, item femina odoratior: & mas sterili, nulloque flore est.

debet sedat: ideò, nuclei confusi vtiliter illiuntur iliorum, & dorsi doloribus: id quod magis prestat oleum ex ijs expref-
 sum: ex melicrato pota, animi deliquiis subuenit. Datur quoq, aduersus coli cruciatus, & renum calculos. Cateris verò
 Arabiis, quorum auctoritate nititur Serapio, ventris tineas pellit, & vrinam cit: quæ omnia Mahaleb communis vsus
 prestare posse non ambigimus. Huius plantam misit ad me primum Iacobus Antonius Cortusus Patritius Pasauinus, rei
 plantariae admodum studiosus: & deinde eandem quoq, misit Franciscus Calzolarius Myropola Veronensis ad auream
 Campanam, vir quidem medica materia haud ignarus. Adamus Lonicerus in suo de stirpium historia libro constanter as-
 serit, nulla tamen hac allata ratione, nec auctoritate, ligustrum & phillyream vnã & eandem esse plantam: conten-
 ditq, caput hoc omnino Dioscoridis spurium esse. Verum is ideo hallucinatus videtur, quod primum phillyrea delineatio à
 ligustro, quod Græcis ξυλός dicitur, non parum dissentiat: secundo quod non solum codices Dioscoridis Græci, & ij quidem
 16 probatissimi, habeant phillyream: sed etiam Oribasij codex manu scriptus, in quem ipse ex Dioscoride simplicia transtulit:
 quem admodum eam etiam habent Paulus & Serapio, qui Arabico sermone phillyream Mahaleb appellauit. Tilia cortex
 communis, ac inde illius vulneribus recentibus agglutinandis efficax est. Folia verò trita, & aqua conspersa pedum tu-
 mores discutunt. Humor è medulla castrata arboris defluens capiti illius capillos reddit, defluentesq, continet. Aqua è flo-
 ribus defluit: a sua peculiari dote datur vtiliter Epilepticis. Ligni carbonem in puluerem triti, auxiliantur his qui ab alto
 deuoluntur fractis ac confusis. Arbor, quæ Græcis φιλύρα, Latinis item Phillyrea vocatur: Arabibus, Mahaleb: Italis,
 Phillyrea, Mahaleb: Mauritaniis sic dicta vnguentariis: Italis, Machaleb. Quæ verò Græcè φιλύρα, Latine Tilia, pariter &
 Italicè siue Teio nominatur: Germanicè, Lunden: Bohemice Lypa: Gallis Tilleu femelle. Mæ vero Tilia, Græcis φιλύρα ιρί-
 20 25: Italu, Tilia masculio & Carpino nero: Germanis Stejn Linden: Gallis Tilleu masle.

Adami Loniceri error.

Tilia viret.

Nomina.

Phillyream sunt qui eandem cum Ligustro censeant: alii qui Tiliam interpretantur, quæ apud Theo-
 phrastum philyra dicitur: at hæc Dioscoridis, videtur à Theophrasto phlyca dicta. Genera quinque Clu-
 sius proposuit, de quibus aliàs. Quam Matthiolus proponit racemosam, ad imitationem textus Diosco-
 ridei, nisi racemos haberet phillyream arborem Gallo prouinciæ Aduersariorum, Lobelii & Lugd. her-
 barii diceremus. Camerarius vna figura tres differentias ostendit, alteram latis, alteram angustis & tertiã
 medio modo se habentibus foliis, vt nihil obstet Dioscoridis descriptioni folia oleæ latiora Phillyreæ tri-
 buentis. Has diuersas species & adhuc alias, de quibus in historia, circa Monspelium obseruauimus, cu-
 ius nomine ad Matthioli figuram adiecimus adhuc mediam & angustifoliam: quæ enim II. est, dicitur
 Phillyrea Narbonensis Lob. Phillyrea tertia Clusio hisp. Taber. Phillyrea Penæ maior & Alaternus ma-
 ior Dalechampii Lugd. Phillyrea media Camer. ad Matth. Cyprus latiore folio, Dodo. fol. Ilarrum, Cæ-
 30 salpino: hæc breuis esto descriptio: Arbuscula est, viri altitudinem non facile superans, ramosa, cortice
 rugoso eoq; candicante: foliis oblongis, integris, acuminatis, firmis, ex viridi nigricantibus, saporis ad-
 stringentis: floribus oleæ similibus, pusillis, ex herbaceo candidis, inter foliorum exortus congestis: quib.
 succedunt fructus racematim inter folia propendentes, rotundi, nigri, magnitudine fructus Myrti, qui
 nucleum osseum cortici fragili alboq; inclusum continent. Non longè Monspellulo obseruauimus, via
 qua itur ad stagna. III. quam angustifoliam vocamus, (licet & aliam angustiore humilioreq; habea-
 mus) Phillyrea angustifolia dicitur Lobelo: & Cam. ad Matth. Phillyrea quarta Clus. hisp. & Taber. Phil-
 lyrea minor Penæ, & Alaternus minor Dalechampii, Lug. Cyprus, Dod. fol. Oleastru Monspelienses dum
 apud ipsos essem, vocabant. Hæc priore humilior magisq; a radice ramosa, ramis minoribus, cortice ni-
 griore vestitis, foliis salignis, angustis, nigricantibus, amaris: floribus ad foliorum exortus circa ramulos
 40 congestis, candicantibus: quibus succedunt fructus nigri paruis pedicellis insidentes, baccarum Myrti
 magnitudine, in quibus osliculum durum continetur. In sepibus MonsPELLIACIS legimus. IIII. Tilia mas,
 quæ hic proponitur, vt & à Lob. Lug. & Tab. Carpinus nigra dicitur Castori: & nobis Vlms, aut certè
 eius aliqua species esse videtur: aliam enim marem agnoscimus, cuius descriptionem subiicere placuit;
 figuram historiae nostræ addituri: Arbor est crasso caudice, ramosa, materia vt Tiliarum robusta, cortice
 lanuginoso, subrufo: foliis magnis, quæ vix rotundantur, vt in fœmina fit, monente Theophrasto 3. hist.
 10. sed in acutum angulum desinunt, Moti fatiux foliis quoad formam simillima, eo excepto, quod pro-
 fundè sint serrata, ex virore nigricantia, prona verò parte splendens, Tilia fœmina vulgaris, foliis tri-
 plo & quadruplo maiora: in qua hætenus nec florem, nec fructum videre licuit. Quam tamen ab annis
 septendecim nunc obseruau, cum in moue nostro Muteto (quo studiosos singulis annis deducere so-
 50 lemas) verè Apollineo ob plantarum copiam, plures sint arbores. Tilia fœmina non est, nec etiam Tilia
 syluestris Tragi, cui folia multo minora: fortè Tilia mas Theophrasti 3. hist. II. quam sterile & nullo flore
 esse scribit. V. Tilia fœmina Plinii seu Philyra Theophrasti C.B. aliis Tilia simpliciter, aliis Tilia fœmina
 dicitur: ad radices antiquarum Tiliarum sæpenumero extuberantias & excrescentias obseruare heet,
 quemadmodum iuxta antiquas quercus vuarum forma reperiuntur. VI. Chamæcerasus petra. C.B.
 Mahaleb, Matth. Cast. Lugd. Cam. Cerasus syluestris, Trago, Chamæcerasus alia quam Punice Mahaleb
 vocant, Ges. hor. Phillyrea Arabicè Mahaleb, Ges. ad hist. Cordi. Macaleb, Gesneri & Matthioli, Lob. Ma-
 chalepum Tabernæmontano.

Tilia mas noua.

ΚΙΣΟΣ

CISTVS

CAP. CIX

60 Cistus quem aliqui citharon, aut cissaron vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, a foliosus: sa-
 xosis locis nascens: foliis rotundis, b acerbis, hirsutis, flos t masculu e vt mali punice, fœminæ al-
 bet. Vis astringens: vnde flores in vino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illi
 cohibent: vetustati vlcera, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis rhobethron, aut cy-
 tinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, t
 altera herbacea, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque inacerant,
 & incoquant, reliquaque vt in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, verum aliquanto magis sic-
 car & astringit. Prodest dysentericis, cœliacis, sanguinem excreantibus, fœminarum profluuiis &
 pota & indita.

a Meum
 φιλύρα i.
 foliosa Car.
 verò ξυλο-
 25. i. ligno-
 sa

b Meum
 φιλύρα i.
 nigra, sed Ca-
 cum Rucellio
 30. i. i.
 cista

c Cata
 φιλύρα i.
 vt tota

Nasitur

I. CISTVS MAS.

II. CISTVS FOEMINA.



III. HYPOCISTIS.



Cisti & hypocistidis consideratio & hifloria.

Hypocistis.

Cistus, hirci barbula.

Fuchsi error dum hypocistin fungum putat.

Hypocistidis succedanea. Plinii lapsis cistum cum hiffo confundentis.

Nascitur vterq; Cistus, e cuius radicibus Hypocistis profilit, in pluribus asperis & scaberrimis locis, & praesertim in Apennino monte. Foemina: in collibus aridis ac saxosis: copiosa in agro Patavino Duum est generum: Alterum mas: alterum foemina. Arbuscula Cistus est parvula, ramosa tamen & foliosa, saxosis ac aridis locis nascens. Mas folijs est rotundis, crispis, acerbis hirsutis, albicantibus. Flos maris ut mali punici, foemina vero albus, & cisti maris longe minoribus, & folia oblonga Salviae emula, albicantia & hirsuta. Hanc rufi in Patavini Sylvestrem Salviae vocant. Hypocistis vero iuxta vtriusq; Cisti radices, quinetiam Ladani nascitur. floris punici figura, vel potius Orobanches suffrigis colore vario. Liquetur Acacia modo: ceterum tunditur recens, elicitur ex eo succus ad medicamenta, & subinde insolatur & aservatur ad usum: siccat enim & potenter adstringit. Quare proli quidem, ac diligentes seplasmij omni studio atq; ope niti deberent, ut sibi vtrunq; genus cum hypocistide vel ex Apennino ipso, vel aliunde comportaretur: quandoquidem sine legitima hypocistide legitima non possit fieri theriaca, nec praeterea alia quadam, quae in medicina usum veniunt, antidota ac medicamenta. Namq; hypocistin, quae passim vtuntur officina, ex hirci barbae radicibus impostores conficiant, succum inde exprimentes, ac ut concresecat, insolantes. Errandi tamen ac simul imposturam j. a. venali causam dederunt Arabes, quod cistum hirci, variulam appellerent. Quod actum est, ut ij omnino aberraverint, qui officinis hypocistidem parant, sibi persuadentes hirci barbam, quam Graeci τριπυλον & τριπυλον vocant, illum esse stirpem, de qua Arabes intelligunt. Quod errore ducti non modo seipos decipiunt, sed etiam alios, qui passim adulterina hypocistide vtuntur. Atqui Fuchsius in libro de componendis medicamentis, quem secundo edidit, vbi passillos ex succino perpendit, non sine magno errore (p. 112) viri eruditi dixerim) putat hypocistin fungum esse. Quandoquidem hypocistis non fungus est, sed veluti germen, quod e cisti radicibus pullulat, effigie fere punicorum & tyinos representans, ut optime sciunt ij, apud quos cisti planta copiosa proveniunt. Hypocistidis lacum supplere acaciam tradidit Dioscorides, ut etiam habetur in Galeni succedaneis, quae illius vice vti possent officina, si modo & ea careret adulterio. Potest etiam num, si desit hypocistis, assumi eius loco floris agrestis punice succus, quippe qui eadem praestet, quae hypocistis, auctore Dioscoride. Plinius deceptus vocabulorum germaniae ineptie

Inepet satis, ino in dicit, commiserit cisti, & cisti historiam: quare obrem non immerito cum damnauit doctissimus Leon-
cenus. Cisti meminit Gal. lib. 7 simp. med. sic inquit. Cistus aut Cistarus frutex est gustu adstringens, omnibusq; parti-
culatim operibus. Attamen folia & parua germina trita adeo deficcant, adstringuntq;, vt vulnera glutinare valeant. At
flores sunt magis efficaces, adeo vt cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanent: cata-
plasmatis ritu illa vlcerum putredinosa inuuant. Est enim eorum facultas non instrenue deficcans, fereq; secundi excessus
à temperatis absoluti: adeo vero frutex hic frigidus est, vt tepidi caloris sit particeps. Porro Hypocistis, quam vocant, multo
est magis astringentia quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionu affectus, puta sanguinis reiectiones, pro-
fluua muliebria, coeliacos, dysentericosq; affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, qua videlicet plusculo hu-
more exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non imbecilliter addit. Sic sane stomachicis epithematis, hepaticisq; commi-
scetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum, quo corpora confirmet ac roboret. Frutex Κίσος, κίσαρον aut
κίσαρον, Græcis dicitur, Latinis quoq; Cistus appellatur: Arabibus, Ramiet, Altheis seu Ibaie albis: Italis Cisto: Hispanis
Ceryuacor: Cistus fœmina, Græcis Κίσος θύλας: Italis Cisto femina: Patavinis Saluia saluega. Hypocistis vero sic Latina
voce, quemadmodum ὑποκίσος, Græcè dicitur: Arabice, Taratith: Italice Hypocisto: Hispanice Pultegras.

Cisti & hypo-
cistidis vires
ex Galeno.

Nomina.

† Hæc dictio non legitur in Græcis codicibus. Sed eam huc ad clariorem (vt puto) sensum ex Plinio transfudit Ruel-
 tom: quod verum illud à Dioscoride studio fortasse breuitatis omissum, satius addendum esse duxerit, quam subintelligen-
 dum, quod etiam Hermodorus fecit.

† Nil mirum esse debet, quod Plinio duo tantum hypocistidis genera prodantur, coloribus raso & candido distincta:
 quando quidem ipsi duntaxat Oribasius quoq; contentus fuisse videtur lib. 12. vbi genus κίσαρον, hoc est, herbaceum, vt vul-
 gari codices habent, non legitur.

Κίσος Gaza apud Theophrastum 6. histo. interpretatus est Hederam, quia κίσαρον pro κίσος (vt multa
 exemplaria habent) legit: quæ forte causa fuit Plinio, vt lib. 16. κίσαρον cum κίσος confuderit, quod recte Le-
 onicenus ostendit, licet Collinutius & Polutianus pro Plinio pugnent. Cisti duo genera facimus, Cistum Cisti generis
 non ladaniferam, & Cistum ladaniferam: illius duo genera, mas & fœmina: maris genera quinq; Clusius
 hist. Hispanica proposuit, quæ inter se foliorum forma, aut colore florum rubro, nunc saturatiore, nunc
 dilutiore differunt. Fœminæ plures species, aut elatior est & rectis virgis fruticat, aut supina est: rursus v-
 trumq; genus colore floris variat, vel candidus est, vel luteus. Ad fœminam communem, nouem adhuc
 species Clusius refert, nam cum florem roseum aut purpureum non habeant, qualem in mare requirit
 Dioscorides, recte ad fœminam referuntur. His adiicit Cisti speciem Lobelus & exoticam Cistifoliam: sic
 & Clusius hist. Pannonica Chamæcisti quatuor proposuit differentias. I. Cistus mas Matthiolo Lac. Ci-
 stus masculus, Lonic. Cistus mas folio rotundiore Matthioli, Lug. forte cistus mas quartus Clus. hist. hisp.
 At Matthioli in suis editionibus, diuersas proponit icones: inter magnas enim figuras habet Cistum,
 cuius folia ex rotunditate oblonga sunt, inter minores hanc proponit foliis rotundis, procul dubio imi-
 tari volens Dioscoridis descriptionem, qui talia in Cisto requirit folia. Cum vero talibus foliis mare ha-
 beremus non viderimus, sed oblongis, adposuimus figuram talem sub Hypocistide. Dicitur Cistus, Dodo.
 Cistus mas, Lob. Cam. Cistus mas primus, Clusio & Lugd. Cistus mas latifolius, Tab. Cisti alterum genus
 Cæsalp. II. Cistus fœmina Matthioli, at maioribus floribus ceteri pingunt, sed nolimus commenta-
 tori sua mutare. III. Hypocistis dicitur id quod ex ipsius & Cisti & Ledi radicis medio pullulat: Limo-
 dori genus vocat Dodonæus. Reperitur rubra, flaua, pallida.

Λάδον. LEDVM. Λάδανον. LADANVM. CAP. CX.

Est & alterum cisti genus, Ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus fo-
 liis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis astringens, ac e-
 oldem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur: siquidem cum cisti frondes pascu-
 tur capra, hircique, pinguitudinem conspicue barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhæresce-
 tem reportant: quam depectentes incolæ colantesque, cogunt in offas, & ita recondunt. Alii vero at-
 trahunt funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in Ladanum. Maxime
 probatur odoratum, subuiride, a [facile mollescens, quod arenas non collegit, nec squalore obsitum est,
 50 resinosum,] quale in Cypro gignitur. Arabicum vero, Libicumq; vilius. Natura ei spissandi, calfacien-
 di, molliendi: ora venarum patefacit: capillum fluentem continet, addito vino, myrrha & myrteo oleo:
 cicatricibus decorem reddit, cum vino illitum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosa-
 ceo infusum: suffitu secundas eiicit: pessis immistum vuluæ duritiem sanat. In medicamenta, quæ at-
 rium dolorem, tussimque finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: aluum sistit cum vino vetere potum,
 & vrinam ciet.

Meu & Ca-
iurmalaxer
λιπαρόν, α-
μύτορον
λαπαειας
πληρωδες. I.
facile molle-
scens, pingue,
expers arena,
nec friabile,
sed resinosu.

Ladanum, quod vulgo alij appellant Ladanum, alij vero Odano, tamen si plerumq; impostoribus malitia adeo sabulo, &
 alijs adulterijs sit vitiatum, vt nihil valoris præstet, ego tamen præstantissimum sapius Venetys emi ab vnguentarijs,
 60 qui odoramenta consiciunt. Verum apud pharmacopolas, qui medicamenta nobis parant, Ladanum, quod syncerum pu-
 rumq; sit, rarissime reperitur: cum eorum plurimi potius curent, vt rem minoris emant, quam vt seligant legitima ab adul-
 ternis, quod tamen iniquum est, inhumanum ac detestabile crimen. Arbuscula, è qua Ladanum colligitur, Ledum appella-
 tur, & inter cisti genera recensetur. Caterum Plinius vocabulorum vicinitate deceptus (vt etiam in superiori commenta-
 tione dictum est) ex cisso, id est, hedera, non autem ex cisto ladanum colligi dixit. Ex quo item multis falso persuasum est
 quod non à cisto, sed ab hedera Ladanum legeretur. Duum est generum: alterum folijs grandioribus, alterum vero minori-
 bus. Est ladani planta Cisto fœminæ fere similis, sed longioribus folijs & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam contra-
 bunt pingue. Prouenit in saxosis, & apricis collibus in calidioribus regionibus. Ladanum, additur in emplastris, quæ ad ro-
 borandum ventriculum parantur. Atqui non modo id præstare ladanum extrinsecus patet, sed etiam in cataplas-
 drachma pondere deuoratum, duabus horis à cæna: siquidem hoc modo concoctionem adiuvat. Admittit in odoratu suffiti-

Ladani con-
sideratio.
Plini lap-
ladanum ex
cisso colli-
gentis.
Ladani...

LEDUM.



Oleum ex Ladano quomodo paratur.

Ladani vires ex Galeno.

Nomen

a Meum... b Meum... c Meum

d Meum... e Meum

f Meum... g Meum

h Meum... i Meum

Ebeni consideratio ex Theophrasto & Plinio.

quia Ladano insunt, poscentes: quippe proueniunt ha ex prauis succis, lertis et asug, quos secantia ac digerentia medicamenta potissimum euocant atque euacuant. Caterum tenuium partium sint facultatis oportet, & minime astringentis non tamen vsque adeo tenuium partium, & desiccatoria, vt nimio plus deficcant, vnaq, cum collectis inibi succis prater naturam, naturalem quoq, humiditatem incrementa pilis suppeditantem absumant, nam sic non tantum alopecia libertabunt, sed & caluiciem afferent. Sed hac ad curandi rationem pertinent. Arbuscula, quae Graece λεδων, Latine similiter Ledum nominatur, Arabicè Chafus. Quod verò λιδων Græci, Latini item Ladanum vocant: Mauritanii, Loden siue Loden: Itali Laudano & Odano: Hispani, Xara.

Cistus Ladanifera vel Ledum: Galeno cistus aut ladanum: Plinio Lada. Recentioribus Ledum & Cistus ledon. Huius genera decem Clusius hist. Hisp. proposuit: quibus tria adhuc Lobelus addit, & historia Lugdunensis, his omnibus & aliam nomine Ledi Bauhini adiecit. Ladanum verò, siue officinarum Laudanum, lenta est resinosa & odorata pinguedo, foliis & ramis Cisti ledi adhærens, quæ inde colligitur diuersimodè, qua de re Dioscorides, Plinius, Hermolaus & Bellonius.

Ebenus.

EBENVS.

CAP. CXL

Ebenus optima habetur Æthiopica & nigra, nullos habens a venarum discursus, factitii cornus lzuore: cum frangitur, densa apparet, mordens gustu, atque b astringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, c internatis segmentis candicantibus, & d modicè fuluis, item frequentibus maculis: cæterum prior bonitate antecedit. e Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consumilia pro ebena vaneunt. Quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget ad veteres destillationes, pustulasq; mirum in modum pollet: si quispiam facta ex eo coticula collyriis vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes, ramentave vino Chio, die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli præterita ipsa excolant, reliqua; eundem in modum peragunt. Alii pro vino aqua vtuntur. Vritur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi vsti inodo, & ita siccis, scabrisq; lippitudinibus conducit.

Redidit Theophrastus in India tantum nasci Ebenum lib. 4. cap. 5. de historia plantarum, vbi sic habet. Ebenus quoq, eius regionis vernacula est. Huius duo genera constant: alterum materie laudatum pulchrumq; alterum vile & vitiatum. Rarum, quod præstantius: reliquum permultum habetur. Colorem commendatum, non recondita, sed statim sua natura capescit: hac Theophrastus. Quod etiam sensisse videtur Virgilius in Georgicis lib. 2. ita canens:

-sola India nigrum

Fert ebenum, solis est thærea virga Sabæis.

Plinius etiam lib. 12. cap. 4. Ebenum nusquam alibi, quam in India nasci scriptum reliquit: nec eam tamen Indiam vniuersam mittere, sed exigua sui parte gigni, præter quoddam fruticosi generis cyrifi modo, in tota India dispersum. Herodotus vero (eodem auctore) Ebenum Æthiopiæ solam ferre intellexisse videtur: quippe qui de Indica nullam fecerit mentionem. Verum tamen ex hoc Dioscoridis capite palam est, nasci Ebenum in ambabus his regionibus. Indi quidem non nisi ex ebena

Deorum

Deorum simulacra ferunt, regesq; ex eo tantum sceptrum sumunt: item pocula, craterasq; ex ebena faciunt, quod sane credant contra malicia efficacissimum esse, & quicquid venesicij fuerit, tractu eius auerti. Itaq; nihil mirum, si quod peregrinum in Italia importatur, summo sit in pretio, cum etiam ab ipsis, quibus provenit, maximo honore habeatur. E-
 beum ex India Roma primum magnus Pompeius Mitbridatico triumpho ostendit, cuius materies densissima omnium con-
 stat: quo fit, ut quamuis multis annis exarescat, non fluitet in aqua, sed tota mergatur. Ebeni siccatos truncos maxime hac
 etate nouit Italia: namq; innumeri visuntur in eorum officina, qui pectines conficiunt ad explicandos aptandosq; capillos:
 itemq; apud illos, qui globulos funiculo traiciendos ad mulierum preces numerandas torno in orbiculos expolunt. Pau-
 senis in libro primo, Graeciani describit. Audiui autem, inquit: Cyprium hominem oppido quam peritum in herbarum
 generibus ad medendi usum notandis, qui diceret, Ebenam nulla solia, nullumq; omnino fructum ferre, quin & stirpem nul-
 lam esse soli exposita: radices tantum terra occultari, quas eruant Aethiopes, atq; in primis, qui quo maxime loco repe-
 riatur, norunt. Hac ille: quae etsi fabulosa sorte videantur, facilius tamen illi crediderim, quam Anquillario, qui miserè
 Anagrim, quam An. inuenies Eghenum vel Eghelum vocant, vocis tantum similitudine fretus, secundum ebeni genus (vi-
 denda sane opinione) Theophrasto esse censet. Cum Eghenus satidissima sit planta, & scribant Theophrastus, & Plinius id
 ebeni genus in India tantum nasci, & in India tota esse dispersum. Redeo ad Pausaniam ebenum, quod quidem sabulosum hanc
 quaequam existimo, cum scribat Georgius Agricola fossilium indagator maximus, reperiri etiam in Germania Ebenum fos-
 sile, ad septimum libri fere calcem. hinc verbum. Quinetiam Hildesheimi intra terram aluminosam iuxta lignum in lapide mu-
 ratum, & in eius commissuris reperitur ebenum fossilium, quod & sparsum in aliorum lapidum cavernis, tanquam in aluo lateris
 Theophrastus non ignorauit. Stirps est nigra, folijs fructuq; carens, cornu politici modo splendidum, solida, sed leuis, omnino
 aspera, simili gargaris lapidi, sed natura admodum diuersa: nam ebenum ignem non sentit, Gagates accensus ardet & igni
 perit: Hec ille. Caterum an ebenum, quod ad nos affertur legitimum sit (si Dioscoridi credimus) non parum videtur dubi-
 tandum, quod suffitum nullo commendetur odore: verum quum cetera eius nota legitimi sint Ebeni, non omnino eorum
 opinio videtur rejicienda, qui nihil de ebena dubitant, & praesertim cum Theophrastus, & Plinius nullibi (quod legerim sci-
 uerimq;) odorati ebeni meminerint. Ebeni vires scripsit Plinius lib. 24. cap. 11. hinc verbum. Non omittam propter miraculum
 ebenum. Scobem eius oculis vnicè mederi dicunt: lignoq; ad catem trito cum passo caliginem discutit, ex aqua vero & radi-
 ce albugines oculorum. Item trisim pari modo cum melle ac dracuncali abiecta radice. Ebenum medici & inter erodentia
 assumunt. Ebeni meminit Gal. lib. 6. simplicium medicamentorum sic inquit. Ebenus ex ijs lignis est, quae trita cum aqua
 in succum soluntur, ut lapidum nonnulli. Vis ei inest ex calfaciendi, extergendi & tenuium partium. Quamobrem quae pu-
 pillas efficiunt, extergere creditur: miscetur alijs remedijs ocularibus, quae ad vlcera vetera, fluxiones & bullas, siue pustulas
 accommodata sunt. hanc Tenus Galenus. Sunt qui lignum ex Indijs petunt, quod quidam GVAIACVM, nonnulli Guaiaca-
 num, pleriq; vero lignum sanctum appellant, cuius aduersus Gallicam luem praecipuus est vsus, eueni genus esse crediderint.
 Quod quidem nec afferere, nec negare ausim, quandoquidem nusquam inuenierim apud quosquam tum veterum, tum
 recentiorum scriptorum, quas frondes, quos flores, quosq; fructus proferat ebcnus. Illud tamen omnib. perspicuum est, Gua-
 iacum nihil, nisi summa nigritia, ab ebena disidere, quae in hoc summo splendore nigricat, in illo albescit: ceteris vero qua-
 litatib. id maxime cum ebena certat. Tria ad nos Guaiaci genera afferuntur, ut in suis Epistolis doctissime adnotauit Ma-
 nardus Ferrariensis: quod & nobis iamdiu plane compertum est, cum haec omnia sapius nobis praemanib. fuerint. E. quum
 itaq; genus crassiori, vegetioriq; mole constat, quo resecto materies apparet interiore parte nigra, exteriori vero subpallida
 & veluti perplexis lineis quibusdam ad fuscum tendentib. per longum intersecta. Alterum caudice minori, nec adeo vegetiori habe-
 tur, cuius extrema partes maiore ambitu se diffundunt: intima vero, quae pariter nigricant, minore satis orbe concluduntur.
 Tertium, q. proprie sanctum appellant, caudice ceteris exiliore visitur, intumescensq; extrinsecus albicans, cuius materies li-
 neuis admodum exilib. in longum actis perplexe distinguitur, estq; hoc longe ceteris & acrius & odoratius. Caterum credendum
 non est eiusmodi ligna, etsi colore, magnitudine ac pondere inter se discrepet, idcirco diuersarum esse plantarum, diuersorumq;
 generum, ut quidam sorte existimant, quorum vnus est Fallopius. Nam quod hoc tam intus, quam extra candidet, illud ve-
 ro interiore sui parte nigricet non aliunde provenit, quum q. hoc magis, illud vero minus adoleuerit vel consenuerit. Qui-
 peo sane nigrius cernitur lignum Guaiacum, quo ad maturiore etatem peruenerit arbor, a qua decisum fuerit: & per conse-
 quens tanto magis albu apparet, quum minus adoleuerit illa, quemadmodum conspicitur in nostris nonnullis Italia arboribus
 & praesertim in moro, nuce & anagyri. Verum tamen illud iniq; persuasum sit, at atè vni plus, quam alteri virium addere
 debere. Quae de re verba facturi dicamus, cum illud, quod plene omni ex parte albicat, odoratius, acrius & amarum ha-
 beat, cumq; eius decoctum crassius & ceterorum decocto pinguius sit, & acrimonia & amare admodum refertum, ut ipsa
 melior experientia, nil mirum esse crediderim, si in eo, vi pote iuniore, vis insit vegetandi praestantior, ac propterea plus
 in se succi contineat, quin & ceteris viribus praestet. Ea q; propter putauerim ego, hoc illi in vsu perpetuo fore, quibus ob Galli-
 cam vlcera emergerint depascentia, contumaciaq; ossa vero cariota sunt, ac putrilagine consumpta, & tumores in ossibus
 penè duriem occalluerint: & quibus deniq; perpetuus articulorum cruciatus, diurnusq; capitis dolor inhaerit, eoq; magis
 quo patiens iunior extiterit, fortior & natura robustior. Huic illud succedere existimamus, quod medium obtinet locum: si-
 quidem hoc odoratius est, & acrius eo, quod nigrius ac crassius inuenitur: neq; illud quidem ab re, quandoquidem id mi-
 nus est etate confectum & maiore humoris copia redundat. Quocirca commodissime hoc uti poterunt, qui natura delica-
 tiores sunt, & temperamento imbecilliores, atq; etiam ij, in quorum artus huiusce luis furor nondum grassari cepit. Po-
 stremo illud minus ceteris praestat, viribusq; infirmius habetur, quod nigrius, crassius & annosius reperitur. Namq; quali-
 bet confescentis planta (quemadmodum etiam cunctis animalibus euenit) continuo exarescit, humidoq; priuatur. Cuius rei
 certissimum est argumentum, quod in annosarum arborum truncis maior appareat nigredo, quam in alijs vel iunioribus, vel
 etate tenellis: nigredo enim siccitatis indicium est, quinetiam deperditi caloris innati & humidi naturalis: id quod tam in
 plantis, quam in animalibus, locum habet. Nihil tamen secius illud diligenter animaduertendum est, quod Guaiacum al-
 bicanti prorsus colore praeditum, recens, incorruptumq; sit: quippe cum ceteris exilius sit, citius ac facilius exarescit, & ob
 humoris redundantiam velocius cariem sentit atq; fracescit. Quam ob causam satius quandoq; foret vetustiore recenter
 caso vti, quam iuniore, quod multo ante tempore fuerit ab arbore decisum. Sunt quoq; recentiorum nonnulli, de quorum
 numero vnus est Alphonsus Ferreus, qui de ligni guaiaci decocto elegans admodum opusculum edidit, qui tantum guaiacum
 illud praesertunt, quod est plantarum ramus etatis media desumptum fuerit. Quorum opinio non planè refellenda videtur: nam
 quicumq; rem naturalibus expenderit rationibus, ramos antiquioris a caudice mediocri etatis parum differre cognoscet: iteus
 ramos huius a caudice iunioris: quippe plus humoris ad se trahit ramorum auctrix facultas, quam caudicis. Idcirco non a-
 lia de causa planta reuiuescunt, cum earum rami implantantur, seruntur & propagantur, nisi quod illud idem humi-
 dum in-

Ebenum quando primum Romae.

Anguillaria arguta.

Ebenum fossilium Agricola.

Ebeni vires ex Plinio.

Ebeni vires ex Galeno.

Guaiaci consideratio, quod quibusdam Ebenum.

Guaiaci tria genera Manardo.

Fallopius notatus.

Guaiacum lignum praestantius.

Alphonsus Ferreus.

dum innatū intra se continēt & eodem vigent temperamento, quo qui adolefcunt: etenim ferculi atq; rami sunt carissimi, perinde atq; filij & propterea animalibus etate tenellis non abfimiles. Id quod maxime confirmat Theoph. li. 1. c. 12. de conf. plantarum, vbi sic habet. Etenim quodq; germen quasi planta quadam in arbore, porinde ac in terra confistit. Atqui mihi longe magis iunioris candidi placeret vsus: siquidem in hunc immediatē a terra humor & alimentum defertur, ac propterea quoniam is fort. esse nullum adhuc fructum protulerit: quandoquidem factum a plantis, vt etiam ab animalibus, multum virium aufert. Præstantissimum itaque lignum Guaiacum illud erit, quod ex iuniori candice recenter casum fuerit, tam exterius, quā interius albicans, rimis carens, densum, ponderosum, minime cariosum, odoratum, gustu & acce, & subamarum. Ceterum quoniam nostra etate aquē cortices, atque lignum in vsu ventum, eandem in vsu rationem seruandam censeo, vt quinam meliores præstantioresq; sint, dignosci possint, quam nos in eligendo optimo ligno in medium attulimus, vt scilicet illi eligantur & probatissimi habeantur, qui a præstantiori candice detracti fuerint. Importatur Guaiacum tam ex occidentalibus, quā orientalibus Indijs: nam & Hispani è suis regionibus nouiter reperit, & Lusitani ex Calicut, Taprobana & Iaua insulis, & Mauritanii, Aegyptij, Arabes ac Persæ à mari rubro per camelorum caroumas (vt aiunt) Guaiacum ad nos conuehunt: quin & ex Aethiopia, vt quidam narrant. At cum omnibus comparatum sit, ea in medicamentorum genere longè magis cetera præcellere, quæ ex orientali plaga comportantur, ob id omnino censendum fuerit, Hispanicum viribus esse imbecillius, quā quod ex Lusitania, vel Alexandria in Italiam importatur. Guaiaci planta (vt ij referunt, qui eam in syluis se vidisse testantur) ad fraxini proceritatem, & ad hominis medietatis habitus crassitudinem plerumque assurgit. Folia fert quadantenus plantaginis amula, dura ac breuia. Flores eius prodeuntur latei: fructus verò inglandis magnitudine, qui esu aluum subducit: cortex annosis niger, iuuenibus verò subtilis. Porro si Guaiaci vires ac qualitates rectè perpendantur, proculdubio liquido constabit, ea præstare posse, quæ in accenda Gallica lue requiruntur: nam cum id ex partibus admodum calidis, ac tenuibus consistat, itemq; sicca, habeatq; sibi resina plurimum admixtum, nimirum etiam potest suis viribus ea efficaciter exiccare, attenuare, liquefacere atque expurgare, quæ humores infecerint: quinetiam sudorem ciere. Huc accedit etiam, quod parte resinosa, quam possidet, contagioni atque putredini mirificè resistit: quæ quidem incommoda hanc pestem comitari solent. Ceterum eo tempore, quo primam in Italiam Guaiacum inferri cepit, necnon etiam multis post annis, non sine summo timore dabatur potandum. Etenim ferebat ar illi manifestum necis periculum imminere, qui rectam exquisiti victus rationem per panis, & vna pars modicum non seruasset, qui que non persistisset in curatione ad quadragesimum diem vsque in tenebris inclusus, ita vt ex aëris quidem claritatem inspiceret, necnon pedem è cubiculo efferreret: is insuper carniū esu, & vini potu interdillum erat, non secus atque veneno. Verum enimvero cum sapius euenisset, vt ante constitutum tempus quidam ab tenuissimam villositatem ita imbecilles ac viribus destituti conspicerentur, vt penè spiritus & vita deficerent, ij ne in tam manifesto vite discrimine versarentur, à consanguineis & assidentibus persuasi, caporum, gallinarumq; intra, ac contusas carnes in cibum sumentes, tantum inde percipiebant iuuamentum, vt vitam quasi deperditam recuperarent. Quo postea medici experimento edocti, vanam illorum doctrinam videntes, qui tam grauem ægræ legem imponebant, paulò pleniori victu visasserunt, nempe iuuenam gallinaceorum carniū, ac maiore panis portione. At nullus tamen adhuc ausus erat viam exhibere. Quare à me sapius animaduersa, ego primus (uis fallor) inter Italos medicos rationibus non obscuri additus tentare volui, posset ne vinum dari ex Guaiaci maceratione is maiori cum iuuamento, qui Gallica lue correpti essent. Quod cum mihi in frigidis morbis feliciter cessisset, quā ex aqua tantum lignum decoquere, id potissimum me adduxit, vt hanc vini potandi rationem ad commune omnium commodum literis, posteritatiq; memoria mandarem, id quod feci pluribus iam annis elapsis: quo scilicet tempore Dialogus noster de morbo Gallico Bononia excusus prodijt in lucem, vbi eodem anno Carolus Quintus inuictissimus Imperator à Clemente septimo Pontifice maximo imperiali diademate feliciter est coronatus. Ex quo postea factum esse audiui, vt plerique medici ex illis nostris lucubrationibus, breui temporis tractu plurimum laudis ac gloria sibi comparauerint, vt pote qui vinum Guaiaci ad suam praxim vertissent, proptero admodum successu. Licet fuerint, qui alijs persuadere conati sint, suum illud esse inuentum: qui vt rem facilius pratexerent, omnibus huiusmodi vini preparationem dissimulabant & occultabant: vel id facerent, vt rem ita plurimi facientes, inde maiorem quæstum consequi possent. Sed cauendum profecto est à quibusdam impostoribus, qui cū sint earum rerum ignari, quæ ad medica facultatis contemplationem spectant, dum lignum, vel eius cortices ex vino decoquunt, cyclaminum, bryoniam, ptyusam, colocynthidem & turperum admiscunt, atque alias mille cacodæmones, qui eos de medio tollant, quippe nulla habita temperamenti, ægritudinis, temporum anni, sexus, nec etatis ratione, singulis diebus huiusce decocti tepidi cyathum omnibus indifferenter præbent potandum. Quo fit, vt si forte quadam vnum quandoque persanant, decem postea iugulent, tanquam improbi carnifices. Verum vt quisque horum manus euitare, atque effugere possit, opera pretium visum est, vini Guaiaci consiciendi rationem subiungere, ac subinde hauriendi modum addere.

Vini Guaiaci consiciendi, & exhibendi ratio. Sumito igitur ligni Guaiaci præstantissimi libra in scobem tenuissimam attriti, aut tornatili instrumento minutim concisi libras quatuor: corticem eiusdem libras duas: cardui benedicti libram vnam & semis: adiantis, aspleni, florum vrisque buglossi, cuiusque libram, cassie odoratae drachmas sex: feminis anisi fescunciam: sacchari libras quinque. Deinde conijciantur omnia in cado vinario mundo apte capacitatis, desuper affusus vini albi quā optimi & seruentis, libris centum & quinquaginta, mox diligenter vas operculetur, omniaque sic macerari triduo dimittantur. Post triduum vero linteo percolentur, assueturq; huiusce macerationis vinum in alio vase ad ægotantium potum. Siquidem bibitur hoc tam in prandio quā in cæna, secundi Guaiaci decocti loco: non mane, neque vespere serapij vice, quemadmodum temere multi facere consueuerunt. Hoc idem vinum longè etiam melius, & maiore quantitate vindemiarum tempore consici potest, admixtis ligno, cortice, ceterisque alijs recentibus viuis albis in mustum compressis: ibique tandem dimissis, quousque mustum effervescente desinat, & pellucidum clarumq; reddatur: veruntamen multiplicanda sunt omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro vuarum quantitate. Præter huius vini potum cibus associandum, bis in die mane scilicet, & vespere tribus aut quatuor horis, antea quā sumatur cibus, ægotantibus exhibeo decocti ligni ex aqua secundū communem Medicorū vsu senas uncias, admixtis vncijs duabus liquoris hoc modo parandi. Sumito primum adiantis, lupi salictarij, sumaria, aspleni, sena, singulorum manipulos tres: radicem centaurij magni, glycyrrhizæ, siliçulæ, vtriusque buglossi, singulorum vncias quatuor: feminis anisi, metanthij, florum satij & erratici buglossi, omnium santalorum, cassie, quā cinnamomum vocant, singulorum drachmas quinque. Hac ex aqua libra viginti quatuor decoquantur ad tertias, demum colentur. Sumitis deinde præstantissima sena libras duas, conijcitog; in vas fictile oris angustis, demum percolatum decoctum seruens superimponito, ac inde obturato fictili ore puluinaris anserinus plumis sarco, igniq; prius calefacto fictile involuito, & loco calido collocato, itaque per diem ac noctem reponito. Postmodum verè manibus sena premitur, mox dil-

Guaiaci corticis electio.

Guaiaci planta.

Guaiaci facultates.

Matthioli primus vinū ex Guaiaco propinam.

Impostorum fraus cauēda.

Vini Guaiaci consiciendi, & exhibendi ratio.

Syrupus decocto ligni miscendus, & eius parandi ratio.

percolatur: cui adijciuntur diluti rosarum efficaciter aluum subducentis libra sex, sacchari libra octo: effervescunt de-
 inde simul subiecto igne, quousq; tertia pars evanescat: quo facto additur electissimi Rhabarbari minutim comisi uncia ac
 ita iterum fervent omnia donec iulapii modo consistat liquor. Postremo percolatur linteolo, & vase vitreo reconditur. At si
 xerantes multa pituita redundant, decocto prescripto optimi turpeti uncia utiliter addi potest. Superest victus ratio, que
 10 pro tali prescribenda est, scilicet ut tam in prandio, quam in cena edat panis ternas tantum uncias, sive is similaceus ac
 probe in clibano coctus: item totidem carnis pullorum gallinaceorum, perdicum, attagenarum, turdorum ac auicularu in
 filum, vineu ac montibus victitantiu, assata potius quam elixa: quin & vva passa modicum. Bibat autē oportet prescripti
 vini equam cum cibo mensuram. Quod si quis purum id bibere nō posset, diluatur aqua, que in phialis vitreis addita Gua-
 iaci ruciola breui temporis spatio effervuerit. Tempus autem huic curationi aptissimum profecto ver est Martio, Aprili &
 Maio mensibus: quod si hoc tempore fieri non possit, fiat mense Septembri in autumno: nam sicuti aestivū ardorib; & exu-
 20 rente iam serio, non modo diuturna pharmaca, sed ne quidem brevia tollerant homines, ita nec brumali tempore, dum in-
 genti frigore sauit hyems. Interea agris sine metu noxa indulgere licet, modo celi serenitas adsit, ut quandoq; in proximis
 hortu ac virdarijs solatij causa lento gradu deambulent: quippe quoniam eiusmodi hortorum amantate animus pluri-
 mum lenari solet. In hac etiam curandi ratione quosdam magis, alios minus perseverare oportet, pro morbi necessitate &
 saluti mensura. Hac ergo ratione vinū Guaiaci exhibitum non modo medetur cuiq; acerrimo Gallica pestis incommodo;
 sed etiam diuturnis articularum, capitis, nervorum, ventriculi, iocindris, lienisq; morbis pituita genitis mirifice succurrit.
 Nec minus etiam podagra laborantibus opem fert, modo diuturna admodum nō fuerit agritudo. Porro in hoc illud etiam
 observandum est, quod ego Guaiaci vinum h; tantum potandum exhibeo, quibus pituita redundet: vel saltim non exu-
 30 peret hils. Siquidem biliosis secundum ac tertium ligni ex aqua decoctum, vini loco semper cum cibo prabendum censui, ut
 communiter ab alijs fieri solet. Non desunt praterea hoc tempore, qui radicem illam, quam alij CINAM, alij Chinā vo-
 cant, Guaiaco praserant, etsi Vesalius admirabilis humani corporis fabrica professor, oppositū senserit. Huius radicis iam-
 dudum apud Hispanos inualuit vsus contra podagras, maximeq; apud invictissimum Imperatorem Carolum v. cui merito
 praeclaram laudem acceptā referre potest. Aduehitur hac (ut audio) ram à Lusitanis, quam ab Hispanis ex regionibus equi-
 noctiali proximis, legiturq; in littoribus maris e terra euulsa: nam in paludibus exorta ac inde maris fluctibus raptā, in
 litus rejicitur. Radix est fungosa, perinde ac arūdinacea, levis, colore rufescente, Rhodia radicis admodū emula. Praesertur
 recens, firma & qua neq; teridinem, neq; cariē senserit, & qua magis rubescat. Damnat eam acriter Vesalius, ut dixi: sed
 quibus validis rationib; id faciat, compertum satis non habeo, praesertim cum illud certo sciam Casarem invictissimū nun-
 quam ea toties vsu fuisse, nisi ex ea plurimum adiuventi percepisset. Ceterum non minus China, & Guaiaco praestat ea
 radix, quam Hispani ZARZAM PARILLAM vocant, quinimo hic ego asserere possum, nonnullos à me esse curatos


Victus ratio.

China radi-
cis co

Zarza paril-
la confid.

CHINA.

ZARZA PARILLA.



Smilacis a-
spera radix

10 morbo Gallico affectos, qui Guaiaci decocto pluries epoto, antea curari non potuerunt. asseritur hac ab Hispanis ex occiden-
 tali India, sed plantam cum folijs haecenus videre non licuit. Sunt tamen rei plantaria studiosi, qui velint zarzam Paril-
 lam Smilacis aspera esse radicem, in quorum opinionem ego facile concedo. Nam inter ceteros, qui ita esse affirmāt, primus
 fuisse in Italia sicut Lucas Ghinus medicus clarissimus, & rei plantariae peritissimus, qui se vidisse palam affirmabat apud
 Illustrissimū Florentiae Ducē Zarza parilla integram plantā ex Hispania allatam, que omnib; suis partibus ac notis, nihil
 ab aspera Smilace differabat: imō nil aliud hanc plantam esse censebat, quam genuinā Smilacem asperam. Id quod paulo
 20 post experimento deprehendit: siquidem, erutis aspera Smilacis radicibus, earum decocto plures curavit morbo Gallico af-
 fectos. Hoc idem quoq; ab alijs medicis esse factum intelligo, & Roma, praesertim sub Paulo tertio Pontifice Maximo, à
 Giberto Horschio Flandro, Medico non vulgari, & rei plantariae studiosissima, ut libra tertio nest. arum Epistola-
 ram,

rum, historicam hanc posteritatis memoria commendauit Ioannes Hesse Medicus Norimbergensis. Caterum non desunt alij, qui hanc opinionem impugnent, quod videant zarza Parilla, & aspera smilacis radices facie non parum differre, cum ha nodosa, illa vero rugosa habeantur. Ego autem quid de re hac veri affirmare possim, sanè non habeo, quod nusquam integrum viderim. Zarza Parilla plantam. Veruntamen cogor interim sequi Luca Ghini opinionem, quod is (vt ego sincere attestari possum) prater id, quod in censendis plantis, dum vixit nemini secundus habebatur, sed quod candidus admodum fidelis & verax perpetuo fuerit. Nec admodum obstat radicum differentia, quandoquidem (vt Theophrastus est auctor) loci à locis differunt, & sapè climatum, celi, soliq; varietate differunt cum forma, tum sapore & odore plantarum radices. His accedit nomenclatura significatio; namq; zarza parilla apud Hispanos nil aliud designat, quam Rubus viticulosus. Parra enim Hispani vitis dicitur, Parilla viticula, & zarza rubus. Hetrusci quoq; Asperam smilacem, quod aculeos Rubi anulos habeat, Ceruinum rubum appellant. Ea arbores etiam proceras ad summum vsq; scandit: quo fit, vt Hedera aculeata pluribus dicatur. Quamobrem aut asperam smilacem zarzam parillam esse dixerim, aut plantam illi viribus, & facie congenerem. Vix illi exsalfaciens & attenuans, & quæ valenter sudorem prouocat. Peculiariter autem praestat non solum ad Gallicum morbum curandum, sed ad quoscunq; articulorum dolores: quinetiam ad quascunq; cutis infestationes, vlcera contumacia, & Libenas. Auxiliatur praterea ijs, qui œdemate laborant, videturq; proprias habere facultates ad frigidum capitis, & cerebri affectus. Decoquantur huiusce radicis vncia quatuor, in libris quindecim aqua, in qua prius macerata fuerint die & nocte vna, ad medias, ac etiam diutius, vbi decoctum valentius desideretur: vbi autem deferrunt, lieteolo mundo colantur, & asseruatur decoctum ad potandum. Dantur huiusce decocti quotidie aegris tam mane quam vesperi, horis quatuor ante cibum vncia octo, prius calefacti, & deinde sudant in lecto stragulis contecti horis duabus, in trigesimum, & quandoq; (vbi morbus contumax sit) in quadragesimum diem, vsq;. Est hac radix magis tenuium partium, quam China & Guaiacum, ob idq; copiosierem prouocat sudorem, & longè melius morbos, qui sunt in ambitu corporis, curat. Est tamen opera pretium decimo quoq; die bibentes purgare, aut cataportis, aut potionibus ad morbum facientibus. Victus ratio eadem instituitur, quæ Guaiaci decoctum sumentibus institui solet, nempe ex pane biscocto, & vni passu, quauquam quandoq; imbecillioribus gallinacci pulli, & auicula concedantur. Daturq; potandum cum cibo idem decoctum, pro affectuum voluntate. Quibus quoque, vbi serena quietaq; fuerit dies, conceditur, vt paulisper egrediantur. Caterum oportet, vt qui hoc medicamento uti volunt, ij prius præpurcati ad hanc curationem accedant. Sed de zarza parilla hæcenus. Sed iam ad Ebenum redeamus, atq; de nominibus agamus. Eius nomen Græcum est Ξεβος, veluti & Latinum Ebenus: Arabicum, Abanus seu Abenus: Italicum, Ebano. Quod verò Latini Lignum Guaiacum, Lignum sanctum, aut Lignum Indum vocant, Italis, Legno santo, Guaiaco, & Guaiacane appellatur: Germanis, Frankosenholtz: Hispanis, Legno santo, & Legno della antilhas: Gallis, saint bois.

Zarza parilla etymologia apud Hispanos.

Zarza parilla vires.

Decoctio zarza.

Nomina.

Ebeni species.

Guaiacum quid sit.

Guaiaci arboris descriptio.

Guaiaci tria genera.

Palam factum.

Guaiaci primus vsus.

Buuam lues.

China descriptio.

Nomina.

China duplex.

China vsus.

Ebenus duplex Dioscoridi, Ethiopica & Indica: hanc Theophrastus 4. hist. 5. agnouit & duplicem fecit: at Brasauolus in tractatu de morbo gallico (vbi 234. morbi gallici species recenset) Ebeni plures facit species, rubram, albam, luteam, variegatam, de Guaiaco intelligens, cum sint, qui velint Guaiacum Ebenum esse. Guaiaci nomen patrium est, Indi enim Guayacan vocant, nunc Guaiacum, Gaiacum & lignum Indum nominant: quod aliqui Buxi speciem faciunt: alij Ebenum statuunt: alij Ebeni speciem, quod facile concesserimus, propter læuorem similem ei qui est in cornu elaborato: propter spissitudinem materiae, propter ipsius grauitatem, quod in aquis statim subsidat & non fluitet, quæ de Ebano prædicauit Plinius, & in Guaiaco obseruatur: ob vires, cum Galenus Ebano vim extergentem cum caliditate ac partium tenuitate tribuat, quam sanè & in Guaiaco reperias. Est autem arbor (referente Monarde de simp. Indiae occidentalis) Illicis magnitudine ramosa, matrice magna nigricante, cortice crasso, pingui, à ligno sicco facile decidenti: foliis exiguis, duris: flore luteo: fructu rotundo solido, in quo semina velut in Mespilo continentur. Ad nos verò aduehuntur caudices crassi ab incolis in truncos serra incisi, cuius diameter pedis longitudinem penè æquat ligno densissimo, in ambitu albo, vel potius flauescente, in medio nigro Ebeni forma resinoso, sapore non insuauis, subamaro: cortices crassi, cinerei, scabri, amariore ligno. Genera tria, alterum de quo dictum, in insula S. Dominici frequens: alterum in insula S. Iohannis de portu diuise, postea repertum, superiori ferè simile, sed per omnia minus & penè sine matrice, superiore tamen odoratius & amarius, quod ab ipsis illi præponitur, & ob mirandas facultates, lignum sanctum dicitur, de quo videntur aduersaria nomine Palmæ, aut Pali sancti Indiæ occiduae, egisse: verum vtriusq; in lue venerea insignes vires. Multæ sunt Insulae in Oceano in quibus Guaiacum nascitur, vt S. Benedicti, Hispaniola, S. Crucis, S. Dominici, S. Ioannis de portu: egregius tamen in insula S. Ioannis oriri existimatur: sed cum hoc ligno naues onustæ in Hispaniam, Genuam, Venetias, afferantur, nec ratione loci dignosci possit, ex ipsius dotibus eligendum. Tertium genus in Orientalibus etiam repertum magnitudine Fraxini, foliis plantaginis breuibibus ac duris: floribus luteis, fructu iuglandis magnitudine qui esu aluum subducit: cortice annosis nigro, iuuenibus subrutilo. Vsum primum ita narrat: Hispanum magnis doloribus ob luem veneream ab Inda muliere contractam, diuexatum fuisse, cui seruus eius, in ea prouincia medicinam faciens, decoctum ligni propinauerit, quo ipsum restituerit: cuius exemplo multi Hispani eadem lue infecti curati sunt. Cura hæc Hispali statim euulgata, & ab ijs qui ex ea insula redierant per totam Hispaniam & vniuersum orbem. Etsi referant Christophorum Columbum cum viros & mulieres, ex insula S. Dominici in Italiam duxisset, simul & luem, Buuam appellatam, eius regionis familiarem attulisse, vnde & remedium aduectum. CHINA radix est tuberculosa crassa, arundini ferè similis, exterius rubens aut subnigricans, interius candicans aut subrubens, densa & ponderosa cum vegeta est, succo exuta fungosa & leuis redditur, insipida: quæ hederæ modo arbores cauliculis tenuibus raris scandit, suisq; farmentis smilacis asperæ non absimilis, foliis mali Assyrii similibus. In maritimis Chinae Indiae regionibus, copiose proueniens (vnde nomen) Lac. Lob. Lon. Cast. Lugd. Tab. cui & Schina: Chinna seu Cinna, Catalp. Chinae radix, Cord. hist. dicitur. Hæc duplex, alia in India Orientali, alia in India Occidentali, quæ colore interius magis ruffo est. De hac Vesalius libellum conscripsit: multa habet Monardes, Garzias, Acosta (qui integram proposuit plantam) & alii. Vsum huius, non solum ad luem veneream, cum ea in regione frequens sit, sed etiam in sanandis morbis inueteratis, vt in Occidente per Sarsam & Lignum, Lusitani didicere ab Indis, apud quos præ alijs remedijs in pretio est. Modus exhibendi: Accipe radicem in taleolos tenuis incisarum

incisarum vnciam vnam: Atque lib. duodecim, stem in olla obturata horis 24. dein lento igne absq; fumo ad medias coquantur: refrigerata colerur, vitro indita loco calido (sic enim diuini corrupta perdurat, reueretur. Huius aquae calidae vnciae decem agro purgato exhibeantur mane, totidem octo horis à prandio in lecto & ad duas horas sudare debet: Victus obseruatur vt in decocti ligni exhibitione, solum potus variat, qui idem esse debet cum priori, cum duplex non paretur vt ex Ligno. Hic modus triginta diebus, nulla alia purgatione intermixta, cum largus sudor satisfaciatur) continuis obseruari debet, agro in conclau remanente. Post id tempus, aeger 40. diebus cibis boni succi vtetur, & vini loco sit aqua hoc pacto preparata: Sume radicis taleolos paruos decoctos in vmbra exsiccatos vnciam vnam, infunde per horas 24. in libris 12. aquae, dein vt prius ad medias coquantur, & ad vsum (singulis diebus decoctionem parando) seruetur. **SMILAX ASPERA** Peruuiana C.B. Sarza parilla Cas. ob similitudinem cum smilace aspera, quam Hispani Sarza parillam (quasi dicas Rubum viticulum) vocant. Zarza parilla, Lac. Dodo. Monardes Lugd. Salsa parilla, Lob. Tab. Sarsa parilla, Lon. Smilax aspera in Zacynthi insula, quae salsa parilla est, diuersa à smilace aspera Italiae, Alpino. Duum est generum: altera radicibus tenuibus, colore albo ad fuluum vergente, in noua Hispania: altera crassioribus radicibus, ac magis fuluis aut subnigris, efficacior quae in Hondura iuxta flumen quoddam reperitur: de hac Monardes. Huius vsum, Hispani primum ex Peruuia in Europam, nunc à triginta circiter annis inuexere. Variis modis & in huc venerea, & in frigidis capitis affectibus exhibetur, vt habet commentator, at vel solius radicis decoctum, vel ipsius puluerem, vel cum Guaiaco & aliis mixtum. Simplicissimus modus hic: Accipe Sarzae vncias octo, aquae lib. 12. coquantur ad remanentiam librarum quatuor, adde sacchari libras quatuor. Huius decocti exhibeatur, praemissis purgantibus vnciae tres mane & vesperi: vel puluis tenuissimus ex pulpa dempto interno neruo drachmae vnius pondere, cum praedicta decoctione mane ieiuno ventriculo & vesperi post caenam, cum victu boni nutrimenti, & potu aquae eiusdem, exhibetur: quidam puluerem cum vino exhibent. Vel hoc pacto: R. Sarsae vncias duas, Guaiaci vncias quatuor, iuiubarum demptis ossibus, numero triginta sex, pruna pastila demptis ossibus num. vigintiquatuor: Florum borraginis, violarum, singularum vnciam semis: Hordei mundi pugillum, aquae libras duodecim: coquantur ad librarum octo absorptionem: cuius decocti exhibentur mane & vesperi vnciae decem, addita syrui violati vncia vna.

Smilax aspera

Smilax aspera

Vfus

Pōdōs

ROSA

CAP. CXII.

Rosa refrigerat, a [& astringit,] sed sicca magis astringit. b Succus recentibus foliis exprimitur, & lectis fornice vnguibus (sic appellantur candidae foliorum partes) reliquum in pila premi, & teri debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuò versata, ne muceant, neue sitis in iis insideat. Aridis rosis, & in vino decoctis expressis liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac vuluae penna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, praecordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitiis, igni sacro illini prodest: siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri solent vulnerariis antidotis, atque compositionibus, quas antheras vocant. Folio vtuntur in calliblephara. Flos, qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum & cruentas reiectiones sistunt.

a Orib. non legit.

b Addit Cerasi & Myrti

Pōdōs

ROSEI PASTILLI

CAP. CXIII.

Pastilli, quos rhodides vocant, hac ratione conficiuntur. Rosarum viridium, quae nullo antea humore madefactae extabuerint, drachmae quadraginta. Indicae nardi drachmae decem, myrrhae drachmae sex, digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus aequent: siccanturq; in vmbra in fictili non picata, & obturato reconduntur. Alii adiiciunt costi drachmas duas, iridis Illiricae totidem, & vinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium vice collo circumdato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur ad illitiones, & diapasmata, quae fiunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Rosae vulgaris est planta, vt supersuūmi omnino iudicauerim eius historiam à me describi debere. Est domestica & syluestris. Domestica multa sunt genera, quae in vsum medicum veniunt. At vulgarissima in Italia trium sunt generum, albiantes, punicea, & quae ex albo rufescunt, quas vulgo appellant incarnate. Praestantissima, quae puniceo colore tacent: proxima lauis ipsae, quae in rufum candicant: vilissima albiantes, in quarum tamen genere ea odoratissima excipiuntur, quae Hetruscis Damascena, & alijs Moschete vulgò dicuntur. Siquidem non modo ceteras excellunt, quod odore admodum suauis fragrent, sed quod etiam magis aluum subducant, id quod indicat earum iucundissimus odor. Urbana in hortis, viridarijs, pomarijs & vineis florēt. Syluestris in sepibus, senticosis, nemoribus & campestribus prouenit. Rose diuersis partibus constant, quo fit, vt pro diuersis tam internis quam externis particulis, diuersum quoq; temperamentum sihi asiscant. Primum itaq; terrestribus & aqueis partibus, quae tamen in ipsis mediocriter se habent, substantiam & adstrictoriam facultatem acceptas referunt. Ab aereis vero & subdulcem, & odoratum saporem assumunt. Ex his demum, quae ignis naturam sequuntur, amarorem concipiunt, ac etiam coloris rubedinem, quae scilicet rubicunda spectantur, quo fit, vt plus insit caloris puniceis, quam subrubentibus. In recentibus astrictioni praestat amaritudo, in sicca vero minime: eaque propter compertum est, earum deiciens alui facultatem, quam priores Graci non animaduertunt, tantum ex amaritudine prouenire, cum recentes aluum subducant, sicca vero nequaquam. Succus medicamentis componendis expetitus, praestantior è puniceis elicatur, item ex subrutilis, verum huic infirmior facultas. Dilutum Gracis ῥοδόσπερμα, è quo rhodopharmacum aluum innoxie deiciens conficiunt, plerunque ex subrubentium maceratis aqua folijs paratur: etsi hac in re ipsae Damascena Hetruscis vocata longè praestet: quippe ex earum vicinis denoratis folijs facile quidem, & citra noxam subducitur aluum. Rosae subrutilis reserat, discatis, abstergit, & de-

Rosarum es- sideratio.

Rosarum succus & dilu-

ROSA.

ROSA SYLVESTRIS.



Syrupus rosa-
solutivus.

Manardus
arguitur.
Damasce-
netr. note.

Sylvestres ro-
se.

Rosa lutea.
Rosarum ge-
nera ex Plin.

Partes in ro-
sa, earumq;
vires.

& deicit: quapropter & bilem trahit, & sanguinem biliosum expurgat. Idem felle suffusus, & ventriculi, iocinorisq; ob-
structionibus opem mirifice prestat. Cor item corroborat, eiusq; palpitationi salutare est remedium: nam illos deicit hu-
mores, qui cordi officiant. Facit & ad biliosas febres, cuiusmodi sunt cuiusvis generis tertiane. Adhuc rosarum dilutum,
ex quo conficitur rhodopharmacum, quod pharmacopola Syrupum rosatum solutivum appellant, in eorum medicamen-
torum genere recentiores medici recensent, quae quoniam absq; aliqua noxa aluum subducunt, suo more Benedicta nuncu-
pant. Albicantes deinde rose (Damasceas tamen exceptas velim) non alium in medicina sibi vendicant usum, quam ut ex
se aquam stillent: siquidem his deiectionaria vis, qua pollent punicea ac subrutile, multo infirmior inest. Quamobrem videtur
Manardus Ferrariensis, vir alioqui doctissimus, immerito id Mesu: vitio vertisse. Nam alba, quas Damasceas appella-
mus, etsi maiore deiectionaria vi ceteris praestent, credendum tamen est, de his non intellexisse Mesuem: quod eas illi facile in-
cognitas fuisse existimem, verum de his albis tantum, quibus passim roseta florent. Cuius rei illud maximo argumento esse
potest, quod Damasceas Hetruscis vocatae nuper in Italia florere coeperint, quodq; eas veteribus cognitatas fuisse (quod sci-
am) memoria prodiderit, nemo: ni fortasse eas credamus esse, quae Plinio spineolae appellantur. Sane rosa magnificanda
sunt, summoq; in pretio habenda, non modo quod viridatis, & hortus sint ornamento ac aspectu perquam iucundo: sed et-
iam quod in praclarissimis medicamentis conveniant, quibus humana vita succurritur. Sylvestres maiore adstringendi sa-
cultate sunt praeditae, quam sativae, sed minori fragrantia redolent, atq; deiectionaria alui ne tantillum facultati re-
tinent. Idcirco Theophrastus lib. 6. de historia plantarum: Sylvestres, inquit, rosa domesticis asperiores tum virgu-
tum foliis constant: florem praeterea ferunt, quo ab illis odore, colore atque magnitudine superantur: hac Theophrastus.
Ceterum quaedam etiam rosa nascuntur in Italia, quae aureo colore fulgent, sed odore sunt admodum ingrato, atque insua-
ui. Rosarum differentias longa historia prosequitur Plinius lib. 21. cap. 4. vbi sic inquit. Contra rosa genera nostri secrete
celeberrima, Praenestinam & Campanam. Addidere alii Mileciam, cuius sit ardentissimus color, non excedentis duodena
folia. Proximam ei Trachiniam, minus rubentem. Mox Alabandicam villosam, albicantibus foliis. Utillissimam vero
plurimis, sed minutissimis spineolam. Differunt enim multitudine foliorum, asperitate, leuore, colore, odore. Paucissima
quina folia, ac deinde numerosiora. Cum sit genus eius, quam centifoliam vocant, quae est in Campania Italia, Gracia
vero circa Philippos, sed ibi non sua terra prouentu. Pangaeus namque mons in vicino fert, numerosis foliis ac paruis: inde
accola transferentes conserunt, ipsaq; plantatione proficiunt, non autem talis odor, atissima est, nec cui latissimum maxi-
mumq; folium: breuiterq; indicium est odor scabritia corticis: Cyrenis odoratissima est, ideoq; ibi vnguentum pulberri-
mum. Carthagine Hispania hyeme tota praecox. Refert & calis temperies: quibusdam enim annis minus odorata prouenit.
Praeterea locis siccis, quam humidis, omnis est odoratior. Sere nec pinguibus vult, nec argillosis locis, nec riguis, contenta ra-
ris, proprieq; ruderatam agrum amat. Praecox campana, sera Milecia, nouissime tamen desinit Praenestina. Rosa ex spina
nascitur. Germinat primo inclusa granoso cortice, quo mox intumescit, & in virides alabastris fastigiato, paulatim ru-
bescens dehiscit, ac sese pandit, in calicis medio sui stantis complexa luteos apices: haecenus Plinius. Partes in Rosa sex an-
tiqui adnotarunt, quae omnes sunt & scitu dignae, & in medicina vtilis, etsi pauci habeantur seplastarii, qui separatim eas
reponant. Primum quidem duae partes inueniuntur in foliis: quarum altera est, vbi calyci folia inseruntur, vnguium mo-
do albicans, ob idq; rosarum vngues haec extremitates appellantur: altera vero foliorum reliquum. His aliae duae succedunt,
in his stoculis qui veluti minuta semina tenuissimis capillis annexa flauescunt in rosarum vmbilico: horum enim partem
faciunt granula, partem vero capilli. Postremo quae reliquae sunt, in ipso Rosarum alabastris continentur: vna scilicet in
tacumine, altera in fundo. Folia cor, ventriculum, iecur & retentricem insuper facultatem corroborant: doiores ex cali-
ditate

stris humilis vel aenacea, albo est flore: est & rubello: VII. Pomifera. VIII. Rotundifolia: hæc purpureæ familis, sed rotundo quasi folio.

Αἰκίον.

LYCIVM

CAP. CXIII

a Oribasius non legit.
b Addit meū
μίζον θέρμη
καὶ λυγρῶν. i.
medium in
caliditate &
frigiditate.
επαλασία. i.
latis leg. Ori.
d Meum
χυλίζεσαι δὲ
τῶν φύλλων
συνὸς τῶν θέρ-
μοις θλα-
σθέντων. i. E-
licitur succus
foliis vna cū
fructu tuffis
εκαπνόν. i.
Fumum legit
Orib.
f Meum
κίρρον. i. ful-
vum.

Lycium, a [quod aliqui pyxantham vocant,] arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, foliis buxi, densis: b fructu piperis, nigro, lævi, amaro, densoq;: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus c [multis, obliquis,] lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque aliis locis: aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est. d Rami cum radiculis tuffi, & ante per multos dies macerati coquantur, tum abiectis lignis, itidem liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthii succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium semine expresso & insolato. Optimum, quod vri potest, restinctumq; rubentem e [spumam] ostendit, glebis intrinsecus nigris, intus, cum fregeris, f rufis, odore minimè viroso, cum amaritudine astringens, crocino colore: cuiusmodi Indicum est, cæteris præstans & efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum discutit: genarum scabiem, pruritus, veteresq; fluxiones sanat: facit ad purulentas aures, exulceratas gingivas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusq; illirum: celiaciis, dysentericis potum, inditumq; conuenit: datur sanguinem excreantibus & tussi ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: reduiis, vlcerebus, quæ serpunt, aut putrent, medetur: sceminarum profluvia appositum sistit: rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice catapotii deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex fructu lonchitide appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens ternum cubitorum longitudine, maioresve, rubo crassiores, à radice numerosos: fractus cortex rubescit: folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus, & regio morbo mederi, & sceminarum purgationes elicere. Assueuerant etiam crudam in potu, eisdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare, venenis quoque auxilio esse.

I. LYCIVM.

II. LYCIVM ITALICVM.



Rhamnus caryalides
Stemb

Lycii confi-
deratio.


Lycium adul-
terinum.

Lycium medicamentum, quo hodie officina passim vtuntur, nimirum notis illi plurimum reclamatur, quod nobis hic reddidit Dioscorides. Siquidem illud officinarum igni admotum non accenditur, nec intus rufescit, nec vllam gustantibus affert amaritudinem: quæ omnia certo sunt indicio, id omnino imposturis, & adulterijs non vacare. Tradidere quidam hoc ab impostoribus fieri è ligustri fructu, alij id tribuunt periclymeni baccis, alij sanguinea virga corymbis, alij paritè ex his omnibus simul contusis elici produnt, ac inde insolari. At legitimum, & quod syncerum sit, quoquomodo se res illa habeat, compertum est, hoc auo ex Lycia, vnde illi nomen, ad nos non importari. Lycij plantam cuius hic imaginem damus appetitam mihi misit Baptista Balistus Dalmata, Myropola, & rei plantaria studiosus, sed reuera planta ipsa viua à me nusquam visa est. Cæterum quanquam censet vitiligator quidam hanc scilitiam potius quam veram esse Lycij plantam, nos tamen cum Lycij historiam omnibus ferè notis illam representare videamus, eam ex Comentarjs nostris eruncandam non duximus, quousque alius compareat, qui ex Lycia vel Cappadocia, vbi nasci Lycium scribit Dioscorides, veriorẽ Lycij plan-

ej plantam ad nos afferat. Habetur quoq; alia quedam planta, que non parum Lycio anulatur. Hanc primum Verona ad me misit Franciscus Calzolarius rei plantaria admodum studiosus, cuius hic imaginem damus, vt de ea quoq; aliorum sit indurum. Lycium Italicum, planta est aculeata, pruni syluestris faciem referens, minoribus tamen folijs. Flores mittit candidos, e quibus bacca gignuntur, ligustri ferè similes, sapore acerbo atq; adstringenti, e quibus succus exprimitur. Nascitur copiosum in agro Tridentino circa arcem de Gresta, saxosis locis. Adstringit, cohibet, roborat, siccatur & reprimit, & vbi legitimum Lycium non sit ad manus, nihil prohibet, quin hoc eius vice succedere valeat: succus e baccis a me extractus, hac omnia belle prestat. Quinam præterea aculeatus ille sit frutex Lonchitis appellatus, e quo Indicum parari Lycium scribit Dioscorides, baculus mihi non constat. Licij vites Dioscoridi explet amurca in cupreo vase decocta, aut etiam rhus decoctus quousq; eius liquamentum mellis crassitudinem acquirat. Licij meminit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Lycion siue Pyxacanthos, arbor spinosa, ex qua lycium, quod vocant, conficitur: id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata vtuntur, & sedis orisq; phlegmonas ulcerationesq; tum herpes, putredines & vlcera contumacia, & aures pure fluentes, & intertrigines ac paronychias. Est autem facultatis exiccatoria, compositum ex diuersi generis substantijs, quæ in repositis Græci vocant: altera quidem tenuium partium digerente atq; calida: altera terrestri & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hac qualitas pusilla medicamento inest, digerit vero & desiccatur non parum, nempe in sacro recessu, in calore autem medijs & symmetris proximum est. Proinde ad diuersos affectus hoc vtuntur medicamine, vt abstergente quidem ad ea, que pupillas obtenebrant: vt contrabente vero, coliacis, dysentericis, ac muliebri profusio adhibentes. Lycium hoc in Lycia & Cappadocia plurimum prouenit: alterum vero Indicum ad omnia valentius est. Et primo de antidotis, non facile adulterinum lycium a legitimo dignosci idem memoria prodidit: hac Galenus. Caterum

Lycii vites ex Galeno.

III. BUXVS.



quoniam Pyxacantha, quo nomine lycium ab aliquibus appellatur, mihi Buxum, que Græcis βύξος dicitur, in memoriam redegit, non omittendum duximus, quin de ea etiam aliquid dicamus. Buxus itaque nobis notissima est planta, quod plurima in Italia proueniat, folio myrti minore, densiore, crassiore, viridior ac subtrotundior: vires perpetua coma, eaq; propter topiario operi accomodatissima: flore herbaceo, fructu ruta simili, quadruplici, apice in cacumine diuiso, ciceris magnitudine, semine rufescente, omnib. animalib. inuiso. Crassissima in Corsica, flore non ferenda: qua causa amaritudinis mellis. Frigidis gaudet & apricis. Materies buxo honorata, raro crispanti, nec nisi radice: catero lenis quies materia, silentio quodam, & duritie ac pallore commendabilis. Eadem spississima, flaua & densissima atq; ponderosissima, adeo vt in aquis non fluitet, nec cariem sentiat. Exicat manifeste, sed in calore non longe a medijs abest, adstringit quoque & roborat. Hac etsi (vt quidam putant) nullius sit in medicina vsus, & ob id a Dioscoride esse prætermittam, nos tamen compertum habemus capillos rufos fieri, vbi frequenter lauentur lixiuio in quo decocta fuerint folia & rami. Sunt etiam qui dicant ligni scobe hausta, sanari alui profluvia. Non desunt etiam e recentioribus, qui velint non aliud esse Italis buxum, quam Indis lignum, quod Guaiacum appellant: ea tantum ratione ducti, quod pluries experimento compertum sit, eius decocto etiam felicius eos sanatos esse, qui Gallica lue affecti erant. Quod etsi experientia concedi possit, illud buxi lignum prestare: attamen quod buxus in Italia nascens, & Guaiacum ab Indis petitur, vna & eadem sint planta (vt in secunda centuria Amathus Lusitanus asserere videtur) nunquam profecto crediderim. Sed delirant qui vnam & eandem faciunt arborem. Siquidem Guaiacum pingue, resinosumq; visitur: materie in-

Buxi confectio.

Quorundam opinio repro- bata, qui Buxum Guaiacum censent.

Contra Amathum.

quibus omnibus notis siccam buxi materiem catere constat. Quoniam Guaiaco (vt narrat h, qui ab Indis ad nos redeunt) folia insunt plantaginis, breuiora, crassiora durioraq; lutea folijs & fructus iuglandis magnitudine. Buxus vero folia fert myrti, breuiora: flores herbaceos, & fructum myrto nufquam gradatorem. Quo fit: vt omnino existimem eos hallucinari, qui putant buxum que in Italia nascitur, idem esse cum Indico Guaiaco, vt nuper sensisse videtur Lusitanus loco ante dicto. Sed quam ab eo ieiune, ne dicam imprudenter actum sit de simpli. medi. cognitione, eorum facile iudicium futurum spero, qui non mediocriter in re herbaria versati fuerint, & huius scripta legent: atque etiam legere non grauabuntur Apologiam, quam nos aduersus illum scripsimus, cui plurima errata atroximus, qua in eiusdem in Dioscoridem enarrationes adnotauimus. Quoniam autem buxo cum materie, tum quoque baccarum facie quadantenus ea arbor similis spectetur, quam nos in Tuscia vulgari idiomate vocamus Silio: alij vero Fusaro, quod ex ea optimi sili sunt, quibus mulieres e lino stamina ducunt, nos vero Euonimum eam esse putamus, prætermittendum sane non duximus, quin de ea hic scriberemus. EVONIMVS itaque Theophrast. libro tertio, cap. vi. de plantarum historia, arbor est mali punica magnitudine, atque folio eiusdem, maiori quam ebanedaphne, molli, vt punica. Germinare mense Septembri incipit: floret vere: flos colore albæ violæ similis, odore infestus, velut cruorem infersas. Fructus cum putamine siliqua sesama proximus, præterquam quod in versus diuiditur quaternos. Illic pecus eum gustatus, quinetiam folium idem facit, & potissimum capras, nisi purgentur, interimit: purgantur autem Ancho: hac ille. Qua quidem si quis cum Silio nostro conferat, eam Euonimum esse facile conijcet. Id enim vt credam, non solum huiusce planta nota me adducunt, sed quod sciam, arbusculam nobis Silio vocatam, pecoribus esse aduersissimam, quinetiam quod grauius oleat. Lixiuum in quo bacca decocta fuerint (vt nostra referunt mulieres) capillum splendidum facit, surculos extergit, & pediculos necat. Materie est Buxi modo pallida, verum nõ adeo graui ac solida. Nascitur si- que in Italia in sepibus, dumetis & syluis. Errat toto celo Tragus, qui hanc plantam Theophrasti & ias esse contendit.

Euonimi confectio.

Tragus error.

Lycium

Summa Confessio. Sicut.

Nomina.

III. E V O N Y M V S.



Lycium officinarum.

Euonymi differentia.

Euonymus, id est, boni nominis, per antiphrasin, unde quaedam exemplaria habent Anonymos, ut & apud Plinium: duplex est, angustifolia & latifolia: angustifolia, alia granis rubeis vulgaris, quae aliquando & albis variat: alia nigris quae Pannonica. Euonymus vulgaris granis rubris C. B. dicitur Fusanus Crescentio, quod ex eo fusi fiant. Carpinus Theophrasti, Trag. Lon. Anonymos, quae alias Euonymos, Cord. hist. Euonymus Theophrasti, Dod. gal. Thal. Geshor. Lob. Tab. Cast. Terragonia (quadratoria Gaza vertit) Theophrasti Lugd. Siler Plinii, Casalpino.

Lycium Latini similiter atq; Graeci, *Lykion* appellant: Arabes Hadhad, Hadad, Kitulian sine Felz akrag: Itali Licio. Quae vero planta Graeci *Lykion*, Latini *Buxus* appellatur: Italo Bosso: Germanis *Durbaum*: Bohemis *Pospan*. Euonymum deniq; appellant Graeci *Lykion*: Hetrusci, Sili: Itali ceteri *Fusano* sine *Fusaro*, quod ex eo fusi à territoribus fiant: Germani *Spindelbaum*.

Lycii seu pyxacanthae, id est, Buxi aculeati vox cum apud Theophrastum non reperiatur, sunt qui existimant oxyacanthi nomine ab ipso proponi. I. Lycium, Lac. Cast. Tab. Casl. Brass. Lycium alpinum, Lug. Pyxantha, Dod. gal. (cui & Onopyxos Theophrasti) & fol. Lon. II. Lycium Italicum, Lug. & Tab. Meminit & tertii Hispanici nomine Clusius & Lobelius, aliud habet Lug. historia: sic Alpinus, Vzeg pro Lycio Indico habitum, pingit: habet & suum Rauwolfius in suo itinerario: tandem apud Acofiam habetur Cate, quod Lycium putat Garzias. Officina suum Lycium communiter ex Periclymeni baccis gravissimo errore conficiunt, qui error à pandectario promanare videtur, qui Periclymenon cum Pyxantha confundit: alii ex Ligustri fructu: alii ex prunis sylvestribus posset non ita contemnendum succedaneum ex oxyacantha seu acuta spina, aut Rhamno aut Rhois succo fieri, cum & veteres non solum è Lycio, sed & è Rhamnis & aliis quibusdam similiter adstringentibus spinis confecerint. III. Buxus Theophrasti, vel sylvestris Plinio C. B. Buxus herbariis: haec frutex est, quaedam tamen & in arborem excrescit. Est & humilior foliis rotundioribus Chamapyxos Trago & Tabernae. III. E-

Acacia

ACACIA.

CAP. CXV.

a Meū & Cat.
b Meum
c Meum
d Oribas.
e in sole.

A Cacia in Aegypto nascitur, spina instar a arboris, fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & b semen lupino simile in folliculis: ex quo, c succus expressus siccatur & in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modice rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis & semine succum: Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum, ulcera quae serpunt, perniones, pterygia & oris ulcera: procidentes oculos reprimat: mensium abundantiam sistit: prociuum vuluam cohibet: citam aluum supprimit, aut potus aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso, quod concreuerat, donec pura extet aqua, & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec ficile fornacibus percoquatur: torreturque in carbonum halitu perfusa. Spinae decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur eius spinae gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perlucet, ligni expertus: proximum est candidum: sordidum vero ac resinofum inutile. Curis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat: ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum Acaciae genus in Cappadocia, Pontoque provenit, Aegyptiae spinae similitudine, [longe minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rutae, semen lenticula minus fert autumno, in loculis connexis, ternum quaternumve capacibus. Succus eius adstringit,] viribus inferior & ocularibus medicamentis inutilis.

Hae non legit Orib.

Acaciae histo. ex Theophr.

A Rbor, quae Dioscoridi Acacia vocatur, Theophrasto Spina simpliciter dicitur libr. 4. cap. 3. de plan. hist. ubi de ea ita scriptum reliquit: Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horret, excepto caudice: nam & super germina 60 foliaq; aculeos gerit. Magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum tectis idonea caditur. Eius duo genera sunt, quadam enim candida, quadam nigra: & altera imbecillis, facileq; putrescens: nigra autem robustior atq; incorrupta, ob id in nauium fabrica ad costas, ventriq; compagine ea vtuntur. Erecta non valde assurgit. Fructum fert in siliqua, leguminum modo, quo incolae coria perficiunt vice galle. Flos & pulcher aspectu, ut coronas ex eo facerent: & medicamentis perutilis, qua de causa colligi a medicis solet. Fit & gumma ex ea: manat hoc tum arbore percussa, tum sponte sine vlla plaga: cum autem caesa fuerit, anno tertio protinus resurgit. Copia huius arboris largè habetur, & silua ingens circa agrum Thebanum est, ubi & robur & perseae, & olea quoque eo loca emigrat, non aquis fluuij riguo distat enim plus, quam trecentis stadijs) sed suis fontibus, qui circa eum tractum permulti exiliunt. Materies arboris dura & caesa colorem celtis vrique representat: hactenus Theophrasti. A quo Plinius non dissentiens, ipse quoq; eius historiam memoria

Ex Plinio.

I. ACACIA AEGYPTIACA.

II. ACACIA.



III. ARBOR IVD AE.



memoria prodidit lib. xxxiii. cap. xii. cuius sic verba sonant. Est & acacia spina. Fit in Aegypto alba, nigraque arbore, item viridi, sed longe melior e prioribus. Fit & in Galatia tenerrima, spinosiore arbore. Semen omnium lenticula simile minore est tamen & grano, & folliculo. Colligitur autumnis, quoniam ante collectum nimio validius. Spissatur succus ex folliculis aqua caelesti perfusus, mox in pila tussis: exprimitur organis, tum densatur in sole mortarijs in pastillos acacia dicta, arboris videlicet sua nomine. Fit & ex folijs per se minus efficax. Ad toria persicienda semine pro galla vtuntur. Foliorum succus, & Galatiaca acacia nigerrimus improbat: item qui valde rufus est: haec Plinius. Succus e recenti semine expressus, ac postea longa insolatione concretus Gracis nomine sua arboris Acacia nuncupatur. In cuius defectu supponuntur officina, tum medicorum vulgus succum e sylvestribus prunis expressum in tenues quasdam placentulas in sole densatum: siquidem legitima acacia ad nos non affertur. Vbi acacia defecerit, licet (si Dioscoridi credimus) eius vice tum rhoris arbuscula folia, tum lentisci foliorum succum, tum etiam hypocistidem medicamentis immiscere. Quamobrem his potius seplasiarum vti deberent, quam supposititio sylvestrium prunorum succo. Acacia imaginem, quam hic appingi curauimus, detulit ad me Constantinopoli Clarissimus Augerius de Busbeke Flander, Caesareus orator ad Turcarum Imperatorem, quae omnibus suis partibus, notisque, veram legitimaque Theophrasti & Plinii acaciam imitatur. Nam planta integra imago, cuius vnum tantum ramulum appinximus, caudicem habet non in rectum, sed in obliquum se attollentem, nigro omnino libro, ramos, surculosque, vbiq; spinis rigentes. Folijs est rotundis, pyri magnitudine, venosis, parte prona fuliginosis, supina vero ex viridi subalbicantibus, minime serratis, subnigricante pediculo, floribus ex albo purpurascens, & sili-

Acacia officinarum.

Acacia suezcedaneum.

Acacia prima Match. descriptio.

Gummi Arabicum.

P 2

quae, & semine Lupino similibus. Dioscorides tamen Acacia albos reddidit flores. Atqui cum Acacia Theophrasto, & Plinio tum nigra, tum alba, generis diuersitate habeatur, facile crediderim albam, album proferre florem: nigram vero (vt nostra haec est) purpureum, & praesertim cum Theophrastus scribat Acacia florem aspectu esse pulchrum, & coronas ex eo factitari. Nam purpureus color longe pulchrior speciosiorque est quam albus. Scire etiamnum conuenit, gummi, quod ab arbore acaciae manat, ideo Serapioni Arabicum nuncupari, quod ab Arabia regione Aegypto contermina suo tempore importaretur. Sed animaduertere oportet, quod Arabicum vulgare vsus gummi longe quidem ab illo differt, quod ab acacia colligitur.

tur: namq; illud non contractis vermiculis simile, sed in grumis versicoloribus conspicitur, quorum alij succinum, alij toparium, alij chrysoptium, alij beryllum colore, & nitore referunt. Quod autem nobis gummi Acacia desit, illud argumento esse potest, quod ipsa quoq; legitima acacia hactenus, quod sciam, non desertur. Nam si hoc, quo utimur, syncerum, legitimumq; acacia esset gummi, proculdubio ipsa quoq; acacia ad nos conueheretur, cum longe magis in paranda theriaca, alijsq; componendis medicamentis expetatur, quam gummi. Hinc itaq; facile quisq; conijcere potest, gummi ex Aegyptia spina defluens ab eo sane plurimum differre, quod Arabici gummi nomine officinarum vulgus habet. Hoc igitur vulgare gummi illud equidem esse existimauerim, quod Gracis gummi simpliciter vocatur. In quam sententiam me adduxit Galenus, siquidem lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Gummi lachryma est congelata, concretaq; in truncis arborum ipsam fundentium, velut resina quoq; in multis visitur plantis, quae resinam sunderere possunt. Caterum quod exiccatoria, emplasticaq; sit facultatis, constat: haec Galenus. Ex cuius verbis palam est, gummi sic in vniuersum Gracis appellatum, nostrum gummi esse vulgo Arabicum dictum. Quod quidem (quantum sensuum iudicio consequi possumus) ex pluribus arborum gummi miscellaneum est. Cuius rei manifesto indicio sunt cum grumorum forma diuersitas, tum colorum varietas. Huc etiam accedit, quod Galenus vnica nomenclatione omnia earum arborum gummi comprehendit, quae resinam non proferunt. Quamobrem omnino explodenda videtur eorum sententia, qui vbi Graci gummi absolute scriptum reliquerunt, illud gummi intelligendum esse contendunt, quod est spina Aegyptia manat. Non desunt praeterea, qui gummi spina Aegyptia illud esse opinentur, quod gummi Dragaganthi, hoc est, tragacantha officinis appellatur, propterea, quod effigie contractos vermiculos referat, quo nihil certe melius illi competere posset. Sed tamen hoc etiam illud non est, vt suo loco dicemus. Galenus lib. 7. de compositione medicamentorum per genera, Acacia gummi $\alpha\kappa\alpha\theta\eta\ \beta\alpha\iota\eta\ \nu\omicron\upsilon$ vocat: hoc fortasse argumento, quod scripserit Theophrastus (vt supra dictum est) ingentem huiusce spina syluam esse in agro Thebano. Sed cum ad nos non perferatur acacia (vt paulo ante scripsimus) nec etiam eius gummi importari credendum est. Gummi Acacia meminit Iacobus Syluius, vir sane aetatis nostrae ingenio & doctrina celebris, suo de natura simplicium medicamentorum libello, his verbis. Gummi acacia non meminit Galenus in Acacia libro sexto simplicium, vti nec acacia mentionem facit paulo post in Acantha Aegyptia seu Arabica, quo nomine solo Dioscoridi vocatur. Vnde colligas licet, acacia & acantham

Gummi Gracis quid.

Quorundam lapsus.

Dragaganthum.

Iacobi Syluii opinio reprobat.

IV. ACACIA ALTERA.

Acacia alterum genus.

Anguillarii opinio.

Acaciae vires ex Galeno.

Nomina.



Aegyptiam seu Arabicam, diuersas esse in Aegypto spinas arbores: haec ille. Sed mea quidem sententia, Syluius manifeste aberrasse deprehenditur: quandoquidem Galeno acantha Aegyptia arbor vtiq; non est, sed herba è carduorum genere, quemadmodum & Dioscoridi libro tertio $\alpha\kappa\alpha\theta\eta\ \lambda\epsilon\upsilon\kappa\eta$, hoc est, spina alba similis, quam Mauritanii suchas appellant: quocirca eo capite Acacia meminisse Galenus omnino fuisse absurdum. Caterum alteram ACACIAM, quam in Cappadocia, Pontog; prouenire tradit Dioscorides folijs ruta, quamque hic depictam damus, accepimus hoc anno a quodam ex istis, qui rei herbariae dant operam. Et quoniam ea Dioscoridis historiam perbelle representare visa est, non potuit animus non inclinari ad credendum hanc secundam esse Acaciam. Est enim aculeis horrida, folio ruta, semine lenticula minore, in siliquis ternum quaternumve capitibus, quod autumno profert, gustu etiam adstringente: color siliquis aureo quodam fulgore resarsus, adeo vt in sole aurimodo pelluceat. Ab hac sane opinione non recedam, antequam eam viderim plantam, quam Anguillarius secundam Acaciam esse censet. Nam eius iudicio minime subscribam, nisi prius plantam conspexerim. Acacia vires adnotatas reliquit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Acacia & planta ipsa acerba est, & fructus & succus, qui lotus quidem & imbecillior, & minus mordax redditur, vtpote acrimonia quandam per lotionem deponens. Porro si parti alicuius sana illinatur, protinus eam & sicciorem, & contractam efficit, nullum quidem caloris sensum inuehens, sed nec frigoris admodum valentem. Vnde constat medicamentum id esse frigidum, & terrosum, immista quaedam etiam essentia aquea. Et sane coniectura est, non esse simile, verum quasdam in sese dispersas habere partes tenues & calidas, quae in ipsa ablutione

segregentur. Estq; & hoc tertij ordinis exiccantiu, & secundi refrigerantiu, vbi quidem elotus fuerit, illorum vero primii. Nomen, quod $\alpha\kappa\alpha\theta\eta$ habet apud Gracos, idem quod est Acacia, retinet apud Latinos & Italos. Ea autem Arabicè Achachie appellatur.

Acacia ab $\alpha\kappa\alpha\theta\eta$ acuo, quasi acuta, quare Theoph. 4. hist. 3. simpliciter Acanthā, id est spinā, vocat. Spina Aegyptia, ex qua Acacia praeparatur, Aetio lib. 1. & Oribasio. Spina Aegyptia, aliquib. Arabica Gal. 6. simplicium: at Diosc. & Plin. distinxere. I. Acacia Aegyptiaca C. B. Acacia Aegyptia, Dod. Gal. Lug. Acacia, Bellonio in iconib. Dod. Alpino, Acacia prima, Lac. Acacia prima Aegypt. Cam. Acacia Alexandrina, Cast. Spina Acaciae Diosc. Lob. Acanthus Theoph. Anguillaræ. Succus expressus Acacia dicitur Paulo & Aetio, ac Gal. succus Acaciae, lachryma cyanea Andromachi fortè: verum officinarum Acacia prunellorum agrestium succus est diligenter spissatus. Gummi quoque ex hoc manat, veterib. absolute videtur gummi dici, vt apud Gal. 4. secundum loca 4. cui lib. 7. secundum genera gummi Thebaicum, alijs Babylonicum, alijs vermiculatum: gummi acanthinum, Marcello: gummi Alexandrinum, Scribonio dicitur. II. Acacia 1. Matt. Cast. Lug. quae licet videatur nil aliud esse, quam Arbor Iudae, cui aculei adpicti: siquidem tota descriptio, aculeis exceptis, nostrae tertio loco positae conueniat: attamen cum commentator se tale accepisse testetur, nolimus eam remouere, sed potius arboris Iudae iconem veram, vt iuxta se posita dignoscatur, adicere. III. Arbor Iudae dicitur Ges. hor. Dod. Lo. Tab. Lug. cui & Colytea 3. Theoph. quibusdam: Siliqua syluestris Clus. Hisp. Cam. in Matt. Cef. Siliquastrum & illi-

& Siliqua sylvestris & fatua & arbor amoris, Cast. Sycomorus, Stephano Ceratonia sylvestris, Gef. hor. cui & Ceratia agrestis & Cercis Theophrasti. Fabago arbor Bellonio. Floribus est cōmuniter purpureis, quandoq; candidis. IV. Acacia altera, Dod. Gal & fol. Lac. Lugd. Acacia altera Dioscoridis, Lob. Tab. Aspalathus secundus Marantha, Gef. hor. Aspalathus Cæs. Camerario.

VITEX. CAP. CXVI.

Vitex siue lygos, frutex est in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, a asperisq; locis, ac tor-
 10 rentium alueis: ramos gerit longos, fractu peruicaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius: una harum album florem mittit b cum purpureo: altera tantum purpureum & semen, vt piper. Excalfa-
 ctorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potum venenatis ictibus, aqua quæ cutem subiit, licno-
 sisq; auxiliatur: lac euocat: menses ciet, drachmæ pondere in vino potum: genituram exoluit: caput
 tentat, & soporem affert. Decoctum herbæ & seminis in defessione, mulieribus vuluæ malo oportunit
 opitulatur: item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu, vel
 appositu: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide.
 Folia suffitu, aut substratu fugant venenata: illita quoque serpentium moribus auxiliantur, testium du-
 20 rinas cum butyro & foliis vitium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum foliis
 medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui manu teneat, dum iter facit, negatur intertriginem sentire.
 Agnum, quasi dicas castum, vocant Græci, quoniam matronæ in Thesmophoriis Athenensium castita-
 tem custodientes, foliis huius cubitus sibi sternunt, & lygon, quasi vimen, propter inuictam ferè ramo-
 rum flexilitatem.

a Cat. *οις ἐπιδ' ποσ.*
 i. campis vdis.
 b Oia exem.
*σὺν ἰσσοπερ-
 φύρῳ. i. cum
 subpurpureo.*

I. VITEX.

Vitis agnus castus



II. VITEX LATIFO-

lia ferrata.



Vitex, quam vulgus herbariorum Agnum castum appellat, arbuscula est in Italia vulgaris notitia. Duo eius genera Viticis con-
 30 recenset Plinius lib. 24. cap. 9. Maior in arborem salicis modo assurgit: minor ramosa, folijs candidioribus, lanugi-
 nosis. Prima album florem mittit cum purpureo, quæ & candida vocatur: nigra, quæ tantum purpuream. Nascuntur in
 palustribus campis. Non multum à salice vitilium vsu distat vitex: foliorum quoq; aspectu, nisi odore gratior esset. Græci
 lygon vocant, alij agnon, quoniam matrona in Thesmophorijs Athenensium castitatem custodientes folijs cubitus sibi ster-
 40 nunt. dicunt præterea Theophrastus lib. 4. cap. 11. de plantarum historia, cuiusdam plantæ ἐλαίαντος appellata (ex olea
 60 & agno nomenclatione deducta, quod vtriq; similis habeatur) sic inquit. Ελαίαντος natura fruticosa, nec ceteris A-
 meris ab similibus folio, figura quidem proximo ceteris, sed molli, lanuginosq; flore populi alba, sed minore: fructu nullo:
 nascitur plurima super insulas fluitantes. Verum an ea vera sit ἐλαίαντος, quam nouus quidam herbarius in Vmbria, &
 apud Pelignos oriri scribit, nō ausim ego affirmare: quod illam non viderim vsquam. Nascitur tamen & in Bohemia plan-
 50 ta, quæ omnibus notis Eleagno astipulæ videtur. Est enim fruticosa, folio viticis simili, molli ac lanuginoso. Flore albo gra-
 duntur ex virgis propè foliorum exortum prodeunte: odore non insuauis, è quo nullus prouenit fructus. Huic alia per omnia
 similis habetur Vienna Austria, in Viridario Serenissimi Cesaris Ferdinandi, quæ baccas profert olea figura, sed longè mi-
 60 nores apice in summitate aculeo simili. Hanc ego Eleagnum appellarem, quod folio ac virgis Agnum, fructu verd oleam re-
 ferre videatur. Et si sciam Theophrasti Eleagnum non esse, quod hac sterili sit, non fructum ferens, nisi fortasse deceptus
 sit Theophrastus, vel eius codex deprauatus, vt in alijs quàm plurimis locis obseruauimus. Vitex, vt scriptum reliquit Ga-
 lenus

*Ελαίαντος
 Theophrast.*

*Elragi Bo-
 hemicæ hist.*

*Elragi
 alia.*

III OLIVA BOHEMICA
sive Elaagnos.



lenus lib. 6. simplicium medicamentorum, caliditate & siccitate classem tertiam sortita est, verum ea est multum tenuis substantia, tum gustu acris simul & adstringens: ipsas tamen virtutes ad medicinam habet inutiles: ceterum folia, semina, calida, siccaque facultate sunt, substantia vero tenui. Nam & ventibus ita apparet, & gustantibus acris simul & subadstringens percipitur tum folium, tum flos, tum semen. Edendo tamen etiam semen est, verum tam perspicue calfacit, ut capiti hoc nomine dolorem pariat. At si frigitur (nam & sic editur cum bellariis) minus caput tentat. Porro flatu ventris discutit & cum non frigidum, & multo magis cum factum facit. Cohibet praterea semen impetus in venerem tum siccitatis expers, tum etiam ipsam expertum. Folia item, floresque ipsius fructus id ipsum prestare possunt. Itaque non tantum esca, potaque, ad castitatem conferre creduntur, verum etiam substrata. Hinc est, quod Athenis in Theophrasti, hoc est, sacro Cetero, mulieres totum sibi fructum substerunt: hinc illi quoque nomen inditum agni, hoc est, casti. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem memoria teneamus, quae superioribus commentariis sunt dicta, agnum calfacere, simulque exicare, tum omnium maxime flatu discutere. Porro quod exalte tenuitum sit partium, facultas eius indicio est. Nam quod caput tentat, non magis a multitudine vaporum ab eo prognatorum, quam a caliditate eius ac subtilitate partium fieri rationabile est. Nam si flatuosum spiritum procreare posset, sanis & ventrem inflaret, & venerem simularet, perinde ut crucia: verum cum non tantum non excitare, imo etiam reprimere queat, fuerit profecto secundum rursus maxime facultatem tum in exalfaciendo, tum in resiccando: non tamen illi par est, nam utroque paulo est inferior: siquidem rursus, tum magis est exalfactoria, tum magis desiccatoria. Differt etiam qualitatis simul ac facultatis mixture. Nam agni semen ac germina modicam

ferunt adstrictionem: at ruta ubi aruerit, exalte amara est, & acris: ubi vero humida, subamara. Non tamen austeritas, aut acerbitas illi inest: aut si cui videatur inesse, ea utique omnino obscura, scio, videbitur, nec par ei, quae est in agno. Quocirca & adiecit, & lienem indurata, & obstructa agni semen potius, quam ruta competit. Sed hac ad curandam methodum pertinent, quam ut omnino non attingam de medicamentorum pronuncians facultatibus, fieri non potest: verum celeriter ad rem propositam reflectere, viri est utique temperati: magisque, etiam id ipsum in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est, ubi ex quibusdam paucis evidentibus generalem facultatem collegero, particulares postea actiones omittam. Nam in praesens id solum novisse sufficit, quod agnus calidus est & siccus facultate, idque non mediocriter, sed tertio excessu, tum admodum tenuium partium. Hac qui norit, ac postea methodum curandi diduerit, ipsemet inueniet, quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto luesitudinem soluens, seu acopum, & exalfactorium ex eo unguentum prepararetur: haecenus Galenus. Huius planta nomen Graecum est ἀγνος ἄγνος: Latinum Agnus, Vitex & Salix amerina: Arabicum Famanchest, Samanchest seu Bengiechest: Italicum Vitice & vulgare, Agno casto: Germanicum Schaffemullen vñnd Reuschlamb: Hispanicum, Garriglio casto: Bohemicum Drmek: Gallicum Agnus castus & officinis.

Vitex, ἀγνος: quasi castus, licet Gaza apud Theophrastum Amerinam sit interpretatus: & ἄγνος, vimen, propter inuictam ferè ramorum exilitatem, unde fortè nomen Viticis. Non solum floris colore variat, sed & foliorum, altera namque est angustiore, altera latiore & serrato folio, quare vtriusque figuram adposuimus, cum vtramque in Patauino horto medico ante viginti annos collegerimus. I. Vitex angustifolia C.B. Vitex maior candida Plinio: Vitex, Trag. Dod. Gal. fol. Lac. Lon. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lug. Cxf. Cam. Agnus castus, Cost. & officinis. Elaagnon Theophrasti. Vitex, Lob. II. Vitex latifolia serrata. C.B. Vitex latiore & serrato folio, Lob. Lugd. Vitex minor, quae & nigra Plinio, Cxf. III. Olea Bohemica & Elaagnos Matth. Lugd. Ziziphus alba Columellae, Bello. in obser. Gef. hor. Cluf. Hisp. Cam. Ziziphus Capadocica Bell. Dodo. Lugd. cui & arbor Paradisea à floris odore. Salix amerina Amato: olea syluestris Septentrionalium, & Elaagnos Theophrasti folio viticis Lobelo.

I'ria.

SALIX.

CAP. CXVII.

2 Cat. 68
ἐν τῶν φύλων
λαοῦ πλὴν
ἀνθρονὸν καὶ
ἀγνος ἄγνος
Ἰ. Succus ex
foliis tempore
floris in
cortice mali
punci calfa-
ctus.
b Meum
τὸ ἐπιπο-
τὸν τῆς
κόρυφου. i. que
obtenebrant
pupillas.

Salicis confectio.

Salix vulgo nota est. Cuius semen, folia, cortex & succus spissandi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere & vino pota, ileosis subueniunt: sumpta per se, & cum aqua, praestant mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdem praebet effectus: corticis cinis admisto aceto maceratus, illitu clauos, & callos tollit. ^a Ex foliis & cortice, succus cum rosacco in calyce punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri utilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus, qui manat ex ea, cum floret, exciso cortice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda, ^b quae obstant oculis suam vim praebet.

Quamuis de Salice, ut vna tantum agat Dioscorides, eius tamen plura traduntur genera tum à Theophrasto lib. 3. cap. 13. de plan. hist. tum etiam à Plinio lib. 16. cap. 37. Nam quaedam in tantam proceritatem assurgunt, ut ex eis in Liguria fiant & pertica & pali maximi vsus ad vitium pedamenta. Alia non tam procerata crescunt, colore rufescentes, sequacis lentitia, quae ligandis cadorum vinariorum circulus commode finduntur. Hanc Salicem Graeci vocant ἄγνος, ut

ye 18-

SALIX.

SALIX LATIFOLIA
rotunda.



SALIX HUMILIS REPENS.



rustica libro. Rursum alia firmiores cortibus & rusticana suppellectili admodum expetita. Alia deniq; sunt minuscula ac spectabili tenuitate, texendis canistris, cistellis ac talatibus aptissima, omnibus folia oleaginea oblonga, superne videntia, & inferne candidantia. Nascuntur humecto solo in fluviorum & fossarum argeribus. Salicis lachrymam trium generum esse prodidit Plinius lib. 24. cap. 9. tamen si unius tantum generis meminerit Dioscorides. Vnam arbor ipsa sponte exudat, altera manat in plagam, cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine: terra est detuncatione ramorum autumni tempore a falce distillans. Caterum qui salicis albicantem spumam adnotatam reliquerit, inuenio neminem: qua delapsis statim floribus ex amisculis vix modo dependet, donec ventis arrepta huc & illuc pluma modo impellitur. Salix cito senescit, ac breui vite spatio perdurat. Salicis recentia folia vtiliter a Medicis adhaerent in latioribus, quae ad serinum conciliandum parantur, sparguntur eadem vtiliter circa febricitantium lectulos. E-potum salicis decoctum, aut lixiuum de salicis cinere paratum, inherentes guttas hirudines necat soluitq; viridia sparguntur vtiliter circa febricitantium lectulos. Ligni materies, cadu ac scutis consiciendis, aptissima. a suo lentore & angustum max sit, & leuitate polleat. Salicis vires memoria prodidit Galenus lib. 6. simp. med. huius verbi. Salicis folijs ad truenti vlnneris glutinationem qua vti posset. Verum floribus eius maxime prope omnes vtuntur medici ad exiccantis emplastri preparationem: est. n. vis eorum ita desiccatoria, vt morsu abstineat: habet vero et quendam adstrictionem. Sunt vero etiam, qui succum ex ea expressum, medicamen seruent mordacitatis experti, & exiccatoriu, ad multas res vtile. Haud enim inueniatur quid ad plures res vtilius, medicamento circa mordacitatem exiccante, quod paulum etiam adstringat, sicut in opere de medicamentorum compositione exactius demonstrabitur. Porro arboris cortex similem facultatem obtinet tum floribus, tum folijs, nisi quod temperatura sit sicioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusq; cinere vtuntur ad omnia, quae valenter desiccare oportet. Nam clauos quos vocant callos, Graeci rulas, myrmecciasq; tollunt, aceto acris ipsum miderantes. Nonnulli autem dum floret salix, cortice eius incidunt & succum quendam colligunt, vtunturq; ad ea, quae pupillas offuscant, extergere videlicet, simulq; tenasium partium medicamina. Vti vero illo ad multa alia quae posset, siquidem salis fuerit. Salix ita Latini dicunt, Graeci ita: Arabibus Bales, Bbulet, Nouina.

Salicis lachryma triplex Plinio.

Salicis spuma.

Salicis vires ex Galeno.

Salix asperus Plinio
Sluunt

Salicis lachryma triplex Plinio.

Salicis spuma.

Salicis vires ex Galeno.

Salicis lachryma triplex Plinio.

Salicis spuma.

Salicis vires ex Galeno.

Salix aut Chalif nominatur: Italia Salice & Salice: Germania Weiden vud Selbinger: Hispania Salce aut Salguir: Gallia Saulz: Bohemia Verba.

Salicis differe-
ntia.

Salix *ἰτιά*, ὅτι τὸ ἴτιον quod ea celeritate crescat, vt salire videatur: ὠλισίανον frugiperda Homero, quia ocysimè semen amittat, vt habet Theophrastus 3. hist. 2. & Plinius lib. 16. cap. 26. Salix alia perticalis, alia viminalis. Perticalis, quæ vulgaris & prima, vel est sterilis, flores ferens amentaceos ante folia: vel est fructifera, ferens racemulos populi instar oblongis granulis. Viminalis variat colore corticis magnitudine & fructu. Colore est cortex albo seu pallido, Gallica dicta: nigro, phænicea Theophrasto, purpurea Plinii: luteo, Græca dicta, vitellina Plinio: Cinereo, quæ latifolia seu aquatica. Magnitudine, alia viminalis magna, alia parua: magna quæ secunda est salix purpurea nigra viminalis, cui peculiare quod ad cuiusq; folii petiolum gemina semper sint foliola, *μελανόφλοιον* Theophrasto: tertia salix phænico-phloios siue phænicea: quarta salix lutea: quinta salix latifolia, quam aliqui Elæagnon Theoph. censent, quæ duplex, alia folio oblongo, quæ salix caprea latifolia Tab. alia folio rotundo, salix quarta Trago, cuius iconem adposuimus: sexta salix angustifolia: septima, salix foliis longissimis, Eleagnos Lugdunensi. Parua variat foliis latis & angustis: latis salix humilis repens, cuius iconem adposuimus, quæ duplex est apud Clusium historia Pannonica, hæc octaua est & nona: decima est rotundifolia in historia nostra describenda. Angustifolia duplex Clusio, vndecima & duodecima: decima tertia, salix Helice Lugdunensi, quæ baccas fert rubentes & caput squaminis compactum: decima quarta salix marina quæ testis ostrearum & saxi in mari adhaerit. Fructu variat, quod alia sterilis, alia fructifera, vt supra dictum.

Ἄγριαια

SYLVESTRIS OLEA.

CAP. CXVIII.

Sylvestris olea, quam aliqui cotinon, id est, oleastrum appellant, alii Æthiopicam oliuam: folia stringunt, trita autem & imposita ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, redurias, nomasque cohibent, crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant: inflammationes, panosque cum melle imposita discutiunt, cutem à capite vulsam conglutinant: oris vlceribus, & priuatim infantium commanducata medentur. Succus & decoctum eisdem habent effectus: sanguinis eruptiones ac muliebri profluuium, ad motus succus inhihet: vix oculorum pustulifera prodest: vlcera & veteres defluxiones sistit: quapropter in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Exprimitur succus rufis foliis, affuso vino aut aqua, succatusque sole in pastillos digeritur: sed longe validior ad recondendum succus habetur, qui cum vino, quam cum aqua expressus est: auribus subuenit siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter coeliacis cum farina hordeacea illinuntur. Vrantur cum floribus folia, vt spodii vicem cinis præstet, in cruda olla, obliato ore luto, vsque dum sigulinum percoquatur: restinctaque vino, & rursus subacta, eodem modo vrantur: postremo cerusa modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem viribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadem vis intelligitur, sed aliquanto inferior: vnde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem vim conuenientior est. Sudor ligni virenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuribus & vlceribus, quæ depascunt, vorantque: quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina scabros vngues excutit. Colymbades trita, & ambustis illita, pustulas gigni prohibent: sordida vlcera purgant. Muria succus collatas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua b flaua & recens stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet: arefacta illitu depalcencia vlcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum sylvestris oliuæ gingiuis putri vligine laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilis: calfacti fatus gingiuis fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

a Meum
ἄγριον ἰ.
ἰαχύν.

b Meum
ἄγριον ἰ.
ἰαχύν.

Δάκρυον αἰθιοπικῆς ἐλαίας.

LACHRYMA ÆTHIOPICÆ OLEÆ.

CAP.

CXIX.

Que conclu-
sant tribus
in locis non
leg. Oris.
a Meum
ἄγριον ἰ.
ἰαχύν.
a magnum
& lene.

Lachryma, quam Æthiopica olea stillat, scammonio similis quadantenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem [ammoniaci aut gummi similitudinem refert,] colore a nigricans, [nec] gustu mordens, superuacua est. Nostrates [olea,] oleastri [que] similem lachrymam sudant, quæ commode ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices, albuginesque illitu emendat: vrinam & menses ciet: cauis dentium impressa ad dolores efficax est. Inter venena scribitur, partus pellit: lepras & impetigines sanat. Appellatur autem Æthiopica & agrestis olea.

Ἀμόργη.

AMURCA.

CAP. CXX.

a Meum
ἄγριον ἰ.
ἰαχύν.

Amurca a [expressæ] oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycii effectus. Insuper dentium dolori, & vulneribus cum aceto, vino, aut multo commode illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inducto suo obstructa. Verustate meliorem fieri constat. Utiliter infunditur sedis, genitalium ac vuluæ exulcerationi. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cum decocto lupini, & chamaeleonte illitu sanat. Cruda & recenti amurca podagras, articularesque dolores foueri, vtilissimum: peruncta in villosa pelle & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

I. OLEA SYLVESTRIS.

Olea Europaea

II. OLEA DOMESTICA.



¶ **C**um oliua, oleum, olea Aethiopica lachryma, & amurca ex vna tantum arbore prodeant: non ab re duximus de his omnibus simul pertractare, & ita singulis partibus vnica commentatione, quantum opus erit, satisfacere, & quicquid ad eas spectat, simul perstringere. Olea itaq; folia habent longa, in acutum desinentia, crassa, pinguiq;, supernè virentia, inferne albicantia, sapore amaro & acrisculo. Florent omnes Iulio mense floribus albis, racematim prodeuntibus, è quib. baccæ prodeunt primum virides, deinde appropinquante maturitate pallescunt, tandem purpureæ prius factæ saturate nigrescunt: decerpuntur mense Nouembri & Decembri, namq; antea non maturefcunt. Sternuntur deinde in pavementis, donec rugosa fiant, deinde mole supponuntur, & torculari premuntur, affusa feruenti aqua: ita enim oleum reddunt. Ligni materies pulchra, solida, venosa, crispa, ardetq; viridis, perinde ac sicca: seruntur in collibus, & in campo. Nascuntur syluestres olea copiosa in agro nostro Senensi, alijsq; Hetruria locis: nascuntur & in Dalmatia tractu, & in quam plurimis Adriatici & Aegæi maris insulis, verum domesticæ longe minores, folijs breuioribus aculeatisq; ramis. Earum bacca etsi numerosa succiditate vincant, magnitudine tamen satiuu cedunt: quin & gustatu adstringentiore sentiuntur, & ori sapidiores existunt. Cuius rei certo sunt testimonio turdi, merula ac sturni: quippe quoniam syluestres oliuæ libentius deuorant, quam feruas. Incola, qui aucupijs delectantur, agrestes oleas summo studio ac industria ab arboribus tuentur: nempe quod confecta siliuarum vindemia, auicula ad has aduolant, vbi mense Decembri & Ianuario visco innumera capiuntur, praesertimq; turdi. Pauci admodum sunt in Hetruria, qui oleastri baccas legant vt oleum inde exprimant: nam ea demum magna siliuarum copia est, quæ facit, vt inibi omnino parvipendantur syluestres. Oliuarum genera decem in antiquorum notitiam peruenisse reperio, paucias videlicet, algianas, licinianas, sergias, ueuias, culminias, orchites, regias, circites, murteas: etsi Forsk. trium generum tantum meminerit, quem admodum etiam plura non nouit hac nostra ætate Hetruria, praesertimq; Senensis ager. Primum harum genus eas nostri faciunt, quæ licet à minoribus olearum plantis proferantur, sunt tamen speciosa forma & magnitudine, Bononiensibus non quidem inferiores: his tantum muria asseruatis vtuntur in cibis: quandoquidem oleo minus apta sunt, quod multo plus amurca quam olei fundant. Proxima tum colore, tum magnitudine præstantes, quamuis prædictis longe minores sint, sunt tamen omnium aptissima ad olei conficiendi usum: quippe quod oleum ex eis expressum, sit non modo flauum, dulce, pellucidum ac cateris præstans, sed etiam copiosum. Gignuntur hæc à procerissimis oleis, prægrandibus, iuglandium nucum instar, ramos in altum latumq; amplissime fundentibus, eas rura nostra Oliastre vulgo vocant. Tertij verò ac postremi generis ea deniq; sunt, quæ passim in vniuersa Italia nascuntur, & omnium vulgarissima habentur. Laudatissima oliua Bononiensibus & nostratibus crassiores muria asseruata Romam, Venetiam, & ad alias cõplures Italia clarissimas vrbes, vbi magnifica, opiparæq; parantur mensæ, ex Hispania importantur. Conducuntur muria oliua breui tempore, seruat a natua viriditate, hoc modo. Sumuntur calcis viua cribrata libras sex, aquæ q; sufficit ad dissoluendum, quousq; calx pulcicula liquida fiat, huic adduntur cineris querni cribrati libras duodecim, & aqua tantum, q; sufficiat ad dissoluendum: deinde in hac pulcicula macerentur oliuarum viridium electarum libra viginti quinque, boru octo continuis, aut ad summum decem (hoc temporis spatium omnem amaritudinem exuent) sed interim lignea vnde leuiter commisceantur, ne ledantur, contundanturve. Eximuntur deinde, & lauantur in aqua, in qua posthac materantur quinu, seu uve dieb. mutata, affusaq; sepius aqua: Extrahuntur deinde, & condiuntur muria in qua serbuerint prius facinulacæ caules in particulas dissecti: & asseruantur sicili, q; commodum fuerit. Ita enim parata natiuam viriditatem seruant, & esui delectabiliores euadunt. Caterum olea, & quercus tam pertinaci odio inter se disident (si rei agraria scriptoribus fides est adhibenda) vt altera prope altera depacta breui tempore pereat. Olea item si primo germinatu a capra depascantur, adeo sterilefcunt, vt nullo remeato in posterum prolifica fiant. At si alia de causa raras admodum, vel nullas proferant baccas,

Olea confideratio.

Olea syluestres

Oliuarum genera decem,

Oliuæ conficiendi ratio.

Olea & quercus odium.

Aethiopicæ oleæ lachryma. baccas, nudatas earum radices à circumstante terra hybernis algoribus opponere, certissimum est remedium. Amant olea apricos tractus & colles, calidasq; regiones, nam in frigidis locis non proueniunt. Syluestris seu Aethiopica olea lachryma, licet multis polleat viribus, eius tamen in Italicis officinis nullus est vsus: neque quod ea ad nos afferatur, adhuc compertum habeo. Sunt, qui hanc putent illud esse gummi, quod medici recentiores, & officina gummi elemi appellant. Verum illud certo argumento est, olea Aethiopica lachrymam gummi elemi non esse, quod gustatu mordax non sit, neq; linguam vellicet: tum etiam, quod omnibus perspicuum sit, eam lachrymam (et si improprie gummi appelletur) non in gummi quidem, sed verius in resinarum genere esse recipiendam: cum igni exposita statim colliquescat & diffundatur, quemadmodum & resina, qua è pinu, picea, & alijs resinam fundentibus plantis colliguntur: licet nobis prorsus ignota sit planta, à qua in Oriente desluit. Siquidem nullum gummi genus (quod ego sciam) igne colliquescit, nisi addito aceto vel vino: quin potius statim comburitur. Est & alia olea maris rubri lachryma, ex qua (vt Theophrastus inquit lib. 4. cap. 8.) medici sistendo sanguini medicamentum componunt. Caterum quamuis atate nostra obscura admodum sit gummi elemi origo, eius tamen vires clarissima apud chirurgicos & vulnerarios medicos reperiuntur: nam in caluaria fracturis, ac vulneribus mirifice vnguentis, & emplastris additur, adeo vt praestantissimum sit in his sanandis medicamentum. De Amurca olei postremo nil aliud dicendum est, nisi quod sit admodum vtilis (vt memoria prodidit Cato) apothecarum & officinarum fabricis, vbi lanei, vel sericei panni reconduntur. Nam si calci admisceatur, & ex ea inde parietes incrustentur, oblinanturq; item laquearia & pavimenta, non modò parietes contractos, vel aduentitios humores nunquam collachrymant, & situm minime contrahunt: sed nec blattæ, nec aranei, nec cuiusvis generis vermiculi ibidem gigni possunt. Syluestris oliua oleum ceteris adstringentius est. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur, sudores illitu arcer, & desuantes capillos cohibet, capitis furfures, vlcera manantia, scabiemq; abstergit. Tardius etiam canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Oliua vires prodidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit. Oliua rami quantum habent adstrictionis, tanta & frigiditatis participes sunt. Fructus verò, si quidem ad vnguem maturuit, moderatè calidus est: sin immaturus est, magis tum adstringit, tum refrigerat. Olea syluestris rami, ac folia magis adstringunt, magisq; refrigerant quam domestica. Olea satiuia, sic Latine, vt ἐλαία ἡμαρτος Græcè vocatur: Arabicè Saiton seu Caiton: Italicè Oliuo domestico: Germanicè Delbaum: Hispanicè Oliuo & Azeitimo: Gallicè Oliuier. Syluestris autem Græcis Ἀγριελαια, ἡ κρότιος appellatur: Latinis, Oleaster & Olea syluestris: Italis Oliuo saluatico: Germanis Wilder Delbaum: Hispanis Azebuche: Galis Oliuier sauvage.

Amurca olei.

Oliuæ vires ex Galeno.

Nomina.

Olea satiuia est & syluestris. I. Syluestris olea seu Corinus Dioscoridi: olea syluestris, Lac. Lob. Dod. Tab. Oleaster Lon. Lug. Cæf. II. Satiua, olea & olea satiuia herbariis dicitur. Oliuarum genera plura proposuit Plinius lib. 15. cap. 3. Columella verò lib. 5. cap. 8. decem recensuit. At Virgilius 2. Georgicorum tria enumerat quæ nota satis, Orchites, Rhadios & Pausias. Tria quoq; ad nos adferuntur genera: grandissimæ nucis ferè magnitudine ex Hispania muria conditæ, quæ Superbæ Plinii fortè: dein maiusculæ & oblongæ ex Gallia & Italia: tum Genua minores rotundiores, quæ Oliuellæ vocantur. Verum apud Generosum Baronem Rudolphum à Salis Cæsareæ Maiestatis consiliarium, aliquoties comedimus peculiariæ à prædictis oliuas, quæ oblongæ sunt & magnitudine ad Hispanicas accedunt, verum minore sunt pulpa seu carne & nigricantes, quæ in Rhartia suis in hortis proueniunt.

Ἀπὸς QVERCVS. ἡλατος GLANS. ὄρνις FAGVS.
Πείρος. ILEX. CAP. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quinetiâ tunicam putamini glandis subiecta. Decoctum ex iis datur dysentericis, cæliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pello scæminis fluxione vuluæ laborantibus subiicitur. Glandes eisdem effectus exhibent: vrinam ciunt: capitis dolorem, & flatus in cibum sumptæ pariunt: resistunt esitata venenatorum ictibus. Decoctum earum, & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica. Inritæ crudæ inflammationes illitu leniunt ad duritias, quas cacoethe vocant, & malefica vlcera cum falsa axungia conueniunt. Iligneæ glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & Ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneæ radicis cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Glandiferarum arborum cōsideratio. Sunt & alia glandiferi generis arbores, præter Quercum, Ilicem & Fagum: inter quas numerantur Cerrus, Suber, Aesculus, Phellodrys & alia nonnulla, qua suo more rura nostra appellant, quarum omnium exacte rationem reddere potest vniuersa Hetruria. Quippe quod & in maritimis nostris Senensibus, & Faliscorum agro, ac etiam Romano tractu, omnia hæc glandiferarum genera adeo numerosa in vastissimis syluis proueniunt, vt glandibus innumerabiles porcorum greges incolæ ibi quotannis saginent. Verum ne aliquis existimet, harum non meminisse Dioscoridem, quod fortasse eas non cognouerit, sciendum est, eum, meo quidem iudicio ἰπύρος nomine comprehendisse in vniuersum omnes glandiferas arbores non solum quod sciret, vna voce omnia illa genera contineri posse, sed etiam vt breuitati consuleret: ἰπύρος enim apud Græcos non modo quercum particulatim significat, sed vniuersim quamcunque glandiferam arborem. Quo fit, vt dixerit ipse: Quercus quæ adstringit. Quercus folijs est oblongis, firmis, robustis, per ambitum vtrinq; sinuatis, caudice crasso, cortice rudi, scabroq; in ramis vero leuiori. Materie robusta, dura, graui, compacta, firmaq;. Glandifera est arbor, & præter glandes Gallas quoque producit cum maiores, tum etiam minores, quas omphacitides vocant. Alios quoq; fert fructus de quibus Theophrastus. Porro mirum est (vt Theophrastus est auctor lib. 3. cap. 8. & 9. de plantarum historia) quod alia plurima præter fructum ferat quercus. Nam gallam gignit paruulam atq; alteram resinosa & nigram: quin & aliud specie veluti morum, sed durum & fractu admodum difficile, id tamen rarum: ad hæc aliud effigiem colis representans. Cum verò perficitur, durum quid parte emicante & perforatum, & tauri caput quodammodo emulans profert, quod præruptum nuclei olea speciem intus ostendit. Fert & quod quidam pilum appellant. Id pilula est comam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernarum luminibus vtuntur: flagrat etenim probe, vt galla nigra. Fert & alteram conigeram pilulam, ceterum quidem inuicilem.

Quercus quæ proferat ex Theoph.

I. QVERCVS LATIFOLIA.

II. QVERCVS FLORENS.



II. QVERCVS.



utilem, verno autem tempore succo melligeno inficietem, tum tactu, tum gustatu. Inq, ramorum alie pilulam aliam gignit sine pediculo, concauoq, sessilem, peculiarem certe, versicoloremq, Nam eminentes quosdam umbilicos candidantes, vel passim variantes nigris maculis habet: partem mediam grantinctura infectam, splendidamq, ostendit aperta, nigra & putricans cernitur. Lapillum quoq, puniceam magna ex parte gignit, quanquam raro. Item aliam eo rariorem pilulam e folijs contolutam, compressam atq, oblongam. Super folijs vero tergo adhaerentem pilulam fert candidam, aquosam, dum tenera est: hac etiam interdum muscas intus continet, veniensq, ad incrementum iustum in modum lanis paruulo galla indurescit. Fungos omitto, qui e radicibus, & iuxta radices erumpunt: communes enim eos cum ceteris habet arboribus. Quinetiam viscum taceo, quippe cum in alijs quoq, proveniat. Sed nihilominus (vt dictum est) ferax hac arbor habetur plurimarum: hactenus Theophrastus. Ceterum non dubitandum est, quin omnes q, partes suas habeant vsus, suisq, possent virib. Stillatitia aqua, qua in balnei calentis aqua vitreo organo a tenellis quercu folijs primo ipsaru exortu decerpitur, citur, iocineris defluxiones sistit, reuulcalentos comminuit, & mulierum alba profluvia cohibet. Datur quoq, potanda vtiliter dysentericis, & sanguine reijciend. bus. Sunt qui in pestilentialibus febrib, eam propinent, q, aduersus venena non paruum valeat. Recentia folia ventriculi ardorem tollunt, si super lingua teneatur. Ceterum aqua qua in marcescentiu quercuum reperitur cauitatibus, scabiem sanne ulcerosam sanat. Glandes vrinam ciunt & resistunt deurrata venenatorum moribus. Inrita, cruda inflammationes leniunt. Ad haec eius echinata pilula sicca, ac vitra vim apprinte adstrictoria possident: eaq, ppter efficacissimod sunt remedia contra omnes alui fluxiones. In suma praestant, vbi supprimere sit opus. FAGVS quoq,

Aqua folioru quercus & eius vites.

Fagi conf. deratio.

glandiferu arborib, adnumeratur, tamen si fructus effigies glandib, prsus reclamet. Est autē Fagus folio carpini nō absimili, graduore tamē, leuiore, nec adeo crispo. Atqui, vt ad fructū redeamus, est quidē is extrema parte, calyculo includitur rotūdo quadantenu echinato, hispido ac scabro: interius verō triāgulari forma nuclei sunt, qui tenui & laui cute, castanearu modo, in atrū rubescete obteguntur. Nucleus albicat, horū sapor dulcis & subastringēs. Materies dura, sed nō admodū firma, arbor in magnā assurgit proceritate, ramis grandiorib, ac patulis. Prouenit in syluis, tam in planitie quā in montib, & colibus. Glies hoc pabulo maxime delectatur ac pinguescunt: quāvobre cum eius aduenit maturitas, innumeri capiuntur glitros in Carniola, Stiria & Carinthia syluis: quippe q, in locis incolae mane inspexeris, qui saccos glirib, plenos ferāt vna tantū nocte capti. Delectatur fagi fructu et mures, siquidē e longinquis regionib, natura ducti gregatim syluas ingrediuntur. Nō & sciam gratib, est cib, ac et turdis, merulis, alijsq, cōplurib, volatilib, Quin & obsessos hastib, hōmes in oppido Chio ea tantū

glands



XI. ILEX LATIFOLIA spinosa.



Ilex conf. deratio & historia.

Ilex duplex.

Smilacis con sideratio ex Theophrast.

Cornari plus circa Smilacem.

glande victitasse, Cornelius Alexander est auctor, donec se ob-
 fidione liberassent. Fagi folia estata laborum, gingiuarumq,
 vitis mirifice opitulatur: tusa, illitaq, torpentia membra
 corroborant. Glandis faginea cinis renum calculis vtiliter il-
 linitur. ILEX insuper arbor est in Italia notissima, specta-
 taq, proceritatis, cortice in rufum nigricante: materies eius
 densa admodum est, grauis ac robusta, in atrum rubescens. Fo-
 lijs laurinis ac perpetuis viret, sed qua externè candicent, sca-
 braq, sint: interna verò virecant, lauesq, cernantur: quin &
 in toto ambitu serrata sunt. Duum Ilex est generum: alter-
 rum folio spinoso, sine aculeis alterum. Hoc vbi que fere scater
 Hetruria: illo verò Hispania. Meminit, vtriusque Columella
 libr. 6. cap. 3. de re rustica, sic inquires: Possunt & ficulnea
 bubus probe dari, si sit eorum copia: Vigneae tamen vel me-
 lior est querneae, sed eius generis, qua spinas non habet: nam
 id quaq, vti Iuniperus, respicitur a pecore. Quare non rectè sen-
 tiunt, qui Plinij tantum & Theophrasti testimonio freti, Il-
 cem haud spinosam, legitimam esse negant. Glandes profere
 quernis minores, qua & in reliquis minus praestant. Ilignus
 tarho Hetruscis in pretio est, non modo quod ignem diu foue-
 at, sed etiam quod (vt aiunt) vapore caput minimè tentet.
 Haec praeter glandes, pilulas quasdam rubentes gignit, qua tri-
 ta cum aceto vulneribus recentibus, & cruentis oculis vtiliter
 imponuntur. In Ilicis genere (vt memoriae prodidit Theoph.
 libr. 3. cap. 16. de plan. hist.) est arbor illa, quam Arcades Smi-
 lacem vocant, ilici smilax (ea autem non est taxus, qua etiam
 smilax dicitur, quoniam de taxo capite 10. eiusdem libri dis-
 seruit Theophrastus) folio tamen non acuteato, sed molliori
 profundioriq, differentijsq, pluribus distinguendum: nec ma-
 terie, vt illa, solida spissaq, sed soluta, molliq, in opere. Sunt
 qui censeant ilicem no spinosam smilacem esse. Sed cum smi-
 lacis materies sit soluta molliq, in opere (vt Theophrastus scri-
 bit) cur eorū sententiā comprobem, non habeo. Meminit huius
 Gal. lib. 6. ca. 3. de comp. med. secundum locos in columella remedys, sic inquires: His fortiora sunt myrti ac baccarū eius de-
 coctū, & ex acerbis cotoneis malis, & virgultorū tenerorū ilicis, arbuti, smilacis ac fagi. Super quo loco dubitat Cornarius,
 quomodo fieri pōt, quod smilax (taxum, vel eius speciem intelligit) qua ab omnib. venenosa describitur, ponatur a Galeno
 inter gurgulionis remedia. In dubij verò solutione nil aliud determinat, nisi quod, cum non vbiq, (sic ipse putat) taxus sit
 veneno-

Gal. lib. 6. ca. 3. de comp. med. secundum locos in columella remedys, sic inquires: His fortiora sunt myrti ac baccarū eius de-
 coctū, & ex acerbis cotoneis malis, & virgultorū tenerorū ilicis, arbuti, smilacis ac fagi. Super quo loco dubitat Cornarius,
 quomodo fieri pōt, quod smilax (taxum, vel eius speciem intelligit) qua ab omnib. venenosa describitur, ponatur a Galeno
 inter gurgulionis remedia. In dubij verò solutione nil aliud determinat, nisi quod, cum non vbiq, (sic ipse putat) taxus sit
 veneno-

XII. SUBER PRIMVS.

XIII. SUBER SECVNDVS.



XIV. PHELLODRYS.



venenosa, ex eo genere sumi debeat, qua lethali careat noxa. Sed si Cornarius Theophrastum sibi aliquin familiarem consulisset, qui smilacem quandam (vt paulo ante ostendimus) in arborem ilici similem refert, rectius meo quidem iudicio, & paucioribus rem hanc explicasset. S V B E R denique arbor est fructu & folio ilicis, perpetua similiter coma virens, quanquam id negat Theophrastus, sed crassissimo cortice vestitur, atq; ilici magnitudine cedit, vt ij quidem attestari possunt, qui Baccano Romam profecti sunt: eo enim in itinere innumera Suberum planta visuntur. Atqui duo eius visuntur genera: alterum folio angustiore, prolixiore, acuminatioreque: alterum verò breuiore, rotundioreq;, & per ambitum serrato, acuminatis quibusdam in locis incisuris. Glandes quoq; profert iligneis pares, paulo tamen minores, deterioresque. Hoc in Romano, illud in Pisano agro proueniens. Hac cortice exuta minime arefcit, quemadmodum reliqua arbores, quandoquidem natura haud ignara, quod sapissime cortice expolianda esset, materiem duplici cortice muniuit. Inter plures, ac varios corticis suberei vsus, qui in rebus domesticis celebrantur, ille pracipuus est, & vulgaris, quod sutoribus maxime sit expetita ad crepidas conficiendas. Quin & globis ex ea factis vtuntur piscatores, quod ea nunquam aqua mergatur, sed superna tet sustinendis retibus plumbeis glandibus in altum ductis. Idcoq; Plinius lib. 16. capite 8. scriptum sic reliquit. Suberi minima arbor, glans pessima, raraq; cortex tantum prae crassus, ac renascens, atque etiam in denos pedes vndique explanatus. Vtus eius anchoralibus maxime nantium, piscantiumque tragulis, & eadorum obturamentis: praeterea in hyberno saminarum calcetra: quamobrem non infacete Graci mulieres cortices arborum appellant. Sunt qui Suberem feminam ilicem vocent, atque vbi non nascitur illex, pro ea subere vtuntur, in carpentarijs pracipue fabricis, vt circa Elin, & Lacademonem: nec in Italia tota nascitur, nec in Gallia omnino. Et eodem libro, cap. 40. inquit. Eius materies tardissime vetustatem sentit, sicut robur, larix, castanea, iuglans: hac Plinius. Est & alia arbor glandifera, quam, quod caudicem habeat Suberi non absimilem, folia ferat suberis, corticem verò, & ligni materiem & glandes quatuor siue cerro non absimiles, Hetturia vulgo appellat Cerrosugaro, quasi Cerrisuberem dicas. Id quod etiam fecisse videtur antiquitas: quandoquidem Theophrasto loco superius citato ea PHELLODRYS dicitur: copiosa hac in agro Senensi

Suberis consideratio, & historia.

Suber duplex.

Suberis cortex vsus.

Suber Plinij.


Phellodrys & eius hist.

in omni-

Anguillarius in omnibus Archidiosi, & comitatus S. Flaviae. hylud Sed illuc vsque non peruenit Anguillarius, cum de hac arbore nihil au-
arguitur. minerit inter glandiferas, qua in Italia proueniunt. Non differt suis in facultatibus ab aliis glandiferis. Suber cortex
Suberis vires tritus ex aqua calida potus sanguinem fluentem ex vtralibet parte fistit: eiusdem cinis ex vino calido sanguinem ex-
Matthiolo. creantibus magnopere laudatur. Omnium glandes in ferinam trita, & potui data, arachnia vnius ponderis, ex succo plan-
taginis, auxiliantur omnibus alui, & vteri fluxionibus. Confert earum decoctum potum contra venena. Cruda ac recentia
intrita, illitaque inflammationes leniunt. Illinantur eadem cum salsa axungia maleficis vlceribus. Calyx quo Glandes in
arbere sustentur, easdem possidet facultates, sed magis eum adstringit, tum contrahit. Galeno tam quercus, quam qua-
Glandifera arborū vires runda aliarum glandiferarum arborum medicina commemorantur libro 6. simplicium medicamentorum, his verbis.
ex Galeno. Quercus partes omnes adstringentis qualitatis participes sunt. Sed plus tamen habet, qua in trunci cortice membrana sub-
est, tum qua sub glandis ipsius calyculo, ea videlicet, qua fructus carnem conuestit. Quamobrem ad profluentium multiebre, &
sanguinis exspuitions, tum dysenterias & diuturnos ventris fluxus comodam esse credunt. Maxime vero ea vtuntur deco-
cta. Valentius tamen adstringit, fagus, & ilex, seu quis has species esse roboris velit, seu toto genere diuersas. Quin & folia ha-
rum plantarum tenella illita non instrenue desiccare valent, minus autem qua sunt alterius roboris, nimirum quanto mi-
nus sortita sunt adstrictionis. Siquidem ego quandoq; glutinasse me vulnus memini salce instictum, cum nullum adesset ad-
manum medicamen prater ipsius quercus folia: trini ea in leui petra, & vulnus, omnemq; vicinum locum cortex. Eandem
vim folijs habet & fructus roboris, eoq; medici nonnulli ad incipientes & crescentes vtuntur phlegmonas, nam qua iam ve-
hementes sunt, adstringentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem, quam ad presentem tractatum attinet. Ce-
terum in presentia nouisse, quod eatenus adstringentem quatenus dictum est, facultatem quercus obtineat, sufficit: ac pro-
inde desiccandi, atq; adstringendi: excalfaciendi autem paulo infra media, in genere scilicet eorum, qua (vt sic dicam) tepida
sunt. Arbor, qua ἄρκυς Graecis: Quercus Latinis appellatur: Chullor, Hullet, aut Beluth, Arabib. Quercia, Italicis: Eychbaum, 20
Germanis: Robre, Hispanis: Chesne, Gallis. Qua vero φηγός Graecis: Fagus Latine dicitur: Arabice, Chinas, aut Chiasas: I-
talice, Faggio: Germanice, Buchbaum: Hispanice, Haia: Gallice, Fau. Qua denique Graca voce Πιπρος: Latina Ilex nomi-
natar: Arabica, Barbes, siue Carmas: Italica, Elice: siue Leccio: Hispanica, Anzina, & Anzineira: Germanica, Stedder-
Gen. Gallis Veuse. Suber autem Graecis φελλός: Italis Sugaro: Germanis, Pantoffelholz. Suber angustifolium φελλάς, &
φύλλοι. Phellodrys, Graecis patiter φελλός, & φύλλοι: Italis prafertimq; Hetruscū, Cerrosugaro.

Quercus ἄρκυς: Veteres omne genus arboris ἄρκυς appellatione intellexerunt, ἀρκύω erumpo aut
pullulo: posterioribus ἄρκυς omnem arborem glandiferam tantum significat & praesertim Quercum. Vna
voce Latina comprehendi posse Plinius negat: at Gaza Roboris appellatione contineri posse censet.
Quercus apud Latinos, modo pro genere, modo pro vnica eius specie ponitur. Sic fructus βελάνη, glandes
dicuntur: licet Latini, vt Iabolenus ait, glandis nomine omnem fructum sint complexi: at Plinius Glandem,
inquit, qua proprie intelligitur, ferunt Robur, quercus, esculus, cerrus, ilex, suber. Genera Quercus
quinq; Theophrasto 3. hist. 9. Platyphyllos, hemeris, phagus, aegylops, haliphlaeos seu cerrus foemina: que
caudice, ligno, folio, fructus sapore, magnitudine, figura, colore variant. I. Quercus latifolia seu platyphyl-
los Theophrasti, cuius iconem adiecimus: quam in marem & foeminam distinguunt. II. Quercus longissi-
mo pediculo est Hemeris Idzororum, Erymodrys Macedonum, Placidam Gaza interpretatur: huic peculia-
re, quod longo pediculo & tenui affixa sit, modò vnica, modò gemina glans: huius & flores adpinximus.
III. Phagus seu Esculus, Roboris primum genus Clusio [qui quinq; Roboris species proposuit, vt est in
Pannonicis, distinctas] in quo genere mas est & foemina. IV. Quercus calyce echinato, Aegylops Idzorū
Aspris Macedonum, Cerris maiore glande Lob. V. Quercus 40
calyce echinato altera, Haliphlaeos Idzororum & Macedonum,
Cerris Plinii minore glande Lobelo: huius lignum saepe lapi-
descit. VI. Huius etiam species in Burgundia reperitur minor,
glandibus tribus quatuorve simul iunctis, qua sine pediculo
surculis haerent, calyce valde hispido, quam apud fratrem Io-
hannem Bauhinum III. Ducis Wirtenbergici Medicum Mon-
rembelgardi vidimus. VII. Quercum marinam refert Theo-
phrastus 4. hist. 7. folijs lenibus, carnosiss, myricæ folio: quam
nunc habemus: oblonga lataq; habet folia eaq; mollia. VIII.
Praeter autem ea, qua ex Theophrasto Matth. refert Quercū
ferre, ad annosarum Quercuum radices vna reperitur anti-
quis incognita, vernali potissimum tempore, aliquando etiam
in Canicularibus, ex superfluo succo circa radicem coacerua-
to diutiusque deteto, sub terra prorumpit concretitium quid-
dam vna forma, colore foris purpureo, intus candido & qua-
si lactifero, saporis adstringentis, qua in aestate lignescit. Col-
ligenda vernali tempore, in vmbra siccanda, siccata pulueri-
fanda, cum puluis hic in Dysenteria sit insignis, & in omni
fluxu sanguinis: hac vna desperatos dysentericos se curasse re-
statu Encelius libro tertio de lapidibus & gemmis capite 51. 60
Hanc cum nemo pinxerit, eam depingi voluimus, ex vna
quam Friburgo à clarissimo Iohan. Schenckio à Grafenberg
ante annos decem accepimus. IX. Fagus Latinorum, non
autem φηγός Graecorum siue Dioscoridis: φηγόν Graecorum
Phegum vertere oportet, non Fagum, cum haer inter se diffe-
rant. Graeci enim vt ex hoc Dioscoridis loco & Theophra-
sto liquet, glandiferis connectunt suam φηγόν, cui glandem
tribuunt, non oblongam sed rotundam. Latinorum
Fagus glandem proprie non fert, sed in echinato involu-
cro

VIII. VVA QUERCINA.



Aspris Macedonum, Cerris maiore glande Lob. V. Quercus 40
calyce echinato altera, Haliphlaeos Idzororum & Macedonum,
Cerris Plinii minore glande Lobelo: huius lignum saepe lapi-
descit. VI. Huius etiam species in Burgundia reperitur minor,
glandibus tribus quatuorve simul iunctis, qua sine pediculo
surculis haerent, calyce valde hispido, quam apud fratrem Io-
hannem Bauhinum III. Ducis Wirtenbergici Medicum Mon-
rembelgardi vidimus. VII. Quercum marinam refert Theo-
phrastus 4. hist. 7. folijs lenibus, carnosiss, myricæ folio: quam
nunc habemus: oblonga lataq; habet folia eaq; mollia. VIII.
Praeter autem ea, qua ex Theophrasto Matth. refert Quercū
ferre, ad annosarum Quercuum radices vna reperitur anti-
quis incognita, vernali potissimum tempore, aliquando etiam
in Canicularibus, ex superfluo succo circa radicem coacerua-
to diutiusque deteto, sub terra prorumpit concretitium quid-
dam vna forma, colore foris purpureo, intus candido & qua-
si lactifero, saporis adstringentis, qua in aestate lignescit. Col-
ligenda vernali tempore, in vmbra siccanda, siccata pulueri-
fanda, cum puluis hic in Dysenteria sit insignis, & in omni
fluxu sanguinis: hac vna desperatos dysentericos se curasse re-
statu Encelius libro tertio de lapidibus & gemmis capite 51. 60
Hanc cum nemo pinxerit, eam depingi voluimus, ex vna
quam Friburgo à clarissimo Iohan. Schenckio à Grafenberg
ante annos decem accepimus. IX. Fagus Latinorum, non
autem φηγός Graecorum siue Dioscoridis: φηγόν Graecorum
Phegum vertere oportet, non Fagum, cum haer inter se diffe-
rant. Graeci enim vt ex hoc Dioscoridis loco & Theophra-
sto liquet, glandiferis connectunt suam φηγόν, cui glandem
tribuunt, non oblongam sed rotundam. Latinorum
Fagus glandem proprie non fert, sed in echinato involu-
cro

ero castanearum more, aliquot paruas, pingues & oleosas nuces, non rotundas, sed acuminatas & triquetras. Quare Fagus Latinorum sui generis est arbor quæ Theophrasto *ἰξία* vocatur, scissimam Caza reddidit, eò quod eius materia facile in tenuissimas laminas findatur, Fagus recentioribus. X. Ilex ^{spino} (quia ferra propter duritiem sit secanda) duplex, altera folio non spinoso, alia spinoso. Ilex Italica folio oleæ. C.B. Ilex prima folio oleæ Plinio. Ilex Lac. Cas. Lugd. cui & Phellodrys folio serrato angustifolia. Ilex angustifolia Tab. Ilex prima Matthioli & Smilax Arcadum Theophrasti, Clus. hisp. Suberi ramulum huius adpinxit Lobelus. XI. Ilex Hispanica spinoso folio. Ilex maior Clus. hisp. & Pan. Ilex maior glandifera, Dod. Ilex arbor. Lob. Ilex latifolia, Cam. in Matth. Ilex Taber. Lugd. cui & Phellodrys nigra: Ilicis alterum genus Casalpino. Hæc altitudine & ligni materia cum præcedenti convenit, & foliis differt, quæ in hoc latiora sunt, ambitu sinuoso & aculeato: licet in eadem diuersa etiam obseruentur, vt in iuuenis folia per margines spinis horreant, adultæ verò aculeis careant. Flosculi pusilli flavescentes, oblongum racemulam constituentes Maio mense inueniuntur: quibus succedunt fructus seu glandes ratione locorum variantes, interdum namque glans maior & longior, vt in Hispania: interdum minor & breuior quam in quercu, vt in Narbonensi: spinosa attamen intelligitur calyce, qui per maturitatem alicubi nigricat, & cuius nucleus albus gratique saporis. Frequens hæc in nemoribus & conuallibus Hispaniæ & Galliæ Narbonensis. XII. Suber, dicitur & Ilex femina Plinio: duplex est, alterum rotundo, alterum oblongo folio. Rotundo, Suber dicitur Lac. Lon: Cord. in Diosc. Casal. & Suberella: Suber latifolium, Clus. hisp. Cast. Tab. Lob. Suber folio breuiore & latiore, Lugd. Phellos siue Suber Dodo. XIII. Suber oblongo folio: Suber angustifolium. Cast. Tab. Suber Aquitanicum & Suber folio deciduo Theophrasti, Clusius hisp. Suberi latifolia suæ ramum adpinxit Lob. XIV. Phellodrys, id est suberi quercus: Ilex femina Arcadibus, Theophrasto monente, Phellodrys, Cast. Lugd. Tabernamontano.

I. CASTANEAE.

II. CASTANEAE EQVINAE.



Castanea hippocastanum

Kasana

CASTANEAE.

CAP. CXXII.

Sardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, aut Iopimæ, aut glandes Iouis appellant, adstringunt & ipsæ, similesque effectus præbent: præsertim tunica, quæ carnem, & corticem media interturiat. Caro his, qui ephemerum biberunt conueniens est.

Castaneæ nuces sunt in tota Italia vulgò notissima: item & eorum arbores hand quaquam incognitæ. Antiqui castanearum complura fecerunt genera: nominibus plerumq; insitis à locis. vnde importabantur. Sed duo tantum in Hetruria habentur genera, satiuum scilicet, & syluestre. In domesticarum genere habentur maiores, quæ Marones vocantur: & minores quæ peculiariter Castania vocantur. Mitiores facile purgantur, harumq; illæ principem locum tenent, quas vulgò Marroni appellat: quippe quod ceteris sint maiores, saporiosiores, speciosioresq;. Arbor est procera, amplaque, folijs oblongis glandis similibus, venosioribus tamen, & per ambitum simbriatis, fructu echinato: nuce intus solida, altera parte plana, altera gibbosa, triplice tegminis ambitu septa, membrana primum tenui, crispâq; & amara, max. lento ac coriaceo cortice demum echinato calyce, alba intus pulpa ac dulci. Ligni materies solida, ac durior. In montanis, vbi quotannis aliarum frugum annona deficit, incolæ castaneis per hyemem victitant. Namque eas in cratibus fumo prius exiccatas ab utroque cortice repurgant, moluntq; in farinam, ac deinde cogunt in panem. Materies arboris adificijs, atque alijs domesticis vtilibus

℞

libus

Castanea
orientalis huc
equina

libris admodum apta est: siquidem non modo ex ea sunt trabes, signa, afferes, & pedamenta, sed & eadem casta & orientalis huc equina. Verum ignarij inepta. Mentibus, & opaco gaudet magis, quam campestribus, & apricis. Creant quoque natura aliud Castanearum genus, in orientalibus regionibus, de quo tam apud antiquos, quam recentiores (quantum viderim legerimq;) nemo est, qui meminerit. Arbor est Castanea haec spectata proceritate, folio pentaphylli, senis tamen diuisuris sed longè humana manu, quin etiam Ricini folio, grandiore, longo ac tenui pediculo appenso. Echinos fert in cacumine, magnitudine nostratibus aequales, subrufo colore, verum duriore ac crassiore putamine, aculeis raris, sed robustis ac firmis, & colore flavescentibus: singuli singulam includunt castaneam nostratibus ferè similem, crassiorem tamen rotundiorèq; cortice subnigricante, praeterquam anteriori parte, qua interno echini putamini coniungitur, ea enim albicat, macula cordis figuram pra se ferente, quemadmodum videmus in repenti vesicaria semine. Totus idem robustus est, simplex tamen, nullam intra se aliam tuniculam habensque carnem ambiat illi similem, qua nostrates castaneae conteguntur. Sapor pulpa vulgarib; ferè similis habetur, sed dulcior paulo, nec adeo mandentibus grato, si tamen ex sicco fructu id quidem recte percipi potest. Adstringunt, & flatu denorata pariunt. EQVINAS hanc castaneam appellant Constantinopolitani, quod anhelos, ac tuscentibus equis plurimum auxilij afferant denorata. Dantur quoque sanguinem reicientibus. Planta ramum, vna cum praequantibus echinis misit ad me Constantinopoli Guliel. Quacelbennus Flander, medicus insignis, vna cum quam plurimis alijs, de quibus in epistolis latius diximus. Castanea vehementer sistunt tum alui, tum ventriculi fluxiones, idque maximè sicca: quin & sanguinem excreantibus profunt. Trita cum sale melleque, subactaque rabidorum canum moribus viliter impoñuntur: & cum hordeacea polenta, & aceto illis mammarum duritias discutunt. Venerem excitant, eo quod flatum gignant. Largius in cibo sumpta capiti dolorem inferunt, inflant, aluum adstringunt, ac agre concoquuntur: attamen qua cineribus obruta torrentur, vulnerato prius in latere cortice, crudis & elixis innocentes redduntur, praesertim si cum pipere, & sale, vel saccharo edantur. Interior castanearum membrana rubens, qua albicans pulpa circumnestsunt ex vno austero pota, duarum drachmarum pondere, sistit valèter immodicos omnes alui fluores, & sanguinis reiectiones, quin etiam cum pari pondere tamentorum Eboris, alba facinarum profluvia cohibet ex aqua alba Nymphaea hausta. De castaneis differens Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Castanea omnium glandium sunt praestantissima. Sunt qui hos fructus λωπίμου; appellant: hi namque & soli inter fructus agrestes alimentum memorabile corpori praebent: haecenus Galenus. Illud porro in his verbis animaduertendum, quod Castanea, quamuis eas Gal. plurimum nutrire prodiderit, non tamen in cibo commendantur, si comedantur frequenter. Namq; ut idem auctor est libro de tenui victu regione, sint ille in aqua cocta, sint rosta, sint etiam friza, semper est autibus noxam inferunt, multoq; magis, si cruda edantur. Quod etiam libro de cibo boni & mali succi memoria mandauit. Castanea ita Latinis vocata, Graecis Κασάνα, caps'arai βάλανος, ἢ δ' ἰδὸς βάλανος, ἢ λόπιμα dicuntur: Arabibus, Sadianalab, Castal, & Stebulot: Italis, Castagne: Germanis, Kastan, Hispanis, Marones: Gallis, Castaignet: Bohemis, Kastany.

Castanearum
vires.

Castanea vehementer sistunt tum alui, tum ventriculi fluxiones, idque maximè sicca: quin & sanguinem excreantibus profunt. Trita cum sale melleque, subactaque rabidorum canum moribus viliter impoñuntur: & cum hordeacea polenta, & aceto illis mammarum duritias discutunt. Venerem excitant, eo quod flatum gignant. Largius in cibo sumpta capiti dolorem inferunt, inflant, aluum adstringunt, ac agre concoquuntur: attamen qua cineribus obruta torrentur, vulnerato prius in latere cortice, crudis & elixis innocentes redduntur, praesertim si cum pipere, & sale, vel saccharo edantur. Interior castanearum membrana rubens, qua albicans pulpa circumnestsunt ex vno austero pota, duarum drachmarum pondere, sistit valèter immodicos omnes alui fluores, & sanguinis reiectiones, quin etiam cum pari pondere tamentorum Eboris, alba facinarum profluvia cohibet ex aqua alba Nymphaea hausta. De castaneis differens Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Castanea omnium glandium sunt praestantissima. Sunt qui hos fructus λωπίμου; appellant: hi namque & soli inter fructus agrestes alimentum memorabile corpori praebent: haecenus Galenus. Illud porro in his verbis animaduertendum, quod Castanea, quamuis eas Gal. plurimum nutrire prodiderit, non tamen in cibo commendantur, si comedantur frequenter. Namq; ut idem auctor est libro de tenui victu regione, sint ille in aqua cocta, sint rosta, sint etiam friza, semper est autibus noxam inferunt, multoq; magis, si cruda edantur. Quod etiam libro de cibo boni & mali succi memoria mandauit. Castanea ita Latinis vocata, Graecis Κασάνα, caps'arai βάλανος, ἢ δ' ἰδὸς βάλανος, ἢ λόπιμα dicuntur: Arabibus, Sadianalab, Castal, & Stebulot: Italis, Castagne: Germanis, Kastan, Hispanis, Marones: Gallis, Castaignet: Bohemis, Kastany.

Castanearum
vires ex Gal.

Sunt qui hos fructus λωπίμου; appellant: hi namque & soli inter fructus agrestes alimentum memorabile corpori praebent: haecenus Galenus. Illud porro in his verbis animaduertendum, quod Castanea, quamuis eas Gal. plurimum nutrire prodiderit, non tamen in cibo commendantur, si comedantur frequenter. Namq; ut idem auctor est libro de tenui victu regione, sint ille in aqua cocta, sint rosta, sint etiam friza, semper est autibus noxam inferunt, multoq; magis, si cruda edantur. Quod etiam libro de cibo boni & mali succi memoria mandauit. Castanea ita Latinis vocata, Graecis Κασάνα, caps'arai βάλανος, ἢ δ' ἰδὸς βάλανος, ἢ λόπιμα dicuntur: Arabibus, Sadianalab, Castal, & Stebulot: Italis, Castagne: Germanis, Kastan, Hispanis, Marones: Gallis, Castaignet: Bohemis, Kastany.

Nomina.

Castanea κασάνα & κασάνα, à Castano Magnesia vrbe, Phocioni: Nux heracleotica Macrobio Plinius lib. 15. cap. 23. genera octo recensuit. Apud Germanos triplex genus, vnum syluestrium & duo fatiuarum. Syluestrium prouentus in Alsatia inferiori: fatiuarum quaedam minores, quae populares & coctiue Plinij videntur: quaedam verò grandes ex Allobrogibus allatae, quas Marones appellant. Verum figura & sapore etiam differunt. Nux Euboica Theophrasti censetur, quam Iuglandem aliquando Gaza vertit. Castanea herbarijs dicitur. II. Castanea equina Lob. Cast. Clus. Pan. Lugd. Tab. Cæs. qui dubitat an sit Myrobalanus folio Heliotropij Plinij. Addit & tertium genus Lugd. historia Castaneae humilis, prouenientis ad montem Pilati non longè Lugduno. Quartum habet Monardis, & ex ea Castor, Castanearum purgatiuarum ex India.

GALLA.

Castanea κασάνα & κασάνα, à Castano Magnesia vrbe, Phocioni: Nux heracleotica Macrobio Plinius lib. 15. cap. 23. genera octo recensuit. Apud Germanos triplex genus, vnum syluestrium & duo fatiuarum. Syluestrium prouentus in Alsatia inferiori: fatiuarum quaedam minores, quae populares & coctiue Plinij videntur: quaedam verò grandes ex Allobrogibus allatae, quas Marones appellant. Verum figura & sapore etiam differunt. Nux Euboica Theophrasti censetur, quam Iuglandem aliquando Gaza vertit. Castanea herbarijs dicitur. II. Castanea equina Lob. Cast. Clus. Pan. Lugd. Tab. Cæs. qui dubitat an sit Myrobalanus folio Heliotropij Plinij. Addit & tertium genus Lugd. historia Castaneae humilis, prouenientis ad montem Pilati non longè Lugduno. Quartum habet Monardis, & ex ea Castor, Castanearum purgatiuarum ex India.

Κασάνα GALLA. CAP. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidè, sed articulorum manus modo rugosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quae efficacior est. Vtriusq; vis vehemèter adstringere: trita crescentias in carne, fluxiones gingiuarum & vuz, atque oris vlcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus, dolorem sedat. Crematae carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida miria extinctae, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra vulvas proidentes, fluxionesque. Capillos denigrant, aceto aut aqua maceratae: dysentericis, coeliacisque cum vino, aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integræ in aqua prae-coqui, in qua non nihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa his vtendum ad adstringenda, aut sistenda, aut siccanda, quae opus sunt.

a Meū & Ca.
dum leuis.



Gallarum
consideratio.

Galla vulgè notissima sunt, easque ferunt arbores omnes (vt Plinius auctor est) quae & glandem. Nasuntur sole de geminis exeunte: & si aestu nimio excipiuntur, crescant protinus, nec amplius adolefcunt. Quercus in Italia praeter glandes duo Gallarum genera ferunt. Minores quae rugosa cute spectantur, fullonibus, & coriarijs expetita, quae Graeco nomine omphacitides dicuntur. Maiores vero, quae

que leniores habentur. Caterum neque in hoc Cornario ad stipulandum esse iudico, quod suis in Galenum commentariis
 tam primo. quam sexto libro de comp. med. secundum locos, acriter contendat, nil aliud omphacitidem gallam esse Dio-
 rudi, & Galeno, quam calycem illum, quo glandes in arboribus continentur. Hoc tantum argumento ductus, quod Paulus
 capi de dysenteria in quodam clysteri scribat: ομφακιδος καρυμινος. id est: omphacidis vsta: est autem cauum illud, ex quo glans
 querquina nascitur, quo coriarij vtuntur. Vbi ipse non omphacidos, sed omphacitidos putat legendum, vulgatam lectionem immutans. Ex qua postea non a-
 liud omphacitidem gallam (vt diximus) esse existimat, quam cauum illud, in quo glandes inseruntur, quod recentiores cu-
 pulam vocant: statuitq; nunquam a sua opinione recedere, nisi quis plane corruptum apud Paulum locum docuerit, aut
 eum ab eo substantiue pro eo, quod calycem Plinius dixit, & vulgo cupula glandis vocatur, dictum ostendat. Sed equi-
 dem non possum non admirari, quod u, quem aliquin suorum scriptorum testimonio, acutissimi ingenij, sanissimi que in-
 dicij vitum semper existimaui, in re tam, meo iudicio, clara, tam facile aberrauerit. Nam si Paulus non putasset, quod ομ-
 φακιδος Graecum vocabulum ob sui raritatem permultis fuisset obscurum, quemadmodum & Cornario fuisse videtur, ci-
 ceri non fuisset opus per circumlocutione illud declarare, vt fecit, cum inquit. Est autem ομφακιδος cauum illud, ex quo glans
 querquina nascitur, quo coriarij vtuntur. Quod praeterea Paulus pro omphacitide galla glandium calycem non acceperit, illud
 manifesto argumento esse potest, quod ipse libro septimo de gallis, non autem de glandibus disserat. duosq; gallarum genera
 construat, quarum alteram omphacitidem appellat: alteram vero magnam, flaua colore, viribusq; inferiorem esse scribit.
 Quod etiam antea Dioscorides, & Galenus fecere, qui omphacitidem gallam glandium calycem esse nusquam, quod sciam,
 tradidere: quod non ignorauerint (vt Cornarius ignorasse videtur) & genere, & specie a gallis differre glandes. Adde, quod
 Galenus, Dioscorides, & Paulus nusquam, quod equidem legerim, vsi sunt hoc vocabulo ομφακιδος pro galla, nisi adiectiue,
 & cum suo substantiuo unis. Quare concludendo putauerim, in Paulo legendum esse, ομφακιδος, non ομφακιδος, vt co-
 tendit Cornarius: quin etiam crediderim Graecum glandium calycem ομφακιδος proprie appellari. Tamen si Cornarius, &
 Andernacus, qui in Paulo vocem illam acerbam vnam interpretatur, Graeca lingua peritissimi, hac non cognouisse, neque
 animaduertisse deprehendantur. Fit ex omphaciti Gallia, chalcantibo, gummi, & vino atramentum scriptorium optimum,
 hoc modo. Sumito gallarum crassiuscule costructarum uncias quinq;, chalcantibi Romani uncias tres, gummi Arabici uncias
 duas, salis drach. vnam. Ponantur haec omnia in fictile vitro circumlitum, & deinde superinfundito vini albi potentis, ser-
 uentisq; libras quinque, & uncias quatuor, & ocluso vasis orificio, quindecim diebus insolato, vel post vaporarij fornacem
 hyeme reposito, misceatq; quotidie rudicula. Illud peculiare sibi maiores galla vendicauerit, vt quotannis aut annona ser-
 tilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem curam praenuncient: nam si rumpantur integrae, & qua perforatae non sunt,
 aut muscam, aut araneum, aut vermiculum exponunt. Si musca volat, futuri belli: si reptit vermiculus, annona penuria: si
 carrit araneus, pestilentium morborum praesagium est. Neque cuiquam mirum videatur, quod ex omnibus gallis ista exo-
 riantur animalcula: etenim ego huius rei sapius periculum feci, nullamque vnquam sum consecutus, prius non perforatam,
 qua ex tribus animalibus vnum intra se non contineret: nam foramine inspecto facile indicium sumi potest, iam ani-
 mal exisse. Dicamus igitur licet, quercu & fructu, & animal gignere. Cuius rei haud ignari veteres illi patres, na sine causa
 quercu dixerunt Ioui summo esse dicatam. Gallarum vires memoria prodidit Gal. lib. 7. simpl. medic. sic inquitens. Gallia,
 qua omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamen, pleraque sui parte essentia terrena, & frigida: perquam
 desiccatur, & repercutit fluxiones: ad hac constringit, contrahitq; partes laxas, ac languidas: omnibusq; fluxionum affectibus
 strenue resistit. Esto vero tertij in desiccando, secundi autem in refrigerandi ordinis. Altera autem galla, flaua illa, & ma-
 gna, laxa q; & ipsa desiccatur quidem, sed tanto minus, quanto minus acerbatae qualitatis est particeps. Cocta itaque ipsa per se,
 ac deinde trita, cataplasma est non instrenuum sedis phlegmonarum, ac proidentiaru. Porro coquenda est, si modica opus
 sit adstrictione, in aqua: sin vehementiore, in vino. Ac si augere in super adstrictionem sit opus, vino vtare austeriore. Hanc
 rustici nostrates διονκιδος, quasi vini gallam dicas, nominat. Denique galla combusta sanguinis reprimendi facultatem
 acquirit, ac nimirum etiam calorem, & acrimoniam ex vstione assumit: sunt q; ys, qua ignem experta non fuerint, tam
 subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Caterum cum ad sanguinis suppressionem preparare eas voles, car-
 bonibus impositas, dum vndequaue candean, aceto, aut vino extinguere oportebit. Quercus fructus xxiij, Graece dicitur:
 Gallia Latine, pariter & Italice: Hafs, aut Hafus, Arabice: Gallöpfel vnd Enchöpfel, Germanice: Galba, & Bugalba,
 Hispanice: Noix de galle, Gallice: Bohemice Galles aneb bublinky.

Cornarii o-
 pinio repro-
 batur dum
 omphacitide
 gallam caly-
 cem glandi-
 um esse dicit.

Andernacus
 notatur.
 Atramenti
 scriptorij co-
 ficiendi ratio.
 Gallarum pra-
 sagium.

Gallarum vi-
 res ex Gal.

Nomina.

Hoc loco Graeci codices habent ροδονδωδον: Qua voce constat, iudicio meo, Dioscoridem galla omphacitidis figuram
 designasse, cum prius magnitudinem expressisset. Attamen ex interpretibus Marcellus manifeste eam etiam ad magnitudi-
 nem tenuit. Ruellius autem, cum eam tuberosam interpretetur, ipse quoque magnitudinem innuisse videtur. Quocirca nobis
 saluum visum est, omphacitidem rugosa parti articulorum in digitis, cum extenduntur, similem reddere: quod non solum id u-
 num Graecum vocabulum: sed multo etiam magis omphacitides ipse apertissime demonstrant.

Pécs. RHVS. CAP. CXXIV.

Rhus, quae obsonijs aspergitur, [ab aliquibus erythros appellata,] semen est coriarij fructus, [sic
 vocati, quoniam coriorum infectores eo vtuntur ad inspissandas pelles.] Arbuscula est in pe-
 tris nascens binum ferè cubitorum altitudine: folijs oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis
 modo: acino vuarum gracilium, denso, magnitudine terebinthi, quad antenus lato, cuius com-
 tunica perquam utilis est. Folia vim habent adstringendi, & acaciae effectus praebent. Decoctum capillos
 denigrat: dysentericis infunditur, in potus eorum, infususque adijcitur: instillatur auribus purulentis:
 gangranas, & prterygia cohibent folia ex aceto, aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassi-
 tudinem [mellis] in aqua decoctis, ad eadem, vt lycium, conueniens. Semen eisdem effectus exhibet:
 coeliacorum, dysentericorumque obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaque illitum ex aqua, ab
 inflammatione vindicat: linguae asperitates cum melle abstergit: candida foeminarum profluvia sistit: ha-
 morrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur,
 coitque, efficacior quodammodo ipso semine. Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur, ad dolo-
 res finiendos.

Onib. non le-
 git conclusa.
 T. p. p. l.
 paria habet
 Onib.

Rhus

I. RHVS.

II. VIBURNVM.



Rhois confi-
deratio.

Rhois plura
nomina a
pud Gal.

Monacho-
rum error
& Plinij.

Fuch. opinio
damnata dū

Rhois tertiu
fecit gener.

Rhus duplex
Theophr.

Petrus Crinitus
lapis ros Sy-
riacum, Man-
nam putatis.
Fluida Theo-
doro.

Viburni hi-
storia.


Rhus Græcorum, cui (ut scribit Plinius li. 24. cap. 31.) Latinis non est inditum nomen, Suiach officinis vulgè vocatur, vocabulo nimirum a Mauritaniis accepto, ut in alijs quam plurimis ab illis fieri solet. Hac in condimentis pro sale utebantur antiqui: idcirco Dioscoridi in ipsius capitis fronte, Rhus dicitur, quæ obsonijs aspergitur. Cuius usus ut audio, & apud Syros, & apud Aegyptios in hunc usque diem perdurat, ubi rhus prouenit præstantior. Nascitur & in Italia Apennino monte plurib. in locis, is omnibus planè notis, quæ illi à Dioscoride tribuuntur. Huius aridis folijs bircorum, caprarumque pelles illa spissantur, crispantur, concinnanturq, quæ vulgè Somachi nuncupant. Ceterum illud non videtur prætereundum, quod etsi Galenus tum alibi, tum præcipue lib. 6. de comp. medic. secundum locos, plura Rhois nomina, & genera explicasse videatur, ut qui id modo Syriacum appellet, modò Ponticum, modò obsoniorum, modò coriarium, modò rubram, non tamen propterea censendum est, Rhois arbores inter se genere, vel specie differre. Quandoquidem nobis constat, vnum tantum genus Dioscoridi hoc loco descriptum esse, quemadmodum & Galeno lib. 8. simp. med. Atqui hoc in re scire conuenit, quod Rhus obsoniorum nihil aliud est, quam semen: coriariorum verò nil aliud, quam folia, & fructus ramusculi. Nostra enim sententia subscribit Dioscorides, qui scriptum reliquit: Rhus semen est exigua planta, quæ coriaris ad inspissandas pelles vtuntur. Quod etiam Galenus confirmat loco citato. Rhus verò rubens nil aliud esse comperitur, quam eius semen immaturum, cui maior adstringendi vis inest, quam maturo, cuius acini quadantenus nigricant. Syriaca præterea, atq, Pontica rhus, etsi in alijs nascatur regionibus, à quibus nomen inuenit, nihil tamen genere distat ab Italica, atq, Iberica, nisi illa magis, hac verò minus viribus præstet. Ideoq, Monachos illos, qui in Mesuem commentarios edidere, longè hallucinari crediderim: nempe qui sibi persuaserint, Rhoem Ponticam alterius esse generis ab ea, cuius exitit usus apud antiquos in obsonijs. Quæ in re & Plinius deceptus esse videtur, cum de coriario particulariter scripserit, ipsumq, diuiserit ab eo, quo in ciborum condimentis antiquitus utebantur. Fuchsius verò, non contentus duobus Rhois generibus, Plinij imitatione, tertium adinuenit. Etenim is lib. de componendis medi. quem secundo loco edidit, Rhoem Syriacum non solum differre scribit ab eo, qui tum culinæ, tum coriaris expetitur, sed peculiarem quidem Syriaca arbuscula succum esse censet, quod Galenus libro 6. de comp. med. secundum locos succum rhois Syriaci in quoddam medicamentum addat. Sed errat Fuchsius in hoc, mea quidem sententia, quandoquidem non video, quomodo ex mentione succi rhois Syriaci à Galeno facta, colligi possit, rhoem Syriacum esse genus separatam: nam ego potius adducar ut creda, ita eum cognominatum fuisse à Galeno, quod apud Syrios cæli & soli illius temperie proueniat ceteris præstantior. Et quamuis Theophrasto lib. 3. cap. 12. Rhus duplex reddatur, mas scilicet, & femina, quod alia sterilis, alia fructifera sit, non tamen ob hoc posteritati memoria prodidit, quod altera cibus, altera corijs nasceretur, sed ambas ad coria inscienda destinauit: quod coriaris folia, & ramusculos tantum accipiant, non autem semen. Rhoem, quæ in Cornelio Celso ros Syriacus deprauatè legitur, Mannam, quæ ex Syria nouè aduehitur, esse putauit Petrus Crinitus Florentinus cap. 7. libri vltimi de honesta disciplina, falsus vocum simili-
tudine, quod ros, quæ dictio rhus Græcè legenda est in Celso, æris rorem significare crediderit: etenim manna ros quidam est. Veruntamen eius sententiam acriter explosit Manardus Ferrariensis lib. epist. suarum primo. Theodorus in Theophrast. Rhois vocabulum fluidam interpretatur, quod nomen Græci etymū secutus sibi Latine sinxit: quippe (ut Plinius est auctor) rhus Latinū nomen non habet. Id quod mihi errandi præbuit ansam, cum iam dudū pro certo existimauerim, fluidā Theophrasto eā arbusculam esse, quæ vulgè Lantana vocatur, e cuius radicib. viscum quidam conficiunt. Verum cum accuratim Græcū Theophr. codicem perlegissem, Theodoriq, nouū vocabulum nō sine bile examinassem, erroris mei causam facileprehendi. Quo factū est, ut iam fateri libeat, fluidā Theodori nil aliud Theophr. designare, quam Rhoem, & ob id Lantana sit à vulgarib. vocatā, ut prius crediderā, non esse. Quæ tamē (ut mea fert opinio) potius VIBURNVM imitatur, quod manna lentā, obsequiosa, flexuq, inuicta sit. Tale enim esse viburnum Virg. in Bucolicis cecinit hoc carmine.

Quamvis lenta solent inter viburna cupressi.

Exiit haec ramulis digitali crassitudine, bicubitalibus, foliis ferè vitis, crassioribus, incanis, & pilosioribus, quae paribus inter nodos aduersis pediculis coniugatim adherent, per ambitum tenuissime serrata. Florem edit album, umbella modo cohaerentem: a quo acini prodeunt lentium modo pressi, qui primo statim exortu virides, deinde rubri, demum verò nigri spectantur: radice per summa caespitum vagante: virga adeò flexiles, lentaeque habentur, ut ad colligandum fasciculos is comode videntur rustici. Nascitur in sepibus, & frutetis, & inculto solo. Folia aspera sunt & gustu adstringentia: fructus, ubi ad vltimum peruenit maturitate, aluum exoluit. Sententia nostra adstipulatur Ruellius, non solum quòd haec planta stentibus admodum ac lenta omnibus suis partibus habeatur, sed etiam quòd haecenus in Gallia proprium retineat nomen. Nam Viurna Gal-
 detra vna tantum litera ibidem viurna vocatur. Plura de hac planta diximus aduersus Guilandini calumnias in Epi-
 stolis nostris. Non desunt autem, qui genistam quandam Viburnum faciant, eo tantum argumento, quòd Calabri Geni-
 stam illam, Vauorna nuncupent. Atqui nihil est, quod me adducat ad credendum, Virgilium Genistam vocasse Viburnum,
 cum haec proprium habeat nomen. Viburni itaque folia adstringentis sunt facultatis, ut praediximus, ideoque praestant ad va-
 cillantes dentes confirmandos, & gingivarum rheumatismos, si decoquantur in vino austero: atqui longe magis valebit, si
 cum oliua foliis decoquantur in aqua & aceto, & ex hoc decocto saepe foueantur dentes. Gargarizatur idem ad columella
 prominentiam & ad faucium fluxiones: vna acini arefacti anteaquam maturescant, & in puluerem poti, alui flu-
 xione, sistunt. Paratur e radicibus sub terra maceratis, & subinde decoctis, & diu tuis, viscum ad aucupia haud
 inutile. Folia ubi in lixiuio decoquantur, capillum denigrant, & eosdem fluentes sistunt. Caterum cum Rhois mentio Ca-
 ritum arborem mihi in mentem redegerit, quam Itali vulgo vocant Scotano, quòd haec quoque planta coriarij vtantur,
 non minus quam Rhois ad coria firmanda, praetermittere sanè non potui, quin in Medicum usum hic eius historiam, & vi-
 ras atterem, & eius quoque imaginem adderem. Est itaque COTINVS planta vel arbuscula fruticosa, foliosaque ra-
 Cotini histo-
 ria.

III. COTINVS.

COTINVS CVM FLORE.



nis numerosis, tenuibus, subrubentibusque, foliis densis, terebinthi rotundioribus, ac latioribus, odore subgrani, galle contu-
 se modo, crescit ad trium quatuorve cubitorum altitudinem, & si quandoque adhuc grandior euadat, candice humo
 brachio paulo minore: materie adeo flaua, ut ad lanificia coloranda maxime insectoribus expetatur. Gerit in ramusculo-
 rum cacuminibus magnam, plumosamque congeriem, umbella ferè speciem praeseferentem, colore ex candido rufescente, in
 qua siliqua oblonga hyperici ferè haud ab similes proueniunt, in quibus semen concluditur. Prouenit copiosa in Tridentino
 agro, Veronensi, & in aliis non paucis Italiae locis, & praesertim in Apennino monte. Meminit breuiter Cotini Plin. lib. 16. Cotinus
 cap. 18. his verbis. Est & in Apennino frutex qui vocatur Cotinus ad lineamenta colore insignis: hac ille. In multis Insabria Plinio.
 locis appellatur vulgò Roso, & Scotano, ubi in arbusculam adoleuit. Vis illi adstrictoria insignis, exiccans, cohibensque. Sa-
 nantur foliorum decocto in collutionibus oris, & linguae vlcera, quin etiam columella, & faucium defluxiones. Valet idem
 ad genitalium quoque vlcera, ubi eo saepe abluantur. Adduntur folia in deflexionibus, quae ad menses cohibendos parantur.
 Sucorum foliorum, ac ramusculorum puluis, ventri prius aceto rosaceo illito, inspersus, alui defluxiones quascunque com-
 pescit. De Rhois haec, quae sequuntur, nobis scripta reliquit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum sic inquit. Rhois Rhois vires
 fruticosa planta astringit, desiccatur. Nam & coriarij ad desiccandum, & adstringendum pelles plantae vtantur: ac pro-
 inde supposuerunt hoc est, excoriaria appellata est. Porro Medicis in usu sunt in primis fructus eius, & succus mul-
 tius austerae qualitatis. Consentaneus est vsus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque & hoc medicamen-
 tertio ordine exiccantium, ex secundo verò refrigerantium. P. ex. vt Galen. ita etiam Latini Rhois nominatur. Nomina.

R + Summ

Sumach, Adurien, Rosbar sadisticos, seu Rosaidicos, Arabibus: Rhus, & Sennacho, Italis: Sumach, & Sumagro, Hispanis: Germanis, Serbebaum: Gallis & officinis, Sumac. Viburnum autem Italis Viburno: Insubria, Lantanna: Gallis, Vionis, & Mauffane. Germanis, Schlingbaum. Cotinus, Italis, Scotano & Roso.

† *In vulgatis Graecis codicibus hic legitur ῥυσοειδὴς, hoc est, ilicis modo. Hac dictio qua ratione ab interpretibus Ruellio, & Marcello omissa fuerit, certe nescio. Sed mihi quidem visa est non omittenda, quod non modo eam quoque Orribus legat, sed quod etiam Rhus foliis pulchre ilicem emuletur.*

Rhus, ῥόσος Hippocrati à colore coccineo acinorum dicitur: **Rhus Cord.** in Diosc. **Lac. Lug. Tab. Rhus coriaria**, Dod. gal. & fol. **Rhus obsomiorum** Lob. **Sumach** Lon. **Castori.** Est & alterum genus à Plinio, myrti folio, propositum, de quo Ges. hor. Lob. Lugd. Dod. Tab. II. Hac quibusdam **Viburnum** Vergili 10 videtur, alius spinea Theophrasti. **Viburnum** Ges. hor. Cast. Lugd. **Kleiner Mälbaum** Trago & Lon. **Lantana** (quod lenti sint rami) Ges. hor. Dod. Casal. cui **Rhoe**, siue Fluida, vt Gaza vertit, Theophrasti videtur. **Viurna** vulgi Gallorum & Ruellii, **Lobelo.** III. **Cotinus** Plinii, Ges. hor. Cam. Cast. Tab. **Cotinus coriaria**, Dod. Scotanum vulgo **Caf. Coccigria** Theoph. Ges. hor. Lob. Lugd. Tab. **Coggygia** Plinii, **cocconelia** Theophrasti **Clus. Pan.** Quidam **Rhoem** coriariorum crediderunt, eò quod huius cortice **Allobroges** coria spissant: & **Gaza** ῥοκίμου λέει legit apud Theophrastum, & **Prunum** satis absurdè vertit. **Oleum Aethiopicam** Hippocratis, **Guilandinus** nominare solebat.

Φαίριξ.

PALMA

CAP. CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis vigore, autumnio decerpi solet, Arabici myrobalan 1 similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. **Palma** acerba est, & adstringens: contra alui, fœminarumq; profluvia, in vino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit: vulnera glutinat illicitu. **Phœnicobalani** recentes plus siccis adstringunt: capitis dolorem afferunt: copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreatibus, stomachicis, & dysentericis vtilis in cibo: illinuntur cum cotoneo, & cerato cœnanthino vesicæ vitiis. **Caryota**, præsertim esu, faucium asperitati medentur. **Thebaicarum** decoctum potu æstuationem sedat: vires recreat cum hydromelite veteri sumptum: cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu, & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet. **Nuclei palmarum**, cæterorum more tremati in crudo fictili, & vino restincti, cinere loto, spodii vicem efficiunt, miscenturque in calli- 30 blephara, quod si non iustam vstionem acceperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt: contra oculorum vnam, & pustulas, palpebrarum defluvia, cum nardo effectum præbent: corporis excrecentias cum vino reprimunt: vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas vtilis ex palmis humilibus Aegyptiæ.

Φαίριξ ἐλάτην

PALMA ELATE.

CAP. CXXVI.

Palma, quam aliqui elaten, aut sathan appellat, fructus palmarum adhuc florentium intolucrum est, calixque: quo in spissamenta vnguentarii vtuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria: sistit vlcera, quæ depascunt: laxatos artus committit: trita mi- 40 scetur cataplasmatibus, & malagmatis: prodest præcordiis, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat: datur bibendum congruè renum, vesicæ, & viscerum vitiis: vuluæ, ac ventris fluxiones sistit: scabiem cum resina, & cera † sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & sathan effectus præstat, non sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit, quæ borassus.

† *Libera. l. cocta leg. An uiquis Cod.*

Palma consideratio, & historia.

Elate & eius historia.



Palmulæ vbi optima.

Vnus et palma.

Palma, arbor est procera, caudice admodum squamoso, ramos in cacumine tantum fundit in orbem actos, cacumini- bus solum spectantibus: foliis longissimis, duplicibus, gladii figura. Flores profert numerosos, tenuibus quibusdam villis appensos, in magni racemi modum, facie crocinis similes: sed multò minores, albo colore. Ii anteaquam emergant, magno 50 quodam concluduntur inuolucro, quod palmam elaten vocant, quo tandem dehiscente, emergunt, ac panduntur. Hinc subinde dactyli prodeunt, qui per autumnum, vna cum sicubus maturefcunt, rufo colore. (Decerpuntur eodem tempore, & insolantur ad vsus,) nucleo intus durissimo, oblongo, canaliculatoq; **Fructus palmarum** adhuc florentium inuolucrum est magnum puluinaris faciem representans, extremitatibus in acutum desinentibus, colore subrufo, fragili materie, ac tenui. Dehiscit hac suo tempore, & numerosos pandit flores, in racemi magni modum, è quibus dactyli proueniunt, parum racemosi. Nascitur **Elate** ex ipso caudice inter primos ferè ramos, duarum spithamarum longitudine, ea, quæ hic appella est, imagine. Hanc, cuius hic imaginem damus, misit ad me integram, vna cum dactylorum racemo, **Gabriel Fallopius** Medicus clariss. quinetiam eodem tempore, eiusdem **Elates** icones graphicè delineatas nobis misit **Iacobus Antonius Corrasus** patritius **Patauinus**, vir quidem vt profapia & virtute præclarus, ita omni humanitate, & liberalitate præditus. Vifuntur palmarum arbores in compluribus Italia ciuitatibus, nempe in hortis, viridariis, & monachorum claustris dictis, inf- 60 gni magnitudine, ac speciosa proceritate, cum tamen climatis nostri temperies earum naturis inclementior sit, fructum nobis non proferunt, sed steriles consenscunt. In Hispania tamen maritimis quibusdam locis fructum edunt, verum immitem, & qui nunquam maturefcit. Quæ in **Creta** proueniunt, fructum sane percoquunt, sed magis admodum **Cypria**. Principem locum tenent, & palmulas omnium præstâtissimas ferunt, quæ in **Iudea** proueniunt, & inter has maximè (vt inquit **Galenus**) quæ in **Hiericunte** nascuntur. **Venetias** palmarum fructus, qui nonnullis palmula, aliquibus caryota, quibusdam verò dactyli dicuntur, ex **Syria**, & **Alexandria** Aegypti aduehuntur, ac etiam ex **Neapoli** illuc prius ex **Numidia** importati. Ex recentibus ab arbore statim decerptis, quibus Italia caret, vinum fieri auclor est **Plin.** lib. 14. cap. 16. quo **Parti**, & **Indi** vtuntur, at ceteri, qui orientalem plagam incolunt. Et vt idem refert lib. 13. cap. 4. **Palma** fœmina fructum non proferunt, nisi prope marem conferantur: quo exciso, aut exiccato, vidua postea sterilefcunt: Nec tamen ob id putandam quod

I. PALMA CVM FRVCTV & floribus.

DACTYLI CVM PALMA elate.



Thomay dactylifera
Sland

aeri fructum non ferant. Quandoquidem scribit Theophrastus lib. 2. ca. 3. de historia plantarum, quod ex fructiferis (plu-
 ra enim sunt, quae fructum non ferunt) tam mares, quam feminae fructus edunt. Quorum plures sunt differentiae, quoniam
 alij sine osse, alij duro osse, alij molli proueniunt. Colore quoque inter se discrepant: alij enim candidi, alij nigri, alij flauis: ad
 summam non pauciores, quam ficorum colores, neque absolutè pauciora genera statuunt. Ad haec differre magnitudine, signi-
 ficat, volunt: quosdam enim rotundos esse in modum malorum: magnitudineque, tantos, ut quatuor tantum in spicam te-
 neantur, alios minutos cicere magnitudine. Saporibus item plurimum differre inquit, sed optimum tam inter nigros
 quam inter candidos, genus, quod regium vocant, cum magnitudine, tum virtute, sed r. crum id esse. Quaedam non fructu
 modo, verum & arbore ipsa, longitudine, formaque, reliqua distant: non enim magna, excelsaeque, sed breues fecundiores,
 quam caetera, trime prope fructificantes. Tales etiam in Cypro, in Syria quoque, Aegyptoque, palmae proueniunt: quae qua-
 drime, aut ut plurimum quinquennes fructificant, hominis altitudine assurgentes. Genus aliud est in Cypro, quod & fo-
 rum amplius habet, & fructum multo ampliorem, discrimineque peculiari discretum, magnitudine mali punici, figura ch-
 hogum, non tamen sapidum, tanquam caetera, sed radicibus similem, ut non deuoretur, sed succo tantum expresso expu-
 tur: haec de palma historia ex Theophrasto. Sunt praeterea, qui palmarum generi adscribant plantam in: yria Aegypto,
 Cypri, & Sicilia nascentem, quam Veneti inde redeuntibus M V S A M appellant, & Musas similiter fructus. Adolefcit haec
 (ut referunt) ad quinque, senumve cubitorum proceritatem è stolonibus alterius sata: folio est arundineo, quod tamen per-
 quam longo, latoque ambitu se diffundit, adeo ut in longum trium cubitorum mensuram quandoque excedat: in latum vero
 30 spicatum, ac etiam quandoque grandiore spatietur, lata crassaque, per medium excurrente costa. Torrescunt folia aestate
 in raris, vel etiam fortasse solis ardore, adeo ut mense septembris eorum costa prorsus nuda cernantur, decidente foliorum
 materia, quod admodum sit tenuis. Caulis squamoso foliorum cortice vestitur, palma, vel arundinis ferè modo. Ramos habet
 nullos, sed canalicibus tantum consistit. E vertice gemmae emergit materiae molli, longitudine ferè cubitali, à quo alia ab origine ad
 summum prodeunt gemmae ternum, quaternumve digitorum inuicem distantia: è quibus circummeminent fructus parui
 cucumeris magnitudine, qui per maturitatem quadantenus flavescent, cortice fici, qui eodem modo digitis detrahuntur.
 Substantia pulpa consistit melopeponum modo, nullo intus osse, neque semine. Sapore cum quadam insipiditate dulci. Pri-
 mum gustantibus fructus insipiditatem quandam praese ferre videntur, adeo ut primo statim gustu non placeant: verum
 quoque assuescunt ijs indies magis delectantur: quippe qui quadam occulta saporis suavitate allecti, qua nisi tractu tempo-
 ris cum palato inicit gratiam, nunquam saturi videantur. Ita Musam mihi describere qui ex Aegypto, & Cypro ad nos re-
 60 portantur. Sed quenam antiquis Musa fuerit planta, quid referam non habeo. Inclinat tamen animus eam esse, quae Theo-
 phrasto in palmarum genere recensetur: quam idem in Cypro nasci tradidit, folio caeteris ampliore, & fructu longe maiore
 magnitudine mali punici, & figura oblongo. Musa ex Arabibus Serapionem inuenio mentionem fecisse inter simplicia, &
 hi de eius viribus in hunc sensum differunt. Musa excalfacit in medio primi abcessus, humectat autem in eius sine: paucum
 praebet alimentum. Primatim prodest thoracis, pulmonis, ac vesicae ardoribus: aluum emollit. Verum liberalior eius vsus sto-
 macho aduersatur, ac iecur obstruit. Quamobrè si quis, cum frigidi sit temperamenti ea copiosius vescatur, subinde aquam
 mulsam, oxymel, aut gingiber coditum sumat necesse est. Factum in vtero alit, renibus opitulatur, vrinae ciet, & venere stimu-
 lar: haec Serapio. Est & aliud palmae genus humile pumilumque, quod in Sicilia & Creta copiosissimum prouenit: quinetiam
 in maritimis nostris Senensibus, cubiti altitudine parum excedens, folio caeteris simili, sed longe minore breuioreque. Flores edit
 ex obliquo è capillacea quadam coma emergentes: è quibus bacca vacuatius prodeunt, ut ex appicta bis imagine quissimè cer-
 nitur

Dactylorum differentia ex Theoph.

Palma in Cypro.

Musa plantae historia.

Musa quid apud veteres. Musae vires ex Serapione.

Camaphis confideratio.



II. CHAMAERIPHES SIVE palma humilis.

tior fieri poterit. Pars radici propinquior in globum extuberans internum, germen quoddam, quod cerebrum vocant, innumeris ferè inuolucris circumseptum habet, tenerimum, sapidum, & ori gratissimum. Adstringenti pollent facultate: atque roborant & cohibent: Germen quod cerebrum vocant estur secundis mensis pro bellariis, cum pipero & salu momento, Cardui aut echinatae Cinara modo: Arridet enim maxime gustui. Id (vt aliqui aiunt) ad venerem excit ad am prestare haud parum creditur. Rami quadragesimali tempore deferuntur venales per totam ferè Italiam, ad exornandos oliuarum ramos, qui sacra palmarum die ab omnibus in templis gestantur. Prestant iidem ad sportulas, tegetes, & scopas parandas: sunt enim ad verrendas domos rami vna cum foliis ad scopas parandas, non solum peridonei, sed etiam vtilis, quod non confringatur, nisi tempore longo. Cetera cum maiori Palma communia habet. Bacca sua adstringenti vi, datur contra omnes corporis fluxiones. Hoc palma genus, Theophrasto *Xamaippos*, appellatur lib. 2. cap. 8. de historia plantarum vbi sic habet. Palmae autem vocatae *Xamaippos* aliud quoddam genus est, taquam eiusdem nominis. Nam excepto cerebro viuunt, & ab radicibus succisa repullulant. Fructu quoque, & foliis distant: sunt enim lato, mollig, folio: ob id sportulas, tegetes, & capitis vmbacula eo contexunt: quae & in Creta insula multa, ac etiam multo plures in Sicilia tales proueniunt, vbi Cefagliani vulgò vocantur. Palmae genus India profert (vt Iosephi Indi navigationes perhibent) e cuius truncis, excisis consulto ramis mense Augusto distillat liquor, quem incolae vasis excipiunt, ebibantque, suauiter vini vice: veruntamen nisi excoquatur, post triduum in acetum acerrimum desciscit. Eaque propter illum decoquunt, vt asdefrutum, sitque hoc modo, velut mel suauissimum, quod postmodum ex aqua resoluunt, & diebus viginti artificio quodam



Chamaeriphes humilis

Xamaippos ex Theoph.

Palmae genus in India.

Palmule The percolant, donec optime sit desecatum, atque pellucidum: quo artificio iucundissimus redditur potus, diuque perennat. Peribaciz Diosc. Palmula, quae Dioscorides Thebaicas vocat, quantum ex pluribus auctoribus comperi, adeo tractu temporis insolata siccescunt, vt molita cogantur in panem. Est & aliud ab his palmularum genus, quod officinae Mauritanos secuta TAMARINDOS appellant, Graecis vero a saporis acrimonia oxyphanica: siquidem Mauritani per Tamar dactylos significant: quare Tamarindorum vocabulo idem intelligunt, quod nostri palmulas Indicas. Indici igitur dactyli producantur (vt inquit Serapio)

IV. TAMARINDI

V. CUCIOPHERA.



rapio) à quibusdam plantis, quae foliis longis, acuminatisq̄, salignis similibus virent: licet à nonnullis existimentur Tamarindi fructus agrestium palmarum. Sed equidem malim ad stipulari Serapioni, quam illis, praesertim cum non constet è veteribus, qui de Tamarindis quicquam memoria prodiderit. Ex iis, qui ad nos importantur, nulli, vel pauci admodum integri reperiuntur: nam plerumque contriti, & in massam quandam compacti deferuntur, quam si disseceris, flavos nucleos invenies, varias formas referentes. Praestant, qui in obscuro rubescunt, molles, recentessq̄, & qui nervosis quibusdam villis facti inveniuntur. Adulterantur ab impostoribus prunis, sed deprehenditur fraus tum colore, tum etiam gustu: quippe nec admodum sunt acidi, nec tam saturato colore nigricant. Refrigerant, ac desiccant (vt scribit Mesues) ordine secundo, tam-
 40 as Auerroio tertio describantur. Aluum ciant, quapropter poti bilem facile solvunt: item & praestatos humores leniunt, & insaniam & furorem mulcent. Dantur obstructis, aqua intercute affectu, arquat, & liengis utiliter. Faciunt & ad
 50 & insaniam & furorem mulcent. Dantur obstructis, aqua intercute affectu, arquat, & liengis utiliter. Faciunt & ad
 scabiam, lepras, vitiligines, & lichenas: quin & contra omnes cutaneas exulcerationes, quae à sanguine praestato emersere, officiant tamen frigidum ventriculorum habentibus, sed noxa tollitur, admistis maci, mastiche, casia, aut Indica nardo. Agere munus obeunt suum, sed roborantur, si admistis caprino sero, aut fumarie, aut lupi salictarij succo bibantur: in sum-
 60 ma palmarum varia, ac diuersa sunt genera. Quare curiosum remittimus ad Theophrastum loco superius citato, & ad
 Plinium lib. 13. ca. 4. vbi de his latissime scripsit. Atqui non ob id scribere praetermittam, quod est etiamnum Theophrasto
 70 planta Κυκιοφορον appellata, libro 4. cap. 2. de plantarum historia, palmam caudice & foliis representans. Verum à Palma
 differt, quod haec individua simplexq̄, assurgat, illa vero quum aliquatenus increuerit, scindatur, & bifida fiat, iterumq̄
 80 borum utrumq̄, pari modo diuidatur, & subinde virgas breues, & multas proferat, cortice sicuti palma ad vtenfilium ne-
 xu vilis. Fructum peculiarem parit: magnitudine & figura, & succo singularem. Quippe magnitudine fere, qua manum
 implet, rotundum, colore flauicantem, succo dulcem, & ori gratissimum, non racematim congestum, vt Palma, sed per
 singula distantum, nucleo magno, vehementer duro, ex quo annulos detornantur quibus in versicoloribus stragulariis vin-
 culis vtuntur. Materies à palma plurimum distat: altera enim rara corpore, & nervosa, & viridis: altera spissa, gravis,
 90 carneaq̄, & caesa crassa admodum, atque dura. Persae quidem maiorem in modum eam praeserunt ad lectorum pedes con-
 sciendos. Haec ex Theophrasto transcripsimus, quod haec planta palmarum generi ascribat. Huiusce arboris poma (vt pu-
 100 to) mihi ad me Constantinopoli Gulielmus Quacelbenus Flander Medicus insignis: sed re vera tunc temporis, cuius arbo-
 ris essent fructus coniectare non poteram. Verum cum posthac illustrandis augendisq̄, commentariis hisce nostris operans
 110 haec poma, quae nucis appellabat Quacelbenus, legitimos Cuciopheri esse fructus, cum omnibus suis notis descriptioni
 respondeant. Sunt enim ea magnitudine, qua manum implere possint, oriq̄, gratissima, & suavi quadam dulcedine
 praedita, colore flauicantia, perinde ac Cydonia mala, à quibus etiam parum facie distant: glabra tamen sunt, & carne si-
 120 brosa. Os internum habent iuglandis magnitudine, quadrilateri fere figura, ima tamen parte lato, & suprema in acu-
 mine altero obductum grandiori, haud fragili, sed duro, villis quibusdam valido compactu sese stringentibus, co-
 130 lore ex raso nigricante. Os substantia interior, vt colore marmor imitatur, ita etiam duritie excedit, in cu-
 140 ius centro cavitatis est, in qua sylvestris auellana vna cum putamine recondi facile posset: verum nullo intus nu-
 150 cleo, sed inanis & vacua. Nos tantum fructum vidimus: quo fit vt planta imaginem hic ostendere nequeamus.

Tamarindo-
rum virco.

Cuciophere
plantæ, & e-
ius fractus
confutatio.

Caterum

Palma elate quid sit. *Ceterum quid in palma illud sit, quod aliqui elaten, aliqui spatban vocant, manifestè declarat Dioscorides, cum inquit. Palma, quam aliqui elaten, aliqui spatban appellant, fructus palmarum adhuc florentium inuolucrum est. Cui adscribitur Theophrastus loco iam citato, ubi ita scribit. Fructiferarum alia mascula, alia femina: interest autem, quod masculinum super spatban floret: femina fructum oblongum illico praestat. Sed elate, siue spatba Galeno duo videntur esse genera lib. 8. simpl. med. alterum quod tenerum sit palma germen: alterum quod eius sit tegumentum. Primum verò genus forsasse illud erit, quod in interiore parte inuolucris gignitur antequam flores prodeant. Id, Dioscoridis testimonio ab aliis quibus Borassus appellatur, atque etiam Elate dici solet. Verum hac in re maxime cacutisse Plinium illud apertissime ostendit, quod ipse lib. 12. cap. vlt. scriptum reliquit, sic inquit. Est praeterea arbor ad eadem vnguenta pertinet, quam aliqui elaten vocant, quod nos abietem, alij palmam, alij spatban. Quibus palam est, Plinium palma adhuc florentis fructus inuolucrum cum abiete arbore confudisse, vocabulorum propinquitate deceptum: Graecis enim ἰλάτῃ, Latinus abietem significat. Quinetiam eundem putasse elaten palmam arborem esse, cum tamen vel germen palma tantum, vel florum sit inuolucrum. Nec minus inter recentiores hallucinari deprehenditur Adamus Lonicerus Germanus, qui spatban in palma nihil aliud esse censet, quam folia, quod ensiformia videantur. De Palmarum viribus pertractans Galenus libro 8. simpl. medic. ita scriptum reliquit. Phoenix arbor adstrictoria facultatis omnibus sui partibus est particeps: igitur ramorum succus austerus est, ex aqua substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis natura est encephalos, quem vocant, hoc est cerebrum, siue medulla, esui aptus: at fructus eius, & maxime dulcis, non paucam obtinet caliditatem. Ceterum cum edendo sit, multo est vsui, non tamen foris impositus, ubi quid roborare, & deficcare, contrahere, stipare, densareq; consilium est, sed & tanquam cibus sumptus & simul cum aliis, & per se. Porro quod elaten vocant, nempe tenerum illud palma germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod verò velut tegumentum eius est, adstringentem & ipsum qualitatem habet: verum plus quam dicta omnia exiccata, utpote quod & essentiae consistentia illis ficcius est, & minime particeps est humiditatis. Itaque iure vtuntur illo ad vlcera putrescentia, miscentq; medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: adhaec facultatibus hepaticis, & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoueantur. Sed & radix planta desiccatoria citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. Et de Palmarum fructu differens libro secundo de alimentorum facultatibus, sic inquit. Est autem non parua in palmulis differentia: alia namque sicca sunt, & adstringentes, vt Aegyptia: alia molles, & humida, & dulces, vt quae caryota appellantur. Haec autem praestantissima in Syria Palestina nascuntur in Hiericunte: reliqua omnes palmulae inter dicta duo genera media censentur. Verum concoctu difficiles sunt, capitiq; dolorem inferunt: quarum alia quidem magis, alia minus sunt humida ac dulces, sicca atq; adstringentes: sed constitutis extremis iam omne quod in medio est facillime deprehendes. Nulla ergo ex ipsis est, quae non dulcedinem quandam, & adstrictionem habeat: siquidem caryota leniuscule adstringunt, & Thebaicus obscura quaedam inest dulcedo. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & aluum fistere ostendimus. Omnes autem palmulae, si largius sumantur, concoctu sunt difficiles, & capiti dolorem adferunt: quaedam etiam morsus cuiusdam sensum ori ventriculi, quod medici stomachum vocant, inducunt. Succus autem ex iis in corpus distributus, crassus quidem omnino est, cum quodam etiam lentore, ubi pingues fuerint palmulae, vt caryota. Cum autem huic succo dulcedo etiam mista fuerit, celerrime quidem hepar ab eo obstruitur: leditur autem maxime ab ipsorum esu, quod & inflammatur, & scyrrho obsideatur: post hepar autem & lien obstruitur, ac leditur. At multo sanè maxime virides palmulae ad omnia sunt noxiae, si paulo largius sumantur. Perspicuum porro est, dulces quidem calidiores, adstringentes verò frigidiores succo praeditas esse. Virides praeterea palmulae inflationes pariunt, veluti & ficus: eadem namq; palmularum viridium ad alias est proportio, quae ficum ad caricas. Ceterum in regionibus non admodum calidis, palmulae non perfecte maturescunt, adeo vt reponi nequeant. Quo fit, vt homines ipsis viridibus vesci coacti, crudis succis impleantur, rigoribusq; qui egre calefiant, & hepatis obstruccionibus prebendantur. Dactyli recentes duo osse exenterati, & insectorij cocci puluere repleti, deuoratiq; saepe a praequantibus, abortum prohibent. Praestant quoque dactylorum ossa in puluerem trita semuncia pondere addita sanguinis draconis lachryma drachma, & portulaca aqua pota, ad albas vteri fluxiones, & praesertim si exempto osse infarciantur Eboris scobe, Margaritis, Corallio rubeo, & deinde sumantur à ieiuniis quotidie tres aut quatuor: eadem composita drachma pondere, cum crudi serici combusti semidrachma, sanguinem mingentibus medentur. Arbor, quae φοινίκη Graecis, Latinis Palma vocatur: Arabibus, Machla, aut Nachal: Italis, Palma: Germanis, Dattelbaum: Hispanis, Palmiera: Gallis, Arbre de dattes, Palmiers siue Dattiers. Huius autem arboris fructus, qui δάκτυλοι & φοίνικες Graecis, Latinis, Palmulae & dactyli dicuntur: Arabibus, Tamar: Italis, Dattoli: Germanis, Dattlen: Hispanis, Tamaras, & Dattiles: Gallis, Dattes: Bohemis, Dakile. Palma elate, Graecis, φοινίκη ἰλάτῃ: Italis, Inuaglio, ouer Cortecchia di dattili. Chamæripbes siue palma humilis, Graecis, χαμαίριπος: Italis, Palma minore: Siculis, Cefagliani.*

I. Palma arbor φοινίκη: fructus δάκτυλοι & φοίνικες, dactyli & palmulae. Gal. φοινικοβάλανος, Caryota Dioscoridi & Plinio: vagina, elate & spatba, Palmes Plinio. Palmam vocant authores, at Tabernamontanus Palmam maiorem. II. Palma Humilis: haec Bdellium est de Mecha apud Arabes. Palma minor, Ges. hor. Palmites Lob. Chamæripbes Dod. Lugd. cui & Palma chamærops Plinii. Meminit Theuetus Palmam viniferam in Aethiopiae promontorio, quae arbor ex palmarum genere pulcherrima, siue proceritatem, siue perpetuam viriditatem spectes: fructus cuius, parui dactyli acerbi, qui non facile edi possunt. Inciduntur haec arbores duobus pedibus à terra, quo succus inde eliciatur, qui vasis terreis pro quotidiano potu excipitur, vt autem diutius conseruetur modicum salis iniiciunt: hic colore & consistentia vinum album Campaniae refert & suauissimi gustus est. III. Musa quae ex palmarum genere censetur, Serapioni & Auicenna Musa, Maum, & Amusa, in Syria Mose: ubi Graeci Christiani & Iudaei eam dicunt arborem esse, cuius fructus edidit Adam in Paradyso, quare Ludouicus Romanus libro navigationum suarum Poma Paradyfi nominat: at Garzias hanc opinionem ridet. Palmae speciem humilem Ges. hor. Musam Dod. gal. Garz. Cast. Cæs. Tab. Lug. vocant: at Lobelus, Musam Serapionis: Musa seu Ficus Indica à costis: Maurz Alpino: Mauze nomine Theuetus suae Cosmog. Tomo 1. lib. 5. ca. 2. proposuit. Huic additur Musa Pacouera à Lug. hist. quam arborem Theuetus Paquouere Americis vocari, & fructum Pacoua, scribit. Meminit idem Cosmographiae tomo 1. lib. 12. cap. 19. arboris in regione Catay, quam Photel vocat, quae altitudinem octo cubitorum vix superat: folio plantaginis, sed paulo spissiore: in ramorum vtraque parte fructus Musae Aegyptiae similis, sed breuior, quem nonnulli ficum Phaaronis vocant, qui ligno ipsi inhaerens

herens sub foliis occultatur: cuius vsus ad sitim & febrium ardentium æstus refrigerandos, & ad arthritidem utilis. IV. Tamarindi, quasi dicas Palmulas Indicas, censentur oxyphanica, id est, Palmulae acidæ & palmæ sylvestris fructus: at videntur potius ad siliquas quàm ad palmas pertinere: dicuntur Tamarindi Lac. Lob. Garz. Cæsalp. Cam. à Costæ, Lug. Alpino, Cord. hist. cui & Acacia Indica: Palma sylvestris, Lon. Oxyphœnix, Cast. V. Cucio phera quo nomine Lugd. & Taber. etiam proposuere, aliqui an Nux Indica sit dubitant: alii id quod pro Bdellii fructu à Clusio in notis in Garziam proponitur, esse statuunt.


MALVM PVNICVM. CAP. CXXVII.

10 **M**alum punicum omne boni succi est, stomacho utile, per exiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, unde in febricitantibus. Acida astringunt, æstuantis stomacho auxiliantur, & multò magis contrahunt, ac urinam ciant: ora, gingiuasque lædunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi puni-
 20 **a** Meum èν-
 ci in sole siccati, & obsoniis insparsi, concoctive, fluentem aluum, stomachumque sistunt: cœlesti aqua
 μαχοιδες
 ἰσχυρῶς
 i. stomacho
 utile & ad-
 stringens sed
 Cat. ἰσχυρῶς
 ἰσχυρῶς
 rori gratum
 & adstringens.
 b Meum ἰσχυ-
 ρῶς τὰ ἐν
 δακτύλοις
 i. ad reducias
 in digitis.
 c ἰσχυρῶς leg.
 antiq. cod.
 d περιφύρον.
 purpureum,
 legit Orb.

madeſcant, bibunturque commodè sanguinem excreantibus: ad defessus dysentericorum, fœminarum-
 que fluxione vulvæ laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris vi-
 rilicatis, & sedis vlcera, nomas, b reducias, & ea, quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium
 vitia, præsertim acidorum. Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolent-
 i glutinant: quas punicum, præstant utilitates: humida gingiuarum vitia, mobilesq; dentes decocto col-
 30 **l**uantur: herniam prolapsu intestini erumpentem, cataplasmate repellunt. Memoria tradunt, qui tres
 quàm minimos cytinis deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. Eliquatur hypocistidis ex-
 emplo. Malicorium asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi vim ha-
 bet, & quos cytini, præbet vsus. Decoctum c [radicis,] potu lras ventris tineas pellit, & easdem euocat.
 Balauſtium sylvestris punice flos est, cytino similis. Cuius complura genera reperiuntur, candidum, d
 [fuluum,] colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo: cui adstrictoria vis inest, eadem
 faciens, quæ hypocistis, & cytinus.

MALAPVNICA.

BALAVSTIA.



60 **P**unica Malus arbor est minime proceras, foliis Oleaginis, Myrti amulæ sed maioribus, saturatè virentibus, crassis, culis, Punici mali
 rubris intercurſantibus venulis, rubroq; pediculo appensis. Rami illi sunt, spinæ horridæ. Flores puniceæ, dactylis
 modo patuli, ore stellatim circumſcripti, è quo folia prodierint tenentia, colore rosaceo, agrestis papaueri amulæ, granulis quib-
 70 **u**sdam mediis capillamentis appensis, vt in Rosa. Fructus coriaceo tegitur corice, exterius rufescente, & interius flavesce-
 te: innumeris refertus granis angulosis, rubentibus, vinoso succo refertis, seſiculo intus latente, quæ intercurſantibus filis
 tenuibusq; membranæ, miro quodam natura ordine distinguantur. Egm. materia staua, cinereo libro vestita. Punica nã
 que Mala in pluribus Italia locis vulgò, ſicut etiam Latine Granata dicuntur, à multis intus conſiſtis granis: quoniam
 Granata.

- non desunt, qui ita appellari velint à Granata Hispania regno, quod inibi numerosa proueniant. Sed quomodo conque-
res habeat, nusquam non cognita sunt in Italia: siquidem inibi & in horris, & in vineis, & in viridariis, eorum frequen-
tissima visuntur arbores. Syluestre alterum, alterum domesticum. Syluestres spontè nascuntur in collibus, & maritimis lo-
cis, & aridis. Domestica triplici (vt etiam scribit Dioscorides) distinguuntur specie: quippe quod alia dulcia sint, alia aci-
da, alia vinoso. Vinolenta ea sunt, quae vulgò Vaiani vocat Hetruria, quaeq; alibi Schiaui, & alibi di mezo sapore Italian
sermone appellantur. At Plinio lib. 13. cap. 17. quinque enumerantur species, dulcia scilicet, acria, mista, acida, & vinoso.
Verùm hac omnia Dioscorides in tria redegit fastigia: vt pote qui vni dulcia, alteri acria, & acida, tertio vero generi mista
& vinoso adscripserit. Hac omnia Italia habet, & celebrat: sed & fructus, & acinorum magnitudine, tum liquoris copia
excellunt dulcia, & vinolenta. Acida mitescere, & dulcia fieri tradunt, si suis, aut humano stercore foeteantur arbori ra-
dices, & veteri vrina sapius irrigentur. Caterùm ne fructus in arbore debiscant, remedio sunt lapides tres, cum seriuar ar-
bor, ad radices collocati, quin & si iam cõfita sit, & fructum ferat, eadem ratione emendatur: sed & hoc item præstabitur,
si scilla secundum radices conseratur. Si florem arbor non continet, vrinam veterem cum pari aqua mensura temperare, &
ter per annum radicibus infundere, efficacissimum est remedium. Eundem præstabis effectum, si arboris florentis truncum
plumbeo concluseris circulo, vel anguis corio inuolueris. Seruantur punica mala incorrupta anno toto, si cum ferè matura
fuerint, petioli, quibus pendent, intorqueantur in arbore, vel si postquam decerpta fuerint, argilla ex aqua resoluta vndiq;
oblinantur, ac deinde pluribus diebus insolentur. Sunt & qui, vt diu integra perennent, ea in feruentem aquam immer-
gant, statim eximant, & soli siccanda exponant, octo dierum spatio. Vini ex omnibus conficiendi ratio hæc est: Acini ma-
turi diligenter à putaminibus & membranis purgati prælo committuntur, ac exprimentur: mox vinum secus ad id ac-
commodatis percolatur, & in vasculis reponitur, quousque sex residat: defecaturq; deinde, & clarum reponitur, affuso de-
super oleo, ne corrumpatur, vel acefcat. Sunt & qui sine oleo illud in cadis asseruent, sed id per æstatem facile acefcat. De flos-
culi nomine inter se discrepant auctorum sententia. Dioscorides florem satiuæ punicae cytinum appellat, balaustrum vero
syluestre. Plinio lib. 23. cap. 6. primus tam satiuæ, quam syluestris partus florere incipientis cytinus vocatur: balaustrum ve-
rè flos vtriusque in ipso erumpens cytino. Laudatissimi satiuarum flores colore perquam rubro ex Creta, & Cypro hoc aut
Venetiâ importantur, aspectu quidem specioso, & viribus ceteris præstantiores. Sed & mangonio fiunt in Italia peregrini
non dissimiles, non tamen vsque adeo præstantes. Immaturus punici cortex ideo Malicorium antiquis dicebatur, quod eo,
vt Rhu ad perficienda coria vterentur. Dulcia punica, quae apyrena alio nomine vocantur, ventriculo inutilia haberi, den-
tes gingiuasq; ledere, auctor est Plinius, etsi rectius sorte id Dioscorides acidis attribuat. Paluis mali punici in olla noua o-
perculo indito in furno tostis, potus fluentem aluum efficaciter sistit. Syluestris vero acinorum officuli vtiliter bibuntur triti
ad aquam, quae cutem subierit, siccandam. Cortice punici ex vino decocto, & imposito perniones sanantur. Punica, & myr-
tus (si rei agraria auctoribus credimus) mutua consuetudine mirum in modum oblectantur, ita vt etiam reddantur sciti-
liores, si altera in alteram inferatur. Paratur ex Punica floribus, hoc est ex internis Cytinorum puniceis, ac tenuibus folijs
Saccharum, perinde ac ex paniceis rosis, admirabilis facultatis, ad vtraq; vteri fluxiones, si semuncia pondere sumatur ex
vino rubro austeriusculo, aut ex punicorum acidorum succo, aut ex aqua in qua ferrum quod Graecis ἑμύμα vocant,
extinctum fuerit: quinetiam ex carniū iure, vbi alia non sint ad manus. Præstat quoq; magno sanè præsidio, ad Gonor-
rheam, ad Celiacos & dysentericos: quo medicamento plurima adiuta sunt mulieres, quae diuturna vteri fluxione labo-
rarunt: id quod Francisco Calzolario Pharmacopœo Veronensi acceptum refero, qui mihi tantum hoc saluberrimum an-
xilium reuelauit. Caterùm est etiam Malicorio præcipua vis aduersus pudendorum vlcera: siquidem id exiccatum, & cum
sicca pariter marina spongia, & aloe tritum, æquali omnium portione, addito aluminis vsti momento, penis vlcera in vi-
ris, & vulua in mulieribus, breui ad sanitatem deducit. Punica folia diligenter contrita, aut eorum succus rosaceo permi-
stus, potenter inueteratos capitis dolores mulcet, fronti frequenter illita. Punicum malum fictili vase inclusum, cooperulo
argilla circumlito, & in furno combustum, dysentericos & torminosos, præsentaneo remedio iuuat, vbi ipsius sesquidrach-
mam in puluerem contriti, ex vino potandum propinabis. Officuli punicorum malorum acidorum vncia vna, cum thuris
drachma in tenuissimum puluerem contrita, auxiliantur vteri profluuii laborantibus, si quotidie ex rosa-
rum stillatitia aqua huiusce pulueris binas hauserint drachmas. Malorum punicorum vires prodidit Galenus lib. 8. simpli-
cium medicamentorum, sic inueniens. Malum granatum omne adstringentem qualitatem obtinet, non tamen in omnibus
ea exuperat. Sunt enim inter ea quadam acida, quadam plus dulcia, quam austeria: & sanè quae ab vnoquoque eorum pro-
cedit vtilitas, secundum vincentem eueniat qualitatem necesse est. Dictum autem in quarto horum commentariorum est
super dulci sapore, austero, & acido: itaque ex illis de malorum punicorum differentia licet colligere. Porro acini magis,
quam succus tum adstringunt, tum exiccant, his etiam magis putamina: vocantur autem sidia. Ad similem illi vim habet
cytini. Malum, quod Graecis ποία, Latinis, Malum punicum appellatur: Arabibus, Kamian, Roman, seu Roman: Italia, Me-
lagrano, & Pomo granato: Germanis, Granatpffel: Hispanis, Granada, & Romanas: Gallis, Pamel de grenade, &
Mygrainer: Bohemis, Grana Ioune yablka.

Malus punica seu granata, fert poma vel dulcia, quae vt plurimum grandiora granis maioribus, in quo
genere quaedam reperiuntur, adeo paruo osse, vt eo carere videatur ἀπὸ βίβα dicta: vel acida: vel mixta me-
dio quodam sapore, quae Arabibus Muza, voce μύζον corrupta. At Plinio lib. 14. cap. 19. quinque sunt spe-
cies, dulcia, acria, mixta, acida, vinoso. Est satiuæ, est syluestris similis, sed incultior & spinis horridior. Re-
peritur quoque steris flores tantum proferens, adeo multiplici folio, vt Rosa videantur centifolia, co-
lore saturato. Empedocles ἡλίζον appellat, quod seriùs gignantur fructus, & ἰπέρλοια μήλα, quod corti-
ce præcrasso vestiantur. Dicitur Recentioribus Malus punica & malus granata.

Myrtus.

MYRTVS.

CAP. CXXVIII.

Mezapros-
i fructus.

MYrtus satiuæ nigra vtilior est medicina, quam candida, & in hoc genere multo magis mortua: se-
men tamen imbecillius parit. Vis & myrti, & seminis adstringit. Semen viride, aut aridum in ci-
bo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus, eosdem ef-
fectus exhibet: stomacho vtilis, vrinam cit: prodest contra phalangii morsum, & scorpionis ictus in me-
ro. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in vino vlcera in extremis mēbris nata sanat: oculorum
inflammationes illitum cum polline polentæ lenit: contra agyloas illinitur: crapulâ arcet præsumptum
vinum.

vinum, quod femine factum aliquantum eius semine exprimitur, alias enim acorem contraheret. Praestat idem seminis effectus: vtile pro cidentia vulvarum in deflectionibus, sedis vitii, & feminis fluxione vulgę laborantibus: purgat fures, vlcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas vocant, vti oleum, quod ex foliis eius factum est. Decoctum foliorum ad deflectiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solidoscentes: eo fracta ferruminationi repugnantia vtilissimę fouentur: vitiliginem emēdat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorū eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliacisq; profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosacco cum vino, ad vlcera serpentina, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condilomata. Arentium foliorum farina vtiliter inspergitur paronychiis, pterygiis, & contra alarum, feminumque perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda, seu cremata cum cerato, ambustis, paronychiis, pterygiisque medentur. Exprimitur foliis succus, adfuso vetere vino, aut aqua cœlesti, cuius recentis vsus est: nam excrucus planę cariem sentit, & vires amittit. Myrtidānum dicitur, adpatum in æquabile, b verrucosum, intubescensq; & concolor: quod perinde quasi manus, myrti caudicem amplectitur. Magis quam myrtus adstringit. Tulum adlito austero vino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in vmbra: multo efficacius & folio, & semine, cerato, pessis, in deflectionibus, cataplasmatibus admistum: vbi adstringendum aliquid est.

b Meum ex
bēd'ns.

I MYRTVS ROM.

II MYRTVS TARENTINA.



Myrtus arbor frequens in Italia nascitur. Cuius duo produntur genera: satiuum, quod in candidum, & nigrum diuisum: & syluestre, quo vniuersa ferē Tyrreni littora virescunt, ac redolent. Siquidem in agro nostro Senensi in maxima, in vniuerso Liguria tractu, Romano, atque Neapolitano vbique Myrti sponte proueniunt. Satiua in arboribus facile adulescunt, at syluestris magis fruticat ramis flexilibus ac lentis, rubro cortice: foliis longiusculis, crassiusculis, firmis, odoratis, in acutum desinentibus, perpetuoq; virentibus, punice amulis: quæ nunquam in nigris nigriora, in candidis candidiora spectantur. Flores omnibus insident candidi, numerosi, intus capillamentis, eximie odorati, ideoq; aqua ex iis confecta odori suauitate vnguentariis plurimum expetitur. At cum nostras aquę sit odorata, atque olfactu iucunda, eam tamen odoratissimam existimauerim, quæ ex Aegyp̄tia myrto elicitur: siquidem & odoratissimā, & iucundissimā in Aegyp̄to nasci Myrtum memoria prodidit Theophrastus. Satiuarum vtrumque genus baccas fert oblongas, agrestes oleas quadatenus referentes, multo sanę syluestribus maiores, paruis numerosisq; intus nucleis: etsi contrarium asseueret Marcellus. Quippe experientia compertum est, quod vbicumque satiuæ Myrtus colitur, grandiores, vegetioresq; baccas edit, quam syluestris: cultura enim Myrti mansuescunt, & longę magis humore replentur, utpote & aliæ satiuæ stirpes omnes: quod quidem indomita telus syluestribus denegat. Caterum, ne quis decipiatur, hic lectorem admonendum esse duxi, cum de syluestri Myrto loquor, non me de rusco intelligere, qui & Dioscoridi, & Plinio syluestris, & acuta myrtus appellatur: sed de vera syluestri myrto, quæ sua sponte in littoribus sine cultu oritur: quæ item in mediterraneis in collibus, syluis, ac campestribus prouenit. Nec tamen si præter ruscum à Dioscoride non fuerit expressa, cum tamen dicat initio capitis, Myrtus satiuæ, & reliqua, his verbis & syluestrem eiusdem generis myrtum tacite dari fatetur. Porro inter syluestres alba quoque, & nigra reperitur, quemadmodum & inter urbanas, quandoquidem ipse quam plurimas syluestres myrti plantas vidi in mille locis, quibus matura inerat baccæ, non sanę nigrae, sed in purpuram albicantes. Myrti montes non amant, quia & frigidos

Myrti confideratio.
Myrti arboris historia.
Marcelli plus.
Ruscus, Myrtus est syl.

III. MYRTVS EXOTICA.

IV. MYRTVS MAXIMA latifolia.



V. MYRTILLVS.



Myrtidanū.

Myrti alia genera. Myrtus Tarentina.

Myrtus exotica.

Myrtilli historia.

odere tractus: tamen cum in mediterraneis, nempe in horti-
 viridariis, vineis, & campis maxime proueniunt: tum in ma-
 ritimis precipue, atque amoenis stagnorum, & lacuum ripis
 a natura nullo studio edita, mirifice proficiunt: vitamq; la-
 tam agunt. Quod Dioscoridi Myrtidanum nominatur, vultu
 notissimum est, vbi scilicet myrtus frequens nascitur. Sunt &
 alia veteribus Myrti genera, nobis quoque non ignota, nempe
 Tarentinum, & exoticum. TARENTINA à Tarento
 Apulia ciuitate, vbi copiosa prouenit ita vocata, folio est no-
 strate longe minuiore, robustioreq; fructu minore, copiosiore,
 & in summitate pluribus apicibus coronato, colore ex nigro
 purpurascens, minutis, crebris, albicantibusq; intus officulis:
 floribus communi Myrto similibus. EXOTICA habetur
 nunc in Italia in hortis, & viridariis. Hac folio est nostrati
 non absimili, diluore tamen, acuminatiore, copiosioreq; &
 adeo denso, vt eo rami vbique stipentur. Fructum fert oblon-
 gum, è longoq; pediculo dependentem, seminibus refertum, so-
 communi Myrto haud absimilem, flores albicant vt in cete-
 ris generibus. Vtraq; topiariis operibus peridonea habetur. Vi-
 ribus quoque pollet vtraq; nostrati paribus, & qualitibus à
 ceteris generibus non differunt. Harum Plinius meminit libro
 15. cap. 29. his verbis. Satiuarum genera topiarij faciunt: Ta-
 rentinam folio minuto, nostratem patulo, exoticam densissi-
 mo, sensu foliorum versibus. Hac non est in vsu, ramosa vtra-
 que alia. In Germania & Bohemia, quod legitima Myr-
 careant, aliam in syluis nascentem sibi compararunt phar-
 macopola, eamque MYRTILLVM vocauerunt. Prouenit
 hac in montibus & syluis, frutice cubitali, caudice duro &
 ramis tenuibus & viridibus. Foliis virescunt buxo ferè similibus,
 sed tenuioribus, myrti minoribus, robustis, & sensim per ambi-
 tum serratis: flores illi sunt, tintinnabuli figura, suis è pediculis
 dependentes inter folia, colore subpunico, rufo intus stamine.
 Floribus bacca succedunt, que matura cum sunt, colore & magnitudine Iuniperinis [Myrti] non absimiles, sed paulo minores,
 vinosa austeriusculaq; & in summitate concaua umbilicatae. Fructus refrigerat, exiccat, roborat, reprimis, cohibet.
 Dantur bacca cum recetes, tum quoq; sicca deuoranda dysentericis & coeliacis. Ha itaq; Germanis vnà cum vniuersa plā-
 ta haud inefficaciter Myrti vicem praestant. Peculiariter autem in vtiuntur insectores ad inspicenda stamina, & chartam
 cereale

Floribus bacca succedunt, que matura cum sunt, colore & magnitudine Iuniperinis [Myrti] non absimiles, sed paulo minores,
 vinosa austeriusculaq; & in summitate concaua umbilicatae. Fructus refrigerat, exiccat, roborat, reprimis, cohibet.
 Dantur bacca cum recetes, tum quoq; sicca deuoranda dysentericis & coeliacis. Ha itaq; Germanis vnà cum vniuersa plā-
 ta haud inefficaciter Myrti vicem praestant. Peculiariter autem in vtiuntur insectores ad inspicenda stamina, & chartam
 cereale

ceruleo colore, ac etiam à pictoribus: quinetiam eduntur astate fragorum vice à pastoribus, & alii; nam gustui placent. Antheriscula cum sint & viscosa, sitim extinguunt. Germani autem Pharmacepi hys passim utuntur. Myrti baccarum vire, cum q̄s desiccantur. Myrti nostrati in Hetruria coria vbiq̄e persciantur: quippe quod ea pelles denjuntur, crissuntur, atque crassoscant. Myrti baccis vltimam maturitatem adeptis, nostrates mulieres vtuntur ad ciborum intinellus, qui cum assatu carnibm̄ esitati maximam cum palato ineunt gratiam. Ideoq̄, Plinius loco supra citato ita scriptum reliquit. Succorum natura precipuam admirationem in myrto habet, quando ex vna omnium alci, viniq̄, vna genera sunt: idem myrtidanum, vt diximus. Et alius vsus bacca fuit apud antiquos, anteaquam piper reperiretur, illius obtinens vicem. Quodam etiam generosi obsonij nomine inde tracto, quod etiaminum myrtatum vocatur. Eademq̄, origine aprorum saepe commendatur, plerumque ad intinellus additis myrtis: hac Plinius. Myrteum condimentum languidos ventriculos roborat, idcirco & caliacis, & dysentericis vtile: quin & feminatum fluxiones, qualescunque sint, valenter inhibet. Myrti frondes, itemq̄, baccarum semen tritum: contra fungorum strangulationes mirifice prestant. Arida selia longè plus siccant, quam viridia. Foliorum, baccarumve decoctum, auxiliatur calidis collectionibus, nempe eryspelatibus & herpetibus. Bacca quoque modo hausta, aut deuorata, cor corroborant, & eius tremori mirifice conferunt. Folia sicca vtuntur in sicili crudo, quousque in cinerem albissimum vertantur, lauanturq̄, deinde, & pro spodio, vel pompholyge supponuntur. Myrtus (vt memoria prodidit Galenus libro septimo simplicium medicamentorum) ex contrariis substantiis planta constat: vivit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum, vnde valenter desiccatur. Porro tum folia, tum gemma, tum fructus, tum succus, non parùm inter se in adstrictione dispident. Caterum quod ramis, & trunko adrascitur rubrofum, quam quidam myrtada nuncupant, quanto dictis siccius est, tanto & desiccatur & adstringit vehementius: quodam id tudentes reponunt; postea vino subigentes in passillos formant. Folia item arida viridibus plus desiccant: miserum enim virentibus humiditas quadam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur, sed & fructu. Restringendi tum hac omnia habent tum soru imposta, tum intro sumpta in corpus, quod scilicet nondum vliam deleteriam, aut purgatoriam substantiam habeant admixtam. Planta, quæ μυρτιν. Grecis, Latinis Myrtus nominatur: Arabibus, Aes, A-lai, sine As: Italis, Myrto, Mortina & Mortella: Germanis, We. sch hendelbeer: Hispanis, Murta, aut Rasum: Galis, Meurte. Myrtillus verò Germanis, Hendelbeer: Bohemis, Byadi aut vranovka. χαμαμυρτιν Grecis: Italis, Myrtilla: Ananienibus, Calauezza.

Myrti vire

Myrteu condimentum.

Myrti vires Matthiolo.

Myrti vires ex Galeno.

Nomina

Myrtus & Murtus μυρτιν & μυρτιν, à Myrsine Atheniensi puella, pulchritudine & robore insigni: amica Palladi, in quam occisa conuersa fuit. Huius plures differentia. I. Myrtus vulgaris: Myrtus Bœtica sylvestris, Clus. Hisp. Lugd. Myrtus, Ges. hor. Dod. Casl. Myrtus candida & nigra, Cord. in Diosc. Myrti maioris quinta species, Lob. Myrtus communis Italica, Cam. II. Myrtus Tarentina, Cast. Lugd. Cam. Myrtus minor, Clus. hisp. Myrtus maior vulgaris, Lob. Myrthus, Tab. Huius quatuor differentias fecit Lob. III. Myrtus exotica, Cast. Lugd. Myrtus exotica Plinii pluribus foliorum versibus, Lob. Myrtus tertia, Dod. Myrtus Bœtica exotica angustifolia, Clus. hisp. His addere oportet. IV. Myrtum maximam latifolia, quam Myrtum lauream maximam, Lob. vocat: dein Myrtum laurifolia secundam, quæ Myrtus Bœtica latifolia domestica, Lobelii: cuius tres agnoscit species Clusius: tum Myrtum nonam angustifolia, Lob. cuius duas differentias magnitudine variantes refert Clus. V. Myrtili, ad Vitim Idæam Theop. referuntur. Fructus colore variat rubro & nigro: sic foliis crassioribus. Dicitur Myrtillus exiguus, Trago: Myrtillus germanica, Lug. Vaccinia nigra, Dod. gal. & fol. Lob. Vitis idæa, Ges. hor. Lug. Vitis idæa nigra, Cam. Vitis idæa prima, Tab. Vitis idæa minor, Thal. Vua vrsi, Anguillaræ.

CERASIA.

CERASA RACEMOSA.



P. unguis ceruus
Stu. h.
P. lucitanica
Sp. h. h.

R. 5. K. p. 111

α κόμης κ-
φαίου.

Cerasia aluo vtilia sunt, si viridia sumantur: eadem ficcata illam sistunt. a Gummi, quod ceru resida-
runt, cum vino diluto, tussi vetusta medetur: colorem commendat, visum exacuit, & appetentiam in-
uitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

Ceraforum
historia.

Nulla hodie arbor est in Italia, qua vulgo notior sit Cerasus. Cerasus itaq; arbor folia fert Messilo latiora, & per ambi-
tum serrata: flores albos racematim dependentes, è quibus rubentes oriuntur bacca, longo, ac tenui pediculo inna-
modo flexili, appensa, prona parte diuisura quadam secta, duro intus osiculo, pisi magnitudine, aut maiore, in quo nu-
cleus concluditur, subamariuscule sapore. Ligni materies fibrosa, compactaq; cortice vestitur leui, pluribus inuolutu re-
ferto. Genera Ceraforum diuersa habentur. Nam alia dulcia, alia subamara, alia austera, alia acida, alia insipida repe-
riuntur: quinetiam alia domestica, alia syluestria. Domestica in hortis, vineis & viridariis feritur. Syluestris in syluis pro-
uenit, ac etiam in vallibus. Harum plantas scribit Plinius lib. 15. cap. 25. nouas, & peregrinas, nec antea visas e Ponto se-
cum primum aduexisse in Italiam Lucillum, postquam debellato Mithridate u victoria potitus Romam venit. Sed postea
tanta agro Italo amuenissimo cum hac arbore intercessit affinitas, & consortium, vt non solum ager is satiuarum plantas
seruauerit, propagauerit, & adauerit, sed & veluti ex eius humore (qua summa fuit inter se societas) grauida terra sa-
tilla, sine aliquo semine in campis, in montibus & syluis numerosissimas plantas procreauerit, & ediderit. Satiuarum spe-
ciosissimi fructus, qui Cerasa, & Cerasia Latinis etiam appellantur, diuersorum sunt generum: quo fit, vt diuersa quoque
fortiantur nomina. Inter hac illa principem sibi locum vendicant, qua Hetruscis vulgo Merchiane, & duracine vocantur:
tamen si horum alia maiora, alia minora, alia saturato colore rubeant, alia vero potius albicent. Quae autem Plinio Iulia-
na, nobis vero vulgo Acquaiuole, hoc est, aquea dicuntur, in nullo sane habentur pretio: quandoquidem adeo sunt tenera
& fragilia, vt nisi sub arbore sua comedantur, facile gestatu collidantur, & marcescant: quin & ob aquea partis redu-
dantiam insipida sunt, orig; ingrata. Quae autem, quod ad modum Cornorum modo nigricent, Corbine nos vulgo vocamus,
Plinius vero actia, & caciliana, cum sint duriuscula, & dulcia, gustatu habentur non iniucunda: verum tamen quod ma-
nus, dentes, ac labra atro colore inficiant, discumbentesq; deturpent, mensis raro apponuntur. Sunt & Cerasa, quae vno tan-
tum petiolo, terne, quaterne, quineve bacca nitantur: quinetiam, quae racematim vna modo proueniant, quorum ima-
gines misit ad me Verona Franciscus Calzolarius: quae peculiariter in hortis, vineis ac viridariis habentur. Viribus & qua-

Ceraforum
genera.

CERASA AVSTERA.

CHAMAE CERASVS.



Prunus Cerasus amara

litatibus ab aliis terasorum generibus non differunt. In cerasorum genere numerantur & illa, quae Rome Visciole, So-
nis Amarine, & in aliis compluribus Italia locis Marasche vulgo nuncupantur, a sapore (vt puto) dicta, quod non in-
iucundi amaroris tantillum respiciant. Horum porro varia diuersaque notantur genera, quae cunctis notiora sunt,
quam a me describi possint, quae etsi omnia sibi acidum asciscant saporem, hac tamen eius plus, illa vero minus
habent. Habentur in hortis passim, viridariis atq; etiam vineis. Rura Tridetina ea Marasche vulgo nominant, quae nimis
acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam est, quod ori admodum gratum habetur: quippe quod in ipso acido
dulce fit

dulce sit admissum, ob idque ille palato maxime placeat. Quaedam præterea inibi Marine, & Marinelle cognominantur, & minora, & rotundiora sunt, & breviori pediculo appensa, gustu nihil fere prædictis reclamante. Est & horum ter-
 tium, quæ vulgus illud Verule nominat, longiore pediculo, bacca etiamnum ceteris crassiore, gustu acerbo, & admo-
 dum acido, colore perpetuo rufescente, nec unquam in atrum uergente, etsi cætera, ubi plene maturuerint, in atrum tibe-
 fiant. Omnia cerasiorum (ut ita dicam) Amariorum genera refrigerant, exsiccantque: quin etiam adstringunt,
 roburant, & cibi appetentiam excitant. Non ita facile denorata, ut dulcia corrumpuntur in ventriculo, ideoque febricitan-
 tibus ac sitientibus facile conceduntur à Medicis Germanis. A pediculis repurgata, vni maturis admiscetur, & deinde vi-
 num ex his paratur, gustu gratissimum, quod in alui fluxionibus vtiliter vsurpatur: aptissima sunt, ut insolentur, & ut
 saccharo candiantur. Quinetiam sapore commendantur ad intinctus conspiciendos, quibus non modo sanis edulia incundissi-
 me conduntur, sed etiam egrotantibus, præsertimque biliosis febribus vexatis. Siquidem illis non modo sitim extinguunt, sed
 et in insanas emendant, & cibi appetentiam conciliant. Sylvestre pumilumque, horum genus nulla adhibita cultura Sylvestria ce-
 rasi sponte prouenit, nihil prorsus tum colore, tum etiam sapore ab illis disidens, quæ inibi, ut diximus, Verule vulgo vo-
 cantur. Bacca quæ cum austeris magnitudine certat. Hæc breui pediculo pendent in arbusculis admodum pumilis, tantæque
 breuitatis, ut, vel potius nulla dodrantalem æquent mensuram. Quo factum est, ut crediderim (etsi id pro comperto
 esse non ausim) hæc eadem esse, quæ Plinio Macedonica dicuntur. Cæterum ego horum plantam Chamacerasum potius
 vocarem. Bacca cum cæteris austeriora habeantur, etiam cæteris ficciora iure fuerint, magisque adstringentia. Sylvestria,
 quibus plerumque vescuntur aues, raro in cibis admittuntur, præterquam à rusticis, tum quod plus osis, quam carnis habe-
 ant, tum etiam quod cum quadam acerbitate amatæ sentiantur. Degenerant cerasi quocumque fimo radicibus admoto, id
 vique adeo odierunt, & horrent: contra proficiunt, si sui ipsius putamina sulce concisa circum radices sepeliantur, ibique
 marcescant. Præcoces illa fructus ferunt, quibus ante florum exortum calx viua radicibus circumponitur: vel quibus aqua
 calida sæpius pede irrigantur, et si postea paruo temporis tractu inarescant. Sine osibus cerasi proueniunt, si arborem tene-
 ram ad duos pedes recides, & eam vsque ad radicem findes, medullamque partiu vtriusque ferro curabis abradi, & statim
 vtraque partes in se vinculo stringi, & oblini fimo, & summam partem, & laterum diuisuras: ita post annum cicatrix
 ducta solidatur. Hanc arborem ubi surculis, qui adhuc fructum non attulerunt, inseres, baccas sine osibus dabit. Galenus
 habita Cerasiorum omnis generis ratione lib. 7. simpl. med. ea hisce paucis perstrinxit. Cerasus arbor fructum fert non paru
 adfrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & in horum, sicut etiam malorum granatorum, & mala-
 rum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam vero dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dul-
 tiam ea, quæ nondum cocta sunt, ac matura, quadam admodum acerba sunt, quadam similiter moris acida: sed in moris
 immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasi non semper. Ergo quæ dulciora sunt magisque in intestinis sunt,
 subducunt, sed minus vtilia stomacho sunt, contra austera. Quæcumque vero acida sunt, ea pituit osis, excrementosque stoma-
 chi vtiliter: siquidem austeris magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem os-
 tibus viscosis, & mordacitate carentibus medicamentis facultatem obrinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata
 est. Proprie autem (siquidem verum est quod quidam scribunt) calculis vexatos cum vino potum adiuuat: nam sic illi re-
 tentionum partium quadam facultas inest. Cerasorum fructus, qui Græcis Κεράσια, Latinis item Cerasia, & Cerasa dicuntur:
 Arabibus, Serasie: Italis, Ciregie: Germanis, Rirsen: vnd Ehrschben: Hispanis, Cerezas: Gallis Cerises: Bohemis Vuisud.
 Cerasa racemosa. Hetruscis, Ciregie grappolose: cæteris vero I-
 talis, Ciregie del Grasso. Cerasa austera, Romanis Visciole: Se-
 nensibus, Ciregie amarine: in cæteris vero Italia locis Maras-
 che: Chamacerasis, Græcis χαμακίρατος: Italis Ciregio-
 nano.

Sylvestria ce-
rasia seu Cha-
macerasus.

Cerasi arbo-
ris cum fimo
inimicitia.
Cerasa sine
osibus.

Cerasiorum
vires ex Gal.

Gummi cera-
sorum.

Nomina

SILIQVAE.



Cerasus à Cerasunte Pontico municipio in Italiam detulisse Lucillum Romanum imperatorem auctor est Athenæus. Plurima cerasorum genera apud Plinium: differentia enim sumitur ex colore, sapore & magnitudine: sic inter satiuia sunt quæ plane cerea, quæ pruno sunt insita, sed non adeo lapida: quædam flores instar paruarum rosarum habent, sed paucos fructus edunt: quædam fructus & flores proferunt penè sine folijs, quæ de re in historia:

Κεράσια. SILIQVAE.
CAP. CXXX.

Siliquæ recentes stomacho aduersantur, alium sol-
 uunt: eadem siccatæ sistunt, stomachoque vtiliq-
 res fiunt: vrinam ciunt, sed præcipue, quæ vinaceis
 condiuntur.

Siliquæ, quæ Græcis Κεράσια dicuntur, in Italia officina Siliquarum
 vulgò Carobe, & Carobole appellantur. Nascuntur ar-
 bores, quæ Siliquas ferunt, copiose in regno Neapolitano,
 præsertim in Apulia, ac etiam in Campania, ut optime sciunt
 qui Fundo Itrum, & hinc Molam iter faciunt: siquidem
 in illa ob leuigatos lapides inibi stratos laboriosa admodum
 via, quam Appiam vocant, frequentissima conspiciuntur. In-
 cola hæc plantas Salequa vulgò nominant, vocabulo nimi-

Siliquarum
conditio:

Ceralonia siliqua

Siliquarū de-
scriptio. *rum à Siliqua detorto. In Creta, Syria, Cypro, ac alijs calidioribus regionibus, arbores in spectatam fetis proceritatem ar-
luntur, ramis in latitudinem potius, quam in longitudinem protensis: cortice cineritio ad caeruleum inclinante, loti arbor
inftar. Folio virent fraxineo, latiore tamen, duriore, rariore, ac magis circumato. Florent discedente hyeme, aut ve-
appetente: fructificant verò æstate, & autumnò, dependentibus siliquis, primum viridibus, & deinde cum sicca, ut ex ru-
fo nigricantibus, mansu lignosis, sed dulci pulpa succoque præditis, semine Aegyptia Siliqua baud dissimil. Siliqua recen-
ter ab arbore decerpta ingrato displicent sapore, sed tractu temporis in cratibus expansa & siccat, adeò mitescunt, ut &
dulces euadant admodum, & gustui suaves fiant. Melleo succo referta sunt, eaque præferuntur qua in orient alibus nascuntur
regionibus: ideoque Indi, & Arabes, non paruum mellei succi copiam ab eis exprimunt, quo zingiber, Myrobalanos, Myri-
sticas naces, & alia aromata condiunt. Id quod testatur Strabo lib. 15. sua Geographia de Indicu arboribus scribens. Aliud
Siliquæ mæl
fundentes. *filiquarum genus, quod sic in Aegyptiam cognominant, scriptis tradiderunt Theophrastus, & Plinius: de quibus mihi dis-
ferendum non proposui, tum quòd Italis nusquam (quantum equidem sciam) nascantur, neque cognoscantur: tum etiam
quòd nullam habeant vsum in medicina. Siliqua sicca, et si omnium consensu manifestò adstringunt, compertum est tamen
præstare earum decoctum potum in irrisicis rariscentibus, ob dulcem, melleamque substantiam, quæ in eis inest. Siliquas in cibi
damnavit Galenus lib. 2. de alimentorum facultatibus, his verbis. Ceratia quorum tertia syllaba per, t, literam scribitur,
& pronuncietur, nihil cum cerasijs per, s, scriptis habet similitudinis. Est autem præni succi edulium, ac lignum: unde ne-
cessario sequitur, ut concoctum sit difficile: nihil enim quod lignosum est, facile coquitur. Præterea incommodum illud ipse
inest non paruum, quòd non celeriter deiciantur: proinde satius esset, ea ad nos non importari à regionibus orient alibus, in qui-
bus nascuntur. Sed de viribus quas & arbor, & ipse habent in medicina, idem Galenus differens lib. 7. de simplicium medi-
camentorum facultate, sic inquit. Ceratonia exiccantior est, & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius, quæ ceratia vo-
cant, nonnihil etiam dulcedinis continent. Accedit autem istis quiddam simile cerasijs: nam si humida sumas, magis ven-
trem subducunt: sicca verò magis sistunt: utpote cum humiditatem expirent, & quòd essentia est crassioris, tantum reliqu-
um habeant. Κεράτια Græcè, Latine Siliqua vocantur: Arabicè, Charumb: Italicè, Carobe & Carobole: Germanicè, &
Johannis Brot: Hispanicè, Alfarobar: Carrouges, Gallicè, Carouge: Bobemicè, Sunasbeo Ianachleb: Officinis, Carobe.**

Κεράτια ob corniculorum similitudinem, Ceronia arbor Theophrasto, officinis Xylocaracta, pro-
Xyloceratia & Carobe. Ceratonia, Dodo. gal. & fol. Gef. hort. Lug. Ceratia Clus hisp. Ceratia siliqua, Lob.
Tab. Siliqua, Lac. Lon. Cord. in Dios. Cast. Cam. Siliqua dulcis, Alpino. Siliqua arbor, Gef. hort. Casal.

I. MALVS.

MALVS OBLONGO FRVCTV.



Mala.

MALA.

CAP. CXXXI.

Folia, flores, & germina cum omnis mali, tum maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstrin-
gendi vis inest, maturis verò longè secus. Ex ijs verna bilem gignunt, nervos omnes lædunt, inflatio-
nes pariunt. Cotonea stomacho utilia, vrinam cient: verùm tosta mitiora habentur. Prosunt celiacis, dy-
sentericis, purulenta extulsientibus, cholericis, præsertim cruda Maceratorum liquor commodè in stoma-
chi, aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto
fouentur vuluæ, & sedes, si procidant. Cotonea, quæ melle condiuntur, vrinam mouent: mel autem sibi
constrin-

constricentem illorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho, atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmaris adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur: ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tuis, expressisque, sed quò perduret, quindecim sextarijs succi vni mellis adiungitur: alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod melinum vocamus: quo vtimur, quorics adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè rotunda, parua, & odorata: quæ verò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus vtilia. Flos & viridis, & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, quæ adstrictione desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis: contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt: stomacho negotium exhibent: æstuationem faciunt, ea multis dulcia mala vocantur. Epirotica mala, quæ Latinè orbiculata dicuntur, stomacho vtilia, sistunt aluum, vrinas euocant: malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt. Persica poma matura tam stomacho, quàm ventri vtilia sunt: acerba aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è ficcisalui stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho vtiliora. Medica mala, persicaue, aut cedromela, quæ Latini citria vocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascensibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum: semen habet pyri. Id in vino potum venenis resistit, aluum mouet: oris suauitatem commendat. decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus. Vestuarijs impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

In malorum quoque genere Dioscoridi recensentur Persica, Præcocia, Cotonea, & Citria: quippe quòd eandem effigiem, & formam representare videantur. Sed nos primum de vulgaribus malis agemus, reliqua subinde sigillatim prosequemur. Malorum itaque planta vnico tantum exit candido, ramos inde statim mittens, in latum longumque se diffundentesi vespertis crasso satis libro, cinereo exterius colore, & interius flauo, laui potius, quàm aspero. Folijs est oblongis, carnosiss, per ambitum tenuiter serratis. Flores edit verno tempore foliatos, albo colore, vel ex candido sensim purpurascens, è quibus poma oriuntur forma, colore, magnitudine & sapore varia. Radicibus nititur paucis, non in profundam actis, sed summa tellure vagantibus. Domestica in hortis, vineis & pomarijs habentur. Syluestria verò locis campestribus, tum etiam in syluis & collibus spontè nascuntur. Fructuum diuersa sunt genera, ac plura quàm explicari possint: quinetiam & sapore, & forma diuersa, quo fit, vt varia quoque sint eorum functiones. Alia namque (vt Galenus inquit libro secundo de Alimentorum facultatibus) austerum, alia acidum, dulcemue saporem gerunt. Sunt etiam quæ ex ijs mixtum habeant, ita vt appareant & dulcia simul & austerum. Quædam præterea cum dulcedine manifestè acida sentiuntur: adhuc alia cum acore acerba. Inuenias autem nonnunquam & quæ tres simul sapes plane referant, dulcem scilicet, & acidum, acerbique nonnihil. Ceterum mala quidè, quæ adstringunt, succum habent frigidum quidem ac terreum, quæ verò acida apparèt, frigidum succum habent, verum tenuiù est partiù. Media autè temperatura sunt dulcia, quæ ad calidius vergunt. Quemadmodum quæ omnis qualitatibus sunt expertia, insipidaue, ac veluti aquosa, ad frigidius inclinât. Malis igitur vteris pro vinctiu saporu facultatibus: austerum quidè, cum vtericulus vel propter calidam intemperie, vel ob multam humiditatem fuerit imbecillus: acerbis autè, cum hoc aucta admodum fuerint: acidis, cum crassum succum, qui non magnopere frigidus sit, suspicaberis in ipso esse collectum. Si quidem succus frigidus non acida, sed acria postulat. Vtraque certè & acida & acria succos crassos incidunt: in eo tamen differant quòd hæc quidem cum refrigeratione, illa autè cum calfactione præstent. Porro dulcis maloru succus, cum sine acrimonia, & crassitie, hoc est, cum solum exquisitè fuerit, celerius, quantum in ipso est, distribuitur: quòd si acrimonia, aut crassitiam habuerit, citius subducitur. Ceterum optima etiam genere mala vitata sunt, antequam in arboribus maturauerint: quippe quoniam concoctu sunt difficilia, & frigida, tardeque permeant, & prauis sunt succi: ad hæc succum habent frigidum, & leuiter crassum. Quæ verò belle matura in hyemem, & ver proximum asseruantur, ea morbis sæpenumero perquam vtilia sunt, aut farina aqua subacta circumlita, aut calidis cineribus mediocriter assata, aut pulchre in aqua bullientibus vaporibus percocta. Dare autem ipsa conueniet statim post cibum, aliquando etiam cum pane, ad ventrem, & stomachum roborandum, ijs qui cibum fastidiunt, tardeque concoquunt, quique vomitu, diarrhoea, ac dysenteria infestantur. In hinc quoque vsum apta sunt acerba: nam parata, vt modò dixi, mediocrem retinent adstrictionem. In Hetruria principatum obtinent, quæ Appie, & Mele rose vulgò vocantur: quandoquidem hæc duo genera, cum suauiter oleant, gustuique arant, cum naribus, & palato maximam incunt gratiam. Eaque propter non longè eum aberrare putauerim, qui dixerit Appie esse Dioscoridi melimela: Rosea verò, quæ eidem Epirotica, & Latinis orbiculata dicuntur. Quæ verò adeo rubent, vt crumepersusa videantur, & acido gustu sunt prædita, non alia de causa ita rubescunt (si rei agraria auctoribus credimus) nisi quòd ex mali & mori nigra insitione suam traxerint originem. Cornarius sua tantum, ni fallor, opinione ductus, putat in suis commentarijs in Galeni libros de compositi. medicamen. secundum locos, Cestiana poma esse arantia siue aurantia mala, quæ in Citrei mali genere ab omnibus recensentur. Nec eum potuit à sua sententia reuocare Plinius, qui libro 15. capit. 14. apertissimè scribit à Cestio cestiana, à Matio matiana, à Manlio manliana, à Claudio claudiana, & ab Appio appiana mala per inuentorum nomina, à quibus habuerunt originem, Romanis fuisse cognominata. Quocirca eo loco scripsit reliquit Galenus ex auctoritate Apollonij, quòd in capitis dolore ex ebrietate cestiana mala sic in vrbe Romana appellata, in cibis cocta conferunt, quòd austerum sint facultate: non, vt somniasse videtur Cornarius, aurantia, quæ præterquam quòd Appollonio, & Galeno incognita fuisse censentur, nusquam gentium, quòd equidem sciam, cocta exhibentur. Quo si, pace omnium dixerim, vt qui sua ceruicis duritiam consulunt, suas sæpius reprobare sententias audiant. Malos, quæ fructus suos tanquam steriles, dare recusant, fecundas effeceris, si plumbeo circulo earum caudicè altitudine pedis à terra sistim concluderis ante florum aduentum, & cum mala coeperint adulescere, soluto vinculo eas libertate donaueris. Præstant dulcia poma ad melancholicos affectus, quinetiam contra pleuresim. Nam si dulce pomum calidis cineribus coctum, & glycyrrhizæ succo, amylo, & saccharo albisimo conspersum, pleuritico edendum præbeat, tam mane, quàm vespere, horis duabus ante cibum, illos quidem mirificè iuuat. MALA COTONEA primum in Italiã aduecta fuerunt è Cydone Creta oppido, vnde Grecis cydonia dicta sunt. Est itaque planta Cydonia malus communi malo ferè similis, atqui folia angustiora sunt, leniora, carnosiora, duriora, & à tergo cadidiora, flore fert albū, vel ex albo purpurascensè syluestris rose figura, quinq; per ambitu folijs distinctū, qui vere prodit. Hæc raro proceram visitat, si uctu scilicet incuruatos deprimeret ramos. Cydonioru malorum

Malorum consideratio, & historia.

Fructuum diuersa genera.

Malorum vires.

Poma præcocia.

Cornarij optimo reprob.

Aurantia Gal. ignora.

Steriles Mali quò fecundant.

Mala dulcia ad Pleuritidè. Malorum Cotoneorum consideratio.

II. COTONEA MALVS.

COTONEA PYRVS.



Cydoniorum
genera.

Pyra cotonea

Diacydoni-
um Galeni.

Mirū admo-
dum auxiliū.
Matorum Cy-
doniorum vi-
res Matthio-
lo.

Persicorum
consideratio,
& genera.

Nucipersica.
Persica amy-
gdala.

Cornarij opti-
mo reprob.

malorum tria in Italia inueniuntur genera. Prima illis, qua peculiariter Mala cotonea cognominantur, pressa, incisuris interfecta melopoponum modo, colore ad aurum inclinato, lanuginosa, & longè cateris odoratiora. Proximum locum sortiuntur, qua maiore admodum corporis mole proueniunt. Dioscoridi & Galeno struthia vocata. Hetrusci hac pyra cotonea vocant: quippe quòd forma magis pyra, quam mala referant. Pulpa, ac succo cateris praevalent, colore tamen, suaueolentia, ac viribus cedunt. Postremò Plinio miluiana sunt, qua nonnullis notha dicuntur, quòd tantum proueniant ex cotoneis malis, qua struthis insita fuerint, vel ex struthis, qua cotonearum surculos receperint. Hec malis grandiora, pyris verò, siue struthis minoras visuntur: forma verò, ac facultate inter vtrumque media. Proueniunt sata in hortis, vineis & viridarijs. Valenter adstringunt, cohibent, roborantque: quin etiam refrigerant ordine primo, siccant secundo. Caterum sanè hac omnia, praecipue mala, maxime officinis expetuntur in medicina vsu. Nempe quòd ex omnibus praeter vinum, miuam, oleum, & quòd Dyacydonium vocant, conficiantur & intinctus, & congelati liquores: qua omnia non agris modò apta sunt, sed etiam sanis vtilia aquè & grata. Galeni quo (vt ipse contestatur in libris, quos de alimentorum facultatibus conscripsit) Cydonie placenta, quam officina Dyacydonium nuncupant, ex Iberia, & Syria Romam conuehebatur, ex melle tantum, & cotoneorum carne confecta, tam ad cibi, quam medicamenti commodum. Qua sacharo, vel melle condita reponuntur, perfecte matura legi debent, alias indurescunt lignorum instar, ita vt dentibus confici nequeant. Qua cruda per hyemem asseruantur, seorsim à pensilibus vuis reponeda sunt, quòd vvas suo acerrimo sapore adeò vitient, vt ea statim marcore conficiantur. Mirum est, quòd multi ferunt, vt si mulier pragnans Cydonia mala crebrius esitauerit, paritura sit infantè cum industrium, tum ingeniosum. Struthiorum radix adalligatur vtiliter strumosis, sed anteaquam eruatur, terra circumscribenda est sinistra manu: quin & opos tet, vt qui fodit, dicat se id facere, & cuius causa. Cydonia mala praesumpta, aluum sistunt, contra verò citant, & vapores caput petentes reprimunt. Semina si in aqua decoquantur, quousque ius mucaginem contrahat, prosunt illis a omnibus inflammationibus, linguaeque scabritie mirifice lauigant. Cydoniorum succus librae ponderis in quo corallorum rubeorum, seminis rosarum rubeorum, & Rhabarbari, cuiusq; drachma, vna cum hypocistidis, & acacia, binis scrupulis, ad tertias bullierint, auxilium est magnum, ad biliosas vomitiones: quinetiam ad dysenteriam. Datur is quotidie potandus mane, & vesperi horis binis ante cibum: verum affectos purgatos esse oportet. PERSICA autem malus notissima est: folijs Amygdala per omnia similibus, ligni materie fungosa, & imbecilli. Flores quoque amygdalinos profert, sed magis purpurascens. Radicibus nititur imbecillibus, minimè in altum actis, vnde fit, vt citò consenescat, & cadat. Persicorum plurima reperiuntur species: nam quaedam rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia candida sunt, alia sanguineo succo madent, alia duracina, alia cotonea vocantur. Ad haec quaedam habentur dulcia, quaedam acida, quaedam vinosas, quaedam amariuscule, & quaedam etiam austera. Prima laus in cibis duracinis, sic ex re dictis, quòd dario- re sint pulpa & caro tam pertinaciter hareat ossi, vt nullo pacto ab eo auelli queat. Praecipua autem in hoc genere illis laus, qua ab aurei coloris nitore, odoreque perquam iucundo, Cotonea cognominant. Secundas sibi vendicant partes, qua cortice detracto sanguineum succum fundunt, nò propterea modò quòd sint gustu reliquis suauiora, sed etiam quia magnitudine, & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec praedicto generi fortasse cedunt, qua à nucis similitudine Nucipersica, quòd nucum iuglandium faciem representent, cognominantur: hac enim cum colore & sapore non refragentur persicis cotoneis, tum etiam non ingrata dentibus duritie, gustum mira afficiunt voluptate. Est & genus aliud Persicorum in Hetruria, ac in alijs Italiae locis agricolarum mangonio factum, qua ideo Persica amygdala appellant, quoniam Persicorum ossium vice dulces amygdalarum nucleos includunt. Habetur Persica vbiq; copiosa in Italia, sed in Apulia copiosissima prouenit. Caterum sanè multis contendit Cornarius, in suis commentarijs in secundum Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos, vbi que corruptum esse Plinij codicem is in locis, in quibus de duracinis persicis tractat: quin & Pauli, & Palladij, & Con-

III. PERSICA MALA.



& Constantini Caesaris libros corruptos esse, vbi in ijs de duracina persica aliquid scriptum reperitur. Quoniam quidem is, vbi in horum monumentis de duracina persica factam fuisse mentionem legitur, ibi de rhodacene, non autem de duracina legendum esse censet. Verum cum in ibi nulla vel ratione, vel auctoritate nitatur, quibus id comprobet, sua tantum ductus opinione videtur: atque ob id facile pronunciaffe, horum omnium codicibus (quod tamen absurdum esset credere) mendam subesse. Quamobrem in hoc potius Cornarium hallucinatum, quam libros deprauatos esse crediderim. Quinimmo virum alioquin doctissimum admiror, quod rem per se claram obscuram reddere conatus sit, quodq; non intellexerit, quid Plinio, & Palladio duracina, quid Paulo Sopaxia, quidne Actio, & Constantino, ac alijs quibusdam Græcis podaxna extiterint. Nam si animaduertisset, hac inter se & nominibus, & re ipsa differre, facilius, meo quidem iudicio, rem dubiam explicasset, nec omnes in vniuersum auctorum codices deprauatos pronunciaffet: cum, vt equidem arbitror, eorum nullus his in locis sit vitiatas. Paulo enim Sopaxia vt vulgata habet lectio, non podaxna Cornarij modo, legendum semper existimaui, quod ipse eo loco de pracocibus, & armeniatis tantum malis differat, non autem simpliciter de persicis. Siquidem, vt Cornarius ipse fatetur, Rhodacene non est alia, quam malus persica, quemadmodum Rhodacena nil aliud sunt, quam mala ipsa Latinis persica vocata: id quod & nos sine vlla controuersia probamus. Sed Paulo Sopaxia (vt diximus) genus est pracocius, siue armeniatis mali, vt ipse declarat his verbis. τὰ δὲ πρακώκια τὴν καὶ Σοπάξια, καὶ ἀρμενίαν ἀπέτλωσαν τὰν πρῶτον, ἢ τὴν ἀποτῶν ἴσας, ἢ τὴν ἑσπέρην διαφθαίρονται. id est: Pracocia, doracia, & armenia persicis prestant: neque enim acescunt, neque similiter corrumpuntur. Quibus palam est in Paulo potius Sopaxia quam podaxna esse legendum, quod tantum persica malus Græcis podaxna vocetur, non

Doracia Pauli li.

Rhodacena suus persica

antem armenica, doracia, & pracox: quarum fructus, tametsi a quibusdam inter persica numerentur, quod forma tantum q; similes videantur, non tamen vera sunt simpliciter persica, qua proprie Græcis nonnullis podaxna μῆλα in vniuersum vocantur, vt ipse etiam Cornarius testatur. Quippe nugaretur ineptè Paulus, si vellet, quod rhodacena persicis prestant, cum nil aliud sint rhodacena, quam persica. His itaque rationibus liceat nobis dicere, Sopaxia Paulo nec podaxna, nec duracina designare, sed pracocius, siue armeniatis mali genus sibi peculiare. Sed iam ad Plinium venio, cui duracina persica persicorum species sunt, quibus palma inter omnes, non autem genus, quemadmodum & duracina cerasa, & vua etiam duracina inter varias cerasorum, & vuarum species eodem Plinio, & Palladio describuntur. Quod maxime arguit, aliud eisdem designare duracina, aliud verò Græcis podaxna, quod verbum hoc vniuersaliter de omni persico pradietur, non autem de aliqua particulari specie. Neque, vt ait Cornarius, vocat nostra atas quadam persica mala duracina, quod esse ceteris duracia sunt, sed antiquos secuta, quod pulpa consistentia gustu gratiora sese offerant, & longiori tempore perdurent. Quod quidem palam facit Plinius lib. 14. cap. 3. cum ait. Duracina vua sine vllis vasis in vite seruabilis est: tanta est contra frigiditatem, tempestatesque firmitas: hanc & Columella pretulit in cibis. Postremo quod rhodacene arbor, persicam arborem in vniuersum significet, cum Cornarius ipse id firmiter asserat, opus sanè non esset hoc pluribus comprobare: sed ne fortassis parum sibi ipsi non esse adhibendam fidem, Aetium consulat, Constantinum Casarem, & Simeonem Serbi inter recentiorum Græcos. Siquidem ij pluribus in locis manifestè demonstrant, nil aliud per Rhodacenam se intellexisse, quam veram, legitimeque persici plantam. Persicorum omne genus damnauit Galenus lib. 2. de alimentorum facultatibus, vt prauis succis facile corrumpantur, ac noxam ventriculo inserant: quapropter Persica primis mensis semper edenda precipit. Quare ego certe nescio, ex quorum scriptis deprompserit Plinius, quod innocua expectantur agris, nisi sortasse & ipse pro persico persam deceptus acceperit, quemadmodum fecere recentiorum nonnulli. Persici flores recentes esu aluum deiciunt, utrumque vomitiones ciunt. Hydropticorum aquam pellunt, si recentes in acetarijs edantur, sed non absque agrotantium laboribus. Arboris lacryma datur ex aqua plantaginis, aut portulacæ succo vtiliter ad cruentas reiectiones: tussientibus verò & anhelosis, ex mulsâ, aut Tussilaginis decocto, addito croci momento: facit ad raucedines, & aspera arteria impedimenta. Datur calculosis cum succo raphani, aut limonum, aut ex vino duarum drach. pondere: confusa folia recentia illinuntur: vtiliter ventris ex aceto ad interancorum vermes: eorundem succus purulentis, vermiculosisque auribus vtiliter insillatur. Nuclei tormina ventris tollunt, si deuorentur: quinetiam potantes inebriari prohibent, si seni septeniue presumantur. Tandem idem & decoquantur in aceto, quousque liquefiant, pulicula modo, ad alopeciam, namque illi mirum in modum capillos replicant. Contusorum cremor ex aqua Verbenacæ illinitur vtiliter fronti, ac temporibus, in capitis dolore. Idem prestat oleum ex ijs expressum, conuenit enim peculiariter hemigrania, & somnum conciliat, id quod & cremor facit: insillatur oleum cum vtilitate ad aurium dolores. Idem tam potum, quam clysteribus infusum, coli dolores à flatu genit, ac etiam à fecibus exiccatis, perbellè mulcet: datur pariter potandum iliaco, ac calculosis, quatuor vnciarum pondere. At qui maxime calculosis auxiliantur hoc modo: Sumito nucleorum osium persicorū quinquaginta, nucleorum osium cerasorum centum, florum sambuci manipulum, vini Cretici odorati libras tres: excipiantur hac omnia fictili nouo, & sepeliantur in simo, diebus decem: deinde destillentur vitreis organis. Aqua que inde fluxerit, pota ante cibum, quatuor vnciarum pondere, mirum in modum renum calculos pellit. Non defuerunt, vt Marcellus Florentinus, & Symphorianus Campegius in historialibus Galeni campis, qui existimauerint eandem plantam esse persicam & perseam, de qua agit Dioscorides in huiusce primi voluminis calce. Que (vt tradunt) ea profecta est, que in Perside exi-

Persicorū vit ex Galeno. Plinij lapsus.

Persici arboris, & persicorum facultas.

Aqua stillacitua ad calculos. Marcelli, & Symphoriani error Persicæ & Perseam idem censentium.

siat exi-

IV. ARMENIACA
malus.ARMENIACA MI-
nor.Armeniaco-
rum confid.Oleum nu-
cleorum Ar-
meniac.

Malica mal-

Theodentila-
pium.

sede excitosa nascitur, et si translata in Aegyptum caeli illius clementia mortiferam in salutarem verteret naturam, adeo ut iuxta recepta, tam sanis, quam morbofis prorsus habeatur innocua. Huius historiam latius prosequitur Theophrastus lib. IIII de plantarum historia (ut infra suo loco dicemus) quam si quis perlegerit, hanc à nostris persicis plurimum discedere comperiet. Manifesto etiam argumento sunt Dioscorides, & Galenus, quod haec planta inter se differant: quandoquidem de his ut formae, & genere differentibus, seorsum suis scriptis tradiderunt. Armeniaca praeterea quae Latini, ut in Dioscoride legitur, praecocia nominant, & Graeci bericocia pronuntiant, nos in Hetruria Graecos imitati vulgò Basocbe, & Moniacbe corruptis vocabulis appellamus, ac si diceremus Bericocia, & Armeniaca. Plura eorum visuntur genera magnitudine potius quam genere differentia: quod evenit non modò caeli clementia, & terra admodum frugifera dotibus, sed & cultorum manigonio: namque ex multiplicata insitione maxime proficiunt. Porro omnia, ubi maturitatem senserint, aureo colore splendunt: idcirco Romanis vulgò Chrysomela, quasi chrysomela dicuntur, eaque praecipue, quae eo tractu cum persicis magnitudinem tenent. Maturescunt tunc estate mense Iunio ante alios fugaces fructus, unde merito Praecocia dicta. Ea parum genere, & natura dotibus à persicis discedere, testis est Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus: sed non item in ventriculo, ut illa, tam cito corrumpi: quanquam recentiores Medici ea longè magis, quam persica, corruptioni obnoxia, experientia contendunt. Haec arbor raro proceras admodum visitur: folia fert nigra Populi amula, Pyri haud absimilia, subrotunda, in summitate acuminata, & per ambitum serrata, quaterna, quinaeque simul emergentia. Flores profert albos Cerasi figurae, e quibus fructus prodeunt persicorum forma, ac ferè magnitudine, sed aureo colore, saepe cum purpura mista. Plura eorum habentur genera, cum sapore, tum magnitudine differentia, quod non modo caeli, solique clementia cauere crediderim, sed etiam cultorum manigonio: namque multiplicata insitione maxime proficiunt, & auferunt. Omnia intra se concludunt, utraque parte turgens, in quo nucleus concluditur eadem figura, qui in quibusdam amarus reperitur, ut in Persico, in alijs verò dulcis, ut in amygdala. Habentur in hortis, vineis & viridarijs. Oleum è nucleis expressum, misce valet inunctum ad inflammas hamorrhoidas: valet quoque ad vlcera tumores, ac lingua impedimenta, & pariter ad aurium dolores. Idem potus vnciarum quinque pondere, cum vini Cretici vncia, calculos pellit, & colicos inuat. Armeniaca minor, arbor est, mali proceritate, folijs alba populi, floribus cerasi admodum similibus, ac pariter racematim prodeuntibus. Fructus edit mali Persici effigie minores tamen, colore aureo subrutulanti, & odore iucundo. Non differunt suis in facultatibus à maioribus: veruntamen austeriori sunt sapore. Insuper MEDICA MALA, ut ex nomine cognosci potest, ex Media primùm aduecta sunt: haec Latini Citria, vel Citromala vocantur. Eorum arbor quae perpetuo pomifera est, aurantiarum ac limoniarum plantas magnitudine aequat. Folia, quae perpetuo ei virescunt, aurantijs parum, vel nihil vestigantur, seraminibus visum ferè effugientibus ubique veluti acu tenuissima punctim traiecta. Quamobrem nesciuerim ego qua ratione Theophrastus (ut Theodorus interpretatur) ei folia assignauerit portulacae, quae illi nullis notis consentiunt. Quo fit, ut admirari non liceat, si recentiorum plerique existimauerint Theophrasti codicem hoc in loco sciatere mendis, & quod ubi legitur ἀνδραπέδον, id est portulacae, legi potius debeat ἀράχνη, id est, araneorum tela. Quandoquidem is fortasse videbatur quòd, cum mali Medica folia sint ubique minutim admodum punctis perforata, ita ut lintecis spississimi modo sint transparen-

rentia.

V. MEDICA MALVS.



rentia, facile telis araneis comparari possent. In quorum sententia ego quoque persisti, quousque Plinius inde me reuocauit. Quippe cum accuratius Plinium perlegissem, comperi Theodorum, alioquin virum & Gracum natione, & Latina lingua peritissimum, male Theophrastum hoc in loco fuisse interpretatum, & vocabuli significatum minus recte accepisse: siquidem, ut apertissime declarat Plinius lib. 13. capite 22. Adrachne arbor est arbutu admodum similis. Inquit enim, Adrachnem omnes fere Graci portulaca nomine interpretantur, cum illa sit herba, & andrachne vocetur, vnius litera diuersitate. Ceterum adrachne est syluestris arbor, neque in planis nascens, similis vnedoni, folio tantum minore, & nunquam decidente. Hinc ergo facile colligi potest, huic planta, qua arbuti frondibus perpetuo virescit laurinus similibus, Medica mali folia comparasse Theophrastum. Citrea arbor (ut diximus) Auranti folio perpetuo virescit: ramos habet flexiles, viridi libro vestitos, atque spinosos. Flores edit subpurpureos, solidos, calathi effigie capitamentis quibusdam e medio emergentibus, omnibus horis pomifera est: alia namque matura cadunt, alia maturescunt, alia vero subnascuntur. In pomis non parua spectatur diuersitas, cum magnitudinis, tum saporis. Quandoquidem nonnulla in tantam excrescunt molem, ut melopepones magnitudine aequent, cuiusmodi sunt, qua ex Liguria & Adriatici, Argelique pelagi insulis afferuntur: alia hu paulo minora, alia vero limonum magnitudine, aut paulo maiora, cuiusmodi sunt, qua a Lacu Benaco comportantur: haec principem in cibis obtinent locum. Nam etsi ceteris pumihora sunt, maiorem tamen reliquis ab ore ineunt gratiam. At qui qua grandiora sunt, etsi speciosa magnitudine excellent, cum tamen in spido gustu non multum placeant, in cibis recertia non aequae ac illa praestant: verum quod pulpa copiosiore consistit, officinis expetuntur, saccharo vel melle asseruanda. Color omnibus aureus, facies oblonga, ut limonum, sed densiore corticis pulpa: cortex illis rugosus, flauus, odore praestans perquam grato. Acidam concludunt medullam, succo plenam, in qua semen latitat hordei figura, grauidius tamen, & duro obductum cortice, amaro sapore. Maturescunt integro anno, decerpunturque cum aureo colore fuluescunt: namque matura cadunt: alia maturescunt, alia vero subnascuntur. Haec Plinij aeo non erant in Italia, ut ipse testatur lib. 12. cap. 3. vbi inquit, saepius tentasse gentes, plantas e Media transferre ad se, qua tamen ibi diu viuere nequiverunt, licet magna cultorum solertia fuerint enutritae. Nunc verid contra translatae factae sunt, atque cum Italo solo tantam inire gratiam, ut non modo in maritimis, sed in mediter-

Adrachne Plinij.

Malorum diuersitas.

ga, ut limonum, sed densiore corticis pulpa: cortex illis rugosus, flauus, odore praestans perquam grato. Acidam concludunt medullam, succo plenam, in qua semen latitat hordei figura, grauidius tamen, & duro obductum cortice, amaro sapore. Maturescunt integro anno, decerpunturque cum aureo colore fuluescunt: namque matura cadunt: alia maturescunt, alia vero subnascuntur. Haec Plinij aeo non erant in Italia, ut ipse testatur lib. 12. cap. 3. vbi inquit, saepius tentasse gentes, plantas e Media transferre ad se, qua tamen ibi diu viuere nequiverunt, licet magna cultorum solertia fuerint enutritae. Nunc verid contra translatae factae sunt, atque cum Italo solo tantam inire gratiam, ut non modo in maritimis, sed in mediter-

40 raneis quidem tum hortis, tum viridarjjs, tum etiam nobilium lacuum ripis frequentissima feliciter germinant, postquam cultu, & diligentia Palladij (is enim proditur primus artem adinuenisse) factum est, ut ex Media in Italiam translata profuerint, ac propagauerint. Theophrasti aetate Citria mala nondum in ciborum vsum venerant, eorum testimonio, qua ipse libro 4. de plantarum historia memoria prodidit, sed tantum odorij gratia vestibus inferebantur. Quin & eorum vsus erat antidoti loco contra venena, ad qua demolienda semen praecipue efficacissimum habent. Refert Athenaeus, quod cum princeps quidam Aegyptius maleficos quosdam damnasset nebulones, quod suorum facinorum lucrent poenas, aspidibus secundum Aegyptias leges in praedam exponendos, ij Citrium in itinere, dum ad bestiarum pabulum ducerentur, comederunt quod coupona quada vices eorum dolens atque miseriam, illis dederat: mox cum in theatrum descendissent, & ab immanibus, ferocissimisque feris demorsi essent, nihil sane molestiae senserunt. Qua de re praefectus non paruum capit admiratio, & a militibus diligenter inquirens, an antidotum aliquod praesumpsisset, certior factus est, citrium tantum ex integritate donatum, eos comedissee. Postridie vero iussit vni praerberi, alteri denegari, & denuo in theatrum trudi ad supplicium. Quo facta qui comederat, demorsus nihil incommodi passus est, alter vero a feris illis vndiq; liquidus factus, confestim interiit. Narrat praeterea Theopompus Chius duodequadragesimo suarum historiarum volu. Clearchum Heracleotam Pontum annu multos veneno necasse: sed ille, inquit, plures adhuc interfecisset, si populum praestantissima citrij vis latuisset. Seruantur citria mala diutius incorrupta, si hordei, vel milij acernis obruantur. Sed habita medicinae ratione, iam de eorum viribus plenius differendum est. Citria itaque venenis aduersantur, eorumque maxime semen. Citrij decoctum collatione oris balitum commendat, suauitatemque accersit. Ipsa autem integra vestiarjjs condita, vestes non modo gratissimo odore perfundunt, sed eas etiam a tineis, & blattis vindicant. Idem potum venenis aduersatur, & succurrit pestilentialibus febribus affectis. Cortex saccharo aut melle conditus, ventriculum & cor corroborat. Si cruda tamen manduntur, non facile coctioni obediunt, quin & crassum generant succum: ob hoc vesci ijs melle, aut saccharo conditis satius est, quod ventriculo commodum calefaciant, ac roborent: quamuis haec nostra at as gula nimium indulgens, in cibis citria cruda praferat cum affatis carnibus esitata. Citria aduersus atram bilem, & morbos maestos, quos illa excitat, opitulatur: Semen priuatim scorpionum ictibus & potum, & appositum mirifice medetur. Acidus eorum succus flauam reprimat bilem, arcetque pestis contagia, & sitim sedat. Proinde recetiores medici ad febres pestilentes serapijs ex eo confectis feliciter vtuntur: Succus grauidarum malacia succurrit. Citrij mali meminit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum sic inquit. Mali medica fructus non amplius malum medicum, sed ab omnibus Citrium nuncupari adsolet. In semine quidem vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, ut ipsum tertij sit ordinis resiccantium, refrigerantiumque. In cortice vero itidem desiccantem temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimonia: proinde desiccet hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulo infra. Porro caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa, frigidatq;: nam & ipsa edunt, sicut & cortex. Semen omne edi ineptum est, tum humidum illud, & acidum. At quo primum differunt tum ualde

Palladius mala Citria propagauit in Italia. Citrioru mira facultas aduersus venena.

Citrioru vires Matthiolo.

Citrij mali vires Gal.

Auicenna no
tatur.

Limonia.

us, qui in illo inuenitur, id quod reuera semen est. Hic amarus est, & digerendi videlicet, siccandiq; facultatem obtinet, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia verò denique exiccant, ac digerendi vim obtinent; hactenus Galenus. Vbi animaduertendum est, quòd cum initio capituli inquit: In semine quidem vincentem habet qualitatem acidam, & siccam, vt ipsum tertij sit ordinis resiccantium, ac refrigerantium, Gal. non de nucleis intellexit, neq; de vero eorum semine, sed tantum de acido Citrij succo, in cuius medio vbiq; includitur semen. Eam autem fuisse in hoc Galeni sententiam, eius verba in calce serè capituli ostendunt, quae ita sonant: Semen omne esui ineptum est, tum humidum illud, & acidum, de quo primum differai: tum nucleus, qui in illo inuenitur, id quod reuera semen est. Hic amarus est & discitit, hoc est calcauit, & exicat secundo recessu. Quam rem male, meo quidem iudicio, assecutus Auicenna, vt pote qui non recte distinxerit, neque hac in re planè Galeni sententiam acceperit, libro suorum canonum secundo, semini Citrij secundam calidorum, & siccorum sedem assignauit: tractata verò, quem cordi viribus dicanit, eidem tertiam frigidorum, & siccorum classem adscripsit, nullum quidem verbum faciens de acido Citrij succo, quem à Galeno sub seminis nomine comprehensum fuisse demonstrauimus. Non longè uatura, & viribus à citrij distans mala LIMONIA & AVRANTIA dicta, & illa quae ADAMI POMA vulgè vocantur, nos verò Lomie dicimus: tametsi Limonia magis cum facie tum facultate Citria referant. Li-

VI. LIMONIA MALA.

VII. AVRANTIA MALA.




monum planta perpetua fronde vires, quemadmodum & Citrus, folijs etiam similibus: sed paulo angustioribus. Flores serè albos, & odoratos: a quibus poma oriuntur citrij faciem referentia. Sunt tamen Citrij minor, oblonga, cute non adeò crassa, & magis succo pregnantia, qui gustu acidior percipitur, semine serè simili, & colore pallida. Eadem omnibus serè gentibus nota sunt magis, quam describi debeant. Sunt maiora & minora: quae etiam succi bonitate differunt, & corticis crassitudine. Nam quae grandiora sunt, & succo, & cortice, carneq; longè sunt praestantiora. Seruntur tanquam peregrinae in hortis & viridarijs: & quanquã mangonio cultorum in frigidis regionibus viuunt, quòd hyeme in concameratis cellarijs recondantur, earum tamen proventus, non est nisi in locis calidis, & praesertim maritimis, & circa lacus amenissimos. Ideoq; in Apulia, Calabria, & alijs regni Neapolitani regionibus copiosa Limonia proueniunt. Isdem qualitatibus praedita sunt, quibus & Citria mala. AVRANTIA verò poma rotundiora, & per maturitatem aureo prorsus colore nitentia, odoratq;, cortice limonibus crassiore, amarioreq;. Internus succus, quo maxime sunt referta, in quo semen citri simile, non in omnibus eodem percipitur sapore. Nam in hoc genere acidus, in illo dulcis, in altero vinosus habetur. Horum arbores citri similes, quemadmodum & Citrea mali coma perpetua virent, folijs Lauro latifolia proximis, crassis, lauibus, ac suauiter odoratis, & in acurum definentibus. Rami pariter illis sunt flexiles lentius, topiarijs operibus haud inidonei, aculeis firmis acutisq; referti: cortice ex viridi subalbicante. Flores albi, odore perquam praestanti. Seruntur in viridarijs & hortis, maritimis praesertim tractibus. Abundant in Campania, Apulia, Calabria, & alia regni Neapolitani regiones, quin etiam Liguria & Benaci lacus viridaria: decerpuntur flores, vbi copiosi proueniunt, ab Vnguentarijs ad varia odoramenta paranda. Peculiariter autem distillatur ex his aqua, quae non solum odoris praestantia ceteras praecellit, sed ad medicamenta etiam optime facit, & praesertim ad pestilentes febres, quae cum exanthematibus in cute eucniunt. Datur enim potanda sex vnciarum pondere magno sanè auxilio, vbi per sudorem à centro ad circumferentias infectos humores trahere sit opus. Siquidem haec aqua valenter sudorem pronocat, & cordi plurimum succurrit, id corroborat, & spiritus viuificat. Cortex Saccharo conuictus

Aurantia.

Aqua florum
aurantiorum
mita facit
ita.

ventriculo

VIII. POMA ADAMI.



ventriculum roborat, & flatu pellit. Quoniam succus sitim
 extinguit & febrientibus inuat, præter dulcium Aurantium:
 nam in febrientibus non adeo salubris est, nec sitim sedat. Ar-
 bor hac semper pomifera est, & eadem fere, quæ citria præstat.
 Aurantia calidior sunt cortice, quandoquidem in reliquis a-
 crior, atque amarior gustu deprehenditur. Refrigerat & exsic-
 cant, quæ scilicet acida & vinosa sunt. Dulcia omnibus parti-
 bus excalfaciunt, cæterorum vero succus refrigerat, & putredi-
 ni aduersatur. Quocirca febricitantibus bene conueniunt, dul-
 cia vero contra. Fit è Limoniorum succo, sicut & citrierum,
 serapium ad restringendam bilis feruorem non inutile: sed
 quoque ad sitim extinguendam: item & ad pestilentes febres,
 & eas, quæ contagione non vacant. Aqua, quæ è Limoniorum
 succo calentis aqua balneis, & vitæ organis extrahitur, præ-
 terquam quod mulieribus expetitur pro fuco ad faciem expo-
 liendam, vitiligines vbicunque sint, & totius corporis cutisq;
 maculas emendat, varos delet, & acaros interimit. Serapijs ad-
 mixta febribus acutis, & contagiosis mire succurrit. Epota ven-
 tris tineas enecat: id quod etiam præstat succus recentè expres-
 sus, vncia pondere potus: idem ex immaturo pomò expressus
 sesquiuincia pondere, ex vino vitico potus mixtice calculos re-
 num pellit. Cæterum non parum laboris impendisse videtur
 Brasauolus in præfatione sui de simplicium examine libri, vt
 doceret, vnde emanauerit Aurantium vocabulum. Sed licet i-
 bi plura de eius origine referat, ea tamen, meo quidem iudicio,
 non multum nomini quadrant: quandoquidem ego potius ex-
 istimaui, vulgo Arantia, quasi Aurantia, altera expuncta
 litera, dicta fuisse. Nam cum hac pomâ aut colore reluceant,
 ab auro merito nomen accepisse videntur: vnde, quantum e-
 quidem reor, Aurantia, hoc est, aurea mala dicta fuere. Cæte-
 rum non longè natara, & viribus à Limonibus distant, quæ A-
 DAMI pomâ vulgus vocat. Siquidem planta, quæ hac profert,

Aqua stillari-
 tia è limonio-
 rum succo & e-
 ius vires.

Brasauolus
 de Arantiorum
 nomine.

Adami pomâ
 rum historia.

Pomorum Ada-
 mi vires.
 Nomina.

30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000
 1010
 1020
 1030
 1040
 1050
 1060
 1070
 1080
 1090
 1100
 1110
 1120
 1130
 1140
 1150
 1160
 1170
 1180
 1190
 1200
 1210
 1220
 1230
 1240
 1250
 1260
 1270
 1280
 1290
 1300
 1310
 1320
 1330
 1340
 1350
 1360
 1370
 1380
 1390
 1400
 1410
 1420
 1430
 1440
 1450
 1460
 1470
 1480
 1490
 1500
 1510
 1520
 1530
 1540
 1550
 1560
 1570
 1580
 1590
 1600
 1610
 1620
 1630
 1640
 1650
 1660
 1670
 1680
 1690
 1700
 1710
 1720
 1730
 1740
 1750
 1760
 1770
 1780
 1790
 1800
 1810
 1820
 1830
 1840
 1850
 1860
 1870
 1880
 1890
 1900
 1910
 1920
 1930
 1940
 1950
 1960
 1970
 1980
 1990
 2000
 2010
 2020
 2030
 2040
 2050
 2060
 2070
 2080
 2090
 2100
 2110
 2120
 2130
 2140
 2150
 2160
 2170
 2180
 2190
 2200
 2210
 2220
 2230
 2240
 2250
 2260
 2270
 2280
 2290
 2300
 2310
 2320
 2330
 2340
 2350
 2360
 2370
 2380
 2390
 2400
 2410
 2420
 2430
 2440
 2450
 2460
 2470
 2480
 2490
 2500
 2510
 2520
 2530
 2540
 2550
 2560
 2570
 2580
 2590
 2600
 2610
 2620
 2630
 2640
 2650
 2660
 2670
 2680
 2690
 2700
 2710
 2720
 2730
 2740
 2750
 2760
 2770
 2780
 2790
 2800
 2810
 2820
 2830
 2840
 2850
 2860
 2870
 2880
 2890
 2900
 2910
 2920
 2930
 2940
 2950
 2960
 2970
 2980
 2990
 3000
 3010
 3020
 3030
 3040
 3050
 3060
 3070
 3080
 3090
 3100
 3110
 3120
 3130
 3140
 3150
 3160
 3170
 3180
 3190
 3200
 3210
 3220
 3230
 3240
 3250
 3260
 3270
 3280
 3290
 3300
 3310
 3320
 3330
 3340
 3350
 3360
 3370
 3380
 3390
 3400
 3410
 3420
 3430
 3440
 3450
 3460
 3470
 3480
 3490
 3500
 3510
 3520
 3530
 3540
 3550
 3560
 3570
 3580
 3590
 3600
 3610
 3620
 3630
 3640
 3650
 3660
 3670
 3680
 3690
 3700
 3710
 3720
 3730
 3740
 3750
 3760
 3770
 3780
 3790
 3800
 3810
 3820
 3830
 3840
 3850
 3860
 3870
 3880
 3890
 3900
 3910
 3920
 3930
 3940
 3950
 3960
 3970
 3980
 3990
 4000
 4010
 4020
 4030
 4040
 4050
 4060
 4070
 4080
 4090
 4100
 4110
 4120
 4130
 4140
 4150
 4160
 4170
 4180
 4190
 4200
 4210
 4220
 4230
 4240
 4250
 4260
 4270
 4280
 4290
 4300
 4310
 4320
 4330
 4340
 4350
 4360
 4370
 4380
 4390
 4400
 4410
 4420
 4430
 4440
 4450
 4460
 4470
 4480
 4490
 4500
 4510
 4520
 4530
 4540
 4550
 4560
 4570
 4580
 4590
 4600
 4610
 4620
 4630
 4640
 4650
 4660
 4670
 4680
 4690
 4700
 4710
 4720
 4730
 4740
 4750
 4760
 4770
 4780
 4790
 4800
 4810
 4820
 4830
 4840
 4850
 4860
 4870
 4880
 4890
 4900
 4910
 4920
 4930
 4940
 4950
 4960
 4970
 4980
 4990
 5000
 5010
 5020
 5030
 5040
 5050
 5060
 5070
 5080
 5090
 5100
 5110
 5120
 5130
 5140
 5150
 5160
 5170
 5180
 5190
 5200
 5210
 5220
 5230
 5240
 5250
 5260
 5270
 5280
 5290
 5300
 5310
 5320
 5330
 5340
 5350
 5360
 5370
 5380
 5390
 5400
 5410
 5420
 5430
 5440
 5450
 5460
 5470
 5480
 5490
 5500
 5510
 5520
 5530
 5540
 5550
 5560
 5570
 5580
 5590
 5600
 5610
 5620
 5630
 5640
 5650
 5660
 5670
 5680
 5690
 5700
 5710
 5720
 5730
 5740
 5750
 5760
 5770
 5780
 5790
 5800
 5810
 5820
 5830
 5840
 5850
 5860
 5870
 5880
 5890
 5900
 5910
 5920
 5930
 5940
 5950
 5960
 5970
 5980
 5990
 6000
 6010
 6020
 6030
 6040
 6050
 6060
 6070
 6080
 6090
 6100
 6110
 6120
 6130
 6140
 6150
 6160
 6170
 6180
 6190
 6200
 6210
 6220
 6230
 6240
 6250
 6260
 6270
 6280
 6290
 6300
 6310
 6320
 6330
 6340
 6350
 6360
 6370
 6380
 6390
 6400
 6410
 6420
 6430
 6440
 6450
 6460
 6470
 6480
 6490
 6500
 6510
 6520
 6530
 6540
 6550
 6560
 6570
 6580
 6590
 6600
 6610
 6620
 6630
 6640
 6650
 6660
 6670
 6680
 6690
 6700
 6710
 6720
 6730
 6740
 6750
 6760
 6770
 6780
 6790
 6800
 6810
 6820
 6830
 6840
 6850
 6860
 6870
 6880
 6890
 6900
 6910
 6920
 6930
 6940
 6950
 6960
 6970
 6980
 6990
 7000
 7010
 7020
 7030
 7040
 7050
 7060
 7070
 7080
 7090
 7100
 7110
 7120
 7130
 7140
 7150
 7160
 7170
 7180
 7190
 7200
 7210
 7220
 7230
 7240
 7250
 7260
 7270
 7280
 7290
 7300
 7310
 7320
 7330
 7340
 7350
 7360
 7370
 7380
 7390
 7400
 7410
 7420
 7430
 7440
 7450
 7460
 7470
 7480
 7490
 7500
 7510
 7520
 7530
 7540
 7550
 7560
 7570
 7580
 7590
 7600
 7610
 7620
 7630
 7640
 7650
 7660
 7670
 7680
 7690
 7700
 7710
 7720
 7730
 7740
 7750
 7760
 7770
 7780
 7790
 7800
 7810
 7820
 7830
 7840
 7850
 7860
 7870
 7880
 7890
 7900
 7910
 7920
 7930
 7940
 7950
 7960
 7970
 7980
 7990
 8000
 8010
 8020
 8030
 8040
 8050
 8060
 8070
 8080
 8090
 8100
 8110
 8120
 8130
 8140
 8150
 8160
 8170
 8180
 8190
 8200
 8210
 8220
 8230
 8240
 8250
 8260
 8270
 8280
 8290
 8300
 8310
 8320
 8330
 8340
 8350
 8360
 8370
 8380
 8390
 8400
 8410
 8420
 8430
 8440
 8450
 8460
 8470
 8480
 8490
 8500
 8510
 8520
 8530
 8540
 8550
 8560
 8570
 8580
 8590
 8600
 8610
 8620
 8630
 8640
 8650
 8660
 8670
 8680
 8690
 8700
 8710
 8720
 8730
 8740
 8750
 8760
 8770
 8780
 8790
 8800
 8810
 8820
 8830
 8840
 8850
 8860
 8870
 8880
 8890
 8900
 8910
 8920
 8930
 8940
 8950
 8960
 8970
 8980
 8990
 9000
 9010
 9020
 9030
 9040
 9050
 9060
 9070
 9080
 9090
 9100
 9110
 9120
 9130
 9140
 9150
 9160
 9170
 9180
 9190
 9200
 9210
 9220
 9230
 9240
 9250
 9260
 9270
 9280
 9290
 9300
 9310
 9320
 9330
 9340
 9350
 9360
 9370
 9380
 9390
 9400
 9410
 9420
 9430
 9440
 9450
 9460
 9470
 9480
 9490
 9500
 9510
 9520
 9530
 9540
 9550
 9560
 9570
 9580
 9590
 9600
 9610
 9620
 9630
 9640
 9650
 9660
 9670
 9680
 9690
 9700
 9710
 9720
 9730
 9740
 9750
 9760
 9770
 9780
 9790
 9800
 9810
 9820
 9830
 9840
 9850
 9860
 9870
 9880
 9890
 9900
 9910
 9920
 9930
 9940
 9950
 9960
 9970
 9980
 9990
 10000

I. Mala propriè dicuntur, quæ breui pediculo annectuntur: ab alijs pomâ, quamuis hoc commune sit
 nomen ferè omnibus fructibus perspicuæ magnitudinis. Differentiæ plurius ratione saporis acidi, a-
 60 quosi, austeri, dulcis: coloris, magnitudinis, figuræ: duæ figuræ adpositæ, magnorum rotundorum & ob-
 longorum: plures differentiæ veteribus indictas, quæ cognoscere cupit, Cordum in sua historia, qui vltra
 triginta species habet, & Tabernæmontanum consulat. II. Ast Cydonia, Cotonea etiam dicuntur, quo-
 nomine primus Cato donauit à Sidonte Corinthi vico: quibusdam, quod mala eius cotone seu lana qua-
 dam tegi videantur: fortè ex Plinio χρυσόμυλα ab externo aureo colore. Apud Plutarchum s. Symposia-
 con, Tryphon medicus, apud Homerum ἀγλαόκαρπον dictum putat. Genera explicat Athæneus; Di-
 pnosoph. Columella lib. 5. c. 10. tria refert, Struthia, Chrysolimiana, & Mustea: icones binæ, altera Coto-
 neæ malus, altera Cotoneæ pyri, quæ Cydonia miluiana etiam dicuntur quibusdam. III. PERSICA quæ
 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 377

Armeniaca.

Citria.

Limonia.

Poma Adami

PYRA.



Pyrorū con- sideratio, & genera.

niacorum, eiusq; ferè saporis. At ex Armeniacorum genere non esse, nucleus ostendit, qui ut persicorum striatus est. Serotina maiora, alia minora: maiora vel flava quæ à Cotoneis cognominata, vel alba, vel viridia, vel buxæ: minora, vel rubra, quæ sanguinea dicuntur, vel flava. Ratione saporis, dulcia, acida, vinosa, amariuscula, austera. Ratione ossium, quorundam ossa à carne separari non possunt, quæ Duracina dicuntur, non quòd seruari diutius possint, sed ob carnis substantiam duriores, quæ modo candida, modò lutea, nunc ex albo subrubea: in quibusdam nuclei disrupti observantur. Sic et figura differunt, quædam orbiculata, quædam in rotunditate oblonga, quædam cotoneis similia & colore & odore, quæ primas tenent: quædam à nucis similitudine Nucipersica: alia quæ mangonio facta persica amygdala vocantur, obs nucleum amygdalorum modo dulcem. Sic denique ex his quædam lanuginosa, alia glabra, lævia, exteriù & interiù virentia. IV. ARMENIACA malus ex genere persicorum Galeno, quare præcocia, inter persica recensuit Plinius: hæc differunt sapore & magnitudine, sunt enim parua, prunis vulgaribus non maiora, alia ut mediocria persica, alia maiora insitione; alia exigua: sunt & candicantia nucleo dulci. Dicuntur præcocia & persica minora, Brunf. Persici quartum genus, Lon. Malum armeniacum vel præcoquum, Ges. hort. malus Armeniaca, Cord. in Diosc. Lob. Dod. gal. & fol. Lac. Lugd. Cast. Armeniaca, Tab. Cæsalpino. V. CITRIA, Limonia, Arantia, tria hæc malorum genera in officinis vîsita, ad vnum genus pertinent. Citria Theophrasto *μῆλον μινδίζον ἢ πορρικόν* à regione: Malum Hespericum & Chrysomela Athenæo lib. 3. *Κίτριον* Galeno Medica malus: quibusdam Assyria: adnumerat Barbarus in suo Corollario, Nuttialia prægrædia & melonum orbiculata facie. Varietas enim est pomorū tam in magnitudine quam sapore: quædam in molem decem librarum pondo excrescunt: quæ Gallis pomcires, quasi poma citria, vocatur: alia his minora: alia Limonū magnitudine aut paulò maiora: sapore vehementiore & remissiore: rem dilutiore saturatioreque colore. De his vide Theophrastum 4. hist. 4. l. de caus. plant. 22. Plinium li. 12. cap. 3. Solinum cap. 49. Macrobius 3. Satur. 19. Palladium in Martio. Recentioribus dicitur Malus citria, medica, citrium. VI. Limonia mala ex citri genere sunt, sed minora, cute minus crassa, succo acidiore. Plures differentiæ: alia oblongiora asperiora, cortice crassiore, succo dulciore, quæ maximè probantur: alia lætiora, cortice tenuiore, succo acidiore: sunt in Hispania, vix nucis amplitudine, odore cæteris præstantiore, arbore excelssiore, sic & pusilli dulcissimi in Zeilan habentur, Scaligero attestante: & in Syria in sylvestribus frequentia exigua & acidissima. Recentioribus Limonia, Limones. VII. Aurantia mala sorte ab Arantio Achaia oppido, vel Arania à gente eius nominis in Persia: alijs à corticis colore luteo, quare Aurea Virgilio: an Cestianum malum Galeni 2. de compos. secundum loca. i. fortè Martianum malum apud Suetonium in Domitiano. Sunt qui Citrangulū Auicennæ & Mesuei statuunt. Censentur insitione ad nos deuenisse: Si enim Arantius Citro inferatur, Arantius vix cubiti altitudinem excedet: at si contra Citrus in Arantio, ad magnam proceritatem peruenit. Variant sapore succi, acido, dulci, medio seu vinoso. Dulcia superficie magis sunt glabra, lævia, mollia: acetosa duriora ac asperiora. Cutis colore magis viridi, magis flavescente, quæ citreolus, magis croceo, quæ Citrangula dicuntur: reperiuntur etiam sine semine, & alia in pomo duò genera acinorū habent: nostris amarus est cortex: meminit Scaliger in Zeilan haberi cortice dulci & suavi. Variat & cortice modo rugosomagis minusue, aliquando extuberat forma rotunda, aliquando oblonga papillarū instar. Recentioribus Aurantia, Anarantia & Aurea mala dicuntur. VIII. Poma Adami: hæc folijs cum limonibus (sed maioribus) floribus cum Citro, fructu, sed triplo qua-

druploue maiore, cum Arantijs conuenit. Poma Adami, Cord. in Diosc. Cast. Lugd. Citrius altera, Cord. hist. Malus Assyria, Dod. Tab. Pomum Assyrium, Lob. Ponziras, Cæsalpino.

A^{ria}.

PYRA.

CAP.

CXXXII.

Pyrorum multa genera. Quæ tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis, & crudis ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata lædunt. Achra pyrastrî genus est, quod tardissimè maturescit. Vim pyro adstringentiorem habet, & ad eadem conuenit stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiant fungos, si sylvestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Quoniam Pyra vulgarissima sunt non modo in Italia, sed vbiq; in tota Europa: quæ proueniunt vbiq; in collibus, agris, vineis, hortis, & viridarijs, sylvestria vero locis incultis & in syluis. Varia est quoq; Pyrorum facies: quod cum omnibus notum sit, quemadmodum & planta: ideo superuacaneum duxi eorum arbores per historiam explicare. Multa de varia apud nos Pyrorū numerantur genera, quemadmodum & apud antiquos, odore, sapore, colore, forma ac prouentu differunt. Quin etiam & sylvestria quoque copiosa videntur. Antiqui, ut Plinius refert libro 8. capite decimo quinto

celebris-

adhibere superba, salerna, decumiana, dolobelliana, pompeiana, liceriana, seueriana, tyranniana, feneviana, lateriana, antiana, tiberiana, signina, purpurea, sementina, laurea, amphorina, coriolana, cucurbitana, & alia, quorum enumeratio longa foret. Quas sane varias appellationes mutuari sunt, vel ab hominibus, qui primum ea in ciborum usum reuocauerunt: vel à locis, vnde venerant: aut à notis, quas aliquibus fructibus acceptas referebant: aut à colore proprio: aut à tempore, in quo ab arboribus decerpebantur. In hoc itaq; nostri quoq; Hetrusci antiquorum consuetudinem secuti, varijs nominibus à diuersis inditibus causis sua Pyra vulgò appellant, moschatele, giugnole, ciampoline, rogie, ghiacciuole, spinoze, quadrane, carouelle, papali, san Nicolo, darelle, Zuccaie, campane, vernareccie, gentili, porcine, sementine, & plura alia habent aliq; nomenclaturis appellata. Caterum si quis vellet in nostratibus, veterum Pyra collatione assequi, operapretium est, ut unumquodq; eorum genus peculiarem perspicuamq; habuisset descriptionem: quandoquidem fieri non potest, ut hac sola nomenclatura innotescant. Porro in vniuersum de eorum viribus differentes, dicamus, sicuti etiam de malis diximus quòd pyrorum facultates ex saporibus gustu dignoscuntur: cum dulcia natura distent ab acerbis, acidis, austeris, & ab his, qua vnum, vel plures pra se ferunt saporis: & contra, hac deinceps ab illis sint diuersa. Pyra (vt scriptum reliquit Galenus lib. 5. simplicium medicamentorum) esu stomacho grata sunt, quin & vim habent exiccandi. Atqui syluestribus magis adstringendis facultas inest: ob id etiam magis praestant contra fluxiones. Et lib. 2. de alimentorum facultatibus ita scribit: Quae de malis diximus, si omnia ad pyra, & punica transferantur, nihil nouo alio super his sermone opus erit. Nam in his quoque alia austeram tantum, vel acerbam apparent, veluti quadam acida, quadam dulcia, quadam denique ex horum mixtura composita sunt, quae nullam penitus huiusmodi qualitatem exuperantem habent: quo fit, vt cum aqua sint, ac bebetia nulla roborandi vi polleant. Talis igitur omnino pyrorum vsus, qualis malorum. At pyria, praesertimque grandibus, quae quod nos menata uocantur, aliqua a seculis facultas donata est. Proinde ea secta in tennes orbiculos, siccat aque reponunt quibus coctis per hyemem, & ver, cum fames est, ciborum parum nutrientium vice vescuntur. Pyri fructus, qui à Graecis, Latini Pyra dicuntur: Arabibus, Humechte, Cirmetre, seu Kemetry: Italis, Pere: Germanis, Byren: Hispanis, Peras: Galis, Poites: Bohemis Hrusk.

Pyrorum facultas. Pyrorum vires ex Gal.

Nomina.

Pyra dicuntur, quae longo pediculo pendent, & quidem à fructus figura pyramidem referent: differentiae plurimae ratione magnitudinis, figurae, saporis, odoris, coloris, temporis, ita vt Cordus in sua historia quinquaginta genera recensuerit. Sic genus quoddam est quod comestum ventrem subducit, qui elegantiori rubore carnis placent: est & alterum genus e quorum medio corpore folium exoritur, quod Pyrophilla dicuntur: est & quoddam pomi folio.

MESPILVS. CAP. CXXXIII

Mespilus, quae à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthae, siue oxyacanthae. Fert pomum linaue, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: quae ex causa id nonnulli tricoccon appellauerunt. Tarde maturescit, esu adstringit: stomacho gratum est, aluumque suppressit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida vocant: arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum, elui aptum, a vmbilico latiore: quod adstringit, seroque maturescit.

a mespili. i. fundum meum habet.

I. MESPILVS PRIMA.



Mespilorum hic à Dioscoride duo recensentur genera: quorum illa, quae folijs est pyracantha, siue oxyacantha nostratibus haud quaquam adstipulari videtur. Quippe (vt sensu patet) nostrates Mespili folijs oblongis, cerasorum fere similibus virent, non autem apud modo per ambitum incisus, veluti oxyacantha. Fructum ferunt non quidem gustatu suauem, sed potius iniucundum, quod acerbus sit, & austerus. Quin & in quibus includit ossicula, non sanè terna: vt primo Mespilorum generi assignat Dioscorides. Caterum si fructum profert Italia, qui priori Mespilo legitime adscribi possit, eius nimirum arboris erit, quae Neapoli, vbi copiosa feritur in hortis, viridarijs, ac vineis, Azarolo vulgò nominatur. Huius plures plantas vidi ego primum Neapoli in amplissimo viridario Pompeij Cardinalis à Columna, via, qua itur ad poeta Maronis sepulchrum, vel vt vulgò dicunt à Pedigrotta. Arbor est mediocri proceritate, cortice, ac materia pruno [pyro] haud ab similibus: spinis horrida, non tamen admodum acutis: folijs laciniatis, apud amulis aut oxyacantha, floribus albicantibus, racematim coherentibus. Fructus illi sunt sorborum crassitudine, oblongi, rubentes, vulgaribus mespilis aequales, sed arctiore vmbilico, tribus tantum intus ossiculis. Maturescunt autumno, Septembri tantum mense. Ex quo perspicui potest, eos Dioscoridis codices hoc loco scaterere mendis, in quibus deprauate legitur, hanc arborem folijs esse pyracantha, non autem, vt legitime legi debet, oxyacantha. Nam (vt superius suo loco explicauimus) oxyacantha folijs germinat dissectis: pyracantha verò buxi modo oblongis. Cuius rei illud manifesto est indicio, quod de hoc Mespilorum genere posteritatis memoria prodidit Theophrastus libro 3. capite 12. cum inquit: Magnitudine arbor ista excellit, gyroque comatur. Folium magna ex parte infissum, quod vel apud parte postrema imitatur,

Mespilorum consideratio.

Azaroli de scriptio.

Dioscoridis locus enucleatus. Mespilus Theophrasti.

Crataegus azarolus. Scamb.

tatur, ampliore figura, quodque promissum, nervosum, apio tenuis, oblongius, totumque circumtusum est, & pediculis tenuis, ac longo dependet: antequam decidat, vehementer rubet. Radice numerosa, altaque arbor cobaret: ob id diuturna, & inextirpabilis est: haecenus Theophrastus. Quae sane verba certo sunt argumento, eam Dioscoridis lectionem planè depravatam esse, quae huic Mespilorum generi pyracanthae frondes reddit. Quinetiam folium explicant oxyacanthae à Dioscoride cum in historia silentio dissimulatum, quod scilicet apij modo per ambitum sit dissectum. Sed illud etiam non ignorandum, tantam oxyacantham cum hac Mespilo intercessisse cognationem, ut si Mespilus hac oxyacantha inseratur, omnium speciosissima proneniat, & longè magis fructifera euadat. Sed ut redeamus eò, unde codicis menda, quae librariorum incuria est, non diduxerant, dicimus quod Azaroli vocata fructus nullis prorsus notis reclamant Mespilus, quae primo loco à Dioscoride descripta sunt. Siquidem ij exigui sunt, terna includant officula alijs Mespilis duriora: quanquam magnitudine, & forma dissimili, seram sentiant maturitatem, ori grati habentur, stomacho non iniucundi, & reliquis denique notis, ac qualitatibus illorum speciem adeò representant, ut non aliud hac in re asserendum putauerim, quam quòd idem sint Azarola, & Dioscoridis Mespila à quibusdam Aronia dicta. Haec cum maturitatem senserint, gustus haud parum placent: quo fit, ut ab incolis pro delictis, non solum cruda expectantur in cibis, sed ijs etiam saccharo, melleque asseruata edantur. Eadem gratissimus sunt cibus vetero gerentibus: quippe non modo sapore placent, sed earum malacia subueniunt. Quae porò Mespila aliquid Serania, & Epimelides appellantur, vulgaribus nostratibus collata nihil inter se dissentire comperiuntur. Folij est mali, sed minoribus: flores fert albicantes, cotonea mali amulosa uelut rotundum, latiore umbelico quinque, acutis processibus coronato: Habetur in vineis, hortis & sepibus. Quapropter nil mirum scriptis mandasse Dioscoridem, alterum hoc Mespili genus copiosum in Italia nasci. Veruntamen Galenum Epimelidid appellatone aliam arborem à nostratibus Mespilis diversam sumpsisse, liquidò constat. Quandoquidem libro 6. simplicium medicamentorum scribit, eius fructum acerbum esse, & ventriculo noxiunt: Epimelida autem à rusticis Italia vuedonem nominari. Hoc insuper illud confirmat, quòd Galenus de utroque Mespilorum genere, seorsum distinctis capitibus tradiderit. In Mespilorum historia Serapio aperte hallucinari deprehenditur, quippe qui serbi titulo omnia referat, quae de utroque Mespilorum genere scripsit Dioscorides. Verum etsi hac in re is quidem aberrat, declarat tamen primum Mespili genus nobis Italiae Mauritianos secutus Azarolum esse: namque in Arabico idiomate Mespila Zaror appellat. Vulgaria Mespila deuorata causticos, dysentericos, & diarrhica affectos iuuant. Sistunt februm, gutturis dentium, & gingiuarum fluxiones, ubi eorum decocto os colluatur. In hoc si infideant feminae, mensium abundantiam sistit. Fit à sicca Mespilis rosarum succo exceptis, additis aliquot Caryophyllis, & coralliorum rubeorum nonnihil, quinetiam myrris & nucicataplasiis, ori ventriculi adiuuendum, ad compefcenda: ro mitiones, & praesertim, ubi cibus reijciatur. Sicca folia in puluerem aspersa, recentia vulnera glutinant, & sanguinis profluuium sistunt: ideo dantur quoque vtiliter ad cruentas reiectiones. In summa ubi adstrictione, corroboratoneque opus sit, cum folia, tum fructus plurimum praestant. Mespilorum officula in puluerem contrita, calidus donibus uolentibus palant: ubi cochlearis mensura cum vino in quo vulgaris petroselinus adhaerere solet, sumuntur, cibantur. Mespilorum vires recensuit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Mespili fructum, alij tricocum nominant, quòd tria intus in vniuersum gerat grana, quorum vnumquodque arboris est semen, ceu ea, quae in malu inueniuntur, ipsius mali: & acini, ipsius vitis: & ficus, minuta illa grana, quas cenchrasidas Graeci vocant. Arboris huius fructus admodum acerbus est, vixque edi potest, ventrem strenuè coercens: quin & in geminibus, & folijs acerba hac qualitas non pauca reperitur. Et libro 2. de alimentorum facultatibus sic inquit: Horum eadem quoque praedictis est ratio: ambo enim adstringunt, sed multò fortius Mespila, quam sorba. Quamobrem alio fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur: sorba tamen ipsis sunt suauiora: prorsus namque nihil acerbi, ut Mespila obtinent, sed succus eorum citra acerbisatem austerus est. Illud porò neminem puto latere, has omnia parè, non assatim, ut ficus, vnaque esse comedenda: nequaquam enim eis, ut cibus, sed ut medicamentis potius indigemus. Haec nouisse longè tibi fuerit vtilius, quam si primam huius dictionis ouer syllabam ab antiquis Atheniensibus per o, solum prolatam, scriptamque fuisse cognoscas Mespila, nullis intus officulis, misit ad me Verona Franciscus Calzolarius. Arbor μισπιλον ή μασπιλον Graecis, Latini item Mespilus, & Mespila nominatur: Arabibus, Zaror, seu Zarur, & Alzarur. Mespilus prima: Italiae & Hispanis Azarola, Bohemis Nybpule.

II. MESPILVS ALTERA.



Epimelis Gal.

Serap. lapsus.

Mespilorum usus.

Mespilorum vires Gal.

Mespila sinerolo officulis. Nomina.

† Ne videamur hic temerè communem lectionem immutasse, quae est pyracanthae, lectorem admonere non alienum duximus, variam esse huius loci scripturam in Graecis tum impressis, tum vetustis exemplaribus. Verum ea notu magis probanda visa sunt, quae habent pyracantham vel oxyacantham (idem enim esse putamus), iunxi rationibus, quae in commentario adduximus.

Mespilus duplex habetur: I. Mespilus folio apij C.B. Haec Aronia Dioscori. Anthedon dicitur Theophrasto & Plinio. Mespilus Aronia, Dod. gal. & fol. Ges. hor. Lob. Tab. Mespilus prima Lac. Cast. Pahrus Africana Ruellij, quae & vinosa cognominari potest, Ges. hor. Mespilus proprie, Cord. in Diosc. Azarolus, Celak.

Cestip. hęc spinosa quidem est, attamen in Italia tanquam magis domesticam spinis carentem obseruamus, a Theophrasto capite de Sorbo admoniti. II. Mespilus vulgaris: apud Theophrastum & Plinium Serania seu Satania cognominatur. Mespilus, Brunf. Trag. (cui Cratægus Theophrasti) Gesn. hort. Lon. Lob. Dodo. Tab. Mespilus altera, Dod. gal. Cord. in Dioscor. cui est Epimelis & hamamelis: Mespilus setacea, Lugd. Hęc duplex est, vulgatioꝝ quę aliquot spinis armatur, fructu minore: altera frequenti insitione mitelcit, nec spinis horret, fructumque edit multo maiorem, cuius iconem proposuit Lobelus editione Belgica. Scaliger meminuit Mespili, cuius fructus albus sit, maliq̃ue magnitudine. Huc referri potest & Mespilus altera humilior, quę Chamæmepilus Gesnero & Lobelo dicitur.

LOTVS ARBOR.

CAP. CXXXIII.

Lotus arbor est vasta magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem: dulcem, tibus gratam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramientorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis, ac venenis fluxione vuluę laborantibus, auxilio est: rufat capillos: citam aluum cohibet.

Lotus (inquit Theophrastus lib. 8. cap. quarto de plantarum historia) proprium genus prestat, magnitudine quanta Myrtus, aut paulo minore, incisuras folium habet, ac Ilicis esse videatur: materies nigra. Genera eius plura fructibus inter se discreta: fructus magnitudine faba: maturefcit vuarum modo, varię colores immutans. Nasctur vt myrta, aduersa intus se densus super germina. gustatu inter Lotophagos dictos pradulcis, suavis, innocuus, atque etiam bona frugis. Ventri bene est bonus, suauior vero, qui sine ligno interiori est: nã vel genus huiusmodi est, & vinu eo exprimitur. Multa hec arbor, fructu copioso est. Exercitum itaque Ophelli cum in Carthaginem proficisceretur, vel eo fructu diebus pluribus pastum commocatum exspectu, accepimus. Est igitur in Insula Lotophagia, Pharide vocata, larga copia: hac autem insula abest, & non multum distat. Caterum non minor in continenti, sed longe largior est: plurima enim hac omnino in Lybia: hac Theophrastus Cui subscribit lib. 13. ca. 17. his verbis. Eadem Africa, qua pergit ad nos, insignem arborem Loton gignit, quam vocant Ceditim, & ipsam Italia familiarem, sed terra mutatam. Præcipua est circa Syrtes, atque Nasamenas. Magnitudo, qua Myro. incisura folio crebriores, alioqui Ilicis viderentur. Differentia plures, eaq̃, maxime fructibus sunt. Magnitudo huius faba, color croci, sed ante maturitatem alius, atque alius, sicut in vuis. Nasctur densus in ramis Myrti modo, non vt in Italia Cerasi, tam dulci tibi cibo, vt nomen etiam genti terraque dederit. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere offeus videtur. Vinum quoque exprimitur illi simile mulso, quod ultra denos dies negat durare Nepos. Baccasque confusas cum Alica ad cibos dolijs condunt, quin & exercitus pastos eo accepimus, vltro, citroque commeantes per Africam, Ligno color niger, ad tibiaram cantus expetitur. E radice cultellis capulos, breuesque alios vsus excogitant. Dioscorides non aliis notis reddidit Lotum, quam quod arbor esset vasta proteritatis. Cui subscribens idem Plinius libro 16. capit. 30. sic inquit. Lotus præcipue domibus expetitur, ramorum petulantia, latissima expatiantium umbra, & in vicinas domos sape transfiliendum. Item eodem loco ita scribit: Loti fructus syluestris quidem est, sed cerasorum pene natura. Nulli breuior opacitas, nec aufert solem hyeme decidentibus folijs. Nulli cortex incundior, aut oculos ex-

Loti arboris historia ex Theophr.

Vinum è Lot.

Lotus Plin.

I. LOTVS.

II. PSEVDOLOTVS.



Zizyphus vulgaris Sp. hort.

Zizyphus lotus Sp. hort.

capium

cipiens blandum. Nulli rami longiores, validioresque, aut plures, ut dixisse totidem arbores liceat. Cortice pellet tingunt, ad
dice Lanas: & libro 17. capite 1. lotos ingentes esse arbores quoque ostendit his verbis. Ea sex arbores fuerit Loti patula ramorum
opacitate lasciva. Caterum non solum ingentes esse arbores Lotos testatur Plinius, sed etiam in longas perdat are-
rates lib. 17. idem ostendit his verbis: Roma vero Lotos in La-
cina area anno qui fuit sine magistratibus 369. vrbu ade co-
dita: intertum ipsa quanto vetustior: esse quidem vetustio-
rem non est dubium, cum ab eo loco Lacinia nominetur. Hoc
nunc circiter annum 450. habet. Antiquior illa est, ed incer-
ta eius etas, qua capillata dicitur, quoniam vestalium Virgi-
num capillus ad eam defertur. Verum altera Lotus in Vulca-
nisi, quod Romulus constituit ex victoria de Decumis, equa-
na ibi intelligitur, ut autor est Massurius. Radices eius in so-
rum vsque Casari, per stationes municipiorum penetrant.
Quamobrem putauerim ego, si modo hodie Loti nascuntur
in Italia, cum non aberrare, qui veram lotum, presertim
Dioscoridi, & Plinio, eam esse arborem dixerit, qua in Tri-
dantino & Geritiensi agro vulgo Bagolaro vocatur: in Vero-
nensi vero, & in aliis quibusdam Italia locis, Perlato. Siqui-
dem licet harum arborum multa pyri magnitudinem aequet, ut
pleraque tamen conspiciuntur, qua longe admodum pyrum
proceritate vincunt. Haec itaque praeterquam quod caudice co-
stet crassissimo, ramis latissimis in altitudinem Latitudinem-
que se extollentibus: cortice spectantur laevi, colore in ceru-
leum nigrescente. Quo fit, ut is grata coloris aspectu respicien-
tium oculos mirum in modum ad se alliciat, ut tradidit Pli-
nius. Folia videntur illici proximis, per ambitum serratis, aspe-
risque, qua medio autumno staccescunt. Fructus eis (ut Plinius
libro 13. & decimo sexto inquit) cerasorum similitudine, qui
ut illa, longiore pediculo pendet: ut primo viret, mox in candi-
dam flavescit, deinde per maturitatem rubescit: denique, post-
quam maturaverit, nigricat, gustu non ingrato. Quae omnes
huiusce arboris delineationes ac nota, Dioscoridi, & Plinio
loto plane respondere videtur. Non desunt tamen, qui nostra
refragentur sententia, censentes fortasse Lotum haud proveni-
re in Italia, sed his maximè repugnat Plinius, qui Lotum Italia familiarem esse affirmat. Itaque cum nulla alia arbor cre-
scat in Italia, qua Plinianam referat lotum, quam ea de qua diximus, nulla ratione possumus, debemusque, a nostra deslo-
tere sententia. Quare non equidem diffitebor, Lotum quoque hoc in Italia esse copiosam. Caterum nesciverim ego, quo-
rum testimonio, & auctoritate fretus Ruellius lotum existimaverit plantam exiguam illam, quam Hetrusci vulgo Agri-
folio dicunt: è cuius cortice (ut superius de paliuro differentes diximus) uti ex viburno nostro, vulgo verò lantana, quidam
viscum conficiunt, quo aves capiuntur. Quae sanè opinio tantum abest ab historia loti, quam ex Theophrasto, Plinioque, tetu-
latus, ut etiam ei prorsus aduersetur: quippe quoniam Agrifolium arbor est, perpetua virens comae, foliis admodum per am-
bitum aculeatis, exigua proceritate, & cortice viridi: qua nota penitus loti descriptioni repugnant. At qui videnda magis
videtur Anguillarij diligentia in vertenda ex Theophrasto Loti historia in Italicum sermonem. Siquidem is, dum nescio
quis carpit, quod perperam (ut ille putat) Theophrasti lectionem verterint, ipse praeter ceteris dum se peritissimum eiusdem
interpretem facit, erroribus illis omnibus, quibus alios accusat, apertissime notari potest. Nam ubi Theophrastus habet
κατάπερ τὰ μύρτα, ὡς ἑλλὰς ἄν, ille quidem vertit. Come quelli del Myrto intrecciati, id est Myrri modo triplici ordine
implicitis. Deinde ubi statim Theophrastus habet πυκνός ἐστι τῶν κλασίων, manifestò declarans fructum ipsum desum pro-
venire super ramorum germina: ille ad arborem, non ad fructus respiciens, autoris sententiam destruit, his verbis: è copioso
di germogli: id est germinibus copiosus est. deinde, ubi paulo inferius Theophrasto legitur ἐστὶ τῶν κλασίων ἀγαθόν
ἰδίωτον ὁ πύρλωος ἐστὶ γὰρ τῶν τοῦ γένος ποιοῦσι τὸ εἶναι ἄν, inutile admodum, & sine villo prorsus sensu, vertit
Anguillarius hoc modo: Ma di questo è piu soave il primo, percioche ve n'è vna sorte cosi chiamata, & di questo se ne facena
vino: id est, isto suavior est primus, quoniam genus vnum est ita vocatum, ex quo vinum parabatur. Hac qui viderint, fa-
cile cognoscent Anguillarij in Graeco literis peritiam. Praeterea manifestò is hallucinatus deprehenditur, ubi Plinij autori-
tate parari vinum dicit ex eo loti arboris fructu, qui nucleum habet. Siquidem contra Plinius ex his loti baccis vinum fieri
scribit, qui sine interiori nucleo habetur: quemadmodum scribit etiam Theophrastus. Sed de his satis. Caterum misit ad
me plantam, cuius hic imaginem damus, Constantinopoli allatam, Augerius de Busbecke, vir quidem clarissimus, cui sub-
scriptum erat, Dactyli ex Trapezonda dulces, & gustui delectabiles. Hanc itaque ego inter Lotorum genera annumeranda
censerem: & praesertim, cum legerim apud Athenaeum eadem de loto scripsisse Polybium, qua de dactylis scripsit Herodotus.
Pseudoloti
descrip.
Pseudolotus arbor est procerà, folijs latis oblongisque, firmis ac nervosis, fructu Sebestenorum effigie, sed longè mi-
nore, colore per maturitatem caeruleo, pluribus intus ossiculis, sapore non ingrato. Italia peregrina haec arbor est, & raris in
viridarijs habetur. Eadem ferè illi qualitates sunt, qua legitima loto tribuuntur. Vires quoque eadem illi sunt, si rerum ex-
perimentatoribus credimus. Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse putant. Nec fortasse abre sur-
rit, inter lotos recensere aliam quoque plantam, quam hic Pseudoloton vocauimus. Lotus Africana altera, arbor est proce-
ra, folijs alterius loti latioribus, baccis rotundis, acuminato tamen cacumine, colore caeruleo subnigricante. Haec pediculis
carent, calyculis tamen ima parte obductis perinde ac glandes, & Mixta, arboris ramis & surculis seriatim coherent. Ha-
bentur arbores multis in locis in Italia, è longinquis tamen regionibus allata. Sunt qui velint arborem hanc eiusdem cum
loto pollere viribus: id quod nos quoque putamus. Aberrant, qui hanc loti speciem, Guaiaci esse plantam contendunt. Sed
haec obiter dicta sint, ut alij quoque, qui rem plantariam excolunt, suam his mentem adhibeant. Sunt etiam qui putent
Lotum



Lotu longam admodum esse arborem.

Lotus Italica.

Loti Italicae historia.

Ruellii error Agrifoliam lotum censentis.

Anguillarij lapsus in Theophrasti veritate.

Anguillarij lapsus in Plin.

Dactyli ex Trapezonda.

Pseudoloti descrip.

Loti Africanae descrip.

... Roma vero Lotos in Lacinia area anno qui fuit sine magistratibus 369. vrbu ade codita: intertum ipsa quanto vetustior: esse quidem vetustior non est dubium, cum ab eo loco Lacinia nominetur. Hoc nunc circiter annum 450. habet. Antiquior illa est, ed incerta eius etas, qua capillata dicitur, quoniam vestalium Virginum capillus ad eam defertur. Verum altera Lotus in Vulcanisi, quod Romulus constituit ex victoria de Decumis, equana ibi intelligitur, ut autor est Massurius. Radices eius in sorum vsque Casari, per stationes municipiorum penetrant. Quamobrem putauerim ego, si modo hodie Loti nascuntur in Italia, cum non aberrare, qui veram lotum, presertim Dioscoridi, & Plinio, eam esse arborem dixerit, qua in Tridentino & Geritiensi agro vulgo Bagolaro vocatur: in Veronensi vero, & in aliis quibusdam Italia locis, Perlato. Siquidem licet harum arborum multa pyri magnitudinem aequet, ut pleraque tamen conspiciuntur, qua longe admodum pyrum proceritate vincunt. Haec itaque praeterquam quod caudice costet crassissimo, ramis latissimis in altitudinem Latitudinemque se extollentibus: cortice spectantur laevi, colore in caeruleum nigrescente. Quo fit, ut is grata coloris aspectu respicientium oculos mirum in modum ad se alliciat, ut tradidit Plinius. Folia videntur illici proximis, per ambitum serratis, asperisque, qua medio autumno staccescunt. Fructus eis (ut Plinius libro 13. & decimo sexto inquit) cerasorum similitudine, qui ut illa, longiore pediculo pendet: ut primo viret, mox in candidam flavescit, deinde per maturitatem rubescit: denique, postquam maturaverit, nigricat, gustu non ingrato. Quae omnes huiusce arboris delineationes ac nota, Dioscoridi, & Plinio loto plane respondere videtur. Non desunt tamen, qui nostra refragentur sententia, censentes fortasse Lotum haud provenire in Italia, sed his maximè repugnat Plinius, qui Lotum Italia familiarem esse affirmat. Itaque cum nulla alia arbor crescat in Italia, qua Plinianam referat lotum, quam ea de qua diximus, nulla ratione possumus, debemusque, a nostra deslo-
tere sententia. Quare non equidem diffitebor, Lotum quoque hoc in Italia esse copiosam. Caterum nesciverim ego, quorum testimonio, & auctoritate fretus Ruellius lotum existimaverit plantam exiguam illam, quam Hetrusci vulgo Agrifolio dicunt: è cuius cortice (ut superius de paliuro differentes diximus) uti ex viburno nostro, vulgo verò lantana, quidam viscum conficiunt, quo aves capiuntur. Quae sanè opinio tantum abest ab historia loti, quam ex Theophrasto, Plinioque, tetulatus, ut etiam ei prorsus aduersetur: quippe quoniam Agrifolium arbor est, perpetua virens comae, foliis admodum per ambitum aculeatis, exigua proceritate, & cortice viridi: qua nota penitus loti descriptioni repugnant. At qui videnda magis videtur Anguillarij diligentia in vertenda ex Theophrasto Loti historia in Italicum sermonem. Siquidem is, dum nescio quis carpit, quod perperam (ut ille putat) Theophrasti lectionem verterint, ipse praeter ceteris dum se peritissimum eiusdem interpretem facit, erroribus illis omnibus, quibus alios accusat, apertissime notari potest. Nam ubi Theophrastus habet κατάπερ τὰ μύρτα, ὡς ἑλλὰς ἄν, ille quidem vertit. Come quelli del Myrto intrecciati, id est Myrri modo triplici ordine implicitis. Deinde ubi statim Theophrastus habet πυκνός ἐστι τῶν κλασίων, manifestò declarans fructum ipsum desum provenire super ramorum germina: ille ad arborem, non ad fructus respiciens, autoris sententiam destruit, his verbis: è copioso di germogli: id est germinibus copiosus est. deinde, ubi paulo inferius Theophrasto legitur ἐστὶ τῶν κλασίων ἀγαθόν ἰδίωτον ὁ πύρλωος ἐστὶ γὰρ τῶν τοῦ γένος ποιοῦσι τὸ εἶναι ἄν, inutile admodum, & sine villo prorsus sensu, vertit Anguillarius hoc modo: Ma di questo è piu soave il primo, percioche ve n'è vna sorte cosi chiamata, & di questo se ne facena vino: id est, isto suavior est primus, quoniam genus vnum est ita vocatum, ex quo vinum parabatur. Hac qui viderint, facile cognoscent Anguillarij in Graeco literis peritiam. Praeterea manifestò is hallucinatus deprehenditur, ubi Plinij autoritate parari vinum dicit ex eo loti arboris fructu, qui nucleum habet. Siquidem contra Plinius ex his loti baccis vinum fieri scribit, qui sine interiori nucleo habetur: quemadmodum scribit etiam Theophrastus. Sed de his satis. Caterum misit ad me plantam, cuius hic imaginem damus, Constantinopoli allatam, Augerius de Busbecke, vir quidem clarissimus, cui subscriptum erat, Dactyli ex Trapezonda dulces, & gustui delectabiles. Hanc itaque ego inter Lotorum genera annumeranda censerem: & praesertim, cum legerim apud Athenaeum eadem de loto scripsisse Polybium, qua de dactylis scripsit Herodotus. Pseudoloti descrip. Pseudolotus arbor est procerà, folijs latis oblongisque, firmis ac nervosis, fructu Sebestenorum effigie, sed longè minore, colore per maturitatem caeruleo, pluribus intus ossiculis, sapore non ingrato. Italia peregrina haec arbor est, & raris in viridarijs habetur. Eadem ferè illi qualitates sunt, qua legitima loto tribuuntur. Vires quoque eadem illi sunt, si rerum experimentatoribus credimus. Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse putant. Nec fortasse abre surrit, inter lotos recensere aliam quoque plantam, quam hic Pseudoloton vocauimus. Lotus Africana altera, arbor est procerà, folijs alterius loti latioribus, baccis rotundis, acuminato tamen cacumine, colore caeruleo subnigricante. Haec pediculis carent, calyculis tamen ima parte obductis perinde ac glandes, & Mixta, arboris ramis & surculis seriatim coherent. Habentur arbores multis in locis in Italia, è longinquis tamen regionibus allata. Sunt qui velint arborem hanc eiusdem cum loto pollere viribus: id quod nos quoque putamus. Aberrant, qui hanc loti speciem, Guaiaci esse plantam contendunt. Sed haec obiter dicta sint, ut alij quoque, qui rem plantariam excolunt, suam his mentem adhibeant. Sunt etiam qui putent Lotum

Lotum Athenæo, Zyzophum esse nostratem, sed decipiuntur, quod Zyzophus folia non ferat Rhamno latiora, nec baccas rotundas puniceasq; sed oblongas, & aureas potius, quam rubentes. Quinetiam, quod Zyzophus esui sicubus, dactylisque haud persimilia sunt, nec eos odoris suauitate præcellant. Lotum scriptis tradidit Galenus libro 7. simpl. med. his verbis. Lotus arbor non ita multa adstrictoria qualitatis est particeps, sed & tenuium partium est, & exsiccatoria. Itaque lignorum ipsorum ramenta muliebri accommodantur profluvio, & dysenterijs, & cœliacis affectibus. Decoquuntur verò interim in aqua, interim in vino, nimirum prout vsus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed & bibuntur. Quinetiam quod pilos defluentes cohibeat, non paruum signum est ipsum adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dicitur quippe est & in sermone de ladanis, eiusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum. Plin. 16. qua Græcis λωτός, Νύκτιδος, Latinis Lotus arbor, & Celtis appellatur: Arabibus, Sadar, Sedar, seu Aladar: Italis, Loto Nomina. albo, Bagolato, siue Perlara: Germanis, Zurgelbaum: Gallis, Alysier: Hispanis, Almez. Pseudolotus, Italis, Loto baslar- do. Lotus Africana altera, Italis, Legno santo, sed falso.

I. Lotus arbor, Lotus Celtis Plinio: Fraxinagolum, Crescentio: recentioribus Lotus, & Lotus arbor. II. Loto Africanæ nomine quæ proponitur, a quibusdam Diospyros Theophrasti censetur, Lotus & Faba Græca, Plinio, Cæsalpinus suspicatur apud Plinium inter Mala esse Tuberum alterum genus, quod Sericum cognominatum est à colore. Guaiacum Patavinum, Ges. hor. (cui & viscago) Lob. cui & Lotus vera Theophrasti: Diospyros siue Faba Græca, Lugd. Ermellinus Cæs. Guaiacana vulgò, Camer. Pseudolotus, Tab. Cerasum Trapezuntia Constantinopoli vocari testatur Bellon. Figuræ duæ adpositæ Pseudoloti & Loto Africanæ nomine, videntur foliorum tantum longitudine, breuitate, angustia, latitudine, pro ratione ætatis & loci, variare. Quod Guaiacum aliqui putarint causa est, quod ligni materia sit alba, & cor nigrescens.

Kpavia: CORNVS. CAP. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primùm virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem repræsentant. In cibo adstringunt: profluvio alui, atque dysenteria salutare, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Mûria, vt oliuæ condiuntur. Sanies, quam virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinuntur.

I. CORNVS

Cornus mas



Cornus est vulgaris notitia. Caterum (vt lib. 3. de plantarum historia, cap. 12. memoria prodidit Theophrastus) Jucus in ea duplex inuenitur. Namque consurgit mas duodecim cubitorum altitudine: folio amygdala, nisi quod pinguis, crassiusq; cortice neruoso, & tenax: caudice non minus crasso. Fœmina virgas paruas, sicut salix amerina, suo latere proferit, & fruticosior est. Nodos amba, perinde ac vitex, tum germinatos, tum inuicem congruos habent. Materies maris excors, totaque solida, cornibus densitate, firmitateq; similis, vnde illi nomen. Fœmina verò medullam continet & mollior est, atque cauatur: ob id ad venabulorum vsum inutilis. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt: fœminam autem fructuosam. Nucleum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odor atq; gratus. Flos olea, & floret, fructificatq; eodem modo, vt singulari pediculo plura proferat. In Macedonia verò (veluti etiam in Italia) amba fructifera sunt: sed mas per æstatem, fœmina verò per autunnum baccas maturat, huius tamen baccæ tantum mascula bonitate cedunt, vt mandu vix possint. Porro cauendum est, ne corni arbores prope aluearia conferantur, vel a natura producta ibidem permittantur: quandoquidem apes flore eius degustato aluo citata commoriuntur: atqui contrarium in homine operatur. At certe mirandum est, quod scriptis mandauerit Theophrastus, Cornum arborem amygdala folio virescere, cum longè diuerso prorumpat. Eaque propter dixerim ego, aut in Theophrasti exemplaribus hoc loco mendam subesse, aut in Ida monte prope Troiam tum soli, tum etiam calli magis æstuante natura, corno folia adeo restringi, vt amygdala quadantenus amula videantur: etsi meo quidem iudicio, potius putandum sit, Theophrasti iectionem hoc in loco deprauatam esse. Arbor est Cornus mediocris proceritatis, plerumq; fructuosa, virgis numerosis, è breui caudice emergentibus, nodosis, firmis, robustisq;. Tota arbor scabro vestitur corrice, adstringenti admodum sapore: proinde expetitur pistrinarijs fabris, ad parandos rotarum dentes: folia illi sunt sanguinea virga, tenuia leuia, mediocriter crassa, ac venosa. Flores edit muscosos aurei coloris, è quibus bacca oriuntur rubentes, oblonga oliuæ figura, & singulari pediculo, praduero intrus osciculo, oliuæ modo, in quo nucleus, sapore dulci, odoratuque gratus. Fit ex baccarum pulpa quoddam obsonij genus cydonite non dissimile. Quin & ex eorum decocto, & saccharo liquor ignis opere, & coctura concreuit, coagulaturque, qui præterquam quod gratissimo placeat gustu, datur vtiliter dysentericis, ac fœminis mensium profluvio laborantibus. Aduersatur cornus à canibus rabidis demorsis, vt inferius libro sexto, diffusius dicemus. Corni vires memoria prodidit Galenus libro septimo de simplicium medicamentorum facultate, sic inquit. Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem restringere, sicut & mespila. Folia quoque & germina gustu acroa sunt.

Lotus Athenæi non est Zyzophus. Loto vires ex Galeno.

Nomina.

Meum & Drag. Zardiy & xpoers. i. flauus aut ceræ colore referens, sed Catacuz. Zardiy & xpoers. i. flauus aut ceræ colore referens, sed Catacuz. Corni historia ex Theophrasto.

Theophrasti locus suspensus

Cornum

vsus in cibo.

Corni vires ex Gal.

60. tiosa, virgis numerosis, è breui caudice emergentibus, nodosis, firmis, robustisq;. Tota arbor scabro vestitur corrice, adstringenti admodum sapore: proinde expetitur pistrinarijs fabris, ad parandos rotarum dentes: folia illi sunt sanguinea virga, tenuia leuia, mediocriter crassa, ac venosa. Flores edit muscosos aurei coloris, è quibus bacca oriuntur rubentes, oblonga oliuæ figura, & singulari pediculo, praduero intrus osciculo, oliuæ modo, in quo nucleus, sapore dulci, odoratuque gratus. Fit ex baccarum pulpa quoddam obsonij genus cydonite non dissimile. Quin & ex eorum decocto, & saccharo liquor ignis opere, & coctura concreuit, coagulaturque, qui præterquam quod gratissimo placeat gustu, datur vtiliter dysentericis, ac fœminis mensium profluvio laborantibus. Aduersatur cornus à canibus rabidis demorsis, vt inferius libro sexto, diffusius dicemus. Corni vires memoria prodidit Galenus libro septimo de simplicium medicamentorum facultate, sic inquit. Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem restringere, sicut & mespila. Folia quoque & germina gustu acroa sunt.

II. VIRGA SANGVINEA.

Virga Sanguinea con- sideratio.

Ol. ex virga sang. baccis.

Virga sanguinea Plinii.

Nomina.



Ritschen: Hispanis, Cornizales: Gallis, Cornier, fructus vero Corneille: Bohemis, Driukouuy, à virga sanguinea, Italis, Sanguineo, & Sanguinello.

Cornus mas est & fœmina: Mas sativa & sylvestris: Sativa fructu rubro, ceræ item colore & albo. Sylvestris fruticat tantum & fructu est dulciore. I. Cornus mas Theophrasti: Cornus Dioscoridis: Cornus sativa & mas. Cord. in Diosc. Cornus mas, Dod. gal. Ges. hor. Lug. Cast. Cornus, Trag. Lon. Lob. Lac. Dod. Cæsalp. II. Cornus sylvestris seu fœmina Theophrasti, Virga sanguinea Plinii, Ges. hor. Dodo. Sanguineus Crescentio, Cast. Sanguen vulgo, Cæsalp. Nartrigel Trago: Cornus fœmina, Dod. gal. (cui & Opulus Columellæ) Ges. hor. Lob. Bellon. Lugd. Tab. Thal. Cornus sylvestris & Olsea Loni. Pseudocrania, Cord. in historia sua.

Oua.

SORBA.

CAP. CXXXVI.

Miam m-
Alcorra.Sorbora
SorboraSorbora
SorboraSorbora
Sorbora

SORBA a colorem luteum referentia, priusquam maturescant, dissecta, & sole siccata manduntur, ut album sistant. Eadem est functio molitorum farinae, si polentæ loco sumatur. Quod & decoctum eorum in potu præstat.

SORBA fructus sunt in Italia vulgarissimi, nullisq; non cogniti. Habentur ferè ubique locorum in campis, vineis & viciis. Duorum sunt generum qua domestica sunt, quemadmodum & que sylvestria. Domestica pomorum diuersitate noscuntur: nam alterum quidem mas, alterum fœmina, qua pomorum diuersitate noscuntur. Vtraque arbor caudice exit recto ac longo, ramis in altum assurgentibus: folio Fraxini sed angustiore, auersa parte albicante, & per ambitum serrato: album edit florem, racematim prodeuntem, è quo fructus exeunt in racemi modum, & ex vno tantum exortu pediculis ducentes, in altera quidem orbiculati, & succo odoratiore, ac nitidore: in altera verd ouati pyri faciem referentes, & gustu asperiores, insuauioresq;, & minus olentes, colore subpallido, & in latere rufescente. Hic maris, ille fœminæ esse creditur. Deterpuntur in maturitate Autumno, & in manipulos colligata suspenduntur, vel reponuntur substratis straminibus, ut imitescant, nam aliter præ nimia austeritate nec mandari, nec deglutiri possunt. Ligni materies solidissima, ac compacta: id eoque ad mensas parandas lignarijs fabris perquam libenter expetitur, quemadmodum & virga à bubulcis ad stimulos parandos. Cortice vestitur scabriusculo, colore ex flauo albicante. Radix illi rara, crassa, solida, atque descendens. Datur vtiliter farina delingenda dysentericis, cæliacis, & sanguinem reicientibus, ac etiam fœminis vterinis fluxibus opportunè. Sylvestrium (vt diximus) similiter genera duo. Vnum quod propriè sylvestre appellatur, alterum quod Terminalis vocat Plinius. SYLVESTRE ferè facie à satiuo non differt, præterquam fructu, qui ex muscarijs umbellatim sambuci modo prodit, crocantibus in rufam baccis oxyacanthinis magnitudine ferè equalibus, sapore tamen à domesticis non parum dissimili, acerbo, adstringentique. Prouenit syluosis ac frigidis locis inter ceteras agrestes plantas. Bacca adstringunt, siccant & repellunt.

sunt, valenterq; desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum: at parui vulneribus, & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimum ea contendunt, ac plus satius desiccant. Cornus hanc longè abfemilis est planta, quam nos vocamus in Hetruria à sanguineo virgarum colore vulgari idiomate SANGVINO, & Sanguinello. Crescit hæc in dumetis, & sepibus: arbor est fruticosa, virgis Cornu tenuioribus, robustis, modo siccis, Cortice sanguinis modo rufescente: folijs Cornu proximis, paulo tamen breuioribus ac latioribus, firmis, neruosis, & rubenti pedicula nitentibus. Floret Vero umbellis albicantibus, quarum flores baccas edunt, racematim coaduntes, sanguineus, tenuibusque petiolis appensa, orobi magnitudine, prius virides, & per maturitatem nigricantes: è quibus Ananiensis rura, in Tridentino agro, oleum conficiunt ad lucernarum vsum, expressis torculari, decoctis prius in aqua baccis. Ligni materies dura & ossenaq; habetur, cornu dimidie cedens, ob idq; sunt qui velint hanc Cornu esse fœminam, sed non video, quibus argumentis hoc probare nitantur. Atqui fortasse à scopo non longè aberraret qui diceret, hanc virgam esse sanguineam, de qua Plinius meminit libro 24. ca. 10. his verbis. Nec virga sanguinea felicitior habetur, cortex eius interior cicatrices, qua præsanauere, aperit: Hæc ille. Sed an planta, Sanguino nobis vocata id præstare possit, nondum periculum feci, quo sit, ut hanc sententiam non ausim affirmare, cum nullis notis de ea meminerit Plinius. Bacca qua ad maturitatem peruenerunt, amara, acerba, adstringentiq;, sapore degustantur: itaque abstergunt, roborant, cohibent ac repellunt: quare oleum, quod ex eis exprimitur, tale quoque esse necesse est. Porro plura non habeo, que de hac planta in medicum vsum veniant. Arbor, qua Grecis ἀγρία, Latinis Cornus vocatur: Italis, Corniolo, veluti fructus eius Cornole, & Cornie. Germanis arbor, Ebernelbau, Rurbeerbaum, & Dierlein: fructus verd Welsch

I. SORBUS DOMESTICA.

II. SORBUS SYLVESTRIS.



III. SORBUS TORMINALIS.



Et repellunt, quae per hyemem à rusticis ad auxilia asser-
uantur: ea enim turdis gratissima sunt. Arboris virga
quod solida, robustaque sint materiae, expetuntur à rusti-
ca pro stimulis bouum parandis. TORMINALIS
folia est vitiginea, Platani modo, laevi, haud infirme: bac-
ca oblongis, asperiusculis, teretibus, racematim coeuntibus,
& longo pediculo appensis, coronato umbilico, co-
lore ferruginea. sapore per maturitatem acido, & austero.
Arbor ipsa spectata satis habetur proceritatis, cortice
abducta laevi, & materiae haud fragili. Nascitur in sylvis,
cum ceteris sylvestribus. Bacca adstringunt, non tamen à
deo valenter, ut domestica. Possunt eadem omnia quae do-
mestica, sed inefficaciora habentur. Astringunt enim ali-
um, & dysentericorum torminibus utilia sunt, unde illi
nomen. Hanc Anguillarius manifesto sanè errore Crataegum
esse censet: siquidem Theophrasto libro 3. capit. 15. de
historia plantarum, Crataegus folio Mespili prolixo sci-
licet est. verum maiori, latiori, oblongiorique, nec serrato
quemadmodum illa sit. Atqui quantum distet Tormina-
lis sorbi folium à Mespili folio, manifestè testatur Plinius
libro 15. cap. 21. quippe qui Torminali Sorbo Platani, non
Mespili folia esse scribit. Adde quòd haec Sorbo ligni ma-
teria, nec versicolor sit, nec valida, nec flava, qualis Cra-
taego esse debet, si Theophrasto credimus. Quinetiam nec
fructus conuenit, qui in hac Sorbo oblongus semper visitur,
in Crataego vero magna ex parte turbinatus. Sorba, testi-
monio Galeni tum libro 8. simplicium medicamentorum,
tum libro 2. de alimentorum facultatibus, eandem ad-
stringendi naturam praestant, quam mespila, sed imbecil-
liore effectu. Vtraque tamen in medico vsu magis, quam
in cibus expetuntur, probanturque. Sorbi fructus Graeci
èa: Latini, Sorba: Itali, Sorba: Germani, Sporoc-
ling! Sporocpffel! Sperberen: Hispani, Sorbas:

Sorbi Tor-
minalis con-
sideratio.

Anguill. Cra-
taegum malè.

Sorbotum
vires ex Gal.

Nomina

Sorbus

Pyrus torminalis
Galli, Sorbes & Corniers nominant: Bohemi, Kzerbiny. Sorbus sylvestris, Italis, Sorbo saluatico: Aueniensibus, Tendo.
Sorbus torminalis, Italis, Sorbotorminale, & Sorbo saluatico: Germ. Wilder Spierwerbaum: Bohemis, Vuoškerusse.

Sorbus alia sativa, alia sylvestris, quæ duplex: sativa variat & forma & sapore fructus. Forma, alia orbiculata, ut mala: alia oblonga, vel turbinata, ut pyra: alia ovato fructu. Orbiculata, dulciora & odoratiora: ovata verò, acida & minus odorata. I. Sorbus fructu ovato Theophrasti. Sorbus, Brunf. Trag. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Ges. hor. Cæs. Tab. Lugd. Sorbus domestica, Cast. Lobel. cui & Ostria Theophrasti. Sorbus esculenta, Cam. Sorbus onata, Fuch. Sorbus legitima Clus. Pann. II. Sorbus sylvestris: Cast. Tab. Sorborum quartum genus Plinio: Fraxinus Bubula, Dod. gal. Fraxinea arbor, Trag. Fraxini species, Lon. Ornus, Ges. in fracto Dod. Ruell. Sorbus sylvestris alpina, Lob. Sorbus aucuparia, Clus. Pann. Thal. Cam. Sorbi quintum genus, Cord. in Diosc. III. Sorbus Torminalis, Cord. hist. Ges. hor. (cui & Mespili aronia sylvestris species) Dod. Clus. Pann. Lob. Lugd. cui & torminalis vera, Lonic. Tab. Casalp. Thal. Cam. Sorbi quartum genus, Trag. Cord. in Diosc. Sorbi sylvestris alia species, Cast. Cratz. 10
gus Theophrasti: Angul. Lugdunensi historia.

ΚΑΙ ΠΡΥΝΟΣ

PRUNVS.

CAP. CXXXVII

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur, sed stomachum malè habet, aluum mollit. Syriaca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt: aluum adstringunt. Folia pruni in vino decocta, collutione & gargarizatu, vnam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem sylvestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata: cum sapa verò decoctæ stomacho utiliores redduntur, aluumque magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat: a potum in vino calidos committit: ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

a Addit. Cat.
περιπλά-
σιον. i. cutis
meatus ob-
struens.

I. PRUNVS.

II. PRUNVS CEREÆ.



Prunorum
consideratio.

Prunorum differentia inexplicabiles ferè sunt, facie, magnitudine, colore & sapore differentia. Nam alia reperiuntur herbaceo colore perfusa, alia rubeo, alia eburneo, alia luteo, alia purpureo: quedam deinde magna, quedam vero parua: quedam mediocria: dulcia nonnulla, alia acida, alia vinosa, alia dura, alia mollia: alia denique rotunda, alia oblonga, alia ovata conspiciuntur. Arbor est procera, radicibus haud altè descendentibus paucisque, caudice subrecto, cortice scabro, multo ramis brachiato, foliis latis oblongisque, per ambitum serratis: floribus candidis, foliatis, racematim prodeuntibus. Fructu carnoso, tenui vestitus cuticula, ossiculo intus oblongo, in quo nucleolus. In vineis, hortis & viridariis habetur. Ceterum licet Diosc. 60
pruna Damascena sicca aluum sistere prodiderit, Galenus tamen aliter sensisse videtur septimo simplicium censu, ubi sic inquit: Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus, aridus verò minus. Sed haud scio, cur Dioscorides pruna Damascena sicca ventrem sistere dicat, cum & ipsa perspicuè solvant, minus tamen ius, quæ importantur ex Iberia: habet Galenus. At qui in hoc Brasauolus Ferrariensis medicus nostra ætatis clarissimus, aperte refragatur Galeno in simplicium medicamentorum omnium peritissimo æquè atque doctissimo, suo de simplicium examine, ubi Galenum scribit hæc in re, non Dioscoridem fuisse deceptum. Quippe quod Galenus non animaduertit, Dioscoridem de siccis prunis Damascenis loqui: quæ præterquam quod sicca sunt, gustu etiam acida sentiuntur, & adstringentia. Quæ quidem in re Brasauolus potius (pace sua dixerim) planè hallucinatus, & à recto veritatis tramite lapsus deprehenditur, quandoquidem non meminert, quod non solùm pruna Damascena sicca, sed etiam alia quàm plurima simplicia medicamentaria deiectionem simul & adstrin-

Calcei urela
contra Bra-
sauolum

adstringentem vite obtinent, ut manifesto testimonio sunt tamarindi, & myrobalanorū omne genus: item rhabbarum, & alia pleraque, quae praeter id quod primum aluum deiciant, postea illam adstrictam relinquunt. Quam sanè prunorum facultatem etsi Brasavolus non perpenderit, Galenus tamen optime nouit, & expertus est. Idcirco cum loco citato pruna Damascena sicca aluum ciere tradiderit, eadem etiam adstrictoria vi pollere, lib. 2. de alim. facultat. his verbis attestatur: Pruna equè ac ficibus concessum est, ut vel exiccata vtilia permaneant. Damascenis à Damasco Syria monte, in quo nascuntur, appellatis, prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur: proxima iis, quae in Iberia, & Hispania promouentur. Verùm hac quidem nihil adstrictionis praeseferunt: nonnulla verò Damascenorum vel plurimum. Probatissima in his sunt, quae cum mediocri adstrictione, magna laxaq; sunt. At parua, dura, acerbāq; & in cibo praua sunt, & ventri subducendo minus idonea: haec Galenus. Ex cuius verbis satis constare arbitror, nulla ferè ratione, nec nisi inualidis admodum argumentis Brasavolum adductum fuisse, ut hac in re Galenum ipsum accusaret, quasi Galenus omnino ignorauerit, quam sapores, quam odores, quam cetera denique non fructuum modò, sed & omnium ferè simplicium medicamentorum qualitates naturam & facultatem sortita essent. De quibus omnibus adeò doctè, & copiosè disputauit, ut parem vquam repererit neminem, ut omnibus perspicuum est ex suis primis quinque libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus accuratissimè conscripsit. Huic sententia aequè & rationibus accedit quoque communis medicorum experientia: nempe quòd compertum sit, pruna Damascena laudatissima, iis similia, quae Galeno praeseruntur, esu ventrem soluere non inefficaciter, adstricta aluo postmodum relicta, tamarindorum, & myrobalanorum modo. Sic igitur Galenum à Brasavoli reprehensione seruasse volumus. Sed si Dioscoridem quoque tueri velimus, nil aliud dicendum putauerim, quàm quòd pruna Damascena siccata aluum adstringere tradiderit, ut referuntur ad alia, quae minus adstringunt: non tamen, quòd voluerit, ea esse deiectoria facultatis expertia. Porro pruna bilem deiciunt: proinde ea vtiliter vsurpant medici ad febres, Prunorum
 20 aetiam biliosos affectus: quin & seplasiariis expetuntur, quippe qui ex iis quotannis electaria, intinctus, liquoresq; varios
 parare consueverint, quibus non modò sani gustu non ingrato delectantur, sed etiam qui languent, resocillantur. Habetur
 & in Aegypto prunus (ut Theophr. est auctor lib. 4. cap. 3. de plant. hist.) insignis magnitudinis, fructum ferens natura & Prunus Ae-
 magnitudine mespilis proximum, nisi quòd rotundum nucleum habet. Florere incipit mense Iulio, fructum circa brumam GYPTIA.
 persequit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanum habitant, propter arboris copiam fructum siccant, & osse exempto
 rendant, ossaq; faciunt: haec Theophrastus. Pruna quae dulcia sunt, minus frigida natura possident, contra verò acida, & Prunorum
 austera: atque omnia frigida, & humida sunt. Palma datur (ut Galenus inquit) Damascenis, quae sicca ex Syria Ven- facultas.
 etias importantur. Secundas tenent in Germania, quae ex Pannonia, & Transyluania conuehuntur: in quorum
 genere, quae minuscula sunt, maiorem cum palato ineunt gratiam, in vino decocta, & saccharo aspersa. Hoc enim
 modo parata, & primis mensis deuorat. s. praeter id quòd esui placent, commodissimè aluum citant: nihil enim adstrictio-
 nis habent, sed dulcia sunt. Habetur & SYLVESTRIS prunus, in dumetis, sepibus & syluis crescens. Pumila est ar- Pruni sylue-
 30 buscula fraticosa, & vbiq; aculeata, folio satiuæ pruni, verum longè angustiore, duriore, asperioreq;. Vere steret floribus stris confid.

III. PRUNVS SYLVESTRIS.

PRUNVS SYLVESTRIS
florens.



albis numerosisque, e quibus bacca proueniunt magnitudine vna acinis aequales, colore in purpura nigricante, viridi intus
 pulpa, austero, & adstringenti admodum gustu, in quo ossiculū includitur cerasorū simile. Tota planta exiccanti & adstringenti facultate praestat, quae admodum & bacca. Bacca colicis, & dysentericis vtiliter deuorantur. Eadē cū arbusculae radicibus
 ex aqua, vel vino austero decocta, sanāt oris, lingua & gingivarū vlcera, & fluxiones, quum etiā columella & faucium
 vlcera

IV. PRUNVS SEBESTENA.



Sebesten cō
sideratio, &
hystoria.

Viscum è Se-
bestenis pa-
ratur.

Sebesten fa-
cultas.
Fuchsi opinio,
reprobata.

Sebesten do-
fis.

Fuchsius re-
prehenditur.

Zizyphorum
consideratio.

ulcera, tum collutione, tum gargarizato eam decelle. Qu-
obrem non parum recreantur hoc medicamento, qui hydrar-
gyro peruncti, oris ulceribus, & fluxione laborant, & praesertim
addito iysio, alumine, & Rhodomelle. Idem decoctum in de-
fectionibus auxiliatur feminis vteri fluxionibus obnoxio. A-
qua è steribus distillata hausta, intestinorum vermes inter-
cit, oculorumq; fluxiones cohibet. Non dissident effigie a pru-
nis, nec dissimili admodum sunt facultate fructusq; quos offi-
cina Arabes secuta SEBESTENA nominant, quiq; Gra-
eci Myxa, & Myxaria vocantur. Quod etsi Dioscorides, & 10
Galenus horum suis monumentis non meminerint, de ijs ta-
men à posterioribus Graecis, nempe Paulo, Aetio, Psello, & A-
ctuario frequens facta fuit mentio. Arborea seri in Italia ce-
perunt Plinij etate: nunc verò nullis ibi in hortis aut virida-
riis (quod sciam) vident. Planta ramum vna cum fructu mi-
sit ad me praecrisi. Medicus Gabriel Fallopius Mutinensis,
vir quidem, vt doctrina & facundia praecellens, ita humani-
tate, & liberalitate illustrus. Est itaq; arbor Sebestenus pru-
no non admodum dissimilis, ei tamen magnitudine cedens.
Folij comatur pruno rotundioribus ac firmioribus, floribus 10
albicantibus, racematim prodeuntibus, è quibus fructus orian-
tur prunis paruis similes, calyculo quodam vt glandes, ima
parte colligati, osse intus triquetro, qui satù bacca proportio-
ne correspondet, in quo nucleus. Li maturitatem adepti, in a-
trum virescant, gustu sunt praedulci, ac lenta tenaciq; pulpa.
Ex qua Syri, & Aegyptij apud quos proueniunt, vnde ad nos
conferuntur, viscum ad aucupia consiciunt, quod Venetis A-
lexandrinum appellant, aucupiu commodissimum. Argumē-
to sunt nuclei, qui in eo reperiuntur, color & dulcedo, qua ga-
stato deprehenditur. Emolliunt, sitim sedant, & aluum citant. 30
Pollent autem deiectoria facultate, non secus atque pruna,
tam Graecorum, quam Arabum testimonio: id quod etiam
comprobatur quotidiana Medicorum experientia. Tametsi contrarium senserit Fuchsius: quippe qui in suis paradoxis ca-
pite 27. vt fortasse in Arabes inueberetur, quos vbiq; fere odisse videtur, nullam Sebestenis deiectoriam esse facultatem
contendit, quin potius ea adstrictoria vi pollere. Sed longè dissentit ab eo opinio nostra, & vulgata, comprobataq; continua
medicorum experientia. Quando quidem quod Sebestena assumpta in medicamentis aluum citant, testis in primis est Pau-
lus Aegineta, qui lib. 7. de iis verba faciens, sic inquit: Myxa arboris fructus est, minor quidem prunis, facultate verò confi-
milis. Ex quibus Pauli verbis elicitur, quod ita ventrem molliant Sebestena, quemadmodum pruna: de quibus idem dissi-
rens eodem libro Galenum secutus: Pruni fructus, inquit, ventrem subducit, recens quidem magis, aridus verò minus. Neq;
huius rei nescius Actuarius hac pluribus commiscet medicamentis, qua bilem eiciunt, vt videre est suo de compositione 40
medicamentorum compendio. Eorum insuper deicienda alui facultatem maximè comprobatur vulgari experientia, claris-
simum omnium lumen. Siquidem (vt iam millies expertus sum) eorum pulpa drachmarum decem pondere deuorata, aut
ad summum duodecim, eosdem fere prabet effectus, quos Aegyptia siliqua cassia vocata. His ergo rationibus, & auctori-
tibus adducor, vt illam quoque Fuchsi opinionem minus probem, qua est, quod electuaria de Sebeste officinis dictum v-
trem deiciat, non Sebestenorum facultate, sed aliorum simplicium medicamentorum deiectoria vi praedictorum, qua in
adduntur: nam si id per se praestant, vt ostendimus, idem etiam alijs admixta praestabunt. Quare, vt ingenue dicam quod
sentio, non Fuchsius tantum, quem alioquin semper admiratus sum, vt virum doctissimum, & de medicina amplissime
meritum: sed plerique alij, nunquam ad eò Graecis additi esse deberent, vt prorsus à Mauriana familia descendent, non-
nunquam & rationes, & experimenta, firma nostra artis & veritatis praesidia, cogantur deserere. Sed vt eò nostram per-
tatur oratio vnde diuerterat, dicimus auctoritatibus & experientia freti Sebestena deiectoriam vim habere. Quarta 50
bacca à cortice purgata vtiliter dantur ex flava bile febricitantibus, atque (vt auctores sunt Paulus, Aetius, Psellus, & A-
ctuario) linguae asperitatem mirifice leniunt: quin & pectori, atque tussi & lateris dolore affectis opitulantur: ventri-
tineas pellunt: vrina ardoribus à bile, vel salsa pituita prouenientibus maximam opem praestant: deuorata triginta, aut
quadragesima, ex iure carniuum macerata, prima statim mensa, aluum commodissime citant: praestantiora sunt plena, pin-
guia, & carnosia, quaeq; situm non redolent, nec terebinthem senserunt. Caterum quoniam Sebestena nobis ZIZYPHA,
que officinis Iuiabe dicuntur, in mentem reuocantur, cum eorum Dioscorides nusquam, quod extet, meminisset, duximus
non fore quidem ab re hic eius historiam & vires diffusius recensere. Arbor itaque est Zizyphus pruno paulo humilior, can-
dice contorto, cortice scabro, vitis fere vinifera simili. Materie oxyacantha proxima, radicibus firmis, ac solidis. Spinae
vbiq; fere riget, longis, leuibus, firmis, acutissimisque, colore ex nigro rufescente, quemadmodum & rami, è quibus
iuniei quidam processus exeunt, colore pallido, tenues sparthi modo, lenti, ac flexiles, spithama longiores, in quibus vtrinq; 60
per intervalla folia exeunt, vt in fraxino, & sorbo, impari tamen exortu oblonga, non magna, firma, vt in clemati-
de, quam vincam peruincam vocant, & sensim per ambitum serrata. Flores à foliorum exortu nascuntur pallidi, &
inascosi, è quibus bacca exoriuntur oliuarum instar, primum virides, deinde subalbicantes, posthac aureo colore, &
cum ad vltimam venerint maturitatem rufescentes, in quibus nucleus osseus concluditur oliua similis. Pulpa ante
maturitatem sunt viridi, austeriusculo sapore referta, ac in prematuris, dulcis euadit, & gustui non ingrata. Quo-
fit vt zizypha in humiditate, & caliditate temperata habeantur. Seruntur in hortis & viridariis. Galenus, qui (vt non-
nulli censent) ea Serica vocat, de eorum viribus libro secundo de alimentorum facultatibus sic habet: Ne his quidem, quid
ad tuendam sanitatem, morbosve profligandos valeat, testis esse possum. Nam ab insolentibus, ac effrenatis pueris, & mu-
lteribus cibo duntaxat expetuntur. Exiguam praebent alimentum, difficile cōcoquantur, ideo stomacho non sunt vtilia. Ean-
dem sen-

V. ZIZYPHA.



Zizyphus r. 1. g. 1. 1. 1.

dem sententiam ex ipso Galeno sumptam reddidit Auicenna, cui tantum illud addidit, quod ea ad pectoris, atque pulmonis vitia conferant, & quod quidam (vt ferunt) cum maxime renum, tum etiam vesicae affectibus prodesse censeant. Verum quoniam (vt diximus) scribit Galenus, nullam se adinuenisse in Sericis facultatem ad corporum affectus curandos, hinc capta occasione Fuchsius iterum digladiatur, honesto quidem studio, non modo cum Auicenna, sed etiam cum ceteris Arabicae familiae auctoribus, asserens id omne, quod de zizyphis Arabes suis monumentis commendauerunt, omnino falsum esse, & a veritate alienum. In quo tamen si vitium aliquod Mauritanis adscribendum est, illud quoque Graecis posterioribus adscribendam erit. Quandoquidem constat, Actuarium & Graecum, & medicum peritissimum, suo de compositione medicamentorum volumine, zizypha ad pectoris vitia compositis medicamentis compluribus admiscere, vbi scilicet ex calidorum humorum redundancia morbus emerferit, item eandem in his usurpare, quae bilem deiciunt. Quod & Nicolaum Alexandrinum in suis compositis medicis, persaepe fecisse comperio. Ideoque nil mirum si ad haec omnia prestare zizypha tradiderit Auicenna: namque suo lentore, ac sua, quae aegre permeant, crassitie (vt rei veritas adstruit) sanguinem crassum reddunt, qui flaua bilis redundancia tenuior, quam par sit, redditur. Cum itaque tradat Auicenna, zizypha & pectori, & pulmonei prodesse, non temere quidem cum locutum esse crediderim (vt fortasse aliqui putant) sed illud ea ratione scripsisse, vt in morbis tantum calidis, & acutis intelligendum esset, in quibus medici vtiliter zizyphis vti possint & debeant. Id quod eius verba aperte indicat, cum dicat, quod sanguinem incrassant. Neque enim erat Auicenna adeo ignarus, vt datis iam praemissis nesciret subinde conclusionem inferre. Sed certe pulchrum, atque tutum esse iudico, quod quandoque cum mortuis lu-

Auicennae defensio contra Fuchsiu.

demur. Et quoniam (vt saepe antea polliciti sumus) nulli medicorum secta, nec huic magis, quam illi noster animus erit additus, sed veritati propaganda, addam ex praedictis rationibus cum Auicenna, eos meo quidem iudicio, labi, ac falli, qui zizyphi sanguinem expurgari, ac abstergi contendunt, quique ea his commiscet medicamentis, quae pectoris affectibus frigiditate obortu parari solent, vt recentiorum nonnulli, qui zizyphis nulla eorum habita ratione ad quoduis pectoris vitium indifferenter vtuntur, & plerumque cum maximo agrotantium discrimine. Ceterum an Galeno Serica zizypha sint, dubitandum sane fuerit, cum aliud Plinio fuisse reperiantur lib. 15. cap. 14. vbi sic habet: Aequae peregrinae sunt zizypha & tubera, quae & ipsa non pridem venere in Italiam. Hac ex Africa, illa ex Syria, Sextus Papinius, quem consulem vidimus, prius utriusque attulit, diuisi Augusti nouissimis temporibus in castrorum aggeribus sata, bacis similia, quam malis: sed aggeribus praecipue decora, quoniam & recta iam sylua scandunt. Tubera duo genera, candidum a colore Sericum dictum. Et lib. 16. cap. 25. Ab amygdala, inquit, proxime florent armeniata, dein tubera, & praecores: illa peregrinae, haec coacta. Item lib. 17. cap. 10. Et zizypha ait, grano seruntur mense Aprili. Tubera melius inseruntur in pruno syluestri, & malo cotoneae, & in calabrice, ea est spina syluestris: haec Plinius. Columella tamen tubera nusquam, quod legerim, meminit, sed zizyphorum lib. 9. cap. 4. duo tradidit genera, quod harum floribus maxime delectentur apes, nempe rutilum, & album. Quo suspicandum sit, Plinii codicem hoc in loco deprauatum esse. Illud suspicionem auxit, quod inter Arabes Auicenna, & Graecos recentiores Simeon Sethi, duas zizyphi species scriptis mandauerint, & quod tamen in Plinio vna tantum legitur zizyphus. Verum cum Actuario, Nicolao Myrepsico, & Simeoni Sethi ζιζυφα, ζιζυφα, & ζιζυφα (tot enim membra scripta inueniuntur) ea esse videantur, quae Galeno serica, eademque Auicenna, Serapioni, aliisque pluribus Mauritanis, mihi quidem statuendum videtur, Galeno serica non aliud designare, quam zizypha. Ex his praeterea omnibus maximum esse argumentum crediderim, in Plinio hic subesse mendam, & illi de zizyphis id adscribendum esse, quod de tuberibus de praecore fortasse legitur. Leguntur zizypha ad calcem Septembris in Autumno, vna cum iuncea ramusculis, & in manipulis colligata, laquearibus suspenduntur, prius diebus aliquot insolata: postremo decerpuntur, & asseruantur in capsulis, ad medicos vsus. Sunt etiam qui decerpta & super cratibus, aut regetibus strata tam diu insolant quousque rugosa fiant. Prunus, Graece κοκκυμυδος: Fructus pruni, qui κοκκυμυδα Graecis, Pruna Latinis appellantur: Arabibus, Anas, Auas, seu Agias: Italis, arbor Pruno Susino: fructus Prune, & Succine, & Susine: Germanis, Praumen, Pflaumen, & Kriechen: Hispanis, Prunas, Andrinias, & Amexcas: Gallis, arbor Prunier, fructus Prune. Prunus syluestris, Graecis κοκκυμυδος αγγελια: Fructus Italis, pignuole saluatiche: Germanis, Schlehendorf arbor: fructus Schleen: Bohemis, Truki. Fructus vero, qui Graecis recentioribus μυζα, μυζα, & μυζαερα: Latinis similiter Myxa, & Myxaria, atque etiam Sebestena Mauritanorum imitatione dicuntur: Arabibus, Sebesten, Motheica, Mukeita, & Mokeita: Vulgo & officinis, Sebesten: Gallis, Sebeste. Nominibus, Hunen, ZusalZef, seu Hanab: Officinis, Iuiuba: Italis, Giuggiole: Germanis, Rot Brustbeete: Hispanis, Azufecif: Gallis, Iuiber: Bohemis, Iuiuba.

Plinii Zizypha & Tuberes.

Zizyphorum duo genera

Prunorum inges turba est, vt habet Plinius: differunt vero haec magnitudine, figura, colore & sapore: Prunus sic quibusdam caro siccior, facile ab osse separabilis, aliis humidior & pertinacius adharet: praecipua laus tribuitur Damascenis, quae Brabyla Theocriti censeatur. Habentur nunc & suauissimi gustus, quae exempto nucleo siccata ex Gallis aduehuntur Prunorum de Prunioles nomine. II. Addita est figura altera

Pruna cerea altera Prunorum, quæ Pruna cerea & cereola dicuntur, quia ex cædido in luteum pallescunt. Eleganti-
 ma etiam sunt Amygdalina, quæ Coccimelea videntur esse apud Theophrastum: recentiores pruna ha-
 Prunus Syl. bent quæ Myrobalana cognominantur. III. Prunus sylvestris, cui hoc peculiare, quod si deflorescen-
 tem imbres contigerint, fructus in oblongū & inane corpus conuertitur, quod Itali Turcas vocant. Car-
 Prun. Sebe- ne huius, vel succo expresso pro Acacia vtuntur. IV. Prunus Sebesten, alia satiuæ, alia sylvestris, autore
 sten. Alpino. Satiua, dicitur Sebesten Trag. Lac. Mixæ, Dod. Lon. Mixæ vel Sebastæ, Cord. hist. Prunus Sebe-
 Zizypha. stena, Lugd. V. Zizypha: duplex est, rutila & alba: rutila, satiuæ & sylvestris, vt rectè Anguillara: Satiua,
 ratione fructus duplex, maior & minor. Zizyphus rutila satiuæ maior, sunt Iuubæ Arabū & officinarum,
 quæ Iuube & Zizypha recentioribus dicuntur, & referre oportet ad Lotum Athenæi, Homeri & Poly-
 bii, & Paliurum Africanam Theophrasti. Zizyphus verò rutila satiuæ minor, ea est quàm Cordus Iuibas
 minores & Tubetes Plinii vocat: hæ à prioribus differunt, quod colore, nitore, carne molli, lentore, sa-
 pore & nucleo maiores quidem imitantur, sed minores sunt, nec oblongæ, sed rotundæ (hæ fortè ad Pa-
 liurum alteram Theophrasti, dum fructu dicit rotundo, referri possunt) atq; similiter flaccidæ. At Zizy-
 Zizypha syl. phus rutila sylvestris, Iuuba sylvestris & Paliurus secunda Theophrasti, & rectè, Anguillaræ dicitur: hæc
 in agro Veronenfi prouenit, spinis valdè horrida, vnde eam habemus.

Κεραρος

ARBUTVS.

CAP. CXXXVIII.

αλευροφλοιον
 i. tenui corti-
 ce leg. Orib.
 b Meū i. sub-
 αίριον. i. sub-
 fuluum.

Arbuti con-
 sideratio.

Arbuti histor.
 ex Theophr.

Arbuti de-
 scriptio.

ARbutus, siue vnedo, arbor est cotoneæ malo non dissimilis, tenui [folio:] etius fructus pruni ma-
 gnitudinem implet, nullo intus nucleo, huic memæcylo cognomen est. Maturus aut b flauet, aut ru-
 bescit: in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisque dolorem mouet.

ARbutus in Hetruria frequentissima prouenit, vbi vel per hyemem perpetuis virefcit frondibus. Hac etsi Dioscoridi vel-
 datur malo cotoneæ adsimilis, magis tamen putauerim ab eo arboris proceritatem representari cotoneæ, quàm folia,
 & caudicis corticem. Vel deprauatus fortasse (vt magis suspicor) est hoc in loco Dioscoridis codex: quandoquidem Serapio
 Dioscoridis ipsius testimonio, Arbutum non describit in vniuersum cotoneæ malo similem, sed eam tantum proferre folia
 malo cotoneæ minoræ: nec scribit tenuia habere folia, vt vulgata habet Dioscoridis lectio: siquidem, vt palam est, Arbuti
 folia in sunt laurinis, & iligneis crassiora. Meminit Arbuti Theophrastus lib. 3. cap. 16. de plant. hist. sic inquit: Arbutum,
 quæ vniuersum cibo idoneum ferat, magnitudine non nimium præstat: corticem tenuem, tamarici similem habet, folium inter
 ilicæ, & lauræ: floret mense Iulio. Flores singulari appendice parte postrema racematim coherant, specie quisq; myrto oblæ-
 go similis, & magnitudine tantus: non foliatus, concavus, tanquàm onū exalptū, ore aperto: cū autè deflorerit, retinaculū
 perforatur, quodq; defloruerit tenue, sicut verticillus circa fusum. Fructus anno integro maturefcit, vt simul hūc haberi, at-
 q; alterū flore sponderi contingat: hæcenus Theoph. Quæ in Hetruria nascitur, folia profert laurinis, iligneisve similia, bre-
 uiora tamen paulò, crassioraq; colore potius pallido, quàm viridi, in ambitu vbiq; serrata, rubra per medium excurrente
 costa. Caudex cortice vestitur subrubro, haud crasso, tamè aspero, squamosoq; a quorumi prodeunt ruli ceteros, ac leuios.

ARBUTVS.



Arbuti vsus,
 & vires Mat-
 thiolo.

Nomina,

Floret mensibus Iulio & Augusto, floribus candidis, parum,
 lilij conuallij vocati figura, racematim dependentibus. E qui-
 bus fructus gignuntur rotundi, fortè etiam ferè magnitudinis
 qui primo exortu virent, deinde flauescunt, maturi verò ru-
 bent, aspero tactu, nulla intus ossicula, fragorum modo, quo-
 rum etiam effigiem referunt. Sapor hic insipidus simul &
 austerus: quinetiam dum eduntur, linguam, & palatum sti-
 mulant acerosa quadam substantia, qua exterius contegun-
 tur, ita vt planè acerosi videantur: integro anno maturefcit:
 nascitur in collibus, & syluosis vallibus. his maxime delicta-
 tur turdi, & merule, quo sit, vt hyeme, quo ten: pore ipsa po-
 ma maturitatem sentiunt, eiusmodi aues inibi laqueis, reti-
 bus, alijsq; aucupij generibus facile capiuntur. Arbuti folia
 coriariis ad spissanda coria expetuntur. Sunt qui credant, ar-
 butum maximam opem præstare aduersus pestem: quamob-
 rem aquam, quæ ex folijs extracta sit, admisso osse in cerui
 corde reperto, vbi statim morbus inuasit, magno (vt ipsi aiunt)
 iuuamento agrotantibus exhibent. In summa, vbi adstringe-
 re, & roborare opus est, Arbutus eximie præstat. Arbuti me-
 minit Gal. lib. 7. simpl. med. vbi paucis inquit: Arbutus arbor
 ipsa qualitate acerba vnà cum fructu est, eum memecylon
 nuncupant. Est autem hic & insensu stomacho, & capiti
 dolorem inferens. Huius arboris nomen Græcum est κόμαρ:
 Latinum, Arbutus siue Vnedo: Arabicum, Hatiladii: Italicū,
 Albatro: Hispanis, Madronho, aut Madromeshro: Galis, 60
 Arbausier.

Vnedo Plinio. At arbor Comaros Dioscoridi, recentioribus Arbutus dicitur.

Αμύγδαλος

AMYGDALÆ. CAP. CXXXIX.

Amygdalæ amaræ radicem tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit. Illitæ nucs idem munus præstant: menses admotæ ciunt: capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti, aut temporibus cum aceto, vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino: item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt, urinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo, † & mentha assumuntur: renum vitis, & pulmonum inflammationibus b
[ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur: calculosis, difficilique vrinæ in passo
auxiliantur: & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, c nucis auellanae magnitu-
dine: quinis, septenisve præsumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cum quadam esca eas vo-
tauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reicientibus sanguinem, potum auxilio est: im-
petigines, quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino po-
tum medetur: calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ, sed multò mi-
nus valent in remediis, quàm amaræ: attamen extenuant, urinam ciunt. Recentium seu cum suo puta-
mine, humida stomachi vitia emendantur.]

a Catæc. σιδ
ἀμύλα λευ-
κοτάτα i. cū
amylo albi-
fimo.
b Conclusa
Orib. non le-
git.
c Meum &
Drag. καρύν
simpliciter.

Amygdalorū
consideratio.
Amygdalæ
historia.

Amygdalarū
vires ex Gal.

Amygdalatū
amararum
facultas.

Amaræ amyg-
dalæ quo pæ-
cto fiant dul-
ces.

Notitia.

Amygdalæ tam dulces, quàm amaræ fructus sunt ubique vulgò notissimi. Differunt tamen inter se: nam amaræ maio-
re exalfaciendi, exiccandiq; facultate præditæ sunt, quàm dulces: quo fit, vt etiam dulcibus longè præferantur ad
crassos, pituitososq; humores expectorandos. Arbor est Amygdalus, spectat a satis proceritatis, caudice crasso, raro tamen, re-
do, cortice aspero, paucis radicibus, siquidem plurimum singulari nititur radice, robusta, grandi, altè descēdente. Foliâ ha-
bet persicyer omnia similia, quâ quoque tota amulatur planta, nam & flores in amygdalo spectarentur, quales in Persi-
co, nisi huius saturatiori purpura rubescerent. Floret vere inchoante. Nucs edit cordis figura, quæ antequam obdurescant,
integram putamine comeduntur, & præsertim ab vtero gerentibus, sunt enim gustui non ingrata. Duplici conteguntur
putamine, quæ admodum iuglandes: sunt alia maiores, alia minores. Leguntur Augusto mense ad finem aestatis, cum ex-
terna earum tunica dehiscit. Tractu gaudent calidiore, quo fit vt in Apulia, Siciliaq; optima, copiosissimaque proueniant.
Galenus dulces paucis perstringens li. 11. de alimentorum facultatibus, sic inquit: Amygdalæ nihil prorsus adstrictorie facul-
tatis sortita sunt: sola enim extenuandi, atque abstergerendi vi pollent: qua tum viscera purgant, tum humorū e pulmone,
ac thorace excreatus molliuntur, ac promouent. Dulces impinguant, lateris dolores, ac tussim sedant, & præsertim earum
cremor. Oleum ab iis expressum mulcet intrinsecos dolores omnes, intestinorum præsertim, vteri ac renum, si calidum sex
vnicarum pondero bibatur, est enim certum auxilium. Et de vtroq; Amygdalarum genere differens lib. 6. simplicium medi-
camentorum, primò amaras, deinde dulces prosequitur, his verbis: Amygdalæ, quæ quidem palam amara sunt, omnino ex-
tenuandi vim possident: quod & qualitas ipsa indicat, & ex-
perientia comprobat. Ac de amaræ quidem qualitate in qua-
to borum commentariis proditum est. Caterum duo ex-
perientia exempla proponi satis est, vnde vim eorum possis
discere. Siquidem ephelim expurgant, & excreationibus ex
pectore pulmoneq; crassorum lentorumq; humorum impen-
dio conferunt. Porro hæc ostensa sunt genere quidem inciden-
tis, specie verò extergentis esse facultatis. Quin & quod per
accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi,
& ipsum supra demonstratum est, sed & experientia mon-
strat: nam in ictere crassorum, viscosorumque humorum in
extremis vasibus impactorum obstructiones abunde expurgant,
expediuntq;. Quin & laterum dolores ab eiusmodi causa ve-
ros, & lienis, & coli, & renum sanant. Porro & ipsa arbor
vniuersa similem sortita vim est: nam huius radices coctæ, at-
que illitæ ephelas purgant. Quotquot verò sunt amygdalæ
dulcissimæ, & ipsa leuiculam amaritudinem possident, qua ta-
men dulcedine superante occultatur: caterum id temporis
spatio clarum fit. Demonstratum autem retrò est, qualitatem
dulcem moderate esse calidam: hæcenus Galenus. Amygdalæ,
vt Theophrastus, & Plinius prodidere, ex amaru dulces fiunt,
si circumfosso stipite, & ab ima parte circumforato, defluent
vndique humor abstergetur. Et contra, dulces amara fiunt,
si primo germinatu tenella arbores a pecore detracuntur.
Amygdalæ (vt etiam tradidit Galenus) non multum suppedi-
tant alimenti: quanquam eis plerique vtantur, & ad robo-
randam venerem, & ad reficiendas vires. Amara gallinas
& gallinaceos necant, si ab iis deuorentur. Eadem contrita,
& fronti, temporibusque illita, capitis dolorem mulcent, &
somnum conciliant, & præsertim, si aqua Verbenacæ exti-
pantur. Hæc vt Græci ἀμυγδαλίτις etiam Latinis Amy-
gdalæ vocitantur. Arabibus, lauz, Kauz, seu Lauzi: Italis,
Mandole: Germanis, Mandelkern: Hispanis, Almendra:
Gallis, Amendes: Bohemis, Mandly.

AMYGDALÆ.



Amygdalus communis L.

† In vulgatis Græcis exemplaribus hic non legitur ἀμυγδαλίτις, id est, & mentha. Verum dictionem hanc vertit Mar-
cellus ex antiquis codicibus, quos habuisse testatur: eam quoque & Orbasius, & Serapio ex Dioscoride transcribunt. Quo-
mòdo vera Dioscoridis lectioni adstipulantur, ita hoc loco mentham addendam esse putauimus.

T. 1. Amygda-

Amygdalus ipsa arbor dicitur, at fructus Amygdala & Amygdalum, Catoni Nux Græca: ob osseum eorum corticem, antiqui inter nuces reponere. Sūt autem dulces & amaræ, & hæc arte dulces fiunt: sic maiores sunt (pruno enim si inlerantur grandiores fiunt & lanugine carent, quæ maximè laudantur) & minores, triplo namque minores aliis ex Asia adferuntur, amaræ & dulces: sunt nuces plerunque oblongæ, reperiuntur tamen & rotundæ. Addere oportet Amygdaloperficum nunc in Alsacia frequentem, cuius osseus cortex perfici instar rugosus, & nucleus perficium olet, grati saporis, fortè perfico primò insita.

Πιστία.

PISTACIA.

CAP. CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. Trita cum vino contra serpentiū ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

I. PISTACIA.

II. STAPHYLODENDRON.



Pistaciorum
consideratio
& historia.

Terebinthus
Indica Theophrasti.

Pistacia, quorum est communis in officinis vsus, ex Persia, Arabia, & Syria Venetias importari solent. Quæ & Syria (vt Plinius auctor est) Lucius Vitellius censor in Italiam primus intulit, cum legatus in ea provincia fuisset, nonisimò Tyberij Caesaris temporibus. Horum arbores Venetijs, Caieta, Neapoli, & in alijs Italia locis vidimus. Tota arbor Terebintho similis est, folijs colore ex viridi in luteum inclinante, Terebinthi modo, è ramusculis vtrinque emergentibus. Nuces racematim prodeunt è ramorum extremitatibus, rufa exterius tunica & odorata: albo sunt putamine, facie vnguentaria glandi simili: internus nucleus cuticula contegitur rufa: atqui medulla virescit, sapore pinea nuci proximo, sed odoratior, ac gratiores. Quo fit, vt legitimã Indicã Theophrasti, Pistaciã arborẽ nulla dubitatione esse censeã, vt superius de Terebintho agẽtes latius diximus. Etenim nota tã perspicua sunt, vt id negare nemo cū ratione possit. His accedit Athenai testimonium. Quippe qui li. 14. c. 20. Dipnosoph. Nicander Colophonius, inquit, in Theriacis Pistaciorũ meminit, sic inquit: Pistacia asiniles truncos onerare videbis prorsus Amygdalinis. Meminit de his & Posidonius Stoicus lib. hist. 3. his verbis. Ipsum fert Persia, Arabia, & Syria, ac Pistacium vocant: fructus racematus est, albo cortice, ac lógus lachrymisq; simillimus, atq; vuarũ modo vicissim coheret. Quæ interius sunt, vident, minusq; bonũ habent succũ quã nux Pineæ, ac melioris sunt odoris. Fratres verd, qui Georgica conscripserunt, hæc inquit, & Fraxinum & Terebinthum, quæ Syri nunc Pistacia vocantur: atque hi per Pistacia dixerunt, cum tamen Nicander aspirauerit, dixeritq; phistacia: hæc tamen Athenæus. Excalfaciunt & humectant, impinguant, roborant, aperiunt, non tamen valde nutriunt. Hæc (vt libr. 2. de alimentorum facultatibus scriptum reliquit Galenus) parum præbent alimenti, tamen si infarctas humore iocineris vias expediunt, & à vitio liberent. Porro an stomacho noxia sint, an vtilia, an aluum molliant, an adstringant, nullum huius rei certum habere testimonium scribit Galenus. Cuius sententia refragatur Auicenna, qui cum palam, & nominatim Galenum refellere nollet, libro secundo hæc dicendi ratione vitur, his serè verbis: Inquit quidam, non inuenio, quod Pistacia stomacho profint, aut sanè officiant: ego autem dico, quod nauseam discutiunt, & ventriculos roborant. Argumento est subamara, subausteraq; qualitas, quæ gustu in iis deprehenditur. Hæc igitur ratione freti medicorum nonnulli, non modo ad iocineris infarctus Galenum secuti pistacia exhibent, sed ad iecur ipsum, ventriculũq; roborandum, ea tam cibo, quam medicamentis immiscunt: quin & ad conciliandã venerẽ, & ad pinguedinẽ inducendã, macie & marasmo affectu cõmendant. Stomacho amica sunt deuorata, aut ex vino pota. Profunt cõtra serpentiũ morsus. Tabidos & suppuratos iuuat.

Quibus-

Quibusdam in locis pistaciorum sylvestrium nomine appellantur casusdam arboris fructus, quam Plinius libro, & cap. 16. STAPHYLODENDRON nominat, et si a pistacijs effigie, & sapore plurimum dissideant. Planta hac humilis est, folio sambuci, materie admodum imbecilli: floribus albicantibus racematim dependentibus, quemadmodum & fructus: qui quibusdam in folliculis prouenit, rufo colore, ciceris ferè effigie, maior tamen: in quo subuirens nucleus includitur, sapore dulcis: sed naseam commouens. Prouenit in syluis & fruteris. Neminè habeo, qui de horum viribus & facultatibus scripserit: verum cum naseam moueant si copiose edantur, vomitiones eadem mouere posse non dubitamus. Sapore pistacijs similes sunt Pistaci nuclei, qui in strobilis includuntur. Hi enim (vt loco citato tradidit Galenus) corpus alunt, bonum procreant succum sed crassum, tamen si agrè concoquantur. Verum si Auicenna etiam credimus; digerunt, leniunt, resoluunt, ac impinguant. Prostant præterea plumonum vitijs, purulenta excreantibus, & tussi molestatis: sed priusquam edantur, aqua calida macerare eos oportet, alioquin ventriculum ladunt. Semen augens, & venerem excitant. Renes & vesicam non modò expurgant, sed etiam roborant, eorumque vlcera prohibent: vrina stillicidio opem mirifice præstant. Quam ob causam strobilini nuclei apud recentiores medicos in frequentissimo habentur vsu ad huiuscemodi affectus. Quæ nuxes Græcè Πιστάκια, Latine quoque Pistacia, & Pistacea appellantur: Arabice, Pustech, aut Festsch: Officinis & Barbaris, Pistici: Italis: Pistacchi: Germanis, Welsch Bimpernùstein: Hispanis, Alhocigo: Gallis, Pistaches. Bohemis, Pistacya. Staphyloedendron, Italis, Pistaci saluatici: Gallis, Pistaches sauages: Germanis Wild Bimpernùstein.

Staphyloedendron Plinij.

Nuclei, pinci vires.

Nomina.

Pistacia peregrina C.B. Terebinthus Indica Theophrasti: recentioribus Pistacia & Pistacium. II. Pistacia Germanica. C.B. & Lon. Nux vesicaria, Trag. Dod. Staphyloedendrum Plinij. Dod. gal. Gef. hon. Lob. Crisl. Tab. Cam. Lugd. Arbor vuz, Aingillara: Pistacia sylvestris, Castori, Coucul & Hebulben Turcarum cum hac conuenire, sentit Matthiolus in suis epistolis.

Κεραυον Κασιλιανον.

NUX IVGLANS.

CAP. CXLI.

Nuxes Iuglandes, quas nonnulli Perficas vocant, sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, biliolæ, capitis dolorem inferentes, tussilentibus inimicæ: vomituris tamen ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta verò, & caricis præsumptæ, & à summo cibo, venenis resistunt, nec minus si à veneni haustu comedantur: largius esitata, tineas latas pellunt: illinuntur mammarum inflammationi, abcessibus, luxatisque, cum mellis exiguo, & ruta: cum cæpa autem, sale, & melle, canis hominisque morfui proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum tritumque, in oleo & vino infandam capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Siltunt menses nuclei usti, si triti ex vino admoucantur: ijdem è veteribus illiti carbunculis, gangrenis, & agilopijs medentur: alopecijs comminudati & impositi, præsentis sunt remedio. Nucibus tussis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentes sunt, utpote suauiores: itaq; allio mistæ eximunt acrimoniam: liuores in corpore illitu tollunt.

I. NUX IVGLANS.

Juglans regia



Nuxes Iuglandes, quæ in communi sunt vsu, itemque arbores, à quibus eduntur, omnibus vulgò notiores sunt, quàm vt à nobis representari debeant, cum nulla arbor Nuce vbique frequentius occurrat. Ha Latine Iuglandes, quasi Iouis glandes, interlitis litteris appellantur. Quo nomine primo mundi auro eas appellatas esse, plures tradidere auctores. Quippe cum homines primum glandibus tantum diu victitassent, inuenta tandem arbore, quæ naces ferebat, degustato nucisrum sapore, horumq; dulcedine miru in modu allecti, naces iouis glandes ob excellentiam appellauere. Iuglandium arbor prægrandis spectatur, caudice procerò, ac crasso, ramis multis, ingentibus, & longè lateque sese diffudentibus, libro vestitur cinereo, crasso, ac rimoso: radicibus nititur prælongis, robustisque. Frondibus pluribus vtrinque ab eodem pediculo exeuntibus, vt in Fraxino, oblongis, & grauiter olentibus. Vere inchoante in ipsa prima germinatione, iulos edit, siue paniculas, quæ breuis flaccescentes decidunt: tum super horum pediculo stas emergit herbaceus, totidemque caliculacea tegumenta, quot flores petiolo contrahuntur, singulisque his singula includuntur nuxes, duplici obducta munimento, & (vt Plinius inquit) puluinito calloso primùm calyce, mox ligneo putamine. Crispo intus nucleo, quadriparitoque, callosa intercedente membrana. Genera Iuglandium plura, quæ cum forma, tum putaminis duritia, fragilitateque dignoscuntur. Præstant oblonga, putamine albicante ac fragili, albo intus nucleo, putamini haud hærente, & gustu dulci. Iuglandes aquas odere, montes amant algoris cupida. Leguntur inchoante autumno, perticis excussa, & siccantur vmbra, exuto exteriori indumento. Proueniunt vbique in campis & collibus. De ijs differens Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit. Nucis arborum in folijs, tum in germinibus adstrictionem quandam possidet: cæterum euidentem, multamque in nucis putamine recenti pariter & sicco: proinde eo tinctorum quoque vti solent. At nos

Nucum Iuglandiũ consideratio & historia:

Iuglan. def.

Iuglandis vires ex Gal.

eius expressi succo similiter, vt mororum, & ruborum in melle decocto, vice stomachici medicaminis vtimur, & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modò dicti succi conuenire censentur. Porro nucis ipsius id, quod edendo est, oleosum est, & tunc: itaque ob id etiam facile exprimitur, & quod diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur, quamobrem

oleum ex eo inueterato exprimere liceat: tunc sanè admodum fit per halitum enaporatorium. Itaque quidam eo gen-
 uas, & carbunculos, & agylopos sanant, ac nonnulli ad rupóτρπα hoc est, neruorum vulnera vtuntur. Et lib. 2. de alimen-
 torum facultatibus sic inquit: Habet Iuglans & adstringentis qualitatibus non exiguum, quæ temporis processu marcescit, de-
 generante tota eius substantia in pinguem succum, adeo vt cibo prorsus fiat inidonea, quod veteri oleo, sua pinguitudine
 adsimilis appareat. Viridis autem, atque etiãnum humida, neque adstringentis qualitatibus, neque oleosa conspicue est
 particeps, sed magis est quodammodo ἀραια id est, qualitatis expers: quod saporis genus aqueum (vt dixi) vocare consueui-
 mus. Iuglans facilius, quàm auellana concoquitur, stomachoque vtibilior est, & multò magis, si vna cum caricis edatur. Pro-
 ditum autem est à plerisque medicis, si ambo hæc cum ruta ante alios cibos sumantur, hominem non magnopere à herbali-
 bus pharmacis ladi posse. Constat præterea humiditas deiectioni magis, aridas verò minus conuenire. Non pauci quoque cru-
 gato iuglandes præsumunt, ventris subducendi gratia. Ad hoc autem virides aptiores sunt, vt pote quæ adstringentis quali-
 tatis minus participes sunt. Quin & aridarum quoque, vt prius in aqua fuerint macerata (vt nonnulli faciunt) simili, ac
 viridium facultas habetur: hæc Galenus. Nuclei vsti alopecis impositi præsentis sunt remedio, recentes stomacho innocentio-
 res sunt, & illita liuores auferunt. Ceterùm Iuglandes virides decerpta mense Maio, vel Iunio appetente, antequàm ea-
 rum putamina obduruerint, saccharo vel melle asseruata, stomacho vtiles euadunt, & ori non ingrata. Iuglandium inli-
 qui mense Martio prima germinatione erumpunt, fici & in puluerem contriti, & ex vino albo poti drachma pondere, fe-
 minis strangulatu vuluæ affectus mirificè profunt. Fit quoque è nucibus oleum, quo ad lucernas vtuntur Insubres, quinet-
 iam pictores & fabri lignarij, vbi splendorem suis operibus addere volunt. Haustum hoc quinque aut sex vnciarum pondere,
 flatu potenter dissipat, quo fit, vt in coli affectibus à flatu genitus plurimum afferat auxiliij. Illius tumores discutit &
 contractos nervos emollit, addita præsertim calce lota: antiquam verò scabiem sanat. Inest quoque iuglandibus nucibus
 propria quadam, & peculiaris facultas ad remoratos menses euadendos, adeo vt ego factò periculo, non parum fuerim demira-
 tus, & præsertim vbi cetera medicamenta, quæ ad hoc munus obeundum præstantiora censentur, nihil mouerant. Mace-
 rantur itaque ad id in aqua iuglandes nuce cum suis putaminibus quousque remollita, atque humefacta eorum nucleis à
 contegente membrana perinde ac virides expoliari possint: sumuntur deinde expoliati nucleis & conduntur macerandi in
 aqua vita præstanti, & post duos dies præpurgatis prius feminis, nucleis duo vel tres integra nuce, quotidie dantur mane ie-
 iunij deuorandi, decem continuis diebus, ante tempus menstrua fluxionis. Sed quoniam sermo nobis est de nucibus, cum Di-
 oscarides, Galenus ac ceteri posteriores Græci de Indicis, Myristicis, Metellis, ac Vomicijs nihil, quod constet, memoria prædi-
 derint, hic ea non dissimulanda putauimus, neque alienum duxi recensere, quæ de ijs ex Mauritanorum monumentis, & recen-
 tiorum quorundam historijs sum consecutus. Sed primo de Indicis dicamus. Nuce igitur INDICAE, myropolis omnibus
 vulgatissima, fructus sunt arboris cuiusdam (vt Mauritanij auctores sunt) palmæ effigie prægrandes, magnorum melonum
 instar, de arbore dependentes: namque magna inuolucrorum mole obteguntur. Cortex ijs extimus colore constat in atrum
 rufescere, subdurius, tenax, callosusque, intus verò villosa materie compactus, quæ manibus extrita in capillamenta sibi-
 scit. Subtus est putamen triquetrum, villosum, barbatumque, cornu instar prædurum, anteriori parte humanam fere faci-
 em referente, eiusdem fere coloris nucleum continens, oui anserini magnitudine, intus concauum: substantia illi pinguis,
 crassitudine semidigitati, duriuscula, tenax, callosaque, albicans, sapore dulci, butyrum referens: tenui, sed aspero obiecta
 cortice, putaminis colore. Prouenit hæc arbor copiosa in India orientali, vnde ad nos affertur. Probantur recentes, eaque
 præsertim, in cuius concauitate liquor quidam dulcis includitur: siquidem hoc argumenta recentiores faciliè cognoscuntur.

Iuglandes cõ
 dita.
 Iuglandiũ vi-
 res Matthio-
 lo.

Nucis Indicæ
 confid.

II. NVX INDICA.

III. NVX MYRISTICA.



Cocos nucifera
Sindus



Myristica
Sindus
Spr

Excalfaciunt secundo absterge, humectant vero primo, emolliunt, lauigant, & dolores sedant. In cibis sumpta, etsi noxium admodum succum non gignant, ventriculo tamen laborē inferunt: Additur nucleus à tenui cuticula repurgatus, in medicamentis: quibus extenuata corpora refocillantur. Idem semen augent, & venereis excitant. Oleum, quod è nucibus Indicis exprimitur, vtiliter hemorrhoidum doloribus inungitur, oleo praesertim admisto, quod è persicorum nucleis elicetur: per se illud, lamborum, & genuum dolores mulcet, & ventris animalia pellit. Quod vero recentes nuces pressa stillauerunt oleum, densum est, candidum, & pingue: in summa substantia, qualitate, sapore, ac denique facultatibus butyro non dissimile, sed longè melius subministrat alimentum. Praestat idem inunctum ad neruorum dolores, quinetiam pectus lenit, non modo illitum, sed etiam haustum. Raucedini opitulatur, macros impinguat, semen auget, & induratos articulos emollit. Nux Indica latiore sagina corpora reficit: idcirco strigosas mulieres mirum in modum impinguat, & ad crassitiam reducit: haecenus de Indis. His succedunt MYRISTICAE, quae vulgo officinis ob odoris praesentiam Muscata, quasi moschata dicuntur. Haec afferuntur ex India (referunt ij, qui Indica littora perlustrarant) & proueniunt copiosissima in insula quadam nomine Badan: ibique eas proferunt arbores quaedam nostratibus persicis haud absimiles, angustioribus tamen folijs, ac brevioribus. Fructus nostratibus nucibus adhuc in arbore existentibus persimiles sunt. Siquidem primo crasso, ac viridi cortice conteguntur, cui deinde subest nux ipsa, duro satis putamine occlusa, nostra tamen tenuiore, Maci quem vocant, in reticuli modum circumuestito, eoque fracto nucleus exit, quem myristicam, moscatamve nucem vocamus. Id quod palam faciunt myristicae nuces, quae saccharo, aut siliquarum melle asseruata, integra ex India ad nos conuehuntur. Has, cum suo tempore maturescunt incola legunt certatim, & quam quisque potest vberius, quoniam sunt ibi omnia communia. Arbores abque omni cultu, suppediunt ante tantum natura, suos fructus edunt. Myristicae nuces suo maci, tanquam rete comprehensa, Venetia in officinis quam plurimis visuntur, duro putamine conclusa, auellanarum modo, colore subnigro: quo fracto compati subest globulus nuclei vice, & is est nux Myristica, quam usurpare solemus. Praeseruntur recentes, quae nullam praeserunt cariem: item ponderosa, sarcta, praepingues, humore redundantes, ita vt adacta acu confestim è vulnuscule exeat humor. Siccant (vt Mauritanii scribunt) & excalfaciunt ordine secundo completo. Adstringunt, oris suauitatem commendant, & fetentis animae virus commansa abolent: lentigines in facie emendant, visum acuunt, ventriculum & iecur roborant: lienem absumunt, vrinam cient, fluentem aluum sistunt, flatu discutunt, & frigidis quibuscumque vteri affectibus misce profunt: & vt in vniuersum dicam, facultas eis eadem, quae & caryophyllis. E recentibus prius contusis, & in cacabo calfactis, praelo exprimitur liquor, qui refrigeratus cera noua instar concrefcit, fragrantissimum spirans odore, neruorum & articularum diuturnis doloribus à frigore excitatis vtilissimus: quin & venereis inunctionibus maxime expeditur. Mulcet misce myristica nux ventriculi dolores, si trita decoquatur ex rhodomela senis vici, & aqua vite binis, quousque aqua euanescat. Namque si huiusce liquoris colati tria cochlearia quotidie dentur ieiunio, proculdubio iuuabuntur, vbi causa a frigido oriatur excremētis aut à flatu. Praestat eadem ad flatuosos vteri cruciatus hoc modo: Coquitur vna crassiuscule tusa, cum matricaria radicibus ex senis vicijs vini albi generosi ad tertias: deinde percolatur decoctum, & additis sacchari duabus drachmis propinatur. Contra venenosorum animalium ictum ex vino pota maxime praestat. Myristicas nuces veteribus Graecis ignotas fuisse illud fidem facit, quod Theophrastus, Dioscorides, & Galenus earum, quod in suis monumentis equidem legerim, nusquam meminerint. Quare & hic quoque asserere non dubitauerim, macerent (vni eius mentione iam ante diximus) Dioscoridi, & Galeno myristicae nucis florem esse nequaquam. Nam si ad


Oleum ex nucibus Indicis.

Nucis Myristicae confid.

Myristicae virca.

IV. NVCES VOMICAE.

VI. NVX METEL.



*Dioscoridis medicis
 Plin. lib. 12.
 Sp. hist.*

V. NVX METEL.




Nuces vomicae & metellae.


eos floris cognitio peruenisset, veri quidem similitudine est quod etiam fructus notitiam habuissent: quos, certo scio, ob sua admirabiles facultates & natura dotes, nunquam scriptis dissimulassent. Præter odoratas, eas etiam nuces memorant Mauritanici, quas VOMICAS & METELLAS vocant. Sed tam officina, quam medicorum vulgus, has magno errore confundunt, quod plerumque legitimas vomicas metellarum loco usurpent, & contra metellas nonnunquam vomicarum vice. Nam vomicas quidem eas appellant errore ducti, quæ lupinorum instar compressæ sunt, & tenui quadam lanugine contextæ, quarum esu canes necantur. Metellas vero quæ nonnihil extuberantes, quibusdam nodis, veluti parvus oculus per ambitum sunt reserta. At eorum lapsus facile deprehendi potest Serapionis testimonio, qui Abrahami auctoritate reddidit nucem Vomica colore inter glaucum & album, auellana paulo maiorem nodosamque. Quibus notis eas esse præditas constat, quas Selapsiariorum vulgus Metellas appellat, quæ nullo modo respondent legitimis Metellis à Serapione descriptis, huiusmodi: Nucis metella arbor, vomica arbori non dissimilis fructum gerit mandragora oleosum, hirsuto cortice, sapore non inuicundo. Quæ nota perspicuo adstipulanturque, quas Vomicas nuncupant: ea siquidem corticem habent hirsutum, oleosa sunt & gustus non ingratus: quin & facultatibus, non autem notis (ut quidam falso existimant Serapionem intellexisse) mandragora fructus referunt, cum auctore Serapione quarto refrigerent excessu, ita ut drachmarum duarum pondere esurata interimant, minore vero mensura temulentiam faciunt. Quos quidem effectus præstare videmus non modo in canibus, sed etiam in hominibus, quibus hæc data fuerint, quas Vomicas esse contendunt. Siquidem Serapio de Vomicarum facultatibus differens, nullam lethalem vim ei adscribit, sed quod tantum duarum drachmarum pondere cum anethi decocto, vel salu hausta, mirifice vomitum eliciant. Quamobrem dixerim ego illas, quibus callosa tubera super eminent, nodique visuntur, oculorum ferè instar, legitimas esse vomicas: Metellas vero, quæ pressæ & hirsutæ canibus necandis aptissime habentur. Ceterum uesiciuerim ego, quæ ratione ductus Leonhardus Fuchsius ultimo libello, ubi tantum stirpium imagines in exigua formam contraxit, dixerit nuces metellas hispidas esse fructus peregrina illius planta, quam antea magno volumine stramoniam vocauerat. Quod profus reclamare videtur Mauritanorum sententia, à quibus harum historias accepimus. In quibus censendus, me antea in errore versatum esse, nunc primum intelligo. Credideram enim nuces, quas Vomicas selapsia vocant, genuinas esse Metellas, nec id tamen sine adstipulantibus indicis. At qui cum diligentius legerem apud Auicennam Nucem Methel crassius, ac breuibus rigere aculeis, & semen ferè Mandragora simile, non potui me ipsum non accusare. Siquidem non is sum, qui (ut multi faciunt) velim mihi potius, quam veritati assentiri, & studiosa imponere posteritati. Hinc itaque factum est, ut priore mea renocata sententia, eorum profus inhaerem opinioni, qui nucem Methellam Stramonij fructum esse affirmant. Siquidem is præter id, quod nucis imaginem refert, & aculeis crassis, ac breuibus riget, mandragora etiam semen simile habet. Nec dubito, quin fructus ipse, ac etiam tota planta soporifera sint facultatis. Nam & ipsa planta facies solanis adeo similis, ut aliud nihil quam ipsum representet: verum eius folia opium redolent, & odor illius gravis, id quidem manifesto indicare videtur. Flores gerit albos, conuoluulvi maioris, siue leuis smilacis emulas. Fructus me spilorum magnitudine, circumquaque aculeatus umbilicatusque, viridi colore, in quo semen Mandragora simile. Scribitur nunc passim in hortis, ut alia peregrina. Frigida est Serapioni excessu quarto, obstruit, mulcet, vomitionis cetera: pota quatuor granorum pondere cum vino fortem facit ebrietatem, duarum vero drachmarum pondere hausta, statim interimit, nisi succurratur epoto butyro calido, vomitu, & aquæ calidæ balneis cum brachijs tum cruribus adhibitis. Ceterum hinc quoque conuenient alij, Vomica nucem, quam vocant, non esse genuinam: quandoquidem (si Auicenna, & Serapioni credimus) Vomica nux, Methella assimilis esse debet: sed aculeorum vice (ut Serapio inquit) nodus quibusdam reserta. Quibus non solum vulgaris vomica caret, sed nullam profus nucis faciem refert. Itaque hanc Caninam, non Vomica posthac appellare licebit, quod Canes deuorata, parua temporis mora interimat. Sunt & alia quadam nuces, quas quidam methellas putant, Myristicarum magnitudine & colore, suis nixi rationibus, de quibus quid in præsentia dicam non habeo. Ceterum valent Stramonie nuces sicca, in pulueremque contrita, ex vino hausta drachma pondere (ut quidam vir insignis mihi affirmavit) magno remedio ad colicos affectus, siquidem (ut ille ait) non solum morbum facile propellunt, sed prohibent quoque ne posthac affligat. Verum ego huiusce medicamenti hætenus minimè periculum feci. At qui non omnibus eadem est facies, quippe quod alia rotunda sint, altera parte sessiles, alia oblonga. Conteguntur hæc capillaceo quodam inuolucro, in acutum desinente, colore sublauro, ut quispiam videre poterit ex earum imagine, quam hic appingi curauimus, ut alij quoque Medica materia studiosi suam de his sententiam proferant. Tria nobis allata sunt genera prima. Nuces Farsalachi Constantinopoli vocari eas, scripsit ad me Gulielmus Quacelbennus, Medicus insignis, ut latius in Epistolis ante à nobis scriptum est. Ego vero hæc Indicas crediderim esse Auellanas, Serapioni Fausel appellatas. Nam illis omnibus notis correspondere videntur. Videtur hæc nux recte agnouisse Mattheus Syluaticus, quippe qui de his ita scriptum reliquit: Fausel, id est Auellana Indica, est simillima nuci Muscata: nisi quod pars vna est plana, altera eminentior, ita ut possit stare erecta, sicut calculus, qui in ludo dicitur pedes: in ceteris intus & extra nuci muscata similis est, sine odore, & sapore adstringenti. Nasitur hæc nux inclusa in quadam lanugine, seu potius capillaceo inuolucro Indica nucis modo barbato, simili folliculo serici. Multoties fertur inter alias species à Calicut, & ego vidi ipsam in suo folliculo: hæc ille. Auellana huiusce planta, (ut Serapio est auctor) est similis Neragil, id est Nuci Indica, proceritate tamè minor. Refrigerat quæ Fausel appellatur & valenter adstringit: proinde membra corroborat, confert calidis morbis quibuscunque tam bibita, quam exterius illita. Decoquitur in vino ad dentium dolores, & fluxionem, siquidem si eo calido foueantur, non solum eorum dolores mulcet, sed commotos firmat, gingiuas laxas stringit, & fluxiones inhibet. Illinitur quoque vtiliter ad palpebrarum scabiem. Additur in collyrijs, quæ parantur ad oculorum inflammationem. At qui præter id admirabile admodum est medicamentum aduersus dysenteriam, drachma pondere quotidie pota cum succo pomorum Cotoneorum, aut cum vino rubro austero. Sed alia est Auellana Indica, quam mihi dono dedit Iacobus Antonius Cortusus, patritius Patavinus, rei plantaria peritissimus. Siquidem hæc longe alia est, cum facie, tum magnitudine, ut ex eius imagine, quam hic appinximus, quispiam videre poterit. Contegitur hæc putamine exteriori cardamomi maioris putamini simili, sed duriore, compactiore, & colore magis obscuro: magnitudine Inguandis, viridi adhuc putamine circumtexta. In eo itaque Auellana concluditur, oblonga vtraque parte acuminata, dorso arcuato, & inferiori parte lata ac sessili, osse contexta duro, leui, castaneorum colore, in quo nucleum concluditur solidum, eiusdem ferè figura, tenui albæque membrana circumuestitus, dulci que intus medulla, & ipsa quidem albicans. At qui de eius facultatibus, nihil hætenus compertum habeo. Ceterum, dum hæc scribo, altera quoque comparuit Indica Auellana, superiori longe minor, ab eodem Clarissimo Cortuso mihi Patavio missa. Est itaque hæc, suo tegumento exempta, quod laue molleque est, colore subpallido, nec folio Palma crassius, glandis acuminata, aut Myrobalani flauis ferè figura, duro putamine, colore vulgari Auellana, oblongo intus nucleo, pumilam amygdalam referens, ut ex eius hic imagine omnibus palam fiet. Afferuntur ex India vna cum Myristicis nucibus. Sed quoniam scribenti mihi de Nucibus omnibus, ANACARDIA sese obtulere

VIII. AVELLANA INDICA.

IX. NUCULA INDICA.



XI. ANACARDIVM.



Avellana Graecis veteribus ignota, cum & ipsa in officinarum usu expetantur, de eâ quoque verba facere ex Arabibus testimo-
 monio, non quidem ab re fore duximus. Sunt igitur Anacardia (vt testis est Serapio) fructus cuiusdam arboris, auicularum
 uelut non dissimiles, unde & nomē, colore etiam nū cordis modo rufescente, cū scilicet de arbore decerpuntur. Inest ijs liquor
 melis crassitie sub cortice residens, sanguinis modo rubicundus, sub quo est & nucleus parua amygdala effigie. Nascuntur
 in Sicilia montibus, qui continuē igneas eructant flammias. Excalfaciunt, & exiccant tertio excessu. Praestat in medicina
 liquor, etsi myropala cōmuni errore & cortice, & nucleo utantur. Anacardia (vt aiunt) labantes reuocant sensus; memoria
 uicinatam resarciunt, & neruorum, & cerebri affectibus, quos frigida causa attraherit, auxiliantur: nihilominus sanguinem
 auerunt, & cutim vlceraunt. Quare Anacardia iuuenibus noxia sunt, cum & adurant, & deleteria facultate non vacent:
 cui tamen remedio est lac affatim potum, & oleum ex eorum nucleis expressum. Hactenus de varijs nucibus, nunc earum
 nomina sunt nobis reddenda. Noces communis vsus Graeci vocant κάρυα βασιλικά: Latini, noces iuglandes: Arabes, Iēz,
 Leuz, aut Giāuz: Itali, Noci: Germani Nüsse vnd Welschnusse: Hispani, Nozes: Galli, Noix. Nux verò, qua ex India
 deferunt, recentioribus Graecis, κάρυον ινδικόν appellatur: Latini, Nux Indica: Arabibus Neregil, Dabig, seu Giāuz. Ital-
 ice, Noce d'India: Germ. Indianische Nuss: Hisp. Noez de las Indias: Galli, Noix d'Indie. Nux deinde, qua μοσχό-
 κάρυον, μοσχόκαρύδιον, κάρυον μύρρις ινδόν; ἢ κάρυον ἀρωματικόν Grace, Nux myristica, aut Nux moscata Latine dicitur:
 Lusitane, lusbague, seu Giāuzbān; Arabicè: Noce moscada, Italicè: Moschar Nuss, Germanicè: Noez de especie, Hispani-
 ce, moscades, Gallicè. Nux praeterea, qua Arabibus Leuz alkei, seu alkee, Officinis ac Barbaris Nux vomica, & Italicè
 Nux vomica nominatur. Nux denique Arabica voce Lenz atrachaha dicta: Latina Nux metella: Recentioribus Serapo-
 nicè, Nux Methel: Italicè, Noce metella nuntupatur. Auellana Indica, Italis, Nociucle d'India. Quod autem
 κάρυον Graeci, Latini item Anacardium dicant: Arabes, Baladar, seu Beladur: Hispani, Anacardo.

Anacardij mentio, & vices.

Nomina.

Nux quemadmodum βαλάρις glandis, ita κάρυον nucis nomine permulti fructus nominantur: siqui-
 dem Athenaeo auctore, Attici omnes fructus lignoso cortice inclusos κάρυα nominant. Κάρυα quod
 put odoris grauitate offendat Plinio. Nux persica & basilica, quod a Perside a Regibus sit translata. Huius
 aliquot differentia a magnitudine & corticis duritie: sunt quae a magnitudine malis aequales Caballinae
 dicuntur, aliae mediocres, aliae minores, sic sunt quae ante festum Iohannis nec folia nec nuces ostendant.
 II. Nux Indica, fructum aliqui censent Palmæ Indicae, quae de re Garziam qui uolet, legat: videtur in ge-
 nere Caryotarum esse, quos Plinius Nicholaos appellat, aut quod Pateton nominat. Coccus Indica, Lac.
 Nux Indica, Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Lugd. Tab. Cas. Palma Indica, Garzia, Lugd. in append. cui & Ele-
 phantis. Aiunt referente Casalpino, crescente nuce colligi huiusmodi sub extimo inuolucro inter stami-
 na, qui nuce perfecta aquae rosaceae similis effunditur, mensura terni calicis ex singulis nucibus, qui in potu
 sit suavis. Arborem tradunt Palmæ similem, cuius folia per sex menses aquam continent: ramos primos
 vere amputari, mox largè, vt ex vitibus lachrymas exstillare, quae vasis excipiuntur, vt pro vino utantur, at
 triduo acscere: liquorem verò percoctum in melleam substantiam transire. Huius est & altera species,
 quae minor & Cuci Theophrasti a Cordo censetur: Nucula Indica quibusdam. III. Nux moscata, vide-
 tur Nux Indica Aetij, cuius etiam in suffragamento moscato meminit. Variat fructu oblongo & rotundo: quae
 oblongo est, mas censetur, & a Cordo in hist. Nux moschata mascula vel maior dicitur, estq; gustu ad-
 stringente, odore ferè nullo, cariosa magis, minus oleosa, affectibus ventriculi & capitis commodior.

Nux de quibus dicatur.

Nux Indica.

Nux moscata.

Auctor

Nux vomica. Auctor est Acoſta in Moluccis humiles eſſe & fructu puſillo naſci. Triplici donantur cortice, cortex enim quibuſdam Narcapthum Dioſcoridis cenſetur: medius verò, qui reticuli inſtar fructui circumjicitur, Macis dicitur: tertius nucem quam in Officinis habent, continet. IV. Nux vomica (quod vomitum dicitur) officinarum: hanc nec veram vomicam, nec merhellam eſſe Anguillara putat. Nux metella vera, vomica officinis, Lonic. Nux metella, Lac. Nux vomica, Lugd. Tab. Cord. hiſt. cui & Canina. Nux metella vulgo, & Fungus oriétalis Caſalpino, verba aſterifcis incluſa ex ſecunda commentariorum editione adieciſimus, maxime propter vomicas officinarum V. Hæc nux methel cenſetur Lug. Nux vomica vera ſeu metella officinarum Lon. Nux vomica, Lacuna: Hippomanes Crateuæ quibuſdã. VI. Quæ pro nuce Methel à Comẽtatore propõitur, ad Solanum, (licet Cardanus dubitet) referimus, cuius duo ſunt genera: alterum fructu rotundo & ſemine albo: alterum fœtidum, fructu oblongo & ſemine nigro. Primum Solanum pomo ſpinoso ſemine albo C. B. Stramonia ſeu pomum ſpinofum, Trag. Stramonia, Dodo. gal. & fol. Geſ. hor. Lac. Lon. Fuch. (cui & nux methel) Lugd. Stramonium peregrinum, Lycoperſicum Galeni, *βαρυκοκκαλον* Dioſdonzi, Lob. Hyoſcyamus Peruvianus, Cordo hiſt. Solanum ſpinofum, Lac. Tab. Hippomanes, Anguillare Geſ. hort. Nux methel Auicennæ, Tatonla Turcis, Paracocalon Græcis, corona regia, Nux improprie, pomum verius, Mandragoris potius quàm Solanis adnumeranda, Solanum Romanum Monſpelij, Solani pomiferi genus tertium, Geſ. hor. Nux methel ſiue Stramonia Alpino, Caſt. Cam. Malum ſpinofum Solanum manicum alterum Dioſcor. cui caput oliuæ, ſed hirsutius tribuit & Theophrastus ſimile fructui platani, Nux methel Auicennæ Caſalpino VII. SOLANVM fœtidum pomo ſpinoso, ſemine nigro, vel Stramonia fatida nigro ſemine, planta eſt fruticoſa, humanam ſuperas altitudinem, ex cuius radice fibroſa, alba, pro ratione totius plantæ, parua, caulis exſurgit vnicus, craſſus, inæqualis, ſtriatuſ, viridis, bicubitalis, altiorue antequam in varios brachietur ramos: hos folia cingunt ampla, quorum aliqua palmum longitudine excedunt & latitudine adæquant, quæ inſtar foliorum Xanthij laciniata ſunt, in acutiores tamen & longiores angulos deſinunt, viridia, venoſa, ex pediculis leuiſſimè villoſis dependentia, grauiſſimo & tetro opij odore prædita, quem etiam non trita, ſed ſaltem veſtibus tranſeuntium mota emittunt. Flores in extremis ramis dadrantales, ex calicibus quinquangulis viridibus, oblongis prodeunt, colore albi, calathi inſtar integri, qui in acuminatos angulos deſinunt, in quorum medio ſtamina quina, etiam lena (quæ extra florem non feruntur) quibus ſingulis ſingula capitula oblonga, alba, vt in lilijs albis reſident, quæ puluere etiam aſperſa. His ſuccedunt fructus copioſi, breui, anguloſo, craſſoque pediculo inſidentes, ex rotunditate oblongi, nucem iuglandem magnitudine æquant: horum exterior cortex viridis, vndique aculeis horridis cingitur, qui exſiccatus, ſpontè in quatuor ſecedit partes: in horum medio fungoſa membranofaque ſubſtantia, cui vndique ſemina depreſſa, lenticulæ forma, multo quàm in altera Stramonia, quæ ſemine albo eſt, minora, tanta copia inſixa ſunt, vt pomum reſertum ſit, quæ ante maturitatem candida, matura verò atra exiſtunt & amara. Naſcitur in Malauar vmbroſis locis & ſecundum aquas: noſtri in hortis colunt. Hoc primus Chriſtophorus Acoſta pictum propoſuit Datura nomine, ſic enim Luſitani & la Burladora, hoc eſt, facetum nominat: in Malabar Ynmaracaya: in Cauara, Datiro: apud Arabes, Marana: apud Perſas & Turcas, Datula dicitur. Germani *Igelſolben vnd ſinckende Stracheln* vocant. Maxima pars Medicorum ijs in regionibus legitimam Nucem Methel Arabum eſſe cenſent. Antiquè Solanum manicum Dioſcoridis: Nuci metellæ congener Cam. in Matth. Frigidam exceſſu tertio & ſiccam ſecundi ſine conſtituunt: pernicioſa idcirco qualitate non caret. Seminis triti dimidiam drachmam ex vino qui hauſerit, diu velut mente alienatus remanet, aut ridens, aut eiulans, aut dormiens, aut alteri colloquens & reſpondens, omnium tamen poſtquam ad ſe redierit immemor. Si nimia ſumatur quantitate, interimet: licet Gentiles ad prouocandas vrinas cum Piperẽ & folijs Betele id exhibere ſoleant: ſed alijs potius vtamur certioribus. Gentiles Medici ad curam eorum qui ſumſere vocati, vomitum prouocant, fortesq; ligaturas & fricationes adhibent, quæ ſi non ſufficiant, balnea ex aqua calida præſcribunt ad ſudorem mouendum: Porro à vomitu Vinum propinat, cui Piper & Cinnamomum admixcent. Semine per noctem in aceto macerato, dein exactè trito, vtiliter ilinuntur herpes miliareſ & eripelata ſerpentia, breui enim ſanari A Coſta monet. Sic & Radicis drachma ex vino pota ſomnum profundum inducit, in quo varia inſomnia & miræ rerum facies obuerſantur. Huius adhuc duo ſunt genera quæ flore, potiffimum à prædicto differunt, ſiquidem colore ſint flauo & ſecundum pediculos non nihil rubent. Sed de his in hiſtoria. VIII. Auellana Indica hic proponitur oblonga, cum ſuo inuolucro & eodem exuta: eiufdem varietateſ aliquot adduntur: dicitur Areca Scaligero, Vartomano, Lugd. Areca ſiue Fauſel, C. luſij: Fauſel ſiue auellana Indica, Syluatico: Fauſel, Serapioni: Frefel Auicennæ, Lugd. Fauſel Garziæ, Lob. Areca Caſt. Tab. Nuci Indicæ affinis fructus Indis Areca ſiue Fauſel Caſal. Auellana Indica Acoſta. IX. Nucula Indica Tab. Auellana Indica Lob. X. Mehenberbene, Lob.

VII. SOLANVM FŒTIDUM ſpinofum.



Auellana Indica. Huius adhuc duo ſunt genera quæ flore, potiffimum à prædicto differunt, ſiquidem colore ſint flauo & ſecundum pediculos non nihil rubent. Sed de his in hiſtoria. VIII. Auellana Indica hic proponitur oblonga, cum ſuo inuolucro & eodem exuta: eiufdem varietateſ aliquot adduntur: dicitur Areca Scaligero, Vartomano, Lugd. Areca ſiue Fauſel, C. luſij: Fauſel ſiue auellana Indica, Syluatico: Fauſel, Serapioni: Frefel Auicennæ, Lugd. Fauſel Garziæ, Lob. Areca Caſt. Tab. Nuci Indicæ affinis fructus Indis Areca ſiue Fauſel Caſal. Auellana Indica Acoſta. IX. Nucula Indica Tab. Auellana Indica Lob. X. Mehenberbene, Lob.

Mehenberbene.

Lob. Tab. Lugd. Est etiam ex Auellanis Indicis XL. Anacardium (a cordis similitudine & colore.) Auicen- Anacardium. na & Serapionis Lug. Anacardium Cord. hist. Lac. Tab. Anacardus, Cast. Cæfal. cui & Anacardium recentioribus Græcis, & Persæ fortè Plinij, Anacardum à Costa.

ΚΑΡΥΑ ΤΟΥΤΙΛΑ.

NUCES AVELLANÆ.

CAP. CXLII.

Nuces auellana, quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsa potæ, tussi veteri medentur: tostæ, & cum exiguo piperis potæ, destillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe vrsi perunctus, alopecij capillum reddit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, cæsiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, persuso syncipite.

NUX AVELLANA.

Auellana nux ideo Græcis Pontica dicitur, quod in Græciam (vt Plinius inquit) à Ponto primum allata fuerunt. In Italia tamen & in vrbana, & in syluestri genere numerosa reperiuntur. Caterum ex domesticis alia oblonga, alia rotunda sunt: veruntamen oblonga & præstantiores, & gustui gratiores esse constat, & illas præsertim, quæ putamine vehementer rubent, & fractu minimè sunt contumaces, quales sunt Vêctine, quæ tam suavis sunt sapore, vt pistacijs ferè comparari possint. Siquidem non omnibus Auellanis idem sapor repetitur, neque eadem pulpa gratia: siquidem alia prædulces ac mansu faciles, alia vero asperiuscula, & ingratiore, & mansu duriuscula habentur. Oblonga ferius maturitatem sentiunt, celerius vero rotunda: quæ propter illa vegetiori sunt nucleo, diuque perdurant. Syluestribus coryletu ferè innumeris scatent Tridentini montes, quæ oblongas pariter, & rotundas largiuntur nuces, tanta vberitate, vt eas rura saccis legant, vbi maturitatem senserint. Auellanarum planta, quæ corylus dicitur, raro procerâ spectatur, sed quæ ab ipsis statim radicibus numerosos emittat caudices, vt fructifera sit: arborefcit tamen, è quibus in summitate rami exeunt frondosi, ac virgæ non breuib, enodi materie. Folijs est Alnus similibus, latoribus tamen, crispioribus, tenuioribusq, & in ambitu serratis. Cortice vestitur tenui, albis maculis vario. Radix nititur minimè crassa, albis tamen, viuacibus, ac robustis. Florere hanc arborem non videmus, sed iulos emittere. Autumno, quo tempore folia decidunt, longi piperis figura, debescit in monte Vere ac defluit, cù folia profiliunt, tunc calyculata legamenta totidem quot iuli, supra pediculam exeunt, eorumque singulis nuces singula. Vestitur auellana nux putamen, viridi callosaque membrana, in extremitatibus tamen mollior, & subnigra in barba modam protrahitur: quo fit vt quibusdam hæc barba

Auellanarum confid.

Coryli hist.



ta nux appellatur, etsi genus reperiatur haud barbarum, sed adeo breui amictu, vt putamen anteriori parte nudum videatur. Nucleus primò molli calyculo innascitur, alba dicitur medulla, atqui subinde indurescente putamine, is adolefcit, tunc membrana circumplexa. Nuci nucleus quandoque albus, quandoque purpurea vestitur membrana, dulcis ferè Amygdalarum modo, sed duriore pulpa. Domestica habentur in hortis, vineis & viridarijs syluestres vero vbiq, proueniunt in siccis & secis itineris. Bilem nux auger, & dysenteria faciunt, vberius deuorata. Trita tamen, & ex mulsa hausta, tussi veteri medentur, & cum exiguo piperis hausta destillationes concoquunt. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe vrsi perunctus, alopecia capillum reddit. Putamina ipsa cruda in tenuem puluerem contrita, & ex vino austero hausta drachmam pondere, diarrhæam cohibent, & alba sanguinum profusio. Verum ad hoc, ac etiam menses cohibendos, sunt quæ magis prestare affirmant subrufescentem medullam, quæ putamini intus inbarens nucleum circum ambit. Aiunt nonnulli vsta earum putamina ac oleo excepta, cæsiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, persuso syncipite. Obscurum simplex rufficitas, serpentem prorsus obtorpescere, quæ Coryli virga percussa fuerit, & tandem emori: nec fortassis mirum, cum nux ipsa cum ficibus & ruta deuorata, venenis ac venenosorum animalium moribus resistat. Oleum è nucis expressum articulozum dolores inunctum inuat. Auellana (vt memoria prodidit. Galenus cum libra septimo simplicium medicamentorum; rùm secundo de alimentorum facultatibus.) plus habent essentia terrestris, ac frigida, quam Iuglandes: quin & plus præbent alimenti, siquidem densiores sunt, & minus pingues. Diocles auctor est, Auellanæ nux minus amygdalis alere, tibi in ventriculo supernat are, largius ostiat ac caput tentare, innocentes tamen esse virides, quæm arida. Nux, quæ à Græcis Pontica dicitur, Latini nux Pontica, nux Prævestina, & nux Auellana dicuntur: Arabibus, Agilez, seu Bunduchritas, Nociuole, Auellana, & Diocelle: Germanis, Haselnuß: Hispanis, Auellanas: Gallis, Noifilles Noyfette; & Melanis: Bohemis Vuoredi Lijzkony.

Auellanarum facultates.

Quædam nota...

Auellanarum vites ex Gal.

Nallius...

Auellana, quæ Februarij finè communiter flores eleganter rubegutes instar staminum ostendit, Heracleotica Theophrasto, quod ex Heraclea Ponti translata: dicitur Nux barbara, Plinio: Nux auellana seu Coryli recentioribus. Alia est sativa, alia syluestris. Satiua fructu est oblongo, rubro, hæc vera pontica veterum: alia fructu rotundo, eoq, vel minore vel maiore, hæc q, cit Auellanæ tertium genus Cordo in Dioscoridè, & Nux auellana maior Lugdunen. dicitur. Est & Corylus Macedonica, cuius nux in racemum congeruntur, monente Gesnèro. Habetur & Byzantina pumila apud Clusum & Tabernamontanum.

Hua

Huc referendæ ex Monarde Auellanz purgatrices, quæ colore & forma nostris respondent, quæ in nouo orbe insula D. Dominici reperiuntur, & Ben magnum medicorum vulgus vocare testatur.

Mora

MORVS.

CAP. CXLIII.

α Ομνια ἐξ
μορία ἢ δὲ ἐν
καμινία. I.
Morus siue
sycaminea
β Κα. ποιλίου
μαλακτικόν
γ λυτικόν.
i. aluum mol-
lit & soluit.

Morus arbor nota est: cuius fructus b aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus: decoctus autem æreo vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha item myricæ semine, iri, & thure. Immatura mori potius siccantur, trisq; acinorum rhois vice, obsonijs miscentur, vt cæliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit: latus ventris tineas excutit: his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur: tinguntque capillum, vitium & fici nigre frondib. simul coctis in aqua cœlesti. Succus foliorū cyathi mēsurā potus, contra phalangiorū morsus auxilio est. Feruefacti corticis, & foliorum iure, dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter mēsem incisa, facto ambitu scrobe, succum emittit, qui postride concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

I. MORVS.



II. MORVS ALBA.



Mori consid.
& historia.
Mori nigre.
descript.

Mori duo sunt genera, album videlicet, & nigrum, à fructuum colore ita appellata. Nam & nigra, & alba mora reperiuntur, quæ non solum colore, & magnitudine differunt, sed etiam sapore. Nigra Morus caudice plurimum est torto, gibberoque ac nodoso, et si nonnunquam satis spectata proceritas reperitur. Ramos edit crassos, in latum magis, quam sursum spatiantes. Libro vestitur crasso, lento, flexilique, cui materies subest robusta, & medullitus flaua. Radicibus nititur numerosis, magnis ac robustis, non tamen altè descendentes, sed quæ cospice tenus in ingentem sese diffundunt longitudinem, & præsertim alba mori, fortasse quoniam hac amplior, altior, proceriorque semper quam nigra habeatur. Nigra folia latiora crassioraque sunt, & ambabus in acutum desinentia, & circumquaque serrata, quanquam nonnulla, in utraque mora, vitiginea quandoque spectantur. Nigra fructum fere rubi, grandiore tamen & oblongiore, sanguineo succo per maturitatem madentem, qui contactu manus & os inspicitur primum viridus est, & subcandicans, dum adolescit rubens & per maturitatem niger. Idem dum rubet acido adstringenti que sapore degustatur, sed ubi maturuerit, adcomitescit, vt dalsu ferè fiat, modicam emansere austeritate. In alba autem bacca minores habentur, quæ ante maturitatem subvirides facta, austeriusculo sapore percipiuntur, ubi verò ultimam sensere maturitatis coctionem, mellem prorsus dulcedinem respiciunt, quo fit vt minime cum nigra facultate conueniant. Alba vbi que scætet Italia, ac etiam Hispania: ad alcedos bombyces sericeos tantum satæ. Nigra verò etiam vbi que, habetur, aut in hortis aut in viridarijs. Sapiētissima antiqui Morus dicta est, quod vltima inter urbanas arbores germinare incipiat. Amat amœnos tractus. Materie constat vtili operibus qua flexu constant, eique hac in re primatus datur. Aeternam arbitrantur ac validam, ideo furculas ex ea circosq; faciunt, vtunturq; ei in nauigiorum fabricis. Mora (vt prodidit Gal. lib. 8. simplic. medicam. item secundo de alimentorum facultatibus) matura quidem ventrem subducunt, immatura verò ubi aruerint, admodum restringunt. Itaque ad dysenterias accommodata sunt, item ad colicam, & quascunq; alias fluentes affectiones. Porro quod maturorum succus ad omni mediantem sit vtilis, propter eam videlicet, quæ iussu illi, adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia cōplura particularia

Mori vitæ
Gal.

que mediocrem exposcunt adstrictionem, competit. At immatura mora præter acerbisatem, sortita sunt & aciditatem, & rura adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam vim obtinere videtur, ex restringente, & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut & latus interaneorum tinea perimat. In alijs autem partibus restringens vincit, in folijs tamen, & germinibus quodammodo media vtrisque temperies est. Mora vbi primum mansa fuerint, ingesta citissime transeunt, & alijs cibus suo veluti ductu viam struunt, verum secundo loco sumpta, celerrime alijs vna cum cibus corrumpuntur: id quod etiam faciunt, si cum eduntur pravo in ventriculo humori occurrant. Quod si corruptionem non sentiant, corpus quidem humectant, sed non planè refrigerant, nisi actu frigida assumentur. Paucissimum ministrant alimentum similiter atque pepones, haud tamè vomitum uent, nec stomacho, ut illi aduersantur. De Moris autem, quæ rubi ferunt, libro 4. in Ruborum commentatione, Deo fauente, Latius differemus. Sed quoniam Mori folijs & vescuntur, & abuntur vermiculi, latinis recentioribus Bombyces appellati, qui admirabili natura speculo, & mirò ac ferè inexplicabili opificio nobis SERICVM vellus conficiunt, veniatque & ipsum in medicum vsum in Arabum medicorum antidotijs, non præter rationem fore duximus eius hic vires (quandoquidem non inuenio è veteribus Græcis, qui de hoc quicquam prodiderit) ex Serapione, & Auicenna describere. De eo itaque scribens Serapio, Bombyx inquit Serapionis verba latina reddidit Nicolaus Muttonus Mediolanensis) aureis iam filis agglomeratis, obscuroq; clausa carere, nec annuo vix spatio intacta. folliculum rostro cõtundit, ac protinus erumpit, vnde oritur Habrisen & Ken. Folliculo autem insolato, ut Bombyx, Seruè extinguitur, sericum aut seta inde efficitur: hæc ille. Caterum alterius, ac sane diuersi generis sunt animalia, quæ à Seruè populis aluntur ad Serica stamina comparanda, de quibus lib. sexto quinque regionum veteris Græcia ita scriptum reliquit Pausanias: Sed enim qua fila ad texturam vsurpant Seres, ea è nulla stirpe sunt. Nascitur in eorum terra vermis, quæ Serem Græci, ipsi longè alio appellant nomine: magnitudine est id insectum dupla magnitudine scarabei, cætera aranei simillimum. Hoc Seres accuratè nutriunt, cellas illi tum aestiuas, tum hybernas aptè fabricantes. Pedibus (habet vero octo, quot & aranea) sub arboribus testile opus facit. Annos fere quatuor panico alitur: quinto demum (neque enim longior contingit vita) viridem apponunt arundinem, quo pabulo bestiola illa maxime delectatur, eo satius saginatur. Educunt inde è visceribus staminum volumina: hæc tamen Pausanias. Bombycinum vellus (ut scribit Serapio) medicorum nonnulli in caliditate, & siccitate symmetrè posuerunt. Cordi laudatissimum. Ipsum enim roborat, in eo sanguinem expurgat, vnde medicamentis cordi potissimum conducentibus admiscetur, præsertim compositioni ex Moscho, Græcis Διάμοσχοῦ inscripta. Vritur, quòd siccitas reddidit, leuigari, & tenuissime comminui possit, quanquam id nonnullis improbetur, ne vires per ignem minuantur. Caterum minutatim inciditur, admixtumq; vniuersis potissimum Succino & Corallio, facile contunditur. Alij vim per coctionem extorquent, decoctoque à colatura in mortario, alicui vaseculo, medicamentum a sole calente infundunt, quo ad bellè macerentur, atque imbibantur facultatemque omnem attraxerint, indeque exiccant, & in vsum reponunt: nec plura Serapio. Scripsit quoque de Bombycini velleris facultatibus Auicenna libro, de viribus cordis, his verbis: Sericum ex fortibus letificantibus est, excellentius tamen est crudum, sed quandoque calidè in vsum & coctum, potissimum si non fuerit tinctum: est autem calidum & siccum in primo: corroborat itaque cor ac etiam visum quemadmodum & memoriam: quin etiam naturales operationes mirifice exhilarat, qua in re crudum eo longè præstat, quod ignem fuerit expertum, tametsi coctum quandoque in vsum veniat, verum antequam in insectorum cornu immersum inficiatur. Excalfacit sericum, resiccatque ordine primo, exiccatur, & attenuat ea natura dote, ut cor recreet, letumque efficiat. Quapropter laxat, firmat, purificat, & illustrat spiritus: neque enim facultas vni tantum assignatur spirituum generi in vna tantum dispositione, sed ei proprium est, omnibus, æquè spiritibus opem ferre, ita ut spiritus tam vitales & animales, quam naturales rescicere valeat. Caterum quamuis negauerit Auicenna decoctum sericum, & fullosum coloribus imbutum in medicos venire vsus, Mesues tamen in eo serapio, quod de pomis inscribitur, id sericum admittit, quod cocco legitime sit insectum. Idque similiter inserit in ea medicamenti compositione, quam Alchermes ipse nuncupavit. Arbor, quæ μορῆα ἢ οὐράμωρος Græcè, Latine Morus appellatur: Italicè, Moro. Eius fructus Græcis οὐράμωρος, Latini Moram dicitur: Italis, Moro. Arabes vtrunque Tut, seu Thut nominant: Germani, Maulberbauit vnd Maulder: Hispani, Moras del moral: Galli Meurier & Meure.

Bombycis historia.

Seres Pausania.

Bombycini velleris vsus.

Nomina.

Morus Sycamine Theophrasto, satiuæ est & syluestris, seu ratione fructus nigra & alba. I. Morus nigra fructu est maiore & suauiore, quæ in arborem excelsam excrescit, aliquando humilis remanet, & Chamæmoros dicitur, augmenti tarditate tantum discrepans: diuersa tamen est ab hac Chamæmoros cuius Clusius in hist. Panhonica meminit. Dicitur recentioribus Morus & Morus nigra: in quibusdam officinis, a Meum ita distinguitur. Morus celsa ad differentiam fructus Rubi, quæ etiam Mora dicitur. II. Morus alba siue candida, in qua folia instar foliorum vitis laciniola & sinuata sæpissime obseruauimus in vrbe Patruina.

a Meum ita distinguitur
 παλικομορῆ
 ἐφ' ὅσον ἐστὶν
 τῆς τοῦ φιλ-
 λῆος μορῆα. I.
 folijs Moro
 valde similis.
 At Cat ὁ φῶ-
 ρος refer-
 τὸν παλικο-
 μορῆ. Illud ve-
 ρὸ, quod se-
 quitur, è mol-
 to lacte abu-
 dans, in om-
 nibus exem-
 plarib. deest.
 b ὁ μορῆ li-
 quor. c Meum
 οὐράμωρος.

Συκομορῆ. SYCOMORVS. CAP. CXLIV.

Sycorum, aliqui etiam sycaminum, id est, morum, vocant, cuius fructus sycorum etiam propter inefficacem gustum, appellatur. Arbor est magna, fico similis, a frondosa, multo lacte abundans: folijs mori: pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut fico, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis sine granis interioribus: quod non maturefcit nisi vngue, aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: vbi protentè fecundo, restibilique iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo vtile est, sed perquam exilem præbet alimoniam: stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere lachryma excipitur, quæ siccata, & in pastillos coacta, fictili vase reponitur. Vis glutinat, discutit collectiones concoctioni repugnantes: bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones: celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomoræ, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Sycomorus (ut Theophrastus est auctor lib. 4. capite 2. de plantarū historia) arbor est moro nostrati similia, quippe folio magnitudine, aspectuque proxima. Fractum præter cætera peculiariter gignit: non enim germinibus, non ramis extre-

Sycomori historia. ex Theophrasto.

min, sed

I. SYCOMORVS..



II. SYCOMORVS SEV Ficus Cypria.



III. PSEVDOSYCO- MORVS.



Melior quatuordecim stans

Sycomoroni mentio ex Gal.

Vulgaris et rot.

miu, sed caudice pomu parit magnitudine ficus, & visu par-
 tum, succo atque sapore caprificis sane simile, verum longe dul-
 cius, granisque internis omnino carens, multitudine numero-
 rum, maturis tere nequit nisi scalpatur. Scalpatur autem vngu-
 bus ferreis: & cum scalpta poma sunt, ad quartum diem ma-
 turescunt: hisce ablatis, alia, & alia ex eodem loco subnas-
 tur, terno ita, & quaterno partu copiosa. Lactiosa arbor ad-
 modum est, & materies (quod sit solida, robusta, & nigra) ad
 multa comoda existit. Hac inter ceteras arbores id sibi pro-
 prium vendicauit, quod casa continud viret, neque siccatur
 vnquam, nisi aqua obruatur. Eaue propter & lacubus, &
 stagnis demergitur madefactaque in profundo siccatur, cumq;
 sicca omnino fuerit, superfluit atq; innat: haltenus Theo-
 phrastus. Hanc quam appingi curauimus, Sycomoroni imaginem
 misit ad me clarissimus Medicus, & rei plantaria studiosissi-
 mus, Vlysses Aldrouandus Bononiensis, vir quidem non solum
 doctrina, sed etiam liberalitate, & humanitate preclarus. De
 Sycomoro disseruit Gal. lib. 2. de alim. facultatibus, vbi ita scri-
 ptum reliquit: In Alexandria Sycomoroni plantam vidi vna cum
 fructu, parua, candidaque ficui adsimilem. Is fructus nullum
 habet acrimoniam, exigua dulcedinis est particeps, estque fa-
 cultate humidior quodammodo, ac frigidior, veluti mora: quin-
 timum inter mora ac ficus medium iure quis ipsum collocarit,
 atque hinc nomen ipsi inditum esse mihi videtur. Ridiculi
 namque sunt, qui fructum hunc ob id aiunt sycomora fuisse no-
 minatum, quod paruis ficibus assimiletur. Ipsius autem na-
 scendi ratio ab alijs arborum fructibus quodammodo est dif-
 fer: haud enim ex primoribus ramulis, ac germinibus, sed ex pra-
 grandibus ramis, caudiceq; enascitur. hac Gal. Sycomoro similes

est, ut loco citato memoria prodidit Theoph.) quae in Creta vocatur Cypria ficus: nam & ipsa fructum edit, caudice, ramisque
 crassissimu. Differt tamen a priore, quod germen quoddam emittit sine vllis folijs, radice, simile, cui fructus prepilatur.
 Caudex arboru magnus, & populo alba proximus, cuiusq; folia vlnu representant. Quater anno fructum fundit, sed nul-
 lum ad maturitatem perducit, nisi pomo ipso immaturo inciso, emissioq; lacte. Dulcedo ficibus non absimilis, & interna
 grossu plane conueniunt: magnitudo autem pruni est: hac Theophrasti verba. Quae sanè maximo sunt argumento, hanc quo-
 que plantam in Sycomori genere annumerandam esse. Caterum aperte hallucinantur q, qui putant arborem Sycomorum
 esse, quae plerunq; visitur in monachorum claustris vulgo vocatur, & in templorum plateis, vbi mortuorum cadauera hu-
 miantur, nusquam alijs in Italia (quod sciuerim nouerimq;) hac planta sponte nascitur. Arbor est procera, folijs vulgaris loti lo-
 gioribus, & in acutum desinentibus. Baccas edit virides, e cuius baccis monachi verticillos faciunt, quibus funiculo tran-
 10 du malieres suas numerant preces. Hanc (vt Bellunensis castigauit) Azadaracht appellat Auicenna, quam deleteria facul-
 tate participem esse prodit Fen sexta quarti, vt latius lib. 6 dicemus. Arbor, quae Συκόμορος Graecis, Latinis Sycomorus, &
 20 sic Aegyptia nominatur: Arabibus, Mumeiz, Iumeiz, Alumeiz, seu Giumeiz: Itali, Sicomoro, & Fico d' Egitto: Baby-
 loni Morsse. Pseudo sycomorus, Italu, Sicomoro falso: Mauritauu, Azadaracht.

Vulgaris er-
 ror.
 Azadaracht
 Nomina.

Sycomorus duplex à Dioscoride & Theophrasto proponitur: altera fructum ex caudice ramisque
 grandioribus emittit, haecque Aegyptia est ficus: altera ex trunco germina sine folijs emittit, qui-
 bus ficus adherent, & haec Cypria est ficus. I. Sycomorus seu ficus Aegyptia, Cast. Lugd. Rannolf. Syco-
 morus in Aegypto, Cord. in Diosc. Sycomorus, Lac. Lou. Dod. gal. & fol. Lob. Alp. Tab. Sycomorus vete-
 rum, Ficus Pharonis vulgò in Syria, Morus Aegyptia Theophrasti, Ges. hor. Sycamine Theophrasti, Cast.
 II. Sycomorus seu Ficus Cypria, Sycomorus in Cypro, Cord. in Diosc. Ficus Cypria, Rauuolfio, & ex eo
 30 Lugd. In hanc classem referas Ficum Indicam Theophrasti, de qua ex Clusio Lugd. & Taber. & Mangle
 Ouedi videtur. Sic & Ficus Nigritarum, folijs ficus, fructu duorum pedum, semine fabae magnitudine,
 figura renis: apud Theuetum, ex quo Lugd. historia sumpsit. III. Pseudosycomorus, seu Zizyphus can-
 dida. Sycomorus Itolorum male, Cord. in Dioscorid. Azadarecht Auicennae, Sycomorus falso Mo-
 nachis. Siliqua Bellonio, Sebastum seu Mixus alba quibusdam, alijs Laurus Graeca Plinij, Ges. hor. Zizypha
 candida Monspeliensium Lob. (cui & arbor Paradyfi Lusitanis) Lugd. Azedarach, Dod. Azadarac, Arbor
 sancta Monspeliensibus, Lotus alba Pelicerio, Clus. hisp. Pseudosycomorus Tab. Cast. cui & ficus Aegy-
 ptia falsa, Pistacia syluestris: Tubet Casalpino.

Σύμα.

FICL

CAP. CXLV.

Fici maturae recentes stomachum laedunt, aluum solunt, sed facile contracta ab eis fluxio sistitur: sudo-
 rem euocant papulasque, sitim sedant, calorem restinguunt. Siccis natura excalfaciendi, a vires alunt,
 sed sitim magis stimulant, aluo vtilis: rheumatismis ventris, & stomachi contraria: gutturi autem, arteria,
 renibus, vesicæ, & ijs, quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissi-
 mz: seruefactæ cum hysso, & potæ, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisque pulmonum vitis co-
 40 ueniunt: aluum molliunt rusæ cum nitro, & cnico, dein manducata. Decoctum arteria, & tonsillarum
 inflammationibus gargarizatu prodest: b cum hordacea farina caraplasinatis miscentur, & in muliebres
 forus cum fenograceo, & pisanæ. Cæterum cum ruta coctæ, torminibus infunduntur: coctæ, illitaque
 duritias discutunt: parotidas, & furunculos emolliunt: panos ad maturationem perducunt, maximè ni-
 50 tro, ini, aut calce addita. Crudæ, si cum antedictis tandantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia
 purgant: cum atramento sutorio, deploratis fere tibiæ fluxionibus, & cacœthicis vlcibus meden-
 tur: quæ & cum vino decoctæ addito absinthio, & hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinuntur. Cre-
 mata cum cerato sanant perniones, pruriginis, sonitusque, si crudæ terantur, & sinapi, liquoreque aliquo
 exceptæ auribus instillantur. Tam syluestris, quàm satiuæ fici c lacteus succus coaguli modo lac contrahit,
 concretumque dissoluit, vt acetum: exulcerat corpora, meatus aperit: soluit aluum, vuluam recludit cum
 60 detrita d nuce Graeca potus: menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrenica cera: podagricorum
 cataplasmatum cum farina fenograci, & aceto vtilis: lepras, lichenas, vitiligines, vitia cutis in facie, psoras,
 vicia in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ percussis à scorpione, venenatorum i-
 70 ctibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum additus
 c Meū & Ca-
 i, & eis τὰς ε-
 μὰς λύσεις
 μίγνεται. i.
 admiscetur &
 hordeacea fa-
 rina.
 c Meū & ijs
 i liquore.
 d Meū μετὰ
 ἀμυγδαλί-
 νου. i. cum amyg-
 dalo. sed Cat-
 i cum amylo-
 e Meū μετὰ
 μύκας, & cum
 habet.
 f Meum. ou-
 κείνη καὶ τὰ
 τραχιά τῶν
 εὐφρασίον. i.
 ficosa, & aspe-
 ra palpebra-
 Cat. καὶ τὰ
 βραχέα. i.
 breuia.
 g Addit Cat-
 ou μέλιτι
 cum melle.
 h Meū καὶ
 πικρῶν ὀφθαλμῶν
 καὶ μεγάλων
 ἰκτερίων. i.
 sinus cucu-
 losos & ma-
 gnos.

retuæ in formicationes tollit cū adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idē præstat succus è teneris
 ramis syluestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tussi exprimentur, & siccatus in vmbra
 ponitur. Et lac, & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramu-
 li ficulnei, faciem afferunt decoctionem. Lac efficiunt, quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo
 iurculo, spathæ loco, moueatur. Grossi, quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ illita, strumas, nodosque
 omnes emolliunt. Crudæ c formicas, verrucas, & thymos, nitro, farinaque additis, tollunt. Folia eadem
 possunt. Illita cum sale, & aceto vlcera in capite manantia, epyrictidas, & futfures sanant: ijs f ficosa extu-
 berationes, & palpebrarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficus, folijs cauliculisque, candidæ vitiligines
 perunguntur: faciunt ad canum morsus, g & vlcera, quæ ceria, id est fauos, vocant. Grossi cum syluestris
 papaueris folijs ossa extrahunt, furunculos cum cera discutunt: contra muris aranei morsus, & scolopen-
 80 dræ venena, cum eruo & vino illita, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris, quam satiuæ lixiuium,
 crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est, & inueterascere: siquidem inter caustica
 intelligitur. Gangrænis prodest, namque expurgat, & consumit, quæ excrescunt, eoque sic vtendum est:
 spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones verustas, h & sinus
 canicularum exedentes, magnosq;, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & o-
 ras comittit, non secus atq; emplastra, quæ cruentis vulneribus injiciuntur, enæma vocant. Bibitur ad di-
 sciendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recen-
 ter colatum, addito olei exiguo: cœliacis, dysentericis, per se cyathus datus prodest: neruorum vitis, con-
 uulsonibus, commodè illinitur ex oleo, vtpote quod sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalagio-
 num morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quænum: omnia tamē adstringunt.


I. FICVS.

II. CHAMÆFICVS.



III. FICVS INDICA.

FICVS INDICAE FRV-
ctus.



Ficorum con-
sideratio, &
historia.

Ficorum varia
genera.

Indicae ficus
lib. ex Theo-
phrasto.

mus, turbinatos, & varios: siquidem alij pyri faciem representant, alij sessiles sunt, alij verò inter hos mediij. Differunt etiam colore: quippe quòd alia alba, alia nigra, alia purpurea, alia virides, alia subrusa, alia pallida, & alia variegata colore spectentur. Mollis praeterea sunt pulpa, granis minutis referta, quae esui maxime placent. Habentur in hortis, vineis & viridarijs, in Italia & Hispania copiose. Ea praeter ceteris laudatur, quae matura rimosa cute visuntur, & quae pulpa pinguedinis dulcedine, atq; sapore ceteras antecellunt. Maturescunt Autumno, Augusto, & Septembri: sed Crophi estate perficiuntur. Deponuntur matura, & in sole siccantur cratibus, non solum ad ciborum, sed etiam ad medicamentorum usum: siccata lignis asservantur. Atqui longè à nostratibus distant Indica Ficus, de quibus Theophrastus lib. 4. cap. 5. de historia plantarum

plantarum ita scriptum reliquit: Indica autem regio arborem ficum vocatam fertitur, quae e ramis & radices dimittit singulis annis, ut primo volumine retulimus. Dimittitur autem non ex nouellis, sed ex anniculis, atque etiam vetustioribus. Illae se terra coniungentes, ceu sepem circum arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent. Radices autem nascentes euidentissime a ramis discernuntur: sunt enim albiores, hirta, tortuosaeque, binaque fonde foliata. Item arbor comam supernam lasciuam gerit, totaque formicato ambitu pulchre orbiculatur, & magnitudine ne vehementer excellit, quippe vimbram bino stadio facere fertur, & crassitudine caudicis pleraque, ultra quam sexaginta graduum orbem colligere, magna vero ex parte quadraginta. Folium pelta non minus habet, fructum admodum paruum, magnitudine ciceris, ficui similem, quamobrem Graeci ficum eam arborem appellabant. Paruum mirum in modum fructificat, non tantum pro magnitudinis desiderio, verum etiam omnibus rebus. Nascitur arbor hac circa Acesuam amnem, haec Theophrastus. Atqui eadem serè à Strabone lib. 15. sua Geographia, & à Plinio lib. 12. ca. 5. de Indica Ficu scripta reperio, sub qua, ut idem scribit Plinius lib. 7. ca. 2. turina condantur equitum. Caterum ea longe ab hac differre videtur, quem nos, quod ex Indis occideratibus allata sit, Indicam ficum vocamus: siquidem hac nec caudice, nec ramis, nec foliis, nec fructu generatam Indicam ficum refert, de qua scripsere Theophr. Strabo, ac etiam Plinius. Hanc Indi suo idiomate TVNE vocant. Ego vero eandem plantam esse censerem Opuntiam Plinio appellatam, quod circa Opuntiam proueniat, ut Theophrastus inquit his verbis: Haec Indica Ficu simile, vel potius quodammodo mirabilius, si quid ex foliis radicein dimittat, qualem circa Opuntiam herbam esse quandam enarrant, cui datum est, ut mandis suauitate possit. Nam ut nobis manifesto constat, abscisso ab hac planta vno tantum folio, humiq; ad medium vsque sepulto, prognatis e se radicibus paulo post folia superius ex ipso prodeunt, adeo ut hac serie foliis e foliis prodeuntibus, in arboris speciem hac planta assurgat, sine caudice, sine ramis, germinibusq; ut ex appicta hic imagine quispiam cernere potest. Adeo ut inter natura miracula hac planta merito recenseri possit. Folia ei crassissima sunt, ita ut quandoque pollicis crassitudinem excedant, e quibus alba, tenuia, longa, acutaq; prominent spinae, etsi sine spinis nonnulla visa sint. Parit hac planta illis in regionibus foliorum summitatibus fructus ficubus nostratibus similes, sed crassiores, & qui anteriore parte in corona speciem desinant, colore ex viridi purpureo ascente. Interior pulpa perinde est ac in nostratibus, verum adeo succosa rubicundaq; ut sanguineo succo, mororum modo manus inficiat. De viribus & qualitatibus, quid veri, certiq; asseram, sanè non habeo: referunt tamen, qui Orientales Indias sunt peruagati, eorum esu & urinam sanguineam reddi: id quod multis non exiguum terrorem incussit, qui horum vires ignorarunt, non sine Medicorum & consociorum risu. Peregrina in Europa est arbor, & in Italia à multis in hortis colitur. Vnicum tantum folium cum fructu mihi dono dedit Angelus Crottus Brixianus, cuius hic imaginem appingi curavi, quod e Prouincia secum attulerat Viennam. Audio quoque in quibusdam Italia locis haberi hanc plantam, quae ficum proferat, quod tamen haecenus mihi in Bohemia agenti, videre non licuit. Habui quidem ego, dum Caricia agebam, hanc plantam, hominis magnitudine, sed nunquam edidit fructum. Caterum ut ad nostrates ficus reuertat, & ut praeter id, quod e Dioscoride proditum est, earum omnibus facultas innotescat, & temperamentum: quin & ut omnes cognoscant, quod praebant alimentum, quamq; utilitatem ac noxam inferre possint, ea paucis edisseram, quae ex Galeno deprompsi, qui in primo lib. 2. de alim. fac. sic scriptum reliquit: Ficus tametsi minus prauis succi gignant, quam cateri omnes non modo fugaces, sed etiam autumnales fructus, non tamen id vitium prorsus effugere potuerunt. Caterum hac ipsis insunt bona, nempe quod comestibiles sint, & facile in totum corpus peruadant, penetrantq;: nam & abstergendi vi pollent haud obscura: cuius gratia post ipsarum usum nephritici multas arenulas exserunt. Cum porro omnes autumnales fructus exiguum corpori alimentum praebant, minimè omnium ficubus id usu venit. Carnem tamen non compactam, neque firmam generat, ceu panis & suilla caro, sed turgidulam, & subinane, peluti faba. Quin ventrem flatibus implent & ipsa, & non medietatem hinc profecto molestiam intulissent, ni etiam celerem descensum essent adeptae, cuius beneficio, cum celeriter percurrant, status quem excitant, non diu manet, atque ob id minus cateris autumnis fructibus ledere consueuerunt. Caterum matura ficus immaturas non mediocriter antecellunt, quod & in aliis quidem omnibus ceruitur fructibus: quanquam nã tantum in illis discrimen existit. Siquidem ad plenum matura ficus paulo minus omni prorsus noxa vacat. Et sequenti tempore, ubi vuarum facultates recenset, sic inquit: Ficus, & vna quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumq; prauis succi habent, praesertim cum exactam maturitatem fuerint adeptae. Porro quod ipsa nutrant, maximo argumento sunt ij, qui vinearum fructum custodiunt: siquidem hi cum duos menses, solis vuis ac ficubus, quorum custodia praesunt, vescantur (nisi forte panis quidpiam cum illis edant) obesi tamen, ac pingues fiunt. At caro, quae ex ipsis gignitur, haudquaquam est firma, ac densa, quemadmodum ea, quae ex carnibus fit, sed laxa est, ac praehumida: ob id celeriter etiam, cum vesci ipsis desierint, contrahitur ac confidet. Idem etiam de Ficubus facis differens loco prius citato, ita scribit: Carica multiplicem quidem habet utilitatem, siquis tamen largius esitauerit, ab eis offenditur: non admodum enim probum sanguinem gignunt, quapropter pediculorum quoq; agmen eas comitatur. Incidendi extenuandiq; vim habent, quae & ventrem ad excretionem irritant, & renes expurgant. Iecori autem, lieniq; inflammatione obsessis sunt noxia, quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulci omnium ciborum, ac potuum. Obstratis autem illis, aut scirrhotentatis, ipsa ex sese nihil profunt nec obsunt: sed medicamentis incidentibus, ac extenuantibus, & abstergentibus mista, non mediocriter auxiliatur. Ideoq; nonnulli medicorum in dictis lienis ac hepatis affectibus exhibent ipsas longè ante cibum cum thymo, aut piperè, aut zingibere, aut pulegio aut satureia, aut calamintha, aut origano, aut hyssopo. Ad eundem etiam modum, si carica cum alio quopiam eorum, quae facultatem habent acrem, aut omnino incidendi aut extenuandi, assumantur, non solum sic affectis, sed sanis quoque utiles erunt. Siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, apertos esse non agrotantibus modò, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto ficus cum sale extenuante, aceto, & garo preparatas vulgò comedunt, quod id utile esse experientia didicorint. Verisimile autem est ipsorum nonnullos medici cuiusdam consilio adductos, ficus hoc modo primò comedisse, deinde eam notitiam ad vulgus dimanasse. Qui vero cum cibo aliquo incrassante ficus, & caritas edunt, nò mediocriter offenduntur. Item lib. 8. de simp. med. facult. idem Gal. ita scribit. Ficus arida vim habet exalfacendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente: habent verò etiam partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idonea sunt, quae tumores duros concoquunt, statim verò etiam ea discutunt: atque ipsa per se illa eiusmodi vim obtinent. Sed & decoctum earum eiusdem vtique natura est. Verum vbi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: vbi verò plus discutere, hordeacea: panis horum in medio est. Sed hac magis sunt propria tractatus de medic. comp. & rationis curandi, verum in praesentia hac de carica nouisse sufficiat. Porro scire oportet, quod quae pinguius sunt, magis possunt concoquere: quae verò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Caterum quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli, non solum consistentia, sed & facultate. Porro ficus virides comepta, propter admistam humiditatem,

Indica ficus altera, & eius historia.

Tunc. Opuntia.

Ficum facult. ex Gal.

Caricam vlt.

faculta

Ficus arbor
& eius vires.

Caricari vi-
res Matth.

Fici præcoces
quo mango-
nio fieri pos-
sint.


Ficus pumila
quomodo ha-
beantur.

Nomina.

facilitatis sunt imbecillioribus: subducunt tamen alium utraq, tum humida tum sicca. Ficus arbor calide tenuioribus partibus temperatior est, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus, valenter enim eorum vterque calidus est. Itaque non mordicat tantum, aut abstergit vehementer, sed & vicerat, & era vasorum reserat, & formicas, quas myrmecia vocant, eicit: quinetiam purgare potest. Porro ficus agrestis, quam erincum Græcè (Latine caprificum) nominant, tum liquor, tum succus ad omnia quam sativa valentior est. Sed & crada, hoc est, vami earum adeo sunt calida, tenuiumq, partium temperamento, ut carnes bubulas duras, si coquendis adiciantur, friabiles ac teneras efficiant: hac de ficubus Galenus Catonibus nobis experimento compertum est, caricis duas aut tres, nocte vna in aqua vite maceratas asthmaticos iurare, qui mane eas deuorauerint. Democritus præcoces ficus fieri pollicetur, si oleo, & columbaceo fimo arbor illinatur. Et contra, serotina, si prima grossi, cum faba magnitudinem excessere, detrahatur. Ficum arborem item atque laurum, è celo fulminibus non icti compertum est. Ficus arbores, ut perquam pumila habeantur, & in vasculis super fenestris spectentur a viatoribus, in aede decuere mangones: abscondito Fici surculum verno tempore, paulo ante germinationem, prominente iam corculo, & subinde contorto manibus cacumine, in quo vis vase terra referto surculum ipsum serito cacumine inuerso, circa quem bordis miliq, nonnihil inspergito, & terra deinde obruito, demissa extra tellurem resecta parte. Fit. n. hoc mangonio, ut inde ramuli enascatur paruuli, qui circū vas se se fundentes, breui admodum tempore ficus optimos edant, pumila perpetuo manente arbore. Ficulneo lacte vermiculosa sanantur aures: & ficulneis foliis facile affricto citatur hæmorrhoides. Pani quoq, probe maturatur, illitis caricis decoctis, additis lilij, aut Iridis, aut Althea radicibus. Fici fructus Σύκα Græcis, Latine Fica, & Ficus appellantur: Arabibus, Sin, Fin, seu Tin: Italis, Fichi: Germanis, Feigen: Hispanis, Higos: Gallis, Figuier: Bæbenn, Fykstepei: & Ficus Indica, Italis, Fico d India.

I. Ficus multa cognomina Plinius affert, vel à figura, vel à gente, vel autore deriuata: verum variant & forma & colore tunice, quæ nigra, subrubra, ex viridi candicans, vel flaua est. Fructus immaturus, èl. v. b. Grossus siccus i. x. d. x. a. e. r. i. n. caricæ: grana ficaria, πικραμίδας vocant, frumeta Plinius. Floris vestigium tū in summo, qua etiā in internā cavitatē foramen patet. II. Chamæficus, siue humilis ficus Lob. Chamæfycæ arbor. Lugd. Ficus pumila, Dod. III. Ficus Indica spinosa: Carduus Indicus & Euphorbium Io. Leonis, Clus. in Cord. ad Dod. hist. Gallican. Ficus Indica, quam aliqui ridiculè Opuntiam vocat, Ges. hot. Ficus Indica quibusdā Pala Plinii, Lac. Tune, Lon. Lugd. Ficus Indica, Dod. gal. & fol. Lob. Cast. qui ab Oponte loco natali Opuntiam dici scribit. In Insulis Peruvianis & Hispaniolæ aliàs spōte prouenit. Indorū Tuneficifera, Aduers. Ficus Indica Theop. Cas. Ficus Indica spinosa, Tab. Anapallus Bellonii: Opuntia vulgo, Camerario. Huc referenda est illa, quam Indorū ferruminatricem Aduersaria & Opuntia osteocollon, quod artuum fracturis & luxationibus mirè proffit, Lugd. hist. vocat, quæ foliis similibus, sed fructu superiore minore, ex auctore historia generalis Indiæ refert. IV. Ficus maritima, planta est in

IV. FICUS MARITIMA.



maritimis proueniens, quæ ex radice cōpacta vnum alterumve emittit foliū subrotundū, pallidè virescēs, ex quo (vt in Ficu Indica fit) alia supernè prodeūt, aded vt hac serie foliis è foliis prodeuntibus quasi ramosa fiat. In foliorum summitatibus prodit flos paruus oblongus, modo vnus, modo duo, colore rufescente. Hanc, ob similitudinem quā cum Ficu Indica habet, in hāc classem retulimus, Ficumq; maritimā nominauimus, quam Neapoli ab ingeniosissimo & doctissimo pharmacopæo Imperato Ferrando nomine Serrulariæ accepimus: quibusdam tamen & Opuntia marina dicitur, de qua plenius in historia nostra vniuersali, cum figura à nemine quidē hactenus proposita, fideliter eā exprimat, vt eam doctissimus D. Io. Rudolphus Saltzmannus Argentinenſis Medicinæ candidatus, nostri amatissimus, vna cum aliis plurimis pro noua nostra historia, animi causa (cum hoc studio vt & omnium Medicinæ partium, maxime delectetur) depinxit.

Persea.

PERSEA.

CAP. CXLVI.

Persea arbor
is confid. &
historia.


PERSEA arbor est in Ægypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem, in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translataque in Ægyptum, mutata natura in cibos receptam.

Quemadmodum superius in malorum commentatione prodidimus, Persea arbor Ægyptia non est (vt putat Marcus Virgilius Florentinus) nostras Italica malus persica, sed planta plurimum disfidens ab ea, vt & Dioscoridis, & Galeni testimonio facile probari potest: quādoquidem v. v. trāmq, sed vt alterā ab altera diuersam, diuersis capitibus tradiderunt. Hac (vt lib. 4. de plant. hist. c. 2. scribit Theoph.) arbor est Ægypti, aspectu magna, formosaq, folio, flore, ramo, totaq, figura potissimum pyro vicina: nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructū abunde parit, omniq, tempore perficit: quippe nouus anniculū semper occupat. Maturitas anniuersariorū afflatu cōscitur: reliquum crudiorē auferunt, atq, recidunt. Est magnitudine pyri, figura oblonga: amygdala modo, colore herbida. Nucē intus habet, vt prunum, verum lōgē minorē molliorēq, caro eius suavis, ac prædulcis mādatur, cōcoctūq, facili, & innocua, etiā largiore cibo sumpta. Radice arbor exuperat, tū lōgitudine, tū etiā crassitudine, multitudinēq, Materie cōst. at robusta, dura, visūq, decora, veluti lotus: quapropter ex ea & simulachra, & lectulos, & mensas, & reliqua similia factitāt. Ex his igitur Theop. verbis, si Persea nota, ac delineationes cū nostra persica malo diligenter cōferatur, liquido patere arbitror, has plantas inter se diuersas esse. Huius imaginē suis coloribus ornatā dono mihi dedit Tridenti Odoardus Polonus Medicus, & rei plantaria studiosissimus, qui Syriā & Ægyptū peragravit. De Persea verba faciens Gal. lib. 2. de alim. facul. hac memoria cōmendauit: Hanc etiam plantā vidi in Alexādia, qua & ipsa magnis arboribus est annumeranda. Tradunt autem fructū huius apud Persas adeo

Persea mēuo
ex Gal.

I. PERSEA.

II. PERSEA PLINII.



noxium esse, ut edentes interimat: in Aegyptum vero translatum, in esculentum miscere, & pyrorum malorumque modo, Persea mian: cum quibus & magnitudine convenit, est ari. Eade recensuit Gal. lib. 2. de comp. med. secundum locos, ubi de cephalae cura: tione agens, sic inquit: In sola Alexandria Persea arborem vidi, at non in alia Romanis subdit a gente. Quidam per sion ipsam appellat, aiuntq; in Persis lethalem eius arboris fructum esse, cum tamen in Aegyptiorum regione innocuus existat: ha- denu Galenus. Ex cuius etiam verbis palam esse crediderim, perseam a persica malo prorsus dissidere, cum in tota serè Eu-ropa persica malus frequentissima proveniat. Quin & ex ijs facile dixerim, Columellam errasse, quod existimaverit, per- sica esse poma, quae a Persis ad Aegyptios allata Persea dicuntur, ut libro cultui hortorum dicato his versibus testatur: Columellae lapsus:

IBERIS.

Tunc praecox bifera descendit ab arbore ficus, Armeniisq; & cerealis, prunisq; Damasci Stipantur calathi, & poma qua Barbara Persis Miseras (ut fama est) patrijs armata venenu. At nunc expositi parvo discrimine lethi Ambrosios praebent succos, edlita nocendi.

Arbor, qua reperitur Graeci, Latini similiter Persea nominatur: Italis, Persea Graeca vocis imitatione dicitur.



Persea duas proposuimus figuras, cum diuersas at- bitremur. I. Matthioli ex quo Lonicerus & Lugd. sumptere: & II. Clusii quae historia Hispanica habetur, quam Perseam Plinii & Plur. cēset, quem secutus Lob. & Lugd. historia. Arbor est Pyro similis perpetuo vi- res, ramis ex viridi pallecentibus, inq; latum diffusis: folia Lauri latifolij superne virentia, subtus cinerei co- loris, firma, nervis per obliquum discurrentibus, ma- sticata cum adstrictione linguam mordicantia: flos ra- cematum compactus, pallidus, ex sex foliolis composi- tus: cui succedit fructus Pruno similis, auetus pyri mo- do oblongus, niger, iucundo sapore: nucleum cordis effigie cōtinens, gustu castaneae aut Amygdalae. Vere florere, autumno maturum fructum ferre in regni Va- lentini Iesuitarum monasterio, ubi vnica arbor ex A- merita eo delata, monet Carolus Clusius in suae histo- riae Hispanicae lib. 1. cap. 2. Author herbarii Lugdunen- sis suae figurae fructum adpinxit eum, quem supra pro Cuciophera exhibuimus: qualem fructum & nuper Danus quidam nobis ostendit.

Iberidis et- put nō habet antiquus ma- nuscriptus co- dex, nec alia, quae vidi un- placia

Lapidium Iberos

Iberis Stenand

IBERIS.

CAP. CXLVII.

Iberis, siue cardamātica, folia habet nasturtii, vere virentiora: canlē cubitalē, aut minorē: in incultis na- scitur. Estare lacteū florē promit, quo tēpore efficacior est. Radices duas nasturtio similes hēt calfa- cientes, & ada-

adurentes. Ipsæ enim ischiadicis cum salsa axungia emplastri modo vtilis, quaternis horis alligatz, vt dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lapa locus perungatur.

Iberidis con-
sideratio, &
historia.

Vidimus primum Iberidem, quam nobis indicauerat Iulius Alexandrinus medicus Tridentinus, qui nunc ob præclaræ sui ingenij & doctrinæ dotes, apud Sereniss. Ferdinandum Regem Roman. artem medicam exercet, extra ciuitatem Tridenti, vbi vulgò dicitur alle Laste, effigie nimirum, qua describitur à Dioscoride, ac aliis pluribus Græcis auctoribus, Huius Galenus in simp. censu nusquam separatim meminit, sed hæc, & Lepidium non nisi nomine differre prodidit. Quod etiam idem testatus est lib. 10. de comp. med. secundum locos circa finem, de coxendicum curatione agens, vbi ex Damocrate sic inquit: Damocratus extat libellus, qui Clinicus inscribitur, in quo versibus Iambicis, quemadmodum solus, de tribus des- serit medicamentis: ac primo quidem de eo disserit, quod ex herba constat, quam ipse Iberidem appellat, quod ad coxendi- cum dolores commendauit. In Iberide Medicum quædam amicum suum curatum fuisse ait herba, quam (vt dixi) ipse Da- moocrates Iberidem vocat, vt qui tantum visu herbam cognouerit, nomen autem eius nullum audierit, cum etiam id ipsum ignorauerit is, à quo eius vsum didicerat. Porro ex notis, quibus eam representat, videtur iberidem appellare, quæ à Græcis lepidium nominatur, appellatione ducta à regione, in qua amicus eius curatus fuit. Describit autem ipsius formam quæ- minibus:

Iberis, & Lepi-
dium idem.

Herba hæc vbiq; multaq; frequens nascitur,
Monumenta iuxta antiqua, muros, & veteres,
Tritasq; quondam publicè pedibus vias,
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola.
Semper virescens, folijs nasturtij
Florentibus vere, attamen maioribus.
Caulem cubitalis longitudinis gerit
Paulo minorem, aut rursus ampliore: ab hoc
Aestate pendent folia, donec multa hyems
Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &
Deiecta, & exiccata depereant gelu.
Adnata radici tamen vernæ alia.
Aestate florem fert colore lacteo,
Multum tenuem, variumq; valde, cauliculus.
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
Visum ferè vt fallens, oculos quoque effugiat.
Odorem habet radix at inde acerrimum.
Verò similem quàm maximè nasturtio.

Iberidis ca-
put additi-
tium.

Monachoru
lapsus.

Iberis altera
Paulo.

Barbari, &
Ruell. lapsus.

Nomina.

Huc illud etiam accedit, quod Galenus item loco citato, Hygieni Hipparchi auctoritate, Iberidem, & Lepidium idem esse testatur his verbis: Si coxendicum dolores leuare est animus, herbam Iberidem, quam aliqui Lepidium vocant, aut nasturtium syluestre colligito. Ex cuius certè sententia asserere non dubitauerim, Iberidem apud Græcos eandem esse cum Lepidio. Vnde perspicuum est, hoc Iberidis caput huiusce primi voluminis calci accreuisse nimia vel librariorum, vel medicorum curiositate. In quam sententiam cum antedictis causis, ea ratio me potissimum deducit, quod constat, huius primi voluminis calcem, non esse legitimum locum, in quo Iberidis historia fuerit collocanda: quandoquidem eiusmodi herbas Dioscorides li. 2. ordinatè disposuit, ac de eis disseruit, vbi priuatim Lepidio, quod Damocratis Iberide existimamus, propriam assignauit sedem. Idcirco rectè Paulus Aegineta Lepidium Iberida etiam appellari scribit, & ex tertio ex calcæcentium ordine esse, ac nasturtio viribus proximum. Et lib. 3. in ischiadis curatione: In totum, inquit, ischiadicos restituit sanitati iberidis herba vsum, quam lepidium quoque appellant. Quare apertè hallucinari deprehenduntur monachi illi venerandi, qui in Mesuem commentarios scripsere, cum expressè contra Galeni & Pauli auctoritatem, & contra rationes, quas superius adduximus, aliud à Lepidio Iberidem esse contendant. Quos tamè excusatos habeo, utpote qui fortasse maius studium rebus diuinis impenderint, quàm vt certam simpl. med. cognitionem assequi potuerint. Dixi de Iberide sententiam meam non hic solum, sed etiam diffusius in Epistolis nostris Medicinalibus, ad Barrolozum Maranthã scribens, quam qui impugnat volunt, nostris imprimis respondeant argumentis, & deinde suas exordiantur opiniones, si quas habent meliores. Ceterum non ignorandum est, Paulum præter Iberidem, de qua nunc agimus, alterius etiam meminisse ab illa longè di- uersæ, eiusq; item vsum ad ischiadas commendasse. Quod eius verba demonstrant, quæ eodem loco ita sonant: Quæ verò a- pulnos Iberis fruticosa nascitur similibus lauri folijs, & multò amplioribus, respondere multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in alijs quoque diuturnis affectibus. Huic planè ad stipulatur Lepidium, quod Plinio lib. 19. cap. 8. hu- paucis describitur: Exit lepidium in cubitali altitudine, folijs laurinis. Quibus sanè notis satis apparet, hoc secundum Iberidis genus, vel lepidij dicamus, quod lauri folia mittit, eam esse stirpem, quæ hodie passim in hortis frequens nascitur, à quibusdam Piperitis, ob vehementem eius acrimoniam dicta. Itaq; manifestè aberrarunt viri alioqui clarissimi Barbari, & Ruellius, cum lepidium illud esse putauerint, quod vulgus herbariorum Raphanum rusticum appellant. Veruntamen folia, quæ huic raphano insunt, verbasco maiora, & helenio equalia, manifestè declarant, his legitimum non innotuisse lepidium, nisi forsitan lepidium Raphani nomine acceperint. Planta, quæ Iberis, καρδαμύνη, καὶ ἀρχοκράδανος Græcis dicitur, nomen Latinum est Iberis, & Lepidium: Arabicum, Seit aragi, Aseit aragi, seu Scitharegi, & Hansab: Italicum, I- beride, & Lepidio: Germanicum, Wilder kress: Hispanicum, Nasturtio montesino: Gallicum, Chasse rage, Passerage seu- uage, & Nasitort sauage: Bohemis, Steuniik.

† Quod caput hoc de Iberide accreuerit in Dioscoride, eiq; adscriptum sit, illud maxime corroborat rationes in commen- tario allatas, quod reperti sunt vetustissimi Græci codices, in quibus hoc caput non legebatur.

Iberidis icon diuersa est apud Matthiolum, alia enim ipsius est inter figuras minores, huic similis: alia vero habetur inter maiores figuras folio Nasturtij, quam libro secundo capite de Lepidio inuenies.



PETRI ANDREAE
MATTHIOLI MEDICI

Senensis Commentarij,

IN LIB. SECUNDVM PEDAGII DIOSCORIDIS
ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.


IN PRIMO, charissime Arce, libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & nascētibus ex eis succis, lachrymis, seminibusque disseruimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cæpa, sinapi, intelliguntur. Idque ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Εχίνος θαλάσσιος

ECHINVS MARINVS.

CAP. I.

Marinus Echinus stomacho, ventriq̄ue utilis est: urinam cit. Huius testa cruda inallata commodè medicamentis admiscetur, quæ p̄foras abstergunt. Cremata verò cinis sordida vlcera expurgat, luxuriantem carnem reprimit.



Echinus marinus notissimus est, q̄s præsertim, qui in Italia tam Tyrrheni, quàm Adriatici littora accolunt. Ingentem Echini mari-
Echinorum numerum vidimus nos, dum placidis mare ageretur vndis, in alveo magni portus Ciuitatis vetera in Ro- ni confid-
mano litore, nigris horrentibus spinis. Alios verò vidi ex Pirano Istria oppido allatos, his longè maiores, purpureo colore
60 suffusos, quos Echinometras appellauerim, quòd scripserit Aristot. lib. 4. de hist. anim. c. 5. hos ceteros magnitudine excedere.
Habentur circa Toronem Echini marini candidi testa, spina, & ouo: augeri forma productiore, quàm ceteri, soliti: spinis
paruis, nō rigidis, sed mollioribus. Genera (vt idem inquit) Echinorum plura sunt. Primū, quod cibo idoneum est, in quo
que ora appellatur, magna, esculēt aq̄, consistūt. pariter in maiore corpore, & minore: nā nouelli adhuc, paruiq̄, pleniūscu-
li illis cōstant. Secundū, ac tertiuū spat hagi, ac brissi, qua genera pelagia sunt, raraq̄, inuentu. Ad hæc, qua Echinometra ap- Echinome-
pellatur (quasi matrē, aut matrīcē dixeris echinorū) qua quidē omnes magnitudine excedit. Genus itē aliud est minutum, tra-
spina longis prædurisq̄, gigni in alto gurgite solitū, quo nōnulli ad destillationes vrina medicam. vtūtur. Quo fit, vt Paulū Iouii error.
loniū plane aberrasse crediderim: quippe qui suo de Romanis piscib. libello, Echinometrā Aristoteli destillationib. vrina spi- Echinorum
ralari, nō aut huiusce minuti genus, memoria prodiderit. Corpus Echini clibani forma visitur, priore, atq̄, nouissima per- descriptio.
te spissū, & cōtinens: cetera verò nō continuum, sed simile lātēna, cui nō obducta mēlranā est. Omnium maxime a natura
muniti

muniti sunt, utpote qui testa vndiq; spinis circumvallata celebantur, quibus vtuntur perinde ac pedibus: hi enim nitibandi mouentur, sedemq; permutant, cuius rei argumentum est, quod semper algam spinis ihplexant gerant. Enant autem, ut quod caput appellant, & os, echinis versum in terram sit: quod verq; ad excrementi exitum deputatum est, id supra habetur, quod idem omnibus turbinatis, patellisq; euenit: partus enim de inis petatur necesse est, vnde fit, ut os inuersum ad partum sit, excrementum vero superius parte prona testa contineatur. Dentes quini Echinis omnibus sunt, cani intrinsici: inter quos caruncula quadam interiaccens lingua officio fungitur, mox iungitur gula, deinde venter in partes quinque distinctus, perinde ac si plures numero ventres hoc animal habeat: sunt enim omnes distincti, pleni, vacantis materiae, & ex uno stomacho dependent, in vnumq; ofium excrementi finiunt. Caro echinis circa ventrem nulla, sicuti in vniuerso corpore. Sed quae oua appellantur, numerosiora testa adherent, membranulis singula obuoluta, & paribus distincta interna: nigra etiam quaedam circa ab ore fusi sunt: guntur, nomine adhuc nullo appellata. Sed cum non vnum, sed plura genera Echinoxum sint, omnium partes quide eas omnes sortiuntur: sed oua appellata, nec omnes cibo idonea, & parua admodum continent, exceptis ijs, qui vada incolunt. Tradunt scintiam maris Echinos praesagire, correptisq; operiri lapillis, mobilitatem pendere stabilientes: quod vbi videre nautici, statim pluribus anchoris navigia infrenant: hac ex Aristotele. Memmius vtriusq; Echini Galenus, marini scilicet & terrestris, vnicum tantum cap. lib. 11. simpl. medic. sic inquit: Erinacei vtriusque tum marini, tum terrestris corpus totum vsum, cinerem efficit facultatis tum extergentis, tum detrahentis. Itaque eo quidem & ad excrescentia, & sordida vsi sunt vlcera. Animal, quod ἰχθυόσχητος Græcis, Latini Echinoxum marinum appellatur: Hispanis, Erizo de la mar: Italis, Riccio marino.

Echinorum
vires ex Gal.

Nomina.


Ἐχίνος χερσαίος.

ECHINVS TERRESTRIS.

CAP. II.

Terrestris erinacei corium combustum alopecis cum pice liquida aptissime illinitur. Assiccatum corpus, & cum aceto mulso potum, renum vitiis auxilio est: item aqua, quae cutem subiit, conuulsionibus, elephantix, & male habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiecat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eisdem vsus vtilissime reconditur.

ECHINVS TERRESTRIS.



Echini terre-
stris consid.
& historia.

Terrestris Erinaceum vulgari notitia animal in Italia est. Duplici constat genere, canino scilicet, ac suillo, quemadmodum & Tassus. Differentia dignoscitur ex eorum rostro: id namq; alij suillum, alij vero caninum habent. Raro ex cauernis exeunt, nisi noctu, quo fit, ut nocturno tempore a venatoribus plerunque capiuntur. Maturentibus vuis per aestatem, & autumnum vineas petunt, vbi ad vuas, quae solum attingunt, accedentes, acinos pedibus diducunt. Hic constitit in terra, in orbem se conglomerant, & super eos se volutant, itaque spinis affixos portant in specum. Eodemq; ad syluestrium arborum poma a ventis decussa, aut maturitate decidua, in cauas arbores gerunt. Inter quadrupes solus Erinaceus volatiliu more testes renibus haerentes habet, eaque propter velocissime coit, non quidem aliorum quadrupedum more superueniens, sed erectus coniungitur propter spinas. Vbi praesens venantem, statim in globum se contrahit, ne quid comprehendere possit praeter aculeos: itaque oblatrantes deludit canes. Assusa conglomerato aqua, illico soluitur is, & ingreditur. Frigidi temperamenti animal Echinoxus est, excrementis compluribus redundans, quibus aculei nutriuntur. Idcirco eius carnes in medicamentorum potius, quam in ciborum vsu sunt expetenda: terrestres enim cum sint, egre concoquantur, & minimum sane praebent alimentum. Praestat terrestris Echini combusti cinis trium drachmarum pondere, additis Agrimonia vncia, & internarum membranarum vetriculi gallinarum quaternis drachmis, ad eos qui dum dormiunt in lecto mingunt: datur hic puluis ex vino vesperi cum se cubitum recipit affectus. Vires longe plures ijs Echinoxus reddidit Rhsis libro de sexaginta animalibus. Veruntamen quoniam illa, quae ibi leguntur, potius apocrypha, quam fide digna semper existimaui: ideo hic ea adnotanda non duxi. Caterum qui sunt harum rerum cupidi, eo se conferre poterunt, vbi diffusus tractantur. Erinaceorum generi adscribitur HISTRIX, quod forma sit illi non absimilis, quanquam corpore longe maior: quin & longioribus aculeis, firmis, tenuissimae mucronatis vnde quaque riger: in specubus moratur, & noctu magis, quam interdum ad pascua exit. Latet hoc animal hyeme in cauernis, ut vsus, totidemq; diebus fert vtero factam. Itaque histrix intendit cutem, & tunc suos iaculatur aculeos: quo fit, ut non modo canes, sed quandoque venatores feriat. Combustis cinis potus (vt Plin. est auctor) partus conceptus vinct. Animal quod ἰχθυόσχητος Græco sermone: Echinoxus terrestris Latino vocatur: Arabico, Cusfud: siue Caused: Italicis, Riccio terrestris: Germanico, Hechel, aut Ygel: Hispanico, Erizo: Gallico, Herison.

Echini terre-
stris facult.

Hystrix me-
tio.

Nomina.

Ἴπποκάμπος.


HIPPOCAMPVS.

CAP. III.

Hippocampus marinum animal est exiguum: cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, auraxugia, seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

HIPPO-


HIPPOCAMPVS SIVE EQVVLVS MARINVS.



20 **Q**uoniam non desunt scriptores, (vt Marcellus inquit) qui in locustarum genere Hippocampum recensant, quibus
 ad multos in medicinis vsus eum commendent: eorum tamen haecenus reperi neminem, qui peculiaribus notis eius
 historiam tradiderit, effigiemq; exprompserit. Ceterum sunt, qui credant Hippocampum id nomini sibi ascivisse ab er-
 ca, quae in hortis olera in campis vero herbas vniuersas, & arborum frondes depascuntur, quasq; proprie Graeci κάμπας vo-
 cant: quippe quod illis fortasse forma ac facie sit persimilis. Ad haec non desunt qui Dioscoridem mirentur, quod scripserit,
 Hippocampum exiguum animal esse, cum tamen nomen plerunq; magnitudinem innuat: ἵππος enim Graecis grande signi-
 ficat, vt hippofelinum, hippolapathum, hippomarathrum clarissime demonstrant. Veruatamen non ob id Dioscoridem
 impugnandum existimant, nec pariter alios qui de eo idem scripserunt: quoniam licet comparatum hoc animal marinis be-
 30 lauis, alijsq; in aquatiliu genere grandioribus, paruum videatur: si tamen eo cruciarum generi comparatur, quarum ima-
 ginem formamq; reddit, & à quibus nomen accepit, grande sanè fuerit. Vnde inclinavit quandoq; animus eum esse Hip-

Hippocampi
 consideratio
 & opiniones.

HIPPOCAMPVS LOCUSTAE GENVS.



40 **H**ippocampum, qui piscatoribus Aquileiensibus vulgò vocatur Falopa. Corpus huic inest locustae modo in longitudinem pro-
 tensum, capite & ceruice oblongis: chelis minimè bifidis, sed acutissimis solidisq; aculeis rigentibus: pedibus sexdenis, quo-
 rum decem, qui circum os habentur, scorpionum caudas extremitatibus referunt, ceteri vero vt in locustis spectantur. Cor-
 50 pora capite gerit sex, quorum postrema in latum funduntur. Dorsum est flexuoso erucarum modo, adeo vt in sicco carum fere
 modo perambulet. Caudam gerit latam, alis pluribus se pandentem, rigentibus vndiq; aculeis, maculis duabus purpureis
 nature artificio insignitam: adeo vt his notis, quasdam villosas crucas referat in nigro rufescentes, quae pari forma sub ter-
 ra degunt in hortis & agris, olerum & segetum radices erodentes. Has Tridentina rura vocant vulgò Caene. Atanienses
 vero, quod villosa sint, Orsolane: qua appellatione planè videtur vulgus illud securum Columellam, qui has crucas hirsu-
 60 tas nominat. Proueniunt haec in Tridentino agro frequentissima, exeuntq; è terra plerunq; imbrium tempore: nam quae
 prope herbarum radices in cauernulis se condunt, facile aquarum ingressu suffocantur. Quapropter olitores eas venantur
 aduenientibus pluuijs, irrigantq; hortos, vt postea exeuntibus mortem inferant. Quo fit, vt si vera referunt, qui dicunt
 Hippocampum è locustarum genere esse (id enim videtur inter antiquos fateri Plinius lib. 32. cap. 11. & inter recentiores
 Marcellus Dioscoridis interpres) nullum aliud marinum animal sese offerat, quod illud magis referre valeat, quam id de
 quo diximus. Sunt & alij, qui pro certo velint, Hippocampum esse pisciculum illum, vel potius mariuum monstrum, qui
 quibusdam Dracunculus: alijs vero Equiculus marinus vocatur, cuius nullus in cibus vsus, flexuosum equum Hippocam-
 70 pum vertentes. Visitur plerunq; hic in piscarijs foris inter minutiores pisciculos, semidrodanti longitudine. Caput illi
 est equinum, quemadmodum & collum: rostrum oblongum fistula in modum cauum, oculi rotundi perspicue: à superio-
 ribus duo oriuntur aculei, qui in mare in crines desinunt: frons illi glabra, syncipus crinitum est, quemadmodum superior
 80 celli

Equiculi ma-
 rini confi-
 deratio

collis pars. Id quod in feminis non visitur, namq; ijs sinciput tantum trinitum est. Verum crines in vivis tantum videntur, extinctis enim illico decidunt. Pinnam habet in dorso singularem, qua ad natandum regitur. Ventre est albicante, extuberanteg, sed femina ventricosior est. Mas sub ventre rimulam habet, qua excrementa excernuntur, femina vero prater hanc alteram dedit natura, excludendu ovium idoneam: cauda est quadrata, reflexaq; vnci modo. Totum corpus ex cartilagineis circulis compactum est, & vbiq; seri aculeatum. Namq; duplici vtrinq; a capite at caudam vsq; aculeorum serie rectis lineis spectatur, nec disparibus aculeis collum praeingitur, ac per longum recta secatur. Horum opinionem, sicut & aliorum, cur rationibus, aut auctoritatibus comprobem, cur item contra reprobem, sane non habeo, cum haecenus nunquam in probatissimorum auctorum monumentis legerim, qui per notas ipsum delineaverit: nam etsi Plinius lib. 36. cap. 5. dum Praxitelis, & eius filij Cephisodori admiranda percurrit marmoris, videti asserat in maxima dignatione Ca. Domitij delubro in circo Flaminio Neptunum, Thetis, atq; Achillem, Nereidasq; supra delphinos, & hippocampus, cum tamen hac poetica fabulosaq; sint, nullam certe ijs adhibendam esse fidem existimaverim. Multa enim & pictorum, & sculptorum adhuc extant signenta, vbi locis innumeris marini visuntur equi piscium in morem natantes, quibus tantum equinis sit facies, reliquum vero corporis partium numerosis squamis contextum, atq; per quam amplius ad natandum munitum piscium modo, partim vero serpentis instar praelongum ac sinuosum, magna quidem, non parva corporis mole. Quod si fabulosa sequamur, hoc facile Plinio Hippocampus esse probabimus. Ceterum tamen si notatum nihil de Hippocampi facie ex auctorum monumentis haberi possit, inclinatur tamen animus, hunc veram esse Hippocampus, cuius hic cum maris, tum feminae imaginem damus, cuiusq; historiam descripsimus, & praesertim cum non pauci doctissimi viri, qui a quilibet historis describunt, in eadem persistant sententia. Hippocampi vires recensuit Galenus libro 11. simplicium medicamentorum, sic inquit: Et Hippocampus animal illud marinum si totum vsseris, alopecij prodesse proditum quibusdam est, ipsumque videlicet deficcantis esse facultatis, & tenuium partium, aut certe eius cinerem: quem quidam unguento amaracino commiscunt, quidam pici liquida, alij veteri adipsi suillo: hac Galenus. Ceterum longe alia Hippocampi vires retulit Aelianus lib. 14. cap. 20. de hist. animalium: cuius verba hic subijciam: Rei piscatoriae niteperiti homines, dicunt Hippocampi ventrem in vino decoctum si quis dederit cuiquam bibere, eum primo ex ea potione acerrimo singultu affici, deinde rursus vehementer torqueri, at enim nihil excreare, sed & superiorem ei ventrem intumesce, & calidos vapores in caput sursum efferri, ac inde per nares minutatim disfluere, & pusculentum odorem reddere, simul & oculos eius sanguine suffusos ignei coloris flagrantia laborare, & eorundem oculorum genas inflari, & vomendi quidem cupiditate ardere ferunt, verum nihil emittere. Quod si natura cuicerit, hunc tamen, periclitata prius morte, in oblivionem, & dementiam incurrere: sin in ventrem inferiorem delapsus fuerit, ipsum omnibus iam membris captum evitae excedere. Ex morte porro qui evadunt, mente capti aquam summo studio persequuntur: hanc enim ipsam idcirco expetunt aspere, tum stillantem audire, quod sane eius agilitudinis leuationem asserat, & somnum conciliet. Itaque ad perennes fluvios, aut ad litora, aut iuges fontes, aut lacus commorationes eis gratae sunt, & iucundae: cum tamen non magno pere desiderant bibere, sed & ipsum natate, & pedes aqua alluere eis plurimam iucunditatis adfert. Sunt qui non haec mala dicant huius bestiae ventrem creare, sed Hippocampus algam acerbissimam, ex qua ita afficitur, depascit. Veruntamen solertia veterani piscatoris, & ad res maritimas bene prudentis, salutaris etiam repertus est Hippocampus: ut & Cretensis grat, & filios admodum adolescentes piscatores etiam habebat. Accidit autem, ut hic piscator Hippocampus simul cum alijs piscibus caperet, et per adolescentes a rabida canicula morderentur. Cum eorum in Methyna Cretensi ad litus taentium vicem dolentes spectatores interficiendam caniculam censerent, & illius iecur medicamentum ad rabiam edendum inuenibus dandum esse: alij consulerent a Diana salutem petendam esse; senex piscator eos de consilijs, qua asserent, laudatos demisit, & Hippocampus exenteratorum alios assos eis comedendum dedit, alios in acetum & mel contulit, usq; morsus vlcera obligavit, atq; hominum adolescentium rabiem vicit, eosq; ad incolumitatem tandem restituit: haecenus Aelianus de Hippocampi viribus. Hoc animal ut Graecis ἵπποκαμπος, ita etiam Latinis Hippocampus appellatur: Italicus pariter Hippocampus.

Hippocampus vires ex Gal.

Hippocampus vires ex Aeliano.

Nomina.

ἵπποκαμπος, κάμπος, κάμπος.

PVRPURA, BVCCINA, CIONIA.


CAP.

III.

a vicijs ira meum scribit & Drag.

PVRPURA vltia exiccat, dentes abstergit, excrescentias in carne cohibet, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem praestant concremata a Buccina, sed vehementius vrunt. Si quis salis plena fictili cro-

PVRPURA ET BVCCINAE.



do adurat, dentificio conveniunt: ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet, nam postquam vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sponte sua deciderit. Fit etiam calx è buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus. b Cionia vocantur purpurarum buccinarumq; mediæ partes, circa quas testæ volumen clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris, buccinisq; facultatem vrendi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho vtilis, sed aluum non molliunt.


b uioiæ. alij
iōiæ

Sunt & Purpura marini pisces, eius sanè generis, qua testæ integuntur. Ha (vt auctor est Plinius lib. 9. capite 36.) illum magni pretij florem retinent, purpureum proprie dictum, tingendis regum vestibus expetitur. Hunc in medijs faucibus gerunt, candida quadam vena conclusum, colore nigricantis rosa pellucidam. Vinas capere contendunt, quia cum vita sua succum illum euomunt. Latent circa canis ortum tricenis diebus. Congregantur verno tempore, mutuoq; attritu lenitorem cuiusdam cera saluant. Lingua purpura digitali longitudine, qua pascitur perforando reliqua conchyliæ: tanta duritia aculeo est. Capiuntur autem purpura paruulis, rariq; textu veluti nasis, in alto iactis. Inest ijs esca, clusiles, mordacesq; concha, quales mitulos videmus, has semineces, sed redditas mari, auido biatu reuiuiscetes, appetunt purpura, porrectuq; linguis infestant. At ille aculeo extimulata claudunt sese, comprimuntq; mordentia: ita pendentis auiditate sua purpura tolluntur. Aqua dulci necantur, & sicubi flumini immerguntur: alioqui capte diebus quinquagenis viuunt salina sua. Anno magnitudinem implent, celerrimeq; crescunt, quemadmodum et conchyliæ omnia. Est in purpurarum genere & Buccinum, ad similitudinem eius buccini, quo sonus editur: vnde & causa nomini, & rotunditate oris in margine insita. Sed maior est purpura, cuniculatim procurrente rostro, & cuniculi latere intorsus tubulato, qua proferatur lingua. Cuiusmodi orbis aculei, qui buccino non insunt, sed vtriusq; orbis totidem, quot habent annos. Buccinum non nisi petris adhaeret, circaq; scopulos legitur. Purpura, buccinaq; simul, quemadmodum & reliqua conchylium genera longa sanæ narratione scriptis celebrata sunt ab Athenæo: ad eius igitur volumina accedant ij, qui plura scire desiderant. Sed quoniam MARGARITAE, quæ non modo ad mulierum, hominumq; decorem, sed etiam ad medicamenta maximo luxu ex-

Purpurarum
conli. & hist.

Buccinum.

MARGARITAE.



peruntur, à marinis & ipsa gignuntur conchis, hic inter pretiosa conchyliæ eas recensere non ab re fore duximus, præsertim quod neq; Dioscorides, neq; Galenus de his quicquam, quod legere, posteritatis memoria prodiderunt. Nasci itaque animalia, quæ margaritas gignunt, in oceano Indico refert Plinius lib. 9. cap. 35. Fertilis admodum earum est Taprobane, & Torou: item Perimula promontorium India, circa Arabiam in Persico sinu maris rubri. Origo, atq; genitura concha est, hanc multum ostrearum conchis differens, ut liquido constat ex ijs, quas nostri vulgò Madriperle appellant, quæ ad nos deferuntur. Has vbi genitilis anni stimulauerit hora, pendentem sese quadam oscitatione impleri roscido conceptu tradunt, si grandis factas postea eniti, partumq; concharum esse Margaritas, pro qualitate roris accepti. Nam si purus influxerit, candorem conspicit: si verò turbidus, & sordidus, sordescere: eundem pallere celo minante conceptum. Et ex eo quippe concha, eius maiorem societatem esse, quam maris. Inde nubilam trahi colorem, aut pro claritate matutina serenam: si tempestiue satientur, grandescere & partus: si fulguret, comprimi conchas, & pro ieludij modo minui. Si verò & tonnent, paridas, & repente compressas, quæ vocant Physematæ efficere speciem, verum inani inflatam sine corpore. Caterum in aqua molles sunt Margaritæ, at exempta protinus durefcunt. Quidam tradunt, sicut apibus, ita concharum exatimibus singulas magnitudine, & vetustate præcipuas esse, veluti duces, mira ad cavendum solertia. Quocirca has summo studio petunt vrinantes piscatores: siquidem capto rege facilius ceteras palantes retibus includunt. Concha ipsa cum manu videt captiosam, comprimit sese, operitq; opes suas gnara propter illas se peti, manumq; si præueniat, acie sua abscindit, nulla infiore pena, & alijs munita supplicijs. Capte multo obruuntur sale in vasis fictilibus: namq; erosa carne, vniones sine margarita pura, & expurgata decidunt in ima vasis. Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, leuore, pondere, tametsi tære admodum sint Margaritæ, quæ his omnibus dotibus præstent. Tradit Iuba Arabicis concham esse similem petri insecto, insutam echinorum modo, iressq; illi Margaritam grandini similem. In conchis quaternos, aut ad summum quinos vniones reperiri Plinius scriptum reliquit. verum Americus Vesputius, qui nostro æuo liburnicis omnè fere australem oceanum explorauit, talem ibi concham sequandoq; habuisse testatur, in qua vniones vltra centum & triginta reperti sunt. Quod non modo confirmant ij, qui post ipsum ad occidentales Indias nauigarunt, sed etiam addunt nuntios, quos vniones in vna tantum concha nasci: præterea alia plura de Margaritarum historia referunt, quæ à Plinio sententia plurimum dissident. Porro certum est & nasci, & capi margaritas in oceano occidentali Scoto, & Anglico sinu, sed eas quidem paruas, nec adeò pellucas, vt orientalibus comparari possint, è quibus contextum thoracem asserunt, quem Diane templo Iulius Cesar dicauit. Reperiuntur Margaritæ quandoq; etiam in Pinnis magnis, quæ Veneti vocant


Margaritæ
& earū con-
chæ historia

Plinij error.

Margaritæ
proveniunt
in Bohemia.

cant ASTVRAE, vt Plin. testatur. Ad hac non in mari tantum, sed etiam in fluminibus aqua dulcis concha prouenit, qua margaritæ gestant. Huius autem rei ego quidem testimonium perhibere possum, quod iam mihi in Bohemia degenti

PINNA, SIVE ASTVRA.



Vnionum
vires.

Nomina.

compertum sit in Vuotana flumine & reperiri & capi conchas, qua pulcherrimos includunt vniones, magnitudine, forma, & candore præstantes. Atq; certi nuntii, ubi quandoq; mirari, cum earum margaritarum copiam viderent apud Serenis: Principem dominum meum, tum etiam apud primarios Bohemia homines. Margarita in medicum etiam vsum veniunt: quandoquidem scribunt Serapio, et Auicenna, eas ad cordis affectus præcipuam opem ferre. Quinetiam collyriis almistis oculorum nubeculas detergere, & aquam eò defluentem absumerè. Animal, quod πορφυρα Græcè, Purpura Latine nominatur: Arabice Naporam & Porphyra: Italice Porpora. Qua verò Latinus Buccina, κήρυξ Græcis dicitur: Arabibus, Barçora, Cobros seu Cobron: Italis Buccine: Hispanis Bozios: Gallis Bios Cornetos. Caterum quod Græci μαργαρίτα, Latini item Margaritæ & Vniones vocant: Arabes Hageralbato: Itali Perle: Germani Perlin: Hispani Perlas.


Μύτις

MITVLI.

CAP. V.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremari eundem buccinis effectum præbent: priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle vtilis habentur: palpebrarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera, quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus vtiliter imponuntur.

MITVLI.



Τελλίνας


TELLINAE.

CAP. VI

Recentes Tellinæ aluo vtilis, sed maximè ius earum. Salitæ vruntur, tritæq; in cinerem, & cum cedria instillatæ, anulos palpebrarum pilos renasci non patiuntur.

Mitulorum
& tellinarum
confid.
Iouij lapsus.

Non desunt, qui Mitulos, & Tellinas idem esse censeant: in quam sententiam potissimum venisse comperio Paulum Iouium virum apprime eruditum: quippe qui libello, quem de Romanis piscibus edidit, malit (etsi medicus esset) cum Athenæo exrare, quam cum Dioscoride recte sentire. Ex cuius scriptis satis aperte constat, aliud esse mitulos, aliud tellinas: nam præterquam quod de his duobus diuersis capitibus ipse discernuerit, differentes etiam vtrisque reddidit dotes, haud nescius illis inesse differentiam. Idem similiter sensit Galenus lib. 11. de simpl. medicamentorum facultatibus.



ubi de viperis differens, eodem capite mitulorum etiam meminit, tellinarum vero peculiari capite, singulis proprias & di-
 versas reddens facultates. Non secus ac illi, sensit Paulus Aegineta, fidelis nempe utriusque sectator. Quamobrem dicendum
 parauerim, differentes nimirum esse mitulos & tellinas. Notissima sunt in Italia Tellina, praesertim Roma, ubi plurimae
 vendes circumferuntur, quod edendo sint, & ori admodum grata, si tamen ab arena optime repurgentur. Caterum quales
 Mituli sint in Italia, qui hac nostra tempestate explicauerit, hactenus inueni neminem, praeter unum Massarium Venerum,
 qui eos mitulos putat, quos Adriatici accola vulgo appellant Muscioli, quasi musculos dixerint. Cuius opinio nobis maxi-
 me probatur: quippe quod & forma, & nomine conchylia ita vocata legitimos referant mitulos. Sunt enim tellinis paulo
 maiores, testa exterius lineis quibusdam scabra: intus vero pellucida & tota pondere leuia. *Μύαξις* ita Graeci, Mituli Latini
 appellantur, pariter & Italici: Arabibus vero, Amarchas: Hispanis, Mixilhus. *Τελλίνας* ut Graeci, ita etiam Latine Tel-
 lina, & Italicè Telline dicuntur: Arabicè Sedef & Talsam: Hispanicè Brignigois.


Nomina.

Χάμας.

CHAMÆ.

CAP. VII.

Chamarum, aliarumq; conchularum in exigua aqua decoctarum ius, alium ciet, id cum vino
 assumitur.



Quamquam Chamæ inter cetera conchyliorum genera longa descriptione ab Athenæo referuntur, nihilominus tamen
 tot huiusmodi testaceorum habentur species, ut non facile sit, eas inter se distinguere. Caterum praeter ceteras con-
 sideratio
 cha, id sibi peculiare asciuerit. Chamæ, quod plerumque in littore hiantes inueniuntur. Idcirco eas rectè Chamæ dici posse
 parauerim, quæ in marinis oris, pendentes sese leui testa contexta reperiuntur. Harum, quam plurimas ipse vidi in A-
 driatici littore. Verum quoniam nulla alia facultate sunt praedita, praeter eas, quibus & reliqua concharum genera
 commendantur, ideo non est, ut plura de his dicamus. Quæ Graeci *Χάμας*, Latini Chamæ, Arabibus Hamæ, & Ita-
 licè Chamæ nominantur.

Nomina.

Οὐγγίς.

VNGVIS ODORATVS.


CAP. VIII.

Vnguis siue onyx conchylia regumentum est, ei simile, quo purpura integitur: quod in India nardi-
 feris paludibus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo uescan-
 tur. Colligitur posteaquam stagnantes aquæ æstiuis squaloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro
 mari defertur, candidans; pinguis. Babylonius nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris
 gratia suffiuntur, sed aliquatenus castoreum olent. Iidem suffitu excitant feminas vultu strangulati
 oppressas,

X

oppressas, comitialesque: poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit, quæ purpura & buccinum.

VNGVIS ODORATVS.




Vnguium odoratorum consideratio.

Rondeletius notatur.

Margaritæ nascuntur in Bohemia.

Rondeletii sententia non accepta.

Qui diligenter caput hoc de vnguibz odoratis legit & expendunt, non ab re fortasse mirantur Dioscoridem, quod scripserit, onyches, id est vngues odoratos in India nardiferis paludibus inueniri, quando nusquam à veteribus & recentioribus memoria proditum sit, nardum in paludibus nasci, sed in montibus, arido & sicco solo. Admirationi suæ illud non obstat putant, quod memoret Dioscorides, Indici nardi genus esse, quod Gangitis vocatur, à fluuio Gange, apud quem effluitur, monte præterfluente. Neque enim volunt eam nardum in fluuio illo, aut in paludibus provenire, sed in monte, aut infima eius parte, quam flumen ipsum alluit. Præterea cum scribat Dioscorides conchulas odoratas in India paludibus inueniri, illis planè absurdam videtur, quod præ cæteris eas laudauerit, quæ à rubro mari deferuntur: quod item Babylonicæ generis meminertit. Addunt insuper, quod cum vngues ij, quorum in officinis pharmacopæorum communis vsus, si vntur, non suauem spirent odorem, sed potius castoreum oleant, qui nimirum odor ab omnibz & iniucundus & ingratus habetur, fieri non potest, quod odoris gratia suffiantur, præsertim quod idem suffitu (vt Dioscorides tradit) excitat aut feminas vulua strangulata oppressas, comitialesq;. Sciunt autem, quod qui huiusmodi morbis tentantur, ab odoratis ladantur, & à fetidis iuuantur. Verum quia nitimur quantum possumus pro nostra virili parte Dioscoridem defendere, & ab erroris suspitione vindicare, quid mihi illa cogitanti occurrerit, nunc edisseram. In primis igitur non ita mihi mirum videtur, quod à Dioscoride scriptum sit, vngues odoratos in nardiferis India paludibus inueniri. Nam si, eodem auctore, aliqui arbitrati sunt, malabathrum esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione, facile fieri potuit, vt idem rei herbaria imperiti paludes, quæ malabathrum gignunt, nardiferas vocauerint, simili ratione decepti. Quorum forte Dioscorides appellationem secutus, eas paludes Indici nardiferas nominauit, in quibus huiusmodi habentur conchilia. Nec placet Rondeletii, alii qui viri doctissimi opinio, qui putat conchilia nullibi haberi posse, præterquam in mari, sic inquit: Nam si conchilia marina sunt animalia, quomodo in lacubus inueniuntur, colligunturq; aquis assu exiccatis? an mare deserunt turbinate, vt flumines lacusq; subeant? Itaque: qui etsi præclarus sit, & doctrina non vulgari præditus, non tamen omnia nature secreta rimari potuit. Quandoquidem & concha Margaritifera, quæ marina quoq; sunt animalia, in Bohemia habentur, quæ à mari longè lateq; distat, in flumine Vuotauua, vt de margaritis agentes paulo superius diximus. Deinde illud quoq; mirum non esse debet, quod ad nos adferantur conchula Indica ex mari rubro ac Babylone. Etenim hoc non euenit, quod imbi nascantur, sed quod Dioscoridis tempore non secus ac nostro, mercimonia, quæ ex India in Græciam & Italiam conuehebantur, omnia prius per mare rubrum conueberentur in Aegyptum, nempe Memphim aut Alexandriam. Sed quomodo sit, dicit aliquis, quod rare admodum reperiantur conchula Indica, quæ suauem spirent odorem, eoz; nardum imitentur, atq; odoris gratia suffiantur? Certè non aliam ob causam fieri puto, nisi vel quod propter maximam locorū distantiam in longo itinere adscititium illum malabathri odorem amittant, vt Indica nardo euenire libro superiori in eius mentione diximus: vel quod ea, quæ ad nos adferuntur, in paludibz capiantur, quæ malabathra prorsus destituuntur. Nam quoniam multo iam tempore malabathrum ad nos non aduehitur, facile adducor, vt credam id in India cultorum negligentia perisse, perinde ac balsamum in Iudæa. Quippe vt malabathrum renascatur (id quod Dioscorides refert) necesse est, vt fixatis æstiuo seruore aquis, humus aridis fruticibus vratur. Quod cum ab Indis fortasse fuerit omissum & neglectum, facile postea factum est, vt vniuersum malabathri genus omnino deperditum sit. Atq; adeo hinc est, vt vngues ij, qui hodie ad nos adferuntur, nullo nardi odore commendentur. Postremo illud mihi haudquaquam absurdum esse videtur, quod conchula Indica suffitu pressas vteri suffocatione mulieres comitialesq; reuocent. Namq; quod fieri potuerit, nos non negamus, onyches olim fuisse odoris grati atq; iucundi, vt pote qui malabathrum redderent. Sed equidem existimo odorem illum partibus ita tenuibus inhæsisse, vt igni impostæ testa ille statim exhalaret, testa verò eadem relicta & intensa, quid mirum si odorem fatidum emisisset & castoreum oluerit? ex quo sanè (vt experientia docet) mulieres vulua strangulatione laborantes suscitantur. Ideoq; variat nostra à Rondeletii sententia, qui vt Dioscoridis lectionem seruare videatur, dicit duos vt Dioscoridi designare non semper id quod grato solum & iucundo, sed aliquando quod vehementi aut graui est odore: quippe etsi id haud negauerim ego, non tamen affirmauerim id eodè in loco iniucundum significare aut grauolentum: siquid cum Dioscoridi hi vngues suauem spirent odorem, quod conchilia, quorum tegumenta sunt, nardi pabulo vescantur, ratio sanè non consentit, vt Rondeletio subscribam. Cæterum cum onyx vnguem significet (vnde conchula Indica vnguis odorati nomen accepit, quod fortasse vnguis alicuius effigiem referat) cur ipsum purpura tegumento similem fecerit Dioscorides, mihi hæc vnus incompertum est, cum purpura operculum rotundum sit, quemadmodum & buccina, conchilij verò longum, nisi vna cum Rondeletio dicamus, haud intellexisse Dioscoridem odoratos vngues facie purpurarum opercula referre, sed quod conchilia operiantur, vt purpura suis, à substantia rei, non quidem à forma comparatione facta. At certè, vt dicam quod sentio,



calamintham, origanum, aliasq; odoratas herbas assumunt, odoris gratia commendantur. In quarum numerum aquae ferri possunt, quae paulo lupinis maiores in agro Romano leguntur, ubi autumno quorundam carduorum caulibus acerrimam cohaerentes innumera visuntur. Cochleas olim vsq; ad eam coenitatem memorat Plinius lib. 11. cap. 56. ut ipsi viuarii à nonnullis fuerint instituta, distinctis quidem generibus earum, quò melius gula fieret satis: separatim ut essent albae, quae in Reatino agro nascuntur: separatim Illyrica, quibus magnitudo praecipua: Apbricanae, quibus fecunditas: Solitanae, quibus nobilitas. Saginam quinetiam commentati sunt sapa & farre, alijsq; rebus, quae eas aiebant. Non me fugit, quas Dioscorides pomatias vocat, plurimas reperiri in montibus Tridentinis, vicinisq; alijs locis, & eas quidem praestantissimas. Eruantur enim è terra hyeme in sepibus & frutetis, vncis quibusdam ferreis prope fruticum radices terra circumfossa. Concluduntur haec contra frigoris iniuriam, quodam albo operimento, duro, gypsi speciem referente, sicq; contacta terra se condant. Fit enim ob hoc, ut in cibis ijs longè suauioras, gratioresq; habeantur, quae vere & aestate imbribus excitata hinc inde vagantur. Quòd autem sic hyeme recondantur, delitescantq; sub terra circum fruticum radices, Hetruria planè ignorat, cum tamen & ibi eodem modo ab his eruantur, qui alibi artem didicerunt. Praestant cochleae, praeter ea quae à Dioscoride scribuntur, ad varia corporis incommoda. Siquidem testa exuta, & hordeacea prisana incocta lateris dolorem tollunt, ubi prisana sorbenda detur, cochleae verò contusa loco dolenti illinantur. Earundem diu elixarum ius potum iliacos inuat: eadem elixaria ac trita, cruentis excreationibus medentur. Disuria efficacissime profunt, si cruda cum suo ipsarum putamine contrita bibantur ex passo, diebus septem continuis, aut ad summum nouem. Vertiginosis quoq; profunt suspiriosisq;, ubi prima die cochleam vnā magnam, sequenti duas, tertio tres, quarto duas, quinto vnā, semicoctas vorauerint affecti, nec minus vertiginosis quàm amentibus medebitur is, qui singulas cochleas diebus singulis plurimis, cum suis testis contritas, ex defrato potandas dederit, sed has maiores esse oportet: si verò minus res successerit, triduo quiescat affectus, & subinde eandem portionem diebus plurimis replicet: Celiacos quoq; iuuant cochleae duae, vnā cum testis contrita, & duobus ovis gallinaceis excepta vini passis ternis vncijs, & aqua quaternis, ac demum ficti vase calefacta & hausta. Praestant eadem ad faucium mollietas & asperitates, si illae coquantur, & deinde trita ex passo ebibantur. Partus faciles reddunt, si à gravidis seminuedantur aliquot ante partum diebus. Adduntur vtiliter in emplastris, quae pus mouent: namque non solum bubones & caeteros tumores concoquunt, sed etiam abrumpunt. Contrita cruda & illita serpentibus vlceribus medentur. Quae verò salinis inhaerent, strumas illita resoluunt, si cum putamine tusa illinantur: columella vitia sanat cochleae viua succus ac vulnerata, cum penna illita. Complures cruda, in nitido mortario tusa, vnā cum ouo gallinaceo incocto, ex succida lana vtiliter fronti adalligantur, ad sedandas oculorum epiphoras. Combustarum cinis, cum ligni & vrticae semine ex melle potus, intra paucos dies lienosos sanat. Quae autem caeteris minutiores habentur, trita & illita, inguinum tumores resoluunt. Omnium putamen vstum, & in puluerem tenuissimum contritum, gingiuarum putredines exulcerationesq; illitus tollit. Idem casu inuentum tritumq;, & potui datum, calculos expellit: quin etiam vrinam mirifice pellit, si duarum drachmarum pondere ex vino albo & aqua calida bibatur: prolapsam columellam cohibet: & procidentem quoq; sedem, sed primè intestinum ablui oportet aqua in qua ferrum candens pluries restinctum fuerit. Cochleis nemoralibus à mucagine nativa diligenter repurgatis, & in lacte bubulo recenter mulso vnā cum Tusilagine concisa decoctis, condimentum sit optimum tabidis, cibi loco propinandum. Item cochlearum carnes à putaminibus & excrementis repurgatae, quin etiam aqua abluta inuoluuntur linteolo crassiore pluries replicato, & sepeliuntur in simo equino feruenti duarum horarum spatio, indeq; detracte lauantur lixiuio calido, & coquantur in iure gallinacei pulli: atq; tabidis, & macie summa affectus auxilio sane magno propinantur deuoranda. Parantur praeterea ad idem maiori etiam cum vtilitate hoc modo: Sumito cochleas maiores quinquaginta, easq; prius belle lotas coquito cum putaminibus in aqua, vnā cum hordeo à gluma repurgato, quousq; hordeum rumpatur. Deinde exemptas è putaminibus coquito iterum ex capi iure quousq; probè discoquantur: demum in percolato linteolo mundo, & quotidie eiusdem affectus propinato sex vncias, addita sacchari vncia tam mane quam vesperi boris tribus ante cibum. Non paruo quoque auxilio ad hoc mali parantur cochleae hac etiam ratione. Sumito cochlearum putaminibus exutarum libras 2: radicem glycyrrhizae recentium libram vnā; rad. altheae vnc. quatuor, atque omnia minutim concisa in vitreum collocato alembicum, & balneo feruentis aquae Chimica ratione eliciatur aqua, cuius vncias quatuor cum sacchari vnciola quotidie mane affectus propinato. Cochleae si tota cum testis vrantur (ut Galenus memoria prodidit lib. 11. simplicium medicamentorum) admista galla omphacidite, simulq; pipere albo, mirifice profunt dysenterijs, in quibus vlcerata nondum putredinosa sunt: conuenit autem ut pipere sit pars vnā, galla vero duae, quatuorq; vncijs cochlearum. Hac vbi ad vnguem leuigaris, cibi inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex vino albo & austero praebeto. Ceterum absq; galla misione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens ite nonnihil ex vstione calidum. Perro cochleae, quae vstione non sunt expertae, si trita vnā cum testis imponantur, & toti ventri aqua inter cuncta laborantium,

Cochleae pomatias.

Cochlearum vires Matth.

Ad tabidos.

Aqua cochlearum.

Cochlearum vires et Gal.

in arturicis articularum tumoribus, agrè quidem diuelli poterunt, ceterum impensè deficcant: & omnino imberere ipsas finire oportet, quoad sponte decidant. Idemq; faciendum in tumoribus ex ictu natis difficilè solubilibus, & ex contusione facta in auribus: deficcant enim illos magnopere vniuersos, etiamsi viscosus, crassusq; in alto humor contineatur. Idem libro citato, cum de diuersis carnibus verba faceret, sic de cochlearum quoq; carne disseruit. At cochlearum caro prius in mortario contusa, ac postea ad leuorem redacta, omnium valentissimè deficcet partes superfluo humore grauatas, adeo vt & hydericis conueniat. Ipsarum autem humor solus per se citra carnem sumptus (vocatut autem is à multis μύξα καὶ μύξα hoc est, mucus limacis) thuri mistus aut aloa, aut myrrha, aut horum quibusdam, aut omnib. quoad habeat cerati consistentiem, medicamentum sit glutinatorium, deficcetq; pulchrè putulentos mucos aurium: sed & fronti inpositum imberet, oculorum fluxiones reficcans. Quidam etiam ad palos eximendos vtuntur totis vnà cum testis ad leuorem tritis: sed & quidam ad sistendos menses. Et quidem ego aliquando in agro carnes ipsas solas in vulnus cum nerui vulneratione, & contusione factum tritas imposui, ipsumq; vulnus pulchrè glutinatum est, & neruus pblegmonè haud perpeffus: erat autem homo durus & agrestis: miscui tamen illis contritis pollinem farina acceptum à pariete mola proximo. Scripsere autem maiores me nonnulli medici, ad eiusmodi vsum miscendum ipsi thus aut myrrham. Verum horū habebam tum neutrum, vt qui tunc ab vrbe abessem in villa. Possis autem & refina fricta contrita admiscere, si adfit, quippiam. Porro vbi multū mucus cochlearum accipere voles seorsum, stylo carnem earum pungito, sed non ante multos dies venatas esse expedit, alioquin enim tempore deficcantur: nam recentes plurimum habēt viscosa illius humiditatis, quam stylo compuncta effundunt. Humiditas hac pilorum in palpebris præter naturam gluten est: hac Galenus. Cochlea tum cruda, tum cocta cum testis suis, aut sine, contrita emplastris concoquentibus, & saniem è vomitibus fracta cute educentibus vtiliter immiscentur. Marina in Italia mediterraneis perquam raro in cibus veniunt: quanquam ijs qui maris litora inhabitant, frequentiori sint vsui. Sunt & in cochlearum genere, quæ tegumento vel testa carent, quæ nobis speciatim Lumache vulgò appellantur, noctu potius, quam interdiu ad pascua exeuntes. Degunt hæ non modò in campis & hortis, sed in cellis vinarijs, & alijs subterraneis viginosiq; adum locis. Gerunt in capite lapidem (non tamen omnes) quem febribus tertianis adalligatum vulgus prodesse existimat. At Plinius lib. 30. cap. 5. auctor est, hunc lapidem adalligatum dentitionem facilem præstare. Expetuntur hæ mulieribus ad expoliendam faciem: namq; ex ijs in stillatorium vas coniectis, additis quibusdam alijs, aquam eliciunt, qua inde earum elota facies leuorem mentitur. Quin & his Aphricam abundare scriptum reliquit Plinius lib. 30. cap. 3. & cum combustas dysentericis vtilissimas esse, dariq; ex eo cinere cochlearia bina in vino myrrite aut quolibet austero. Eadem cum Thuris polline contrita, addito oui Gallinacei albo & illita, faciunt mirificè ad puerorum Enterocelas, sed interim pueros in lecto iacere oportet. Vruntur & ipsa vtiliter & in puluerem teruntur, qui inspersus quamcumq; pedum exalcerationem sanat. Κοχλιας vt Grecis, ita Latinis Cochlea nominantur: Arabibus Balzum & Halzum: Italis Chiocciolo: Germanis Schnecken: Hispanis Catamuyos & Caracoles: Galis Escargots.

Cochleæ marina.

Cochleæ sine testa.

Nomina.

Καρκίνος.


CANCRI.

CAP. X.

Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, & adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum vino, magnopere prodest canis rabiosi moribus: rimas pedum se- disq; perniunculos & carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiq; exasinio lacte, auxili- antur contra serpentium phalangiorumq; morsus atq; scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure e- firati, iis profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verum inefficacius omnia præstant.

α σκυφύρα
vñs pñs ko-
χλιαείω ενι
i. cum gen-
tiane radicis
cochleario
vno.

CANCER FLVVIATILIS.




Hallucinantur, qui credunt Cancros à Dioscoride & Galeno descriptos, illos esse, quos vulgus Italarum Gambari no- minat. Καρκίνος enim Græcè (vt hoc loco scribit Dioscorides) non eum significat cancrum perpetam vocatum, qui a- appellatur à Græcis, sed qui rotundo corpore habetur, quem nos Hetrusci vulgari nomine dicimus Granchio. Is Ve- netijs, vbi MARINORVM numerus propè infinitus habetur, vbi crustam exuerit, à corporis mollitie vulgò vocatur Malleca. E quorum genere sunt etiam quæ appellantur Macinette: nam & hæ suo tempore crustam exuunt. Hoc ita esse testatum reliquit Aristoteles libro quarto, capite secundo de historia animalium, vbi sic inquit: ο δὲ καρκίνος μέγας τῶν τοιούτων ἀνορροπούγιον, καὶ τὸ σῶμα τὸ μὲν τῶν καράβων, καὶ καείδων ἀνορροπέ, τὸ δὲ τῶν καρκίνων ἐρηγύλον: hoc est: Cancer solus ex crustaceis non regitur cauda, & corpus cum quidem locustis, squillisq; longum sit.

Cancrorum consideratio.


Multorum error.

CANCRI

CANCER MARINVS.

**Astacus.**

canceris verò rotundum est. Porro **ASTACVS** Oppiano speciatim dicitur *gammarus* magnus ille marinus, quem Romani & Tyrreni litora incolentes Leonem appellant. Veneti autem, quasi adhuc Gracum nomen retineant, cum vulgò *Astase* nominare consueuerunt. Idem dictus est *gammarus* à Theodoro Aristotelis interprete: quippe quòd vulgari *gammari* faciem representet. Veruntamen (ni fallor) Aristoteli $\alpha\sigma\tau\alpha\kappa\omicron\varsigma$ nil aliud esse crediderim, quàm quod Veneti *Astase*, Ro-

ASTACVS.

Gammari no
men gracum
Anst. ignora
uit.


manis verò Leo nuncupatur: quandoquidè is paulò inferius postquã de marinis, quæ crusta integuntur, animalibus disse-
ruisset, videtur sanè vulgares fluuiatiles *gammaros* describere statim post fluuiatiles *cancros*, cum inquit: $\epsilon\varsigma$, δ ϵ $\chi\alpha\iota$ ϵ τ ι ρ \omicron
 γ ϵ ν \omicron μ α ρ δ μ α ν , ω σ τ ϵ ρ \omicron ι κ α ρ ν ι ν \omicron ι , τ δ δ ϵ ϵ τ δ \omicron σ \omicron μ \omicron ι σ τ \omicron ι ς α ς α κ \omicron ι ς : hoc est. Genus item aliud est, quod quidem paruum
est veluti *cancri*, facie verò *astacis* simile. Hæc, meo quidem iudicio, declarant Gracis fluuiatilem *gammarus* proprio ca-
tere nomine, utpote & paruorum *cancrorum* aliqua genera, ut ipse eodem loco testatur Aristoteles, cum inquit: Ceteri mi-
nutiores, & nullis penè nominibus annotati. Quo sit, ut putauerim ego *gammaros* Galeno appellari γ α μ μ α ϵ ι δ ι , mutu-
ato, cum Romam venisset, à Latinis vocabulo, quod eo carerent Graci. Namq, lib. 3. de alimentorum facultatibus: Λ ς α ν \omicron ι (inquit) χ α ι ω δ γ \omicron ν ϵ ι : χ α ι κ α ρ ν ι ν \omicron ι χ α ρ α β \omicron ι , χ α ϵ ι δ ι , χ γ α μ μ α ϵ ι δ ι , \omicron σ α τ α λ λ α λ ϵ π ι ν \omicron ν ϵ χ ϵ τ \omicron ω ϵ τ χ ω
 \omicron σ ρ α ν , hoc est: *Astaci*, *paguri*, *cancri*, *locusta*, *carides*, *gammarides*, & id genus alia tenui testa concluduntur. Magis hoc
affirmare non dubitauerim, quod nomen hoc à Galeno Gracum factum, nec apud Aristotelem, nec apud quenquam repe-
rim vnquam. Quibus etiam ex verbis palàm certè est, inter **GAMMARIOS** & *cancros* manifestam esse differentiam.

Quorundam
medicorum
errore.

Cancrorum
vires ex Gal.
Antidotus ad
rabidoru ca-
num morsus.

Quamobrem eos medicos hallucinari censemus, qui pro *cancris* ad canum rabidorum morsus, itemq, ad tabidos & mara-
smo laborantes *Gammari* vtuntur: quandoquidè cum Dioscoridem, tum Galenū non de *gammari* quidem, sed de *cancro*-
cru intellexisse nobis conperit sit. De *cancris* Gal. lib. 11. de simp. med. hac fusius scripta reliquit. At fluuiatilem *cancro*-
rum cinis, quanquam similiter predictis exiccatorius est, substantia tamen proprietate mirificè contra rabidoru morsum
efficax est, usq, tum solus, tum cum gentiana & thure multò prestatior. Thuris sane partem vnā esse oportet, quinq, autem
gentiana, porro *cancrorum* decem: & rarò equidem aliter illis vsis nos sumus vsi: ceterum ad eum modum plerumq, quo
*Aeschri*on empiricus ille vtēbatur, medicamentorum peritissimus senex, conciuis ac preceptor meus. *Patella* erat eris rubri,
in quam impositos *cancros* viuentes, hæcenus vtēbat, dum facillè ad lauorem redigi possent. Hic *Aeschri*on paratum ac
promptum semper in adibus hoc habebat medicamen, vtens *cancros* tempore aestiuo post ortum canis, quando sol in leonem
transisset, luna decima octaua. Porro bibendum hoc medicamen ijs, qui à cane rabido fuissent morsu, præbebat quotidie
vsque ad diem quadragesimum, mensura cochlearij satù magni aqua inspersum. At si non protinus ab initio, ve-
rum aliquot post dies curam cepisset demorsu, tunc quotidie duo cochlearia aqua inspergebat. Ad ipsum verò vniuersum
empla-

GAMMARVS.




30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

compositum applicabat medicamentum, quod ex pice brutia & opopanace, acetoz, conficitur, habens picis libram vnā, vnam aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanacis vero vncias tres. Hac tamen a presenti instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerem: nimirum cum nullus vnquam eorum, qui illo, vt dictum est, fuerunt vsi, sit mortuus. Caterum seorsum alterum librum conscribam aliquando de ijs, quae proprietate substantiae totius quid agunt, è quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaq, tum hoc in loco scribendi imper-
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000


Καρκίνος ὀδύνην ποιεῖ καὶ τὸν ἄλγος γὰρ ἔχει.

Ceterum gammarorum faciem referunt locusta & squilla, quanquam ha chelis careant. Gerunt gammarum eo tantum Gammarorum
tempore, quo crustam exuunt, duos in capite lapillos albos, rotundosq, quibus vtuntur medici vtiliter ad expellendos re-
lapilli.
num calculos: conterunt enim hos in puluerem, & ex vino potandos exhibent. Sunt, qui hos igne prius tostos, ad idem ma-
gnum probent. Et praesertim vbi ex petroselini vulgaris succo propinentur. Nec desunt, qui censeant eosdem ad cordis imbecil-
litatem facere, atqui ego de re hac, quid certi affirmare possim, non habeo. Idem cum vini excremento, quod circa vasa la-
pidis instar concreuit (Tartarum vocant chimista) vlceribus pudendorum medentur, si simul triti aspergantur. Dantur
quoq, cum Tilia arboris carbone vtiliter ab alto deuolutis, quinetiam ad dissoluendos internos sanguinis grumos. Eorun-
dem puluere dentes quoq, dealbantur firmanturq, Caterum, rotundis cancris marinis similib, quos Adriatici accola, ma-
ri & semina discrimine vulgo Granci & Macinette nuncupant, abundat maximè vbiq, suis in fluminibus ac riuulis He-
truria: quem admodum Insubria, Transalpinarumq, regionum fluuij ac lacus gammaros alunt: Ita Hetruria cancris,
vbi ab Aeschione & Galeno à cane rabido demorsis ex eorum cinere saluberrima parabatur antidotus.
Cancris fluuiatilis putamen diligenter contritum, & ex vino subdulci potum, renum calculos pellit. Idem combustis, tritig,
& ex melle illiti, Strumas discutunt. Eorundem puluere sanantur sedis rima. Exustorum cinis oleo subactus, perniciosis
vires.
vires. Suffuntur sicci, vbi fetus haeserit mortuus in vteri ceruice. Idem triti crudi & tumentibus mammis illiti, mirifice
profunt: quinetiam impactas mammarum durities resoluunt & lac exiccant. Scorpiones proximos omnes ad eum locum
conuenire tradidere quidam, vbi cancri decem fluuiatiles marinive, cum ocimi manipulo contriti, repositi fuerint. Flu-
uiatiles autem peculiariter hortorum erucas pellere dicunt, qui de colendis hortis scripsere, si pluribus in locis inter olera li-
gnetis clauis figantur. Sed & illi non minori in errore versantur, qui putant marinos minutiores (vt ita dicam) gammaru-
los, quos vulgo Gambarelli & Gambarusoli appellamus, eos esse, quos tum Aristo. tum Galenus, tum Aelianus, tum Plinius
cancellos nominant: quippe quod hi gammaruli Aristoteli proprie squilla parua dicantur. Siquidem ij, qui in hoc genere
nunquam rufescunt, Venetis alijsq, quam plurimis populis, proprium adhuc è QVILLÆ retinent nomen: vulgo enim Squillarum
Schille dicuntur: quanquam in Hispania, praesertimq, in Cantabria omnes hi gammaruli Squilla nulla differentia vocati
sunt. His, vt diximus, ad stipulatur Aristoteles lib. 4. de partibus animalium. cap. 8. cum inquit: Squilla à cancrario
genere differunt, eo quod caudam habeant: à locustario vero, quod forcipe careant. Quibus sanè claret, cancris nullam
misse caudam, quapropter omne crustatorum genus, cui cauda desit, in cancrario genere fuerit recensendum. Cuiusmodi
sunt MAIÆ vulgo Granceuole, Paguri vulgo granciporri, marini ac fluuiatiles canchri vulgo Granchi appellati: & id
genus plura. Nec aliam ob causam diximus gammarulos paruas dici squillas, nisi vt omnibus notum sit, eas etiam haberi
in locis




M A I A.

**Cancellorū
consideratio.** his longè maiores, vt memoria prodidit Aristoteles libr. 4. cap. 2. de historia animalium, sic inquit. Squillarum enim genere continentur gibba, crangones & parua, quæ maiores nunquam effici possunt. Quibus liquido constat vulgares gammarulos Aristoteli paruas facile esse Squillas, cum ij maiores nunquam exadant, quam qui semper parui in piscarij



**Rondeletii
erratum, Pa-
garum, Maiā
statuentis.** habentur venales. Quinetiam id ipsum affirmare non dubitamus, quod ijs caudā sit locustarum & gammarorum modo, chela verò seu forcipes deficiant. Squilla tametsi concoctu contumaces sint, Galeno tamen teste, stomachicis conferunt. Eadem trita & cum aceto pota, lumbricos & tineas eijciunt. Quadam autem peculiari facultate ad mulierum conceptus in cibis efficaces sunt. A Scorpionum ictu securum dicunt illum, qui Squilla marina imaginem in achate lapide sculptam in anulo gestauerit. Caterum Rondeletius, vir quidem doctissimus atq; praeclarissimus, PAGVRVM, quem Granciper-


PAGVRVS.



ro Itali vocant, Maiam facit. Sed facile quispiam illum deceptum deprehendet, qui diligenter Aelianum de Paguris scribentem legit. Sclauj, qui Lapidiam incolunt, quarumq; littora Adriaticum mare alluit, Graecum adhuc nomen seruantes, qui no-

qui nobis Grauciporri vocantur, Paguri vulgò appellant. E Paguris in caavernis extinctis oriri scorpiones testis est Nicander. Sed ad CANCELLOS redeo, nomine ipso paruulos cancras designantes, de quibus scripsit Galenus libro tertio de alimen-

CANCELLI



torum facultatibus: Cancelli, inquiens, animalcula sunt perexiguus cancris similia, colore flauo. Afferuntur enim cancelli inter minutulos pisciculos duplici sanè genere, vt quarto tum libro, tum capite de animalium historia retulit Aristoteles, his verbis: Quem autem cancellum appellant, communis ferè socius crustatorum, & testatorum generum est: quippè qui natura locustis similis spectetur, nasciq; seorsum per se solitus sit. Verùm quod testam deinde petit, quam ingressus vitam traducat, hinc similis testa coniectis animantibus est, quapropter is in ancipiti esse, genusque sibi vindicare vtrunq; videtur. Forma tamen (quod simplicius dixerim) similis araneis est, nisi quòd partem capiti, & pectori subditam, ampliore quam aranei habeat. Cornicula duo rufa, tenuia gerit, quibus oculi magni totidem subiacent, qui nunquam intro recedant, vt cancrorum, sed semper eminentes appareant. Os sub ijs est, quod velut capillamentis quibusdam pluribus circumdatur. In pedes subiuncti duo bifurces, quibus cibum ori admoueat: bini item vtriq; adherent lateri, & tertius paruus. Thoracis pars inferior mollis tota est, dissectoq; sinu pallidum intus cernitur. Meatus ab ore ad ventrem pergit: foramen excretionis perspicuum nullum potest. Pedes, ac thorax duritiem pra se ferunt, sed minus quam cancri. Nexu nullo testis adheret, purpurarum modo, & buccinarum; sed absolutus liberq; vagatur. Oblongior est, qui turbinem subit, quam qui neritem, (quem naticem interpretamur) genus enim diuersum est, quod in naticis degit, cetera quidem non absimile: sed dextrum bifurcularum pedem paruum habens: cum laeuum grandiusculum habeat, & ingredi eodem ipso grandiore potissimum solent: hac Aristoteles. Aelianus verò lib. 7. cap. 31. de cancellis ita scribit: A conchis quidem inopes, & nudi primùm cancelli nascuntur, deinde eas tanquam domicilia ad habitandum deligunt. Cum enim vacuas, & inanes offenderunt conchulas purpurae, aut turbinis, primò intra eas ingrediuntur: deinde cum in ampliore magnitudine excreuerunt, quam ijs vt capi queant, in testam laxiorem tanquam domum alteram demigrant, neq; modo in supra dictorum conchas immigrant, sed & in permultas alias capaciorem transeunt, & ampliore nacti ea tanquam maiore domicilio gaudent; ac sepe de spolijs multo certamine inter se contendunt, viribusq; inferiore repulso, victor exuuias assequitur: haec Aelianus. Cui in omnibus subscribit Plinius lib. 9. cap. 31. & 42. His igitur diligenter perspectis, omnibus, vt arbitror, palàm fiet, & cancras & cancellos a squillis differre. Animal, quod καρκίνος Graecè, Cancer Latine appellatur: Arabice Sartham, seu Sarthan: Italice Granbio: Hispanice Cangreio: Gallicè Cancres.

Cancellorum historia.

Cancelli ingrediuntur conchulas.

Σcorpιος χερσαίος

SCORPIO TERRESTRIS.

CAP. XI.

Terrestris Scorpio tritus crudus, & impositus, suae plagae remedium est: quin estur affatus, ad eadem.



T Terrestris

Scorpionum
consideratio.Scorpiones
vbi minus
nocui.Scorpionum
genera nouē.Scorpionum
foetus.Scorpiones
aligeri.Scorpionum
facultates.Olei ex scor-
pionib. vires.

Nomina.


Terrestres Scorpiones animalis sunt vulgò nota, quòd in quacunque domo, non modò in cubiculis, & cellis videntur, sed vbi que passim reperiantur: adeo est hominum vita periculis obnoxia. Licet autem sint in Italia minus venenosi, minusque nocui, quam alijs in regionibus, quae sub meridie sita sunt, ipse tamen complures vidi in Hetruria à Scorpionibus ictos, qui saeuissimas perpeffi sunt exacerbationes, & quasi ad mortem redacti. Contra in regionibus frigidis minus nocui sunt. In agro Tridentino à scorpionibus icti nihil noxa percipiunt. Quod tamen euenire affirmant gratia peculiarari sibi à Deo impetrata precibus diui Vigily episcopi, quem & patronum praecipuum habet, & aduocatum apud Deum. Hoc idem asserit Aristoteles lib. 8. cap. 29. de animalium historia, vbi sic inquit: Morsus beluarum ex locorum diuersitate plurimum differunt, vt in Pharo, locisq; alijs, scorpiones non ledunt. At in alijs locis, & praecipue in Scythia, multi & magni nocui sunt, & vel hominem, vel quamuis bestiam percusserint, interimunt, nec sues euadere possunt, quanquam ceteros virulentos ictus minimè sentiunt. Plinius, Auicenna, Albertus, Aelianus, & aliorum plerique, nouem Scorpionum genera assignant, diuersis duntaxat coloribus distincta: nimirum quòd alijs sint flauis, alijs rufis, alijs cinereis, alijs ferrugineis, virides alijs, alijs lutei subatraque cauda, alijs vinosi, alijs albi, alijs deniq; fuliginis colore. Praeter nigros, & ferrugineos, virides quam plurimos me vidisse, legisseq; recordor, in comitatu Arci non longè à Sarca flumine, quadam in syluula nouellis quercubus composita apud sacellum diui Pauli, vbi paruo admodum tempore, sero ardente, ego & eremita quidam, de his, qui sub saxis latebant, plus quam mille & quingentos collegimus, crassos & plurimum sarctos. Plures inter eos feminas inuenimus, quae suos nuper editos foetus albos, pediculi magnitudine, sub ventre secum vbi que gerebant, singuli singulis cruribus adherentes. Quapropter non ab re prodidit Aristoteles lib. 5. cap. 26. de historia animalium, quòd terrestres Scorpiones vermiculos ouorum specie pariant complures, & incubent: mox vt prolem perfecerunt, pellantur ab ea ipsa, & interimantur à suis liberis magno numero: sapius enim vndenos pariunt. Plinius auctor est, Scorpionum ictum multo magis feminis perniciosam esse, quam viris: praesertim virginibus, quibus semper lethalem esse ait. Quibus septeni in cauda internodij numerantur, longè sauiosiores habentur, quam y quibus tantum semi insunt. Nonnulli praeterea literis mandarunt, quibus subscribit Strabo lib. 15. suae Geographiae, Scorpiones quosdam habere alas, quibus per aëra volitantes de vna in aliam regionem deferuntur. Hoc enim credere non videtur absurdum, cum idem formicis similiter eueniat, quandoquidem & haec isdem fere coloribus distinguuntur. Tantòq; magis credendum est, quòd in Castellae Hispaniae regione sepius agricola aliquos terra cespites aratro scindant, vbi formicarum more innumeri scorpiones gregatim hyeme delitescant. Citra Cynamolus Aethiopyas late deserta regio est, à scorpionibus gente sublata, si Plinio credimus. Qui praeterea tradit, (vt in Cancro superius diximus) quòd si decem cancri cum ocimi manipulo adalligentur, omnes, qui ibi sunt scorpiones, ad eum locum coibunt. Quod tamen Dioscoridi manifestè resisti videtur, nam superius in cancri scriptum reliquit: Dioscorides: Cancrì Scorpiones necant, si triti cum ocimo admoventur. Ferunt à vespis, apibus, & crabronibus eos non icti, qui prius à scorpione percussi fuerunt. Quin etiam narrat Plinius lib. 25. cap. 9. Scorpiones mortuos reuiuiscere, admoto albo veratro. Quidam medici vtuntur Scorpionum cinere, qui viuis sint exusti, ad vrinam ciendam, vbi praecipue, qui renum, aut vesica calculo obstruuntur. Quo fit, vt in hunc vsu commendauerit Mesues oleum ex vjs paratum, quod officina habent, renibus & pubi illitum. Hoc idem commendauit Auicenna ad aurium dolores. Ego tamen illud vsu exploratum habeo, quòd oleum per me factum, in quod sanè magnus scorpionum ingreditur numerus, cordi duntaxat, & pulsantibus temporum, manuum, & pedum arteriis, illitum, ab omnibus liberat venenis, dummodo erodenti facultate vacent. Quin & eos sanat, qui tam à viperis, quam ceteris venenosis animalibus vel icti, vel demorsi fuerint. Quae de reij (absit tamen verbis iactantia) testimonium perhibere possunt, qui prius oleo sancto à sacerdotibus illiti, nostro postmodum peruncti euasere incolumes. Praestat item maxime hoc oleum, cum in homines pestilentia sauit: quippe quòd non modo peste infectos iuuat, sed & sanos praeseruet. Praestat deniq; ad omnes interaneorum vermes, omnesq; dolores mulcet ex frigore, vel ex frigore genitos, praesertim ventriculi, coli, ac vteri. Eius parandi rationem trademus (Deo concedente) libro sexto, vbi de venenorum remedijs, siue Antidotis latius differemus. Σcorpιος ἡερσαίος Graecis, Latinis Scorpio & Scorpius vocatur: Arabibus Harrab, seu Hacharab: Italis Scorpione terrestre: Hispanis Alacra.

Σcorpιος ἡερσαίος

SCORPIO MARINVS.

CAP. XII.


Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines & hebetudines.

Scorp. ma-
rini & Scor-
penae confid.

Credidere quidam marinum Scorpionem, & Scorpenam vocatam, nihil inter se differre, verum tamen hos pisces inter se differre haud insperabitur, qui Plinius & Athenaei auctoritate nitatur: vterque enim ad inuicem distinxit illos. Patro uterq; in dorso spinam gerit venenatam, qua imprudentes piscatores sapius icti: neq; iam desuerunt, qui eius ictu sint interempti.

in tempore. Proinde existimant nonnulli, ictum similitudine falsi, inter Scorpenam, & marinum scorpionem nullum
 profusum interesse discrimen. Atqui Scorpio spinas quoque in capite habet, quae praedictis non sunt minus venenosa. Ceterum
 Scorpio, & SCORPENA (ut equidem arbitror) eiusdem ferè generis sunt, sed in specie & forma pulpaque praestantia (ut
 Athenaeus est auctor) inter se pluribus differunt. Siquidem Scorpius è pelagis piscibus est, scorpena longè maior; adeo ut
 odonai nouen. 259, quandoque ponderet libras. Scorpena verò piscis est litoralis, scorpione multò minor. Scorpius item vniuer-
 so corpore rubet, cornua bina in capite gerit, sed mollia: & acutos in ore dentes, minutulos tamen: Pinnis constat aculeatis,

SCORPENA.



eam bis, quae per medium excurrunt dorsum; quam his, quas anteriore, & posteriore parte gerit, sed ipsa tantum aculeis icit,
 qui dorso annectuntur: quorum tamen vis his, qui scorpena insunt, imbecillior est. Hunc sunt, qui vulgò vocent Pesce cap-
 pone, sed in Iletruria maritima quibusdam locis vocatur Cerna. SCORPENA autem, quae suum apud omnes retinet nomen, Scorpenae
 dentes adeo acutos non habet: gerit tamen in dorso aculeos scorpionis modo, sed eminentiores, ac duriores, nec usque adeo pin-
 natos: in ceteris verò pinnis ipsa omnino caret, praeterquam circa branchias, ubi duos praelongos habet aculeos, & nonnullos
 circa caput: corpore est in nigro virescente. Sunt tamen, qui indifferenter scorpionem scorpenam vocent. Vinum in quo Ma-
 rinum Scorpio nec. utus fuerit, haustum, iocinoris doloribus medetur. Nec minus ad id quoque, valere dicunt lapidem in eius
 capite inuentum, oboli pondere sumptum. Ceterum Scorpij marini selle ex lana supposito, secundas & menses elici cer-
 tum est: quin etiam eodem incipientes suffusiones oculorum, & albugines tolli, ex melle oleoque, illito, intermissis diebus.
 Adhaerit Scorpenarum paruorum vistarum cinis epotus, calculos exterit. Σκορπίος θαλάσσιος, Graecè: Scorpio marinus Nomina.
 Latine: Italicè Pesce cappone & Scrofano dicitur: Scorpena autem Scrofanello.


Δράκων θαλάσσιος.

DRACO MARINVS.

CAP. XIII.

DRACO marinus dissectus, & apertus impositusque, spinarum suarum ictus qua ferit, medela est.


DRACOMARINVS.



Variat auctorum sententia in marini Draconis historia. Quandoquidem Alberto marinus draco ingens est bestia, ser-
 pentis faciem referens, alis non amplioribus, quam quae ad natandum sufficiant, sed ob virium praestantiam omni-
 um aquatilium velocissimus cenetur: quapropter breui admodum tempore ingentia metitur maria. Quin & venenosum
 animal, adeo ut quoscunque pisces, vel alia quaecumque animalia dente vulnerauerit, interimat. Piscatorum praeter
 caprus statim ut in arenam sese protrahi cernit, mira celeritate scrobem in litore fodit, qua se condere possit: hac
 Albertus. Qui etsi ex Aristotele, et Plinio (ut opinor) transcribat, plura tamen addit videtur, quibus an multa sit adhi-
 benda fides, quid statuum non habeo. Siquidem hoc animal Aristoteli tanta admiratione non praestat, nec draco appellatur,
 sed

Serpentis marina, hist. *sed serpens, ut is posteritatis memoria commendavit libro 9. cap. 37. de historia animalium his verbis. SERPENS MARINA, colore, & corpore Congro proxima est, sed obscurior, atq; acrior: hanc si capta dimittatur foris, in arenam rostro quem ex Aristotele.*

SERPENS MARINA.



Draconis
marini histo-
ria ex Aristo-
tele.

primū adacto terebrat, subitq; tota. Est ore acutiore hac, quam terrestres. Et lib. 2. cap. 14. Sunt etiam (inquit) mari indigenae serpentes terrestribus similes: nisi quod caput habeant congre. Et quidem genera earum plura sunt, colore numero rosea varietatis. Nascentur non in altissimis gurgitibus certum est. De marino autem Dracone scribens libro octavo, cap. decimo tertio, de hist. anim. Draco marinus, inquit, piscis est litoralis quemadmodum dentex, scarabeus, cernua, aurata, magil, mullus, turdus, pulcher, gobius, atq; alij complures, & omne saxatile genus. Meminit quoq; de eo Plinius libro trigesimo secundo cap. septimo, sic inquit: Extra has sunt rotunda in oleario usu cochlea, cucumis, cynopus, cammarus, cynosdesia, draco, quidam volunt esse dracunculum. Est autem graculo similis, aculeos in branchiis habet ad caudam spectantes. Huic sane non parum correspondere videtur, quem Veneti Piscatores, quin etiam Tergestini, & Aquileienses vocant pesce Ragno, Itali vero Trascina. Quippe qui inter litorales, aculeos circum branchias habet caudam versus spectantes, & alios in dorso adeo venenatos, ut ab eo icti, nisi curam admiserint diligentem, vel doloribus intensissimis crucientur, vel moriantur. Itaq; & is videtur Plinio fuisse Draco, quē libro nono cap. quadragesimo octavo ipse araneum quoque vocavit: cum inquit: Atq; pestiferum animal Araneus, spina in dorso aculeo, praesertim cum libro trigesimo secundo, cap. ultimo, inter litorales pisces, & mari magis peculiare, non aliter araneum recensere videatur, quam draconem Aristoteles. Caterum in libro nono, capite vigesimo septimo, Serpentem marinam, de qua superius ex Aristotele diximus, draconem quoq; vocat, & utriusq; historiam errore manifesto confundit, sic inquit: Rursus draco marinus captus, atq; immisus in arena, cavernam sibi rostro mira celeritate excavat. Id quod Aristoteli marini draconis non est, sed marina serpentis. Quibus apertissime constat, Plinium aut negligenter hoc in loco Aristotelem legisse, aut eius lectionem haud recte intellexisse. Nec sanē quispiam Plinium excusabit, qui dixerit draconem marinum in arenam immisum, perinde ac serpens illa, rostro sibi cavernam fodere, quando quidem cum nullo rostri mucrone sit institutus (ut recte vir doctissimus Saluanus inquit) sed obtuso quidem ore habeatur, nulla prorsus consentit ratio, ut cavernam in arena sibi tam facile excavare queat. Itaq; Matthiolus non tam leuiter Rondeletio subscribit, qui hoc Plinij erratum haud animaduertens. Praeterea inquit, quod de Dracone scripsit Plinius, id in araneo nostro (araneus illi Draco marinus est) quiuis experietur, qui piscium captura interesse voluerit. Captum enim araneum arena semper se obuoluentem cernit. Atqui aliud, mea quidem sententia, designat Plinio, rostro in arenam immisso cavernam sibi mira celeritate excavare draconem: aliud verò Rondeletio, in arena se obuolueri, ut fere caeteri faciunt pisces, qui viui retibus in litus a piscatoribus deuoluuntur. Quare non absq; iniuria in Matthiolum inuebitur (illum tamen non nominat) cum dicit absurdam esse illius opinionem, qui in Dioscoridem commentaria scripsit, quod scribat is non eundem esse Plinij, & Dioscoridis marinum Draconem. Sed hanc iniuriam q̄s refellendam, imò potius agrè ferendam relinquo, qui hoc loco Rondeletij viri alioqui doctissimi negligentiam in examinanda Plinij lectione facile cognoscent. Non video sanē, quo pacto Draconem lib. nono cap. vigesimo septimo à Plinio descriptum facere legitime possit Rondeletius Dioscoridis Dracone minimè differentem, cum ibi nil aliud describat Plinium, quam serpentem marinam Aristotelis. Caterum marina serpentis imaginem, primus (quod viderim legerimq;) ad amussim delineatam edidit Hippolytus Saluanus, medicus doctissimus, in pulcherrimo suo de piscibus volumine, vnde nos habere, quam pinximus, accepimus: Δράκων θαλάσσιος Græcè: Italicè, Trascina: Gallicè Vive dicitur.

Plinius Ser-
pentem ma-
rinam, cum
Dracone cō-
fundit.

Rondeletio
non subscri-
bendum.

Σκολόπενδρα.

SCOLOPENDRA.


CAP. XIII.

SCOLOPENDRA marina in oleo decocta si illinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.


Scolopendra
consideratio.

Scolopendra marina animal est non magnum. Scribit de ea Aristoteles lib. secundo cap. 14. sic inquit. Marina Scolopendra terrenis similes sunt, magnitudine tamen paulo inferiores: gignuntur in saxosis locis: colore magis rubro, pedum numero terrestres superant, sed cruribus sunt gracilioribus. Serpentum more non altis gurgitibus nascuntur. Hac ille. Quibus haud parum ad stipulari videntur, quae à Rondeletio in suo de piscibus libro pinguntur: ac etiam à nobis quoq; ex illius codice huc translatae sunt, vermium terrestrium figura, & numerosis, tenuibusq; vring, pedibus stipata. Verum ab his longè differt marina Scolopendra, quam mihi dono dedit Constantinopoli allatam Clarissimus Augerius de Busbecke, qui superioribus annis apud Turcarum Imperatorem pro Casare Ferdinando oratorem egit. Hanc ego legitimam esse Marina Scolopendram censeo, ideoq; eam hic excudi volui, ut aliorum quoq; sit iudicium. Aristoteles lib. nono cap. trigesimo mo de historia animal. Quae autem, inquit, centipeda appellatur, ubi hamum deuorauerit, euomit foras sua interiora: nec hamum reijciat, non recipit intro. Id quod etiam scribit Plinius libro nono cap. quadragesimo tertio. Sed haec se-

SCOLOPENDRA.



SCOLOPENDRA MARINA, RONDELETII.




40
 nim tam exiguo animali, quod pro marina Scolopendra pingit Rondeletius, vix credibile videtur, cum tam exiguo sit ore,
 & angusto, ut hamum quantumvis tenuem deglutire nequeat. Quo fit, ut omnino adducar ad credendum, nostram hanc
 legitimam veramq; esse Scolopendram: id enim adeo manifestum facit vniuersa eius effigies, ut omni prorsus iudicio cum
 carere putem, qui aliter senserit.

Nápxn.

TORPEDO.

CAP. XV.

50
 Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet: eadem appo-
 sita euerfam sedem, prociouamq; coerctet.



Torpedo

Torpedinis
consideratio.

Torpedo in cartilagineorum planorumq; piscium genere ab auctoribus recensetur, perinde ac raia, lenia, thon-
solea, pastinaca, & alia id genus plura. Corporis facies, si caudam abscideris, orbicularis fuerit. Caput adeo in-
pulas contractum est, ut ipsius nullum vestigium appareat: Oculos tamen habet anteriores, superiori parte, sed exigui,
circa hos paulo foramina duo semicirculi effigie, qua perpetuo reclusa spectantur. Os habet supina parte haud am-
minutis intus dentibus. Lingua illi nulla, os praecedunt foramina duo, qua olfactus gratia nata videntur. Eadem in parte,
(ut auctor est Aristoteles libro secundo cap. decimotertio de hist. anim.) Branchias utrinque quinas habet, sed exiguas &
arcuatas. Excrementorum meatus una corporis parte suum habet locum: prope cauda exortum, qua illi brevis est, sed car-
nosa, & in latam desinens pinnam. In cauda dorso duos quoque pinnae habet, sed prior altera maior, quinetiam ad ca-
da ipsius exortum binas gerit, utrinque unam, latiores semicircularesq;, de quibus tantum libro quarto, cap. decimoter-
tio de partibus animalium, meminit Aristoteles, ceteris silentio praeiit. Atqui haud recte eodem in loco eundem de Tor-
pedinis cauda scripsisse iudico, cum Torpedini non secus ac Pastinaca, ceterisq; cartilagineis, longam, spinosam, rigidam-
ve caudam tribuat. Corpus totum molli ac leuicute contegit. Supina parte albicat, sed prona flavescit, vinoso fere colore.
Dorso non omnibus eadem facies: siquidem aliquibus quinque sunt in dorso macula nigra orbicularisq;, oculorum scri-
effigie, pentagoniq; figura disposita. Unde illi nomen, Romanis occhiatella: Alijs eadem fere visuntur macula, sed non in
in primo genere nigra. Sunt enim circuli versicoloribus picta, nota quadam in medio existente, qua oculi pupillam qua-
dantenus refert. Nonnullis haec macula desunt, sed minores, minutiores ac numerosa in toto dorso dispersa spectantur: qu-
busdam vero nulla prorsus apparent, dorso tantum flavescente. Ceterum, etsi praescriptis notis Torpedines diuerso esse ge-
nere videantur, non tamen in ijs variat torporis inducendi facultas: namque omnibus eadem est. Torpedo vinam paru-
animalis ouis prius intra se genitis, ut cetera fere cartilaginea, & adeo prolifica est, ut scripserit Aristoteles, Torpedinem vi-
sam esse grandem, qua intra se fetus circiter octuaginta haberet. Tanta huic vis peculiaris inest, ut retibus capta, antea-
quam manu attingatur, & manus & lateris piscatoris stupore non modico afficiat: id quod etiam fit, si capiatur hamo.
Talis namque huius facultas per setas & hastam insensibili quodam modo permeans, ad manum piscatoris tandem trans-
uecta, celeriter torporem inducit. Idcirco Galenus lib. 6. de locis affectis: Ea (inquit) potentia torpedo praedita est, ut si fu-
scina attingatur a piscatore, transmissa qualitate per hastam ad manum, eam repente obstupescit. Idem postea retulit
Plinius lib. 32. cap. 1. sic inquit. Torpedo etiam procul, & longinquo vel si hasta, virgave attingatur, quamuis praeu-
lidos lacertos torpescere facit, & pedes quamlibet ad cursus veloces alligat & retinet. Et lib. 9. cap. 42. ita scribit: Non
torpedo vim suam: ipsa enim non torpens, mersaq; in limo se occultat, pisces, qui securi adnatantes obtorpuere, corripit.
Quod ante ipsum prodiderat Aristoteles lib. 9. cap. 37. de historia animalium sic inquit: Torpedo piscis, quos appetit, affi-
cit ea ipsa, quam in suo corpore continet, facultate inducendi torporis, atq; ita retardatos praestupore capit & vescitur. Ad-
dit sese in arena & limo, tum pisces, qui adnatantes obstupuerunt, corripit. Quam rem pleriq; conspectam a se retulerunt.
Est enim pigra Torpedo ob pinnarum in corporis mole defectum, & cum piscibus vescatur, cumq; lento motu eos capere ne-
queat, astu illos capit, cuius rei indicio sunt Mugiles, qui cum velocissimi sint, saepius in torpedinum ventriculis reperiu-
tur. Ceterum proprietates hac viuus duntaxat inest: nam si eadem in exanimatis persisteret, comesta (veniunt enim frequen-
ter in cibis) vniuersum corpus stupidum redderet. Quamobrem Galenus lib. 11. simp. med. de ea ita scriptum reliquit: Sed
& Torpedinem totam (dico autem animal marinum) capitis dolores sanare capiti admotam, sedemq; euersam coercere,
a quibusdam est proditum: verum ego cum utrunq; essem expertus neutrum facere comperi. Eam igitur cum cognissem,
ad huc viam esse applicandam, cui caput doleret (posse enim fieri, ut hoc medicamen anodynon sit, hoc est, dolore liberet,
similiter alijs qua sensum obstupesciunt) ita habere comperi, putoq; eum, qui primus est usus, tali quapiam motum ra-
tione uti aggressum: hac Galenus. Non desunt auctores, qui putent vim torpidam in Torpedine haud in toto corpore esse
diffusam, sed in quibusdam tantum particularibus eius corporis membris, sed an hoc verum fabulosum ve sit, haud facile
fuerit asserere: sunt tamen rationes, qua illorum sententia non parum refragantur. Venetis piscis hic ab effectu, vulgo Tro-
molo appellatur: siquidem membro stupefacto, subinde tremorem incutit. Romani vero (me quidem latet, vnde id nomen
traxere) eundem vulgari nomine Batti potta & Foterigia dicere consueuerunt. Quae Naupia Graecis, Torpedo Latinus vo-
minatur: Arabibus Tead: Italis, Torpedine: Hispanis Hugia: Gallis, Turpilles.

Torpedinis
mira facul-
tas.

Torpedinis
vires ex Gal.

Nomina.

Εχιδνα

VIPERA:

CAP. XVI.

α μολδα. i.
ε. bulosa.
b vapor. 5
χουσι μαλα-
εχθρη φύλλα
βραχίος. i.
spica nardi,
& malaba-
thri folii pa-
rum, ita ha-
bet antiquus
manuscri-
ptus codex.

Viperinae carnes si coctae edantur, claritatem oculis afferunt: neruorum vitis auxiliantur: increscen-
tes strumas reprimunt. Detracta autem cute, caput caudaq;, quoniam carne vacante, amputari de-
bent: quippe a commentitium est quod praecipitur, certam utrinq; mensuram praecidi oportere. Reli-
quum vero corpus exemptis interaneis, elotum dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo &
anetho. Aiunt ius, qui vipersas esitent, pediculos procreari, quod plane a veritate abhorret. Adiciunt a-
liqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est.
Viua autem vipera in fictile nouum demittitur, adiciuntur salis, caricarumq; tritarum, singulatim quin-
que sextarii, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblitur, & fornacibus inassatur, donec sal in
carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem reconditur. Plerunq;, ut ori gratior fiat, immisce-
tur b spica, aut folium nardi, aut malabathri momentum.

Viperarum
consideratio.

Iampridem captum est veras Viperas nasci in Italia. Earum enim partus eas indicarunt: quandoquidem recentiorum
medicorum quidam Viperas summo studio indagantes, ut Galeni more, hoc etiam a quo legitimam possent parare theria-
cam, inuito consilio cum his circumforaneis, qui serpentibus alendis quaestum faciunt, Viperas ipsas praegnantem sunt con-
secuti, qua in capsulis conclusa catulos peperere, quod proprium Viperarum sit animal edere, non quidem oua ceterorum
serpentium more. Nec tamen propterea illud verum esse compertum est, quod nascentes Viperas viscera abrodant, occisa pa-
rente, ut libro de theriaca ad Pisonem prodidit Galenus (si tamen is liber legitimus est) ex Nicandri auctoritate, & Plinius
lib. 10. cap. 62. qui Aristotelis verba praeterquam interpretari deprehenditur, a quo vipera historiam ipsum accepisse liqui-
do constat. Cuius sententiam non tantum explodit, quod experimento comperit tam est, sed & Aristoteles ipse: quandoqui-
dem nusquam dixerit, viperinos fetus parentis viscera, aut vterum abrodere, sed quod qui tardius eduntur catuli (tardius
enim ideo illi excluduntur, quod vipera singulos singulis diebus parit) abrodunt membranam quandam, qua in matris vte-
ro obdu-

Plinii lapsus.

VIPERA.



no obvoluntur, vt citius prodeant in lacem. Qua in re, vt hoc omnibus palam sit, sic lib. 5. de historia animalium capite vltimo, sonant Aristotelis verba. *Τῶν δὲ ὄφιδων ὁ μὲν ἔχει ἐξ ἑξ ὡλοκεῖ: ἐν αὐτῷ πρῶτον ὡλοκεῖται, τὸ δὲ ὡλοκεῖται ἔχει ὡλοκεῖται ὄφιν, ὃς μὲν ἔχει ἐξ ἑξ ὡλοκεῖται, ὃς μὲν ἔχει ἐξ ἑξ ὡλοκεῖται, ὃς μὲν ἔχει ἐξ ἑξ ὡλοκεῖται.* Viperā ē serpentibus animal edit, cum intra se primum oua pepererit. Omnes hoc vnus coloris, & molli cute coniectum, vt piscium est. Fœtus supernè gignitur, nec duro cortice continetur, sicut nec piscium quidem. Parit paruas viperulas membranis obuolutas, quæ tertia die rumpuntur. Euenit interdum, vt qui in vtero sunt, abrosis membranis prorumpant. Singulos diebus singulis parit, pluresq; parit quàm viginti: hæc Aristoteles. Cuius sententiam (vt dictum est) peruertens Plinius, vbi ei dicendum fuerat, quod vltima viperule adhuc in matris vtero degente, sua abrodant inuoluta, anteaquam prorumpant, dixit ceteras tarditatis impatientes, perumpere latera, occisa partem. Porro huic explosæ sententiæ etiam Philostratus refragatur: nam in vita Apollonijs Tjancij narrat, Apollonij ipsum vnam, ac incolumen vidisse Viperā, quæ suos catulos nouissimè exclusos lingebat. Marci præterea, qui serpentium domitores se prædicat, quiq; falsè ex D. Pauli profapia se originè duxisse gloriantur, Viperā Marasso vulgò appellant, vtq; maiore eum spectatorib; inuent gratiā, sepiusimè viperinos dentes, longos, acuminatos, atq; mortiferos ostentant, cõditos (vt Plin. inquit lib. 11. c. 37.) gingiuis, atq; mēbr. inula quadā circūdatos, lethali veneno referta. Quin & viperarū nuper editos fœtus ostendunt, quos viperæ suis alunt in capsulis, quib; eas deferunt: nec tamen illi matris viscera sciunt. Ceterum q; viperæ primum intra se oua pariant, mox animalia gignant, Theophrastus quoq; auctor est libro 7. cap. 14. contra eos, qui secus sententiam Viperæ (vt scribit Auicenna libro quarto, vbi de venenis agit) caput habent pressum, latumq; vbi ceruicij annectitur quæ peculiariter illis tenuis est, nec corpore admodum sunt longa, vt pote nec cauda. Ad hæc Galenus, cum scriptis adere vellet, quibus notis mares viperæ a feminis distent, eo libro, qui de theriaca ad Pisonem inscribitur, sic inquit: Viperæ femina subrufa sunt, & perquam agiles, ceruice elata: oculis subrubentibus, inuerecundis, atque intuitus feri: huius caput latum, quàm mari, quem etiam excedunt vniuersa corporis mole, earumq; excernens meatus suum propius caudam obtinetur. Mari duo tantum insunt canini dentes, femina verò plures. Proinde igitur Nicander cecinit his versibus.

Viperarum partus ex Aristotele.

Viperarum facies, & serus discriminò.

Τοῦ μὲν ὡπερ κινώδοντε δύο καὶ τρεῖς ποσὶν ἔχει, ἰὸν ἐρευζόμενον. ἄλλοτε δὲ τοὶ πέντε ἔχουσιν.

Hoc est soluta oratione.

Masculi quidem supra canini dentes duo colore notantur, venenum eructantes: at plures semper femina insunt. Illud insuper addiderim, Aristotelem memoria mandasse lib. 8. cap. 15. de historia animalium, quod licet hyemæ ceteri serpentes cavernas subeant terra, viperæ tamen sub saxis condantur. Ex quo palam est, Plinium hoc etiam loca non rectè intellexisse Aristotelem: quippe quod tradiderit lib. 8. cap. 39. Viperam solam terra conditam, ceteras autem saxorum cauis. Illud Plinij lapsus, nempe cecinit Aristoteles, quod Plinius poetas secutus retulit, feminam scilicet in coitu mari caput abrodere voluptatū dulcedine. Sed vt iam viperis vires suas, ac facultates reddamus, hic ea nunc referam, quæ de huius lib. 2. simplicium medicamentorum, cum libris de antidotis pluribus posteritatis memoria prodidit Galenus. Viperarum igitur carnes palam videre est exaltantes & desiccantes, vbi condiuntur ceu anguilla, nempe oleo, sale, anetho, porro & aqua, seruato nimirum modo. Quod autem totum corpus per cutim purgent, discere tibi liceat ve! ex huius, quæ ego iuuenis etiamnum in Asia nostra sum expertus: quæ singularim deinceps narrabo. Homo quidam morbo, quem elephantia cognominant, laborans, aliquot tempore cum sodalibus conuersabatur, donec ex ipsius consuetudine conuersationeq; quidam nostram morbi insuerentur contagione: ille iam graueolens erat ac deformis. Constructo igitur illi tugurio proximo vicum, in rugo collis propter fontem, illic hominem collocant, tantum illi quotidie ciborum ferentes, quantum victui suppeteret. Ceterum ad canis exortum, cum fore messoribus haud procul metentibus vinum esset allatum in fictili sanè quam fragans, is quidem, qui attulerat, deposito illo prope messores, abiit. Verum vbi eius bibendi aduenisset tempus, sublato fictili adolescens, vt pro more impleto crateræ, competente aqua vinum temperaret, in cratera vinum effundit, & vna excidit viperæ mortua. Quæ re attoniti messores, veriti ne quod, si ebibissent, inde sibi malum eueniret, suam quidem sitim aqua potione sedare maluerunt. Ceterum cum illuc discederent, quasi præ humanitate ac misericordia, homini illi elephantia obnoxio vinum largiuntur, rati expedire illi potum mori, quam viuere in ea miseria. At ille, vbi ex hoc bibisset, admirabili quodam modo sanitati restitutus est: nam tuberosum illud omne cutis totius non aliter, quam animalium à testis mollitie nuncupatorum malacostrocon, tegmè decidit. Quantum autem reliquum erat, molle admodum apparuit, instar cutis cancrorum & locustarū (carabos Graci vocant) vbi extrema testa exciderit. Alterum quoq; eiusmodi non dissimili casu in Mysia, Asia, non procul ab vrbe nostra accidit. Vir quidam elephantia laborans profectus est ad aquarum calidarum sponte nascētium usum, sperans inde nonnihil se commodi adepturum: erat illi scortum ancilla iuuecula, sanè formosa, compluribus amatorib; ambita. Profectus igitur ille,

Plinij lapsus.

Viperæ carnis vires ex Galeno.

Viperæ vino
delectantur.

Viperarū ve-
natio & earū
pastilli.

Viperarum
vires aduer-
sus tabem.

cum aqua uteretur, in adibus, quibus vicinus erat locus squalidus, & viperarum plenus, forte fortuna ex illa una in vice-
um vini incidit negligentius positum, extinctaq; est. Ac scortum quidem in lucro id reputans quod fors euenisset, hero id vi-
ni propinat. Catero ille, vbi ebibisset, ad eum modum, quo ille, qui degebat in tugurio, persanatus est: hac Galenus. Qu-
erit alia e viperis experimenta ibidem scripserit, vnde similiter alij in olumes euasere, vt eius firmior redderetur ratio, quod
scilicet viperarum esu elephantiasis sanentur, astamen breuitati consulentes, ea hoc loco silentio inuoluenda duximus. Ve-
rum enimvero nil mirum alicui fuerit, Viperas ambas, quarum meminit Galenus, se tam facile immersisse vino: siquidem
illis natura comparatum est, vt vino summo delectentur. Quamobrem narrat Aristoteles libr. 8. cap. 4. de historia ani-
malium, quod ideo viperas aliqui vino cum scilicet ad sepes disposito venantur, quia vini incontinentes sunt: ebria enim
capiuntur. Id quod etiam dicit Dioscorides in sexti libri prefatione de venenis, venenatūq; agens. Quinetiam vipera (vt
ad Pisonem scribit Galenus) supresses & cantharides deuorant. Item Aristotelis testimonio libr. 8. cap. 29. de historia ani-
malium, scorpionum deuorari a vipera certum est: ob idq; (vt idem est auctor) eorum venenatorum morsus grauiores sunt,
quæ alijs animalibus venenatis vescuntur: quod profecto faciunt vipera. Ha theriacen ingrediuntur, at non omnes, nec
omni tempore capta probantur. Proinde Galenus libro primo de antidotis rem hanc scite & aperte declarauit, sic inquit:
Viperas non vt aliqui faciunt, aestate media, neq; statim, vbi cauernas egressa fuerint: aestate siquidem earum caro fitum ex-
citatur, statimq; ab egressu frigida est, sicca & extenuata. Optimum itaque tempus est, quod is medium intercedit, quod &
Andromachus ipse significauit, quo tempore & qui Bacho sacra faciunt, viperas dilacerare solent, vere quidem finiente,
nondum tamen aestate incipiente. Vel si ver ad magnam sui partem hyemale fuerit, circa principium aestatis, non multo
tempore post pliadum ortum. Viperas autem, quæ prægnantes sunt, reijcere oportet, aliarum vero caput, ac caudam ab-
scindere: nam præterquam quod hæc particula virulentiores esse videantur, etiam dura & parum carnis habens. Sufficit
autem in magnis viperis, id quod vterq; amputatur, quatuor digitos æquare. Totum vero reliquum corpus, intestinis ex-
emptis, pedesq; detractis, aqua primo ablucendum, atq; in vas fictile conijciendum est: deinde aqua pura superinfusa vitidq;
anetho (tunc enim viget) alla prunas vt coquatur subijcere conuenit: vel arida ligna, quæ, quod sumum non emittunt, a-
rabra vocant: vel quod melius adhuc est, vitium sarmenta. Salis autem, siquidem suo tempore viperas ceperis, tantillum
inmiscere oportet: sin aestate iam incipiente, nihil. Porro obseruandum est, ne ille capiantur, quæ in maritimis locis, quæ
in aliqua salsa aquarum lacuna degunt, antidotus enim quæ ex huiusmodi viperis confecta fuerit, situm excitabit. Cum
igitur Vipera probe cocta fuerint, ac si quis comedere vellet, eas ex aqua eximere oportet, deinde carnes ita a spinis auelle-
re, vt nihil ex spinis simul auferatur: atq; his exquisitè contritis, panis ex purissima farina optimè confecti, qui præcipue
& bene fermentatus sit, & in furno, non sub clibano coctus, modicum quiddam admiscere. Nonnulli tamen in commiscen-
do panem viperis hanc mensuram seruandam præcipiunt, vt panis pondus viperinarum carnum dimidio minus sit, alij
tertiam partem excedat malunt: ego vero quandoq; quartam, quandoq; & quintam panis imposui. Caterum nisi probe
coctus fuerit, periculum est, ne aliquid aciditatis medicamentum contrahat. At satius est, panem hunc ita coctum per ali-
quot dies loco aliquo sicciori prius exiccasse. Verum cum viperas & panem coniunxeris, diligenterq; adeo subegeris, vt nul-
la viperina carnis particula non contrusa remanserit, pastillos ex ea massa conficito, qui tenues sint: nam crassi cum difficul-
ter siccescere soleant, & carnem putrescere, & panem acescere sinunt. Quamobrem panem quoq; ante siccatum terere melius
est, & non, quemadmodum ante nos qui Casari theriacam faciebant, viperarum iure maceratum: id quod ipse quoq; di-
sci, sed mihi postea melius esse visum est, panem antea contritum viperarum carnibus exactè iam subactis admiscere: uti-
namq; pastilli siccantur, qui siccum panem, non madidum acceperint. Sit autem cella, in qua pastillos siccabis in supe-
riori domus parte ad meridiem conuersa, vel saltem ad septentrionem non respiciat, vt solis radiostota penè die admittat:
talis enim in loco commodè siccescunt. Statim vbi fuerint conformati, ea parte collocentur, qua solares radij peruenire non
possunt. Frequenter autem ipsos conuertere opus erit, vt æqualiter vtraq; ex parte siccescant: quod facere si quis omiserit,
superior quidem pars celeriter arefcet, inferior autem humida diutius permanebit, periculumq; erit ne marcescant. Postea
verò quam exiccari fuerint, maneat adhuc aliquot diebus eadem in cella longius, quam prius a solis radijs, sæpeq; deinceps
conuertantur. Sufficient autem ad hæc omnia quindecim dies ad summum, post quod tempus donec theriacam conficere
volueris, recondi debent in vase stanneo aut vitreo, aut etiam aureo. Vitrum siquidem, & aurum nullam fraudem admi-
ttit: stannum autem plumbi mistura adulteratur, quod vitare conueniet, non solum in hac, sed & in quibuscunq; alijs an-
tidotis: quemadmodum & argentum, si purum non fuerit: vasa namq; ex eo fabricata celerrimè rubiginem contrahunt,
purum autem argentum, Romani candidum vocant. Caterum longè melius est, haud multo post, quam pastillos confeceris,
ipsis vti: quanquam non multum detrimenti capiunt, etiam si peracto anno, atq; etiam multo post, eis vtaris. Rectè namq;
a principio siccati, ad tertium quartumq; annum integri perseuerant, dummodo tamen aptè reponantur, & subinde pul-
uisculus quidam, qui ipsis obnasci cōsuevit, mundis linteis interdum abstergetur. Is namq; si diutius inhereat, pastillos per-
forabit. Perspicuum est autem eos inutiles euadere, qui perforati fuerint, quemadmodum antequam hoc ipsis accidat, et-
iam si multum tempus intercesserit, vtilis permanent. Hac Galenus de conficiendis pastillos vipereos ratione, quod optimi &
præstantissimi habeantur. Caterum illud Dioscoridi ridiculum videtur, quod qui viperas esitent, pediculos procreent. Cui
tamen reclamatur Galenus lib. 11. simplicium medicamentorum, vbi id certò is euenire asserit, quibus plurimum mali succi
in corpore exuperat. Narrat Plinius lib. 30. ca. 3. quod Antonius Musa Cesaris Augusti medicus cum incidisset in insanabilia
vlcera, viperas edendas dabat, miraq; celeritate persanabat. Quare non demirabor Cardanum viperarum carnes mirum
in modum prætulisse ad eos persanandos, qui tabe afficiuntur, & pulmonum vlceribus laborant. Namq; quodam in consi-
lio ad Ioannem Scotum Archiepiscopum S. Andrea ita de eis scribit: Dicam tibi secretum maximum, liberans a tabe, ele-
phantiasis, & morbo Indico, atq; præter omnium spem impinguat & sanat etiam deploratos. Sumito itaq; viperam illam
rubram, crassam & breuem, quam Itali appellant Milort, & abscisis capite & cauda, detractoq; corio, & exemptis inte-
stinis, & pinguedine per se asseruata, viperam ipsam dissecato plures in partes anguillarum modo: coquit oq; deinde in a-
qua cum belzoino & sale, additis etiam paulo post petroselini vulgaris folijs: cum autem excocta fuerit, linteolo petro-
lato, ac ex eo gallinaceum pullum iuueniculum coquito, ac panem subinde ipso iure maceratum, cum pulli carnibus eden-
dum præbeto: & interim cum asseruata pinguedine dorsi spinam, caterorum membrorum articulos, & pulsantes maxime
pedumq; arterias, quin & pectus ipsum inungito. Interim verò in vaporario calido maneat affectus, atq; id reperat diebus
septem continuis. Hoc enim auxilio pulmonum vlcera ad extimam cutem expelluntur excitatis ibi tuberculis: interna ve-
rò vlcera sanantur, & agri belle reualefcunt: hæcenus Cardanus. Qui tamen non parum cacutisse videtur in hac vipera
describenda, namque plurimum a vipera serpente distare scimus, quam Mediolanenses, ac cateri Insulres Milort appel-
lant. Siquidem hæc omnium innocentissima serpens est, & domibus plerunque familiaris: illa verò contra, cum mori fa-
cile de-

caile demorfos perimat. In Aegypto Aegyptios ipsos viperis, alijsq; serpentibus similiter atq; anguillis viciis are prodidit Galenus lib. 3. de alimentorum facultatibus. Quibus item eos vesci traditum est, qui occidentales, nouiterq; repertas Indias incolunt, perinde ac ij, qui orientales inhabitant, vt libro 7. auctor est Plinius. Cini ex viperea pelle factus, capiti asidne aspersus, alopeciae scditates aufert. Vipera totius cinis, quae vna in vas nouum fictile coniecta fuerit, additi succi fenicuius vnus, duabus, & thuris grumo, & deinde cooperculo argilla circumlito tecta, & in fornace combusta oculorum hypochysos & calgines potenter tollit, collyrijs adhibitus aut per se tantum. Vipera caput linteolo colligatum & collo suspensum, magnum sane amuletum est contra anginas, quippò non solum iam factas sanat, sed ne fiant, prohibet. Vipera ita Latinis dicta Graeci ἰσίδρα vocatur: Arabibus Labane alsahay: Italis Vipera: Germanis Brandtschlangen: Hispanis Bivora & Bicha: Gallis Viperes.

Aegyptiis viperæ cibis.


Γῆρας ὄφιδος.

SENECTA ANGVIVM.

CAP. XVII.

Senectus anguivm in vino decocta dolori aurium, infusu; & dentium, collatione auxilio est. Addunt camin medicamenta oculorum, sed præcipuè viperinam.

SENECTA ANGVIVM.



N' illis non cognita anguivm Senecta: quippe quae sepe in campestribus inter saxa & stirpes inueniatur. De hac cum Senecta differeret Aristoteles lib. 8. de historia animal. cap. 17. sic inquit: Serpentes senectam exiunt tum vere cum egrediuntur, tum etiam autumno. Vipera etiam exiit tam vere quam autumno. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahunt, ita vt obocari videatur ijs, qui rem non intelligunt: tum caput exiit: glabrum enim hoc vniuersum antequam reliquum corpus, apparet: atq; vna ferè nocte & die senectus tota exiit à capite orsa ad caudam: & cute altera vitus subnascens, ipsa remouetur. Vt enim fetus inuolucro secundarum, quo contentus prodierit, exiit: sic ista senectate detracta renouantur. Porro de ea nil aliud memoriae prodidit Galenus lib. 11. de simplicium medicamentorum facultatibus, quam quòd in aceto decocta dentium dolori medetur. Marcellus tamen empiricus anguivm senectam vulvis commendat, si ijs licio alligetur. Eandem quoq; prætulit, ad coeliacos, in rosaceo prius decoctam in stanneo vase, & deinde ventri impositam. Γῆρας ὄφιδος Graecè: Senecta anguivm, Latinè vocatur: Alchalba & Selach albae, Arabicè: Spoglia delle Serpi, italicè: Schlangenbalck Germanicè: Pelle de la culebra, Hispanicè.

Senecta anguivm consideratio.

Notitia.

Λαγώς θαλάσσιος καὶ χερσαίος.

LEPVVS MARINVS ET TERRESTRIS.

CAP. XVIII.


Lepus marinus loligini paruae similis est: qui per sese tritus, aut cum a vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassarum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui valetudine conuicti sunt: affricu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput, & cum adipe vsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem intercipere proditur: vuluæ & alui fluorem sistit: comitiales muer: contra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum lac & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem lentiginemq; sanat.

Analysis cum vrtica simpliciter, non cū vrtica marina vt Ruellius, Marcellus & Cornarius veruēt. Ita enim habent omnia exempla.

Marinus Lepus (vt nonnulli memoriae prodidere) sic primum appellari cepit, quod terrestris leporis faciem referat. Quapropter hac de eo à Plinio produntur lib. 9. cap. 43. Lepus, inquit, qui Indico mari nascitur, etiam tactu pestilentis vomitum, dissolutionemq; stomachi protinus creat. In nostro ossa informis, colore tantum lepori similis: in Indis & magnitudine, & pilo duriore tantum, nec viuis ibi capitur: hac Plinius. Ex quibus facile conijci potest, Dioscoridem potius de nostratium marium Lepore intellexisse, quam de ijs, qui in Indico innatant pelago, argumento quòd parua loligini similem marium leporem reddiderit. At Aeliano marinus lepus cochlea exenterata similis habetur, cui sane is, in uoluptate hic primo in loco ex Rondeletio appinximus, illi haud parum similis videtur. Huic color in dorso est ex rubro nigrescens: caput habet deforme, cuius alterum cornu Libella, quam Graeci ζυγάλια vocant, simile ceruicatur: alterum

Leporis marini confid.

LEPVS MARINVS I.



verò mutilum est, foramine apparente, per quod processum quendam carneum exerit ac retrahit adeò, vt lingua ferè in-
gineu exprimat. In horum medio oris rima visitur. Os habet in dorso perinde ac Sepia, sed tenuius ac striatius. Dentis
& cornicula duo mollia, cochlearum modo citra capiti sedem, sed breuiora & resissa. Atramento refertus est, vt loliginis,
quibus quoq; internis visceribus omnibus similis habetur. Est & alterum genus grandius atq; exterius a prescripto diffe-
rent. Siquidem anteriori parte appendices duas habet latas carnosasq;, ore in medio reposito. Inferius paulò cornicula

Leporis ma-
rini alterum
genus.

LEPVS MARINVS ALTER.



quoq; duo prominent, sed breuiora quàm in altero & acutiora: osse hic in dorso caret, cetera Sepia similia sunt, atq; vi-
sceribus loliginem quoq; refert, quem admodum atramento. Pernitiosum valde Lepus marinus animal est, lethaliq; vene-
no refertus, adeò vt deuoratus interimat, & conspectus à pregnantibus abortum faciat, ingenti excitata prius nausea. I-
deòq; rectè Plinius scripsit lib. 32. cap. 1. Lepus marinus venenum est, alijs in potu, aut in cibo datus, alijs etiam visus, si-
quidem grauida si omnino aspexerint faeminam ab eo genere duntaxat, statim nausea & redundatione stomachi vitium
fatentur, & deinde abortum faciunt. Cetera moriuntur totidem diebus, quot vixerit lepus, incertiq; temporis venescium
id esse, auctor est Lycinius Macer: hec ille. Tetrum & pisculentum odorem spirat marinus Lepus, nec alibi degit quàm in li-
mo & sordibus. Albertus auctor est, tertium Leporis marini genus reperiri, communi piscium magnitudine, sed capite le-
pori non absimili, dorso rufescente, esculentum: tamen si à nonnullis excludatur, vt pote quod & concoctu contumax sit, &
elephantiasim gignat. Dioscoridi marinus lepus praestat tantum illitus ad euellendos pilos. Plinio praestat quoq; ad strumas
si imponatur, & celeriter amoueat. Idem (vt Marcellus empiricus est author) aut eius sanguis cum oleo tritus, e-
uulsos pilos renasci prohibet. Verùm si renascantur, adeò molles futuros dicit, vt si iterum euellantur, & posthac illinatur
locus, haudquaquam eos renascituros. Ceterum TERRESTRIS Lepus notissimum animal est, & cursu velocissimum.
Solum hoc inter cetera terra animalia, quae vtrinque dentata sunt (vt scriptum reliquit Aristoteles libro tertio de par-
tibus animalium, capite decimo quinto) & quae vnicum tantum continent ventrem, coagulum habet. Sunt & lepo-
res albi, quales etiam Plinius libro 8. cap. 55. refert in alpidibus inueniri. Hi hyberno tempore admodum albicantes in
summis vallis Anania montibus frequentes reperiuntur, eo praesertim tempore, quo niuibus altissimis vestiuntur: qui
tamen adeò magni non sunt, nec ita in cibum parati cum palato ineunt gratiam, vt qui in campestribus capiuntur. Ce-
terum candidi hyeme tantum conspiciuntur, nam liquecente niue subrubescent, quemadmodum & ceteri. Cuius rei
iudicio sunt illi, qui cum non perfecte priores pilos exuerint, partim candidi, partim subrutili visuntur. Lepores aperti
oculis dormiunt, nec (quae sua maxima timiditas est) alio quàm fuga se tutari sciunt. Huic soli pilos in bucca intus
sub pedibus esse adnotauit Aristoteles lib. 3. de historia animalium, cap. 12. Archelaus auctor est, cui etiam sententia
rigue

Lepus mari-
nus venenū.

Leporis ter-
restris confi-
deratio.

Vana opinio
leporis & que
gignere.

sique subscribunt. Leporibus utranque sexum, & utramque gignendi vim inesse, & omnes lepores aequè gignere, ac si essent Hermaphroditi. Verum inualuit falsa hac opinio, quòd crediderint homines tumores binos in inguinibus utriusque sexus prominentes, testiculos esse. At qui hi testes non sunt (vt in Castore inferius dicimus) sed folliculi glandula faciem referentes, qui meatus intus habent obliquum, è quo liquor quidam effluit, perinde ac è Castoris folliculus, quos omnis superior aetas

LEPVS TERRESTRIS.



falso testiculos putauit. Hos quoque, quinimo & vulgus vniuersum, hac in opinione confirmauit, quòd viderint, Lepores, quanquam plurimi quotidie capiuntur, etiam quodammodo fecundius procreare. Veruntamen id non euenit, quoniam mares ipsi pariunt, sed quia (teste Aristotele libro 6. de historia animalium, cap. 33.) superfœtant, dum adhuc vitæ gerunt, similiterque statim à partu concipiunt, ita quòd singulis mensibus generant. Sed factus edunt non vniuersos: interpositis enim diebus, quot res tulerit, peragunt partionem: vnde tam innumera fecunditas: nam etsi fœmina lac nuper natis præbeat, nil tamen prohibet, quin eadem repetat coitum, & lactans gerensq; vtero, denuo concipiat factum. Mares (vt loco citato idem prodidit Aristoteles) auersi coeunt cum fœminis: retro enim ijs genitale membrum à natura datum est, vt apparet, dum vrinam reddunt. Ex quo etiam multis persuasum est, mares factum concipere, siquidem cognitu perquam difficile est, an mares, an fœmina sint, vt etiam cuniculis contingit: qui cum fecundius etiam prolifcent, quam lepores, non ob id tamen mares vnquam parere visi sunt, quamuis quolibet mense fœmina pariunt. Tra-
du Plinius lib. 11. cap. 37. bina iecinora Leporibus inesse circa Brietam, & Thernem, & in Cherroneso ad Propontidem: a translatis aliò statim absumi. Id quod ante ipsum memoria prodiderat Aristoteles libro 2. de historia animalium, cap. 17. Item libro 3. de partibus animalium, cap. 7. vbi hoc Leporum genus pluribus in locis reperiri testatur, speciatim vero in Sycino agro, circiter Bolbam lacum. In Ithaca insula (vt idem tradidit libro 8. de historia animalium, cap. 28.) Lepores si aliunde illati dimittantur, viuere nequeunt: sed eodem reuersi, vnde maris introierint insulam, moriuntur. Leporina carnes in cibis esitata præter id quòd agrè concoquuntur, crassum atrabiliosumque generant succum. Veruntamen (vt inquit Rasis libr. de 60. de animalibus) dysentericis conferunt, si assata sumantur. Iecur vero a vesiculis, iecinorosis vtiliter exhibetur potandum. Integè cum pelle Lepus, operculato scitili impositus, in clibanoque igne succenso tam diu dimissus, vt penitus exuratur, vrina vitæ mirificè opitulatur, aded vt calculos eiciat, tam in renibus quam in vesica genitos. Leporinum sel saccharo exceptum, oculorum argemas nubeculasq; delet. Leporinum stercus (vt aiunt) mulieribus gestatum, conceptum impedit. Sed illud experientia compertum est, quòd vuluis earum immisissum, & mensium defluxiones cohibet, & humentem exiccat vterum. Renes crudi, præsertim adhuc calentes deuorati, auxiliantur mirificè calculosis, quin etiam cocti idem præstant. Pulmo autem frequenter adhibitus, attritos ex calciamenti pedes sanat: eiusdem testiculi ijs salubriter manduntur, qui vesica molestis laborant. Leporinus sanguis adhuc calens, cum hordeacea farina decoctus ac deuoratus, dysentericorum profluuium illico sistit. Ad idem quoque valet Leporinus simus potus. Idem atque pili, qui sub ventre habentur (vt Marcellus est author) cum melle decocti, & faba quantitate frequenter deuorati, rupta intestina conglutinant, etiam si lasio in gracilibus fuerit intestinis, verum assidue hoc medicamento vtendum est, donec periculum omne tollatur. Pili leporini vsti, sanguinem vndequaq; fluentem sistunt, peculiariter autem ad fluxum sanguinis narium y valent, qui è ventre viui Leporis euulsi fuerint, si in nares intromittantur. Sunt qui scribant, eos ventriculi doloribus affici nunquam, qui leporinum Talum secum portauerit: sed hac superstitiosa sunt, quanquam non omnino reijcienda. Animal λεγώς θαλάσσιος Græcis, Lepus marinus Latinis nominatur: Ita-
lis Lepre marino. Quod vero λεγώς χερσαίος Græcè Lepus terrestris Latinè dicitur: Arabicè Arnebetri: Italicè Lepre terre-
stre: Germanicè Hase: Hispanicè Lievre: Gallicè item Lievre.

Leporibus bina iecora


Nomina

Τρυγών θαλάσσια. PASTINACA MARINA. CAP. XIX.

Marina Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat, nam eos frangit & euocat.

Pastinaca marina similiter atq; Raia, & alia id genus, in piscium planorum, & cartilagineorum genere collocatur. Pastinacæ Hanc Veneti Pesce colombo, Romani Bruco appellant. Duo eius vidimus genera, aliarum, cuius vnus tantum aculeus canda inest: alterum, cui duo. Postremam hanc aquilam quidam esse censent. Verum cum Aquila vno tantum aculeo sit munita, nec parum capitis figura, & cauda longitudine à Pastinaca differat, piscatorum sententijs ego potius accesserim: quippe

PASTINACA MARINA.



Marcelli i-
gnoratio.

Pastinacæ &
eius radii vi-
ra.

quippe qui dum Istria litora perlustrarem, Pastinacas nonnullas mihi obrulerunt, quarum alia unico, alia gemino ambo armata spectabantur, has mares, illas feminas appellantes. Sed mirum dictu, quam acriter feriant Pastinaca. Aculeo-
nim robustos admodum habent, vtrinque minutis dentibus, ipsisq; aduncis ferra in modum excisis, quorum venenato usu
piscatores grauius afficiuntur. Quam ob causam memoria prodidit Aëtius lib. 3. quod qui à marina Pastinaca percussus
fuit, his vulneris locus manifeste apparet: Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim, & fir-
mum habet aculeum, quo vehementissima vi in altum impulsio nerui sauciantur: quapropter in aliquibus mors derepen-
te totum conuellens corpus comitatur. Idcirco non absq; fori ratione Plinius libr. 9. cap. 48. ita scriptum reliquit: Nullum
vsquam execrabilius venenum, quam radius super caudam eminentis trigonis, quam nostri Pastinacam appellant, quin-
cunciali magnitudine, arbores infixus radici necat. Arma ut telum perferat & ferri, & veneni malo. Latet pisci hic (vt
& idem auctor est libro citato, cap. 42.) latrociniatur ex occulto, transeuntes radio figens. Marcellus Vergilius, nimirum
cupidus ineundi rationem, qua Pastinaca radio vti posset, dentium doloribus sedandis, quippe quod in silentio inuoluerit
Dioscorides, fatetur, etsi diligenter, vt consentaneum est, inquisiuerit, nunquam tamen apud antiquos scriptores eam se
consecutum fuisse. Qua in re aperte declarat, sibi cum Plinio parum intercessisse consuetudinis: quandoquidem Plinius lib.
32. cap. 4. nos abunde docuerit modum, quo ea radio in dentium doloribus vti valeamus, sic inquit: Pastinacæ quoq; ra-
dio scarificare gingiuas, & in dentium dolore vtilissimum. Conteritur is, & cum helleboro albo illitus, dentes sine vexatio-
ne extrahit. Quapropter mirari non licet, si quandoq; in plateis circulatorum, dentium extractores cernimus, qui dentes
absq; ferreis instrumentis, nullo illato dolore extrahant. Idem radius equos persanat, qui subcutaneis vermibus exedantur,
si eo vlcera scarificentur, purganturq;. Pastinacæ iecur oleo incoctum, non modo hominum scabiem sanat, sed etiam bruto-
rum. Piscis tamen esculentus est, si abscisis in vniuersum cauda & capite, decoquatur.

Τρυγών θαλάσσια ita Græcis, vt Pastinaca marina Latinis, pariter & Italis nuncupatur.

Σηπία

SEPIA

CAP. XX.

SEPIÆ coctæ dum estur atramentum ægrè concoquitur: aluum mollit. Collyriis è testa factis conueni-
enter genarum scabritie perfricantur. Vstum in sua testa, donec id, quod crustosum est, abscedat, po-
stea tritum, expurgat vitiligines, furfures, deptes: & vitia cutis in facie: clotum in medicamenta oculo-
rum addi solet: contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absumit,
cum sale tritum & iniectum.


Sepiarum
consideratio.

Polypi mira
magnitudo.

Gesnerus no-
tatur.


SEPIÆ in omnibus Italiae piscarijs, proprium retinent nomen, venalesq; habentur, in ijs inquam, in quibus marini vene-
unt pisces. Hæ polypis similes sunt, præterquam quod hi innumeris pedibus excellunt, illa vero maiore corporis mole. Est
Sepijs in dorso os candidum, superiori parte durum ac læue: inferiori autem fungosa quadam medulla repletum, qua & le-
uiter aspera, & ligni modo frequentibus venis distincta visitur. Expetuntur Sepiæ ossa aurifabris: facile enim in partem il-
lam fungosam annulorum, cæterarumq; rerum formas imprimas, qua metallis igne colliquis expleri solent. Sepiæ suo et-
iam astu non vacat: vbi enim piscantem sensere, effuso atramento, quod pro sanguine his est, infuscata aqua abscondun-
tur. Id quod etiam faciunt aduenientibus voracioribus piscibus. Pariunt (vt prodidit Plinius libr. 9. cap. 51.) omnibus
mensibus, plerunque autem in terreno inter harundines, aut sicubi enata fuerit alga: neque his bimatu longior est vita.
Id quod de polypis retulit Aristoteles lib. 9. de historia animalium, cap. 37. Qua in re dixerim, quod si historia, quam
tradit Plinius libr. 9. cap. 30. de illo tam ingenti Polypo, cuius caput Lucullo ostensum fuisse narrat, dolij magnitudinæ
amphorarum quindecim capax: atque pedes, quos vix vtroque brachio complecti esset, longitudine pedum triginta, vena
perhibetur, nullum sequetur absurdum, quin polypi & denis, & bis denis annis viuere possint. Quod etiam tum sepji-
tum loliginibus enenire posse non dubitauerim, præsertim cum eodem loco scripserit Plinius, sepias, loliginesq; eiusdem
polypi magnitudine in Hispanico litore vndis expulsas esse repertas. Sepiæ atramento tantam vim esse Anaxilæus est au-
thor, vt eo in lucernis accensis addito, cæteris ablatis luminibus, homines circumstantes Aethiopes videantur. Hic an
vel iniuria me redarguat Gesnerus, doctis viris relinquo iudicandum, cum ego sensum, non verba Anaxilæi referam. Sepiæ
polypi, loligines, & cætera id genus mollia difficillimè concoquuntur, quam ob causam antea cæcis verberibus solent, quam
exco-

SEPIA.



excoquantur. Quamquam Athenæus Sepias aqua elixas ventriculo vtilis existimauerit, dixeritq; eas sanguinem attenuare, atque hemorrhoides ciere. Caterum (vt Galeno placet libr. 3. de alimentorum facultatibus) dura sunt carnis, egre conficiuntur, & succi crudi plurimum gignunt. Attamen ijs quibus probe concoquantur, non parum corpori præbent alimentum. Quin & eius testa exusta (vt libro. 11. simplicium medicamentorum, idem scriptum reliquit) ad vitiligines, Sepiarum fa- culcates.

LOLIGO SIVE CALAMARO.



lentes, & scabiem vsum vtilem præstat: mista præterea fossili sale, in oculis existentes vngues eliquat, & antequam vratur frictione dentibus splendorem affert, & illitione vlcera desiccant. Sepia oua in cibis sumpta vrinam ciere Plinius commemorat, renumq; lentorem disycere. Sepijs, nucibus & allio paratis quidam vescuntur, vt salaciores in venerem prorumpant. Quæ Σεπία Græcis: Sepia item Latinis & Italis appellatur: Arabibus Sarathan & Sarthan: Germanis Blackfisch: Hispanis Siba: Gallis Seche. Nomina.

Τρύγλα.

MULLVS PISCIS.

CAP. XXI.

Mullorum assiduo cibo aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei ac scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoueat.

Mullus piscis Latinis olim sic dictus, relicta nulli appellatione, hodie Græcorum more Latinè etiam Trigla, & Italicè Mulli confiteratio, Trigilia nominatur. Duo eius habentur genera (vt diligenter obseruauit Saluianus) colore & magnitudine differantia. Maior qui pedali longitudine sæpe visitur, rubro vestitur colore, aureis lineis à capite ad caudam ductis. Minor purpureus est, maculis quibusdam flauis, liuentibusq; apparentibus, nec palmarem longitudinem excedit. Ambo barbati sunt, ideoque à Venetis appellantur Barboni. Antiquis is magno expetebatur pretio, præcipuè ganeonibus: cum ex fide dignis constet monumentis, Mullos sæpenumero à priuatis etiam hominibus argenti libra singulos venisse, tanta cum eorum iecore, & capite gratia intercesserat gula. Quamobrem Galenus lib. 3. de alimentorum facultatibus de eo hac memoria prodidit. Mulli iecur à gulosis mirabilem in modum voluptatis nomine commendatur. Quidam verò ipsum ne per se quidem solum edendum censent, sed gareleo, quod vocant, in vase preparato, cum pauxillo vini viscus in eo tantisper distent, dum ex vniuersa eius substantia, & preparato liquamine vnus ac similis succus, quantum sensu potius iudicari, factus esse videatur, in quo intincta nulli carne vescuntur. At mihi profecto nequaquam tante suauitatis visum est, ut cum


Mulli facultas et Gal.

Z

vt cum

vt eum honorem mereatur, neq; tam insignem corpori vilitatem conferre, vti nec ipsum caput: quanquam hoc quoq; laudant ganeones, ac secundas post iecur ferre predicant. Caterum intelligere nequeo, cur permulti grandissimos mullos em-
prient, cum nec adeo suavi sint carne, vt miores: nec concoctu facili, vt qua dura admodum est. Itaque cum aliquando

MULLVS PISCIS.



quendam ingenti pecunia prae grandes Mullos ententem interrogarem, cuius rei gratia illos tantopere expeteret, respondit se primum propter hepar illos tanti emisse: tum autem & propter caput. Idem loco citato, circa capitis initium ita scribit. Mullus omnium ferè aliorum durissimam habet carnem, impendioq; friabilem: quod perinde, ac si dicas, nihil in eo esse lentoris neque pinguedinis. Eaque ex parte cunctis alijs praestantius nutrit, dummodo probè concoquatur: haecenus Gale-
nus. Mulli, auctore Plinio, ter anno foetificant, tantaque ijs ingluuius, vt etiam hominum cadaueribus vescantur. li-
ceteris in cibis praestant, qui inferiori labro vtrinq; barbati habentur. Romani, Neapolitanis & Venetis longè praestant. Vi-
num, inquit Athenaeus, in quo Mullus viuus immergitur, haustum venerem viris mirum in modum inhihet: faminis verò
conceptum. Pisci τρυγλα Graecis, Mullus Latinis vocatur: Italis Triglia & Barbone: Hispanis Salmoneta.

Nomina.

Ἰπποπόταμος


HIPPOPOTAMVS.

CAP. XXII.

2 Mesi & Ca-
tecuz addunt
μελά οβρυ. i.
cum vino.

Hippopotami testes exiecati ac triti, a contra serpentium morsus bibuntur.

HIPPOPOTAMVS.

Hippopota-
mi historia.

Hippopotamus est (vt Plinius narrat libro 8. cap. 25. & 26.) belua, qua in Nilo editur, crocodilo altitudine maior: 60
vngulis bifidis, quales bubus: dorso equi, & iuba & hinnitu: rostro resimo, cauda torta, & dentibus aprorum
aduncis, sed minus noxijs: tergoris ad scuta, galeasq; impenetrabilis, praterquam si humore madeat. At Aristoteles libr.
2. de historia animalium, cap. 7. à quo Plinius transscripsisse videtur, de fluuiatili equo ita scriptum reliquit: Os qui-
busdam animalibus rescissum, vt cani, leoni, denique omnibus, quibus dentes serrati, alijs paruum, vt homini, alijs me-
diocre, vt generi suum, equo fluuiatili, quem gignit Aegyptus, iuba equi, vngula qualis bubus, rostrum resimum. Talis
etiam inest bisulcorum modo, dentes exerti, sed leniter, cauda apri, vox equi, magnitudo asini. Tergoris crassitudo tanta,
vt ex eo venabula faciant. Interiora omnia equi, & asini similia: haec ille. Caterum (si Pausania credimus) Hippopotamus
dentes in inferiori maxilla, vt aper exertos habet, eosq; adeo conspicuos ac grandes, vt in Arcadicis scribat à apud Pra-
conid-

ifanias.

concessit matris Dindymena simulacrum anticum extitisse, cuius facies, eboris vice è dentibus Hippopotamorum erat conformata. Sed longe admodum distare videtur ab Hippopotami historia animal, cuius hic imaginem damus, quanquam illud pro Hippopotamo primus Bellonius pinxit, & deinde eum sequutus Gesnerus. Siquidem huic bouum modo pedes bisulci non sunt, nec talus bisulcorum similis, sed canum, luporumve similes, multifidi, unguibus in digitorum extremitatibus emergentibus. Os non mediocre illi esse videtur, cum Bellonio, crocodilum in ore habeat. Dentes nulli visuntur exerti a proprio modo: iuba illi nulla, nullaq; equi aut asini facies: cauda elephanti potius quam apri è posterioribus pendet: aures habet vrsinas, & rostrum porcinum, quod etsi vesimum sit, absurdum tamen fuerit affirmare hoc animal hac tantum nota esse Hippopotamum: nam potius toto corpore, praterquam pedibus, porcum referre videtur. Nec me à mea deducit sententia statua illa lapidea Nili, qua à Roma habetur, prope quam tale animal, quale hic pinximus, stare videtur, ore crocodilio appresso atq; sublato: siquidem cum id nullis notis equum fluuiatilem referat, de quo Aristoteles, Plinius & ceteri antiqui scriptores meminere, mihi persuadere non possum, ibi hoc animal Hippopotamum representare. Et praesertim cum nusquam legerim, Hippopotamum crocodilos venari, & eos dentibus mordicus retinere. Sed Bellonium potius miror, quippe qui scribat, se vidisse Constantinopoli Hippopotamum huic similem, qui absq; humore tribus annis in sicco vixerat, vinebatq; adhuc: cum scribat Aristoteles lib. octauo cap. secundo de historia animalium, quadam esse animalia, vt sunt, quae marina testudines appellantur, Crocodili & equi fluuiatiles, quae viuere quidem disclusa ab aqua natura non valent, id quod ipsa natura ratio & experientia comprobant: quare dixerim ego, potius errasse Bellonium, quam Aristotelem. Itaq; Bellonium hac in re vel cecutisse crediderim, aut longè plura, maiorave narraffe, quam ipse viderit vnquam. Quod autem ita sit, testantur quadam antiquissima Romanorum numismata qua suis cum Hippopotamis ad viuum delinatis iam ante excusa, [hic tamen omissa sunt,] ope & auxilio Iacobi à Strada Mantuani, Caesaris Ferdinandi & Maximiliani antiquitatum praefecti, qui ex suo promptuario illa numismata vt appingerentur concessit. Hippopotamus olim non solum Nilo flumine aiebatur, sed Bambotho quoque iuxta Athlantem Africa & Indo India flumine, vt Strabo & Iulius Solinus narrant. Nusquam veri Hippopotami reperiuntur, inquit Ammianus Marcellinus, vt coniectantes regionum incola dicunt, insectantis multitudinis tadio ad Blemmas migrasse compulsi. Segetum Hippopotamus astu magno depascitur destinatione ante determinatas in diem: nempe ex agro ferentibus vestigijs, ne qua reuertenti insidia comparentur. Primus eum viuum & quinque crocodilos, Roma adilitatis sua ludu M. Scaurus temporario eripio ostendit. Hippopotamus in quadam medendi parte etiam magister existit. Assidua namque satietate obesus exit in litus, recentes harundinum casuras perspeculatus, atque vbi acutissimum videt stipitem, imprimens corpus venam quandam in crure vulnerat: atq; ita profluuiio sanguinis morbidum alias corpus exonerat, & plagam limo rursus obducit. Huius corij cinis cum aqua illitus panos sanat. Adeps frigidus febres: item simus suffitu. Dentes è parte laeva dolores dentium, scarificatis gingiuis. Pellis eius è sinistra parte frontis in inguina adalligata, venam inhihet. Eiusdem cinis alopecias explet. Quod Dioscorides Hippopotami testes contra serpentium morsus propinat, è Nicandri Theriacis, vt alia quam plurima desumpsisse videtur, vbi hunc segetum Aegyptiarum depopulatorem nobis describit his versibus.

Hippopotamus Bellonii & Gesneri.

Bellonius arguitur.

Hippopotamus vbi alatur.

Hippopotami vites.

ἵππος, τὸν νεῖλος ὑπερσάιν ζιβαλόεσσαν
 Βόσκει ἀρούρησιν δ' ἐκακὴν ὀπιβάλλεται ἀρήνη.
 Ὅσι καὶ ἐκ πῶτα μῶσιν λιπῶν ζάλον εἰλυοίνα,
 Χιλῶς ὅτι χλοῶσιν τῶν δ' ἀπεχέμελο ποίην
 Τόσον ὅπως εἶβαν λείπεις βυθὸν ὄσση τῶν περ
 Ἐκτέμελαι γένεσσι παλάσθ' ὄν ὄγατον ἐλαυνῶν.

Belua, quae ἵπποπόταμος Graecis, Hippopotamus item Latinis, & fluuiatilis equus appellatur: Italis Hippopotamo.

Κάστωρ. FIBER. CAP. XXIII.

Fiber ancipitis vitae animal, plerunque cum piscibus & cancris ex aqua victum capessit. Huius testes serpentium venenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinent vsus.

CASTOREVM SIVE FIBER.



quidem

quidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundasque eiciunt: cetera inflationes, tormina, singultus, venena, ixiamque ex aceto bibuntur: lethargicos & utcumque verno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illiti prosunt tremulis, conuulsis & omnibus neruorum vitiis. In summa calfactoriam vim habent. Eligi debent testes, qui ex vno ortu connexi sunt (fieri enim non potest, ut gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui, & virus redolente, gustu acri, mordente ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniciunt in follem gummi aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est, quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abiici, cum venatu videntur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ autem pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euefficiente tunica assumere & siccatum potui dare.

Fibri histor.

Quemadmodum in superiore spectatur Germania, vbiunque Rhenus influit, quin & in Austria, atq; Pannonia, vbi Danubius, in alijsq; finitimis prouincijs, vbi Drauius & Sauus discurrunt, Fiber sanè, quem Græci καστορα appellat, animal est (vt Dioscorides inquit) quod ex amphibio habetur genere: quippe quod & terris & aquis vitā ducat: ibi namq; videtur modo in fluminib. natate, modo in litore vagari, modo in propinquis syluis spatari. Fiber lutra ferè faciem refert, maior tamen. Caput huic est subrotundum, dentes & oculi murini, lingua suilla, leporinaq; maxilla, rostro reufo, minime prominente, longis quibusdam setis barbato, quemadmodum & supercilia. Dentes anteriores, qui vtrobiq; bini spectantur, illi sunt, longi lati, incurui, acuti & intus concavi, flauo colore: molares autem in vtraq; parte octoni, sed inæquales & lima instar asperi, auricula breues, subrotunda, parua, pilosa. Priores pedes digitis quinq; conspicuis constant muris montani aut sciuri modo, firmis vnguibus armati, non autem Simia similes, vt scribit vir quidam clarus: posteriores verò anserinos emulantur, digitus pariter quinq;, cartilagine nigra comprehensis. Caudam habet latam, superiori parte squamosam, altera vero sede leuem & pilis, vt superior vacuam, qua vnà cum posterioribus pedibus ad natandum vitur. Iecur habet magnum, subnigrum, lobis quinq; dissectum, vbi quoq; sel hæret inter minores. Renes longè maiores sunt, splen verò minor, quam requirat corporis moles, vesica suillam refert. Testes illi sunt parui, substricti, & adherentes spina, qui

Vana opinio.

adimi sine animalis vita non possunt. Id quod rectè apud Plinium animaduertit Sestius medicus. Idcirco manifesto fabulantur Solinus, Andromachus, Aelianus, Apuleius, Iuuenalis, Cicero & Plinius, quippe qui scripserint, Castorem sibi testes dentibus amputare conspecto venatore: sed miror Plinium in hac falsa persistisse sententia, cum legerit apud eundem

Castoreum nō prouenire ex testibus.

Sestium (vt ipsemet scribit lib. 32. ca. 3.) id esse fabulosum & comprobatur ab eo errorem cerneret. Ceterum cum Fibris testes sint manifesto spina coherentes & gallorum Gallinaceorum testiculos non admodum magnitudine superent, castorea, qua medicamentis vsurpamus, veri testes nō sunt, sed folliculi quidam, qui tam in maribus, quam in fœminis, vtrinq; in inguinibus, statim sub cute ouorum gallinaceorum magnitudine, & sepe maiores conspiciuntur. Meatum vterq; habet, cuius orificium extra corpus circa pubem perspicuum est, parumq; alterum ab altero distat, ex vtroq; exudat fluitq; humor substantia oleosus, odore perquam graui, quem animal lingua lambit, & deinde seipsum inungit. Liquoris, quo folliculi idem referti sunt, in viuus adhuc animalibus fluidus est, olei modo: deinde exemptus folliculis, & aliquandiu asseruatis, mellis spissitudinem coloremq; contrahit. Postremò cera in modum concreuit, vbi in sumo suspenduntur folliculi. Quod autem hi tumores folliculive, testiculi non sint, ex hoc liquido constat, quod tam in maribus, quam in fœminis habeantur, quodq; nullus in ijs fit meatus in penem, qui inter illos tamen situs est, quinetiam ipsorum folliculorum magnitudo eos non esse testiculos facile cōvincit. Postremò cum testiculi intus spina coherentes conspiciantur, ipsiq; parui, vt praxidimus, nulla consentit ratio, vt Castorea, testiculi esse possint. Nos ergo id primū à Rōdeletio edocti, rei nouitate excitati, Castores duos, marē alterū, alterū fœminā, à Serenissimo Austria Archiduce Ferdinādo nobis dono datos secumimus, vnā cum Claudio Richardo, Casaris Ferdinandi Chirurgico, collegis nostris clarissimis, Andrea Blauio, Ioanne Villebrochio, Georgio Handschio, & alijs nonnullis astantibus medicis, qui omnes non aliter rem se habere inuenimus, quam ipse describat Rōdeletius, cui sequitur a posteritas huiusce secreti munus acceptum referre debet. Cum antiquitas vniuersa, & ad hæc vsq; tempora secuta aetas, in hoc versata sit errore, vt crediderit castorea veros Fibrorum esse testiculos. Fœmina vno tantum meatu & parit & egredit & mingit, vteri & vesica ceruicibus illuc concurrentibus. Cauda vnā cum posterioribus pedibus estur, & quod gustatu piscium carnes planè sapiat, ijs etiam editur diebus, quibus nobis carne interdictum est à lege. Dentes Fibris anteriores (vt diximus) ferocissimi atq; acutissimi sunt, quibus arborum ramos, vt ferro, cadit, quos postea miro coaptat artificio, sibiq; domum construit pluribus tabulatis in riparum caui, vbi iuxta flumina degit. Animal est horrendi morsus: nam hominis parte comprehensa, non ante, quam fracta contrepuerint ossa, morsu resoluit. Ceterum diligenter animaduertere oportet, ne ab impostoribus adulterata castorea emanent: namque pauca admodum habentur ex ijs, que venalis Venetias importantur, que quidem adulterio careant. Cuius manifesto est indicium nimia eorum magnitudo. Quinetiam præstantia indicium præbet conclusus liquor in recentibus mellis instar, in diutius verò asseruatis, cera modo concretus. Adulterantur contritis eiusdem animalis renibus, fœtibus inde testium folliculis. At mihi quidem sæpius contingit & videre & habere ex Austria, Stiria & Carniola Castorea, que omni prorsus adulterio vacant. Plinius libr. 32. cap. 3. eos Castoris testes efficacissimos putat, qui è Ponto afferuntur, id quod prius scripserat Strabo libro tertio sua Geographia, hu verbis. Producit Capreas Hispania, equosque syluestres affatim. Quibusdam in locis lacus incrementa suscipiunt. Cygni & eius generis aues plurima: similiter & otides aues. Fluuij quidem ferunt Castoras: sed Castoreum non eam, quam Ponticum, habet vim. Pontico enim proprium est, vim in medicamentis habere efficacissimam, vt in alijs permultis. Ideoque male vertit Strabonis interpretes φαρμακωδης venenosum, cum potius medicamento sum vertere debuisset, id est in medicamentis præstantius, vt alia permulta qua ibi proueniunt, cuiusmodi est Absinthium, Pbu, Acorum, Amomum & alia complura. Quod cum Damocratem non lateret, in Mithridatis antidoto Ponticum Castoreum addit. Horum meminit Galenus lib. 11. simp. med. sic inquit: Testiculos castoris nuncupant Castoreum, medicamentum & celebre, & multi vsus, aded vt Archigenes de Castorei vsu totum conscripserit librum. Atq; ille sanè particulares eius facultates exposuit, nos verò velut in alijs medicamentis fecimus, ita & in hoc quoq; generalem modò facultatem dicemus: ad quam si quis respiciat, ipse per se particulares inuenire poterit. Itaq; quod ex calfaciat, manifestum est: nam si voles ipsum ad vnguem laeuigatum oleo materatum parti cuiusdam illinere & infricare, euidenter illam iuculescere percipies. Porro calfacientia omnia, vbi constat substantia

Rōdeletii laus.

Castorei adulteratio.

Straboni & Plinio quod Castoreum efficacissimū.

Castorei vires et Gal.

MVSTELA VVLGARIS.



quoniam & in turris ascendit, atque inibi rotunditas (modo eas comprehendere possit) earumque pullos eruat. Altera syluis in-
 colis, rariore, illas deserit: hac proprie Mars vocitatur. Differt ab illa, quod corpore consistat aliquantulum longiore, guttate
 sit lateo, & pilo conegatur clariore tactuque molliore, ut vel his nominibus eius generis pelles, magnatibus expetantur, ad
 hyemales vestes suffulcendas. Sunt qui putent, postremam hanc duorum esse generum: alterum quidem, quod
 in faxis, quercis, ilignis, syluis versatur: alterum vero, quod in piceis & abregnis tantum oberrat, pulchritus nimirum
 aspectu. Mustelarum quoque generi adscribitur quod Germani ZOBELLAM, nos vero Zibellinum vocamus. Hec corporis
 tum forma, tum magnitudine parum differt a martes, quamuis paulo minor sit. Totum corpus habet pile fuluis vestitum,
 praeterquam guttate, quod ex albo nigricat. Zobellis referta est Moscouia, & Lituania, atque etiam in his abundantissima alia
 regiones, a quibus eorum pelles ad nos conuehuntur. Veneunt magno pretio in locis etiam, ubi capiuntur: quo fit, ut venato-
 res quantumvis distanti fuerint. Parro & VIVERRA inter mustelas annumeratur. Ea autem animal est sciuri magnitudi-
 nis, pileo subluvo, audax admodum, & animantibus fere cunctis inimicum, praesertim cuniculo, quos saepe gregatim suis ex-
 antri pellit. Oblectatur sanguine mirum in modum, adeo ut sanguine potius, quam carnibus victitet. Inueniuntur prae-
 terea (ut audio) in Germania, Polonia, & vicinis locis alia Mustelarum genera: quae quoniam hactenus ipse non vidi, neque
 explorata sunt mihi, ideo quid de his scribam, non habeo. Verum quod nunc in Bohemia vitam agam, equidem futurum
 spero favore atque auxilio Serenissimi Ferdinandi, Archiducis Austriae Principis, & domini mihi colendissimi, ut non solum mi-
 hi liceret tractu temporis haec & alia animalia videre & cognoscere, quae in hac boreali plaga proueniunt, sed & multa ra-
 rarum sequi, quae ad rem tum herbariam, tum metallicam spectabunt. Mustela serpentes acriter persequuntur, dimicant-
 que deuorata prius ruta. Basilisco mustela virus exitio esse auctor est Plinius libro 8. cap. 21. adeo natura nihil placuit esse
 sine pari. Inveniunt enim eas cauernis facile cognitibus sola rabe. Necant illi simul odore, moriunturque, & natura pugna
 consistunt. Mustela etiam oculis puncta erutis aiunt visum reuerti, eademque, quae in lacertis, & annulis faciunt. Mustela
 cuiuslibet firmis moschum nonnihil respicit. Is melle exceptus, addita lupinorum aut fenigraci farina, strumas, ceterisque
 pituitosos tumores discutit. Mustelarum felle cum succo feniculi vtuntur quidam ad oculorum argemas & nubecu-
 las: quin etiam idem lentigines, & alia huiusmodi cutis vitia emaculare perhibent, si cum melle, & vitis alba radice, aut
 ari farina illinatur. Nec desunt, qui putent Mustelarum pulmonem ad omnes pulmonis morbos efficacem esse. Mustelarum
 combustarum cinis aqua subactus illitu capitis dolores mulcet: oculis vero iniectus suffusiones emendat. Hoc animal Tarda
 Graeci dicitur: Latinis Mustela: Italis Donnola.

Mustela na-
tura, & vis.

Nomina.

Βάτραχαι.

RANA E.

CAP. XXV.

Contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt Ranarum, si ex sale & oleo decoctae edantur, ins-
 que earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis, pro-
 fluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium
 ranarum cruor auillosos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsorum instillatus: decoctae in aceto,
 & aqua dentium dolores collutione leniunt.


Ranarum
consideratio.

Rubeta.

Ranarum
partes.


Ranae Italiae, praesertimque in subriae populis frequentissima. Genere sane differunt, quemadmodum magnitudine, colore,
 ac natura. Aliae namque ex putredine gignuntur aestiuis imbribus puluere madefacto, quibus sic ortus breuis est vita,
 nullusque earum usus. Aliae vero rite, & secundum naturam ordinem, proueniunt in mari, fluuijs, paludibus, ac lacubus. Sunt
 & terrestres, quae in frutetis, & rubetis plerumque viclitant, ob idque rubetae Latinis dicuntur. Nec desunt in hoc genere, quae
 etiam Calamita dicuntur, quod in arundinetis vitam agant: Verum utraque & venenata, & lethales habentur. Cate-
 rum illae in fluuijs, paludibus, & lacubus versantur, & degunt, quarum nobis in cibis inualuit usus, colore viridi, aut
 subrutilo, cincte uide, tamen si & inibi quandoque ex his cernuntur, quae non tuto edi possunt, ut pote quae a rubetis non im-
 tum pernicie distent. Patriunt Ranae, ut Plinius tradit lib. 9. cap. 51. & experientia quotidie comprobari potest, minimas
 carnes nigras, quas gyrinos vocant, oculis tantum, & cauda insignes: mox pede figurantur, cauda findente se in posteriores.
 Mirumque semestri uita resoluantur in limum nullo cernente, & rursus vernis aquis renascuntur, quae suere nata, perinde
 occulta

RANAÆ.



ocultatione, cum omnibus anni id eueniat: hoc Plinius. Cui tamen sententia prorsus refragatur experientia: quippe quod in paludibus maritimis, que glaciem nunquam hyeme contrahunt, quocumque anni tempore ranas conspiciere liceat. Quapropter dicendum fuerit, Plinium eas tantum quot anni in limum resolui existimasse, que ex ipsius aqua & terra putredine gignuntur. Carnem habent Rana albam, q̄s sanè vtilem, qui bebit a febre aut phthisi laborant, & praesertim Ranarum vis

B V F O.



sic capi, aut gallina iure decoquantur. Vnguentis adduntur, vbi siccare aut discutere sit opus. Decocta, quousque distillant & siant veluti vnguentum, scabiem equorum sanant illita. Ranas decoctas contra serpentium venena antidotum esse patet ex Nicandri Theriacis vbi sic habet

Βάτραχοι καὶ αἰχμοὶ ἀλλὰ τοκῆς
Βάτραχοι ἐν χύτρῳ καθιερθέντες αἰεῖσι.

Βάτραχοι sic Græcè, Rana Latine vocantur: Arabicè Difsaba: Italicè Rana: Germanicè Frosch: Hispanicè Rana: Nominè Gallicè Grenouille & Raine.

Σίλῦρος

SILVRVS.


CAP. XXVI

Silurus recens in cibo nutrit & facilem præbet aluum, sale verò conditus, minimum suppedirat alimentum: arteriam expurgat & vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixæ corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenteriis prodest, si in desidentium fatus adiciatur: fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Existimat Paulus Iouius in libello de Romanis piscibus, Silurum eum esse piscem, quem vulgus Sturionem appellat. Verò Pauli Loulio primio nuptio nem. Namq; Aristoteles Siluro dentes assignat adeo firmos atq; acutos, vt is hamos etiam ferreos frangere valeat. Plinius item lib. 9. cap. 15. tradidit, Silurum vbicunque sit, grassari, omneq; animal appetere: idcirco innatantes equos sæpe demergere, præcipuè in Rheno Germania amne prope Lisboum & in Danubio. At Sturiones etsi prægrandes sint, edentuli penitus

penitus habentur. Ad hec Silurus Aristoteli & Plinio fluminalis semper describitur piscis, cum tamen Sturio frequentius in mari, quam in fluminibus reperitur. Quo factum est, vt facile deductus sim in sententiam clarissimi Manardi Ferraricis: quippe quod pro certo crediderim, Silurum Italis haudquaquam esse cognitum. Quandoquidem inibi in fluminibus,

SILVRVS EX SECVNDA EDITIONE.




Nomina.

quanquam ingentibus, nunquam (quod sciam) Silurus fuerit repertus. Pannoni Danubij accola Silurus vulgari seruane vocant Acchia: Rheni vero litora inhabitantes Germanica lingua Bolich appellant: siquidem is maxime grassatur, morsuq; petit omne animal, quod sibi obuiam sit. Is effigie Gobium refert, capite magno, ore amplo, & dentibus ferocissimis. Hac in sententia me quoq; Plinius confirmat: is enim Silurum & in Rheno, & in Danubio nasci auctor est. Piscis qui Σιλυρος Graecis, Silurus Latinis appellatur: Arabibus Harbe: Italis Siluro: Germanis Bolich vnd Balich.

Siluri confideratio.
Theodori Gazæ error.
Glanides.

Mirum sane est Theodorum Gazam, Græcum hominem atq; doctissimum, ad eam Pliniana lectioni fuisse additum, vt Pliny errores potius, in vertendo Theophrast. & Aristotele fuerit sequutus, quam ipsorum Græcorum genuina iam plantarum, tum animalium nomina. Id quod in Siluro ab eo factum esse, quis facile cognoscer, qui Plinium cum Græco Aristotelis codice contulerit. Siquidem id omne, quod de Glanide scripsit is, Plinius errore magno, suo tribuit Siluro: qui

SILVRVS.



Rondeletii
erratum.

factum est vt Theodorus Glanidem in Aristotele Silurum verterit. Hac itaque falsa interpretatio alijs errandi præbuit ansam, qui tantum Latinum Aristotelis codicem legerunt, vbi Glanidem Silurum vertit interpretes. Id quod nobis quoque antea accidit, quippe qui Gaza ipsius interpretationem sequuti, illius & Pliny erratum non agnoscentes, Pauli Iouij opinionem refutauimus, quod Sturionem nullis armatum dentibus sciremus, Silurum vero Plinio valde dentatum esse, & rapina viuentem, adeo vt is natantes in fluminibus equos saepe demergat. Verum cum posthac & Pliny & Gaza ipsius errata agnoscerem, non potui vtrumque non accusare, quod me quoque in errorem vocauerint. Quare sit in presentia, vt ego subscribam Saluiano, qui Pauli Iouij opinionem firmis defendit argumentis, contra Rondeletij & Gesneri sententiam, quod hic Glanidem potius, quam legitimum Silurum pingat: ille piscem quendam marinum potius, quam fluminalium, dentibus armatum, quem a Gesnero sibi missum scribit, quanquam id manifestò neget Gesnerus. Nec probo tamen friuola Rondeletij argumenta, que contra Iouij & Saluiani opinionem scribit, cum Saluianus ea omnino superauerit. Scribant itaq; illi, quicquid volunt, ego quidem nunquam à Iouio & Saluiano posthas dissentiam, nisi prius horum scripta vbiq; ab his consultata conspexero. Piscis qui Graecis Σιλυρος: Silurus Latinis appellatur, Arabibus Harbe: Italis Sturio: Germanis Stör oder Styrle: Gallis Eslyrgeon: Hispanis Sullio.

Squadr.

Σμαρίδες


SMARIDES.

CAP. XXVII.

SMaridis piscis salici caput exustum, a excrecentes vlcerum oras puluillosq; reprimat, nomas cohibet, thymos clausosq; absomit. Caro b non secus atq; balsamentum prodest a scorpione percussis, aut a cane demortis.

a Meum
ἐλευ σέλλαι
ἰπερσαρκύν-
τα. i. visce-
rum super-
crescentem
carnem coh-
bet.
b Meum
καθαίπερ πᾶς
τάρχος i.
veluti omne
balsamentū,

SMARIDES.




Μαρίδες

MAENAE.

CAP. XXVIII.

MAenarum ex caputibus cinis, si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiam gatum oris putril- gines collutione leuat.

MAENAE.



Etsi studij, ac diligentiae plurimum impenderim, vt quinquam piscis sit Smaris, certior fierem, nunquam tamen apud Ari- stotelem, nec Plinium, nec deniq; veterum quenquam aliquid certi nactus sum, ita vt planè Smaridem cognoscere, ac describere possem. Illud tantum inueni, ijs Smaridem esse pisciculum, manis facie similem. Ex quo facile adductus sum, vt eos non longè aberrare putauerim, qui Smarides eos pisciculos dixerit, quos vulgo Veneti appellant Girolis: namq; hi praeter id quod corpore minores sunt, manas notis omnibus representant. Ceterum cum Mana, quae vulgò Menole dicuntur, sui vulgaris notitia, non est, cur plura de eis differam.

Smaridis es-
sidentatio,
Mane.
Nominis.

Σμαρίδες ita Graecis, vt etiam Latinis Smarides nominantur: Arabibus, Absmaris: Italis Smaridi. Quae vbi Graeci μαρίδες. Latine: Mana dicuntur: Italicè Menole: Hispanicè, Pandelhas.


Κοβίος

GOBIVS.


CAP. XXIX.

GObius recens in suillum ventrem coniectus, si confusa rima in duodecim aquae sextarijs donec duo supersint, decoquatur excolatus & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijcitur. Illius contra serpentium, canumq; morsus auxilio est.

GOBI-



GOBII ALIUD GENVS, SIVE PAGANELLO.




Gobiorū cō-
sideratio.

Gobij facult.
ex Gal.

Gobij flumi-
stiles.

Gobij in Venetiā ichthyopolis frequentissimi conspiciuntur, quod inibi in finitimis lacunis mirum in modum satif-
cent, ac numerosi proueniant. Quare non immerito prodidit Aristoteles in marinis littoribus, ubi in profundum non
labatur aqua, summa cum voluptate morari Gobios. Hos Veneti detractis posterioribus syllabis Go vulgo vocant. Capite
sunt ampla, gustuq; persuaues, quod carnem habeant tum pinguem, tum etiam friabilem. Proinde de his differens Gale-
nus libro 3. de alimentorum facultatibus, sic inquit: Gobius litoralis est piscis, ex eorum numero, qui parui perpetuò ma-
nent. Præstantissimus autem ad voluptatem, coctionem simul ac distributionem, & succi bonitatem est, qui in arenosis
litoribus, aut saxosis promontorijs vivit. At qui in fluminum ostijs, aut stagnis marinis versatur, non eque
suavis est, neque probi succi, neque concoctu facilis. Caterum sciendum est (vt etiam annotauit Galenus) Gobios non in
uari tantum reperiri, verum etiam in fluminibus, & lacubus, quemadmodum testantur ij, qui in Lario lacu, itemq; Ver-


GOBIUS III. ET IIIL.



hinc capiuntur, laudatissimi quidem, propterea quod eorum icter maximam cum palato inerat gratiam. Nam tametsi
 hi pisces, qui Italis dicuntur Bottatise, fluviatiles Gobij non sint, de quibus meminit Ausonius, sunt tamen omnibus
 sui partibus, pulpaque adeo Gobijs similes, ut mihi nihil verendum sit, quin recte in Gobiorum fluviatilium, lacustrium-
 que generi recenseri possint: quemadmodum & ij, qui in fluvijs vniuersim minores existunt, quanquam ex ijs etiam


Bottatise.

GOBIUS V. & VI.



nonnullos inuenias, qui duas, aut tres uncias pendant. In agro Tridentino pauci admodum sunt fluuij, qui Gobios non a-
 lant: namque & Athesis & Nofius, & Lauisus, & Sarca ijs refertissimi sunt. Hos inibi quidam vulgo vocant Capitoni,
 quidam vero Marsoni: at in Hebrunia, vbi tamen rarissimi habentur, corrupto à Gobijs vocabulo, vulgo dicuntur Gbioxxi.

GOBIUS FLVVIATILIS.



hii pisciculi non modo concoctu facillimi, sed & ori suauissimi, atque gratissimi, praesertim cum ouis iurgent: hac enim Gobii vi-
 uunt & pinguis, & copiosa sunt, gustui vero suauissima. Quo fit, vt solertissimi piscatores horum facturas obseruantes,
 non minus expiscandis ouis operam nauent, quam piscibus ipsis. Κωβίος Gracis, Latinè similiter Gobius appellatur: Ara-
 bibus Kamen, Italis Gobio: Germanis Goeb: Hispanis Cadozes: Gallis Gouiones.

Θύρρος

THVNNVS.

CAP. XXX.

Conditanei thunni caro, quam omotarichon vocant, sumpta iis auxiliatur, quos vipera nomine pra-
 ster momorderit: sed oportet vinum quam plurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomitione
 reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè valet: canum morsibus vtilissimè illinitur.


Thunni pisces inter cetaceorum genera recensentur. Is multitudine sua omnibus litoribus sunt nati, praesertimq; Tyr-
 theni accolis magis, quam ijs, qui Adriatici litora inhabitant. In Euripis maxima eorum est captura. Irrumpunt Ma-
 io Mense, ac Iunio in mare nostrum mediterraneum per Herculis columnas ab Atlantico oceano, cogentibus xiphijs, hoc
 est, spathis piscibus, qui ense à rostris prominente instructi, eos toto mari persequuntur: sunt enim xiphia immanes beluae.
 Nam (vt Plinius inquit libro 32. cap. 2) mucronato nostro tam validè naues perfodiunt, vt in oceano mergantur, pra-
 sertim ad Mauritania locum, qui Cotta vocatur, non procul à Lixo flumine. Thunni igitur cum piscium simplicissimis
 timidissimique sint, non aliter in fugam à xiphijs gregatim aguntur, quam ouium greges à lupis: quam ob causam vel in-
 anibus terriculamentis acti, facile vadis atque litoribus intruduntur. Porro summa spectantium voluptate Maio & Iunio Thunnotum
 mensibus Thunni à Gaditanis non longè ab Herculeo freto capiuntur, ad quam piscationem vniuersus concurrat populus, captura
 maximo clamore tympanorū sonu, ac bellicis puluere & igne concrepitantibus terriculamentis. Hac enim eorum captura
 faciliorem reddunt: quandoquidem stolidi cum sint, vocibus & strepitu territi, concitantur ad vada, quo in loco postea gre-
 gatim retibus capiuntur, maximoque omnium plausu trabuntur in litus. Thunni diuersa sortiuntur nomina: namque
 primus thunnotum fetus ab ipso statim ouo Cordilla dicitur, qui mox in Limarius euadit: ex limarijs autè adulescentibus
 Pelami.

Thunni con-
 sideratio.

Xiphia piscis.

Thunnotum

Pelami.



Tunnorum
in cibis facul.

Nomina.

*Pelamides sunt, sic à luto dicta: cum verò de pedalem excessere mensuram, in Thunnos abeunt. Athenæus bos dicitur vine-
re ait, & in prægrandes euadere pisces. Sed huic opinioni videtur aduersari Aristoteles, cum assereret, eos biennio vitam
finire. Animal est paruum (vt scribit Plinius) scorpionis effigie. Hoc ardente Sirio sub pinna affigit aculeo, tantoq; infesta
dolore vt in naues exiliant, quo tempore, vt maxime noxi damnantur in cibis. Caterum thunnorum ventres, quò in abe-
tu ori gratiores habentur, eò magis ventriculo nocent: contra eorum carnes, quæ omni prorsus pinguedine carent, etsi non
tantam cum palato ineant gratiam, minorem tamen ventriculo inferunt noxam. Quanquam huiuscemodi pisces, qui in
cetaceorum genere recensentur (vt Galenus est author libro 3. de alimentorum facultatibus) dura carne sunt pradi: quæ
ob causam & prauis sunt succi, & excrementitium præbent alimentum. Quapropter, sale macerata plerunque eduntur,
quòd inde alimonia tenuior facta ex ipsis in corpus distribuatur: ob idq; sit coctioni, & sanguini faciendo accommodatior.
Nam recens horum caro ni admodum probè concoquatur, magnam crudorum succorum copiam in venis congerit. Piscis,
qui Græcis Θύννος, Latinus item Thunnus vocatur: Arabibus, Kesam & Aliena: Italiis Tonno: Hispanis Atuni: Gallis Thun.*

Garum.

GARVM.

CAP. XXXI.

Garum omne, quod ex piscibus, carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo fatus fiat depascen-
tia vlcera sistit. Morbis à cane medetur: dysentericis, atque ischiadicis infunditur: nonnullis, vt ex-
ulcerata adurat: aliis autem ad lacescenda, quæ vlcera non senserunt.

Ιουός ιχθύων.

IUS PISCIVM.

CAP. XXXII.

Recentium piscium ius, modò per se, modò ex vino potum, aluum subducit, Priuatim ad hunc usum
conficitur è phycidibus, & scorpionibus, & iulide, percis, & recentibus aliis saxatilibus, nec virus
resipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

Gari confid.

Nomina.

Garum dictum esse à veteribus tradidit Plinius lib. 31. cap. 7. quòd olim conficeretur ex pisce, quem Græci Garon vo-
cabant, intestinis illius sale maceratis, ac eliquatis. Quòd item postea è scombri extis confici coeptum est. Fuit olim
Garum complurium ciborum condimentum, adèd vt nullus ferè liquor, qui ad gula luxum magis præstaret, ab antiquis
fuerit excogitatus. Veruntamen de hoc non intellexit Dioscorides, sed generatim de omni piscium, & carniū muria, quæ
hæc diutius asseruari solent. Caterum de piscium iure non est cur pluribus agam, cum satis ab ipso auctore de eo proditum
sit. Quòd Græci γάρρον, Latini similiter Garum dicunt: Arabes Muri sue Almuri: Italiis Garo: & Salamuoia. Quòd verò
Græcis Ιουός ιχθύων, Latinis Ius piscium dicitur: Italiis Brodo de pesci.

Κόρες κλιτικοί.

CIMICES LECTVLARII.

CAP. XXXIII.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni
deuorentur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt: vuluarum ex-
animationes olfactu reuocant. Poti cum vino aut aceto adhærentes sanguifugas abigunt: triti & vrina-
riæ fistulæ impositi, vrinæ angustias leuant.

Cimicum
consideratio.

Cimicum vi-
res.

Cimices sil-
uestres.
Nomina.

Inter omnes nocturnos hostes, qui nobis dulceni somni quietem intercipiunt, nulli quidem nocentiores, infestioresq; ha-
bentur, quàm Cimices: quippe qui non solum morsu dilacerent, quo & somnum interturbant, & sanguinem nobis adi-
munt, sed etiam factorem adeò detestabilem, abominandumq; nobis ex se relinquunt, vt eo longè magis sensus, spiritusq;
ledantur, quàm vniuersa corporis partes, quæ ab ijs fuerint ictæ. Caterum tamen infestissima, foetidissimaq; sint anima-
lia: noluit tamen eos genuisse natura omnium rerum parens, quin suum haberent in medicina usum. Vtuntur ijs recen-
tiores quidam ad ciendam vrinam, viuis in penis organum immisissis, non autem mortuis, & tritis, Dioscoridis modo. Quòd
mihi magis consentaneum esse videtur: siquidem in meatum vrinariū inditi, ingressu titillationem excitant, & vrina
vim expultricem proritant. Sunt & syluestres Cimices, qui ex herbis victum, & locum habent, lectularijs maiores, colore
viridi, aequè ac illi foetidi. Sed hi nullū, quòd sciam, obtinent in medicina usum. Cimices ita Latinis κόρες, Græcis appellantur:
Italiis Cimici: Germanis Wansgen: Hispanis Chismes, Chimesas, & Parauelbos: Gallis Puneses.

CIMICES LECTULARII




Όρα

MILLEPEDAE

CAP. XXXIII.

Millepedæ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex vino potæ difficili urinae, & regio morbo auxiliantur. Millepedæ cum melle anginis vtiliter illinuntur trita, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.



Millepedæ, quas vulgo appellamus Porcelletæ, animalia sunt exigua, & omnibus vulgaria: proinde non operæ pretium duxi, ut plura de eis in præsentia referam, quàm tradiderit Dioscorides. Ceterum animalcula hæc Galeno commenta sunt lib. 2. de comp. med. secundum locos ad diurnos capitis dolores, ubi sic inquit: Maxime etiam profunt sub aquario vase nascentes aselli, millepedæ appellati, si oleo incoquantur. Quamobrem nesciuerim, cur dixerit Plinius lib. 29. cap. ultimo, Millepedam animal esse e vermibus terræ, pilosum, multis pedibus arcuatim repens. Animalia; quæ Græcè όροι, Latine Millepedæ, Aselli & Multipedæ vocantur: Arabice, Harna: Italicè Millepedi: Germanicè Esel: Hispanicè Gallibus: Gallicè Cloporte.

Millepedarum confid.
Millepedarum vsus.
Nomina.

ΣΙΛΦΑ

BLATTA

CAP. XXXV.

Blattæ eius, quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillantur mitigant.

Blattarum plura esse genera, auctor est Plinius lib. 29. cap. ultimo. Verùm hæc, quarum in Hæturia aliquibus locis inueniuntur, gens est multitudo, & quæ vulgò vocantur Piattole, noctu magis, quàm interdiu in cellis vinarijs apparentes, circa latinarum ora, in pistrinis, balneis, viginosisq; adium partibus, foedissima quidem nauseosaq; sunt animalia. Gryllos hæc qui noctibus astate strident, quadantenus referunt: planiores tamen, cruribus etiamnum tenuioribus arancorum modo: proinde fuga citissima. Lux istis aduersissima, ita ut, si nocte lumen repente inferatur, humentibus locis, in quibus degunt, cæcissimo cursu refugiant. De his igitur, ut potè quæ multum in pistrinis versantur, intellexisse Dioscoridem credendum est: non autem de illis vermiculorum modo oblongis, quæ in apum aluearijs, & in carnibus diu sale inueteratis enascuntur: quanquam & hæc blattæ nomen sibi vendicauerint. Nobis hæc vocantur vulgò Barbeggie, alijs verò Carpe. Blattarum vires, quas pluribus Plinius conscripsit, silentio inuoluimus, rati gratioribus, salubrioribusq; remedijs morbos posse sanari.

Blattarum consideratio.

Nomina.


scari, quam ijs, qui à tam foetidis, atq; execrandis sumuntur animalibus. Quae Graecis οὐδεν, Latinis pariter & Italis Blaita nominatur: Germanis Brillen vnd Heimuchen. Hispanis, Rapacoua.

Πνεύμων θαλάσσιος.

PVLMO MARINVS.

CAP. XXXVI.

POdagras, pernionesque emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus.



Pulmonis marini confi.

Pulmones marini animalium pulmonibus non absimiles habentur. His (vt Plinius est auctor libro 9. cap. 47. eadem quae frutici inest natura, perinde ac spongijs, vrticis, stellis, & olothyris. Conspiciuntur marini pulmones plerunq; vndis supernatantes, futuram maris procellam praesagientes. Colore cristalli in modum pellucido, cum caruleo misto, substantia tam fragili, vt vix è mari integer eximi queat. Mirum, quod si ijs virga baculiq; perungantur, nocte facium accensarum modo lucem edunt: admotus pruritus facit, & ruborem excitat, id quod ego in me ipso expertus sum. πνεύμων θαλάσσιος, ita Graecis: Latinis vero Pulmo marinus appellatur: Italis Potta marina. Hispanis, Natura de uicja, Capacha de velha.

Nomina.

θαλάσσιος, ita Graecis: Latinis vero Pulmo marinus appellatur: Italis Potta marina. Hispanis, Natura de uicja, Capacha de velha.

Πνεύμονες.

PVLMONES.

CAP. XXXVII.

a Meum αὐτῆς. i. ipsius.

Svillus, & agninus, vrsinusq; pulmo impositus, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuctur. Vulpinus verò si arefactus bibatur, sulphureos adiuuat. Adeps a quoque liquet. & eius, intususq; aurium dolores finit.



Vana de vrsae partu opinio.

Multa praeterea sunt horum animalium membra, de pulmonibus quorum differit Dioscorides, quae medicamentum vim possident, de quibus postea speciatim suis locis dicitur. Verum cum haec animalia nemini non sint cognita, non opus esse existimo, vt de ijs plura dicamus. Quanquam illud silentio non dissimulandum, quod scilicet Vrsarum partus non sit plurimis membris indiscretus, cruribus praesertim, & vndiq; rudis, ac informis: nec quod parentis linctu formam tandem recipiat vrsinam, vt nonnulli scriptis commendarunt, & credit vulgus. Quandoquidem in valle Anania supra Tridentum vidimus nos prae grandem Vrsam praegnantem, ab ipsis venatoribus exenteratam, cuius catuli adhuc in vtero existentes, omnibus suis membris distinctis, ac formatis reperti sunt, non autem informes, vt pleriq; existimant, magis fortasse Aristotelis, & Plinij auctoritatibus freti, qui ita esse memoria prodiderunt, quam sensibus, & experientia.

Nomina.

Πνεύμονες Graecè, Pulmones Latine dicuntur: Arabicè, Rich, & Riche: Italicè Polmoni: Hispanicè, Leyanos: Gallicè, Polmon.

H'πα'α

IECINORA. CAP. XXXVIII.

A Sini iecur in assatum esu comitialibus prodest: veruntamen ieiunis edendum præcipitur. Capræ vero in assati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius vaporari: prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iecinoris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex vino potum, contra serpentium, † volucrumq; morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitat, tostum, & in cibo ab emortis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri credatur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninis dicitur: hunc à cane, qui mordit, exemptum & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum autem sale Mergu iecur, ex hydromelite binis ligulis potum, secundas pellit.



P RATER Afini, Capra, Hirci, Apri, rabidi Canis & Mergi iecur, est & Lupinum, quo vtuntur medicorum nonnulli, qui Iecinoris lupi confid. primas tenent in vniuersa Italia. Siccant enim lupinum iecur, mox in puluerem conterunt, & tanquam præcipuum medicamentum vs exhibent, qui iecinorosis afficiuntur fluxionibus: vsq; similiter, qui aqua inter cutem laborant. Quamquam id probare non videatur Galenus lib. 11. simplicium medicamentorum, sic inquit. Iecur lupinum sæpenumero in Lupini Iecinoris vires ex Galeno. medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur, nec tamen quod memoria dignum sit, amplius præstare comperi, ad illud videlicet comparans, quod sine ipso componitur. Secus autem Galenus de iecore lupino scripsit postea libr. 8. de compositione medicamentorum secundum locos, vbi iecinoris medicamenta recenset, cum sic inquit. Cochlearum terrestrium carnem valde probe terito. & assusis vini nigri cyathis tribus calfacito ac bibendum dato. Videntur autem hæc iuxta totam substantiam efficacia esse, non secundum vnâ aut alteram qualitatem. Quale est & lupinum hepar, cum abunde experimentum habemus. Vfus autem ipsius consimilis cochleis est: teritur enim exacte hepar lupinum, & datur drachma vna cum vino aliquo dulci, qualia sunt theraum, Creticum, & scybelites, ac dulce protropum. Benigna enim hæc sunt viscera, ipsum vitare potentia, & media iuxta calidi & frigidi oppositionem: & ob id talia pharmaca omnibus intemperaturis conuenire videntur, vt quæ ex substantia proprietate comoditatem de se exhibet, & neq; calidas neq; frigidam intemperies ladunt: hæcenus Galenus. Caterum idem in simplicium medicamentorum censu, libro paulo ante citato, Canis rabidi iecur non vs præstare viribus, quibus aliquorum fert opinio, scriptum reliquit his verbis. Iecur rabientis canis, si assum edatur, remedium existere vs, qui ab ipso fuerint demorsi quibusdam memoria est proditum. Ac scio certè quosdam qui ipsum sumpserunt, mansisse superstites, verum non illo solo: siquidem alijs præterea remedijs vsi sunt, quorum fecimus penulm in rabiosorum morsibus. Audiui verò quosdam, cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos. De iecore Mergi in aqua degentis, tamen si Galenus nihil literis mandauerit, Paulus tamen id renum calculos eijcere tradidit. Dioscorides verò secundas, non autem calculos pellere protulit. Quo sit, vt Pauli codicem de prauatum esse crediderim. At ventris quidem Mergi meminit Galenus citato loco, eorum opinionem vt vanam explodens, qui ventriculo roborando ipsam exhibent. Eoq; idem deridet medicos, qui ad idem vsurpant internas ventriculorum gallinarum tunicas: siquidem ait, se vtrunq; expertum fuisse, nec inde quicquam consecutum emolumentum. Quod tamen cum ignorent recentiorum quidam, cum seplasijs ad ventriculum roborandum aliquid præcipiunt, nihil frequentius habent in ore, quam illud, Recipe stomachi gallinarum, longè magis vulgum, quam Galeni dogmata secuti: quanquam in hoc Galenus sua experientia fretus, aperte Dioscoridis refragetur. Quod Græci ηπα, Latini item hepar & iecur vocant: Mauritanij Bedib: Itali Fegato: Germani Eber: Hispani Figado.

† Sunt qui hoc loco non ανωον quod est volucrum, legant: sed ανωον id est, quadrupedum, priore tantum mutata littera. Certè facilis hic fuit librariorum lapsus: tamen quæ sit vera Dioscoridis scriptura, non facile intelligi potest, cum Plinio aues etiam dentate prodantur.

Αιδιον ελαφου.

GENITALE CERVI.

CAP. XXXIX.

Genitale cerui tritum, & in vino potum, à vipera demorsis auxiliatur.

Rhasis auctor est, Genitale cerui, præter vim, quam sibi natura comparauit contra viperarum morsus, vt etiam scribit Dioscorides, auxilio esse remorantibus vrinis, ac coli cruciatis affectis, si vbi aqua probe fuerit elotum, ipsa statim cerui visceribus ablu-

ablutionis bibatur aqua. Aiunt in puluerem tritum, & ijs medicamentis inditum, qua venerem excitant, ea valentiora efficere. Quin & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. Cerui genitale auxiliari serpentium moribus auctor est quoq; Nicander in Theriacis hoc carmine, à quo sumpsisse videtur Dioscorides:

Ἡ ἐ καὶ ἐξ ἐλάφοιο ταμῶν ποιεῖνα θοραίν.

Nomina.

Quod αἰδ' οἶον ἐλάφου Græci, Genitale cerui Latini dicunt: Itali, Verga del ceruo.

Ὄνυχες ὄνυ, καὶ αἰγῶς

VNGVLÆ ASINI ET CAPRÆ.

CAP. XL

Vngularum asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare: eadem oleo subacta strumas discutiunt; & illitæ pernionibus medentur. Caprinarum cinere peruncta ex aceto alopecia sanantur.



Vngularum vires.

Nomina.

Non solum Asini & Caprarum vngula in medicum veniunt vsum, sed & Vaccarum, ex prioribus tantum pedibus mixta, vt auctor est Rhafis libello de 60. animalibus. Siquidem harum combustarum cinerem potum, nutricibus lactis copiam prabere existimat: Mularum verò mulieres infecundas reddere. Quinetiam mures earum suffitu fugari, ipse carbonibus impositis & accensis. Earum nomen Græcum ὄνυχες, Latinum Vngues & Vngula: Arabicum Chafit, Stes & Dalef: Italicum Vngie: Hispanicum Vnhas de animal: Gallicum Ongle.

Λειχήνες ἵππων.

LICHENES EQVORVM.

CAP. XLI.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super vngulas indurati calli, qui triti, & in aceto poti, comitibus mederi traduntur.

LICHENES EQVORVM.



Callorunt qui vires.

DE Callis, quæ equorum cruribus innascuntur, meminit Plinius libro 28. cap. 10. & 15. ijsq; tritis, & per aures cum oleo infusis, dentium dolorem mulceri scribit, diebusq; quadraginta ex vino aut mulso potis calculos expelli.

Casertim

Ceterum Galenus, cui etiam subscribit Paulus, addidit hos quibusdam usurpari ad quemlibet animalium morsum: Aet- Nomina.
 χιλις ιττωιτα Græcis, Latinis verò Lichenes equorum nominantur: Arabibus Zeide: Italis Calli de caualli: Hispanis Im-
 pones de los cauallos: Gallis, Cal des iambes des cheuaux.

Κατ' ἰμῶνα CORIA VETERAMENTARIA. CAP. XLII.


Veteris corii cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calceamentorum attritus sanat.

Coria vetera, quæ videlicet veteramentorum sunt, vsta (vt Galenus memoria prodidit libro 11. de simplicium medi- Veteramen-
 camentorum facultatibus) ad attritiones commodari calceamentorum scriptum à quibusdam est, tanquam scilicet torum vires
 hoc faciant ex antipathesi quadam. Certè quæ phlegmone obsidentur, haudquaquam iuuantur: verum vbi sedata fuerit ex Galeno.
 phlegmone, non iniuria iuuantur, nempe quia resiccantur: hæc Galenus. Ceterum veteramenta prunis accenso fumo na-
 tu accepto, efficacissimum constat esse remedium ad vuluæ strangulatus, vt mihi quoq; experientia comprobatum est:
 quandoquidem hoc tantum remedio ego deploratas in eo affectu mulieres incolumes pluries reddidi. Iis similiter accensis
 serpentes efficaciter sugari compertum est, neq; eos modò, qui in domibus nostris oberrant: sed eos etiam, qui in hominum
 corpora ingrediuntur, dum homines per astatem alto somno oppressi, ore aperto in campestribus obdormiunt. Quod scriptis
 tradidit Marcus Gattinaria nostræ ætatis medicus non contemnendus, accidisse suo tempore cuidam homini, cui cum fru-
 stra adhibita essent innumera medicamenta, ipsaq; alioquin efficacissima, illud tamen magnificè præstitit veteramento-
 rum fumus traiectorio in corpus haustus. Siquidem cum primum immani fera (erat enim vipera non parua) sumi nido- Vipera ex ho-
 rem præsensit, visa est à circumstantibus egredi per anum, nõ sine magna omnium admiratione. Κατ' ἰμῶνα sic Græci, quæ mine fugata.
 Latini Coria veteramentaria vocant: Arabes Geldalatiche: Itali Scarpe vecchie: Hispani Zepatos viegos. Nomina.

Ἀλιόεσες καὶ ἀλεκτρίονες. GALLINÆ ET GALLI. CAP. XLIII.

Dissectæ gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur: sed identidem alias
 sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus: sangui-
 nem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti
 in lamias cornus specie similis (ea verò inter coquendum abiici solet) siccatur, tritaque in vino conue-
 nientissimè stomachicis datur in potu. † Ius è vetere gallinaceo aluum deiicit. Abiectis itaque interaneis
 salem coniici oportet, & confuto ventre decoqui in viginti sextariis aquæ, donec ad tres heminas redi-
 gantur: totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, cnicum
 aut filiculam. Crudos humores, crassosq; , atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, su-
 spiriis, articulariis morbis & inflationibus stomachi.

GALLINÆ ET GALLI.



Tametsi Gallinarum ius simplex (vt Galeno proditum est libro 11. simplicium medicamentorum) retinendi vim ha- Gallorum &
 beat: gallorum tamen veterum cum sale diutius decoctorum, subducendi facultatem obtinet. Aduersus serpentium gallinarum
 morsus tam gallinis, quam gallinaceis vtuntur medici, non tantum ipsis dissectis & apposis (vt docet Dioscorides) sed vi- vires ex Gal.
 ventibus adhuc plumas detrahunt ab ano, eumq; demorsis partibus apponunt: attrahunt enim hæc animalia cucurbitu- & aliis,
 larum modo in se venenum, quo mox interficiuntur. Quamobrem alios gallinaceos viuos continuo apponere necesse est,
 donec iniectum virus penitus absumat. Vtuntur præterea gallinarum adolescentium iure, ad æquandos corporis humo-
 res: post febrium discessum, cum saccharo, serapy modo. Ad hæc gallorum cum gallinis nondum coeuntium testes, deperdit ac
 in morbis vires mirificè restitunt: quam ob causam heceticis & marasmo laborantibus, morborumq; diuturnitate macre-
 factis vtiliter exhibentur. Insuper gallinaceorum testes semen prolificum suppeditant, & venereas roborant vires. Plinius
 cum de gallinis differeret lib. 29. cap. 4. hæc inter cetera memoria prodidit. Non præteribo (inquit) miraculum, quan-
 tum ad medicinam non pertinens, si auro liquefcenti gallinarum membra miscantur, consumunt illud in se, ita hoc ve-
 nenum auri est. At gallinaceis ipsis circulo sarmentis addito collo, non canunt. In quibus illud quoq; sibi à natura datum,
 non est non summopere admirandum, quòd noctis horas distinguant suo cantu: qua in re nunquam adeò somno capiun-
 tur,

Nomina.

tur, quin statim horis cantent: etsi per anni circulum noctes modo breues, modo maxima fiant. Gallina sic Latini, *ἄγελαι* Græci vocantur: Arabibus, Degedi siue Giazjudiuch: Italis Galline: Germanis Han vnd Hennen: Hispanis Gallinas: Gallis Gallines & Coq.

† Codices Græci typis expressi hoc in loco habent: ὁ δὲ ξανθὸς τῆ νεοτακτοῦ μάλα ἰσα δίδεται ἰσχυρῶς χεῖρ ἐαυτοῦ ἰσχυρῶς, καὶ ὅτι τῶν ἰσχυρῶν περιμένειν λῆως σκευασεῖς. hoc est ad sensum: Ius galli iunioris maxime datur ad contemperandos humores vitiosos, & in ardoribus stomachi simpliciter paratum. Verba illa Ruellius, cuius interpretationem aliqui sequimur, vel neglexit, vel illegitima indicavit. Nos vero huc ea afferenda duximus, non solum quod in vulgatis codicibus ac antiquissimo (teste Marcello) legantur: sed quia etiam à Serapione referuntur. Quibus etiam subscribere videtur verborum series & communis rei vsus.

Ωδρ.

O V V M.

CAP. XLIII.

Ovum molliculum plus alit forbili & durum plus molli. Luteum oui contra oculorum dolores vile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo: & condylomatis, cum meliloto: cum vva autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla, in patinis frigitur, vt cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat: spiramenta cutis occludit: inflammationes oculorum infusum lenit: ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à solis adustione tuetur: fronti impositum cum thure fluxiones arceat, auertitq;: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & vino mitigat: vtiliter contra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus & thoracis rheumatismis.



Ouorum cōsideratio.

DE Gallinarum tantum ouis hic locutam fuisse Dioscoridem, credendum est: quippe qua sint cæteris præstantiora, eorumq; sit tum in cibis, tum in medicinis præcipuus vsus. Nam quemadmodum testatur Galenus lib. 3. de facultatibus alimentorum, & Isach Arabicus in suis dietis, gallinarum oua gratioris sunt saporis, ori iucundiora, plusq; afferunt alimentum, quam cætera. Alunt hæc, & breui reficiunt tempore, recreant, semen prolificum augent, & vires ad coitum suppeditant. Quæ omnia eò præstant efficacius, quò recentiora sunt, & à gallinis edita, quæ prius admissarios gallos susceperint: quandoquidem (vt Galenus inquit) recentia veteribus plurimum præstant, quippe optima sunt recentissima, pessima autem vetustissima. Secundum locum sibi vendicant à perdicibus, & phasianis edita, quanquam gallinacea viribus non ex-

Perdicum & Phasianorū oua.

cellant. Deteriora verò sunt anatum, anserum, gruum & reliquarum aquatiliū: aggrauant enim ventriculum: succum crassum gignunt, & agrè concoquuntur, tametsi plurimum præbeant alimentum, vbi à validis, robustiq; ventriculis optime conficiantur. Columbarum oua admodum calida sunt, potius in medicamentorum, quam ciborum vsum expetenda.

Pannonum oua pessima.

Pannonum autem ac struthiocamelorum pessima sunt, saporis horrendi, concoctu contumacia et humana temperatura inimica. In ouis luteum candido longè præstat: nempe quòd illud temperatum constat, ori non ingratum, boni succi & concoctu minimè contumax: hæc verò frigidum est, pituitam gignit, agrèq; concoquitur. Oua varijs & diuersis modis deco-

Ouorum coctura diuersa. Oua tremula.

quuntur: quo fit, vt etiam diuersum afferant nutrimentum, & ob id diuersos in corpore pariunt succos. Probantur, quæ cum putamine decoquuntur, & horum præ cæteris, quæ tremula vocant, quòd lactis semicoagulati instar tremant. Sordidiora, quæ vt velocius hauriantur, breuiorem cocturam experiuntur, minus sanè nutriunt. Quæ autem cum putamine longiore elixatione indurescunt, difficillimè concoquuntur, crassos generant succos, obstruunt, in ventriculo marcescunt: ar-

Oua frixa.

restant, quæ integra in feruentem immerguntur aquam: hæc à nostris, quòd quasi dispergantur, vulgè Sperdute vocantur. Veruntamen curandum, ne hæc quòd, indurentur: siquidem vbi duritiem contraxerint, non secus atq; alia diuina coctæ, redduntur noxia. Quæ deinde ex oleo, aut butyro integra friguntur, ventriculum ladunt, ructus commouent, agrè conficiuntur, consocium corrumpunt cibum, malum præbent alimentum, & putridas pariunt exhalationes. Quæ demum super prunis torrentur, aut ignitis figulinis tegulis inassantur, aluum cohibent, difficilèq; concoquuntur. Et hæc sufficiunt ad

Ouorum vires ex Gal.

ouorum in alimentis facultates. Cæterum quibus, quantisq; oua in medicamentis polleant viribus, retulit Galenus lib. 11. de simp. med. facultatibus, sic inquit: Ouorum album & tenue illud, quo item ad opthalmias vtimur, ex numero est medicamentorum minimè mordacantium. Itaque vtendum est oui albumine non tantum ad oculos, verum etiam ad alia omnia, quæcunque medicamenta requirunt maxime expertia mordacitatis, vt sunt omnia sedis ac pudendorum vlc-

ca magna. Miscetur quoque vtiliter medicamentis profluvium sanguinis ex cerebri membranis suppriment: l. u. que n-
 mura. Cuiusmodi est medicamen Pompholyx elota, & metallicorum quadam etia, de quibus priuatim supr. differui-
 de. Porro & ipse vitellus adsimilis est nativæ, ac proinde miscetur ceratis morfus expertibus, ovis videlicet aut elixis, aut
 est. Verum id tamen manifestum est inter hæc leuculam existere differentiam, quod paulo plus desiccant que sunt assa:
 a quantum huius accipiunt facultatis, tantum deperdant de mitigandi potentia. Miscetur & cataplasinatis pl. legno-
 nem arcentibus, vt is que ex meliloto constant, sedi applicandis. Crudo vero ovo toto vrimur admisto rosaceo ad palpe-
 brarum, aurium, mammarumque phlegmonas, que scilicet aut ictis illis, aut alio quouis modo euenerint, aut extiterint
 in artibus corporibus, puta cubito, & digitorum tendonibus, aut articulis, idque in pedibus pariter, & manibus. Porro in
 aceto coctum ouum si edatur fluxiones ventris desiccant. At si etiam quippiam eorum, que ad dysenteriam, aut celiacum
 effectum conueniunt, illi miscueris, atque in igne modico, fumique experte (qualis est, qui ex prunis constat) in sartagine
 frictus, edendumque ita præbeas, non minime sanè laborantes adiuueris. Aptissima tale admisionem sunt onphacium,
 rhus, cum ipse qui cibis adspargitur erythros nuncupatus, tum succus ipsius, gallæ, sidia, hoc est mali granati putamina, ci-
 miblearum integrarum vstarum. Aptæ quoque & vuarum acini, & myrta, & mespila, & corna. Magis istis medica-
 mentosa sunt balaustium, hypocistis, cytini, siue mali punici flores. Sed & ad ambustiones protinus crudum impostum est
 vitæ, si quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, siue etiam cum vitello totum commiscens applicet.
 Eadem mediocriter refrigerat, & citra morsum desiccant. Nam medicamentis, que humiditates desiccant, aut elixum, aut
 est, aut in sartagine frictum miscetur: ijs vero, que crassa in pectore, pulmoneque inidunt, sorbibile quod vocant: id quod
 aqua eo vsque laxari debet, dum incaluerit. Eiusdem ipsius natura nomine & ad eos, quibus fauces aut ex vociferatio-
 nis ex humorum acrimonia exasperatae sunt, assumitur: tum scilicet quod affectis partibus illinitur, atque cataplasma-
 ti modo inbarret: tum quod substantia sua lenitate ea mitigat, sanatque. Eadem ratione stomachi, ventris, intestinorum,
 a refusa medetur asperitatibus: hæc Galenus. Ouum recentissimè exclusum, si crudum dum adhuc calet absorbeat, præstat
 præstat maximo sanè auxilio, cum ad alba sceminarum profluvia, tum quoque ad gonorrhæam. Caterum oleum, quod è
 vitæ diu in sartagine frictus elicitor, illitum asperitatibus cutaneis mirifice prodest: serpigines, & vtiligines emendat:
 rimas librorum, manuum, sedisque sanat. Quinetiam vlcera in dolores, & articularum cruciatus mulcet. Prodest & auri-
 um doloribus, atque vlcerebus: item ambustus vtiliter illinitur: cerebri contusas membranas putrilagine affectas mirum in
 modum à partibus sanis segregat, vt nos compluries magno cum honore periculum fecimus. Ex ovis præterea omnibus volu-
 cribus generatio euenit, quanquam & aquatilibus fere omnibus, præterquam phocæ, delphino, & alijs nonnullis. Gig-
 antur item ex ijs & terrestribus quadam, vt crocodili, lacertæ, testudines, stelliones, & alia: & è reptilibus omnia, vipe-
 ra excepta. Verum, vt Hippocrates auctor est libro de natura pueri, seu foetus (nisi fortassis librorum culpa eo in loco co-
 dex sit deprauatus) pullus ex vitello nascitur, informaturque, ex albumine vero alimentum, & augmentum capeffit. Cui
 sane sententiæ illud prorsus refragatur, quod de pullorum creatione longo satis sermone posteritatis memoria prodidit
 Aristoteles lib. 6. cap. 3. de hist. animalium. Illud insuper eam refellit sententiæ, quod experientia sæpe à mulierculis
 compertum est, quæ suis gallinis oua incubanda subiiciunt. Siquidem exempto quandoque foetu, die vno, atque duobus ante
 tempus exclusionis, fractus pulli visceribus magnam vitelli partem inuenerunt in corpus assumptam. Testudinum oua,
 quæquam diutius elixantur, nunquam tamen eorum album concrefcit, quantum luteum admodum durefcit. Præterea
 experimento compertum habeo testudines statim oua non edere cum testa obducuntur, quemadmodum volucres, sed post-
 quam omnia, quæ in corpore fuerint, testaceum contraxerint putamen: namque mihi quandoque contigit disseccasse testudi-
 nem, quæ vtero septena gerebat oua, suo putamine obducta, quæ & serpentibus euenire quidam existimant. Ouum quod
 Latini, & Græci vocant: Arabes, Naid, Beid, seu Baid: Itali, Vouo: Germani, Eim Ey: Hispani, Hueuo, & ouo: Gal-
 li Oeuf.

Quorum
partes.

Oleum ex
ouorum la-
teis.

Animalia ex
ouis orta.

Oua testi-
num.

Nomina.

Tétrages.

CICADAÆ

CAP. XLV.

Cicadae, quæ in assata manduntur, vesicæ doloribus prosunt.

CICADAÆ.



Cicadarum
consideratio.

Cicada passim in Italia cognoscuntur, atque adeò inibi vulgaris notitiae sunt, ut saepe estate assiduo cantu messorum, agricolos, ac viatores in campestribus obtundant. Caterum, quemadmodum tradidit Aristoteles lib. 5. cap. 30 de historia animalium, & Plinius lib. 11. cap. 27. qui certe ea omnia Aristoteli accepta referre potest: Cicadarum duo sunt genera: alia enim minores, quae prima prodeunt, & nouissima pereunt; alia maiores, quae canunt, eademq; nouissima prodeunt & prima intereunt. Sunt quae canunt praecinctu diuiduae siue minores, siue maiores sunt: quae autem non canunt, indiuiduae sunt. Pariunt in aruis cessantibus, excavautes foetura locum asperitate praecurata, quam parte habent posteriore, quemadmodum & bruci. Quin etiam in arundinibus, quo adminiculo vites eriguntur, nidum foetura excavaunt. Proveniunt large copia imbrium. Crescit primò in terra vermiculus, deinde fit ex eo, quae tettigometra vocatur parentis nomine, quo tempore gustu suavissima sunt, anteaquam cortex rumpatur. Postmodum circa solstitia noctu exeunt, statimq; rupto cortice prodeunt cicada ex matrice illa cicada, quam modò tettigometram dixi. Mares canunt in utroq; genere, femina verò silent. Vnum hoc animal, ex ijs quae viuunt, sine ore est. Pro eo quiddam aculeatum linguis simile habent, & hoc in pectore, quo rorem lambunt. Pectus ipsum fistulosum, vnde illis redditur cantus. Oleas maxime amant, ut minus umbrosas, quanquam & ceteras non aspernantur arbores: proinde vbi arbores desint, nasci non possunt. Loca praeterea frigidiora oderunt: quamobrem in umbrosis nemoribus esse nequeunt, nec in frigidis etiamnum regionibus. Quo factum est, ut crediderit Albertus cognomento magnus, gryllos, qui noctu strident, cicadas esse: quippe quòd in Germania, quae sunt oriundus, frigidissima regione ad Arcticum spectante, tametsi frequentes habeantur grylli astate in campestribus, hyeme verò ad hypocaustorum fornaces plerunque stabulantes, cicadae tamen desunt. Parthi cicadis vescuntur, quemadmodum & gentes ad Orientem. Idcirco mirum non est, quòd dixerit Aristoteles, eas esse gustu suavissimas, anteaquam tettigometra rumpatur cortex. Cecinus fluuius (ut Pausanias est autor) Locrensem agrum, à Rhegino diuidens, cicadarum miraculo est memorabilis. Citerioris enim Locridis accola, atque alia omnes arguta sunt. At in Rheginorum finibus trans Caecinum, nulla est omnino cicada vocalis. Cicadarum vires descripsit Galenus lib. 11. simplicium medicamentorum, sic inquit: Sed & cicadis siccis quidam vtuntur ad colicos affectus, cum paribus numero piperis granis, dantq; aut tres, aut quinq;, aut septem, per intermissionem videlicet, & ipsos etiam paroxysmos. Porro aly assas edendas offerunt, quibus affecta vesica est. *Térztes Gracus, Cicada Latinis dicuntur: Italis Cigale: Hispanis, Ciguatregas: Gallis Sigale.*

Cicada sine
ore est.

Alberti laps.

Cicadarum
vires ex Gal.

Nomina.


Aeneides.

LOCUSTÆ.

CAP. XLVI.

Locustæ odoris suffitu urinæ difficultates adiuuant, praesertim quæ sceminas malè habent: earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos, aut onos dicitur, sine pennis, praelongis cruribus. Exiccata autem si ex vino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abunde vescuntur Aphri, qui Leptin, incolunt.

LOCUSTÆ.

Locustarum
consideratio.

Locuste omnibus nota, varia pro morum & locorum diuersitate sortiuntur nomina. Verum herbis & segetibus infestissima, quòd saepius quibusdam in regionibus paucis admodum diebus vniuersa terra germina absumant. Harum, quemadmodum tradidit Aristoteles lib. 5. cap. 28. de historia animalium, qui mares sunt, foeminis magnitudine cedunt. Pariunt in terra fixo cauliculo, quo mares vacant: ac vniuersa, & loco eodem foetum deponunt, ita vt quasi fauus esse videatur. Hinc vermiculi, speciem oui gerentes oriuntur, qui terra quadam pratenui tanquam membranula ambiuntur: qua disiecta emergunt locustæ ac euolant. Tam molli foetura hæc est, vt ad tactum leuissimum dilabatur & pereat. Pariunt exitu veris, & statim à partu moriuntur, vermiculis circa collum innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Mares quoq; eodem tempore obeunt. Locis montanis, aut tenuibus locustæ non fiunt, sed planis, rimosisq; pariunt enim in rimis sua oua. Transeunt Locustæ immensa maria, immensosq; tractus permeant (vt Plinius inquit) diraq; mensibus contegunt nube, multa contractu adurentes, omnia verò morfu erodentes. Italiam ex Africa maxime coorta infestant, tanta sanè multitudine, vt solem obumbrent sollicitè suspectantibus populis, ne sistentes suas operiant terras, quòd non modo vniuersas cum segetes, tum herbas deuorent ad radicem vsque, sed & radices ipsas regenerare prohibeant. Huius rei testimonio fuere inaudita Locustarum agmina, quae nostro tempore volente anno Domini M. D. XLII. ex paludibus Meotidibus profecta, non solum vniuersam Pannoniam, maximamq; Germania partem, sed totam etiam Italiam occuparunt, non sine magna omnium è terra nascentiu pernicie: siquidem omnè segetem, omnemq; virentem herbam radicibus deuorant. Hæ Parthis in cibo grata. Quamobrè admirandum non est, si sacris literis mandatum sit, vt Levitici 11. capite legitur,

Locustarum
agmina in
Italia.Locustæ in
cibus.

à Mole

in Mare probatas esse in cibis. Nec mirum etiam; diuum Ioannem Baptistam ijs ex syluestri melle victitasse in deserto: rati-
 onem non desunt interpretes, qui velint pro locustis quasdam herbarum radices intelligi: alij vero nonnullas arborum sum-
 mantes. At mehercule in horum sententiam deuenire nunquam potui: quin potius certo crediderim, ipsum nempe legis
 Mosca sectatorem acerrimum; hisce Locustis animalibus victitasse, quemadmodum etiam sentit diuus Augustinus, ex-
 ponens diui Pauli epist. ad Romanos. In Cyrenaica regione (vt Plinius est auctor) lex est ter anno debellandi Locustas, pri-
 mo una obterendo, deinde foetum, postremo adultas, desertoris poena in eum, qui cessauerit. Et in Lemno insula certa men-
 sura praefixa est, quam singuli enecatatum ad magistratus referant. Necare & in Syria militari imperio coguntur: tot
 orbis partibus vagatur id malum. In India ternum pedum longitudinis esse traduntur, adeo vt foeminarum crura serra-
 rum vsum praebant, cum inaruerint. Earum nomen Graecum ἀνείδες, Latinum, Locusta: Italicum item Locusta: Hi-
 spanice, Logostas de tierra, & Gasanthotes grandes: Gallicum, Locuste & Sauterelles. Locustæ de-
bellantur.

Nomina:

OS SIFRAGVS. CAP. XLVII.

OS SIFRAGVS.

Venter eius auis, quam Latini ossifragum appel-
 lant, particulatim potus, calculos cum lotio pel-
 lere proditur.



Varia admodum est inter scriptores Ossifragi historia. Si-
 quidem Aristoteli volucris est aquila maior, colore cine-
 reo, albicante. Probe hac fortificat & viuut. Pia & benigna est:
 non enim suas tantum nutricat pullos, sed & aquila. Cum
 autem illa suos e nido eiecerit, anteaquam adolecant, quod
 inter se cibi auiditate dimicent, hac recipit eos, & educat. Pa-
 rum Ossifragus oculis valet: nubecula enim oculos habet la-
 sos. At Plinio lib. 10. cap. 3. Ossifragus in aquilarum genere
 annumeratur, isq; ab eodem proditur ex haliaeto, hoc est, a-
 quila marina natus. Marinam hanc suum genus non habere,
 sed ex diuerso aquilarum coitu nasci, idem auctor est. Alberto
 praterea Ossifragus ea videtur auis, quam idem lib. 23. Arabi-
 ca voce appellat Kirij, cum sic inquit: Kirij auis est prada vi-
 ditans, bona pullificationis, & diligenter pullos nutriens, non
 solum suos, sed & ab aquila abiectos tadio nutriendi: hac ille.
 Qui vel clarius meminit Ossifragi inter aquilarum genera, vbi
 ita scribit: Quintum autem aquila genus est paruulum valde,
 & a quibusdam vocatur frangens os, eo quod quando carnes
 comedit, ossa in altum desert, & super lapidem cadere permit-
 tit, vt ex ijs constractis medullam sugat: haecenus Albertus. Ve-
 rum is ab Aristotele dissentire manifeste cognoscitur, quod A-
 ristoteli Ossifragus non sit genus aquila minimum, sed auis
 maior aquilis, dempta Germana. Quo fit, vt in hac historia
 Albertum hallucinatum esse credam, quemadmodum & Pli-
 nium in eadem deceptum puto. Namque marina illa clarissi-
 ma aquila vocata (vt Aristoteles tradit) oculorum acie maxime pollet, ac pullos adhuc implumes cogit aduersum intueri
 solem: tum cuius oculi prius lachrymarint, hunc occidit, reliquum educat. Id quod abunde ostendit hac in re Plinium er-
 rasse, atque oscitante fortasse Aristotele legisse, quippe cum marina aquila pulli acerrimi omnino sint visus, nullam ij cum
 Ossifrago cognationem habere videntur, quod hic potius quadantenus cecitate laboret. Caterum, quod nobis esset Alberti
 codex librariorum culpa deprauatus, in quo ossifrago pro osina legebatur, iamdudum credidimus ossifragum apud Albertum
 eam auem esse, quae in maritimis nostris Senensibus circa Hercules portum, & Orbetelli stagnum frequens visitur, cygno
 maior, rostro longo, inferiori parte sacculi instar ampli. Hac autem incolis vulgo vocatur Agrotto. Sed cum postea animad-
 uertissem Albertum in hac historia aperte Aristoteli refragari, atque aliud Alberti exemplar nactus essem, in quo osina,
 non ossifraga, vt vitiose in alio scriptum erat, capi eos acriter accusare librarios, quorum negligentia in causa fuit, vt in hoc
 mihi ipsi haecenus imponerem, secutus deprauatam Alberti lectionem.
 auis, quae Graecis ἀνείδες; Latinis ossifragus nominatur. Ossifragi co-
sideratio:

Plinii opinio:

Alberti sen-
tentia.

Alberti & Pli-
nii lapsus.

Κορυδαλλός GALERITA. CAP. XLVIII.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pauonis modo, gestans. Hac assa, & in cibo sumpta,
 coeliacos adiuuat.

Alaudarum (vt memoria prodidit Aristoteles libro 9. cap. 25. de historia animalium) duo sunt genera. Alterum Alaudarum
 terrenum, cristatum, Galerita a crista appellatum. Alterum gregale, nec singulare, more alterius, verum voblo-
 ri simile: quantum magnitudine minus & galero catens. Canipestres amba sunt aues, vermiculis victitantes, deci-
 dentibusque seminibus. Mares suauiter canunt, primaque sunt aues, quae astatem cantu pronunciant. Porro Alaudae
 ad aucupes aues expauescunt, vt saepe, dum sentiunt se persequi, in hominum gremia confugiant, ne rapiantur.
 Mares in canens diutius retenti, altero saepius obcitantur oculo. Quae auis Graecis κορυδαλλός; Latine Galerita & Alau-
 da vocatur: Arabicis Hanabroch seu Kanabroch: Italicè Lodola: Germanicè Waldlerch: Hispanicè Cucuyada: Gal-
 licè Alouette. Alaudarum
historia:

Nomina:

GALÉ.




Χελιδών.

HIRVND O.

CAP. XLIX.

Diflectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram atigerint, in iuuençæ corio, aut ceruina pelle, brachio aut collo adalligati, comitalib. proderunt, & sæpe profus eos recreabunt. Hirundines vti ficedulæ, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum quàm matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert: anginæ commodè perunguntur: vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui anginæ morbo conflictantur.

Hirundinum
historia.

Chelidonia.

Hirundinum
vires ex Gal.

Nomina.

Hirundinum tria habentur genera: vnum nostra tecta subit: alterum vetustorum adificiorum muros, cauernulas, & mantium scopulos expetit: tertium verò nidificat in altis fluminum ripis. Hæ quotannis (vt Plinius auctor est) ex Africa maria transeuntes, appetente vere ad nos aduolant, & Martio plerumq; Mense nostras ingrediuntur ades: ibiq; nato, & quibusdam stramentis sibi construunt nidos, in quibus ova pariunt, & bis pullos excludunt, tantum humana fident benignitati: atq; vbi vltimos educauerint partus, æquinoctij autumnalis tempore, in suas remigrant regiones. Chelidoniam herbam ab his inuentam tradunt, vnde illi nomen est inditum. Hanc suis obcecatis pullis deferunt in nidum, hoc tantum medicamento ijs visum reddentes. Quineriam experientia compertum esse quidam aiunt, quod si data opera pulorum hirundinum oculi acu perforentur, sanantur paucis diebus, allata à matre chelidonia herba. Hinc igitur edocti medici ad oculorum claritatem chelidonium adhibent: sed his refragatur Aristoteles, vt in maiori chelidonio inferius differemus. Hirundinum verò stercus oppositum præstat: excacat enim, si calidum in oculos decidat. Quod etiam sacra testantur monumenta, in quibus, Tobiam hoc stercore excacatum fuisse, legitur. Caterum vires Hirundinum recensuit Galenus lib. 11. de simpl. medic. facultatibus, sic inquit: Hirundinibus quoq; vsi sunt multi, comburentes videlicet, & cinerum admiscentes, ac deinde synæchicos inungentes, & in totum omnes quicunq; in faucibus atq; columella cum tumoribus consistunt affectus. Vtuntur & ad acuendum visum hoc cinere nonnulli. Alij verò eas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent. Auis χελιδών Grecis, Hirundo Latinis appellatur: Arabibus, Thartaf, Chatas aut Chataf: Italis Rondine: Germanis Schwalb: Hispanis Golandrina & Andorinha: Gallis Arondelles.

Ελέφας.


E B V R.

CAP. L.

EBoris scobe illito, paronychia sanantur. Vini adstringendi chur obtinet.

Omnibus

ELEPHAS.



Omnia sane perspicuum est, ni aliud Ebur esse, quam Elephantinorum dentium materies, multis apta operibus, tametsi Pausanias libro quinto descriptionis veteris Graeciae, non dentium sed cornuum materiem esse ebur describat, his verbis. Quod ad ebur verò pertinet, si qui hominum sanna illas esse è beluarum ore exertas, non cornua existimant, ab Alcei Gallicæ fera, & tauris Aethiopicis specimen capiant. Alces enim qui mares sunt, (nam feminis nulla omnino prodeunt cornua) è supercilijs, Aethiopicis tauri è naribus cornua omnino extrudunt. Quis igitur in magno ponat miraculo esse animal, cuius ex ore erumpant cornua? Argumento & illud esse facile potest illam eboris molem cornua esse, q̄ bestia sunt, quæ arò certòq; tempore cornua abijciant: rursusq; illa quoties amiserint rursus reponant. Hoc cervis, capreis, & item Elephantis accidit. Dens certe animali nullo iam adulto cum semel decidit renascitur. Quare si dentes essent, & non cornua, quæ nature vis, vt renascerentur efficere potuisset? Hac & plura Pausanias. Elephantorum meminit Plinius longa admodum historia, initio libri octavi pluribus capitibus: tametsi non omnia, quæ scribit, probanda putauerim. Elephantos fert Africa ultra Syrticas solitudines, item Mauritania & Aethiopia: sed maximos India mittit: li quàmquam magnitudinem caetera excedant quadrupeda, Aristotelis tamen testimonio adeò cicurantur, vt omnium ferarum mitissimi & placidissimi cauant: quippe qui per multa officia & erudiantur & intelligant. Corio Elephanti integuntur bubalino simili, vt is verus præbuit exemplum, què Roma vidit Leonis decimi Pont. Max. æuo, et si rarissimi horreat pilis. Caput eis magnum, oculum breue, aures verò vndiq; duum palmorum amplitudine: nasum, quem peculiariter in Elephanto promuscidem appellant, longissimum habent, concavum, grandis tubæ instar: hic infra anteriores dentes ad terram ferme promittitur, quo pro manibus vtuntur. Os gerunt pectori proximum, vt quod cum suillo ineat similitudinem: è cuius superna parte dentes duo prominent præcipua magnitudinis (quales plurimi venales conspiciuntur Venetijs in publico foro, vulgò Merceria dicta, ac in alijs Italiae emporijs) qui prona cuspide deorsum vergunt. Pedibus nituntur rotundis, disci instar, latitudine duum triumve palmorum, quos callosa materia obducit: vngulis quinq; circum, rotundis, mediocrium concharum magnitudine. Contra ijs magna ac fortia, neq; (vt quidam imperiti existimant) vno tantum osse constant indivisa, sed genua stectunt, vt pote & caetera quadrupeda. Quamobrem Elephanti (vt refert Aloisius Cadamustus, qui classe in Aethropiam, & ad Calicut nauigauit) vt eos, qui deferri volunt, suscipiant, genua submitunt, seseq; erigunt deinde. Elephantis cauda bubali, trium palmorum circiter longitudine, rarissimis setis referta. Quocirca haud facile se tueri possunt à muscarum inuena, nisi aliam illis industriam natura tribuisset, qua ab ijs se vindicent: quandoquidem ferientibus muscis, cutim, quam cancellatam obtinent, contrahunt, quo fit, vt arctatis in rugas repente cancellis, muscas comprehensas enecent. Homini- bus non nisi lacestiti nocent. Veruntamè irritati homines promuscide comprehensos, adeò in sublime iaciunt, vt priusquam in terram decidant, suffocentur & pereant. Adhac nullus hominum tanta pernicitatu inuenitur, quem mox Elephas non comprehendat, etiam non currens, sed gradatim incedens. Id efficit vasta animalis moles: quandoquidem sui gressus longitudine, humanam omnem pernicitatem euincat. Vicitant arborum tam frondibus, quam fructibus: neq; vlla tam ingens est arbor, quam ij promuscide non prosternant, frangant ac dilacerent. Adolefcunt ad sexdecim palmorum altitudinem, quapropter qui eos conscendere non assueuerunt, non secus fastidio afficiuntur, ac illi, qui nauibus non assueti maria sulcant. Effrenes præterea adeò natura Elephanti sunt, vt nullis habenis cohiberi possint, quo fit, vt liberi incedere dimittantur: verum cum maxime gubernantibus suarum regionum hominibus pareant, & eorum sermonem intelligant, idcirco verbis facile reguntur. Adeò conspectum ignem expauescunt, vt eo territi à fuga reuocari non queant. Qua re ab ijs non cognita, qui eius Elephanti curam gerebant Roma, in cuius dorso oppidulum construxerant, eo die, quo Iulianus Medicus Pontificus Max. frater vxorem è Gallia duxit, in magno sanè discrimine versati sunt: nam vbi bellica tormenta ingrem eructantia conspexisset, magnumq; ac terrificum sonum sensisset, tanta se fuga dedit, vt nunquam cohiberi voluerit, donec vnà cum conclusis in oppidulo hominibus in Tyberim sese commiserit. Elephanti non coeunt neq; gignunt, nisi annuum vigesimum agant, vt auctor est Aristoteles lib. 6. cap. 27. de historia animalium. Qua in re Pliny error manifestus deprehenditur: quippe qui marem quinquennem, feminam decennem generare memoria prodiderit. Elephanti nulla nouere adulteria: nam vnus tantum femina coitu vtuntur, eamq; cum vterum gerentem viderint, nò amplius tangunt. Quantum verò temporis vnaquaq; femina vtero gerat, haudquaquam sciri potest: quod Elephanti pudore nunquam nisi in abdito coeant. Idcirco alij eis annum & sex menses statuerunt, alij biennium, alij deniq; triennium. Pariunt femina cum dolore, quemadmodum & mulieres. Pullum editum ore lambunt, qui statim cum natus est, cernit & ambulat. Vnde Elephantos (vt inquit Aristoteles) tradunt quidam annos ducentos: sed florere atate circa sexagesimum vel septuagesimum narrant. Iidem hyemis ac frigoris impatientes sunt. Gaudent annibus maxime, circaq; fluuios vagantur, quos intrant libenter bubalorum more. Caterum Elephanti ingenio & intellectu hominibus proximi sunt: siquidem patrios sermones intelligunt, summam præstant obedientiam, prudentiam seruant, & religionem præ se ferunt: solem namq; ac lunam

Elephantorū historia.

Plinius de Elephanto.

Errot quorundam.

Plinii lapsus,

Elephantorū partus.

Elephantorū
mira agaci-
tas.

Fuchsi opi-
nio falsa.

Eboris vires.

Nomina.

lunam venerantur. Cuius rei auctores sunt Maurisani, in quorum regionibus Elephanti innumeri conspiciuntur: qui gre-
gatum noua nitescere luna ad amnes descendunt, ibi, lauatur: mox purificati, genibus flexis salutant sidus, & in gregem
reuertuntur. Sunt, qui tradant tanta intellectus sagacitate Elephantos pollere, vt maria transituri ad alienas regiones,
non antea naues conscendere voluerint. quam y, qui eos ducebant, iuretur. indo de reditu promiserint. In syluas ituri gre-
gatum serè semper ingrediuntur, quorum agmen ducit natu maximus: cogit verò atate illi proximus. Produunt Elephan-
tos a venatoribus circumuentos, cum sciant præd. in solùm in dentibus suis ab illis expecti, dentibus vehementer impin-
gentes arboribus eos sibi euellere, prædaq, se redimere. Quod facile crediderim vanum ac fabulosum esse: quemadmodum
esse falsum superius ostendimus, quod siber viso venatore sibi ipsi testes amputer. Elephanti omnes natura indomiti, sil-
uestresq, sunt, mitescunt autem arte, vt pleraq, alia fera animalia. Item si parui & atate tenelli educantur: quanquam
Plin. tribit, natu grandes domari fame & verberibus: præsertim si alijs domitis, qui tumultuantem coerceant, admo-
ueantur. Porro non desunt in Elephantorum genere, qui natura feritate nunquam domari possint, quales in Senega vt in
suis nauigationibus scriptum reliquit Aloisius Cadamustus) Aethiopia regno reperiuntur. Elephantorum dentes ad mira-
bilis magnitudinis venales spectari possunt in compluribus Italia vrbibus, veluti Roma, Venetijs, Mediolani & Neapoli:
quibus non solum innumeri pectines parantur ad explicandos capillos, sed etiam alia plura instrumenta, qua ad huma-
num usum accommodantur. Hinc itaq, fit, vt nesciam ego, qua ratione ductus Fuchsius, scripserit in libro de compositione
medicamentorum, quem nuper auctum edidit, Ebur nullibi penè verum reperiri: atque illud quod vulgò eius vice in offic-
inis prostat, marinorum piscium dentes esse: quòd in hoc erret euidentius est, quam vt à nobis ostendatur. Præstat Ebur ad
albas mulierum fluxiones, si tamen in tenuissimum puluerem, lapide porphyreo redigatur, propineturq, ex lactuce semi-
nis cremore, aqua in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Quod Græcis ἐλέφας, Latinis Ebur nominatur:
Italæ Auorio: Germanis Haisfambeyn: Hispanis Diente de elefante aut Marfil: Gallis Iuoire.

Ἄσπράγ αλος ὄος

SVILLVS TALVS.

CAP. LI.

SVillus talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus coli, longisq; tormini-
bus medetur.



Nomina.

Talus in animalibus os illud vltimum pedis est, quod tibia cruris annectitur. Id Græcis ἀσπράγ αλος, vulgò autem os da-
uicula appellatur, de quo non operæ pretium est, vt plura dicamus. Nomina subiiciam. Græcum est ἀσπράγ αλος ὄος
Latinum Talus Suillus: Italicum Talone del porco: Hispanicum Tornizuelo de pie de puerco: Gallicum Talon de porcean.

Ἐλάφιν κέρα

CERVINVM CORNV.

CAP. LII.

a Antiquus
codex. ἵστ-
εικαίς. i. v-
tero affectis.

Cervini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœlia-
cis, a regio morbo & vesicæ doloribus cum tragacantha: fœminis fluxione vuluæ laborantibus,
cum liquore huic rei accommodato. Cervi cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum
indito, vritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & defluxionibus salutare est,
infrictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur, feruefactum in aceto, sicut
gingiuæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Ceruorum
historia.

Cervi animalia sunt notissima. Sed quoniam eorum natura non omnibus cognita est, vt candido cuiq, lectori fiat sa-
tis, ea de Cervis hinc referam, qua Aristoteles tum 6. & 9. de histo. animalium libris, tum 4. de partibus eorundem
posteritatis memoria prodidit. Cervi itaq, syluestrium animalium genere constant, magnitudine asinorum, cursu velocis-
simi & ingentibus armati cornibus. Ii cum turgente iam Venere coitum appetunt, adeò rabie libidinis sciuunt, vt insa-
niant, & maximo cum strepitu & clamore vagantur in syluis: quo fit, vt conualles & montium cavitates, eorum boatu
resonent. Tanto impetu, tantaq, rabie mares feruntur in coitum, vt saepe inter coeundum fœminas declinent atq, proster-
nant in terram. Cum autem maris genitale vtpote durum, sustinere non possint fœminæ, eun: es & currentes cocunt &
concupiunt. Mares non in eadem immorantur, sed mutant & hircorum modo, breui interposito tempore aliam atq, aliam
supergradiuntur. Si forte sortemur in vnâ tantum fœminam concurrant plures, imis cornuum admittunt, statim supra
frontem enatus, acriter inter se pugnant ad mortem vsq. Cum mares impleuerint fœminas, separantur per se ipsi. & pro-
pter libidinis graueolentiam quicq, solitarius scrobes fedit. Fœtent vt hirci: facies quoq, eorum nigrescit aspergine, vt hircorum.

CERVINVM CORNV.



Degunt ita quousq; imber accedat, tum pascua repetunt. Hac ideo Ceruo accidunt, quia salax animal suapte
 natura est, atq; etiam quia pingui abundat: pinguescunt enim astate supra modum. Quamobrem nec currere quidem pos-
 sunt: sed secundo aut tertio cursu capiuntur ab ijs, qui pedibus insectantur. Quo fit vt vbi se prapingues sensere, latebras
 querant, fatentes incommodum pondus. Coitus est ab arcturo, Mense Augusto & Septembri. Implentur cerua paucis
 diebus, & ab eodem multa. Vtero ferunt octo Menses. Pariunt magna ex parte vnum: sed nonnullis etiam gemines cer-
 uam peperisse perspectum est. Ferarum quadrupedum Cerua maxime prudentia praestare videtur, tum quia circa senectas
 pariat, quod scilicet belua rapaces propter homines minus accedunt: tum etiam quia cum peperit inuolucrum primum exe-
 dit, quod ad multa (vt nonnulli asserunt) in medicamentis expetatur. Redeunt mox ad prolem, deuorata a partu scelis
 herba. Anniculis maribus nondum cornua nascuntur, nisi quod indicij gratia sit initium quoddam protuberans, quod
 breue hirtumq; est. Bimis cornua primum oriuntur simplicia & recta, ad subularum similitudinem: quamobrem Subu-
 lones per id temporis eos vocant: trimis bifida exeunt: quadrimis trifida, atq; deinceps ad hunc modum (vt Aristoteles in-
 quit) procedit numerus vsq; ad annum sextum. Ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dignoscere etatem ramorum
 numero. Verum in Italia (sit tamen cum Aristotelis venia dictum) vsq; ad vndenarium numerum ramificant, quod & Aristoteles
 Albertus testatur se vidisse in Germania, quemadmodum & nos vidisse fatemur. Addam praeterea, quod certo scimus, Gu-
 lictum Bauariae Ducem inter res suas pretiosas habuisse bina cerui cornua, quorum singula vnum & viginti ramos fun-
 debant. Hac admiranda cornua postea dono, vt pote raro ac singulari, data fuerunt Srenissima Pannoniorum Reginae Ma-
 ria, Caroli V. Imperatoris, & Ferdinandi Romanorum Regis sorori. Vanum est credere Ceruorum etatis annos dignosci
 posse ramorum numero, quod singulis annis vnum super addant: quippe cum longaeui admodum sint, si quot annis ramoru
 numerus augetur, profecto ijs, qui vltra centum annos vixisse narrant auctores, cornua quercubus, & pinis maiora su-
 mero etatem dignosci.
 40 isent. Caterum (vt Aristoteles scribit) duplici indicio senes cognoscimus, tum quod dentes aut nullos, aut paucos habeant:
 tum quod adminiculis careant, qua imis cornibus prominent ante frontem: Nam ijs in pugna vtuntur iuniores, sed in seni-
 bus non renascuntur, cum praelijs omnino cesserint. Cerui (vt etiam Theophrastus inquit libro & capite primo de historia
 plantarum) quotannis cornua amittunt: ideo sub ipsa die quam maxime inuia petunt. Latent amissis velut inermes, sed
 & ipsi bono suo inuidentes. Fit hoc mense Aprili, statuto tempore: idq; opacis faciunt locis, vt muscarum tadio vacent: pa-
 scentur per id tempus noctu quasi verecundantes, donec recipiant cornua. Decidua amittunt difficilibus, & inaccessis locis,
 & qua inueniri nequeunt: vnde illud prouerbum ortum: qua cerui amittunt cornua. Quasi enim sua amiserint arma,
 cauent ne inermes reperiatur. Cornu sinistrum compertum esse (inquit Aristoteles) a nemine adhuc fertur: occultunt e-
 nim id tanquam quodam medicamento praditum: etsi Plinius & Albertus oculi dextrum memoria prodiderunt. A pha-
 lango demorsi, vel a quouis generis eiusdem, caneros edunt: quod idem homini etiam prodesse putatur: sed non carent fa-
 50 sidio. Cerui sibilo, & cantu venantium, pastorumq; fistulis capiuntur: mulcentur enim alliciunturq; ea voluptate, ita vt
 alter venantium cantet palam, aut sibilet, alter clam feriat a tergo, vbi socius iam tempus esse significauerit. Namq; ani-
 mal simplex ceruus est, & omnium rerum miraculo stupens, intantum vt equo, aut bucula accedente, propius hominem
 iuxta venantem non cernat, aut si cernat, arcum ipsum sagittasq; miretur. Si ceruus erectas auriculas teneat, acerrime
 sentit, nec latere insidia possunt: sin demissas, facile interimitur. Maria tranant gregatim natantes porrecto ordine, &
 capita imponentes praecedentium clunibus, vicibusq; ad terga redeunt. Hoc maxime notatur a Cilicia Cyprum traicien-
 tibus. Nec vident terras, sed in odorem earum natant. Ceruorum femina cornua non habent: nec maribus nascuntur, si
 cum per etatem nondum cornua gerunt, castrantur: sed si cornigeris testes exciduntur, non decidunt cornua, & magnitu-
 dine eadem seruantur. Ceruas tamen cornigeras, non sine natura miraculo, quandoq; inuentas esse compertum habeo. Hu-
 60 ius autem miraculi fidem facere possunt illa cornua ceruae, qua sunt Augusta Vindelicorum apud Antonium Fuggerum no-
 bilissimum ducem, in quorum singulo sex rami conspiciuntur. Atq; id ipsum confirmari potest non dissimilibus ceruae cor-
 nibus, qua argento laborato ornata conseruat Dux ille Bauariae, de quo a nobis paulo ante facta est mentio. Vita cerui (vt
 Plinius memoria prodidit lib. 8. cap. 32.) in confesso longa: quandoquidem post centum annos quidam capti sunt cum tor-
 quibus aureis, quos Alexander magnus addiderat, ad optis iam cute in magna obesitate. Caterum quod vita tam longa sint
 Cerui vita.
 cerui, quanta eos esse ferunt, non videtur approbasse Aristoteles lib. 6. de historia animalium, vbi sic inquit: Vita esse quam
 longa hoc animal fertur. Sed nihil certi ex ijs, qua narrantur, videmus: nec gestatio aut incrementum hinnuli ita euenit,
 quasi vita esset pralonga: hac Aristoteles. Qui reuera nihil certi nancisci potuit ex his, qui centum annos post Alexandrum
 capti sunt cum torquibus aureis. Nec etiamnum ex Caesaris Augusti cerua, qua similiter innumeris elapsis annis post eius
 Imperium capta nunquam iugulari potuit, prohibente torque argenteo, temporis diuturnitate cute quasi contecto, in quo
 scripta legebantur verba haec: Noli me tangere, quia Caesaris sum. Monte Asia Elapha nomine apud Arginufam, quo loco
 Alcibia-

Aristoteles arguitur.

Vulgaris opi-
 pino vana,
 ramoru nu-
 mero etatem
 dignosci.

Ceruis castra-
 tis cornua no
 nascuntur.

Alcibiades mortem obiit, cerua omnes scissa aure sunt, qua nota vel alibi si loca mutauerint, dignoscuntur. Mirum quippe est dixisse Aristotelem lib. 8. cap. 28. de historia animalium, Aphricam nec ceruos, nec apros gignere. Cui etiam Plinius lib. 8. cap. 33. Cum tamen palam omnibus sit, & aprorum, & ceruorum greges in Aphrica haberi: nisi posteriori auro aliunde eo fuerint illati. Dictamnium herbam extrahendus sagittis (vt Plinius est auctor lib. 8. cap. 7. perui monstraucere percussit eo telo, pastusq; eius herba eiecto. Quod tamen Dioscorides caprus attribuit telo in Creta valuerat. Cerui manifesto sel in iecore non habent, quem admodum equi, asini, muli, cameli, dama: & in natalitium genere delphinus & phoca: sed id in venulis continent, qua per intestina sparguntur: quo fit, vt eorum viscerum non modo in vita minime recipiantur, sed nec a canibus quidem edantur, nisi prae pingui sint: amarescunt enim bile, qua suffunduntur. At ceruis Achainis cognomine, sel contineri in cauda creditur, auctore Aristotele. Est quod ibi contineri aiunt, colore quidem simile felli, sed non ita vt sel humidum, lieni simile parte interiore. Hoc degustantibus atrocissimum est venenum, adeo vt breui temporis spatio hominem e medio tollat. Vermes cerui omnes continent in capite viuos, qui nasci solent sub lingua in concavo circiter vertebram qua ceruici innectitur caput, magnitudine haud minores his, quos maximos carnes putres ediderint. Gigni vniuersi atque contigui solent numero adeo circiter viginti. Ceruinus sanguis (vt Rasis inquit libro sexaginta animalibus dicato) clysteribus infusus intestinorum vlcera sanat, & diuturnas alui fluxiones cohibet: ex vino vero sumptus, venenatis sagittis resistit. Eius cerebrum neruorum, & compaginum collectiones mundat. Cerua ad candorem vsque exustum, ex melle haustum, alui tineas pellit. Iuuenum ceruorum tenerrima cornua, quae adhaec lanuginosa cuticula operiuntur (auctore Scribonio Largo) in taleolis concisa, & nouo fetili indita, ac inde operculo argilla circumlito, in clibanum imposita, donec adeo arescant, vt in pulucrem facile conteri possint, additis pipere & myrrha, colicruciatis mirifice medentur. Sordes etiam, eodem auctore, quae in protensis oculorum ceruorum angulis haerent ac coalescunt, tam hausta quam illite, praestant mirifice ad venenatorum serpentium morsus. Ideoque a Siculis venatoribus dicitur genter colligi scribit, & quocumque portari cum ipsis in cingulo. Os praeterea, quod in ceruorum corde reperitur (tamen Vesalius vir alioqui clarissimus libro, quem de humana fabrica edidit, nullum inibi os reperiri falso contendat) omnium cordis affectibus confert. Quin & contra omnia venena mirifice praestat, antidotisq; admiscetur, quae pestilentia aduersantur. Sed cauendum est, ne huius loco seplasiarij bubulam tracheam arteriam accipiant in compositionibus, vt facere consueuerunt. De Tubere, seu Boletto ceruino vel fungo, quem e cerui semine oriri quidam asserunt, satis superq; a nobis dictum est in libro nostrarum Epistolarum. Itaq; qui hac non legerunt, ibi huiusce fungi historiam & vires inuenient. Quod Graeci ἐλάφου κέρα, id Latini Ceruinum cornu vocant: Itali Corno del ceruo: Germani Huchhorn: Hispani Cuerno de ceruo, & Punta de ceruo: Galli Corne de Cerf.

Κέρυρας

ERVCAE.

CAP. LIII.

ERucis, quae in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, a venenatis bestiis feriri negantur.

Erucarum historia.

ERuca, quibus Olitores maximè inimicantur, animalcula sunt vulgaris notitia, sed hortis admodum noxia, quod quandoque adeo numerosa proueniant, vt inuitis olitoribus olera cuncta vna tantum deuorent nocte. Gignuntur (vt memoria prodidit Aristoteles lib. 5. cap. 19. de historia animalium) ex virentibus herbarum folijs, maximeq; ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio: mox vermiculi inde contrahuntur & augentur: tum intra triannum eruculae efformantur. Haec tempore senescentes motu cessant, suaq; forma immutantur, durioreq; cortice integuntur, cuius color auro fulget: ob idq; (vt Aristoteles prodidit & post ipsum Theophrastus lib. 5. de causis plantarum) appellantur tantisper chrysalides, quasi aurelias dixeris. Dum eo putamine integuntur, ad tactum tantum mobiles sunt, & palpitantes, meatibus araneosis obducta: non os, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident. Longo post tempore putamine abrupto, euolant inde animalia pennigera, quos papiliones vocamus. Itaque primum dum Erucae sunt, cibo auctur, atque excrementum emittunt: at vero cum in aurelias transferunt, nihil vel gustant vel excreant. Harum, dum adhuc puer essem, ingentem copiam quodam anno peperit Hetruria, adeo vt pueri omnes mirabili quadam ostentatione numerosas in plateis gestarent aurelias, ita aureo nitore fulgentes, vt ex puro auri metallo factas quisque credidisset, nisi deprebensae fuissent palpitantes. Fuit eo anno tanta Erucarum multitudo, vt vniuersas eroderent herbas: quo postmodum factum est, vt vbiq; stirpium folia ac rami, adificiorumq; parietes, his veluti viuo ac palpitanti fulgerent auro. Facies eis quasi humana, capite bicorni, corpore infantuli modo fascia obducti: id quod silentio dissimilauit Aristoteles. Haec quarentibus quotannis sese offerunt circa urbium moenia, & adificiorum muros, circa eos praesertim, quibus adiacent horti ac viridaria: plerumque enim in adificiorum cauis capite ad terram verso reperiuntur appensa. Caterum etsi dixerit Aristoteles, erucas ex herbarum, olerumq; praesertim folijs ex sese gigni, absq; animalis semine, visuntur tamen hoc auro papiliones ex aureliis exorti, auersis olerum folijs oua parere subalbida, milio minora, ex quibus eruca tandem prodeunt, vt sericino erucarum generi euenire comperimus. Vnde mihi quidem dubitandum videtur, an rem hanc diligenter perpendit, vel exquisitè tractauerit Aristoteles. Quanquam minimè negauerim, quin & ex putri quodam humore per se eruca nasci possint, quem admodum & mures, angues, vermes, aliaq; complura generantur. Plinius grana illa ex rore fieri putat, solaq; addensari, quod tamen natura speculatores non ita facile comprobant. Erucis olera non erodi auctor est Plinius, si paulo imponantur in hortis ossa capitis ex equino genere femina duntaxat. Aduersus quas & cancrum fluuiatilium in medio horto suspensum auxiliari narrant. Sunt etiam qui sanguineis virgis tangunt ea, quae nolunt his obnoxia esse: haec Plinius. Calumellae praeterea lib. 11. de re rustica circa calcem, necandis prohibendisq; erucis haec in medium protulit: Vbi vero apricis regionibus post pluuias noxia inceserunt animalia, quae a nobis appellantur Eruca, Graecè autem κέρυρας nominantur, vel manu colligi debent, vel maturinus temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius superiorem partem prorepunt. Id tamen superuacuum est facere, si ante sationem semina succo herba sedi macerata sunt: nihil enim sic medicatis nocent eruca. Sed Democritus in eo libro, qui Graecè inscribitur ἐὰν ἀνιπαθῶν, affirmat, has ipsas bestiolas enecari, si mulier, quae in menstruis est, solutis crinibus, & nudo pede vnamquamq; aream ter circumbeat: post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. Sed postrema haec, quae a Columella referuntur, superstitiosae sunt relinquenda. Κέρυρας ita Graecè, Latine Eruca vocantur: Arabicè Riapsa: Italicè Bruchi: Germanice Däuppen oder Holzgourm: Hispanice Bruchi: Gallicè Chenilles.

Erucarum generatio.

Remedia contra erucas.

Nomina.

Kerber

Kantharides

CANTHARIDES.

CAP. LIIII.


Frumentis congeste Cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro mundoq; linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quam acerrimi halitum, donec æstu exanimentur: postea lino transfixæ reponuntur. a Potentissimæ omnes varietates, b luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore, crassæ, ac blattarum modo præpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Βυρρηστίς & Πινοράμνα.
ERVCAE.

BUPRESTES ET PINORVM
CAP. LV.

a Meuræ
ερεπυεσ. i. ef-
ficaces.
b Luteis, in
meo non le-
gitur, nec est
in pennis.

Simili modo reconduntur Buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, vlcere, calorem elicere: qua de causa admiscentur medicamentis, quæ lepras, ferosq; lichenas, & carcinomas sanant: menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aquæ siccæ cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quòd vrinam moueant. Alij pennas, pedesq; contra potentiora beneficia, remedio esse tradiderunt.



Cantharides vulgata sunt animalia, nomine à cantharo, qui Latine scarabeus est, deducto, ac si eas dixeris paruos scarabeos. Sunt in Italia frequentissima, calidioribus præsertim regionibus, vbi non modò in frumentis inueniuntur: sed in faxinis quoq; stabulantur. Præstant quæ solida, recentesq; sunt, nam veterascentes facillè cariem sentiunt, vnde inutilis sunt in medicamentis. Buprestes autem (vt Plinius inquit libr. 30. cap. 3.) non perinde in Italia sunt vulgares & frequentes: sunt tamen scarabeis similes, quanquam minores. At pinorum erucæ numerosa sanè habentur in Tridentinis montibus, quòd inibi pinorum perpetuò vireant sylua, Ananiensi præsertim tractu, ac Flemarum conuallibus. In extremis arborum ramis, & ijs plerunq; qui in earum cacumine attolluntur, innumerabiles Erucæ rufescentes, ac pilosa mirò artificio nidificæ, quibusdam tenuissimis velleribus innumeris inuolucris contextis. Latent in his hyeme, ita frigoris noxam euitantes. Nudi magnitudo adeò ampla est, vt nonnunquam conclusi vermiculi millenarium numerum excedant. Inuolucris materies, qua concluduntur, tenuissima serici velamina maximè emulatur, tenuior tamen est. Hac sanguinis manationibus aptissima est, quare imposita confestim fluorem sistit. Sed de his hæcenus. Caterùm sunt medicorum quàm plurimi Mauritanos præcipuè sequentes, qui quotiescunq; Cantharidas medicamentis miscent, præcipiunt capita, alas & pedes abijci, tanquam partes cæteris nocentiores: quod tamen Galeni sententiæ omnino repugnat. Quippe qui lib. 11. simpl. medicamentorum integras cantharidas medicamentis addendas præcipit, quemadmodum & ijs integris ipse perpetuò fuerat vsus. Sed si responderint ij, illud nec eorum esse institutum, nec Mauritanorum, sed Hippocratis libr. 4. de victus ratione in morbis acutis, audiant quæso quibus verbis eodem loco Hippocratis sententiæ declarat Galenus, cum inquit: Quidam dictionis huius mentem haudquamquam intelligens audax medicus, prædictas partes à cantharidibus abiecit, deditq; hydropi: cui cum à primo die abscessus in sura comparuisset, post tres alios dies sectus est, effusaq; copiosa aqua, curatus esse visus est: quòd pars tumoris præter naturam plurima statim ad moderationem redacta sit, veruntamen non multis post diebus obiit. Quam ob causam medico quidam crimen ingessit, perperam data esse cantharidum corpora inquiens: Nempe propinanda, ablatis corporibus, tum caput, tum pedes, tum alas, idq; esse quod in dictione enunciaretur. Quare non cunctatus audax ille medicus, hydropi alteri ita propinauit: moxq; facto similiter in femore abscessu sectoq; multis post diebus hominem mori contigit, quanquam vrinam prouocatorio medicamento ex cantharidibus confecto, quidam citra bibentium incommodum vsi sint: hæc Galenus. Ex quibus facillè cognoscitur, Arabes non rectè Hippocratem intellexisse. Quamobrem sciendum esse existimauerim, quòd ablatis cantharidum extremitatibus, exuantur antidoto, quo natura sunt prædita in proprii veneni remedium. Quod cum accuratè perpèndisset Galenus, eas integras suis medicamentis semper admiscuit: vt facile attestantur qua libro 11. de simplicium medicamentorum facultatibus memoria prædidit, sic inquiens: Veruntamen sufficientem habemus de cantharidibus experientiam, quòd in vngues psorodeis cum idoneis ceratis, aut emplastris impositæ, sic illos educunt, vt toti cadant. Miscuimus eas etiam facultatibus psoris, & lepris congruentibus, necnon quibusdam septis, atq; interim etiam ijs qua clauos, quos vocant, eiciunt. Porro præceptorum meorum quidam earum paulum quiddam in medicamenta vrinam cientia iniecerat. At quidam solas alas & pedes iniiciunt, quæ aiunt esse alexiteria ijs, qui corpora ipsorum bibissent: alij contra: at nos totas indimus. Caterùm aptiores sunt ad ea, quæ expertum me dixi, ea

Cantharidū
consideratio.
Buprestes.
Pinorum e-
rucæ.
Error multo-
rum, alas &
alia abiicien-
tium.
Cantharides
integras vsus
pandas,
Cantharidū
vires.

Buprestes.

Nomina.


cantharidum, quæ inuenta in frumento, lutèa transfersim in aliis tingula obtinent, potissimum si inciuntur in vas fictile nouum, deinde ori vasis linteum obductum sit rarum, & vas ita teneas inuersum, vt linteum, quod cantharidus iubet, vaporem ab aceto sursum elatum excipiat, donec emoriantur ipsa cantharides. Et de Buprestibus agens, ita subdit: Sic Buprestes quoque reponere expedit. Sunt autem & ipsa animalis quoddam genus cantharidibus tum specie, tum virtus adsimile. Mox de pinorum eruca: Quin & eruca (inquit) quæ in pinis nascuntur, merito nuncupata pityocampa, huius sunt facultatis. Καυθαρίδες vñ Græcis, ita etiam Latini Cantharides appellantur: Arabibus Dherarie siue Carariba: Italis Cantarelle: Germanis Golde Keffler: Hispanis pariter & Gallis Cantarides. Βυρρηστίες Græcè, item Latine Buprestes nominantur: Arabicè Xofostis: Italicè Buprestis: Germanicè Knöster: Hispanicè Arebentabuei. Πίτυκαμπα Græcis, Pinorum eruca Latinis dicuntur: Bruchi de pini Italis: Pytoriapsa Arabibus: Die Würm von Sichten Germanis: Genianos del pino Hispanis.

SALAMANDRA. CAP. LVI

a Oris. addit
α & lepras abolere:
δι & lepras abolere:
δ & lepras abolere:
exulcerare.


Salamandra lacertæ genus est, iners, varium, quod frustra creditum est ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, a Oris. addit α & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite, in melle seruatur ad eundem vsum.

SALAMANDRA.

Salamandræ
consideratio.Salamandræ
igne absumi.Arist. vanz
opiniones.Salamandræ
generatio.Salamandra
aquatica.

Salamandra in agro Tridentino copiosa inueniuntur, Ananiensi præsertim valle, iuxta semitas, & in opacis viginosisq; locis. Incipiunt enim apparere verno tempore, atq; etiam autumnò, calo maximè pluuiò. Sed æstate ob solis seruores: itemq; hyeme ob vrgentissima frigora, suis è latebris non exeunt. Salamandra corporis magnitudine, formaq; lacerti similis est, verùm capitis ac ventris crassitudine excellit, breuiore tamen constat cauda. Illa etsi altioribus nitatur viribus, ad gressum tamen ignauior est, hic verò contra agilis celerq; conspicitur. Color illi niger, luteus non minimis infectus maculis, quadam lauitate pellucidus. Visu Salamandra horribiles atq; abominanda sunt, ita vt faciliè eorum aspectus hominibus nauseam pariat. De hac differens Plinius lib. 10 cap. 67. sic inquit: Salamandra animal lacerti figura stellatum, nunquam nisi magnis imbris prouenit, & serenitate deficit. Huic tantus rigor, vt ignem tactu extinguat, non alio modo quàm glacies: quod quidem facit prunis superposita, non secus atq; cetera animalium carnes, quæ prunis assanda traduntur. Veruntamen in medium magni ignis, vbi flamma valentius agit, vel in fornacem proiecta, statim comburitur. Vanum est ergo credere (vt etiam Dioscorides inquit) igne iam minimè absumi posse, eoq; victitare, vt chamaleon aère: quandoquidem facto periculo, igne exustam breui Salamandram vidimus. Quo fit, vt scripserit Galenus lib. 3. de temperamentis, Salamandram ad certum vsq; temporis spatium ab igne nihil pati: vri tamen, si ea longius igni sit adnota. Quod postea effecit, vt explicare nesciam quo argumento, quæ ratione prodiderit Aristoteles libr. 5. cap. 19. de historia animalium, Salamandram igne minimè comburi, sed per eum in ambulantes, flammæ & prunas extinguere: cum contrarium experientia facile probari possit. Illud præterea mihi dubium est, an idem eodem capite vera retulerit, cum asserit in Cypro insula ararijs fornacibus, vbi chalcites lapis ingestus compluribus diebus crematur, in medio igne, exoriri pennatas bestiolas paulò muscis grandibus maiores, quæ per ignem saliant atq; ambulent, amotoq; igne statim emoriantur. Quippe quod maximè id natura operibus repugnet. Adde etiam quod si hæc vera essent, ea nunquam reticuisset Galenus, qui diligentissimè omnia Cypro metalla inuestigauit ac nouit, pariterq; metallorum fornaces, cum fuerit ipse harum memorabilium rerum accuratissimus indagator. Vidi ego in Germania ararias complures fornaces, à quibus vtranz, cadmiam, pompholygem, spodium, aris florem, & alia necum r. tuli, sed muscas per ignem obambulates mihi nunquam videre licuit. Quæ in re nesciuerim, quonam pacto Aristoteles seruari possit: nisi dixerimus, ipsum hoc in loco non suam, sed aliorum historiam recensere. Sed de his hæcenus. Ceterùm Salamandra nil gignunt (vt Plinius tradit) neq; est in eis genus masculinum femininumve. Nascuntur enim ex putri quodam humore terra. Morsu venenum inferunt, serpentium modo. Quinetiam fructus, & herbas quadam oris saliuæ veneno insciunt, maxima degustantium iactura: quandoquidem non pauci reperti sunt, qui hoc veneno interiire. Est & Salamandra aquaticum genus vt inensibus frequentissimum, capite terrestribus breuiore rotundioreq; cauda anguillarum modo, nigro vndiq; dorso, ventre autem rufescente, luteo maculis

SALAMANDRA AQUATICA.




²⁰ *maculis resperfo, horrendo aspectu, aequè atq; terrestre. Animal, q; Græcis σαλαμάνδρα Latinis similiter Salamandra nunciatur. Arabibus Adhaya: Italis Salamandra: Germanis Dlm oder Moll: Hispanis Salamantegua: Gallis Salamandre.*

Αράχνη

ARANEVS.

CAP. LVII.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; vtrilq; temporibus, aut fronti, tertianos circuitus perfanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera, quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem densamq; telam orditur, quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quarpanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.



⁴⁰ **A**ranearum & phalangiorum (vt lib. 9. cap. 39. de historia animalium scribit Aristoteles) plura sunt genera. **Mordax** Araneorum quod in duo distinguitur, alterum simile ijs, quæ lupos appellant, est paruum, varium, procax, salax, pulex nuncupatur. Alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus nigris, tardum & lentè ambulans, nec viribus valens neq; saliens. **Cætera**, quæ medicamentarij proponunt, aut nullum aut certè exilem inferunt morsum. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod non texit: partim maius, quod asperam, parvamq; telam apud terram aut sepes orditur, bucculis intexere solitum primordijs intus positus obseruatur, dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accurrit, vt capiat: partim varium est, quod paucam vilemq; telam sub arboribus facit. Tertium genus, quod sapientissimum lentissimumq; omnium est, nostris adificijs latissimas contextit telas. Huius vt equidem arbitror hic meminit Dioscorides. Plinius araneos, qui ictu, vel morsu venenum inferunt, phalangia nominat, quorum historiam lib. 29. cap. 4. diffusius Phalangiorum genera ex-
⁶⁰ **enarravit** his verbis: Phalangium est Italia ignosum, & plurium generum. Vnum simile formica, sed multo maius, rufo capite, reliqua parte corporis nigra, albis intercurfantibus respersum guttis. Acerbior huius, quàm vespa ictus. Viuit maxime circa furnos & molas. Aequè phalangion Græci vocant inter genera araneorum, sed distinguunt lupi nomine. Tertium genus est eodem phalangij nomine araneus, lanuginosus, grandissimo capite. Quo dissecto inueniri dicuntur intus vermiculi duo, qui ceruina pelle conclusi, & mulieribus adalligati ante solis ortum, praestant, ne concipiant. Vocatur & thagio, acino nigro similis, ore minimo sub aluo, pedibus breuissimis, tanquam imperfectis. Dolor à morsu eius, qualis à scorpione. Vrina similis, araneis textis. Idem erat astertion, nisi distingueretur virgulis albis. Huius morsu genua labefaciuntur. Peior vtroq; est caruleus, lanugine nigra, caliginem concitans, & vomitus araneosus: etiamnum deterior, à crabrone penna tantum differens: hic & ad maciem perducit. Myrmecion capite formica similis, aluo nigra, guttis albis distinguentibus, vesparum dolore torquet. **Tetraganthij** duo genera habent, peior medium caput distinguente linea alba, &

Phalangiorū
genera ex
Actio.

transuersum altera, hic ori tumorem facit. At cinereus posteriori parte taudicans, lentior. Minimè autem noxius eodem colore, qui telas muscis in parietibus latissime pandit. Hactenus de araneis & phalangys Plinius. Cui subscribens Aetius lib. 13. cap. 18. Phalangiorum genera, inquit, plura sunt. Quae vero apud eos, qui de noxijs bestijs scripserunt, referuntur, ut plurimum sex numero existunt. Vnum quidem ex eis rhagium, alterum lupum, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalon, sextum scolecion appellatum. Ac primum quidem rhagium, id est acineum, figura rotundum est, colore vero nigrum, acti vna nigra similitudine, vnde etiam appellationem accepit: & os quidem iuxta medium ventrem habet, pedes vero ex vtraque parte quam breuissimos. Alterum vero lupus appellatum, muscas perdit eiusque pascitur: ac corpus quidem habet latum ac volubile, partes vero circa eius ceruicem incisae sunt. amplius autem, & os eius eminentias tres habet. Tertium autem myrmecium, hoc est, formicarium dictum, quod formicus maxime assimilatur, colore est fuliginosum: corpus vero eius velut astrum quibusdam insignitum, praesertim circa dorsum. Quartum deinde cranocolaptes, oblongum est & viride, stimulumque iuxta collum habet, atque si in aliquem irruat, locos circa caput petit. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet saxeam & obduratum: lineamenta vero per omne corpus similia animalibus illis, quae lucernas noctu circumuolitant. Sextum postremo scolecion siue vermicarium appellatum, sublongum est, & submaculosum, maximè circa caput. Atque haec quidem species phalangiorum enumerantur. Haec de phalangys Aetius. Ego autem asserere non dubitauerim, omnia haec phalangiorum genera haberi in Italia: quippe quae a me saepius sint visa, quam scribat Plinius, phalangia in Italia non oriri. Quin potius praeter praedicta genera inibi & alterum reperitur omnium perniciosissimum, quod a Taranto Apulia ciuitate, vbi innumera astate tota vagantur in campis, Tarantulam appellant. Icti vero ab his variè ac diuersè torquentur: siquidem alij perpetuo canunt, alij rident, alij plorant, alij clamitant, alij dormiunt, alij vigilijs afficiuntur, plerique vomitionibus laborant, nonnulli saltant, sunt qui sudant, alij tremebundi fiunt, quidam paucioribus infestantur, & alij alia patiuntur incommoda, siuntque phreneticus, lymphaticus ac maniacus similes. Quae quidem symptomata tam varia, ac diuersa non aliunde prouenire dicendum est, quam aut ex vario horum animalium veneno, aut ex demorsorum hominum temperamentis. Nam atra bile tentatis, pro eorum temperaturis omnia haec accidisse conspeximus: tamen si non desint, qui putent Tarantula venenum dietim, vel horatim immutari fierique, ob hoc, ut tam varijs symptomatibus vexentur, qui ab ea ictiuntur. Habentur Tarantula etiamnum in maritimis nostris Senensibus Tyrrheno litori adiacentibus, & Romano agro frequentes: veruntamen non perinde ac in Apulia numerosa. Degunt haec inter segetes in quibusdam terra cauernulis, è quibus interdum exeuntes, saepe eos messores ictiunt, qui huius insidiae ignari, crura ocreis non munierunt. Ictos vidi ego nonnunquam in plateis iacentes, & in xenodochijs, qui praedictis affectibus torquebantur. Sed mirum certè, quam faciliè huiusce veneni vis musica mulceatur. Quandoquidem (ut equidem attestari possum) auditis lyricis instrumentis, vel tiliarum sono, primo statim occursum icti à Tarantula à languoribus cessant, & in medium tripudiarum & saltare incipiunt, tamque diu rem prosequuntur, ac si sani essent, & nullo vnquam tenerentur dolore. Quod si eueniat, ut tibicines tantillum conquiescant ac interponant, non multo post tempore in terram concidunt, & ad pristinos redeunt languores: nisi tamdiu indeficiente sonitu saliant atque tripudient, donec veneni virus, partim insensibiliter per cutis meatus, partim per sudorem exeat & discutiatur. Ob id igitur tibicines stipendio conducuntur, alternatimque mutantur, ut absque vlla sonitus intermissione, tamdiu tripudient demorsis, quousque penitus curati quiescant: cum tamen, dum haec aguntur, sint, qui antidotis eos corroborent, nimirum theriaca, mithridatico, ac alijs, quae venenosorum morsibus aduersantur. Constat quoque esse ex mortifero araneorum genere quam Solifugam appellat Iulius Solinus, his verbis: Sardinia est quidem absque serpentibus, sed quod alijs locis serpens est, hoc Solifuga Sardois agris animal perexiguum, simile araneis forma. Solifuga dicta, quod diem fugiat. In metallis argentarijs plurima, nam solum illud argenti diues est: occultum reptat, & per imprudentiam supercedentibus pestem facit. Nomen ἀράχνη Graecum est, ut Latinum Araneum: Arabicum Hamdebut seu Hanchebut: Italicum Ragno: Germanicum Spinn: Hispanicum Arana: Gallicum Areine. 40

Tarantulae
consideratio.

Tarantulae
remedium
musica.

Solifuga
historia.


Nomina.

LACERTA


CAP. LVIII

Lacertae caput intritum & appositum, aculeos, & omnia corpori infixae extrahit: varos, formicantes verrucas & penfiles, quas acrochordonas vocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueat, ictis à scorpione leuamentum praestat.

LACERTA.



Seps, quam aliqui lacertam chalcididam vocant, in vino pota, morsus suos sanat.



Lacerta, que vulgares oberrant, oua quemadmodam serpentes pariunt, & cochleis maximè insidiantur. In Arabia (ut Plinius est auctor) cubitalis aequant mensuram: & in Mauritania, auctore Strabone, bicubitales reperiuntur: in India verò Nisa monte, si Plinio credimus, ad 24. pedum longitudinem lacerti reperiuntur, colore fului, aut pumici, aut cerulei. Est & insula Capraria lacertis maximis referta, ut referunt, qui ad fortunatas nauigarunt insulas. Caterum, que Chalcidica vocantur, in Lybia, & Cypro copiose prouenientes, non habentur in Italia. Morantur he plerumque in locis aridis, & inter saxa. Varia est harum historia, apud auctores: nam quidam nostratibus lacertis similes esse fecere, quidam verò inter serpentium genera recensent. Nicander Dioscoridi subscribit: quippe qui in theriacis iudicat Vitabis & Sepem corpore humilibus lacertis similem. Veruntamen Aetius lib. 13. Sepam inter mortiferos recolligit, sic inquit: Serpens, qui Seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum reperitur, ex crasso autem tenuem abit: recta vero, ac tarde proserpit. Caput habet latum, os acutum, vniuersum autè corpus multis albis notis respersum. Caterum hi, qui ab eo percussi sunt, intratres, aut quatuor dies pereunt: hac Aetius. Pausanias porò aliter sentit: videtur inquit eum Aegyptum Arcadia quondam regem in venatione occupatum, & imprudentem Seps oppressit. Seps similis est minima, cineris colore, maculis ex interuallo variis, lato capite, angusta ceruice, aluo maiori, cauda breui, obliquo incessu, quasi cancer, quod & cerasta serpenti proprium est. Quamobrem credendum putauerim, aut fabulam esse Lacerta Chalcidica historiam, aut pluribus hoc nomen conuenire serpentibus. Verum minimè reticendum duximus, reperiri in Hebruria, in Romano agro, ac etiam in Apulia quoddam lacertarum genus Terrantola vulgò dictum, quoniam sub terra delitescat. Quae cum homines morju perimat, fecit, ut mecum quandoque cogitauerim, an ea fortassis Nicandro ac Dioscoridi Chalcidica esset lacerta: aut Stello, quod stellis maculata, insignitaq; cernatur. Sed hac libro sexto loco Deo, latius explicabimus, vbi de his, quae morfu, vel ictu venenum emittunt, sermonem faciemus. Quae Graecis σαῦρα. Latine Lacerta nominatur. Italis Lucertola: Germanis Heidex: Hispanis Gartixa. Quae verò Σεψ, Graece, Latine Seps & Lacerta Chalcidica vocatur: Italice Seps.

Lacertarum consideratio.

Chalcidicam descriptio.


Seps inter mortiferos Actio.

Terrantola.

Nomina.

Scincus aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus, quauis inueniatur a in Lydia Mauritaniae. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum Nasturtio. Aiunt carnes, quae renes amplectantur, id sibi virium vendicasse, ut si drachinae pondere bibantur, venerem accendant. Verum decoctolentis cum melle, aut semine lactucae cum aqua pota, veneris cupiditates inhibentur: additur in antidota.

a Ori. le. ἀπολλωνίας. Apollonia.



Scinci confi.


Scinci Vicen-
tial.

Fuchsi error.

Scinci Aegy-
ptiulstoria.Crocodili hi-
storia.


T Ametsi scribat Dioscorides, Scincum esse terrestrem Crocodilum, sui generis: aquatile tamen animal est. Quando-
quidem qui Venetias importantur, in mari rubro, & in Aegypto Nilo flumine capiuntur. Hi quamvis forma crocoda-
los referant magnitudinem tamen longè minorem habent: namq; qui ad summum adoleuerunt, nostrates lacertas ma-
gnitudine non excedunt. Squamis vestiuntur subluteis, caesia à capite ad caudam discurrente linea. At non eadem crocoda-
lus tunica: quippe qui nigro natura sunt dorso. Pausanias in Libya bicubitales reperiri Scincos tradidit: veruntamen q; ad
nos non deferuntur. Sunt in agro Vicentino lacus quidam, qui Scincos etiam gignunt, sed minutulos, ac nigricantes, qui-
bus sepius vtuntur seplasiarū deficientibus marinis, non sine magno fortasse hominum discrimine. Reprobatur hos Fuchsi-
us quoque lib. 1. de compositione medicamentorum, sic inquit: Scincus animal est in aquis degens, lacerta magna female,
sed ventricosus: cauda lata, vt anguilla, ad natandum apta. Quapropter quos officina subiiciunt, cum duabus caudis, ve-
ri non sunt, sed ex Vicentino agro allati: hac ille. Qui tamen dum aliorum errorem merito damnat, ipse (pace vni alio-
rum clarissimi dixerim) in alterum non minorem mihi quidem incidisse videtur, quod existimauerit, legitimum Scin-
cum, cuius effigiem damus, regi lata cauda ad natandum, anguilla modo. Quandoquidem Fuchsi Scincus, quo Foroulien-
sis ager, & qua circa Vtinum ciuitatem stangentes sunt aqua, maximè scatent, & cui lacerta magna corpus, tumidus ven-
ter, ac maculis varius, rotundum quadantenus caput, anguilla cauda, nigrumq; dorsum est, Scincus verus non est: sed po-
tius animal salamandra generi adscribendum, quod terrestrem salamandram non paucioribus referat notis, quam aqua-
tiles restudines terrestres representant: ob id itaq; rectè Vtinenses hoc animal Salamandrā aquaticam vocant, abhorrentq;
maximè, quòd inter venenata omnino reputent. Huic sanè cum Aegypto scinco nulla est cognatio: quippe Aegyptius capite
constat longo, dorso quadantenus elato: ventre lacerta non maiore: corio squamis subluteis, numerosis, minimūq; in vni-
uersum referto: cauda lacerta modo tereti, breuiore tamen: caesiaque à capite ad caudam discurrente linea. Talis nimi-
rum Scincus est, qui quotannis ab Alexandria Aegypti Venetias numerosus conuehitur. Scincorum meminit Plinius libro 20
28. cap. 8. vbi ita scribit. Ex chamaleontis similitudine est Scincus, quem quidam terrestrem crocodilum esse dixerunt: can-
didiore autem, & tenuiori cute. Praecipua tamen differentia dignoscitur à Crocodilo aquatico squamarum seta à cauda
ad caput versa. Maximus Indicus, deinde Arabicus. Afferuntur falsi. Rostrum eius, & pedes in vino albo poti, cupiditate
veneris accendunt. Vtique cum satyrio, & eruca semine singulis drachmis omnium, ac piperis duabus admixtis, ita vt pa-
stillis singularum drachmarum bibantur. Per se laterum carnes obolis binis cum myrrha, & pipere pari modo pota efficio-
res ad idem creduntur. Prodest & contra sagittarum venena, ante posteaq; sumptus. In antidota quoque nobilia additur.
hac Plinius. CROCODILVS (vt refert Aristoteles in libris de historia, & partibus animalium) animal est magnum,

CROCODILVS.

Crocodili ge-
nera & vires.Chamaleon-
tis historia.

ad quindecim vsque cubita crescens: quamvis ad duodeviginti scripserit Plinius. Hic animal non parit, sed ouum anserini
magnitudinem non excedens: idq; in terra, non autem in aquis. Parit cum plurimum sexaginta, viuitque diu, maxi-
mumque animal minima hac origine euadit: namque foetus ex ouo exclusus proportionem respondet, lacertorum magni-
tudinem aequans. Linguam adeò indiscretam habet, vt omnino ea carere videatur. Cuius rei causa est, quod idem & terre-
stris, & aquaticus quodammodo est. Ergo vt terrestris, locum obtinet lingua, vt verò aquaticus elinguis. Pisces enim aut
nullam habere linguam videntur, nisi valde resupinentur, aut inexplanatam habent. Solus inter cetera superiorem mo-
uet mandibulam, minimeq; inferiorem: causa est, quod pedes ad capiendum, retinendumq; inutiles habet. Oculi crocodi-
lo suilli, dentes exerti, & vngues in pedibus acutissimi, coriumq; durissimum, telis ac sagittis minimè cedens. Interdum
plerumque terram incolit, noctu verò aquis se mergit, innatatq; flumine. Duo eius esse genera Plinius est auctor loco citato.
Vnum maius, de quo diximus: alterum minus illi simile, multum infra magnitudinem, in terra tantum, odoratissimūq;
floribus viuit. Ob id intestina eius diligenter exquiruntur, iucundo nidore facta. Crocodileam vocant, oculorum vitijs vti-
lissimam, cum porri succo inunctam, & contra suffusiones, vel caligines. Illita quoque ex oleo cyprino molestias in facie
enascens tollit. Ex aqua verò morbos omnes, quorum natura serpit in facie, nitoremque reddit. Lentigines tollit, ac
varos, omnesque maculas. Et contra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis. Felle inunctis oculis contra suf-
fusiones nihil vtilius predicant. Maiores dentes è dextra maxilla adalligati dextro lacerto (si credimus) coitus stimulant.
Corij vtriusque cinis, ex aceto illitus his partibus, quas secari opus sit, aut nidor cremati, sensum omnem scalpelli aufert.
Sanguis vtriusque cleritatem visus inunctis donat, & cicatrices oculorum emendat. Cor annexum in lana ouis nigra, cui
nullus alius color incurauerit, & primo partu genita, quartanas abigere dicitur. Corpus ipsum excepto capite pedibusq;
elixum manditur iichiadico, hac Plinius. Veruntamen que is alterius intestinis assignauit, ea Dioscoridem simo tribuisse
constat. Ceterum cum Scincus Chamaleontem, cuius formam refert, mihi in mentem reuocauerit, veniatq; & ipse in me-
dicum vsum, non ab re fore duxi, eius tum historiā, tum etiam facultates enarrare. CHAMAELEON igitur (vt Aristote-
les memoria prodidit libro. 2. capite. 1. de historia animalium) figura totius corporis lacertam planè representat. Latera
deorum

CHAMAELEON.



... ducta ventri iunguntur, vt piscibus: & spina modo piscium eminent. Rostrum simia porcaria simillimum: cauda
 ... in tenue desinens, & longis implicata in se orbibus. Elatior à terra est, quàm lacerta. Pedes singuli bipartiti se-
 ... partesq; talem inter se habent situm, qualem pollex ad manus reliquam partem obiectam. Sed ipsa etiam reliqua
 ... paulotenus in digitos quosdam finduntur, aduncis vnguiculis. Corpus asperum totum, vt crocodilo. Mutat suum colo-
 ... in lacum. Omnium ouipatorum tenuissimus est: quippe qui omnium maxime inopia sanguinis rigeat. Causa ad mores
 ... eum referenda est: pra nimio namque metu multiformis efficitur. Motus ei piger admodum, vt testudinis: pallescit
 ... moritur, defunctusq; colorem eundem seruat. Subit cauernas, & latitat more lacertarum. **Caput eius, & guttur si** Chamaeleon
 ... accenditur lignis, imbrum, & tonitruum concursus facere Democritus narrat. Item iecur in tegulis vstum. De- tis vices.
 ... oculo, si viuenti eruatur, albugines oculorum cum lacte caprino tolli. Lingua adalligata, pericula puerperij adimi.
 ... si viuenti exempta sit, ad iudiciorum euentus pollere dicunt. Item dextram maxillam ad formidines, pauoresq; cor-
 ... vero illito detrahi pilos: & felle glaucumata, & suffusiones corrigi. **Χιτωνος** vt Gracis, ita etiam Latinis Scincus ap- Nomina
 ... tur: Arabibus Aschancur, siue Scanchur: Italis Stinco & Scinco: Hispanis Stinco.

Γῆς ἐὼς ἄπο

TERRĒNI VERMES.

CAP. LXI.

Terreni vermes impositi, praecisos nervos glutinant: tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe,
 infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillentur, den-
 tum doloribus praestant auxilium. Triti in potu ex passio vrinam ciunt.

Terreni vermes etiam in medicum vsum veniunt, quandoquidem oleo incoquantur ad articulorum, neruorumq; cru-
 uatus. Veruntamen aberrant plerunq; myropola in olei conficiendi ratione. Imponunt enim vermiculos in **Terrenorum**
 cadum, & affuso inde oleo igni seruescunt: quo fit, vt paruo momento non modo inassentur, sed penitus comburan- vermium, & eo
 ta, nullo in oleo humore relicto. Fit autem rectius, cum vase vitreo excipiuntur, & diutius calore balnei macerantur, riu olei vices.
 tior nates: namque hoc modo eorum succus elicitur, comburiturq; nequeunt. Praestat hoc oleum ita paratum, praesertim
 s vermes rosaceo macerentur, ad podagricorum dolores, à calidis defluxionibus prouenientes, inunctis prius locis dolen-
 tem oleo, & mox superpositis vermibus in eo elixis, tuis, admistisq; cum aequali cerati pondere, quod tria pharmacum
 nent ex argenti spuma, oleo & aceto conflatum. Quibus etiam commendauit Plinius libro 30, cap. 3. ipsorum vermium
 corem cum melle triduo emplastri more impositum. Quin & ipsos vermes in oleo veteri elixos, & superpositos. Ad hac
 menses vermes prius vino albo eloti, ac per se absque oleo vase vitreo excepti, operculato vasis ore, ne quid expirare possit,
 imbalneum calentis aquae immerguntur, tamdiuq; efferaescere permittuntur, donec in liquorem oleo similem vertantur.
 reserunt quidam hoc, quod maxime praestet neruorum, & intestinorum vulneribus glutinandis. Quod longe efficacius
 efficit, si factitio balsamo, de quo libro primo diximus, fuerit admistum: aut oleo, quod vitreus organus è larigna, siue abi-
 gna lacryma elicitur. Namque his additis vniuersa corporis recentia vulnera breui tempore glutinat, us exceptis, qua ca-
 piti inferuntur. Dantur vt iliter terreni vermiculi igne cremati, & in puluerem contriti felle suffusis, ex marrubij, vel ab-
 lantq; decocto: addunturq; in electuarijs ad idem paratis, vt Galenus docuit libro de theriaca ad Pisonem. Triti, ac rosaceo
 subacti (vt idem author est) podagricorum inflammationes extinguunt. **Γῆς ἐὼς ἄπο** Gracis dicuntur: Latinis vermes terreni: **Nomina**
 Arabibus Charatin: Italis Vermis terrestri, & Lombrichi: Germanis Regenwürm: Hispanis Lumbrices de tierra: Gallis
 vers de terre.


Μυροδάλη

MVS ARANEVS.

CAP. LXII.

Mvs araneus dissectus & impositus, sui morsus veneficia luit.

Araneus mus (vt Acrius inquit) colore quidem mustela similis est, magnitudinis autem mivi. Os vero sublongum ha- **Aranei mu-**
 bet, & exiguam caudam. Dentes ei tenues, duplici ordine nati, in utraq; maxilla: quo fit, vt quatuor dentium ordi- ris constid.
 nes habeat. Quibus vtiq; notis abunde respondent q; a quibus picturam, quam hic damus, mutuati sumus. Meminit muris
 aranei Nicander, in suis theriacis, dixitq; perire in rotarum orbita, si progrediens in eam inciderit. Quod tamen fabulosum
 poeticumque censemus: tametsi non desint, qui terra è plaustorum rotis excussa, huiusce succurrant morsibus. Scribit
 Plinius libro 8. capite 5^{to} mures Araneos vltra Apenninum non haberi, cum tamen hoc quo in vniuersa reperiantur **Plin. argu.**
 Italia **III.**



Nomina.


Italia: In Ananienfibus montibus, Tridentino agro frequentes vifuntur. Nihilominus incola inter venenata non habent: id quod fortassis & calis & folis temperamento euenit. Siquidem nec Scorpiones ibidem exorti ictu venenum relinquunt, vt in eorum mentione fuperius diximus. Μυροζάνη Gracè, Mus araneus Latine appellatur: Italicè Topo ragno: Germanicè Epitmauff: Hispanicè Murganbo.

Mūc.

MVRES.

CAP. XLIII.

MVres, qui in domibus oberrant, concifos fcorpionum plagis vtiliffimè imponi, in confeffo eft. Si in-
affatos infantes ederint, oris faliuam exiccati promittunt.

Muris con-
sideratio.Glirum con-
sideratio.

MVres diuerforum funt generum, fiquidem domeftici, fylueftres, ac montani reperiuntur, funt etiamnum aquatilis, & marini. Verùm primùm de ijs differentes, qui noftris in domibus oberrant, quiq; etiam in agris in magnam fegetum pernitiem morantur, Aristotelis verba referam, qui libro 6. de hiftoria animalium cap. vltimo fic habet: Murium generatio mirabilis prater cetera animalia, maiorem in modum eft, tum numero, tum celeritate. Iam enim femina pregnant in vafe miliariò aliquando occupata, paulo poft referato vafe, mufculi numero viginti & centum reperti funt. Murum etiam percipimus ortum redundantis agreftris murium generis. Locis enim compluribus agri, tam inaudito modo orifolent, vt parum ex vniuerfo frumenti relinquatur: tam cito abfumitur, vt nonnulli mediocres agricola, cum pridie metendū flatuerint, poftidie mane cum mefforibus accedentes ad fegetem, abfumptam inueniant totam. Interitus autem minime euenit ratione: paucis enim diebus omnino abolentur: quanquam fuperiore tempore homines vincere, vel fuffendo, vel fues, vt latibula effoderent, admittendo, non poffent. Quin etiam vulpes eos venantur, & cati fylueftres inprimis: fed tamen fuperare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt. Nec aliud quicquam omniū vincit, nifi imbres: ijs enim quam primùm intereunt. Terra Perficæ parte quadam mure femina refiffa, fetus feminini pregnantes comperiuntur. Sunt qui vehementer confirment, Mures, fi falem lambant, impleri fine coitu. Aegyptijs muribus pradurus, ferè vt erinaceis, pilus eft. Habentur in murium genere & GLIRES. Idcirco (vt Plinius auctor eft lib. 36. cap. primo) apud Romanos cenforia extabant leges, Glires in cœnis apponi vetantes. Verùm hoc auro ganeonibus maximè expetuntur in cibo, non modicam palato iniuriam fieri putantes, fi tam pingui priuetur alimento. Sed ij minimè perpendunt, vel potius negligunt, quòd glires pinguedinis exuberantia ventriculi appetentiam deftruant, lentum ac frigidum gignant fuccum, concoctūq; contumaces exiftant. Notatum non congregari glires, nifi populares eiuſdem fyluæ, & fi mifceantur alienigena, amne, vel monte difcreti, interire dimicando. Genitores fuos feſos ſeneſta alant inſigni pietate. Senium finitur hyberna quiete. Conditum

et hi cuncti, rursus estate iuuenescunt. Montibus Goritiensi agro conterminis, & in Carniolo, Carinthia, ac Stiria al-
 pino vna maxima est horum quandoq; foetura. Quò fit, vt numerosi à venatoribus capiantur, praesertim cum sagina
 gaudet abundant sylua. Exeunt venatum nocte, & arbores suffientes, in quibus stabulantur, si eos stupefactos innumeros
 capiant, adeo vt ipsi repletis saccis domum plerumque redeant, quos postea excoriant, & impositos praenimia copia cadis, sa-
 le & muria asseruant, quemadmodum pisces. Horum caro ipsi vtiliter estur, qui canina laborant fame: namque exube-
 rant pinguedine obtunditur appetentia, & tollitur morbus. Discoquitur Gliris caro detracta pelle, & intestinis exemptis
 modo in siccis nouo, addito nardo ad tertias, atque ita asseruatur, quod constat deplorata aurium viria eo remedio sana-
 ri. *Agri-cola*, vir alioqui doctissimus, & acerrimus rei metallica indagator, quòd forte veros glires non viderit, *Agricola er-*
 ror, Sciuros, *Sciuros à villosa cauda,* Glires existi-
 mantis. *Sciuros à villosa cauda,* Glires existi-
 mantis. *Murium*
montanorū
consideratio.


MVS MONTANVS.



numquam superant, cruribus non vsque adeò longis. Capite leporem referunt: verum tam breuibus auribus sunt, vt
 vsq; supra pilos appareant. Pilo vestiuntur vario tarsi modo, oblongo. Breuem habent caudam, & pedes acutis vngui-
 bus armatos. Hyeme admodum pinguescunt, & obesi fiunt, ita vt aliquando monstrosè intumescant. Hi Ananiensibus,
 Phebeique montibus, in Tridentino agro frequentes habentur, vocanturque vulgò corrupto vocabulo Marmontane,
 quasi Mures montanos dixerint. Eriguntur sapius vsq; modo, anterioribus pedibus veluti manibus, cibum ori admini-
 strantes. Dentes anteriores quatuor habent leporis instar, sed longiores, atque acutiores, quibus seuisimè mordent.
 sed mirum est (ego enim qui periculum feci, id certò testari possum) quòd si acutis forcipibus secentur, vna tantum
 morderentur. Domi retenti si iuuenes sint, exuta quadantenus feritate mitescunt, sed vtensilibus damnum in-
 ferunt: quippe qui omnia, quibus obuiant, erodant, & destruant. Hyeme delitescunt, foeno ac paleis in aceruum congestis
 se condentes. Dormiunt integris mensibus, quemadmodum & glires. In montibus viuunt. Stramenta in cauer-
 nis comportant, quibus à frigore se tueantur. Exterrefacti acutissimè vociferantur, ac sibilant, & ad tumulos confugiunt.
 Horum carnes syluestri & graui quodam odore adeò spirant, vt quibusdam nauseam moueant. Quo fit, vt sale & muria
 asseruant: tum odoris grauitatem, tum etiam exuperantè humiditatè ob pinguedinis copiam exuant: cum tamen tã recen-
 tis, quam sale conditi concoctu admodum contumaces existant, ventriculo laborem inferant, corpusq; vniuersū excalfaci-
 unt. Horum pinguedo medicis expetitur, quod contractos molliat & restituat nervos. Sunt verò & alia quoq; murium ge-
 nera, nempe, Ponticum, Lassicū, Noricum, Pannonicum, Indicum, à regionibus prouincijsq; cognominata. Ponticus pilo est
 candidior, sed superiore cauda parte saturatè nigricat: ea enim digiti longitudinem non excedit, corporis magnitudo il-
 li vt sciuro: insectatur aues & mures. Hunc sanè id esse censemus, quod Armellinum vocamus. Lassicus pilis vestitur in

Murium alia genera

SCIVRVS.



cinerea

Sciuri conf-
deratio

Nomina.

cinereo candidis, ventre tamen albicante: est Pontico paulò maior: hunc *Varium* appellamus. *Noricus* corporis mole domesticam *mustelam* aequat, pilis leporinis fere similibus, breui constat cauda, caret auribus, non tamen foraminibus, quae habet aurium instar. *Pannonicus*, cui color subviridis, *mustela* speciem refert, verum magnitudine domesticos mures non superat. Postremò *Indicus* colorem habet fere *murium montanorum*, albus tamen compluribus intercurfantibus pilis, capite est & ore in longum porrectis, quin & auriculis breuissimis: cauda ab ipsis clunibus crassiore in exilitatem ad imum prolixè defluente, cruribus dodrantalibus. Corpore selem aequat, pedibus aliquantò breuioribus, ac pilo hispidiore, praesertim si aucto tractu mulceas. Atque haecenus de *murium* generibus. Caterum posset & *Sciurus* in *murium* genere recenseri, nam praeter caudam, quae illi adeò villosa, amplaq; est, vt ea se totum inumbret & contegat, cetera *Pontico mure* fere similia sunt. Animal vulgò notum. Meminit *Sciuri* *Plinius* libro octauo cap. trigesimo octauo, hu verba: *Prævident temp. statem & Sciuri, obturatusq; quæ spiraturus est ventus, cauernis, ex alia parte aperiant fores.* De cetero ipsis villosior cauda pro tegumento est. Ergo in hyemes alijs prouisum pabulum, alijs pro cibo somnus. Hac ille. Non desunt, qui *Sciuri* carnes in cibum paratas commendent, & quòd vtile corpori præbeant alimentum, quodq; cum palato non vulgarem ineant gratiam. Habet etiam eius pinguedo suum in medicamentis vsu vbi emollire, ac discutere opus sit. Caterum *murium stercus* (vt in libro de theriaca ad *Pisonem* legitur) aceto subactum, capillis defluentibus vtiliter illinitur. Quinetiam per se potum, vesica lapidem comminuit. Mores ita *Græcis*, *Latinis* verò *Mures* appellantur: *Italis* *Topi*: *Germanis*, *Maus*: *Hispanis* *Ratones*: *Gallis* *Sorice*.

Γάλα.

LAC.

CAP. LXIII.

a Meum.

ὡς καὶ ἐν τοῖς
Ἰνδίοις ὄρε-
σιν ὑπὸ ἡμῶν
ἠσθροῦται. i.
sicut in Iusti-
nis montibus
a nobis vi-
sum est.

Lac generatim omne boni succi est, corpus alit, aluum emollit: stomachum & intestina † inflatione vexat. Venum tamen dilutius aestiuo habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & therebinto magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum autem dulce, crassum, & præpingue: non autem vsque adeò vtile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea, sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, veratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrem, & stomachum subuertit: a quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem caprae, quibus candidum veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu eorum: & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum, præcipueque candentibus calculis marinis exustum. Et in summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum, vesicae & renum: foris vesicis in Iustinis montibus addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcumque semel feruefactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiuuat. Lac quodcumque serum continet implicitum, quod vbi discessit à lacte, multò potentius ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia, volumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comitialibus, lepris, elephantus, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schiston, id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo feruet ramoque ficulneo recenti mouetur, insparsis, postquam bis, aut ter efferbuerit, totidem aceti multi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuò fictilis labrum detergere, sextariumque argenteum frigidae aquae plenum diuinitere. Bibitur heminis per interualla singulis, vsque ad quinas, ita vt intercedentibus spatiis, potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rofiones, vftionesque, ab exitialibus medicamentis factas: vt à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præsertim bubulum ad id eximie confert, gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes, gingiuaque stabilis. Fluxiones alui, si vlcera sentiantur, renesque, ouillum, bubulum, aut caprinum, cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem, & cum hordeacea prisana, aut alicaceo cremore infusum magnopere intestinorum rofiones mitigat: exulceratae vuluae immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit: mammis autem exuctum, prodest tabi, & stomachi rofionibus: contra haustum leporem marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis vtile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & neruorum vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, vt ostendimus, schistum præbeat. Primiparae canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra venena antidoti vicem obtinet: abortus mortuos expellit.

Τύπος.

CASEVS.

CAP. LXV.

Caseus recens sine sale sumptus alit, stomacho vtilis est, & facile in membra delegatur: carnem facit aluum modicè emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis, à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflammationibus, & fugillatis prodest. Qui verò recens salitus est, minus alimenti præbet: carnem aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium ventri, interaneisque exhibet. Vetusiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit quam optime canes aluntur. Quod hippacen vocant, caseus est equinus: ea virus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportione respondet. Nec desunt, qui Hippacen equinum coagulatum appellant.

Βούτυρον καὶ αὐτὸ λίγνος.

BUTYRVM, ETEIVS FVLIGO.

CAP. LXVI.

Elacte pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouilla est. Fit & ex caprimo, agitato in vasis lacte donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est, & emolliens: vnde largius epotum, ventrem resoluat.

resoluit: prodest, vbi oleum non adfuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat: gingivarum pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatenibus asserit. Contra inflammationes & duritias vuluæ, quod nec virus resipit, nec verustatem sentit butyrum efficax est: dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamenta addi solet, quæ pus mouent: vtile præsertim cum nerui, aut cerebri membranz, vesicæ ceruix, vulnere acceperit. Id autem purgat, replet, carnem creat, ab aspide percussis vtilissimè imponitur. Recens obsonis additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellariis. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernam nouam ingestum acceditur, fictiliq; operculato, quod superne in siphuculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post detraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare, & adstringere: fluxiones cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

LAC, CASEVS, BUTYRVM.



Lac est benigni alimenti superfluum in feminarum mamillis ex bina sanguinis coctione progenitum. Constat autem Lactis confi-
 id tribus diuersis essentiis: nimirum caseosa, butyrosa, ac cerosa, qua abinuicem separata, variam consequuntur tem-
 periam. Sed à lacte primum rem exorsus, de eo tantum facultates differam, cuius hac tempestate tam in cibus, quam in me-
 dicamentis est vsus. Tale autem est humanum, caprinum, ouillum, bubulum, bubalinum, & asininum. Et quamuis vete-
 res vsi fuerint tum camelino, tum etiam equino: cum tamen in Italia, ac in aliis conterminis regionibus, quod sciam, eo-
 rum nullus sit vsus, hæc tanquam superuacanea omnino reticenda censemus. Præcellit igitur humanum, quod temperatum
 est in omnibus suis partibus. Hoc sequitur caprinum, etsi aliquantò ficius sit. His crassius est ouillum, minusq; serosum. Bu-
 bulum deinde, ac bubalinum, præter id quod admodum sit crassum, cæteris longè pinguius habetur. Quamobrè lib. 10. simp.
 mod. dicebat Galenus: Miror autem quo pacto Dioscorides ex ouillo, & caprino butyrum confici referat. Ego namq; ex bu-
 bulo fieri noui, ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo: hæc Galenus. Porro asininum sicut lac omne seri exuberan-
 tia superat, sic cæteris pinguedine cedit. Probatum in vniuersum lac colore, odore, sapore, ac substantia. Ob id igitur præfer-
 tur quod colore perquam albo visitur, pellucidum, ac clarum, non viride, non luteum, non nigrum, nec aliquo liuore suffu-
 sum: odore suauis, sincero, minime graui, aut viroso: sapore quidem dulci, non amaro, acri, acido, aut salso: substantia me-
 dia inter crassum, & tenue, ita vt eius gutta vngui instillata non defluat, sed in sua spherula permaneat. Quod autem ta-
 le fuerit, omnium sanè præstantissimum erit, & in cibus optimum. Contra pessimum præbet alimentum, ventriculum, ac
 totum corpus subuertit, quod contrarias notas habuerit, quodq; ex morbofis animalibus emulsum fuerit, vel etiamnum ab
 is, quæ reprobata, venenosaq; plantas depascuntur. Quocirca memoria prodidit Galenus lib. 3. de facult. alim. quod si ca-
 pra, aut alterius cuiuspiam animalis scammoniam, aut tithymalum depasti, lac cibi loco quis sumpserit, omnino alius il-
 li fuerit. Optimum datur vtiliter atate consistentibus, senibus non naturaliter frigidis, biliosis, & marasmo affectis, & de-
 niq; vbi ventriculus excrementis vacet. Nocet lac potum contra febricitantibus, capitis dolore affectis, opthalmicis, resolutis,
 convulsis, fluxione tentatis, calculo oppressis, pituitosis, adolescentibus, obstructis, & iis præsertim, qui lacte, & eduljis la-
 cte paratis, cænas & præandia claudunt: tantoq; maior inde sequitur noxa, quanto crassius lac assumptum extiterit. Ea q;
 propter citato loco inquit Galenus: Lac, quod seri plurimum habet, etiam si semper eo vtare, nullum prorsus periculum ad-
 fert. Quod verò huiusmodi humiditas exiguum habet, caseosa autem crassitudinis multum, omnibus qui ipso frequen-
 ter vtuntur, est periculosum. Ceterum vt lac, quod bibendum est, prosit, hæc præterea adsint oportet: lac nimirum receter
 sit mulsus, aliquid mellis, sacchari, aut salis admistum sit, ne in ventriculo concreseat: tantumq; ex eo sumatur, quantum
 concoquere valeat ventriculus. A cibus etiam omnibus, & vino, postquam assumptum fuerit, abstinendum est, quousque à
 ventriculo secesserit, minimeq; exercitio vtendum est. At quoniam lac dentes inficit (etsi Dioscorides contrarium de asini-
 no scripserit) eo statim ebibito, vino, aut hydromelite os abluere oportet. Quod autem immisto coagulo coëcreuit, quâquam Lactis coa-
 gulari vires.
 bus replet, agrè concoquitur & crassum gignit succum. Quamobrè si quandoque in cibum veniat, primum omnium inge-
 rat: siquidem ultimo loco sumptum (vt fieri adsolet) aut statim putrescit, aut subsidetem cibum secum ad ima incoctum
 trahit. Lac omne, humanum præsertim, cerebrum auget, corpus impinguat, siccam & asperam tussim lenit, venerem robo-
 rat, vrinae ardoribus subuenit, dissoluta corpora reficit, probi multiq; est alimenti, bonam facit aluum, facile in sanguinem
 vertitur, carnem auget, pectus dilatat, & cæteris alimentis maius adfert nutrimentum. Quod autem lac primipara canis
 peruntios glabrescere faciat, potum verò emortuos educat fetus, vt nonnullis proditum esse scribit Diosc. reprobatur Galenus

- Butyri vires ex Gal.** lib. 10. simpl. med. Butyrum præterea (vt loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habens etiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem, ac molliem. Corporum etenim plane durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at qua in mollibus sunt phlegmona, eas & concoquit, & digerit per facile. Nam parotides, & bubones, & oris phlegmona, aliaque partes complures illo proptus solo oriuntur, nimirum in pueris, ac mulieribus. Sed & dentientium puerorum gingiuis illitum, nihilo imbecillius melle gingiuis extenuat, per quas exitus est dentibus: & alios omnes in ore affectus phlegmonosos, posteaquam fluxio restiterit, digerit & pariter concoquit. Proinde cataplasmati inditur, qua extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs, & bubonibus. Sed & in ventrem deuoratum, & ex eo distributum, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, idque in pleuritici, & peripneumonici affectibus, cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur, magis quidem concoquit, verum minus educit: plus verò si cum melle, & amaris amygdalis, sed minus concoquit. Fit ex bubuli præsertim lactis pinguedine id, quod vulgò Roma, ac in vniuersa fere Italia Capo di latte appellant, mensis plurimum expetitum, quod gustus, ac palato maximè arrideat. Verum enimuero ob pinguedinis copiam, præterquam quod ventriculum relaxat, & cuncto supernatat cibo, nutrimentum eiicit, anteaquam concoquatur, vapores in caput mittit, & crassum generat succum.
- Casei consideratio, & facultates.** Caseus autem fit ex crassiore cuiuslibet lactis substantia, admisso coagulo, & expresso inde sero. Præsertim in cibus recens, quod noxam ventriculo non inferat, concoquaturque facilius, quam qui diutius asseruatur. Namque vetus, qui quoddam linguam parumper vellicet, quam plurimis gratior redditur, omnium pessimus est: quippe qui ceterum magis adurat, sitim excitet, & difficiliter concoquatur. Quin & calculos in renibus gignit, iecur obstruit, aluum cohibet, & in calefactis corporibus atram bilem gignit. Quo fit, vt plus damni ex eius succi prauitate, & feruenti quadam inferat, quam quod humores crassos attenuando compensare possit. Fugiendus igitur istiusmodi caseus est, cum neque ad concoctionem, neque ad mouendam vrinam, neque ad ciendam denique aluum, quicquam boni conferat, quem admodum neque ad succi probitatem. De hoc autem edisserens Galenus lib. 10. simplicium medicamentorum, sic inquit: Itaque cum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse conieci, & iam a famulis absumptum putabam: verum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri iuberem, rogant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit, proponentibus, cui rei quis illum vtiliter posset accommodare. Interea cum ad me arthriticus quissiam in curru conuectus esset, topus, quos Græci τρωπος nuncupant, in articulo habens, subiit mihi crure suillo falso decocto caseum eo decocto materare, ac probe in mortario subigendo vnitum, topus imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnificè adiutus est: nam rupta sponte sua cute, absque incisione videlicet, emergebant quotidie citra dolorem topus particula. Vbi autem totus, qui apud me erat caseus, fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum seruauit, & postea rursus vsus est inueterato: atque vbi tunc quoque idem percepit commodum, sapius deinceps vti perseuerabat, & quosdam amicos similiter affectos docuit. Atque id quidem nos excogitauimus: ceterum comprobauit, ac confirmauit experientia: hactenus Galenus. Ex quo palam fit, eiusmodi caseum esse omnino in cibus reprobandum. Qui verò nec recens, nec vetustus fuerit, cum & ipse non sit expertus læsionis: minore tamen constat noxa. Præstat ceteris ouillus. Verum sicuti Pergamenum caseum Galenus in laudem sua patria præ ceteris commendauit libro 3. de alimentorum facultatibus: ita nec mihi sanè vitio vertendum existimauerim, si Hetruscum ceteris Italicis præferam, eum præsertim qui in nostro Senensi agro, ac etiamnum Florentino ex ouillo lacte conficitur, qui vulgò appellatur Cascio marzabino, gustu dulcis atque suavis, quod lac, ex quo paratur, coagulo non sit concretum, sed cinara floribus, qui passim vniuersè ferè Hetruria coaguli vicem præstant: quo fit, vt senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cedit, qui in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mense Septembri, recensq; estur. Hunc vulgò Rauaggiuolo appellamus. Desertus is Romam, quod à Prasulibus, aliisque primatibus summopere expetatur, quippe qui odoratas redoleat herbas, quibus vbiq; nostrates referti sunt colles, iique præsertim, qui non longè distant ab vrbe nostra. Bubulus præterea caseus, est plus ceteris nutrit, pinguiorq; existat, est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprinus verò quanquam ex temperatione lacte sit confectus, inueteratus tamen reliquis caseis est deterior, cum statim exicetur, & friabilis fiat. Bubullus denique in globos illos iunceis vinculis constrictus conformatur, qui nostris Mozzæ, Romanis autem Priuature vulgari sermone dicuntur. Is caseus, quo passim Hetrusci vescuntur, ori quidem gratissimus est, & dulcis, sed egrè concoquitur, quod substantiam habeat admodum pinguem ac lentam. His accedit, qua vulgò nobis Recotta dicitur. Fit hac ex serosa lactis parte ad ignem decocta. Recens (si Auicenna, Rasi, & Isach credimus) minus ventriculum vexat, quam caseus omnis recens pressus. Confert calidis defluxionibus obnoxius, sitim sedat, somnum conciliat: veruntamen obest ventriculo frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem egrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum cohibet, & flatum procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. 10. simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumiturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, qua sanie infestantur acri, vice aqua sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quacunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hac medicamentum commiscetas. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Butyri vires ex Gal.** lib. 10. simpl. med. Butyrum præterea (vt loco citato scribit Galenus) facultatis est concoquentis, paulum habens etiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem, ac molliem. Corporum etenim plane durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere: at qua in mollibus sunt phlegmona, eas & concoquit, & digerit per facile. Nam parotides, & bubones, & oris phlegmona, aliaque partes complures illo proptus solo oriuntur, nimirum in pueris, ac mulieribus. Sed & dentientium puerorum gingiuis illitum, nihilo imbecillius melle gingiuis extenuat, per quas exitus est dentibus: & alios omnes in ore affectus phlegmonosos, posteaquam fluxio restiterit, digerit & pariter concoquit. Proinde cataplasmati inditur, qua extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs, & bubonibus. Sed & in ventrem deuoratum, & ex eo distributum, magnificè confert expuitionibus ex pulmone, idque in pleuritici, & peripneumonici affectibus, cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur, magis quidem concoquit, verum minus educit: plus verò si cum melle, & amaris amygdalis, sed minus concoquit. Fit ex bubuli præsertim lactis pinguedine id, quod vulgò Roma, ac in vniuersa fere Italia Capo di latte appellant, mensis plurimum expetitum, quod gustus, ac palato maximè arrideat. Verum enimuero ob pinguedinis copiam, præterquam quod ventriculum relaxat, & cuncto supernatat cibo, nutrimentum eiicit, anteaquam concoquatur, vapores in caput mittit, & crassum generat succum.
- Casei consideratio, & facultates.** Caseus autem fit ex crassiore cuiuslibet lactis substantia, admisso coagulo, & expresso inde sero. Præsertim in cibus recens, quod noxam ventriculo non inferat, concoquaturque facilius, quam qui diutius asseruatur. Namque vetus, qui quoddam linguam parumper vellicet, quam plurimis gratior redditur, omnium pessimus est: quippe qui ceterum magis adurat, sitim excitet, & difficiliter concoquatur. Quin & calculos in renibus gignit, iecur obstruit, aluum cohibet, & in calefactis corporibus atram bilem gignit. Quo fit, vt plus damni ex eius succi prauitate, & feruenti quadam inferat, quam quod humores crassos attenuando compensare possit. Fugiendus igitur istiusmodi caseus est, cum neque ad concoctionem, neque ad mouendam vrinam, neque ad ciendam denique aluum, quicquam boni conferat, quem admodum neque ad succi probitatem. De hoc autem edisserens Galenus lib. 10. simplicium medicamentorum, sic inquit: Itaque cum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse conieci, & iam a famulis absumptum putabam: verum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri iuberem, rogant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit, proponentibus, cui rei quis illum vtiliter posset accommodare. Interea cum ad me arthriticus quissiam in curru conuectus esset, topus, quos Græci τρωπος nuncupant, in articulo habens, subiit mihi crure suillo falso decocto caseum eo decocto materare, ac probe in mortario subigendo vnitum, topus imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnificè adiutus est: nam rupta sponte sua cute, absque incisione videlicet, emergebant quotidie citra dolorem topus particula. Vbi autem totus, qui apud me erat caseus, fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum seruauit, & postea rursus vsus est inueterato: atque vbi tunc quoque idem percepit commodum, sapius deinceps vti perseuerabat, & quosdam amicos similiter affectos docuit. Atque id quidem nos excogitauimus: ceterum comprobauit, ac confirmauit experientia: hactenus Galenus. Ex quo palam fit, eiusmodi caseum esse omnino in cibus reprobandum. Qui verò nec recens, nec vetustus fuerit, cum & ipse non sit expertus læsionis: minore tamen constat noxa. Præstat ceteris ouillus. Verum sicuti Pergamenum caseum Galenus in laudem sua patria præ ceteris commendauit libro 3. de alimentorum facultatibus: ita nec mihi sanè vitio vertendum existimauerim, si Hetruscum ceteris Italicis præferam, eum præsertim qui in nostro Senensi agro, ac etiamnum Florentino ex ouillo lacte conficitur, qui vulgò appellatur Cascio marzabino, gustu dulcis atque suavis, quod lac, ex quo paratur, coagulo non sit concretum, sed cinara floribus, qui passim vniuersè ferè Hetruria coaguli vicem præstant: quo fit, vt senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cedit, qui in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mense Septembri, recensq; estur. Hunc vulgò Rauaggiuolo appellamus. Desertus is Romam, quod à Prasulibus, aliisque primatibus summopere expetatur, quippe qui odoratas redoleat herbas, quibus vbiq; nostrates referti sunt colles, iique præsertim, qui non longè distant ab vrbe nostra. Bubulus præterea caseus, est plus ceteris nutrit, pinguiorq; existat, est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprinus verò quanquam ex temperatione lacte sit confectus, inueteratus tamen reliquis caseis est deterior, cum statim exicetur, & friabilis fiat. Bubullus denique in globos illos iunceis vinculis constrictus conformatur, qui nostris Mozzæ, Romanis autem Priuature vulgari sermone dicuntur. Is caseus, quo passim Hetrusci vescuntur, ori quidem gratissimus est, & dulcis, sed egrè concoquitur, quod substantiam habeat admodum pinguem ac lentam. His accedit, qua vulgò nobis Recotta dicitur. Fit hac ex serosa lactis parte ad ignem decocta. Recens (si Auicenna, Rasi, & Isach credimus) minus ventriculum vexat, quam caseus omnis recens pressus. Confert calidis defluxionibus obnoxius, sitim sedat, somnum conciliat: veruntamen obest ventriculo frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem egrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum cohibet, & flatum procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. 10. simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumiturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, qua sanie infestantur acri, vice aqua sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quacunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hac medicamentum commiscetas. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Casei bubuli antiqui vires ex Gal.** Itaque cum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse conieci, & iam a famulis absumptum putabam: verum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri iuberem, rogant. Cum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit, proponentibus, cui rei quis illum vtiliter posset accommodare. Interea cum ad me arthriticus quissiam in curru conuectus esset, topus, quos Græci τρωπος nuncupant, in articulo habens, subiit mihi crure suillo falso decocto caseum eo decocto materare, ac probe in mortario subigendo vnitum, topus imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnificè adiutus est: nam rupta sponte sua cute, absque incisione videlicet, emergebant quotidie citra dolorem topus particula. Vbi autem totus, qui apud me erat caseus, fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum seruauit, & postea rursus vsus est inueterato: atque vbi tunc quoque idem percepit commodum, sapius deinceps vti perseuerabat, & quosdam amicos similiter affectos docuit. Atque id quidem nos excogitauimus: ceterum comprobauit, ac confirmauit experientia: hactenus Galenus. Ex quo palam fit, eiusmodi caseum esse omnino in cibus reprobandum. Qui verò nec recens, nec vetustus fuerit, cum & ipse non sit expertus læsionis: minore tamen constat noxa. Præstat ceteris ouillus. Verum sicuti Pergamenum caseum Galenus in laudem sua patria præ ceteris commendauit libro 3. de alimentorum facultatibus: ita nec mihi sanè vitio vertendum existimauerim, si Hetruscum ceteris Italicis præferam, eum præsertim qui in nostro Senensi agro, ac etiamnum Florentino ex ouillo lacte conficitur, qui vulgò appellatur Cascio marzabino, gustu dulcis atque suavis, quod lac, ex quo paratur, coagulo non sit concretum, sed cinara floribus, qui passim vniuersè ferè Hetruria coaguli vicem præstant: quo fit, vt senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cedit, qui in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mense Septembri, recensq; estur. Hunc vulgò Rauaggiuolo appellamus. Desertus is Romam, quod à Prasulibus, aliisque primatibus summopere expetatur, quippe qui odoratas redoleat herbas, quibus vbiq; nostrates referti sunt colles, iique præsertim, qui non longè distant ab vrbe nostra. Bubulus præterea caseus, est plus ceteris nutrit, pinguiorq; existat, est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprinus verò quanquam ex temperatione lacte sit confectus, inueteratus tamen reliquis caseis est deterior, cum statim exicetur, & friabilis fiat. Bubullus denique in globos illos iunceis vinculis constrictus conformatur, qui nostris Mozzæ, Romanis autem Priuature vulgari sermone dicuntur. Is caseus, quo passim Hetrusci vescuntur, ori quidem gratissimus est, & dulcis, sed egrè concoquitur, quod substantiam habeat admodum pinguem ac lentam. His accedit, qua vulgò nobis Recotta dicitur. Fit hac ex serosa lactis parte ad ignem decocta. Recens (si Auicenna, Rasi, & Isach credimus) minus ventriculum vexat, quam caseus omnis recens pressus. Confert calidis defluxionibus obnoxius, sitim sedat, somnum conciliat: veruntamen obest ventriculo frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem egrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum cohibet, & flatum procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. 10. simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumiturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, qua sanie infestantur acri, vice aqua sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quacunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hac medicamentum commiscetas. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Caseus Hetruscus optimus.** Verum sicuti Pergamenum caseum Galenus in laudem sua patria præ ceteris commendauit libro 3. de alimentorum facultatibus: ita nec mihi sanè vitio vertendum existimauerim, si Hetruscum ceteris Italicis præferam, eum præsertim qui in nostro Senensi agro, ac etiamnum Florentino ex ouillo lacte conficitur, qui vulgò appellatur Cascio marzabino, gustu dulcis atque suavis, quod lac, ex quo paratur, coagulo non sit concretum, sed cinara floribus, qui passim vniuersè ferè Hetruria coaguli vicem præstant: quo fit, vt senescens nunquam acris euadat. Cui nec alter cedit, qui in nostro agro præstantissimus fit ex caprarum lacte, mense Septembri, recensq; estur. Hunc vulgò Rauaggiuolo appellamus. Desertus is Romam, quod à Prasulibus, aliisque primatibus summopere expetatur, quippe qui odoratas redoleat herbas, quibus vbiq; nostrates referti sunt colles, iique præsertim, qui non longè distant ab vrbe nostra. Bubulus præterea caseus, est plus ceteris nutrit, pinguiorq; existat, est tamen reliquis concoctu difficilior. Caprinus verò quanquam ex temperatione lacte sit confectus, inueteratus tamen reliquis caseis est deterior, cum statim exicetur, & friabilis fiat. Bubullus denique in globos illos iunceis vinculis constrictus conformatur, qui nostris Mozzæ, Romanis autem Priuature vulgari sermone dicuntur. Is caseus, quo passim Hetrusci vescuntur, ori quidem gratissimus est, & dulcis, sed egrè concoquitur, quod substantiam habeat admodum pinguem ac lentam. His accedit, qua vulgò nobis Recotta dicitur. Fit hac ex serosa lactis parte ad ignem decocta. Recens (si Auicenna, Rasi, & Isach credimus) minus ventriculum vexat, quam caseus omnis recens pressus. Confert calidis defluxionibus obnoxius, sitim sedat, somnum conciliat: veruntamen obest ventriculo frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem egrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum cohibet, & flatum procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. 10. simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumiturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, qua sanie infestantur acri, vice aqua sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quacunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hac medicamentum commiscetas. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Recocta vires.** Recens (si Auicenna, Rasi, & Isach credimus) minus ventriculum vexat, quam caseus omnis recens pressus. Confert calidis defluxionibus obnoxius, sitim sedat, somnum conciliat: veruntamen obest ventriculo frigidum habentibus, & neruorum morbis. Inueterata autem egrè concoquitur, sitim excitat, parum nutrit, aluum cohibet, & flatum procreat. Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. 10. simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumiturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, qua sanie infestantur acri, vice aqua sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quacunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hac medicamentum commiscetas. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Seri vires ex Gal.** Reliquum est Serum, quod lactis aquosa est substantia. Hoc (vt Galenus inquit lib. 10. simplicium medicamentorum) extergendi potentiam possidet, sumiturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis vlcera, qua sanie infestantur acri, vice aqua sero colluat, optimè sanè fecerit. Præterea quacunque medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata, & hyposphagmata, peculiaribus ad hac medicamentum commiscetas. Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Ex Mesue.** Prætulit Mesues serum, quod ex nigrarum caprarum lacte elicitur, deinde quod ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, qua fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pastuis viditantium, recenterq; foetarum. Excalfacit hac, atque siccatur ordine primo completo, & vsque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua referta est facultate, aluum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flauam, tum atram ab exustis humoribus genitam deicit: quo fit, vt mirificè conferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur vtiliter febrientibus ex bile, & viscerum, ac vasorum obstructionibus. Competit etiamnum vitus in cute à bile, & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginebus, alphis, psoriasisq; admodum conuenit: hac Mesues. Optimi seri parandi rationem docuimus fusius nos, quodq; magis in medicina præstet, in nostro Epistolarum medicinalium volumine. Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.
- Lactis facultes ex Gal.** Lactis autem facultates memoria prodidit Galenus loco nuper citato, vbi ita scribit: Lac vbi aliam quampiam exiccantem facultatem habuerit adiunctam, optimum est remedium dysenteria, & omnium ventris acrimiarum fluxionum. Eam accipit à lapidibus, qui prædecocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet, qui vocant καχλινιας. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris assumpta pars fuerit. At nos iniectis scireis in ipsum cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem facultatem efficimus. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est vtile: præterea ad hypopia, & hyposphagmata.

Quintus palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas corum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Injundimus ipsum & vtero vlcerationem per sese, tum iis medicamentis commiscentes, quibus misceri potest, utique citra morsum curantibus, & ubi in sede vlcerationis praesentia saniei acrimonia dolentia, aut phlegmonas, aut rugas perpetiunda. Sic & ad vlcerationes pudendorum, vnde quae leniri postulant, siue ob inflammationem, siue morbum, siue ob malignitatem. Ea, propter & cantharis applicatur vlceribus, medicamentis anodynis commistum, qualia sunt, quae ex pompholyge constant. Et quid attrinet commemorare, quod ore contentum, collutum, gargarizatumq; vel maxime phlegmonas eius mitigat: Sed & tonsillas, & antiadas phlegmone affectas admodum mitigat, & proinde anginam. Atque ut semel dicam, medicamentum est leniens, totam quidem substantiam habens mordacitatis expertem: sed multo magis, ubi concoctione moderata potissimum pars serosi humoris absorpta est. Sic mihi videntur etiam medici ad venena, quae erosionem interimunt, lac lacum iudicare, velut & lepus marinus interficit, & cantharis. Sed & sunt, qui aconitum, & thapsiam sumpserunt. Sed haec excoctione fecerunt. Quod Graeci γάλα, Latini Lac dicunt, Arabes, Leben: Itali, Latte: Germani, Milch: Hispani, Leche: Galli, Lait. Caseus vero ita Latinis: τυρός, Graecus vocatur: Arabibus, Lubon seu Gieben: Itali, Cascio: Germanis, Kase: Hispanis, Queso: Gallis, Fromage. At Serum Latine dictum, Graecè ὀρός γάλακτος appellatur: Italicè, Siero: Germanicè, Seldur: Hispanicè, Suero de leche: Gallicè, Ser du lait. Quod denique Graeci βούτυρον, Latini similiter Butyrum nominant: Arabes, Zebd: Itali, Burro: Germani, Butter: & Aucten: Hispani, Manteca: Galli, Beurre, & Buyre.

Nomina

¶ In hoc loco non praeterendum duxi, quod in Graco codice manu scripto non φουσιτιόν, hoc est inflationem patitur, sed φουσιόν, id est, naturale legatur: quod lac potius stomachum iuuet, quam inflationem vexet: id enim innuit verum naturale. Hanc lectionem secutus fuisse videtur Serapio: quippe qui ex Dioscoride ita transcribat: Et lac confert stomacho. Quia & facilis potuit esse librorum lapsus ob vocum similitudinem.

LANÆ, ET OESYPVS. CAP. LXVII.

Succidæ lanæ molles è collo feminibusque, laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbutæ: siquidem facillè succos combibant, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic enim œsypum vocant) emolliunt: capitis, stomachi, aliarumque partium doloribus, cum aceto, & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum

LANA.



lanarum cinis crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & vlcerata ad cicatricem perducit. Mundæ autem, & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more vruntur. Nec secus simbriati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque modo vrunt. Alii in fictili oris paruli, verucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatæque lanas, oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem, lanisq; permutatim interstratis, leuiter succedunt, & vltas tollunt. Quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluit, collecta reconditur. Lauantur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere patiuntur: idque sæpius, mutant aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat. Oesypum vocant Graeci, succidarum lanarum pinguitudinem: cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, vt respumer, agitur, aut lignea rude validiusculè conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & confidente pingui, quod supernatabat, collectoque in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur: hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine, nihil profus spumæ extet. Collectum œsypum manibus emolliunt, & si qua intedit spurcicia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec ad motum linguæ œsypum adstringat leuiter, nec mordeat, atq; pingue candidumq; spectetur: tum in fictili vase conditur: verum omnia fetido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alii elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in æneo vase ex aqua decoctis, pingue, quod supernatat, collectum aqua, vt diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, que calidam aquam contineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis

& satis crassum. Alii bidui spatio aquam effundunt, nouamq; adiiciunt. Melius est laue, radice non ca-
ratum, quod succidarum virus oleat, & si manu in cōcha fricetur cū aqua frigida, albescat, nihil in se du-
ri, aut concreti habens: veluti quod cerato, aut adipe adulteratur. Oesypum exalfacit, explet vlcera, & e-
mollit, præsertim sedis ac vuluæ, cum meliloto & butyro. In vellere appositum menses, & partus euocat:
vlcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra erosos angulos oculorum,
scabiolosque, genas quæ occalluerūt, & ciliorum defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec reda-
ctum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, vti demonstrauius, quæ in oen-
lorum medicamenta commodè addi solet.

Nomina. **C**um Lana succida, & earum sordida pinguitudo, quàm Græci Oesypum appellant, & officinarum vulgus Isopum hu-
midam vocat, plenissimè à Dioscoride descripta sint, nihil nobis hic relictum est, quod declarandum, vel adiuuandum
esse putemus. Caterum εειον quod Græcis, Lana Latinis dicitur, pariter & Italis: Arabibus, Sauf, aut Suf: Germanis,
& Schmusige Wollen: Hispanis, Lana: Gallis, Laine. Quod verò Græcè οϊσωπος, Latine itè Oesypus nominatur: Arabibus,
Senferatab: Italicè, Esipo: Hispanicè, Isopilho humido: Gallicè, Graisse de la Laine forge.

Πιτύα

COAGULVM

CAP. LXVIII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum morsibus, cœliacis, dysentericis, & forminis
fluxione vuluæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur, sanguinem in grumos cōcretum
discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cum butyro, præstat mulieribus, vt concipiant:
potum verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui
vocant, priuatim cœliacis, dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apru,
cerui, vituli, bubaliq; coagula similes naturas sortiuntur, contra aconiti potum in vino, & concretum lac
in aceto conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem in-
tercipit. Vituli marini, castorei vires repræsentat: comitialibus, strangulatis vuluis, potu conferre existi-
matur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cū alterius ani-
mantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin mi-
nus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natate possunt. In summa coagulum o-
mne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Coaguli con-
sideratio.Coaguli fa-
cult. ex Gal.

Animalium coagulum (vt Aristoteles memoria prodidit lib. 3. c. 21. de historia animalium) lactis substantia est: quip-
pe quod in eorum ventriculo, quæ adhuc lactent, contineatur. Est ergo coagulum lac ignem habens intra sese, quod
cū animalis tepore concoqueretur, caseum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia: & inter dentata vtrinque
lepus. Quo vetustius coagulum est, eò præstantius: tale enim profluuii alui mederi præcipuè potest: atq; etiam quod leporis
est. Sed laudatissimum hinnuli: hæc Aristoteles. Quod autem leporinum coagulum sanguinem reijcientibus conueniat, vt
Dioscorides scribit, minimè quidem probare videtur Gal. lib. 10. simpl. med. vbi sic inquit: Coagulum omne acris, ac digerē-
tis potentia est, ac nimirum etiam exiccatoria: nam necessariò id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagulum comi-
tiale morbu, si cum aceto ebibatur, præterea profluuium muliebri sanare proditum est: sed & lac in ventre coagulatum
dissoluere: quod certè & nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium coagulo. Attamen le-
porinum omnium est præstantissimum. Sed & sanguinem in ventre concretum simili modo epotum dissoluit, ac efficacius
fortasse cæteris leporinum: verum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo.
Quidam autem sanguinis ex thorace reiectiones leporinum coagulum epotum suppressere prodiderūt. Caterum nec alium
quenquam eo vsum noui, nec ipse sum ausus acris vti remedio ad affectum adstrictionem poscentem. Porro coagulum equi-
num ad dysentericos, & cœliacos accommodari scripserunt nonnulli. At phoca coagulum exitiè aprum esse quidam præ-
dicant, tanquam vires obtineat castorei. Verum quacunque proditum est, quodq; coagulum secundum essentie totius præ-
stare proprietatem, non est nunc tempus exponere. Quam vim Dioscorides contra venenatorum morsus hic tribuit coa-
gulo leporis, capræ, hinnuli, cerui, eandem quoque Nicander in Theriacis hisce versibus:

Εν ᾧ τίδει τὰ μισον σπίνανος νεαρῶσ λαρῶσ
Ἡ φρονὸς τε βροῖο πάροι θ' ἀπαλύματα κόψα s
Ἡ ἐλάφον νηδῖων, πλὴν δ' ἠ καλέκσιν ἐχθῖνον.
Ἄλλοι δ' ἐγκατόεντα κεκρύφαλον ὠν ἀπερύσας
Δρακμάων ὄσοντε δ' ὠ καταβάλεο μοίρας
Τέτρασιν ἐν κυάθοις μέθυσ πολλὴ δότο μίξας.

Eius nomen Græcum πιτύα: Latinum, Coagulum: Arabicum, Ansea, Anshæ, seu Anshaa: Italicum, Caglio: Germani-
cum, Lipp/ Rinnlipp/ & Râß lipp: Hispanicum, Coalbo: Gallicum, Presure.

Στέαρ.

ADEPS.

CAP. LXIX.

ADEPS anserinus, aut gallinaceus recens, & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit. Sale inuetera-
tus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis
in fictilem ollam demissus, quæ alteto tanto capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare insti-
tueris, obstructo diligenter vase flagrantissimo soli exponitur: eliquescens inde humor in fictile alter-
um excolatur, donec adeps omnis absumatur: mox loco vehementer frigido reconditur, & ad vñs
digeritur. Alii fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis vi-
cem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teritur, coniectusque in ollam eliquatur, ad-
iecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines, & fatigationes leuant. Suillus adeps, & vrsinus hoc curantur modo. Recens, præpinguis, re-
nibus potissimum detractus, in largiore aqua cælesti, & quàm frigidissima, exemptisque tunicis, diligen-
tissime manibus confricatur, & exprimendo ferme ficcatur, subindeq; noua aqua abluatur: cæterū fictili
capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibis prunis spatha mouetur, eliquatur,
colo

do loco recondat. Pingua autem indito melle vindicantur à putredinis vitio. Vis omnium est ex-
 facere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt. Earundem vi-
 rium compos leoninus: nam resistere eum aiunt iis, qui insidias moliuntur. Ceruino, elephantinoq; per-
 unctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus: qua ex causa decoctus cum polenta, rhoe, & calce
 dysentericis datur, & cum pisanæ lucco infunditur. Ius decocti phthificis in sorbitionibus prodest, datur
 quoque vtiliter iis, qui cantharidum venena hauserunt. Hircinus, vt qui validissime discutiat, podagricis
 auxiliatur, cum fimo capræ, & croco impositus: huic proportione respondet ouillus. Suillus verò contra
 vuluæ, & sedis vitia idoneus est: ambustus igni medetur. È sue vetustissimus quisque sale conditus excal-
 cit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest cinere, aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tu-
 moribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus, gallinaceusque
 conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolo-
 res. Vrsinum constat raptos vitia alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur
 aurium doloribus. Fluuiatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecât,
 & melli admisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines, suffusionesque efficax est, addita
 cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis euulsos perunctis radicibus recens, & per se illitus ob-
 literat, atque renasci non patitur.

Tamet si de adipibus, seuis, & pinguibus, qua in medicum vsum veniunt, copiosè, & abundanter locutus sit Dioscori-
 des, vtpote qui non eorum modò facultates, & vires tradiderit: sed etiam rationem docuerit, qua illa curentur, spissa
 & odorata reddantur, & à putredine vindicentur: tamen cum de eorum natura, & facultate accuratius (meo quidem i-
 dicio) copiosius etiam, & particularius disseruerit Galenus, nec vanum, nec à nostro instituto alienum duximus, hic eas
 omnia referre, qua ab ipso memoria prodita sunt libro 11. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit: Pingue-
 do, & adeps & hæc quoque communissima sunt inter animalium partes. Nam omnia qua bene nutriuntur, aut pingue-
 dinem, aut adipem obtinent. Quæ verò macilentia sunt, maleq; nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem apparent, sæpe
 verò adeò pauculum, idq; siccum, vt agrè vti possis. Porro differt à pinguedine adeps crassitie: ac propterea animalibus to-
 tam naturam terrosiorem habentibus adeps prouenit, velut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter ab igne li-
 quesit, nec facillè, vbi liquata fuerit, rursum concrescit, cogiturve. At adeps nec facillè funditur, liquecitur, & susus celer-
 ritimè coit, ac conglaciatur, multoq; apparet pinguedine durior. Sus enim bene nutritus, pastusve multam habet pinguedi-
 nem, ob naturalem temperamenti humiditatem. At boues, & capra, & quascunq; id genus cornigera, ob siccitatem adipem
 plurimum generant. At tu si voles, oleosam, & pinguem in animalibus substantiam omnem, adipem appellato, vt pleriq;
 medici. Sed & pinguedinem appellare totum hoc genus tibi licet. Non tamen licet tibi citra mendacium adipem caprinum
 humidiores esse dicere, quam suum. Nã hic omnium ferme aliorum est humidissimus, ac proinde actione sua vicinam oleo
 vim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat, tum concoquat: ac proinde cataplasmatis, qua ad phlegmonas accom-
 modantur, commisceri solet. Qui verò mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino, aut in colo, ijs potius caprinum
 adipem, quam suillum iniicimus: non quòd acrimonia plus obtundat (nam ex natura sua suillus obtundit magis, ac pro-
 inde miscetur medicamentis vlcera curantibus, cuiusmodi est, quod vocant parygrum) sed quòd caprinus ob crassitiam cit-
 tius concrescat, suillus autem instar olei defluat: proinde ipsum potius dysentericus, & tenesmosis iniicimus, quando mor-
 sum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem partium nonnulla acrimonia magis tetundunt, vbi nimirum in
 alto mordicatorum corporum, quod molestum est, haerit. Nam quod crassarum est partium, minus: magis autem quod
 subtilium partium est, tota corpora penetrat, & omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hæc ratione adeps
 anserinus, qua in alto corporum mordicant, magis obtundit: sed & suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallina-
 ceorum adeps, ac gallinarum. Porro calidior semper ac siccior est masculorum animalium, & horum ipsorum executorum
 minus tum calidus, tum siccus. Quippe mas castratus eiusdem semper generis femina assimilatur. Hoc autem sermonis
 caput commune est, cuius meminisse oportet: Pro animalium temperatura semper existere differentias eius, qua in illis est,
 pinguedinis, aut adipis, aut quocunq; modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animalibus oleosi, & pingui.
 Igitur cum sus omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate, ac siccitate inferior sit: proinde pinguedinem quo-
 que minus habet calidam, magisq; humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria, & excelsatoria hu-
 manorum corporum. Huius enim meminisse perpetuo oportet in principis huius operis dicti. At differentia, qua sunt cu-
 iusq; singulatim, in maioris minorisq; ratione sunt. Nam pinguedo suis, vt ad nos quidem, largius humectare potest, sed
 non aequè excelsare, vt oleum: verum pinguedinis suum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum
 adeps suillo multo calidior est, & siccior. Rursum id & hic memoria repetentibus nobis, marem femina esse tum calidiores
 tum sicciores: marem autem castratum assimilari feminae, velut quicquid iuuenilis est ætatis. Et inter iuuenilia femi-
 na mare humidior est, & minus calida. Sic & adeps vitulinus, taurino minus, tum calidus est, tum siccus: & hædorum,
 quam caprarum, sed & caprarum minus, quam hircorum: & rursum taurorum minus, quam leonum: nam horum a-
 deps omnium propè quadrupedum adipe potentius digerit: nam & ipsorum calidissimus est, & maximè tenuiū partium.
 Itaque si ipsum medicamentis ad vlcera, & phlegmonas conuenientibus commisceas, non modo nihil adiuueris, verum
 etiam laferis, nimirum addita maiori, quam conueniat acrimonia. Inueteratis tamen tumoribus atque scirrhis in motum
 induratis, tum nervorum curuaturis (αγρῦλας Græci vocant) & in summa quacunque scirrhusa sunt, ijs aptissimus est, in
 quibus sanè inefficacissimus apparet suillus. Taurinus autem ab utroq; ex aquo distat, vt quanto calidior sicciorq; suillo est,
 tanto superetur à leonino. Itaque tanquam in medio consistens, meritò utriq; medicamentorum miscetur generi, & in
 scilicet qua scirrhosis medentur, & iis, qua phlegmonas concoquunt, cuiusmodi est tetrapharmacum quod vocant, ex cera,
 resina, pice, & adipe constans. Nam siue in hoc taurinum, siue vitulinum, siue hircinum, siue suillum indideris, semper pa-
 ri mouendo aptum, & concoctorium medicamen effeceris. Sed suillus si addatur, in pueris & feminis, & vt breuiter
 dicam, omnibus quibus caro est mollior, competit. Sin taurinum adieceris, fossoribus, & messoribus, & omnibus carnem
 duram habentibus, siue ob naturalem temperiem, siue ex ratione, ac forma vite, conueniens effeceris. Caterum adeps omnia
 dum inueterascit, se ipso & calidior, & tenuior efficitur, ac proinde quoque magis discussorius. Verum id omnibus serè in-
 ueterascentibus accidit, qua quidem putrescere non anticipent. Nam vinum, mel, acetum, frumētum, butyrum, lana iu-
 cida, oleum omne, siue lentiscinū, siue cicinum, siue raphaninū, siue ipsum quod ex oliuis conficitur, vetustate & calidior,
 & tenuioris essentia efficiuntur, ac proinde gustantibus apparent acriora, & ad induratos, agrèq; solubiles affectus omnes
 adhibentur.

Pinguedinis
vires ex Gal.

Pingued. & a-
dipis differ.

Caprinus.

Anserinus
Gallinarum
adeps.

Suillus.

Taurinus.

Vitulinus.

adstringentibus potentius digerentia. Atque ego sanè gustantibus acriora videri dixi. At quidam, quibus studium est nomi-
 nis significatiu corrumpere, non acria, sed adstringentia vocant id genus omnia, adusque piper: tanquam intersit nihil,
 adstringens, an acre dixeris. Et si denuo illos roges de galla, myrtis, mespilis, mali punici putaminibus, qua sidia vocant, rhoe
 & omphacio, & hac dicunt adstringere: tametsi aduersissimum ex illis sensum percipiamus ei, qui in nobis sit à pipere, py-
 rethra, napy, caporbio, capra, allio, & adarce: igitur si quemadmodum adstrictionis vocabulum de utroque affectu, quem
 sensu percipiunt, communiter efferunt, sic ipsos quoque affectus vnã habere naturam existimant, quiduis aliud potius
 habentis sunt, quam homines, vt qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoa, gallam, balaustrum, hypocistida
 constringere nostram substantiam: secernere verò, mordicare, ac penetrare, piper, napy, pyre-
 thra, improprie adstringentia nuncupant, qua mordicant, & excalfaciunt: ceterum in cognoscendis ipsis medicamentis
 non peccat. Verum si oportet coniectantem dicere, an in vocabulis, aut in rebus hallucinentur, equidem in vocabulis potius
 falsis vitiis illos dixerim, & maximè quibus Græca lingua insueta est, qualis est Dioscorides Anazarbensis, qui profectò
 vitiis bene dixit eorum, qua de materia medica memoria prodidit, ceterum significata Græcicarum vocum non satis
 parauit. Hic ergo cum ait magis esse adstrictorium adipem caprinum suillo, siquidem acriorem significare velit, per magis
 adstrictorium, accipimus sermonem ceu verum. At si illud, talem habentem qualitatem, & facultatem, qualem vhus, rbe-
 ra, hypocistis, balaustrum, haud verum esse sermonem dicemus. Porro quoniam viperarum adipem, vbi radicitus pilos sub
 adscissis, prohibere illos recrescere illitum referunt, visum est mihi eius facere periculum esse satius: at vbi prout
 adscissis, mentitos comperi, sicut etiam quòd initia suffusionum sanet. Verum vrsorum adipem alopecias curare ve-
 rius profectò: cum tamen probatiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro cum dicant tamen vlpinum adipem do-
 lora curare sanare, absque vt explicent, quos aurium dolores dicant, ceu non noscentibus ipsis distinguere, qua dicunt, at-
 tendendum non est: Alij piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones, aut quemcumque alium affectum nominare
 vti congruat. Alij non simpliciter piscium, sed addunt fluuiatiliu: alij verò potius marinorum, quòd videlicet aliquid
 plus vnde videntur, quam vulgus: hac Galenus. Ceterum de Tasi pinguedine, qua (vt experimento manifesto constat)
 articulos, & articularum duritias emollit, & discutit, nihil posteritatis memoria prodiderunt Dioscorides, Gale-
 nus, & Paulus. Nec praterea Galenus pinguedinis curanda, ac paranda rationem vllam, quòd sciam, tradidit: nec quibus
 aduentu veteres pinguedinem imbuerent, & in vnguenti morem conficeret: quemadmodum hac nostra atate vnguen-
 ta parant, quam vulgò POMATA vocamus. Ea autem hoc modo paratur: Sumunt ceruini adipis, aut hadi bi-
 bus libra: suilli verò recentis vncias sex, deinde exemptis membranis, vino albo lauant, exprimuntq; tandem, donec vinum
 emeucat: post hac elotam pinguedinem in fictile nouum, vitro, vel plumbo oblitum conijciunt, additis nardi Indici granis
 tribus, caryophyllorum semuncia, nucis myristica drachmis duabus, malis appianis, vel syluestribus semicontusis senis, vel
 septem. Hac omnia in sufficienti aqua rosacea quantitate macerant die vna: deinde lento igne tamdiu decoquunt vas o-
 pumulo contegentes, & rudicula sepius miscentes, quousq; vniuersa ferè aqua euanescat. Percolant deinde linteolo spissiori
 subdito vase mundo, aqua rosarum madente, dimittuntque concrefcere. Quo facto in fictile nouum iterum conijciunt, adie-
 dunt amygdalini dulcis vncias sex, cere alba vncias quatuor, & ad ignem colligunt, ac postmodum linteolo percolant in
 vitrum catinum aqua rosarum affusa, sinuntq; concrefcere. Demum eadem aqua moschum experta, aut alijs fra-
 grantibus aquis tamdiu lauant rude miscentes, donec vnguentum illud ad summum albescat. Tunc enim extrahunt, & vi-
 tro recondunt, seruantque in frigido loco, ne rancorem contrahat. Hoc in Italia frequentissimum obtinet vsum ad la-
 tum, mentis, & in emillarum rimas, tam à frigore, quam ab acri succo factas. Vtuntur eo praterea ad desquamata cutem,
 & alcrustosas papulas, qua pueris in capite enascantur. Sunt qui ei corallia porphyreo lapide lauigata admisceant, vt me-
 lancholicis, rimas occludantur. Alij verò cinnabarin addunt, vt flammeeum referat colorem. Porro (vt lib. 3. de facult. alim.
 scribit Gal. & Isach Arabicus in diatris) Adeps omnis in cibus sumptus ventriculum effundit, appetentiam deicit, pituitam
 auget, parum nutrit, succum illaudabilem gignit, alui fluxiones comouet, retentricem ventriculi facultatem imbecilem
 tollit: sensus & intellectum habet, somnolentiam inducit, & in ventriculis facile in bilem vertitur, & in vapores ca-
 pi percutit. Quare adeps est potius in ciborum condimentis, quam in alimentis expetendus. Etia Græcis, Latinis adeps, &
 pinguedo appellatur: Arabibus, Mevum, Vxaham, siue Sabam: Italia, Grasso: Germanis, Fett, Fettigkeit vnd Schmalz
 Hispanis, Gordax: Gallis, Gresse.

Viperarum.
Vrsorum.

Adeps pisciu.
Tasi pingue-
do.

Pomate pa-
randæ ratio,
& vsum.

Adipis in ci-
bis facultas.

MEDULLA. CAP. LXX.

Audatissima est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis
 exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & veluti
 caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat, & recondat.
 Omnes medullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, vlcera explent. Ceruina perunctos venenata fugiunt.
 Curantur recentes, adipis modo, aquæ resperlu subactæ, selectiq; ossibus tantisper elotæ, & in linteum ex-
 pressæ, donec aqua sincera emanet: & deterfa sorde pinna, siqua innatet, liquatæ in duplicato vase in pilâ
 exprimuntur: & vbi coiere, omni face, quæ ad ima sidit, derasa, fictili nouo reponuntur. Quòd si libet in-
 cutas reponere, facito omnia, quæ de anserum, & gallinarum adipe demonstraui.

Medulla, vt scriptum reliquit Galenus lib. II. simplicium medicamentorum, vim habet indurata, & scirrhusa corpora
 emolliendi, siue musculis, siue tendonibus, siue ligamentis id accidat, siue etiam visceribus. Optimam semper exper-
 tus sum ceruinam, deinde ipsorum iuniorum bouum, quos vitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorum vitulinam
 appellat. At hircorum, & taurorum tum acrior est, tum sicciior. Itaque durities scirrhusas dissoluere nequit, siqua etiam
 memoria manet eorum, que in quinto libro de his sunt prodita. Ex vitulina igitur, & ceruina medulla pessi componuntur
 veteris emollientes. Et extrinsecus vteris medicamenta imponuntur, qua ex medulla preparantur, vim habentia
 emolliendi: Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, qua sanè reuera est medulla, sed & ex spina, quam & ipsam
 medullam nominant, spinalem videlicet: que tum durior, tum sicciior est, quam alia. Illa enim mollior est & pinguior:
 ac proinde ego spinalem seorsum per sese absque illa repono. Sed ea mihi vtriusque medulla cura est, ne aut putrescant,
 aut siccum colligant. Itaque in hyeme primum eas capio, velut & adipem, deinde in adibus siccis, atque editis, planè
 humoris experibus, cum folijs lauri siccis repono. Nam qua recentia sunt & humida, multum etiam qualitatu sua
 illis impatiunt, vt acriores fiant medulle. At si quando ambiente calido, & austrino, medullas aut adipem voles reponere,
 paratum sit in hoc cubiculum neque calidum, qualia ferè sunt qua meridiem spectant (putrescunt enim in talibus) nec hu-

Medullæ vi-
res ex Gal.

Medullæ in
cibis facultas

Nomina.

mo proximum, atque humidum (nam in talibus situm contrahunt) sed supernum atque excelsum, & ad aquilonem obuersum, paruas habens fenestras apertas, ut tam noctu, quam interdum ab Arcto spirantes ventos accipiat: hactenus Galenus. In usu vero ciborum spinalis medulla id nutrimenti corporibus exhibet, quod cerebrum. Idcirco pituitosum, ac crassum generat succum, agrè concoquitur, ventriculo nocet, nauseam concitat: robustis tamen ventriculis concocta, bonum præbuit alimentum. Porro quæ ex ossibus elicitur medulla, quanquam largius sumpta ventriculi appetentiam destruat, pituitamque gignat: si tamen probè conficiatur, valentissimè nutrit, magisq; ori placet, quam spinalis, quod hæc sapidior sit in omnibus suis partibus. Μουελός Græcè: Medulla Latine vocatur: Arabice, Mochial balhadam, seu Moch simpliciter: Italicè, Medolla: Germanicè, Waxt: Hispanicè, Tuetanos, & Tutanos: Gallicè, Moelle.

Καδὴ

FEL

CAP. LXXI

Fel omne reponitur hoc modo: Recens præligato ore folliculi lino tamdiu demissum in feruentem aquam, dum quis spatium trium stadiorum percurfaret, mox exemptum siccat in umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in vitreum vas, quod mel habeat, immittitur: circumuoluto ad os vasis lini principio, & operto vase reconditur. Est autem omnis fellis vis acris, & exalfaciens: intensis tamen, & remissis viribus differunt. Siquidem præstantius in effectu esse videtur fel marini scorpionis, & piscis qui callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyænaeque: item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ, quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque vrsino, taurinum multò efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molitur, si intinctum eo tomentum aut fimbriam, sedi subijciat. Priuatim taurino angina: cum melle perunguntur: sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsque perducit. Idè auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte, aut caprino instillatum, medetur: & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris, & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur: phagedenicis vlceribus colis, & feroti doloribus ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro, & terra cinolia quàm optimè purgat. Ouillum, & vrsinum contra eadem pollent, verùm inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus: thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium vlcera, reliquaque omnia magno vsu assumitur.

Fellis vires ex
Gal.Fellis bubuli
lapis, & eius
vires.

Nomina.

Quamuis de fellis reponendi ratione, atque etiam de eius viribus abunde scripserit Dioscorides, non tamen ob hoc præmittenda existimaui nonnulla, quæ à Galeno lib. 10. simpl. medicamentorum de fellis facultatibus sicut memorie sunt commendata. Est igitur fel (auctore Galeno) succorum, qui in quoque sunt animalium, calidissimum. Itaque sicut sanguinem, & carnes dissimiliter temperata obtinent animalia: eadem ratione & fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est: & quæ illis minus sunt calida, proportione & hunc humorem illi inesse minus calidum, quantò scilicet & in alijs sunt inferiora. Ceterum hæc differentia habentur non modò pro diuerso animalium genere, quod hæc magis, illa verò minus calida sint: verùm etiam pro diuerso eiusdem generis animalium temperamento, ac etiam irritamento. Quandoquidem fel tauri interfecti, qui funibus adalligatus, violentèq; diu trahitur, & cursum & canum latratu defatigatus, & sitim famemque & multum laborem perpeffus fuerit, ab eius felle plurimum differe inuenietur tum substantia, tum colore, tum facultate, qui in pascuis letus liberq;, vitam desiderat, ac quietam duxerit. Nam defatigati, ac vexati animalis fel substantia crassius erit, colore nigrius, aut viridius, aut magis caruleum, magisque arugini simile: ob idq; etiam longè calidius erit quàm alterius, qui in pace, & otio degerit: Ideoque fel animalium quantò tenuius est, ac colore constat dilutiore, tantò minus spissioribus & magis colore saturatis exalfacit. Gignitur in bubulo felle lapis quidam nonnunquam oui magnitudine, croceo colore, facileq; friabilis, cuius Dioscoridem & Galenum meminisse non reperio. Hic (ut plerique perhibent auctores) potus vesica calculos comminuit. Naribus inditus visum mirifice acuit, & aquam in oculos fluentem inhihet. Tritus lentis quantitate, & beta succo commistus, & in errhinis naribus attractus, comitialibus sabuenit. Non desunt etiam qui idem magno successu ex vino exhibeant potandum felle suffusis. Denique aurata lupi piscis, perdicis, & galli gallinacei felle mirifice delectantur in coitu femina, si viri penis eo perungatur. Quod Græcis καδὴ, Latinis Fel appellatur: Arabibus, Saratac, aut Merata: Italis, Fiele: Germanis, Gall: Hispanicis, Hiel: Gallis, Fiel.

Αἷμα.

SANGVIS.

CAP. LXXII.

Sanguis anseris, anatis, & hædi, vtilissimè in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis, & columbæ, necnò perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisque illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhihet. Hirci, capræ, cerui, & leporis sanguis inaffatus tartagine, dysenterias, & cœliacorum profluvia sistit, in vino potus contra toxica efficacax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginesque emaculat. Caninus comitales modè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino & leporis coagulo, cuminoque contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitque. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicaméta additur, quæ erodunt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebrarum cuelli creditum est. Hoc idem viridium ranarum sanguine præstat. Menstruus sanguis foeminarum, cum illitu conceptum inhihet existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur, leuat podagra dolores, & ignem sacrum illitus.

Difo

Differens de sanguine Galenus, statim initio lib. 10. de simplicium medicamentorum facultatibus, etsi minimè eat in-
 Sanguinis cõ
 sideratio.
 fias, quin animalium sanguini aliquid insit, quod medicamentorum usu rectè competat, vt Dioscorides, & pleriq;
 de eius viribus scripserunt, liquidò affirmarunt: declarat tamen, multa de sanguinis viribus à scriptoribus esse pro-
 Vana sangui-
 nis experimẽ
 ta.
 da, quæ factò periculo fabulosa potius, & vana reperiuntur, quàm vera. Siquidè, vt idem refert Galenus, falsum sanè esse
 in confesso est, quòd epotus noctua sanguis difficulter spirantes sanitati restituat. Vespertilionum verò perunctus
 mammas, eas extuberare non sinat: pilosque renasci inhibeat, his partibus illitus, vnde recenter ipsi euulsi fuerint.
 Eadem similiter esse asserit, comitiales ebibito agni sanguine curari: pilosque è palpebris euulsos nasci prohiberi viridiũ ra-
 nam cruore. Quibus facile conijcere possumus, hoc in loco Dioscoridis codicem librariorum fortasse culpa mendosum esse,
 quippe quòd ibi legatur, oculorum palpebras ranarum viridium sanguine depilari, cum potius Galeni testimonio (etsi sen-
 Dioscoridis
 locus suspe-
 ctus.
 tentiam hanc non approbet) euulsi in palpebris pili harum sanguine renasci prohibeantur. Quin & aliud huic capiti men-
 tum fuisse videtur, quòd hic ea, quæ de admissariorũ equorum sanguine prodidit Galenus, de equarum sanguine, quæ ad-
 missariorũ experta sunt, legantur. Nisi fortè interpretum vitium sit, qui sexum in Dioscoride perpetuam mutarint. Præterea
 ipse Galenus: Tametsi non desint, qui turturis, vel columba sanguinem præferant in perforata caluaria, vbi rosaceo meli-
 ore nihil possis: nonnulli verò laudibus extollant gallorum, gallinarumque sanguinem ad sanguinis fluorem è cere-
 brum membranis: crocodili verò terrestris ad roborandam oculorum aciem: admissariorum equorum, quòd septicus sit, ad ex-
 teriorum vbiq; cutim: domesticorumque murium ad ἀποχολέσας Græcis vocatas, id tamen nunquam experiri vo-
 lunt. Metum enim (inquit) ne curiosus, vel stolidus viderer, si tantis, tamq; probatis remedijs semel præteritis, considerem
 sanguinem horum animalium illis plus posse præstare. Quòd si quis hac experiri volet, certò scio, damnabit non modò, qui
 se delusum factò periculo reperiet. Taurinus autem sanguis epotus antea quam concreseat, inter de-
 berat recenter medicamenta, quòd haurientem protinus strangulet, vt sexto volumine diffusus dicitur. Eius nomen
 Nominã:
 Galeni αἷμα Λατινὸν Sanguis: Arabicum, Dem: Italicum, Sanguis: Germanicum, Blut: Hispanicum, Sangre: Galli-
 cum, &c.

Α' ΠΡΩΤΑΤΟΣ

FIMVM.

CAP. LXXIII.

Armentariæ bouis fimum, si recens admoueat, vulnerum inflammationes mitigat: folijs autem in-
 uoluitur, & calefactum cinere feruenti superponitur: coxendicis cruciatus fotu compescit: illitum ex
 aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quòd à masculo boue redditum est, proci-
 dentes vuluæ reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum præsertim in montibus
 degentium, potum in vino, regium morbum emendat: menses cit cum odoramentis haustum, & partus
 euocat. Tritum in farinam, & impositum laniscum thure, fœminarum profluuia sistit, cæterosq; sangui-
 nis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecijs exustum, & cum aceto, aut oxymelite illitum: cum axun-
 gia verò impositum, his qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur ser-
 pentium morfib; vlcerebus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vitalem ischiadici vstionem hunc in
 modum accipiunt: In eo interstirio, vbi pollex brachiali committitur, caua veluti lacuna subsidet, in qua
 oleo imbura substernitur, deinde sigillatim feruentes stercoris caprini pilulæ imponuntur, dum va-
 por per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare: adustio id genus Ara-
 bica appellatur. Ouillum ex aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles verrucas, thymos, & ambusta
 igni rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua, aut vino potum, reiectiones sangui-
 nis sistit, vetustum lateris dolorem mulcet: adrupta, & conuulsa ex aceto bibitur: luxatis cum cerato ro-
 laceo medetur. Tam asinorum, quàm equorum fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, san-
 guinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in vino, mox potum,
 contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum vehementius & excalfacit, & vrit: cum hor-
 dace farina mistum, strumas ex aceto discutit, carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine &
 oleo: ambustis igni medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen
 contra venena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauria-
 tur, comitialibus prodelle credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum
 cum aceto, & illitum, alopecijs medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus mu-
 scæ, alui deiectionem promouent. Caninum, quòd flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum
 vino, aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflammatione vindicat, & obi-
 tet: intumescere non patitur: sed ea statim glutinat: sicca ex melle anginae perungi comodè disimè tradun-
 tur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq;
 seruat. Optima est candidissima, & friabilis, anyli modo, minime pôderosa, in humore statim eliquescens:
 quæ cum teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos o-
 rya pascunt, ipsumque non dissimile vendunt. Alij anylum, aut cimoliam miscent, & adscito anchusæ
 colore per raram cribrum paulatim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro
 crocodilea vaneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus, caninumque gutturi imposi-
 tum, anginis auxiliari.

Stercoris, vt posteritatis memoria prodidit Galenus libro 10. simplicium medicamentorum, vim habet vel maxime dige-
 Sretercoris vi-
 res ex Gal.
 rentem. Verum humanum ob foetorem abominandum est. At bubulam, caprinum, crocodilorum terrestrium & ca-
 rum, vbi osibus duntaxat vescuntur, neque grauitè olet, & multa experientia non tantum nobis, sed & alijs medicis me-
 rita maioribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui cognomentum erat Pharmaceon, & alia omnia composita
 medicamenta collegit, vt multos impletet libros, & stercore ad multos saepe affectus vitur, non modo medicamentis, quæ so-
 ri imponantur commiscens: sed is quoque, quæ intrò in os sumuntur. Cæterum humani stercoris hoc habeo experimentum.
 Humani ster-
 coris experi-
 mentum:
 Afflicto quidam à phlegmone ad fauces existentibus vexabatur, adeò vehementer, vt suffocationis subiret periculum, & sa-
 ue ob hoc periculum venam secare cogebatur. In hunc cum fortè quis incidisset, pollicitus est se prabiturum medicamenti
 experimentum, & se vocari, si quando rursus aliqua in parte gutturi emicuisset phlegmone, ante sanguinis missionem præ-
 cepit. Itaque vocatus, medicamento illito statim hominem curauit. Vt autem iterum profectus, non in ipso tantum, sed &
 in alijs

in alijs, qui similiter erant affecti, rogabat is, qui assiduo suffocari periclitabatur, data mercede, ut se medicamentum illud doceret. Erat enim ille & locuples, & in pecunia sumptu liberalis. Porro ubi conuentum esset de pretio, is qui vendebat scripturam: Hoc medicamentum, inquit, per antipatheian quandam utilitatem obtinet. Esse autem eam antipatheian, ut qui curatur nesciat, unde conficiatur. Iussit itaque alium daret, qui pro ipso disceret, quiq; iureiurando reciperet, sese nullius medicamenti facturum copiam, priusquam ipse, qui dedisset, foret defunctus. Itaque à morte eius, qui indicat, non tantum ille qui didicerat, suum hominem, sed & alios sanabat: & mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum volens ac libens obtulit. Erat autem stercus pueri siccum, cum melle Attico ad lauorem tritum. Victitabat autem puer, cuius stercus accepturus erat, ut ipse qui medicamentum dederat ostendit, lupinis, illis videlicet, qui ex more edis solent cum pane bene cocto in clibano, modicum salem, & fermentum habente. Præbebat autem bibendum vinum vetus: atque hæc omnia mediocriter in quantitate, modo ut perfecte ea puer posset concoquere. Itaque cum primo die eo victu esset usus, postero tamen die nondum stercus capiebat, sed in eo quoque die rursus eodem alebat victu, ac tertio demum excretum sumebat: ac postea arefacto utebatur, similiter ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem illum, qui docuerat, fugit autem alios cibos ob factorem, prætulisse lupinos: sese verò experimenti gratia, carnes gallinaceas, aut perdicum ex aqua aut tenui iure bene coctas persape exhibuisse, & medicamentum nibilo minus operatum. Atq; ego sanè hæc tibi de humano stercore narrare possum: hæc Galenus. Caterùm sit ex humano stercore vitreis organa aqua, præsertimque ex eo, quod homo rufus excrementis, quæ cuniculosis, exedentibus, sinuosis, & contumacibus vlcibus mirifice opem præstat. Delet & oculorum argemas & subeculas. Quinetiam carcinomata sanat exterius adhibita. Intus verò sumpta comitiales iuuat, lapidem in renibus, & vesica comminuit: aqua intercute laborantibus prodest: item & ys auxiliatur, qui non modo à cane rabido demorsus sunt, sed etiam ab omnibus alijs animalibus icti, quæ venenum ei aculantur. Porro oleum, quod post eius stillatitiam aquam ab organo emanare solet, carcinomata, sinus, aliaque vlcera, quæ Græcis cacoethe dicuntur, etiam valentius sanat. Bubulum deinde stercus (ut idem Gal. citato loco scriptum reliquit) exiccantius attraheturq; & ipsum est facultatis, ut palam facit, dum apum vesperumque morsus iuuat. Atque hæc ut à proprietate substantia totius iuuentur, fieri potest. Caterùm humidum illud vere collectum, cum boues herbas depascuntur, impositum rusticorum phlegmonas discutit, & aqua intercute laborantes iuuat. Siue tamen oportet, omnia genus medicamentum duris agrestium hominum corporibus aptari, nempe fossorum, & messorum, & qui opus obeunt aded validum. Quæ & ad eorum scirrhosos tumores aceto in cataplasmatis formam composita illinuntur. Caprinum præterea digerentis, & acris est facultatis, aded ut induratis scirrhosum in modum tumoribus congruat, nec tantum lenis, ad quos creberrimè medici non pauci huiusmodi stercorea applicant, sed etiam aliorum partium. Siquidem ego (inquit Galenus) eo usus sum ad genu tumorem habens inueteratum, & agre solubilem. iusso fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxycratum, indito videlicet hoc stercore, & mirifice homo ille fuit adiutus. Erat autem rusticus, in quo id factum est. Et iam etiam alius rusticus, cum sic usus esset, non tantum in genu, sed etiam alijs in partibus ad tumores similes, perinde adiutus est. Nã acrius est medicamentum, quam ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui molli sunt carne, sanare possit. Quin & ad aquam intercutem, & ad splenicis varie caprino stercore utimur. Sed & vltimum tenuiorum quidem partium, verum haud manifestò redditur acrius. Quamobrem sanè ad alopecias congruit, & omnia aded quæ extergentia medicamentum desiderant, ut lepras, psoras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatis, quæ alia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & bubonas diuturniores. Est enim vis eius cuiusque etiam vltima absterforia, & digerens, nec eam paruum habet digerendi potentiam. Nam medicus quispiam ex his, qui in agris, & vltima medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad viperarum morsus, & multò sanè etiam magis aliarum bestiarum, ac profecto ex his complures seruauit. Et hic ipse quoque medicus arquetis potandas ipsas σπογδαδus, hoc est, pilulas caprinæ ex vino præbuit, & ad profluuium muliebrem cum Thure apposuit. Quæ omnia sanè optimus medicus ignorare non debet, ceterum potiora eligere potissimum ad urbanos, & honoratos, alicuiusque existimationis viros: in quibus equidem ego tanquam nunquam sum usus medicamine, cum multo meliorum suppetere copia. At tamen existit nonnunquam talium usus, aut in venatione, aut rusticatione, cum scilicet meliorum nihil adfuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis dura, ac asinum. Nam eiusmodi multos in agris reperias dignos, qui bibant spyrathos. Caterùm è canibus ossa comedentibus stercus præterquam quod ceteris tum præstantius, tum candidius habeatur, fistula gutturi insufflatum anginam curat: sicuti & hyssenteriam ex lacte caprino haustum, in quo prius igniti calculi fuerint extincti, aut ignitum ferrum, quod Græci σπινθηρ vocant. Quinetiam periodicas, circulares, & fugat febres, si cochlearis mensura in accessu ex vino præbeatur bibendum in patientia Prodest & malignis vlcibus inspersum, vel emplastris ad id facientibus commistum. Pollet etiam suis viribus Lupinum: idcirco id magnis laudibus extulit Galenus citato loco, sic inquit: Lupinum stercus quidam colicis potandum dicitur, non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in intervallis, si quidem phlegmone vacarent. Quorum ego quosdam vltima non amplius hæc affectu correptos, & correptos non amplius id grauitè passos, sed nec post paucum temporis. Accipiebat autem ille albius potius luporum stercus, quæ ubi ossa ederint, solent excernere: verum illud etiam in eo mirabat, quod vel suspensum, euidenter sapenúmero iuisset. Itaque, hic stercus capiebat, quod non decidisset in terram, id quod non erat inuentu difficile. Ea enim est luporum natura quæ canum, ut suspensio altero posteriorum trurum, & metiant, & catent in eminenti quopiam loco ex terra. Itaque in spinis sape astate stercus lupinum reperitur, & fruticibus, vepribus, herbis, procerioribus. Inuenitur porro in stercore illorum & nonnihil ossium deuorati animalis, quod ut effugerit commansionem, ita & concoctionem: quod & ipsum contendens ac conterens, bibendum præbuit colicis: ac si homo esset peritatis amans, miscebat & salis quippiam, aut piperis, aut quippiam eiusmodi. Vt plurimum autem ex vino albo consistentia tenuis bibendum præbebat: interim verò etiam ex aqua. Hoc ergo stercoreis, quod patientibus ilibus applicandum esset, inbebat suspensio vinetis confecto ex lana, non cuiuslibet ouis, verum multò præstabat eam esse ouis à lupo laniata, unde quod ad hunc usum accommodaretur, esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, ex pelle cervina, & lorum quod cingeret ilia, & in qua stercus contineretur, parari præcipiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maxima fabæ confecimus, quam experiri gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec potuimus non mirari, cum plurimos ipsorum, videremus adiutos: ceterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorū transmitti posset. Quod autem ciconia simum comitiales iuuat, plauti resertit Galenus, asserens eos esse redarguendos, qui talia scripserunt. De ouillo, columbino, gallinaceo, & murino, & crococalium, cum satis superque disseruit Dioscorides, nec plura à Galeno, & alijs descripta repererim, quæ medicina magis competere possint, non est quid amplius addendum existimem. Veruntamen animaduertendum est, quod, quemadmodum etiam de animalium fellibus diximus, stercorea ipsa inter se plurimum differunt temperamenti, & victus animalis ratione. Quippe quod alterum sit altero plus, minusue calidum, pro animalium diuersorum generum temperie, aut pro alimentorum temperamento in eiusdem speciei animalibus. Caterùm non duxi prætermittendum, quod de ibicis stercorea scribit Marcellus

Aqua, & oleum
ex humano
stercore.

Bubuli sterco-
res ex Gal.

Caprini ster-
vires ex Gal.

Canini sterco-
ris vires.

Lupini sterco-
vires ex Gal.

Ciconia ster-
cus.

Ibicis sterco-
ris mira faul-
tas.

ad ischiadicos, & arthriticos, cū certè admirabile sit auxiliū. Ille itaq; sic habet: Incredibile & vnicū remediū
 ischiadicos & arthriticis hoc est, quo & ipse Ausonius medicus sanatus est, & multos ita iacentes, vt mouere se sine cruciatu
 nequeat, intra quinque dies stare, ambulare autem intra septem dies facit. Conficitur sic: Fimum Ibicum luna septima-
 decima colligat, quanquam & alia luna vetere collectum, simili efficacia proficit, dum modo medicamen septimadecima lu-
 na componatur. Ex eo ergo fimo quantum vnus manus pugno pleno poteris comprehendere, dummodo impar sit nume-
 rus pelularum, in mortarium mittes, atque adicies piperis grana vigintiquinque, diligentissimè trita: tunc addes mellis o-
 ptimi beninam, & vini veterissimi optimi sextarios duos, & contritis prius pilulis vniuersa miscebis, & repones in vasculo
 vitro, vt cum fuerit opus, paratum habeas medicamentū ad subueniendum. Sed vt maior sit medicaminis efficacia, luna
 septimadecima illud facere debetis, & cum daturus fueris, à die Iouis incipe, & per dies septem continuos dato, ita, vt qui
 vnicū remediū est, stans in se abello contra orientem bibat: quæ potio, si ita, vt scriptum est, data, & obseruata fuerit, etiam si
 articulis, & coxa infirmus contractusque fuerit, & immobilis, ac desperatus iacuerit, necesse est, vt septima die
 ambulet. Hec ille: qui et si non dixerit, quantum huiusce medicamenti quotide sumere affectos, oporteat, intelligendum ta-
 men censet, vt in septē aequales partes diuidi debeat, & vna quotidie sumi. Quod Græcè *δρόπατος*. Latine Stercus & fi-
 nis. Arabice, Hebel, Zebel, aut Bhar, hauiā. Italice, Sterco: Germanice, Dreck: Hispanice, Estiercol: Gallice, Fiâte.

Nomina.

Opus.

VRINA. CAP. LXXIII.

Humanam vrinam suam cuique bibere, contra viperæ morsus ac venena, incipientemque aquam in-
 ter cutem proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisque morsus, ea conuenientissimè fo-
 rentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus, & lepras nitro addito expurgat. Sed
 vicia vlcera capitis manantia, furfures, pforas, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit: nomas, &
 præcipue genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decoctaq; in calyce mali punici, ca-
 nam vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vase cum
 melle emendat cicatrices, argema, caliginesque: ex ea, & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod
 in vrina subsidit illitu ignem sacrum mitigat: feruefactum cum cyprino, inditumque, vuluæ dolores mul-
 cet, strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina si cum myrrha instilletur,
 aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu ex-
 pelit. Caprina ad aquam quæ cutem subijt, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur: vri-
 namq; per aluum extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitijs mederi.
 Lynceus vrinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coireue in calculi duritiam, vulgò
 creditū est: quare quod de ea proditum est, vanum esse cōuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur suc-
 cinum pterygophoron, ideo dictum, quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; flu-
 uione labdranti conuenit.

Vrina omnes quidem, vt scriptū tradidit Galenus lib. 10. simplicium medicamentorum, facultate sunt calida: sed plus
 tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum. At vrina hominis omnium propè aliarum vrinarum est im-
 becillima, exceptis porcis domesticis, quibus exempti sunt testes. Nam illorum similis est totius corporis temperatura tempe-
 nis hominum, & vrina similiter debilis. Verum montanorum aprorum valida est, vt etiam ex odore apparet, qui vtique
 acerrimus est. Hac vtuntur Hetrusci ad puerorum vermes, oleum suo in vtriculo vrina admiscentes, & in fumo tandiu
 suspendentes, donec crassa fescat ad mellis spissitudinem: deinde illud diligenter asseruant, eoz; puerorum nares, tempora, &
 vmbilicū inungunt magno sanè successu: nam & ego sæpe periculum feci. Sed quamuis Dioscorides complurium vrinarum
 vias descripsit, vt quas varijs, ac diuersis morbis vtiles esse existimauerit, Galenus tamen vrinarum medicamenta parui-
 pendisse videtur. Quippe qui crediderit (quem admodum & de sanguinibus differens inquit) cām parata reperiantur va-
 lantiora medicamenta, ac experimento comprobata, ijs præcipue morbis congruentia, quibus vrinam conferre nonnulli au-
 tem aut, earum medicinas ad curiosos superstitiososque spectare magis, quam ad peritos medicos, qui hæc nauseosa, incerta
 que remedia nunquam probatis, expertisq; præponunt. Quod autem puerorum vrina agrè spirantibus conferat (vt Diosco-
 ridis auctor est) minimè probat Galenus, cum loco citato inquit: Vrinā pueri orthopnoæ vocata gratia ebibere necessarium
 non est, cum sint & alia medicamenta, qua huic medeantur affectui. Quin cum bibisset quidam, affectu liberatus non est,
 vnon eximium quid præter alia possideat. Chrysocolla conficiendæ rationem, quam fieri ex puerorum vrina prodidit Dio-
 scorides: quamque seplasiarij, & aurifices vulgò Borrace nominant, duobus in locis scriptam reliquit Galenus lib. 9. sim-
 plicium medicamentorum, vbi de ea speciatim egit, & lib. 10. eorundem de vrinis differens. Et quamuis (vt libro quinto di-
 citur) legitima, probatq; chrysocolla fossitia habeatur, sit tamen artificio ex pueri vrina in ardentissimis solis caloribus,
 areo mortario, atq; etiam pistillo areo tamdiu circumacta, donec mellis spissitudinem assequatur. Præfertur, qua hoc mo-
 do parata sit, ad contumacia vlcera sananda, exedentiaque coercenda. Illud profecto vanum, ac fabulosum esse manifestè
 deprehenditur (vt hic Dioscorides scribit, & nos eum secuti superiori libro in succini mentione ostendimus) quod vrina lyn-
 ce, simulac excernitur, duretur, coeatue in lapidem illum, quem Lyncurium vocant. Quippe quod is inter succini genera ab
 omnibus fide dignis auctoribus recensetur: quod sua proprietate natura pennas ad se trahat, quemadmodum & cetera
 succini genera paleas, festucas, ac leuissima queq; alliciunt. Quantā verò à legitimo lyncurio vulgaris ille lapillus differat,
 qui officinæ lapis lyncis appellatur, & cuius est vsus apud seplasiarios, & medicos, qui simplicium medicamentorum scien-
 tiam negligunt, ij diiudicent, qui simplicium historias, & facultates optimè norunt. Quandoquidem is, quem pro fabuloso
 lapide lyncis vendit aut impostores, lyncurium succini genus haudquaquam est, nec alius quiuis lapis ei viribus respondens,
 nec siquidem vrinam cieat, & renum, vesicæq; calculos comminuat, vt seplasiariorum, & medicorum vulgus opinatur: qui
 perum Dioscoridis, aliorumque in re medica bonorum auctorum familiaritatem curant. Ceterum hinc satis constare ar-
 bitror, Christophorum Encelium (pace viri alioquin docti dixerim) planè hallucinari, quod lib. 3. cap. 27. de re metallica,
 poetarum sortasse, & aliorum quorundam fabulis addictus magis, quam veris probatissimorum auctorum testimonijs, pro-
 bare contendat, Lyncurium ex vrina lyncis coalescere, atque ex maris vrina fuluum fieri, ex fæmina verò vrina album.
 Hanc autem opinionem suam ex eo comprobare videtur, quod aliquando in vesica apri, itemq; suis domestici lapillos inue-
 nerit. Ex quo postea colligit, mirum non esse, quod lyncis quoq; vrina in lapillos concreseat. Sed quam leuis & infirma sit hæc
 ratiocinatio, vt comprobet quod contendit, quamque vana sit opinio hac, eorum sit iudicium, qui magnis laboribus,
 multis

Vrinarum fa-
 culta. ex Gal.

Vrina apri.

Vrinæ medici-
 nas contem-
 pit Galenus.

Chrysocolla
 factitia.

Vana de lyn-
 curio opinio.

Lapis lyncis
 vulgatus.

Encelij opi-
 nio vana de
 Lyncurii ge-
 neratione.

Salutæ vires
ex Galeno.

Nomina.

multis studijs, summaque diligentia rerum simplicium peritiam sunt assecuti. Atque hæcenus de vrinis, & hucurio. Restat modo, vt etiam de Salua aliquid in medium afferamus. Itaque cum eius non meminerit his libris Dioscorides, postquam nonnullis humani corporis morbis opitulari, ea de eius viribus, & facultatibus hic referam, quæ a Galeno libro 10. simplicium medicamentorum memoria produntur his verbis: Sialon, siue sialon, siue ptyelon appellare libet, nihil interest. Verum id sciendum est, vim eius esse differentem, tum in animalium speciebus, tum in eorum vnoquoque sano, aut egro, ieiuno aut sitibundo, aut cibo potuque sumpto. Etenim vt vrina, & bilis, & sudor: sic etiam salua sumpta quidem cibo imbecilla est: valida & acris eorum, qui ingenti aut inedia, aut siti premuntur. In medio vtriusque est eorum qui probe concoxere quidem, nondum tamen cibum potumve ingesserunt. Hac ergo salua nutrices puerorum lichenas curant, paruum videlicet digitum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes. Idq; faciunt subinde tanto scilicet interuallo, dum salua vires in lichene perdurent, ac nondum sint extincta. Sed & triticum mandentes rustici non pauci furunculis imponunt. Nam celeriter eos & digerit, & cõcoquit: cum si macerarent aqua, non eque prodesset. Ex quo liquet saluam ipsam auxiliij robur adferre. Atque corporibus mollibus, & puerorum, panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro omnia sic commansa digerunt, & sugillata, ceteraque ecchymomata, maximè vbi panis simul cum paucis radicula fuerit commansus. Porro tota substãtia vel maximè aduersa est salua bestijs hominem interficientibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autem mihi quidam incantationem sese ostensurum, qua scorpios interficeret: vbi illam semel dixisset, in scorpionem expuit: inde rursum eam obmurmurans iterum scorpionem conspuit: ac vbi tertio dixisset, atque expuisset, mortuus est scorpionus. At postea ego absque incantatione à sola salua morientem vidi scorpionem, idque celeriter passum à salua esurientium, aut sitiētium: tardè autem ab illis, qui cibo, potuque fuerant impleti: in alijs autem proportione. Quod ἔρον Græcis: Latinis, Vrina, & Lotium nominatur: Arabibus, Baul: Italis, Orina. Quod verò σιάλον, σιάλον, ἔρον πύλον, Græcè, Salua Latine, pariter & Italicè vocatur: Arabicè, Busach, Bezach, & Ihab.

MEL.

MEL.

CAP. LXXV.

PRincipem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & Sicilia, cognomine hyblæum. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauum, nec humectum, graue & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumque resilit in digitos. Mel abstergendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera, sinusque, commodissimè infunditur. Decoctum, atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum: item aurium sonitui, & dolori cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lentes, & fœda capitis animalia illitum necat: nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circumcisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum caliginem discutit: faucibus, tonsillis, anginae, collutum gargarizatumve medetur: vrinam ciet: auxiliatur tussi, & à serpente percussis: contra haustum meconiam, cum rosaceo calidum allumitur: aduersus venena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit: crudum tamen aluum inflat, tussim laesit, & ea de re despumati vsus aptior est. Primatum tenet in mellis genere vernum, deinde æstiuum: hybernium verò, vtpote quod crassius constet, deterrimum reputatur, ceragini faciendæ idoneum. Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est: quoniam apes inibi absinthio vescantur: quo vitia cutis in facie, & maculae aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote mel conflatur: quod qui edere, mente alienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & falfamenta, aut eporum mulsum: resumpta, quoties vomitione reijciuntur. Acre autem est, & olfactu sternutaméta mouet. Quod cum costo illitum, sceminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India verò, & felici Arabia in arundinibus inuenitur: salis modo coactum est, dentibus, vt sal, fragile: aluo idoneum, & stomacho vtile, si aqua dilutum bibatur: vexatae vesicae, renibusque auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

MEL.



Mellis confideratio.

MEL, quod apes colligunt, omnibusq; vulgarissimum est (auctore Galeno lib. 3. de alimentorum facultatibus) oritur in plantarum folijs: earumq; neque succus, neq; fructus, neq; pars, vlllo pacto dici potest. sed eiusdem cum rore generis est: non tamen assidue, nec copiose, vt ille, prouenit: repertumque est aliquando æstate super arborum, ac fruticum, herbarumque

que sibi mel quoniam plurimum, aded vt agricola velut ludentes canerent, Iupiter melle pluit. Cui subscribens Plinius lib. vi. cap. 12. sic inquit: Mel ex aere venit, & maxime siderum exortu. fitq; precipue ipso sirio explendente, nec omnino prius verum exortu sublucanis temporibus. Itaque cum prima aurora arborum in folia melle rosida intuentur. At si qui manna sub do fuere, vinctas liquore vestes, capillumq; concretum sentiunt. Siue ille est caeli sudor, siue quadam siderum sa- lina, hinc purgantur se aeris succus: vtinam esset & purus, ac liquidus, & suis naturae, qualis defuit primò. Nunc verò è tan- to cadens altitudine, multumq; dum venit sordescens, & obusio terra halitus infectus: praeterea à fronde, ac pabulis potus, & in uisceros congestus apum: ore enim vomunt, ad hac succo florum corruptus, & alueis maceratus, totiesq; mutatus, ma- gnam tamen caelestis naturae voluptatē affert. Ibi optimus semper, vbi optimorum doliolis florum conditur. Attica regionis hic, & Sicilia Hymetto, & Hybla ab locis, mox Calyda in insula. Haecenus de melle Plinius citato loco. Verum enim uero (vt in libro 11. cap. 14.) mel, quod in Creta Carina monte colligitur, musca non attingunt, nec eo in monte eadem

Porro venenatum mel, quod in Heraclia Ponti prouenit, cuius hic meminit Dioscorides, Plinius quoq; in libro ante citato, ca. 13. subiunxitque & alterum eodem in Ponto gigni gente Sannorum, quod ab insania, quam Maxomenon vocant. Id existimatur contrahi flore rhododendri, quo scatent syluae. Habentur praeterea & alia mellis genera, quae rosida non sunt, sed ex plantis nascuntur, vt illud, quod ex anacardys fluere Arabes scribunt, & inter Graecos Geographorum libro 15. ex arborum siliquis, quas arbores proferunt, denorum digitorum longitudine, mellis ple- num, quod qui ederint, non facile euadant. Quinetiam refert Pomponius Mela tertio de situ orbis, tam pinguis alicubi, & in solo Indiam esse, vt in eo mella ex arborum frondibus defluant. Exprimuntur etiamnum è vulgaribus siliquis, quae dicuntur, quo tam Indi, quam qui Troglodyticam Arabiam incolunt, gingiberis radices recentes viridesq; ac etiamnum myrobalana omne genus. Quod facile conijctur ex ijs quae ex Alexandria Aegypti Venetias quot- tidie importantur. Caterum non desunt inter recentiores medicos, qui disputant, an Saccharum, quod sub mellis genere profertur veteres, praesertim Dioscorides & Galenus, in India, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate Saccharo dici pos- sit. Et quamuis plerique reperiantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo affirmant, communis vsus saccharum, & quod ab antiquis describitur, vnum & idem esse, quod ex eadem proueniant planta, tamen Manardus Ferrariensis, & Locardus Fuchsius ipsum secutus, maximam inter ea ponunt differentiam, omnino opinantes in alio arundinum genere uenisse antiquorum saccharum, de quo inter mellis genera scripsere Dioscorides, & Galenus, concresecereque ad hanc formam ex caelesti rore, quemadmodum & id quod mannam vocamus: non autem in ijs arundinibus, è quibus in aqua deorsu huiusce etatis saccharum in Medera, Sicilia, Creta, Rhodo, & Cypro insulis, ac etiam in Aegypto exprimitur. Quia in eos viros alioqui doctissimos, plane hallucinatos crediderim, quod nullo, vt puto, auctorum probatorum testimo- nio ducti sibi persuaserint, manna in modum ex rore concresecere antiquorum saccharum solis ardore super arundinum fo- liaz in India, quam in felici Arabia. Quippe quod nusquam repererim scripsisse Dioscoridem, Galenum, nec veterum, vel recentiorum quorumquam, concresecere saccharum in arundinum folijs, ex rore solis feruore concreto, siue potius extricato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se concrescit. Quo fit, vt mihi refellenda videatur eorum sen- tentia. Nam si verum illud esset vt ipsi imaginantur, non modò non est credendum, sed ne cogitandum quidem Dioscori- dem, qui diligentissime simplicium medicamentorum historias literis, memoriaq; mandauit, silentio praeterisse tam pul- chrum & admirabile, scituq; dignum natura opus in saccharo consiciendo. Nec minus id reticisset Galenus natura ope- rum maxime indagator, quemadmodum nec reticuit lib. 3. de alimentorum facultatibus, aerei mellis historiam, quod nos manna vocamus, quodq; sua aetate in monte Libano, alijsq; locis super arborum frondes repertum scribit. Quamobrem ma- gis ueritati consonum videtur, vt dicamus, nil aliud veteribus saccharum extitisse, quam nostratis sacchari arundinum

larymæ, seu liquor, qui nimia succi copia aperto in latere calamo, perinde ac gummi, exterius concreuerit. Huic nostra opi- nio subscribit Plinius lib. 12. cap. 8. sic inquit: Saccharon & Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in arundi- nibus collectum gummi modo, candidum, dentibus fragile, amplissimum nucis auellanae magnitudine: haec Plinius. Ex quibus facile cognosci potest, quod non ex rore, vt manna euenit, coalesceret antiquorum saccharum super arundinum folia, sed quod fractis calamis earum internodijs cohereret collachrymans, è quibus vulgare nostrum conficitur. Quandoquidem hoc modo resina, gummæq; omnes scisso sui arboris cortice emanant. Alia praeterea huc accedit ratio, quae (vt equidem arbi- tror) Manardi, ac Fuchsij sententia prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna à sole tacta, dum arborum inheret folijs, paruo temporis interuallo in auram euanescit (vt libro primo diximus in manna mentione) eadem sane ratione id saccharo euenisset, si ex rore (vt ipsi contendunt) concreseceret. Siquidem à sole tactum, rarefactumq; facile dissipasset in auram, nec gummi modo concreuisset. Eoque magis, quod nusquam legerim in Dioscoride, nec Gale- no saccharum è folijs arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum reperiri. Quod etiam testatur Strabo libro 15. Geo- graphicae ubi aperte scribit, in India arundinem mel siue apibus gignere: non autem quod ex rore in arundine fiat, vt quid- dam perinde, ex ignarusque medicus mecum contendere, atque etiam, vt suam mordicus teneret opinionem, Strabonis co- tra corrumperere non est veritus. Praeterea cum memoria prodiderint Dioscorides, Galenus, & Plinius, antiquorum saccha- rum durum esse, & sili modo coactum, album, dentibus fragile, ex his coniecere licet, è rore saccharum nequaquam fieri. Quip- pe quoniam manna, quae eodem modo è rore concrescit, sal minimè refert, nec dentibus fragili deprehenditur, sed potius man- dentibus tenax & cera modo lentescens. Quare crediderim antiquis saccharum fuisse tenuiorem, ac praestantiorem illi- partem in arundinum sacchariferarum medulla, quae per internodiorum fissuras exiens solis calore concreuerat, vt & sac- charum nostrum calore ignis arte concrescit, & addensatur. Quod cum accuratissime perpendissent homines, liquoremque praestantiam agnouissent, à natura edocti hoc arte se facturos existimarunt. Neque id incassum attentasse videntur, quan- doquidem sacchari integros calamos assumentes, minutimq; incidentes, ignis calore radiu decoxerunt, donec vniuersum li- quor ab unpta ignis aqua, diu efferverens in saccharum salis modo in vasis fundo concreuerit. Verum etsi sacchari arte facti nihilauerint Dioscorides, & Galenus, non desunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse. Solimi auctoritate ferri, qui in India palustribus arundinem ita crassam progigni ait, vt fissis internodijs lombi vice vectitex nauigantes, è cuius radicibus dulcem etiam exprimant humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorem hunc, qui ex harum canarum radici- bus elicitur, saccharum nostri vsus fuisse existimant, proculdubio falluntur, quia Indi non modò ex decoctis canarum, sed etiam quae quoque arborum radicibus sibi potus parent, cum illius cali & soli clementia frequentissima sint plantarum radices, quae media dulcedine imbuuntur, vt Strabo testis est loco nuper citato, vbi sic inquit: Nullus annus in India inuenitur vtro- que tempore sine pluuia, quae propter contingit annum feracem esse, cum semper terra sit fecunda: fructus autem arboros multos gigni arborumque radices, praesertim magnarum arundinum, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à salibus repulsa, tam caelesti, quam fluuiali: aded quod ea, quae apud alios & fructuum, & succorum maturitas dicitur, apud illas

Mel Heraclie- ticum.

Mellis gene- ra non rosida.

Sacchari con- sideratio.

Manardi, & Fuch. opinio reprobat.

Antiquorum Saccharum.

Factiij Ge- chari inuencio.

Aliquorum lapsus.

concoctio est: quae tantum ad dulcedinem operatur, quantum ea, quae per ignem fit. Sententia nostra Lu. cum quoque, si
fragatur, illud explicans hoc carmine:

Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Quinetiam Marcus Varro, qui eodem ferè tempore claruit, his tribus versibus attestatur, dum inquit:

Indica non magna nimis arbore crescit arundo.

Illius & lentis premitur radicibus humor,

Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex his palam est, hos omnes de factis Indorum portionibus, quae hinc vini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex illa
cannarum radicibus saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è glycyrrhiza radicibus, quoniam & è decoctis, presens
siliquis, sicut & alij è dactylis, dulces elicimus succos ad vray vsus potationes: quemadmodum & occidentales Indi. e pluribus
dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores, quod mellis dulcedinem praesentent,
esse mel, neque saccharum. Nec mirum sanè si Indica arundines radicibus dulcissimum praebeant succum, non modo illa ma-
gna, sed etiam quae ibi nascuntur nostris fortasse non multo grandiore: cum etiam nostrates recentes mansa quadantenus
ori dulces sentiantur. Quod autem minores arundines in India radicibus dulces praebeant potus, superioribus carminibus
explicauit abunde Marcus Varro, cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino dissentit, cui arundines, quarum
meminit, vastissima sunt proceritatis. Hinc ergo eorum sententia explodenda videtur, qui credunt ex illarum magnarum
arundinum radicibus, saccharum nostro similis factitasse Indos, quod non quidem saccharum, sed dulces inde potus vini
loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulcret Manardus Ferrariensis, utque lucidius comprobaret an-
tiquorum saccharum, perinde ac mannam, ex rore fieri, libro 9. epist. 5. Auicennam etiam admittit, quem tamen alias v-
bique reiecit, ac reprobauit, asserens, quod cum ipse huius fuerit sententia, ultimo capite libri secundi, antiquorum saccha-
rum mannam vocauit, cum inquit: Zuccharum alhusar est manna cadens super alhusar, & est sicut frusta salis. At nos, qui
huic opinioni minimè adstipulamur, dicimus Alhusar, siue Alhasser (ut Bellunensis castigauit) nullo pacto Arabica lingua
arundinem significare, sed aliam Aegypti, & Arabia arborem, sic ab eius loci indigenis appellatam: quandoquidem Arabes
(ut testatur Serapio) arundinem Casab dicunt. Quod manifestè declarat zuccharum alhasser apud Auicennam huiusce ar-
boris esse mannam, vel gummi, non autem Gracorum saccharum in calami concretum. Illud in super nostram comprobet
sententiam, quod eodem loco addidit Auicenna, sic inquit: Et in zuccharo quidem alhusar est cum abstersione pauca, sti-
pticitas, & amaritudo. Siquidem austeritatis, & amaritudinis, quae in antiquorum saccharo fuerint, nusquam meminere
Dioscorides, & Galenus: nec item quod conferret id pulmòni, & aqua intercuti, ut paulò infra voluit Auicenna. Qui etsi di-
xerit deinde zuccharum hoc oculorum morbus, pariterque renum, & vesica vitij auxiliari, non tamen ob hoc dici potest,
zuccharum alhasser esse antiquorum saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicenna testimonio (cum
& ipse hoc in loco Auicenna auctoritate nitatur) probari potest, quod antiquorum saccharum gummi modo collachrymatis in a-
rundinibus concreveret, non autem ex rore. Quippe quod is de zuccharo agens loco nuper citato, ibiq; antiquorum saccha-
rum recensens, inquit: Assumptum sicut gummi ab arundine abstergit oculum. Quibus palam fit, antiquorum saccharum
perinde ac gummi, ab interiori medulla exterius emanasse, ibique postmodum solis ardoribus concreuisse. Verum enimvero
quod Alhasser apud Arabes sui generis arbor sit, & ab arundine maximè differat, & quod eius zuccharum, quamuis ab Au-
cenna manna dicatur, quod fortasse granulis concreuat manna similibus, ex rore haud quaquam fiat, sed gummi modo
ab arbore desillet, manifestè ostendit Serapio capite de saccharo his verbis. Alhasser habet lata folia, & habet zuccha-
rum, quod egreditur ab oculis ramorum suorum, & à locis foliorum eius, & colligunt de eo homines rem conuenientem &
in zuccharo eius est amaritudo, & egrediuntur ab hac planta mala quadam, sicut testiculi camelorum, è quibus liquor
quidam emanat adurens, stipticèq; facultatis, ad cauteria peridoneus. Et lignum quidem Alhasser est leue, crassum, rectum
pulchrumq;: & ideo assimilauerint cantilenarij in cantilenis suis, brachia & crura dominarum ligno eius: hac Serapio. Ex
quibus facile & Manardum & Fuchsum, viros alioqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Ceteram Fuchsius,
ut probaret antiquorum saccharum è rosido cali succo in calami concretere, utq; illud à nostrate diuersum ostenderet, di-
cit, quod cum nostri vsus saccharum, perinde ac mel calidum reperitur, sitimque facile concitet, antiquorum saccharum
esse non potest, eo quod Galenus sua aetate saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pace sua dixerim)
experimento minimè responderet: à quo non discedens Galenus libro 7. simplicium medicamentorum de saccharo ita scribit:
Sacchar, quod ex India, atq; felici Arabia conuehitur, in calami, ut aiunt, corefuit, & ipsum mellis est species: minus certò
nostrate dulce, sed ad similes ei vires obtinens, & ad abstergendum desiccandum & digerendum atinet. Porro quatenus nec inimicum
stomacho est, ceu nostras, nec sitim afferens, eatens ab illo substituta differt. Quibus Galeni verbis clarè est, quod cum saccha-
rum melle minus sit dulce, minus etiam calidum sit necesse est. Eaq; propter asserit Gale. saccharum non perinde ac mel, sti-
tim excitare: non tamen quod nulla ab eo sitis exciteretur, uti Fuchsius interpretari videtur. Quin etiam idem Galenus libro
8. cap. 4. methodi medendi, saccharum inter ea connumerat, quae febrientibus exhiberi possunt. His igitur rationibus, &
auctoritatibus adductus sum, ut certò crediderim, antiquorum saccharum ab hisdem arundinibus emanare, à quibus vul-
gare nostrum exprimitur: sed hanc tantum inter se differentiam esse, quod à natura factum, sit nostrate factitio longe tenu-
ius: Ideoque Auicenna: Zuccharum (inquit) Tabarzed frigidius est, & subtilius. Hoc laudibus extulit Paulus, & post ipsum
Auicenna, Archigenis auctoritate Sal Indum ipsum appellans, ad linguae scabritiem, ariditatemque in acutissimis febrili-
bus. Sed eo nos hac aetate caremus, quod amplius non asseratur: quanquam ego non ita pridem à viris fide dignis accepi, qui
dini Thomae insulam, itemque Mederam lustrarunt, adhuc hinc in locis saccharum inueniri in arundinibus sacchariferis con-
cretum (illi non dissimile, quod arte fit, & candidum cognominatur) postquam ab illis sponte emanarit gummi modo.
Quod autem adferri desierit, non aliud in causa esse existimamus, quam quod hodie paucum admodum prouenit. Siquis
dem Dioscoridis, & Galeni tempore, quo ad eos copiosum conuebeatur, cum adhuc non innotuisset exprimendi ratio, ne-
cesse quidem erat, ut arundines sacchari liquore praegnantes, cum annis compluribus adoleuissent, & falcem nunquam ex-
perta essent, per se liquorem exudarent, veluti innumeris arboribus gummi, & resina emanant. Proinde non mirum, si
à natura facti antiquis fuerit vbertas. Sed postquam lucri dulcedo, fulgentisq; auri sitis docuit homines artem modum,
quo saccharum concisis, decoctis, pressisque arundinibus copiosius elicerent, factum est, ut Indi quotannis vniuersos incedo-
rint calamos, ac iterum quotannis feuerint. Hinc igitur euenit, ut nullis remanentibus, quae saccharo plurimum annorum
aetate turgent, natura impedita sit operatio, deperditumque hac de causa sit antiquorum saccharum. Cuius vice eo recu-
tiores videntur, quod officina candidum cognominant, arte factum, pellucidum, salis fossitij modo, dentibusq; fragile, ut an-
tiquorum saccharum vnde quaque referat. Competit perinde ac illud, scabritiei linguae, pectorisq; asperitatis. Verum ad

Manardi ra-
tio infirma.

Alhasser quid
ex Serapione.

Fuch. opinio
reprobata.

Sal Indum.

has id præstantius est, quod in sicilibus, vbi violaceum tulapium asseruatur, astate concreuit: eo quod violarum diluti facilitate humectet, leniatque magis. Caterum qui plura de saccharo legere desiderant, qua sententiam nostram longè magis probent, videant in Epistolarum nostrarum volumine epistolam ad Iacobum Bosellum scriptam, ibi enim plura quàm hic a nobis comprobata inueniet. Quod Græcis μέλι, Latinis Mel appellatur: Arabibus, Hael: seu Hassel: Italis, Mele: Germanis, Miel: Hispanis, Miel: Gallis, Myel. Quod autem Græcè: σάκχαρον, Latine quoque Saccharum dicitur. Arabicè, Zuchar: Indica, Zucchero: Germanicè, Zucker: Hispanicè, Azucar: Gallice, Sucree.

Κερός.

C E R A.

C A P. L X X V I.

Cera optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitum quadantenus melleum referens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida hoc modo. Ex ea radunt album, syncerumque, atque transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto petitz, insperfoque nitri momento, decoquant: cumque iterum, tertioque inferbuit, separatum vas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, siqua fortè adhæsit: tum denuo indita noua maris aqua teruct, vti retulimus: & vase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram suspensa manu intingunt, quò celerius concrefcet, & quàm minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immiti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino confuti, interuacante spatio suspenduntur, & interdiu continuò sub sole, non sub luna asperguntur, vsque dum perfectè albescant. Verùm si eximius ille candor desideretur, eadem scitari, & identidem recoqui opera pretium est. Nec desunt qui pro marina, in muria quàm acerrima fœmel, aut iterum excoquant, dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente extrahunt: postea orbiculos substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec candorem summum contraxerint. Præcipiunt hoc ob eundem munus vere, cum sol remissa vehementia humorem pariat, vt non facilè liquetur. Cera omnis molli, calfacit, modicè explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Cera, vt Galenus scriptis mandauit libro 7. simplicium medicamentorum, mediū quodammodo tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium, & desiccantium. Habet verò quiddam etiam crassarum partium, atque emplasti- Cera vires ex Gal.
cum, quamobrem non modò exiccare, sed & per accidens humectare videri fortassis poterit, perspirationes videlicet prohibens. Quapropter aliorum medicamentorum tum excalfacientium, tum refrigerantium materia est. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium: nec tamen intrò in corpus assumpta, sed foris imposita. Siquidem paulum quiddam digerentis, calidaque facultatis retinet, qua plurima melli inerat. Eius nomen Græcum κηρός: Latinum, Cera: Arabi- Nomina.
cum, Hamaha. Italicum, Cera: Germanicum, Wachz: Hispanicum, Ciera: Gallicum, Cire.

Πρόπολις.

P R O P O L I S.

C A P. L X X V I I.

Propolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in vehementi ariditate mollis & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit: in vetere tussi suffra proficit, impetigines admota tollit. Ea in alueariorum foribus, cerosæ naturæ inuenitur.

Ori. leg. 5. 6.
πανος πρέσ-
σαν. i. sty-
racem spiras.
Propolis cõ-
sideratio.

Quanquam, vt hic Dioscorides inquit, & Marcus Varro li. tertio de re rustica, Propolis ea est cerosa materia, qua in aluearijs præ foribus reperitur, seu, vt apertius dicam, præ spiraculis, vbi intrandi, exeundi que apibus patet aditus: tam Plinius lib. II. cap. 7. ita scriptum reliquit: Prima fundamenta comosin vocant periti, secunda pissoceron, tertia propolis. Inter coria, cerasque magni ad medicamina vsus. Comosis crusta est prima, saporis amari. Pissoceros super eam venit picantium modo, seu dilutior. Cera initium, plerunque è mitiore gummi. Propolis crassioris iam materia, additis floribus, nondum tamen cera, sed fauorum stabilimentum, qua omnes frigoris, aut iniuriæ aditus obstruuntur: odore & ipsa etiam Propolis vires ex Gal.
nam graui, vt qua plerique pro galbano vtantur. Huius etiam meminit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Propolis extergentis, non ita valentis est facultatis, caterum admodum valenter attrahentis: est enim essentia tenuis. Porro excalfacit recessu secundo completo, aut certè tertio incipiente. Et vt idem quoque scribit libro 3. de compositione medicamentorum secundum genera: Propolis valentius attrahit, quàm cuiusvis generis resina. Quamobrem illis in neruorum vulneribus medendis propolin admiscet. Caterum cum propolis, cera, & mel, de quibus hic disseruit Dioscorides, medicamenta sint omnia mire artificio ab apibus conflata, non ab re his quoque addendam fore duximus Apum historiam. APES igitur (vt Plinius auctor est) sunt & rustica syluestresque, horrida aspectu, multò iracundiores, sed opere ac labore Apum confi-
deratio.
prestantes. Sunt & vrba, quarum duo genera. Optima breues variaque, & in rotunditatem compactiles. Deteriores longæ, & quibus similitudo vesparum, etiamnum deterrima ex ijs pilosæ. Apes odere fœdos odores, proculque fugiunt, sed & insectos. Itaque vnguenta redolentes infestant. Icientes pereunt: relicto enim aculeo interiora dirumpunt. Quin & morbos suapte natura sentiunt. Index eorum tristitia torpens: & cum ante fores in teporem solis promotus alia cibos ministrant: cum defunctas progerunt, funerantiumque more comitantur exequias. Reges habent, pluresque inchoantur, ne Apum rex, &
regimen.
desint. Postea ex his soboles cum adulta esse cœpit, concordis suffragio deterrimos necant, ne distrahant agmina. Duo eorum genera: melior rufus, quàm niger, variusque. Omnibus forma semper egregia, & duplo quàm cateris maior: penna breuior, crura recta, ingressus celsior: in fronte macula quodam diademate candicans. Multum etiam nitore à vulgo differunt. Cùm rex procedit, vnà est totum examen, circaque eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur. Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhortanti, solus immunis. Circa eum satellites quidam, lictoresque assidui custodes auctoritatis. Procedit foras non nisi migraturo examine. Id multò intelligitur antè aliquot diebus murmure intus strepente, apparatus indice diem tempestiuum eligentium. Si quis alam ei detruncet, non fugiet examen. Cùm processere, se queque proximam illi cupit esse, & in officio conspici gaudet. Fessum humeris subleuant: validius fatigatum

ex toto portant. Si quæ lassatus deficit, aut fortè aberravit, odore prosequuntur. Vbiunque ille confedit, ibi cunctarum castra sunt. Duce prehensio totum tenetur agmen: amisso dilabitur, migrantque ad alios. Esse vtrique sine rege non possunt. Inuita autem intermunt eos, cum plures fuerit, potiusque nascentium domos diruunt. Rege consumpto, marces plebs, ignavo dolore: non cibos conuehant, non procedunt, sed tristi tantum murmure glomerantur circa corpus eius. Subtrahitur itaque deducta multitudine: alias spectantem exanimem luctum non minuunt. Tunc quoque ni subueniatur, fame moriuntur. Gaudent Apes æris plausu, ac tinnitu, amantissimumque locum, & fragrantibus herbis. Harum ergo causa prope alacra oportet serere thymum, adiastrum, rosam, violas, liliū, cytisum, fabam, eruium, cunilam, papauer, conyzam, castam, melilotum, melissophyllum (malim legere myriophyllum) cerinthen. Est autem cerinthe folio candido, incuruo, cubitali, capite concauo, mellis succum habente. Horum florum auidissima sunt, atque etiam sinapis, quod miremur, cum oliuae flores ab his non attingi constet. Ideoque hanc arborem procul esse melius est, cum aliquas quam proximè seri conueniat: quæ & euolantium examina inuitent, nec longius abire patiantur. Cornum quoque arborem cauere oportet: nam flore eius degustato (et si is nobis profluua sistat) aluo concita moriuntur. Remedium sorba confusa è melle præbere hys, vel yrinam hominum, vel bouum, aut grana punici mali amineo vino conspersa. Amant & genistas circumseri aluearibus, hysque gratissimum. Mira apum prudentia, earumque operis obseruatio, vt annotauit Aristomachus Solensis, quem admirabili admodum diligentia duodesexaginta annis, apum amore captum, nihil aliud egisse tradunt. Ratio autem operis ita se habet. Interdiu statio ad portas more castrorum: noctu quies in matutinum, donec vna excitet omnes gemino aut triplici bombo, ut buccino aliquo. Tunc vniuersa prouolant, si dies mitis futurus est. Prædiuant enim ventos, imbresque, & tunc se continent tectis. Itaque temperie cali (hanc enim inter præscita habent) cum agmen ad opera processit, alia flores aggerunt pedibus, alia aquam ore, guttasque lanugine totius corporis, quibus est. Quarum adolescentiores ad operam exeunt, & supra dicta conuehant: seniores intus operantur. Quæ flores transportant, prioribus pedibus semina onerant, propter id natura scabra, pedes priores rostro, totaque onusta remeant sarcina pandata. Excipiunt eas terna aut quaterna, atque exonerant. Sunt enim intus quoque officia diuisa: alia struunt, alia poliunt, alia suggerunt, alia cibum comparant ex eo, quod allatum est. Neque enim separatim vescuntur, ne inæqualitas operis, & cibi fiat, & temporis. Struunt orsa ea concameratione aluei, textumque vel vsque ad summa tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, vt alijs intrent, alijs exeant. Fauis superiore parte affixi, & paululum etiam lateribus simul hærent, & pendent vna. Alueum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter poscit alueus, aliquando & duorum generum, cum duo examina concordibus populis dissimiles habere ritus. Ruentes ceras fulciunt, pilarum intergerinis à solo fornicatis, ne desit aditus ad sarcinandum. Primi ferè tres versus inanes struuntur, ne promptum sit quod inuitet furantem. Nouissimi maximè implentur melle: ideoque auerso alueo fauis exmuntur. Gerula secundos flatu captant. Si cooriatur procella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. Quidam in humeros eum imponi tradunt. Iuxta verò terram volant in aduerso flatu vepribus hebetato. Mira obseruatio operis. Cessantium inertiam notant, castigant, mox & puniunt morte. Mira munditia. Amoluntur omnia è medio, nullaque inter opera spurcicia iacent. Quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant, vnum congesta in locum, turbidum diebus, & operis ocio egerunt. Cum aduesperascit in alueo strepunt minus, ac minus, donec vna circumuolet, eodem quo excitauit bombo, ceu quietem capere imperans, & hoc castrorum more, tunc repente omnes conticescunt. Caterum (vt Pausanias testatur) Himmetus mons pastiones habet apibus omnibus aptissimas, quæque solis cedunt Halisonum pascuis. Apud Halisones certè adeò mansuetæ sunt apes, vt cum hominibus vna pabulatum exeant, ac liberè vagentur, quippe quæ aluearibus nullis contineantur. Passim verò opus faciunt, illudque ita concretum, vt mel à cera nequeas seiungere. Fit præterea Mel sine fauo, vt Aristoteles est autor lib. quinto cap. vigesimo secundo, vbi sic habet: Ad Anisum urbem conuehitur à locis superioribus mel candidum, crassumque maiorem in modum, quod apes faciunt arboribus sine fauo, quale etiam fieri in Ponto cognitum est. Sunt etiam apes, quæ fauos sub terra triplici ordine faciunt, in quibus mel est, vermis nullus: sed nec fauis omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes confingunt. Si fortè fortuna apum vniuersum deperderetur genus, facile reparari posset ex bienni vitulo, vt lib. 4. Georgicorum clare docuit Virgilius, ita canens.

Apum reparatio ex vitulo.

Exiguus primùm, atque ipsos contractus ad vsus
Eligitur locus: hunc angustiq; imbrice tecti,
Parietibusque premunt arctis, & quatuor addunt
Quatuor à ventis obliqua luce fenestras.
Tum vitulus bima curuans iam cornua fronte
Quæritur: huic gemina nares, & spiritus oris
Multa reluctanti obstruitur: plagisque perempto
Tunsa per integram soluuntur viscera pellem.
Sic positum in clauso linquunt: & ramea costis
Subiiciunt fragmenta, thymum, castiasque videntes.
Hoc geritur zephyris primùm impellentibus vndas,
Antè nouis rubeant quàm prata coloribus, antè
Garrula quàm tignis nidum suspendat hirundo.
Interea teneris tepesactus in ossibus humor
Aestuat: & visenda modis animalia miris,
Trunca pedum primò, mox & stridentia pinnis
Miscentur: tenuemque magis, magis æra carpunt:
Donec, vt astiuus effusus nubibus imber,
Erupte: aut vt neruo pulsante sagitta,
Prima leues ineunt si quando prælia Parthi.

Nomina.

De reparatione Apum hætenus Virgilius. Caterum etiam apes in medicina usum habent: siquidem sicca & in puluerem contrita, hys admista, quæ ad id faciunt, ex oleo, & cera inunctis alopecij capillum restituit. Πρόπολις vt Grecis, ita etiam Latinis Propolis appellatur: Arabibus, Mum, vel Isafach alcut: Italis, Propoli: Germanis Borsstos: Hispanis, Bortum de colmena. Gallis, Cire vierge.

Τριπέρι.

TRITICVM.



CAP. LXXVIII.

Optima è tritici generibus ad secundæ valetudinis vsus habentur, quæ recentia, & iam perfectè adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt: canum moribus profunt, mansa & imposita. Confectus eorum simillagine panis, plus alit, quàm cibarius. E trimestrium farina panis, leuiorem cibum præbet, & qui faciliè in membra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Greci rheumatismos vocant: item contra interaneorum inflationes: lérigines ex aceto mulso tollit. Fures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: viperarum ictibus auxiliantur: & torminosos profunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahendique vim habet: a priuatim callos pedum, claudiosque extenuat: & cætera tubercula furunculosque ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina contra venenatos ictus cum aceto, aut vino commodissimè illinitur: eadem si decocta in glutini modum deligantur, cruentis excreationibus proderit: contra tussim, & exasperatas arterias, cū mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discuti inflammationem. Panis & crudus, & coctus cum aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigeret: sed herbis, succisve huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum ex simillagine, & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius, ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

a Omnia ex
ιδίως τὰ ἐν
πέλασσι λε-
πίλι ἐν κεί-
τὰ ἄλλα φύ-
ματα. i. pri-
uatim ea, quæ
in plantis pe-
dum, & alia
tubercula at-
tenuat.

I. TRITICVM.

II. TRITICVM HYBER-
num aristis carens.



Tritici genera (vt Theophrastus auctor est libro 8. cap. 4. de plantarum historia) plura notantur, cognomina ex locis sortita, vt Aphricum, Ponticum, Thracium, Assyrium, Aegyptium, Siculum: quæ & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differunt. Quadam vel aliunde cognomina sortiuntur pro suis viribus, tum alijs, tum vel maxime quæ ad cibum pertineant, vt cachrydias, stlengys, alexandrinus, quorum omnium differentias in supradiçtis colligere licet. Nec verò ab re fuerit, si illa quoque pro differentijs capies: & aliud praxox, aliud serum: & aliud auctu amplum multumque reddens, aliud ieiunum quoddam parumque ferens: & aliud spicam grandiore effundens, aliud paruam: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptū breui absolui, vt Aphricū: & aliud culmo tenui constans, aliud crasso, quod etiā ipsū Aphrico datum est: crasso tamē, & cachrydias dictum consistit. Item aliud tunicū paucis aliud multis vestitur, vt Thraciū: & aliud vnicalamū, aliud multicalamū, & magis minusq;. Adde etiā si quid aliud his, aut prædictis, ratione viriū proximū est: eiusmodi namq; differentia naturaliores profecio appareāt. Quilicū & trimestriū annumerari genus par est, & bimestriū, & si quid intra pauciores dies valeat consummari, vt in Eubœa genus quoddam intra quadraginta dies crassari, perficique posse affirmant: idemque firmum esse, ac ponderosum, nec trimestris modo leue. Quamobrem famulis id præberi inquiunt: etenim nec multum in hoc surfuris esse volunt. Igitur genus id celerrimum quidem ad consummationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria verò quadam habentur, quæ ex Sicilia & in Achaiam aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumque fecunda habentur: quanquam cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud Caristum. Trimestria verò permulta, & vbiq; habentur: leuia hæc, & parum fecunda, vnicalama sunt, atque in to-

Tritici gene-
ra ex Theo-
phrasto.

tum infirma. Leuissimum igitur triticum, quo ad simplici ratione agere licet, Ponticum est: ponderosius ex iis, quae in Graeciam aduehi solent, Siculum datur: sed eo ponderosius, quod Bœotia fert. Indicum asserunt, quod athleta, qui Bœotiae ternos semisextarios vix possint consumere, cum fuerint Athenis, facile quina consumunt. Leue satis & quod in Laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris caeloq, intelligi debet. Nam & Asia ultra Bactra quodam in loco adeo grande frumentum fieri tradunt, vt nucleis oliuae sua equiparent magnitudine grana singula. In Pessoris autem dictis adeo firmam nasci affirmant, vt si quis plus comederit, distumpatur necesse sit. Haec de tritici generibus Theophrastus. Ceterum Plinius Italicam nostrum omnibus praetulit lib. 18. cap. 7. his verbis: Tritici genera plura, quae fecere gentes. Italicum nullum quidem comparauerim candore, ac pondere, quo maxime decernitur. Montanus modo comparatur Italiae agris externum. Haec fuit sententia Alexandro magno regnante, cum clarissima fuit Graecia, atq, in toto terrarum orbe potentissima: ita tamen, vt ante mortem eius anni fere centum quadraginta quinque Sophocles poeta in fabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudauerit: ad verbum translata sententia:

Et fortunatam Italiam frumento canere candido.

Qua laus peculiaris hodie Italicum est. Quo magis admiror, posteros Graecorum nullam mentionem huius fecisse frumentum haec Plinius. Nec sane mirum videri debet, quod Graecus ille Sophocles Italicum frumentum ceteris praetulerit, quae quidem natura Italicum adeo praeceteris adamauit, & moribus, ac legibus, omnique ornatu ad politice (vt ita dicam) viuendum instituit, vt merito etiam frumentum omnium praestantissimum in eorum alimentum procrearet. quemadmodum & alia multa, quibus Italia plerasque superat gentes. Triticum omne radicibus numerosis, ac pratensibus nititur, folio vno, geminibus omnino multis, sed quae in ramos brachiari non possint. Tot a hyeme herbaceum est: remollito autem caelo, caliculus de medio assurgit, cuius tertio, aut 4. geniculo, spica geritur, non prius euidens, quam folliculo inclusa. Consumpto eo, sterumpit, quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus perdurat: post flore granum crassescit, maturaturque intra quadragessimam diem, quanquam etiam citius in calidiori tractu. Seritur vbiq, locorum. Locis autem maritimus & tractu amaniore calidiorq, fragilius ac copiosius prouenit. In aliquibus Italia locis, ac praesertim in agro nostro Senensi, mari-

Triticum Italicum.

Triticum spicis viginti-quatuor.

III. TRITICVM MULTIPlici Spica.



Tritici electio, & panis optimi conficiendi ratio.



Panis quis optimus Gal.

Oleum & Tritico.

mis locis planta vna visa est 24. fere spicas, tantaque reperitur ibi solis vbertas, vt quandoque modius vnius centum asserre sit visus. Quare recte ita de eo scripsit Plinius: Tritico nihil est fertilius: hoc ei natura tribuit, quoniam eo maxime alat hominem, vt pote cum e modio, si sit aptam solum, quale in Bizacio Africa campo, centeni quinquageni modij reddant. Misit ex eo loco Diuo Augusto procurator eius ex vno grano (vix credibile dictu) quadringenta, pauci minus, germina. Misit & Neroni similiter, trecentas & quadraginta stipulas ex vno grano: cum centesimo quidem & Leontini Siciliae campi fundunt, alijsq, & tota Batica, & in primis Aegyptus. Triticum omne folio exit arundinaceo, angustius tamen quam hordeum, culmus quoque lauius, nec perinde fragile. Notatur & in spicis differentia. Siquidem alia sine aristis, conseruati proueniunt: vt in vniuersa visitur Bohemia: alia, vero longa, asperisque rigent aristis, quod quidem genus altero melius est, & fecundius. Triticum autem, ex quo omnium optimus fit panis, eligi debet fractu contumax, densum, graue, colore aureum, lucidum, laue, trium mensium, maturum, mundum, pinguique terra ortum. Nam plerumque euenit (teste etiam Galeno libro primo de alimentorum facultatibus) vt quod furtu flauum densumque apparet triticum, intus rarum, laxum, albumque conspiciatur, quod vtique plurimum fursuris habet. Quo fit, vt panes fursuracei inde confecti infirmum non modo praebeant alimentum, verum etiam ventriculum ipsum excrementis replent. Farina porro ea ceteris praestat, quae non ad summum molita, non noua, non longi temporis, & crebris fursuris fuerit. Nam quae superflue molitur, fursuraceos facit panes: & quae recentior est, adscititiam mole caliditatem retinet: quae vero iam diu molita fuit, puluere, situ, carie, aut viroso aliquo odore labefactatur. Haec deinde, dum fit panis, optima est associanda aqua, eaque subigenda, quae fluxerit e laudatissimis fontibus, pellucida sit, non palustris, neque ce-

num aut limum redoleat. Quinetiam fermentum admiscendum fuerit triticeum, non antiquum, mediocri quantitate, ne inde ipsius abundantia panis acorem contrahat. Inijciendum est & salis albi parum, vt panis sapidiore efficiatur. Post hoc farina ita subacta, optime manibus pinsitur: mox massa illa in panes mediocri magnitudinis digeritur, qui postquam abunde creuerint, & fermentati fuerint, in clibanum prius aequaliter calefactum, dein a cineribus, & prunis expurgatum decoquendi inmittuntur. Sed furnus iusta capacitatis sit oportet, ita vt quantitati panis proportionem respondeat. Quippe quemadmodum modica panum quantitas, in amplum clibanum missa, exiccatur, ac comburitur: ita & magna in angustis simul comprimitur, & decoqui nequit. Quamobrem panes (dicebat Galenus citato loco) ad concoctionem probatissimi sunt, qui plurimum fermentati, & probe elaborati in clibano igne moderato percoquuntur. Nam profusior ignis primo statim occurso adurens, exteriorem superficiem in testa modum indurat, crudis incoctisq, remanentibus interioribus partibus. Vnde accidit, panem hunc visu iniucundum fieri, & duplici nomine prauum, quod interne crudus sit, atque illaboratus: externe vero siccus, & praessatus. Qui autem longiore spatio vndique aquabiliter praessatur, hic & probe in uentriculo concoquitur, atque ad actiones, quae concoctionem consequuntur, accommodatissimus redditur. Triticum in agris facile degenerat in lolium: praesertim cum annus pluuuus frigidusque aduenerit, vt in lolij mentione latius dicemus. Fit et tritici granis inter ferri laminae igne calfacti compressis oleum, quod ad vlcerum sinus commendant. Sunt etiam nunc, qui eo vincto

IV. FRUMENTVM INDICVM. FRUMENTI INDICI SPICA.



ad pedum, & manuum rimas quas frigus excitauerit: item ad asperam cutim laeuigandam. Meminit tritici Galenus lib. 8. Tritici vires
 simpl. med. sic inquit: Triticum vt medicamentum foris impositum, primi est ordinis excalfacientium: non tamen nec ex Gal.
 resicere, nec refrigerare manifestò potest: habet verò etiam quiddam viscosum, & obstruens. Porro quod ex eo conficitur
 anulum, eorum frigidius est, tum siccus. Quod verò ex pane sit cataplasma, vim habet magis digerentem, quam quòd ex
 tritico: nimiram cum & salem, & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum vim habeat attrahendi,
 digerendiq; e.a. qua in alto resident. Et primo de facultate alimentorum: In cibum assumptum (inquit) agra concoquitur,
 suum excusat, laborem ventriculo infert, & caput vaporibus tentat. Potest inter Tritici genera quoque recenteri illud fru-
 menti genus, quod quidam perperam Turcicum appellant. Perperam, inquam, quòd INDICVM, non Turcicum, voca-
 ri debeat. Nam ex occident alibus Indiis primò allatum est, non ex Turcia, & Asia, vt credidit Fuchsius. Huius quatuor vi-
 dum genera, colore tantum cum granorum, tum spicarum differentia. Namq; & rufescentibus semiuibus, & nigrican-
 tibus, & crocancibus, & subalbicantibus Indicum frumentum habetur. Calamum edit arundinaceum, quemadmodum
 & solia, crassum, rotundum, procerum, geniculatum, & alba sarctum medulla, Sacchariferarum Arundinum modo, in
 cum summitate paniculas fundit diuulsas, spicis pluribus inde emergentibus, mutilis tamen, & granis vacuis, nunc luteo,
 nunc candido, nunc purpureo colore, prout frugifera spica colorata sunt. Fructus, in quo grana vaginis foliaceis concludun-
 tur, in ipso caule è lateribus prodeunt. Horum spica picea arboris conum tum longitudine, tum crassitudine aequat, circa
 quã tota omnino nuda coaceruantur grana, penitissimè sese stipantia, laeua, ac subrotunda, pisi magnitudine, alba intus
 substantia, inq; pecto aut decè versus, rectis lineis ordine digesta. E vaginarũ fastigio capillacea coma dependet, eo ipso colore,
 quo grana habentur. Radicibus nititur multis, duris, ac peruosis, sed minimè crassis. Serunt Indi hoc semen, quod Malitz
 vocant, hoc modo. Descendunt in agrum aliquot simul, recta linea dispositi, aequaliterq; distantes, & deinde acuto palo ter-
 rã perforant dextra manu, & statim quatuor quinqueve grana sinistra manu in vnũquodq; foramen coniciunt, pede al-
 tero foramina occludentes, ne Psitaci semen depascantur: & ita seriatim passu suo distancias metientes, agrum totum se-
 mine replent retrocedentes. Verum anteaquam semen terra credant, biduo id aqua macerant, nec serunt, nisi prius terra
 pluuia maderit. Nascitur infra paucos dies, & quarto in India demetitur mense. Est etiam huiusce frumenti peculiare ge-
 nus, quod duobus tantum mensibus, & seritur, & demetitur. Quinetiam aliud, quod quadraginta tantum diebus à satio-
 ne maturefcit. Verum minutum est & infirmius, nec aliam ob causam seritur, quam quòd vbi futura annonae caritatem
 verentur. Eius temperamentum nostro tritico simile esse creditur, aut paulò calidius, id quod indicare videtur panis ipsius
 candida. Farinam mittit candidã, è qua panes pinunt, crassiore tamen substantia, ac magis viscida, quam nostri, adeo vt
 eorũ alimentum crassius quoq; sit, & quod facile obstruere possit. Quo fit vt eiusmodi frumenti farina iis in cataplasmatibus
 sit utilis, quibus mouendi pus insit facultas. Id quod valentius etiam praestat fermentum ex eadem farina paratum. Ex ea
 quoq; rura alpinis tractibus pultem, quam suo idiomate vocant Polenta, conficiunt, & addito butyro, & caseo auidissimè
 vtunt. Est enim cibus non insuauis, sed crassum prabet alimentum. Nam suo lentore meatus obstruens, apostematibus
 manentibus peridonea existit. Caterum facit Indicum frumentũ, vt de Saraceno, quod id mihi in mentem renocauit, ali-
 quid differã. Hoc primũ ex Africa allatũ dicunt, & ideo ab Italis appellatur multis in locis Saracino, hoc est SARACE-
 NICVM, quanquã non desint, qui illud quoq; vocent Formentone, quasi vile frumentũ. Crescit id in primis folio subro-
 tundo, quod deinde tractu tẽporis hederaceum euadit, verũ acutius & mollius. Caulẽ edit fragile, rotundũ, in anũ, bicubitũ ale-
 re, saepe maiore, rubet, foliosumq;. Florẽ deinde fundit paruum, candidũ, racemosũ, è quo semẽ oritur triquetrũ, pullo colo-
 re, nigro exterius cortice, sed alba intus medulla. Seritur passim in aruis, perinde ac alia humetacea Aprilis, & metitur Iu-
 lio mense

Triticum In-
dicum.

Indici tritici
historia.

Frumenti Sa-
racenici hi-
storia.

V. FRUMENTVM SARACENICVM.



Tragierros.

Nomina.

lio mense in calidioribus locis, adeo ut ibi bis in anno, in eodem agro proueniat: nempe vere & post messem, id quod in pluri-
 bus fit Italia locis. Itaque bisferum est, calefacit & humectat,
 verum non multum a temperatis distat. Farina ex lacte de-
 cocta prestat illis ad biliosas inflammationes. Rustici ex eius
 farina non solum panes conficiunt, sed pulmenta, quibus hye-
 me victitant. Piusunt quoque idem in pila, & ex utriusque
 rum putaminibus prisanam inde conficiunt, qua nonnulli
 vescuntur è carni iure decocta, est enim cibus non ingra-
 tus, si recte coquatur, nec adeo, ut grana dissiliant in pulcem,
 sed integra permaneant. Rustici, qui circa Italia, & Germa-
 nia fines degunt, pultem, quam vulgari idiomate appellant
 Polenta, conficiunt, & deinde forti stamine massam in tenuis-
 ac latas portiones secant, & caseo, & butyro subinde confra-
 sas in cibum sumunt. Est enim (ut ego quoque testari possum)
 non ingratus, nec ventriculum grauat, perinde ac pulsilla,
 quæ è milij farina paratur à sylvanis. Quanquam autem
 flatu expers non est, haud tamen adeo inflat, ut fabam, &
 faba, atque pisum. Hallucinantur profecto, qui putant hoc
 frumenti genus illud esse pabulum, iumentis purgandum aptis-
 simum, quod antiqui ocymum vocauerunt. Quo fit ut Tragum
 manifestò fuerit deceptus, non solum quod in hoc versetur er-
 rore, sed etiam quod huic frumento omnes tribuerit vires, quæ
 ocymo odorato tribuunt auctores: quod quidem non parùm riden-
 dum videtur, usque præsertim, qui rei plantaria excolenda in-
 uigilant. Triticum sic Latine dicitur: $\tau\rho\rho\iota\varsigma$ Græcè: Henta,
 Henca, siue Hantha, Arabicè. Grano, siue Formento, Italianè:
 Korn, siue Weizen, Germanicè: Trigo, Hispanicè: For-
 ment, Gallicè. Frumentum Indicum, Indus Mat: Italis, Gra-
 no, siue Formento Indiano: Germanis, Turcisch Korn,
 Bohemis, Turecken Zjto. Frumentum Saracenicum: Italis,
 Fermentone, & Saracino: Germanis, Heydentorn: Bohe-
 mis, Pohanka.

Posteaquam Dioscorides hoc libro secundo Animalia, à quibus non solum alimenta, sed & remedio-
 rum copia delumuntur, exposuisset, ad Cerealia seu fruges accedit. Cùm verò Frugum duo sint summa
 genera, Frumenta, ut Triticum, hordeum &c: & Legumina, ut Faba, Cicer &c. à frumētaceis orditur. Fru-
 mentacea autem sunt, quæcunq; geniculato culmo & harundinaceis constant foliis, semenque panificio
 & pultibus aptum, in spicis aut Iubis producunt, ceu triticum, hordeum, milium, panicum, & quotquot
 his similia existunt. Ast Frumenti duo etiam prima sunt genera, per tempora satus diuisa. Hyberna, quæ
 circa Vergiliarum occasum, seu Nouembrem sata terra, per hyemem nutriuntur, ut Triticum, Hordeum:
 Æstiuæ, quæ ante æstatem Vergiliarum exortu, circa Maium seruntur, ut milium, panicum. Verùm in
 Græcia & Asia omnia Vergiliarum occasu feri testis est Plinius: quædam autem utroque tempore in Ita-
 lia: ex his quædam & tertio, Veris scilicet: aliqui enim vernæ appellat, milium, panicum, siliginem. Sed ad
 Triticum accedamus. Etsi Triticum generaliter omne Frumentum, quod ex spicis tritum ac trituratione
 repurgatum est, significet, ut ex Varrone colligere est, posteriores tamen peculiari frumenti speciei Tri-
 tici nomen tribuunt. Cuius genera plura, quæ ex locis cognomina sortita sunt, Theophrastus 8. hist. 4. &
 ex eo Plinius lib. 18. ca. 7. recensuere: nunc verò septem præcipuè species habentur, de quibus in vniuer-
 sali nostra historia: est namque aliud, cuius spicæ aristis carent: hocque vel hybernum, vel æstiuum: aliud
 longioribus aristis armatum, hocque vel multiplici spicæ, vel simplici: hoc rursus quatuor generum in
 nostro phytopinace fecimus, qui tamen primum & secundum genus aristis donatū idem censuerit, cum
 eo non contenderimus: quo loci etiam Triticū amyliæum malè irrepsit. Sic & granis color alius candidus,
 alius subruffus: alia rotundiora, alia oblongiora: grandiora quoq; & tenuiora. I. Triticum longioribus
 aristis C. B. Triticum, Matth. Lac. Lugd. Triticum tertium, Trag. Lon. Fuch. Tiphæ Dodonæi & Fuchsi.
 Lugd. Typha Cerealis, Dod. gal. Triticum Romanum Trag. Dod. fol. quod Tritico Typhino non dissi-
 mile dicit: quare qui Triticum hoc cum Typhino Dodonæi & Tritico aristis circumuallato Lobelidem
 contenderit, cum eo non disputarim. II. Triticum hybernum aristis carens C. B. Triticum, Brunf.
 Dod. gal. & fol. Cord. hist. Ges. hor. Tab. Tritici primum genus, Trag. Fuch. Lon. Triticum spicæ muticæ
 Lugd. Siligo spicæ muticæ, Lob. Triticum aristis carens, Cæsalp. III. Triticum multiplici spicæ C. B.
 & Lob. Tritici quinta species, Anguill. Triticum spicæ ramosa, Cæsalp. Triticum Typhinum multiplici
 spicæ, Taber. IV. Panicum Indicum (quia primum ex India allatum) maius C. B. Turcicum Frumen-
 tum, Trag. Fuch. Dod. fol. Ges. hor. Tab. cui & Asiaticum: Triticum Bactrianum siue Indicum, Cord. hist.
 Ges. hor. Frumentum Indicum, Matth. Lonic. cui & Turcicum: Milium Indicum, Lac. Milium Indicum
 Plinianum vel Mais occidentalium, Lob. Maiz Indorum, Cæsalp. Cam. Distinxit Plinius lib. 18. ca. 17. co-
 lore candido, nigro, ruffo, etiam purpureo: variat namque floris colore qui modò purpureus, modo re-
 ber, modo luteus, aliquando pro ratione fructus futuri. V. Frumentum Saracenicum, quia ex Afri-
 ca primum semen allatum, cuius Theophrastus inter frumentacea nomine Erysimi alterius, meminisse
 videtur, C. B. Ocymum veterum, Trag. Ocymum Varronis, Anguill. Frumentum Saracenicum, Matth.
 Cast. Lugd. Tragotrophon Fago triticum, Dod. gal. Fegopyron, Dod. fol. Frumenti genus folio hederæ-
 ceo, Cord.

co. Cord. in Diosc. Frumentum Vaccinum, Lon. Erysimum Theoph. Lob. Ocymum Cereale, Clus. Pan. Tab. cxi & Tragopyrum: Formentone vulgò Cæfalpino.

Kedā.

HORDEVM.

CAP. LXXIX.

Hordeum est candidum, purumque, id minus, quam triticum alit. Ptisana tamen ob cremorem in decoctione redditum, plus alimenti præbet, quam polenta ex hordeo facta, contra acrimonias, atque gutturis scabritias, exulcerationesque pollet: quibus etiam triticea ptisana præsidio est: sed plus alit, magisque urinam mouet. Lac abunde suppeditat, si cum sceniculi semine decocta sorbeat. Hordeum abstergit, urinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in multa aqua cum fico, vt inflammationes, collectionesque discutiat: duritias b cum resina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latus ex-

4 Omnia exē.
Κριθὴ ἴαεί-
σθαι λευκὴ, &
καθάρσ. i.
Hordeum o-
ptimum est,
album &
mundum.
b Omnia exē.
μὲν πῖσος &
πῖσος i. cum
pice, & resi-
na.

HORDEVM.




cruciat: aduersus intestinorum inflationes cum lini semine, fæno græco, & ruta illini iuuat: strumas cū pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad cōcoctionē perducit: & cū myrto, aut vino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farinæ ex aqua, atque cum pice, & oleo decoctus, puri mouendo est, cum aceto subactus, idem & cum pice contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesque mitigat.

Non minus Hordeū in Italia vulgaris notitia est, quam triticum. Est autem (vt Theop. lib. 8. c. 4. de plant. hist. memoria prodidit) in hordei genere differentia, quippe quod aliud binis versibus, aliud ternis, quaternisque, cumque plurimū senis: est enim vel eiusmodi quoddam genus. Quod verò pluribus construitur versibus, hoc semper ferè spissius, postaque arctius constat. Magnam & Indicum differentiam facit: quandoquidem ramis natum sit brachiari, vt proposui. Et spica verò aliis grandiores, rarioreque constant: aliis minores, frequentioreque: & aliis distantiores à foliis, aliis proximiores, vt Achilleis cognomine. Et hordeorum ipsorum aliud rotundius, minusque, aliud oblongius, maiusque, atque in spica rarius. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod & farinam reddere copiosius creditur: & contra hyemem, & flatum, & in totum contra calis mutationes candido validius esse videtur: hætenus Theoph. Oritur & in Gallia hordeum, quod cantherinum dici putauerim, quia folliculo castratum enascitur. Galli qui serunt, mundum vocant hordeum, quod

Hordei consideratio.

ante granum glutina concidat, in reliquo autem non nisi agrè deglubitur. Hordeum magis quam triticum, rubiginem facit, minusque, soletat imbrium impetus. Siquidem infestis imbribus, aut vliqinoso locis, aut longiore pluuiâ dilutis satum in lolium degenerare affirmant. Exit Hordeum folio tritici latiore, asperioreque, quinetiam culmo fragiliore, ac minore, sed articulis geniculato, simplici in stipula, folio, & eo quidem scabro, latoque: grana simplici amiciuntur tunica, qua tamen solide inheret, e cuius acumine arista prodeunt firmiores, longiores, mordacioresque, quam in tritico. Nititur fibra a radice. Pinguissimo agro Hordeum committendum, quod eius satum facile macrescat solum, nec feri postulat, nisi soluta, siccaque terra. Præstat, quod candidissimum est, farctum, ponderosum, coctum facile, & quod situm non contrahit. Rursum enim, vt contra cæli tempestatem, & hyemem validius, sic medica vi infirmis. Hordei meminit Galenus lib. 7. simpl. Hordei facult. medic. vbi ita scriptum reliquit: Hordeum primi est ordinis in exiccando, & refrigerando: habet etiam paucillum abster- ex Gal. sionis. Paulo etiam plus desiccatur, quam farina fabacea, cui non insunt cortices: cetera verò similia sunt foris vtentibus. In cibo autem hoc fabis præstat, quod flatuosam naturam exuat: fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentia, quam hordeum, quam obrem eo plus etiam alunt. Porro quoniam vtrumque paulum à medio recepit, multo sunt vsui. Nam talia medicamenta multis aliis miscentur, ceu materia quadam: itaque etiam cera, & oleum, non paucis medicamentis coniunguntur. Albiton verò, hoc est polenta, multo plus hordeo desiccatur. Et primo de fac. alim. sic inquit: Hoc item semen in vsu frequenti apud homines est, quod non eandem cum tritico habet facultatem. Siquidem illud palam calfacit, hoc verò non modo non calfacit (quo modo nonnulla, qua in medio sunt calfacientium, & refrigerantium, vt amyllum, & elotus panis) sed quoquo modo ipso vtare, siue panes ex ipso feceris, siue ptisanam coxeris, siue polentam paraueris, vim quandam refrigerandi habere cernitur. Dissidet præterea succi specie à tritici natura hordeum: nam ex succis, quos vtrumque, semen gignere natum est, qui quidē è tritico in nobis prouerit, crassus & viscosus est, qui ab hordeo tenuis, ac nonnihil deterforius. Nulla igitur apparandi ratione hordeum vnquam calfacit: sed variè pro modo præparationis humectat, ac desiccatur. Etenim manifestè cernimus, polentam ex tosto hordeo factam siccare: ptisanam contra humectare, si quidem vt decet fuerit parata, hoc est, cum in coctione quam plurimum intumuerit, postea igne lento per multum otium in chylū fuerit redacta: hæc Galenus. Hordei cōbusti cinis, ambustus, & carnibus, qua recedat ab ossibus, vtiliter inspergitur. Hordei quoque farina ex aceto, & melle subacta, vtiliter illinuntur lentiginibus. Ceterum cum recentiores medici Gal. ptisanam non rite, & ad vāguam parare nouerint, eius vice integrū deglubitum hordeum accipiunt, & rarisser decoquunt, dum

altis



hæc enim, qua legitima referat zeam. Verum enimvero quod zea, Italica sit Spelta facile ex Dioscoride coniectari potest, quod scripserit duplicem esse zeam, quarum vna simplex, altera dicoccos appellatur, eo quod in geminis putaminibus grana bina gerat. Nam & Spelta apud Italos duum est generum: vna spicas profert simplicibus granorum versibus: altera vero in duplicibus constat. Zeam hanc quidam, vt Foroiulienses, Pirra farra vulgò appellant, quòd ex ipsius deglubitis granis farra modo halicam conficiant. Plinius præterea libro 18. ca. 8. zeam esse Italia in Campania maximè, & semen vocari ait. Id quod manifestè ostendit, cù zea fuerit copiosa fruges in Italia: facile in huc vsq; diem eius perdurare prouentù. Quòd cum ita esse certò credam, nil aliud antiquorum Zea esse potest, quàm Spelta nobis vocata. Hæc Hetrusci antiquos quadantenus fecerunt, appellant vulgò biada. Nam quemadmodum hoc nomen Semen, omnibus seminibus est commune: ita biada, qua idem est, quod seges, cunctis segetibus, & frugibus communiter aptari potest. Sunt & apud Insubres, qui Speltam, algam, quæ abicam vocent: quòd facile attestatur hanc esse zeam. Siquidem & veteres deglubitam zeam, halicam appellauerunt, Zea itaq; quam nos speltam vocamus, tritico haud absimili folio prouenit, tenuiore tamen culmo firmioreq; verum spica, a tritico differt, quòd plana sit, granis tantù vtrinq; è lateribus simplicibus versibus prodeuntibus, aristis longis, ac tenuibus. Durius sunt genera. Dicoccos, maius, firmiore, gradioreq; culmo, & spica grandiore prouenit, qua duabus siliquulis simul cunctis duo grana profert: alterum quòd minus est, minore tum culmo, tum spica spectatur, in qua grana singula, singulis includuntur putaminibus. Seritur vbiq; locorum in agris, cæterorum frumentaceorum modo. Tunditur vtraq; in pilam, donec glutinam exuat, & frangitur in particulas, prissana hordacea modo, vt suo loco inferius dicitur. Leues efficit panes, concocti faciles, haud ingrati gustus. Zea meminit Gal. lib. 6. simpl. med. sic inquit: Zea vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici, & hordei: itaque ex illis cognoscatur. Eius nomen Græcum Zeia, Latinum, Zea: Arabicum, Hair: Italicum, Spelta, Biada, & Pirra: Germanicum, Spels; & Peters Korn; Runkorn; & Dinkelkorn: Hispanicum, Spelta: Gallicum, Espeltra, & Espeautre.

Semen.
 Zea historia.
 Zea facula
 ex Gal.
 Nomina.

Zea duplex quidem Dioscoridi, his tamen addere possumus eam quam oryzam Germanicam Tragus vocauit: & eam quam Zeopyron (quod Zea & tritici naturam habeat) Dod. & Lob. nominant. Dux ad dicit icones. I. Zea prima & simplex Dioscor. quod simplicis sit grani, an Typha apud Gal. C. B. Spelta prima quoad iconem, secunda quoad descriptionem, Trag. Frumentum loculare, Ruell. Briza, Dod. gal. Lugd. Briza monococcos, Lob. Monococcon & Frumétum barbarum, Dod. fol. Zea alterù genus Fuch. Zea, Matth. Lac. Cast. Zea simplex, Cord. in Diosc. Zea monococcos, Tab. Spelta vulgo, Cæsal. II. Zea altera quæ dicitur Dioscor. eò quòd in geminis putaminibus grana bina iuncta habeat. C. B. Zea, Brunf. Cord. in Diosc. Lon. Dod. gal. & fol. cui & Spelta & Semen Latinorum: Zea primum genus, Fuch. Spelta prima, Tr. Far, Cæf. Zea, Ador, Far adoreum Tabernamótano. Hæc & aristis armatur, vt expressit Zea alterius nomine Matth. Lac. Cast. Zea maioris seu dicocci, Lugdunensis historia.

CRIMNON. CAP. LXXXIII

Crimnon crassior est ex zea, triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abunde alit sed agrè confectum vehementius adstringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Crimnon

Crimmi con-
sideratio.
Nomina.

Crimmum crassior zea, aut tritici farina extitit apud antiquos, qua ad pulvem conficiendam utebantur: quaque loco panis diutius videtur atunt, ut Plinius est auctor lib. 18. cap. 8. *Κερίμνον* Græci, quod etiam Latini Crimmum, & Hispani Farina atorcolada, aut Rolum vocant.

† Neque Ruellium, neque communem, vulgatamq; Græcam lectionem hic secuti sumus: sed Marcellam, qui probatissimi codicis testimonio non *ὀλυρα*, quod facile conficiatur: sed *ὀκατέρας*, quod agrè concoquatur legendū patet.

ὀλυρα

OLYRA

CAP. LXXXIIII

Eidem zea generi † olyra adscribitur, sed minus aliquantò nutrit. In panes, ut zea, cogitur. Fit quoque ex olyra crassior farina, quam Græci crimmon vocitant.

Olyra confi-
deratio.

Marcelli lap-

Secale.

Olyra & Se-
cale differē-
tia.

Brunfelsii, &
Cornarii et
Hermolai
Ruellii & Ma-
nardi lapsus.
Siligo anti-
quorum.

Siliginis de-
scriptio ex
Plinio.

Secalæ vul-
garis vires.

Olyram zea esse speciem, Dioscoridus testimonio, ambigit nemo, tametsi hac etate nō seratur in Italia: ideoq; Galienus dem Olyram pellere facultatib. ait, quibus & zea: u. n. utramq; inter triticum, & hordeū medium tenere temperamentū asseruit. Adducitur aut Marcellus, Dioscoridus interpres, ut fere credat, Olyram à Secale vulgò vocato, è quo rustici Alpium cultores panē conficiunt, minimè differre. Qua in re Plinium alioqui sibi familiarē, haud accuratè legisse videtur, cum non animaduertit, seorsim ac differenter scripsisse illū de Olyra & Secale, quod speciatim Farraginē appellat. Nam lib. 8. c. 10. de olyra siue Arinca sic idē habet Plinius: Ex Arinca dulcissimus panis, ipsa spissior quā far, & maior spica, eadem & ponderosior. Rarè modius grani decem & septem libras implet. Exeritur in Gracia difficulter, ob id iumentis dari ab Homero dicta. Hec est, quam olyram vocant. Eadem in Aegypto fertilis, facilisq;. De Secale autem scribens lib. 18. cap. 16. Id autem, inquit, quod Secale siue Farrago appellatur, occari tantum desiderat. Secale Taurini sub Alpibus Asiam vocant, deterrimum, & tantum ad arcendam famem utile. Fœcunda, sed gracili stipula, nigricia triste, sed pondere præcipuum. Admifcetur huic Far, ut mitiget amaritudinē eius, & tamen sic quoque ingratisimum ventri est: nascitur qualicunq; solo: hac ille. Quibus non solum liquidò constare non ambigo, Secalam quidē ab Olyra differre, sed quod nullū aliud sit gr. num, quam vulgaris Siligo nostra. Siquidē hac, præter id, quod in Italia adhuc genuinum nomen retinet, vbi Secala vbiq; ferè appellatur, ceteris quoq; notis Pliniana Secali correspondet. Est. n. fœcunda, stipula tritico graciliore, nigricans, tum ipsi, tum eius panis: quin etiam rustici farris loco, tritici aut Milij tertiam partē admifcent, ut panis amarorē amittat, quia seminum mistura olyra minimè indiget, cum dulcissimum per se conficiat panē. Ad hac plurimum differre Olyra à Secala nostrate testatur grauisimus author Gal. lib. 1. de alim. fac. vbi sic habet, de Typha, Olyra, & Zea scribens: Typha semen extrinsecus corticem habet, veluti Olyra, & Hordeum, verum decorticatū in panes congeritur: & paulò post inquit. Ex nobilissima autē Olyra, cum vt decet, fuerit decorticata, nominatim Tragum conficiunt: id quod repetit libro de attenuante vidus ratione, sic inquit: Ceterum semen vt Hordeum, Olyra, & Auena, est mundandum, & cortice spoliandum: ideoq; dicebat Plinius, quod in Gracia Olyra difficulter exeritur. Siquidē Secala vulgaris nostra decorticatone non indiget, quemadmodum nec Triticum, cum ipsa tritura tantū nuda è folliculo prodeat. Præterea ex colore quoq; nascitur, Olyram non esse Secalā vocatā, vt Gal. lib. 1. de alim. fac. testatur his verbis: Color in hordeis quidē & Olyris est albus, in triticis autē subflauus, id quod nusquā in Secala visitur. In eodē versatur errore Otto Brunfelsius, & Ianus Cornarius, quorum sententis manifestò ea, que diximus, refragantur. Præter id non possum nō admirari Hermolaum, Manardū & Ruellium, alioqui doctissimos viros, quippe qui vno ore fateantur, quod tamen nusquā reperitur, Olyrā Plinio Siliginem nuncupari, cum is non siliginem, sed Arincā Olyrā vocauerit, & speciatim de vtraq; tanquam de rebus inuicē discrepantibus scripserit lib. 18. c. 8. 9. & 10. Is enim pro siligine intelligit quoddā præstantissimi frumenti genus, è cuius farina selectiore parte veteri panē conficiebāt omnium præstantissimum, leuissimumq;. Pro Olyra autem aliam frugis speciem, è qua dulcis fiebat panis. Plinij autē verba sunt hæc: E siligine laudatissimus panis, pistrinarumq; opera laudatissima. Præcellit in Italia, si Campana Pisis nata misceatur. Ruffior illa, at Pisana candidior, ponderosior verò Cretacea. Iustū est è grano Campana, quam vocat castratā, è modio redire sextarios quatuor siliginis, vel è gregali sine castratura, sextarios quinq;. Præterea stors semodiam, & cibarij, quod secundarium vocant, sextarios quatuor, fursuris sextarios totidem. E Pisana autem, siliginis sextarios quinq;, cetera paria sunt. Item eodem lib. c. 10. Similago, inquit, ex tritico fit laudatissima, ex Aphrico iustum est, e modis redire semodios, & pollinis sextarios quinq;. Ita n. appellant in tritico, quod florē in siligine. Hoc ararie officina, chartariæq; vtuntur. Et cap. 11. Panis summa laus, ait, Siliginis bonitate, & cribri tenuitate constat. Plinio quoq; videtur subscribere Gal. lib. 1. de facult. alim. cap. de Tritico, de panibus scribens, vbi sic habet: Et apud Romanos quidem, vt etiam apud alios propemodum omnes, quibus ipsi imperant, panis quidem purissimus *σιλίγινης* id est Siligineus: qui autem huic est proximus *σεμιδαλίνης* id est Semilaceus nuncupatur. Verum *σεμιδαλίνης* quidem Græcum nomen est, & antiquum: *σιλίγινης* verò neq; Græcum est, neq; ipsam aliter possum exprimere. Inter panes igitur Siligineus plurimum alimenti præstat post ipsum autē Semilaceus, tertio loco Medius, qui & *σηκομίσος* & *αυτοτύπος* dicitur: quartum post huic sordidiorum genus, in quibus fursuraceus est postremus. De olyra autē agens: Olyrini sanè panes, inquit, si ex bona Olyra fiant, post triticos saltē sunt præstantissimi, secundi autem ab his sunt Typhini. Quod si olyrini ex vitiōso semine sint facti, Typhini non erunt eis inferiores: hac ille. Quibus sanè nulla dubitatione conuincitur, contra eorundem doctissimorum virorum sententiam, Olyram non esse Siliginem: qua quantum differat à Secala nostrate, non solum ex panis ipsius præstantia scire quis poterit, qui aliter sentiat, sed etiam ex eius historia apud Plin. lib. 18. ca. 10. vbi sic habet: Siligo nunquā maturefcit patitur, nec vūa segetum inanis dilatationem patitur, propter teneritatem, ijs, qua maturefcere protinus granum demittentibus, sed minus quā cetera frumenta in stipula periclitatur, quoniam semper rectā habet spicam, nec rorem cōtinet, qui rubiginem faciat: hac ille. Qua sanè euidenter admodum distinguunt Secala vulgaris, & Siliginis antiquorum differentias. Sed mirum, quod secuta à Romanis etas adeo hoc præstantissimum semen neglexerit, vt non solum in Italia, vbi frequētissimum habebatur, sed in tota Europa, nusquam hoc auo reperiatur. SECALE folio prouenit tritici angustiore, stipula tenuiore, sed firmiore, ac proceriore, spica pendente, aristis infirmioribus, sed sæcundis granis: diu floret, adeo vt quadragesimo tantum die à flore maturefcit. Seritur alpinis tractibus. Refrigerat & humectat ordine primo: emollit, absterstone non vacans, & pus mouet. Sordidos effluit (Plin. lib. 18. ca. 16.) efficit panes, agrestibus hominibus idoneos, amarulentos ac lentos, q; facile permeabiles: minus alit quā triticum & hordeum. Secala vulgaris farina, quod glutinosa emplasticaq; sit, vbi ter additur in emplastris pus mouentibus. Seminis decoctum tineas ventris pellit, præsertim addito coriandri semine. Idem Mulomedici Secalam decoctam dare solent iumentis, qua tincis infestantur, Idonea est farina ad glutinum librariarum parandum, est enim ceteris tenacius. Culmorum cinis aqua subactus & illitus, pedum, manuūq; rimas sanat. Culmi aqua macerati vtilis sunt festucandis vitibus, iunci enim, aut genista vicem explent. Olyra Græcis *ὀλυρα*. Siligo Latini dicta.

SECALE.

aliud apud alias nationes nomen non habet. Secale autem Nominā vulgaris Latinis Secale, siue farrago: Germanis, Korn: Italis, Segala: Hispanis, Centeno blanco: Gallis, Seigle blanche: Bohemis, Zito.

Secale siue Rogga duplex est, vnum enim autūm alterum vere feritur: hybernū maius, vernū minus est. Siligo, Brunf. Lon. Siligo veterum & secale, Trago: Secale Fuch. Dodon. gal. Matth. Cast. Lobel. Tab. Lugd. Olyra, Cord. in Diosc. Rogga siue Secale, Dod. fol. Fit aliquando vt ob copiosius alimentum attractum grana ob corticem tenerum ruptum, longiora reddatur, quæ à feruore Solis forinsecus nigrescunt, intus verò densiore & candida materia constat. Quod vitium aliqui matrem Secales, alii clauos Siliginis vocant. At Plinius lib. 18. cap. 17. hoc intellexit, dum inquit, inter vitia segetum & luxuriam esse, cum onerata fertilitate procumbunt: sunt tamen, qui statuunt Plinium eo loci id voluisse exprimere, quod Theophrastus 8. hist. 7. φυλλομανίαν, infanam foliorum luxuriam vocauit. Huius figurā cum nemo expresserit, in nostra historia proponetur.

Ἀθήρα. A T H E R A.

CAP. LXXXV.

Athera ex zea fit tenuissimè molita: est autem forbitio, quasi liquida pultrix, infantibus conueniens, & cataplasmatibus efficax.

Cum Dioscorides satis superq; declarauerit, quid sit Athera, necessarium quidem non duximus, de ea plura scribere. Veruntamen illud ignorandum non est, quod nonnulli auctores sunt, qui Atheram etiam fieri asserant ex tritico, olyra, & amylo. Hæc Germanis vulgò Mosa nuncupatur, vtunturque ea plurimum non modò infantulorum lactantium cibis, quemadmodū nos pane in aqua decocto, sed & quotidianis mensis, quam ex farina, lacte, & butyro parant, vt ij quidem norunt, qui diu in Germania versati sunt. Quæ Ἀθήρα Græcè, Athera item Latinè, & Italicè nominatur: Germanicè, Wuos: Hispanicè, Papas. Atheræ consideratio.


Τράγος. T R A G O S.

CAP. LXXXVI.


Tragos quandam haliæ frugis figuram gerit: multò minus, quam zea nutrit, quod multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluumque magis emollit.

Tragos, quem aliqui halicam, nonnulli verò far notis referre asserunt, hac ætate, quod ego sciam, non prouenit in Italia. At quoniam (vt Plinius inquit libro 18. c. 10.) ex oriente peregrinus nobis inuectus erat, vnde nostro etiam æuo innumera deferuntur planta, mirum quidem non est, si, tam longo temporis tractu, relicto Italico cultu, in proprium redierit solum, ex quo primùm ad nos aduehi cepit, vt in aliis quam plurimis euenisse comperimus. Nomen eius Græcum τράγος, Latinum quoque Tragus: Arabicum, Nominatur: Germanicum, Ameltorn: Gallicum, Double turquet.

Et Cum



TRITICVM AMYLAEVM.



Cum Tragos Germanis *Amelcorn* dici auctor sit Matthiolus, placuit figuram Frumenti seu tritici & mylai Germanorum adiacere.

Βρώμος

AVENA.

CAP. LXXXVII.

AVENA.

a Μεύ ὄσπι
ἀκρεα δίκω-
λα i. veluti lo-
custas bipede-
des. Cat. ἀνε-
δια δίκωλα.
i. locustulas
bipedes.
Avena confi

Avena facultates ex Gal.

Nomina.



ORYZA.



Oryza sativa

Oryza

AVena genicula quaedam habet: folio, & stipula triticum imitatur: & in cacuminibus dependentes paruulas veluti a locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad caraplatimara, vti hordeum. Pulve huius alius sistitur: prodest tussientibus in forbitione succus.

TAmetsi Avena, vulgaris notitia seges, seratur in campis gaudeatq; frigido tractui, & edita sit a natura in equorum potius, quam hominum alimentum, in Germania tamen ab aceribus repurgata, & iure pinguium carniem ediza, frequenter in cibis sumitur, quemadmodum in Hetruria saxa, & oryza. Sic enim parata tibus sit haud ingratus, & praesertim vbi estur antequam disiliat. Quin & puliculam Germani ex ea parant eadem ratione, quam in Athera paulo superius retulimus. Bromos, id est, Avena (vt Galenus memoria prodidit lib. 6. simpl. medic.) vnum est ex leguminibus: verum vt medicamentum similem hordeo vim obtinet. Nam illud desiccatur, & digerit mediocriter, & sine morsa: temperiem autem habet paulo frigidior: nonnihil etiam adstrictionis obtinet, vt ventris profusiva iuuet. Et primo de alimentorum facultatibus: Hoc semen (inquit) in Asia frequens est, & potissimum in Mysia, qua est supra Perseum, vbi & typha, & olyra vberimus est prouentus. Iumentorum autem est alimentum, non hominum: nisi vti que aliquando extrema fame, ad panes ex eo quoque semine conficiendas compellantur. Citra famem autem coctum, ex aqua esurcum vino dulci, aut sapa, aut mulso. Eadem cum putamine calefacta, & in sacculis adhibita, flatuosos dolores tollit. Ceterum Avena farina (vt Plinius adnotauit lib. 22. cap. 25.) decocta in aceto nauos tollit. Seges hac, qua Βρώμος Graecè, Avena Latine vocatur: Arabicè, Cartamum, siue Churtal: Italicè, Vena siue Gena: Germanicè, Habern: Hispanicè, Avena, & Auea: Gallicè, Auoyne.

Avena Βρώμος, forsan à Βρώμα quod cibum significat: nam vt auctor est Plinius lib. 18. cap. 17. Germania: populi eam serunt, quibus frumenti instar est, cuius pulve etiam viuunt: & sanè quotidiano vsu apud Germanos frequentissima, non autem sola hac pulve vtuntur, vt falsò Plinius scribit. Theoph. 4. de caus. plant. 6. Auenam ex Zea fieri: & Plinius loc. cit. primum frumenti vitium esse, & in eam hordeum degenerare, scribit. Hæc triplex est, vulgaris, dein nigra, tum nuda.

ὄρυζα

ORYZA.

CAP. LXXXVIII.

ORyza frugum generis est, in palustribus, riguique nascens. Mediocriter alit: sed alium suppressit.

ORyza folio exit arundinaceo, carnosio, porro haud abfili: culmum fert cubitalem, & saepe maiorem, geniculatum & tritico crassior, firmioremq; in cuius summitate spica prodit, in ramulos diuulsa, in quibus semen vtriusque impari exortu prouenit, cortice sublauro, aspero, tenuibus quasi costis striato, cui figura, quod gluma expoliatum, candidum est. Gaudet locis vliginosis ac palustribus. Prouenit copiosa in nonnullis Italiae locis, huiusmodi tantum solo: sed copiosissime.

*prossima in Asia, Syria, & Aegypto. In cibus Oryza admodum est familiaris, concoctuaq; facilius euadit, & ori gratior, vbi ex lacte bubulo, aut amygdalarum cremore, aut carniuum pingui iure decocta fuerit. Datur vtiliter in cibus, dysentericis, & diarrhoea affectis, praesertim vbi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi fuerint extincti decoquatur. Sunt, qui Oryza quoque dicunt genitale augere semen, in bubulo lacte decoctam, additis saccharo, & cinnamomo. Oryza decoctam vtiliter dysentericis infunditur, ac etiam potandum datur. Farina bellè quidem cataplasmatibus admiscetur repellentibus: morbum incipientes inflammationes arceat cum rosis & anthemide decocta, & illita. Huius meminit Gal. qui lib. 1. de simpl. med. facult. ite, sic de ea paucis scribit: Oryza habet adstrictorium quippiam: quare mediocriter ventrem fistit. In lib. 1. de aliment. facult. it. Semine hoc, inquit, omnes in sistenda aluo vtuntur ipsum eodem modo, quo halicam deponunt. Difficilius tamen quam halica conficitur, & minus alit, ceu vtique & in edendi suauitate ab ea quam pluri- Nomina:
 *Oriza, Oryza, Arabibus, Arz seu Arzi: Italis, Riso: Germanis, Reiss: Hispanis, Atroz: Gallis, Ris.**

Oryza: *Oriza* Theophrasto 4. hist. 5. ex qua Plinius lib. 18. cap. 7. Prisanam fieri scribit, quod aliqui de Oryza quae vulgo cortice nudata venalis habetur, intelligendum volunt. Dicitur Oryza Italica, ad differentiam Germanicae. C. B. Oryza peregrina, Trag. Oryza, Brunf. Cord. in Diosc. Dodo. Matth. Lat. Lon. Lob. Cast. Cæsalp. Lugd. Cam. Tab. cui & Hordeum galaticum.

Χάλικα HALICA CAP. LXXXIX.

Halica fit ex zea, quam dicoceos appellauimus: plus alit, quam oryza: aluum a magis cohibet, b stomacho longè vtilior. Decocta in aceto, illitaq; lepras tollit: ynguuum scabritias extricat: incipientibus aegriops medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

a Magis non legit Orib.
b Orib. *εὐσθμάχος*. i. stomacho vtilis.
Halicae consideratio.
Parandi ratio ex Plinio.

Halicam antiquitus parabant ex zea, creta, & gypsum admiscentes. Huius rei auctor est Plinius lib. 18. cap. 11. sic inquit. Halica fit ex zea, quam semen appellauimus. Tunditur granum eius in pila lignea: nam lapidis duritia contentum nudat, & concidit in medulla. Ita sunt halicae tria genera, minimum, ac secundarium, grandissimum vero a phocina appellant. Nondum habent candorem suum, quo praecellunt, tamen Alexadrina praesertuntur: postea mirum admiscetur creta, qua transit in corpus, colorinq; & teneritatem affert. Inuenitur hac inter Puteolos, & Neapolim in colle Leucogea appellato. Halica adulterina fit maxime ex zea, qua in Aprica degenerat. Latiores eius spicae, nigrioresq; & tenui stipula, pinsunt cum arena, & sic quoque difficulter deterunt vtriculos: posteaq; gypsi pars quarta inspergitur, atque re cohaerit, farinario cribro subcernunt: haecenus Plinius. Ex quo non satis admirari possum, quod veteres & creta, & gypsum in cibus simul cum Halica citra noxam esitassent, cum proculdubio coeptum sit, gypsum in corpus assumptum adeo fruibis meatibus obstruere, vt facile homines strangulet. Nisi forte asse dixerimus, quod quauquam aliqui cretam, alij vero gypsum halicae commiscerent, vt candidior, & melleior euaderet: ablutionibus tamen prius eam expurgabant, quam decoctam traderent. Namq; & hoc tempore gingiberis radices fabrili rubrica inficiunt, vt illas a carie, & teredine vindicet: quae tamen & abluuntur, & deraduntur, & cribro excutuntur, cum in ciborum condimentis, vel medicamentorum misturis ea experuntur. Hoc enim mihi visus est innuisse Gal. lib. 1. de alim. fac. cum ait: Caterum diligentissime, dum ex halica elota sorbitiones parantur, animaduertere oportet. Quippe cum Halicam ad sorbitiones parandas elui praecipiat, id sane facere videtur, vt repurgetur a creta, & gypso, quibus inficiebatur. Quod autem in cibum non sumeretur Halica, qua ab omni

Halica ex zea Africana.
Gingiberis rad. rubrica inficiuntur.


in gonio non esset purgata, ostendit idem Gal. loco nuper citato, cum inquit: Halica ex genere est tritici, qua valenter nutrit, succumq; lentum habet, siue in aqua duntaxat coctam cum mulso, aut dulci vino, aut etiam adstringente sumas, siue ex aceto, saleq; conditam. Qui autem per sanitatem ob vehementem ventris mordicationem, siue a biliosi humoris copia, siue a liande profectam, sorbitione egent, his halicam assatim coctam, quoad teneram flacciditate adepta colliquescat, deinde conditam, & colatam, vt ptisanam colato cremori persimilis sit, sorbendam exhibeto. Haec Galenus, qui certe tot laudibus in re Halicam non commendasset, si creta, vel gypso admixtam assumpsissent in cibum. Fiebat antiquitus Halica non modo ex zea, qua dicoceos dicitur, sed etiam ex tritico, & aliis frumētaceis, vt ex Galeno, Paulo, Aetio, & aliis intelligi facile potest. Fit & hoc tempore in vniuersa Italia, quamuis eam non Halicam, sed Far falso appellitent. Namque far ab halica longe diuersum putamus. Quod autem Far a chondro, siue halica differat, sitq; per se frumenti, vel tritici proprium genus, antiquis Adoreum vocatum, è quo Far ipsum paratur, id sane ex plurimum probatissimorum auctorum scriptis aperte constat. Siquidem id primum declarat Plinius lib. 18. cap. 8. sic inquit: Frumenti genera non eadem vbiq; neque vbi eadem, sunt iisdem nominibus. Vniuersum far, quod Adoreum veteres appellauerunt. Quin & eodem capite, vt fortasse palam faceret, aliud esse zeam, è qua fit halica, aliud vero far: Qui zea vtuntur, inquit, non habent far. Item cap. 7. eisdem libri: Populum Romanum, ait, farre tantum è frumento trecentis annis vsus Verrius tradidit. Quo tempore Romanus nullus fuit halica vsus, vt ipse testatur Plinius lib. 22. cap. 25, cum inquit: Halica res Romana est, & non pridem extogitata, neque arbitror Pompeij magni aetate in vsu fuisse. His accedit Asclepiadis, & Galeni auctoritas lib. 7. de compositione medicamentorum secundum locos in quodam eclegmate ad cruenta sputa, vbi sic habet. Farris Clusini appellati sextarii dimidium, decocti marrubij viridis sextarium vnum: haec in vas vitreum coniecta, diem & noctem macerari finito. Sequenti die pharmacam mollito, quemadmodum halicam maceramus: haec Galenus. Quibus palam est à farre differre halicam. Galeno deinde subscribit Aetius lib. 9. cap. 45. vbi ex Archigene haec habet. Quod verò Latine in regionibus Romae vicinis far appellant, hoc modo paratur: Frumentum modico tempore aqua madefacito, indeq; extractum, ac in pilam coniectum, veluti ptisanam, à cortice repurgato, vbi verò corticem exuerit tollito, atq; in sole siccato: deinde manibus tritum, donec penitus à cortice fuerit mundatum, crassissime molito, ita vt granum vnum in quatuor, aut quinque partes redigatur, & siccum asseruato. Vfus autem tempore halica modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur. Pro agris verò variè paratur, & epithematis quoque admiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc virides tollunt, ex ipsisq; far concinnant, quomodo & suauis, & iucundius redditur: haecenus Aetius. Ex cuius, & supradictorum testimonio, illud plane omnibus partem arbitror, quod far ab halica dissideat, qua de re etiam plura, duce Deo, dicemus in epistolis nostris. Quod Graeci *χάλικα* Latini pariter & Italia Halica nuncupatur: Arabibus, Chandaros.

Halicae vires ex Galeno.
Farris, & halicæ differentia.

Milium in panes coactum minus ceteris frugibus alit: sistit pulte sua aluum, vrinam cit. Torretur milium, feruentique in sacco ponitur, vt torminibus reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit.


Mili confid. & historia.

MILIVM.



Milii vires ex Galeno.

I. PANICVM MINORE PANICVLA.



Nomina.

a Meum. λέ τις μελί- τις καλῶσι. i.eam aliqui Melinem appellanc.

Milium, folia profert arundinacea, panico aequalia, callamum bicubitalem, crassum, geniculatum, lanuginosumq; radicem multiplicem, ac dextram, panicula dimulsa e cacumine dependentibus. In quibus copiosum oritur granum, subrotundum, solidum, laue, subflatum, tenui tunica vestitum. Seritur in agris, pingui & stercoreato solo. Eius panis dum recens est, & arte quadam pistoria recte paratus, vt Verona fit, & ita calidus, vt ex furno excipitur, denotus, sua quadam dulcedine placet, & a pluribus expetitur. Quare non desunt, qui ipsum calidum per plateas circumferant, clamantes, Pan di miglio caldo, caldo: at cum obdurat, ingratus sane est. Syluani, qui carbones, & arbores secant in Tridentino agro, sola pulte Miliacea, quam vulgo appellant Polenta, se alunt, eam cum lacte edentes, nec alio dicunt se posse alimento perdurare. Quare anno toto hoc tantum alimento viuunt, & fontanam aquam potant. Milium fomentum est optimum ad siccandum circa morsum, & ad festus repellendos, praesertim vbi cum sale admixtum fuerit. Siquidem recte ad tormina adhibetur, quae a flatu excitantur, & ad lateris dolores quin etiam praestantius est additis chamameli floribus. Medicamenta, quae in milij aceto sepeliuntur, diutius a carie, & putredine praeseruantur: imo & ipsa carnes recentes milio astate sepulta, pluribus diebus a putredine vindicantur. Milium, vt libro 7. simplicium medicamentorum prodidit Galenus, primo ordine refrigerat, excicat vero tertio exoluto, aut certe secundo intenso: paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar quidem edulij comestum, plane inter omnia frumentacea edulia minimum confert nutrimenti, sed & ventrem desiccant. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum ijs, quae circa morsum exiccari postulant: & cataplasmatis modo illitum exiccari potest, at tamen admodum friabile est, proinde difficile est eius in cataplasmatis vsus. Quibus omnibus ea prorsus adstipulantur, quae idem de Milio tradidit lib. 1. de alimentorum facultatibus, cum inquit: Milio item in pane nonnunquam vtuntur, urgente frugum penuria. Panis tamen ex eo exigui est alimenti, & refrigerans. Constat insuper praeridum, & instar arenae, aut cineris friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentum. Iure ergo aluum humentem desiccant. Agricola huius farinae cocta, admixto adipe suillo, & oleo vescuntur. Κίχρος Graec: Milium, Latine dicitur: Arabicè, Ieuers, Geguers, siue Gians: Italicè, Miglio siue Meglio: Germanicè, Hirtz: Hispanicè, Millo, & miyo: Gallicè, Millet.


Miliu a milliari summa Festo, quasi millesimu granum ferat: κίχρος Theophrasto 8. hist. 3. a minutis ficuum granis numerosissimis, quae κίχραμις vocatur: πασπαλη, Hippocrati: πάσπαλος, Galeno. Habetur semine luteo ac albo: alterum semine nigro, quod a vulgato differt, caule latiore & non hirsuto & latiore iuba. In Argouia nunc frequenter seritur nigrum, quod ex radice caules emittit non aded vt in priori altos, foliis latioribus, iuba sparsa & minore, semine aliquantum maiore & rotundiore, & ad pulres conficiendas altero longè vtiliore. De Indico dicitur sequenti capite.

Ελυμος. PANICVM. CAP. XCI

Panicum a frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodemque modo in panes subigitur. Eisdem habet vsus: minus tamen & nutrit, & stringit.

Panicum

II. PANICVM DOMESTICVM. III. PANICVM SYLVESTRE.



Panicum folio, radice, culmo, milio est per omnia simile, paniculus autem differt. Siquidem in Panico pedali longitudi-
 ne panicula provenit, ad terram versa, non ut in milio diuulsa, sed praedensis compacta racemis, granis numerosis, hir-
 futa. Seritur in campis mense Maio, & quandoque statim post messem. Est & aliud genus, quod mammosas ferè pa-
 niculas gerat, & pene semen racematim proferat, copiosiore proventu. Color paniculis varius: namque in quibusdam
 candidat, in aliis rufescit, in pluribus verò flavescit. Reperitur & SYLVESTRE, sed cibus inutile, & tantum auicu-
 lidoneum, quibus panicula offeruntur. Hoc satiuo longè minus, gracili admodum stipula, geniculata tamen, cubitali
 longitudine, aut maiori: foliis angustioribus, breuioribus, asperisque, paniculis in cacumine longis, subrubentibus, hir-
 suru & asperis, adeo, ut pertinaciter vestibus inhareant, sed panico valde minoribus. Spontè per se provenit in hortis
 & viridarijs: quinetiam in campis, & vineis. Vis illi panico similis, sed longè magis adstringit, siccatur, ac refrigerat: ut scri-
 ptum reliquit Galenus, lib. 6. simplicium medicamentorum, ex leguminum genere est, milio specie simile, facultate
 certe pauci nutrimenti, & exiccatoria. Siftit quoque nonnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si verò foris
 illinatur, exiccatur, atque refrigerat: haec Galenus. Ceterum scribit Ruellius secundo de natura stirpium volumine, Pa-
 nicum in Italia Melicam appellari. Qua in re aperte hallucinatur: namque melica, qua apud Insabres vulgò Melega
 nominatur, illud genus frugis est, quam nostrum vulgus in Hetruria Saggina vocat: alij verò in Italia populi Sargo
 appellant. Nec vsquam, quod sciam, in Italia panicum melica vocatur. MELICA autem (ut utar hoc nomine)
 frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens, adeò ut campi, in quibus ad maturitatem vsque ad-
 oleuerit, arundinetam representare videantur. Eius tamen calamus non ut vulgarium arundinum, inanis est, sed sicut
 arundinum modo, alba farctus medulla, sambuci modo. Panicula quas ad Cybelis pomorum magnitudinem
 summis proferunt culmis, magnas, crassasque, quaedam cum maturitatem senserint, in nigro rufescunt: quaedam verò
 nigredinem in vniuersum contrahunt, quaedam subalbicant granis compluribus onusta. Seritur in campis aratro cultis,
 assercoratis. Refrigerat, siccatur, cohibet & resoluit. Facultas ei haud milio dissimilis. Depectitur granum à rusticis, inc-
 luturq; in farinam, & inde in agrestem cogitur panem concoctu contumacem, & qui parum alat: aluum adstringit: et si
 in Hetruria potius ad columbarum, gallinarumq; seratur saginam, quam ad hominum alimentum. Hoc Plinio libro
 18. cap. 7. Milium est INDICVM, quod tamen non animaduertit Ruellius, alioqui maximus Plinij sectator. Plinius
 eum sic habet: Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundi-
 nem culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prae grandibus culmis, lobas vocant, omnium frugum fertilissimum.
 Est & aliud Milij Indici genus, quod primum mihi Patauo missum est, à Iacobo Antonio Cortuso, Nobili Patauino &
 rei plantaria studiosissimo. Verum hoc altero longè nobilius, praestantiusque habetur, nam glutinam facile exuit, & mi-
 norum, pulchrioremque conficit panem: idem culmo, foliis, paniculisque alteri simile habetur. Sed haec omnia in Bohe-
 mia minor a prouenerunt, aeris fortasse inclementia. Fit etiam Milij Indici communis arundinum medulla medicamentum
 ad strumas valde vrile; hoc modo: Sumuntur huiusce milij internodia decem, extrahiturque inde vniuersa medulla,
 hinc sponsia noua integra, rubensque additur, & igni simul comburuntur: deinde in puluerem teruntur, additis pipcris
 nigri granis duodecim. Pulueri admiscetur triticeae farinae vncia, & postea exceptis omnibus ouo recenti, inde placentula
 conficitur, & sub seruantibus cineribus coquitur. Demum in sex partes diuiditur, & Luna decrefcente, pars vna alter-
 nis diebus vespere, strumoso dormitum ituro propinatur, nullo addito potu: fitque ita, quousque affectus senas illas vo-

Panici confi.
 & historia.
 Panicum al-
 terum.
 Panici sylu.
 confid.
 Panici vires
 ex Gal.
 Ruell. lapsus:
 Melica con-
 sideratio.
 Milium Indi-
 cum Plinii.
 Milii Indici
 aliud genus:

IV. MILIVM INDICVM.

Nomina.



aspera, & quartū spica nigra. Figura adposita Panici est sylvestris sine aristis, siquidem alterius eius speciei vtriculi in oblongam aristam desinunt. C. B. dicitur Panicum palustre & sylvestre, Dod. gal. Panicum sylvestre Matth. Cast. Taber. Lugd. Cam. Panicum herbariorum sylvestre, Lobel. Panicastrella similis alia.

SESAMVM.



Sesami consideratio.

rauerit particulas: deinde altera. & tertia luna, idem reperitur. Hoc medicamento plures curati sunt. Flores, qui erant in Mili Indici Paniculis excutuntur, drachma ponderis ex rubro vino hausti, rubra faeculentarum profluuiis sistunt, quemadmodum ex albis paniculis accepti albes quoque vices faeces cohibent. Dantur pari iuuamento etiam dysentericis, & ceteris alui fluxionibus affectis. Idem praestat granorum patamen, cui vitello probe decocto exceptum, & a ieiunio illico deuoratum. Quod ἔλπος Graecis: Panicum Latinis appellatur: Arabibus, Dochon: Italis, Panico: Germanis. Semine: Heydelfenich / Fuchschwanck: Hispanis, Panico, & Paniso. Gallis, Pani. Milium Indicum. Hetruscis, Sagina: Longobardis, Melega: Venetis, Sorgo. Panicum sylvestre Graecis ἄργυρος: Italis, Panico saluatico, siue Panicastrella.

Panicum à panniculis quibus semen inest, Plinio lib. 18. cap. 7. quod mel frugum Dioeci dici, idem lib. 22. ca. 25. testatur, qua de re dictum plenius in nostro Phytopinace. Hoc quadruplex reperitur, minore, maiore & caerulea pannicula: & Indicum de quo supra. I. Quod & vulgatius, dicitur Panicum pannicula minore C. B. Milium exiguum, Trag. Panicum, Fuchf. Cord. in Diosc. & hist. Ges. hor. Dod. gal. & fol. Lon. Lob. Celsalp. Taber. Cam. Hoc variat panniculis albis, flauis, purpureis, quare semine est albo, luteo, rufescente. II. Panicum pannicula maiore C. B. Panicum domesticum, Matth. Panicum, Lacu. Cast. Panicum aliud Indicum pannicula villosa, Lob. Panicum Indicum, Dodo. fol. & Tab. cui & villosum & Hispanicum. III. Panicum sylvestre est, quod quadruplex existit, primum quidem duplex, sine aristis & cum aristis: alterum simpliciter spica molli: tertium spica aspera, & quartum spica nigra. Figura adposita Panici est sylvestris sine aristis, siquidem alterius eius speciei vtriculi in oblongam aristam desinunt. C. B. dicitur Panicum palustre & sylvestre, Dod. gal. Panicum sylvestre Matth. Cast. Taber. Lugd. Cam. Panicum herbariorum sylvestre, Lobel. Panicastrella similis alia, Celsalpin. Gramen Mannae alterum, Dodon. fol. & Lugd. Milium sylvestre & supinum quod Ischaemon videtur, Clus. Hisp. an. Schraden, Cord. in Diosc. & Ges. hor. IV. Milium Indicum, quia Plinius lib. 18. cap. 7. ex India in Italiam inuectum scribit. C. B. Panicum, Trag. Milium Indicum, Matth. Fuch. (cui & Sarracenicum vel Sorgi) Cast. quo ad descriptionem Lugd. Cam. Sorghi, Dod. gal. Lon. Melica, Cal. Dodo. fol. cui & Sorghum, Sorgo. Melica Italarum Lob. Sorghum, Ges. hor. Tab. Maizum, Ges. hor. cui & Panicum Indicum, & Milium Indicum. Hoc variat seminis colore nigro, rubro, luteo, albo.

Σησαμω. SESAMVM
CAP. XCII.

Sesamum stomacho inutilis cibus: halitus grauitatem facit, quoties inter mandendum, commissuris dentium inhaesit: neruorum crassitiem illitu discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastae moribus: capitis dolores, qui aestuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in vino: praesertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptii vtuntur.

Tametsi Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, officinis notissimum sit: pauci tamen reperiuntur septuaginta, qui Sesami plantas viderint vnquam, cum nullum, vel rarissimum, quoddam agros steriles reddat, seratur in Italia.

Siquidem

Lolij historia iuueni cadauere apes procreantur, qua nobis suauissima fundunt mella: an non ex rudi vilique materia gignantur in terra visceribus pretiosissima metalla, & gemma? Sileant ergo hi blaterones, natura monstra, qui potius ad perdendas scientias, vitiandasque, quam iuandas nati sunt. Sed haec iam missa faciamus, & ad instutum nostrum redeamus. Est itaque Lolium, vt praediximus, vitium frugum, & hyeme statim prima e terra profilit, folio longo, pingui, hirsuto, adultum culmo tritici graciliore, in cuius summitate spica habetur longa, aculeatis siliquulis impari exortu vtrinque referta, e quibus

Lolij vires. grana tria vel quatuor cumulatim aperte exeunt, cortice contumaci contexta. Maturefcit vna cum tritico. Attenuat, resoluit, & abstergit. Panis qui Loly multum admisit, inebriat, & caput maximè afficit, adeo, vt qui ederint, somno quodam graui opprimantur, & quasi vertiginosi fiant. Nocet oculis, & visum obtenebrat. Ideoque Italia, apud quos plurimum inter segetes prouenit, cribris ad hoc paratis lolium à tritico magna diligentia secernunt, seruantque pro alendis gallinis, &

Fuchij error. capis. Namque non solum ab eo non leduntur, sed belle saginantur. Credit Leonhardus Fuchsius (vt declarauit in suis circa Lolium clarissimus de stirpium historia commentarijs) Pseudomelanthium, quod inter segetes frequens nascitur, legitimum esse Lolium. Id quod (pace sua dixerim) non modò communi doctissimorum virorum, qui in stirpium doctrina diuersati sunt, sententia refragatur, sed & veterum scriptis, qui Lolium in spica, non calyce, non capitulis Melanthij vel papaueris modo inclusum, semen proferre tradiderunt. Et quauis Theophrasti auctoritate nitatur, vt sui Lolij effigiem representet, plura tamen ex eo reddidisse videtur, quam ipse usquam in Theophrasto legerim. Quam in re mihi quandoque iocandi fuit occasio, vt dixerim Fuchsi ideo in lolio tam manifestè lapsum fuisse, quòd forte eo tempore, quo haec scriberet, contigerit id lolium in pane comedisse. Quod autem id legitimum sit Lolium, quod rei herbaria peritis, agricolis etiam, & omnibus fere vulgò cognitum est, testis est Dioscorides libro 4. cap. de phœnice, vbi phœnicem spicam lolio similem proferre prodidit. Ex quo palam fit, lolium in spica, non autem in capitulis pseudomelanthij, & papaueris modo semen ferre. Ex vulgata quoque Lolij facultate Fuchsi error deprehendi potest. Siquidem panis, (vt praediximus) in quo lolium fuerit, stupiditatem quandam, & veluti temulentiam esitantibus parit cum inexpugnabili ferè somno. Quamobrem vbiq;

Lolij vires ex Galeno. locorum inuerniculis à tritico, alijsque cerealibus ipsum separant, qui eius noxam sensere. Lolium, vt scriptum reliquit Galenus lib. 5. simpl. med. desiccatur & excalfacit efficaciter, vt propinquum sit acribus, magis quam Iris: sed non est perinde vt illa subtilis essentia, verum multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsam quispian in principio tertij ordinis excalfacientium, secundi verò extremè exiccantium. Eius nomen Graecum αἰλα: Latinum, Lolium: Arabicum, Sceilen, seu Zenod: Italicum, Loglio, & Gioglio: Germanicum, Tvalch / Rutweyhen / vnd Sulch: Hispanicum, Yoio: Gallicum, luayara, & Tur. ije.

Lolij nomine multae donantur à diuersis plantae, nos duas potissimum hoc nomine dignas censemus: alteram spica breuiore de qua infra: alteram spica longiore de qua nunc. Lolium spica longiore tritici pestis, C. B. dicitur Lolium, Dodo. gal. (cui & Zizania Arabum) & fol. Matth. Cord in Diosc. Lob. (cui & in iconibus Triticum temulentum) Cast. Casalp. Lugd. & Taber. cui & Iureum: Lolium verum, Gennero de hortis.

Ἀμύλον

AMYLV M.

CAP. XCIII

Conclusa non leg. Orib. **A** Mylum [ex eo appellatum est, quòd sine mola fiat.] Optimum a [ex trimestri, natione Creticum, aut Egyptium. Ratio faciendi amyli haec est. Purgatum trimestre triticum madescit] quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quò minus cremor vitulis vna excludatur: vbi mollissimum esse videtur, mutata aqua, pedibus calcari oportet: rursus infusa, tertio demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisq; siccatur, regulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole: namque si paulisper vnum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaq; vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit: lacti, atque obsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quae maceratur, ac eluitur vno, aut altero die, & subactae farinae modo manibus subigitur: pressaq; feruentissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur. Nullus in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

a Orib. addit. τὸ ἐκπλυμμένον, καὶ ἔρηχόμενον, ἐν ὅσῳ σατι γλυκεῖ δόσιν ἐπιμένον. i. quod fit ex tritico, purgato, loto & madefacto, aqua dulci affusa.

Amyli confi.

Amyli vires ex Gal.

Nomina.

A Mylum, quod vulgò Amidum officinis vocatur, omnibus quidem notum est: probatur autem, auctore Plinio libro 18. cap. 7. leuitate ac laeuore, atque vt recens sit, & candidum. Caterum etsi praetulerit Dioscorides Amylum, quod Creta aduehitur, Plinius tamen longè magis Chium, cui insula (vt ipse scribit) Amyli inuentio debetur, praestare asserit. Amylum, vt memoria prodidit Gal. lib. 1. de alimen. facul. ex tritico conficitur, leuigandi exasperatas partes vim obtinens, quae communis est omnibus substantijs consistentia siccis, quae neque adstrictionem, neque acrimoniam, neque aliam quamuis facultatem habent insignem, quas substantias iure ἀπορώς, id est, qualitatibus, quae sensu deprehendi queat, expertes appellant: quae is inter humiditas substantias est aqua. Caterum amyllum similem lotis panibus habet facultatem: nam, vt illi, minus quam panes non loti, corpori praebet alimentum, & non calfacit, cum cateri panes calfaciant. Quod verò ad triticum in aqua elixum attinet, cum ea amyllum ne conferendum quidem est, cum palam id tum calfaciat, tum valenter nutrit, si coctum fuerit: id quod factum (vt diximus) est difficile. Porro Amylon (vt Pli. tradit lib. 22. cap. 25.) hebetat oculos, & gula inutile, contra quam creditur. Item sistit aluum, epiphoras oculorum inhibet, & vlcera sanat. Item pustulas, & fluxiones sanguinis: genas duras emollit. Datur cum ouo bis, qui sanguinem reiecerint: in vesica verò dolore semuncia amyli cum ouo, & passis tribus, sufferuefacta à balneo. Quod Graeci ἀμύλον, Latini similiter Amylum vocant: Mauritanii, Nix: Itali, Amido: Germani, Amlung: Hispani, Amyden: Galli, Amydum.

Ἰνάλις

FOENVM GRÆCVM

CAP. XCV.

Foeni Graeci farina vim habet emolliendi, discutiendique: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas, quam externas inflammationes, efficaciter illinitur: liëem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius foeminarum malis subuenit: & siue tumor, siue praclusio sit vuluae, fouentur, & insident. Foeni graeci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis

FOENVM GRAECVM.

locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesmos, foetidamque dysentericorum proluuiem. Oleum, quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalium cicatrices abstergit.


Foeni Graeci semen profert plantam trifolio simile, folia habet per ambitum serrata, caules exiles, complures ab vna radice prodeuntes: flores candidos, paruos, è quibus cornicula prodeunt incurua, acuminataq; in quibus semen concluditur subfuluum, pingue, odore graui. Radice nititur multiplici atq; tenui. Seritur pingui solo Februario, & Martio calidiori tractu. Digerit, resoluit, emollit, pellit & abstergit. Sicci seminis farina, cum sulphure, & nitro lentigines delet. Medetur vlcerosa scabiei, si cum quarta parte seminis nasturtij, excipiatur aceto, & subinde illinatur. Eadem in hydromelite decocta, addita axungia, auxiliatur genitalium tumoribus: quinetiam parotidas iuuat, chiragram, podagram, & articularum luxationes. Ex vino subacta carcinomata purgat. Datur vtiliter potandum fœnogræci decoctum diuturna tussi laborantibus, & vbi pectus fuerit exulceratum. Seminis mucago, madefactus in eo linteolis, & fronti adhibitis, oculorum fluxiones auertit. Decoctum verò eius ex aqua oculorum inflammationes arcet instillatum. Huius meminit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Fœnum Græcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo: proinde seruentes phlegmonas irritat acerbataq;: qua verò minus sunt calida, & magis dura, eas digerendo curat, Τάλισ, καὶ κόμπεπος id Græcè dicitur, quòd Latine Fœnum græcum: Arabice, Olba, Helbe, seu Hebbe: Italicè, Fieno greco: Germanicè Feni greco, & Bockshorn: Hispanicè, Alfornas & Alloluas: Gallicè, Feni greco, & Senegre.

Fœni Græci confid. & hist.

Fœni Græci vires Matth.

Fœni Græci vires ex Gal.

Nomina



Fœnum græcum Plinio dictum, à siliquarum forma, βέρεπος καὶ ἀνίβερος Græcis, & Siliqua Columellæ dicitur. Fœnum græcum, Trag, Matth. Lac. Lob. Dodo. fol. Cast. Cam. Cæsalp. Fœnogræcum, Fuch. Cor. in Diosc. & hist. Dod. gal. Fœnum græcum fatiuū, Lug. Hoc enim duplex est, fatiuum & syluestre: hocque duplex, alterum à Dodonæo & Lobelo, alterum ab Herbario Lugd. propositum: quod enim Tragus Fœnogræci syluestris nomine proposuit, in hanc classem non pertinet.

Λίνον.

LINVM. CAP. XCVI

I. LINVM.

Linum vulgò notum est: cuius semen easdem, quas fœnum græcum, vires habet. Discutit, & emollit omnem intus, forisq; inflammationem, cum melle, oleo exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie, varosq; crudum tollit: illitum cum nitro, & ficulneo cinere, parotidas, duritiasq; discutit: vlcera, quæ serpunt, fauosq; cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij, & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituat: tussim lenit: ventrem stimulat, si farina piperis, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, vuluæq; erosionibus immittitur,alui extremèta euocat, ad vuluæ inflammationes in defensionibus perquam vtile.

Linum caulem edit sesquicubitalem, teretem, rectum, obsequiosum, folia oblonga, angusta molliaque: ramulos promit in summitate ternos, quaternosve, in quibus carulei emicant flores: Semen edit in orbiculatis folliculis in acutum desinentibus, planum, laue, cordis figura. Radice nititur vnica, non tamen sine fibris. Seritur passim in campis, attrito ac stercorato solo. Cum Linum, & eius semen sint non modo medicis omnibus, sed etiam ceteris, & presertim agricolis, vulgò notissima, superuacaneum quidem foret, pluribus eorum historiam persequi, etsi seminis vsus, & vires minimè silentio sint praterenda. Exprimitur ex semine oleum, quod non solum medicis, & seplariis expetitur: sed etiam pictoribus, lapicidis, lignarijs, camentarijs, ac ferrarijs fabris. Praestat & ad lucernarum vsum, quod diutius igni resistat, quam quod ex oliuis exprimitur. In medio

Lini confid.

Olei ex lini semine vires:

autem



Linum catharticum

II. LINVM SYLVESTRE.

III. LINVM SYLVESTRE angustifolium.



IV. XYLON SIVE GOS-
sipium.



diutius igni resistat, quam quod ex oliuis exprimitur. In medi-
co autem vsu neruorum cōuulsionibus peridoneum est. Quin-
etiam ad eorum emolliendas duritias, & ad ossium compage-
nes explicandas mirifice prodest. Perutile est omnibus sedis af-
fectibus, nempe hemorrhoidibus, condylomatibus, rimis ac do-
loribus: feminarum induratos locos emollit: infunditur vtili-
ter coli dolore vexatis. Nymphææ, aut rosarum stillatitia aqua
ablutum, ambustus auxiliatur. Sunt & qui hoc bibendum ma-
gno successu ijs exhibeant, qui laterali dolore vexantur & ne-
phriticis, verum recens sit oportet: quandoquidem inuetera-
tum, contracto rancore non modo excalfacit plusquam par sit,
sed & nauseam commouet. Ceterum quoniam (vt Plinius
inquit libro 19. capite primo) XYLON, siue Gossypium, quod
nos vulgari sermone Bambagia, alij Cotone appellant, inter
lini genera nonnulli annumerant, & cum eius, quod sciam,
nusquam meminerint Dioscorides, & Galenus, mihi sanè præ-
termittendum non fuit, quin de eo hic differerem. Planta est
Xylon non admodum magna, caule tamen ramis non paucis
referto, folijs [viriginis] triquetris [floribus luteis, v. bicote-
nus purpurascens] fructu [exigui mali magnitudine] bar-
bato. pontica nucus fere modo in quo semen concluditur [pipe-
re maius, in quo medulla est alba ac pinguis] vna cum mollis-
sima, ac cãdidissima lanugine, que m. turo iam fructu eximi-
tur, atq; netur ad multa vtilis. [Planta seritur, adolescitq; tri-
bus, aut quatuor mēsis, ad arbuscula proceritatem.] Excal-
facit eadē & siccatur. Vsta sistit sanguinis profluvia: & præser-
tim in vulneribus. Seminis medulla rufescentibus & difficulter
spirantibus mirifice auxiliatur: genituram quoq; auget. Oleū
e seminis medulla expressum lentigines, & ceteras cutis infec-
tiones delet. Est & plãta lino similis, tū folijs, tū caule, tū quo-
que florū ipsorū figura, quãquã aureo sint colore. Hãc a nobis in

Xyli mentio
& vires.

Linum sylue-
stre.

Linii vires ex
Gal.

uentã LINVM syluestre vocare libuit, nō solum, quod Linū facie referat, sed quod lini modo in stamina trahi possit. Captu-
res ab vna radice emittit caules, graciles, teretes, rectos, ac flexiles: folijs in caule vniuerso lini emulis, sed brevioribus ac fir-
mioribus. Flores in cacumine exeunt pusillis e ramulis, aurei lini florib. facie h. iud. ab similes. Nasctur spore in cõuallibus in-
culto solo. Herba ipsa vna cū florib. decocta, & cū receti butyro illita, tumores resoluit, & inflammationes lenit, quinetiã in-
duratos articulos emollit, addita althea radice & gallinaceo adipe, panosq; in in quibus sanat. Lini seminis vires memoria
prodidit

*prodest Gal. lib. 7. simpl. medic. sic rubens. Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeo sane excrementia humidi-
tate plenum est. Est vero etiam in primo ordine quodammodo calidum, ac humiditatis, & siccitatis quodammodo in medio
est situm. Quinetiam emollit, resoluit, concoquit & abstergit. Quod Graeci λίνον, Latini item Linum appellant: Arabes, Ba-
mbarichen, siue Bez erchet an: Itali, Lino: Germani, & ein vnd Flach: Hispani, Lino: Galli, Lin. Linum sylvestre, Graecis, Nomina.
λίνον ἢ λίνον: Itali, Lino saluatico: At Gossipium, Graecis, Ἐύλον Βάμβαξ, siue πάμβαξ, siue ἐπιπέρον. Officinis & Barba-
ra, Cotum, Bambax, seu Bambaxum: Itali, Bambagia, siue Cotone: Germanis, Baumwoll: Gallis Coron.*

Linum in Lolium mutari auctor est Theophrastus 3. de caus. plant. 21. cuius genera ratione loci na-
tality Plinius lib. 19. ca. 1. recensuit: in Phytopinace nostro licet nouem proposuerimus genera: nunc ta-
men & decimum tenuifolium violaceum agnoscimus, de quibus ex professo in vniuersali nostra histo-
ria ubi descriptionibus fidelissimis etiam icones adponemus. Lini enim duplicis tantum meminit
Marthiolus, satiuum & eius quod flore luteo est: adiecimus tamen & tenuifolium cum vulgatissimum sit. I.
Linum satiuum C. B. & Dodo. fol. Linum, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord in Diosc. Lac. Lonic. Lob. ob. Cast.
Cris. Lug. Linum Germanicum siue Satiuum, Trag. Linum satiuum vulgare caeruleum, Lob. icon. II. Linum
maritimum luteum. C. B. Linum sylvestre, Matth. Dod. fol. Cast. Casalp. Linum sylvestre primum, Lugd.
Linum marinum luteum Narbonense, Lob. III. Linum sylvestre angustifolium flore minore. C. B. Lina-
ria quarta species Trago: linum sylvestre tenuifolium, Lob. Tab. Linum sylvestre tertium, Clus. Pan.
Lugd. Linum sylvestre caeruleo flore, Camer. ad Matth. Flore est caeruleo, reperitur & albo. IV. Gossipi-
um duplex nouimus, alterum vulgatum, alterum arboreum, quod in horto, Doctoris Zuingeri vidimus
curus iconem historia nostra exhibebit: sed de vulgato quod Coto & Bombax Serapioni dicitur, Xylon.
Fuch. Matth. Dodo. gal. Ges hor. Lac. Lon. Gossipium, Matth. Lob. Dodo. fol. Cast. Lugd. Casalp. Taber.
Cam. d'ind. par. papas, Guilandino.

CICER DOMESTICVM.

CICER SYLVESTRE.



*Cicer satiuum
E p' sardos. S. lund*

CICER.

CAP. XC VII

Cicer satiuum aluo idoneum est, vrinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menses ac par-
tus expellit, lac auget. Cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas informi-
cationes: ad scabiem, vlcerà capitis manàtia, impetiginesque, item contra carcinomata, & vlcerà, quæ ca-
cothe vocantur, cum melle, & hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrunque cit vri-
nas, dato cum roremarino hydropticis, aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exul-
ceratam velicam, & renes. In verrucarum formicantium, pensiliumque genere, prima luna singulis gra-
nis singulas tangunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur.
Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acris, sed semine discrepat. Idem quod satiuum præstat.

In Cicerum genere habetur satiuum & sylvestre. Satiuum trium est generum, candidum, quod Columbinum vocatur, est &
rubeum Venæcum dictum, quod ad excitandam venerem mirifice præstat. Habetur item & nigrum ceteris minus,
quod arietinum appellant. Adolefcit ciceris planta cubitali altitudine, paulo procerior, folijs oblongis, sub-

Ciceris con- siderariet.

Ciceris hist- albi-

Ciceris vires
ex Gal.

Ciceris vires
ex Actio.

Ciceris vires
Matthiolo.

Cicer sylue-
stre.
Nomina.

albicantibus pilosis: caule lignoso, haud recto, ramis multis brachiato, floribus subpurpureis, e quibus siliquae prodeunt bre-
ues, sarctae, hirsutae, in mucronem acutum tenuem desinentes, in quibus ad summum cicera duo concluduntur. Radice nati-
tur lignosa, fibrosa, albe descendens. Solum amat pingue. Seritur vere appetente & maturescit aestate, quo etiam temper-
demetitur. crescentibus siliquis, nam si citius extirpetur, semen rugosum euadit. Horum meminit Gal. 1. de alim. fac. in quibus:
Cicer non minus quam faba inflationes excitat, sed valentius nutrit. Venerem stimulat, creditumque est etiam simul semen
generare: cuius gratia admissary, equis quidam ipsum exhibent. Inest praeterea Ciceribus facultas abstergendi maior, quam
fabis: adeo ut quaedam ex ipsis contractos in renibus calculos euidenter frangant, atque comminuant. Nigra autem sunt ea,
& exigua in Bithynia praecipue nascentia, Arietinaque, vocata. Huius ex aqua decoctum potare praestiterit: Vescuntur & vi-
rentibus adhuc ciceribus homines ante adeptam maturitatem, quemadmodum & fabis: haecenus Galenus. Nigrum voca-
ri Arietinum tradidit Plinius, quod arietum capita sua imagine representet. Theophrasto quoque Cicerum plu-
res sunt differentiae libro octavo capite quinto de hist. plan. ubi sic habet: Cicer & magnitudine, & sapore, & odore, &
forma, plerumque differentias ostendit, ut arietinum, & columbinum. Candida inter omnia dulcedine praestant. Cicerum sa-
cultates recensuit criannum Aetius, sic inquit: Cicer statuosum legumen, ac alimentosum, ventri accommodatum, vi-
nam ac menses euocat, & lac, & sperma copiose generat. Huius decoctum, praesertimque nigri, calculos renum frangit. Alie-
rum vero genus, quod Orobiaeum vocatur, attrahit, discutit, incidit, & abstergit. Iecur, lienem, & renes expurgat: scabiem,
& impetigines exterit: parotidas, ac testiculorum durities discutit: affertque ad ulcera maligna praesidium non penitentem:
haecenus Aetius. Cicerum farina ex intubi stillaritia aqua decocta, & iocineri illita tumores illius resoluit, & serpentium mor-
sibus medetur, praesertim, si cum Hyperici decocto misceatur: columbinum aqua maceratum, & deinde contusum, & illitum, pu-
rescentes gingiuas sanat. Paratur e cicerum rubeorum sesquilibra, additis quibusdam alijs, decoctum perquam optimum ad
vrina ardores, hoc modo: Sumito eorum sesquilibra, & in lib. 10. aqua die vna macerato, & ad tertias deoquito. Deinde per-
colato decocto addito dulcis radicis vnciam, item malua, & eius radice, graminis, & althaeae, agrimoniaeque, & cuscute ma-
nipulum, Sebestiae, & zizyphas decem, praeterea seminis melopeponis delibrati binas vncias, baccarum Helicacabi, & ber-
tensis Solani, & lithospermi, singulorum drachmas quatuor, osium dactylorum con tritorum drachmas tres: et permittuo
haec omnia feruere ad tertias: propinato quotidie mane vncias quatuor. Errant maxime Germani, qui Pisoum ius, potan-
dum exhibent ad abstergendum ventriculum, sibi persuadentes Pisum, columbinum esse cicer CICER syluestre, satiuo cice-
ri simillimum habetur, sed folia denticulata non sunt & siliquae minores, rotundioresque spectantur. Est planta in vniuer-
sum hirsutior, atque asperior. Nasitur sponte in agris: & locus incultis. Excalcificat & siccatur, & cum plus amarituumis habeat,
magis quam satiuum abstergit & aperit. Caterum syluestre omnibus sepe notum est, & si Plinio fides est adhibenda, ven-
trem subducit: sed statum, & intestinorum dolores gignit. Graecis ἐπίβυδος: Latinis, Cicer nominatur: Arabibus, Champ,
Hamos, seu Halhamos. Italis, Ceci. Germanis, Richern / Richererts / vnd Zisererbs: Hispanis, Grauanco: Galis, Cicer.
Cicer syluestre, Graecis ἐπίβυδος ἀγρίος: Italis, Ceci saluaticchi.

Cicer satiuum est & syluestre. Satiui differentias Theophrastus & Plinius referunt, siquidem habet-
mus floribus candidis, aut ex purpura rubescentibus, seminibus albis qui columbini, rubri qui arietini, a-
lijs venerei: & nigri qui, ut Galenus voluit, arietini, alijs Venerei dicuntur. Aliud quoddam Ciceris ora-
bae Theophrasti nomine aduersaria proposuere. Ciceris vero syluestris tres quoque occurrunt differen-
tia, alterum enim est folliculis rotundis, alterum folliculis oblongis, quod duplex existit. Hic de priori ser-
mo, quod dicitur Cicer syluestre folliculis rotundis. C. B. Cicer syluestre, Dodo. gal. Matth. Cast. Lugd. Ci-
cer syluestre herbariorum Lob. Cicer syluestre primum, Dodo. fol. & Taber: quod fructu etiam maiore &
oblongiore reperitur monente D. Cam.

L. κύαμος.

FABA.

CAP. XCVIII.

a Omnia exē
κύαμος ἑλλη-
νικός. i. faba
gizca.



Fabarū consi.
& histona.

Faba inflationem excitat, agrē concoquitur, tumul-
tuosa somnia facit, tulsu confert, carnem gignit, me-
dia calidi, frigidiq; natura. Decocta in polca, & cum suo
cortice esitata, dysenterias, & coeliacorum profusua si-
stit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio
leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abij-
ciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maiorem-
que flatu parit. Lomentum eius & per se, & cum polen-
ta illitum, inflammationes, quas vulnus excitauit, mi-
gat: cicatrices concolores facit: turgentes grumoso la-
cte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiu-
uar: lac restinguit: furunculos, sugillata, parotidasque cum
faeni graeci farina, & melle discutit: cum rosa autem, thu-
re, & oui candido, procidentes oculos, tumores, vasque
reprimat: subactum vino, suffusiones, & ictus oculorum
recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fra-
xiones, fronti illinitur: decocta in vino testium colle-
ctiones sanat: quod tardius pubes erumpat pueris, imo
ventri illinitur: vitiliginem purgat. Fabarum cortice illi-
ti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt
& minus alimenti capessunt: cum polenta, scisso alumi-
ne, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutunt.
Decocto earum lana inficiuntur. Faba dempto cortice
in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, im-
poni solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concu-
tatis: namque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba, caule exit quadrangulo, obliquo, geniculis interspa-
mani fragiliq; alijs multu, e quibus flores plures ex uno pab-

Vicia faba
Linn.

color acerrimam exant, nō quidem vtrinq, sed vno tantum latere seriatim appensi, versicolores, hirti, ac cristati. Prodeunt
 i caule rami dispari exortu, e quibus folia emergunt pinguis, vtrinq, quaterni: e ramusculorum cacuminibus capreoli ex-
 erunt singulares, sed adeo tenues, vt facile perdantur. Siliquas primas edit vs floribus, qui in inferiori caulis parte habentur,
 cetera leguminibus maiores, crassiores, carnosioresq, apice in acutum desinente, quibus faba concluduntur, forma, colore
 & magnitudine differentes. Nam alia magna, alia parua, alia subrotunda, alia compressa, & alia quidem colore sunt al-
 bicante, alia subrutilo, alia subnigro. Planta tota vnica nititur radice, tenuibus adnatis fibris. Seritur in agris ceterorum
 leguminum modo. Gaudet irrigari pluua, dum floret, deflorescens vero contra, tunc enim nisi exiguas desiderat aquas. Se-
 ritur a nonnullis solum ad arua impinguanda: namq, cum florere incipit, totaq, succosa est planta, illam arant agricola,
 qua subinde sepulta contabescens, latissimum, pinguisimumq, agrum reddit. Fabalium caulium, & siliquarum cinis, ad
 10 caedentes, & veterū neruorum dolores, cum vetere axūgia illitus, prodest. Faba, vt memorie prodidit Gal. li. 7. simpl. medic. Fabarum vi-
 res ex Gal.
 in excitando, & refrigerando secundū vtrumq, ad mediū temperamentū propinquissimè accedunt. Caro Fabae paulū quid
 abstergentis facultatis cōtinet, sicut cortex nō nihil adstringētis. Idcirco medicorū nonnulli totā fabam cū oxycrato decoctam
 dysentericis, celiaciis, & vomentibus, quos ἐμετικὰ; nominant, exhibuerunt. Porro vt eduliū, flatulenta est, ac coctū diffici-
 li quid aliud: excreationibus ex thorace, & pulmone idonea: vt medicamentum verò, foris imposita, sine molestia de-
 ficat. In podagricis ea saepenumero vsi sumus ex aqua decocta, & deinde adipe suillo admista. Ad neruorum tum contusio-
 nes, tum vulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos, quos exictu iam phlegmone occupauerat, cum
 polenta. Sed & testium, & mammarum aptum est cataplasma. Nam ha partes cū phlegmone tenentur, moderatè re-
 frigerant, maxime cū mamma ex lacte ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoq, ab eo cataplasmate
 extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Et libro primo de aliment. fa-
 cultatibus, sic inquit: Inflat is cibus quocunq, modo apparetur, nec per quamuis longam decoctionem id vitij potest amitte-
 re, quod ptisana minimè negatum est, deponit enim per illam quicquid habet flatulenti. Qui porro affectus singulos cibos
 sequi natos, animaduertere, & mente consequi volet, quandam totius corporis tensionem, quasi a flatulento spiritu per sen-
 tisset, maximeq, qui ad huiusmodi esculentum non fuerit assuefactus, aut ipsum minus recte coctum assumpserit. Habent
 autem faba non densam, nec grauem, sed fungosam, leuemq, substantiam: qua tamen ipsa nonnihil absterforia possidet fa-
 cultatis, similiter ptisana. Etenim manifeste fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur. Quod intelligentes mango-
 nes, ac muliercula, in balneis quotidie hac vtuntur, velut alij nitro atq, aphronitro, & in uniuersum vs, qua abstergent. Illi-
 vant praeterea & faciem hac, quemadmodum ptisana: nam qua in summa cute eminent lentes, exterit, & maculas ve-
 lut ex sole contractas. Huius ergo facultatis nomine in alui quidem transitu diu cunctatur, sicut qua glutinosa, & crassi

10 II. FABAE SYLVESTRIS.



succi sunt sine vlla abstergendi facultate, qualia halicam, iragum, similaginem, & amyllum, esse perhibuimus. Cū
 porro ferculum ex fresca faba paratum, quod ἔτρος Graeci
 nuncupant, flatibus non careat, multo amplius integra faba
 inflabit cibus: quanquam fricta (nam hoc modo aliquando
 pro bellarijs sumunt) flatum deponit, sed tum concoctū, per-
 difficultis, tardog, descensu incommodior redditur, & crassi
 succi alimentum in corpus diffundit. Quod si viridis, immat-
 20 tura, nondumq, arefacta edatur, commune omnium fructuum,
 quos ante perfectam maturitatem ingerimus, rationem ob-
 tinens, corpori humidiorum alimoniam exhibebit, ac proin-
 de maiorem excrementorum vim non tantum in vjs intesti-
 norum, sed etiam per vniuersum corporis habitum producet.
 Merito igitur minus quoq, nutriet, sed promptius deficiet.
 Plerique autem hominum non crudas solas fabas comedentes,
 vna eas cum suilla carne decoquūt, veluti olera consueue-
 runt, ruri verò etiam cum caprina, & ouilla. Alij fabas in-
 flare sentientes, capas admiscunt, cū in ollis pulmentum
 ex illis struunt: sunt qui non simul elixatas, sed cum pulmen-
 to capas ingerant crudas. In omnibus nāq, dapibus quicquid
 flatuosum continetur, per calfacientia, & extenuantia cor-
 rigi comparatum est. Est etiam planta, cuius hic imaginem
 appingi curauimus, quam SYLVESTREM FABAM appel-
 30 lare libuit, quod cum domestica non parua habeat simili-
 tudinē. Crescit hac in Apulia, vt quidā mihi retulerūt, pas-
 sim in campestribus humi repens, caulibus quadrangulis sese
 inuicem implicantibus, folio domestica faba, floribus in pur-
 pura albicantibus, e quibus siliqua oriuntur, lupinorum mo-
 do compressa, fabarum longè minores, in quibus semen conti-
 netur rotundum, fabarum sapore. Sunt qui dicant hanc eas-
 dem cum domestica habere vires. Sunt qui hanc plantam ve-
 lint Galeno libro primo de alimentorum facultatibus ARA-
 CVM vocari domesticum, qua in re forte non malè senti-

Fabae sylue-
 stris historia.


unt, nec volo ego quoq, horum sententia contradicere: etsi ego syluestrem fabam eam vocauerim, ob similitudinem, & pra-
 ferim, cum alia sit planta, cuius hic imaginem quoque expressimus, qua Arachum secundo loco a Galeno descriptum per
 omnia referat. Dicant alij rei plantaria studiosi suam quoq, sententiam, quam facile ex Galeni verbis elicere poterunt, qui
 de Aracu siue Arachis ita scriptum reliquit: Postremam nominis Aracorum syllabam scriptam per, e, in Aristophanis Helca-
 40 dibus inuenimus, vbi inquit: Aracos Triticum, ptisanam, alicam, zeam, toicum, similaginem. Semen hoc cicercula semi-
 ni est ad simile, fueruntq, nonnulli qui putarunt ipsum non esse generis a cicercula diuersi, quandoquidem & vsus ipsius o-
 mnium, & facultas, cicerculae facultati est ad simile, nisi quod Araci sunt duriores, minusq, facile elixantur: qua causa etiam
 est, cur cicercula concocta sint difficiliore. Apud nos autem syluestre quoddam, rotundum, ac durum, eruoq, exilius, in fructi-
 bus
 50
 60

Araci hist.
 Galenus de
 Araco.

Ff
 bus

Theophrast.
de Azaco.

III. ARACVS NIGER.



Nomina.

bus cerealium repertum, quod Arachum nominant, non per, e, sed per ch, ultimam syllabam proferentes: proijciunt ipsum, uti & semen securidaca, seligentes. Hæc ille. Meminit quoque Araci Theophrastus lib. 8. cap. 8. de historia plant. sic inquit: Nam & Avena magis in hordeo exire videtur, & in lente Aracum, res scabra, & dura. Id quod in planta, quam pro sylvestri Aracho appinximus, quis facile videre potest. ARACVS humi repit, caule anguloso, flexili, subaspero, cicercula hæud absmile: folia illi sunt oblonga, caulem infernè ambientia, qua summo cacumine clauiculas tenues fundunt: flores edit non magnos erui serè modo, è quibus siliqua oriuntur pisi minores, in quibus semen est asperum, rotundum, pullo colore. Nascitur inter segetes, campestribus locis. Abstergit, resoluit, deficcac & expurgat. Verum in altera nullam video ego Cicercula cognationem, quo fit, ut eam fabam sylvestrem appellauerim. Κύαμος sic Græcis, Latinis verd Fabam vocatur: Arabibus, Hachille, Haballe, sine Bachale: Italis, Faua: Germanis, Bonen: Hispanis, Hauas: Gallis, Fane. Faba sylvestris, Græcis, κύαμος ἀγρίος: Italis, Fana saluatica. Aracum, Græcis ἀρακός: Italis, Araco.

Faba κύαμος à feracitate dicta, & κύαμος ἑλλεινός ad differentiã Egyptiacã, semè est inter legumina maximũ & quo maius, eò magis in longitudinè depressum: minora autem rotundiora sunt, quæ in siliquis cõtinguntur ut plurimum ternæ ad summum, & rarissimè quinz, quæ ut plurimum candidæ, sunt nigra & ex rubicundo colore purpurascens: & flores aut candidi lituris nigris conspicui (quas lugubres dicunt, ideoque ab eorum usu aliqui abstinent) aut ex purpura nigrescentes. Est autem


tem satiuua & sylvestris: est & purgatrix, quam alij ad Phaseolos referre malunt. Satiua est maior & minor. Faba satiuua maior. C. B. Fabulum Gellio & Festo: Faba, Brunf. Fuch. Matth. Cord. in Diosc. Ges. hor. Lac. Lon. Cast. Cæsalp. Tab. Faba vulgaris, Trago, Fuch. Cord. in hist. Faba maior recentiorum, Lob. Faba satiuua, Lugd. Phaselus satiuus, Faba non est, Dodo. gal. Bona siue Phaselus maior. Dodo. fol. II. Faba sylvestris Matth. Cast. Lugd. Tab. Phaselus sylvestris & niger, fortè Faba, Dodo. gal. Ges. hort. Sylvestris Græcorum Faba, Lob. Bona sylvestris, Dodo. fol. Pifa nigra, Cam. Aracus Fuch. dicebatur. III. Aracus & Aracus niger Matth. Cast. Cam. Eruilia sylvestris, Dodo. gal. & fol. Ochrus siue Eruila, Lob. Cicer eruinum quorundam, Lugd. semen colore est subluteo, aut nigro.

Κύαμος αἰγύπτιος.

FABA ÆGYPTIA.

CAP. XCIX

I. FABA ÆGYPTIA.



Agyptia Faba, quam aliqui Ponticam vocant, in Ægypto plurima prouenit: in Asia etiam, Ciliaciaq; lacubus inuenitur. Folia habet ampla, et etiam si ad arborum frondes comparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine: & ubi flore exiit, fert folliculos vespartum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullæ modo, prominet. Cibotion, aut Cibotion, id est arculam, ideo nominant, quoniam seratur ipsa humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur arundine crassiore, quæ cruda coctæue estur: ei Colocasia nomen est. Faba virens manditur, & exiccata nigrescit: vulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilem: dysentericis, celiacisque prodest, in parso polentæ vice, lomento: datur quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti si terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum, & cum rosacco coctum instilletur.

Sunt qui Ægyptiam fabam sua radice appellatione Colocasia nuncupent. Hanc primum Tridenti anno 1534. ostendit mihi Odoardus Polonus, qui alias quoq; plantas, & eas quidem raras, secum deferebat ex Syria & Ægypto. Caserio

Ægyptiæ fabæ confid.

7. Melampyrum
spec. inueni
Plant.

Ceterum eos equidē in errore versari crediderim, qui putant plantam illam ex Aegypto allatam, qua Ari speciem representat, esse fabam Aegyptiam. Siquidem haec, nec caulem, nec flores, nec fabas edit, nec radice nititur crassissima, arundinacea, nec spinis subborrens, vt Theophrastus inquit. Ceterum explodenda videtur Anguillarij sententia, vbi probare contendit AEGYPTIVM ARVM legitimam esse Colocasiam.

II. ARVM AEGYPTIVM.

Siquidem ipse, non aliam ob causam Ari huiusce plantam caule viduam perpetuū esse censet, quam quod illarum regionum incolae quotannis radices effodiant ad esum, nec permittant eam ad suam peruenire frugem. Sed quam friuolo nitatur argumento, ipsamet planta palam facit, cum neque in Italia pluribus annis ad senectutem vsque in scilicet, & viridarijs educata, vsquam caulem ediderit. Deinde quis crediderit vnquam effodi has plantas, ijs in regionibus adeo diligenter, vt alicubi quandoque aliqua non remanserit? Absurdum quidem hoc est, & minime credendum. Ideoq; cum ijs consentiam, qui Ari speciem esse putant, siquidem cum folio, tum radice Arum imitatur, vt ex eius imagine hic expressa, quam mihi dono dedit Augerius de Busbecke, vir sanè clarus, ex Constantinopoli allatam, quis certior fieri poterit. Meminit huius Theophrastus lib. 4. cap. 10. de plantarum historia, vbi ita scribit: Faba Aegyptia in paludibus, stagnisq; exit. Caulis eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato. Rimas intrinsecus habet tendentes per totum, lili modo. Caput in cacumine orbiculatum, vesparum sauo non absimile. Inque singulis cellis singula faba continentur, paulo super id eminentes, multitudine plurimum terdena. Flos papauere duplo maior, colore roseus, in plenum caput. Super aquam folia ad singulas fabas amplexa exeunt. Fabam quamq; conterenti amarū illud, ex quo pilula fit, inflexū patescit: fructus ita se habet. Radix illi crassissima, arundine plenior, rimas similiter atq; caulis habens: manditur & cruda, & elixa, & assa: eoq; cibo, qui incolunt paludes, vtuntur. Nascitur itaq; sponte vel plurima: ceterum & seritur in limo paleis largè admixtis, vt descendat, incorruptaq; maneat, sicque faba faciunt. Si autem semel apprehenderit, perpetuū manet. Radix enim valida est, nec procul arundinum stirpibus, verum spinis subborrens. Quamobrem eam crocodilus refugit, ne occurrens oculo offendatur, quoniam acutè non videt. Nascitur haec etiam in Syria, Ciliciaque: haecenus Theophrastus. Hanc amplissima emittere folia tradidit Plinius lib. 21. cap. 15. vbi sic inquit: In Aegypto nobis Colocasia, quam cyamon vocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule, cum coctus est, araneoso in mandendo: thyrso autem, qui inter folia emicat, spectabilis: folijs latissimis, etiam si ad arbores comparentur, ad similitudinem eorum, quae peruenat in nostris omnibus vocamus. Adeoque Nili sui dotibus gaudent, vt implexis Colocasia folijs, in variam speciem vasorum, potare gratissimum habeant. Seritur iam haec in Italia: haec Plinius. Aegyptia faba (vt Galenus auctor est libro primo de alimen.) sicuti nostratè magnitudine logè praecellit, ita & naturā humidiorē, magisq; excrementitiā sortita est.

Anguillarij opinio explodenda volētis Aegyptiū Arū esse Colocasiam.

Aegyptiā fabae histor. ex Theophr.

Colocasia ex Plinio.

Galenus de Aegyptia faba. Nomina.



† Graeci codices hoc loco habent ως γαλερί, id est, instar galeri. Quae autem horum loco assert Ruellius ex Plinio sumpsit loco citato. Vbi verbis, quae illa sequuntur, rectius forte hunc Dioscoridis locum interpretari videtur.

Fabam Aegyptiam & Arum Aegyptium, diuersas fecit plantas Marthiolus, alij verò non distinguunt. Arum Aegyptium seu Colocasia, saepius vidimus, at Fabā Aegyptiā, si modò diuersa sit, nunquam vidimus, quam vtinam aliquis ad nos mitteret pro vniuersali historia nostra, eius enim, vt par esset, honorifica fieret mentio. I. Faba Aegyptia Matth. Lacu. Lugd. Cast. cui etiam Colocasia dicitur, Colocasia Lon. II. Aron maximum Aegyptium, Aron cui folium cauium Theophrasti, & fortè faba Aegyptia Dioscoridis, cuius radicem Colocasiam dici monet. C. B. Arum Aegyptium, Matth. Ges. hor. Lob. in icon. Dod. fol. Cast. Lugd. Cam. Aron magnum Colocasia vulgo, Pampina Paradyfi Siciliae incolis, Cæsalp. Faba Aegyptia, Cord. in Diosc. Colocasia Bellon. Ges. hort. Clus. Hisp. Lob. obser. Lugd. Culcas, faba Aegyptia, Alpini. Hanc nec fructum nec florem ferre, scribit Bellonius, Lugdunensis verò cum flore pingit, quem tamen haecenus videre non licuit.

Θαρός.

LENS.

CAP C.

Ens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, & grè concoquitur, stomachum malè habet, eumq; & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Praestat in cibo, quae facillimè coquitur, nihil atri in macera-

Ff 1 macera-

de antea quidem melancholicis, ac siccantibus cibis abstinendum: hyeme vero eis utendum: uti sane in estate hume-
 scantibus, & refrigerantibus in vere medijs temperamenti, medijsq; facultatis epulas offerendum. Est porro mediorum non
 una, nec simplex species: quaedam enim huiusmodi sunt, quoniam cum extremis nihil habent commune: quaedam ex duo-
 rum contrariorum a quo intervallo a medio distantium mixtione sunt mediocritatem adeptae: ut si quis iuxta id, quod paulo
 ante dixi, prisanam lentis commisceat. Sic & lentophacen, quae ex beta, & lente nomen apud Gracos inuenit, Heraclides
 Tarentinus non sanis modo, verum etiam laborantibus exhibebat, est enim & hoc ex pugnantibus compositum edulium: qua-
 obrem etiam tardius, quam beta, citius vero, quam lentes per aluum descendit. Est & illud perspicuum, huius succum in
 corpus dispersitum, ex amborum virtute, lentis videlicet, ac beta, esse permixtum: haecenus Galenus. Ex cuius verbis facile
 colligi potest. Lentes in frequenti ciborum usu minimè esse recipiendas, praeterquam ab ijs, quibus morbi alicuius ratione, ut
 medicamentis potius, quam ut cibis conueniant. *Phasolus* Gracis est, quae Lens Latinis: Hades, Arabibus: Lenticchia, & Lente,
 Italis: Linsen: Germanis: Lenteyas, Hispanis: Lenticilla, Gallis.

Nomina

Lentium genera duo habemus, maius quod album, minus vero, aliud cinereo, aliud subruffo colo-
 re, aliud colore ex luteo pallido. Lentis maioris figura adposita.

Phasiolus

PHASIOLI.

CAP. CL.

Phasioli inflant, spiritus cient, aegre coquantur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

PHASIOLI.

Phasioli sunt in Italia vulgares, & in hortis, ac aruis frequen-
 tes. Diuersa eorum habentur genera, varijs coloribus distincta,
 nam & candidi, & rubescentes, & melini, ac diuersis resper-
 maculis reperiuntur. Quos superiori quoq; aetate cognitos fuisse
 putauerim: etsi nonnulli eos nuper in Italia venisse existiment.
 Candidi, quibus granum cateris minus est, caterorum legumi-
 num more, in aruis feruntur: at rubescentes, melini, ac varij semi-
 nantur in hortis alijsue locis, vbi umbra aestiua fuerit opus. Si-
 quidem praeterquam quod fructum suo tempore demetendum
 proferunt, suis etiam inuolucris, ac sequaci foliorum, clauicula-
 rumq; reptatu, testudines, attegias, mapalia, tuguria, cameras,
 pergulas, scenas, ac tabernacula, è lignis cancellatim fabricata o-
 pacant, ac veluti topiario opere contexunt: solaresq; radios inhi-
 bent, non secus quam vitis, lupus salictarius, bryonia, colocynthis,
 clematis, periclymenum, & stirpium id genus, quae arbores & se-
 pes scandunt, perreptant, implicant, ac conuestiunt. Quo fit, ut
 crediderim ego, illos a veritate haudquaquam desciscere, qui di-
 xerint, hoc Phasolorum genus hortensem esse simlacem, hoc et-
 iam libro à Dioscoride descriptum: quippe quod illi maximè re-
 spondeat, ut in sequentibus dicitur. Quamobrem longe aberrasse
 videtur Marcellus, in carpendo Hermolao tantopere auidus, cum
 dixerit sibi parum verisimile videri ad eam altitudinem, & fo-
 liorum copiam posse legumen aliquod augeri, ut scenas, & taber-
 nacula vestiens inumbret. Quandoquidem non modo huic refra-
 gatur Dioscorides: sed & ipse simlacis numerosus plantarum
 proventus, quae in quam plurimis hortis, ac viridarijs longissi-
 mos scandunt palos, & cancellata tecta conuestiunt. Cateram
 nec eos quidem hallucinari putauerim, qui pro certo asseruerint,
 Phasiolos supradictis coloribus infectos, quos equidem nihil ab
 hortensi simlace differre existimo, Dolichos esse, quorum memi-

Phasiolorum
 confid.
 Candidi, Ru-
 bescentes, Me-
 lini, Varij.


Marcelli et-
 cor.

Rouigliosa.

Phasiolorum
 descriptio.

Phasiolorum vi-
 res.

Fucus ad mti-
 llerum orna-
 tum.




nie Theophrastus lib. 8. cap. 3. de plantarum historia: & Galenus libro primo de facultate alimentorum: & ipsum secutus
 Paulus. Quippe quoniam Dolichi (ut adiuuante Deo infra in simlacis hortensis mentione dicemus) non sunt illud pisorum
 genus, quod Ausonius vulgo dicitur Rouiglione, Tridentinus vero Arabeia, ut Manardo Ferrariensi placet. Quandoquidem
 hanc sub Ochri nomine, tam Galenus, quam Paulus describere, ut eo, quem modo citauimus loco patebit. Porro in hoc pra-
 senti capite Dioscorides de candidis tantum, ac vulgaribus phasiolis differuit, non de eruilia, Arabeia vulgo vocata: in se-
 quentibus vero capite de hortensi simlace, eorum mentionem fecit, qui vel rubentes, vel lutei, vel versicolores enascuntur.
 Albi itaq; & magis vulgares, qui feruntur passim in campis, mense Maio & quandoque post messem sine pedamento per se
 subsistunt, sed in latum sese pandunt, folijs hederaceis, maioribus tamen & mollioribus, venosis, ternis ex vno pediculo pro-
 deuntibus: flores emittit candidos piso minores, è quibus palmaria cornula prodeunt, teretia, & in acutum desinentia, pri-
 mo quidem exortu viridia, & per maturitatem albicantia. In his semina plura, quae phasiolos appellamus, continentur, fa-
 cie quadrupedum renibus similia, alba, praeter umbilicum, qui tantum in ijs nigricat. Phasioli excalfaciunt, & humectant
 ordine primo. In cibum sumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, semen tamen generant, & venerem sollicitant, pra-
 fertimq; vbi longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur: at qui id valentius praestant, si lacte bubulo pingui decoquan-
 tur quousq; rumpantur. Redduntur in cibis innocentiores, si cum sinapi vel lari semine edantur. Tumultuosa praeterea ac
 terrefica faciunt somnia, perinde ac lentes. Cornicula dum tenerrima sunt, elixantur, & in acetarijs denotantur, addito pi-
 pere, gustu non ingrato: Eadem prius elixa, & farina circumlita, & deinde in oleo feruenti aut butyro frigida, addito pipere,
 & vna acerba succo, Italis quoq; expetuntur in cibum. Praestant peculi.riter propria sua ipsius facultate ad sanandum e-
 quorum morsus, si dentib; attriti crudo vulnere illinantur. Parant quoq; è phasiolis muliebrem fucum hoc modo: Sumunt
 phasiolorum alborum, mica panis triticeo albisimi, singulorum libram, Cucurbitam longam, teneram, virentemq; vnam
 dissecta prius cucurbita macerata simul omnia ex lacte caprino nocte vna, deinde addunt seminum melopeponu vncias quin-
 que, nucleorum persicorum mundatorum vnc. 3. nucleorum pineorum delibatorum selibram: Conterunt per se omnia in
 lapideo

in lapideo mortario, & deinde addant pulum columbinum domesticum vna cum plumis in particulas dissectum, abieci-
tantum intestinis, & omnibus simul mistis, ex vitreo organo, ad hoc parato, in vase feruentis aque collocato, aquam distil-
lant, & subinde diligenter custodiunt. Siquidem huiusce aque lotionem nitorem faciei conciliant, & cuti molissimum ad-
dant lauorem. Ceterum cum phasioli pisa mihi in mentem reuocauerint, & nihil de eis meminere Diosc. pretermittere
Pisorum hist. quidem non potui, quin de eis quoque, differerem. PISVM itaq; caulibus fistulosis ramosisque, capiteolis multis & ramosum
summitatibus, prodeuntibus, folio numerofo, longiusculo, et apiculato, ac subpingui: siliqua cylindracea, rotando, & cauli-

PISVM MAIVS.

PISVM MINVS.



Pisorum ge-
nera duo.

Quorundam
opi. refutata.

Tragi error,
Pisum cicer
arietinum ce-
lentis.
Pisorum vi-
tes ex Gal.

Nomina.

do semine albi ciceris magnitudine. Florem edit papilionis animalis figura, circa umbilicum purpureum, quandoq; in vni-
uersum candidum: radice imbecilla: Grana in siliquis sese inuicem stipant, vt in vicia, & eruo. Seritur vere, & aestate de-
metitur. Duo eius sunt genera, alterum maius, alterum minus. Maius pedamento gaudet, quo fit, vt Agricola arborum ra-
mos illi adiungant. Facilem & solutam terram desiderat, & in apricis feri. Minus humi accumbit, gracilius omnibus no-
partibus nec adeo in cibo gratum. Duum hoc est generum, album, & cinereum, quod Eruiliam vocat quidam: Ananienjes,
& cetera Tridentina rura, Arabeia vernaculo sermone appellant: alij Rouiglionem. Seritur, vt maius, aprico loco, solo probe
culto ac soluto, in qualitatibus omnibus nihil prorsus a maiori differt. Exiccant pisa fabarum modo, remissius tamen. Sunt
qui scribant Pisorum iure hausto purgari puerperas, & lactis copia auferri, aurigmosos sanari, & aqua intercenti succurri, sed
proculdubio decipiuntur, quod hac haud quaquam prestare possit medicamentum, quod refrigeret, & siccet. Verum erran-
di ansam ceteris praeiuit Tragus, quippe qui perperam putarit Pisum cicer esse Arietinum, cui ea inest facultas. At quantum
ab Arietino ciceris distet Pisum, facile quisquam conijcere poterit ex his, qua superius in Cicere diximus. Cicer enim Arieti-
num nihil ab alijs ciceribus differt, nisi colore, cetera similia sunt. Ideoq; errorem hunc debent diligenter vitare Germani,
qui suis puerperis pisorum ius propinant, quin etiam is qui sumpserunt purgatiuum medicamentum, extergendi ventricu-
li gratia. Nulla enim pisis inest abstersoria facultas, vt Gal. inquit lib. 1. de alim. fac. his verbis: Pisa tota substantia cum fabis
quandam habent similitudinem, eodemq; cum fabis modo sumuntur. His duabus tamen rebus ab eis discrepant, tum quod
non aequae ac fabae sunt statulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habent, ideoq; segnius quam illa per aluum
secedunt. Vbi faba non sit ad manus, pisum eius poterit esse succedaneum, praeterquam is in morbis, qui abstersione opus ha-
bent. Ita phasiolus Graece, vt etiam Phasioli Latine dicuntur: Italicè, Fagioli. Hispanicè, Fasiolos: Gallis, Fasiolis. Pisum,
Graecis πικρόν, Italis Pisello & Piso. Germanis, Erbis, Pisum minus Graecis, πικρόν μικρόν. Italis, Pisello minore. Gal. Pois.

Pisa a Pisa loco, vbi olim copiose nascebantur: quae diuersorum generum sunt, maiora quae hortensia, cuius
fructus dum virides rotundi, reficcati, angulosi fiunt: colore candido alias sordido: haecq; duplicia, vel sine
folliculis comeduntur, vel simul cum folliculis & leptoloba dicuntur: sunt quadrata: sunt minora, quae
vel hortensia & ramis affixis in altum scandunt, & ramulare pisum dicitur: vel in agris seruntur, & hami
serpunt, & sunt vel alba (quae maiora & minora) vel virida, vel caerulea quae rariora, vel ruffa, quae nostris
cinerea dicuntur. Est pisum proliferum, vbi plures siliquae simul iunguntur: sunt pisa Americana rubrae
sunt & syluestria, de quibus omnibus in historia.

O' paber.

ERVVM.

CAP. CII.

Conclusa no
leg. Oub.

ERuum patens frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habens: e quibus fo-
rina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Eruum capiti onerosum est: aluum est turbans
langui-

Eruium per urinam extrahit: elixo boues saginantur.] Parandæ farinae ratio hæc est. Vberiora grana candida que deliguntur, permiscendo que aqua resperguntur, donec sufficienter combibant: postea torrentur, vique dum hians cortex disrumpatur: molita que, farinario cribro incernuntur: postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est: urinam ciet: meliorem colorem efficit: sanguinem per vesicam, aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo, aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat: lentigines, & vitia cutis in facie, & maculas, totum que corpus emēdat: nomas, gangranas, duritias que; serpere non patitur: manuum duritias emollit: atra vlcera, quæ theriomata vocat, fauēque; emarginat: carbunculos rumpit: cum vino subacta illitu moribus viperarum, canum, hominum que medetur: urinae difficultates, tenesmos que; ex aceto mitigat. Eruium tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptum que conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore sanat fouendo.

I. OROBUS.

II. OROBUS CRETICVS.



Erui officina, Græcorum more. Orobus appellat: Planta itaque est eruium sarmentosa, foliosa, humi procumbens, caulibus ac ramis multis sese implicantibus, foliis paruis, longiusculis, lute minoribus, pluribus ex vno pediculo vixit- que pari exortu per interualla prodeuntib. vno in cacumine permanente. Flores edit paruos, ipsos que subpurpurascētes, & aliquando candidantes: Siliquam gerit Pisi ferè similem, sed breuiorem, & graciliorem, in qua semen rotundum concluditur, pressa, strictaue inter granum & granum siliqua. Duum est generum, candidum, & rufum. Gal. tertium quoque ad- didit, nempe pallidum, inter priora medium. Non diu est, quod legitimum habetur, & feritur iam vbi que, in Italia. Alterum quoque vidimus erui genus, quod Creticum vocant, nostrati ferè simile, sed minusiore semine, & siliquis gracilioribus. Porro Brasauolus credidit Eruiam, qua Theophrasto, Galeno, ac Paulo, ochros appellatur, legitimum esse Eruium, non- minis vicinitate fortasse deceptus. Qua in re Fuchsius quoque hallucinatus deprehenditur, quod suo de plantarum historia volumine Cicercula vulgò vocatam, satiuum Eruium esse existimauerit: etsi cicerculam omnes rei herbaria periti Galeno- labryram appellari non dubitent. In cicercula enim, vt periculum facientibus clarissimum est, haudquaquam ea reperiū- tur facultates, quibus pollere Eruium tradidit Dioscorides. Quandoquidem prater id, quod omni prorsus amaritudinis- vacat, largius est ita nunquam sanguinem per vesicam & aluum cum torminibus elicit, vt de orobo fatetur Dioscorides, & Galenus: ex quo planè constat tam Brasauolum, quam Fuchsinum, vtriusque pace, hac in re deceptos esse. Sed ignoran- dam non est, quod etsi Eruium ab agricolis seratur, habetur tamen & inter sponte nascentia: namque & per se inter segetes- frequens oritur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter vicia species annumerat. Animaduertendū prater ea est, quod- quancumque ad Eruiam farinam conficiendam eligit Dioscorides candidius Erui semen: Gal. rament lib. 1. de fac. alim. can- didū pallido, ac rufescente, longè minus prestare scribit. Quapropter Brasauolus Galeni rationē mittimè habuisse videtur, cum sibi ex Dioscoridis tantum sententia persuaserit, album erui semen in medicamentorū vsu tam rufum, quā pallidum- vitiis antecellere. Erui farina melle excepta nō recreantur, quorum pulmones crassis excrementis redundant: expectorat- a. ex thorace id omne, quod inhaerit. Lienē minuit Eruium, à ieiunis deuoratū. Inguinū bubones resoluit, ex melle illitū. Virides eius siliqua priusquam indurescant, cum suo caule foliis que, cōtrita illit a que, nigros faciunt capillos. Erui farina in- Tberiacam quoque, venit: nam sine ea parari nequeunt Viperei pastilli. Erui vires prodidit Gal. lib. 8. simp. med. ita inquitens. Orobus desiccatur quidem excessu secundo intenso, calfacit verò primo. Porro quatenus amaritudinis est particeps, eatenus- incidit, extergit, atque obstructions expedit. Caterum si sumatur copiosè, sanguinem per urinas euocat. Et libro 1. de ali- mentorū facultat. ait: Boues apud nos, vt apud alias plerasque gentes, Erui in aqua edulcato pascuntur: hominum tibi- prorsus

Erui con-
Erui duplex
Eruium Cre-
ticum:
Brasauoli la-
plis, Ochra,
Eruium cen-
sentis.
Erui farina:
Erui vires et
Galeno.

III LUPINVS COERVLEO
flore angustifolius.



omnes strangulet herbas, qua illi adhaerentur. Floret inprimis circa medium caulem. Seruntur in agris sterili solo in Hetruria Lupini, non modo ad alimentum vsum, sed ad agros impinguandos. Caterum prater satiuos Lupinos, syluestrium in Hetruria innumera exoriuntur planta, qua Maio mense in campestribus visuntur, floribus roseo colore rufescentibus. Satiui dulcorantur in Italia, ibiq; frequenter eduntur cum sale. Excalfacit, & siccit manifeste, abstergit, aperit, digerit, resoluit & attenuat. Lupinus (vt scriptum reliquit Galenus lib. 1. de alimentorum facultatibus) multi vsus legumen censetur. Elixus enim, ac deinde in aqua dulci, donec omnem sibi ingenitam exuat insuauitatem, commadefactus, ita editur cum garo, ac oxycaro, vel sine his etiam, sale modico conditus: non velut hordeum, & alia multifariam instructa. Lupini dura, ac terrefris substantia est: quocirca necessario concoctioni repugnat, & crassum gignit succum: ex quo non probe in venis confecto, crudus proprie appellatus succus aceruatur. Et lib. 6. simpl. medic. sic inquit: Lupinus editur coctus, multis ante diebus in maceratione in aqua amaritudinem deponens: fitq; tunc nutrimentum succi crassi. Caterum vt medicamentum ita preparatus ex genere est emplasticorum. At quis naturam amaritudinem habet, is etiam extergendi, digerendiq; vim obtinet. Interficit lumbricos tu illitus, tum addito melle linctus, tu ex posca epotus: quin & decoctum eius lumbricos eijcere potest. Tum etiam foris identidem perfusum, vitiligines, achoras, pustulas, exanthemata Graci vocant, psoras, gyanas, vlcera maligna, qua cacothie vocant, iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo, siccandq;. Expurgat iecur & lienem, cum ruta & pipere suauitatis gratia assumptum. Elicit menses, ac foris cum myrrha, & melle impositum. Porro Lupinorum farina, sine mordacitate digerit: nec enim liuida tantum, sed & choras, & dura phymata curat: sed tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, idq; pro laborantium temperamento, &

Lupini syluestri
Lupinorum
facult. ex Gal.
Lupin. farina

afectus diuersitate, quod ex vsu est eligendo. sed non est praesentis instituti talia distinguere: digerit item qua liuida sunt. Et quacunque modo diximus prestare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt vero etiam qui eam ischiadicis cataplasmatis modo illinunt. Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia valentior domestico, eiusdem genere cum ipso facultatis. Lupinus satiuus sic Latinis, Gracis *Σέπιος ήμαρος* appellatur: Mauritanis, Tarinus, Arinus, seu Tormus: Italis, Lupinus domestico: Germanis, Wickbonen, Feigbonen, Wolffbönen: Hispanis, Entramuces, & Entramucos: Gallis, Lupinus. Lupinus vero agrestis Latinis, *Σέπιος άγριος* Gracis, & Italis Lupino saluatico dicitur.

Nomina.

Lupinus duplex, satiuus & syluestris: syluestris flore vel luteo, vel caeruleo minore fructu: hicque vel latifolius hirsutus, vel angustifolius. I. Lupinus satiuus albus C. B. Lupinus Brunf. Trag. Fuch. Matth. Lac. Lon Cord. in Diosc. Cast: Caesalp. Tab. Lupinus satiuus, Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Lob. Lugd. Lupini communes, Ges. hor. Lupini albi, Fuch. Cam. In hoc genere maximi, flore antequam aperiatur subcaeruleo, intus vero albo. II. Lupinus luteo flore. C. B. Ex radice vnica fibrosa plures caules emittit vides, striatos, subhirsutos, sesquipalmares, circa quos folia priora quidem duo subrotunda & integra, reliqua vero longis pediculis donata, quorum inferiora in nouem, superiora in septem partes communiter diuisa sunt: flores obtinet luteos, spicatos, violae luteae colore & sane odore: quibus succedunt siliquae satiuis minores, duriores & hirsutae, quibus semina iis minora, plana, rotunda, maculis & lineis variegata, saporeq; amarissima includuntur. Hic vt & sequens, licet apud multos sponte oriatur, apud Germanos tamen, quibus hic violae Turcicae nomine donatur, hortensis est. Dicitur Lupinus syluestris luteus, Dod. gal. & fol. Lupinus Hispanicus flore luteo Ges. hor. Lupinus luteus Cam. ad Matth. Tab. De Lupino flore purpurascete, latifolio, hirsuto, seu syluestri Dioscoridis, dicitur in historia exhibita simul figura, prout sponte in laco Gramuntio prope Monspelium prouenit, qui praedicto altior & ramosior est. III. Lupinus caeruleo flore angustifolius C. B. Hic est foliis multo angustioribus & minoribus, vt figura ostendit, communiter in septem partes diuisis: flosculis quam in illa minoribus, caeruleis, aut subrubentibus, quibus siliquae multo minores succedunt, vix conspicua lanugine hirsutae, quibus semina minuta rotunda, colore sordido, variis maculis aspersa & amara reconduntur. Florent eodem tempore quo satiuus, & quia satiuus amariore, idcirco iis valentiores: hinc Lupini minores Tabernamontano dicuntur.

Toryida

RAPVM

CAP. CIIII


Decocta Rapi radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venierem stimulat. Decocto podagrae, pernionesq; fouentur: contritoq; tapo, atq; imposito iuuantur. Si excauate radici rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymae eius decoctae madantur, & urinam ciunt. Semen antidotis, & theriacis, praesertim quae sensu doloris auferunt, anodyna

a Cat. ειληος
μεινους διαθε-
σεις. i. exulce-
ratis affe-
ctiones.

I. RAPVM ROTVNDVM.



II. RAPVM LONGVM.



III. RAPVM SYLVESTRE.



Rapi conf. & genera.

Crucifera melleo sive

Rapum quo p. isto ab erucis vindicetur.

Rapum sylue
Rre Matth.

anodyna vocant, idoneum est: potum contra venena salutare: venerem concitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit: sed multo magis appetentiam recreat. Sylvestre rapum in aruis nascitur. † Frutex est in cubiti altitudinem assurgens, ramosus, lauis in cacumine. Folia fert lætia, digitali latitudine aut maiora: & fructum in siliquis calyculatis: cumq; eorum involucria aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quondam capitis speciem præbet: in qua semina parvula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoque corpore, utimur: præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici, aut lolii farina fieri solent.

Rapum in Italia vulgò notissimū est, ut superuataneum sit eius formam describere, præsertim apud Insubros, vbi statim post messem, vbi seges prius fuerat astate, Iunio, ac Iulio mensibus, in aruis secundo seritur: deinde mense Octobri, cum radix ad summū extuberauit, è terra eruitur. Satium in triplici recensetur genere, sessile, longum, & rotundum: tamen si literis mandauerit Plinius libro 18. cap. 13. longum erraticum esse. Non omittendum natura miraculum, ex tam paruo semine tribus penè mensibus gignitur tam magna radix, ut ea aliquibus in locis plus quam centenae libras pendat. At librarum triginta pondere nos sepius innumera rapa vidimus in Ananiensi agro, longa, & colore purpurea. Rapum & radix (ut Theophrastus est auctor lib. 7. cap. 4. de 60 plantarum historia) gaudent frigore, & sic ea dulcescere putant, simulq; incrementum in radicem, non in folia verri. Austrinis, atq; serenis temporibus celeriter caulescunt. Nursinis Plinio palma, quod eo fortasse solo magnitudine, & dulcedine ceteris præsent. Alpinis, quibus rara seges, rapa vitia admodum, ac necessaria habentur, tam in hominum alimentum, quam iumentorum pabulum. Quæ astate seruntur, vindicantur ab erucarum iniuria, quæ plerunque tenella folia in uniuersum erodunt, commissa sationis tempore semini fuligine, aut maioris sedi succo per noctem macerato semine: siquidem Columella rem hanc sibi experientia comprobata afferit. **RAPVM** longum forma tantum ab altero differt: cetera verò nihil dissidet. **SILVESTRIS** rapi plantam ob meam ab Hetruria vbi frequens nascitur, absentiam, hæcenus

IV. RAPUNCVLVS.



hactenus consequi non potui, atqui volo etiam meipsum accusare, quod in ipsam neglexerim apud amicos. Quare Rapi sylvestris imaginem, quam hic appingi curauimus, et si sylvestre Dioscoridis rapum non referat, refert tamen plurimum domesticum: quam ob causam, illud quoque excudi curauimus, tanquam Rapum sylvestre nostrum. Non desunt rei herbaria studiosi, qui velint Rapunculum vulgò vocatum, quo Itali in acetariis vescuntur, vnà cum Fuchio rapum esse sylvestre Dioscoridis, quorum opinionibus refragari cogor: quippe quoniam Rapunculi capitula, in quibus semen concluditur, duplicia non sunt, nec vlla in ipso semine reperitur qualitas, qua abstergere possit. Horum etiam sententia repugnat Theophrastus lib. 7. cap. 6. de plantarum historia, quippe qui sylvestre rapum radice constare longa raphani modo, breuiq; caule consistere scribit. RAPUNCVLVS itaque planta est cubitalis, caulibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, in cacumine ramosis: antea quam caulem edat, folia profert oblonga humi accubantia, sed qua in caule fere toto sunt longiori facie, sed breuiora, & angustiora spectantur. Flores fert in ramusculorum cacumine purpurascens, & ad caeruleum inclinantes, quatuor tantum foliis conformatos. Semen in simplici capitulo continet minutum, pullo colore. Radice nititur alba, trium digitorum quatuorve longitudine, crassiuscula, extuberante media ipsius parte, alba, fragili, tenera, & subdulci quodam succo pradiata. Id quod, meo quidem iudicio, non praetermisisset Dioscorides, si rapunculus noster sylvestre illi fuisset Rapum. Nascitur in aruis non cultis, in collibus amoenis, & in pratis, quin etiam in hortis iam feritur, vt gradiores edat radices, quarum esu plurimi delectantur. In caliditate & frigiditate radix non longè abest à temperatis, imò nec in aliis qualitatibus. Eduntur in acetariis eadem non solum cruda, sed etiam cocta, quod maximè gustui placeat &

Rapunculus non est Rapum sylu.

Rapunculi consideratio.

Rapunculus feritur.

Rapi sylvestris Matth. consi.

Rapi vires et Galeno.

Nomina.

appetentiam excitet. Caterùm quid in medicum vsum Rapunculus prestare possit, nondum compertum habeo, et si non desint, qui putent lactis vbertatem in nutritibus facere, si coctus cum longo pipere edatur. Sed ad SYLVESTRE rapum nostrum venio, quod frequens in Bohemia in agrorum marginibus & iuxta semitas nascitur. Exit hoc folio, caule, flore, filiculis, semine, domestico simile, sed aggressioribus foliis, omni aggressiora, asperiora, hirsutioraq; spectantur. Radix illi est raphani modo longa, crassaq; sed sapore per omnia domesticum refert: acriore tamen & amarior, quo factum est, vt sylvestre rapum hanc plantam vocauerim. Legitimum nasci copiosum in Hetruria diximus, non quod ipsum vsquam à nobis visum sit, sed quod id ex aliorum relatione intelleximus. Nostri semen, cum insigniter amarum habeatur, & absterforia sit facultate pradiatum, alterius loco securius illini poterit, vbi cutem detergere fuerit opus: quin etiam necandis vermibus vtile quoque fuerit. Radix, quod acrior amariorq; sit, excalfacit ordine secundo, & siccatur in principio primi: atqui semen id longe valentius prestat: praeterea abstergit, incidit, aperit, attenuat & prouocat magis quam domestici. Rapi domestici radix excalfacit & humectat. Semen vero calidum est & siccum: cum autem etiam sit amarum, abstergit, aperit, digerit, prouocat, flatu gignit. Rapi vires recensuit Gal. lib. 6. simpl. med. ita inquit. Rapi semen venerem excitat, vt pote spiritum flatuosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflatq; & semen generat. Et lib. 2. de alim. fac. inquit: Rapum siue γογγύλιδα, siue Couiada appellare velis, quod eius extra terram est, oleraceum censetur. Radix, quae terra continetur, aute elixationem & dura est, & cibo aliena: in aqua autem decocta, mirum si aliqua ex congeneribus plantis minus nutrit. Hanc quoque ipsam multifariam homines parant: nam & in muria, & in aceto reponunt, quod in totum annum vsui esse possit. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoq; si quis ultra modum esitauerit, & maximè si perfecte conficere eam nequeat, crudum succum in venis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere duxerit, potissimum quando bene fuerit percotta, vt qua longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perpressa, ad eum modum videlicet, quem antea in hac praparendi ratione docuimus. Sin crudior ingeratur, concoctu est difficilior ac flatulenta, stomachoq; noxia: nonnunquam autem & ventrem mordicat. Constat experimento, semen valere ad variolas & morbillos: nam potum semidrachma pondere, morbillos latenter ad cutim expellit. Τογγύλιδα Graecè vocatur, quod Latine Rapum: Arabicè, Seliem, Selgem, Selgrem, siue Alsegrem: Italicè, Rapo: Germanicè, Rüben: Hispanicè, Nabo: Gallicè, Raue, seu Naueau blanc de lardin. Rapum Sylvestre Graecis γογγύλιδα ἀγρία: Italis, Rapo saluatico. Rapunculus Italis, Raponzolo. † Quod in Graco hic legitur γογγύλιδα, Ruellius vertit fruticosum. Quae vox est potius ab eo ex Plin. li. 20. cap. 3. reposita, quod etiam alias saepenumero facit, quam Graecè Latina reddita. Nos fruticem vertimus, licet hac, vt alijs pleriq; vocibus, Dioscoridem improprie vsum fuisse existimemus.

Rapa quasi ruapa, quod è terra eruantur Varroni: at verisimilius etymò à Græco ῥάπυς Athenæo li. 9. c. 2. γογγύλιδα Diosc. à rotunda orbiculariue radice figura. Theop. 7. hist. 4. marè & foeminà dicit, ambas tamè ex eodè semine nasci, sic c. 6. eiusd. lib. & sylvestris meminit. Diuidimus in satiuam & sylvestrè: satiuam in longà seu foeminam, in rotundam seu marè, & in seissilè. Sylvestris alia radice non bulbosa, alia radice turbinata: his addimus Hetich Americū ex Theueto, quod Rapū Americanum vocamus & fottè apud Plin. lib. 21. c. 15. Oetū est. I. Rapa satiuam rotunda seu mas Theop. & Plin. C. B. Rapum, Trag. Lac. Lon. Cast. Rapa, Bruf. Dod. gal. Ges. hor. Cæs. Rapū satiuum, Fuch. Cord. in Diosc. Rapū vulgare, Dod. fol. Rapū maius orbiculatū, Lob. Rapum orbiculatum, Tab. Rapum satiuum orbiculatum. Lugd. Huius radix quoad formā cōmuniter tuberosa est, rarò globi instar orbiculata, frequentius in latitudine effusa: variat & paruitate & magnitudine: colore externo etiam vel viridi, vel candido, vel puniceo: habetur nunc, quae foris & intus flauescunt: sic & Berna, quae obsoletè nigra, vt plurimum rotundae, rarius oblongatae, quae vulgaris dulciores sunt. II. Rapa satiuam oblonga seu foemina Theophr. & Plinio C. B. Rapum longum Matth.

Cast. Lon. Lugd. Rapum oblongum, Trago Dodon. fol. Rapum tereti, rotunda oblongaque radice, Lob. Rapa radice in rotunditate oblonga, Cæsalp. Hæc magnitudine etiam variat. III. Rapa sylvestris non bulbosa C. B. Rapum sylvestre, Matth. Lugd. Tab. Rapum sylvestre non bulbosum, Lob. Rapa sylvestris, Cæsalp. IV. Rapunculus esculentus, forte Rapum sylvestre Dioscoridis & Plinii C. B. Raponeoli, Brunf. Rapunculum vulgare, Trag. Rapunculus, Matth. Lac. Dod. fol. Lon. Cæsalp. Cast. Tab. Cam. Rapuntium paruum, & pes locustæ Aucennæ, Lob. Rapunculus minor, Lugd. Rapum sylvestre, Fuch. Ges. hor. Rapum sylv. minus, Dod. gal. Erinus Nicædri & Diosc. Cplünæ. Flore est cæruleo, aliquando purpureo, aliàs candidate vel albo. Verū Rapūculi vndecim species in Phytopinace proposuim⁹ esculentum, spicatum, triplicē, umbellatu triplicē, nemorosum triplicem & alpinum ex Baldo: cuius iconem adiecimus.

V. RAPUNCVLVS ALPINVS
spicato similis.



NAPVS.



Napotum
consideratio.

Napi seminis
vires Matth.

V. Rapunculus alpinus spicato similis, palmo maior, vnico caule ex fissuris rupium prodiens, folium vtrinque habet subrotundum Bellidis cæruleæ forma, quibus succedunt folia, quæ ex cauliculo striato, oblongis pediculis insident, ex rotunditate oblongata, satis lata, profundis rarisque incisuris donata: & licet ea quaterna sint, rarius plura, attamen in cauliculi summo folia, forma similia quina vel sena pene sine pediculo, stellæ modo flori subiiciuntur: siquidem cauliculi summo apici insideant: flores viginti & plures, quasi ad exortum conglobati, lauis, breuibus tamen, & striatis pediculis insidentes, qui oblongi sunt tenues, infernè albicâtes quasi inflati, qui sensim angustantur, cæruleo purpurei in extremitate crenati: ex singulorum medio, filamentum oblongum prodit, quod in summo bipartitum aliquando instar Capreolarum vitium contorquetur. Hunc in Baldo Augusto mēse, inter saxa collectum, cum D. Guilandino horti Patauini præfecto anno 1578. Patauii ostendissemus, Rapunculum montanum nominavit: at Nobiliss. Iacob. Antonius Cortusus, nunc horti eiusdem præfectus, Cantabricam alteram Anguillaræ statuebat. Cum iam delineatus esset hic Rapunculus, eundem à Doctore Ioanne Neudorffero Norimbergensi, rei herbariæ studiosissimo & nobis amicissimo, accepimus, vnà cum radice quæ tuberosa est inæqualis, Rapunculo vulgato triplo maior. Ab eodem & duas alias Rapunculi species ex monte Sumano, necdum descriptas accepimus, vt & à Nobilissimo Cortuso elegantem aliam Petramarulæ nomine, quarum omnium & descriptiones & figuras vniuersalis historia nostra, Deo cōcedente vitam, exhibebit.

Bovis. NAPVS. CAP. CV.

Cocta Napi radix inflat, modicum alit: semen eius potum venenorum vires hebetat: antidotis admiscetur. Conditur sale radix.

Napi in raporum genere recensentur, & quanquam folio, & radice, raphanos magis referant, caule tamen, floribus, semineq; rapum emulantur. Plura Theophrasto, & Plinio produntur genera: quanquam hac tempestate duo tantum repperim, nempe album, & flauum. Flauis tamesi albos crassitudine superent, magisq; colore placeant: sunt tamē inspidiores, & gustui ob id minus grati. Omnes melius placeant in pinguium carniū iure decocti, inflant tamen, & magis quàm rapum saturant, & magis quoque venere excitant, & præsertim addito pipere. Radix excalfacit ordine secundo, & humectat primo incipiente: atqui semen excalfacit & fccat, abstergit, aperit, digerit, prouocat, & incidit. Semen additur in Theriaca, quod venenis potenter resistat. Necat & interaneorum animalia, ex limonum, aut aurantiorum succo potum: ex Adianti autem, siue lentium decocta potum, morbillos & ex æchemata ad cutim propellit. Duplicem enim

enim nomine morbillis affectos iuuat, tum quòd à centro ad circumferentias corporis materiam morbiferam ducat, tum quoque quod propria sui ipsius facultate morbi malignitatem superet, ac compefcat. Datur vtiliter cochlearis mensura ex vino addita lini seminis drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit, vbi ex oxymelite, & tepenti aqua hauriatur. Datur quoque diebus pluribus quotidie drachmæ pondere, ex marruby stillatitia aqua aut decocto, vtiliter Ictericis, & aqua intercuti incipienti. Sed plura de eo in epistolis diximus. In Aegypto frequentius feritur, quòd inibi ex eius semine tufo pressoq; copiosum exprimant oleum, ad omnia vtile ad qua semen.

Bovius, nomen Græcum est: *Napus*, Latinum: *Italicum*, *Napo*: *Germanicum*, *Stechrüben*: *Hispanicum*, *Nabicas*: *Gal-* Nomina. *icum*, *Nauet*.

Napus, *βουβίς*: *Dioscoridi*, à tumentis figura deducta significatione: *ῥαφανίς* species Galeno. *Plinius* li. 20. cap. 4. *Naporum* non plures quàm duas differentias proposuit, alterum *Bunion*, alterum *Buniada* medicis Græcis vocatum: nec quenquam moueat locus *Plinii* lib. 19. cap. 5. vbi quinq; *Naporum* genera fecit, siquidè hæc de *Raphano* sint intelligenda: quod probatur ex eo, quod quæ *Theop.* 7. hist. 4. de quatuor generibus *ῥαφανίδων* retulit, ea *Plinius* de *Napo* recensuit. Agnoscimus *Napum* satiuam quæ *bunium*: & syluestrem, quæ *Bunias*, quæ etiam ex non transplantatorum semine nascitur. *Napus* satiuam *C.B.* *Rapum* mas apud *Theophrastum* censuit *Athenæus*. *Napi*, *Brunf.* *Napus*, *Dod.* fol. *Matth.* *Cord.* in *Diosc.* *Ges.* *hor.* *Lac.* *Lob.* *Cast.* *Cæsalp.* *Cam.* *Napus* hortensis, *Dod.* gal. *Napus* *bunias* satiuus, *Fuch.* *Napus* satiuus, *Lugd.* *Napus* verus, *Anguil.* *Bunias* *Napus*, *Aduer.* *Lob.* icon. *Rapum* satiuum alterum & *Napus* veterum, *Trago.* *Napus* primus *Lon.* Hæc radice est colore aliis candido, a liis buxæ & croceo: radice etiam nigra in horto *Illustissimi Ducis Wirtembergici*, quem *Montembelgardi* colit frater *Ioh. Bauhinus*, legimus.


ῥαφανίς. RAPHANVS. CAP. CVI.

Radix, quæ Græcis raphanus dicitur, exalfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciet, vrinam pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuuet: cum autem præsumitur, cibum suspendit: quare vomituris commodissimè datur ante cibum: sensuum aciem excitat. Decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, effica est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissimè illinitur: lienosis vtilis: sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: contra viperatum ictus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his qui fungis strangulantur, tam cibo, quàm potu salutaris est: menses cit. Semen, vomitiones facit, vrinam mouet, lienem extenuat: cum aceto illitum gangrænas validissimè emarginat: coctum cum aceto mulso, anginis per quàm vtiliter gargarizatur: contra cerastis morsus, potum ex vino auxilio est. Syluestris raphani, quam Romani armoraciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lampsanam imitantur: radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium, quàm radix in olera recipitur: sed hæc exalfacit, vrinam concitat, æstiuosa est.

Raphanus satiuus
Stechrüben

I. RAPHANVS I.

II. RAPHANVS II.



Raphanus Græcis dicitur, Latinis Radix appellatur. In Hetruria quod Latinum nomen imitentur, Radice vulgò vocant: quemadmodum & Romani suam antiquam Raphani syluestris appellationem retinēt, qui ipsum prima litera fideratio.

Diosco. locus III. RAPHANVS RVSTICANVS siue vulgaris.

suspectus.



Raphanivires Matth.

Fuch. error circa Armoraciam.

Raphanus rusticorum.

metatresi Ramoraciam appellant. Caterum cum sylvicis, sativa longè dario, acriorq; deprehendatur, Dioscoridi co- dex hic, vt in aliis plerisq; locis, mendi suspitione non vacat: utpote qui Armoracia radicem reddat teneram mollemve, & subacrem. Folio prouenit Raphanus napo simili, & rupo angustiore, scabrore, ac magis hirto, caule tereti, flore albo, silis- quis tumentibus, rupo quadruplo maioribus, in mucronem desinentibus, in quibus semen concluditur rotundum, rufum, & sapore acutum, rupo, napiq; semine cum minus, cum et- iam durius. Radix illi varia, nam nonnullis longa, alba, terri- tenera, fragilis, nec admodum acris, qua ceteris in Hetruria praestantior habetur: aliquibus crassa, napi pene figura, alte- ra longè dario, acrior, & gustui ingrator. Differunt quoque colore: namque & alba, & nigra, vbique sepe habetur, non solum sativa, sed agrestis quoque: sed haec altera minus fre- quens. Satiua feritur in hortis & agris: Agrestis spontè pro- uenit in campestribus in agro Romano. Recens minutim inci- sa radix, albo meraco inspersa, & butyro in sartagine calefa- cta, & pubi admoda, remorata vrinam pellit: idem praestat eiusdem succus, duarum vnciarum pondere ex Cretico vino 20 haustus. Vncia corticis cum tãtundem mercurialis, croci gra- nis quatuor, cassia odorata pulueris drachma, & drachmis duabus succi sabina, omnibus simul in mortario contusus, & tenuissimo linteolo exceptis, & vteri cervici adhibitis, subue- nit praesentaneo auxilio agrè parturientibus. Eiusdem radi- cis succus vnã cum oleo dulcium, aut amararum amygdala- rum, & vini albi nonnihil seruifactus, addito colocynthidis mometo, aurium sonitus curat, si calidus instillabitur. Leon- hardus Fuchsius, Armoraciam eam esse stirpem putat, quam Raphanum rusticum nonnulli vocauerunt, folijs oxylaptho 30 maioribus, radice longa, pollicis crassitudine ac etiam crassio- re, acerrimo gustu, sinapi haud absimili: floribus in caulium summitatibus albis & pusillis, radicibus acerrimis, qui-

bus vitur vniuersa Germania, & Pannonia ad carniū intinctus, [& quanquam appetentiam faciat, tenera tamen & caput ladit & nidrosas eructationes mouet. Nascitur spontè in pratis, viridariis, & secus itinera. Radix excalfacit, & siccatur ordine tertio completo. Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, & abstergit. Ea omnia potest, qua domestica & agrestis radix, sed valentius operatur. Quinetiam Sinapi vires obtinet, vrinam, & arenam valentius pellit. Illinitur contrita radix ex vino albo, & recenti butyro calefacta, vtiliter pubi ad ciendam vrinam, siue sit dolor ex renum calculis, siue ex crassa lentãq; pituita vesica cervicem obstruente. In quo casu datur quoque non paruo auxilio potandum vinum, in quo incisa radix fuerit macerata.] Qua in re eum alioqui peritum, facile hallucinatum crediderim, acerrimo 40 fortasse illius planta sapore fretum. Quod si vs vel Romam vnquam profectus esset, vel ceteras notas accuratius perpendisset, nunquam (vt arbitror) in eum errorem incidisset. Rectius fortasse saperent, qui hanc plantam perperam Armoraciam faciunt, si Crateuz Thlaspin, de quo in Thlaspin meminit Dioscorides, eandem esse scriberent. Raphani Theoph. lib. 7. ca. 4. de hist. plant. plura sunt genera: nempe corinthium, cleonium, liothalassium, boeotium. Adolescit amplissime Corinthium, quod vel radice constat detecta. Hoc enim sursum versus protruditur, nõ vt cetera in terram ampliari solitum est. Lio- thalassium, quod Thracium vocant, validissimum aduersus frigora traditur. Boeotium dulcissimum est, & figura rotundum, nec vt Cleoneum praelongum. Quibus folia lauia, dulciora, suauioraque sunt: quibus autem scabra, acriora. Genus prae- terea redditur, quod folijs eruca simile constat. Raphanus (vt lib. 8. simpl. med. scribit Gal.) excalfacit quidem excessu tertio, deficcatur vero secundo: agrestis autem in vitroq; efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est. Facultas ei inest di- 50 gerendi, itaq; ad sugillata, & alia id genus lauida ob talem facultatem accommodata existit. Aperit, prouocat, incidit, ex- tenuat, rarefacit. Meminit item Galenus Raphani lib. 2. de alim. facult. sic inquit: Radicula solam, crudamq; vrbani homines vt plurimum prima mensa ex garo sumunt, alii ducenda gratia: pauci autem acetum admiscunt. Rustici vero frequenter cum pane esitant, non secus ac alia, qua nobis natura non ars parauit obsonia, in quibus est origanum viride, nasturtium, thymum, satureia, pulegium, serpillum, mentha, calaminta, pyrethrum, eruca. Quippe haec omnia viridia, & dulciorum sunt obsonia, vnã cum illis sumpta, suntq; herbacei generis planta. Radicula caulis quoq; & folia nonnunquam eduntur, sed necessitate magis, quam sponte. Radix in eorum numero est, quibus obsonij potius, quam nutrimenti nomine assidue vescimur. Vm extenuatoriam gerit, cum qua conspicue vnã calfacit: acris enim in ea qualitas exuperat. Verno tempore caulem in altum assurgentem producere solet, ceu alia, qua nata sunt excaulescere. Hic elixus estur ex oleo, garo, & aceto. vt rupo caulis, sinapiq; & lactuca: nutritq; magis caulis iste, quam cruda radícula, vt qui acrimoniam in aqua deponat: quanquam minimam sanè & ipse alendi potestatem habet. Quidam non solum caulem, sed vnã ipsas radículas elixantes comedunt, raporum modo. Ceterum cum medicos, tum idiotas illos mirari subit: qui à cœna crudas eas edunt, concoctionis iuuande gratia: ipsi quidem id se experientia abunde compertum habere dicunt, nullus tamen eos citra da- 60 num potuit imitari. Radix, qua Graecis papari: Latinis item Raphanus & radix appellatur: Arabibus, Fugel, sine Fegiel: Italis, Rafano, & Radice: Germanis, Reetich: Hispanis, Rauano, & Rauanillo: Gallis, Reffort. Raphanus longus: Italicè, Radice longa. Raphanus rusticanus: Graeco Paparis, & Reppos: Italis, Rafano & Rauano: Germanis, Oren: Gallis, Rafan, siue Reffort sauvage.

Raphanorū Theoph. ge- nera plura.

Raphani vi- res ex Gal.

Nomina.

Raphanus veteribus papari, quasi radix perspicua: posterioribus papari, & papari, quia sta- tim à semine oriatur. Theophrastus licet vtraque vsus sit voce, attamen Raphanum papari vocauit, at papari

ubi habetur, Brassicam intelligere oportet, quæ causâ erroris fuit Plinio ca. 5. lib. 19. ubi Raphani genera recenset, quæ ex Theophrasto 7. hist. 4. sunt desumpta, ubi de Brassica egit: & quæ Theophrastus Raphani genera proposuit, Plinius lib. 19. cap. 5. pro Napi generibus recensuit. Has licet nunc differētiâ obleruare, ut sit præcox alius, alius serotinus: hicq; albus, niger & rubeus: albus, oblongus & orbicularis: niger, communiter rotundus, rarius oblongus: ruber oblongus, qui & fibras rubentes per substantiam dicurrentes obtinet: habetur & radice lutea: est rusticanus: & deniq; sylvestris aquaticus. I. Raphanus maior orbicularis C.B. Raphanus, Brunf. Matth. Lac. Cord. in Diosc. Cast. Raphanus vulgaris, Trag. Gef. hor. Raphanus satiuus, Fuch. Lugd. Raphanus magnus: Lob. Raphanus orbicularis, Tab. Raphanus rotundus, Lon. Raphanis siue Radicula satiuâ, Dod. fol. & gal. Radix & Radicula, Cæsalp. II. Raphanus oblongus C.B. Raphanus longus, Trag. Lonic. Raphanus prælongus, Gef. hor. Raphanus secundus, Matth. Lugd. Raphanus minor purpureus, Lob. Radicula satiuâ minor, Dod. fol. colore radix variat, noster albo est cortice: Italicus rubello. III. Raphanus rusticanus seu Thlaspi alterum Dioscoridis C.B. Raphanus maior seu Armoracia, Brunf. Trag. Gef. hor. Raphanus sylvestris Fuch. Raphanus magnus & montanus, Dodon. gal. Raphanis magna, Dod. fol. Raphanus rusticanus, Matth. Lob. Raphanus rusticus, Lag. Cam. Raphanus marinus, Tab. Armoracia Plin. Lac. Thlaspi maius, Cord. in Diosc. Lon. Cæsalpino.


Sisapar.

SISER CAP. CVII

Siser vulgò cognitum, cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, & appetentiâ inuitat.

I. SISER I.

II. SISER II.



Et si antiquis omnibus Siser aded notum fuit, ut horum nullus habeatur, (quod sciuerim viderimq;) qui eius scripserit historiam, nobis tamen aded obscurum, ignotumq; est, ut hoc auo difficillimum sit, cum nobis, tum ceteris, qui ante nos scripserunt, verum ac legitimū ostendere Siser. [* Non aēsunt, qui crediderint, album quoddam Carotarum vocatum genus, quæ naporum modo carnum iuri incoquantur, legitimum esse Siser. Ceterum eos hallucinari putauerim, Plinij testimonio ductus, qui libro 19. capite 5. hæc habet: Inest Siseribus longitudine neruus, qui decoctus extrahitur, amaritudinis tamen magna parterehctâ. Id quod in hisce Carotarum radicibus haudquaquam reperire licet: quippe quæ nec neruum concludant, nec gustat amaritudinem relinquunt, sed dulcedinē potius quandam præ se ferant. Quod præterea Siser sapore sit subamaro, facile ex Galeni sententiâ comprobati potest lib. 8. simplicium medicamentorum. Ex cuius verbis facile colligitur, Siserâ ab hisce carotis plurimum recedere. Sciendum igitur est, quod Siser in Italia non feritur, tametsi in Germania, Rheni præsertim fluminis accole, suis in hortis Siserâ frequentissima habeant, quæ & ferunt, & colunt. Ideoq; Magnæ ventalia abunde reperiuntur à Tincæ agro illuc allata. Siser folio est olusatris, caule & umbella pastinacæ simili, radicibus doctantibus, neruosam intus matricem continentibus, subamaris & colore subcroceo, & quæ gustatu gratiam cum puto non modicam ineant. Quarum in cibus præstantia allectus Tiberius Cesar (ut citato loco tradit Plinius) omnibus anis à Germania aduectis Siserâ curauit ex Gelduba castello Rheni imposito, ubi generositas præcipua.*] Ego superiori

Siseris consideratio.

tempore, quorundam relatione persuasus, scripseram reperiri verum Sifer in agro Maguntino circa Rhenum: sed postquam deinde cum aliis doctis viris regionu illius de re hac conferrem, affirmabāt id esse falsum: quippe quod ea radix, quam priores illi Sifer faciebant, eadem esset, quam nos hic appinximus, quamq; Germani Gelb Ruben, & Mōren vocant: quares in causa fuit, ut nunc aliter sentiam. Adducor itaq; ut putem si Sifer nunc apud nos extat, id eam esse plantam, qua folia promit hortensi pastinaca similia, breuiora tamen, atque minora, caules etiam similes habet, striatos. Semen in umbella prouenit, petroselinii modo. Radicibus nititur numerosis asphodeli modo, teneris, fragilibus, dulci sapore & amariuscule, ori grati, tenui intus matrice, cuius hic quoque imaginem expressimus. Hoc ut censeam, plura sunt, qua me inducunt: primum, quod Sifer apud veteres, si cuncta ab eis de Sifere tractata obseruentur, pastinaca congenera sit. Namq; Plinius, (vbi ceteros omittam) libro 20. cap. 5. vbi de pastinaca egit, illico de Sifere, tanquam de congenera tractauit, quemadmodum & hoc nostrum esse videmus: praeterea, quod eius radix (vt idem Plinius inquit) neruum siue matricem intus habeat, qua eximitur, cum cocta fuerit. Deinde quod seratur frequentius, auulsis à radice agnatis, vt Inula, Lilium, Arum, quam semine, quod semine satum non nisi tertio anno esui idoneum proueniat, radice verò quotannis. Id quod fecisse veteres in Siferu satione testatur Marcellus, Dioscoridis interpres, & Ruellius, qui quamuis non scribant, vbi id legerint, nec à quibus autoribus acceperint, ego tamen illu credendum esse censeo, quod mihi certò persuadeam, hosce probos, doctosq; viros, haud quam scripsisse hac, nisi id alicubi legissent apud antiquos autores. In qua sententia confirmat me Columella lib. 11. cap. 3. de re rustica, sic inquit: Pastinaca & Sifer, atque Inula, coalescunt alie pastinato, & stercoreto loco, sed quam rarissime ponenda sunt, vt maiora capiant incrementa: qua verba si diligenter expendantur, radice feri Sifer, non semine facile constabit: quin etiam quod numerosa sit radice Asphodeli fere modo, rarissime idem poni oportere, vt latius radices fundatur, & incrementam suscipiant. Nam quod crassiores sunt, eò gustui suauiores habentur. Ideoq; dicebat Plinius libro 19. cap. 5. inter medica dicendum Sifer, & ipsum Tiberius Princeps nobilitauit, flagitans omnibus annis à Germania. Gelduba appellatur castellum. Rheno impositum, vbi generositas praecipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Inest longitudine neruum, qui decoctis extrahitur: hac ille. Quibus palam est, Germanicum Sifer Tiberio fuisse gratum, quod in frigidioribus regionibus generosius, & grandius proueniret. Ad hac scribit Dioscorides, decoctā Siferis radicem, & ori gratam esse, & stomacho vtilem. Id quod in huius plantae radicibus manifesto deprehenditur, vbi prius elixa, & deinde butyro in patellu farina circumlita frignantur. Vnus tantum mihi scrupulus reliquus est, quippe quod in hoc nostrate Sifere nulla fere percipiatur amaritudo, cum tamen Galeno, & Plinio, Sifer amatore non vacet. Verum hoc à mea me non deducit sententia, quod haud me lateat, regiones saepe plātis immutare sapore. Si quidem cepa, quanquam sui natura acris admodum sit, in Caertano tamen agro, vbi omnium maxima prouenit, nulla prorsus acedine redundat: id quod multis in locis, in Raphano videmus, & in Aro (vt Galenus inquit) quod in Cyrenaico agro prouenit. Dixi sententiam meam, non vt hanc plantam legitimum faciam Sifer, sed vt noscant rei plantaria studiosi, non lenibus rationibus me adductum esse ad credendum, eam ipsam esse Sifer. Syluestre quoque extare Sifer, perinde ac Pastinacam, testis est Plinius lib. 20. cap. 5. vbi inquit: Sifer erraticum satiuo simile est, & effectu stomachum excitat, fastidium absterget, ex aceto Laserpitiato sumptum, aut ex pipere, vel mulso, vel garo. Vrinam ciet, vt Opion credidit, & venerem: in eadem sententia est & Diocles. Praeterea cordi conuenire conualescentium, aut post multas vomitiones perquam vtile. Heraclides contra argentum viuum dedit, Veneri subinde offensanti, agrisq; sese recolligentibus. Satiui priuatim succus cum lacte caprino potus sistit aluum: hac Plinius. Siferis meminit Galenus lib. 8. de simpl. med. facult. his verbis: Siferi radix cocta stomacho grata est, & vrinam mouet, secundo ordine excafaciens, adiectam habens amaritudinem quandam, cum leuicula adfrictione. SIFER ALTERVM, folia, caules, umbellas, flores & semen habet syluestris pastinaca. Radix, napi effigiem representat, colare albicante aut subflauescente, sapore subdulci, ac simul amariuscule. Seritur in hortis ac etiam in agris, in vniuersa Germania & Bohemia. Excafacit & humectat, inflat, aperit, vrinas mouet. Valet radix ad ea omnia, ad qua Sifer primum valere diximus. Tametsi sub Siferis alterius nomine hac planta posita sit, nihil tamen cum legitimo Sifere habet cognationis. Sifer Graeci si-capou dicitur: Mauritanis, Culcas, Fifarum, siue Seifarum: Italiis, Sifaro. Sifer alterum: Italiis, Carota bianca: Germanis, Stierlin, siue Stirgellin: Hispanis, Chirinias: Gallis, Cheruy, siue Giroles, aut Carottes blanches.

Sifarum, quod cum Elaphobosco Dioscoridis & Plinii multum conuenit, dicitur Sifer Brunf. Cord. in Diof. Ges. hor. Lon. Cam. Sifarum, Dod. gal. & fol. Lob. & Tab. Sifer satiuum, Fuch. Sifer primum, Matth. Cast. Sifer alterum, Lac. Sifer Germanicum & Elaphoboscū Plinii, Cefal. Sifarū maius, Lugd. Elaphoboscū Diosc. Columnæ. II. Quæ pro Sifero altero hic proponitur, Pastinacā tenuifoliam satiuā radice lutea, ad differentiam eius quæ radice alba, & eius quæ radice rubra est, vocamus: aliis Staphylinus primus, vt Trag. Staphylinus luteus, Dod. gal. Sifer alterum, Matth. Tab. Sifer Lac. Pastinaca satiuua prima, Fuch. Pastinaca satiuua flaua, Lon. Pastinaca satiuua Diosc. & Daucus Theop. Lob. Pastinaca tenuifolia satiuua, Dod. fol. Pastinaca radicibus luteis, Ges. hor. Carota radice buxei coloris, & Daucus domesticus Galeni, Cefal. Carota nostra lutea, Lugd. Carota altera radice ex albo flauescente Castori.

LAPATHVM.

LAPATHVM, SIVE RVMEX. CAP. CVIII

EX generibus rumicis, oxylapathum vocant, quod in acutum tendit, dura habens extrema, in palustribus nascens. Alius est satiuus, & illi a dissimilis. Tertium genus syluestre, paruum, plantagini proximum, humile, & molle. Quartum est, quod alii oxalida, alii anaxirida, aut lapathon vocant. Folia eius syluestri, ac exiguo rumici similia: caule non magno: semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus, emicante. Omnium decocto olere alius emollitur. Crudi illitu, melicendes, rosaceo aut croco adiecto, discutiuntur. Syluestris, & oxylapathi, & eius quam oxalida nominant, semen ex aqua, aut vino vtiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionū: & ceteris. Quod si quis in potu praesumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos vngues perfanant: sed antea locus aceto, & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foueatur: aut in foliis balnearum confricetur. Coctæ in vinum, & instillatæ, aurium dentiumque dolorem mulcent: strumas, parotidasque discutiunt: lienem cum aceto extenuant. Aliqui amolientis strumis radicū gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ, & admixtæ formicæ

I. OXYLAPATHVM.

II. * LAPATHVM SAN-
guineum. *



III. OXALIS SIVE ACETOSA

fœminarum profluvia sistunt: cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicæ comminuunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Eisdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

T Ametsi Rumex, qui & Lapathum, nomine à Grecis Rumicis commutato, appellatur, hodie in hortis non seratur, in his tamen sponte frequens nascitur, quinetiam incultis locis, foliis nigra beta proximis, sed minoribus, plantagini proximis, humi accubantibus, caule cubitali, striato, flore rubro, semine minuto, pellucido, subnigricante, radice longa, crocata amaraq. Lapathum, quod in paludibus nascitur, Dioscoridi Oxylapathum vocatur, non quidem quod gustu acutum, seu acidum sentiatur, ut oxalis, quam vulgus officinarum Acetosam appellat, sed quod foliis proveniat in acutum desinentibus. Siquidem ὄξυς Græcorum appellatione, modo significat acutum saporis respectu, modo mucronatum respectu forma. Ad quod non aduertentes Auicenna, pariterq. Serapio, Lapathum omne nullo discrimine Acetosam nominant, perperam id ad saporem referentes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides in primo lapathi genere. Plinius lib. 20. cap. 21. Oxylapathon non nisi in palustribus nascens, satius similis esse scribit, cum tamen alterum alteri dissimile faciat Dioscorides. Illud verò, quod ab acido succo ὄξυς Græcis dicitur (etsi id silentio inuoluat Dioscorides) duorum est generum, maius nimirum, & minus. Illi folia sunt agrestis rumicis adeo amula, ut quandoq. oculos fallant, tanta est lineamentorum similitudo, atqui herba degustata, illico cognoscitur. Est tamen folio minore, paulo leniore, angustioreq. sagittali fere ab ipso exorta figura: Radicibus nititur pluribus vbiq. fibratis, sed haud ut in Rumice crocantibus, acido gustu, perinde ac folia & caules, caule cubitali, & striato & succoso. Nascitur sponte in pratis, & seritur etiã à nonnullis in herbis. Alteri verò folia sunt longè minora, lancea cuspidis figura, mollia, lauis, quibusdam veluti capillamentis subrubentibus inpersa, succosa, foliisq. maioris acidiora. Semen viriq. idem subrubrum, paruum & acuminatū, præterquàm quòd maiori maius, minori verò minus. HIPPOLAPATHI duo obseruamus genera. Hortense alterum, alterum sylvestre.



Oxylapathū.

Auicenn. & Serap. lapfus.

Oxylapathū Plin.

Oxalis duplex.

Hippolapathum duplex.

III. OXALIS SIVE ACETOSA minor.

VI. HIPPOLAPATHVM.



VII. HIPPOLAPATHVM sylvestre.



Lapathi vires ex Gal.

Oxylapathi vires ex Ae.

Lapathi vires Matthiolo.

Quod in hortis feritur Rhabarbarum Monachorum vocant. Siquidem hoc folio, semine, radice, ac ceteris in vniuersum notis legitimum Hippolapathum refert. Planta est grandis, ac formosa, foliis, semine, radicibus, ac ceteris in vniuersum notis, minoris lapathi similibus, sed omnia longe maiora, nam folia grandia sunt, helenij ferè modo, radix pariter grandis, vegeta, fuluo colore. Seritur à pluribus spectaculi causa in hortis & viridarijs. Sylvestre autem non solum in palustribus & vliginosistractibus prouenire videmus, sed etiam in montibus, vs præsertim in locis, vbi pecudes diutius stabulari solent, & vbi eorum fimo pinguescit solara, illi planta omnino respondens, quæ sub Rhabarbari nomenclatura, passim hodie in hortis ac viridarijs plantatur. Folia gerit numerosa, magna, horrens haud abfimilia, sed viridiora & asperiora: caulibus bicubitalibus: floribus in ramusculorum cacumine numerosis, rufescentibusq;: sexen profert in rubris folliculis inclusum, acuminatum & subrufescens. Radix nititur crocante, pollicis crassitudine, dura ac lignosa. Lapathi meminit Gal. lib. 7. simpl. med. sic inquit: Lapathum moderate digerentem sortitum facultatem est, ac oxylapathum mistam: nam simul cum eo quod digerit, nonihil quoq; repercutit. Semen eorum manifestam quandam etiam adstrictionem obtinet, adeo vt & dysenterias, & diarrhas, siue profluaia sanet, & maxime oxylapathi. Porro hippolapathum, quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores. Et libro 2. de alimentorum facultatibus: Rumicè, ait, vti antè diximus, sylvestrem betam possit quis appellare, cum non gustu solum, verum etiam facultate hortensi beta persimilis sit. Quoniam autem beta iucundior est rumicè, idcirco ea magis homines vescuntur. Quare nec nos quoque prolixius hic de rumicè scribere oportet, cum in beta omnia ad rem facientia exposuerim.

Oxylapathum (Aetius auctor est) peculiariter præstat ad ca-
 rabiosorum morsus, si vulnum in primis eius decocto foueatur, & deinde herba ipsa illinatur, atque potanda vna cum radi-
 cibus presbeatur. Fit è lapathi acuti radicibus aqua per Alabicum, quæ omnes cutis, & præsertim faciei, maculas ac pustulas tollit,
 nempe alopecuriam, vitiliginem, lichenemq;. Sumuntur aquæ radicum oxylapathi, & melopeponis præparati singulorum

librae duae, oza bitundinum decem, salis nitri semuncia, Tartari albi uncia duae: attritis terendis ponuntur simul cum aqua praeparata in vitreum Alembicum, & succenso igne extrahitur aqua: cum qua mane abluitur facies, & vesperi illi-
 etas oleo de Tartaro, & Amygdalino simul mistus. Vinum decoctionis oxylapathi diebus aliquot potum, auriginem pellit,
 & vitam ad pristinum nitorem restituit. Credunt quidam lippire nunquam eos, qui Rumicis sylvestris radicem luna de-
 struunt, nitidissime secum portauerit. Oxalis maior refrigerat & siccatur excessu secundo digerit, aperit, & nonnihil
 vomit. Herba ipsa biliosis ac pestilentibus febribus aduersatur: praestat & ad cordis affectus. Sitim sedat, putredini resistit:
 vomit, nec appetentiam excitat. At minor refrigerat, ac siccatur perinde ac altera digerit, & incidit. Omnia belle potest,
 quae in uis, nec infirmioribus poilet vribus. Hippolapathi hortensis radicis succus cum sulphure illitus scabiem sanat, cum lu-
 pularum decoctione scabie lentiginibus, alphas, & aliis cutis infectiones exterit. Radicis dilutum, ex vino paratum, praestat ad pel-

Vinum oxy-
lap.

lap. Idem facit sicca radice pulvis, drachma pondere ex meraco potus: quinetia ex Marrubij decocto hau-
 lap. Hippolapathi sylvestri eadem insunt qualitates & vires, quae & ceteris Lapathi generibus. Planta
 quae Graeci λαπαθον η δξυλαπαθον: Latinis etiam Lapathum & Rumex, Officinis Lapathium acutum appellatur: Arabibus,
 Hunadh, Hunadh seu Hamad: Italis, Rombice, & Lapatio: Germanis Amysfer: Hispanis, Labara: Gallis, Lapais. Quae ve-
 netae Oxalis item Latine & Officinis dicitur: Germanice Saur Amysser: Hispanice, Azederilha: Gallice, Oze-
 tte, Saliette. Oxalis minor, Graeci δξυλις μικρη: Italis, Acetosella, Saecciola & Sannicciola. Hippolapathum,
 Officinis Rhabarbarum monachorum: Italis, Rombice maggiore. Germanis Wönch Rhabarbarene:
 Galis, Reubarbe de marais: Hippolapathum sylvestre, Graeci, ηπικλαπαθον ηγριον Italis, Rombice saluatica maggiore.
 Nihil fortasse Plinius à Dioscoride dissentiet, si in hoc loco sequamur lectionem Oribasij lib. 11. simplicium, qui ha-
 bet οξυλαπαθον η δξυλις μικρη, id est, non prorsus simile primo. Nam ex hac patere arbitror, non tantum priora lapathi
 inter se differre, quantum vulgata lectio innuere videtur.

Nomina.

Lapathum à λαπαθον exinaniendo nominatur, siquidem foliorum decoctum alium molliat: Latinis
 Rumex dicitur, quod non tantum satiuo competit, siquidem Plinius lib. 20. cap. 21. Oxalidi tribuat. Gene-
 ra plura sunt Theophrasto 7. hist. 4. Plinius loc. cit. quinque recensuit genera, in nostro Phytopinace oxa-
 lidis decem differentias, lapathi & hydrolapathi tredecim, & hippolapathi duas proposuimus. I. Lapathum
 folio acuto, quod Oxylapathum Dioscoridi & Plinio C. B. Lapathium acutum & Siela sylvestris Auicenne,
 Tra. Lapathum acutum & Oxylapathum, Lob. Lapathum sylvestre, Ges. hor. Lapathum & Rumex, Lon.
 Calt. Oxylapathum. Fuch. Dod. gal. Matth. Lac. Lug. Rumex acutus Cor. in Diosc. Hæc folijs est aliquando an-
 gustissimis, oblongis & crispis. II. Lapathum rubens, quod cum oxylapatho plurimum conuenit: ex radi-
 ce oblonga, mediocriter crassa, fibrosa, lutea ut in vulgari, à qua fere magnitudine tantum differt, caules
 emittit oxylapatho breuiore, ramosos: folijs est oblongis, aliquando rugosis, saturato rubore nigricanti-
 bus, costa media ac fibris dilute rubentibus, quæ vna cum caule cruento succo turgent, ut si terantur
 manus inficiant: floribus & seminibus priori correspondet. In hortos semel sata, seipsam semine propa-
 gat. Viribus cum oxylapatho conuenit, nitrosiore tamen gustu est, quare eius decoctum, aut succus ex-
 pressus alium lubricat. Seminibus etiam puluerisati in aliquo decocto adstringente exhibiti, in sistendis san-
 guineis fluxibus singularis efficacia. Dicitur ηρυθρον λαπαθον. Lapathum nigrum Dod. gal. Lapathum rubens,
 Dod. fol. Lapathum sanguineum, Lob. & Cam. Lapathum rubrum Cæsalp. Cam. ad Matth. cui & Cre-
 rense: Lapathi syl. tertium genus, Lugd. Sanguis dra-
 conis herba, Ges. hort. & Lonicero. III. Acetosa pra-
 tensis seu lapathum quartum Dioscoridis, & Lapathum
 syl. Plinij. C. B. Acetosa & Lapathum acetosum, Brunf.
 Acetosa, Lon. Oxalis, Trago. Matth. Fuch. Dod. gal.
 & fol. Lac. Oxalis prima, Cæsal. Oxalis maior, Matth.
 in icon. Lugd. Lob. cui & Lapathum oxalida. Acetosa
 maior, Cast. Lapathum minimum, Ges. hort. Rumicis
 seu Lapathi quarta species, Cord. in Diosc. Huius fo-
 lia aliquando crispantur: aliquando media ipsorum
 pars per longitudinem candida reperitur: nonnun-
 quam vtrinque ab exortu duplici sagittali figura con-
 spiciuntur. Huius species in montibus reperitur, ma-
 ioribus & rugosioribus folijs, quam sunt ipsius pra-
 tensis, in reliquis vix differens, quæ in montibus Hel-
 ueticis & Sabaudicis reperitur: Est & alia tuberosa ra-
 dice: alia geniculis nodosis: alia Calthæ folio: alia ro-
 tundifolia seu Romana, quæ maximis etiam folijs re-
 peritur. IV. Oxalis aruenis lanceolata. C. B. Oxalis mi-
 nima, Trago. Dodo. fol. Oxalis minor, Matth. Gesn.
 hort. Lugd. Oxalis parua, Dodo. gal. Oxalis veruecina
 tenuifolia sinuata. Lob. Oxalis sponte nascens, Cæf. Oxa-
 lis ouina, Tab. Acetosa minor, Cast. Acetosella, Lon.
 Rumicis seu lapathi sextum genus, Cord. in Diosc. Hæc
 maior minorue, latioribus angustioribusq; folijs, pro-
 ratione loci pinguioris aridiorisue reperitur. Eadem
 reperitur etiam non lanceolata. V. His addamus Ace-
 rosam Creticam, semine aculeato, prius à nemine de-
 scriptam nec pictam. Hæc cauliculis est sæpe plurimis
 dodrantalibus, humi reclinatis, in alios ramulos diui-
 sis, folijs paruis, oblongo pediculo donatis, oxalidis
 veruecine forma, sed auriculis carentibus, ramulis flosculi iunguntur & adherent multi exigui, quibus

V. ACETOSA CRETICA.



veruecine forma, sed auriculis carentibus, ramulis flosculi iunguntur & adherent multi exigui, quibus

rense: Lapathi syl. tertium genus, Lugd. Sanguis dra-
 conis herba, Ges. hort. & Lonicero. III. Acetosa pra-
 tensis seu lapathum quartum Dioscoridis, & Lapathum
 syl. Plinij. C. B. Acetosa & Lapathum acetosum, Brunf.
 Acetosa, Lon. Oxalis, Trago. Matth. Fuch. Dod. gal.
 & fol. Lac. Oxalis prima, Cæsal. Oxalis maior, Matth.
 in icon. Lugd. Lob. cui & Lapathum oxalida. Acetosa
 maior, Cast. Lapathum minimum, Ges. hort. Rumicis
 seu Lapathi quarta species, Cord. in Diosc. Huius fo-
 lia aliquando crispantur: aliquando media ipsorum
 pars per longitudinem candida reperitur: nonnun-
 quam vtrinque ab exortu duplici sagittali figura con-
 spiciuntur. Huius species in montibus reperitur, ma-
 ioribus & rugosioribus folijs, quam sunt ipsius pra-
 tensis, in reliquis vix differens, quæ in montibus Hel-
 ueticis & Sabaudicis reperitur: Est & alia tuberosa ra-
 dice: alia geniculis nodosis: alia Calthæ folio: alia ro-
 tundifolia seu Romana, quæ maximis etiam folijs re-
 peritur. IV. Oxalis aruenis lanceolata. C. B. Oxalis mi-
 nima, Trago. Dodo. fol. Oxalis minor, Matth. Gesn.
 hort. Lugd. Oxalis parua, Dodo. gal. Oxalis veruecina
 tenuifolia sinuata. Lob. Oxalis sponte nascens, Cæf. Oxa-
 lis ouina, Tab. Acetosa minor, Cast. Acetosella, Lon.
 Rumicis seu lapathi sextum genus, Cord. in Diosc. Hæc
 maior minorue, latioribus angustioribusq; folijs, pro-
 ratione loci pinguioris aridiorisue reperitur. Eadem
 reperitur etiam non lanceolata. V. His addamus Ace-
 rosam Creticam, semine aculeato, prius à nemine de-
 scriptam nec pictam. Hæc cauliculis est sæpe plurimis
 dodrantalibus, humi reclinatis, in alios ramulos diui-
 sis, folijs paruis, oblongo pediculo donatis, oxalidis
 veruecine forma, sed auriculis carentibus, ramulis flosculi iunguntur & adherent multi exigui, quibus

Semen succedit, tenuibus membranis aculeatis inclusum, cuius nomine cum Tribuli terrestris semine similitudinis aliquid habet, minus tamen est, minusq; pungens, cui pediculus oblongus, incuruus, tenuis ut in Caltha additur. Iunio floruit & semen maturuit, in horto Illustris Ducis Wirtenbergici, qui Montembelgardi colitur. VI. Hippolapathum latifolium, seu Hippolapathum Dioscoridi, Galeno & Plinio C.B. Rhabarbarum, Brunf. Rhabarbarum Monachorum Trag. Ges. hor. Rumicis alterum genus Fuch. Lapathum sativum Dod. gal. Lapathum hortense Lac. Lapathum maximum Ges. hor. Cæsalp. Lapathi vel Rumicis species Cord. in Dioscoridem. Hippolapathum Dod. fol. Matthiol. Hippolapathum sativum latifolium. Lob. Lugdunens. Hippolapathum hortense Matth. in icon. Lugd. Hippolapathum sativum, Cast. Tab. Bulapathum Scaligero. Patientia vulgi. Vtitur eo frequenter pro Rhabarbaro, sed duplici doli. Est & alterum rotundifolium. VII. Hydrolapathum folio cubitali. C.B. Rumex palustris vel septimus Trago. Hippolapathum, Dodo. gal. Ges. hor. Hippolapathum sylvestre. Matth. Cast. Hydrolapathum maximum, Lob. Lugd. Lapathum palustre, Taber. Rumicis seu Lapathi quintum genus, Cordo in Dioscoridem.

Lampsana

LAMP SANA.

CAP. CIX.

Lampsana sylvestre olus est. Plus alit quam rumex, & stomacho utilius. Cuius folia, caulesq; coquantur in cibo.

I. LAMP SANA.

* II. RAPISTRUM MONOSPERMON.*



Lampsana cōsideratio.

Lampsana Plinij.

Lampsana vires ex Gal. Nomina.

Quamvis hic inter olera, qua in alimentorum usum venire, Lampsana recensetur à Dioscoride, nullis tamen notis ab ipso describitur, quod fortasse suis in regionibus notissima haberetur: id quod nobis ita alii non evenit. Quamobrem dixerim unà cum Plinio lib. 20. cap. 9. inter sylvestres brassicas lampsanam esse pedalis altitudinis, hirsutis folijs, napi similibus, nisi candidior esset flore. Nascitur hac frequentissima in Hetruria, Apulia, ac plerisq; Italia locis, his praesertim campis, qui aratrum eo anno minime sensere: tamen si nobis hac tempestate non fuerit, nisi forsan urgente annona penuria, in alimentorum usum recepta. Meminit huius Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, his paucis verbis: Lampsana est succos praeus provere. it. Ceterum illita abstergendi nonnullam, digerendiq; facultatem possidet. Olus ut hoc Graeci καυλοσιν, ita Latini, sine Brassica sylvestris nominatur: italis Cauolo saluatico & rapo fuljo, & rapastrela.

Quae pro Lampsana à Matthiolo pingitur, Rapistrum esse aruorum, ex eius epistolis satis liquet. Hoc Rapistrum à similitudine cum folijs Rapae dictum videtur: Est flore luteo, est albo, aliquando purpureo, est & monospermon. I. Rapistrum luteum C.B. Lampsana, Matth. Cast. Lon. Lug. qui & alteram habet figuram, ut saepissimè solet, nomine Lampsanae verae. Lampsana flore melino, Taber. Lampsana, Ges. hor. Rapistrum, Brunf. Ges. hor. Dodo. fol. Rapistrum aruorum, Lob. Sinapi agreste quartum, Trago. Iriio Fuch. Erysimum Theophrasti, Dod. gal. Rapa sylvestris altera, Cæsalp. II. Rapistrum monospermon à nomine prius pictum nec descriptum. Ex radice longiuscula non crassa exurgunt caules pedales & altiores, rotundi, tenues, ramosi, eleganter virentes, leuiter hirsuti: folia per terram sparsa Rapi folijs similia, ad principium laciniata, dein subrotunda, leuiter sinuata, crassa leuiterque hirsuta, securdum cauliculos palmares, reuues, flores prodeunt, vulgari forma eleganter lutei, quibus siliquae pulcherrimae succedunt, rotundae quasi geminae, sibi insidentes (ut in radice gladioli) ita tamen ut pars superior, in qua

quod semen unicum continetur, sit maior: hæc strijs instar seminis Coriandri diuiduntur, & singulæ in oblongum filamentum abeunt. Huius semē Lampfanæ monospermi nomine Doctor Doldius Norinberga matuit. Maio mense floruit, & semen in horto Doctoris Zuingeri hic Basileæ maturuit.

I. BLITVM MAIVS.

II. BLITVM RVBEVM.



III. BLITVM ALBVM.

BLITVM. CAP. CX.

BLitum estur oleris modo, aluo vtile est: nullius in medicina vsus.

BLitum duorum est generum, rubrum nimirum, & album. Blitū duplex. Vtrumque notum, in hortis seritur ac etiam in ijs sponte & campis nascens. Rubro caulis & folia adeo rubeunt, ut coccineo colore infecta videantur, et si temporis tractu tandem purpurascant. Folia amaranthum referunt [minus tamen rubeſcentia] sicut etiam caulis, qui purpurascens, striatus, cubitaliſque flores edit spicatos, siue in racemi modum, pariter purpureos. Quin & radix [multifida] sanguineo succo madet. Est in hoc rubri genere alterum, quod nobis MAIVS BLITVM vocare libuit, quod crescat arbuscula magnitudine, folijs, & caule altero longe maioribus: flore grãdi, numerosis paniculis, siue spicis scatente, cacumine deorsum spectante, rubentibus amaranthi ferè modo, caule brachiali crassitudine, striato, firmoque, lignoso. Seritur in hortis & viridarijs, & habetur etiam fictiſibus ad fenestras opacandas. Auxiliantur peculiariter ad menses remorantes pronocandos, molas, & secundas educendas, si femina vapore decocti calidi suffiantur, adeo ut vapor ad vterum ascendat. ALBVM prouenit iſdem folijs, laxioribus tamen, & colore subalbidis. Flores & semen racematim coherentes, tenuibus insident ramusculis, ex alarum cauis procedentibus panicularum effigie, yluestris panicis modo. Hoc oleris Tridentina rura Biedone vulgo appellant, recipiturq; nonnullis in cibum. Id namq; aqua prius decoquunt, demum affuso oleo, vel butyro insartagine frigunt, additis allio, & omphacio, vel aceto. Veruntamen cibus is nonnunquam (ut ego ex visu testari possum) vomitum mouet, ventriculi, & intestinorum terminas facit, & alui fluxiones ciēt, excitata bile. Eaque propter Plinius lib. 20. cap. 23. ita de eo scriptum reliquit: Blitam inerti videtur, ac sine sapore, aut acrimonia vlla: unde conuitiis feminis apud



Handwritten notes at the bottom of the page, including a signature and the number '5'.

Bliti vires ex Galeno.

Nomina.

apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est: ventrem aded turbat, vt choleram faciat aliquibus. Dicitur tamen a tuersus scorpiones potum, e vino prodesse, & clavis pedum illi. Item lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocrates mensura sibi eo cibo putat: hactenus Plinius. Bliti meminit Gal. 6. simpl. med. hu. verbis: Blitum olus est esculentum, humide, rigidum, temperatura, in secundo maxime excessu a temperatis. Item 2. de alim. facul. Qui porro, inquit, atriplicem, blitum, gustabilem qualitatem intelligit, brassicam, saporis commeminit, lactucam in brassica, ac horum olerum medio esse non debet: itebitur: si quidem vna egregie desiccata, haec contra plane humida, aquosaque sunt. Quapropter non ex solo oleo, garoq, sed addito aereo sepius, nieliumque assumuntur: alias namque, stomacho infesta iunt. Diximus autem istiusmodi olera nonnihil ad laeuigandum acuum momenti asserre, maxime si cum humiditate glutinosam lubricitatem sortita sint: hac Galenus. Quo fit, vt mirari liceat, si Pliny, & Galeni scripta perpendamus: quod dixerit Dioscorides, Blitum alio vrile esse, & nullum in medicina vtilis. Eius nomen Graecum est βλίτον: Latinum, Blitum: Arabicum, Bachala iamenia, siue Bachala aliamania: Italicum, Blito: Biedone & Bietolone: Germanicum, Wäner: Hispanicum, Bredos: Gallicum, Poree rouge, Blette. Blitum rubrum maius, Graecis βλίτον μικρον: Italis, Blito, Biedone, aut Bietolone minore, & Gelosia. Blitum album, Graecis βλίτον λευκον: Italis, Biedone & Bietolone bianco.

IV. BLITUM POLYSPERMUM.



Blitum βλίτον, forte ita dictum quasi βλίτον id est, abijciendum, propter vilitatem, vel ab inullo fatuoue sapore. Genera plura esse Theophrastus 1. hist. 9. pronunciauit: quare aliud facimus maius, aliud minus: maius rubrum & album: minus quoque album & rubrum, hoc verò vel caule tantum, vel omnibus partibus rubet. I. Amaranthus maximus siue cristatus, an Erythraium Theophrasti 8. hist. 1. & 3. vbi Gaza Trionum vertit, C. B. Blitum maius, Matth. Blitum rubrum maius, Cast. & Lug. quod Polyanthes Dalechampius appellat: Bliti peregrini genus primum, Casalp. Blitum Indicum, Taber. Amaranthi species alia: arborescens cognominata, Ges. de hort. Amaranthus purpureus tertius, Dodo. gal. Amaranthus maior floribus obsoleti coloris, Dodo. fol. Amaranthus maior floribus panniculosis, spicatis purpureis, Lob. Amaranthus magnus, Cam. 1. Blitum rubrum maius C. B. Blitum rubrum, Matth. Lob. icon. Dodo. fol. Cam. Blitum rubrum minus, Matth. in icon. & Lugd. Blitum maius rubrum vel secundum, Dodo. gal. Blitum satiuum rubrum, Ges. hor. Blitum primum vel rubrum, Casalp. Blitum, Lob. obs. & Taber. III. Blitum maius album. C. B. Dod. gal. Lob. Lugd. Blitum album, Matth. Cast. Blitum satiuum album, Ges. hor. Blitum, Lac. Blitum maius, Dod. folio. IV. Blitum polyspermum adiecimus, à seminis copia qua cauliculi onerantur dictum, quod ex radice alba gracili, plures caules sesquicubitales, etiam minores, striatos emittit, folijs paucioribus, pediculis oblongis donatis, eos cingentibus, Solani vel etiam Bliti forma, modò latiores, modò angustiores, ex viridi nigricantes, summis tamen minoribus: ex caule prodeunt plures ramuli, flosculis racemosis & muscolis, ex luteo viridibus onusti, quibus semen copiosissimum Botryos

instat nigrum & splendens succedit. Prouenit in nostris arenosis ad Wiefam fluium, sed longè humilius: maius verò in pinguioribus locis vbi finum reperitur, inter Blitum & Atriplicem. Hoc mirè capi pisces auctor est Cassianus, cui Polyspermon dicitur, vt & Lugd. cui & Anguillara experimèto nixus subscipit: Polyspermon, Lob. & Tab. Blitum syluestre, Cam. ad Matt. quid si ad Blitum tertium Tragi referatur?

Malva

MALVA.

CAP. CXI.

Malua satia eius longè aptior syluestri: stomacho aduersatur: aluum iuuat, sed multò magis caules interaneis, & vesicæ vtilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, ægilopas ex melle sanant: verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra saleni vtendum est. Contra aculeatos apum, vel parumque ictus, illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feriuntur: vlcera manantia in capite, furfuresque cum vrina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tritaque vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in fessione mollit: prodest erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur, contra phalangiorum morsus remedio est: lac euocat. Semen in vino potum, addito loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.


Malua conf.

Malua vulgaris aded notitia est, vt nulli ferè reperiuntur, qui eam non nouerint: hac olim antiquis de industria in hortis seruebatur, in quibus nunc spontè frequentissima prouenit: ea enim tunc vescebantur homines, eateo modo. Plura eius genera: Vna hortensis, altera agrestis, & vtraque maior, & minor. Vulgaris aded notitia Malua est vt eam calamo delineare opus non sit, sed ea, quæ aliquibus locis in Italia arborescit, nit aliud est, quam satia cultorum manonio in tantam magnitudinem assurgens, vt lib. 1. de plant. hist. cap. 5. prodidit Theophrastus, cum inquit: Quodam etiam comperta sunt ob culturam diuersa effici, atque à sua natura discedere, vt Malua in altum se attollens, atque in arborem transiens. Quippe ita fit neque tempore longo, sed mensibus senis, aut septenis, ita vt longitudine, crassitudineque instat hasta

Malua in arbore Theophrasti.

I. MALVA.

II. MALVA MAIOR.



* III. MALVA ROSEA
flore pleno.*



hæsta possit grandescere: quæ propter comode ad vsum baculi ve-
nit. Tempore verò longiore exacto, pro ratione magis quoque
incrementa capebat: hætenus Theophrastus Plinio lib. 19. cap.
4. præter eam, quæ in Arabia septimo mense arborefcit, & ba-
cutorum vsum præbet extemplo, est & Malva arbor in Mau-
ritana Lixi oppidi aestuario, vbi Hesperidum horti fuisse pro-
duntur. Ipsa altitudinis pedum viginti, crassitudinis quam
circumplecti nemo possit: in simili genere habetur & canabis.
Maluâ, quæ in arbore degenerauerat, vidi ego primùm Gri-
gnani ad Benaci ripas, in quodâ monachorû cœnobio, vbi eorû
otio, & cultu tantâ sibi ascuerat amplitudinẽ. Est & ea inter
maluarû genera recedenda, quæ in hortis ac viridarijs grande-
fcit arbuscula instar, caudice simplici, magno, rotundo, baculi
faciẽ referẽte. folijs amplis, raris & quæ ad terrâ sunt, nõ vt in
altera diuisa spectantur, sed tantû per ambitû leuiter simbriatû
ferratis: ijs verò, qui in caule sunt, vulgaris maluæ modo diuisis
floribus vt in altera rose maioribus, & nõ vt in altera versico-
lorib. sed in quibusdâ simplici omnino foliorû ordine, syluestri
rosa modo, in alijs verò multiplici. Radice nititur firma, diua-
ricatâ, sicut lupino maiore. At POLYCAVLON, folia ge-
rit hortensis maluæ grandiora, subhirsuta, per ambitum hor-
tensis maluæ modo diuisa, longisq; pediculis appensa. Stolonibus
pluribus ab vna radice prodeuntibus, tricubitalibus, &
quandoque maioribus, subhirsutis, baculi effigiem referentibus:
floribus, in toto serè caule magnis rosarum effigiem refe-
rentibus, foliosis, colore vario: nam in quibusdam plantis pur-
pureus, inflammatus, in aliquibus candidus, in nonnullis, car-
nis colorem referens, visitur, adeo vt forma ita etiã colore
cum rosis certare videatur. Huius flores minus quàm rose fugaces
sunt, sed inutiles & nullo prorsus odore præditi [* Nam
si vt rose nares conciliant, quemadmodum oculos hilari for-
ma ac coloris viuacitate alliciunt, nulli dubium est, quin de
præstantia ac pulchritudine cum rosis certare potuissent.*] At


Malua arbor
Plinio

Malua rosea

Rosa est fugacior sit, hoc magnopere præcellit, quod odore sit gratissimo, tam recens, quàm sicca: tum quoque quod præcla-
rissimi sit facultatibus prædita. Semen edit ceteris maluis simile, sed maius. Radice nititur longa. Althæa modo flexilis
ac lenta. Seritur in hortis, & viridarijs, ac etiã in scitilibus, ad opacandas in æstate fenestras. Hanc itaque, nihil est,
quod

Malua quar-
ta.

quod prohibeat, quia Maiorem malaam appellare possumus: quanquam non desint, qui arboream malaam ipsam appel-
lent. Cum tamen Gal. li. 7. de simpl. medic. facultatibus, & li. 14. nihil aliud sit ar' ad εὐδρομαλάχην quam Althea. Eam
nisi facile prestare potest, qua & cetera maluarum genera. Scripsit ad me superioribus annis Ioan. Iordanus Medicus, nati-
vitate Genuensis, sed hactenus non potui ab eo hanc plantam extorquere. Quartam quam hic quoque
expressimus, nusquam antea à me conspectam, mihi dono misit Franciscus Calzolarius Pharmacopaeus Veronensis, & tri-

IV. MALVA MAIOR
altera.

V. MALVA QVARTA.

Maluz vices
Matthiolo.Omnimor-
bia.Maluz vices
ex Gal.

Nomina.

plantaria studiosus. Folia profert oblonga Hedera heliciis ferè modo, per ambitum sinuata, sed haud profunde divisa: pos-
culus praelongis inhaerentia, caulibus multis, lentis ac foliosis: floribus ac seminibus hortensis maluz. Prouenit sponte in altis
montibus. Magis digerit quam domestica, minusq; humiditatis habet. Non differt viribus ab alijs Malua generibus. Malua
radix sicca, die vna in aqua macerata, & deinde madida papyro circumuoluta, & sub cinere feruenti decocta, & in unum
siccata, vtiliter vsurpatur ad dentifricia: mundat enim afflicta dentes, & gypseam materiam soluit. Foliorum & radicis
decoctum gargarizatu exasperatas fauces lenit, mucago verò acrimonias emendat: Fegues facta folia in cibum apposita rha-
cedines expediunt, ex oleo autem, sale, & recenti butyro aluum citant. Fit è folijs cum salignis siondibus vtriusq; vniuersi-
mum emplastrum ad vuluerum, & alias quascunque inflammationes. Valent eadem cum porris & capis illis ad se-
pentium venenosorum morsus. Succus auribus instillatus dolorem sedat. Decocta vna cum radice ad lentorem vsq; datur po-
tenda agrè parturientibus magno iuuamento: id quod etiam praestat succus selibra pondere haustus. Semen ex vino rubro
potum nauisem tollit. Cauliculi molles decocti delibratiq; comeduntur ex aceto, & oleo, & sale, asparagorum modo, &
prima statim mensa, ad citandam aluum: in summa, malua ad multa vtilis est. Ideoque non immerito antiqui Maluam
omnimorbiam appellauerunt. Datur vtiliter succus potandus melancholicis sex vnciarum pondere, at insanientibus vncia
octo propinquantur. Malua meminit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Malua agrestis quidem dige-
rentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis: Hortensis verò quanto plus habet aqueae humiditatis, tanto faculta-
te imbecillior est. Fructus eius tanto validior est, quanto & sicciior. Porrò huius generis est & ea, quae anadendromalache
nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo: appellatur etiam althea. Et libro 2. de alimentorum faculta-
tibus: Est, inquit, ab hac hortensi alia quaedam syluestria malua, ceu à lactuca est ὀπίσθαιον, id est lactuca syluestria: Inter re-
rò has congeneres plantas id est discriminis, nempe quod sicciiora sint syluestria, satina humidiora. Permissum quoque est
maluz succo aliquid glutinosum, quo lactuca caret. A refrigerandi facultate manifestè abest, vt etiam ante sumptionem
cernere licet, si ex ambobus vicissim oleribus cataplasma ad calidum quempiam affectum, quale est erysipelas, componatur: id
quod factitare homines consueuerunt, molliuscula folia perquam diligenter tundentes, donec ad leuorem exactissimum re-
ducta sint. Tum namq; cognosces lactucam manifestè refrigerare, maluam verò modicum, & quasi tepidum quendam ca-
lorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidum est, sed etiam quia glutinosum, praecipue cum
olei garrumq; affatim vna hauritur. Ad concoctionem mediocriter se habet. Si horum trium olerum succos inter se com-
pes, tenuis & absterforius beta, malua crassior glutinosiorq; lactuca in vtriusq; medio stasuetur. Herba, quae Μαλάχη Grae-
cè, Malua Latine vocatur: Arabicè, Chubeze, seu Chabazi: Italicè Malba & Malua: Germanicè, Pappel: Hispanicè, Mal-
na: Gallicè, Malue. Malua arborea, siue Malua maior: Graecis Δειδρομαλάχη: Italis, Malba siue Malua maggiore: Germa-
nis, grosse Pappel: Gallis, Malues de iardin. Malua maior vnicaulis Graecis Δειδρομαλάχη μονόκαυλος: Italis, Malua
arborea, siue Malua maggiore à un gambo solo. Malua hederacea, siue montana: Italis Malua saluatica montana.

Malua

Malua quoddam aluum molliat, idcirco Græcis *μαλάχη* à *μαλάσσω* emolliendo ventre, propter naturalem lentorem suum, ut Paulus asserit: unde Martiali Mollis dicitur. Nouem species in Phytopinace recensimus. I. Malua syluestris folio rotundo, quam Theophrastus 7. hist. 7. coqui, & cibo esse idoneam scribit. C.B. Malua, Brunf. Matth. Lac. Cast. Malua vulgarissima & prima, Trago. Malua syluestris pumila, Fuch. Dod. gal. & fol. Thal. Malua syluestris repens pumila, Lob. Lug. Malua syluestris lupina, Cord. hist. Malua agrestis minor, Gef. hort. Malua minor, Lonic. Malua syluestris minor, Tab. & vulgaris minor Cam. Malua flore candido, Cæsalpino II. Malua rosea folio subrotundo, flore simplici, quæ Malua satiuua est apud antiquos, & quam cultu arborefcere scribit Theophrastus, Malope Plinio C.B. Malua hortulana Brunf. Malua hortensis, Fuch. Dod. fol. Lac. Malua satiuua, Dod. gal. Malua maior, Matth. Malua rosea fruticosa, Lob. Malua arborea siue hortensis. Tab. Malua rosea simpliciore flore, Lug. Floribus est candidis, rubentibus saturatis vel dilutis, siue ex rubro nigricantibus. III. Malua rosea folio subrotundo, flore pleno, C.B. Malua Romana multiplex, Trag. Gef. hort. Malua rosea, Matth. (in minoribus figuris pingit simplici, in maioribus pleno flore) Malua rosea multiplex, Lob. Tab. Lug. cui & Rosa transmarina. Malua hortensis multiplici flore, Dod. fol. Lon. Habetur candido, incarnato, rubro, puniceo, nigricante flore, eoque maiore & minore. IV. Malua arborea Veneta dicta flore cæruleo. C. B. Malua maior altera, Matth. Lugd. Malua arborefcens, Gef. hor. Dod. fol. Cam. Malua arborea, Cast. V. Malua montana hederaceo folio, C.B. Malua quarta, & Malua hederacea siue montana eidem in icon. & Cast. Malua maior tertia Matthioli, Lugdunensi.

Ἀτρίπλεξ.

ATRIPLEX.

CAP. CXII.

Atriplicem aliqui chrysolachanon vocant, cognitum olus est: duo eius genera, syluestre, & satiuum. Coctum estur, ut olus: aluum molliat. Panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur. Semen cum aqua multa potum, regium morbum sanat.

I. ATRIPLEX DOME-

stica.

II. SPINACIA.



60 **E**t si in Hetruria hortis rara admodum sit Atriplex, frequentissima tamen apud Insabres seritur à ruricolis in hortis, & Attiplicis consideratio. in campis, quod ex ea presertim rura sibi quoddam placenta genus conficiant hoc modo: Incidunt enim acutissimo cultello Atriplicis folia, & caseo in scobem attrito, butyro, ac suis commiscunt, & in sartaginibus foliosa pasta substrata, decoquant, comeduntq. abunde, perunctis vndique labijs. Hac inter olera ocysime affurgit: nam & seritur, & manditur decimo quinto a satu die. Trium est generum, hortense, syluestre, maritimum. Hortense ATRIPLEX folia promit [humotenus] cauletenus lata, in mucronem tamè desinentia, sagittarum instar, pinguis, succosa, colore ex viridi in luteum languescente. Caulis, qui illi rubet, multis vndique adnatis ramis, ad quatuor cubitorum mensuram adolescit: semine spicato, pressis, tenuibusq. foliulis concluso. Præstat Atriplex in cibis vere tantum: siquidem ut ocysime crescit, ita & velocissime senescit, & deperditur. Credidere recentiorum quidam Atriplicem, & Spinaciam vulgò dictam, eiusdem esse generis. Verùm ij, meo quidem iudicio falluntur apertissime: quippe præter id, quod Spinacia nouum in Italia olus est, & foliorum, & caulis, Spinachiam. Hb & semi-



Plantaginis
vires ex Gal.

culdbio falluntur. Plantago (vt scriptum reliquit Gal. lib. 6. simpl. med.) mista est temperatura: habet enim quiddam aqueum frigidum, habet vero & austerum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaque refrigerat simul, & deficcet, & in utroque secundi excessus a medijs est. Porro medicamenta, qua cum hoc quod refrigerant, vna etiam sicca sunt, ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines conueniunt, ac proinde & ad dysenterias: nam & sanguinis profusio sistunt, & si quid aduratur, refrigerant: tum sinus quoque glutinant, & alia vlcera recentia simul & vetera. In omnibus ferè id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secunda est plantago, idque temperatura symmetria, & conuenientia. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem, qua nondum obtupeat. Semen eius, & radix similis sunt facultatis, nisi quod siccioris, & minus frigida. Sed semine etiam subtilium est partium: radices vero crassiorum. Ipsa autem herba folia exiccata tenuioris, & minus frigida facultatis sunt: nempe distillato ex eo, ac digesto excremento aqueo. Hac ratione & radicibus vtuntur ad dentium dolores tum mandentes, tum collutionibus ipsorum incoquentes. Praeterea ad iecinoris, & renum obstructions, non haec tantum adhibent, sed folia quoque, & multo magis semina. Haec enim quandam in se absterzendi facultatem obtinent: qua & in herba viridi inesse satis conici potest, verum ab humiditate copia vincit. Herba, qua Graeci ἀπρόγλωσσον, Latinus Plantago vocatur: Arabibus, Lisen, aut Lisan alhamel: Italia, Piant. quae seu Centinerbia: Germanis, Begerich: Hispanis, Lhantem, Tamehagem: Gallis, Plantain. Plantago media siue minor, Graeci ἀπρόγλωσσον μικρὸν, siue μέσον: Italia, Piantagine minore. Plantago longa Graeci, ἀπρόγλωσσον μακρὸν: Italia, Piantagine longa, siue Lanciola. Plantago aquatica recentioribus appellata, Graeci incognita: Officinis, Barba glauca, Italia, Piantagine aquatica.

Nomina

III. PLANTAGO LONGA.

V. PLANTAGO AQUATICA.



Plantago à planta ducto nomine, plures habet differentias, vt in Phytopinace monuimus. I. Plantago latifolia maxima sinuata. C. B. Plantago rubea, Brunf. Trag. Lon. Plantago maior, Matth. (figura enim transposita in alijs editionibus) Fuch. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Tab. Cast. Cam. Plantago latifolia, Cord. in Diosc. Plantago vulgaris latifolia, Lob. & Lugd. Arnoglossa. Plantago latifolia laeuis, Lob. icon. Plantago καλύπτου maior seu rubra, Thal. Plantago & Centineruia, Cæsalp. II. Plantago ROSEA, quae Plantaginis latifoliae maximae species est, cum ea foliorum forma & radice conuenit, at caule, seu spica variat, quae multo breuior est: antequam enim penitus adolescat, multis foliis conuestitur, ita vt foliorum & densitate & frequentia herbaceum florem multiplicis rosae instar, forma non colore, ostendat. Vocatur Plantago rosea Aduers. Lob. icon. Lugd. & Cam. Plantago multiplex Tabernae montano. III. Plantago latifolia maior incana. C. B. Plantago maior, Brunf. Matth. Lac. Lon. Lugd. Plantago maior incana, Lob. 60 Plantago media, Fuch. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Thal. Plantago latifolia vel media, Trag. Plantago tertia, Cord. in Diosc. Plantago minor Dioscor. Tab. Cynoglossa quorundam, Lugd. Haec etiam reperitur spica multiplici seu pannicula sparsa. In hoc genere & minor est. IIII. Plantago angustifolia maior. C. B. Plantago minor, Brunf. Fuch. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lac. Lon. Lugd. Plantago lanceolata, Trag. Tab. Plantago longa, Matth. Plantago angustis oblongisque foliis, Cord. in Diosc. Plantago quinqueneruia, Lobel. Plantago media, Cast. Lanceola vulgo, Cæsalp. Plantago ἀπρόγλωσσον minor, Thal. Haec aliquando caulem palmarem emittit, in cuius summitate folia plura habentur, eo modo quo ad radicem disposita: spicis rotundis breuissimis, panniculis lanuginosis insidentibus. Habetur & altera angustissimo folio, quam in Phytopinace descripsimus. Addere oportet & angustifoliam minorem: & denique partem quandam

quandam, quæ spicarum loco globulos habet hirsutos, albos, quam à Doctore Io Henrico Cherlero vnâ cum aliis Nemauso accepimus, cuius & iconem & descriptionem in vniuersali nostra historia exhibebimus. V. Plantago aquatica latifolia. C. B. Barba Syluana, Ianuensi: Plantago aquatica, Brunf. Trag. Matt. Fuch. Dod. gal. & fol. Ges. hor. (cui inproprie plantago) Lon. Cast. Lugd. Thal. Casalp. qui vult plantaginem maiorem Dioscoridis & Plinii, ab hac non abhorre. Plantago palustris siue aquatica, Tab. Plantago aquatica foliis Betæ aut Plantaginis, flore Gallii albi, Lob. icon. qui in obser. an. Alisma siue Damalorum sit dubitat. Reperitur huius species angustifolia, quæ & humilior est.


Sium. SIVM, SEV LAVER. CAP. CXX.

10 Sium in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, foliis latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratio. Quæ cruda, coctaque esu, calculos rumpunt, atq; excernunt: vrinas cient: menses, & partus extrahunt: dysentericis in cibo auxiliantur. De Sio Crateuas tradit, a herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam menthæ, nigra, & † ad erucam accedentia.

a Me. & Dra. πία βαμικο-
δης ὀλίγη ἐ-
χρησα πολλά
φύλλα περι-
εργή. herba
fruticosa, exi-
gua, habens
multa folia
rotunda.
† Οἰβ λιπα-
ρὰ. i. pinguis.

I. SIVM VERVM.

II. SIVM VVLGARE.



10 Sium in scaturientium fontium riuus, quorum aqua hyeme calent, æstate verò frigescent, plerumque nascitur. Ceterum fallitur apertissime, qui pro Sio herbam Crescione vulgò vocatam, tam scilicet dulcem lactuca similem, quam acrem, ac subamaram, cui nasturtij sapor, & eruca folia insunt, in medicamentis vsurpant. Quippe quòd ea non alia sit planta, quam sisymbrium aquaticum sequenti capite à Dioscoride descriptum, non legitimum Sium, quod nostratibus Senensibus vulgò vocatur Gorgolestro. Hoc enim à Dioscoridis Sio nullus prorsus disidet notis: quandoquidem pinguis est planta, caule recto: foliis latis, in ambitum serratis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis: umbellas profert in summis caulibus, floribus candidis: semine odorato, aniso non dissimili. Rari admodum sunt fontium riuuli, quibus aquaticum sisymbrium inuadet, qui Sium etiam nò habeat. Sium VVLGARE, caulem edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragilem; folia gerit apij, non insuauia, flosculos in summitate albos, semine corniculis incluso, paruo, minutog; radice superuacua. Prouenit tantum in aquis decurrentibus, perinde ac Sium verum. Plin. lib. & ca. 22. Sium cum aquatico sisymbrio Plinii lapsus. 60 confudisse videtur: quòd Sio Sisymbrii aquatici vires assignauerit, nominis fortasse communitate deceptus. Nam Dioscoridis testimonio, sisymbrium hoc, quòd aliqui cardaminam vocant, nonnulli etiam Sium appellant. Vnde quòd forte existimauerit Plinius, Sium & Cardaminam vnâ & eandem plantam esse, vni tantum Sio vtriusq; facultates reddidit: et si Plin. lib. 20. cap. 22. speciatim de syluestri sisymbrio in riguis proueniente disseruerit. Serapio Sium Senation vocat: verum Senatio Senecio Dioscoridi alia est planta, vt lib. 4. in eius mentione explicabitur. Confert Sium in cibis ys, qui oculorum bebetur: Sium laborant, qui metiam spleneticis, & malo habitu laborantibus. Cruda folia coctave esa, calculos rumpunt atque excernunt, vrinas cient, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. Hepatis obstructions quoque expedit, vniuersa planta decoctum potum, auriginem tollit, hydropicos iuuat. Ventris tinea pellit, id quòd valētius facit eius semen tritum, cosblearis mensura, ex vino austero potum. Succus illitus lentigines delet. Decoctum cum sale, & nitro, equorum scabiem sanat. Prouenit etiam eo quidam in acetariu. Sium vulgare, excalfacientis est facultatis, quæ tamen imbecillior illi est.

Sii confid.

Plinii lapsus.

Senatio Se.

Sii vsus.

*III. SPINACHIA SEMI-
ne non spinoso.*



V. ATRIPLEX SYLVE-
stris. II.

IV. ATRIPLEX SYL-
uestris. I.



VI. ATRIPLEX SYL-
uestris. III.



Spinachia
descrip.

& seminis forma, atq; colore ab atriplice maxime differt, sicuti & sapore. Namque suspicatur Manardus Ferrariensis, no-
scio tamen qua ratione ductus, Atriplicem, & Spinaciam Chrysolachani speciem esse. Sed eius sententiam minime proban-
dam censeo: chrysolachanon enim Latinis aureum olus significat: quod tamen si Atriplici competere possit, non tamen ob id
Spinacia convenire videtur, qua folijs, caule, flore, ac semine perpetuo vivescit. Seritur Augusto, quin etiam Martio. Na-
scam

Chrysolachanon
Sunt.

*VII. ATRIPLEX ANGV-
sto Centinodiæ folio.*

IX. ATRIPLEX MA-
rina.



situr septem diebus à fatu, folio primum triangulari, deinde sagittali, mox à pediculo intubi sylvestris modo laciniato: exiguatur radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, & saepe longiore, intus cauo. Flores gerit in vertice rotundos, paruos, herbaceo colore, racematim coherentes: semen spinosum, angulosumque prouenit, in quocunque solo, quod stercoreatum fuerit, & copiosa vbique crescit in hortis: hyemes, & frigora spernit. Nam in Bohemia, hyeme tota, venale in plateis reperitur, & frequentissima. In quo genere foemina quoque habetur: hac facile noscitur, quod semen nusquam proferat. Non desunt, qui putent hoc olus ex Hispanijs primum fuisse aduectum, ob idque volunt spanaceum, non spinaceum appellari debere, sed reuera, à spinoso semine ita denominari cepit. Coquitur plerunque sine aqua, nam cum multum

Spinaciae fac.

humoris inter coquendum remittat: proprio contentum iure videtur. Refrigerat, & humectat ordine primo, nec omnino vacat nitrosa qualitate, aluum emollit, flatus parit. Bilitur eius succus ad scorpionum, phalangiorum & araneorum ictus, ac etiam vulnere illinitur, quimeriam coctum lenit exasperatas fauces. Caterum duo alia Atriplicis genera habentur, vnum sylvestre, alterum maritimum. Sylvestre aliquot habet species: nos hic tres excudi curauimus, foliorum diuersitate distimiles. Primum genus folia edit hortensi haud dissimilia, minora tamen & qua ad terram sunt per ambitum laciniata, subalbicantiaque: caulem sesquicubitalem, ramosum, ac etiam striatum, semen racemosum, & exile. Radicibus nititur numerosis, ac tenuibus. Nascitur sponte cum in hortis, & vineis, tum secus itinera, & locis incultis & campestribus. Secundum folijs exit latioribus, quercus modo per ambitum incisus, subalbicantibus: cetera cum altera paria sunt. Nascitur propè urbium mœnia, & locis quoque alijs incultis. Eadem illi sunt qualitates & vires, quae priori. Tertium folia habet lata, viridia, carnosia, per ambitum laciniata & in acutum desinentia: semen racemosum, ceteris minutius, caule ramoso, firmo atque striato. Nascitur intra & extra urbium, & oppidorum mœnia, & in aruis. Viribus praestat, quibus & praecedentes.

Atriplicis alia genera.



ATRIPLEX verò in maritimis nascens, humi iacet, suos circumquaque caules spargens, in quibus folia sunt subalbicantia, spinachij oleris figura, sed minora, salso sapore. Semen profert in caulium summitatibus, baccis quibusdam inaequalibus racematim coherentibus. Radice nititur diuicaria, multiplici. Vis illi, quae ceteris atriplicibus, sed propter salsedinem, quae referta est, magis quidem aluum citat, magisq; abstergit, si è carniū iure decocta edatur: digerit, incidit, attenuat, liquat, & putredine vindicat, aperit, & abradendo expurgat. Flumentem ventriculum siccatur, hydropicos iuuat, pingues extenuat. Huius nulla (quod equidem sciam) facta est mentio à Dioscoride & Galeno, sed ijs facile sese offeret, qui non grauatur, vt hanc & alias maritimas herbas cognoscant, maris litora peragrarè. Eam nos copiosam inuenimus Tergesti ad salinas in maru litore, nimirum diuersam ab halimo olerè maritimo, vt eius imago, quam hic damus, aperte declarat. Inibi quoque plantam illam nobis contigit videre, quae KALI Mauritaniae appellatur, cuius cinere vtuntur fabri vitrary ad vitrum

Atriplicis marinae descriptio.

conficiendum: ex decocto autem eiusdem herba paratur sal illud, quod Alkali iisdem dicitur. Hac cum primum terra emergit, folio est tereti forma, minori sedo non ab simile: atque deinde crescens, caule erecto, geniculato, nō multo post tempore indigitalem fermè longitudinem attollitur. Cum verò amplius adoleuerit, è geniculis folia emittit pingua ac crassa, in medio cana, & ex lata origine mucronata. Vbi denique planta adulta senescit, folia in caulium cacuminibus longè minora exiliaque conspiciuntur, colore rufo: ex quorum ortu pilulae prodeunt rotunda ac parua: quibus exile semen includitur. Caules habet pingues & rufos. Sapor vniuersae planta salis, veluti crithmo. Itaque excalfacit, adstringit, dissoluit: attenuat, contrahit, & desiccatur citra apertam caliditatem aut siccitatem. Hanc quidam alteram Dioscoridis Anthyllidem esse censent: sed errant, meo quidem iudicio, vt latius dictum est in sequenti libro, tum etiam in ea Apologia, quam in Anatem illum Lusitanum scripsimus. Atriplex, vt memoria prodidit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, humida, & frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis à medijs, frigida verò primi, quam vtique tepidam esse caliditatem

Kali Mauritaniae mentione.

Kali Anthyllidis altera quibusdam. Atriplicis vires ex Gal.




Attriplicis se-
mē ex Serap-
aluum mo-
net.

posuimus, cuiusmodi rosis inest. non tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimum terrena, similiter ma-
ua. Quin & ventrem celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatem. Porro paululum omnino eius est, quod digerendi obtinet
potentiam. Hortenses autem atriplex, & maiua, quam agrestes, tum humidiores sunt, tum frigidiores. Proinde phleg-
monis, & phygethliu incipientibus gliscentibusq, & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigentibus autem
& declin. antibus, ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet: itaque ad morbum re-
gium ex pituita (rectius fortè hepatis legendum) infarctu prognatum vtile est: hac Galenus. Scribit Serapio, Rasim vidis-
se hominem quendam, qui ex Attriplicis semine duarum drachmarum pondere sumpto, crebris tum vomitionibus, tum al-
ui deiectionibus vexatus fuit, adeò vt ad extremam virium imbecillitatem deueniret. Quod mihi quidem mirum non est: 40
quandoquidem noui ego pharmacopolam quendam, qui ad rusticos purgandos Attriplicis tantum semen exhibebat: quod
ijs non sine molestia magna aluum abundè ciebat, atque etiam simul crebros prouocabat vomitus: qua tamen facultas pau-
cis, vt puto, hactenus innotuit. Attriplex sic Latinis, Græcis ἀτρίπλαξ, καὶ χρυσοδάχρον, vocatur: Arabibus, Catas, seu
Caras: Italis, Attriplice: Reppice & Treppice: Germanis, Wolten vnd Wiltten: Hispanis, Armoles: Gallis, Follete, & Femes.
Choux, Arroches, Bonne dames. Spanachium, Græcis Σπανάχιον: Italis Spinace: Germanis, Espinat: Arabibus, Spanach:
Gallis Espinoches, siue Espinach. Attriplex syluestris, Græcis ἀτρίπλαξ ἀγρία: Italis, Reppie saluatico: Germanis Wildmil-
ten: Gallis, Arroches sauuages. Attriplex marina, Græcis ἀτρίπλαξ θαλασσία: Italis, Attriplice, siue Reppice marino. Kali
ita marinis vocata, Italis, Soda.

Attriplex ἀτρίπλαξ παρὰ τὸ ἀθρόως αὐξεῖν, vt pote quæ octauo á fatu die prodeat, vt habet Theophra- 50
stus 7. histor. i. Duodecim genera nouimus, quare diuidimus in hortensem, syluestrem & maritimam. Il-
læ in plures species distrahuntur, folijs namque rubicundis, in luteum languescens & nigricantibus:
sic & sinuatis & non sinuatis reperiuntur. I. Attriplex hortensis rubra, C. B. Lon. Attriplex fatiua folio ru-
bicundo, Trag. Attriplex domestica, Matth. Attriplicis fatiua species altera, Dodo. gal. Attriplex fatiua ruffo
folio, Cord. in Dios. Attriplex fatiua altera, Lugd. Attriplex fatiua, Lob. obser. Attriplex fatiua altera folio &
flore purpurea liuens, Lob. icon. Attriplex hortensis, Dod. fol. Attriplex rubra, Tab. Attriplex purpurea græ-
dis, Cam. Ab hac potissimum colore differt Attriplex hortensis alba. II. Lapathum hortense alterum
seu Spinacia semine spinoso, C. B. Spinachiam ob semina dura & spinosa coaceruata, at Σπανάχια recetio-
ribus Græcis à raritate, quòd rarè illa medici vtantur. Hispanach Arabibus. Spinachia, Brunf Fuch. Dodo.
gal. & fol. Tab. Spinacia, Matth. Lob. Lug. Casalp. Spanachium, Matth. in icon. Cast. Spanachia, Lon. Spi- 60
naceum olus & Seutlolapathum, Gef. hort. Seutlomalache Ruellio. Olus Hispanicum, Trago: cuius tres
sunt species, altera semine spinoso, quæ vulgatio, quæ mas quibusdam: altera semine non spinoso sed
rotundo, quæ fœmina: & tertia sterilis. III. Lapathum hortense alterum semine non spinoso, C. B. Spinachiam
manifestum habere sexum, rectè Scaliger, quare hic de nobili hactenus non depicta. Hæc ex radice oblonga,
tenuibus fibris constans caulè emittit pedalem, teretè, striatum, còcautum, infernè aliquando subruben-
tem, ramulis brachiatum. Folijs vestitur molliusculis, obscure virètibis, succi plenis, quorū inferiora multò
quàm in vulgari latiora, aliquando palmum æquantia, non acuta sed subrotunda & Boni heinrici instar
laciniata: superiora verò acuminata & ob vnam vtrinq; laciniam quasi triangula. In alarū sinu flosculi ra-
cematim coharēt, quibus semina rotunda, nequaquã spinosa, verrucarū instar còglobata succedunt. Hæc
diligen-

diligentiſſimè coli deſiderat, quare in paucioribus hortis habetur, & quò ſæpius tenella ſucciditur, eò ſurculioſior euadit. Dicitur Olus Hispanicum & Spinachia nobilis, Trago. Spinacia fœmina, Gef. hor. Spinacia ſatiua mas, Lugd. & Camerario. IV. Atriplex ſylueſtris prima, Matth. Lugd. Atriplex ſylueſtris, Fuch. Dodo. gal. & fol. Gef. hor. Lac. Atriplex ſylueſtris maior, Lonic. Cynocrambe prima, Cæſalpino. V. Atriplex ſylueſtris ſecunda, Matth. Lugd. Tab. Atriplex ſylu. Cord. in Dioſ. Cæſalp. Atriplex ſylueſtris ſinuata, Lob. Dux hæ ſpecies tantùm foliorum amplitudine & exilitate differunt. VI. Atriplex ſylueſtris latifolia, C. B. Blitum quartum, Trago, Solanum quartum, eidem. Pes anſerinus, Fuch. Dod. gal. & fol. Lon. Lugd. Cam. Atriplex ſylueſtris tertia, Matth. Lugd. Atriplex ſylueſtris ſiue pes anſerinus latifolia laceris lacinijs, Lob. Chenopodium, pes anſerinus primus, Tab. Cynocrambe alterum genus, Cæſalpino. Huius & altera ſpecies eſt acutior & nigriore folio. VII. Atriplex anguſto Centinodiæ folio. C. B. Hæc ex radice parua fibroſa, caulem emittit lupinum, læuem, ſtriatum, qui mox in ramos brachiatur, hique in alios quos folia cingunt Helxines aut Cétinodiæ maioris æmula, oblōga, acuminata, integra, obſcurè virètia, quorum inferiora aliquando ad exortum in duas alias laciniantur: ramulis inſident floſculi exigui coacruati, ſuccedente ſemine cæteris minore, foliaceo, tenui cute obducto, racematim cohærente. Nascitur circa mænia, in areis, lociſq; ſimetarijs. Dicitur Atriplex ſyl. prima, Matth. inter maiores figuras, inter minores enim non expreſſit. Atriplex ſylueſtris altera, Dod. gal. Atriplex ſylueſtris humilima, & quarta Dod. fol. Atriplex ſylue. Polygoni aut Helxines folijs, Lob. Cam. Atriplex ſyl. prima Matthioli polygoni folio Lugdunenſi. VIII. Atriplicem ſylueſtrem lappulas habentem à nobis primum deſcriptam exhibet. Hæc atriplici ſylueſtri ſecundæ Matthioli aliquantum ſimilis: quæ ex radice parua, fibroſa, cauliculos plures emittit palmares & maiores, ſtriatos, leuiſſimè hiſpidos, longè à ſe inuicem diſcedentes, quos cingunt folia ſinuofa alternatim diſpoſita, alijs minora, breuibus pediculis donata, ad quorum exortum lappulæ duræ adhærent, in quibus ſemen nigrum, paruum, compreſſum continetur. Monſpeſſuli prouenit: eandem Atriplicis ſylueſtris hiſpidæ paruæ, erectæ nomine, à Doctore Doldio Norinberga accepimus. IX. Atriplex maritima. C. B. Atriplex marina, Matth. Caſt. Dod. fol. Lugd. Cam. Atriplex marina repens, Lob. Cynocrambe tertium genus, Cæſalpino eſt rubro & herbaceo ſemine. X. Kali Mauritanorum nomen eſt, quod aliqui ad Anthillidem alteram Dioſcoridis: alij ad eiuſdem Tragum, minus rectè, ſapore acerbo, & defectu acinorum reclamantibus, referunt: videtur Plinius lib. 8. cap. 22. ad Halymum retuliſſe. Nouem ſpecies in Phytopinace propoſuimus, duas adponimus figuras, quia vna figura vtramq; ac ſi vna foret, Matthiolus

* VIII. ATRIPLEX SYL-
ueſtris lappulas habens. *



quorum inferiora aliquando ad exortum in duas alias laciniantur: ramulis inſident floſculi exigui coacruati, ſuccedente ſemine cæteris minore, foliaceo, tenui cute obducto, racematim cohærente. Nascitur circa mænia, in areis, lociſq; ſimetarijs. Dicitur Atriplex ſyl. prima, Matth. inter maiores figuras, inter minores enim non expreſſit. Atriplex ſylueſtris altera, Dod. gal. Atriplex ſylueſtris humilima, & quarta Dod. fol. Atriplex ſylue. Polygoni aut Helxines folijs, Lob. Cam. Atriplex ſyl. prima Matthioli polygoni folio Lugdunenſi. VIII. Atriplicem ſylueſtrem lappulas habentem à nobis primum deſcriptam exhibet. Hæc atriplici ſylueſtri ſecundæ Matthioli aliquantum ſimilis: quæ ex radice parua, fibroſa, cauliculos plures emittit palmares & maiores, ſtriatos, leuiſſimè hiſpidos, longè à ſe inuicem diſcedentes, quos cingunt folia ſinuofa alternatim diſpoſita, alijs minora, breuibus pediculis donata, ad quorum exortum lappulæ duræ adhærent, in quibus ſemen nigrum, paruum, compreſſum continetur. Monſpeſſuli prouenit: eandem Atriplicis ſylueſtris hiſpidæ paruæ, erectæ nomine, à Doctore Doldio Norinberga accepimus. IX. Atriplex maritima. C. B. Atriplex marina, Matth. Caſt. Dod. fol. Lugd. Cam. Atriplex marina repens, Lob. Cynocrambe tertium genus, Cæſalpino eſt rubro & herbaceo ſemine. X. Kali Mauritanorum nomen eſt, quod aliqui ad Anthillidem alteram Dioſcoridis: alij ad eiuſdem Tragum, minus rectè, ſapore acerbo, & defectu acinorum reclamantibus, referunt: videtur Plinius lib. 8. cap. 22. ad Halymum retuliſſe. Nouem ſpecies in Phytopinace propoſuimus, duas adponimus figuras, quia vna figura vtramq; ac ſi vna foret, Matthiolus

Kali nomine propoſuit. Kali genicularum, C. B. Aduer. Lugd. Cam. Taber. Salicornia, Dod. gal. & fol. cui & Kali articulatum. Salicornia ſiue Kali genicularum vermicularum, Lob. icon. Alkali aliud, Gef. hor. Alkali, Lon. qui Matthiolum imitatur. Cali tertium: Salsicornia, Cam. ad Matth. qui quatuor habet differentias, quæ tamen parui ſunt momenti, (ipſomet monente) & autumnii tempore rubent. Kalli primam, Kellu Aegyptijs, Alpin. Salsolæ genus aliud, Cæſalpino. Hoc habetur & rubrum & viride. XI. Kali maius cochleato ſemine, C. B. Kali magnum ſedi medijs folio, ſemine cochleato, Aduerſ. Soda, Lob. icon. Kali magnum Lob. obſer. Penæ Lugd. cui & Kali Dalechampij. Salsolæ genus Iſgarum vulgo, Cæſal. Kali cochlearum maius Camerario.

Крѣпѣва. BRASSICA. CAP. CXIII.

BRASSICA ſatiua aluo idonea eſt, ſi modò leuiter ſeruefacta edatur: nam percocta aluum liſſit, ſed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur: ſtomachum autem malè habet, acrior eſt æſtiua. In Agypto propter amaritudinem non eſtur. Cæcutientibus, & tremulis eſſe prodeſt. Summo cibo ſumpta crapulâ diſcutit, & vini noxam reſtinguit. Melior ſtomacho cyma, ſed acrior, & ad ciendū vrinam validior: ea condita ſtomacho inimica eſt, aluum conturbat. Crudus ſuccus cum nitro, & iri deuoratus, aluum emollit: cum vino quoque epotus, viperarum morſibus auxiliatur: cum ſœnigræci farina, & aceto, podagris, & articulorum vitijs illinitur: prodeſt & ſordidis vlceribus, & vetuſtis illitis: caput purgat naribus infulſus: menſes extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per ſe illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque: epinyctidas, ignem ſacrum, leprasque ſanant: carbunculos ex ſale rampunt: ſtupeſcentes capillos retinent. Cocta addito melle aduerſus depaſcentia ulcera, gangrænasque valent. Lienoſisque ex aceto cruda proſunt. Manſa deuorato ſucco, retuſam vocem inſtaurant. Decoctum eius potu, aluum, & menſes ciet. Flos poſt conceptionem in peſſo ſubditus, partum abortu vitiat. Semen eius, præſertim quæ in Agypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota theriaca additur: faciei cutem lentiginesque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetuſto excepti, diuurnos laterum dolores mitigant.



Κράμβη ἀγρία BRASSICA SYLVESTRIS. CAP. CXIV.

Sylvestris Brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: sativæ similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cuius cyma in lixivio cocta, ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresque discutunt.

a Meū λιου-
κόν ὄρον. i. al-
bū liquorem
b Cat. λιπα-
ρά τῆν εὐκα-
σιν. i. pin-
guis consistē-
tia, sed de her-
ba nō de fuc-
to scribit
Dioscorid.
Brassicæ sati-
væ genera.

Κράμβη θαλασσία BRASSICA MARINA. CAP. CXV.

Marina Brassica à sativâ prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, longa, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, vt hedera, pediculo. a Albo succo prædita est, sed paucò, falso gustu, & aliquantum amaro, b pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissime aluum ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Sabellica.

Capitata seu lacuturris.



Caulorapū.

Brassica folijs laciniatis.

Brassicæ syl-
vestris consi-

Sativa Brassica, Theophrasto, & Plinio auctoribus, in multiplici recensetur genere. Id quod & horti in Italia attestatur: nam in ijs multiplex, & varia crescit Brassica. Brassica laevis, folio exit grandi, ima parte vtrunque dissecto, per ambitum simbrato, laevi, pinguique: caule breui, firmo, subalbicante, alba intus medulla. Flores edit melinos, & semen rapisimile, ac similibus quoque siliquis incassis, subrufo colore, & subamarum, seritur passim in hortis. Cato brassica tria fecit sfigia. Vnam grandibus, latisque folijs, caule magno, tonsilli cymarum luxuria. Alteram crispo folio, quam ab apij similitudine apianam vocant. Tertiam propriè vocatam cramben, minutis caulibus, tenerioribus folijs, laevem, teneram, tenui succo, acerrimam quidem omnium, & magis medicamento sam. Verùm Plinius lib. 19. cap. 8. Brassica (vt diximus) complures enumeravit species. Inter quas eam Sabellicam appellari tradidit, qua caule exit firmo, nodoso, latis & crispis admodum folijs, & qua in medio sunt crispioribus, lactuca modo in se concluditur, intus albicans: tenera, subdulcis, in cibis grata & qua hac ætate omnium præstantissima habetur. Ait enim, Sabellica vsque in admirationem crispa sunt folia, quorum crassitudo caulem extenuat, sed dulcissima perhibetur ex omnibus. Est & capitata conglomeratis vndaque in orbem folijs, Plinio lacuturris appellata, qui loco citato sic inquit: Nuper subiere lacuturres ex conualle Aricina, vbi quondam fuit lacus turrisque, qua remanet, capite prægrandes, folijs innumeri: alij in orbem porrecti, alij in latitudinem torosi. Nec plus capitū vili post trititanum, cui pedale aliquando conspicitur: & cyma nullis serior. Quæ omnia nostratibus brassicis capitatis, quæ vulgò Capucci dicuntur, pulchrè respondent. Folia fert primum ampla, subrotunda, à pedamento in gyrum sese fundentia, quæ deinde in orbem capitatum, ac solidum conglomerantur, qui in aliquibus rufescit, in quibusdam albicat, in nonnullis vitescit. Seritur in Germania in campis: in Italia verd in hortis. Viribus ab alijs Brassicis non differt, nisi quod in cibis nocentior habeatur. Est in super ex ijs, quæ nostris Italia hortis proueniunt, alia quedam, cuius caulis rapis in morem extaberat, manditurque subinde medulla, pingui iure incocta raporum modo. Huius non reperio meminisse Pliniam, nec eo vetustiores alios, qui de hortorum sationibus scripsere: sicuti nec illius, quæ folijs admodum per ambitum laciniatis, minutimq; intercisus assurgit. Perniciosa porro Brassicis omnibus cum vitibus odia seruantur, vitemq; viuam oleris huius odore fugari Theophrastus, & Plinius affirmat, asit amq; ad olus diffugere Varro tradidit. Quo argumento vsus Androcides, Brassicam contra temulentiam pollere credidit. Sed cur crapulam sedet, id causa reddidit in problematibus Aristoteles, quod scilicet dulcem nimirum succum, abstergentemq; contineat. Sylvestris in maritimis nostris Senensibus Argentario promontorio, alijsq;

III. BRASSICA CAPITATA. *IV. BRASSICA GONGYLODES.*



V. BRASSICA CAULIFLORA.



tum Tyrreni, tū Adriatici litoribus frequens nascitur. Planē non longē à Terracina vrbe; via qua itur Neapolim, plurimam vidimus, foliis domestica similibus, sed hyoscyami modo hirsutis, amaro ac insuavi gustu. Ex semine Brassicae veteris (vt Plinius est auctor lib. 19. cap. 10.) rapa sunt, atque inuicem. Brassica semen crassiuscule contrusum, & carniū iure Semitis vi- feruesactum, potumq; vnā cum ipso iure, colico dolore laborā- res. tes presentaneo remedio inuat. Brassica tormina discutit, si Brassica vires biscocta edatur, addito cumini semine, sale, & oleo, & hor- Matthiolo: deacea farina polline, praesertim si sine pane deuoretur. Idem facit ius decocta cū veterē gallo. Prodest idē ius iocinorosis, lie- nosis, & renū calculo laborantibus. Prodest percocta tabidis, si frequēter edatur. Succus ex melle coctus, visum clarificat, an- gulis tantū oculorū illitus: datur succus vtiliter potandus ad- uersus fungorū venena. Cocta, & longo pipere aspersa, vnaq; cū iure sumpta, nutritibus lactis vbertatē prabet. Caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cū melle in ecte- gmate parata, datur lambenda magna vtilitate anhelosis: in summa, Brassica est ad omnia vtilis, id quod antiquitus Chry- sippus medicus testatus est, si quidem is de Brassica integrum volumen scripsit, per singula membra hominis digestum: Quamobrem haud nobis mirum videri debet, si DC. annis antiquitus Romani, expulsis medicis, sola Brassica sibi ad omnes morbos medicinam fecerunt. Brassica satiuā, & esca- Brassica vires ex Gal. lenta, vt memoria prodidit Gal. lib. 7. simpl. med. desiccandi vim habet tum esa, tum foris imposita, non tamen etiam ad- modum acrem. Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat: praeterea phlegmonas iam induratas, ac egrē solubi- lei, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinycti- das, & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se abster- sionem, quo lesiones curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime brassica Aegyptia, quanto ea scilicet temperatura stocior est. Sanē amara qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta, qua ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quaecunq; alia modicam abster- sionem possulant, adiunat. Caules brassica combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet adurentem vim participet. In hac ratione is veterem adspem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent: nam valenter

valenter digerens medicamentum efficitur. Brassica verò agrestis quodammodo calidior, ficiorq; domestica est, cen-
propemodum omnia agrestia sui generis, domesticis secundum vtramque hanc facultatem valentiora sunt. Quamobrem
neque intra corpus citra noxam sumitur, vt qua longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa, & gust. inci-
bus amarior est quam domestica: quanquam domestica quoque subamarum quiddam & acre contineat: sed vtramq; ha-
bet agrestis validam: quare etiam extergit, & digerit quam domestica valentius. Marina autem brassica supra quã quod
ventrem deiciat, vtpote subsalsa, & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis vsus, & ad omnia ea, ad que
tales qualitates accommodantur, idonea. Et lib. 2. de alim. fac. Brassica quoque, inquit, à multis vt obsonium estur, medici
autem, vt deficcante medicamento, ea vtuntur. Diximus de hac quedam cum de facultatib. medic. ageremus, tum etiam
in libro superiore: qua nunc summam perstringemus. Ergo brassica succus purgandi vim quandã obtinet: contra solidum
eius corpus siccitatis ratione cohibere magis, quam incitare deiectionem potest. Proinde cum expellere alui excrementa
propositum erit, abeno, in quo elixa vnã cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, vasculoq; in quo para-
tur, oleum cum garo iniicere oportebit: si salem pro garo sumas, nihil refert. At humentem aluum siccare volentes, cū me-
diocriter bullisse videbitur, priore aqua effusa, repente aliam calentem iniicimus: ac ita rursus in ea discoquimus, vsque
dum tenera flaccidaque euaserit: quod non facimus, cum ventris subducendi gratia sumitur: hætenus Gal. Ceterum licet

VII. BRASSICA MARINA. *VIII. BRASSICA MARITIMA maior.*



Brassicæ ma- Dioscorides prodiderit marinam brassicam folia ferre rotunda aristolochia, longa, ac tenuia, ea tamen non ab re ab omni-
rinæ confid. bus esse cõsetur, quam vulgus officinarum Soldanellam appellat. Quippe qua in maritimis nascatur, foliis lacteo succo ma-
Locus Diosc. deat, ramulis constet rubentibus, è quibus prodeunt ipsa folia, hedera modo, qua gustu salsa, & amara, & quadantem
suspectus. actria sentiuntur. Flores fert lauis simlacis vulgaris haud absimiles, calathi effigiem referentes. Quamobrem Diosc. codicem
hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendii suspitione non vacare putamus. Facile enim euenisse crediderim librariorum
incuria, vt folia μακρὰ, id est, longa, pro μικρὰ, id est, parua, hoc loco successerint: & certè facilis fuit vnus litera lapsus.
Siquidem Soldanella vocata omnibus notis marinam brassicam representat, exceptis foliis, qua sunt aristolochia rotunda
Ruellii error. minor. Ruellius vir doctissimus, etsi in hoc nobiscum ceterisq; consentiat, quod marina brassica hæsit herba, qua vulgò
Soldana, & Soldanella dicitur, nulla etiam (vt inquit) reclamante nota: in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur,
Syluatici er- quod Soldana folia aristolochia longa, atque etiam pralonga reddiderit. Errat præterea in hac planta Mathæus Syluatici-
ror. cus pandectarum auctor, quod crediderit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius error apertè conuincitur ipsius Sero-
pionis testimonio: quippe qui Chachile suum V snea simile fecerit, folioq; non aristolochiam, sed nasturtium imitari tra-
didit. Marinam brassicam in litoribus Venetis, Aquileiensibus, ac Tergestinis, vbi copiosa nascitur, nos sapius vidimus, ac
Nomina. legimus. Præstat eius decoctum, potum cum rhabarbaro, ad ducendas hydropicorum aquas: idem facit foliorum siccorum
puluis, addito Rhabarbaro & cubebis, pluries ex vino potus. Κράμβη ita Græcis, Brassica Latinis appellatur: Mauritani,
Corumb, siue Karumb: Italis, Cauolo, & Verza: Germanis, Rõl: Hisp. Colhes, & Couues: Gallis, Choulx. Brassica lanis,
Græcis Κράμβη λεία: Italis, Cauolo liscio, siue Verza liscia: Germanis, Rõl: Gallis, Choulx verds, aut Choils. Brassica cri-
spa, seu Sabellica, Græcis, κράμβη ἄλος: Italis, Cauolo cressa, seu Verza cressa. Brassica capitata, Græcis, Κράμβη κεφαλα-
ία: Italis, Cauolo capuccio: Germanis, Rapstraut: Gallis, Choulx cabut. Brassica marina, Græcis, Κράμβη θαλασσίαι:
Italis & Officinis, Soldanella: Gallis, Choulx de mer.

Brassica quæ δὸς Ἰσραήλ a vorando dicta videtur: κράμβη quasi ποράμβη quod pupillas oculorum lædat
Theoph. παρὰ. Cuius genera plura 7. hist. 4. & Plin. lib. 19. cap. 8. Cumanam, Aricinam, Pompeianam,
Sabellicam.

Sabellicam, Lacuturrē recensuit. At li. 20. c. 9. ex Græcorū sententia tres species enumerat, Crispam, quæ
 Schinada à similitudine foliorum Apii: alteram Leam latis foliis, quæ caulodes: tertiam propriè Cramben
 appellatam. Plures agnoscimus differentias & quidem pro foliorum colore, crispitudine, densitate, aliis-
 que qualitatibus. Aliis enim color viridis, aliis candicans, aliis purpurascens. Crispitudo & læuitas tam in
 candida, quam in viridi, quam nigram vocant, reperitur. Summa genera sunt, satiuæ & syluestris: satiuæ al-
 ba & rubra, horumque species vigintisex in Phytopinace enumerauimus. I. Brassica alba vel viridis:
 Theophrasto, læuis & caulodis Plinio. C. B. Brassica, Brunf. Brassicæ satiuæ maioris species altera, Trago.
 Brassica læuis, Matth. Cast. Cæs. Brassica candida, Gef. hor. Brassica lata alba, Lon. Brassica vulgaris satiuæ,
 Lob. Dod. fol. Brassica alba vulgaris, Lob. Brassica prima, Tab. II. Brassica Crispa, fortè Sabellica Pli-
 ni. C. B. Brassica Crispa, Matth. Gesn. hor. Lac. Brassica alba crispa, Lugd. Brassica patula crispa Sabauda
 Lob. Brassica Sabauda, Dod. Brassica Sabauda crispa, Tab. In hac magnam colorum varietatem ob-
 seruauimus, est niuea tota: est quæ candidissima, verum circumferentia, quæ crispitudinem efficit, viridi:
 est quæ rosea, quæ purpurea, quoad neruos discurrentes per folium, at crispitudine viridi: est & sulphurei
 coloris magis minusve intensi. III. Brassica capitata, hæc alba habetur & quidem capite vel globoso,
 vel oblongo, non penitus clauso: pluribus item capitibus conglobatis: habetur & rubra. IV. Brassica
 GONGYLODES, Rapitius colis Catoni fortè: quæ ex albarum genere est. C. B. Hæc statim à radice cau-
 lem emittit, qui proximè radicibus infra folia crassescit, & strumosus factus in mediocri rapi magnitudi-
 nem modò rotundam, modò oblongam extuberat. Ex quo prodeunt caules, sic & folia læui brassicæ æ-
 mula, quæ aliquando profundis laciniis crispantur: flores veluti aliæ profert, sic & semina, quæ tamen a-
 pud nos rarè ad frugem perueniunt, sed ex calidioribus regionibus pro satione inferuntur. Amat solum
 pingue, benè stercoratum & subactum. Dicitur Brassicæ albæ quarta species & Rapocaulis, Dod. gal. Cau-
 lorapum. Scalg. Lob. obs. appen. Cam. ad Matth. & Tab. Brassica thyriuta, Gef. hor. Brassica caule rapum
 gerens, Dod. fol. Rapa Brassica peregrina, Lob. icon. Brassica cuius caulis in caput extuberat. Cæs. Bras-
 sicæ raposa, Lugd. Brassica rapicaulis, Cam. V. Brassicam CAULIFLORAM seu Pompeianam Plinii
 cum hortis instructioribus sit communis, adiecimus. Hæc breuissimo est caule, foliis paucis, latis, lacinia-
 tis albam referentibus, ex quorum medio caules albidus, crassi, molles, & pingues, asparagorum instar cõ-
 pacti, exeunt, qui si rectè coquantur, ori gratissimi: & si hyemem superârint, vernali tempore altiores fa-
 cti, flores & semina instar vulgaris Brassicæ proferunt. Dicitur Brassica Pompeiana, aut Cypria, Dodo gal.
 Lugd. Brassica florida botrytis, Lob. Brassica cauliflora, Dod. fol. Cam. ad Matth. Brassica prolifera flori-
 da, Tab. Brassicæ capitata: tertium genus, Cæs. VI. Brassica SPINOSA C. B. Ramum hunc adpictum

VI. BRASSICA SPINOSA. *IX. SOLDANELLA ALPINA.*



ex Bembiano horto Patauio accepimus, & totam plantam expectamus vniuersali nostræ historiæ cum
 descriptione addendam. VII. Brassica maritima seu Soldanella officinarum, C. B. Brassica marina,
 Matth. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gef. hor. Lac. Cast. Lug. Cam. Soldanella, Gef. hor. Lob. Lon. Tab.
 Cæs. alpino. VIII. Brassica maritima maior C. B. Brassicæ marinæ genus, Rauw olff. & ex eo Lugd. in
 append. Elegantem hanc Conuoluuli marini nomine, Neapoli à præstanti Imperato accepimus, ve-
 rum & virentem in horto D. Zuingeri vidimus: hæc cum folia quædam habeat laciniata, quædam parte
 superiore sinuata, quædam non, placuit eius figuram proponere: eius descriptionem vniuersalis hi-
 storia exhibebit. IX. Soldanellæ nomen inuitat & alteram alpinam ob elegantiam adponen-
 dam. Hæc ex radice crassiuscula oblonga, à qua multæ fibræ candicantes ex vno veluti capite dependent,
 folium

folium emittit, sæpè vnum aut alterum, aliquando plura, rotunda, crassa, supernè viridia, infernè dilutè virentia, sapore subadstringente & amaro nonnihil, & ingrato: cauliculo dodrantali læui, nudo, gracili, subrubro à radice prodeunte (qui communiter vnicus, rarius geminus,) flores insident bini, terni, alioquin plures, cæruleo colore nunc saturatiore, nunc dilutiore (rarius niuei) insignes, deorsum propèdentes, campanulæ formam repræsentantes, multipliciter dissecti: quibus singulis succedit capitulum oblongum, durum, membraneum, in filamētum finiens, quod semen paruum durum cōtinet. In Alpibus Helueticorum & Iuræ, Austriæ quin & Styriæ, Baldoq; monte prouenit, Iulio & Augusto florens. Cuius & aliud genus est folio minus rotundo, breuioreq; pediculo. Soldanellam putant dictam à similitudine cum Officinarum Soldanella, quid si ab effectu, cum polleat vi vulnera glutinandi, & ad cicatricem perducēdi nomen habeat: Vocamus Soldanellam alpinam folio rotundo: Soldanella montana, Adu. Lob. Soldanella alpina, Clus. Pann. Cam. ad Matth. Lunaria alia minor cærulea, Dalechampii. Asclepias quibusdam Lugdunensi.

Τετλον.

BETA.

CAP. CXVI.

Beta duorum generum est: è quibus nigra coquitur cum lenticula, vt ventrem sistat: quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosū humorem, quem habet in se, noxi iucci est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat: aurium doloribus auxiliatur. Decoētum radice, & foliorum, surfures lendelq; deterget: perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitiligines, nitro antea perfrictas: alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas: atque depascentia vlcera, illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustiq; cocta medetur.

I BETA ALBA.

II. BETA NIGRA.

Beta confid.
& genera.Beta rubra
radice.Beta facult.
ex Gal.

Beta tam candida, quam nigra in Italia hortis frequentissima nascitur. Alba foliis prouenit ceteris grandioribus, triplicis aut hortensis rumicis ferè similibus, per ambitum leuiter simbriatis: caulem gerit bicubitalem, striatumq; flores exiguos sublutei coloris: semen copiosum, inæqualiter rotundum, ac subasperum: radice aīa, raphani modo longa, ac etiam tenera. **NIGRA**, foliis, caule, floribus, semine, ac radicibus prouenit alba similibus, paulò tamen minoribus & nigricantibus foliis. In Germania tamen habetur & **RVBRA**, non modo foliis, ceteris angustioribus, durioribus, sed etiam radice, qua illi vaporum oblongorum magnitudine extuberat: colore adèd rufescente, vt eius succus viuū sanguinem referat, 60 adnatis circumquaq; prodeuntibus: caule verò, pariter rubente, semine ceteris simile. Nō adèd multum differt suis in qualitatibus, ac viribus à ceteris generibus. Hanc Germani hyeme in aqua, aut cineribus calentibus obrutam coquant, subinde corticibus exuunt, incidunt, & in acetariis asperso pipere concinnant ad esum. Carota vulgò vocata modo. Sed, & riliu dulcior est, & gustus gratior: adhuc eas quoque parumper elixant, & deinde transversim in particulas secant, & sicili vase cum aceto & sale recondunt, addito rusticano Raphano, quem illi Kren vocant, minutim conciso. His vescūtur deinde cum assis carnibus. Transferunt à satione omnia genera, cum folia quinque eruperint: verum latiora, ampliora, & grandiora euadunt, si radices recenti simo bubulo liniantur, & deinde transferantur. Beta facultates adnotauit Gal. lib. 8. simp. med. sic inquit: Beta nitrosa facultatis particeps est, qua tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Ceterum cocta nitrositatem omnem exuit, sitq; facultatis phlegmonis aduersa, leuiter digerētis. Porro ad detergendum, digerendumq; vtilior est beta

et beta alba: nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice, quam in aliis partibus. Et lib. 2. de
 alim. facult. inquit: Beta absterforius inesse succus conspicitur, adeo ut aluum ad excretionem extimulet, & nonnunquam
 stomachum demordeat, praesertim ijs, quibus natura sensu exactiore prae datus est: ob idq; largius commansa, stomachum in-
 fecta. Huius, seu aliorum oleru, exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quam malua, aptius accommodatur: magis
 autem ubi cu sinapi estur, aut aceto. Lienosos item similiter manducata mirifice iuuat. Iure enim quis ipsam medicamen-
 tum potius, quam alimentum dixerit, ubi hoc modo manditur: haet. Gal. Inueniri syluestre Betam tradidit Plin. lib. 20. c.
 1. etiamq; vocari Limoniu, quod describitur a Diosc. lib. 4. a Gal. verò li. 7. simpl. med. Cuius sententia refragatur Gal. li. 2.
 de alim. fac. cum inquit: Equide non satiuam solum maluam, sed agrestem quadam etiam esse perhibuimus, quemadmo-
 dum & lactucam. at agrestis Beta nulla est, nisi utique quis lapathum ita nominare velit. At Asinus quidam Galenum
 iactare, non erubuit, ut Plinium seruasse videretur, qui aliorum fidem sequutus, in quam pluribus deceptus est. Candida
 beta, Plinio loco nuper citato auctore, cocta, & cum allio crudo sumpta, alui tineas enecat. Succus a facibus expurgatus (ut
 esse sepius periculum feci) clysteribus infusus, ad indurata alui euocanda excrementa mirum in modum pollet, praesertimq;
 in lenientia clysmata nihil profecerint. Alba radix derasa, & melle, saleq; illita, suppositaq; aluum exonerat. Nigra autem
 in aqua decocta, & illita, pruritus extinguit. Succus ex ea expressus, valet tam potus, quam illitus ad serpentium veneno-
 rum morsus. Candida beta cocta, & cum allio crudo deuorata, ventris tineas abigit. Oler: Graecè τεύλον, Latine Beta vo-
 cant: Arabicè, Decka, & Celb: Italicè, Bietola: Germanicè, Mangolt, & Priesen: Hispanicè, Aselgas: Gallicè, Porrée.
 Beta alba, Graecis τεύλον λευκόν. Beta nigra, Graecis τεύλον μέλαινον: Italis, Bietola nera: Ger. Schwarzwangold: &
 Priesen: Gallis, loatre, reparée siue porrée. Beta rubra, Graecis, τεύλον ερυθρόν: Italis, Bietola rossa: Ger. Rotwangold.


Beta syluestr.
Plinio.

Galenus à
calumnia de-
fenditur.
Beta vires ex
Plinio.

Nomina.

III. BETA RVBRA.

IV. BETA CRETICA.




Beta, quoniam figuram literæ β dum semine turget, referre videatur, nomen habet. Theop. 7. hist. 4.
 candidam habet & nigrā quæ Sicula dicatur (vnde Sicla practicis) & 6. hist. 3. & syluestris meminit. Qua-
 tuor præcipuas hortensis agnoscimus differentias: Prima vulgaris, quæ nigra, folio breuiore & viridior:
 secunda, quæ alba, candicantibus foliis, iisq; multò longioribus & amplioribus: tertia quæ rubra, radice
 rubra & magna: quarta quæ lutea, radice buxea, caulibus buxeis, foliis virentibus: quibus addimus & Cre-
 ticam. I. Beta alba, Matth. Gef. hor. Lon. Lob. icō. Cast. Cam. Bera candida, Trag. Fuch. Dod. gal. & fol.
 Cord. in Diosc. Lac. Lug. Beta altera, Cæf. Beta, Brunf. & Tab. II. Beta rubra vulgaris C. B. Beta rubra,
 Brunf. Trag. Dod. fol. Lon. Beta rubra vulgatio, Lob. & Lug. Beta nigra, Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hor.
 Lac. Cast. Lugd. III. Beta rubra radice crassa C. B. Beta rubra, Matth. Lob. Cast. Lugd. Gef. hor. cui &
 Seutlostaphilinum: Beta nigra Romana, Dod. gal. Beta rubra Romana, Dod. fol. Beta nigra Latinis, Cor.
 in Diosc. Rapū satiuum rubrū, Fuch. Rapa rubra Beta species, Gef. hor. IV. BETA CRETICA semine
 aculeato: elegans est hæc, & à nobis primò proposita: ex radice enim tereti, breui, plures prodeunt caules
 cubitales per terram sparsi, rotundi, striati, ad radicem hirsuti, cani, in ramulos effusi: foliis paucioribus,
 beta nigra similibus, sed minoribus: floribus ex flauo virescentibus: seminibus statim ad radicem multis,
 & hinc inde per caulem asperis extuberantiis donatis, in tres aculeos abeuntibus, in latera recuruatis, vel
 si maior siliquam appelles, in sua enim cavitare granum vnum continet, ad formam seminis Adonidis,
 subrotundum, quod in apicem abit, duplici membrana tectū, interiore rufescente, quæ proximè medul-
 lam albam farinaceam cingit: exterior minus ruffa, non proximè granum cingente. Hanc florentē prin-
 cipio mensis Iulii, & Augusti sine semine prægnantem, iamq; aridam in horto Doct. Zwinge si legimus:

Beta Cretica.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque, cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus, auxilio est: commanducata dentium stupores sedat: stomachi, & intestinorum æstuationem, fluxionesque mulcet: renes, & vesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant: Veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febribus valens. Contra teretes ventris tineas, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax est: item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur: interancis fluxione laborantibus, atque vuluarum erosionibus, infunditur: contra dolores, quos æstus excitauit, caput ex rosacco, & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum vino emēdat: vulneribus, quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

I. PORTULACA DOMEST.

II. PORTULACA SYLVESTR.



Portulacæ
genera duo.

Portulacæ vi-
res ex Gal.

Plinius.

Nomina.

Portulaca omnibus vulgarissima est. Duo eius habentur genera. Vnum satiuum, cui folia insunt latiora, pinguis, saba-
ria vulgò vocata modo crassa, splendentia, & à tergo candicantia, gustu insipido, quadam cum austeritate: can-
lem edit crassum, glabrum, erectum, subpunico colore, atque pinguem: femine nigro, exiguo, in herbaceis calyculis incluso:
radice multifida. Quæ autem sponte nascitur in hortis, vineis, campis, & aliis locis, prouenit caulibus rotundis, lentis, pin-
guibus, rufescentibus, humi sese diffundentibus. Folia gerit alteri similia, sed multò minora, & oblongiora, numerosiora-
que, cætera consimilia sunt. Manditur cruda ad oris vlcera, & commotos dentes. Folia lingua subdita, bibendi desiderium
refringunt. Alterum verò syluestre humi repens, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus foliis. Portulaca meminit Gal. lib.
6. simpl. med. vbi ita scribit: Portulaca frigida, & aquea temperamento est, pauca cuiusdam particeps austeritatis, proinde
fluxiones repellit, & maxime biliosas, & calidas, cum eo, quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerant.
Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertij excessus à temperatis, ac medijs: in humectandi verò secundi. Hac ra-
tione & æstuant, vt si quid aliud, adiuuat, tum ventris osculo imposita, tum totus hypochondrijs, potissimum in febribus
hecticis. Præterea dentium stuporem sanat, nempe qua ab acidorum succorum contactu, asperè exiccat a fuerant, leniens,
atq; replens, utpote cum viscosam habeat humiditatem: similiter verò & succus eius. Itaque non foris modo impositus, sed
epotus quoq; refrigerat. Hoc sanè & toti herba comese accidit. Quoniam autem subadstringit, vtiliter dysentericis editur,
& muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multò est, quàm herba, succus ipsius efficacior. Et lib.
2. de alim. fac. Portulaca (inquit) quidam vt cibo vtuntur: sed imbecillem præbet alimoniam, eamq; humidam, frigidam,
& glutinosam. Vt medicamentum autem, dentium stupori medetur, ob lentorem suum morsus expertem: de ea diffusus in
opere de faciliè parabilibus sumus locuti. Hac ipsa, vt tradidit Plinius libr. 6. cap. 20. emplastris modo imponitur vmbilico
prociduo. Sanat & mammarum, & podagra inflammationes, cum melle aut cimolia creta. Prodest in vniuersum omni-
bus calidis affectibus. Portulaca syluestris qualitate & viribus non differt à domestica, nisi quòd adstringenti vi paulo sit
potentior, atque etiam non nihil minus humectat. Ruricola integras plantas elixant, & deinde in sole siccant, & ad bye-
males cibos afferunt. Huius herba nomen Græcum est ἀνδράκων: Latinum, Portulaca: Arabicum, Baklancha, seu Pach-
le albanica: Italicum, Portulaca, Procaccia, & Porcellana: Germanicum, Burckeltraut, & Porckeltraut: Hispanicum,
Verdolagas, & Baldrogras: Gallicum, Pourcelaine, Pourpier, & Pourchaille. Portulaca syluestris: Græcè, ἀνδράκων ἀγρία:
Italis, Prochachia, & Porcellana saluatica, & parimente grassola.

Portulacam

Portulacam cum Peplio herba diuersissima Plin. lib. & cap. 20. confundit, quin & vires syluestris cum
 fariæ viribus: quod ex eo factum, quoddam aliqui Peplion agrestem portulacam vocarint. I. Portulaca
 latifolia seu fatiua. C.B. Portulaca hortensis, Trag. Fuch. Dod. gal. Portulaca maior hortensis, Gesn. hor.
 Portulaca domestica, Matth. Lob. Cast. Tab. Portulaca fatiua, Cord. hist. Dod. fol. Lugd. Portulaca, Cord.
 in Diosc. Portulaca latioribus foliis, Cæsalp. Portulaca maior, Cam. II. Portulaca angustifolia seu syl-
 uestris C.B. Portulaca, Lac. Portulaca syluestris, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lob. Cast. Lugd. Por-
 tulaca spontè nascens, Cord. hist. Portulaca minor, Gesn. hor. Cam. Portulaca aruensis, Tab. Portulaca an-
 gustioribus foliis, Cæsal. Cephæa herba, Cord. in Diosc. Cephæa Lonic. quoad descriptionem.

Ἀσπάραγος

ASPARAGVS.

CAP. CXVIII

Corruda, siue syluestris asparagus, vulgaris est notitiæ. Huius caliculi in cibo cocti, ventrem emol-
 liunt, urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, renum vitia, &
 coxendicum cruciatus, in potu proficit: cum vino autem, phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti
 succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, vt aiunt, si de-
 coctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus contusis, atque defos-
 sis: quod, quantum equidem sentio, planè à veritate abhorret. † Altilis autem asparagus, multis ramis
 fructat, foliis fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri cauli-
 culi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autem, coctusve, urinæ stillicidium, difficultatemque,
 ac dysenterias mitigat. Radix cum vino, aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis, aut cice-
 ribus, sumpta, regium morbum sanat: coxendicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut hau-
 stam eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

a Catac. 71
 τραιός. i. pe-
 traus.

I. ASPARAGVS.

II. ASPARAGVS SYLVEST.



Asparagus duplex habetur, altilis, & spontè proueniens. Huius tria visuntur genera, nempe Palustre Græcis ἄλωος πο-
 catum, montanum, & petræum, Corruda propriè dictum. Altilis passim in hortis seritur, caterisq; notior est, quam vt
 debeat explicari. Thyrsus is primùm siue germea è radicibus mittit, tenerum, cacumine crassiore, in acutum desinente, O-
 robanche modo, qui tandem auctus in ramos sese explicat, in quibus folia sunt capillacea, fœniculo breuiora, tenuioraq;
 Florem edit exiguum, quo flaccescente, bacca subsequuntur, primùm virides, & deinde rufescentes. Radice nititur circa
 caulem spongiosa, à qua numerosa oriuntur fibra ellebori modo, albicantes, crassioresq; vt in Rusco. Montanus [qui in mon-
 tibus] & Palustris [qui in paludibus prouenit] facie vix ab altili differunt. Horum omnium cauliculi, qui in cibo passim
 expetuntur prima germinatione, dulces sunt, & gustui grati. Corruda verè contra, siquidem h̄ tenuiores & amariusculi
 sunt, & nullam ferè in cibo gratiam habent. Nascitur Corruda siue petræus siccis & saxosis locis, & præsertim in sepibus,
 & fruticibus, caule lignoso postquam adoleuit flexiliq; albicante, foliis exiguis, præduris, & aculeatis. Nascuntur altilis A-
 sparagi totius anni decursu, si vbi fructum legeris, radices, qua summo cespite vagantur, circumfoderis, ac aperueris. Serun-
 tur etiã ad esum, nã non ingratus sunt cibus, siue in acetarijs, siue dum caulescunt, asperso modico sale, recetiq; butyro, cum
 pipere deuorentur. Meminit horum Gal. lib. 6. simpl. med. sic inquit: Asparagus petræus, aut myacanthinus abstergendi
 non habet, idq; citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Hinc renes, ac iecur infarctu liberat, & maxime herbe
 ipsius

Asparagi cõ-
 sideratio, &
 genera.
 Montanus &
 palustris.
 Corruda.
 Asparagorū
 facultates ex
 Gal.

*III. ASPARAGVS SYLVEST.
aculeatus.*

Ex Plinio, &
Auienna.



Nomina.

ipſius radices, & ſemen. Quin & dentium dolores ſanct ſiccitatis nomine, quam vel maxime dentes requirunt. Et libr. 2. de alim. facult. In ſuper (inquit) aſparagorum alius regium in hortis naſcens, alius & ex eo id eſt, paluſtris appellatur, ceu alius ab iis, qui à bryonia oritur. Omnes autem ſtomacho vitales ſunt, urinam cient, & parum praebeant nutrimenti. Si tamen ū probe concoquantur, olerum aſparagus magis alunt, nimirum quando illis ſunt ſicciores: haec Galenus. Aſparagi in cibo ſumpti, vt ſcribit Plinius lib. 20. cap. 10. oculus claritatem afferunt: pectoris, & ſpinae doloribus proſunt. Venere ſtimulant, & ventrem leniter molliunt. Aſparago trito cum oleo perunctos, pungi ab apibus negant: haecenus Plinius. Caterū, vt memoria prodidit Auienna Fen vltima libri quarti, Aſparagi in cibo ſuaui odore corpus totum commendant: verum urinam foetidam trahunt. Paluſtris & Mōtanus eadem omnia poſſunt, quae altilis, nec imbecilliores, nec valentiores vires habent. Caterūm Corruda, ob manifeſtam, quam poſidet amaritudinem, longè magis aperit, prouocat, & abſtergit, id quod manifeſte patet ex ſatida quam ciet vrina. Graecis ἀσπράγος, Latinis Aſparagus nominatur: Mauritani, Halion, ſive Helium: Italis, Aſparago: Germanis, Spargen: Hispanis, Eſparagos: Gallis, Eſparge. Aſparagus ſylueſtris, Graecis ἀσπράγος ἀγρικός: Italis, Aſparago ſaluatio.

† Licet in Graecis non planè conſtet, hic altilis, vel ſatini aſparagi mentionem fieri: tamen non video, quomodo haec ad ſylueſtrem quoque referri poſſint, vt aliqui referenda cenſent. Cum enim hunc notum eſſe antea dixiſſet Dioſcorides, non aliam, vt ſolet, eius ſubieciſſet deſcriptionem. Quo ſis, vt haec potius ad ſatium referenda putemus, vel ſaltem mendum ſubefſe ſuſpicemur.

Cord. in Dioſc. & hiſt. Lon. Caſt. Aſparagus horteniſis, Dod. fol. Cam. Aſparagus ſatiuus, Lac. Lugd. Aſparagus altilis, Fuch. Tab. Aſparagus maior, Gef. hor. Aſparagus domeſticus vulgaris, Lob. II. Aſparagus ſylu. genuiſſimo folio C. B. Aſparagus ſylu. Matth. Caſt. Lugd. Aſparagus tertius ſatiuo ſimilis, Palarium leporis vulgo, Caeſ. His addere poſſumus Aſparagum marinum, ſeu Corrudam marinam Monſpeliacam. III. Aſparagus ſylu. aculeatus C. B. Aſparagus montanus ſeu Corruda, Matth. Aſparagus ſylueſtris, Gef. hor. ap. Lac. Dod. fol. Corruda, Dod. gal. Cord. hiſt. Lugd. Corruda prior, Cluſ. Hiſp. Corruda Penae, Lug. Lob. icon. Aſparagus petraeus, Caeſalp. Tab. Huius tres ſpecies obſeruantur.

Ἀσπράγος

PLANTAGO.

CAP. CXIX.

a Ori. ſic habet. Ἀσπράγος, οἱ ἐπιάνευρον, οἱ παλιάνευρον, οἱ τὸ μὲν μικρὸν τὸ δὲ μέγα. I. Plantago, quam ab herpianeuron a li polyneurō vocat, dum eſt generum, aliud parū, aliud magnū. b Ori. habet μακρότερα. I. longiora.

Dvo a Plantaginis genera. Minor folia habet anguſtiora, b minora, molliora, lauiora, & tenuiora: cauliculo anguloſo, in terram inclinato: floribus pallidis: ſemine ſummis caulibus emicante. Altera maior, laetior virentiorq; latis conſtans foliis, oleracei generis: cuius cauſis cubiti altitudinem petit, anguloſus, ſubruber, a medio ad verticem tenui ſemine circumdatus: radicibus nititur teneris, hirtutis, candidis, digitorum craſſitudine æquantibus. Naſcitur in lacunofis, ſepibus, & locis humidis. Multo vtilior magna eſt. Vim habent folia exicatoriam, conſtringentem: quare omnibus malignis vlceribus, & fluxioni opportunis, atque elephanticis, ſordidiſq; illita proſunt: profluuia ſanguinis, vlcera quae ſerpūt, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent: vetera vlcera, & inæqualia cicatrice obducunt: chironia ſanāt: ſinus conglutinant: morſibus canis, ambuſtis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, ſtrumis, ægylopiis, illita, cum ſale proſunt. Coctum cum aceto & ſale olus, dyſentericis, coeliacisq; ſumptum ſubuenit. Datur & in locum betæ cum lenricula coctum, & ad aquam intercutem, cui leucophlegmariae nomen eſt, datur & herba decocta poſt aridas epulas, ſic vt media antecedit: comitialibus, & ſuſpirioſis data proſicit. Foliorum ſuccus, colluta ſubinde oris vlcera, purgat: cum cimolia, aut ceruſa igni ſacro medetur: fiſtulis infuſus prodeſt: lippitudinibus, & aurium doloribus idē ſuccus inſtillatur: additur quoque in oculorum collyria: gingiuis cruore ſuffuſis, & ſanguinis reiectionibus, potu confert: clyſtere dyſentericis inſunditur: contra tabem datur in potu: aduerſus ſtrangulationes vuluae, in vellere ſubiicitur, etiam ſi vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum alui fluxiones, & ſanguinis excreationes ſiſtit. Decocta radix, & mātucatu, & collutione, dentium dolores ſedat: eadem cum foliis, vlceribus renum, & veſicae in paſſo datur. Ferunt tres radices, cum tribus vini cyathis, & pari aquae modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis geſtamine, diſcutiendis ſtrumis vtantur.

Plantaginis conſideratio & genera.

Quoniam à Dioſcoride, Plinio, Apuleio, aliſq; omnibus antiquis authoribus, duo tantum Plantaginis genera recipiuntur, maius nimirum, & minus, eam tamen, quam vulgus, quod lancea cuſpidis formam referat, Lanceolam corrupto à Quinqueneruia vocabulo. Maior eò quod eius folia, quae latiora ſunt, ſiſtris ſeptem & quandoque pluribus tantum nervis ſecundum longitudinem excurrentibus diſtinguuntur, Septineruia appellatur. Media, quoniam in eius ſeſis quinque apparent coſtae, Quinqueneruia dicitur. Folia habet anguſtiora, minora, molliora, lauiora & tenuiora: cauliculo eſt anguloſo, in terram inclinato, floribus ſpæatis, pallidis, piloſisq; ſemine ſummis caulibus emicante: radicibus multoſis, teneris

I. PLANTAGO MAIOR.

II. PLANTAGO ROSEA.



III. PLANTAGO MEDIA.



tenuibus, albicantibusq. Nascitur & hac perinde ac altera plurimum humectis & vliginosis locis, in hortis, & fecus vias. Minima vero, quod eius folia, qua leuiter hirsuta sunt, tres tantum habeant nervos, Trinervia dici potest. Longa, folia gerit longa, cuspidis lancea modo, vnde illi nomen; striata, nervosaq. humi accubantia: caules, flores, semina, ac etiam radices media plantaginis omnino similia. Nascitur locis incultis, ac ferè vbiq. Quam vero recentiores A Q V A T I C A M vocant, folio est ceteris crassiore, carnosiore, robustioreq. ac leniore, ex lata origine in acutum desinente, lancea cuspidis modo, caulem gerit cubito longiorem, ramosum, flosculis candidis vbiq. refertum. Radicibus nititur numerosis, albicantibus, vt in Elleboro. Nascitur tantum in aquosis, & palustribus. Maioris, & minoris semen tritum, ouoq. exceptum, & calenti regula inassatum, dysentericos iuuat, frequenter deuoratum. Recentia folia trita, & illita, lichenis auxiliantur: quinetiam vitia sedis omnia curant, nempe ficos, rimas, condylomata, hemorrhoidas, proidentiaq. Illinuntur quoque vtiliter primo impetu rubenti podagra. Medentur omnibus digitorum vitis. Luxatis, cum dolores, tum tumores tollunt folia trita, & sale modico illita: contusis, verberatis, & ab alto deuolutis, non solum illita, sed deuorata profunt. Succus ex rosaceo fronti adhibitus, capitis dolores a calida causa prouenientes mulcet. Datur quoque magno iuuamento ad cruenta sputa, addito Armenio bolo, aut hematite lapide. Idem cum millefolij succo mistus, exuentam vrinam reddentibus mirifice medetur potus, & praesertim addita philony perfici drachma. Illinitur quoque recte erysipelis, addito aceto, & sokani, sediq. succo, Scillaritia plantaginis aqua, cum aequali acerrimi aceti portione, sanguinem enaribus fluentem cohibet, si linteola in ea madefacta applicentur pedum plantis, manuum volis, & iocinori. Longa non differt facultatibus & viribus ab alijs generibus, nisi quod minus humiditas qua-

Plantaginis aquatica mentio.

Plantaginis facult. Matt.

Etatem habet. Quoad Aquaticam cum neminem antiquorum habeant, neque apud Graecos, neque apud Mauritanos, aut Latinos, qui huius planta meminerit, nec de eius viribus aliquid scriptum reliquerit, nihil sanè habeo, quod de eius viribus tuò in medium afferre possim. Non desunt, qui hanc plantam Damasonium, sine Alisma esse autument: atqui proculdubio

Sii vires ex Galeno.

Nomina.

illi est, quam legitimo Sio. Sij meminit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum sic inquit: Sium quantum g. s. odoratum est, tantum etiam excalfaciens facultatis est particeps. Digerit autem, & urinam mouet, & calculos remouet, & menses euocat. Quod Græci σιον, Latini quoque Sium vocant: Mauritanii, Rorcathalmi, & Inhamenacha, seu Hamenachella: Itali, Sio, & Gorgolestro: Germani, Wassermerck: Hispani, Rabacas: Galli, Berle. Sium vulgare, Italiane Sio falso.

Sium ὄσιον ἴσκειν, quia in aquis vacillando succutitur à præterlabentibus aquis: vel potius ab excruciantibus calculis. Apium palustre foliis oblongis serratis. C. B. Sion odoratum, Trag. Sium verum, Matth. Lugd. Thal. Sii primum genus quod Lauer vulgò dicitur, Fuch. Apium palustre, Fuch. Lon. Lug. Lauer & Sion Crateuæ, Dod. gal. Sium, Cord. in Diosc. Gef. hor. Dod. fol. Sion siue Lauer Dioscoridis Olusatris folio, siue Pastinaca aquatica, Lob. icon. Sium Crateuæ maius, Lugd. Sium maius latifolium, Tab. Crescione vulgò, Elioselinum Diosc. Theoph. Plinio, & Sium Galeni Cæsalp. Hoc variat ratione latitudinis foliorum. II. Sium vulgare, Matth. Lugd. Sium, Lac. Cast. Sion. Matthioli & Italorum, Lob. Vella Galeni, Angul. laræ.

Sisymbrium

SISYMBRIVM

CAP. CXXI

a Orib. μέγαν. i. magnū
b εὐωδες. i.
odoratum
leg. Orib.

Sisymbrium (alii serpyllum a sylvestre vocant) in solo inculto nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi vim habet: contra stitlicidia vrinæ, calculosq; semèn ex vino bibitur: tormina, & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti, aut temporibus illinuntur. Item contra vesparum, apumque iclus. Vomitiones potu cohibet. Alterum sisymbrii genus, aliorum Cardaminam, alii Sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus Sio, prouenit: eue id eo nonnullis Cardamina nominatur, quòd gustu cardamum, id est nasturtium representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta cruce modo finduntur. Id excalfacit, vrinas mouet: crudum estur. Purgat lentigines, cutisque vitia in facie, noctibus impositum matutinisque detractum.

I. SISYMBRIVM HORTENSE. II. SISYMBRIVM SYLVESTRE



Sisymbrii cōsideratio.

Tametsi prodiderit Dioscorides Sisymbrium in solo inculto nasci, Theoph. tamen lib. 6. cap. 7. de plantarum historia, & lib. 5. cap. 8. de earum causis, satiuum etiamnum Sisymbrium in hortis reperiri posteritatis memoria commendauit. Quod sanè eam herbam esse crediderim, quæ hodie in omnibus serè hortis prouenit, quam nostrates officina Balsamitæ, vulgus verò mentham Romanam, vel crispam appellat. Quippe quòd hæc proferat folia circumata, & vulgari mētha latiora rotundioraq; crispata tamen: caulem edit quadrangulum, rubentem virentemq; & flores spinatos: & odore, gustuq; mentha longè acrior sentitur. Cuius rei illud etiam, præter assignatas notas, manifestum indicium facit, quòd Balsamita hæc facillè in mentham degeneret, nisi diligens admodum adhibeatur cultura. Quod libro de plantarum causis paulo antea citato, apertè testatur Theoph. his verbis: Si ymbrii mutatio in mentham, velut prædictis opposita scilicet est, cum ex neglectu eueniat. Fit enim cum quis non excolit, neque curam solitam adhibet, vt radices amplius deducantur, quam in partem vi tota conuersa, debilitor pars superna consistit, odorisq; sui vehementiam amittit, quasi ex ambobus illis, germinet.

Sisymbrii in mentham mutatio.


atque odore similitudo proueniat. Quippe acritudine exolefcente, reliquus odor, quia mollis quidem remiffusque est, proxime ad mentham accedit. Quamobrem transferre sapenunero iulent, ne istud eueniat. Hac Sisymbrii causa est: haecenus Theophrastus. Sed equidem non putauerim Dioscoridis Sisymbrium sponte in incultis nascens, cum Theophrasti Sisymbrio conuenire, quin potius alterum ab altero longè dissidere crediderim. Syluestre enim in Ananiensi agro in incultis natum com- Syluestre. pluribus locis videmus, ac legimus, nullis deficietibus notis illi à Diosc. tributis, caule quadrangulati, radicibus longè vagantibus, villosis, quod mihi quidem satiuo effigie planè reclamare visum est. Huc alia accedit ratio, qua facile probari potest, syluestre Sisymbrium à satiuo plurimum differre. Quandoquidem si idem essent, cum Sisymbrium cultura negligentia in mentham degeneret, fieri quidem non posset, ut syluestre aliter usquàm inueniretur, quam in mentham permutatum, cum nulla bonum cultura nascatur: quo postmodum fieret, ut locus, in quo Sisymbrium primò adoleuisset, breui temporis tractu vti mentham fieret, quod tamen nusquam haecenus factum reperi. Caterum Brasauolus, cum hac fortasse non perpensis, credit Balsamitam, quam ipse Florentinam mentham appellat, tam satiuum, quam syluestre Sisymbrium indifferenter ex parte posse. Qui praeterea fatetur se vidisse (quod potius eum oculos fefellisse putauerim) Balsamitam descivisse in calamintham, Plinium quidem, non Theophrastum secutus: siquidem Theophrastus in mentham, non in calamintham Sisymbrium descivisse prodidit. Plinij verò codices nonnulli libro 19. c. 10 scriptum quidem habent, quod Sisymbrium in calamintham degeneret, quam lectionem accepit Brasauolus: sed ea lectio deprauata censetur. Idcirco factum est, ut ij, qui Pliniam castigarunt, eam restituerint, quod compertum habuerint Plinium ex Theophrasto historiam sumpsisse. Itaque iam eius loci vera, & legitima lectio est, ut in castigatis codicibus legitur, quod Sisymbrium in mentham desciviscat, non in calamintham. Sisymbrium verò, quod (ut Dioscorides inquit) aliqui Cardaminam, alij Sium appellant, ea nimirum her-

Brasauoli ex-
ror.

Sisymbrium
aquaticum.

III. SISYMBRIVM AQUATICUM.

IV. SISYMBRIVM AQUATICUM ALTERUM.



haec, quam vulgò nostri Crescione appellant, acris sapore praedita, de qua etiam diximus in precedenti capite, de Sio dissectis. Siquidem ea in fontium rivis discurrentibus comite Sio nascitur, folijs primo exortu rotundis: cum verò adoleuerint, circa modo dissectis: odore, ac sapore satiuo nasturtio proximis. Meminit huius Plinius libro 20. cap. 22. quamuis libro 19. cap. 8 aliud Sisymbrii genus commemoret his verbis: Sisymbrium simili modo seritur: latissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. Hinc quidam existimant, Plinij de vulgari mentha stro, quod in aquosis passim prouenit, differuisse. Sisymbrium tam hortense, quod tenuissimum est partium, excoalsciens, & exiccans in fine secundi ordinis, in principio tertij: attenuat, digerit, resoluit, aperit, incidit, prouocat, quam sponte proueniens, & flatus, & lumbricos pellit, cum herba ipsa in puluerem trita, tum eius decoctum potum: valet ad vteri inflationes, si vna cum parthenio in calenti regula calefactum, & odorato meraco aspersum, imò ventri applicetur: valentius quoque vterinis doloribus à parthenio subuenit, si vna cum parthenio, artemisia & anthemidis floribus, tenuiter concisa, tribus, aut quatuor ouis excipiat, & deinde in patella, cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, & calida applicetur ventri, super ipso vmbilico. Illinitur tam recens, quam siccum calefactum, & vino cretico aspersum, coeliacis & ad ventriculi dolores a flatu prouenientes. Succus testibus illius nocturnas pollutiones cohibet. Caterum aquaticum Sisymbrium cum raphano omni, & petroselinij radicibus, & ex albo meraco, & butyro calefactum, & calidum pubi adhibetur, vrinam remorantes educit ac trahit. Succus ex aceto illinuitur vtiliter veteribus. Est & alterum eiusdem generis, sed folijs & caulibus longè minoribus, ramulis numerosis, in cacumine tantum comantibus, in quibus stoculi exeunt pusilli, tenues, albicantes. Hoc autem non solum in aquosis, & riguis prouenit, sed in hortis & secus itinera, acuto sapore. Imbecillius est altero, namq; minus excoalscit & secat: vbi verò alterum non sit ad manus, hoc vti praestabit. Sisymbrii vtriusq; mentione fecit Gal. li. 8. de simplic. medicamen. facultate,

Crescione.

Sisymbrii vires
Matth.

Sisymbrii vtriusq; vires
ex Galeno.

Nomina.

cultate, sic inquit: Sifymbrium tenuium partium, digerentis, excafacientis, & exiccantis facultatis est, & temperatum in tertio ordine. Sed & semen eius tenuium partium est, & calidum. Quocirca ipsum quidam cum vino exhibent frigiditibus, & tormina patientibus. Sifymbrium verò, quod quidam Cardaminam vocant, quandoquidem cardamo, hoc est, nasturtio simile quiddam gustu præsert, cum siccum est, tertij est ordinis excafacientium, & desiccantium: cum humidum, & viride, secundi. Vt Græci σισύμβριον, ita etiam Latini Sifymbrium dicunt: Arabes, Sifnabarion, seu Sifnabar. Sifymbrium satium, siue hortense, Græcis σισύμβριον ἡμερον: Italis, Sifembro domestico, Balsamita, seu Mentha cresta: Germanis, Ragenbalsam: Quòd verò σισύμβριον ἕτερον Græcis, Sifymbrium alterum Latinis appellatur: Sifymbrium aquaticum: Officinis, & Barbaris Senetion. Italis Sifembro aquatico, & Crescione: Germanis, Brunnfressen / vnd Bassettressen: Hispanis, Berroes, & Agriolis: Gallis, Cresson.

Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. Sifymbrium hortense, Matth. Lac. Cast. Lugd. Mentha hortensis altera siue crispa, Gef. hor. Sifymbrium mentha agrestis, Lob. II. Mentha rotundifolia palustris, videtur Sifymbrium Dioscoridis. C. B. Mentha rubea, Brunf. Balsamina agrestis & Nepeta tertia, Trag. Sifymbrium Fuch. Dod. gal. & fol. Cam. Sifymbrium sylvestre, Matth. Lugd. Sifymbrium primi species prima, Cor. in Diosc. Sifymbrium agreste aquaticum, Gef. hor. Mentha aquatica & sylu. altera, Lonic. Mentha palustris, Cam. hort. Aquatica siue Sifymbria, mentha rubra folio & flore nigræ menthæ, Lob. Sifymbrium primum Thal. Mentha sylvestris prima & Sifymbrium terrestre Diosc. & Theoph. Cæsalp. Calamintha aquatica, Taber. Variat folijs aliquando maioribus, aliquando minoribus: aliquando tota rubet: habetur magis (vt pictura ostendit) minusque hirsuta. III. Nasturtium aquaticum primum. C. B. Nasturtium aquaticum, Trago. Lonicero Dodoneo fol. cui & Sion Crateuæ: Sifymbrium aquaticum, Matthioli Cast. Cæsalpino, Sifymbrium Cardamine, Fuchio, Lugdunensi. Cluf. Pann. Sifymbrium alterum Dioscoridis Cord. in Diosc. Gef. hor. Thal. Sifymbrium tertium, Lacu. Sifymbrium aquaticum primum, Tab. Sion Crateuæ erucafolium, Lob. Variat hæc prout humidioribus, aridioribusue locis enascitur: illud folijs ferè Terebinthini magnitudine: hoc triplo minoribus quamuis viribus nõ discrepent: sic & tenuioribus folijs & simplicioribus cauliculis locis siccis reperitur. Alterum etiam est Nasturtium aquaticum quod amarum est, & ultra cubiti altitudinem assurgit, folijs magis acuminatis, de quo & Thalius in sua Hircynia. IV. Nasturtium pratense vulgatius. C. B. Flos cuculi, Brunf. Dod. fol. Nasturtium pratense vel tertium, in quod aquaticum non raro degenerat Trag. Nasturtium agreste & Hiberis, Fuch. Nasturtium syl. Lonic. Sifymbrium aquaticum alterum Matth. Tab. Sifymbrium Cardamine, Dod. gal. Lac. Sifymbrium aquatico non ablimilis, Cæsalp. Cardamine altera, siue Sifymbrium Cardamine secundum. Lob. Lepidium minus, Cord. in Diosc. Iberis & Nasturtium pratense, Gef. hort. Sifymbrium Cardamine secundum Matthioli. Sifymbrium Cardamine tertium Dodonei. Cardamine altera Lobelij, Lugd. qui huius tres cones proponit, licet vnus sint plantæ. Iberis seu Cardamantice nasturtij folio, Thal. Flos aliquando totus albus, communiter leuiter purpurascit: rarius flore pleno reperitur. V. Nasturtium minimum siliqua longa. C. B. Hoc ex radice tenui, fibrosa, caules rarius palmares, sed minores, tenues, striatos emittit, circa quos folia oblongis pediculis donata, pleraque tripartitò diuisa, quædam tamen in partes quinque

*V. NASTURTIVM A-
quaticum minimum.*



*VI. COCHLEARIA FO-
lio subrotundo.*



vel Rheseda vulgaris modo diuiduntur. Flores obtinet albos, tenues, in summo comantes, quibus succedunt alique lōge, angustæ, exiguo & subacri semine refertæ. Variat ratione loci, in aquaticis namq; planis maris, in vineis riguis Wilensibus miliaribus Basilea, lōge minus reperitur, cuiusmodi & Patavij obseruauimus. Provenit etiam in alpebus locis humidis. Dicitur Cardamine quarta Dalechamptio, Sisymbriū aquaticum minus, Cam. apud Matth. VI. Cochlearia folio subrotundo, sic a foliorū forma dicta, quæ & forma & sapore Nasturtijs & Thlaspi affinis est. Cochlearia, Dod. gal. & fol. Lugd. Cam. ad Matth. Telephium, Lac. Britannica Plinij, Cochlearia vulgo, Ges. hor. Cochlearia Batava, Lob. Ex radice tenui, fibrosa, alba & gustu acri, folia pediculis oblongis insidentia prodeunt complura, lata, crassa, splendens, concaua, instar cochlearis munitur profundi, quorum prima rotunda sunt, reliqua oblongantur. & nonnunquam angulosa existunt. Ex horum medio caules terni, quaterni, dodrantes, paucis folijs, quæ caulem amplexantur cuncti, qui in alios cauliculos brachiantur, quibus secundum longitudinem flores candidi quatuor foliolis constantes, quatuorque exiguis filamentis donati adnascuntur: quibus succedunt capsulæ interstitio membranoso tenui, in apicem desinente diuisa, vtrinque semen exiguum, rufum, continent. Hæc licet sponte in maritimis Germania inferioris, Hollandiæ & Frisiæ, & circa Hamburgum locis palustribus proveniat, in superiori tamen Germania tantum in hortis visitur: altero a satione anno, Aprili & Maio flores, semen Iunio maturans. Calida & sicca vt Nasturtium, cuius peculiaris in scorbuto vsus, vel in acetarijs, vel cocta cum lacte aut vino, & continuè bibita.



CRITHMUM CAP. CXXII

Crithmum, seu, vt aliqui, Crithmon, fruticosa, & vndique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, lanioribus, salso gustu: flores candidi sunt: & semen, ceu rosamarinum, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, grati odoris, & iucundi. Radix, semen, & folia incōcta vino, potu vrinæ difficultati, & regio morbo auxiliamentosa menses cient. Estur crudum, coctumue in oleo: seruetur etiam in muria.

a Cat. παχυτέροις. i. crassioribus.
b μολινά: i. lutei. Oris.

CRITHMUM I.

CRITHMUM II.



Quatuor habentur genera, quorum tria Marina sunt, & quartum Terrestris. Nascitur Crithmum non modo in omnibus Tyrreni promontorijs, scopulis, ac rupibus, præsertim Argentario monte in maritimis nostris Senensibus, & vniuerso circum Italiam litore, sed etiam in Adriatico sinu, vbi scopulosa, & prærupta superstans litora: quemadmodum nobis contigit videre eo tractu per quem a Timæo fonte Tergestum nauigatur: namq; inibi illa scopulosa litora crithmo referta sunt. Crithmum Romæ, & in vniuersa ferè Hetruria Fœniculum marinum dicitur: etsi in alijs quam plurimis Italia locis, vbi à maritimis in hortis, ac viridarijs translatum vivescit, herbam sancti Petri appelliter vulgus. Quo nominis argumento non desunt, qui existiment, plantam hanc legitimum esse Empetron libro 4. à Dioscoride descriptum inter simplicia medicamenta, quæ deiectoria pollent facultate. Inter hos inuenio Pandulphum Collinutium in defensionibus Plinij contra Leoniceum, qui Empetron corrupto vocabulo Sanpetram herbam vocari putat, nulla habita facultatis, notanturq; ratione. Cuius sententia maxime refragatur experientia, quod Crithmum quanquam abunde; copiosèq; ingestum



Crithmi consideratio.
Fœniculum marinum.
Quorundam lapsus, Empetron cententium Hetruriam S. Petri.

Crithami a-
lia genera.Crithmum
alceum,

stum, nec pituitam, nec bilem, nec aquam intercutem trahit, quemadmodum Empetro reddidit Dioscorides: qui propterea illud inter ea, quae aluum deiciunt, medicamenta locauit. Quomodo autem Empetron quis idem cum herba sancti Petri recte dixerit, si empetron nullis alijs à Dioscoride representatur notis, quam quod nascatur in montibus, & maritimus, salis & amaro sapore? Verum enimvero non modò putandum, sed etiam pro certo, meo quidem iudicio, affirmandum erit, habere hanc Crithmum esse. Quippe quòd ea notis omnibus, quae radicibus, folijs, caulibus, ac seminibus, & vniuersè denique planta tribuit Dioscorides, Crithmum planè referat. Caterùm maritimi crithami duo alia habentur genera. Primum, & praeclarissimo viro Iacobo Antonio Cortuso mihi missum, vulgari ferè simile est, nisi quòd folijs est angustioribus, & in cacumine mucronatis, atque pungentibus, salso, amariuscule & acuto sapore: caulibus verò praeponderantibus, succosioribus, vegetioribusque, in quorum cacumine ramuli exeunt bini, terni quaterniue, suas singuli umbellas proferentes, alio stulosculis refertas, è quibus semen oritur foeniculo quadantenus simile, cui radicem quoque similem profert. Iudem procauo locis in maris litoribus. Alterum planta est fruticosi, ab vna radice plures emittit caules rectos, circa quos totos folia habentur, per interualla tamen plura ex vna origine gregatim prodeunt, longiuscula, crassa, & salso etiam gustu, sub horum exortu peculiare quoddam erumpit folium, ceteris duplò longius, è quo prope caulis cavitatem pediculus exit, è quo sex, septemue folia breuiora produntur, vt ex appicta eius imagine quispiam videre poterit. Flores fert in cacumine orbiculatos, villososque, colore pallido: Radice nititur longa, tereti, non sine alijs aduatis. Nascitur in litore maris, locis planis non cingit.

CRITHMUM. III.

CRITHMUM. IV.

Crithmum
terrestre.Crithmi vites
ex Gal.

Nomina.

Non desunt quoque, qui hanc Empetron faciant, sed ego his haud subscribere ausim, cum plura sint, quae reclament. Haec enim nusquam in montibus oritur, nec pota ventrem exoluit. Est & altera planta, quae non solum odore, saporeque, gustu saliginoso atque amariuscule Crithmum refert, sed quadantenus sua ipsius facie. Hanc nos terrestre Crithmum, his de causis appellare volumus. Nascitur hac in Bohemia copiosa, praesertim in agro Pragensi, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus & secus vias, ac etiam alijs in regionibus folijs, longis, angustis, firmis, ternis ex vno pediculo, ipsorumque longo prodeuntibus vtrinque, denticulatis, falcis frumentariae modo: ceterum quae in caulium summis partibus habentur, minora, breuiora que sunt. Caulem gerit ramosum, alis concauum geniculatumque, in cuius summitate ramuli exeunt diuisi, in quibus florida, albicantesque sunt umbellae, in quibus postremo semen oritur paruum, oblongum, acre, & odoratum. Radice nititur styrisi pastinaca haud absimili, minore tamen: sapore in primis dulci, sed si diutius mandatur, acris, & odorato. Crithmi vites recensuit Gal. lib. 6. simp. medic. his verbis: Crithmum gustantibus salsum quodammodo est, cum paucula amarum, quamobrem vis eius est exiccatoria, & abstersoria: vtraque tamen imbecillior in eo est, quam in amaris. Crithmum secundum, ea omnia prestare potest, quae primum Crithmi genus, nisi quòd vim aliquam incisiuam habere videtur. At tertium ea omnia potest, quibus pollere cetera genera diximus. Quartum aperit, digerit, excalfacit, siccit & medicoriter incidit. Κοιθμοῦ Graeci, Crithmū item & Crithamū Latini vocant: Itali, Crithmo, Finocchio marino, & herba di san Pietro: Germani, Bacilen, vnd Meersensel: Hispani, Perexil de la mar, & Vnhas de agnula yerua: Gallis, Basille, & Fenil marin.

Crithmum duplex in secunda editione proposuit, at sequentibus editionibus secundum & quartum adiecit. I. Crithmum seu Foeniculum marinum C. B. Batis hortensis, Plinio: Cretamum marinum, Crethentio. Crithmum primum, Matth. Crithmum Matth. edit. 2. Dod. gal. Cord in Diosc. Lac. Cast. Lugd. Tab. Crethamum marinum. Cord. hist. Crithinus marinus, Creta vel Salsa marina, & Batis, Gef. hort. Crithmum marinum, Dodo. fol. Foeniculum marinum, Empetrum Rondeletio, seu Calcistaga, Lobelo Banicula, quali parua Batis vulgò, Cæsalpino Creta marina, Lonicero. II. Crithmum secundum, Matthioli Camerario. Crithmum spinosum, Dodonæo folio Tab. Pastinaca marina, Lobelo, Lugdunensi: qui alter



tam habet figuram nomine Tribuli marini quorundam. III. Crithmum marinum Asteris flore
 C.B. Crithmi marini species, Matth. editio secunda. Crithmum tertium, Matth. Lugd. (qui & Matth. &
 Dodo. figuram habet) Cam. Crithmum Chrysanthemum, & Aster atticus marinus quibusdam, Dod. fol.
 Luteum Chrysanthemum, Lob. Crythmus secundus, Tab. IV. Crythmum quartum, Matth. Castrenf.
 Tab. Cam. qui an $\pi\rho\pi\omega\varsigma$ sit Tralliani dubitat: Crythmus agrestis, Trago. Eryngium montanum recen-
 dorum, alterum Lob. Eryngium quartum, Dod. fol. Ammi quorundam Dalechampij, Lugdunensi.

CORONOPVS. CAP. CXXIII

Coronopus oblonga herbula est, per terram strata, filis folijs: coquitur in oleo. Radicem habet te-
 nuem, adstringentem, qui in cibo cœliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias.

I. CORONOPVS.

II. CORONOP. SIVE SER-
 pentina.



Varias, ac diuersas reperio eorum fuisse sententias, qui non parum laboris, ac studij impenderunt, vt plantarum histo-
 riam à mendis omnibus expurgatam, pristina ac propria redderent integritati, in inuestigando, quamam inter tot
 plantas legitime Coronopus dici possit. Quorum vnus exitit Nicolaus Leonicensis, vir quidem ingenio, & doctrina precla-
 rus, qui longa verborum serie hac de re scripsit, conclusitque tandem, Coronopum eam herbam esse, quam ipse vernaculis
 sua lingua Capriola, nos verò nostra Sanguinella appellamus, quòd eam pueri estate naribus indant, vt inde sanguinem e-
 liciant. Verum cum eius sententiam minimè probandam existimauerit Manardus Ferrariensis, hac in re magis Dioscoridi
 adductus, quam Plinij, ac Theophrasti placitis, qui Coronopum inter aculeata recensent, his magis adstipulandum es-
 se iudicauit, qui voluit Coronopum Dioscoridi eam esse herbam, quæ vulgò dicitur Herba stella, omnibus Italia hortis vul-
 garis, ac admodum frequens, sponte etiam in aggeribus, locis incultis, & secus vias nascens, quòd in acetarijs passim vsurpe-
 tur, quam is, qui Capriolam, siue Sanguinellam dictam Coronopum esse censent. Quandoquidem hac nusquam, quòd sci-
 am, in cibo sumitur, sed in brutorum tantum venit pabulum. Nec desunt praterea, qui firmiter asseruerent, quòd quæ inter
 plantas vulgò nonnullis Pes coruinus vocatur, aliquibus verò Pes gallinaceus, quæ vtuntur nonnunquàm medici ad exulcerandas
 corporu particulas, vbi id exposculet necessitas, legitimus sit Coronopus Inter quos non modò deprehensi sunt commentato-
 ris Aucenna, quos nullam rei herbaria peritiam habuisse constat, sed & recentiorum quidam, præsertim ex eorum nume-
 ro, qui de stirpium historia, & facultatibus scripsere commentarios: Namq; Ortho ille Germanus cognomine Brunfelsius,
 tamen non ignoraret, eos à probatissimis viris refelli, qui in hanc venerunt sententiam: tamen (quæ multorum est pertinax
 opinio) maluit cum rei herbaria imperitis errare, quam cum doctis, & peritis rectè sentire. Quippe Pes coruinus vulgò vocatus
 (vt in sequentibus suo loco differemus) Coronopus non est, sed proculdubio Ranunculus, qui Græcis $\beta\epsilon\rho\rho\rho\rho$ appellatur,
 cuius varia Dioscoridi produntur species: inter quas vulgaris Pes coruinus suam retinet sedem. Quòd autem Leoniceni
 Capriola Coronopus sit Dioscoridis, ego quidem cum Manardo nunquam affirmauerim. Nam etsi gerat hac herba
 in sui culmi fastigio quinque veluti graciles spicas, quæ cum manibus dilatantur, cornicis, vel alterius volucris formam pedis
 representant: cum tamen (vt etiam Manardus inquit) in hominum cibum non expetatur, folio exeat nullis incisuris dis-
 secto, non seratur in hortis, & arida tanquam fenam assurgat, nullo pacto asserendum censeo Capriolam esse Coronopum.
 Ceterum si modo quis in eo Plinium sequi velit, quòd dixerit libro vigesimo primo cap. 16. (quòd tamen ex Theo-
 phrastio sumptis) jaculeatarum caules aliquarum per terram serpere, vt eiu, quæ Coronopus vocant, suffrã, meo quidem
 iudicio

Coronopi
 consideratio.
 Capriola;
 Coronopus
 Leonicensis.
 Herba stella.
 Quorundam
 opinio dam-
 nata.
 Brunfelsius
 taxatur.
 Leoniceni
 opinio repro-
 bata.

judicio, probare contendet Sanguinellam, siue Capriolam esse Coronopum, quod eius caulis culmi modo geniculis inflexus, humi minime repat, sed rectus in altum assurgat, & culmorum in morem spicas ferat. Verum eos non aberrare putauerim, qui dixerint Capriolam hanc aculeatum esse gramen, cuius meminit Plinius lib. 24. cap. 39. hu. verbu: Sunt qui & aculeatum gramen vocant trium generum, cum in cacumine aculei sunt plurimum quini, dactylon vocant. Hos cornu-
 Gramen acu- uerim, qui dixerint Capriolam hanc aculeatum esse gramen, cuius meminit Plinius lib. 24. cap. 39. hu. verbu: Sunt qui &
 leatum Plinij. aculeatum gramen vocant trium generum, cum in cacumine aculei sunt plurimum quini, dactylon vocant. Hos cornu-
 ros naribus inserunt, extrahuntque sanguinis ciendi gratia. Neque vsquam, quod equidem legerim, expressit Plinius (ut
 Ruellius testari videtur) gramē hoc aculeatum esse coronopum. Illud praeterea animaduertere oportet, quod Dioscoridis non
 scribit Coronopum aculeatam plantam esse, neque eum inter aculeatas libro tertio recensuit, sed hic inter olera, quae in ci-
 borum vsum veniunt. Quamuis contrarium fecerit Theophrastus, quod fortasse ad foliorum formam alluserit, quae laci-
 niarum tenuitate coronopo aculeata videntur, cum tamen pungere non valeant, ut cum acanthini fortasse lufit Dioscori-
 des. Quare facile adducor, ut credam, Coronopum tam Theophrasto, quam Dioscoridi idem esse. Ideoque Plinius libro 21.
 Theophrastum secutus, Coronopum aculeatum facit: libro vero 22. Dioscoridem fortasse imitatus, aculeorum hanc qua-
 quam meminit. Sed & illud silendum non duximus, quod ex illo graminis genere, quo pueri ludentes sanguinem e naribus
 eliciunt, Sclavi Carniola incola, item Goritienses semen colligunt, deglubuntque in pilis, & mili, vel panici modo carum
 um iure decoquunt, granulis oblongiusculis panico minoribus, gustus non ingratis, adeo ut Germani Himmeltau vocent,
 hoc est, caelestem mannam. Huius plantam (cuius inferius libro quarto inter gramina mentionem faciemus) Sclavi corni-
 cis pedem appellant. Quo fit, ut quasi certo crediderim, quod Leoniceus ab ijs fortasse doctus, putauerit hanc plantam esse
 Dioscoridis Coronopum. Qui cum Coronopum scribat spinis nullis rigere, serique in hortis in ciborum vsum, eos n. bis
 existimauerim, qui nobiscum senserint eam plantam legitimum esse Coronopum, quae vulgò nobis Herba stella vocatur.
 Coronopi Nempe nullam haecenus plantam vidi, quae perinde ac illa adamusim Coronopum referat. Coronopus itaq; folia fert longa,
 historia. angusta, per intervalla corniculata, humi accubantia, & in stella modum radiantia, caulem, spicam, florem, & semen
 rit per omnia plantagini similia, adeo ut nulla ferè accedat notarum differentia, radice nititur vnica tantum, numero
 tamen adnatis capillamentis, foliorum sapor plantagini omnino est: quo fit, ut crediderim Coronopum eiusdem esse gen-
 Coronopi Syl ris. Inuenitur quoque Coronopus sponte nascens diluto extenuatoque solo in comitatu Goritiensi, non longe à Sonty flum-
 uestris men- nis ripis, & alijs etiam in agris & in loco, qui dicitur in collibus. Folia fert tenuiora, capillaceaue, rariuscule cornicula-
 tio & vires. tum accubantia: caulibus, spicis, floribus, semine, hortensi similibus, sed longè tenuioribus. Eam inibi vulgò Serpentina
 appellant, quod eius radix in vino pota viperarum, aliorumque venenosorum animalium moribus maxime aduersatur,
 sitque praeipuum remedium, ita ut ipsa sola (quod equidem experientia compertum habeo) liberet demorsos. Praeterea
 eam quoque ad hydropem, quam Anasarcam vocant, epoto apozemate pluribus diebus, in quo radix conferbuerit, sunt
 hanc Holostrum esse censeant, quorum non possum non probare sententiam, ut libro quarto fusius disseram. Coronopi
 Coronopi vi- paucis perstrinxit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Coronopodus radix coeliaci prodesse credenda
 res ex Gal. manducata. Eius nomen Graecum κορωνόπος, item & Latinum Coronopus: Italicum, Coronopo, & Herba stella: Germani-
 Nomina. cum, Kränsfuß: Hispanicum, Guiabelha: Gallicum, Capriole. Gallis, Corn de Cerf, siue Sanguinaire. Coronopus hys-
 tris, Italis, Herba stella saluatica, at peculiariter Goritiensibus, Serpentina vocatur.

I. SONCHVS ASPERA.



Coronopus seu pes cornicis à foliorum forma Gaza apud Theophrastum 7. hist. 9. Silaginem verat. I. Coronopus hortensis. C. B. Coronopus, Trag. Mat. Fuch. Lac. Lon. Lob. obser. Lugd. Cæsalp. Tab. Pseudocoronopus, Dod. gal. Coronopus fatua, Cord. hist. Cast. Cam. Coronopus vera, Gef. hor. cui & stella herba: Herba stella siue cornu Ceruinum. Dod. fol. Cornu Ceruinum, Lob. icon. Huius habetur syluestris species folijs hirsutioribus, & ad Erucæ similitudinem laciniatis. II. Holostrum strictissimo folio maius C. B. Coronopus syluestris, Matth. edit. secūda & in icon. Lob. icon. Cast. Lugd. Tab. Coronopus siue Serpentina, Matth. Coronopi syluestris species, Gef. hor. Serpentina, Matth. Ital. Lob. obser. Dod. fol. Coronopus montanus, Cæsalp. Plantago marina, Camerario.

Σόνχος. SONCHVS. CAP. CXLIV.

Sonchi duo genera. Syluestris quidam est, & magis spinis horret. Alter teneritate quadam mollescit, cibus expetitus. Caule constat anguloso, & inam, interdum rubente: folijs in ambitu per intervalla dissectis. Vtriusque vis refrigerat, modicè adstringit: vnde æstuantis stomacho, & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat. lac elicit: in vellere appositus, sedis, ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba, quam radix illita, vibrata à scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar est, latis constans folijs: caulem in ramos exeuntem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

Sonchi cōfid. & genera duo.

Sonchus in Hetruria, vbi Latinum nomen adhuc perdurat, Cicerbita vulgò vocatur. Visuntur in hortis, campis, & in agris incultis & secus itinera, duo sonchi genera, alterum asperum, alterum laue. Folia vtraque sonchus profert cichorij modo laciniata, quae quidem in aspero crispata, aspera, & pungentia, subrubentiaque habentur: in laui vero lenia, & spinis nullis rigentia. Huius duo habentur genera, quae tantū folijs aliquatenus differunt, nempe eorum alterum laciniatis habet.

II. SONCHUS LAEVIS.

III. SONCHUS LAEVIS ALTERA.



* IV. SONCHUS LAEVIS
caeruleus.*



habetur folijs, minus quoque laciniatis, ac etiam magis exten-
sis. Omnibus caulibus est cubitalis, intus vacuus, mollis, fragilis,
lacte pregnans, & plerumque rufescens. Flores gerit in caulium
summitate melissos, senetioni haud absimiles, qui deinde in
pappos evanescent. Sed tertium illud genus, de quo in fine ca-
pituli differunt. Dioscorides, non solum non invenitur in Italia,
vbi non recordor me hactenus vidisse plantam, qua Sonchum
arborescentem referat, sed neque etiam de eo quicquam, quod e-
quidem legerim, memoria prodiderunt Theophrastus, & Pli-
nius. Soncho nostri Itali utuntur hyeme in acetarijs, praesertim
que eius radicibus, qua cum tenera sint, mansueta, dulces, frequen-
ter mensis expetuntur. In vino decoctus stomachi fluxionibus
medetur. Lacteus liquor a caule emanans, datur potandus
agere spirantibus, & asthmaticis. Idem auribus instillatus dolo-
rem tollit, & praesertim in malicorio cum oleo decoctus. Stran-
guriam quoque sanati cyathi mensura vicia pondere potus. Com-
manducata folia oris grateolentiam tollunt. Sonchus laevis
non differt a primo genere, sicis in facultatibus. Sonchi vires
nobis descripsit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum,
his verbis: Sonchus vbi adoleuerit, ex spinosis plantis est, cate-
rum viridis etiamnum, & tener estur, perinde ut cetera ole-
ra sylvestria. Temperamentum eius quodammodo mistum est:
constat enim ex aquosa, terreaque, essentia, utraque leniter frigida.
Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps: & sine cataplas-
matis in morem illinatur, siue edatur, manifesto refrigerat:
postea vero quam plane resiccatus fuerit, terrestre eius tempera-
mentum redditur, modicam habens caliditatem. Σόνχος sic
Graece, ut etiam Latine Sonchus appellatur: Italicè, Soncho,
Cicerbita seu Crespine: Germanicè, Wilderhasentol / Genfz
distel: Hispanicè, Serraya, & Serallha: Galicè, Latteron, & Pa-
lais au lieure. Sonchus laevis, Italis, Cicerbita gentile.

Sonchi vires
Matthiolo.

Sonchi vires
ex Gal.

Nomina.

† Hæc dictio *εὐρύς*, quæ vacuum, & inanem significat, hic
non legitur in vulgatis Graecis. Sed tamen eam habent vetusti codices, quibus etiam ad stipulatur Orbasius. Ergo non erit,
ut aliqui putant, ex Plinio duntaxat reposita.

Sonchus a *νότος* *ζώνης*, quod salubrem fundat succum, qui rotones stomachi lenit, caule nam-
que

que dissecto, copiosus succus lacteus defluit. Diuidimus in asperum & læuam: vtrumq; in laciniatum, & non laciniatum. I. Sonchus asper lacinosus. C. B. Sonchus aspera, Matth. (sed in iconibus figura transposita) Gef. hor. Lac. Cast. Lugd. Tab. cui & Cicerbita aspera, Endiuiia syluestris, Lonicero. II. Sonchus læuis lacinosus primus. C. B. Intybus syluestris seu erratica altera, Trag. Sonchus læuis, Matth. Gef. hor. Cast. Dod. fol. Thal. Sonchus non aspera, Fuch. Sonchus tenerior non aspera & lactuca leporina Apuleij Dod. gal. Sonchus læuis vulgaris, folijs lacinosus dentis leonis, Lob. Sōchus læuis laciniatis folijs, & Sonchus læuis & Andryala minor Dalechampii, Lugd. qui tres habet icones. Sonchus lenis aut læuis, Cord. hist. Sonchus in collibus vmbrosis, Cæs. Sonchus læuis alter flore luteo, Tab. Flore est luteo: aliquando & niueo reperitur. III. Sonchus læuis alter vel lactuca murorum lutea. C. B. Intybus syluestris tertius, Trago. Lactuca syluestris luteo flore, Gef. hor. cui & Sonchus arborefcens Dioscoridis & Sonchi genus læue dicitur. Lactuca syluestris cuius Galentus meminit, Anguil. Lactuca montana, Cæsalp. Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato hederaceo. Lob. Sonchus tyluaticus quartus, Tab. Videtur esse Sonchus læuis altera Matthioli, Castoris, & Lugdunensis. IV. Sonchus læuis laciniatus cæruleus. C. B. Ex radice crassa, oblonga & obliqua candicante, dura & veluti internodiis distincta, ob multas veterū caulium extuberantias, circumquaq; fibrosa, quibus tenacissimè terræ adhæret, caules exurgunt cubitales & altiores, rubicundi, rotundi, hirsuti, striati, fistulosi: quos cingunt folia lata profundè laciniata, per ambitum dentata, in mucronè desinentia, latiore pediculo caulè complectentia, subtus leuiter incana, lactescencia: in summo caule flores complures, purpurascensibus & subhirsutis pediculis insidentes, Cichorei forma plurimis foliolis laciniatis, à cæruleo ad purpureum inclinantibus, aliquando elegantissimè cæruleis, qui in pappos cum semine exiguo cinereo euanescent. Hic in Alsatia montibus altissimis, Iulio & Augusto floret, semenq; profert. Dicitur Sonchus læuis flore cæruleo, Clus. Pan. Sonchus flore cæruleo & Sonchocichorium, Cam. ad Matth. Sonchus læuis quartus flore cæruleo, Tab. Intybus πλατιφύλλος Hærcynica, Thalyo.

Σέρης

SERIS, SIVE INTYBUS.

CAP. CXXV.

Seris duum generum est. Altera syluestris, quæ picris & cichorion vocatur. Altera satiuæ, latioribus folijs constat, stomacho quàm horrensis vtilior. Quæ iterum in duas species digeritur, vna folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit stomacho vtilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, vtiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, valet ad illucorum, quæ refrigerationem desiderant.

I. INTYBUS MAIOR.



Cichorium endiuia

II. INTYBUS MINOR.



Cichorium endiuia

Quoniam in Græcis vulgatis codicibus initium istius capituli & in verbis nonnullis, & in Seridis generibus deprava-
 rum, & confusum legitur; ideo ex libro Oribasij simplicibus dicato, atq; etiam ex antiquissimis Dioscoridis codi-
 bus manuscriptis, illud legitime, & ordinatè legendum putamus, hoc modo. Σέρικ ἀγρία, καὶ κηπευτή. ὡν ἡ μὲν ἀγρία
 δασυή, ἢ μετὰ ἀρπικρίας, ἢ καὶ κηχάριον καλεῖται, ἢ δὲ ἡμερος πλατυφυλλότέρα, καὶ εὐσμοωτέρα τῆς κηπευτῆς, τῆς δὲ κηπευ-
 τῆς, δὲ ἢ ἡ δασυή, ἢ μετὰ ἀρπικρίας, ἢ θριδακωδέσσερα, καὶ πλατύφυλλος, ἢ δὲ ἡ εὐσμοωτέρα, καὶ ἡ μετὰ ἀρπικρίας: id est Seris sylvestris, &
 hortensis. Sylvestris quidè duplex: altera picris, quæ & cichoriō vocatur: altera sativa latioribus folijs, & ori gratior, quàm
 hortensis. Hortensis verò duplex genus: vna folio latiore, lactuca similior: altera folio angustiore, & gustu amara. Huic le-
 dioni maxime adscribitur Serapio, quippe qui ex Dioscoride tot habeat sylvestris Seridis species, quot domestica. Id quod
 etiam ex usu clarissime patet, cum tam sativa, quàm sua sponte nascens Seris quotidie sit præ manibus, & sumatur in ci-
 10 bu. Sativa quidè ubiq; ferè in Italia in hortis colitur. Maior provenit folio erratica ampliore, leuioreq; lactuca simili,
 ab hortensi angustifolia Seride non longè dissimilis, caule bicubitali, brachiato: floribus cæruleis, Cichorei similibus, semine
 parvo, oblongo. Vnca nititur radice, ipsaq; villosa, quin & ori erratica gratior. At intubus minor, folia gerit alterius
 longiora, angustiora, humi accubantia: caulibus est tenuioribus: radice verò, floribus & semine maiori per omnia simili-
 libus, nihilq; differt (uis in facultatibus à maiore. [Quinetiam sylvestris duæ species, quarum alteram Scariolam minorem,
 sive Cichorium sativum: alteram quidè sylvestre Cichorium & picrin ab amaritudine vocant. Sativa folijs exit latio-
 ribus sylvestri, minori sativoq; Intubo minoribus, angustioribus tamen atq; brevioribus, minusq; per ambitum laciniatis,
 sed caule & flore similibus. Radicem habet pedali longitudine, alba intus pulpa, teneram & subamaram. Seritur passim
 in hortis. Sylvestris verò Intubus] quæ spontè provenit [in agris incultis, in pratis, & secus itinera] passim ferme virefcit,
 folijs in ambitu longè magis laciniatis, [sonchi asperæ modo incisus, & in summitate sagittæ instar acuminatis: rubea per
 20 medium excurrente costa, amaro sapore: caulis est illi durus atque lignosus, flores à cæteris generibus haud absimiles, quem-
 admodum & semen. Radice nititur domestica duriore, amariorq; Tiresia cæciores sunt, qui Hieracium, & sylvestrem
 lactucam, Intubum sylvestrem faciunt.] Sunt qui pro certo habeant, Scariolam à domestica latifolia Seride nihil differre,
 quod ut esse comprobet Serapionis scriptura. Alij Scariolam vocant alteram domestica speciem, quæ angustiore est folio,
 & gustu amarior. Sed animadvertendum est, Scariolam in Serapione, Serapionis non esse, sed interpretis, cui nulla, mea
 quidè sententia, in hoc fuerit adhibenda fides. Quippe cum sciuerit is Scariolam corruptà à barbaris voce, nil aliud
 significare, quàm Seriolam, Serimq; non aliud esse Græcis, quàm Latinis Intybum, huius generis latifolium (perperam
 tamen) Scariolam appellavit. Quæ in re eorum equidem sententiam magis laudauerim, qui angustifoliam Serim, quod
 latifolia sit minor, Scariolam, seu potius Seriolam, ac si parvam Serim dixerit, vocant: tametsi in sylvestrium quoq; gene-
 re, etiam in Seriola dici possit, quæ passim in hortis colitur, quod domestica Seriola non longè sit absimilis. Omnes itaq; in
 30 Italia vulgares sunt notuæ, quod nostratibus mensis frequentissime in acetarijs apponantur. Quamobrem olitores has hye-
 meterra & sabulo in hortis obruunt, quoniam hoc artificio mirum in modum albescunt, & tenerima evadunt, & in to-
 tam asseruantur hyemem, artem hanc a naturæ edocti, quod viderint sæpius in campestribus Cichorium aquarum inun-
 dationibus terra, vel arena obrutum & tenerimum, & candidissimum reddi, exuta omni ex parte amaritudine. Est quo-
 q; tertium INTYBI HORTENSIS genus, amplo, foliosoq; cespite proveniens, folijs magnis, sed ubiq; in ambitu cri-
 spis ac fimbriatis, caule cæteris maiore, crassiore tenerioreq; in acetarijs expetitur: reliqua cum cæteris paria sunt. Seritur
 in hortis ab oblatoribus, quod admodum in acetarijs in cœnis placeat. Verùm quamvis asserat Dioscorides sylvestrem In-

Diosc. locus restitutus;

Scariola quæ sic.

Intubi crispæ mentio.

III. INTVBVS CRISPA.

IV. CICHORIVM DOMESTICVM.





Ek 2 tybum

Intybi Hortensis
 Cichorium Domesticum
 Serim

V. CICHORIVM SYLVESTRE.

VII. DENS LEONIS.



VIII. CICHORIVM CONSTANTINOP.

Aphaca intra-
bi-
bi-
vulvestris
species.

Dens Leonis
feu Ambu-
beia,

Ambubeia
vires Matth.

Septasriorū
negligen-
tia Hieraci-
um pro En-
diuia fumen-
tium.



tribus Cichorium vniq̄, frequentissimum, harum plantarum loco modo hieracium, modo sylvestrem lactucam suo lacte refertam subvertit, atq; ex ijs aquam quam nomen de Endiuiā mentiri faciunt, suis plumbeis eliciunt organis, quod maxime detestandum est: nam etsi hieracio sylvestrique lactuca vis frigida insit, tamen præterquam quod nullam cum icmore habeant conuenientiam, lac, quo eo potissimum tempore turgent, quibusdam suis partibus caloricum addo est, et

tybum, quemadmodum: & satiuum duorum tantum esse generum, Chondrillam tamen, cuius historiam ipse sub duplici specie sequenti capite describit, inter Cichorij genera esse respondentem, nemo est qui ambigat. Quemadmodum & tertiam illam, qua Theophrasto lib. 7. cap. 11. de plantarum historia Aphaca vocatur. Hac enim illi ingustabilis, & amara est: festinanter hæc floret, sed celeriter flos senescit, atq; in pappos euanescit: tum iterum prouenit, atq; iterum alius, idq; tota hyeme, vterq; toto vsq; ad æstatem factitatur. Fos melini speciem gerit: hæc ille. Huic per omnia in vniuersum respondet, qua nonnullis DENS LEONIS, alijs Dens caninus, quibusdā Capus monachi, alijs Rostrum porcinum, pleriq; verò Ambubeia vocatur. Tamen Plinio Cichorium ipsum propriè Ambugia, vel Ambubeia dicatur. E terra prodit hæc herba, in ipso statim veris initio, folijs cichoraceis, frequenter laciniatis, in sagitta modum desinentibus, humiq; accubantibus: caule palmari, rotundo, glabro, subrubente, intus concauo, lacteo succo pregnante. Flore luteo, folioso, quo decidente subcreuit papposum caput, & admirabile nature ludentis opus, quod tandem spirante vento effluit in auras. Radicem habet Cichorio proximam, lacteo succo plenam, sed longè amariorem. Prouenit in hortis, in campis, prope sepes & in ruinosis ædificiorum muris, quæ etiam in vineis, pratibus & viridarijs: adstringit, roborat atq; alstergit, magis quam vtrumque Cichorium. Cocta stomachum dissolutum adstringit, cruda verò aluum fistit: eadem dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta, succus potus prodest quibus genitura effluit. In acetate decocta vrina tormina discutit. Vniuersa planta decoctum potum auxiliatur regio morbo laborantibus. Tradunt Magi succo totius cum oleo perunctis fauorem conciliari, eosq; facilius impetrare quæ volunt. Sed profectò maxima est septasriorum multorum negligentia, atq; ignauia, qui cum in hortis numerosissimum, præstantissimumq; habeant Intybum, & in campe-

IX. ZACINTHA, SIVE CICH.
Verruc.

X. CYANVS MAIOR.



CYANVS MINOR.



linguam exurat, ac vellicet: quibusdam verò adeò somnificum, vt non desint, teste infra Dioscoride, qui illud meconio permisceant. Est & alia Cichoracei generis planta, quã quidam Zacyntham vocauerunt, nobis autem ab effectu CICHORIVM VERRVCARIVM appellare libuit. Radice hac nititur rapunculi figura, subnigricanti colore, adnatis circumquaq; capillaceis fibris. Folia habet Cichorij, verum paulo asperiora ac minus laciniata. Caules edit cubitales, & quandoq; maiores, tenues, asperiusculosq;, in quorum summitatibus flores oriuntur aurei, cichoracea specie, quibus flaccescentibus semen remanet subnigrum, capituli instar, circumquaq; secundum longitudinem secti striatiue, melopeponis modo. Prouenit in campestribus, & à nonnullis quoq; seritur in hortis & scitilibus, in medicum vsu. Mira huius planta facultas est ad tollendas verrucas. Siquidem scimus nos nonnullos quorum manus verrucis admodum numerosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acetario semel tantum huiusce Cichoracea planta folijs. Idem prestat eius semen, tribus diebus drachma pondere à cœna deuoratum, dum se cubitum recipiunt verrucosi. Hoc velim acceptum referant rei plantaria studiosi Francisci Calzolari Pharmacopœi Veronensi, qui plantam ad me vnã cum facultatibus misit. Caterum aliud CICHORIIGENUS, CONSTANTINOPOLI allatum, misit ad me Vienna, Clariss. Angerius de Busbecke Flander: Folia per omnia cichorio syluestri similia sunt: caules edit glabros, tenues, in quorũ summitate flos emicat aureus, numerosis folijs stipatus, qui tandẽ in pappos euanescit, radicibus numerosis Asphodeli modo dependentibus, siliquarum ferè raphani figura. Cuius imaginem, ob rei nouitatem, hic appingi curauimus. Nascitur, vt audio, in pratis & herbosis locis. Et si hæcenus huiusce planta facultates nemo mihi aperuit, crediderim tamen à ceteris Cichoraceis, suis in facultatibus

Cichorij verrucarii mentio & vires.

Verrucariz facultas.

Cichor. Constantinop.

Cyani mentio ex Plin.

ipsi minime dissentire. Sunt præterea qui Intybaceo generi herbã adscribant, quæ à flore cyaneo CYANVS Plinio dicitur aliquibus verò vulgò Battisecula, vel Battisuocere, nobis autem fior Campese, quod in campis inter segetes, Maio & Iunio mensibus numerosus proueniat, expetitur hîc maxime rusticanis puellis, suis contexendis coronis, quibus per aestatem capus

* CYANVS MINOR FLORE
multiplici.*

Cyanus du-
plex.

Cyani utri-
usque vires
Matthiolo.

Intybi & Ci-
chorii vires
ex Galeno.



put & tempora cingunt. Sed quibus notis, quibusue rationibus inter Intybacea annumerari possit, quid dicam, non habeo. Duum est generum, maius, & minus. Hoc frequentius in campis habetur, folio longo, piloso, albicante, barbulo quibusdam dissecto. Caules edit plures, bicubitales, lanuginososq, arg, folijs minoribus refertos, floribus in cacumine caeruleis, in ambros crenatis, squaroso è calyce prodeuntib. Radice nititur vnica sed fibrosa. Maius latioribus prouenit folijs, alboribus, pilosioribus, & nulla in parte diuisis, vt in lychnide. Vegetiores quoq, habet caules, albicantioresq, breviores tamen, & flores longiores & patentiores quam minor. Florum color cyanus, caeruleusue spectatur, foliosus, & in crista modum extremis vtilaciniatus, calyculis, è quibus prodit squamosis ac subasperis. Nascitur in montibus frequentius, quam in campestribus. Huiusce vim nullus antiquorū, quod sciuerim, scriptis mandant: quanquam Placentinus, quod affirmauerint aliqui cyanum pestilentibus morbis propria dote aduersari, suo de Cichoria serapio, quod ad Pestilentes febres maximè commendauit. Cyanum etiam inferuit. Maioris puluis datur vtiliter ab alto deuolutis & sanguinem reijcientibus, ex aqua plantaginis, aut portulacae, aut maioris symphyti, aut equiseti: succus illius recentia vulnera glutinat, & oris vlcera sanat. Minor ea omnia prestare potest etiam valentius, qua de maiore dicta sunt: peculiariter tamen huiusce folia, siue semen, ex vino decocta, & hausta, auxiliantur à Scorpione, phalangioq, icthi: quin etiam omnibus venenis resistunt. Praestat quoq, tota planta ad pestilentes & pernecabiles febres. Succus illius oculorum inflammationes tollit. Intybi & Cichorij vires recensuit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Intybus est subamarum, & magis quod agreste est, quod ob id ipsum, p. 30 crida, hoc est amarum, quidam nuncupant, quidam verò Cichorium appellant. Est autem ea sicca, frigidaq, temperata, vtrumq, secundo excessu. Porro domestica magis etiam quam agrestis refrigerat. Sed & humiditatis multa admissio siccitatem


extinguit: verum vtraq, adstringentis qualitatis est particeps, velut & chondrilla: nā & ipsa est seridis, seu intybi species. Et libro 8. de compositione medicamentorum secundum locos: Cichorium, inquit, & Seris cibary generis existunt: apud nos namq, rurales ambo haec edunt & cruda, & cocta. Facultas horum olerum subfrigida est & submara. ac moderate adstringens: & propter has qualitates, optima pharmaca calidis intemperaturis ipsa: hepatis existunt. Vtraque enim, quod moderate refrigerant, amplius & robur visceri addunt per adstrictoriam facultatem: insuperq, cum viscerum osculorum venarum in sima visceris parte ad eas, qua in gibba sunt, extergent. Neque verò frigidas intemperies magnopere laedunt, quemadmodum qua frigidam humiditatem absque adstrictione, aut amaritudine possident, facere solent. Inuare etiam viscus talium olerum substantia potest, etiam si citra serosorum, aut aliorum humorum vitiationem intemperes fiat per se, & cum humiditatis cuiuscunq, complexu: ex mistura enim mellis humiditatem per vrinam educunt. Quapropter etiam si siccata tusa, quis potioni inspergat, itidem iuuant. Quin & decoctorum decoctum potatum multum commodi affert. Si verò non calida aliqua intemperies infestet, aut si obturatio quadam sit circa viscus, magnopere auxiliantur ex vino albo tenui potata, cum his qua vrinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorum est tum recens, tum exiccatus, sed & ipsa olera exiccata, tusaq, ac trita potui inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum, auxiliantur. Cichorium domesticum, eadem omnia potest, qua domestica intubus, ea tamen siccior est, & magis extergens. Syluestre isdem polla viribus, quibus cetera genera pollere diximus. Verum cum plus amaritudinis habeat, magis quoq, abstergit. Planta que σεπίς Gracis, Intybus satiuus Latinis dicitur: Mauritanis, Dumbebe, Aundebe, seu Endebe: Italis Endiuiia: Germanis Endiuen: Hispanis Endiuiia: Gallis Endiuiie. Intubus minor, Gracis, Σεπίς μικρά: Italis Endiuiia minore: Officinis Scariola domestica, Intubus crispa. Italis, Endiuiia Crespa. Qua verò Σεπίς ἀγρία ήμερος Gracis, Intubus syluestris & Cichorium domesticum Latine: Hetruscis, Torna sole: Italis ceteris, Cichoria domestica: Germanis Wegweis & Wegwurt: Hispanis Almerones & Cichoria: Gallis Cichoree. Officinis, Scariola minor. Syluestris intubus, Gracis Κίχόριον ἀγρία: Italis Cichoria saluatica: Germanis Wild Wegwurt. Dens leonis, Gracis praesertimq, Theophrasto Αφάκην: Italis Dente de Cane & Piscia al letto: Germanis Pfaffenblat & Münchstopff: Officinis, Taraxecon, & Caput monachi, ac nonnullis restrum porcinum & Ambubeia. Cyanus maior, Gracis Κύανος: Italis fior Campefe, fior Aliso, & Battisuocera: Germanis Kornblum: Officina Batifecula.

I. Endiuiia vulgaris latifolia. C. B. Seris domestica latifolia Dioscoridis: Intubum & Seris hyberna Plinij: an Hypochæris apud Theophrastum, quam vocem Gaza Porcelliam reddidit. Intubus maior, Matth. Intybum satiuum latifolium, Fuch. Dod. gal. Lob. ob. Lugd. Intybum satiuum, Cord. in Diosc. Dod. fol. Intybum latifolium Italicum, Cichorium satiuum, Endiuiia, Seris. Gef. hor. Intybus hortensis. Lac. Intybus satiuus maior, Cast. Tab. cui & Cichorium domesticum. Seris siue intybum satiuum latifolium. Endiuiia & Scariola, Lob. icon. Endiuiia vulgo Cæsalp. Endiuiia hortensis. Cam. Floribus est caeruleis rarius candidis. II. Endiuiia angustifolia C. B. Intubus minor Matth. Intybum satiuum angustifolium, Fuch. Dod. gal. Lugd. qui iconem habet & Matthioli & Fuchsij. Intybus hortensis alter, Lacu. Intybum angustifoliū quod Scariola aliquibus. Gef. hor. Intybum minus album. Tab. Cichorium satiuum, Cord. hist. Cichoriū angustifoliū. Lonic. Floribus est caeruleis, aliquando albis. III. Endiuiia crispa. C. B. Intubus crispa Matth. Tab. Intubū crispū, Lacu. Endiuiia Romana crispa, Cam. IV. Cichoriū satiuū C. B. Lob. icon Tab.

Tab. Cichoria sativa. Trag. Cichoriū domesticū, Matt. Cast. Cichoriū sativū latifoliū, Lon. Cichoriū he-
 dypnois Lac. Cichoriū latioris folii, Dod. fol. Seris sativa, Lob. ob. Intubū sylvestre latifoliū, Lug. Flore
 albo & cœruleo variat. V. Cichoriū officinarum seu Picris, ob insignem amaritudinem. C. B. Solfequium,
 Brunf. & Cichorea. Cichorea cœrulea, Trag. Cichorium sylvestre, Matth. Cast. Dod. fol. Cichorium a-
 greste, Lonic. Cichorium Lacu. Cord. hist. Tab. cui & Intybus erratica. Cichorium, Cæsalp. Intybum syl-
 vestre, Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. cui & Ambubeia officinarum. Intybum agreste, Gef. hor. Intu-
 bum sylvestre angustifolium, Lugd. cui & Hypochæris Dalechampii, duas habet icones. Seris sylvestris,
 Lob. ob. Seris piris, Sylvestre cichoriū, Lob. icon. Flore est cœruleo, candido, roseo: aliquando ipsius
 caulis quatuor digitorum latus est, quod etiam in Anchusa, Echio & Beta observauimus. VI. Cichorium

*** CICHORIVM SPINOSVM. ***

sa, caulem emittit durum, lignosum, qui mox in mul-
 tos ramos latè se diffundentes, virides, striatos bra-
 chiatur, qui omnes in oblongas quasi spinas seu cor-
 nua finiunt: folia plura circa radicem per terram spar-
 guntur, eleganter virentia, & Cichorii vulgaris modo
 in plures lacinias, sed subrotundas diuisa, in caulibus
 verò rata observantur, eaq; oblonga, angusta, nec laci-
 niata, quæ amara quidem sunt, sed non lactescunt, &
 citò etiam pereunt, etiam reliquis plantæ partibus e-
 leganter virentibus. Flores plures sparsim proueniunt
 in ramorum maximè alis, foliolis herbaceis sustentati,
 qui vulgaribus forma similes, sed longè minores, cœ-
 rulei coloris, ex senis septenisve laciniatis foliis com-
 positi, in quorum medio apices aliquot observantur:
 his succedit semen, vulgari simile, similiq; techa in-
 clusum. Iulio & Augusto florere. Hoc Chondrilla spi-
 nosa primum, dein Cichorii spinosi nomine Doctor
 Doldius Noriberga misit: verum in horto D. Zuingeri
 hoc anno legimus, & cum hætenus à nemine fuerit
 descripta, eius iconem etiam, vt Dominus Saltzman-
 nus Medicinæ Candidatus eleganter expressit, addere
 placuit. VII. Dens Leonis latiore folio. C. B. Dens leo-
 nis, Brunf. Matth. Dod. fol. Taber. cui & Rostrum por-
 cinum. Dens Leonis vulgi: officinis Taraxacon, Coro-
 na & Caput monachi, Lob. Hieracium maius, Trago,
 Hieracium paruum, Cord. in Diosc. Hieracium mi-
 nus, Gef. hor. Hedypnois maior, Fuchf. Hedypnois
 Dalechampii, Lug. Chondrilla altera, Dod. gal. Chon-
 drilla Galeni, Anguill. Taraxacon minus, Lonic. A-
 phaca, Cæsalp. Habetur maior, media & minor. VIII.
 Dens Leonis bulbosus C. B. Cichorium Constantino-



politanum, Matth. Cast. Lugd. Dens Leonis Monspelienis, Lob. ob. Dod. fol. Dens leonis altera, Tab.
 Chondrilla altera Dioscoridis, Lob. icon. IX. Chondrilla verrucaria C. B. Zacintha siue Cichorium ver-
 rucarium Matth. Cast. Lug. Cichorium verrucarium Matth. Ital. Cam. Verrucaria, Seridis species, Gef.
 hor. Chondrilla species in ruderibus, Cæsalp. X. Cyanus montanus latifolius, vel Verbasculū Cyanoides
 C. B. Verbasculum, Trago. Cyanus maior, Matth. Dod. gal. & fol. Lob. Cast. Lugd. Came. Cyanus flore
 grandi, Cæsalp. Cyanus sylvestris, Lonic. Cyanus montanus, Gef. hor. (cui & syluaticus) Tab. Flore est
 cœruleo, aliquando umbilico purpureo: rarius flore albo inuenias. XI. Cyanus segetum cœruleus. C.
 B. Lychnis agraria & flos frumenti, Brunf. Leucoion cœruleum Dioscoridis, Hermolao: Baptifecula, Tra-
 go, Cyanus minor, Matth. Cast. Lugd. Cam. Cyanus, Fuchf. Dod. gal. Lonic. Cæsalp. Cyanus sylvestris,
 Fuchf. icon. Cyanus vulgaris, Lob. Cyanus flos, Dod. fol. Cyanus cœruleus aruensis, Tab. Thal. Papauer
 heracleum Dioscoridis & Theophrasti, Columnæ. Flos communiter cœruleus, rarius albus: si verò in
 hortos transferatur & colatur, non solum erit cœruleus, sed purpureus, remisso vel intenso colore, viola-
 ceus item & varius: & rursus flos simplex vel plenus.

Χονδρίλλα CHONDRILLA. CAP. CXXVI.


Chondrilla, quam aliqui cichorion, alii Serin appellant, caulem, flores & folia habet cichorio similia:
 qua ex causa nonnulli sylvestris intybi speciem esse pronunciarunt, verum tenuior tota est. In cuius
 ramulis, gummi mastiches simillimum, magnitudine sabæ inueniri solet: quod tum myrrha tritum &
 linteo appositum, instar oliuæ, foeminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, di-
 uiditur in pastillos: qui nitro admisti vitiligines emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat. Quod i-
 tem tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admouetur: contra viperas in vino pota proficit. Suc-
 cus decoctæ in vino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Chondrilla genus, folium ferens ob-
 longum, circumrosus, humi sparsus: caulem succo madentem lacteo: radice tenui a rotunda, læui, ve-
 geta, flauescente, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos pal-
 pebrarum pilos reflectit. Nascitur in lætis & cultis.

a Ori. ἐπὶ τῆ
 κρη κορυφῆν
 ἐχέει. i. in
 summo ver-
 ticē habens.
 Chondrilla
 vtriusq; con-
 sideratio.

Nimirum sylvestris Cichorii species Chondrilla est: gracilioribus tamen folijs, caule, floribus ac semine. Frequentissima
 hac non modo in Hætturia, sed etiam in vniuersa Italia incultis locis, scrobium aggeribus & secus vias, atque etiam
 in pratibus

I. CHONDRILLA

II. CHONDRILLA




in pratis virefcere, ac fuo tempore florefcere confpicitur: qua radice nititur Cichorio breuiore, & lacteo fucco pregnante: nec minus etiam, quam cichorium in acetarijs recipitur, quamuis amarior fit. Vifitur & alterum genus huic non longe difimile, folijs tamen non ita in ambitum laciniatis, nec adeo in mucronem definentibus. Hac à lactis vbertate, quo in omni parte, præfertimq; radice redundat, à noftris vulgò Lattaiuola vocatur. Rura eam fuis acetarijs pro cichorio indifreniter admifcent. Chondrilla vires fcripfit Galenus lib. 8. fimplicium medicamentorum, vbi fimul de intybo & cichorio

Chondrilla vires ex Gal.

I. CUCURBITA OBLONGA.

Nomina.



Cucurbitæ consideratio, & genera

differuit, nihilq; ei peculiare reddidit, præterquam quod intybi fit fpecies. Veruntamen libro 2. de facultatibus alimentorum non sanè intybo, nec cichorio, fed lactuca Chondrilla fimilem fecit. Huic nomen Græcum χορδαιλλη: Latine pariter & Italicum, Chondrilla, & Terracrepola: Arabicum Candarel, Cadaron feu Amiron: Hispanicum Leituga & Lechugas dentre los planos: Gallicum Lettron.

Chondrilla, quibusdam propter formam, feridis agreftis fpecies. an fortè apud Theophrastum 7. hift. 9. & 11. οπάτη, Fraus vt Gaza vertit. I. Chondrilla prior, Matth. Caft. Lugd. Chondrilla altera, Lacu II. Chondrylla cœrulea latifolia C. B. Chondrilla fecunda, Matth. Caft. Condrilla prima, Lacu. Chondrylla latifolia cœrulea, Tabernæmontano.



Κολοκυθα. CUCURBITA. CAP. CXXVII

Cucurbita efui apta. Cruda, trita illitu tumores & abfcelfus mitigat. Ramenta eius infantibus, contra capitis ardorem, quam fyriafin vocant, in fyncipite illinuntur: oculorum inflammationes, podagrasq; refrigerant. Succus è ramentis tufis per fe, aut cum rofaceo infufus aurium doloribus auxiliatur: aduftiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat. Totius feruefactæ & expreffæ fuccus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter refoluit. Vinum in cucurbitam recentè excauatam, infufum, fi miftum fub diu teneatur, potum aluum lauigabit.

Cucurbita fatiua qua per æftatem in cibum frequentiffimè vario fumitur apparatu, in triplici cenfetur genere. nempe

II. CUCURBITA LAGENARIA.

III. CUCURBITA MAIOR sessilis.



IV. CUCURBITA INDICA.



uempe longa, rotunda & sessilis. Sed quanquam Cucurbita inter se forma distemiles habeantur, non tamen propterea viribus & natura sibi inuicem repugnant. Siquidem (vt Columella tradit, & Plinius refert lib. 19. cap. 5.) forma varia in cucurbitis arte, & mangonio fieri facile potest. Nam semina: quae proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparandas supra dictis, quae in medio, rotundas: quae in lateribus, crassas, breuiores ac sessiles, apertissimas quidem ad recipiendum tum vinum, tum oleum, tum alios quoslibet liquores, uiccorum, & cadorum vice. Si uero cordi sit, ut fiant corpore vastiores, de media cucurbitae parte semen inuerso seratur cacumine. Sed diligenter custodiendum est, ne eo mulieres accedant: namque earum contactu facile elanguescunt incrementa uirentium: tantoque magis, si eis fluxerint menses: tunc enim solo oculorum intuitu tenellos enecant factum. Quae autem ad semina seruantur, è primo seligantur prouenta, pendeantque in sua uite ad hyemem usque: deinde sublata insolentur, aut ponantur in fumo, donec penitus siccescant: aliter facile earum semina, ascita putredine, depereunt. Amant Cucurbita mirum in modum aquas: nam si prope in patens vasculum aqua subiiciatur, à quinq; uel sex digitorum interuallo, ante posterum diem adrepentes cognoscuntur descendisse. Sine semine nascuntur, si per triduum antea, spargenda semina oleo sesamino macerentur. Hederaceis uirescit cucurbita folijs, sed amplius admodum & subcandicantibus: fl. egellus sarmentosus, angulosus & humi repentibus. Verum ubi admiculum naeta fuerit, illud facile comprehendit clauiculis, quibus arbores & pergulas scandit, usque sese implicat. Flores illi albi grandioresque, & in stelle fere modum diuisi, uerum perpauci frugiferi. Noscuntur hi facile, conceptu sub ipsis extuberante. Fructus edit magnos, qui quidem in vno genere longi, in altero rotundi, & in altero sessiles uisuntur: uerum omnes in magnam extuberant molem. Seruntur passim in hortis, & circa sepimenta. Sunt & alia Cucurbitarum varia genera Italia peregrina, quae diu per hyemem recentes asseruari possunt. Ferunt has ab occident. alibus Indys in Italiam uenisse: unde Indica à pluribus uocitantur. Sed iam diu Italico solo proueniunt. Harum varia habentur genera, magnitudine, facie & colore differentia, referunt tamen omnes Melopeponum effigiem. Sed alia magne, imò maxima, uentricosaque, alia parua, alia mediocres, & alia oblonga, alia rotunda, vario colore, quae quidem omnibus notiores sunt, quam à me describi debeant. Crescunt folijs nostratibus longè

Cucurbitae historia.

Cucurbitae Indicae mentio.

maiori-

Cucurbitæ
vires Matth.Cucurbitæ
facult. ex Gal.

Nomina.

maioribus, firmioribusq; asperis & rigenti pediculo adnexis, vitiginea facie. Sarmenta illi crassa, angulosa, aspera bracteaq;. Ea humi repunt, longo admodum tractu, atq; etiam scandunt, & pergulas & attegias opacant. Flores magni, lutei fere effigie, aureo colore. Fructus decerpuntur Autumno, & asseruantur hyeme tota in culinis. Semen in ventre conditum magnum, amygdalini nuclei figura, in quo nucleus concluditur dulcis & suavis. Sapor is subdulcis, non vt nostratiorum, adeo insipidus: verum gustui insuaues sunt, nisi precipuis condimentis saturentur. Vulgarium cucurbitarum folia recumt iumentis illita affricataq; muscas abigunt. Eadem manibus puerperarum adhibita, lac siccant. Oleum quod e cucurbitarum floribus paratur, is in eo diutius insolatis, renum calores inunctum extinguit, & capitis dolorem ex calida causa ortum decentem & presertim febrientibus. Arida cinis ambusta, & pudendorum vlcera sanat. Estur passim astate in cibus cum insculis elixa, tum quoq; in oleo aut butyro fixa, farina prius circumlita & acerbæ vix succo aspersa. Cucurbita facultas scriptas reliquit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum his verbis: Cucurbita humida frigidaq; temperatura est, & triaq; qualitate secundi ordinis. Quocirca ramentorum eius succus ad aurium dolores cum phlegmone iunctos, cum rosacea vtentibus utilis est. Sic tota quoq; illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. Comesta autem humida est, & firmo propellens. Et libro 2. de alimentorum facultatibus: Cucurbita, inquit, cruda cibo insuauis est, stomacho perniciofa, & concoctu planè inexpugnabilis: adeo vt si quis alterius cibi inopia ingerere eam compellatur, ceu quidam iam ausus est, podus cum algore ventriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euertet, & ad vomitum concitabit, quo solo ab vtgentibus symptomatibus poterit vindicari. Hanc igitur, aliaq; ex fugacibus complura, aut mox quam elixata est, aut fructum in sartagine, aut assam omnes homines esse consueuerunt. Cucurbita verò, de qua dicere cœpimus, elixa nullam euidenciam saporis qualitatem habet: nisi quis eum quoq; saporem nominare velit, qui neq; acris neq; salus est, nec acerbus, nec amarus, nec id genus quippiam manifeste representat, veluti nec ipsa aqua. At huiusmodi cuncta communi nomine omnes *πρωια*, id est, qualitatis expertia vocitare solent (Latini fatua aut insipida dicunt) quoquo modo nos quoq; clarior doctrina gratia appellabimus. Talis ergo cum sit cucurbita, non immeritò varios apparandi modos admittit, vt pote qua in medio omnis excessus constituta est, ob idq; ad quemuis excessum ex aquo duci potest. Proinde cucurbita, quantum in se est, humidum frigidumq; corpori alimentum prabet, omnium humidorum ciborum ratione: qui scilicet citra adstrictionem tales sunt. Nec sanè infeliciter concoquitur, modo non anteuertat corruptio. Nam ea illi solet nonnunquam accidere, cum aut vitiose fuerit preparata, aut prauos humores in ventriculo acruatos offenderit. Est aliquando ob nimiam in eo moram: quod alijs quoq; omnibus fugacibus, qua humido sunt temperamento, euenire solet. Nam in ventriculo corruptuntur & ipsi, ni celeri descensu id mali effugiant. Quemadmodum ergo cucurbita pura, & vt in se ipsa est, succum in totum corpus alendi gratia digestum, expertem qualitatis gustabilis obtinet: ita cum alicui vehementem habenti facultatem fuerit iuncta, facile illi adsimilatur: vt si cum sinapi sumatur, succus ex vtroq; in membra diffusus, acris efficitur cum manifesta caliditate. Eadem ratione si cum salso quopiam esitetur, ceu nonnulli in patinis cum salsamento instruant, salsum in corpore humorem generabit. Est porro sic apparata cibus longè suauissimus, si salsamentum ex ponticis illi suera, qua *μύλλα* appellantur. Quod si cum malis cotoneis elixa, decenterq; condita fuerit, succum austerum in distributione habebit propollentem. Assa autem, vel in sartagine fixa, vt propria permultum humiditatis deponit, ita reliqua cum pars nullam sibi valentem vim adsciscit, vt nec cum in iure simplici paratur. Caterum ob aqueam qualitatem sibi innatam, non immeritò origano iungi gaudet. Quæcunq; enim talia sunt, acris aut acidis, austerisve aut salis permisceri saporibus postulant, si quis & cum voluptate ea sumere, & nauseam cupiat euitare. Cucurbita Indica cum subdulci sint sapore, crediderim primo excessu refrigerare, & humectare secundo. Cucurbita Latina dicta, Græcis *κολόκυθα* id est *κόλυμα*, appellatur: Arabibus Haraha, Hara seu Carha: Italis Zucca: Germanis Kürbs: Hispanis Calabazza: Gallis Courge, Courle siue Cause. Cucurbita Indica, Italis Zucche Indiane, oltramarine.

Cucurbita à concuruatu dicta, quod facillè, si quid obstitit, quò minus extendatur, incuruescat. I. Cucurbita oblonga flore albo folio molli. C.B. Cucurbita fructu longo, Trag. Cucurbita oblonga, Fuch. Cucurbita anguina & oblonga, Dod. gal. Cucurbita longo fructu, Cord. in Diosc. Cucurbita camera-ria, Cord. in hist. Cucurbita siue Zuccha omnium maxima anguina, Lob. Cucurbita longior, Dod. fol. Cucurbita longa, Tab. Cast. Cam. Cucurbita cameraria longa Lugd. Cucurbita fatiua longa, Cæf. II. Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli C.B. Cucurbita, Brunf. Cucurbita minor, Fuch. Dod. gal. Cucurbita plebeia, Cord. hist. Cucurbita lagenaria, Lob. Cast. Cucurbita lagenaria minor, Tab. Cucurbita prior, Dod. fol. Cucurbita cameraria minor, Lugd. III. Cucurbita maior sessilis flore albo C.B. Cucurbita cuius fructus in orbem collectus intumescit, Trag. Cucurbita maior, Fuch. Cucurbita cameraria maior, Dod. Gal. Lugd. Cucurbita lato & sessili fructu, Cord. in Diosc. Cucurbita latior, Dod. fol. Zuccha maior rotunda, Cord. hist. Cucurbita rotunda, Cast. Cæfalp. Cucurbita lagenaria maior, Taber. Matthiolus vna figura omnes expressit, Cucurbitæ titulo, in longam, rotundam & sessilem distinguens, quem secutus est Lacuna & Cast. IV. Cucurbita maior rotunda, flore luteo, folioq; aspero. C.B. Cucurbita Indica, Mart. Cast. Tab. Cucurbita, Zucca marina Italis, Gef. hor. Cucurbita rotunda, Cæfal. Cucurbita Indica rotunda, Lug. Cucumis seu Zucco marinus, Trag. Cucumer marinus, Fuch. Lon. Pepones rotundi, Dod. gal. Pepo rotundus minor, Dod. fol. Varia huius sunt genera, quæ magnitudine variant, earum namq; quoddam genus, quod vix vtriusq; vlnis complecti potest: colore etiam differunt, sunt croceo, luteo, citrino.

Σίκυς ἡμερος.

CUCUMER SATIVS.

CAP. CXXVIII.

SATIUS Cucumis aluo & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, qui corruptionem non sentit vesicæ prodest: olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè vrinam mouet: cum lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibus vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra aduersionem infantium, quam syriam vocant, syncipiti imponuntur: fronti admota oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant & nitorem afferunt. Radix sicca & ex hydromelite pota, drachmæ pondere, vomitionem mouet. Si quicquam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoq; illita cum melle, vlcera concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

I. CVCV.

I. CUCUMERES.

II. CUCUMERES LONGI.



Quamquam Græci (ut Galenus est auctor lib. 2. de alimentorum facultatibus) omnia tam Cucumerum quam Melo-
 Peponum genera Pepona nominant, peculiariter tamen *αίτιος* nomine, quo præsens caput inscribitur à Diosco-
 rido & Galeno 2. libro de alimentorum facultatibus, statim post Pepones & Melopepones, id tantum omnes ferè
 comprehendunt, quod Latinis Cucumis appellatur. Verum non ob id plane decerni potest, an hic reddat Dioscorides
 nostratus Hetrusci Cucumeris vires, qui alijs Italia populis Anguria vulgò nuncupatur, an alterius, qui proprie Insubribus,
 & Veneris Cucumis dicitur, Hetruscus verò Citrus, omnibus notissimus. Planta est sarmentosa, humi repens, folijs vitigi-
 neis, asperis scabrisq; flagellis pariter scabris atq; rigentibus: flores edit melinos, fructu sub ipsis extuberante, qui tandem in
 longum protensus citrei mali modo viridi primum fit colore, & dum maturefcit, flauo cortice verrucis scatente: seritur
 passim ab olitoribus in hortis. Siquidem non ex Dioscoride modo, sed nec ex alijs veteribus hæcenus quæquam reperi, qui
 Cucumis Græcis proprie *αίτιος* appellatus, notis vllis representet. Sed quòd Græci *αίτιος* vocabulo nostratam Citralum &
 Insubrium Cucumerem significent, facillè conijci potest ex ipso Dioscoride: quippe qui lib. 4. Cucumerem syluestrem asse-
 rat fructu solo, quem oblongis glandibus non dissimilem parit, a satiao dissidere, cum alijs folijs, floribus, ac sarmentis sati-
 uam profus referat. Verum cum huic ille per omnia respondeat, quem nos Citralum, alijs verò Cucumerem dicunt, non
 possum non liberè pronunciarè, Dioscoridem hic Citrali nobis vocati, non autè Anguria vires descripsisse. Quamobrem hæc
 in historia apertè hallucinari Brasauolū putamus, quòd procul dubio existimauerit, veteres Græcos, præsertimq; Dioscori-
 dem, *αίτιος* appellatione Anguriam, vel Hetruscorum Cucumim representasse. Quandoquidem assignatis iam rationibus
 accedit & Plinij auctoritas, qui lib. 19. cap. 5. Cucumeres, ait, in Italia virides, & quàm minimi: in prouincijs quàm ma-
 ximi, & citrini aut nigri. Placent copiosissimi Aphrica, grandissimi Mæsia. Viuunt hausti in stomacho in posterum diem.
 Quod proprium est citruli nobis vocati, non autè anguria vulgò Insubribus appellata. Anguria enim in Italia in magnam
 extuberant molem: & cum aquea sint substantia ac prædulces, qua maturitatem sensere, ingesta facillè à ventriculo labun-
 tur, quod nostratibus citrulus, & Insubrium cucumeribus non euenit. Nam cum glutinoso, frigideq; succo referti sint, ob
 idq; concocta perquam contumaces habeantur, non nisi post longum tempus à ventriculo descendunt. Ad hæc (ut citato loco
 subdit Plinius) Cucumeres, in fistula flore demisso, mira longitudine crescunt. Atq; idem in tantum odere oleum, ut si è vi-
 te pendentibus vas olei subijciatur, adeò refugiunt, ut in banum curuentur: quod angurijs, qua sphericam formam refe-
 runt, minimè euenire posse comperio. Videmus præterea Citrulos nostrates adhuc florentes in fistulas coniectos mira longi-
 tudine creuisse. E quorum semine qui postmodum orti sunt, eandem retinuerunt formam, adeò ut in vite pendentibus angu-
 rim modo contorti viderentur. Non enim differunt tota sua facie altero nisi in fructu, qui longus est, & serpentis modo car-
 um, strijs per longitudinem protensis. Seruntur in hortis & præsertim in Apulia. Seruantur Cucumeres, (ut Plinius auctor
 est) vsq; ad alios penè prouentus: & id quidem non solum muria fit, sed & scrobe opaco in loco arena substrato, sænoq; sicco
 operto, ac deinde terra obrutos: ita. n. virides seruari tradunt. Hyemè odere omnes, & frigora: die sexto vel septimo à satio-
 ne prodeunt. Tenerrimi autè ac iucundissimi fiunt, si semen ante saturationē lacte fuerit maceratum. Qui verò præcoces habere
 volunt, confecta bruma, stercoreatam terrā in cophinis habeant, ibiq; semen condant, & modicū præbeant humorem: deinde
 cum enata semina fuerint, tepidis dieb. & insolatis, iuxta adificia sub dio ponāt, & omni à vento protegāt. Caterū frigorib.
 ac tempestatib. sub tectū referant, idq; tādū faciāt, quousq; æquinoctiū vernū conficiatur, & nulla amplius reliqua sit pru-
 ina suspicio. Postea totos cophinos dimittant in terrā, sic. n. præcoces fructus habebūt. Recens cucumis in tenues particulas se-
 dit & impositus, quascunq; inflammationes sedat, quinetiā in ardentib. febrib. ariditatē linguæ aufert, si frequenter in ore reti-
 neat. Quid aut veterib. fuerint, quidve nobis sint Pepones ac Melopepones, nō equidè facillè ausim decernere: etsi nō desint,
 qui di-

Cucumeris
 consideratio.

Ant de Citru-
 lo, an de An-
 guria, intelli-
 gen. Diose.

Brasauolus
 reprehendi-
 tur.
 Plinius de
 Cucume,

Cucumeris
 vires,

Peponum & Melopeponum confid.


Melopepones Galeni notam Melones.

Fuchsierror, Cucumer. Angurias creditis.

Peponum historia.

qui dicant Melopepones Galeno lib. 2. de alimentorum facultatibus, communes nostros Melones esse: Pepones vero, quoniam eo genere Veneti corrupta inde voce vulgo Pipone vocant. Verum enimvero cum asserat Galenus, quod pars intima carnis semen inclusum tangens, cum in Peponibus edendo non sit, in Melopeponibus passim ab hominibus manditur, mihi enim adeo dubium reddit, ut aliquid in hac re certi statuere nequeam, neque inuenire possim, quid Pepones & Melopepones Galeno extiterint. Quippe quoniam utriusque generis, tum scilicet Peponum, tum Melopeponum carnea pars semen continens estur, & non estur, prout fructus ipsius, minusve maturitatis fuerint adepti: nam utriusque, cum ultimam senserint maturitatem, id suprema carnis vna cum seminibus in medium fructus concidit, quod cum euavidum, & insuauiter periturum, nusquam comeditur. Quod tamen utriusque minus maturis, non euenit: eaque, propter extractum prius seminibus estur tota eorum caro. Hac igitur tametsi me (ut dixi) dubium reddant, inclinatur tamen animus ad credendum, per Melopepones Galenum nostros Melones intellexisse, si modo ipse eorum unquam habuit notitiam. Dixi sententiam meam quam ijs ruminandum relinquo, qui Vipereo ore non sunt. Siquidem nihil tam dulce, tam suauiter, tam bonum, tamque proficuum reperitur, quod venenatis labijs non amarescat. Caterum quid per Pepones intellexerit, nihil prorsus (ut ingenere fatear) quod proferam, hactenus habeo. Verum tamen cum illis mihi non facile conuenit, qui Venetas Piponas dictas Galeno Pepones esse existimant. Minus adhuc illis assentior, qui Pepones Angurias esse dicunt. Namque Serapio cum primum ex Galeni auctoritate de Peponibus & Melopeponibus differret, dein peculiare de Anguria caput fecit, quam Arabica lingua Dullaha nuncupauit. In cuius reddendis viribus nullam affert Græcorum testimonium, sed tantum sua gentu auctoritatibus innititur. Hinc facile adducor, ut credam Angurias veteribus Græcis penitus ignotas fuisse. Eas equidem nunquam vidisse, vel non cognouisse demonstrat Fuchsius medicus clarissimus, quippe qui suis de stirpium historia commentarijs non sine magno errore putat cucumeres, quos Citrulos Hetrusci nominant, angurias esse. Nam etsi Hetruria angurias vocet cucumeres, non tamen contra cucumeres vulgares vocat angurias, ut perperam, meo quidem iudicio, Fuchsius & intellexisse, & scriptis mandasse videtur. Sed ad nostros PEPONES iam venio, qui tametsi notiores sint, quam à me explicari possunt, non ob id tamen eorum historiam mihi haud describendam putavi. Serpit itaque melopeponum, aut peponum planta (sicut nobis eos quouis modo appellare) longis ac viticulosis sarmentis cucumeris modo, folio vitigineo, minoribus tamen incisuris, scabris hirsutisque, floribus luteis, fructu grandi, humani capiti instar, & saepe longè maiori, cortice cartilagineo. Non omnibus idem est color: Namque, alij herbaceo sunt colore, alij pallido, nonnulli flauo, quidam albo, plerique cinereo. Sunt qui tota cute textura quadam reticulari, magno natura artificio proueniant. Striati ferè sunt omnes, prominentibus circumque secundum longitudinem toris, in vertice & umbilico coeuntibus. Interna pulpa gustui suavis, versicolor tamen: in altero enim genere rubet, in altero albicat, aut ex albo rufescit. Qui præstant (plurimi sunt, qui nulla commendantur gratia) præter odoris iucunditatem, dulces & suaues sunt: semen in vitro gerunt copiosum, oblongum, albo contextum putamine, in quo dulcis concluditur nucleus. Gaudent leto & aprico solo, ac etiam libertate, qua possint vltro vagari. Seruntur in hortu &

III. MELOPEPONES.



agris. Rigari volunt, vbi pluuia defecerint: vbi vero fructus cōcoqui cœperunt, pluuia ijs aduersissima sunt, ijs enim tristatur, & ignavi, inspidi & ingrati redduntur. Atqui mirum sanè est, ut inter complures, qui ex eadem proueniunt planta, pauci præstant, ceteris insuauius redditus. Bonitatis indicium præbent, qui odoratioribus habentur, quibusque, crispior fuerit pediculus, quin etiam ponderositas præstantia argumentum est. Sunt qui rosarum, qui moschi odorem spirant, olitorum mangonio, seminibus ea parte, qua germinant, parumper apertis, & in rosacea stillatitia aqua maceratis, qua moschum exceperit. Est & genus, quod tota ferè hyeme asseruatur, postquam decerptum est, flauo colore, hos Hetrusci Melle-sacharove condiunt, citriorum pomorum more. Vertere quoque mulieres melopepones in suum usum, forma concinnanda gratia. is itaque in particulas sectis, Ari & bryonia radices addunt, quinetiam limonium succum, coniunguntque in alembicum: deinde capilli lactis id addunt, quod hæc omnia superet, & in aqua feruentis balnei distillant, & aqua, que fluxerit, facin concinnant. Semen in medicamentis suum quoque habet usum. Cremor enim ipsius lacteus febrientibus vtiliter propinatur ex hordeacea ptisana: siquidem non solum refrigerat, sitimque extinguit, sed oppilationes tum iacinosas, tum vascularum expedit & vrinam prouocat. Datur item tusientibus, tabidis & marasmo affectis, ac etiam in vrina ardoribus, additis vesicariæ pastillis, aut dulcis radices succo, mumia momento & gummi Arabici, & tragacantha nonnihil: valentius tamen proficit, si accedat seminum papaueris cremor, & baccarum Halicacabi, & malua decoctum. Sed de peponibus & melopeponibus nostris hactenus. Reliquum nunc est, ut de Anguria quam Dullaha appellat Serapio, quoque differamus. Est itaque ANGVRIA planta, folia ferens colocynthidis medicamentosa, maiora tamen, aspera & per ambitum diuisa: caulem sarmentosum, humi repentem, ut cucumis & pepo. Florem edit aureum, fructum magnitudine mirum in modum extruberantem, ponderosum, subrotundumque: Cortice laui, herbaceo colore, maculoso tamen & ea parte, qua humi iacet, allicante, carne intus humidissima, aquosa, in quibusdam prædulci, in nonnullis autem subacida, inspidave sitimque extinguende perquam idonea. Semen concludit latum, peponum duplo maius, cucurbita paulo minus, cortice solidiori & nucleo grandiore. Est quoque seminis in colore differentia, quod vni nigrum, alteri rubrum innascatur. Seritur in hortis & viridarijs ac etiam in agris. Decerptur fructus, & diu quoque asseruatur in horreis. Tritici enim aceruis insidens, non solum à putredine tuetur, sed coquitur, si immaturus decerpatur. Frigidus est, & humidus, ordine secundo, siti arcenda aptissimus. Quo fit, ut Itali deute

Fucus ex peponibus ad decorandas feminas. Peponum vires.

Anguriae mentio & hist.

IV. ANGVRIAE.



dente Syrio eius pulpa interna se refocillent. Confert adu-
rentibus febribus, & linguae ariditati quàm maximè. Acu-
tos humores vincit, & ijs praesertim auxiliatur febrientibus,
qui humorum malignitate magis, quàm abundantia scitent.
Siquidem Anguria (vt Serapioni placet) aluum in principio
fortiter non citat: ideoq; illis conuenit, qui tenuis & imbecil-
lis sunt temperamenti, macri & exangues: etenim ijs alte-
rantibus magis opus est, quàm ducentibus humores, verum
quamuis id effici possit acidis medicamentis, insipida tamen,
qua nonnullam dulcedinem habent (vt Anguria) hisce in ca-
sibus longè magis conueniunt. Impossibile enim est, quin aci-
da, & qua cum ipso aceto parantur medicamenta, incidant
& attenuet. Id quod imbecillia corpora, macra & exanguia,
haud quaquam sustinere queunt, quod eiusmodi acida potio-
nes maciem augeant, & ventriculum ledant. Atqui etiam
vbi quispiam acida adstringentia propinauerit, impossibile
quidem videtur, vt non obstructions augeantur, si ea in ioci-
nore & eius meatibus extiterint. Etenim acida & adstrin-
gentia medicamenta exiccant, & nihil prorsus humectant.
Porro insipida & qua crassa sunt substantia, quibus aliqua
(vt in Anguria) dulcedo insit, suo quidem temperamento
humectant ac simul refrigerant, generantq; in ipso iocinore
sanguinem aquosum, qui flaua bilis feruorem & malitiam
coercet, tam in iocinore, quàm in venis. In calidis regionibus
Anguria suauior prouenit, ideoq; circa Romam, in Campa-
nia, Apulia, Calabria & Sicilia, praestantiores habentur, &
mole vastiores. Cucumeris vires memoria prodidit Galenus
lib. 8. simplicium medicamentorum, his verbis: Cucumis escu-
lentus maturus quidem tenuioris essentia est: qui verò im-
maturus est, crassioris. Sed & abstergendi & incidendi fa-
cultate participant: quare & vrinam mouent, & corpus splen-

Cucumeris vires ex Gal.

didum reddunt: ac magis quoq; si quis semine arefacto, contusog, atq; cribrato, vice pulueris abstergory vtatur. Superat in
humida, frigidag, temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen,
aut radicem arefactat, haud etiam humida sucrit natura, sed iam desiccantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut etiam
in secundo incipiente. Est & in istis maior abstergendi facultas, quàm in fructus ipsius carne. Et lib. 2. de alimentorum fa-
cultatibus idem de Cucumeribus ita scribit: Vrinam quidem & ipsi, quemadmodum pepones, cient, sed minus quàm illi,
quod ipsorum substantia minus est humida: ideoq; non facile, vt illi, in ventriculo corrumpuntur. Ergo quibus cucumeres
bene concoquere datum est, dum in hoc fusi, intrepide, affatimq; ijs se expleant, longi temporis tractu, gelidum & vtcunq; cras-
sum humorem in venis aceruati contingit, qui per eam, qua vena funguntur, concoctionem, haud facile in probum san-
guinem potest conuerti. Proinde omnibus prauis succi edulys, quatumuis probè à nonnullis conficiantur, abstinere in totum
consuluerim. Clam enim sensimq; post longum tempus prauus in venis succus ex ipsis suggeritur atq; accumulatur: qui vel
leniula putredinis arrepta occasione, febres seuisimas, & mirè contumaces excitabit. Et paulò antea de Peponibus scri-
bens: Vniuersa (inquit) peponum natura frigidior cum larga humiditate existit: habent & quandam abstergendi vim: i-
deoq; vrinam cient, & deorsum expeditius, quàm cucurbita & melopepones rapiuntur. Quod porro abstergant, discere li-
cet sordidam cutem defricando. Quamobrem etiam maculas calore solis factas, & lentes faciem occupantes, atq; in super-
ficie albos extergere possunt. Sed semen, quod in eorum veluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeò vt renibus etiam
calculo infestatis sit accommodatum. Gignit pepo in corpore vitiosum humorem, potissimum quando non probè concoctus
fuerit. Tum verò morbum etiam, qui cholera dicitur, inducere consuevit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit,
vomitioni quoq; idoneus est: largiusq; ingestus, nisi quis aliquid eorum, qua probi sunt succi, supermandat, omnino vom-
itum concitabit. Et de Melopeponibus agens: Melopepones (ait) & minus humidi quàm pepones sunt, nec adeò prauis succi: Melopepo-
num item vrinam prouocant, tardiusq; deorsum descendunt. Ad vomitum verò excitandum, non eandem vim peponi-
um obtinent, sicut nec celeriter adeo vt illi in ventriculo corrumpuntur, cum prauus humor in eo collectus fuerit, aut alia
quaepiam corruptionis causa ipsum prehenderit. Caterum tamen si in iuuando stomacho autumnalibus fructibus longè sunt
inferiores, haudquaquam tamen ei, vt pepones, officiant. Hac ille. Caterum praetermitendum mihi non duxi, quin legen-
tes admoeam, esse impostorem, qui me redarguat, quòd scripserim, hoc nomen σικυος cucumerem tantum designare, quòd
reuera id generale sit nomen omnium horariorum fructuum, videlicet peponum, melonum, cucumerum, anguriarum, &
ceterorum generis eiusdem. Vtq; hac comprobare videatur, Galenum adducit libro secundo σικυος τριφυλον, quippe
qui scribat, negare medicos nonnullos, siuctum, qui pepon dicitur, simpliciter appellandum σικυος, sed cum additione σ-
ικυος τριφυλου, id est peponem cucumeralem, ac si σικυος ex genere τῶν σικυωσων esset. Id quod minimè Galenus affirmavit, sed
potius reprobauit his verbis: Medici quidam non simpliciter nominare voluerunt peponas, sed totum id σικυος τριφυλον no-
minare oportere contenderunt. Nos verò in presenti sermone de eiusmodi non laboramus, vt qua ad medicinam nihil con-
ferant: multò enim satius est, rem dilucide interpretari, quàm huiusmodi anxia disquisitione doctrinam obscurare. Tum
porro clarissime explicabimus, cum vocabula vulgò maximè vsitata eligentes, ipsorum significationem seruauerimus: hac
ille. Quibus palam est, nebulonis ipsius imposturam, sibi longè magis aduersari quàm mihi: nunquam enim negavi, no-
men σικυος ad illa omnia generaliter referri posse, sed dixi peculiariter Dioscoridi vulgarem tantum cucumerem designa-
re, quemadmodum quoq; Galeno, apud quem nusquam me legisse memini, nomen σικυος aliud designare quàm cucume-
rem. Ideoq; de cucumeris alimento scripturus eodem libro, postquam de Peponibus & Melopeponibus egit, σικυος id est
de cucumere, quos alio nomine appellare non potuit, peculiare caput instituit. Id quod etiam fecit lib. 8. de simp. medic. fa-
cultatibus vbi de domestico, & syluestri cucumere egit. Σικυος ἡμερος Graca voce, Cucumer satius Latina vocatur. Arabi-

Peponum vires ex Gal.

Melopepo- num facultas ex Galeno.

Nomina. L I ca Cha-

ca Caathe seu Chethete: Italica Cocomero, Hetruscis Cedruolo: Germanica Cucumern: Hispanica, Cogombro: Gallica Cocombre. Cucumis longus, Italis Cocomero serpentino: Hetruscis, Cedruolo longo. At $\omega\epsilon\pi\tau\omega\upsilon$ Græcis, Pepon item Latini appellatur: Mauritanis Batheca seu Bathiecha: Italis Mellone, Hetruscis, Pepone: Germanis Pseben vnd Dier: Hispanis Melon: Gallis Melons. Anguria ita & Latine nominatur: Arabicè Dullaha: Italicè Anguria: Hetruscis Cocomero: Germanicè Gurthen: Hispanice Cogombro: Gallicè Cocombres.

Cucumis, Varroni à curuore, quasi Curuimer dicitur: cuius genera duo notauit Theophrastus. 1. hist. 18. satium & syluestre: huius verò tria, Laconicum, Scytalicum & Bœoticum: quem sequitur Plinius lib. 19. cap. 5. I. Cucumis satiuus vulgaris. C.B. Fuch. Cucumis satiuus, Brunf. Matth. in icon. Dod. gal. (cui & Melopepon Galeni) Lon. Lugd. Cast. Cucumis, Trag. Tab. Cucumis vulgaris, Dod. fol. Cucumeres, Matth. Lacu. Cucumer satiuus, Cord. in Diosc. Cucumeres satiuus & esculenti, Lob. Citreolus vulgaris, Cæsalp. Fructus maturus habetur subluteus, totus etiam albus: totus viridis. Variat magnitudine quoque & forma. II. Cucumis flexuosus, C.B. Cucumeres longi, Matth. Cucumis anguinus, Lacu. Lugd. & Taber. Cucumis anguinus flexuosus, Lob. Cucumis longus, Matth. 4. Lug. qui duas habet figuras. Cucumis oblongus, Dod. fol. Cucumis satiuus secundus, Cast. Citreolus alter, Cæsalp. Huius species habetur fructu cubitali. III. Melo vulgaris C.B. Melo. Brunf. Trag. Matth. ital. & edit. 2. Tab. Dodo. fol. cui & Melopepo vulgi. Pe po, Matth. in icon. Casto. Lugd. Pepones, Fuch. Melopepones, Matth. Ges. hort. Lac. Lon. Lugd. Melocucumis veterum, Cord. hist. Cucumis Galeni & antiquorum, Dod. gal. Melo vulgi Lob. Cæsalp. Magna est fructus varietas, vt qui oblongus, modice rotundus vel depressus: quandoque maior, quandoque minor: cortex asper, rugosus, tuberosus, aliis luteus: viridis, cinereus, pallidus, varius, pulpa aliis ruffa, candida virensque, quibusdam suauior, quibusdam moschi odore: sunt æstiuus, hyberni: Americi Italis Zatte dicti: Neapolitani gymnospermi dicti: sunt denique & pilosi. Sed genera hæc Cucumerum, Melonum, Melopeponum, Peponum & Anguriarum, ordine in Phytopinace recentuimus, quæ omnia hic non repetimus, cum potissimum earum plantarum mentionem faciamus, quæ in Italia nunc obseruari possunt, de Germanicis namque Gallicisque plantis plurimis, hæcenus non descriptis, vt & de aliis, ex professo in Historia acturi. IV. Anguria voce primus Aëtius vsus videtur, cum aliàs Citrullus à Citreo colore dicatur: & ad Peponem Dioscoridis, Galeni & Plinii referri possit. Anguria Citrullus dicta C.B. Citrullus, Trago Ges. hor. Lon. Taber. Anguria, Matth. Lac. Cast. Dod. fol. Lugd. Cam. Cucumis Citrullus. Fuch. Ges. hor. Dod. gal. & fol. Cucumer vulgo, Cæsalp. Citrullus officinarum, Lob. Variat fructus, colore corticis, pulpæ & seminis: rarius sine semine reperitur.

Θείαξ.

LACTUCA

CAP. CXXIX.

Lactucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refragatur. Ipsæ verò frequentiores in cibo, claritati oculorum officiant: inflammationibus & ignibus sacris opitulantur. Muria condiuntur. Cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo, aut lacti syluestris lactucæ similem.

Θείαξ ἀγρία.

LACTUCA SYLVESTRIS.

CAP. CXXX.

a Catac.
κατὰ πᾶσαν
scilicet ὅ-
ντων. i. se-
cundum om-
nem facultatem. Meū
& Drag.
κατὰ πᾶσαν.
i. secundum
omnem.

Syluestris lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis & candidiora folia, graciliora & asperiora. Amaro gustu est & viribus a aliquantum papaueri similis: vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obulos: argema, caliginemque repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quàm satiuæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerem arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, vt in aliis liquaminibus moris est, insolatum.

Lactucæ consideratio,

Laticaulis & rotundicaulis. Lactucæ generæ.

Lactuca Romana.


Lactuca satiuæ herbarum ferè omnium vulgò notissima est. Cuius etsi plura ac diuersa in Italia reperiantur genera, vt in hortis & olitorijs foris æstate tota conspici potest, non ob id tamen existimandum est, quod ea viribus & facultatibus inter se differant: quanquam non negauerim ego, alteram alteri in cibis præstare. Eam siquidem, qua conglobata in orbem folijs crispis, teneraq; inuenitur, quis neget maiorem cum palato inire gratiam, quam qua dura, parula ac lactescens habetur? Est etiam quam à lato caule laticaulem, & à rotundo rotundicaulem, & quam sessilem, quod humi procumbat, appellauerint Græci. Nos verò in capitata, rotundam & crispam diuidimus. Differunt etiam foliorum colore, nam alia saturate viridis est, alia subviridis, alia subcandicans, & qua cruentis maculis sit respersa, quam è Cypro allatam ferunt. Crispa folijs exit crispis, Intybo maiori similibus & per ambitum laciniatis. Rotunda in orbem spargitur, rotundioribus folijs, tenerioribusq; vnà sese stipantibus. At capitata seu sessilis, folijs parum à rotunda differt, sed in globum folia circumuoluuntur, & extuberant brassica capitata modo. Est & quartum quoddam genus, cui in cibis prima laus, Romanum vulgò vocatum, folijs maioribus, pinguioribusq; id in ouatum caput extuberat, vbi in cacumine ligetur, & cateris tenerius albiusq; euadit, & præsertim si terra circumducatur ad cacumen vsq;. Tenerescit enim hoc mangonio mirum in modum, & candidius & palato gratius redditur. Caulem edunt omnes albicantem, lacte pregnantem, & in summo brachiatum, folijs plenum, in acutum tendentibus, qua senescentes amarorem contrahunt. Flores in ramusculorum cacuminibus prodeunt lutei, qui tractu temporis papposi effecti, in auram resoluuntur: semen omnibus oblongum in acutum desinens, colore non solum albo, sed etiam nigro. Nascitur quarto aut quinto die à satione, & adulta transpo-

I. LACTUCA CRISPA.

Lactuca crispa

* II. LACTUCA CRISPA non capitata. *

L. sativa



III. LACTUCA FLO- rescens.

L. sativa

* IV. LACTUCA FO- liis Endiuia. *

L. sativa



transponitur. Seritur passim ab olitoribus & ab alijs quibuscunq; in hortis. Lactuca florescens folia, qua ad terram sunt, exolet. paucioraq; spectantur, caulis illi brachiatus, parvis foliolis, ipsisq; acuminatis refertus: floribus melinis non magnis qui in pappos euanescent. Scatent ea horti ferè vniuersi in fine Aestatis. Olim lactuca vltimis apponebatur mensis, ideoq; inquit Marialis ille Epigrammaticus:

Claudere quæ cenæ lactuca solebat anorum,
Dic mihi cur nostras inchoet illa dapes?

Lactucæ vi-
res Matth.

Lactuca succus ex rosaceo fronti & temporibus illitus, non solum febricitantibus somnum conciliat, verum etiam capiti do-
lorem mulcet. Gargarizatur idem vtiliter ex punici mali succo, ad columella inflammationem. Testiculus illitus noctur-
nas pollutiones compefcit, & seminis profluum, & præsertim addito caphura mometo, sed Venerem restinguit. Idem præ-
stat epotum semen, è papauerini seminis cremore haustum, nec minus vrina ardoribus opitulatur. Cauendum autem lactu-
carum vsus suspiriosis, sanguinem excreantibus, pituitosisq; sed is maxime, qui procreandis liberis dant operam. Lactuca

LACTUCA SYLVESTRIS.

Lactuca syl-
uestris.



Lactucæ vires
ex Galeno.

florescens, amaro percipitur gustu: quam ob causam abstergen-
di facultate non vacat, & præsertim lacteus eius succus. Lactem
caulium liquor oculorum argemæ & maculas delet, & vitia
cutis emendat. Sylvestris in campestribus & incultis locis na-
scens, facile dignoscitur, quod caule, floribus, semine & folio sa-
tiuam iam flores, & semina proferentem emulcat: verum ca-
stu amara est, & lacte copiosiore referta. Folio exit ol longo, la-
ceracj maioris modo per ambitum laciniato, candidiore, grati-
liore, asperioreq; quam domestica, quin etiam aculeato. Post-
quam caulem ediderit, amaro gustu. Caulem mittit florescentem
domestica quadantenus similem, & flores pariter similes. Ab-
stergit eius lacteus succus, & somnum conciliat, soporiferu: a-
iam est, prouocat & deijcit. Non desunt Pharmacopæi, qui
sylvestri lactuca aquas per alembicum parant, quam deinceps
Intubi aqua vendunt, decepti superiorum myropolatum usita-
tia. Meminit huius Theophrastus libr. 7. cap. 6. de plant. hyst. sic
inquiens: Sylvestris lactuca folio breuior quam satiuæ est, rãq;
consummatum aculeatur, & caule simili modo breuiore per-
citur, succum acrem ac medicatum habet. Nascur in aruis. Lac-
eius extrahunt per messem tritici, & purgare aquam inter-
tem dicunt, & caliginem arcere ab oculis, & argemam auferre.
cum lacte mulieris. Satiua (vt memoria scriptum reliquit Ga-
lenus lib. 6. simplicium medicamentorum) humidum est, frigi-
dumq; olus, non tamen extremè (siquidem edendo non foret
verum maximè secundum aqua, vt sic dicam fontana frigida-
tem: proinde ad calidas phlegmonas accommodum est, & ad
parua & leuia erysipelata: non tamen maioribus satis acci-
donea est. Est etiam edulium sitim arcens. At semen potu gen-
tura profluum cohibet: quamobrem etiam q; qui libidinis
somnia vexantur, datur. Sic & agrestis lactucæ semen. Cum
quoq; colligitur succus, argemæ & caliginem expurgans ad acu-
stiones etiam cum lacte mulierum inungitur. Et lib. 2. de alimentorum facult: Pleriq; medicorum (inquit) reliquis omni-
bus hoc olus, ceu ficus autumnalibus succibus, prætulerunt. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod, si
rò nonnulli vitio verterunt, id in præcipuam ei laudem cedit: & si ita se re vera haberet, non modo nulli olerum, sed ne-
ptimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulys esset secundum, nempe sanguinem aiunt lactucam generare: quidam non
simpliciter sanguinem dicunt, sed multum addunt, multum sanguinem lactucam generare affirmantes. Verum q; tamen
prudentius obijciant, longius tamen alijs à vero absunt: quanquam hoc ipsum, puta multum sanguinem procreare, non est
quod meritò quis damnet. Constat enim huiusmodi edulium laudatissimi succi censendum esse, quod plurimum quidem
sanguinis, aliorum verò succorum nullum producere sit comparatum. Si verò, quia permultum è lactuca sanguinis cogera-
tur, idcirco damnandam eam censeant, facillimè huic malo occurrì potest: quippe cum vescentibus, & liberalius exercen-
& ea parcius vti integrum est. Hac ergo aduersus eos, qui olus hoc non rectè vituperant, dixisse sufficiat. Illud porro non esse
conuenit, omnibus alijs oleribus paucissimum sanguinem, & vitiosum generantibus, ex sola lactuca non multum quidem,
nec vitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Vt plurimum quidè cruda ipsa vescuntur. Aestate autem, cum
in semen iam proruptura est, in aqua dulci pracoquentes, cum oleo, garo & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimen-
tis obsonijsve, præsertim ijs, quæ caseo constant. Pleriq; etiam anteaquam excaulescat, in aqua elixa vtuntur: vti ego iam
facio, ex quo dentes mihi deteriores esse cœperunt. Nam amicus quidam meus cum olere hoc à longo tempore me vt fami-
liari cibo vsurum fuisse sciret, videretq; post mandata me citra magnam molestiam non posse, coctura rationem indicauit. Et
enim in iuuentute, quoniam assiduo os ventriculi bile efferuescebat, astus moderandi gratia lactucis vtebar: cum autem
ad prouectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quam in iuuentute, somnum iam studio & industria accersenti mihi
auxilio fuit. Quippe qui etiamnum iuuenis lucubrandi gratia vigilijs dedita opera me assuescebam, declinante iam æta-
te, ipsa ex se in somni, grauius hoc incommodo molestabar. Aduersus quod vnicum mihi præsentissimum remedium lactu-
ca vespere commanducata semper fuit. Lactuca sic Latinis: Δείδα & Græcis appellatur: Mauritanis Cherbas seu Chas-
talis Lattuca: Germanis Lactuck: Hispanis, Lechuga aut Alfalsa: Gallis Lactue. Lactuca florens, Italis Lactuca feti-
ta. Lactuca sylvestris, Græcis Δείδα & αἴχνη: Italis Lactuca saluatica.

Nomina.

Lactucam (quod copia lactis exuperet & lac augeat) sic dicta, diuidimus in satiuam & sylvestrem. Satiuam
in crispam, rotundam, capitatam, Romanam & Cypriam, quæ foliorum & forma & colore, vt & seminis cra-
didi & nigri variant. I. Lactuca crispa, quæ capitata & non capitata est, illa est Lactuca crispa Matth. Lac.
Lactuca satiuæ maior quæ in caput coit, Trago, Lactuca capitata Lob. ob. Dod. fol. Cast. Tab. Gef. hoc.
Lactuca capitata, Cæsalp. Lactuca sessilis, Lonie. Lactuca satiuæ sessilis, Lob. icon. Lactuca 3. & lacu-
ca Plinii, Dodo. gal. Lactuca rotunda, Lugdun. Quæ verò non capitata. II. Dicitur Lactuca crispa
Trag. Dodo. gal. & fol. Lugdun. Cast. Taber. Lactuca satiuæ crispa, Fuch. Lactuca crispa non capi-
tata.

Tab. Lob. icon. Lactuca folio crispo, Cæsalpino. III. Lactuca fatiua, Dod. gal. & fol. Lugd. Cord. in Dio-
scor. Lactuca florens, Matth. Lacu. Lactuca fatiua folio scariolæ, Lob. Lactuca, Ges. hor. Cæsal. Cam.
Taber. IV. Lactuca foliis Endiuia, C. B. Lactuca secunda, Trag. Lactuca quartum genus, Matth. Lactu-
ca Intybacea, Taber. Hæc etiam crispatur. V. Lactuca sylvestris costa spinosa. C. B. Endiuia, Brunf. La-
ctuca sylvestris prior, Trag. Lactuca sylvestris, Matth. Fuchf. Dod. gal. & fol. Lacu. Lon. Cast. Cæf. Thal.
Lactuca agrestis, falsò Endiuia, Italis Serriola, aliis Scariola, Cord. in Diosc. & hist. Endiuia vulgatio-
ricinarum, Lob. ob. Seris domestica, lactucina Dioscoridis, Lob. icon.

† Antiquus
codex. μ-
κρότερον. i.
maior.
a Meū & Dra-
σίαν πικρὰν.
i. radicem a-
maram. Cat.
πίκρον πικρὸν
ζω. i. radi-
cem paruum
amaram.

Trigidior.

GINGIDIVM.

CAP. CXXXI.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria & Cilicia plurimum nascitur. Herbula est sylvestri pastinacæ si-
milis, tenuior & † amarior: a radice parua, candicante, subamara. Olus hoc crudum, coctum, con-
ditumve estur, magna stomachi vtilitate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ prodest.

Gingidii
consideratio.



Non potui vnquam eorum subscribere opinionibus, qui plantam Cerofolium vulgò vocatam, Gingidium esse censent,
vt in alijs commentarijs nostris antea editis differuimus. * Huiusce sententia esse comperiuntur Ruellius & Fuchsius,
viri clarissimi (licet ille non plane ad stipuletur) nec non recentiorum alij, qui stirpium cognitionem profitentur, in hoc con-
sentiant, quod Gingidium ea sit herba, quam nos vulgò Cerofolio vocamus, illi verò Chærefolium. Veruntamen cum hæc
radice nitatur, qua nihil amara sentitur, sed potius acris, & odorata, quemadmodum & folia, idcirco eorum opinionem
non equidem (vt dicam quod sentio) probandam putauerim. Quinimo crediderim, vel Gingidium hæcenus in Italia non
esse repertum, vel inibi non facile oriri: præsertim cum Dioscorides & Plinius asserere videantur, peculiare olus esse
Gingidium tam Syria quàm Cilicia hortis. * Quare & Fuchsi & Ruellij sententiam improbauimus. Nunc autem cer-
tè primum animaduerto, me hac in re haud esse hallucinatum, habita & inspecta legitimi Gingidij planta, quam è Syria
allatam mihi misit Iacobus Antonius Cortusus, Patritius Patavinus, vir vt omni humanitate clarus, ita rei plantaria in-
dicator accurrimus, vnà cum altera planta peregrina, quam ipse Visnaga vulgò vocari significauit: cuius hic quoq; ima-
ginem expressimus. Est itaq; GINGIDIVM pastinacæ sylvestri haud absimile, amarius tamen, caule ramofo, rotundo,
sesquipedali, striato, subnigricante, geniculatoq; umbella in cacumine alba, minoribus circumquaq; comantibus folijs: i-
psijs laciniatis: è floribus semen prodit, quo maturecente, umbella in sese contrahuntur, vt in Pastinacæ, & tactu gluti-
nose sentiuntur. Radicem habet candicantem, palmari longitudine, subamaro sapore. Copiosum in Syria prouenit, vnde in
Italiam aduectum semen iam in hortis feritur. Non desunt, qui velint VISNAGAM, vel ipsum legitimum esse Gingi-
mentio.

Gingidii hist.

Visnagæ
mentio.

I. GINGIDIVM.

II. VISNAGA.



60
Darius quædam
et s. 6 476
Stem.

lum, vel eius alterum genus, quòd folia quadantenus magis Pastinacam referre videantur. Sed mihi non arridet eorum
opinio, quòd planta sit pastinacæ longè maior, & grandes robustasque faciat umbellas, adeò vt festuca siue pediculi,
qui illam consciunt, pro dentiscalpijs iam multis in vsum venerint. Ego quidem ipsam potius maiorem pastinacam voca-
rem sylvestrem, siquidem non solum notis omnibus pastinacam refert: nam caulium crassitudine, longitudineq;: quin et- Pastinacæ ma-
ior sylvestris,
iam umbella magnitudine, vulgarem sylvestrem pastinacam superat, sed etiam viribus. Nascitur copiosa in Syria: etiam
nunc feritur in hortis in Italia. Cæterum vt de planta, quam vulgò Cerofolio vocant, aliquid dicimus, cum & ipsa in ci-
borum

III. CEROFOLIUM.



Cherophylli
Pliniani
mentio.

Pæderos
Pausaniz.

Gingidii vi-
tes ex Gal.

Nomina.

borum vsum veniat, & suas quoque habeat in medicina virtutes: huc de ea differemus. Est CEROFOLIUM planta nemus non nota, passim in hortis nascens, fragilis ac tenera, sensu ab vno pediculo emergentibus folijs, vulgaris petroselinis modo, per ambitum incisus: caulibus sesquicubitibus, pinguibus, subrescentibus, inanibus, geniculatis: umbellam in summo caule gerit albis flosculis ornata, e quibus tenuia recta, ornatur cornicula, in racemi fere modum, plura ex vno pediculo procedunt, pilosa, rufescentiaque, & in cacumine aculeata, in quibus semen longiusculum concluditur, pullo colore. Radix illi brevis, in plures diuaticata fibras. Tota planta dulcis est & odorata, acriusculo quodam accedente sapore, vix fere sensibili: quo fit, vt alijs oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Estur cruda in acetarijs, vna cum alijs plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum beta, alijsque oleribus. Qui hanc Myrrhim esse autumant, non diligenter eius notas expenderunt. Cherophylli meminit Plinius lib. 19. cap. 8. sic inquit: Rursus alio comitatu aquinoctio Autumni feruntur coriandrum, anethum, atriplex, malua, lapathum, cerephyllon, quod paderota Græci vocant: & acerrimum sapore, ignei effectus, saluberrimum corpori. Verum Plinij cerephyllon cerofolium nostrum esse non potest, quod hoc nostris hortis familiare, tam vehementi acredine non sit praeditum. Nec crediderim illud idem esse eidem Plinio secundum Acanthi genus, quod is lib. & cap. 22. pariter Paderotam vocari scribit, cum Acanthus omni prorsus acredine vacet: nisi forte sit planta, Pausania libro secundo veteris Græciæ Pæderos appellata his verbis: Nascitur Pæderos herba intra septem aprulo loco, neque alibi vsquam provenit, ne in ipsa quidem Syconia: folia ei minora sagi, ilicis maiora. Forma eadem fere cum quercu folio, altera pars subnigra, alba altera, neque omnino dissimilis color ei, qui in alba populi folijs cernitur. Atqui vix credam hanc plantam, ob magnam eius raritatem, esse Plinij cherophylli, quod passim in hortis habebatur. Meminit Gingidij Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum his verbis: Gingidium sicut gustu amaritudinem & adstrictionem praefert, sic temperamento quoque ipso caliditatem & frigiditatem. Secundum vero vtramque qualitatem desiccatorium est. Sed enim stomacho amicum, utpote non parvam obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuam caliditatem possidet: secundo autem recessu desiccatur. Et lib. 2. de alimentorum facultatibus sic inquit: Plurimum in Syria Gingidium nascitur: esturque similiter ac Scandix apud nos. Stomacho mirè vtile siue crudum, siue elixum libeat sumere: longioris autem decoctionis impatiens est. Nonnulli ipsum cum oleo & garo mandunt: alij vinum etiam, aut acetum adijciunt, ac multo magis ita stomachum iuuat. Cum aceto sumptum fastidiosos ad cibum inuitat. Perspicuum vero est, quod hac herba medicamentum potius est quam alimentum: quippe quæ adstrictionis & amaritudinis non obscura nec exigua particeps est: hac Galenus. Ex quibus facile comprobari potest, Cherofolium non esse Gingidium, quod in ipso ea amaroris & adstrictionis qualitates gustu haud manifestè deprehendantur. Quod Græci γινγιδιον, Latini similiter Gingidium vocant: Itaque Gingidio: At Cerofolium, χαίρεφυλλον: Italis Cerefolio: Germanis Körffel vnd Kerbelkraut: Gallis Cersueil.

Gingidium foliis Cherefolii. C.B. Gingidium, Matth. Cast. Lugd. Gingidium Dioscoridis primum, Taber. II. Gingidiū umbella oblonga. C.B. Visnaga, Matt. Lob. Lug. (qui duas habet icones.) Cast. cui & Pastinaca sylvestris maior. Gingidiū, Visnaga, Dod. gal. Gingidiū Anguil. Gingidium Syriacū olus, Cord. hist. Gingidiū alterum, Dod. fol. Gingidium siue Bisnaga, Clus. hisp. Gingidium tertium, Taber. Cumini fatiui alterum genus, Cæsalp. III. Chærophyllum Columellæ, an Anthriscus Plinii & Enthuscū Theophrasti, C.B. Cherefolium, Brunf. Dod. fol. Chærefolium fatiui, Trag. Cerofolium, Matth. Lugd. Cersueil, Dod. gal. Lob. icon. Cæsalp. Lonic. Tab. Cam. Cerifolium, Ges. hor. Gingidium Ruellio, Fuch. Lacu. Gingidii species, Lob. obs. Oreoselinum, Anguillaræ.

Σκάνδιξ

SCANDIX.

CAP. CXXXII.

Scandix, sylvestre olus est, amarum, subacre: quod crudum coctumve manditur: stomacho & ventri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus & iecinori confert.

Scandicis
consideratio.


Hermolai
laus.

Scandicis
historia.

Quamquam Scandix antiquis rei herbaria scriptoribus stirps fuit notissima, vt qua ab his in frequenti ciborum v-
su haberetur alijs admista oleribus: cum tamen hæcenus eorum repererim neminem, cui fides sit adhibenda, qui Scandicem notis aliquibus, vel lineamentis descripserit, nesciuerim profectò quonam pacto, quave ratione confirmari possit, & in Italia Scandicem nasci, & pariter dignosci à compluribus. Caterum scribit Hermolai v-
doctissimus, & in stirpium historia omnium suæ ætatis facile primus, se vidisse Scandicem in exemplari Græco Dioscoridis appictam folijs fœniculo proximis, floribus luteis siue albis, corniculis caule summo emergentibus. Hanc ipsam nos quoque sapius vidimus Maio & Iunio mensibus inter segetes, præsertimque in agrorum marginibus. Sed quamvis tradiderit Hermolai eam fœniculi folijs assurgere: mihi tamen magis sumariam, & quadantenus anthemidem referre videtur quam fœniculum. Flores gerit hac chærefolio proximis albicantesque, e quibus tandem prodeunt cornicula tenuia longiuscula, recta, acuminata, acubus, quæ in geranio emicant, non dissimilia, quemadmodum & in chærefolio visuntur.

L PECTEN VENERIS.

* IL SCANDIX ITALICA.*



Scandix Italica
S. Italica

hæc huic longè tenuiora, & fragiliora innascantur. Quo fit ut rectè intuentibus specie tantùm, non autem genere differre hæc planta haud dubiè appareant: id quod etiam indicat eorum sapor. Quamobrem qui charesolium scripserunt esse gingidium, id non sine ratione fecerunt. Cum enim certò crederent, hanc de qua in præsentia differimus, plantam legitimam esse Scandicem, facile etiam hinc persuaderi potuerunt, ut assererent charesolium esse gingidium: quoniam Dioscorides consuevit stirpes per cognationes describere. Quapropter in eorum sanè irem sententiam, si hæc, quam Scandicem putant, tantum acrimonia & amaroris gustantibus relinqueret, quantum in Scandice veteres inueniri prodiderunt. Verùm cum eas non obscuras quidem qualitates, quas veteres vera scandici assignant, in hæc, ut ita dicam, noua Scandice nunquam ego repererim, sicuti nec in charesolio, quæ veteribus gingidio tribuuntur, cogor omnino eorum sententiæ refragari, & ab ipsis dissentire. Quapropter nisi regionis, & climatis ratione, & locorum mutatione eueniat, ut hæc stirpes omnem tum acrimoniam, tum amarorem exuerint, non facile quidem adduci potero, ut credam harum alteram gingidium, alteram vero Scandicem esse. Neque ab hac mea me deterret opinione Hermolaus, quòd viderit is Scandicem hanc in Græco Dioscoridi codice appictam: quippe cum inter omnes rei herbariæ scriptores nullus, quod equidem sciam, reperiat, qui per notas aliquas Scandicem descripserit, nesciuerim ego quamam historia, & ratione fretus aliquis vnquam illam pictura expresserit, nisi forte Dioscorides ipse manu propria eo in libro ipsam appinxerit. Plinius Scandicem anthriscò similem reddidit. Sed cum ignotum per ignotius descripserit, nihil nobis luminis huius in tenebris affert. Scandicem commemorat Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum his verbis: Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre, & amarum, aded ut in succando, & excalsaciendo secundi sit ordinis intensi. Vrinam valenter ciet, & viscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans. Hac Galenus. Ex quibus manifestè colligi potest, plantam, quam pro Scandice accepit Hermolaus, quamque pro eadem plerique recentium herbariorum hodie ostendunt, nullo pacto legitimam esse Scandicem. Quandoquidem ea non tantam acrimoniam, nec amaritudinem gustui representat, ut dici possit primum caliditatis & siccitatis gradum excedere. Caterùm si vlla est planta, cui hæc comparari possit, eam adamusim mihi quidem referre videtur, quam Plinius lib. 24. cap. 19. à pectinum similitudine, VENERIS pecten appellat. Siquidem hæc radice nititur candida, cauliculis semipedibus maioribus: folijs sylvestris pastinacæ, vel ferè anthemidis proximis, exilibus: floribus albis, tenuibus, emicantibus summatim ab eodem capitello, compluribus acuminatis rostellis inter se disiunctis, quæ pectines planè referunt, quibus linum mulieres concinnant, siue pectunt. Quæ certè omnia reperiuntur in hac vulgari Scandice. Huius radix cum malua rufa, corpori infixæ extrahit. Eadem cum herba, & floribus in patella calefacta ex albo meraco, & butyro, vna cum bortenfis Petroselinii folijs, pubiq; adhibita, remorantem vrinam, pueris præsertim prouocat. Quæ herba Græcis & Græcè, Nomina Latine Scandix similiter nominatur: Italicè Scandice, Pecten veneris, Italis, Pectine de Venere: Germanis WildWoren.

Plinii Scandix.
Scandicis vires ex Gal.


Pecten Veneris & eius historia.

Nomina

Scandicis licet differentias aliquot notauerimus, tamen hoc loco, ad Matthioli Scandicem, alias duas à nemine descriptas nec pictas, ex Phytopinacæ exhibemus. I. Scandix semine rostrato vulgaris C. B. Pecten Veneris, Matth. Ges. hor. Lugd. Cam. Cast. Scandix Dod. gal. & fol. Lacu. Ges. hor. Cord. in Dioscoridem, (cui & Latinorum acicula) Tab. Casalp. Cam. Veneris pecten Plinij, Lob. Acus pæctoris vulgaris, Clusio Pannonicarum. II. Scandix semine rostrato Italica: palmaris est, radice parua, alba, fibrosa, ex qua cauliculi terni quaternique procumbentes prodeunt, circa quos folia Scandicis vulgari similia, sed tenuiora: umbellæ minores, floribus albis succedunt semina oblonga, acubus similia, non tot vt in priori, vbi communiter octo obseruantur, sed bina, terna quaternaque, & illa hæc longitudine media superant. Semen Neapoli Norinbergam vnde à Doctore Doldio

* III. SCANDIX CRETICA. *

accepimus, missum fuit. III. Scandix Cretica, ex-
dice vulgari simili, caulis cubitalis, angulosus, striatus,
subhirsutus exurgit, qui in plures brachiat, ad omnes
exortum folia pediculis oblongis donata, subrotunda
per ora oblique dissecta, obscure virentia, leniter hirsu-
ta, prodeunt quæ verò caulem cingunt, & superiora
sunt, forma Scandicis vulgaris dissecta: umbellæ parvæ
sparsæ floribus albis, eorum autem foliolis, quam in
vulgari latioribus, quibus succedit semen rostratum,
decem, duodecim & pluribus rostris simul iunctis,
quorum cuilibet apices duo quasi aculei rigidi præsi-
guntur.



a Cat. μαρ-
θρω ὁμοια,
λεπτοσχιδῆ
i. fœniculo si-
milia, cum
tenuibus in-
cisuris.

Caucalidis
consideratio.

Καυκαλις.

C A P.

CAVCALIS.
CXXXIII.

CAucalis, quam alii sylvestre daucum vocant, ca-
liculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folis
apio similibus, a fœniculi modo per extrema mul-
tis, hispidsq; candida in cacumine umbella, suaviter
olente. Crudum, coctumve olerum modo estur: vr-
nam mouet.

Visitur *Caucalis* in *Hetruria* campestribus, inculto præfer-
tim solo, vt & *Ananiensi* tractu in *Tridentino* agro, vul-
lis reclamantibus notis. *Rura* nostra hanc *Petrosello* saluata
vulgò appellant. Quippe quod folia, quæ per ima prope radicem
exerunt, apium quadantenus effigie referant, quod vulgò *Pe-*
trosello dicunt: etsi quæ superiore parte prodeunt, per ambitum

*sint fœniculi modo capillamentis diuisa. Caulem mittit pastinacæ: in cuius cacumine umbellam gerit floribus candidis, odoratam, dauco non absimilem. Semen odoratum radice pastinacæ. Quapropter Galenus libro 7. simplicium medica-
mentorum, ita de ea scriptum reliquit: Caucalidem quidam daucum sylvestrem nuncupant: est enim ei adsimili gustu fœ-
mul ac viribus. Nam excalfacit vt ille, & desiccet, vrinam ciet, & muria ad repositionem conditur: Hac ille. Aperit, pro-
uocat, abstergit, attenuatq;. At nos dicimus, longè pluribus caucalim pollere viribus, siquidem cordi vtilis est. Eperis
succus calculos, & arenas pellit, & iecinoris, lienis, renumq; pituitas extenuat. Semen potum oculorum aciem acut.*

Caucalidis
vires ex Gal.

Caucalidis
vires Matth.

I. CAVCALIS.



* II. CAVCALIS NODOSO E-
chinato semine.



men. is feminatum adiuuat. Datur viris contra seminis profluuiam, vna cum aspleno, & viticis semine. Steriles prolificas
 facit. acide ex vino potum: praestat aduersus Trigonis, Draconis, & scorpionis marinorum ictus, vulnere illitum. Herba
 ex aceto mansa, & vomitione reddit. a. v. n. t. rem purgat. appetitū languescentem excitat, & nausea fastidia discutit,
 macantholios iuuat, tum herba ipsa in cibis deuorata, tum succus potus, tum semen quemadmodum totius planta deco- Nomina,
 cina. proinde datur viriliter quartanarum, & scabiosis, quinetiam morbo gallico affectis. Vt Graeci xavvaλis, ita etiam
 Latini *Caucalis*, appellatur: Italis, *Caucalide*, Perrosello saluatico: Gallis *Perfil sauage*.

Caucalidis diuersas proponit Matthiolus figuras, aliam similem ei, quam pro Visnaga posuit: aliam
 in maioribus iconibus, hanc nimirum quam caucalidem latifoliam alteram semine aspero nominamus;
 17. etq. caucalis flore rubro, folio latiore Lob. *Caucalis Matthioli* Lugd. *Caucalis secunda* Taber. forte
 Daucoides maius Cordi & Thalii. II. *Caucalidem* & alteram lubet addere quam nemo ante descripsit,
 de reliquis speciebus quinque suo loco) Hac ex radice oblonga, tenui, alba, caules emittit binos ternos
 uel quatuor, qui in alios brachiantur, rotundos, striatos, asperos: quorum alii semipalmares, incurui, alii bipalma-
 res erecti prodeunt: hos folia pastinacae syluestris amula, at breuiora & pauciora, multoq. tenuius di-
 uita, aspera, ex virore nigricantia, ad singula per e internodia, oblongis pediculis donata cingunt: flosculi
 ex quatuor ex quinque foliolis compositi subrubentes, vel pallidi, aliquando albi breuissimis pediculis insi-
 dent: quibus succedunt parua capitula echinata & conglobata, in quorum singulo vnicum semen. Hanc
 Iulio mense anno 1578, in horto Patauino collegimus, & *Caucalidem* semine ad caulium nodos echina-
 to nominauimus: missa etiam ad nos fuit, *Lappulae caninae Cortusi* nomine.

E. v. ca. p. 17.

ERVCA.

CAP. CXXXIII.

Ruda eruca venere in largiore cibo concitat. Semen eius idem praestat, vrinam cit. Concoctioni pro-
 deit. aluo per quam accommodata. Semine ad condimenta vtuntur: quod, vti in longum tempus af-
 fuerit, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris eruca, maximè in
 liberta. quae occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolae vtuntur. Vrinam vehementius pellit, &
 multo satiuua actior.

I. ERVCA SATIVA.

II. ERVCA SYLVESTRIS.



Vulgaris admodum planta est *Eruca tam satiuua*, quam sponte nascens, quod frequentissimè in caenis acetarijs insera- *Erucae conu.*
 tur. *Satiua* folijs exit longis profunde, sed rarioribus incisuris, laciniatis, Sisymbrij aquatici modo, sapore acri, & a- & genera.
 mariusculo: caule sesquipedali, floribus in cacumine albicantibus, semine in tenuibus corniculis concluso, vt in *Trione*. Ra-
 dix illi est alba, tenuis, acri sapore. Seritur passim copiosa in hortis. Erratica arid. solo gaudet, adeo vt in muris quoque
 nascatur, folijs domestica angustioribus, ac frequentius laciniatis, gustu acriori, sapidioriq., caulibus numerosis, floribus
 luteis, corniculis in vniuersa fere planta copiosis, sursum spectantibus, semine sinapi simile, acri & amariusculo. Cocta *Eru-* *Erucae vires*
 ca infantum tussi medetur, addito saccharo. Tradidere quidam (superstitiosum tamen mihi est) *trita syluestris erucae folia* *Matthiolo,*
 sinistra manu descripta illucq. deuorata, Ictericos sanare. *Syluestris* magis excoalsfacit, siccat, attenuat, aperit, incidit, ex-
 trahit;

trahit, extergit, prouocat, quàm satiuā. Excalfacit olus (vt testatur Galenus libro 2. de alimentorum facultatibus, per quam manifestè, adeò vt non facile solum absq; iunctis lactuca folijs edatur: nam ita immodico calori per frigus admixtum excessum temperat. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in venerem stimulos addere: Caput etiam magis dore afficiet, si solum edatur. Semen (vt scribunt antiquorum nonnulli) muris aranei morfibus medetur: ventris tinea excicat, lienemq; extenuat: tritum, & cum felle bubulo mistum, nigras vlcera cicatrices ad candorem reducit. Cum melle verò perunctum, vitia cutis in facie emendat, & lentigines emaculat. *Herba, quæ Græcis ἐϋζωμον, Latinis Eruca vocatur Mauritanijs, Iergir, Ergit, seu Gargir: Italis, Ruchetta, & Rucola: Germanis, Weiss; Senff: Hispanis Oruga & Araga: Gallicis, Roquette. Eruca syluestris, Græcis ἐϋζωμον ἀγροίον: Italis Ruchetta gentile, & Rucola saluatica: Germanis Wild Weiß; Senff: Gallis petite Roquette & Roquette sauuage.*

Nomina.

Eruca quòd vellicando linguam quasi erodat, Græcis ἐϋζωμον, ob suauitatem, quæ ei in condiendis obsonijs inest, vt habetur apud Plinium lib. 20. cap. 13. I. Eruca latifolia alba seu satiuā Dioscoridis C. B. E. ruca Brunf. Cord. in Diosc. Ges. hor. Cast. Eruca siue Rucula marina maior, Trag. Eruca satiuā. Matth.

* III. ERUCA CAERULEA. *



Sinapis alterum genus. Erucula maior, Cord. in hist. Sinapi syluestre, Dod. gal. Eruca folio latiore, Castalp. Eruca maior, Cam. II. Eruca maior syluestris C. B. Eruca syluestris, Matth. Lob. Dod. fol. Cast. Taber. III. ERUCA PALVSTRIS cærulea, ex radice oblonga, tenuiter fibrosa, ex ruffo albicante, caules plures palmares, sesquipalmares aliquando, striatos, hirsutos emittit, ad quorum exortum folia per terram sparsa, quæ Erucæ vulgaris modo sinuosa sunt & quasi circumtosa, hirsuta, alpera, sed longè breuiora, multoq; angustiora: in caule verò qui ramulis aliquot brachiatur, folia pauciora, minus sinuata, & inferioribus aliquando latiora sed breuiora, quædam etiam angusta & integrarum ramulorum extremis flosculi eleganter cærulei, interdum dilutè cærulei, ex quatuor foliolis constantes insident paruis ex iis filamētis prodeuntibus: his succedunt filiquæ oblongæ, tenues & breues, quibus semen subrotundum, minutum & acre includitur. Toto ferè anno floret. Prouenit apud nos locis arenosis & quidem usque Birsia alluit: quibusdam etiam locis in muris prouenit non longè à Bar in monte S. Otiliæ prouenire Doctor Nicolaus Agerius retulit, vbi violam petream vocent. De syluestri minore & palustri lutea, vt & ea quæ echinata est siliqua, & denique marina dicetur suo loco.

Ωκίμιν. OCIMUM. CAP. CXXXV.

OCimum vulgò cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, vrinam pellit, lac euocat, agrè tamen conficitur. Il-

a Meum
μελαγχολώ-
σι i. infan-
tibus.

litum cum polline polentæ, aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis manni, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio, oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit: destillationes exiccat. Semen potum conuenit a atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatistiquè: naribus haustum, subinde mouet sternutamenta, quod idem herba efficit: sed oculos premi-
necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant, quandoquidem manducatum, & in sole positum vermiculos creat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Ocimi confi.

Ocimi genera tria.


Ocimum citratum.

Monachorū iactantia circa ocimum garyophil.

OCimum quemadmodum odoratissimum, ita & omnibus notissimum est. Namque perrara sunt vbiq; edium sinistra, perraraq; cœnacula, ac viridaria, quæ Ocimo non redoleant, utpote quod frequens seratur, & fouetur in singulis vasis. In Italia hoc auo Ocimi tria habentur genera. Quorum primum quod maius vocant, folijs assurgit amarantho longè maioribus, latis, longis, ac crassis, citrea malo similibus, floribus spicatis, albo colore, è quibus semen gignitur subnigricans. Totā planta suauiter spirat. Secundum folijs exit, ac ramulis, dicto similibus sed duplo longè minoribus, cuiusmodi duæ habentur species, odore tantum differentes, alterum odore plebeij ocimi, alterum citrei mali adeo simile, vt ferè nulla sit odoris differentia. Proinde hoc citratum vocauerunt Arabes, quo modo ipsum quoq; Mesues nominat. Tertium, quod folijs constet minutis atque angustis, sitq; ceteris odore fragrantius, Italis vulgò appellatur Basilico gentile, Mauritanijs Ocimum garyophyllatum nuncupatur. Horum omnium meminit Serapio, vocauitq; medium hic a Dioscoride descriptum, Ocimum non garyophyllatum: Garyophyllatum verò, quod ceteris tum minutius, tum odoratius habetur. Demum Citratum à Citreo odore alterum, vt omnibus palam fiet, qui Serapionis monumenta perlegerint de Ocimo differentis. Idcirco videant quaso patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios scripserunt, quo iure quædam ratione in electuario de gemmis se iactent Ocimum garyophyllatum hac tempestate primos adinuenisse, cum hoc Serapioni so-

I. OCIMUM MAIVS.

II. OCIMUM MEDIUM.



III. OCIMUM GARYOPHYLLATUM.



ljs exeat parvis, & caule quadrangulari: monachis vero folijs melissophyllo maioribus, per ambitum serratis, & caule minime anguloso, Qua in re eos, pace sua, aperte hallucinatos putauerim. Nec equidem credendum arbitror, quod de alio ocimi genere intellexerit Mesues, quam de tertio illo genere in delitijs habito, de quo diximus. Nam cum ceteris odoris fragrantia longe praestet, nulli dubium est, quin in roborandis cordis ipsius viribus ceteris sit longe aptius, atq; etiam praestantius, vt quod in electuarium de gemmis addatur ad cordis affectus: ideoq; datur vtiliter oderandum ex aceto, in animi deliquio. Scribit Brasauolus suo de simplicium examine Roma primum excuso libro, tantam de Ocimi viribus inter Plinium, & Dioscoridem esse controuersiam, vt alterum ipsorum errasse dicendum sit. Quippe ex Aphris tradit Dioscorides, quod si a Scorpione feriantur, qui ocimum ederint, nullo dolore afficiuntur. Contra vero Plinius, qui libro 20. capite 12. si eo die, inquit, feriatur quispiam a scorpione, quo ederit ocimum, seruari non posse. Qua in relectionis impatiens deprehenditur Brasauolus: quandoquidem si eo loco Plinium de Ocimo differentem, patienter perlegisset, cognouisset utiq; quam recte Plinius ipse hanc dirimat controuersiam, usq; respondeat, qui ocimum accusant, cum inquit: Ocimum quoq; Chrysippus acriter increpuit, inutile esse dicens stomacho, vrina, & oculorum claritati. Praeterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris vitia. Ideoq; ca-
 Adiciunt quidam tritum si operiatur lapide, scorpionem gignere. Aphri vero, si eo die feriatur quispiam a scorpione, quo ederit ocimum, seruari non posse. Secuta atas alacriter ocimum defendit: nam id esse capras, nec minus quam mentham, & rutam scorpionum terrestrium ictibus, marinorumq; venenis mederi ex vino, addito aceto exiguo. Vsu quoq; compertum deficientibus ex aceto odoratu salutare esse. Item lethargicis, & inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris, impositum ex vino: stomacho quoq; esse vtile: hac Plinius. Ex quibus clarissime patet, Plinium eorum placitis refragari, qui tam acriter ocimum damnarunt. Degenerat quandoq; ocimum in serpyllum, vt auctor est Theophrastus libro 5. capite 8. de plantarum causis, vbi sic inquit: Ocimum autem, quod loco soli exposito situm est, transit in serpyllum, quia vehementer siccatur. Folio namq; minus, odoreq; vehementius redditur, quippe cum alimenti quoq; minus habeant, qua sicca sunt. Sed huiusmodi mutationes ita euenire putandum, vt aliquid similitudinis faciant, non vt omnino speciem exprimant alienam: haec Theophrastus. Ceterum Auicenna libro de viribus certum a Dioscoride dissentire videtur. Nam ocimum, scribit, sanguinem turbidum, & melancholicum generat, quoniam superflua humiditas, qua est in ipso, parit inflationem in venis. Nec aliter videtur sensisse Galenus, qui libro 8. simpli-

Brasauoli la-
psum in prima
editione.

Ocimi dege-
neratio in
serpyllum.

Ocimi vires
ex Auic. &
Gal.

8. simplicium medicamentorum de ocimo ita scriptum reliquit: Ocimum ex secundo est ordine calfacientium: habet recrementitiam humiditatem: proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Caterum foris illitum, & concoquendum vtile est. Idem libro 2. de alimentorum facultatibus, cum inquit: Ocimo etiam plerique, ut obijciuntur, ex oleo, & gero esitantes: vitiosi autem est succi. Admentuntur ob hoc quidam dicentes, si tritum pabulum in ditum operiatur, celerrimè intra paucos dies Scorpiones gignere, presertim vbi quis quotidie ollam ad solem calcetere: sed hoc sanè a vero abest. Id porro verè de eo dixeris, olus esse pravi succi, stomacho noxium, & concoctu difficile. Sed illud in ocimo non ignorandum puto, quod ocimum per y ab ocimo per i maxime differre deprehenditur probatissimorum auctorum testimonio. Siquidem apud antiquos Ocimum erat pabuli genus, dictum vel quod cito proveniret: vel primum inter cetera pabuli genera e terra erumperet: vel quod iumentis citaret alium, sic appellatum ab Græca voce ὄκιμον, qua Latinus valet ut. Ocimum vero herba est illa odorata, de qua supra disputauimus, sic nominatum ab ὄκιμον verbo Græco, quod redolere significat. Vnde rectius forte per ζ quam per c scribendum esset. Caterum ocimum antiquis quibusdam bouum pabulum ex secta viridi segete, priusquam indurescerent culmi: vel ex seminibus pluribus simul in agro satis, nempe e fabarum modis decem, vicia duobus, & eruilia tantundem vnà in iugero satis, & ante maturitatem recisis. Catoni tamen e vicia, sano græco, faba, eruoq; in vnum commisit, & exinde satis ocimum est. Quo fit, vt putauerim ocimum antiquis, non modò herbaceam, viridemq; fuisse segetem, e pluribus seminibus vnà in agro satis in primum iumentorum pabulum: sed etiam ex vno tantum cerealium genere, nempe hordeo, auena, vicia, eruo, alijsq; his cognatis, quod eiusmodi pabulo verno tempore, non modò alantur boues, ac etiam equi, sed etiam repurgentur. Id quod nostra quoq; etate fit pluribus in locis in Italia, presertim cum hordeo, eruo & vicia. Nec placet eorum sententia, qui sibi nulla, vt arbitror, ratione, nec auctoritate persuadent, Ocimum plantam esse sui proprii generis, quod e veteribus nullum hæcenus inuenimus (quantum equidem vidi & legi) qui ocymi herbae historiam literis memoriaq; mandauerit: sed comperi quidem, quod vocabulum hoc non magis vni, quam alteri conueniat: quandoquidem vnicuiq; pabuli generi, quod primo statim vere cito proveniat, accommodari potest. Quare plantè exploranda videtur Adami Loniceri opinio, & Tragi, quod non sine errore ridendo frumentum Turcicum, siue, vt alijs placet, Saracenicum, quod Tridentina rura vulgò appellant Formentone, & Foroiulienfia à pullo seminis colore Saracino, ocimum esse firmiter existiment. Quin etiam ij turpiter aberrasse deprehenduntur, quod huic planta, qua suum Ocimum est, omnes odorati ocymi facultates reddiderint. Nec alia ratione moti frumentum Saracenicum ocimum esse censent, quam quod satum tertia à satu die erumpat. Verum ocimum non ea de causa nomen hoc (mea quidem sententia) sibi comparauit, sed quod citius ceteris pabulorum generibus vere primo adolescat: nam innumera essent ocymi genera, si id omne, quod statim ferè à satu oritur, ocimum vocari debeat. Quod ὄκιμον (vt antè dictum est) Græci, ocimum item Latini appellant: Mauritani, Berendaros, & Bedarog: Itali, Basilico: Germani Basilien vnd Basilgram: Hispani, Albahaca: Galli Basilich. Ocimum alterum siue medicum, Græcis, ὄκιμον ἴτερον: Italis Basilico mezzano. Ocimum minus siue tertium, Græcis ὄκιμον μικρότατον: Italis Basilico gentile.

Ocymi ab ocimo differrentia.

Ocimum antiquorum quid.


Ocimum non est planta.

Loniceri & Tragi error circa Ocimum.

Nomina.

* IV. OCIMUM LATIFOLIUM

Crispum. *



subcærulea & maculata, longis pediculis rubentibus donata. Flores aliorum similes & ex candido rubescentes obtinet, semenq; paulò maius, nigrum ex rotunditate oblongatum, foliaceis capsulis inclusum. Tota planta odore est Ocimi vulgaris, Augusto & citius florens in olla aluimus. Ex India in Hispaniam & inde in Italiam & Germaniam semen transmissum. Dicitur ocimum latifolium Cæsalpino: Basilicum Indicum, vel potius Hispanicum Camerario in suo horto: Ocimum S. Mauritianum, Iohanni Bauhino, in libello de plantis à diuis denominatis.

Ocimum quodà celeritate proueniendi dictum censetur, βασιλικόν, id est, regale recentioribus Græcis varia habet genera, magnitudine, odore & colore variantia. I. Ocimum gariophyllatum maius C. B. Basilica maior, Trago, Basilicum maius, Lon. Ocimum maius, Matth. Fuchf. Dod. gal. Cast. Cam. Ocimum nigrum, Cord. hist. Ocimum maximum citratum, Gel. hor. Ocimum maximum caryophyllatum & Citratū Lob. Ocimum tertium maximum, Dod. fol. Ocimum citratum, Cæsalp. Ocimum magnum, Tab. II. Ocimum vulgatius. C. B. Ocimum, Brunf. Dod. fol. Basilica minor & Baccharis germanica, Trag. Ocimum medium, Matth. Cast. Lugd. Cam. Ocimum mediocre Fuch. Ocimum medium vulgatius, Lob. Ocimum tertium & medium, Cæsalp. III. Ocimum minimum C. B. Ocimum gariophyllatum, Matth. Cord. hist. Lugd. qui duas habet icones, Ocimum minus, Matth. in icon. Dod. fol. Cord. in Diosc. cui & garyophyllatum & Tab. Ocimum paruum, Lac. Gef. hor. Ocimum minimum garyophyllatū Lob. Basilicum minus, Cast. Ocimum alterum tenuifolium, Cæsalp. IV. Ocimum latifolium, maculatum vel crispum, elegantissimum hoc Ocimum à nemine pictum adijcere placuit, quod ex radice parua eaq; fibrosa, caulem emittit cubito minorem, subrubentem, striatum, raris pilis ijsq; breuib; vestitum, qui ad quodlibet ferè internodium in breues ramulos brachiatur. Folia obtinet duorum digitorum lata, & amplius, oblonga, læuia, rotunda, quorum quædam modicè serrata, quædam profundè secta in lacinas quæ crispantur, maculata ex rubro nigricantia, vel

OROBAN.

ὀροβάνχη

OROBANCHE.

CAP. CXXXVI.

a Omnia ex-
empla. καυ-



Orobanche a cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quaedam legumina nasci constat, & ea strangulare: vnde orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, concoctionem accelerare creditur.

λίον ἐστὶν ὑπερυδρον ὡς διασπασμαῖον, ἐνίοτε δὲ καὶ μείζον, φύλλοις ἔσπελίπαρον, ἐν δασυ, τρυφέρον. i. Cauliculus est subruher, ad duos dodran-
tes altus, aliquando etiam maior, foliis subpinguibus hirsutus, tener.

Orobanchen, qua omnibus notis legitima Dioscoridis respondet, vidimus primum in Ananiensi agro supra Tridentum, ac deinde vbique ferè in Italia nasci comperimus, in campis non modò inter omnia leguminum genera, sed & inter segetes cannabim, linum, in pratis & in vijs secus agrorum sepes. Caterùm etsi scriptis mandauerit Theophrastus lib. 8. de historia, & 5. de causis plantarum, Orobanchem etiam necare amplexu, complexuq; suo; ea tamen, qua hic à Dioscoride representatur, & à Plinio lib. 22. cap. vltimo, nullo sanè complexu, sed sua tantum presentia, legumina, segetes, cannabim, & linum interimit, qua prope ipsam oriuntur. Quam ob causam Ananiensem, quòd vicinas strangulet, ac deuoret plantas, Herba lupa vulgò orobanchen appellant. Proflit hac (vt inquit Dioscorides) nullis vnquam folijs, sed vno tantum assurgit cauliculo, asparagi instar, colore subrubro, hirsuto, molli, pinguiq; & qui sesquipedalem non excedat longitudinem. Flos è quibusdam patefcit globulis in cacumine congestis, subalbidus. Radix digitali visitur crassitudine, fungosa, ac fragilis. Hac planta nonnullis etiam vulgò Coda di leone appellatur, alijs verò Herba Tora.

Orobanches consideratio, Orobanche Theoph. alia. Herba lupa. Herba Tora.

ba tora vocatur, quòd vacca ea degustata (vt pastores facto periculo testantur) statim taurum adeant. Sunt & qui (ut laudato scribit Plinius) Cynomorion eam appellent, a similitudine canini genitalis. Ex quibus omnibus non temerè dicendum existimauerim, vel Theophrastum (pace sua) hac in re deceptum esse, vel aliam à Dioscoride, & Plinio orobanchem concepsisse. Orobanche vt Galenus est auctor libro 8. de facultate simplicium medicamentorum, est sicca, frigidaq; temperatura in primo ordine. Huius plantae nomen Graecum est, ὀροβάνχη, quemadmodum & Latinum Orobanche, nec non Er-
borum Nomina.

Orobanches facul. ex Gal. Nomina.

Orobanche non ramosa elatior C.B. Orobanche, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Cast. Casal. Orobanche maior, Clus. Pan. Limodorum siue Orobanche, Dod. fol. Orobanche vera, Gef. hor. Orobanche secunda, Tabernaemontano.

Τραγοπόγων

BARBULA HIRCI.

CAP. CXXXVII.


Barbula hirci, qua ab alijs Come vocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci: magno super caulem calyce: è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Hirci Barbula, quam Hetruria vulgò appellat Sassefrica, vulgaris admodum est notitia. Radix, quòd gustu dulcis iucundaq; sit, estur hyeme frequenter in acetarijs. Duum est generum, alterum flore aureo, alterum purpurascente. Primum genus, folijs exit croci, latioribus tamen ac longioribus: flore aureo, rostro porcino vocato non absimili, maiore tamen, qui calyce continetur. Is sereno calo fathiscit, nubiloso verò contrahitur, occluditurq; calyce, quemadmodum & Chamaeleonis echinus. E concluso calycis vertice barba dependet incana, proluxa, vnde nomen accepit, vt Theophrastus prodidit lib. 7. de plantarum historia. E floribus papposum oritur caput, in quo semen continetur oblongum. Radice nititur longa, alba, dulci iucundaq;. Prouenit copiosa in pratis, ac etiam saxosis locis. Sed certè nesciuerim ego, qua ratione ductus negauerit Hermolaus, hanc Theophrasto, & Dioscoridi legitimam Hirci barbulam esse, cum illa pulchrè, huius notu respondeat. Radix excalfacit, ac etiam primo ordine humectat. Glutinat hac recentia vulnera, si foliorum succus, vel eius stillatitia aqua splenij, & attritis linteolis superponatur. Aliud quoq; Tragopogoni habetur genus, quòd à foliorum colore, purpureum vocant. Prodit hoc folijs alteri similibus, sed à radice numerosioribus, viridioribus, latioribus, robustioribus, caule quoq; simili, geniculato, conspicuis propè genicula alis, è quibus rami prodeunt. Flores edit in cacumine purpureos, sed altero minores, radiantibus circumquaq; calycis apicibus, in stella serè modum. Radice nititur quoq; grandiore, longioreq;, quinetiam robustiore, duriore, & lacteo succo referta, non quidem vt in altera, dulci, sed adstringente & amarissimo. Radicis lacteus succus adstringit, cohibet, firmat, & modicè abstergit: esui tamen inidonea est. Tragopogono congener videtur quoq; planta SCVRZONERA siue SCORZONERA Hispanis vocata, quòd à Vipera demorsis, quam ἡ Scurzo vocant, presentaneo remedio auxilietur. Hac noua est planta, nec puto esse quenquam, qui de ea ante nos scripserit. Inuenta est primum Sorzonera in Catalonia Hispania, à quodam seruo Aphro, à Ceruero Leridano Viro nobili, pretio empto. Nam cum quidam messorum in agro à viperis demorderentur, hic qui in Aphrica plantam hanc nouerat, propinato eiusdem radicis succo, incolumès seruabat omnes, quotquot demorsi fuerant, sed nemini plantam ostendebat, ne lucro fraudaretur. Quo postea factum est, vt vafiores quidam obseruantes à longinquo tra-

Barbulæ hirci consideratio. Hermolai error. Tragopogon purpurei mentio. Scurzonera mentio.

I. TRAGOPOGON SIVE

Barba Hirci.



II. TRAGOPOGON AL-
terum.



IV. SCORZONERA HI-
spanica.



V. SCORZONERA BO-
hemica.



Scorzonera Hispanica

Scorzonera Bohemica p. Bohemica: h. Sicut.

Etum, à quo Aferille plantam deferebat, illac concesserint, plantamq; consequuti sunt, inuentis rescissa nuper herbare-
liquis. Ea itaque effossa, factoque ipsius periculo, diulgata res est, & SCVRZONERAM id est VIPERINAM
eam appellauerunt. Hanc primum misit ad me siccam Clarissimus Regina Romanorū medicus, Ioannes Odoricus Melcho-
rius Tridentinus. At paulo post viride, viuentemq; eandem vidimus, ad Casarem Ferdi. ex Hispanijs allatam, ob rei raritatē.
Ceterum

Ceterum non multo post tempore, copiosam quoque in Bohemia nasci compertam est, clarissimi Doctoris Riberæ, eiusdem
 Cæsarum medici diligentia in monte quodam syluoso, vlginosoq; non longè à Poggebrot, dum Casarem sequeretur ad ve-
 nationes. Folia fundit hac planta spithama longitudine, succisa vocata emula, sed longiora, Tragopogono longè latiora
 et quæ solo propinquiora sunt, fibrata, longo pressoq; pediculo a radice prodeuntia, humiq; accubantia, quorum nonnulla
 per ambitu leniter sinuata spectantur. Caulem edit sesquidrantalem, & sepe maiorem, rotundum, geniculatum, in quo
 folia angustiora, breuioraq; spectantur. Flores profert aureos, Tragopogono adè emulos, cui & tota planta (vt prædixi-
 mus) congener esse videtur, vt alterum ab altero, paucis admodum notis dignosci possit. Hi flaccescentes in papposum mu-
 tentur orbem, in quo semen continetur album, longum, Tragopogono simile. Radix illi subest sesquidrantalis, pollicari
 crassitudine, raris adnatis fibris, cortice subnigricante, vegeta, tenera, fractu facilis, succosa, alba intus pulpa, lacteo succo
 pinguis, dulcis, & gustatu iucunda. Nasitur in syluis, & vlginosis locis, ac etiam alibi. Floret æstate vnà cum Trago-
 pogono. Nos hic eius imagines appingi curauimus, quarum quæ radice breuior, crassiorq; habetur, & folijs est amplioribus
 ex Hispania allata est, altera verò in Bohemia prouenit. Foliorum aut radicum succus datur presentaneo remedio potan-
 tes, aduersus viperarum, cæterorumq; venenatorum animalium ictus, quin etiam ad quoscunque pestiferos morbos. Deuora-
 taradix recens, sicca, aut sacharo condita quotidie, pestilentia contagia arcet, & venenis quibuscunque resistit. Datur
 eadem aut eius succus, vtiliter quoq; comitilibus: item cardiacis, vertiginosis, & animi deliquis, cordis pulsu, tremore vè
 oinosis. Enimvero commanducata per se radix, tristitiam discutit, hilaritatemq; conciliat. Quin etiam lacteus radicis
 succus oculorum aciem acuit, nubeculas delet. In summa, tota planta magni est ad omnia vsus. Τραγοπόγον ita Græcis,
 Latius verò Barbula hirci vocatur: Italis, Barba di becco & Hetruscis Sassefrica: Germanis Bochsbar vnd Gauchbrot:
 Hispanis, Barbe de cabron: Gallis Barbe de bouc. Barbula hirci altera, Græcis Τραγοπόγον ἑτερον: Italis Barba di becco
 purpurea. Scorzonera, siue Scarzonera, seu Viperina: Italis Scorzonera.

Scorzonera
 vires Matth.
 Nomina.

Tragopogon pratense luteum. C. B. Barbula hirci, Trago, Matth. in icon. Lacu. Cast. Tragopogon,
 Matth. Gef. hor. Dod. fol. Fuch. Lonic. Cæsalp. Tragopogon luteum, Lob. Tab. Thal. Barbula hirci,
 Dod. gal. Lugd. Cam. Hirci barba, Cord. in Diosc. & hist. II. Tragopogon cæruleum, C. B. Trago-
 pogon alterum, Matth. Lugd. Tragopogon puniceo flore, Gef. hor. Tragopogon fylu. flore purpureo,
 Cæsalp. Tragopogon, Dod. fol. Lob. Barbula hirci

* III. TRAGOPOGON LACINIATUM. *



altera, Matth. in icon. Cast. Barbula hirci purpuro-
 cærulea, Tab. Barbula hirci flore purpureo, Cam. Est
 flore cæruleo, purpurocæruleo: rarius albo. III. Tra-
 googon LACINIATVM luteum, C. B. Ex radice longa
 tereti, digitum crassa, foris nigricante, intus alba & la-
 tescente, folia prodeunt plura per terram sparsa viri-
 dia, læuia, inferne albicantia: quorum prima graminea
 sunt, subsequencia verò instar Coronopi laciniata exi-
 stunt, & horum aliqua licet laciniata sint, Crocii ta-
 men folijs neutiquam latiora, aliqua verò lata existunt.
 Caulem obtinet sesquipedalem & altiozem, asperum,
 striatum, & cauum, in paucos ramos diuisum, qui
 calyces sustinent striatos, quibus flores lutei manè pa-
 tentes, dein se claudentes infiti: his succedunt femina
 minora quàm in vulgari, striata, non autem aspera:
 quæ reclusa simul sphaericam formam ostendentes
 vento spirante in pappos auolant. Maio mense & Iu-
 nio floret. Prouenit in hortis quibusdam semine ex
 Italia allato: in Patauinis & Bononiensibus montibus,
 vt auctor est Anguillara (cui Acorus Theophrasti dicitur)
 reperitur: in Apulia frequens quoq; vt Fabius Co-
 lonna refert, qui Tragopogon laciniatis folijs nomi-
 nat. IV. Scorzonera latifolia Hispanica. C. B. Scorzo-
 nera Hispanica, Matth. Cast. Clus. pan. Tab. Lugd.
 Scorsonera siue Viperaria, Lob. Scorzonera Lonic.
 Dod. fol. Cæsal. Thal. Cam. Tragopogon peregrinus
 vel Hispanicus, Gef. hor. Hæc floribus est simplicibus
 & plenis. V. Scorzonera latifolia Germanica. C. B.
 Scorzonera Bohemica, Matth. Lob. Lugd. Scorsonera
 maior vel Pannonica prima, Clus. Pan. Scorzonera
 Germanica prima, Tab. Variæ sunt Scorzonera spe-
 cies, ratione florum, foliorum, & saporis variantes:
 est latifolia & angustifolia: latifolia flore est luteo, sed radice vel subdulci, vel amara. Angustifolia etiam du-
 plex, altera lutea, radice dulciuscula aut amara: altera flore ex rubro subcæsis, folijs angustioribus, radice
 amariuscula.

est latifolia & angustifolia: latifolia flore est luteo, sed radice vel subdulci, vel amara. Angustifolia etiam du-
 plex, altera lutea, radice dulciuscula aut amara: altera flore ex rubro subcæsis, folijs angustioribus, radice
 amariuscula.

Ornithogalum. ORNITHOGALVM. CAP. CXXXVIII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine
 mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visun-
 tur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthium. Ra-
 dix bulbota, cruda, & cocta manditur.

Ornithogalum adè inter segetes frequens oritur, vt si Maio mense in aruis requiratur, perpensis prius notis illi à Dio-
 scoride attributis, facile ab omnibus inueniatur. Ruellius in Gallia ornithogalum copiosum nasci scribit, pueris non
 M m 2 incog-

Ornithogali
 consuetatio.

I. ORNITHOGALVM I.

II. ORNITHOGALVM II.



III. TRASI.



Trafi histo-
ria.

Traforum
vires Matth.

incognitum, qui propter astantes, cum ab agricolis aratro terra
proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, Ornithogali radi-
ces vomere erutas colligunt: & cum sint castaneis suauiores, & &
crudis, & in cineribus incoctis vescuntur, odore iucundissimo
os mirum in modum commendante. Radices in orbem fere col-
lecte sunt: cortice pullo: candidissima intus carne, perquam odo-
rata: vere, vel estate cum sponde virent, hyeme vel autumno cum
exarantur agri, radicitus velluntur. Diu seruari possunt, & ubi
annona premit inopia, plebis rustica famem & ieiunia, castane-
arum more satiant. Mirè suis expetuntur, qui rostro probi-
culos excavant, & harum capti dulcedine, gregatim ad holi-
cendas, radicitusq; vellendas aduolant. Duas ORNITHOGA-
LI plantas expressimus, quod duo eius genera censeamus. Or-
nithogalum alterum, caulem promit tenuem, folia croci emu-
la, quae ab imo ad summum caulem circumuestiunt. Flores in
summitate albicantes in quinque diuisos apices, qui dum pate-
scunt, stella faciem referunt. Radice regitur bulbosa, alba, atten-
ferè per omnia similis. Caterum cum ornithogali radices suau-
tatis sua praestantia, in mentem mihi reuocauerint illa, quae
in agro Veronensi, vbi tantum, neque alibi, quod sciam, nascun-
tur in Italia, vulgò vocantur TRASI, saporis dulcedine, casta-
neis proximè accedentes, recentioribusq; quibusdam in medica-
mentis eadè expetantur, eas hic recensere nò ab re fore duxim.
Sunt igitur TRASI bulbosa radice, fabarum magnitudine, ob-
longa; & cum siccantur, rugosa. Harum planta quae vere & estate
germinat, folio exit longo, in mucrone exeunte, Cyperi modo, quò
quidè planta tota plurimum amulatur. Caules enim edit cubi-
tales, et angulosos, in quorū cacumine folia exiliora stellarū mo-
do radiant, inter quae flores exeunt spicati, subfulucentesq;. Ra-
dices habet numerosas, tenues, à quibus globuli dependit bulbosi,
oblongi, fabarum quantitate, ac etiam grandiores, colore sub-
rufescente, alba dulciq; intus medulla, castanearum sapore, scabro putamine. Harum plantam misit ad me Franciscus Cal-
zolarius Veronensis. Siquidem Trasi (quod sciam) non proueniunt sponte in Italia, nisi in agro Veronensi. Harum cremore
pectoris, & laterū vitia expurgant, quo fit, vt tussientibus opè non modicā praestent: tunc duntur enim radices in acerrantibus
carnibus

cornu iure, deinde per linteolum exprimitur cremor: quem etiam veneris potionibus miscent recentiorum nonnulli. Praestat idem cremor bibitus ad vrina ardores, & praesertim si Melopeponum, cucurbitarū & cucumerum semen addatur: valet item potus ad dysentericos, siquidem humorum acrimoniam retundit, & praesertim ubi ex aqua paratur in qua candens ferrum extinctum fuerit. Veronenses pro bellarijs vtuntur. Manduntur vna cum cortice, qui, quod sit asper ac sicus, expulit. exuio cremore. Sunt radices haec, vt experientia compertum est, & ex dulcedine conici potest, in calfacientium, & humectantium genere, sed status quodammodo gignunt (laniunt, laeuigant, emolliunt.) Quod ὀρνιθόγαλον Graeci, Latini propter Ornithogalum nominant: Itali Ornithogalo, Galli Churles. Ornithogalum alterum, Graeci ὀρνιθόγαλον ἕτερον: Itali Ornithogalo secundo. Trasi ita Veronensibus appellati, Venetis Dolzolmi & Trasi dicuntur.

Ornithogalum propter lacteum florum colorem, similem ei, qui in ouis gallinarum est, quod aliqui Bulbinam Theophrasti 7. hist. 13. & Athenæi censent. I. Ornithogalum primum, Matth. Lucun. Lugd. II. Ornithogalum album minus C. B. Ornithogalum 2. Matth. Cast. Lugd. Ornithogalum, Dod. gal. Ges. hor. Cæs. Lob. icon. Lugd. Ornithogalum candidum vulgare, Lob. obs. Ornithogalum candido flore, Cord. in Diosc. Ornithogalum alterum minus, Cam. Bulbus leucanthemus minor. Dod. fol. Lugd. Bulbus solsequius, Taber. III. Ornithogalum maius SPICATVM, ex radice bulbosa, oblonga, capæ simili, magna satis & candida, cui saepe plures bulbi iunguntur, caulis vnus, rotundus, cubitalis, & aliquando altior, nudus exurgit: folia enim strata infimâ eius partem cingunt sena vel octona, etiam pauciora, cubitali longitudine & digiti latitudine, modo angustiora, modo latiora (vt Lugdunensis historia duabus figuris ostendit) tenuia: caulis etiam à medio in summum vsque pluribus floribus ornatur, qui veluti spicam constituent, hi oblongis pediculis insident ex sex foliolis compositi, foris herbacei, intus lactei coloris, Phalangii flores referentes, in quorū medio lutei apices conspiciuntur: quibus succedunt siliquæ triangulares, semina nigra phalangii instar continentes. In Gallia Narbonensi circa Monipeliū in agris frumentaceis prouenit: sed & in asperis & petrosis aliqui notarunt. Sunt qui Ornithogalum Dioscoridis censeant: alii an Scilla Epimenidia apud Theophrastum 7. hist. 11. de qua Plinius lib. 19. cap. 5. Epimenidii nomine, sit dubitant. Moly descriptio apud Dioscoridem conuenire videtur. Dicitur Ornithogalum spicatum, Lob. Ornithogalum Narbonense, Dod. fol. & Lugd. cui & Ornithogalum magnum Myconii. Ornithogalum maius Monipeliacum, Clus. Pan. Ornithogalum alterum, Camer. apud Matth. Bulbus ornithogalo similis, Cæalpino. IV. Cyperus esculenta radice rotunda: Theophrastus 6. de caulis plantarum 16. Cyperi meminit, cuius radices sunt dulces, & cibo idoneæ, quod huic nostræ conuenit

* III. ORNITHOGALVM maius Spicatum. *



Ornithogalum candidum vulgare, Lob. obs. Ornithogalum candido flore, Cord. in Diosc. Ornithogalum alterum minus, Cam. Bulbus leucanthemus minor. Dod. fol. Lugd. Bulbus solsequius, Taber. III. Ornithogalum maius SPICATVM, ex radice bulbosa, oblonga, capæ simili, magna satis & candida, cui saepe plures bulbi iunguntur, caulis vnus, rotundus, cubitalis, & aliquando altior, nudus exurgit: folia enim strata infimâ eius partem cingunt sena vel octona, etiam pauciora, cubitali longitudine & digiti latitudine, modo angustiora, modo latiora (vt Lugdunensis historia duabus figuris ostendit) tenuia: caulis etiam à medio in summum vsque pluribus floribus ornatur, qui veluti spicam constituent, hi oblongis pediculis insident ex sex foliolis compositi, foris herbacei, intus lactei coloris, Phalangii flores referentes, in quorū medio lutei apices conspiciuntur: quibus succedunt siliquæ triangulares, semina nigra phalangii instar continentes. In Gallia Narbonensi circa Monipeliū in agris frumentaceis prouenit: sed & in asperis & petrosis aliqui notarunt. Sunt qui Ornithogalum Dioscoridis censeant: alii an Scilla Epimenidia apud Theophrastum 7. hist. 11. de qua Plinius lib. 19. cap. 5. Epimenidii nomine, sit dubitant. Moly descriptio apud Dioscoridem conuenire videtur. Dicitur Ornithogalum spicatum, Lob. Ornithogalum Narbonense, Dod. fol. & Lugd. cui & Ornithogalum magnum Myconii. Ornithogalum maius Monipeliacum, Clus. Pan. Ornithogalum alterum, Camer. apud Matth. Bulbus ornithogalo similis, Cæalpino. IV. Cyperus esculenta radice rotunda: Theophrastus 6. de caulis plantarum 16. Cyperi meminit, cuius radices sunt dulces, & cibo idoneæ, quod huic nostræ conuenit

alio videtur eiusdem 4. hist. 10. Malinathalla, & Plinii lib. 21. cap. 15. & 29. Anthalium: Auctori libri de Plantis Aristotelis lib. 1. cap. 5. Margaritæ Aegyptiæ, Trasi, Matth. Cast. Cæs. Lugd. Trasi Veronensium, vel esculenti Cyperi, Lob. Dulcichinum. Ges. hor. (cui & Schænocaryon) Dod. fol. Cyperus dulcis Tab. Cam. cui & Granum azelon Arabum: Malinathalle Theophrasti, Columnæ.

Ydra TVBERA CAP. CXXXIX.

Tubera rotundæ radices sunt, sine caule, sine foliis, flavescentes, vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.


Tubera, quæ occulta quadam facultate terra in se parit, & conglobat, numerosa in Hetruria à rusticis effodiuntur, quod magnatibus maxime expetantur in cænis. Duo eorum in Romano agro habentur genera: quorum alteri candida, pulla vero alteri pulpa subest. Rimosus vtriusque cortex, ac niger. Est & tertium genus in Ananiensi, & Tridentino tractu proueniens, laui cortice, colore subrufo, ceteris longe minus, insipidum, & gustu iniucundo. Tubera meminit Plinius lib. 19. cap. 2. sic inquit: Et quoniam à miraculis rerum capimus, sequemur eorum ordinem, in quibus vel maximum est aliquid nasci, aut vivere sine vlla radice. Tubera vocantur hæc, vndique terra circumdata, nullisq; fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtrique extuberante loco, in quo gignuntur, aut rimas vrgente, neque ipsa terra coherent. Cortice etiam includuntur, vt planè nec terram esse possumus dicere, neque aliud, quam terra callum. Siccis hæc ferè & sabulosis locis, frutetosiq; nascuntur. Excedunt saepe magnitudinem mali cotonei, etiam librali pondere. Duo eorum genera, arenosa dentibus inimica, & altera sincera. Distinguuntur & colore rufo nigroq; & intus candido. Laudatissima quæ Aptrice crescunt. An ne vitium id terra? neque enim aliud intelligi potest: malum ne id ea protinus globetur magnitudine, quæ futurum est, & viuas ne, aut non, haud facile arbitror intelligi posse. Patrescendi enim ratio communis est ijs cum ligno. Lartio Licinio pratorio viro iura reddenti in Hispania Carthagine paucis his annis scimus accidisse, motu

Tuberum consideratio,

Plinius de Tubera

Historia ex Plinio.

TUBERA.



Tuberum vires ex Gal.

Ex Avicenna Nomina.

tuber, vt deprehensus intus denarius primos dentes inflectent. Quo manifestum erit terra naturam in se globari. Quod certum est ex his, quae nascuntur, & feri non possunt. Et lib. eodem cap. 3. De tuberibus (inquit) hac traduntur peculiariter. Cum fuerint imbres autumnales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maximè è tonitribus, nec ultra annum durare, nerrima autem verno esse. Quibusdam locis acceptantur, & feruntur, sicut Mytilenis. Negant nasci, nisi exundatione fluminum inuecto semine ab Tiaris: est autem u locum, quo plurima nascuntur. Sunt & in fungorum genere a Graecis dicti pezica, qui sine radice, aut pediculo nascuntur. Haec de Tuberibus Plinius. Tubera (vt memoria prodanda Gal. lib. 2. de alim. fac.) radicibus, aut bulbis sunt annuanda, vt quae nullam euidentem habent qualitatem. Quia ergo his vtuntur, ad excipienda condimenta, tanquam materiam habent, ceu alia qualitatis expertia, & innoxia, & aquosa sunt. Quibus omnibus commune est, vt alimentum nulla insigni facultate constans, corpori praebeant, sed singulisculum duntaxat, crassitudine tale, quale id ipsum est, quod ingestum fuerit: ex tuberibus quidem crassius, ex cucurbita liquidius & tenuius. In alijs eadem est proportio. Sed longe aliter de his scripsit Auicenna, cum inquit: Tubera terrena magis, quam aquosa sunt, omniq; prorsus sapore expertia. Attribiliares & crassos gignunt humores, magis quam cetera eorum genera. Quo fit, vt frequenter deorati apoplexiam, & paralysem concitent. Ad haec concoctu contumacia sunt, & ventriculum aggrauant. Quae Graecè ὄζυζα, Tubera Latine dicuntur: Arabicè Ramech, Alchamech, Tamer, & Keme Italicè Tartuffi: & Tartufole Germanicè Hirskrunst: Hispanicè Turmas de tierra: Gallicè Truffles sine Truffles.

Σμίλαξ κηπαία.

SMILAX HORTENSIS.

CAP. CXL.

Hortensis Smilax frutex est, cuius semen à nonnullis lobia vocatur. Folia habet hederæ, molliora tamen, tenues caules, & capreolos vicinis fruticibus circumvolutos: qui tantum adolefcunt, vt topiarias scenas repræsentare videantur: siliquas scænegræci profert, longiores, torosiores: in quibus semina renum similia, sed inæquali colore, recluduntur: quæ quadam ex parte a fuluescunt. Siliqua concocta, cum semine in oleribus asparagi modo estur. Vrinam ciet, & tumultuosa somna facit.

à Orib. ὄζυζα i. subpurpureus.

Smilacis hortensis cōsideratio. Manardi error.


Dolichos Galeni.

Manardi error, Dolichos Eruiam esse volentis.

Phaseolorum coctura.

Hortensis Smilax (vt supra nobis dictum est in Phaseolis, sub quorum appellatione falso credidit Manardus de eruiis scripsisse Dioscoridem) nil aliud, mea quidem sententia, esse potest, quam ea Phaseolorum genera, varijs coloribus depicta, quæ vulgò Italis dicuntur Fagioli Turcheschi. Siquidè præter id, quod (candidi) rubentes, (nonnulli melini plerq; diuersis, varijsq; maculis infecti) versicolores, & (vt Dioscorides inquit) renum figura cernantur, folijs exeunt hederæ, caule tenui, è quo capreoli prodeunt, quorum reptatu non modò palos, & arbores smilacis aspera modo scandunt, ac viuunt: sed in hortis attegias, pergulas, testudines, scenas, & tentoria inumbrant, & opacant. Horum planta tota sere facie vulgaribus Phaseolis persimilis visitur, peculiariter autem differt in siliquarum & seminum magnitudine, quæ omnia in hortensibus maiora, latioraq; spectantur, differunt etiam caule. Seritur passim in hortis & viridarijs. Hos Galenus lib. 7. de alim. fac. ex auctoritate Theophrasti Dolichos appellat, sic inquiens. Dolichus ad aëlo longo palo consurgit, & fructum gerit: sin hoc adminiculo careat, vitiosus fit, & rubiginè tentatur. Quod quotidie visitur, in hoc Phaseolorum genere: quippe quod nullo sustentaculo in altum euecti, humi repunt, & contracto tractu temporis humore, situ ac rubigine deperunt. At vbi longissimo inhaerent pedamento, breui temporis spatio, ad culmen vsq; illi se circumuoluunt. Quo fit, vt longè aberrasse Manardum existimè, quod asserat libro primo epist. 3. Dolichos nil aliud esse Galeno, quam Eruiam, quæ Italicè nonnullis vulgò appellatur Rouiglione, alijs verd Arabica, cum tamen Galenus, itemq; Paulus, Eruiam appellent Ochrum. Nec nobis obstat, quod Eruiam (vt ipse asserit) rubiginem contrahat, cum adminiculo caret, quibus a terra subueitur, quodq; huiusce tantum leguminis siliqua vnà cum semine comedantur, vt Gal. lib. 2. de alim. facul. præfatione, & Paulus Dolichos mandari testantur. Nam etsi aliquando Eruiam secti arborum rami apponantur, vt illos implicent, nunquam tamen longissimi adfiguntur pali, quod ea minimè illos scandere valeat, versicolorum Phaseolorum modo. Adhuc Eruiam quæ humi serpat, rubigine minimè deperit, vt Tridentinus ager vbiq; testare potest, quippe quod ibi frequentissima feratur, dimittaturq; nullo propè fixo pedamento humi accumbere. Nec obstat præterea (vt ipse Manardus scribit) quod sola Eruiam inter legumina cum siliquis comedatur. Nam quamuis decocta vnà cum siliquis mensis apponatur, nunquam tamen aliquem me vidisse fateri possum, qui siliquas simul cum granis deuorauerit: est enim eruiam inuolucrum suis partibus extrahunt, & membranosas, exhaustasq; siliquas dentium attritui prorsus repugnantes, in patinis suis relinquunt. Sæpius autem cum huiusmodi Phaseolorum cotniculis euenit: quandoquidem cum tenella adolefcunt, anteaquam consenscant, aqua prius elixa, non modò in acetarijs integra, nullisq; abiectis putaminibus assumuntur in cibum, sed butyro vel oleo fixa addito gingibere, & omphacio iucundissimè deuorantur. Aluum emolliunt & pectus dilatant, semina in cibum sumpta magis instant, & ventriculi laborem faciunt, quam vulgaris Phaseoli, copiosiusq; semen generant, & reuerentissimulant, præsertim quæ cum longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur, quod quidem longè valentius proficit.

SMILAX HORTENSIS.



stant, si ex lacte bubulo pingui elixentur. Hinc itaque fit ut certò potius credam, hoc phaseolorum genus dolichos esse, quàm eruiliam Manardo vocatam. Illud insuper hac in re sentit Manardus, quòd Dioscorides Phaseolorum appellatione, de quibus supra mentionem fecit, non quidem communes ac triuiales, sed Eruiliam significauerit: Smilacis verò hortensis nomine, de qua hic sermo, vulgares illos phaseolos representauerit. Qui (vt suam tueatur sententiam) consentaneum minime videri inquit, quòd duobus diuersis capitibus eodem libro de Phaseolis scripserit Dioscorides. Sed haudquaquam à ratione & veritate eum alienum existimarem, qui responderit, primùm tractasse Dioscoridem de vulgaribus & candidis Phaseolis, qui passim in campis aliorum leguminum more seminantur, vbi de omni segete, & leguminibus differuit. Deinde verò de versicoloribus, qui in hortis & viridarijs ad operæ topiaria explenda seruntur, inter ea, quæ in hortis & viridarijs coluntur. Quamobrem vt hortenses à campestribus secerneret, inquit: Hortensis Smilax frutex est, &c. Quod manifestè declarat, eum hic de hortensibus, illic verò de ijs, quæ in campis proueniunt, intellexisse, atq; eos ita seiunxisse. Quare in re non potui non quandoq; admirari Manardum, medicum a liquin ingenio & doctrina insignem, quod tam facile adductus esset, vt asseueraret dolichos esse eruiliam, cum eum legisse existimandum sit, Galeno & Paulo eruiliam ochrum vocari. **Nomina**
 Planta, quæ σμίλαξ κηπευαία Græcis: Smilax hortensis Latini appellatur: Arabibus, Lubia: Italis, Smilace degli orti, & Fagiuolo Turchescò: Germanis Weisch Wonen: Hispanis Feyones: Gallis, Faseolos de Turquie & Faies peinctes.

Smilax hortensis, quod Smilacis modo arborescenscendat, δολιχός Hippocrati, alijs λόβος, alijs φασόλος. Smilax hortensis, Brunf. Trag. Fuch. Matt. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lacu. Cast. Lug. Tab. Cam. Phaseolus vulgaris, Lob. Dolichos. Anguillata, Dod. fol. Lacu. Plurima nunc habentur Phaseolorum genera: est namque vulgaris, sunt Brasiliæ, Indici, Americani, & horum omnium plurimæ differentia: etenim in vulgari obseruare licet diuersitatem in floris colore, qui vel niueus, vel flauescens, vel purpureus siue amethystinus: in fructu maior coloris varietas, sunt niuei, flauis, ex flauo obsoleti, purpurei, rubri, latericei ferè coloris, amethystini, cærulei, nigri: vel albi nigris venis & lituris distincti, sic & carnei & etiam cinerei similibus venis notati. Sed de his & aliis suo loco plenius.

MEDICA DIOSCORIDIS.



Medica. MEDICA. CAP. CXXI.

Medica, cum recentè prodiit, foliis & caule trifolio pratensi similis est: procedens verò folia contrahit, caules edens trifolii, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine dependet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro grammine vtuntur, qui pecora alunt,

Medicam inde nominationem inuenisse certum est, quòd Medicæ conprimùm, Plinio lib. 18. cap. 16. auctore, ex Media in Italia aduecta fuerit. Verùm etsi hac quondam in vniuersa Italia sereretur ad pecorum pabulum, & omnibus ferè cognosceretur, iam tamen pauci sanè reperiuntur, qui Medicam viderint, ne dum serant: quanquam non desunt, qui eam se consecutos existiment. Non defuerunt, qui mihi varias plantas pro Medica ostenderent. At quoniam paucis admodum notis medicam referebant, non libuit vllam Medica imaginem hic exprimere. * Et cum ab amicis hoc anno semen accepissem, illudque magna cum diligentia terra mandassem, accidit solo forsitan repugnante, vt nulla exorta sit planta. * Hac (vt Plinius tradit loco citato, & antiquo-

Medicago salua
 Stenab.

Nomina.

rum pleriq; testantur) vno tantum satum plus tricenis annis perdurat. Eadem (vt quidam referunt) abundat Hispania, vbi magna admodum cura colitur ad iumentorum & pecudum pabulum: eamq; Alfalfa vocant. nomine ab Arabicis corrupte mutato. Nam (vt lib. 2. cap. de Cot inquit Auicenna) vocatur etiamnum Aphris Alfafasat. Nascitur & in Gallia. Ruellio credimus, ibiq; minus trifolium appellatur. Medica sic Latinis & Italis, vt Græcis μνδίζη nominatur: Mauritanis (vt modo dictum est) Cot & Alfafasat: Hispanis Alfalfe, Eruaye & Alfalfa: Gallis saint Foin vel grand Trefle.

Medicæ nunc apud Italos & Gallos vsitata figuram (cùm Marthiolus non habeat) addere volumus, hæcque dicitur Medica, Dodo. gal. & fol. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lacu. Cast. Cam. Cæsal. Medica sativa Lugd. Fœnum Burgundiacum, Lob. cuius hæc est descriptio, cum Medica Dioscoridis conueniens. Ex radice longa, tenui, lignosa, complures cauliculi cubitales, rotundi, virentes, infirmi, vt plurimum procumbentes prodeunt, circa quos folia trifoliorum forma, initio latiora, dein minora, oblonga, per ambitum serrata: flores Trifoliorum forma in foliorum alis quasi in spicam exeunt, colore cœrulei: quibus succedunt siliquæ cochlearum similitudine, sed angustiores, vt cornu arietis intortæ, in duas treve spiras contractæ, quæ semen minutum, oblongum & flauescens continent. Variat floribus cœruleis, violaceis, ex cœruleo purpureis, subnigris, mixtis & etiam luteis in Hispaniæ syluestribus, vt & Gallia Narbonensis reperitur. Apud Hispanos fœni gratia in agris seritur, & singulis æstiuus mensibus demeti solet, siquidem multos annos radice viuat.

Aphaca

APHACA.

CAP. CXLII.

a Me. Fru-
vot. i. fru-
tex est.

Aphaca a in aruis nascitur, altior lente, tenuibus foliis: siliquas lenticula maiores fert, in quibus ternana, quaternave semina nigra lente minora, continentur, quæ adstringendi vim habent: quare torrefacta, stomachi, aluiq; fluxiones sistunt, si fresca lentis more decoquantur.



Aphacæ con-
sideratio.

Non solum in vniuersis Italia locis Aphaca sponte nascitur inter segetes, sed & à multis in campis seritur leguminum & erui modo, ad columbarum saginam. Folio germinat vicia maiore, crassioreq; quadrangulari caule, flore subtrabeo, siliquis inde dependentibus pisorum instar, breuioribus tamen, sed lenticula maioribus, in quibus includitur semen, vicia quadantenus maius. Goritiensi agro frequentissima nascitur inter segetes, & prope sepes. Quo fit, vt maxime aberrant, qui censent Aphacam nihil à Vicia differre, quæ inter segetes vbiq; copiosè prouenit, & seritur quoq; ad columbarum, aliarumq; volucrum saginam. Quippe quod hæc minori sit folio, Aphaca angustiori, in acutum desinente: tenuiori caule: bicubitali, qui clauiculis è ramusculorum summitatibus prodeuntibus, segetibus sese implicat, flore in purpuram rubescente, siliquis longioribus, gracilioribus ac rotundioribus, nigro semine stipatis, Orobi magnitudine. Ea q; propter de Aphaca & Vicia differens Galenus lib. 1. de alimentorum facultatibus, ita scribit: Aphaca & Vicia seminum figura non rotunda

Quorundam
lapius, Apha-
cam cum Vi-
cia confun-
dentium.
Galenus de
Aphaca &
Vicia.

Vicia
I. APHACA.

Vicia sativa
II. VICIA.



est, veluti fabarum, sed aliquantò latiuscula, similiter lentis. Hæc quoq; cum sua planta, & valvulis integra rustici reputant, vt brutis pecudibus pabulo sint. Per famem tamen quosdam noui, qui hæc quoq; comederint, potissimum vere cum etiamnum virent, quemadmodum fabas, & cicera esitare consueverunt. Semina autem hæc non solum insauia sunt, sed concoctis

concoctum etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, cum huiusmodi naturam obtineant, alimoniam
 quae ex ipsis in corpus permanat, improbi crassiq; succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem: hacten-
 am Galenus. Aphaca semen, vicia modo amarum est, & terrena essentia, ideoq; abstersoria est facultatis, adstringendi
 quae vim habet. Vicia excalfacit, & siccatur, mundatur, abstergit & adstringit. Viribus non differt ab Aphaca. Sed non de-
 scribitur, qui scribant, Aphaca & Vicia farinam, urinas ciere, tabidosq; iuuare, vbi ex ptisana frequenter sumatur. Illinitur
 quae, vtiliter vino subacta, ad serpentium, hominum, canum, ceterorumq; quadrupedum morsus: melle excepta, & illita
 lentiginis, varos & cetera cutis vitia delet. Ceterum illud animaduertendum est, quod Theophrastus lib. 7. cap. 7. & 11. de
 plantarum historia Aphacam inter intybacea, vel cichorij genera connumerat. Quare mirandum non est, si etiam in alijs
 quibusdam a Dioscoride discrepet, quemadmodum in coronopo, orobanche, ac alijs nonnullis ostendimus. Nec mirum et-
 iam Plinium hac in historia variasse: nam lib. 27. cap. 5. Dioscoridis Aphacam ad verbum retulit: libro vero 21. Theophra-
 stam secutus, eam inter cichoracea reposuit. Quae Graecis ἀφάκη: Latinis item Aphaca & Aphace nuncupatur: Arabibus
 Aphak, Afaki sine Albikia: Italis Aphaca: Germanis Wilde Wicken vnd Bogels Wicken: Gallis Vesse sauage. Vi-
 cia Graecis βίχιοι: Italis Veccia: Germanis Wicken: Gallis Vesse.

Aphacae vi-
res.

Aphaca inty-
bi genus.

Nomina.

Vicia à vinciendo Varroni, quod capreolis se vincire soleat: hæc fatiua est & syluestris, vel angustio-
 rellatiore folio: & horum rursus differentia. I. Vicia latiore folio. C. B. Aphaca, Matth. Aphace,
 Fuch. Vicia maior sylu: Trag. Vicia, Dod. gal. & fol. Lacu. Ges. hor. Lob. Vicia sylu. Lon. Vicia vera, Lug.
 Cracca maior, Tab. II. Vicia angustiore folio C. B. Eruum, Brunf. Vicia maior & Orobus, Trag. Vicia,
 Matth. Cord. in Diosc. Fuchf. Lon. Vicia vulgaris fatiua, Clus. Pan. Aphaca vera, Lugd. Arachus Dod.
 gal. Cracca primum genus, Dod. folio.

Πράσιον κεφαλαίων.

PORRVM CAPITATVM.


CAP. CXLIII.

Capitatum porrum inflationem facit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, urinam
 ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratam
 vesicam renesq;: cum ptisana vero coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris, & aceto
 cocta, in deflectionibus ad præclusiones vuluæ, & duritias, vtilis habetur. Porrum bis aqua mutata co-
 ctum, tum frigida maceratum, dulcescit & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstricto-
 vim habet: quare succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluvia sistit, maximè si
 naribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vitia, a tabemq; pro delinctu efficax est: ar-
 teriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex mel-
 le potus aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoq; cum aceto aut thuris polline, lacte
 aut rosaceo, vtiliter aurium doloribus, & sonitu instillatur. Varos tollunt folia illita cum rhoe, qua ad
 obsonia vtuntur: epynictidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones co-
 hibent, seminis drachmæ binæ, cum æquali baccarum myrti pondere potæ.

a Omnia exē.
 ή προς τα εν
 θώρακι πάν-
 τα σιω μέλιτι
 αν. ευλειαν. εν
 ποσει ή προς
 φθίσεις βρω-
 θεν, κ. θέρει
 δε και πλε
 αρτηρίαν. I.
 & ad omnia
 thoracis vitia
 cum melle
 pro eclegma-
 te vsurpatnr.
 Facit etiã ad
 phthisim co-
 mestum, sed
 & arteriam
 purgat.

PORRVM SECTILE.

PORRVM COMMVNE.



Allium porrum p. sectile, L.
 A. siliquosum p. sectile, L.
 C. B. 72. 111

Porrum

C. B. 72

Porri confid.

Porum, quod copiosum quadragesimalis nostri ieiunij tempore plerunq; in foris olitorijs vnà cum oleribus venale copio- sumq; reperitur, omnibus notissimum est. Caterum etsi magnopere laborent hortorum cultores, vt eorum porri, longi, crassi, candidi ac teneri euadant, nesciunt tamen eos capitatos efficere: quamuis ij apud veteres in frequentissimo vsu fuisse- sent, quod longis, qui proprie sectiui appellantur, sapidiores, gustuiq; gratiores haberentur. De his igitur tanquam praestan- tioribus scripsit Dioscorides, non tamen quod à sectiuis genere differrent, è quibus mangonio capitati sunt, tegula in trans- plantatione supposita, incisus prius ante medullam folijs, ne adolendi facultas in sublime feratur, nec ad radices, sed in i- pso capite confideat: vel sarculo conuelluntur radices, vt delumbata alant, neq; distrahant, vt scriptum reliquit Plinius lib.

Capitatum porrum.

Sectiuū por- rum ex Colu- mella vt fa- ciendum.

Porri descrip.

Porri facult. Matthiolo.

Porri facult. ex Galeno.


19. cap. 6. Quae quidem Columella accepta referre debemus: Quippe qui lib. 11. de re rustica cap. vltimo: Porrum, inquit, sectiuum facere velis, densius satum praeceperunt priores relinqui, & ita cum increuerit, secari: sed nos docuit vsus longe me- lius fieri, si differas, & eodem more quo capitatum modicis spatijs, id est, inter quaternos digitos depangas, & cum conua- luerit deseces. In eo autem quod magni capitatis efficere voles, seruandum sit, vt antequam translatum deponas omnes radi- culas amputes, & fibrarum summas partes intondeas: tum testula vel conchula quasi sedes, in singulis subiecta seminibus adobruuntur, vt fiant capita latioris incrementi. Cultus autem porri capitati assidua sarritio, & stercoratio est, nec alim- tamen sectiui, nisi quod toties rigari & stercorari, sarririq; debent, quoties demetitur: hac ille. Est Porrum capitatum, fo- lijs allio similibus, latioribus tamen, ac longioribus, carinatis, & in acumen desinentibus. Ceruix illi longa bulbosaq; can- didans, crassiori summitate: radicibus multis ijsq; tenuibus capillata, & numerosis tunicis circumcompacta: binum in caulem profilit, caepe modo, longum cauumq; floribus in cacumine in orbem conglomeratis: semine nigro, capaceo non absumis. Se- ritur in hortis. Illinuntur decocta folia ad tumentes, dolorificasq; hemorrhoidas, magno sane auxilio. Folia melle subacta illinuntur vtiliter ad phalangiorum & caterorum venenosorum ictus: caput cum ceruice coctum, & ex melle delinctum, praestat ad omnia trachea arterie, & pectoris vitia. Sumitur sub cineribus tostum, ad fungorū venena. Crapulam & ebru- tates discutit. Semen ex passo potum, vrinae difficultates soluit. Porrum non transplantatum cum terrenis vermibus, in oleo decoctum ad tertias, contumacia aurium vlcera sanat, si quotidie oleū in aures infundatur. Porri facultates recensuit Ga- lenus lib. 2. de alimentorum facultatibus, vbi simul etiam de allio, & capis agens, sic inquit: Harum plantarum radicibus percrebro vescuntur homines, rarius caule folijsq;, acri admodum facultate praeditis pro radicum portione. Corpus excal- faciunt, & crassos in eo humores extenuant, glutinososq; incidunt. Bis tamen aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur, quanquam ne sic quidem vim perdunt extenuandi. Verum facultatem quandam obscurissimam alendi corpori ex- inde acquirunt, cuius antea, quam decoquerentur, nihil prorsus obtinebant. Caterum allium non modò vt obsonium, ve- rum etiam vt medicamentum sanitati accommodum, quod obstructa soluere & discutere possit, vsurpatur. Aliquam inter elixum, vsq; dum acritudinem abijciat, viribus quidem suis imbecillius fit, sed succi prauitatem non amplius seruat, quam admodum nec porri, nec caepe, cum bis fuerint decocta. Porrum SECTILE non differt à capitato, nisi quod capite fit te- nuiore ac etiam ceruice. Ea omnia prestare valet, quibus capitatum pollere diximus. Πράσον κεφαλιόν id vocant Graeci, quod Latini Porrum capitatum: Arabes Curat seu Kurat: Itali Porro Capitato: Germanilauch: Hispani Puerto: Galli Porreau. Porrum sectile, Graecis πρᾶσον τμηθὲν, Italis Porro minore.

Ἀμπελόπρασον. AMPELOPRASVM. CAP. CXLIII.

Ampeloprasum stomacho magis quam porrum aduersatur: plus autem excalfacit, vrinam & menses vehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

I. AMPELOPRASVM.

* II. AMPELOPRASVM proliferum. *



Handwritten notes at the bottom left of the page, including the number '72. VII'.



Provenit agreste porrum plerunq; in vineis, vnde à natalibus ἀμπελόπρασον quasi vineale porrum, Græcis appellatur. Agrestis porri confid. Nascitur hoc in vniuersa Hetruria non solum in vineis, sed etiam frequens admodum secus sepes in agrorum marginibus & in amaranthi locis. Rura nostra ipsum vulgari sermone appellant Porranello. Porri faciem representat, sed minus acruice capiteq; longè minoribus, & ad mandendum durius acriusq;. Estur à rusticis, & agricolis in acetarijs crudum, recentis ally vire: quanquam mansu durius sit, gustu acrius, & concoctu difficilior. Est præterea Ampeloprasum (vt lib. 6. simplicium medicamentorum prouidit Galenus) acrius & siccius domestico, sicut agrestia omnia reliqua domestica: ut proinde stomacho, quàm illud nocentius: sed & crassos, ac lentos humores potentius incidit, valentiusq; infarctam organa obstructione liberat. Hac quoq; ratione vrinas, & menses saepe prouocauit, vbi à crassis & lentis retinebantur humoribus. Adèd vero est calidum, vt illitum cataplasmatis modo exulceret. Dicitur est autem antè, quod quæ eum in modum sunt calida, extremi sint ordinis: hætenus Galenus. Caterùm illud silentio haud dissimulandum puto, quod Galenus minus fortasse rectè id tribuerit Ampelopraso, quod nominis significationi reclamatur, & potius scorodopraso committere videtur, cum loco citato inquit: Si inter allium & porrum medium quiddam concipias, facultatem ampeloprasifruentem. Quandoquidem scorodoprasum, teste infra Dioscoride, vt ally & porri vires, ita & nomen sibi vendicauit: ampeloprasum verò dictum est, quod in vineis nascatur. Id quod ipsemet Galenus confirmat libro 8. simplicium medicamentorum his verbis. Scorodoprasum sicut gustu, & odore mediam ally & porri qualitatem possidet, ita et vires. Et lib. 2. de alimentorum facultatibus: Ampeloprasif (inquit) à porro tanta est differentia, quanta in alijs congeneribus plantis inter syluestria & satia inuenitur. Sunt qui hoc in totum sequentem annum reponant, aceto condientes, haud aliter quàm cepas, ex parte cibo commodius, & prauo minus succo obnoxium efficitur. Quod ἀμπελόπρασον Græci, Latini Porrum agreste, & Ampeloprasum dicunt: Mauritanij Nabati: Itali Porro saluatico & Porranello: Germani Wildlauch: Hispani Ajos & Puerros de las vinbas: Galli Porree de chien, siue Porreau sauuaige.

Ampeloprasum PROLIFERVM, ex radice rotunda candicante oblongis fibris capillata, catulis exurgit cubito minor, viridis, rotundus, læuis baccis, in quo quaterna plerunq; folia oblonga, angustiuscula, immixta caput infidet, duabus membranis laxis in oblongam caudam ambeuntibus obuolutis, quibus apertis in medio quasi bulbi simul congesti conspiciuntur, vnde flores purpurascens, ex oblongis pediculis dependentes prodeunt: quibus succedunt quasi cornicula semen nigrum continentia. Huius plures differentia, de quibus in historia nostra. Hoc Ampeloprasif Matthioli nomine Camerarius in sua editione exhibuit, & Ampeloprasum proliferum Lobelo dicitur: cui simile Allium, siue Moly montanum secundum gramineo folio, Clus. Pan. & Bulbi syluestris species prima apud Cæsalpinum.

Κρόμμυον CAEPA. CAP. CXLV.

Cæpa longa acrior est, quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent & extenuant, fastidium pariunt & expurgant, aluo vtilis sunt. Ex detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosque excretionum exitus referant, subditæ pro balanis. Succus cum

CAEPA CAPITATA. CAEPA SECTILIS.



Allium cepa, L. stemm. Allium sectile, L. melle

melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: an-
ginæ eodem perunguntur: suppressos menses pellit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cum
aceto, ruta & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitilignes sanat: & cum pari spodio,
scabras lippitudines sedat, varos cum sale reprimat: contra calcamentorum attritus, cum gallinaceo
dipe utilis est: citæ aluo prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad purulentas aures, & e-
liciendam earundem aquam, valet: alopecia earum succo perfricantur, qui celerius quam alcyonium pu-
los euocat. a Largiore cibo capæ capitis dolores ciet, coctaq; vehementius vrinam pellit: eos lethargi-
cos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo vescantur: elixa & cum passis vuis & fico

a Meū & Dra
βσι δ' ε' κε-
φαλαλγες,
πλεοναθεν-

los euocat. a Largiore cibo capæ capitis dolores ciet, coctaq; vehementius vrinam pellit: eos lethargi-
cos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo vescantur: elixa & cum passis vuis & fico


λα δ' εν νόσοις λιθαργικς ποιεί, ε' φθεία δ' ε' ερη' κω' τερον γινέαι. i. capitis dolorem inducit, si verò vberius edatur in morbu.
lethargos facit, cocta verò magis diuretica euadit. Cat. verò sic βσι δ' κεφαλαλγες πλεον βρωθει, ε' φθέν δ' ε' ερη' κω' τερον γι-
νέαι, πλέεν δ' ε' ε' ομμενον εν νόσοις λιθαργικς ποιεί. i. capitis dolorem inducit largius comesta. Cocta verò magis vrinam
mouet. Vberius verò comesta in morbis lethargicos facit.

Caparum hi-
stor ex Theo-
phrasto.


Caparum plura diuersaq; Theophrasto notantur genera lib. 7. cap. 4. de plantarum historia, vbi sic habet: Different
& capæ & allia genere. Sed Caparum genera plura, vt quæ a locis nomina accepere: Gardia, Cnidia, Samothracia-
tem Setania & Fissiles, & Ascalonia. Ex his Setania minima, sed largè dulces. Fissiles verò & ascalonia, tum cultu, tum
natura inter se differunt. Fissilem etenim hyeme sua cum coma, inertem relinquunt, vere externa folia detrahunt, & vbi-
qua colunt: detractis his folijs, altero germinant, simulq; inferius funditur, vnde fissiles appellatae sunt. Quidam vel omni-
bus detrahenda folia censent, vt vim suam imo contineant, neq; effusa seminescant. Ascaloniarum peculiaris quadam na-
tura notata est: etenim sola fissiles, & quasi steriles, ab radice consistunt, nec ea parte crescere ac proficere possunt. Quan-
obrem non eas deponunt, sed semine ferunt: deinde circa ver, cum germinatum sit, transferunt. Perficiuntur adeò celeriter,
vt cum ceteris, aut etiam prius euelli possint. Plus temporis dimissa in terra, putrescunt. Plantata caulem edunt, seminaq;
tantummodo fundunt: tum exinaniuntur atq; inarescunt. Harum igitur talis natura est. Differunt & colore nonnullæ:
etenim apud Isum cetera quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, Sardinianaq; simi-
liter ferre affirmant. Cretensium peculiaris maximè natura notatur, sed Ascalonijs quodammodo proxima, ni forte vel
eadem dici debeat. Est enim in Creta genus quoddam, quod semine quidem satum in radice crassatur: depositum verò in
caulem seminaq; totum funditur: sine capite, saporeq; dulce est. Id enim quasi è contrario ceteris habet: omnes namq; de-
posita melius, celeriusq; perficiuntur. Omnes post arcturum proueniunt, tepido adhuc solo, vt depositas imbres occupent.
Seruntur & toto capite, & circumciso, sed germinationes haud similes fieri solent. Parte namq; inferiore capæ nascun-
tur, superiore herba tantum erumpit: secta verò in rectum, germinare omnino nequeunt. Gethyum dictum sine capite est,
& quasi longa ceruice consistens: ob id germinatio tota in fronde, sapiusq; retondetur, vt porrum: qua de causa semine fer-
tur id, nec deponitur. Capas hisce ferè differentijs discernere licet: hætenus Theophrastus. Nascuntur Capa in vniuersa
Italia frequentissima, quæ etiam inibi multiplici signantur genere, vt refert Plinius lib. 19. cap. 6. & vt nos quotidie vide-
mus. Capæ folijs proueniunt longis, fistulatis, teretibus & acuminatis. Caule verò cubita i maioriq;, tubæ faciem præsefe-
rente, inani ac fragili, in cuius summitate flores exeunt in globum sese stipantes, è quibus semen oritur nigrum, porraceo si-
mile. Radice nititur bulbosa, sessili, rari rotundi instar, & inferiori parte fibrata: sed etiam in his notantur differentia.

Gethyum.

CAEPA FISSILIS.



CAEPA ASCALONICA.



Quadr.
A. ascalonicum
C. 3. 72. VII

Quandocumque forma alia maiores, alia minores, quadam longae, quadam rotundae, quadam vero sessiles proueniunt. Si- Caparum va-
 cur colore rubentes, & subrubentes alia, quadam virides, & candida nonnulla. Quin & sapore vel acerrime, vel melleo- rix species.
 ri acrimonia praedita sunt, aut nihil penitus acres inueniuntur. Omnium maxima sunt, quae Caieta Romam importan-
 tur. Haec tamen ad summum rubescant, ac crassioribus tunicis compacte sint, leuiuscula tamen acrimonia pollent, mansu-
 que tenerrime comperiuntur: ob idq; in cibis ceteras antecellunt. In Hetruria ea minus acres notantur, qua magis rubent:
 contra vero alba, quippe qua omnium ibi acerrima proueniant: Quam ob causam ad medicamenta potius, quam ad cibos
 feruntur: quanquam secus fortasse in Graecia eueniat, quod si uas candidis aciores esse memoret Dioscorides, Capa se-
 ctilis, folijs exit, caule, floribus & semine, vulgaris cepa similibus, sed longe minoribus, tenuioribusq;. Bulbis vero ac-
 crue, oblongis, tenuibus & minimè capitatis: ob idq; germinatio tota in folijs, saepiusq; retondetur, vt porrum. Seritur
 10 in hortis ad obsonia, & condimenta paranda. Iisdem potest facultatibus, quibus vulgaris cepa dotatur. Capa fissilis,
 facie tota Ascaloniam refert, nisi quod omnibus suis partibus maior spectatur. Bulbi plures ab vna tantum radicum coma
 oriuntur, longa tenuiq; ceruice nitentes, Ascalonia modo, sed acredine differentes. Habentur passim in hortis, in Hetruria.
 Ea omnia possunt, quae & cetera genera. Connumerantur etiamnum inter caparum genera (vt locis supra citatis Theo-
 phrastus & Plinius testantur) quae ASCALONIAE ab Ascalone Iudae oppido appellantur, & quae his similes sunt Theo- Ascalonia.
 phrasto sectiles nominatae, nobis verò in Hetruria vulgò Cipolle maligie. ASCALONIA, folijs prouenit tenuibus, lon-
 gas, secretibus, fistulosis, in acutum desinentibus, ceruice pariter tenui, bulbis numerosis, ab imo radicum cespite prodeuntib.
 paulo nuda auellana maioribus, parui fici faciem representantibus, sapore admodum acri, haud tamen ingrato. Seruntur
 Ascalonia cepa in hortis ad ciborum condimenta. Excalciant & siccant: incidunt, aperiunt, prouocant, deijciunt. Non
 solum ea omnia praestare possunt, quae cetera caparum genera, sed cibi appetentiam faciunt: vermes intestinorum necant,
 20 & caput non adeò ladunt. Datur Capa vtiliter deuoranda, elixa, aut sub prunis tosta, cum saccharo, anhelosis, asthma-
 ticis, & suffocantibus, addito butyri momento. Excavatur alba ea parte, qua sunt radices, & praestanti repletur Theriaca, Caparum vi-
 cura in li succo thibacta: & deinde occluso foramine, sub calidis cineribus coquitur, donec probe fuerit macerata: deinde res Matth.
 premittitur, & exprimitur cremor, is sanè perutilis, qui pestilentia laborant, sed illico sudare oportet affectos. Excavatur item,
 & cumini puluere repleta coquitur, & exprimitur eodem modo, instillaturq; vtiliter succus ad aurium surditatem. Cras-
 sior Capa squama sub feruenti cinere tosta, antiquum capitis dolorem sedat, vbi frustulum eius calidum in dolentis lateris
 aurem introducatur, super asperso rosaceo & laurino oleo, succidaq; addita lana, quae totam operiat aurem. Capa succus
 cum acerrimo aceto mistus, sanguinem è naribus manantem sistit, is inmissus. Capa (vt memoria prodidit Gal. libr. 7. Caparum
 simp. med.) ex quarto est ordine excalfacientiam: essentia autem eius potius crassarum est partium. Vnde etiam haemox- vires ex Gal.
 rhoidis aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tum alopecijs attrita pilos alcyonio citius re-
 30 fixit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terreae substantiae est, eiusq; calida: at succus aquea,
 atque caliditatis. Hic igitur is, qui suffusi sunt, aut aciem oculorum obtusam praecrasitudine humorum obtinent, inun-
 ctum prodest. Ex huius temperatura tota cepa flatuosa est manducata. Itaq; quae temperatura sunt sicciore, minus flatuum
 generant: haec Galenus. Quod autem Capa corporibus prebeant alimentum, supra in porri mentione retulimus ex ipso
 Galeno, qui de his simul differuit. lib. 2. de alim. facult. Κρόμμυον Graecè, Capa & Cape Latine vocatur: Arabicè Basil seu
 Bassal: Italicè Cipolla. Germanicè Zwibel: Hispanicè Cebolha: Gallicè Fiboule & Oignons. Capa sectilis, Graecis κρόμ-
 μυον τμηθόν: Italis Cipolle settiuole. Capa fissilis, Graecis κρόμμυον σχισθόν: Hetruscis Cipolle malige. Capa Ascalonia,
 Graecis κρόμμυον ἀσκαλωνίων: Italis Scalogna.

Σκόροδον.

ALLIUM.

CAP. CXLVI.

40 Allium quoddam satium atq; hortense habetur, quod in Aegypto, singulari vt porrum capite con- Conclufa ita
 stat. [dulce, in purpureum vergens, paruum: reliqua verò magna & candida,] ex pluribus coagmen- legit Oriba.
 tantur nucleis, quos aglithas, id est spicas, Graeci nominant. Aliud est syluestre, quod ophioscorodon: id λευκόν κ' λε-
 est anguinum, vocant. Vis allii acris est: excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, sto- πόν. i. cādi-
 machum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutim exulcerat: aciem oculorum do ac tenui.
 esu hebetat. a [Eosdem effectus praebet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur] latas ventris ti-
 neas in cibo sumptum abigit, vrinas detrahit: contra viperarum ictus, & priuatim haemorrhoi, prodest, a Catacuz.
 ita vt non aliud magis, si cum vino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum Ελαφοσκο-
 morsus, & illitu & cibo valet. Magnae & allio utilitates contra aquarum mutationes: vocem clarificat: ροδον οί ο' α-
 veterem tussim crudam coctumve lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos & lentes enecat: γελοσκορο-
 cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecijs cum nardino vnguine, medetur: eruptiones δον. Ρωμαίοι
 papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines, lichenas, lentigines, vlcera capitis manantia, lepras & fur- άλλιυμ κερ-
 fures, cum melle eximit: cum thure & reda decoctum dentium dolorem leuat, si in ore contineatur: είνεμ, φύλαγ
 contra venenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus & cumino illinitur. Feruefactae comae εν όρεινοίς κρη-
 ems, foeminarum deflectionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia suf- τραχέος χα-
 fitur. Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod myttoton vocant, esu cit vrinam, ora venarum pate- ελοίς έμφερες
 facit, hydropicis vtile. τος όφιοσκο-
 ρόδω, δ' ύδα-

60 μω δ' έχει δρυμείαν, θερμαινικλή, δηκτικλή, φυσώδη, κοιλίας παρακτικλή, ξηραντικλή, σωμαχική, ποιητικλή διψας. i. Elaphoscoro-
 don, quod & syluestre scorodum. Romanis allium ceruinum. Nascitur in montanis & asperis collibus. Simile est ophioscorodo. Vim au-
 tem habet acrem, excalfacientem, mordacem, flatuosam, aluum turbandi, stomachum siccandi & sitim faciendi.

Allium vulgaris est notitia. Duum est generum: Satium & syluestre. Huius plura sunt genera, nempe Ophioscoro- Allii confi-
 don, Elaphoscorodon: vrsinum & Anguinum alterum. SATIUM, folijs prouenit porro similibus, minoribus ta- deratio.
 men, ceruice longa, capite bulbofo, quod pluribus coagmentatur nucleis siue spicis, sapore acri, sed ori non ingrato. In hortis
 & campis seritur. Ceterum quanquam scribit Dioscorides Allium, quod non coherentibus nucleis siue spicis, sed singulari
 & solido capite consistat, in Aegypto nasci: eiusmodi tamen & in Hetruria, & in compluribus alijs Italia locis prouenit, i- Allii descri-
 70 biq; Allium mas appellatur. Alij meminit Theophrastus lib. 7. cap. 4. de plant. histor. sic inquit: Allium ante solstitia, ptio ex The-
 aut paulo post solstitia seritur nucleatum diuisum. Discrimen eorum, quod aliud praecox: aliud serotinum: est enim genus ophrasto.
 quoddam eiusmodi, vt sexaginta diebus perfici possit. Differunt praeterea magnitudine singulari. Cyprium vocatum ma-
 xime

I. ELAPHOSCOR. OPHIOSC.
& Allium domesticum.

II. ALLIVM ANGVINVM



III. ALLIVM VRSINVM.



xime tale est, quod non decoquunt, sed in stratori mutantur: & cum tunditur, mirū quam spuma increseat. Quia & illud differentiam facit, quod quadam non nucleis coagmentantur. Ductedo autem, & odor & crassitudo, eorumq; causa, tempore, cultuq; penē videntur contingere, ut etiam aliorum. Perficere femine potest, sed tarde: primo etenim anno caput accipit, sequente discerni in nucleos incipit, tertia reddetur perfecta, nec quicquam defertur, sed etiam quidam vel deposito melius id existimant. Radicis autem Allij, aut cepa haud simili ortus fieri solēt: allij namq; cum nucleis extumuerit, tota intorquetur: & hinc aucta in nucleos rursus discernitur, atq; ex vno pluraficiuntur, dum caput consummatur. At Cepa continuo ab radice aliud, atq; aliud obducit, ut & bulbis, & Scylla, & eiusmodi omnia. Etenim allia & cepa, si non euellantur, plura indies fiunt. Super fistula quoq; & allium capitari posse, & cepa affirmant: haec Theophrastus de allio domestico. SYLVESTRE vero, quod Graeci οφιοσκορδον, id est, anguinum allium vocant, vbiq; in montib; praesertim, & collibus nascitur, singulari capite constat, nullis diuisum nucleis, satiuo longē minus, sed odore & sapore illi persimile: folijs angustioribus, gracili caule: in cuius cacumine flos emicat, ex rubeo purpurascens, a quo nigrum gignitur semē. Simile huic habetur, quod ελαφοσκορδον (Graeci vocant, id est, ceruinum Allium) appellatur. Quare vitruvius vna cum domestico, quod medium locum tenet, hic appingitaurimus. Atqui cum ophioscorodon aliquando in montibus legerem vna cum alijs herbarijs, nobis occasionem praeiit la- quandi de errore detestando, in quo turpiter versati sunt Arabes, & eos secuti: quod pro scordio herba, qua trifolium nem folijs emulatur, de qua Andromachus & Galenus

Allium syl-
vestre.

Arabū lapsus.


Brasauoli
error.

tellegerant, allium sylvestre in pastillos theriacos addiderint, & in illius locum suffecerint, non minus vocabulo- rum vicinitate, quam imperitia decepti, ut sequenti libro in scordij mentione (Deo fauente) latius explicabimus. Per- rō illud hic silentio non dissimulandum duxi, ne forte seplasiarjs imponat, quod Brasauolus aperte falli deprehendit li- bro suo de simpliciu examine Roma prius excuso, vbi sylvestre allium ampeloprason siue scorodoprason a rei medica an- tribus appellari scribit. Qua in re non vno tantum, meo quidem iudicio, sed duplici, pace eius dixerim, notatur er- re. Primum quod existimauerit, allium sylvestre scorodoprasum vel ampeloprasum esse. Deinde quod certo crede- rit.

ria ampeloprasum, & scorodoprasum vnam & eandem plantam esse. Hi Brasauoli errores manifestè redarguuntur Dioscoridis autoritate. Siquidem is non solum eas plantas nominibus, sed etiam capitibus & facultatibus distinxit: quem etiam secutus est Galenus, licet, vt in ampelopraso diximus, huic tribuerit, quod scorodopraso tribuendum erat. In his igitur Galenus.
 palam sit, allium syluestre ophioscorodum appellari: syluestre porrum, quod in vineis proueniat, ampeloprason: tertium vero, quod promiscuus allij, & porri facultates obtineat, scorodoprasum. Quare mirari subit Brasauolum virum aliqui dantur, quomodo is, qui simplicium medicamentorum examen conscripsit, hac in Dioscoride & Galeno non viderit, vel non animaduertit. Ceterum plantam, quam hic nouam expressimus, ANGVINVM quoque allium appellare libuit, Allium Angu.
 quod radix non solum genuino allij sapore, odoreq; sit predita, verum etiam, quod folia nigris sint maculis conspersa. Folia propter alio conuallio ferè similia, angustiora tamen, & nigra maculis respersa: quin etiam caulis ipsidem insicitur notis, gu.n.un.
 Draucunculi maioris modo, quo factum est, vt à nobis allium Anguinum fuerit appellatum. Cervice nititur longa: radice bulbosa, inuolucris, vt in croco circumtectâ, numerosis inferna parte fibris, vulgaris allij odore, saporeq; predita. Excalfacit & siccac perinde ac Allium agreste, & suis in facultatibus illi per omnia simile existit. Nunc primum à me inuentum est, dum superiori anno M. D. LXXII. montes qui Bohemiam à Silesia disterminant, in quibus Albi fluius originem ducit, peragratem. Addidimus & VRSINI allij quoq; imaginem, sed cum de viribus hætenus nihil certi exploratiq; habeamus, non est vt latius de eo sermonem faciamus. Folijs exit latis, minoris plantaginis ferè equalibus, frequenter striatis, Allii Vrsini mentio.
 caulis angulosis, in quorum summitate flores sunt in umbella ferè modum se diffundentes. Radice nititur bulbosa, spicataq; lili modo, dependentibus ima sede capillamentis. Nasctur in collibus, in syluis, & aliquando inter segetes. Ea omnia prestare posse creditur, quæ ceteris agrestium alliorum generibus assignantur. Allium (vt Galenus inquit libr. 8. de simplicium medicamentorum facultatibus:) desiccac & excalfacit excessu quarto, quin etiam digerit, obstructions aperit. Exopod or Græci, Latini Allium dicunt: Arabes Chaum, Cairin & Thum: Itali Aglio: Germani Knoblauch: Hispani Alos: Galli Ail & Aux. Allium anguinum: Italis Aglio serpentino. Allium vrsinum: Italis Aglio de gli Orsi: Germani Vår vnd Hunds Knoblauch. Allii ex Gal. facultas. Nomina.

Allium, ab halante graui odore, ab Ægyptiis vnà cum Cepis, pro numine habitū, Plinio lib. 19. cap. 6. authore, & Plutarcho, qui 4. in Hesiodum commentario, cūr coluerint ostendit: cuius nouendecim species in Phytopinace nostro recensuimus: hac prima figura tres proponuntur, Elaphoscorodon, Ophioscorodon & Allium domesticum, cuius genus quoddam capitibus ingentibus ex Africa adfertur: est & quoddam Amphicarpum, quod & radicem nucleis seritur, & seminibus, quæ nucleos similitudine referunt. Quod vero Elaphoscorodon appellatur, dicitur Allium Caninum, Trago, Allium syluestre, Fuchs.
 10 Gef. hor. Thal. Cæsalp. Cast. Allium syluestre tenuifolium, Lob. & Dodo. fol. Ampeloprason, Cord. in Diosc. Loni. Allium tenuifolium, Cam. Ipsius vero Matthioli Ophioscorodon, Allium bicorne vocamus: Allium caninum alterum, Trag. Allium syluestre alterum Fuch. Allium syluestre maius, Dodo. gal. Scorodoprason Lonic. II. Allium anguinum Matth. Lug. Allium serpentinum, Cast. Lob. cui & ophioscorodon. Allium alpinum, Gef. hor. Tab. Cam. Victoralis longa, Gef. hor. Clus. Pan. Hoc folijs est oblongis, angustioribus: est rotundis latioribus: illud scemina, hoc mas censetur. III. Allium vrsinū Matt. Fuch. Dod. gal. Lob. obs. Cast. Clus. Pan. Cæsalp. Thal. Cam. Lugd. Allium vrsinum latifolium, Lob. icon Lugd. Allium syluestre, Brunf. Trag. Cord. in Diosc. Allium syluestre bifolium, Arctoscorodon, Gef. hor. Allium sylv. latioris folii, Dod. folio.

SCORODOPRASVM. CAP. CXLVII.



Scorodoprasum magnitudine porrum æquat, qualitatam porri & allii particeps. Vnde promiscuas sibi vires ex utroq; vendicauit, effectus allii & porri præbens: inefficacius tamen coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum vicem transit.

Quoniam antiquorum nullus, præter Dioscoridem, Galenum & Paulum, Scorodoprasum meminuit, propterea existimat Marcellus arte & cultorum mangonio ex, allio & porro in vnum sub terra colligatis, non autem natura, scorodoprasum prouenire. Sed hac in re Marcellum, pace sua dixerim, cauitisse illud manifesto indicio est, quod compertum sit, legitimum Scorodoprasum natura, non mangonio factum, in compluribus Italia locis sponte sua nasci, in pratorum agrorumque marginibus, & propter sepes: ac inde postea translatum, in hortis & viridarijs depositum virescere, ita vt intuentibus legitimum se ostendat, & Marcelli errorem prodac. Crescit id porraceis folijs, quæ digitis attrita ita allium & porrum simul resipiunt, vt illorum etiam effectus præbeant, quemadmodum rectè prodidit Dioscorides, & Galenus attestatur libro octauo simplicium medicamentorum, his paucis: Scorodoprasum sicut gustu & odore mediam allij & porri qualitatem possidet; ita & vires. Id Græcè Σκοροδοπρασον, Latine similiter Scorodoprasum appellatur: Italice Scorodepraso: Germanice, Aber Knoblauch: Gallice Ail porreau. Scorodoprasum si confid. Marcelli err. Scorodoprasum si vires ex Gal. Nomina.

Σινάπι

SINAPI

CAP. CXLVIII

• Meū & Cat.
 ἐκλεγε μὴ πύ-
 κῃ ἀξίον, πύ-
 κῃ ἀπύρον.
 elige quod
 non obaridū
 est & fuluum.

Sinapi hortense, aliqui napi vocant. • Eligi debet adultum, valde rufum, non magnopere sicum. sed quod fractum interne virefcat, & veluti quodam succo madeat, caesium colore: siquidem recens id genus, tempestivum habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra praeduros tonsillarum tumores, ac veterem callosamque arteria scabritiem, succus ex aqua & melle convenienter gargarizatur: sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum: comitialibus quoq; auxiliatur: foeminas utique strangulata oppressas excitat: lethargicis, de naso capite, illinitur. Cum ficis admistum, donec rubescat lecus, & ad coxendicum cruciatus impositum, ad haeres & omne genus doloris confert, cum permutanda valetudinis causa ex alto vitia extrahenda sunt: alopeciam illitum medetur: faciem purgat: sigillata enim melle, adipe aut cerato rapit: ferae impetigines, & lepra, eo cum aceto perunguntur: contra febriam circuitus aridum bibitur, aut potui, polenta modo inspargitur extrahentibus emplastris, scabiemque extenuantibus vtiliter admisceri solet: tritum grauitati aurium, & sonitui cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna vtilitate cum melle illinitur. Expressus recenti lemne succus in sole siccat.

SINAPI I.



Sinapi conf.
 ex Plinio.

Sinapi, Plinio libr. 19. cap. 8. auctore, trium est generum. Quorum vnum gracili assurgit folio: alterum rapitiam frondem exprimit: tertium eruca folio laciniatur. Haec omnia Sinapis genera obseruantur in Italia: illud siquidem, quod tum folio, tum etiam semine tenui nascitur, erraticum est. Folia habet tenuiora, plura ex vno ramusculo prodeuntia: caulem rectum, firmum, asperum, scabrum, hirsutumq;, a medio ramosum: corniculis numerosis atque hirsutis. Nascitur locis incultis, in campestribus, & inter rudera. Ea omnia praesare potest semen, qua satiuo sinapi assignantur. Quod verotapi fronde constat, caeteris maius, hortense est, caulem mitius vegetum, subhirsutum, a quo ramusculi superioriparte cresunt, in quibus semen subrasum in corniculis prouenit, acc-

SINAPI II.



Sinapis alba
 Sternub.

SINAPI III.



Sinapis raris
 Sternub.

rimo sapore, ac etiam olfactu infestum. Seritur in hortis passim ab olitoribus, eiusq; in officinis vsus. Tertium deinde & i-
 pium acium est, semine albo, minusq; acri. Folijs exit sylvestri eruca similibus, frequenter laciniatis, ramis tenuibus, in
 summitate exeuntibus, in quibus vtrinque siliquula spectantur, albo intus semine, non adeo, vt in alys generibus
 ari: quare non adeo vt illa excalfacit & siccat. Itaq; etsi ad omnia vtile habeatur, ad qua cetera genera, imbecillius ta-
 men est. Tritum hoc, mustoq; recenti commistum, diutius eius dulcedinem tuetur, atq; eam deficere prohibet, quod ebulli-
 tionem reprimat. Ea q; propter qui ex Tridentino agro in Germaniam mustum comportant, hoc Sinapis genere cadus im-
 pto, dulcedinem musti conseruant. Seminis farina illinitur aceto subacta, ad serpentium & scorpionum ictus, pota au-
 tem succurrit fungorum venenis. Manditur semen contra dentium dolores: datur quoq; vtiliter suspiriosis & asthmati-
 ci: sensus purgat: menstrua & vrinam ciet. Illinitur etiam hydropicus ex pueri impubis vrina. Sordities corporis omnes
 expurgat: & cuti natiuum conciliat nitorem, si cum ea aqua subacta fricentur ea corporis partes, qua extergende sunt.
 Fit ex ea intinctus, quem Sinapismum vocant, quo velut irritamento languescens ventriculus ad appetendum cibum ex-
 citatur. Eo enim velut igniculo, morosus palatum titillante, vorandi conciliatur auuiditas, sed huius vis confestim in sub-
 limis fertur, nec aliud magis in nares & cerebrum penetrat. Sinapis temperamentum tantummodo expressit Galenus li-
 bro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Sinapi calfacit, & desiccet quarto ordine. Huic nomen Gracum σινυπι
 & Νατι: Latinum quoq; Sinapi & Sinapis: Arabicum, Cardel aut Chardel: Italicum Senape: Germanicum Senff:
 Hispanum Mostaza: Gallicum Seneue. Sinapi alterum, Gracis σινυπι τρεπον: Italis Senape siue Senauro saluatico. Si-
 napi tertium, Italis Senape bianca siue Rocchetta: Gallis Mostarde blanche & douce.

Sinapis vires
ex Matth.

Sinapismus.

Sinapis vires
ex Gal.

Nomina.

Sinapi σινυπι τρεπον τρεσ οταε, oculos enim laedit, cuius septem species in Phytopinace proposuimus.
 I. Sinapi rapi folio, luteo semine, & Sinapi alterum Plinii. C. B. Sinapi primum, Matth. Lacu. Cæsalp.
 Sinapi, Matth. in icon. Gef. hor. Cast. Sinapi secunda species, Dod. gal. Sinapi fatium prius, Dod. fol.
 Sinapi hortense luteum, Lonic. Sinapi hortense, Cord. in Diosc. Lugdun. Sinapi fatium Eruca aut ra-
 pifolio, Lob. II. Sinapi apii folio, & Sinapi gracile Plinio. C. B. Sinapi, Brunf. Sinapi luteum fatium
 alterum, Trago. Sinapi alterum, Matth. Lacu. Cæsalp. Sinapi primum, Cast. Sinapi hortense, Fuchf.
 Dodo, gal. Sinapi fatium, Lugd. Sinapi fatium alterum, Dodo. fol. Sinapi syl. luteum, Lonic. Si-
 napiagrethe apii aut potius laueris folio, Lob. Hoc semine est vel subruffo, vel albo. III. Sinapi Eru-
 ca folio. C. B. Eruca siue Rucula marina minor, & Sinapi nouum, Trag. Sinapi tertium, Matth. Cast. Cæf.
 Sinapi sylvestre, Dod. fol. Lugd. Sinapi sylvestre minus, Bursæ pastoris folio, Lob. Eruca, Dodo. gal.
 Eruca fatiua, Fuch. Eruca sylu. Gef. hor. Eruca aquatica, Lonic. Luteo & albo flore est. Elegans est etiam
 Sinapi paruum, siliqua aspera, cuius descriptionem in Phytopinace dedimus.

Καπσαρον . . . NASTVRTIVM . . . CAP. CXLIX.

Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho ad-
 uersatur, aluum turbat, tincas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem sti-

I. NASTVRTIVM.

II. NASTVRTIVM CRI-
spum latifolium. *



N n ; mulat,

mulat, sinapis & erucæ simile intelligitur: lepras & impetigines abstergit. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum resistit, atq; eas iussu fugat: capillorum defluvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit: coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur: tumores, collectionesq; dilcutit: erant furunculos illitum cum muria. Herba ad omnia eadem effectus, licet minor.

Nasturtii cō-
sideratio.


Plinius nota-
tur.

Nasturtii vi-
res Matth.

Nasturtii vi-
res ex Gal.

Nomina.

* III. NASTUR. CRISPVM
Angustifolium. *



* IV. NASTURTIVM LA-
tifolium. *



Nasturtium hortis familiaris & frequens herba est, tenuis folijs parvis, laciniatis: caule tenui, sesquipedali: flore albo: semine in rubeum nigricante, folliculis rotundis ac pressis contento, thlasi modo, acris sapore. Scribitur passim in hortis & usurpatur ad ciborum condimenta & intinctus, & venit quoq; alijs cum herbis in acetarijs. Plinius auctor est libro 26. cap. 13. album & nigrum reperiri. Verum cum Nasturtium Venerem inhibere scribit, vel codicem eo in loco depravatam, vel Plinium ipsum Nasturtij naturam non recte novisse, & ideo in hoc deceptum esse crediderim, quod experimentis, & Dioscoridi repugnet. Excalfacit, attenuat, mundat, aperit, vrit, extrahit, resoluit & incidit. Animum exacuere videntibus traditur, unde animi torpore affectos ad nasturtium deorandum adhortatur adagium. Succus dentium dolorem mollet, si calidus in aure dolentis lateris fuerit insillatus. Semen denariorum decem pondo ex aqua potum bilem subducit, capitis vitia purgat, visumq; clarificat. Nasturtij semen (vt lib. 7. de simplicium medicamentorum facultate memoria prodit Galenus) adurentis facultatis particeps est, sicut sinapi. Promde coxendicis, & capitis dolores atq; adeo quodcumq; aliud rursus clarificationem postulat, eo perinde atq; sinapi excalfaciunt. Miscetur quoq; remedijs, quæ exhibentur asthma, uti is, tanquam succet id, quod crassos succos valenter incidere valeat: velut & sinapi. Nam omnia ei simile est. Porro & herba arefacta simili semini vim possidet. Humida verò adhuc, & viridius propter aqueæ humiditatis admisionem, multò semine inferior est: adeoq; sic mordacitas eius moderata est, vt cum pane ea trahatur, ceu obsonio. Καρπὸς αἰπόριος Grecis: Nasturtium Latinus vocatur: Mauritanis Norf alchef seu Nars: Italis Nasturtio & Agretto: Germanis Rrussen vnd Gartenkreut: Hispanis Nasturto & Malpica: Gallis Cresson de jardin & Nasturt.

Nasturtium à narium tormento Plinio libr. 19. cap. 8. quod diuidimus in hortense, pratense, aquaticum & montanum: hic de hortensi, quod triplex, latifolium, commune & minus. I. Nasturtium hortense commune, seu Nasturtium album Plinii. C. B. Nasturtium, Brunf. Matth. Anguill. Cord. in Diosc. Lon. Lac. Dod. gal. Lob. obs. Cæs. Cast. Taber. Cam. Nasturtium hortense, Trago, Fuchf. Dodo. fol. Lob. icon. Lugd. Nasturtium maius album, Ges. hor. Variat, aliud enim est foliis simplicibus, quod læue & album: vel subhirsutum, minusque album: aliud foliis valde diuisis, hocque maius & minus: illud crispum & non crispum. Quod crispum est, vel II. latifolium est, vel III. angustifolium, vt ex figuris adpositis colligere est, nec alia descriptione indiget. Vtrumq; copiose vidimus in horto Abbatiae S. Fridolini in Seckingen, cum Reuerendis. Princip. D. Iacobæ à Sultzbach eius canobii Abatissæ, valetudinis causa adessemus, & quidem semine ex Turgauia allato. IV. Nasturtium hortense LATIFOLIUM ex radice oblonga, tenui, leuiter fibrosa, caulem emittit cubitalem, rotundum, qui in alios brachiatur: folia ad radicem plura, longis pediculis donata, quæ nec diuisa, nec laciniata, sed longa, integra, obscure serrata: quæ verò in caule obseruantur quemadmodum & flores & rechæ, vulgari Nasturtio respondent: sic & color & sapor idem. A fratre D. Iohanne Bauhino, Ill. Ducis V. Vitenbergci Archiatro, primò accepimus.

Nasturtium latifolium
Staud.

Thlaspi herbulz est angustis foliis, digitali longitudine, in terram versis, subpinguibus, in cacumine
duobus, binum dodrantū cauliculo, tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu circa ipsum torum, ab
extremo in laus se pandente: femine nasturtii, incluso vasis lenticulæ effigie, nisi quod infringitur, vn.

I. THLASPI. I.

* II. THLASPI VVLGATVM
ferrato folio. *



III. THLASPI. II.

IV. THLASPI III.



Thlaspi aureum
3. lumb.

Na ←

dcno-

a Me. i. in
 sepibus & pa-
 rietibus. Dra.
 Thlaspi con-
 sideratio.

Cuiusdam
 error.


de nomen accepit, flos albiat. Nascitur in semitis, a & sepibus, fossisque. Semen asperi gustus exaltans: bilem utrinque extrahit, potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis infusum: sanguinem pota educit, internas suppurationes rumpit: mentes ciet, sed partus enecat. Alterum thlaspi tradit Crateus, quod aliqui Perficon sinapi vocant, latis foliis, radicibus magnis: vtile ischiadicorum infusioni.

Tamet si Thlaspi, cuius hic imaginem habemus, caule iam edito, folijs non sit in cacumine diuisis, cum tamen caulis habeat notas, quas suo Thlaspi inscripsit Dioscorides, nihil impedit, quin credam id esse legitimum, & presertim cum iam obseruauerim, antea quam caulescat, ipso ineunte Vere, hoc Thlaspi folia fundere, humi accubantia, que circa cacumen diuisa sunt, sed hec adeo fugacia sunt, vt paulo post confluescant, & pereant. Qua autem in caulis habentur, sunt quidem, vt Dioscorides inquit, angusta, subpinguia, & digitali longitudine: caule deinde est tenui, duorum didrantum longitudine, non sine adnatis ramulis, in quibus fructus circa ipsos totos spectantur, nempe folliculi compressi, lenti, aut disco similes, in quibus semen concluditur, nasturtio simile, acuto sapore. Nascitur in semitis, sepibus & iugis, quin etiam inter rudera, & in vetustis adificiorum muris & tectis. Ideoq; manifesto hallucinatur nouus quidam scriptum censor, qui hoc Thlaspi Crateus, non Dioscoridis esse contendit. Error patet quod Dioscorides Crateus Thlaspi ser-

* V. THLASPI SAXATILE

minori folio.*

VI. THLASPI IIII.



Thlaspi alce-
 tum.

Thlaspi vires
 et Gal.

bat folijs esse latis, & radicibus magnis, quibus qui non videt carere hoc nostrum, is prorsus cecutire dici potest. Atquis planta est, qua nobis nota sit, quaeq; Crateus Thlaspi referre possit, eam ipsam ego putarem esse, quam superius statim post raphanum appinximus, & Vulgarem Raphanum & Rusticanum appellauimus. Siquidem haec lata folia habet, & radices magnas, & ad Ischiadicos herba vtilis est. Ceterum planta quam THLASPI ALTERVM vocauimus, quod cum semine Thlaspi haud absimile videatur, folijs exit alteri maioribus, latioribusq; prope caulem diuisis, & per ambitum serratis: caule firmo ramofoq; siliquis latioribus in cacumine diuisis pressisq; in quibus semen minutum continetur, auro colore. Nascitur in agrorum marginibus & inter segetes. At TERTIVM folijs prouenit a radice numerosis, oblongis, subalbicantibusque, minime gustatu acutis, caulibus & ramis tenuibus, tenuibusq; folliculis circumquaque stipatis, in quibus semen Thlaspi simile, acerrimi gustus: nascitur in agro Pragensi, locis saxosis & asperis. Floret medio Vere, & Iunio mense fert semen, acuto sapore. QUARTVM folia profert longa, angusta, raraq; caulem ramofo, & folliculos in vultu congestos, in quibus semen. Nascitur in incultis locis & in collibus. Verum non desunt, qui existimauerint, Thlaspi, & Bursam pastoris vulgo dictam, vnam & eandem esse plantam, cum tamen huiusce Bursae pastoris folia, qua per ambitum sinuatim laciniata visuntur, semenq; his, qua de Thlaspi memoria prodidere Dioscorides, & Galenus, minime conueniat, eorum sententia prorsus explodenda videtur. Ceterum legitimum reperiri in Italia certum est: siquidem eo maxime a byndat, & Goritiensis ager, & Gradisca mania, ea parte qua Sontius aluit. Nascitur frequentissimum, & acerrimum in Pago sancti Petri non longe a Goritia, alijsq; circumstantibus locis, semine perquam acri, in folliculis inclaso, in cacumine diuisis, lenticula effigie, superna parte pressis, vt Dioscorides inquit. Semen Thlaspi exaltat, exicat, attenuat, vrit, extrahit, prouocat, expurgat & incidit, perinde ac Nasturtij semen. Alterius semen minus mordet, minusq; longe calfacit & siccatur, atq; etiam cetera minus praestat, quam alterius. Tertium id quod alia genera praestat, sed non adeo vehementer. Quarti semen cum acerrimo habeatur sapore, pariter calfacit, & siccatur, & ea omnia praestare potest, que primi generis Thlaspi adscribuntur. Meminit Thlaspi Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum sic inquit: Thlaspi semen habet, & ipsi facultate acere, adeo vt internos abscessus potu disrumpat. Menses ciet, & fetus enecat, per sede infusu sanguinolentia euacuans, ischiadib. prodest. Est enim alioqui tu supernae, tu infernae biliosorum humoru euacuatoriu, acetabuli mensura

VIII. BURSA PASTORIS.



potum. Et libro primo de antidotis: Vtuntur Thlaspi (inquit) quod è Creta assertur, quodq; vbiq; nascitur, colore inter luteum, & flauum medium, figura rotundum, exiguum adeo vt multoties grano milij cedat. Melius est autem è Cappadocia comportatum thlaspi imponamus. Hoc ad nigredinem inclinat: figuram non exacte rotundam habet, & antedictum magnitudine permultum superat, atque ab vno latere paruam quandam, veluti compressionem praefert, vnde & nomen obtinuit. Prouenit autem vt hoc, ita & illud in Cappadocia quam plurimum. Ideoq; non absolute quod inde adportatur, optimum censendum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, nec Cretico, nec passim nascenti simile: hac de Thlaspi Galenus. Ex quibus satis constat, Italicum thlaspi illi, quod Cappadocia profert, non esse viribus comparandum. Reliquum est, vt de BURSA PASTORIS, cuius superius meminimus, aliquid in medium afferamus. Caules edit teretes, sesquidrantales ramis tenuibus in summitate emergentibus, folia eius prima verbenaca proxima spectantur, sed qua in caule sunt Thlaspi aemula sunt: radicem habet tenuem candidamque: flores edit in summis ramulis albos, è quibus pressa oriuntur siliqua, cordis ferè imaginem referentes, semine intus paruo ac minuto. Nascitur fere vbiq; praesertimque secus vias, in antiquis edificiorum parietibus, in hortis & vineis, & inter rudera. Sed tum veteres nihil de hac posteritatis memoria mandauerint, ea tantum recensèbo, qua a recentioribus de eius viribus adnotata inuenio, cum planta ipsa omnibus vulgè notissima sit. Est igitur Bursa pastoris ex refrigerantium, exiccantium, & adstringentium genere. Quapropter prodest attrita, & emplastri more imposita inflammationibus, & sacris ignibus. Decoquitur pluuiali aqua cum plantagine, & Armenio luto, bibiturq; eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & ad cruentas excretiones. Herba succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. Sistit mensium abundantiam, si eius, & persicaria decocto infideant mulieres, esturg, ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tam deuorata quam adnota, tenui pulicula circumlita, & in oleo fixa, additur in emplastris, qua ad capitis vulnera componuntur, & in vnguentis compluribus. In calcebs comecta, & nuda pedibus pressa, auriginem tollit. Quae herba ἄραρις Graecis, Thlaspi quoq; Latinis dicitur: Barbaris Nasturtium tectorum: Italis Thlaspi: Germanis Besenkraut: Hispanis, Paniqueño de storblanquio. Gallis, Seneue Sauuage. Thlaspi secundum sine alterum, Graecis ἄραρις ἑτερον: Italis Thlaspi maggiore. Bursa pastoris, Italis & officinis eodem nomine appellatur, quoniam etiam Sanguinaria aliquibus, nonnullis Herba cancri, & aliis Crispula quoque vocatur: Germanis Seeckelkraut.

Bursa pastoris vires Matthioli.

Nomina.

lenti infusus medetur. Sistit mensium abundantiam, si eius, & persicaria decocto infideant mulieres, esturg, ad idem, & contra denique omnes sanguinis fluxiones efficax est, tam deuorata quam adnota, tenui pulicula circumlita, & in oleo fixa, additur in emplastris, qua ad capitis vulnera componuntur, & in vnguentis compluribus. In calcebs comecta, & nuda pedibus pressa, auriginem tollit. Quae herba ἄραρις Graecis, Thlaspi quoq; Latinis dicitur: Barbaris Nasturtium tectorum: Italis Thlaspi: Germanis Besenkraut: Hispanis, Paniqueño de storblanquio. Gallis, Seneue Sauuage. Thlaspi secundum sine alterum, Graecis ἄραρις ἑτερον: Italis Thlaspi maggiore. Bursa pastoris, Italis & officinis eodem nomine appellatur, quoniam etiam Sanguinaria aliquibus, nonnullis Herba cancri, & aliis Crispula quoque vocatur: Germanis Seeckelkraut.

Hoc loco Ruellius legisse videtur ὄραρις, quod verterit lenticula effigie: nec temere, quod Thlaspi semen illi pulchre respondeat. Veram vulgè, uti Graeci codices habent ὄραρις, hoc est, dici figura.

Thlaspi à fructus forma nomen accepit, qui velut infractus & contusus est, cuius genera viginti nouem in Phytopmate recensuimus. I. Thlaspi folio acuto C. B. Thlaspi primum, Matth. Lugd. Thlaspi vulgarissimum Vaccariae folio, Lob. Thlaspi alterum, Dod. fol. II. Thlaspi vulgatum serrato folio: hoc nobis vulgare est & dicitur Thlaspi, & vulgare Thlaspidion, Trag. Thlaspi latifolium, Fuch. Thlaspi minus latifolium. Lonic. Thlaspi alterum, Dod. gal. Thlaspi secundum, Tab. vtrum hanc exprimere vellent Matth. & Lob. subdubitamus, siquidem similem primae nec dum videre licuit. III. Thlaspi siliquis C. B. Nasturtium quartum, Trag. Thlaspi secundum, Matth. Lugd. Thlaspi primum, Dod. gal. Lugd. Thlaspi Drabae folio, Lob. obs. Thlaspi Dioscoridis Drabae & Chamelinæ folio, Lob. icon. Thlaspi latius, Dod. fol. Thlaspi maius, Tab. Thlaspi platycarpon, Cam. hor. Thlaspi Cæsal. IIII. Thlaspi laxatile, C. B. Thlaspi tertium Matthioli, Lugd. Thlaspi: vt in nostris montosis prouenit, delineari curauimus. V. Thlaspi laxatile minori folio, à radice crassa è rupium fissuris prodeunte, caules exsurgunt sesquipedales, etiam breuiores, tenues, qui aliquando in summo in ramulos brachiantur: folia ad radicem plura, breuia, oblonga, acuta & leuiter crenata, quæ in caule pauca sunt & angustiora: in ramorum summitate flosculi albicantes, quibus succedunt folliculi copiosi, oblongis pedicellis insidentes, tenues, ex rotunditate oblongi, membranoso septo distincti, semen minutum, flatum, acre continent. Prouenit in nostro monte Wasserfall: Sic & in Heluetiorum & Rhetorum alpibus. Dicitur Thlaspi tertium Saxatile, Camerario in editione sui Matthioli. VI. Thlaspi umbellatum Creticum, C. B. Thlaspi quartum, Matth. Lugd. Arabis sine Draba, Dod. gal. Ges. hor. Lugd. Draba sine Arabis, Dod. fol. Thlaspi Creticum, Ges. hor. Tab. Cam. Clus. Pan. Cæs. Thlaspi Candiae umbellatum Iberidis folio, Lob. In hac figura folia inferiora Iberidi similia, sunt à pictore omissa: flore est communiter purpureo, aliquando albo, luteo nondum vidimus. VII. Thlaspi villosum: Ex radice tenui oblonga albicante, caulis pedalis, vnicus rotundus, villosus seu hirsutus exit, ad cuius exortum folia octo vel decem humi strata, longis pediculis donata, cuspidate orbiculata, hirsuta: quæ verò caulem cingunt, longè breuiora sunt, pediculis carentia, latioreq; basi ipsum amplectentia, horumq; quædam leuiter crenata: flores obtinet albos quatuor foliolis compositos, quibus succedunt siliquæ satis magnæ, hirsutæ, compressæ, superiore parte fissæ, ex quarum medio apex prodit: vtriusque duobus donantur, in quibus granula aliquot rufescentia, acri sapore prædita continentur. Hoc anno 1577. legimus (licet & Monspeulli sponte proueniat) in Patauino horto

Thlaspi

* VII. THLASPI VILLOSUM.*

Thlaspi pilosi nomine: verum cum hirsutie carens villosum appellare lubet. Huius semine olim in Italia pro veri Thlaspeos semine vsus fuit, sic dictante Nobiliss. Iacobo Antonio Cortuso, Patr. Parauino, horumq; Medici ibidem nunc praefecto. VIII. Bursa Pastoris maior, folio sinuato C. B. Bursa pastoris maior Brunf. Trag. Gef. hor. (cui & Thlaspi fatuum) Taber. Bursa pastoris, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lob. Cas. Thlaspi Cast. Lugd. Pastoria Bursa, Fuch. Dod. gal. & folio. Sunt & Bursae aliquot species, vt in Phytopynace monuimus.



Draba consideratio.

Draba Diosc. adulterina.

Ἀραβίς, ἢ Δραβή. ARABIS, SIVE DRABA. CAP. CLI.

Draba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroque latere folia, cuiusmodi lepidii, sed molliora, & candidiora. In cacumine vero sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba haec cum prisana coquitur in Cappadocia maximè. Semen aridum pro pipere obsoniis admiscetur.

Draba caput multis sanè argumentis conspicuum est, est Dioscoridi adulterinum. Nam si primùm planta nomenclationem expendamus, illam quidem facile coniciemus, (vt Marcellus rectè animaduertit) nec Gracam esse, nec Latine appellationem. Deinde cum nec apud Galenum, Orbasium, Paulum, Aetium, aliosq; Gracos auctores, quicquam de Arabi Drabaue scriptum reperiatur, hinc facile conici potest, Drabam Dioscoridi esse adulterinam. Ad hac illud quoq; rem sic se habere, maximè arguit, & ab aliquo Dioscoridi additam esse Drabam, quod bis in Græco exemplari manu scripto in secundo hoc libro habeatur, tum vt hic statim post Thlaspi, tum etiam post Glastum, ad libri calcem intrusa: sed istuc Arabis appellatur, & aliàs istuc de ipsa traditur, etiam ysdem verbis, vt nec de nomine, nec de re satis constet, maximè cum apud nullum alium scriptorem, neque Draba, neque Arabis mentio fiat. Ceterum quocunq; modo res se habeat, mihi dubitandum haud quaquam fuerit, quin planta, cuius hic imaginem expressimus, legitima genuinaq; sit Draba hoc in loco addita. Drabam Serapio Nasturtij generibus adiecit, & eam Nasturtium

Draba Serapioni.

I. ARABIS, SIVE DRABA.

* II. DRABA LVTEA.*



Sisymbrium strictissimum oris. Draba. sp.

Orientali nominat, quod insignis eius acrimonia indicium est: & quoniam in nostrate leuiuscula sentitur acrimonia, idcirco in hac, qua in Italia nascitur, Serapionis saltem sit Draba, ego profecto affirmare non ausim: nisi forte id Draba accedat pro regionum diuersitate, quemadmodum Aro euenire inferius dicitur ex Galeni auctoritate.

Herba, qua ἀραβίς & δραβή Græcè: Arabis item, & Draba Latinè pariter & Italicè appellatur: Barbaricè, Nasturtium Orientale: Gallicè Draue.

Draba prima umbellata C. B. Arabis siue Draba Matth. Lob. (cui & Nasturtium Babyloniam Lugd. Arabis, Lacu. Lon. Arabis verior, Cam. Draba Diosc. Cæs. Cast. Draba vulgaris prima, Chl. Pan. II. Draba lutea longissimis siliquis C. B. Ex radice longa, dura, albida, acri, caules bicubitales & altiores, graciles, rotundi, striati exurgunt, qui supra medium in plures ramulos, leuiter villosos brachiantur, quorum summitatibus flosculi sine ordine, nec in umbella, copiosi, lutei, ex quatuor foliolis compositi insident, quibus succedunt siliquæ oblongæ, strictissimæ, semen tenue, flauescens & acre continent. Folia verò oblonga, breuibus pediculis donata, acuminata, per oras crenata, rarius laciniata, & leuissime villosa sunt. Hanc Tubingæ collegimus ad Necarim, quamuis & Heidelbergæ reperiatur, & Dracum in Rhætia sponte proueniat: Cl. Camerarius primus in suo Matthiolo, Arabis quorundam nomine pinxit.

Ερύσιμον.

IRIO.

CAP. CLII.

Erysimon, Latini Irionem vocant, iuxta vrbes, rudera, hortosq; nascitur: folijs erucæ syluestris: cauliculis in lori modum lentis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacumine gracilibus, vt fæno graeco corniculatis: semine nasturtii, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si a purulenta extulsuntur: regio morbo, & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua aut melle vtiliter b cæcis carcinomatis, parotidibus, c duritiis mammarum, & testium inflammationib. In totum extenuat, & excalfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat, atque torreatur, vel linteo illigatum, d pinsita farina oblitum perassetur.

a Drag. ἐμάπυς, ἔρχατ id est, suppuratis, tulli. Meum. ἰκτερον, ἰσχυράσας, ἐκλεγχόμενον σὺν μέλιτι πίνεται καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα φάρμακα. i. icterum, coxendicum dolores delincta cum melle. Bibuntur etiam aduersus lethalia medicamenta. b. Drag. μικρά. id est parua. c. Meum. κρυπτά. id est, Cæca. d. Catacuz. διδύμων καὶ μαζών πλεγμόνας. i. testium & mammarum inflammationes. c. Meum. γέατος. i. farina subacta.

I. IRIO.

II. IRIO ALTERA.



Quæquam Theophrastus, & antiquorum alii Erysimon inter cerealia commemorant, & sesamo simile faciunt: quod tamen a Dioscoride representatur, folijs erucæ amulis, tanquam ab illo admodum dissimile, hic inter acerrimas plantas, non inter frumentacea, vbi de sesamo differuit, ab eo repositum est. Ea q; propter facile dici potest, Erysimon aliud designare Theophrasto, aliud verò Dioscoridi: Ideoq; Plinius vtriusq; in Erysimi historia ad stipulari videtur. Namq; lib. 18. c. 7. Theophrastum secutus, ipsum frugibus adscribit, sesamoq; simile facit. Et lib. 22. cap. 25. Dioscoridem imitatus, folijs erucæ paulò angustioribus, & semine Nasturtij Erysimum esse prodidit. Hoc idem palam est fecisse Galenū: quippe qui lib.

lib. 6. simplicium medicamentorum Erysimum plantis comparavit, qua acrimonia praeclata sunt, uti nasturtium & napi. Et lib. 1. de alimentorum facultatibus ipsum inter fruges retulit, qua in cibum veniunt, una cum sesamo quiens: Ut porro milio panicum ad simile est quodammodo, sed ad omnia deterius, ita & Sesamo Erysimum corporis, ut plinius non nihil affine: sed mansum insuavius est, & tenuioris alimenti, adeo quod in omnibus illo deterius existit. Caterum Ruellius, quod dixerit Plinius Erysimum, & Sesamum rubentibus provenire folijs, item ipsis virentibus nullum animal vesci, illud frugis genus autumat Erysimum esse, quod vulgo Tridentina rura appellant Formentone, Forotulien, & vero, quod pullo sit colore, nominant Saracino. Verum hac in re Ruellius deceptus deprehenditur, quod nullis notis respondeat hoc Erysimum, quod Theophrasto, & Plinio describitur: quandoquidem, quod vulgo appellatur Formentone, caule tantum rubet, non folijs, à nulloque pecude respuitur, sed ab omnibus avidissime depascitur, nec vlla ex parte Sesamum emulatur. Porro sciendum est, Dioscoridis Erysimum non esse sylvestrem erucam illam, quam nos nobilem appellamus, ut credit Herimolus, itemque Ruellius ipsum secutus, sed stirpem ab ea diversam. IRIONIS itaque duo videntur genera, foliorum magnitudine differentia ut ex iconibus videre est. Illud autem magis Dioscoridi genuinum esse censeo, cuius folia minora, & cornicula paulo vegetiora spectantur. IRIO ALTER, folia mittit hortensis Erucæ, caules lentes, flexilesque, ramis in summitate tenuibus, rotundis, acutis, tenuibusque, corniculus undique stipatis sursum spectantibus, in quibus semen concluditur minutum, flavo colore. Provenit ut alter iuxta urbes, rudera, hortosque. Idem praestat eius semen, quod alteri quoque adscribitur, peculiariter autem sesquidrachma pondere, ex ovo sorbili devoratum tribus continuis diebus, seminis profluviis cohibet, & ex vino renum calculos pellit. Verum non ob id negaverim, aliud quoque Irionis esse genus, cum omnibus Irionis sere nota sit praeditum: etsi scio non defuturos canes, qui me allatrabant. Id Graecis ἐρύσιμον dicitur, quod Latinis similiter Erysimum & Irio: Italis Erisimo & Irione: Germanis Hederich vnd Wilder Senff: Hispanus Rinchaon: Gallus, Velar, ou de la tortelle. Irio alter vulgaris, Italis Irio, ouero Erisimo commune.

Ruellii & Hermolai lapsus.

Irionis genera duo.

Nomina.

Irionis nomine, Matthiolus Rapisfrum proponere, sunt qui statuant, verum ex verbis, quae ex secunda commentariorum editione adiecimus, colligere est eum intellexisse eam, quam vocamus I. Erysimum siue Irio vulgatum. Hierobotane foemina Brunf. Verbena foemina, Trag. Verbena recta siue mas

* III. ERYSIMO SIMILIS
Hirsuta.*



Πίπερι.

PIPER.

CAP. CLIII.


Quae in piperis capite conclusa sunt non habet Onbasius.

Piper [in India nasci, breui arbore traditur: quae] inter initia praelongum fructum, veluti siliquam, promittit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper eundem. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensque sese, racemos emittit, grana ferentes, qualia videmus. Ea acerbam candidum piper faciunt, aptum ocularibus remediis, antidotis, & medicaminibus, quae contra venenata parantur. [theriaca vocant. Longum vero vehementius mordet: & quoniam priusquam ematuret, decerptum est, & subamarum relinquitur, antidotis, & theriacis medicaminibus expetitur.] Nigrum vero, utpote quod tempestiva maturitate collectum sit, odoratum esse constat, candido suavis, acrius, [et ori gratius, nec non ad condimenta, vtilius] sed candidum, & adhuc in acerbum veniens, antedictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, ac minime fuffurosum. Inveniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, casta, inania, minimaque ponderis.

ponderis, quod vocant brasma. Vis omnium excalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, absterget caliginem, qua oculis obuersatur. Piper febrium horroribus circuitu repetentibus, siue potu, siue illitu subuenit: serpentium moribus auxiliatur: partus extrahit: conceptum adimere creditur, statim a concubitu suppositum: tussi, omnibusq; pectoris vitiis, siue eclegmate, siue potu succurrit: anginae eo & melle conuenienter perunguntur: potum cum recentibus lauri foliis, tormina discutit: cum vua passa manducarum pituitam a capite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat, ad intinctus esculentorum additum: strumas cum pice discutit, vitiligines ex nitro emaculat. Ficili nouo. vt aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix ginger, vt aliqui existimauerunt, sicuti paulo post ostendemus. Namque piperis radix costo similis est, ora gustantiu accendit, saliuam ciet. Hec uenena reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine pedicularis herbae, quam Itaphidem agriam vocant.

I. PIPER.

II. MACROPIPER.



Piper Longum
Mains.

Piper Longum
Minus.

Piperis Nigrum

Lyfiani nauigationibus suis hoc aeuo confectis per Oceanum Atlanticum versus austrum primo, & hinc deinde in Orientem ad Calecut, Taprobanam aliasq; Indici pelagi insulas: item Hispani liburnicus uecti ad occidentales Indias, Per... alias complures regiones, quae antiquos Geographos penitus latuerunt, non modo Pipere, & huiusmodi odoratis simplicibus vniuersam repleuerunt Europam, sed & scriptum historiis, a quibus oriuntur, posteritatis memoria prodiderunt. Quod postea fecit, vt nobis plane ignorasse videantur Theophrastus, Dioscorides & Plinius, aut ob regionum distantiam indigenam potius in hoc fidem secuti, quam quod forte ea viderint, quae de pipere scriptis tradiderunt) aut ob aliam quamuis causam plantae illius formam, ac notas, quae piper in India gignit, ac quoniam modo piperis planta suum edat fructum, an scilicet racematim, an corymborum modo, an in siliquis inclusum, an bacciferarum arborum more. Siquidem Plinius libro 12. cap. 7. ita scribit: Arborea quae passim piper gignunt, iuniperis nostris sunt similes, quanquam in fronte Caucasi solibus opposita gigni tantum eas aliqui tradidere. Summa a Iunipero distant paruulus siliquis, quales in Phaseolis videmus. Haec priusquam dehiscant, decerpta, tostaeq; solis faciunt, quod vocatur piper longum: paulatim vero dehiscentes per maturitatem ostendunt candidum piper, quod deinde tostum solibus, colore rugisq; mutatur: hac Plinius. Quibus a Dioscoride non longe distidere videretur, nisi piperis plantam similem iunipero redidisset: namque Dioscorides nullis eam notis repraesentauit, neq; alicui similem fecit. Theophrastus praeterea quinquam scriptum reliquit lib. 9. cap. 22. de plant. hist. Piperis duo esse genera, vnum rotundum, alterum oblongum, eius tamen arboris effigiem silentio praeterijt. At hi, qui... liburnicus immensa traiecerunt maria, propriasq; perlustrarunt regiones, vbi piperis vtriusque planta innumera videntur, nigram, ac rotundum gigni narrant a quibusdam infirmis viticulis vicinas arbores altiore complexu scandentibus, ad fastigium vsque, acuta clematidi non dissimilibus, folio tamen malum Assyrium amulantibus, sed minori, gustu aliquantulum acri, quin & racematim proferri vuarum labruscae modo, sed minorem, confertius tamen perpetuo virentem, donec siccet, & plenam maturitatem consequatur, deinde mense Octobri per maturitatem decerpi, & subseruenti sole tegetibus palmeis expansum torrerit, quousque nigrescat, & rugosum euadat: quod tridui spatio plerunq; fit: radice nititur pusilla. Huic nigri piperis planta persimilis omnino est, quae piper album gignit. Piperis prouentus maximus habetur in Malauar locis maritimis, quae a Comorin ad Cananor vsque pertingunt: quinetiam in Malache maritimis, & in insulis, quae circa Lauam sunt: vnde per mare Erythraeum ad nos comportatur. Longum autem, vt iam testantur, alio feruntur arbores, estq; velut nucamentum quoddam, exilibus granulis squamatim compactum, quod velut iulus in pentica...

Piperis & plantae eius hist.

Plinii lapsus.

Piperis duo genera Theophrasti. Piperis hist.

Piperis plantae in Italia.

zuce, cui pulchrè adstipulatur, vermiculosa facie dependet: piperato gustu: nunquam tamen in allum, vel nigrum piper coalescit. Galenus indigenam fidem, & Dioscoridem secutus, eandem plantam tam rotundum, quam longum piper esse credidit. Sed delusi sunt, siquidem alia valde diuersa planta Piper longum mittit, quod in Begala nascitur. Piperis hanc vidimus nos Neapoli, qui Lusitanorum descriptioni maximè respondere visus est, quod viticuloso caule esset, & demum acuta modo. Sed & aliam arbusculam vidi Venetis, quae prorsus illius planta faciem exprimit, quam vulgus Ribem appellat, cuius bacca, quae quoque racematim cohaerent, ita bella piper imitantur, vt si aciores sese declarassent, ego quidem a pipere genuino nihil distare putassem. Viret haec in hortis clarissimi medici Maphei à Mapheo, in quo plurima simplicia rotunda digna visuntur. Quo fit, vt mirum non sit, si in pipere diuersa variant auctores. Quandoquidem cum varia in Italia pipere ferre habeantur arbuscula, facile credendum est, varietatu longe maioris eas in India reperiri. Caterum piperis planta, cuius hic imaginem appinximus, nusquam vicia, aut sicca à me visa est, sed ita Praga Bohemorum eam mihi delineabat Lusitanus quidam miles, qui Indicas perlustrauerat oras. Verum integro: usque gri piperis racemos Verona ad me misit Franciscus Calzolarius Pharmacopaeus haud indoctus. Porro & aliud piperis genus habetur, quod AETHIOPICVM, siue piper nigrum vocat Serapio. Hoc in siliquis nigris racematim prouenit, piperum, aut phaseolorum modo. granis pipere nogyo paulo minoribus. & pertinaciter siliquis inhaerentibus: vtuntur hoc Aethiopes ad dentium dolores. Nascitur in Aethiopia, vnde nomen inuenit apud Arabes. Affertur ex Alexandria Aegypti cum alijs aromatis Excalfacit, & esiccatur vehementer, attenuat, incidit, prouocat, aperit, digerit, resoluit. Non desunt, qui huius historiae ignorantes, quam describit Serapio cap: 337. de grano Zelae, illud perpetuum Carpesium esse putent: quorum opinionem haud probandam conuicimus in nostrarum epistolarum volumine, ad locum Hessum, medicum Norinbergensem scribentes. Addunt quoque piperis generibus corniculatum illud piper, quod vulgo INDICVM appellant, aut vt alij volunt Siliquastrum, quod acerrimi sit gustus. Ea planta itaq; prouenit folijs hortensis solani maioribus longioribusq;, caule cubitali, ac etiã longiore, viridi, ramis compluribus brachiato, geniculatoq;: floribus candidantibus.

III. PIPER AETHIOPICVM.




Piperis Aethiopici mentio.

Quorundam ex explosa Piperis corniculati mentio.

IV. PIPER INDICVM.



V. PIPERIS INDICI VARIETAS.



quibus vagina oriuntur corniculorum speciem referentes, herbeo primum colore, & deinde coralliorum modo rubescente, a pectore longu gustu acerrimo, adeo ut piper omne sua superet acedine. In his semen concluditur minutum, colore subalbicans, eisdem protinus gustus. Seritur in hortis & ficilibus. Huius plura habentur genera: Nam aliud pumilius tota planta provenit, & corniculis longe minoribus, aliud vero rotundis fere siliquis. Sed omnibus eadem est acedinis vehementia. Exsiccat & siccant omnia excessu quarto. Ideoq; valenter vrunt, & exculcerant corpus. Recentia cornicula tusa & illa ischiadicos iuuant, siquidem locum exurunt. Non desunt doctissimi viri, qui hoc piperis genus Cardamomum faciunt, manifesto tamen errore. Piperis meminit Gal. lib. 8. simp. med. sic inquit: Piperis radix vires costo similes potissimum obtinet. Porro fructus eius nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est: humiditatis eius indicium est, quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum pinguetum daret. Porro fructus, qui velut omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est, & superexsiccatum. Verum utrunque valenter tum excalfacit, tum desiccet. Integra grana quinque numero quotidie deuorant, ijs auxiliantur, qui ventriculi dolore, tum ex flatu, tum cruditatibus exorto, laborant. Caterum quoniam Dioscorides inter simplicia de CARYOPHYLLIS, qua mihi piper in mentem redegit, nihil posteritatis merita mandauit, cum ex eiusdem afferantur regionibus, sintq; in precipuo medicorum usu, adeo prestantissimum, odoratumq; medicamentum silentio non desimulandum duxi. Provenit igitur Caryophyllorum arbor in orientali plaga, quibusdam Indicis, pelagi insulis, non longe a Radem. Huius caudex buxo similis est, eademq; materies. Folia vero caryophylli vulgaris instar habet, sed rotundiora: fructu est paruo, ex atro rufescente, in clauum modum capitato, exertis in aduersum quatuor denticulis, sese sedens. Decussatis, prominulo apice, quadrati alueli sinu medio umbilicatum prodante. Arbor que Caryophylos profert, Lauri faciem refert, folijs tamen angustioribus, salicis, aut persica mali similibus, insimul per aruitum sinuatis, multis pradiat ramis, floribus numerosis imprimis candidis, deinde virentibus, postremo vero rufescentibus, vique adeo odoratis, ut reliquos flores odoris suauitate superent: e quibus Caryophylli proueniunt, qui ni aliud int, quam rudimentum fructus. Flores enim qui quaternis foliolis constant, huic fructus rudimento insidet, fibris numerosis refertus, perinde fere ac Myrti flores. Proueniunt Caryophylli in extremis ramulis, Myrti modo. Adhuc pediculi quibus Caryophylli nituntur h sunt, qui officinis vulgari idomate appellantur Fusti. Nascitur autem arbor ipsa sponte ex decussatis Caryophyllis. Adolefcit intra octennium, perduratq; in centesimum annum vsque. Nascitur magno prouentu tantum in Moluccis insulis. Nam quamuis in Zeilan & nonnullis alys Indie locis proueniat arbor, nusquam tamen fructum edit, preterquam in Moluccis. Cultores arundinibus flagellant arborem, constricto prius circumquaque tegetibus palmarum solo. Caryophylli meminit Plinius libro 12. cap. 7. his verbis: Est etiam in India piperis grani simile, quod vocant Caryophyllon, & grandius, fragiliusq;. Tradunt in Indico loco id gigni. Aduehitur odoris gratia. Horum nusquam innotionem fecisse Galenum: tamen si Serapio ex Galeni auctoritate plura de Caryophyllis tradiderit suo de simplicium medicamentorum volumine. Quamobrem crediderim aut Galeni librum, in quo de Caryophyllis disseruit, perisse, aut Pauli potius, quam Galeni testimonio de his scripsisse Serapionem. Nam de Caryophyllis prius Paulus iisdem, quibus postea Serapio, verbis tractauit, lib. 7. ubi hac habet: Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam, qua nomine praedicatur, sed ex India veluti flores caryophylli arboris festucae, & nigri sunt, longitudine fere digitali, odorati, acres, & amari calidi, & sicut in tertio propemodum ordine: & multiplici vsus sunt, tum ad obsonia, tum ad alia multa medicamenta. Caryophylli, ut scribit Serapio, iocorum, stomacho, & cordi auxiliantur: Conuulsionem adiuuant, & alui fluxiones cohibent. Quinetiam eorum puluis quatuor drachmas cum pondere cum lacte junctus, venereas vires adauget.



Piperis vires ex Galeno.

Caryophyllorum hist.

Caryophylli Plinii.

Caryophyllorum vires ex Paulo.

VI. CARYOPHYLLI AROMATICI.



Oo 2

Exacuum

ingenera Caryophyllata
Stenod.
Spa.

Caryophyl-
lorum vires
Matth.

Exacuunt praterea, Auicenna auctore, oculorum visum, & eorum nubeculas, argemasq; exterunt. Atque haec de
historia & viribus Caryophylli seminis Aromatici. CARYOPHYLLORVM planta ramusculum, Caryophylli ma-
stum, cuius hic imaginem damus, misit ad me Franciscus Calzolarius Veronensis. Excalfaciunt, siccant Caryophylli &
extenuant ordine tertio, odorati, acres, subamari, non sine leuicula adstrictione. Itaque roborant, & aperunt simul, a-
tenuant, digerunt, inciduntq;. In ribis deuorati, ventriculi, iocinoris, cordis, & capitis affectibus auxiliantur. In pul-
rem hausti ex vino, aut malorum cydoniorum succo, vomitiones cohibent, caliacos iuuant, nauseam remouent, & ubi ap-
petentiam reuocant, roborantq;, cum ventriculum, tum etiam caput. Afferunt & iocinori praesidium: namque ubi refrige-
ratum fuerit bellè excalfaciunt. Ideoque hydropicis, & praesertim anasarca affectis, vtiliter propinantur. Olfacta reuocant
animi deliquis laborantes, mansiq;, anhelitum commendant. Conferunt comitialibus, resolutis, conuulsis, stupidis, &
veteriosis: concoctiones adiuuant, & alui fluores torrefacti cohibent: illiuntur quoque per quam vtiliter cum mastice,
Rhoe, corallis, & punici floribus, ad ventriculi morbos, & praesertim hos, quibus adstrictione opus est. Hausti quatuor drach.
marum pondere ex bubulo, caprilioue lacte, vniuersem excitant. Exacuunt praterea oculorum aciem, & caliginem tollunt,
quin etiam nubeculas, & argemas, in tenuissimum puluerem triti, & oculis inditi. Idem tam deuorati, quam suffri, va-
lent, aduersus pestilentem contagionem: suffiuntur vtiliter capitis fluxione et noxi, & qui varium obstructione lateris,
fumo naribus excepto. Adduntur in Antidotis, & in succis, qui ventriculo, & capiti roborando parantur. Ceterum quo-
nam in Caryophylli nomen incidimus, hic non prorsus intactos relinquemus flores illos, qui ab odore similiter CARYO-
PHYLLI, & Garofoli vulgò vocantur. Hi quidem non fuerunt, quod ego sciam, à veteribus cogniti, etsi nolis bedesur-
acedè celebres, vulgares aequè ac iucundi, vt nullus iam sit hortus, nulla adium ferè fenestra, qua hinc floribus non ornentur.

Caryophylli
flores, & eius
mentio.

VII. CARYOPHYLLI DO- mestici.



VIII. CARYOPHYLLI SYL- uestres.



Vetonicorū
florum de-
scriptio.

Seruntur à mulieribus, colunturq; in scilicet, aut capsulis ligneis transpositi, sapiusq; irrigati. Horum plantam recentio-
res nonnulli Vetonicum Coronarium appellant, sed quo auctore, haecenus compertum non habeo. Verum ne videat eor-
um inuenta negligere, liceat etiam mihi eadem vti nomenclatione. VETONICVM itaq; coronarium, quod caryophyllum
appellamus, folijs est longis, Tragopogoni modo, breuioribus tamen, carnosioribus, ac pinguioribus, incuruis, & in autum
deinentibus. Cauliculos edit numerosos, rotundos, geniculatos, laeues, cubitales, tribus, quatuorue in summitate aduati,
in quorum cacumine teres, longiusculusq; calyx spectatur, superiore parte serrato modo denticulatus, è quo flos speciosissi-
mus oritur, Caryophyllorum odoratu, vnde illi nomen. Varia sunt horum florum genera, colore & foliorum stipatu diffe-
rentia. Alij enim maiores sunt, alij minores. Variat in floribus color: quandoquidem alij coccineo colore rutilant, alij sa-
turata purpura nitent, alij candido, alij carneo colore gaudent. Sunt & versicolores nonnulli, albo rubroq; colore misti
respersi, sed in angonio parati, seminibus diuersorum generum simul constrictis. Stipantur ferè omnes in omni genere, na-
merosa foliorum serie, perinde ac rose, cum quibus de pulchritudine, odoris praestantia, & colorum varietate ad victoriam
vsque certant. Ideoq; mirum, nullam apud antiquos horum extare memoriam. Habetur eadem planta etiam sponte na-
scens [locis incultis & aridis atque saxosis. Foliis, caulibus, floribusq; exeunt altilibus similibus, sed longè minoribus tenui-
oribusq;] altera floribus rutilis, altera candidis, vtraque tamen gracilior, flore paruo, haud folioso, & nullo caryophyllo-
rum odore. Nasuntur locis incultis, & aridis. Calida, sicq; pollere facultate altili Vetonicum inditio esse potest odor
fragrantia, & saporis amarulentia quadam. Flores, & praesertim purpureorum, praestant ad omnes cordis affectus, nempe
ad animi deliquia, & cordis ipsius tremore: praestant item ad vertigines, apoplexiam, epilepsiam, paralysem, & conuulsiones
Betonice, aut amaraci decocto poti. Afferuntur saccharo, perinde ac rose, vtilis admodum non solum ad praedicta omnia, sed
ad cuncta venena, et venenosorum animalium ictus. Dantur ad intestinorum animalia necanda, et aduersus pestilentem contage-
V. de

Caryophylli
syluest.

Vetonicorū
florum vires
Matthiolo.

Valentius tamen id facit succus ex vniuersa planta expressus. Namque is haustus, quatuor vnciarum pondere, vbi morbus
 rursus liberat. Syluestrium radices, trium drachmarum pondere hausta ex meraco, à vipera demorsos sanant. Iuxta
 adhibentur floribus uetum, us in eo insolatis, quo naribus illito reuocantur auini deliquo confertati. Idem quoq; vtile est
 presilenti aut arcende, vbi eo quotidie nares, arteria, & manus irrorentur. Syluestres praestant quoque ad ea omnia, ad
 quae altiles praestare diximus, verum longe remissius operantur. Quod Graeci πέπερι, id Piper Latini vocant: Mauritani,
 Fufel, seu Fuisul: Itali Pepe & Peuero: Germani Pfeffer: Hispani Pimienta: Galli Poyure. Piper Aethiopicum, siue nigro-
 rum, Itali Pepe de Ethiopia. Indicum Piper siue Siliquastrum, Itali Pepe cornuto, aut Pepe de India: Germanis India. Nomina.
 Pfeffer: Gallis Poyure de Inde. Quod verò Graecis καρβορύλλον, Latinis pariter Caryophyllum appellatur: Mauri-
 tanis, Persis, Turcis, Indis, Calafur, Carunfel seu Charunful: Barbaris Gariosilus: Itali Garofono: Germanis Dägelin:
 Hispanis clauos de especia, siue Clauellos: Gallis Girophles. Caryophylli flores domestici, nonnullis Veticum. Itali Garo-
 fani & Garofoli: Germanis Grabsblum, siue Däglinblum: Gallis Oeilletz siue Giro fleurs. Caryophylli syluestres, Ita-
 li Garofani & Garofoli saluaticchi: Germanis Donder Däglin: Gallis Armoiries & Oeilletz sauuage.

† Ex Graecis vulgatis codicibus aliqui hoc in loco scriptum habent ως φασιν, quod sonat, vt dicunt: alij verò ως φανός
 id est, vt lenticula. Vnde etiam ex interpretibus alij hanc, alij illam secuti sunt lectionem. Oribasius verò nec hoc, nec il-
 lud legit: qui praeterea alia multa & hic, & alibi non describit, quae fortasse non temere quis illegitima iudicare possit.

Piper veteribus triplex, longum, album & nigrum, quae tria genera adhuc in Officinis nomine Ma- Piperis de-
 cropiperis, Leucopiperis, & Melanopiperis habentur. Seritur autem Piper ad radices arboris, quod sese scriptio.
 conuoluendo scandere possit, foliis raris, mali Assyrii effigie, sed minoribus, acutis, virentibus, gustu ca-
 lidis. Fructus vuarum modo racematim cohaeret, semper virens donec maturitatem consequatur & sic-
 cetur, quod circa medium Ianuarii in Malauar euenit: radix pusilla. Est autem inter eam plantam quae
 nigrum fert, & quae candidum, tam exigua differentia, vt à nemine, quam ab incolis dignosci possit: eo
 modo quo vitis, quae vnam fert nigram, ab ea quae albam. Sunt autem candidi plantae rariores in certis Longum
 Malauar & Maluca locis nascentes, vbi eo magnates, quemadmodum nos sale, vtuntur. Quae verò lon- Piper.
 gum Piper profert, longè alia est planta, nil cum his similitudinis habens, in Bengala proueniens plus
 quam quingentarum leucarum spatio à Malauar, vbi candidum & nigrum prouenit, distans: quam rectè
 ergo longum nigro, aut albo substituitur? His generibus adduntur Aethiopicum, Caudatum, Canari-
 num: habet & Alpinus peculiare piper longum, quod Feluel tauil nominat, herba iunci foliis crassiori-
 bus, è quibus sectis succus flavus, acris, magis quam piper exurens, emanat. I. Piper Matth. Lugd. Lon.
 non nouimus. II. Piper longum, Cord. in Diosc. & hist. Cast. (cui aliud Orientale ex Bengala, aliud Oc-
 cidentale, in Cartagena & nouo orbe) Piper, Clus. ad Monar. Piper longum Monardi Lob. Piper lon-
 gum Americum, Lugd. Piperis longi genus in India Occidentali, Casal. Additur huic figura & vna pi-
 peris rotundi. III. Piper Aethiopicum, Matth. Lob. (cui & Amomum officinarum quarundam) Cast.
 Lugd. Tab. Carpesium, Cord. hist. IV. Capsicum, fortè quod semen comestum mordeat, καρικόν A-
 ctuario dicitur: Zinziber Caninum Auicenna: Siliquastrum Plinio lib. 19. ca. 12. cuius aliquot differen-
 tia in fructu, ratione forma & coloris: color is aliis in initio niger, aliis viridis, in maturitate autem aut
 croceus, aut rubicundus. Figura aliis longa, eaq; vel crassa, vel gracilis & incuruata: aliis breuis, eaq; lata
 cordata: vel rotunda cerasi forma: denique & piloso caule. Binae figurae adpositae, altera Capsici siliquis ob-
 longis, quod dicitur Piper Indicum, Matth. Cast. Casalp. Cam. Piperitis, Cord. in Diosc. Siliquastrum
 longis siliquis, Trag. Capsicum oblongius, Fuch. Dod. gal. & fol. Lugd. Siliquastrum, Fuch. Lacu.
 Lon. Tab. Capsicum Actuarii, Lob. V. Altera figura oblongum recuruis siliquis, latum, cordatum &
 rotundum exprimit. VI. Caryophyllorum aromaticorum, cum diuersa sit historia, duas figuras adposui-
 mus, alteram quae Matthioli, est foliis Cinnamomi rotundioribus: alteram laurinis foliis: siquidem
 arbor sit lauri forma & magnitudine, foliis laurinis, sed angustioribus, Salicis aut Persicae folio similibus,
 oblongioribus tamen pediculis donatis, multis ramis praedita, copioso flore, quaternis foliolis constan-
 te, fibroso, Myrti floris instar, extremis ramulis insidente odoratissimo, candido, dein virescente, postre-
 mum rufescente: qui induratus est Caryophyllum ipsum, (vel potius Caryophyllum, rudimentum est
 fructus, quemadmodum in malis, pyris, atque puniceis videre est) clauum vocant, quod in modum clau-
 si capitatus, exertis in aduersum quatuor denticulis, sese stellatim decussantibus. Caryophylli à septem-
 bri ad Februarium vsque decussati, biduum aut triduum siccantur, dein asseruantur: qui verò in arbore re-
 manent, crassiores fiunt, neque ab aliis, nisi vetustate differunt, sub quorum cortice semen continetur:
 ex decidentibus arbor ipsa sponte in Maluccis (vbi solum fructifera gignitur) prouenit. An Carpesium
 Quinto medico? Arbor ipsa Caryophyllon Aeginetæ & Sethi, Charumfal Arabibus dicitur. Fructus
 qui adfertur, cum immaturus sit & minor, quam in arbore remanente, idcirco Caryophyllum immatu-
 rus aut minor, Cord. in hist. Florem Caryophyllorum Clusius in Corol. ad Dodonæum gallicae editionis
 vocauit, aliis Caryophylli & Caryophylli aromatici. Maiores verò, qui secundae figurae adpicti, Nicolao
 Anthophylli dicuntur, vt & Lob. Lon. Casal. Tab. sed improprie, contrarium enim dicere deberent,
 cum hic maturus sit fructus, quare Caryophyllum maturum seu maiorem, Cordus in sua historia nomi-
 nauit. Meminit Garzias in insula, cui D. Laurentio nomen, fructum esse Auellanæ magnitudine cum
 suo putamine, qui Caryophyllos redoleat. VII. Caryophyllus flos à Caryophyllorum aromaticorum o-
 dore nomen habet, licet sint alii odoratiores mangonio, alii minus, alii etiam inodori: sic in Chinarum
 regione, licet etiam nascantur, nequaquam tamen odoris suauitate commendantur, vt ii, qui apud
 nos habentur. Veteribus florem hunc indictum plerique credunt: quid si dicamus Betonicam alteram
 esse, quae inter notha apud Dioscoridem reperitur: etsi sint qui minus rectè Iphium Theophrasti, cuius
 6. historiae 2. & 7. hist. 12. meminir, censeant: aliis Herba tunica est: aliis Cantabrica Plinii lib. 25. cap. 8.
 Summa genera duo facimus; flores sunt altiles & syluestres. Altillis species multae, magnitudine, colore
 & foliorum numero differentes. Flores namque aut maiores: & vel maioribus, vel minoribus foliolis
 constantes. Sunt colore aut niuei, aut diluta purpura candicantes, aut croceo rutilantes, aut versicolo-

res: vt candidi & crocei, candidi & rubei, candidi rubris punctulis aspersi. Rubentes, aut violaceo admixto purpurei, aut rubri lacteis notis aspersi, sicq; guttati, aut rosæ syluestris colore. Sic ex vno caule duo florum genera, partim candidi, rubrisq; maculis aspersi, partim crocei, sæpe etiam vno pediculo duobus coloris flores videas: aliquando vnus ex alio mediis excrefcere videtur: sic in vna planta flores trium generum: in summa, mangonio & arte varietas magna fit in his floribus. Syluestrium quoque magna varietas existit, & in magnitudine, & coloris & floris figura, & calycis varietate, plerique tamen impurissimi sunt flore: quæ ratio vt supra quadraginta species in Phytopinace nostro recensuerimus. Verum Caryophyllus altilis, dicitur Caryophyllea, Trag. Caryophylli domestici, Matth. Cam. Flos garyophyllorum, Lonic. Flos garyofilus, quem alii Violam Damascenam vocant, Casal. Caryophylleus flos maior, Dod. fol. Caryophyllus multiplex, Lob. Tab. Betonica, Ges. hor. Betonica altilis, Fuch. Veronice altilis, Dod. gal. Betonica coronaria, Lac. Cantabrica Turnero. VIII. Caryophyllum syluestrem videtur Galenus agnouisse, & s. de tuenda sanit. Sarxiphagon appellasse: nam & syluestris nostra calculum frangit & educit, quod Galenus de Cestri seu Betonica in Gallia proueniente testatur. Fortè & Theophrastus 6. hist. 1. & 6. per Iouis florem inter coronarios suffrutices minutis conditum foliis, cuius flos, sine odore, tantum in coronarum vsu, syluestrem caryophylleum intellexit. Hoc verò loco quæ proponitur, Caryophyllus syluestris est vulgaris flore simplici, qui licet communiter sit inodorus, aliquando tamen odoratus est, flore purpureo frequenter, rarius albo: Tonitruum flos, Brunf. Garyophyllea syluestris, Trago. Caryophylli syluestres Matth. Cast. Lugd. Cam. Betonica syluestris prima, Fuch. Veronica, Dod. gal. Armerius flos primus, Dod. fol. Armeria siue Caryophyllus minor syluestris, Lob. Lugd. Flos Caryofilus, syluestris, Casal. Tunica syluestris, Lon. Caryophyllus montanus, Tab. Caryophyllea syluestris, Thalyo.


Zingiber

GINGIBER.

CAP. CLIIII.

Gingiber sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. Qua virente ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur, & primis potibus, & eduliis admiscunt. Huius radices, cyper modo, parua sunt, candicantes, & odoratae, atque pipera sapore imitantur. Eligi debent, quæ teretes non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant: & fictilibus in Italiam asportantur. Gingiber cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. Excalfactoriam vim, & excoquentem habet: aluum leniter emollit: stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt: in antidota addi solet: In summa piperis viribus respondet.

* I. ZINGIBER ET EIVS
siliqua.



Brauaoli ex.
ror.

Gingiberis vi
res ex Gal.

Gingiber (vt referunt Lusitani, qui plurimum se vidisse sententur in India) radix est, quæ geniculatis repit internodijs, folijs arundinaceis, quæ bis terue in anno renouiscunt, ac uirescunt, sed quæ in cacumine fastigiantur: gramini amplitudinem non excedere aiunt, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdunt nonnihil subesse discriminis in sapere cum præcox eruitur. Opportunum demetendi tempus, cum sola inaruerint, alioquin & teredini obnoxium est, & carie tentatur. Eruiturq; nonnunquam eius radix libra pondo, sed non omnium eadem est amplitudo. Plus in profundum non agitur, quam ad ternos, quater nosue palmos. Cum eruitur, radicis internodium in serobe fossore relinquant, terramq; illi aggerunt, cum eius radicis semen, proximo anno eruturi fructum, id est, regenerantur radices. Adueritur Gingiber in Italiam copiosum ex Calcut magno India emporio, atque ex Troglodytica Arabia non solum tractu temporis exiccatur, sed & saccharo recentissimum asseruatur, vel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis expriment. Id sane longè magis Veneto præstat: cum hoc officinarum mangonio ex aridis fiat radicibus, longo temporis tractu modico acerrimo lixiuio, calce, quernoq; cinere parato: modo muria modo dulci aqua maceratur, & edomitur, quibus non modo odor et perditur ac euanescit, sed & sapor, & acrimonia subtrahitur. Illud verò cum statim è terra effossum nullo serè maceratione candiatur, vires & facultates non exiit, sed eas seruat. Quæcumq; Brauaolus non rectè, meo quidem iudicio, velle videatur, quod Venetijs mangonizatum Gingiber gustantibus plus acrimonia relinquat, quam illud, quod recentissimum in India siliquarum melle, aut saccharo conditum asseruatur, & cum alijs aromatum generibus ad nos conuehitur. Quod quantum à veritate & ratione dissonet, ij iudicare poterunt, qui diu in myropolijs versati, rem omnino exploratam habent. Gingiberis vires memoria prodidit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Gingiberis radix vtilis est, quam utique ex Barbaria ad nos conuehant. Excalfacit potenter, sed non primo statim occurso, velut piper: vnde sanè & minus esse subtilium partium, quam piper, existimandum: siquidem in tenues solueretur partes, & celerrimè actiu, vt illud per se calidum. Apparet enim illaborata, & crassior adhuc quadam ei inesse substantia, nec ea sicca & terrestri, sed humidior potius atque aquea. Quo fit, vt facile perforetur, cum scilicet recrementitia insit humiditas. Neque enim quicquam eorum, quæ aut planè sicca sunt, aut humida, sed elaborata, & familiarem continentia humiditatem, huc vire obnoxia sunt. Idem vsu venit piperi longo. Atque hinc est, quod diutius perseuerat, quæ proficiscitur à gingibere, aut piperi longo caliditas, quam quæ ab albo, aut nigro. Nã sicut ab aridis salamis flamma simul celerrimè accenditur, et vndequaq; diffunditur.

tunc eundem in modum, quæ à siccis potestate medicamentis editur caliditas. At quæ prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt randa, & tardius accenditur & durat diutius. Ex quo fit, ut utriusq; medicamenti diuersus sit vsus. Siquidem vbi totum corpus celeriter excalfacere consiliū est, ea tunc exhibenda sunt, quæ & celeriter à caloris nostri contactu incallescant, & celeriter quocumq; ferantur. Verum vbi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contra agendum, nimirum quæ tarde calefcentia plurimo tempore perdurent, ea offeruntur. Caterum licet ginger, & piper album hac ratione à nigro pipere differant: non magna tamen est differentia. At nasturtium, napi, thapsia & agrestium columbarum sterces, maiori tempore perfecte accenduntur, & plurimo tempore perdurant: haftenus Galenus. Faciem Gingeris representat radix illa,

* II. ZEDOARIA LONGA & rotunda. *



quam Mauritanii, & officina ZEDOARIAM appellant, odoratio-
 rior tamen, amariuscule, neq; adeo vt ginger acris. Huius
 nusquam, quod sciam, meminere veteres Græci, etsi recentiores
 ab Arabicis edocti, nempe Aetius & Actuarius, eam suis medica-
 mentorum compositionibus admisceant. Zedoaria (vt cap. 172.
 testis est Serapio) conuehitur è Sinarum regione, vltra extremas
 India oras. Et sunt radices rotunda, cum facie, tum magnitudi-
 ne Aristolochia rotunda similes, colore autem, & sapore Zingi-
 ber æmulantur. Excalfacit Zedoaria, & siccit ordine secundo,
 flatu discutit, & propria quadam facultate impinguat. Post
 sumpta grate virus animæ, quod allium, cepa vel vinum exci-
 tavit, abigit. Venenosorum animalium moribus opitulatur, al-
 ius fluxiones sistit, vteri abscessus resoluit, vomitiones reprimis
 & coli cruciatus tollit: hæc Serapio. Cuius quidam autoritate
 freti, cum Zedoariam, quæ passim in myropolijs habetur, radices
 esse longas inspiciant, minime consentiunt legitimam hæc Sera-
 pionis esse Zedoariam, sed genuinum esse Costum affirmant. Ve-
 rum si rotundas Zedoaria radices inspicerent, quæ apud me sunt
 à Francisco Calzolari Veronensi mihi dono data, Aristolochia
 faciem referentes, & soliditate pares, nihil mihi verendum est,
 quin illi suam immutarent sententiam, siquidem viderent ro-
 tundam Zedoariam eiusdem esse saporis, coloris odorisq; quibus
 longa referta est, & nihil nisi forma ab ea differre asserere cog-
 rentur. Quinetiam proculdubio faterentur (vt ego quoq; exi-
 stimo, imò potius non dubito) duo haberi Zedoaria genera, per-
 inde ac Aristolochia, nempe rotundum alterum, alterum lon-
 gum. Atqui reuera, non parua oritur mihi suspicio an Auicen-
 na, & Serapionis Zedoaria eadem sint radices, cum scribat A-
 uicenna præstantiorem Zedoariam apud Napellum nasci, & i-
 psius esse Theriacam. Id quod me adducit ad credendum eam es-

Zedoariae h-
 stor. & vires.

Serapio:

Zedoariae ro-
 tundæ metio:

se Auicenna Zedoariam, quam quidam Antoram (ego Antitoram) appellant, quod hæc, omnium consensu, vna cum Na-
 pello nascatur, & eius sit antidotum. Toram enim vulgus Napellum appellat: & Antitoram vel Antoram Auicenna Ze-
 doariam, quod contra Toram præsentaneum sit auxilium. Deinde opinionem auget, quod videam Auicennam Serapionis
 Zedoariam, & eiusdem vires describere sub capite & nomine Zurumbeti, vt latius in Epistolis nostris scripsimus ad Gul-
 elmum Quacelbenum. Non desunt, qui crediderint, quod ARNABO, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum Zedo-
 riam & idem referant medicamentum. Verum Serapionis testimonio cap. 271. Arnabo apud Græcos nihil aliud desi-
 gnat, quam Zurumbet apud Arabes: quippe quod hoc loco de Zurumbet eadem scribat Serapio, quæ de Arnabo ante ipsum
 adnotauit Paulus. Est autem Arnabo, vt ex Serapionis autoritate memoria prodidit Isach, arbor proceræ, in oriente
 præueniens: folijs longis, colore viridi, in luteum languescente, salicis modo, sicuti & ramorum cortex. Infrugifera est, ci-
 treum odorem spirans. Quibus facile patet, Arnabo non modò Zedoariam non esse: sed nec in Europam ad nos aduehi. Quo
 fit, vt Cordus aberrasse deprehendatur: quippe qui Zurumbet Zedoaria genus existimet. Hanc fortasse secutus Fuchsius me-
 dicus doctissimus, in libro de compositione medicamentorum, quem locupletatum nuper edidit, non sine magno errore pu-
 tat Zurumbet & Zedoariam idem esse. Qui non minus in Arnabo quoq; errasse cognoscitur, quod velit Doronicum orien-
 tale id esse, quod Paulo Arnabo: atqui res hæc aliter se habet, vt ex antè dictis satis colligi potest. Hallucinatur etiam hæc in-
 re Brunfelsius: quod is scripserit suo de medicis vocabulis Onomastico, quod Arnabo vnguentum est odoriferum. Verum eius
 lapsus non aliam causam fuisse arbitror, quam quod oscitauerit Paulum legerit: nam Paulus apertissime asserit, Arnabo
 vnguentis expeti, quod suauiter oleat, non autem vnguentum esse, vt Brunfelsius somniaisse videtur. Id Ἰνδία, Ἰνδία
 Græcè: Ἰνδία: Græcè, quod item Latine Zingiber & Ginger nominatur: Arabicè Lengibel seu Zingibel: Italicè
 Gengeno: Germanicè Ingber: Hispanicè Gengiure: Gallicè Gingambre. Quod verò Ἰνδία, Ἰνδία Ἰνδία post-
 teribus Græcis, Zadura & Zedoaria Latinis pariter & Italis appellatur: Germanis Zitrwen: Gallis Cretonart.

Zedoaria A-
 uicennæ quæ.

Arnabo & Zu-
 rumbet hist.

Cordi Fuch-
 sii & Brun-
 felsii error.

Nomina.

Zingiber & Zimpiber Plinii, Officinis Ginger dicitur, quod alii harundinis, alii Iridis folia habere
 referunt: alii Cypero cognatum volunt: cuius radices colore variant, sunt albæ, sunt rubræ: illæ sæpius
 creta, hæc verò rubrica exterius infectæ sunt, vt magis à teredinibus præferentur, cui candidiores & mol-
 liores magis obnoxia: quamuis Ludouicus Romanus testetur in terra omnifariam rubra nasci. II. Zedo-
 aria quæ in Calecut Ginger Syluestre dicitur, à quibusdam veterum Arnabo & Arabum Zurumbet
 censetur: at Garzias scribit Arnabo Pauli arborem esse proceram, suauem odorem spirantem: Zerumba
 verò, graminaceam esse plantam. Verum ad Costum Syriacum Dioscoridis referendam censemus. Hæc
 longa & rotunda inuenitur, communiter tamen in Officinis longa habetur: alii vnam tantum ra-
 dicem, alii differentes statuunt, illam longam, hanc rotundam, vel tuberosam nominantes. Sic
 & hæc quæ tuberosa est, foris nigricans reperitur, & Zerumbet Serapionis censetur Clusio in notis
 ad Garziam.

† Solidū non
leg. Oris
† d'expit' r' p' a
i aciora, Or.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. Caulem edit geniculatū, solidū, multis alis concavum: folia menthæ, maiora, molliora, candidioraq; † gustu piperis, acri, a-
tra tamen vllam odoris gratiam: fructum acrem, in furculis paruis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita, tumores veteresq; duritias discutiunt, sugillata delent: quæ postquam inaruerunt tusa pro pipere in obsoniis admiscuntur. Radix parua, nullius in medicina vsus.

I. HYDROPIPER SIVE
Persicaria.

II. PERSICARIA AL-
tera.



Hydropipe-
ris confid.

Ruell. lapsus,
Pseudocupa-
torium Hy-
dropiper sta-
guentis.

Quæ Persica-
ria sit Hydro-
piper.

Persicaria
vires Matth.

TAmetsi pro virili parte contendat Ruellius, vt non minus doctis, quàm elegantissimis verbis comprobet, eam non sper-
nendam stirpem, quam vulgus officinarum Eupatorium appellat, legitimum esse Hydropiper: is tamen hac in re ap-
tè hallucinari deprehenditur, quamuis alioqui fuerit non modo in medica materia peritus, sed & Latinis & Grecis literis
apprimè doctus. Siquidem Dioscoridi Hydropiper folia edit mentha maiora, molliora, candidioraq; gustu piperis, acri, citra
tamen vllam odoris gratiam: non autem amaro sapore, vt Ruellius ait, Dioscoridis verba peruertens, quo facili suam a-
struat sententiam. Vulgare verò Eupatorium folijs crescit cānabinis, duris, hirsutis, amaro gustu, non quidem acri, vt piper-
is: quinetiam adedò odoratis, vt hac de causa herbam esse viribus insignem, quāvis ab antiquo silentio pratermissam, sem-
per existimauerim, cum tamen odoris fragrantiam in hydropipere reperiri neget Dioscorides. Præterea hydropiperi caulis
inest geniculatus, solidus, à foliorum & adnatorum exortu alis plurimis concavum: semine etiamnum acri, in ramis
prope folia racematim coherente: Pseudoeupatorio verò caulis est procerus, minimè geniculatus, in cuius ramis nullum a-
pud frondes racematim coheret semen: sed in cacumine flores gerit subrubentes, qui diuisi muscarij facie, syluestri origani
modo, per maturitatem in pappos euanescent: è quibus semen prodit amarum totius planta sapore: quanquam esse hoc a-
crimonia praditum non rectè Ruellius asseueret. Qui quoniam vulgare Eupatorium plerumq; in aquis orni conspexerit,
id omnino legitimum esse Hydropiper pro certo asserere non dubitauit, nulla prorsus habita ratione, an alia inter res respon-
derent nota. Quamobrem, vt ex dictis rationibus clarissimè patet, Ruellius hac in re non ita mature mihi videtur sensisse,
vt eius clara doctrina, ingenijq; præstantia exposcere videbatur. Quandoquidem cum vulgare hoc Eupatorium primo sta-
tim occurssu gustui amarorem relinquat haudquaquam obscurum, facile hinc iudicium consequi potuisset, hoc non esse Hy-
dropiper, quo vnà cum sale in ciborum cōdimentis piperis vice prisca atas utebatur: nam quæ amara sunt, præter quæ quod
piperis vicem explere minimè valent in cibis addita, ab omnibus respuuntur tanquam natura inimica. Hydropiper duum
est generum, alterum minus, alterum maius: item alterum acri admodum sapore, alterum verò omni: acedius expers, &
aspero tantum adstringentiq; gustu praditum. Ceterum si in Italia Hydropiper nascitur, illa meo quidem iudicio est persi-
caria (vt vocant) species, qua in alterius discrimen, cui folia insunt pullo colore emaculata, nullis similibus inficitur nota,
sed folio tantum viridi adolescit. Quippe qua folijs proueniat oblongis, mentha maioribus, mollioribus ac canidi-
caule admodum geniculato duroq; alis concavo: e cuius adnatis rufum semen racematim prodit, acri admodum gustu, ita
vt linguam vehementer vellicet. Illud insuper hanc opinionem corroborat, quòd prope stagnantes aquas hæc planta plerumq;
virescat, vbi eam Dioscorides nasci testatur. Manebo itaq; hac in sententia, etiam latrantibus Sycophantibus, quoniam non
quispiam appareat Dioscorides, qui aliud asserat nobis Hydropiper, quod sua è sede hinc abigat persicariam. Sternetur com-
mode hæc recens, viridisq; in thalamis, pulicibus necandis, & postera die eycitur. Suilla carnes salsa, circumducta herba præ-
seruantur a tarmis & vermibus. Ideoq; præstat succus ad vermiculosas aures. Ceterum altera, quæ eadem est facie, nisi
quod

quod in arboribus est, maculosis provenit folijs, caule vegetiore, humi accubante & racemis grandioribus: viribus est longè
 & circa eos folia olea longa, multa: & in cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum, .i. tenues,
 quod suo acri odore sternutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, suggillationes
 rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

Hydropiper
 r's vires ex
 Galeno.
 Nomina

Hydropiper seu Piper aquaticum, vel Persicaria à forma foliorum. Est autem Persicaria alia acris, a-
 lamitis: & quæ mitis est, alia maculosa, alia non maculosa. I. Persicaria vrens seu Hydropiper. C.B. Pul-
 caria maculosa, Brunf. Hydropiper, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dios. Lac. Cast. Lug. Cæs. Hydropipe-
 r. Dod. fol. Lob. icon. Persicariæ primum genus, Trago: Persicaria mas. Lon: Persicaria vrens, Lob. Per-
 sicaria mordax, Thal. Persicaria, Tab. II. Persicaria mitis maculosa. C.B. Lob. icon. Persicaria scemina,
 Trun. Lon. Persicaria altera, Matth. Trag. Persicaria. Fuch. Dod. gal. & fol. Ges. hor. Lug. Cast. Persicaria
 maculata, Thal. Crataegonum, Laeu. Persicaria prima Cæs. Hæc quibusdam Lappathum quoddam: aliis
 Plumbago Plinii: aliis eiusdem lib. 25. cap. 3. Britannica, & apud Dioscoridem Britannica seu Bretanica,
 quæ & Betonica, quod caput à recentioribus, tanquam spurium est deletum.

Πταρμική.

PTARMICA.

CAP. CLVI.

PTarmica exiguus frutex est, surculos habens paruos, multos, † & rotundos, abrotano non dissimiles: † Or. ἀπὸ τῆς
 & circa eos folia olea longa, multa: & in cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum, .i. tenues,
 quod suo acri odore sternutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, suggillationes
 rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

I. PTARMICA.

II. PTARMICA ALTERA.



Xeranthemum
 Placit
 Sph.

PTarmica in Bohemia passim in hortis seritur, è montib. in quibus nascitur, illuc translata. Hanc, quod acri sit sapore, Ptarmicæ hi-
 quidam Pyrethrum vocant. Surculos habet tenues, sesquidrantales, rotundos, & circa eos folia oblonga, oleaginea, stria-
 copiosa; & per ambitum serrata, flores in cacumine Anthemidis figura, minores tamen, sed dilutiore umbilico, qui suo a-
 cri odore sternutamenta mouet, unde illi nomen. Nascitur sua sponte in montibus, saxosis locis. Aperiit Ptarmica, discutit,
 prouocat, attenuat & incidit. Sicca puluis naribus inditus sternutamenta mouet. Mansa radix dentiū dolores mulcet, &
 pruritū detrahit. Folia cum florib. illita, suggillationes rapiunt. Est quoq; alia PLANTA, quā Ptarmicā appellare libuit,
 quod canib. tenuibus proueniat: folijs olea, & florib. & capitulis, quæ narib. immissa, sternutamenta cieant. * Ptarmica in
 Hetruria frequentissima prouenit: nascitur & in Trietino agro, præsertim Ananiensi tractu, surculis frequentib. paruis, ro-
 tunda, abrotano nō dissimilibus: è quib. plurima prodeūt folia incana, olea modo obloga: unde & Oliuella multis vulgò no-
 minatur. Gerit in surculorū cacuminib. capitulū, Chamameli destoretis modo: cui quemadmodū & herba, vis quadā aded
 acris inest, ut olfactu statim sternutamenta excitet. Rura nostra ex Ptarmica Scopas, quib. pauimenta verruntur, conficiunt,
 nec in

Ptarmicæ vi-
res ex Gal.
Nomina,

nec in alium colligunt vsus. * Verum hac Dioscoridis Ptarmica non est. Huiusce meminit Galenus lib. 8. simpl. med. bi-
verbis: Ptarmica flores ciende sternutationis vim obtinent: est enim temperies eius calida & sicca, viridis etiam, um ordi-
secundo, siccat & tertio. Eius nomen Græcum *απαρμίζω*, Latinum item Ptarmica & Sternutamentaria: Italicū Ptarmica.

Dracunculus aquaticus ferrato folio. C.B. Pyrethrum, Brunf. quoad iconem. Tanacetum album
acutum, Trag. Tab. Pyrethrum sylvestre, Dod. gal. Cord. in Diosc. Ptarmice, Fuch. Lon. Ptarmica, Mar-
Gef. hor. Lob. icon. Cast. Lug. Cam. Ptarmica sylvestris germanica, Thal. Ptarmica folio Taraconis, Leb-
obs. Ptarmica quibusdam purata, Cas. Draco sylu. Dod. fol. Gef. hor. cui & Tarchon aquaticum. II. lacta
ole. & folio altera. C.B. Ptarmica altera, Matth. Lugd. Ptarmica, Lac. Ptarmica Austriaca, Clus. Pan. Lob.
Cam. Matthiolus editione secunda hanc, & non priorem proponit, quare verba eius asteriscis inclusa in-
serere lubuit.

Στρουθιον.

RADICVLA SEV LANARIA HERBA.

CAP. CLVII

Struthium herba vulgò nota: qua purgandis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, vi-
nam ciēt: prodest tussi, iocinerosis, orthopnœæ ex melle sumpta, cochlearis mensura: aluum soluit. Ex-
dem cum panace & capparis radice, calculos frangit, & cum vrina exturbat: duritiem lienis absomit: men-
fes imposita trahit: partus efficaciter enecat. Cum polenta autem, & aceto illita, lepras tollit: tubercula
discutit, cum farina hordeacea, & vino decocta. Miscerur & malagmatis, & ocularibus colliriis, claritas
causa. Sternutamenta mouet: per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

I. PSEVDOSTRUTHIVM.

* II. SAPONARIA *



Struthii con-
sideratio.

Struthion seu Radicula, aded olim vulgaris notitia fuit, quod purgandis lanis ea vterentur, vt Dioscorides eam notis vi-
lis representare superuacaneum duxerit. Sed cum tractu temporis huius exoleuerit vsus, eius quoq; notitia simul ab-
lita videtur. Quo fit, vt arduum sit nobis nunc diiudicare, quenam planta Italis Struthion iure dici possit. Mauritiam
& officinis Condisi ea nominatur, quam illi frequenter medicamentis admiscunt, quibus naribus inditis sternutamenta
ciēt. Nec propterea vsquam in officinis reperitur, quamuis medicorum compositionibus sapius inferatur. Quamobrem of-
serere non ausim, an Struthion nascatur in Italia: quippe quod hactenus ipsum non modo non viderim, sed neminem, qui se
illud cognosceret & ostenderet, adinuenerim. Theophrastus inter folio aculeatas struthium habet lib. 6. ca. 3. de plant. arum
historia. Plinius verò lib. 19. cap. 3. his verbis struthium describit: At que vocatur Radicula, lauridus demum lanis succum
habet: mirum quantum conferens candori mollitiq;. Aequè nascitur satiuæ vbiq;, sed sponte præcipua in Asia, Syriaq; sa-
xosis, & asperis locis. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule ferulaceo, tenui, & ipso citis indigenarum experio. &
tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur: folio oleæ, struthion Græci vocant. Eleret æstate, grata aspectu, verum sine odore,
spinosa & caule lanuginoso. Semen ei nullum: radix magna, qua conciditur ad quem dictum est, vsus. Non desunt, qui
struthium plantam esse velint, cuius hic quoq; imaginem dedimus, eamq; pseudostruthium appellauimus. sed cum aculeata
plantam non sit, ferulaceum caulem non gerat, nec lanuginosum, nec semen spicatum proferat, neq; admodum crassa
tatur radice, nec aded sit acris, vt excalfacere & siccare possit ordine quarto, ijs qui hac duuntur opinione, hæc subseru-
re p-

Struthium
Plinii.

Pseudostru-
thii confid.

Pseudostruthium folia profert longa, subpinguia, caules multiplices foliososq; in quorum summitate spicati
 produunt flores. Radice nititur candida, longa, digitali crassitudine, & rapiani modo acri. Nascitur incultis locis, secus i-
 trina, & in agrorum marginibus. Radix exsiccatur & siccat ordine tertio. Incidit, attenuat, resoluit, aperit, digerit. Sunt
 enim, qui eam preferant contra venenosorum animalium ictus, non modo vulnere admotam, sed etiā in potu sumptam.
 Quinetiam aduersus pestilentia contagia. Struthii vires adnotauit Gal. lib 8. simp. med. sic inquit: Struthii radice petif-
 ficam vitium, utpote gustu acri, & calida siccaq; temperamento, ex quarto quodammodo ordine. Sed & abstergit & ir-
 ruat: proinde quoq; sternutationem prouocat, ceu cetera omnia, quae calida sunt temperie & gustu acria. Ex his omnibus
 palam sit Fuchium virum alioqui doctissimum, in hoc errasse, quod in suis de stirpium historia clarissimis commentarijs,
 plantam vulgò Saponariam vocatam legitimum Struthium esse censeat, eamq; pro Struthio depingat. Hac enim folio
 plantagine exit, non olea: laui non aculeato: caule geniculato, non lanuginoso: gustu potius insipido est, quam aded acri,
 ut quantum exsiccantium ordinem attingat. Quae herba *σπέρδιον* Graecè: Struthium, Radicula & herba lanaria Lati-
 ne dicitur: Arabie Condes, Chundes seu Kunder, Barbarè Condisi: Italicè Radicetta & Herba lanaria: Gallis Herbe aux
 foulons. Pseudostruthium, quidam Theriacariam vocant.

Struthii vires
ex Gal.

Fuch. lapsus,
Saponariam
Struthiū sta-
tuentis.

Nomina.

I. Quam pro Pseudostruthio proposuit, Plinius lib. 33. cap. 5. Luteam: Vitruuius 7. Architecturae 14.
 Luteum: Virgilius Egloga 4. Lutum appellat: sunt qui Resedam Plinii: alii Myagron, seu Melampyron
 Dioscoridis velint, Luteola herba C. B. Anthirrinum, Trag. Lugd. Pseudostruthium, Matth. Cast. Stru-
 thium, Lac. Lugd. Herba lutea, Dod. gal. Lugd. qui tres habet figuras. Lutea vel Luteum, Ges. hor. Cam.
 Luteola, Job. Lutum herba, Dod. fol. Guadarella vulgo, Cæs. Catanance, Lonic. Tab. II. Saponaria læ-
 uis, quod saponis vicem præbeat ad purgandos pannos: Saponaria, Trago, Matth. Ges. hor. Lac. Lob.
 Dod. fol. Cæs. Tab. Cam. Saponaria maior, Lugd. Struthium, Fuch. Lonic. Lugd. qui duas habet icones,
 Thlio. Flore est dilute purpureo, aliquando roseo, nonnunquam candido.

Κυκλάμινος

CYCLAMINVS.

CAP. CLVIII.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea, varia, in quibus supra infraq; albicant maculae: caule nudo,
 quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum
 lata, ut rapum videri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; detrahit: menses potu, ap-
 posituue ciet. Tradunt, si prægnas radicem transgrediatur, abortum fieri, partum appensa accelerat: con-
 tra venena, præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita contra serpentium ictus remedio est: immista
 vino inebriat: regium morbum discutit. tribus drachmis pota, cum passo, aut diluto mulso. Sed oportet
 cum qui ebibit, multis vestibis contectum, loco calido, & a perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius
 erudet: eiectionem autem sudores sallei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infun-
 ditur: ad deicienda quoq; alui excrementa, in vellere sedi subiicitur: illito vmbilico, & a imo ventre co-
 raxam tenuis, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & remissa oculorum aciei, oblitus cum
 melle succus prodest: medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociua
 sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutè purgat,
 eruptiones popularū reprimat: vulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur. lienen babsuim, vitia
 cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras & capitis vlcuscula, pernionesq; foueri
 congruū est: ipsaq; in oleo vetere feruefacta, illito oleo vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo
 expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, ut strigmenti cras-
 situdinem vnguentum contrahat, cum primis vtile pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur,
 Nascitur ad amatoria assumi cōtusalam, & in passillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus.

a Meum

επογραπία.
i. imo ventre.
Cat. σπιγα-
σπία. i. circa
vmbilicum.
b Meum &
Cat. addunt
καπλασμο-
μένν. i. im-
posita.

Ἐτέρα κυκλάμινος.

ALTERA CYCLAMINVS.

CAP. CLIX.

Et altera cyclaminus, quam cissanthemon, aut cissophyllon vocant: foliis hederæ, sed minoribus:
 geniculatis caulibus, crassisq; circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candi-
 do, odorato: a acinis hederæ molibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua. Nascitur in a-
 speris. Huius acini drachmæ vnius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus lie-
nem per vrinam, & aluum absumunt: ad orthopnoeam bibitur: reliquias a partu purgat.

a Meū & Cat.

καρπός δ' εὖς
καί τις σαφύ-
λῆς ὁμοίος
κισσῶ i. Fru-
ctus est velut
vix acini, si-
milis hederæ.

Cyclamini
confid.

Ruell. lapsus.

Sigillum S.
Mariæ.

Bothomariæ
Mauritan.

Cyclamini
genera ex
Mel.


Cyclamini
vires ex Mel.

Cyclamini
vires Matth.

Sanguis.

Tametsi Cyclaminus prima, quæ vulgò Panis porcinus dicitur, planta sit vulgaris notitia, secundam tamen hucusque
 mihi videre non licuit in Italia: quanquam asserit Ruellius, hanc illam esse stirpem, quam herbariorum & officina-
 rum vulgus Sigillum sanctæ Mariæ vocat. Et cum plures sint herba, quæ ab imperitis eo nomine appellantur, polygonatum
 salicet, Serapionis secacul, & tertia, quæ hydropiperi similis est: harum Ruellius nullam esse Cyclaminum putat, sed aliam
 ab his longe diuersam, cuius facies, ut ipse delineat, nil aliud representare videtur, quam vitem nigram à Dioscoride lib. 4.
 descriptam, quam nos in Hetruria vulgò vocamus Tamaro. Hanc scribit ipse Sigilli sanctæ Mariæ nomen sibi ascriuisse, quod
 eam Mauritanii Bothomariæ nomen. Quæ in re Ruellius, eius pace dixerim, aperte fallitur: quandoquidem tota Mau-
 ritanorum familia primum tantum genus, non autem alteram Cyclaminum Bothomariæ nuncupat. Non defuerunt,
 qui varias ad nos cyclamini alterius plantas miserint censendas: sed cum pluribus cyclaminis ipsius destitueretur notis, eas
 omnes me neglexi, & ingenuè fateor. Cyclamini primi generis dua (ut Mesues auctor est) reperiuntur species, maior & mi-
 nor. Hæc radice prouenit parua nucis auellanae, cicerumq; magnitudine. Illa verò magna constat radice, sessili aliquantum,
 lata, in rami modum extruberante, pullo colore: quæ (ut diximus) vulgaris admodum est, & passim in syluis & vmbrosis
 nascens, maximè sub arboribus, & in frutetis, secus itinera. Minorē vidi ego in agro solùm Tridentino in vallis Anania mon-
 tib. ubi copiosa nascitur. Cyclaminus (ut idē Mesues memoria prodidit) tam hausta quæ clystere infusa, pituita viscosam mi-
 risse detrahit. Coli cruciatus tollit a pituita progenitos, aut ab induratis excrementis. Succus in errhinis additur ad expurgā-
 dum cerebrū, & diuturnos finiat capitis dolores, frigidisq; cōueniat hemicranij. Itē resolutis opitulatur, ac omnib. cerebri, et
 vtriusq; affectibus a frigiditate, puenientibus. Aqua distillata a cyclamini radicibus si naribus sursum trahatur, fluentē inde sanguinē
 vrinam modū sistit. Eadē pota sexvnciarū pōdere, addita selectis sacchari vicia, manās ē pectore, aut vetriculo aut iocinore

I. CYCLAMINVS.




Cyclamini vires ex Gal.

Nomina.

stergit, & incidit, & ora venarum aperit, & attrahit & digerit. Clarum verò id est ex particularibus operibus. Ad eò vehemens eius facultas est, vt abdomine illito, ventrem subducat, & fœtum interimat. Κυλάμιος herba sic Graecis, Latine quoq; Cyclaminus, & Rapum terra vocatur: Mauritani Buchormarien, Buthermarien seu Bothormarie: Barbari officinæ Cyclamen, Panis porcinus, & Arthanita: Italici Cyclamino & Pan Porcino: Germani Schweinbrodt/Erdaßffel. Hispani Pan de puerco: Galli Cyclamen seu pain de pourceau.

Cyclaminis differentias octo agnoscimus, hic verò duas proponimus. I. Cyclamen orbiculato folio, infernè purpurascens. C. B. Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, Trag. Cyclaminus, Matth. Doi. ga. Cord. in Diosc. & hist. Ges. hor. Lacu. Lon. Cæs. Cast. Cyclaminus rotunda, Fuch. Cyclamen folio herderaceo rotundiore, Lob. obs. Cyclamen vulgare, Lob. icon. Cyclaminus orbicularis rotundifolius.

* II. CYCLAMEN RADICE oblonga. *



num maculis, purpureis tamen euidentibus: folia rumicis, sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit, racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram vertitur.

sanguinem mirificè cohibet: & fracta ibi vasa conglutinat, ad quod nos attestamur. Succus cum oxymelite sumptus duarum drachmarum pondere, aluum exoluit, & icteris leniunt, obstructions aperit, quo fit, vt hydropicos & ictericos tuet. Sed is propinandus non est, nisi addita Mastiche, aut myrsina nuce, aut Rhabarbari scrupulo: namq; hac eius vehementiam minuunt. Contusa radices recentes illinuntur vtiliter ser-rhosis, durisq; tumoribus & strumis. Additur quoq; maior succus in ynquentis, quæ ad splenis tumorem, duritiemq; videntur: plures enim liengi hoc medicamento sanati sunt, quibus antea vti, sanari nequuerunt. Idem magno quoque auxilio additur in clysteria ijs, qui coli dolore, & ceteris intestinorum torminibus vexantur. Affricta recens radix, cum succo ex lana impositus, hemorrhoidas eijcit. Sanant radices aurium sonos, & surditatem, si concisa, in rosaceo, amygdalino, chamamaliq; oleo, & vini modico conferueant, & deinde oleum guttatim in aures fundatur, & excotta radice calida auribus applicentur, vesperti cum se cubitum recipiant affecti: verum hoc pluries repetendum est, radicibus mane sublatis, auribusq; calido vino ablatis. Idem quoq; prestatur, si cum persicorum, amararumq; amygdalarum aliquot contendantur, & deinde in aqua vitæ macerentur diebus tribus, si quidem expressus inde cremor, auribus inditus, mirificè auxiliatur, si vna, aut altera eiusdem gutta instilletur eodem tempore: Succus abdomini illitus, ventrem subducit. Illita radix serpentum ictibus medetur. Succus cum æquali mellis portione, in ore detentus, lingua, gingiuarum, ceterarumq; circumstantium partium vitia sanat, & dentium dolores mulcet. Gargarizatur succus, addita plantaginis aqua, ad eorum faucium morbos. Cyclamini meminit Gal. lib. 7. simp. medic. vbi ita scribit: Cyclaminus varias vires obtinet: nam & ab-

Δρακονίλια μεγάλη. DRACUNCVLVS MAIOR. CAP. CLX.

DRacunculus maior in vmbrosis circum septagignitur. Caulem habet rectum. lauem, duum cubitorum, baculi crassitudine, vesicoloribus dracocoloribus, maculis, purpureis tamen euidentibus: folia rumicis, sibi inuicem implicata. Fructum summo caule facit, racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram vertitur.

gentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, dum maturefcit, & succus exprimitur siccatuq; in umbra. Radix quoq; messibus effoditur, elotaq; particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatu in umbra. Vis ei calfaciendi cum diluta vini potione. Crudam, coctamve cum melle delingi prodest contra orthopneas, rupta, conuulsa. tussim & destillationes: pota cum vino venerem stimulat: vlcera, quæ cacoethe vocantur, atq; phagedanica expurgat, præsertim cum vite alba: ex ea, & melle collyria ad fistulas, & partus euocandos componuntur: ad vitilignes cum melle, efficaciter illinitur: polypos & carcinomata absomit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas caliginem, albuginesq; effectum præbet. Herba, radicisq; odor teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt, qui eius succum cum oleo, aurium dolorib. infundere: quin etiam folia, utpote quæ adstringant, vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exemerit, posse à vipera feriri inficiantur.

Δρακονίς μικρά

DRACUNCVLVS MINOR.

CAP. CLXI.

DRACUNCVLVS minor folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, verticolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguē planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim cohæret, colore primùm herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxq; radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. a Nascitur in se-
 20 politis. polypum absomit: carcinomata illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus infe-
 runt. Odorem aiunt, postea quàm flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix
 30 excalfacit: orthopneis, ruptis, vulsis, tussi, destillationib. auxiliatur: humores pectoris excreatu faciles red-
 dit, siue cocta rostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: urinã pellit, ve-
 nerem excitat, cum vino pota: phagedanas vlcerum, & quæ cacoethe vocantur, trita cum melle, & bryo-
 ma alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas, & eiciendos partus fieri solent: qui
 radice sua manus perfricuerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto vitilignes emaculat. Folia recent-
 40 ribus vulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus apposuis-
 se prodest. Caseus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines & o-
 culorum caligines conuenit. Radix cocta, crudave ad sanorum vsus, pro olere recipitur. In Gymnensis in-
 50 sulis quæ Baleares vocantur, coctã radicem cum melle multo, in cõuiujs placentarũ loco offerunt. Radix
 mellibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatu in umbra, & ita reconditur.


a Meum
 φύτα, εν
 συσκιαις αει
 φραγμεις κρη
 αιμασιαι. i.
 Nascitur in
 vmbrosis cir-
 ca sepes &
 macerias.

I. DRACUNCVLVS maior.

II. DRACUNCVLVS minor.



Licet in vetustis quibusdam Dioscoridis codicibus maioris minorisq; Dracunculi historia speciatim diuisis capitibus ad-
 notata reperiatu: attamen cum altera ab altera parum disidere videatur, cumq; etiam Galenus, Paulu. & Serapio, Dracunculo-
 qui in simplicium materia Dioscoridem ad vnguem secuti sunt; eiusq; dicta bona fide retulerunt, vnus tantum Dracun-
 culi meminerint: non ab re credere recentiorum nonnulli, horũ alterum ex alterius auctoris offum. prodijse, & alicuius
 curiosi-

III. DRACUNCVLVS AQVA-
ticus.Dracunculus
maior.Dracunculus
alter.Dracunculi
species ex
Plinio.Theophras-
tus de Dra-
cunculo.Dracunculi
vires Matth.Dracunculi
vires ex Gal.

Mesues.

Dracunculus
tertius Plinia.

Qualitas.

Dracunculus
hortensis.


curiositate hic historia Dioscoridis accretisse. Quamobrem
ego quoque cogor eisdem adductis rationibus, aliquatenus in
eorum ire sententiam: quanquam ingenue fateri possum, me
vtrumque Dracunculum Tridenti ac Venetijs vidisse. alterum
quidem, qui maior est, Ari sive Rumicis folijs, sibi inuicem im-
plicatis, caule bicubitali, baculi crassitudine, versicolore, ma-
culis in purpuram nigricantibus resperso, adeo ut angustissimis
videatur: alterum vero, qui & minor, & omnibus vniuersis
ris est, folijs hederaceis, albis quibusdam maculis confectis:
caule ac fructu maiori similibus. Quippe quod longam ex
vaginam emittat externa parte herbaceam, interna vero ni-
gricanti purpura infectam, e cuius medio corniculum profertur
purpurascens, a quo demum racemosum oritur semen (ut Dio-
scorides inquit) cinereo primum colore, per maturitatem ve-
ro aereo rufescente, feruenti ac mordaci gustu. Radice nitum
rotunda, bulbosa, acri, tenui libro obduta. Quinetiam in ce-
teris totius planta notis, a maiori Dracunculi historia nihil
ferè differre conspicitur. Quapropter etsi predicta recentiorum
sententia non ausim refragari, quod rationibus satis euiden-
tibus nitatur, & doctissimorum consensu confirmetur: cum
tamen sapius maiorem & minorem Dracunculum viderim,
non prorsus alienum esse necesse quandoque cogitavi, si quis suspi-
cetur duo, ut sunt Dracunculi genera, a Dioscoride sive, e ca-
plici etiam historia representata. Hanc quoque illi suspitionem
augere poterit Plinius, qui non tantum duas, sed quatuor e-
numerat Dracunculi species lib. 24. ca. 36. sic inquit: Id e-
dem quod Graeci Dracontion vocant, triplici effigie mihi de-
monstratum est, folijs betae, non sine thyrso, flore purpureo: hoc
est simile Aro. Alij radice longa, veluti signata, artu uio-
monstruere, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio
fuit folio maiore, quam cornus, radice arundinacea, totidem
(ut affirmabant) geniculata nodis, quos haberet annos. totidem

demque esse folia. Quarta vero generis meminit ipse in sequentibus lib. 25. cap. 2. cum inquit: Eadem Lusitania provincia
cognoui in agro hospitis nuper ibi repertum Dracunculum appellatum, caule pollicari crassitudine, versicoloribus viperarum
maculis, quem ferebant contra omnium morsus esse remedium. Alij sunt, quos in priori volumine eiusdem nominis diximus:
sed huic alia figura. Aliudque miraculum exeuertis e terra ad primas serpentium vernationes bipedali ferè altitudine, ruf-
susque cum eisdem in terram se condentis: nec omnino occultato eo apparet serpens: hac Plinius. Huc etiam accedat Theo-
phrastris auctoritas, qui lib. 7. cap. 11. de plant. hist. Secundum Dracunculi genus inter Ari genera constituit, his verbis: Dra-
cunculi autem radix (sunt enim qui genus quoddam Ari Dracunculi appellant, quod eius caulis varietatem habeat quan-
dam) cibo inepta penitus est, & medicis tantum commoda. Ex his igitur, & Pliny verbu perspicuum omnibus fieri potest,
plura esse Dracontion sive Dracunculi genera, ut etiam Venetijs oculata fide comprobari potest in horto Clarissimi medici Ma-
phei à Mapheo, vbi praeter Arum duo videntur astate Dracunculi genera. Radicis farina duarum drachmarum pondere ex mel-
le sumpta, pituitam tam crassam, quam tenuem, per inferna ducit, & renes expedit, & praesertim ex vuarum passiarum cre-
more, & mastiches momento sumpta. Recens radix feruenti cinere tosta & illita, dolorificas & tumentes hemorrhoides cu-
rat. Resoluit illita scirrhusos tumores, strumas & chercidas, & lienis duritiem emollit. Eadem absterguntur cutis maculae
quacunque. Cum melle & caprino simo illinitur vitiliter podagricis, neruorumque contusionibus. Supposita menses remouent
trahit. Dracunculus, ut Galenus testatum reliquit lib. 6. simpl. medic. quiddam Aro persimile obtinet, tum folijs, tum ra-
dice: ceterum illo tum acris est, tum amarius: ac proinde calfactorium magis, & tenuioribus partibus. Habet etiam leuam
quandam adstrictionem, quae quandoquidem cum predictis duabus qualitatibus, acris scilicet & amara, coniuncta est, me-
dicamentum factum est utique maxime efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum, & lentos succos
extenuans: optimumque remedium est contumacium ulcerum, quae varicosis nuncupant: hac Galenus. Ceterum de Dra-
cunculo differens Mesues inter cetera simplicia medicamenta, quae deiectionaria vi pollent, scripsit, eo hausto deiectione corpore pitui-
tam. Quae in re à Manardo acriter reprehenditur: quippe quod vbi dixerit Galenus, ac etiam Paulus ipsum secutus, Dra-
cunculum omnia corporis viscera expurgare, non quod deiciat, id agere intelligunt, sed quod obstructions aperiat, crassam
pituitam attenuet, & vasa detergat. Est & aliud DRACUNCULI genus, quod quidem tertium apud Plinium, cum
Fuchio viro doctissimo esse putamus. Siquidem illi folia sunt Corni arboris ferè similia, & radix arundinacea, genicula-
ta, longa & Ari modo feruens. Insuper ex geniculis ipsis multiplices oriuntur fibrae, quibus pertinaciter humi inhaeret. Ra-
dice folia prodeunt oblonga, Ariari alterius amula, e quorum exortu alia exurgunt folia, longis pediculis nitentia, quae ut
diximus, Corni arboris folia referunt, sed his grandiora, tenuioraque, habentur, e quorum nonnulla, quae conclusa sunt, ut eius in
immagine videri apertissime potest, fructus racematim enascitur, bacis per maturitatem rufescentibus, in quibus semen est ni-
grum, paruum & oblongum, crasso quodam succo circumdatam. Nasitur montanis locis, sed humectis & vliginosis. Hanc in
Moravia primum legimus, dum illac iter faceremus. Degustata radix primo statim occursum insipida deprehenditur, et penitus
post linguam, sautesque, adeo vellicat, ut omnes illae partes tenuissimum pungi aculeis videantur. Itaque valenter excalfactis &
siccat: quin etiam adurit vlieratque, ideoque rarefacit & incidit quae in corpore crassa, lentaque sunt extremata, perinde ac Dra-
cunculi alij & Arum, quare ab his viribus non differt, sed facultate imbecilliore habetur. Ab omnibus his forma maxime dif-
fert HORTENSIS Dracunculus, quo in acetarijs vescimur, utimurque, ad intinctus acerrimo gustu. Caules fundit nune-
rosos, tenues, in quibus folia oblonga [lini modo] radicibus [cohaeret] humi repentibus, graminis modo, floribus passillis, albis
racemosis, femine superuacuo. Seritur in hortis ferè omnibus. Sunt qui afferunt hanc plantam cultorum in angonio facillime esse
non sui natura procreare, eam siquidem nasci putant lini semine excavatis cepis imposito, ac deinde terra recodito: sed hoc falsum
credimus.

IV. DRACONCELLVS.

V. OPHIOGLOSSON.

* Ophio. abortus. *



crediderim, quod facto periculo, operam quidam perdidierint. Huius nec Graci, nec etiã Mauritanii, q. sciam, meminere. Verim perpenſa eius acrimonia, qua maxime lingua vellicat, eorũ esse medicamentorum, qua valentiſſimè excaſciunt atq; ſecant, facile conijci poteſt. Incidit, digerit, aperit & prouocat: manſa pituitam ciet: dentium dolores mulcet: concoctionem adiuuat & vrinas mouet. Eſtur paſſim in acetarijs vnã cum lactucis, alijsq; oleribus. Habetur præterea & alia herba, quam inter Dracunculi ſpecies quidam reſeruent, quod LINGVA Serpentina nonnullis dicatur, etſi non deſint, qui Lucciolam & Argentiam ipſam appellent. Nascitur hæc in pratis, ſed ocyſſimè deperditur. Proſilit enim menſe Maio, ſed cum teneriſſima ſit, pauco poſt tempore euanida flacceſcit, ac ſubinde nuſquam apparet. Mittit vnum tantum folium, pingue, plantagini aquatica vocatã haud diſſimile, nulla per medium excurrente coſta, è cuius inferiore ſinu cauliculus exit, pallidam ſerpentis linguam in cacumine gerens: vnde Græcorum voce Ophiogloſſi nomen inuenit. Exiccat citra inſignem caliditatem. Præſtat hæc maxime ad recentia vulnera glutinanda: quo ſit, vt eam quidam miriſicè extollant ad enterocelas. Maceratur in oleo, quo diutius inſolato vtuntur chirurgi ad prædicta felici (vt aiunt) ſucceſſu. Datur potanda ex aqua Equiſeti, ad inteſtinorum, & thoracis vulnera, & cæterarum intrinſecarum corporis partium. Ideoq; auxiliatur ſanguinem reiicientibus: bibitur aduerſus alba ſeminarum profluuiã, ex aqua foliorum quercus. Vinum auſterum, in quo tota planta incocta fuerit, ſi cum eo oculi abluantur, lachrymas cohibet: illinitur recens, ſiccæ ad vulnereſt inflammationes, ex gallinæ adipe. Omphacinum oleum, in quo copioſa folia diu fuerint macerata inſolatãq; addita lachryma abegna, aptiſſimum ſit medicamentum vulneribus recentibus glutinandis. *Δρακόνιον* quod Graci vocant, Latinis Dracunculus appellatur: Arabibus Luſ & Alluſſ: Italis Dragontea: Germanis Natterwurk: Hiſpanis Taragontia: Gallis Serpentine. Dracunculus minor, Græcis *Δρακόνια μικρά*: Italis Dragontea & Serpentaria minore: Germanis Klein Natterwurk: Gallis Petite Serpentine. Dracunculus aquaticus, Italis Serpentaria acquatica: Germanis Waſſer Natterwurk. Dracunculus hortenſis, Italis Dragoncello & Dragone: Gallis Targon. Ophiogloſſum, Græcis *ὀφιογλωσσόν*: Italis Lingua ſerpentina, Argentina ſiue herba Lucciola: Germanis Natterzünſlin: Gallis Herbe ſans chouſture, ſiue Langue de ſerpent.

Lingua Serpentina ſiue Ophiogloſſon.
Ophiogloſſi vires.
Nomina.

Dracunculus triplex proponitur. I. Dracunculus biſtortæ folio. C. B. Dracunculus maior, Matth. Caſt. Dracunculus Matth. Dod. Gal. Dracunculus maior Matth. Dod. fol. Serpentaria maior Matth. Lug. Dracuncium maius, Tab. Hoc an in rerum natura ſit, Dodonæus dubitat: Aduerſaria inueniri negant: hætenus eum non vidimus, quare nil aſtruere licet, at omnes rei herbariæ ſtudioſos publici boni cauſſa rogamus, vt ſi eum vel habeant vel inueniant, nobis eius copiam faciant. II. Dracunculus polyphyllos, qui Dioſcoridis maior videtur & Plinii. C. B. Dracuntium maius, Brunf. Dod. fol. Dracunculus maior, Trag. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dioſ. Lacu. Lon. Cam. Dracunculus minor, Matt. Caſt. Dracunculus polyphyllos & Loph criſpum, Cord. hiſt. Dracunculus, Gef. hor. Caſ. Anguina Dracontia & Serpentina Colubrina, Lob. Dracunculus ſiue Serpentina maior, & Serpentaria minor, Matt. Lug. qui duas habet figuras. III. Dracunculus paluſtris arundinacea radice C. B. Hydropiper rubrum, Fuch. & Dracunculus Plinii tertius, eadem in icon. Aron paluſtre, Gef. hor. Dracunculus paluſtris, Dod. gal. Cord. hiſt. Lug. Dracunculus paluſtris minor, Lon. Dracuntium paluſtre, Tab. Dracunculus aquaticus, Matt. Caſt. Dod. fol. Cam. Aquatica anguina ſiue Dracunculus, Lob. Dracontii genus apud Plinium, Caſ. IV. Dracunculus hortenſis integro folio C. B. Draco à Ruellio primò deſcriptus, Dod. gal. Dragoncellus, Matth. Dracunculus hortenſis eide in icon. Caſt. Tab. Draco hortenſis, Gef. hor. Lug. (cui & Chryſocome Dioſcoridis Dalechamptio) Cam. Draco, aut potius Tarchon Simeoni Sethi, Lob. Tarchon Auicennæ & Sethi, Gef. hor. Dragone vulgò,

Cæfalpino. V. Serpentaria secunda, Brunf. Ophioglossum, Trag. Fuchf. Matth. Dod. fol. & gal. Lon. Cast. Lug. (cui & Ceratia Plinii & Dracunculi species) Tab. Cam. Thal. Lob. cui & Encaphyllum, Lingua serpentina, Matth. Italico. Cast. Cæf. Lingua vulneraria Cord. hist. Lancea Christi & aliis Luceola, Gef. hor. Figura quidem Matthioli solum Ophioglossum non ramosum exprimit, hæc verò & non ramosum seu vulgatum, & ramosum & abortiuum exhibet.

Αρον.

A R V M.

CAP. CLXII.

• Oia exem.
μικρότερα ὅ
καλλιότε-
ρα. i. mino-
ra tamen &
minus macu-
losa.
Ca. ἀσπιλό-
τα. i. imma-
culata.

A Ron, apud Syros Lupha vocitatum, folia emittit Dracunculi, sed a longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croccum semen exit: radice dracunculi alba: quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta manduntur. Radix, semen & folia dracunculi vires habent. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expentur.

I. A R V M.

II. A R V M M I N V S.



Ari confid.

Ari descript.

Ari species
altera.Ari vires
Matth.

Arum in Hetruria, item in agro Goritiensi, frequentissimum prouenit, in campestribus, in vineis, in jacobium margi-
nibus, & passim in semitis propter sepes, præsertimq; in maritimis nostris Senensibus, vbi vulgò ipsum vocant Gigaro
ad larum alludentes: quo modo officinis Arum corrupto vocabulo appellari solet. Arum folia habet Hederacea, cordata
effigie, Dracunculi maiora, minimè dissecta, & albis resperfa maculis, quæ hyeme virent, & aestate siccantur. Caulem edit
palmarem, è cuius fastigio erumpit inuolucrum spithama ferè longitudine, in acutum desinens, quod fructu completur,
& fouet. Eo deinde fathiscente, solida pistilli facies aureo colore emergit, & anfractu penitus patète, crocea semina spectan-
tur, quæ in corona modum concinnè contexta, infimam eius sedem ambiunt. Hac non longo temporis tractu viridia fiunt,
& per maturitatē rufa, baccarū speciem præ se ferentia, vinosaq; ambiūt ipsa caulem, sese inuicē stipantia, frumēti in diti
modo. Radice nititur alba, bulbosa, oblonga, permultis stipata fibris, ellebori modo, gustu perquā acris. Nascentur in campestribus
in vineis, & secus itinera & sepes. In Bohemia quoq; in montibus quibusdam copiosum admodum prouenit, sed ita lico lon-
gè minus, folijsq; tenuioribus, & minori quoq; radice, ad eò vt ego hoc Arum minus appellare consueuerim. Ceterum
Ari alteram speciem, cuius hic imaginē expressimus, misit ad me Franciscus Calzolarius pharmacopæus Verouensis, in
plantaria indagator, è monte Baldo allatum. Huic folia insunt sagittæ speciem representantia, & caulis rectus, glaber, do-
drantalis, valde perspicuus, rubentium baccarum botrum in cacumine habens, confertum, & in acutum desinentem. Radi-
cibus nititur numerosis, tenuibus, circumquaq; se diffundentibus, è quibus bulbosi quidam globuli, fabarū quantitate de-
pendent, alba intus pulpa, & perquam acerrimi gustus. Excalfacit & siccit ordine quarto. Ideoq; vrit, attenuat, incidit &
abstergit. His nō desunt, qui vt antur ad arcendos a suis mensis parasitos, & voraces lurcones, earum puluerē delicatū epulis
admiscentes: nam vbi fauces occupauerit, tã fixo & contumaci ardore afficit, ne posthac quicquā vorare queant, nisi lube-
le caprillove lacte diutius gargarizato, aut receti butyro sēsim deglutito. Abstergit Arū, attenuat, aperit, incidit & suocat.
Decocta radix melle excepta, medetur pectoris morbus omnib. pituitosis: expectorat. n. valentissime crassas lentasq; excru-
tiones: ideoq; asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel feruentib. cinerib. tosta, vtiliter tussitibus, ex amygdalino oleo.
Id q; bellè quoq; præstat lac potū, in quo radix ipsa fuerit incocta. Illinitur eadē, aqua prius elixa, epiphoris, segillatim, infla-
matisq; tonsillis, sabacea farina addita, & desuto subacta. Subigitur quoq; oleo, & tumentib. hæmorrhoidibus com. modè
illinitur.

III. BONVS HENRICVS.



illinitur: Radicis succus exedentia & contumacia vlcera curat, quemadmodum & narium polypum folia ambusta sanant. In Semen tritum vel haccarum succus rosaceo commistus, aurium ponuntur eadem vtiliter podagricis, calenti fimo bubulo illita. doloribus auxiliatur. Dantur vtiliter seminis drachma due ad menses educendos, & secundas pellendas ex vino. Caterum cuni Arum in mentem mihi iam reuocet plantam, à quibusdam Serpentariam, Colubrinamq; vocatam, quamque Germani BONVM HENRICVM appellant, libuit eius historiam, & vires huic orationi attexere, quòd folijs Arum quadantenus referat, qua longis pediculis nitentia profert. Hec caules plures edit, ipsosq; foliosos, in quorum fastigijs herbacei, racemosiq; videntur flores, & deinde semen. Planta candicat tota, perinde ac si tenuissimo farina polline conspersa esset: quin etiam aded leuis tactu habetur, vt vngvine aliquo illita videatur, vnde illi nomē apud Germanos Schmerbel. Radice nititur vegea, crassa, in plures diuaticata partes, croceo colore, acuti lapathi modo, cuius speciem esse censemus. Nascitur ferè vbiq; in pagorum plateis, in ruderibus & areis. Planta est calidi & sicci temperamenti, aperit, abstergit, resoluit & digerit. Radicis succus illitus scabiem tollit, & cutis maculas extergit, praesertim si cum aceto misceatur. Quidam eam quoq; praeserunt aduersus venenosorum animalium morsus. Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillatitias aquas ad succum parant, quas ad faciem erugandam illustrandamq; magnis laudibus efferunt. Id quod etiam efficaciter praestat insolatus radicum succus, cerussa speciem referens, quem Gersa vulgò nominant, is siquidem mirum in modum carni splendorem, & candorem conciliat. Ari vires memorie prodidit Galenus libr. 11. simplicium medicamentorum, vbi ita scribit: Arum terrena essentia constat, sed calida: proinde extergendi vim possidet, verum nõ valentem, sicut Dracontium. Est itaq; in exiccando, & calefaciēda primi ordinis. Radices eius maxime sunt vtilis: siquidem comesa crassitiem humorũ medicatim inuidunt, adeo vt & excretionib; ex pectore idonea sint, sed magis tamen aptũ est Dracontium. Nescio sanè quare ratione scripserit Galenus, Arum, quo degustato os totum exurit, & acerrimum sentitur, calidum siccumq; ordine tantum primo haberi. Et lib. 2. de alimentorum facult. sic inquit: Ari radix rapi modo manditur. In quibusdam autem regionibus acrior quodammodo nascitur, vt Dracontio ferè similis sit. Dum rectè parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidam inycere conuenit. Cyrenis contra, quam in nostra regione, Arum se habet: nam illic minimum medicamentosi, minimumq; acrimoniae possidet, adeo vt vel r. ipis sit vtilius. Idcirco radicem quoq; in Italiam comportant, vt qua absq; vt putrescat aut regermet, longo tempore perdurare possit. Herba, quam Graci ἀρον, & Latini similiter Arum dicunt, Mauritanis Iarus & Sara: Syris Lupha vocatur: Barbaris, Aron, Barba Aaron, Dragontea minor, & Serpentaria minor: Italis Aro & Gigaro: Germanis Klein Matterwurtz: Hispanis Yaro: Gallis Vid de chien. Arum minus, Graci ἀρον μικρον: Italis Gigaro minore. Bonus Henricus, Italis Herba infarinata: German. Schmerbel oder Gut Henrich.

Boni Henrici histor.

Boni Henrici vires Matth.

Ari vires ex Gal.

Nomina.

Arum Plinius lib. 19. cap. 5. inter bulbi genera recenset: at lib. 24. cap. 16. maris & foeminae meminit: & à quibusdam radicem Aron, caulem verò Dracontium appellari monet. Aliquot differentias notauimus, aliud folio maiore & acutiore, aliud rotundiore, aliud duriore per totam aetatem virente. Sic eius quod maximo est folio, venae omnes albicant, apud Italos frequens: aliquando maculis albis est conspersum. Reperitur in Helueticis montibus quod nigricantibus litoribus, aliquando purpureis signatur: quod verò apud nos vulgatissimum, nullis maculis notatur. Sic & pistillus alteri purpureus, alteri ex albo luteus. III. Lapathum vinctuosum C. B. Bonus Henricus, Brunf. Trag. Matth. Tab. Rumicis tertium genus, Fuch. Rumicis secundum genus, Turnero: Totabona, Dodo. gal. & fol. (cui & Chrysolactanon) Lob. Thal. Lapathi syluestris secundum genus, Lugd. A. triplex canina, Loniceris.

Α' ε'ισαρον.

ARISARVM.

CAP. CLXIII.

Arisarum exigua herbula est: cuius radix oleae magnitudinem implet, longè maioris quam Aron acrimoniae. Vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radicis, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

Arisaron, Plinio lib. 24. cap. 16. auctore, in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tamen, minoribusq; folijs, & vtiq; radice, qua tamen oliuae grandis magnitudinem implet. Huius die hodie ab herbarijs ostenduntur genera: quorum primum ad me primum misit Aloisius Anguillarius Romanus, horti Patuini praefectus, diligentissimus rei herbariae inquisitor, qui praeterea testatus est, Arisarum plurimum nasci in agro Romano, non longè ab vrbe: Cui folia Aro similia sunt, à Luca Ghino viro optimo accepimus. Vtriusq; picturam exhibere libuit, non quod vtrumq; probemus (alterum enim non verum putamus) sed vt de ijs aliorum etiam sit iudicium. Primum folijs prouenit Ari, longè tamen minoribus: cauliculum edit tenuem, in cuius summitate vaginula quadam oritur, altera parte diuisa, è qua ligula tenuis, exigui germinis modo sese exerit, pallido colore. Radix illi oliuae instar magna, oblonga, candicans, adnatis pluribus vbiq; emergentibus. Nascitur in collibus & campestribus. ALTERVM folia mittit longa, angusta, longis pediculis nitentia: radicem bulbosam, iuglandis magnitudine, numerosis vbiq; adnatis fibris, gustu etiã acri. Excalfacit radix, siccit, incidit, abstergit, digerit & aperit. Meminit Arisari Galenus libro 6. simplicium medicamentorum his paucis: Arisarum multo minus

Arisari historia.

Arisari vires ex Galeno.

I. ARISARVM.

II. ARISARVM ALTERVM.



Nomina. minus est Aro. Radicem habet oliua magnitudine. Est autem multò ipso acrius. Vt Gra:is ἀείσαρον, ita etiam Arisarum Latinis, & Arisaro Italis nominatur. Arisarum alterum, siue Pseudoarisarum: Italis Arisaro falso.

I. Arisarum Matth. Dod. gal. Gef. hor. Arisarum primum, Lonic. Lug. Dracunculus minor, Gef. app. Lacu. Dracunculus alter seu henicophyllos, Cord. histo. Arum maius Veronense perperam Arisarum, Lob. Arisarum latifolium Matthioli, Tab. II. Arisarum angustifolium, (quod Dioscoridis esse videtur) C. B. Dod. fol. Clus. hisp. Tab. Lob. Arisarum tenuifolium, Cam. Arisarum alterum, Matth. Dod. gal. Lug. Lonic. Arisarum, Gef. hor. Lacu. Cæs. Pseudoarisarum, Castori.

Ἀσφόδελος

HASTVLA REGIA

CAP. CLXIII.

Hastula regia vulgaris notitiæ est: foliis maioris porri: caule læui, ferente in cacumine florem, quæ anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres. Quæ exal-
faciunt: vrinas & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis, & tussibus drachmæ pondere
potè ex vino medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente
demorsis datur aptissimè trium drachmarum pondere, verùm foliis, floribus & radice ex vino morsu-
linire oportet: item vlcera sordida & depascentia: mammarum quoq; & testium inflammationes, tuber-
cula, furunculosq; : decoctis in face vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Ra-
dicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitq; perquã vtile oculis medicamen-
tum: ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem
infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit: oleum in excavatis
radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus, & ambustis igni, conducit: & furditati instillatum
in aurem auxiliatur. Candidam vitiliginem, linteò antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen,
floresq; in vino poti, scolopendræ & scorpionum venenis, mirum in modum resistunt: aluum purgant.

Asphodeli
historia.

Asphodeli
melino flore.

Anthericum,
flos Aspho-
deli.

Hastula regia, quæ Græcis dicitur Ἀσφόδελος, planta est à radicibus foliosa, folijs porraceis longioribus, angustiori-
busq;, carina ad eò perminente, vt triquetra vileantur. Caulem edit cubitalem, & quandoq; maiorem, insigni la-
uitate: Flores in cacumine albicantes, (est etiam qui melinos faciat) numerosos, in stella modum sese pendentes, e quibus
bacca proueniunt subtortuda, herbacei coloris, in quibus triquetrum cõcluditur semen nigro colore. Particulatim florer, vt Scri-
la, ab imo incipiens, verbasci quoq; modo. Radicibus nititur numerosis, nigricantibus, bulbosis, oblongis, subuirescete raris pul-
pa indicis longitudine, & inferna sede crassioribus, prominente infima parte tenui cauda, succosis, acris & amaro gustu. Nas-
citur in montibus pingui solo. Plãta est spectatu iucunda, cū integra effoditur, ob ingentē bulborū numerū, qui sape centenariū
excedant, quanquã citato loco dicit Plinius, Asphodeli radicē alijs numerosiore esse, vt quæ octuaginta simul acervati sape
bulbis reperiatur. Atqui Gal. 2. de alim. facu. vna tantū bulbosa radice magnitudine, figura, amaroore scilla radice quoda-
modo simili, Asphodelum constare legitur. Ausus caulem (vt Plinius est auctor lib. 21. cap. 17. Theoph. & ferè Græci omnes)
cubitale, & sape quum cubitorū, anthericū vocauerunt: radicem verò, id est, bulbos, asphodelon. Latini autē illud albicantē, &
asphodelum hastulam regiam dixerunt. Ceterum Asphodeli florē recte Dioscorides è Nicandro poeta Medico vetustissimo ap-
pellat

I. HASTULA REG. SIVE
Asphod.

* II. ASPHODELVS
luteus. *



περὶ ἀσφιδέλου scribit contra Theophrastum, Plinium, & alios Græcos, qui caulem ita nominari volunt. Verba autem de
Thetiacæ Nicandri hæc sunt, quib. & caulem & semen describit dum plantã ad serpentium, & scorpionẽ ictus valere dicit:

Ἀσφιδέλου ἀσφιδέλοιο διαθέας ἀλλοτε ρίζαν,
Ἄλλοτε, καὶ καυλεῶν ὑπέρονον ἀνθερίκοιο.
Πολλὰκι δ' αὖ καὶ σπέρμα τελοῦσ' ἀμφοῖς ἀέζει.

Vermes Albuicum creat (vt Theophr. ait qui in volucres bestiolas flosculorum specie degenerant: ij tandem cum
flaccescens, inaruerit scapus, etoso conceptaculo prouolant. Mandebatur antiquitus, Hesiodo teste, huiusce planta tum
caulis in cinere tostus, tum bulbis cum semine, vino, & sale addito: quin etiam cum ficis, mira voluptate. Illinuntur utri-
liter asphodeli radices, ex aceto decocta, lichenosis scabiosisq;. Eadem cum hyoscyamo seruesacta, & pice liquida excepta,
alarum virus, tediane emendant. Crispantur quoq; capilli, de raso capiti affricta saepe radice. Ea epota, scripsere quidam
excitari venereos impetus. Iuuat eadem felle suffusus quin etiam aqua intercute affectos, ex vino pota. Decocta & illita
parotidas sanat. Eximuntur renum lapilli, si eiusdem ex vino decoctum sumatur in potu. Sanat illita iumentorum sca-
biem, & vlcera ad pilum reducit. Meminit eorum quoq; Gal. lib. 6. simp. med. sic inquit: Asphodeli radix utilis est, si-
cut ari, asari, & dyacontij, nempe extergentis, & disurgentis facultatis. Vsta autem cinis calidior, & exiccantior,
subtiliorq;, ac digerere poterior efficitur, ac proinde & alopecias sanat: hæc Galenus. Caterum asphodeli radix mirifice com-
mendatur Aetio lib. 1. ad ciendos menses, his verbis: Asphodeli radix in vino albo vetere decocta, & vino calido meraco
quæ mensura hausto, menses suppressos celerrimè ciet. Planta qua ασφιδέλος Græcè, Hastula regia Latine vocatur: A-
rabice, Cheunce, Bhunte, Birquach, Abg seu Arxeras: Italice Asphodelo Amphodillo & Hastula regia: Germanicè Gold-
wurz vnd Heidnisch: Hispanicè Gamones, Gamonites: Gallicè Asrodile.

Asphodeli v-
res ex Gal
Nomina

Asphodelus siue hastula regia, quoddum floret, effigiem ceptri regii referat: meminit Matthiolus
ferre flores albicantes, esse, quæ & melinos faciat, quare duæ figuræ adpositæ, cum non solum floris ra-
tione differant, sed totius plantæ magnitudine, cum albæ, radices sint crassiores, folia latiora: luteæ ve-
rò, & radices, quæ tenuiores luteæ sunt vt, & flores, folia angustiora, qua de re suo loco. I. Asphodelus
albus non ramosus, C. B. Hastula regia, Matth. Ges. hor. Lac. Lug. Asphodelus Lonic. Cast. Ges. Cæf.
Asphodelus mas, Dod. gal. Asphodelus albus, Ges. hor. Dod. fol. Chs. Hisp. Tab. Cam. Asphodelus ma-
ior albus, Lob. II. Asphodelus luteo flore & radice, C. B. & Camer. hastula regia apud Tragum: Hastu-
la regia minor, Cast. Asphodelus luteus Ges. hor. Tab. Cæf. Dod. fol. Lugd. Asphodelus luteus minor,
Lob. Lugd. (qui duas habet figuras) Tab. Iphyon Theophrasti, Angillara.

BVLBVS ESCVLENTVS CAP. CLXV.

Esculentus bulbus vulgè cognitus, à nobis estur. Stomacho, & aluo utilis rufus, & qui ex Africã de-
fertur. Amarum verò, & scilinus stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acri-
moniam habent, exalfaciunt, venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præ-
sent, carnes creant, inflationem pariunt: luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur:
spicula extrahunt: gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canum

morfus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures, & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt: fugillata varosq; per se, aut ex eu luteo, & lentigines cum melle, vel aceto emendant: fractis auriculis, vnguibusq; ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi. Crenati verò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, attrasq; cicatrices, in sole illiti emaculant: faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiofore eorum cibo abstinentum, quoniam nervos tentant.

Βολβός ἐμετικός.

BVLBVS VOMITORIVS.

CAP. CLXVI.

a Cat. φλο.
ὀς μέγ. α.
i. cortice ma-
gno.
Bulborum
consideratio.

Bulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò, & longiora, quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum vesicæ malis medentur: vomitiones mouet.

BVLBVS VOMITORIVS.



Multorum
error.

Bulborum
vires ex Gal.

Bulborum genera, esculentum & vomitorium, antiquè vulgò notissima fuisse ex eo maxime constat, quòd eorum faciem non representauerit Dioscorides. Nobis vero Bulbi eam ob causam, vel quòd iamdiu exoleuerint, hodie omnibus tam medicis, tum herbarij aded incogniti sunt, vt neminem hactenus inuenerim, qui eos legitime demonstrat: Legitimos inquam, quod non desint, qui v inter ceteros Aesculapij videantur, BVLBOS quosdã ostentant, quos vomitorios, & esculentos faciunt, sua tantum opinione reti. Verum ego non ita facile adduci possum ad credendum, nisi collatis plantarum notis. At cum Dioscorides hosce bulbos nullis descripserit lineamentis, non potui illorum acquiescere passionibus, & si non desint Sycophantæ, qui me inscitia accipiunt, quòd has dixerim me non cognoscere plantas, quorum q̄i volunt doctrinam sequi, consultum fortasse fecerint, si hosce labores nostros haud quaquam legere decreuerint. Siquidem ego candidis lectoribus, non autem nasutis, hæc parauim monumenta. Veteribus autẽ fuerunt in frequentissimo ciborum vsu: nis præsertim admisti, qua veneris concilianda gratia parabatur, utpote qui venerem stimulent. Quod autem ad id expecti, & commendati fuerint, Martialis aperte testatus est in xenis suis, dum cecinit:

Cum sit anuconiunx, cum sint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quam satur esse potes.

Ceterum na desuere, qui crediderint Bulbum esculentum esse Ascalonium cepe, aut fissile illud caparum genus, quòd Hetruscis vulgò vocatur Cepolla maligna. Sed horum error manifestè deprehenditur ex Theophrasto, qui Ascalonium, fissileq; cepe inter caparum genera lib. 7. cap. 4. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de quibus speciatim differunt lib. 7. cap. 13. Bulborum meminit Gal. lib. 6. simpl. medicamentorum scribens: Bulbus esculentus frigidior, & crassior

est, lentumq; succum procreat. Nam & coctu difficilis est, & flatuosus, & venerem prouocans. Attamen illitus ob amaritatem simul & adstrictionem, abstergit simul & glutinat, & nimrùm exiccat. Est enim ostensum, amaritudinem in extergentibus esse substantijs, adstrictionem verò in glutinantibus. At siccitas vtramque consequitur. Bulbus autem vomitorius multò est calidioris temperatura, quàm predictus Bulbus. Et lib. 2. de alimentorum facultatibus, sic de bulbis scribit: Bulbi genere cum predictis conueniunt. Nam horum quoque radix direptis folijs manditur: in vere interdum ipse etiam coliculu. Amarum austeramq; vim, euidenter Bulb in se habent: quamobrẽ elanguescentis stomachi aliquatenus excitant auiditatem. At verò neq; ijs aduersantur, quibus à thorace atque pulmone pus conuenit expuere: quanquam crassiore, ac glutinosiore sunt corporis substantia. Etenim amaritudo crassitudini reluctatur, lenta, crassaq; nata incidere, quemadmodum in commentarijs de medicamentis prodidimus. Quapropter bis elixi vberius quidem alent, sed excreare volentibus aduersabuntur, vt pote omni amaritudine exciti. Tum verò ex aceto, oleo, garoq; mistis, esitare satius fuerit: nam ita magis profectò oblectabunt, ac nutriunt, minusq; inflabunt, ac facilius concoquentur. Βολβός qua Græcis ἐδωδιμος Latinis Bulbus esculentus cognominatur: Mauritais Basar Alzer: Italis Bulbo che si mangia. Qui verò Græcis Βολβός ἐμετικός Latinis Bulbus vomitorius dicitur: Mauritais Zir: Italis Bulbo vomitorio, Cipollo canina.

Nomina.

Hyacinthus racemosus moschatus C. B. Bulbus vomitorius, Matth. Cast. Lugd. Muscari, Clus. hist. Hisp. & Pann. Dipcadi Chalcedonicum, Lob. Lugd. (duas enim habet figuras) Hyacinthus spurius recentiorum alter. Dod. fol. Hyacinthus botryoïdes Chalcedonicus moschatus, Tab. Flos interdum initio purpurascens, aut viridis: dein ex purpura virens, aut ex virore albicans, vel nigricans, dein pallidus est & luteo odoratissimo flore

Σκίλλα.

SCILLA.

CAP. CLXVII.

Scilla vim acrem atque fruentem habet: assatam ad multa vtiliorem esse constat. Polline ad crustam subactò, aut luto oblita in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficiens

facienter intosta fuerit: qua exempta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem qua prius, sunt: nam qua ita non affatur, interaneis maximè noxia est, torretur item in olla, indito operculo, qua in furnum demittatur, sumi etiam solet quod maximè est medium, direptis viuentibus tunis. quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidem parte se contingant. His scillæ tegminibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vrimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo feruifacta, aut cum resina liquefacta, imponitur: decocta in aceto demorsis à vipera cataplasma est. Ad singulas affæ partes adiectis octonis tosti salis, cochlear unum, aut alterum damus ieiunis, ad emolliendam aluum: in potu autem, & odoratis medicaminibus, & quibus vrinam ciere volumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, & ore reuicentibus, tres obolos in delinctu exmelle sumpsisse satis est. Coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maximè vt concoctionem adiuuet, strigmenta per aluum extrahit. Cocta & simili sumpta modo, eisdem præbet effectus: sed cauendus Scillæ vsus his, qui intestinum sentiunt vlcus: ad peniles verrucas, & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen, & in carica, aut melle deuoratum, aluum emoluit. Scilla tota in limine ianux suspensa, mali medicamenti noxam ardet.

Παγκράτιον.


PANCRATIUM.

CAP. CLXVIII.

Pancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est magni bulbi, subrufo colore, aut subpurpureo gustu amaro ac feruente: foliis lilii, sed longioribus. Scillæ vires, & præparationem habet, eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur: cui tamen mitior, quàm Scillæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis, splenicisq; cū hydromelite, commodissimè dantur.

I. SCILLA.

* II. SCILLA HISPANICA.



Superioribus annis credidimus, Scillas, quarum in Italia omnibus, tum medicis, tum seplasticis communis est vsus legitimus esse: in hanc autem opinionem veneram pluribus coniecturis ac rationibus fretus. In primis enim Plinium inueniam lib. 19. cap. 5. Scilla maiorem quam ceteris bulbaceis radicibus amplitudinem reddidisse: quare cum sepe vidissem ex ijs Scillis, quibus passim vrimur, nonnullas ad tantam magnitudinem creuisse, vt ferè caput hominis aquarent, non poteram non existimare illas esse veras. Deinde legeram apud Theoph. lib: 7. c. 12. de plant. historia, Scillã prius caulem floresq; gignere, quam folia. Id quod in nostratibus cum manifestè deprehendatur, mihi quidem non videbatur esse discedendum a vulgari opinione. Adde quod sæpenumero quasdam Scillas vidi paruas, pyro paulo maiores, has equidè putabam Pancratium esse: illas vero communis vsus, Scillas, idq; eo magis, quod Dioscorides tribuit Pancratio radicem magno bulbo simile: horum autè radix mediocris potius, quam eximia crassitudinis censeretur. Verùm cum postea aliquantò accuratius harum plantarum historiam expendissem, inueni Aloes folium, Dioscoridis & Plinii testimonio, Scilla similitudinè habere. Quod nimirum refragatur Scilla communis vsus, vt qua folia ferat non aloes, sed lilio proxima: inter qua non parua quidè intercedit differentia. Quinetiã legi in Theoph. & Plin. quod Scilla floret ter in anno: hoc item (quantum videre potui) non euenit nostris vulgaribus Scillis. Sed ne veritati fortasse detrahã, omnino id affirmare non ausim. Hinc itaq; iure quondã factum est, vt de Scilla non vterius vulgarem illam tenuerim, sed in dubiam venerim sententiam, an scilicet Scilla communis vsus legitime sit, & dici mereantur: aut alia reperiantur, qua folijs aloes similibus proueniant. Caterum dum adhuc in re dubia versaretur, a quibusdam medicis Hispanis accepi in Hispania maritimis Scillas innumeras oriri nostratibus duplò maiores, folijs aliena amulantibus, sed minus crassis: qua amaritudine, acrimonia, ac virium præstantia communes nostras Scillas longè vincunt.

Scillæ, & Pancratii confid.

Scilla Hispanica.

* SCILLA MAIOR RADICE rubra.*



Scillæ præparatio.

Scillæ vires ex Galeno.

Nomina.

benè spirans, benèq; coloratus deget: hoc aceto qui vititur, in corpore residebit, non flatus, non bilis, non cruditas, non stercus, non vrina, alius lubrica omninò erit. Morbo comitali diuturno efficaciter proficit, incipientem verò ac nouum perfecte discutit: ad podagras præterea, & ceteros articulares morbos, & ad iecoris, lienisq; duritas efficaciter facit. Scilla (vt memoria scriptum reliquit Galenus libro octauo simp. med.) admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quissiam secundi ordinis censeat excalfacientium. Præstat autem aut assam, aut elixam sumere: sic enim virium eius vehementia exoluitur. Nomen illi Græcum est σκίλλα, Latinum item Scilla: Arabicum, Haspel, Hausel, Aschil, seu Alaschil: Italicum, Scilla: Germanicum Meer Zwibel: Hispanicum, Cebolla albatrana: Gallicum, Stripouille, Charpentaire & Oignon marin.

Scillæ tria genera apud Plinium lib. 19. cap. 5. mascula albis foliis, fæmina nigris: & tertium cibus gratum Epimenidium: figuram addimus duplicem, primam Matthioli: alteram Clusii, partim quia Matthiolus Hispanicæ meminit, partim quia Clusius author est, hæctenus neminem veram figuram dedisse: his adiecimus Pancrati figuram, cum Dioscorides de Pancratiio distinctim à Scilla egerit. I. Scilla maior radice alba. C. B. Squilla, Brunf. Scilla seu Cæpa maris, Trag. Scilla, Matth. Fuch. Cord. in Dioic. Gef. hor. Lugd. Scilla communis, Dod. gal. Scilla maior, Castori. II. Scilla Hispanica, Clus. Hisp. Cast. Lugd. Scylla, Lonic. Cæs. Scilla siue Cæpa marina, Lob. Scilla, Dod. fol. Hæc ex radice crassa, alba, multis tunicis, lento humore intercedente, munita, multisque fibris capillata, caulis cubitalis, rectus, folus nudus, floribus plurimis, Ornithogalo spicato similibus, candidis & stellatis ornatus: quibus succedunt siliquæ triangulares compressæ, semen nigrum planumquè continentis. Folia verò ex radice ad caulis exortum prodeunt vtrinque quina aut fena, lata, virida, densa in humum reclinata & carinata. Floret Augusto & Septembri: Octobri semen maturefcit: folia, caule exsiccato Nouembri & Decembri, prodeunt apud Hispanos & Lusitanos, apud quos copiosè prouenit: III. Scilla maior radice rubra. C. B. Hæc radice est maiore, extimis tunicis rubentibus, foliis latioribus, longioribus & carinatis: quod copiosè in mediterraneis Hispaniæ, Clusius obseruauit, vbi pro præsentaneo veneno habetur. Pancratiium, Clus. Hisp. Dod. fol. Lugd. Taber. Scilla rubentibus radice tunicis, folio aloes carinato, Lobelo.

Κάππαρις.

CAPPARIS.

CAP. CLXIX.


Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus magis in orbem euagatur. Spinas, vt rubus, habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes numerosasque. Tenui plerunq; solo, asperisque locis, in insulis, & iuxta rudera nascitur. Caulis, & fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho, quam cruda vtilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & vrinam cruci-

vincunt. Scilla bulbo nititur ingenti, subrubro, radicibus nigri-
na sede numerosis, squamis crassis, lento succo pregnantibus, a-
cri & amaro, folia mittit aloes similia, caulem sesquicubita-
lem, lauem, & flores in summitate subpurpureos. Iam ergo non
dubitauerim, (si vera ij retulerunt) asserere prædictas Hispanias
Scillas veras esse, nostrates verò legitimum esse Pancratiium
Dioscoridis: huic enim pulchrè respondent folia, quæ libi sunt
verum longiora. Nes obstat, meo quidem iudicio, quod Dioscori-
des scripserit, Pancratiium radicem esse magna bulbo similem:
namq; bulbus hoc loco genus, non speciem denotat. Atque adeo
hinc fortasse sit, vt Scilla quarum est communis vsus, non ea
præstent efficaciter, quæ legitima pollicentur: quod Pancratiium
(vt Dioscorides testatur) mitior, quam Scilla facultas est.
Dixi sententiam meam, quamuis sciam non deesse nasutos, qui
nostram hanc impugnant sententiam. At qui mihi magis expe-
dit, Dioscoridis & Plinij nitidissimis niti testimoniis, quam tu-
rum fucatis acquiescere nugis. Quidam etatis nostre medici in
cerebri, & neruorum frigidis affectibus, Scillam crudam abru-
uolucris repurgatam minutim secant, & cum melle platurm: in
vas vitreum coniungunt, insolantq; per aestatem, ardente præso-
lim srio: demum percolato melle viuuntur ad comitales. &
alias cerebri aegritudines, à frigiditate excitatas. Sed alia lo-
diuersa fuit Galeni ad hos vsus scilla paranda ratio. Quippe qui
conscissam Scillam nunquam melle commistam exposuit insu-
landam, sed vt ab ea succum sole colliquatum in diebus cau-
cularibus eximeret in sicile, vel vitreum vas, in quo primum
mel fuisset, dissectam scillam immittebat: deinde tantisper insu-
labat, donec solaribus radijs ipsa liquefceret. Ex quo palam fit,
quod plerique à Galeni instituto prorsus aberrant, vt qui sili-
num mel conficiant scilla liquoris vice. Scillinum quoque ac-
tum admirabilis est ad multa facultatis: si quis enim quotidie
parum ebiberit, illi quidem faucium orisq; partes nunquam
malè valebunt: os ventriculi benè valebit: facile spiritum ducit:
oculi acutissimè cernent: flatus nullus in ventre excitabitur, &

crenatumque excrementum emittit: bibitur utilissime in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, nem ruptis & convulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, collato inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit: ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto tota vitilignes albas absterget. Radix foliaque intrita, strumas, ac duritias discutunt. Aurium vermiculos intulus iuccus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capparum, vehementer inflat. Apula vomitus facit: & quæ a Lybico, & quæ rubro mari, defertur, mirum in modum acris est: liquidem in ore pustulas creat, gingivasque; osse tenuis exest, quare in cibis non ab re damnatur.

I. CAPPARIS.

* II. CAPPARIS ACUMINATO folio.




Capparis frutex est in Italia vulgaris satis notitia. Floribus enim, & fructibus muria asseruatis frequentissime in ci- Capparum
bu vititur. Ex quibus suaviores, & qui cum palato maiorem ineant gratiam, sunt recentes acerrimo asseruati aceto, consideratio.
quod plerique faciunt in Hetruria. Præstantissima capparex ex Alexandria Aegypti Venetias aduehuntur. Est & in Apulia
Capparum proventus, vnde etiam plurimæ deferuntur, verum longè deteriores his, quæ ex Aegypto importantur. Vomito-
nes Capparex hauri quæquam ciet, vt Dioscorides inquit: nisi fortasse hac facultate sint prædita, dum recentes,
a virides comeduntur, anteaquam muriam experiantur, & deinde elixentur. Proueniunt etiam Roma in collapsis edi-
fiorum parietibus, ruderibusque, præsertim circa Pacis templum, itemque Senis, quæ quidem Apulia saporis præstantia
minime cedunt. In cultis nasci Capparex negat Theophrastus lib. 6. cap. 5. de plantarum historia. Seruntur tamen hac Capparum
ate, colunturque perinde ac segetes, & legumina, quemadmodum & Plinii tempore, qui serendi rationem lib. 19. cap. 8. satio.
hu verbis explicauit: Quippe cum Capparis quoque seratur, siccis maxime, area in defossu cauata, ripisque vndique circum-
fructu lapide, alius euagatur per agros, & cogit solum sterile fieri. Floret aestate, viret usque ad Vergiliarum occasum. Sa-
bulosis familiarissimum. Capparis vires reddidit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Capparis ra- Capparis vi-
dici cortex vincentem habet qualitatem amaritatem, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet, quod diuersis pu- res ex Gal.
giantibusque, constat facultatibus, quippe abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: excalfacere, incidere, digerere
attonia: porro contrahere, densare, constringere acerbitate. Idcirco lienes induratos, si quid aliud, hoc medicamentum
inure valet, tum foris idoneis illinendis remedijs admistum, tum intro in corpus assumptum: siue decoctum in aceto, aut
oxy-melite. & id genus, siue aridum contusum, illisque permistum. Quippe cum aperte crassos, lentosque humores hoc pacto
sumpta euacuet, nec eos tantum per vrinas, sed & per ventre: sæpe etiã sanguinolentos defert, vnde & lienes adiuti sunt, &
coxarum dolores. Quinetiã menses promouet, & ex capite purgat, detrahique, auxiliaturque, ruptis, atque convulsis. Ceterum cui-
nã ipsum potioni, in quoque affectuum misceri conueniat, non est presentis instituti persequi. Porro radice eius cortex
60 vlcibus malignis cataplasmatibus modo impositus, non malum est remedium, vt qui illa extergere valeat, nec segniter de-
ficere. Præterea dentium labores prædictarum qualitatum ratione adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum vino,
sæpe etiam solus dentibus mansus, ac morsus. Ex dictis ergo clarum est, incidendi quandam ei facultatem inesse, itemque ex-
tergendi, digerendi, contrahendi. Vitilignes siquidem cum aceto detrahunt, et chæradas, & duros tumores digerit, idoneis
ad ea medicamentis mistus. Radice cortice, fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad omnia sit imbecillior.
Imò & folia, & caules eius, similem vim obtinent: memurique me folijs quandoque, paucis diebus duritiem chæradis
naturam referentem discussisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum virium obtundat vehementiam. Nec
mirum est, quod aurium vermes succus amaritate occidat sua. Porro Capparis, quæ in admodum feruentibus regionibus
prouenit, vt quæ in ferr. Arabia, multo est nostrate actior, adeo vt plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Et lib. 2.
de aliu.

de alim. fac. sic de Cappare scribit : In Cypro Capparis plurima prouenit. Facultas eius tenuium admodum est partium: proinde minimum alimenti in corpus eorum, qui ipsa vescuntur, distulit : quemadmodum & alia omnia, que tenuium constant partibus. Vtitur autem fructu huius planta magis, vt medicamento, quam vt alimento. Importatur ad nos etiam sale conspersus, quia solus asseruatus putrescit. Clarum ergo est, quod capparis adhuc viridis, antequam sale conciat, plus habet nutrimenti: nam ex salitura permultū eius amittit, nig. sal abluatur, prorsus haud quicquam nutrit: alium tam n. iuducet. Verum ablutus, & demaceratus, donec omnem salis naturam exuat, vt minimi sanè alimenti citu est, ita. onium, & medicamentum, cum ad excitandum prostratum appetitum, tum ad deradendam, deiciendamq. partem ventri adhaerentem accommodatum erit, ac denique ad lienis, iecorisq. amolendas obstructions. Verum in his v. sus cum exymelite, aut oxelao ante alias omnes dapes sumi oportet. Tenellis porro capparis germinibus homines, vt urbinthi turionibus, vescuntur: cumq. adhuc virent, in oxalme, & aceto, non secus atque hos reponunt. Planta, que xan. m. rapis Gracè, Capparis similiter Latine dicitur: Arabicè, Cappar & Kappar: Italicè Capparò: Germanicè Kappari: Hispanicè Alcaparras: Gallicè Caprez.

Nomina.

* III. CAPPARIS LEGVMINOSA. *



Capparis duplex est, rotundo & acuminato folio, vt ex vtraque figura clarum sit: verum eam, que rotundo folio est Matthiolus expressit. I. Capparis, Trag. Matth. Cord. in Diosc. Dod. gal. Gef. hor. Lon. Lac. Cast. Lugd. Capparis retuso folio, Lob. Capparis Italica, Cæsal. Capparis secunda, Tab. II. Capparis Dod. fol. Capparis folio acuto, Lob. Lugd. Capparis aliud genus, Cæf. Capparis prima, Tab. III. His adiecimus Capparim leguminosam, plantam aspectu pulchram & eleganter virentem, quæ ex radice oblonga, lignosa, ramos emittit cubitales & altiores, teretes, læues, striatos, qui in alios brachiatur, circa quos folia lata oblonga, crassiuscula, capparis æmula, ab vno pediculo striato semper bina, vt in Faba, saturato colore virentia. Flores summis cauliculis insident, qui priusquam dehiscant, rudimentorum capparis florum similitudinem referunt, foris herbidi, expansi verò faris candidi, intus rubei, è quorum medio stamina plura, oblonga, crocea, educuntur: quibus succedunt siliquæ oblongæ, angulosæ, sesaminis similes, quarum veluti ex thecis compositæ, in quibus singulis semina continentur plura, lata, compressa, ex rotunditate in acumen desinentia. In horto Petri Quith Pharmacopæi Lutetiani, ante annos octodecim collegimus: in rudibus tamen Romanis spontè prouenit. Vocatur Capparis leguminosa siue Fabago Belgarū & Peplios Petri Quith, Lob. Capparis Fabago, Dodonæo: Fabago Belgarū Lugdunensi: Capparis syluestris siue Fabaginea, Camer. ad Matthiolum, Morgani Syrorum, Rauwolfio & Lugdun. in appendice. Apud Auicennam esse Ardifrigi & Andiriam apud Rhazm, ex descriptione & facultatibus suspicantur: vsus enim ipse apud Syrios contra vermes, cum tota planta sit amara, grauiq. odoris.

Λεπίδιον.

LEPIDIVM.

CAP. CLXX.

Lepidium, aliqui gingidium vocant, herbula vulgò nota, muria cū lacte seruatur. Vis foliorum acris & exulcerans, quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum helenii radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest, lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Lepidii consideratio.

Cum satis superq. à nobis ostensum sit in primi libri calce, in Iberidis commentatione, Iberidem nihil à Lepidio differre, superuacaneum esset, hic ea repetere, quæ ad Lepidii historiam explicandam loco citato diffusius adduximus. Si quidem eo quisq. facile accedere potest, qui ea, quæ ibi diximus, scire desiderat. Folia gerit Nasturtij, vere virentiora: caule cubitalem, aut minorem, florem album tenuemq. semen circum summos tenuesq. cauliculos in siliquis Nasturtij æmulis, sed minoribus, minuto intus semine. Radicem albam, acri sapore. Nasctur locus incultis saxosis: in templorum arceis atq. Sepulchris (Democrati) secus itinera in rudibus & agrorum extremitatibus. Excelsa facit & siccat magis quam nasturtium, extrahit, attrahit, incidit, attenuat, aperit, digerit & vrit. Veruntamen haud sicutio involuendum duxi, quod Plinius in Lepidii historia prorsus à Dioscoride dissentire deprehenditur. Quippe qui scripserit lib. 19. c. 8. Lepidium cubitali longitudine assurgere, folijs laurinis, non autem Nasturtij, vt Dioscorides inquit. Quod sanè nobis insinuat videtur, Plinij Lepidium eam esse Iberidis speciem, quam scribit Paulus lib. 3. de coxendicium dolore agens, folia lauri ferre. Hac enim (vt libro superiore diximus) ea facile fuerit, quam vulgus herbariorum ideo Piperitum nominat, quod acerrimo gustu, linguam mirum in modum vellicet. Caterum non possum non admitti, quod tam facile crediderint Hermolai, Manardus, ac Ruellius illos secutus, Lepidium eam plantam esse, quæ vulgò in Italia appellatur Raphano. Nam hæc folijs sit helenio paulò minoribus & verbasco maioribus, nullo pacto Dioscoridis Lepidium referre potest, vt quæ tenuis admodum sit herba. Nec item Plinio ad stipulari videntur, qui Lepidium prodidit laurinis folijs exire in cubitalem altitudinem: nisi fortasse ij Clarissimi viri nostratem Piperitum, quæ procul dubio Plinianum refert Lepidium, Raphanum vocauerint. **LEPIDIVM** Pauli, caulibus cubitalibus fruticat subalbicantibus: folijs laurinis.

Lepidium Plinii.

Lapsus Hermolai, Manardi & Ruellii.

I. IBERIS, SIVE LEPI-
dium.

II. LEPIDIUM, PIPE-
ritis.



RANUNCULVS I.

Ranunculus sceleratus



maioribus tamen, robustis, floribus in cacumine spicatis, tenuibus ac albicantibus. Radice alba acerrimi gustus, perinde ac folia, qua dentibus attrita os vniuersum accendunt. Seritur in hortis, ac etiam quibusdam in locis sponte nascitur. Excalfacit & siccatur vehementer, ac ea omnia potest qua Lepidium primum: ceterum longe valentius operatur. Quod λεπίδιον Græci, Lepidium quoque Latini vocant: Mauritanii, Seit aragi, Hausaub, Asceitaragi seu Scitharegi: Itali, Lepidio: Germani, Gauchblum vnd Wildertrief: Galli, Passeraige sauuaige, & Nasfort sauuaige: Hisp. Nasturtio montefino. Lepidium Paulo Aegineta, & Plinio: posterioribus Græcis λεπίδιον: Itali, Piperite & Peperella: Gallis Passerage, siue Poyuree: Germanis, Pfeffertraut.

I. Iberis folio Nasturtij C. B. Iberidis figura bis à Matthiolo posita, primum quidem ad calcem libri primi, dein hoc loco: verum cum diuersas icones habeat, aliã inter minores, qualis est ea quam li. i. inuenies: aliam folijs Nasturtij inter maiores icones, idcirco talem in hunc locum reiecimus. II. Lepidium latifolium, quod λεπίδιον seu squammas & maculas faciei delectat. C. B. Piperitis, Brunf. Dod. gal. Lon. Lepidium siue Piperitis Trag. Matt. Cam. Lepidium Aeginetae & Plinij, Matth. in icon. Lug. Lepidium maius, Cor. in Diosc. Lepidium siue Hiberis maior, Cord. hist. Lepidium magnum, Fuch. icon. Lepidium Plinij, Cam. Dod. fol. Lepidium Aeginetae, Gef. hort. Tab. Raphanus syluestris officinarum, Lobelo.

Βατράχου. RANUNCULVS.
CAP. CLXXI

Complura Ranunculi genera, vis tamen omnibus vna acris, & vehementer exulcerans. Nam ^{a Meū. παρά} ^{σειθρος. i. iuxta fluentes.} ^{† Ori. γοα- τας. ἐς περ. i. geniculatus.} vnum coriandri folijs constat, latoribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaraque, multis capillamentis, hellebori modo, fibrata: nascitur in a limitibus humidis. † Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia

b Cat. χλω-
ει εσπερ. i. vi
ridius.

Sardinia proueniens, quam acerrimum, quod syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore gra-
ui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes illitu exulcerant, &
crustas non sine dolore gignunt: quare vngues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: for-
micantes verrucas, & peniles, alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepente decocta perniones fouentur.
Sicca radix tritaq; sternutamenta ciet, naribus admota: dentiū dolorē appensa leuat, ipsos tamē frangit.



RANUNCVLVS II

RANUNCVLVS III



RANUNCVL. IV.


* RANUNCVL. IV. FLORE PLENO.*



Ranunculus

RANUNCULUS V.

RANUNCULUS VI.



Ranunculū, qui Græcis βαλπάχιον dicitur, vulgus herbariorum in Italia, & alibi etiam Pedem corui, & Pedem galli, quædam perperam, vocant, vt superius quoque in coronopi mentione diximus. Planta est vulgò nota, pluribus tamen, & diuersis generibus distincta. [TERTIVS minoribus prouenit folijs, floribus melinis: sed tota planta grauem spirat odorem. QVARTVS non est absimilis tertio, folia tamen magis diuisa sunt: florem edit lactei candoris: radices numerosas fibrosasq;] Et quamuis quatuor tantum generum meminerit Dioscorides, vnum genus est, quod nobis QVINTO loco assignabitur, quod quidem folia mittit secundo ferè similia [atque etiam hirtiora] sed cui inter complures, quibus nittitur, [ellebori modo] radices albas, tuberosa quadam pendeat, veluti ex funiculo, radix nucis iuglandis magnitudine, rapimodo albicans, acris tamen & exulcerans, qua per hyemem, arescentibus iam folijs, vtuntur quidam, vbi exulcerandi sit opus. Nascitur locis incultis & secus itinera. Excalfacit & siccatur ordine quarto, vlcera, extrahit, incidit, digerit. Radix recens tusa & admotæ, vesicas excitat: quare Ischiadicis vtiliter illinitur. SEXTVS folia mittit Anemonis primi similia: caules cubitales, striatos, flores in summitate magnos, aureo colore: radices numerosas, fibrosasq;. Nascitur in riguis, & humido locis. Cateris minus est acris, quare minus excalfacit & siccatur. Illud porro genus lanuginosius, vel, vt Plinius ait, foliosum, copiosissimum in Sardinia nascens pluribus foliorum incisuris, altiore caule, acerrimo gustu, pleriq; ideo Apium risus nominant, quod quibusdam memoriae proditum sit, eos tanquam præ latitia ridentes interire, qui ipsum comederint. Sed rem se aliter habere crediderim, & alijs potius astipulandum esse. Si quidem Pausanias auctor est, herbam hanc, si edulio fuerit vescentibus neruos contrahere, rictuq; ora diducere, ita vt qui mortem oppetunt, velut ridentium facie intereant. Quod & Salustius confirmat, qui huius venenata herba meminit, sic inquit: In Sardinia quadam herba nascitur, quæ Sardo dicitur, agresti apio similis. Hac ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. Ideoq; Dioscorides libro 6. Sardoniam ranunculi genus esse testatur, quæ vescentibus mentem adimat, & quadam neruorum distentione debiscere in rictus ora cogat, ita vt imaginem ridentium præbeat: ob id Sardonius risus in adagium cessit. Caterum quorundam error. Ranunculi meminit Gal. lib. 6 simpl. medic. vbi ita scriptum reliquit: Batrachium, id est, Ranunculus, quatuor habet speciatim differentias. Omnia verò vehementer acrem facultatem possident, adeo vt cum dolore exulcerent. Hac itaque ratione, si moderatè vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues leprosos diuellunt, & stigmata discutunt & acrochordonus, & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant, pauco tempore admotæ: nam si diutius inhereant, non excoriatur solum ipsa cutis, sed & in crustam vritur. Atque igitur hac omnia caulis & foliorum sunt opera, si imponas virentia. Porro radix arfacta sternutatorium est medicamentum, similiter alijs omnibus quæ valenter desiccant. Sed & dentium dolores iuuat, vt & frangat eos valenti scilicet exiccatione: & vt semel dicam, calida & sicca valde est tum radix, tum vniuersa adeo herba. βαλπάχιον ita Græcis, Latinis verò Ranunculus appellatur: Italis, Ranunculo, & Pie coruino: Nominæ, Germanis, Hanenfusi: Hispanis, Hierua belida: Gallis Bacins. At Ranunculus quintus, Italis, Pie di Gallo: Germanis, Drüßwurß: Gallis, Pie pou.

Ranunculi consideratio.

Ranunculus quintus.

Quorundam error.

Ranunculi vires ex Gal.

Nominæ.

Ranunculus, quod limitibus humidis, opacisq; marginibus ranarum more lætetur: aut quia inter eius frutices ranæ frequenter inueniantur. Huius quadraginta quatuor species Phytopinax exhibet. I. Ranunculus palustris rotundifolius, læuis. C. B. Apium aquaticum, Trag. Apiastrum, Cor. in Diosc. Ranunculus primus, Matth. Ges. hor. Lac. Cast. Lugd. Ranunculus tertius, Lonic. Ranunculus aquaticus, Fuch. in icon. Ranunculus palustris, Dod. gal. Cord. hist. Lugd. Tab. Thal. Ranunculus palustris rotundiore folio, Lob. Ranunculus palustris folio Apij Cam. II. Ranunculus palustris lanuginosus C. B. Ranunculus secundus, Matth. Lugd. Ranunculi altera species, Sardinia Herba, Cord. hist. Ranunculus lanuginosus alter, Cæs. differt

differt à primo quòd lanuginosus sit. IV. Ranunculus montanus albus, simplici flore. C.B. Ranunculus quartus, Matth. Lacu. Gef. hort. Ranunculus albus maior. Gef. nor. Ranunculus albus flore simplici, Lob. Aconitum batrachoides, Aduers. & Lob. icon. Ranunculus flore albo, Dod. fol. Ranunculus albus, Tab. Ranunculus montanus albus & Ranunculus externus quartus, Lugd. Ranunculus montanus tertius, Cæs. Ranunculus leucanthemos folio Aconiti, Cam. In hortis habetur flore pleno. V. Ranunculus bulbosus radice rotunda. C.B. Crus galli & Coronopus parvus, Brunf. Ranunculus exiguus & sceleratissimus, Trag. Ranuncul: quintus, Lac. Matth. Lug. Batrachion Apuleij, Dod. gal. Ranunculus minor, Fuch. Cord. hist. Tab. Ranunculus bulbosus. Lob. Thal. Ranunculus tuberosus, Dod. fol. Lugd. qui duas habet figuras: Ranunculus lanuginosus primus, Cæs. Ranunculus flammula dictus, Verticillum Apuleij, Gef. hor. Ranunculus radice bulbosa flore simplici, Camer. In sylvestribus enim flore est simplici, in hortis translatus, non modò flores multiplicat, sed ex vno & alterum promit. Reperitur etiam locis arenosis & saxosis ita parvus. vt vix trium vnciarum sit. VI. Ranunculus montanus globoso flore. C.B. Ranunculus sextus, Matth. Lugd. Aconitum tertium eidem, Anemone montana quædam, Gef. hort. Trollius flos, Gef. in fracto. Clus. Panno. Ranunculus montanus alpinus glomeratus, Lob. Ranunculus flore globoso, Dod. fol. Lugd. qui duas habet icones. Ranunculus montanus alter, Cæs. Ranunculus globosus siue montanus, Cam. Ranunculus alpinus luteus Tabernæ montano.

Ανεμώνη

ANEMONE

CAP. CLXXII.

Dvo Anemones genera, vnum sylvestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species: vna phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia à cæterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, ac veluti geniculis quibusdã cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput, flore puniceo: tenuibus, & b multis radicũ capillamētis. Acrior est, quæ nigra habet folia. Vis vtriusq; acris: ea de causa succus naribus infusus purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decoctam passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicarrices eorundem, & hebetudines emendat: sordida vlcera abstergit. Folia & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua ciunt, vellere apponit: illita quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti argemonem nominari eupatorium patent: quoniam à sylvestri Anemone, argemonem, & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) c propter colorum cognationem in floribus distinguere non possunt. Verùm papauer, & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraq; tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper anemone, & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

a Meū, & Ca. *λεπλοχιδέ-
σπρα δ'έσπρος
τη γη. i. te-
nuioribus in-
cisuris ad ter-
ram.*
b Omnia ex-
empl. vnico
verbo. i. *καί
πλεον. i. &
pluribus.*
c Omnia ex
empl. *διὰ
τὸ τῶν ἀνθῶν
ὀμόχρωτον
εἶναι. id est
ob florum pur-
pureum simili-
lem colorem.*

ANEMONE I

ANEMONE II



Anemonis nos quinque obseruauimus genera: Primũ folio prouenit coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, caulis lanuginosis, tenuib. striatis, in quib. tenuiora per interualla sunt folia: florib. sylvestris papaueris magnitudine. *seru-
circum*

ANEMONE III.

Anem.



ANEMONE IV.



ANEMONE V.



circum distinctis folijs purpurascens, capitulo umbilicoten-
nus emergente, nigro colore, nigriq; capillamentis stipato, pe-
rinde ac in papauere. Radix illi olea magnitudine, subrotunda,
fibrataque, & sapore acris (oritur in aruis & alijs cultis locis.)

SECUNDVM folijs assurgit maioribus, & frequentius laci-
niatis, cynocibni Aconiti modo, caulib. alteri similibus, sed ali-
quãto crassioribus, inanibus, & in rectum spectantibus, quibus
flores insunt, in summitate dilutiore purpura nitescetes, capi-
tulo circumquaque comato, perinde ac alterum. Radicẽ habet
breuem, rapunculi ferẽ figura, fibris adnatis multas acris etiam
gustu. Nascitur locis cultis, & presertim in aruis. Nihil suis in
facultatibus à priore differt. TERTIVM folijs crescit Ra-

Secundum

Tertium.

nunculo primo amulũ, caulibus tenuibus, sesquipalmaribus,
rotundis, in quorum cacumine flores exeunt albi, quinque tan-
tum folijs distincti, rosarum magnitudine, & nonnunquam
tenui quadam purpura respersti, inferiore presertim sede: radi-
cem habet fibratam ac tenuem: nascuntur in collibus. Tota
planta ceteris mitior est quare minus excalfacit & fitent. Ha-
bentur quoque Anemonis genera alia duo, quorum hic quoq; i-
magine damus, folijs laciniatis, & floribus in altero purpureis,
in altero aureis. QVARTA, folia profert frequenter laciniata,

Quartum &
quintum.

caule ramosũ, flores in summitate purpureos, radicẽ globosã &
paruam, fibris numerosis stipatã, prouenit cultis locis. QVIN-
TA, parum differt à quarta, minoribus tamẽ est folijs, tenuio-
ribusque: floribus aureis, radice parua, faba magnitudine. O-
ratur cultis locis & in aruis. Omnia genera Maio mense flo-
rent. Non desunt tamen, qui credant, Anemonem, & syluestre
papauer idem esse: sin minus, saltem eiusdem esse generũ. Sed ij,
mea quidem sententia, falluntur; & prorsus aberrant à Dio-
scoridis proposito. Quandoquidẽ si hoc idem sensisset Diosco-
rides, alterum ab altero diuersis capitibus non distinxisset, neq;
vt legitur in huius capitũ calce, differre Anemonem à syluestri

Brauaeli et-
ror.

papauere tradidisset. Tamen si existimet Brauaolus, Dioscoridis Anemonem id omnino esse syluestris papaueris genus, quod
fore prodit ceteris rubentigare: minimẽ aduertens, quod si huius cauliculi franguntur, statim lac ipsum distillant. Quin nec
illud quidem animaduertisse videtur, quod hoc longa constet radice, non autem oliua modo rotunda: capitulumq; ferat
papauere

* VI. ANEMONES FLORES VII. PULSATILLA
varii.*



Fuch. lapsus.

* VIII. PULSA. RUBRA.
IX. PVL. LVTEA.*

Pulsatilla hitoria.



Pulsatilla vires Matth.

Ruell. lapsus.

papaueris, non asparagorum cacuminibus simile. Fuchsius pre-
terea in eo libello, in quo tantum stirpium imagines expressit, A-
nemones purpurea loco, illam depingit herbam, qua plerisque
PULSATILLA cognominatur, etsi nullam, quantum equidem
sentio, habeat cum Anemone cognationem: illa namq, cum pri-
mum erumpit, folia mittit incana & admodum hirsuta, mi-
nutimq, laciniata, qua sapore sunt perquam acris, adeo ut non
minus exulcerent, quam ranunculus, & flammula vulgo dicta.
Flos, qui in stellae modum, similiter hirsutus, ineunte vere debi-
scit, anteaquam folia erumpant, nigricanti splendet purpureo
cuius medio quidam aurei stosculi emicant, eos admodum annu-
lantes, qui rosas innascuntur: in quorum umbilico stocus quidam
purpureus visitur, sericinum referens opus. Exteriori vero parti
in ipsius caulis rotundi, tenuis atq, incani cacumino, circa fori
basim, villosus alter circumquaque sopandit stocus, colore cin-
reo, sericino stamini mollitia ac leuore minime cedens. Semen
capilloso, incanoq, capitulo, iuglandis fere magnitudine, continetur.
Radix illi subest pedali longitudine, exesa, nigri chamaleo-
nis modo: cui sapor quidem subdulcis, non autem acris, veluti fo-
lijs, & caulibus. Prouenit locis incultis, aridis, & saxosis. Folia
caules, & flores cum acerrimo sint gustu, excalfaciunt & suam
ordine quarto: incidunt, attenuant, attrahunt, digerunt, expur-
gant & exulcerant. Radix vero cum subdulcis sit, non longe ab-
erit a temperatis. Sunt qui hanc miris laudibus efferant contra
pestilentiam & ad hausta venena, itemq, contra omnium venen-
osorum tum morsus, tum ictus: quam obrem in antidoti ad-
ditur. Scribit Ruellius Anemonem in Gallia copiosam nasci, cum-
que esse plantam, quam herbarij Herbani venti vocant: verum
si herba venti Helxine fuerit, vel Solidago minor, vt Simon lan-
nuests interpretatur, aberrasse Ruellius manifeste deprehenditur.
sin aliter, quid dicam nescio, cum me omnino lateat, quid Rud-

lius per Herbam venti intelligere voluerit. Meminit Anemones Gal. lib. 6. simpl. medic. vbi ita scribit: Anemona omnia
crem, extergendi, attrahendi, & ora vasorum reserandi facultatem obtinet. Itaq, radix commansa pituitam enocat: &
succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcera anemona expurgant, & lepra de-
trahunt, mensura apposite eliciunt, & lac trahunt. Vt Graecis ανημων, ita Latinis pariter & Italis, Anemone vocant.
Arabibus, Iackaik alnahamen, seu Sakaik albeamen, seu Mamira: Galis Passesleur: Pulsatilla, Italis Pulsatilla. Germani-
cis Kuchenschell oder Doctentraut.

Nomina.

Anemo-

Anemone dicta à vento, quòd flos nunquam se aperiat, nisi vento flante, Plinio lib. 21. cap. 23. unde & Herba venti quibusdam, cuius plures species: Matthioli quinque; propofult, cuius figuram mutare nolimus. I. Anemone prima, Matth. & Lugd. II. Anemone secunda, Matth. & Lugd. III. Anemone alba radice fibrosa. C. B. Anemone tertia, Matth. Cast. Lugd. Anemone alpina, Ges. in fracto, Anemone tertia Matth. flore albo, Lob. Anemone Pann. Dod. fol. Anemone sylu. prima Ranunculi folio, Clus. Pan. Anemone maior alba, Tab. Anemone flore candido, Thal. Aconito cognata videtur, Ges. hor. Ranunculi vnde decima species, Cord. hist. IV. Anemone prima Matth. edit. secunda. Anemone quarta eidem in aliis edit. Cast. Lugd. Anemone, Lac. Anemone ramosa purpurea Tab. V. Anemone altera Matth. edit. secunda: Anemone quinta eidem in aliis edi. Cast. Lug. Anemone altera, Lac. Anemone hortensis, Trag. Anemone ramosa lutea, Tab. VI. Figura hæc Anemones diuersos flores exprimit: 1. enim flore est purpureo, venis subrubris variegato: 2. colore est cæruleo: 3. coccineo colore: 4. flore est pleno dilute purpurascens: 5. aureus est: & denique: 6. candido medio, luteo & elegantissimo flore est. VII. Pulsatilla dicitur quòd seminum tremuli pappi leuissimo flatu huc atque illuc agitur: Anemone est altera Plinii, quæ Limonia dicitur li. 21. c. 11. Ruchenschell, Brunf. Herba venti, Trag. Lon. Anemone sylu. Fuch. Herba Sardea, Dod. gal. Ranunculi decima species vel leptophyllon comatum, Cord. hist. Pulsatilla, Matt. Dod. fol. Cast. Cæs. Lug. Cam. Pulsatilla vulgaris, Lob. Clus. Pan. Anemone videri potest Pulsatilla dicta, Ges. hor. & Anemone montana, & Ranunculi Diosc. secunda species, eidem: Pulsatilla prima Tab. Samolus Plinii Dalechapii: plures huius sunt differentie & in colore floris & foliorum forma. VIII. Pulsatilla rubra, non admodum excreuit, folioque est minutius inciso: flore minore ex longioribus & angustioribus foliis, iisque rubris copiosior: aliquando & niueo flore reperitur. Hæc Pulsatilla rubra Lob. & Lugd. dicitur. IX. Pulsatilla lutea, vulgari similis, foliis tamen minus laciniatis: flores summis cauliculis insident lutei, Maii medio flores, quibus succedunt capitula, papposum, barbatumque; semen continentia. In monte Heluetiorum Gothardo, & in montibus Taurinensium prouenit. Dicitur Pulsatilla flore luteo, Ges. hor. Dod. fol. Lugd. & Pulsatilla lutea Camerario in editione Matthioli.

Αργεμόνη

ARGEMONĒ

CAP. CLXXIII

Argemone in totum syluestri papaueri similis est. Folia habet anemones, diuisa: florem purpureum, caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem dimittit. Argema, & nubeculas expurgat. Folia illi inflammationes compescunt.

Exant nonnulli Dioscoridis codices, in quibus duo Argemones genera diuersis capitibus leguntur, nonnulli verò hoc tantum habent, quod nos legitimum esse credimus, non dissentientes à compluribus doctissimis viris, qui alterum huc illegitimè accessisse censent: præsertim cum Galenus, & Paulus illius nusquam meminerint. Veruntamen, ut satisfactum omnibus sit, alterius quoque Argemones historiam hic adiciendam duximus, quæ sic habet. Argemone altera foliis syluestri papaueri si nalis est. Vt ei inest, si recens trita imponatur, intercisiones sanare, & oculorum inflammationes mitigare. Potest cum aqua, dysentericis auxiliatur, vulnera conglutinatur, & inflammationibus utilis est. Conuulsis, & vellicantibus imposta medetur: contra serpentium morsus utiliter cum vino bibitur. Prouenit argemone frequentissima in Hetruria, præsertim in agro nostro Senensi, sicut & in quibusdam locis vallis Anania Tridentini tractus, quæ nullis, quantum equidem iudico, notis Dioscoridis descriptioni refragatur. Legitimam argemonem etsi antea in valle Anania nasci putabamus, sit tamen nunc, ut notis ipsius diligentius consideratis, plura in ea planta desiderari animaduertam, quæ legitime argemone in sunt. Quare eius imaginem hic ponere non libuit. Genuinam ego hæcenus consequi non potui. Sed Plin. lib. 25. c. 1. Argemones tria fieri genera memorat, idque demum probari, cuius radix thus redoleat. Quamobrem in maximo errore fuisse deprehenduntur veteres nostri tum medici, tum seplasarj, quòd Eupatorium Argemones vice acceperint, sub Agrimonia nomine, de qua lib. 4. suo loco, Deo duce, latius differemus. Argemones vires sane quàm paucis perstrinxit Gal. lib. 6. simp. med. sic inquit: Et huius herba facultas abstersoria est, & digerens. Ea quæ Græcè ἀργεμόνη, Argemone item Latine, atque Italicè dicitur.

Argemones confid.

Caput secundum Argemones adulterinum.

Veterum nostrorum error: Argemones vires ex Gal.

Nomina.

Αναγallis

ANAGALLIS

CAP. CLXXIII

Dvo sunt Anagallidis genera, quæ tantum flore distant: nam quæ cæruleo flore est, formina dicitur: mas quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes: foliis in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helinx folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi vim habet, inflammationem arceat, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargarizatus, capitis paruitatem purgat: & naribus infusus, dolorem detium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: argema cum melle Attico emendat: retusæ oculorum aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, iecinoris, & renium vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cæruleum edit florem, prociuum sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illi euocare. †

† Addit Crates et Crateuas exριζότομος εις το αυτόε αυτα φησιν ἀναγallis, i. Et Crateuas herbarius eadem de eius naturaprodidit: Anagallidis confid.


Centone, Anagallidum vires ex Gal.

Morsus diaboli historia, & vire.

Anagallis tam mas, quàm formina, quæ officinis vulgò Morsus gallina dicitur, notissima est. Nascitur cultis & incultis locis: & sæpè in hortis, ac lato solo. Caterum planè, meo quidem iudicio, hallucinantur, qui Anagallidem eam esse plantam putant, quæ in Hetruria vernaculo nomine Centone vocatur. Insubribus verò Pauarina. Nam hæc florem fert candidum & caulem rotundum: Anagallidum verò alteri flos est cæruleus, alteri puniceus, & quadrangulus vtrisque caulis. Anagallidum vires recensuit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum sic inquit: Anagallis vtraque tam ea, quæ cæruleum habet florem, quàm ea, quæ purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent verò quandam etiam calorem attractorium, ita ut & infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordicationem: quamobrem & vtriusque glutinant, & putrida adiuuant: hæc Galenus. Verùm cum Morsus gallina eam stirpem in mentem mihi reuocaberis, quàm vulgus barbariorum MORSVM diaboli, alij Succisam appellant, cumque putem me quàm plurimis fortasse

I. ANAGALLIS MAS.

II. ANAGALLIS FOEMINA.



V. SVCCISA, SIVE MORSVS diaboli.



Opinio superstitiosa.

Succisae vires.

Scabiosa scabra

Nomina.

fortasse rem gratam facturum, si his nostris commentariis ipsam quoque inseram, hic locus visus est, vbi commodè de ea aliquid dicam. Morsus igitur diaboli herba est locus inculta proueniens, salibus, ac etiam interdum pratis, & dumetis. Folis constat plantagini angustifoliae, quam vulgò laccolam vocant, similibus, lauioribus tamen, & quae circa caulis, qui ad binum cubitorum longitudinem assurgunt, exeant breviora, angustiora, leniterque per ambitum laciniata. Floret astate, scabiosa vocata modo. Multifidas habet radices, nigricantes, ellebori modo succisas, & circumrosas: vnde superstitiosum nomen inuenit. Siquidem scripserunt nonnulli superstitutionibus dediti, quos credulum vulgus sequitur, cacodemonia tanta efficacia radicem inuidere hominibus, atque hac de causa, vbi succreuerit, statim eam vndiquaq; dentibus succidere, & circumrodere: tanta est hominum superstitio. Herba hac si viridis cruda, tritaque carbunculis pestiferis imponatur, praesentaneo remedio (vt aiunt) eos sanat, am si vinum, in quo decocta fuerit, bibatur. Radix per se est, cuius decocti vinum vtiliter bibitur, non modò ad vteri dolores & ulcendos: sed etiam ad pestilentem aërem arcedam. Gustu admodum amara est: ex quo perspicuum esse potest eam esse calidam & sicca facultatis. Siccata puluerem praebet pleriq; ad alui tinea necandas, ac eadem sugillata illitu emendant. Herba, quae ἀναγallis, Graecè, Anagallis quoque Latine vocatur: Italicè, Anagallide: Germanicè, Gauch heyl: Hispanicè, Muruges: Gallicè, Morgelline, & Mourò. Succisa, officinis, Morsus diaboli: Italis, Morso di diauolo: Germanis, Teuffels 60 abbiß.

Anagallidem diuidimus in aruensem & aquaticam: aruenis phænicea est, caerulea, lutea: aquatica etiam aliquot differentiae occurrunt. I. Anagallis phæniceo flore C. B. & Cam. Anagallis mas, Brunf. Lob. Anagallis punicea, Cæs. Anagallis, Cord. in Diosc. Ges. hor. Anagallis terrestris mas, Thal. Anagallis phænicea, Tab. Corchorus Theophrasti, Anguil. II. Anagallis caeruleo flore C. B. & Cam. Anagallis foemina.

Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Matth. Lac. (cui & Corallium Pauli) Lon. Cast. Lug. Anagallis phænicea mas. Lob. Anagallis punicea, Cæs. Anagallis, Cord. in Diosc. Ges. hor. Anagallis terrestris mas, Thal. Anagallis phænicea, Tab. Corchorus Theophrasti, Anguil. II. Anagallis caeruleo flore C. B. & Cam. Anagallis foemina.

fœmina, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Lon. Cast. Lugd. Anagallis fœmina cœrulea, Lob. Anagallis cœrulea, Cæs. Tab. Anagallis terrestris fœmina, Thal. III. Anagallis aquatica: ea à nobis addita, quæ maximè vulgata. Hæc ex radice cãdida, longa, repente, à qua plures tenues fibræ deorsum mittuntur, caules complures rotundi, pingues, & in alas diuisi attolluntur, quos folia crassa, læuia, lata, subnigra, leuiter per ambitum serrata, cingunt: è quorum sinibus cauliculi exurgunt, circa quorum summa flores cœrulei quadrifolii Anagallidis fœminæ floribus minores obseruãtur: his succedunt capsulæ parur, quibus semen minutum inclusum est. Hæc maiore & minore est folio, rursus quælibet folio vel subrotundo, vel oblongo. In palustribus, circa fontes, ac riuorum margines reperiuntur. Dicitur Sion Brũf. Sion non od. itum, Trag. Ges. hor. Sii alterum genus, Fuch. Cepæa & Beccabūga, Dod. gal. Sium maius, Lon. Anagallis aquatica Lob. Dod. fol. Cæs. Cam. Lugd. Tab. Thal. Calida est planta Nasturtio aquatico fere similis. quæ vt illud editur, & ipsius contra Scorbutum vsus, minus tamen Nasturtio potens; vrinam mouet, calculos frangit, menses promouet, & fœtus mortuos propellit: Tumoribus etiam cum butyro tosta & aceto imposita, prodest. IV. Anagallis aquatica folio rotundo non crenato: Hæc cum circa

III. ANAGALLIS AQUATICA.

IV. ANAGALLIS AQUATICA folio rotundo.



thermas Aponitanas frequens sit, eius & descriptionem & iconem adiecimus, ex radice parua, multis fibris compacta, cauliculus palmaris & sesquipalmaris, angulosus, læuis, viridis, in summo diuisus exurgit: folia ad radicem plura oblonga, subrotunda, quæ caulem alternatim posita, saturato colore virentia, cingunt: flocculi albi singuli singulis pedicellis insidentes, ex pericarpis virentibus prodeunt, quibus succedunt exigui folliculi pericarpis iisdem conclusi, in quibus copiosum minutissimũ nigrumq; semen continetur. Prouenit locis vdis humidisq; (sed rarior inuentu) circa scaturiginem Thermarum Aponensium, & etiam Monspelii obseruauimus: reperitur etiam circa Antuerpiam. Dicitur Anagallis aquatica altera Lob. in suis obseruationibus (quem sequitur hist. Lugd.) in icon. verò est tertia. Modò Alismatis, modo Cochleariæ speciem, Guilandinus nobis nominauit, quibusdam Samolus Plinii videtur. V. Succisa seu morsus Diaboli, Matt. Dod. fol. Iacea nigra, Brunf. Morsus diaboli, eidem, Trag. Dod. gal. Lon. Lob. Lug. Tab. Cam. Succisa, Fuch. Cast. Scabiosa folio integro, Cæs. Pycnocomon, Columnæ. Hæc communiter glabra est, alia est hirsuta: glabra, alia maior, alia minor: maior alia & communiter foliis integris, alia foliis dissectis. Flos cœruleus, aliquando purpureus, incarnatus, rarius albus.

Κισσός. HEDERA. CAP. CLXXV.

Hedera differētias multas in specie sortitur, summas autem genere tres. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Cãdida fructum fert candidum: nigra nigrũ, aut croci æmulum, quã vulgus Dionysia vocat. Helix fructum nõ gignit, a sed tenues habet viticulas, & folia parua, angulosa, & † rubra. a Meum καὶ Hedera omnis acris est, & adstringens, neruos tentat. Flos trium digitorũ carptu, facit ad dysentericos, in λευκὰ ἔχει δὲ vino bis die potus: ambustis cũ cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane κλήματα ἰ. detrita, henes sanant. Foliorum, & corymborum succus, cũ irino vnguento, melle, aut nitro, naribus infunditur: & cõtra veteres capitis dolores, caput eo cũ aceto, & rosaceo perfundi vtile est: purulētis auribus stramenta aut do-

aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut e poti corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punici mali cortice cum rosaceo, si instillentur: contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinuntur omnium vlcere generi, etiam si cacoethe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, ut antea diximus, decocta. Mouent menses triti, & subditi corymbi: iidem poti, post purgationes sceminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua, & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graueolentiaque emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

I. HEDERA ARBOREA.

II. HEDERA HELIX.



Hederæ con-
sideratio, &
genera.

Helix.

Helicis plura
genera.

Hederæ, cuius hic tria tantum summa genera fecit Dioscorides, etsi plures eius in specie differentias esse testetur, planta est vulgaris notitia. Verum si quis Hederæ plura genera nosse desiderat, non fortasse Plinio contentus, licet de ipso abundè disseruerit lib. 16. cap. 34. legat Theoph. lib. 3. cap. 18. de plant. historia, vbi hederæ sigillatim species diligentissimè persequitur, & de ijs copiosissimè pertractat: vel potius ipsum audiat, nam hæc, quæ sequuntur, ipsi ad verum acceptaverimus, qui loco citato sic habet: Hederæ quoque multigena est: quedam enim humi repens, quedam se in excelsum attolens: & excelsarum genera plura, sed tria summa patefcunt, candida, nigra, tertiâq; helix, id est clauicula. Horum utem species plures: quippe alia fructu tantum candida, alia etiam foliis: rursus fructum tantum candidum ferentium, alia maiusculum, densum, & velut in globum circumactum fructum profert, quam corymbiam quidam vocant, Athenienses a charnicam rigam eam appellant: alia minorem, sparsioremq;, modo nigra. Habet nigra differentias, sed non hunc in modum conspicuas. Sed helix differentiis maximis discernitur: etenim foliis plurimum distat, cum paritate, tum quod angulata, concinnioraq;, sint: cum hederæ rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant etiam intervallorum longitudine, atq; etiam sterilitate, quoniam fructum quedam non ferant: quod non in hederam transfigurentur, ut quidam volunt: at verum si omnes hederescant, ut aliis placet, atatis certè, dispositionisq;, non generis erit discrimen, quemadmodum pyri ad pyræstrum. Tamen eius quoque folium multum ab hederæ distat: verum id rarum, & in paucis euenit, ut vetustate permittitur, seu in populo alba, & crotone. Ergo helicis plura genera, sed qua conspectiora, summaq;, occurrant, tria sunt. Herbacea, quæ plurima est: secunda candida: tertia versicolor, quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæq; distare videntur, quippe herbacea quedam folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam densiori: quedam minus hæc omnia habens. Et in versicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumq;, habitu diuersa: pari modo & magnitudine, coloreq; distat. Auctu perfacilis herbacea, inq; plurimum venit. Manifestam esse qua hederescat, affirmant, non tantum foliis, quæ maiora, latioraq;, habet, verum etiam germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbaes verò crassiora, breuioraq;. Ac hederæ, ut semen proferre incepit, germen sublime, rectumq;, edit. Est quidem vniuersa hederæ radice numerosa, densa, flexuosa, crassa, surculosa, nec nimis alta, sed præcipuè nigra, & inter candidas, quæ asperissima, immitissimaq;, habetur, quamobrè eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat, & exiccac, ablato alimento. Crassatur hæc maiorem in modum, atque arborescit in tantum, ut per se ipsa hederæ arbor fiat. Attamen ex maiore parte semper super aliud vitam degere solet, atque (ut ita dixerim) amplexicanlis est, ita pro sua natura, vel quiddam eiusmodi illico gerit. Nam è germinibus radículas assiduè inter folia mittit, quibus arboribus, murisq;, obrepit, quasi de industria i

...atque ita humorem auferens, exhauriensq; arefacit. Et si inferius succidatur, nihilominus viuere, dura-
 re potest. Habet vel aliud discrimen non mediocre in fructu: nam alius dulcis, alius vehementer amarus, tam in candida,
 quam in nigra. Indicium, quod alium aues mandunt, alium minime attingunt: hederam ita se habet. Haecenus Theophra-
 stus de hederam generibus. Ceterum tamen tot Hederam genera Theophrasto describantur, dua tamen Hederam sunt nobis
 nota, nempe maior, & minor. MAIOR itaq; quam arboream vocamus, non solum in syluis excelsas arbores scandit,
 sed etiam antiqua aedificia, urbium moenia, sepulchraq; aded occupat, vt ta-
 men omnia diruat, & vna cum iis collabatur. Eadem in primis folio prouenit pyri modo, oblongo, quod tamen tractu
 temporis triquetrum efficitur. Id quoque laue, crassumq; est, & longo nixum pediculo, sapore misto, nam & acedinis, &
 amaritudinis, & acerbitatis est particeps. Florere incipit ad finem Autumni, floribus muscosis, colore pallido, e quibus hye-
 matis menses lanuatio. MINOR sterilis est, Helix vocata. Haec raro arbores scandit, sed aut humi repit, aut saxa,
 macula, sepes, & aggeres occupat, folio semper triquetro, ac maculoso: sarmentis albicantibus, lignosis, fructu nullo ne-
 que flore vtraq; perpetua fronde virent. Serpentibus gratissima est Hederam, quod in ea hyeme delitescant, eius sese calore fo-
 uentes. Foliorum succus ex vino austero potus lienas sanat, Decoquantur ex oleo, & aceto septem hederam folia, totidem
 coriandri, & ceterorum nu. lei, & cortice delibrati, terunturq; deinde, & temporibus, & sicuti illinuntur, contra capitis do-
 res, & carum proueniens. Qui scrobiculas cauterio paratas gerunt in cruribus, aliisve corporis partibus (fontanellas
 vocant), folia hederam superponunt, magna sane utilitate, non solum, quod illuc fluentem humorem alliciant, extra-
 hant, sed quod etiam roborent. Mulieres consuetis hederam foliis pileos parant, & papulosis infantium capitibus imponunt,
 faciem, & ut illos, virus extrahentes. Lachryma, qua ex caudice distillat, illita lendes, & pediculos necat. Minor potest
 casum, qua maior, sed inefficacior tamen est. Est & herba, quam vulgus HEDERAM TERRESTREM vocat.

Maior.

Minor.

Hederam vires
Marthiolo.



Hederam ter-
restris men-
tio.

III. HEDERA TERRESTRIS. *IV. HEDERA TERRESTRIS

Slechima hederam

montana.*

Slechima hirsuti



Hac itaque longo reptatu humotenus sese diffundit, quadratis funiculis, e quibus folia emergunt rotunda, crispa, & per
 ambitum serrata, floribus subpurpureis, pusillis, in caulibus e foliorum exortu, Aprili mense prodeuntibus. Radicibus niti-
 tar tenuibus, qua e caulium geniculu prodeunt, & eos humi reptantes connectunt. Nascitur in opacis, circa semitas, urbium
 muros, & etiam in hortis. Amaro gustu tota planta est, ideoq; abstergere, attenuare, aperireq; facile poterit. Vulneratis vi-
seribus auxiliari in potionibus pleriq; consent, id proprie facultati ascribentes. Huic u addere solent Rubia, & albi Diaca-
mi radices, quinetiam Betonicam, Pilsellam, Pimpinellam, Sanguisorbam, Pentaphyllum, Bistortam, Stellariam, Equi-
setum, Virgam auream, Tormentillam, & Brassicam rubram, & ex his omnibus in albo vino decoctis potiones parant, ad-
duntq; rhodomellus, quod sufficit, ad potum dulcedine conciliandum. Huiusce medicamenti, interne vulneratis exhibere
solent quotidie ternas uncias, magno quandoq; auxilio. Succus cum erugine mistus, instillatur vtiliter cuniculosi vlceri-
bis. Fit e terrestri hederam oleum, foliis recentibus in eo maceratis, diuque astate insolatis, admirabilis sane facultatis ad
colicos affectus, & ceteros intestinorum cruciatus, cum potum, tum clysmate infusum. Hederam (vt auctor est Galenus li-
bro septimo simplicium medicamentorum) ex contrariis composita est facultatibus: habet enim quiddam adstrin-
gentis substantie, quam terrenam, & frigidam esse ostendimus: habetque etiam nonnihil acris, quam calidam
esse vel gustus comprobatur. Nec deest tertia: aqueam namque substantiam quandam tepidam obtinet, certe si viri-
da sit. Siquidem dum arefcit, hac prima exhalet necesse est, manetque qua terrea est, & frigida, adstringens, & ea
qua calida,

Hed. terrestris
vires.

Hederam
restris hederam.
Hederam facul-
tates ex Gal.

Nomina.

que calida, & acris. Hedera, quæ ita Latinis, Græci κισσός nominatur: Mauritanis, Cuscus: Italis, Hedera seu Lella: Germanis, Marter, siue Epherobaum/ Ephero siue Epich: Hispanis, Edera, Era: Gallis, Lierre. Hedera minor, Græci κισσός μικρός: Italis, Hedera minore. Hedera terrestris, Græcis, κισσός χερσαία: Italis, Hedera terrestris.

† Non ab re quidem suspicandum est (vt doctissime adnotavit Marcellus) huic loco in Dioscoride mendam subesse, & quod non ἐρυθρά, hoc est, rubra, vt habent vulgati codices, legendum sit, sed ἐρυθροτέρα, id est concinniora. Nam præ aliis rationes, huic lectioni adstipulatur Theoph. qui libr. 3. cap. 18. de plantarum historia eo nomine hedera belica sola depingit.

Hedera triplex hic proponitur. I. Hedera arborea, Matth. Ges. hor. Lugd. Tab. Hedera. Bruf. Trag. Cord. in Diosc. Dod. fol. Cast. Cæs. Hedera nigra, Fuch. Dod. gal. Lac. Lon. Hedera corymbosa, Lob. Tab. Hedera species secunda seu nigra, siue Dionysia, aut corymbifera, Thal. Huius folia quò magis arborefca ed magis rotundantur, exceptis iis, quæ in summo sunt, baccas nigras habet & luteas. II. Hedera maior sterilis C. B. Hedera helix, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Lugd. Cæs. Lon. Tab. Cam. Helix siue prouoluta sterilis hedera, Lob. Hedera arborea sylvestre genus, Ges. hor. Hedera species tertia helix vocata, Thal. Hedera minor, Cast. Hæc an diuersa sit ab arborea ambigit Theoph. Plinius concedit: alii non concedunt, cum fieri possit vt alicubi non arborefcat, ob imperfectionem, non speciei, sed individui. III. Hedera terrestris vulgaris, hæc Chamæcissus Diosc. fortè, si in descriptione pro μικροτέρα legatur μικροτέρα: apud Plinium Hedera se non attollens à terra. Elatine, Brunf. Hedera terrestris eidem, Matth. Cast. Dod. fol. Tab. Thal. Lug. cui & Malcocillus: Chamæcissus, Fuch. Dod. gal. Lon. Cam. Chamæcisma. Cord. hist. Humilis hedera, Lob. Maior est, est & minor elegantior cauliculis erectioribus, breuioribus, vt & foliis, floribus magis cæruleis, quæ locis humidioribus circa arbores antiquas reperitur. IV. Hedera terrestris montana, quæ priore viticulos breuiores habet, sed hirsutiores, foliis maioribus, floribus tæm, qui purpurascunt, quæ in montosis Thuringiæ prouenit, & valentior ea, quæ in planis colligitur, vt D. Camerarius in suo Matthiolo monet, Hedera terrestris speciem montanam vocitans.

Χελιδόνιοι μέγα

CHELIDONIVM MAIUS.

CAP. CLXXVI.

2 Omnia exemplaria ὑπογλαυκά i subglauca

Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliolis: foliis ranunculi, mollibus tamen, & colore a cælis: flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte. In eo succus crocæ mordax, acris, & liquantulum subamarus, grauitè olens. Radix supernè singularis, infernè in multa crocæ

I. CHELIDONIVM MAIUS.

II. CHELIDONIVM MAIUS alterum.



cæa capillamenta fibratur. Siliqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa, in qua semen papaueris maius recluditur. Succus in æreo vase, cum melle pruni decoctus, oculis claritatem adfert. Foliis, caule, radice, succus exprimitur inente æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, & vlcibus quæ serpunt: imposita cum vino, aut manduca.


simplicium medicamentorum, sic inquit: Chelidonium minus, cum acius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, rugasq; scabros eicit. Succus eius per nares purgat, utpote admodum acer. Itaque hac herba quarti ordinis fuerit absoluti

Nomina.

I. GARYOPHYLLVS INDICVS
maior.

Maianis, Memicen, & Chilodomon. Italis, Celidonia minore, & Fauoscello: Germanis, Feigwarzen/Blatter Kraut/Pfaffenhödtin: & Meyentraut: Hispanis, Scrofularia menor: Gallis, Couillons de prestres, & petite Esclere.

Chelidonium minus nostrum, cum Dioscoridis per omnia conuenit, excepta vi acri, an fortè ratione soli hoc contingat? Strumen Plinio lib. 25. cap. 13. Chelidonia rotundifolia C. B. Ficara & Scrophularia minor, Brunf. Chelidonium minus, Trag. Matt. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in hist. & Dioscor. (cui & Amellus Vergilii) Ges. hor. Lac. Lon. Cast. Tha. Lug. Tab. Malacocissus minor, Fuch. in icon. Fauagello vulgò, Cefal. Testiculus Sacerdotis, Syluatico. Huius folia aliquando purpurea macula notantur: flore est simplici, rarius pleno.




II. GARYOPHYLLVS INDICVS
minor.



Ο θήνα **OTHONNA**
CAP. CLXXVIII.

Othonnam aliqui maioris chelidoniae succum esse aiunt: quidam glaucii: alii succum floribus corniculati papaueris expressum. Alii permistos caeruleae anagallidis, hysocyami, & papaueris succos esse contendunt. Alii Troglodyticae cuiusdam herbae succum, quae Othonna vocatur: nascique eam in Arabia tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna foliis erucae, a perforatis cribri modo, & veluti à tinea derolis, squalore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidam Anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adiiicitur, ubi expurgare est opus: mordet enim & abstergit omnem caliginem, quae oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elutos, semotis calculis, in pastillos ad eadem di-

***III. GARYOPHYLLVS INDICVS**
minor flore simplici.



α Omnia ex πολύτητα ὡσπερ σπύροκοπα, φαφαρά, ὀλιγόφυλλα. i. multis foraminibus, veluti à vermibus perforata, friabilia & pauca. Sed Ca. habet. ὀλιγόχυλα: i. pauci succi

geritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Ægyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam, & adstrictione, mordaci.

Othonnam Dioscoridi fuisse incognitam, illud nobis manifesto argumento esse potest, quod nihil ex se de ea scribat, sed omnia alijs accepta referat, ex quorum tantum opinione fama que hæc de Othonna memorie prædit. Quare mirari non licet, si nostra quoque ætate Othonna minimè cognoscatur. Non desunt tamen rei herbaria periti, qui eam plantam Othonnam esse censeant, quam Indicos Caryophyllos vocat vulgus: quibus ego quoque subscriberem, si hæc planta eruca foliis cresceret, iisque paucis, cribri modo perforatis, & friabilibus. Verum cum foliosa sit planta, & non paucis foliis referta, quæ Tanacetum potius, quàm Erucam referunt, eaq; cribri modo perforata, aut tanquam à vermibus erosa non sint, nec friabilia, non video sanè, cur in horum sententiam concedere queam. Nihil enim me mouet ad probandam horum opinionem floris color, & latifolia imago, alijs reclamantibus notis, cum numerosa sint plantarum genera, quæ croceis, & latis proueniunt floribus. Ego quidem, si mihi discernendi facultas daretur, in Chrysanthemi genere hanc plantam reponerem, quod tamen alijs, me peritioribus, discernendum relinquo. Ceterum ut omnibus satisfactum esse intelligam, duas huiusce Indica plantæ imagines hic addi curavi. Est itaq; hæc planta fruticosa, caulibus bicubitalibus, & quandoque maioribus, striatis, rectis, subrufescentibus, è quibus multifida prodeunt folia, & numerosa, Tanaceti amula, sed maiora, & magis diuisa: radix illi est breuis, sed numerosa, nec altè descendens. Tria huiusmodi plantæ obseruauimus genera, floribus tantum differètia. Namq; genus est ceteris procerius, quod flores profert aureos, magnos, numerosis admodum stipatos folijs, odore minus quàm in altero graueolenti. **ALIVD** floribus spectatur minus, rubino, ternoq; eorundem ordine concinnatis, floridus in medio capillamentis, ut in Rosa: huius flores colore quidem & sapore differunt. Ii enim ex aureo in purpureum colorem inclinant, subnigricantq; folijs crassiusculis, nitentibusq; aspectu admodum iucundo, adeò ut ex holoserico, quod Velutum vocamus, à natura facti videantur, sed odore sunt graui, & qui caput feriat. Postremum autem, quod prædictis est minus, nihil à præscripto differt, nisi quod non tam altè adolescit, & flores habet simplici tantum foliorum coronamento, sed ceteris minores. Cetera similia sunt. Prodeunt omnes è calyce oblongo, torosog; Lychnidis coronaria ferè simili, longis pediculis nitentes. Semen inde sit oblongum, tenue, ac nigrum. Serunt in hortis, visuntur passim super fenestras in fictilibus & arculis, spectaculi gratia. Excalfacit & siccatur, quo fit, ut ea quoq; in medicum usum tradi possit, vbi abstergere, & aperire sit opus, minor tamen valentius quàm maior. Hanc cum admisceret Paulus suis medicamentis, asserit quibusdam in locis maioris chelidonijs succum esse, eorum fortasse opinionem secutus, qui ita scripserunt, ut refert Dioscorides. Eius nomen Græcum ὀθόννα Latinum item, & Italum Othonna. Caryophyllus Indicus, Italis, Garofano Indiano.

Nomina.

Caryophyllos Indicos Matthioli, aliqui Othonnam Dioscoridis, & Plinii, alii Argemonem Diosc. alii Lycopersicum Gal. alii Caltham Plinii, quam grauis odoris dicit: alii Petilium florem eiusdem cèsent. Hæc variant magnitudine, florendi tempore: flore item simplici, rarius multiplici: colore rubri, crocei, mellei & albi. Tunetanum vel Africanum dicitur, eò quod primum hic flos in Germaniam fuerit illatus, quòdo Carolus V. Imperator, apud Tunetum victoria potitus est. **I.** Tanacetum Africanum maius flore pleno. C. B. Caryophyllus Indicus maior, Matth. Lugd. Caltha Africana fruticosa flore multiplici, Gesn. hor. Flos Africanus maior, Dod. gal. & fol. Tab. Othonna maior polyanthos, Lobel. Flos Indicus maior flore pleno, Cam. Flos seu Caryophyllus Indicus, Cast. Flos Indiæ, Cef. **II.** Tanacerum Africanum minus flore simplici, C. B. Caryophylli Indici, Trag. Tagetos Indica, Fuch. & Lugd. Flos Indianus seu Viola flammea, Fuch. in ico. Flos Africanus minor, Dod. gal. Flos Africanus, Dod. fol. Lob. Flos Indianus, Lon. Caltha Africana minor flore simplici, Gesn. hor. Caryophyllus Indicus minor Matth. Cast. Lugd. Othonna, Lac. Tanacetum Peruvianum, Cord. hist. & Rosæ Indianæ alijs. Flos Indiæ alter minor, Casal. Flos Africanus minor flore simplici, Tab. Flos Indicus minor flore simplici, Cam. Sunt qui primum, Othonnam Diosc. & Plinii: hoc verb Argemonem Dioscor. & Argemona Plinii statuunt. **III.** Tanacetum Africanum minus flore pleno. C. B. Matthioli vna figura minorem vtrumq; expressit. Hic dicitur flos Africanus minor multiflorus, Tab. Flos Indicus minor flore pleno, Camerario.

I. AVRICVLA MVRIS.



AURICVLA MVRIS. CAP. CLXXIX.

Muris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concatis: folijs angustis, a oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis, cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. **b** Radix illita agilopiasanat. Sunt qui Alfinem, muris auriculam vocitant.

Reperiuntur quidam Dioscoridis codices, qui hoc loco Alfinem habent, quæ libro quarto post helxinem describitur, quod & ipsa nonnullis Muris auricula appelleretur. Quæ forsitan nominis cognatione adducti, posteriorum quidam, ex quarto Dioscoridis volumine in hanc locum ipsam transtulere, vbi sunt generi.

a Meum, add. λεπλά μικρά. **i.** tenuia parua. **b** Meum add. καθάλα ἢ ὄστῃ ὁμοία τῆ σκολοπενδρία λεπτότερα ἢ ἡ ἰλασων. **i.** in vniuersum similibus est scopolendrio, sed leuior, & minor. Auriculæ muris consid.

Myosotida

generis, vel potius nominis alteram representavit Diosc. Sed quoniam ipsa Dioscor. scribendi series clarissime demonstrat, alijam post helxinem sequi debere, quod ei adeo similis sit, ut tradat Diosc. eandem fuisse cum helxine, nisi humi-
 lior esset, id. v. lib. 4. de ea nobis dicendum erit, quod inibi eius legitimum sedem esse existimemus. Caterum hac, de qua
 bo. mentio est, passim mense Maio floribus ornata visitur, nimirum in pratis, in campis, in hortis, secus vias, & vbiq. fere loco-

*II. ECHIVM SCORPIOIDES
 palustre.*

rum. Huiusce vires paucis perstrinxit Gal. li. 7. simpl. med. sic
 inquit: Auricula muris desiccata ordine secundo: caterum nul-
 la euidem caliditatem possidet. Ea Graecè *μυρὴ τοῦ τῆς* voca- Nominā-
 tur: Latine *Auricula muris*: Italicè, *Orecchia di topo*: Germ.
Waldt Mangelt mit blawen Bluomen: Hist. m. *Oreya*
de raton yerua: Gallicè, *Oreille de ratte*.



I. ISATIS DOMESTICA.

I. Auricula muris, Matth. Dod. gal. Lac. Cast. Lug.
 nisi sit Myosotis scorpioides (cuius figurā adiūxim⁹)
 Lob. minus rectè expressa, quid sit ignoramus. II, E-
 chium SCORPIOIDES palustre, ex radice repente
 fibrosa, caules exsurgūt, aliquando reclinati, aliquā-
 do erecti, rotūdi, leuiter hirsuti, etiam glabri, sesqui-
 palmares, etiam minores, & ad ripas aliquando bicu-
 bitales, qui in summo in duos tresve interdū ramu-
 los, nudos, recuruos brachiantur: folia cingunt ob-
 longa, subrotunda & pinguinacula: summis ramulis
 flores insidēt ex quinq; foliolis compositi, commu-
 niter dilute cærulei, aliquando cædidi, quibus paruae
 succedunt techa, pedicellis tenuissimis insidentes,
 quibus semen minutum albicans inclusum. Aquosis
 tantum locis nascitur: tota aestate floret, aliis ab radi-
 ce cauliculis subinde enascētibus Dicitur Cynoglos-
 sa minor, Brunf. Euphrasia cærulea, Trag. Tab. Echiū
 palustre Cord. Thal. Scorpioides cæruleū vel palu-
 stre, Ges. hor. Leontopodium Lon. & Lugd. Myosotis
 Scorpioides partim repens, partim erecta, Lobel.
 Heliotropium minus primum, Cæs. Huius duæ spe-
 cies: altera palustris maiore flore & penè glabra: al-
 tera in agris minore flore & hirsuta.

Ἰσάτι. GLASTVM. CAP. CLXXX.

Satiium Glastum, quo infectores lanarum vtun-
 tur, folium habet plantagini simile, verum pin-

II. ISATIS SYLVESTRIS.



Isatis tinctoria



Rr 3

guis

grius, nigriusque: cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima: caules tenuiores, multifidos, quadantenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes: in quibus semen flore tenui, luteo. Eadem, quæ & supra dicta præstat: potu, & illitu lienosis auxiliatur.

Isatidis, seu Glasti conf. **I**satis sativa, quam in Hetruria vulgò Guado appellamus, tingendis lanis, fullonibus & insectoribus maxime expetitur, quod lanarum insectus, quibus cum admiscetur, firmet, & nunquam deperdi patitur. Huiusce maximus habetur proventus in Umbria circa Noceram, ubi oppidum est Guadam ideo appellatum, quod ibi Isatis frequentissima seratur. Sylvestris nascitur in campestribus, incultis locis, & in pascuis. Glastum sylvestre, Plinio inter sylvestres lactucas recensetur libro 20. cap. 7. quippe quod illi non sit absimile. Fit ex Isatide caruleus ille color pictoribus expetitus, quem Indicum vocant, de quo diffusius lib. 5. suo loco differemus. Meminit vtriusq; Isatidis Gal. lib. 6. simpl. med. sic inquit: Isatis sativa, quæ videntur tinctorum, facultatis est valenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara, atque adstringens. At Isatis sylvestris manifeste iam acre quiddam tum gustu, tum actione præfert. Proinde quæ sativa valentius desiccant, valentius etiam humida putredinibus obsistit. Planta Græcis Ἰσατίς ἡμερος, Latinis, Glastum sativum nominatur: Italu, Guado domestico. Quæ verò Græcis ἰσατίς ἀγρία, Latinis Glastum sylvestre, & Italis, Guado salustico: Germanis, Weid: Gallis, Pastel sauvage appellatur. Vtrumque Glastum vocant Mauritani, Dili, Dileg, Vesme, Chate, Chate, seu Alchat, Adlen, aut Adhlen, & Nil: Germani, Weid: Hispani, Pastel: Galli, Gueda, seu Pastel de Languedoc.

Nomina.

Isatis duplex: sativa, quæ Lactucæ quartum genus Plinio: Sylvestris, Lactucæ tertium genus eidem, cum enim animadvertisset Diosc. Isatidis sylvestris folia lactucacea dixisse, cum Lactucis miscuit. I. Isatis sativa, Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. (cui & Luteum Vitruvii) Ges. hor. Lac. Lon. Lugd. Isatis domestica, Matth. Cast. Glastum sativum, Lob: Cam. Glastum, Cæsal. II. Isatis sylvestris, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Lon. Ges. hor. Cast. Tab. Lugd. Isatis agrestis, Cord. in Diosc. Glastum siue Isatis sylvestris, Lob. Cam. Habetur & Isatis Indica, Anil & Nil Garziæ (ubi Clusius in notis addit cum Isatide convenire) à Costæ, Cam. qui ex hoc Indicum in Ægypto fieri scribit.

Ἰσατίς.

TELEPHIVM.

CAP. CLXXXI.

† Meum Ἰσατίς λεπτή. i. angusti, tenuis.

Telephium herba portulacæ similis, & caule, & foliis: alas binas in singulis foliorum geniculis annectit: ramuli à radice teni, septenive prodeunt, foliis referti caruleis, crassis, lentis, carnosis: flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

I. FABARIA.

* II. TELEPHIVM PURPUREVM. *

Sedum telephium
stem.



teo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

Quædam

Quoniam non desunt rei herbaria periti, qui existiment, Telephium eam esse stirpem, quam quidam Fabariam, alij Fabam pinguem seu crassam, quidam vero Fabam inuersam appellant, cum tamen nulla reperiatur qualitate praeterita, qua absterforia, siccantisq; facultatis particeps dici possit, ut Galenus Telephium esse testatur, foliaque proferat portulaca longe maiora, eorum sane sententia plane adstipulari non ausim: tametsi ea compluribus notis Telephium referre videatur. Telephij vires memoria prodidit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, ut ita scribit: Telephium excicandi, & detergendi facultate est, non tamen insigniter calida: verum in hoc forsitan quippiam ipsum primi esse ordinis censet. Deficit tamen secundo ordine intenso, aut certe principio tertij: proinde ad putrida vlcera conuenit, & leucas & aliphon cum aceto sanat: hactenus Galenus. Caterum illas quidem Telephij qualitates haud reperies in Fabaria nostrate, etsi has, ut paulo ante diximus, notis pluribus proximè Telephij historiam accedat, ut eius pictura, quam hic damus, aperte satis demonstrat. At si facultates tantum obstant, quò minus ea planta Telephium esse, & dici mereatur, in hoc illa ratio non parum ponderis habitura est, qua superius ostendimus, verum Chelidonium minus herbam illam esse, quam in eius mentione depictam exhibuimus. Nam si Arum, teste Galeno, is caret facultatibus in Italia, quibus in Graecia praditum est, nil mirum videri debet, quòd & alie planta cum solo vires mutauerint suas, ut illi planta, & huic Fabaria dicta facile euenisse suspicandum est. Velim tamen in his, ut in alijs quoque dubijs plantis, suum cuique esse iudicium. Herba, quae τηλέφιον Graeci, Telephium item Latine dicitur. Italus: Faua grassa: Gallis, Reprise, Ioubarbe des vignes: Germanis: Wundkraut.

Telephij consideratio.

Telephij vires ex Gal.


Fabaria. Nomina.

Telephium hoc cenetur (quod tamen minimè est, deficientibus foliorum alis, sed Scorpioides Matthioli, Telephium Dioscoridis est) vulgò Fabaria, à foliorum cum faba similitudine: dicitur Scrophularia media, Brunf. Fabaria, Matth. Lugd. Telephium siue fabaria, Matth. in iconibus, Cast. Telephium album, Fuch. Acetabulum alterum album, Fuch. in icon. Acetabulum alterum, Cord. in Diosc. Crassula maior, Dod. gal. Cæsalp. (qui Coryledon alterum Dioscoridis censet) Thal. Anacamperos, Gef. hort. Faba inuersa, Gef. hort. Lob. icon. Telephium, Gef. hort. Lob. obs. Tab. Cam. II. Addidimus & Telephium purpureum, quòd parum à primo discrepat, cauliculis tenerioribus, magisq; rubentibus, folijs magis crenatis, floribus purpureis, radice minore: quae frequens est ad Rheni littora hic Basileæ. Dicitur Scrophularia seu Portulaca maior, Trag. Telephium purpurascens. Fuch. Lugd. qui duas habet figuras. Telephium purpureum Tab. Cam. Acetabulum alterum purpureum, Fuch. icon. Fabaria, Lonic. Crassula montana, Cæsalp. Telephium vel Crassula purpureo flore Camerario ad Marthiolum.

LIBRI SECUNDI FINIS.

Rr 4 PETRI





PETRI ANDREAE
MATTHIOLI, MEDICI
Senensis Commentarij,

IN LIB. TERTIVM PEDACII DIOSCORI-
DIS ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

SVperioribus, charissime Aree, commentariis, tradidimus de aromatibus, vnguentis, oleis, arboribus, earum fructibus, & lachrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ vernacula, & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scatent remediis, prosequemur.

aMeū & σικ

νὸ τῶ ἐπι-

φάνεσαν ὡς

περ τὸ σίλφι-

ον, ἀραιὰ δὲ

ἐστὶ ὅλη. ἰ. ἢ

ita densa su-

perficie, sicu-

ti sulphurium,

nam totara-

ra est.

Cōclusa non

legit Orib.

bMeū & Car.

ὑπὲρ δένδρων.

i. super arbo-

ribus.

Idem leg. O-

ribasius.

cMeūm με-

τὰ κρόμυρα-

τος. ἰ. cū di-

luta vini po-

tionē.

d Meum non

legit, mirē

Agarici con-

sideratio.

Fuch. lapsus.

Agarici vires

ex Gal.

Ἀγαρικόν.


AGARICVM.

CAP. I.

AGaricum radix fertur laserpitij similis, a sed facie summa solutior, & rariore fungosq; tota contextu. Duo eius genera: scemina, quæ præfertur, rectis intus venarum discursibus constat: mas rotundus est, & vndique compactior. Vtrique gustus in initio dulcis, mox ex distributione in amaritudinem transit. [Gignitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicē esse plātę affirmēt: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine.] Gignitur in Galatia Asiæ, & Ciliciab in Cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi, calfaciendiq; naturam habet, effcax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso febrim non sentientibus: febriculosis verò in aqua mulsa: arquatis quoque, suspriosis, iocineris, renumque vitio laborantibus, dysentericis. Item si vrina ægrè reddatur, si vuluæ stranguatus vrgeat, si pallor, membra decolorat, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si hien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humo:is sorbitione deuoratur: simili modo acidida ructantibus propinatur: sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicium, & articulorū dolores, & cōitiales morbos, si cū aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ceteræ feminis, quas inflatio vuluæ vexat, vtiliter aequali modo datur: horrores soluit, datū ante febrū accessiones: alium purgat, drachma vna, aut altera, si cū aqua nulla bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum c diluta portione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, d mirē auxiliatur. In summa, internis omnibus vitijs conuenit, pro viribus, & ætate datum, nunc ex aqua, nunc ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

AGaricū cuius duo habentur genera: mas alterū alterum scemina, fungus est in arboribus nascens. Plura de eo diximus h. i. in Larici arboris historia. Prestantissimū habetur in Tridentinis montibus, vbi sepius proprijs manibus illud diuulsimus, adacta securicula. Ceterum tametsi Plinius libro 16. cap. 8. omnes glandiferas arbores Agaricum ferre tradat, in Tridentinis tamen syluis, ac etiam in reliquis Italia locis, quod equidem viderim, sibi tantum larici innascitur. In Cedro Agaricum gigni, tum in Asia Galatia, tum in Cilicia scribit Dioscorides, nulla eius mentione facta, quod in Larice ipsa aut glandiferis (vt Plinius inquit) arboribus proueniat. Fuchsius in libro de compositione medicamentorum, quem nuper actum excudit, Agaricum ex Sarmatia per Illyriam Venetias afferri tradit, & ex Galatia, & Cilicia Alexandriam, & ab Alexandria Venetias: eo fortasse argumento ductus, quod Dioscorides auctor sit agaricum nasci in Sarmatia regione, in Galatia Asia, & Cilicia. Verum iam pridem desijt ex illis locis importari, vt testantur mercatores & pharmacopæi. Equidem compertum habeo, omne ferè agaricum, quod Venetijs venditur, partim deserri ex Tridentinis montibus, in quibus sunt syluæ Laricibus refertæ, partim ex Vulturena agro, & alijs finitimis Rhetorum Vindelicorumq; locis, partim ex Norico tractu: neque certè vnquam, dum ego Venetijs agerem, intelligere potui, quod agaricum aliunde conueheretur. Quare adducor, vt putem, Fuchsium in hoc planè deceptum esse: Agarici meminit Galenus sub quodam radicis genere libro 6. de simplicium medicamentorum facultate, vbi sic inquit: Agarici radix, hoc est, qua trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis, sed paulo post subamara apparet, & acrimonia quardam speciem temporis spatio inducit, leuiculaq; adstrictioni est, & consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem qua superioribus commentarijs dicta sunt meminerimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aërea, & terrea à caliditate extenuata: porò minimum habet substantia aquea. Hac ratione, & digerendi, & calfaciendi vim habet, & crassitudinem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Proinde regio morbo laborantes sanat, eos vtique, qui sic ab infarctu iecoris laborant. Inuat & morbo

AGARICVM.



comitali obnoxios eadem facultate, tum vigores per circuitum recurrentes ex crassis, aut viscosis humoribus natos sanat. Iuuat & morsos a bestijs frigore ladentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impositum, tum intro in corpus sumptum pondere drachma vnus cum vino diluto. Est & purgatorium. Et li. primo de antidoti idem Galenus inquit: Agaricum si autem nullam admittit: optimum est leuissimum: densum vero, & graue, & lignosum deterrimum: quod autem inter hac medium est, quantum signis, tantum & viribus ab vtrisque distabit: haecenus Galenus. De viribus Agarici Mesues quoque scripsit, sic inquit: Agaricum deicit vtranque bilem, ac etiam pituitam ipsam: crassos, lentos, putrescentesq; humores expellit. Eius propria facultas est cerebrum, omniumq; sensuum organa, ac musculos expurgare: excrementa, qua spinali medulla pariter & nervis inhaerint, educere: pulmonem, ac petus a lentis ac putrescentibus humoribus detergere: ac deinde ventriculum, iecur, lienem, renes, & in mulieribus vterum mundare. Praeter hac soluit Agaricum compaginum omnium contumacem materiam. Quapropter non mirum videtur, vocasse Democritum agaricum familiarem medicinam, cum ad omnes corporis partes conformitatem habeat. Nam non imbecilles possidet vires ad plerosque tum capitis, tum cerebri, tum eiusdem membranarum morbos: nempe diuturnum dolorem, comitalem morbum, apoplexiam, vertigines, maniam, atrabilem, & cerebri inflammationes. Est etiam morborum omnium, quorum causa fuit obstructio, medicina admodum singularis: quo fit, vt regio morbo affectis, aqua intercute laborantibus, ac liene vexatis leuamentum praestet. Vinam quoque petit, ac menses commodè ciet. Coloris nitorem Agarici vsus toti corpori commendat. Ventrus tineas tum necat, tum deicit. Coxendicum doloribus conuenit, & diuturnas febres discutit.

Ex Mesue

Non desunt quoque, qui Agarico pro sapone vtantur, dum caput lauant, eum conserre putantes ad frigidus capitis morbos. Quod Graeci ἀγαρίκον Latini quoque Agaricum dicunt: Mauritani, Garichum, seu Garicum: Itali, Agarico & Fongio di- Larue: Germani, Dannenschwam: Hispani, Agatico: Galli, Agaric: Bohemi: Agaryka: Poloni Modrzenniuua.

Nomina

AGARICVS inter fungos referendus est: verum alius arboreus, alius saxatilis dicitur: de saxatili, qui Fungus petraeus, & Lac Lunæ dicitur, cuius in lactantibus ad lactis auctionem vsus est, hic non agitur. Sed de Arboreo, qui duplex, & ratione sexus, mas & femina: & ratione coloris, candidus & niger. Probatum quod candidissimum & leue: quod vero graue, nigricans, perniciosum fugiendum: quin & quod corrolum & quod prope caudicem est. Iustum pondus infusi est à dracumis duabus, ad drachmas quinque: in puluerem redacti, à drachma vna ad duas.

RHAPONTICVM. CAP. II.

Rheum, aliqui rheum, Latini rhaponticum vocant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum sunt, regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centauro magno similis, sed minor, a & rufior, fungosa, aliquantulum leuis, sine odore. Optimum habetur, quod teredines non sensit, si gustatu b cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorè redat pallidum, aut ad crocū inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, rupta: lienosos, hepaticos, tormina, & Cat. renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intenta præcordia, & vuluæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & coeliacorum affectus, contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valerudinibus eodem, quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant in mulso: sin aliter ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. Liuentia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitū dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

Mesue, in epot. b Oris, habet maxime.

Rhaponticum officina Rheuponticum vocant. Quod nomen sibi ascriuisse videtur à Rha fluuio regionem quandam in Pontu continere, in cuius fluminis ripis numerosum nascitur. Cuius rei testis est Ammianus Marcel- Quorundam error Ceterum maioris radicis pro Rhabarbari an idem eam Rhabarbarum à Rhapontico Dioscoridis nullo discrimine differre. Quippe quorundam temporis curriculo legitimum Rhabarbarum Italia non viderat. Quod cum paucos post annos ad nos esset allatum, non desuere qui priorem reuocauerint sententiam. Id quod maxime palam facit Manardus Ferrariensis in suis epistolis. Quandoquidem in libro quinto epistola 2 firma hac, & stabili ducebatur opinione, vulgare nostri vsus Rhabarbarum, &


Rhapontici confid. Rhabarbari an idem eam Rhabarbarum à Rhapontico Dioscoridis nullo discrimine differre. Quippe quorundam temporis curriculo legitimum Rhabarbarum Italia non viderat. Quod cum paucos post annos ad nos esset allatum, non desuere qui priorem reuocauerint sententiam. Id quod maxime palam facit Manardus Ferrariensis in suis epistolis. Quandoquidem in libro quinto epistola 2 firma hac, & stabili ducebatur opinione, vulgare nostri vsus Rhabarbarum, &

I. * RHAPONTICVM FOLIO

Helenij incano.*

II. * RHA DIOSCORI-

dis.*



rum, & Dioscoridū Rhaponticum & idem esse, & nihil inter se cognatione differre. Veruntamen cū postea legitimum conspexisset Rhaponticum ē Moschouia allatum, quod Dioscoridis historiam notis omnibus referret, nouam statim in dū opinionem, & priorem, quam habuit, reuocauit, vltima quinti libri epistola ad Leonicum scribens. Rhaponticum primum vidi ego Venetijs in officina ad medici insignium, ē Constantinopoli allatum, ac deinde alijs pluribus in locis etiam

Vana Auer-
toiscalumnia
contra Gal.

Alexandria conuectum, q̄ nullis reclamantib; notis, verū antiquorū Rhaponticum refert. Inuehitur Auerroes li. 5. suarū collectanearū, tum in Galenū tum in reliquos, qui dixerunt Rhabarbarum facultate tantū adstringenti pollere, q̄ purgatiuam, que illi inest, facultatē minimē compererint: cū tamē Auerroes ipse sit maximopere carpendus, q̄ neq; Gal. neq; ceteri seniores Rhabarbari nostri vsus vsquam meminerint, nec quicquam de eo posteritatis memoria prodiderint, tamē de Rhapontico à Dioscor. descripto plura tradiderint, inter cuius facultates nulla penitus, que purgando fit, inueniri potest.

Rhapontici
sib Rhabar-
baro memi-
nere Serapio
& Auicē.

Rhapontici meminere, sub Rhabarbari tamen titulo, nisi interpretis (vt ferē suspicor) sit lapsus, cū Serapio, tum etiam Auicenna: quandoquidem non plures suo Rhabarbaro assignauerunt facultates, quam qui eos praeceperunt, Rhapontico assignauerint. Quippe quod eorum neuter scripserit, suum Rhabarbarum deiectionis facultate pollere. Id quod verum iudicium praeberet, scripsisse hos de Rhapontico, non autem de Rhabarbaro. Quo fit, vt non ab re putandum sit, id euenisse interpretum ignorantia Rhaponticum in Rhabarbarum permutantium. Cognouit tamen legitimum (ni fallor) etatis nostrae Rhabarbarum Paulus Aegineta, cū ipsius meminerit libr. 7. cap. 11. in quibusdam medicamentis aduersus podagras, quorum

Aegineta
Rhabarbari
agnouit.

gnomina sunt Diacorallion, compositio Agapeti, & compositio Atactos. Verū non praeterea credidit ipse, Rhaponticum à Rhabarbaro differre. Cuius rei auctoris fidem manifestam facit libr. 1. cap. 43. vbi scribit, quod deuorata terebinthina resina oliua quantitate dormituris aluum leniter mollit, & quod id praestatur efficacius, si Rheapontici momentum admiscetur. Ex quibus palam fit, per Rhaponticum Paulo Rhabarbarum designari, quod fortasse inter hac existimauerit nullus

Rhapontici
& Rhabarbari
discrimen nō
esse statuit.
Ruellius ma-
le.

intercedere cognationis differentiam, quemadmodum credidere recentiorum quidam, de quibus paulo antē diximus. Paulo enim si Rheapontici, & Rheaparbari aliqua intercessisset differentia, vbi peculiariter de simplicibus medicamentis agitur, de vtrorumq; facultate speciatim scripsisset. Sed cū ibi tantū Pontici meminerit, iudicium haud dubium est, illi Rhabarbari, & Pontici nullam fuisse differentiam. Caterum Ruellius eos acriter reprehendit, qui inter Rhaponticū, & Rhabarbarum

Rhapontici
& Rhabarbari
discrimen nō
esse statuit.
Ruellius ma-
le.

nostram discrimen faciunt, cū sua ferat opinio, alterum ab altero minimē disidere: atque si qua differentia reperiretur, eam non aliunde prouenire, quam regionum, vbi gignitur, diuersitate, clementia, vel inclementia caeli. Neque alio modo ne afferit, Ponticum nullo odore commendari, quam aquilonarium regionum, in quibus oritur, immensi frigiditate: cū tamen Pontica regio non vsque aded sit frigida, vt Ruellij sententia admitti debeat, sed vt potius tanquam inani reputanda videatur. Quandoquidem sequeretur, quod cetera stirpium genera, qua tam in Oriente, quam in Meridie odoris fragrantia commendantur, in aquilonari plaga, & in ipsa Ponti regione penitus in odore reperirentur. Quod tamen falsum esse semper crediderim: nam quamuis stirpes omnes, qua in aquilonaribus regionibus oriuntur (de his, qua natura odoratiores habentur, intelligo) ex climatum, & aeris algore, sint odore ac ceteris qualitatibus imbecilliores, non ob id tamen harum qualitatū aded expertes deprehenduntur, vt discerni nequeant: quin & in quemlibet vsum, vbi scilicet conferant, non recipiantur suis in regionibus. Quippe si ob frigoris, ac regionum inclementiam suas innatas qualitates penitus exuerant, aded vt sola tantū forma remaneret, propriam omnino peruerterent speciem. Quod tamen nulla ratione, nec auctoritate probatur. Siquidem comperit iam pridem apud nos est, quod quanquam Celtica nardus, qua à quibusdam Carinthiis

& Syria

& Syria albus nobis affertur, à quibus penè quatuor, vel quinque totius anni mensibus, nix colliquata labitur: itemq;
 avari radix, quae nostro auro ex Sarmatia Europa, glacie, & niuib. maiore anni parte semper obducta, aduehitur in calami
 odorati rsum, odore tam valido, naresq; feriente fragrare non deprehenduntur, quemadmodum Celtica illa nardus, quae ex
 Lybia, & Isthria defertur, & acorum, quod ex Ponto, Syria, & Aegypto petitur, nò tamen ob hoc euenit vnquam, quum suis
 proprijs a natur. alibus fragrent odoribus. Quo fit, vt infirma admodum, quantum equidem conyicio, sit Ruellij sententia.
 Quare hinc nobis concludere liceat, Rhabarbarum odoris expers non esse, acris, oli, & regionis algore, sed quòd alia à Rha-
 barbarico vel Indico sit planta. Declarant prater hac, Rhabarbarum à Rhabarbarico plurimum distare purgatoria vis, quam
 natura ipsa Rhabarbaro largita est, odor nares feriens, compacta simul substantia, aureus color, ariditas, amaritudo, quae
 gustu percipiunt. & ponderis grauitas. Quandoquidem Rhabarbaricum nullo odore commendatur, minimè deiectionem mo-
 luit, cum potius adstringit: non est amarum, sed subacre: non aridum, sed lentum: non compactum, sed rarum: non ponde-
 rosum, sed admodum leue. Quibus rationibus fretus non temere asserendum putauerim, Ruellium hac in re magnopere
 hallucinatum fuisse, praesertimq; cum dicat, nullo alio discrimine Rhabarbarum à Rhabarbarico differre, quam odore tan-
 tum. Vnum quippe videtur argumentari, Rhabarbarum, & Rhabarbaricum vnàm & eandem esse radicem, quòd forma,
 colore, ac specie nihil inter se distare oculorum sensibus appareant, cum tam in facultatibus, quam qualitatibus, maxi-
 me inter se differant. In simili errore versantur etiam y (sunt enim qui ita sentiant) qui sibi falso persuadent, abietis la-
 chrymam à Larigna nihil dissidere, & vnàm ac eandem lachrymam esse, eo quòd in colore, in substantia, ac in ceteris notis,
 in quibus perpendendis oculi tantum iudices sunt, adeo persimiles videantur, vt visibili facultate altera ab altera discerni
 non possit. Verum si quis rem ceteris sensibus experiri aggrediatur, discriminis certior fiet: namque olfactu odoris fragrantia-
 am baud insuauè. gustu verò amarorem in abietis lachryma comperiet, quibus Larigna caret. Et quisnam iuniperi resinam
 a leuiscama scerneret, nisi rei ipsius incorruptus iudex fuerit gustus. Quis a Strobilina resina, & à quibusdam gummi glo-
 bulis thuris ipsam agnosceret, nisi adulterium tum igne, tum gustu deprehenderetur: Tanta praterea intercedit similitudo in-
 ter pistacium, & vnguentariam glandem, vt nisi hac amaritudinem gustus relinqueret, illud verò dulcedinem, difficil-
 limum sanè fuerit alterum ab altera distinguere. Quid porro inter se similitus reperitur, quam cassia, & cinnamomum, etsi
 hac omnino specie non conueniant? Hinc facile adductus sum, vt nullius momenti eorum argumenta semper existimaue-
 rim. quae res secundum quasdam tantum qualitates diiudicant, quibus etiam saepe decipiuntur, vt y, qui hac leui ratione
 dicit Rhabarbarum, & Rhabarbaricum idem esse contendunt. Meminit Rhabarbarici Galenus libro 8. simplicium medica-
 mentorum, vbi de eius viribus ita scriptum reliquit: Rheum, quidam ipsum Rha nuncupant, mistam habet tum tempera-
 turam, tum facultatem. Habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est adstrictio, & adiuncta est quadam illi celi-
 ditas: siquidem si plusculum mandatur, subacre conuiscitur. Quinetiam aerea cuiusdam substantiae subtilis est particeps,
 quod indicat tum laxitas, tum leuitas: verum non minimè & opera. Ob id enim licet adstringens, tamen non tantum con-
 ualsis, sed & ruptis, & orthopnoea prodest. Sic quoque liuentia, & lichenas sanat cum aceto illitum. Porro quod adstrictio-
 nis opera baud instrenua sunt, hinc discere liceat, quòd sanguinem expuentibus, coeliacis, & dysentericis conferat: nec enim
 reducatur terrestri frigido tenue aereum, imo eò quòd deducat, & in altum perducatur valentioris effectus causa existit. Et in
 libro de antidotis primo: In Rheo, inquit, quoque fraus committitur: nam quibus in locis nascitur, simulatque euulsum est,
 ipsum elixant, quòd succum remittant, ac tam succum, vt syncerum, & aquae impermistum, quam Rheum exiccatum, vt
 non elixum ad nos postea mittunt. Idcirco scire oportet adulteratum dignoscere, quod facillimè ab his deprehenditur, qui
 Rheum sua sponte nascens viderunt: haecenus Galenus Ceterum adulterium, quod in Rheo fieri prodidit Galenus, id (vt
 paulo post dicturi sumus) de Rhabarbaro tradidit Mesues. Cui tria Rhei constituuntur genera, nempe Turcicum, Barba-
 rum, & Indicum, quod & Scenicum vocat, omnia à regionibus, à quibus conuehuntur, cognominata, vel in quibus pro-
 ueniunt. Quippe Turcicum nil aliud illi designatur, quam Ponticum, vel quòd è Ponto ad Turcas vicinos deferatur, vel
 quòd ab ijs saltuosis conuallibus, in quibus vltra Tanain fluium priores Turca, Pomponij Mela, & Plinij testimonio, ve-
 nationibus fere vixere tantum, iam pridem in Pontum fuerit delatum. Siquidem ab his non longè distat Rha fluius, circa
 quem Rha, quod Ponticum posteri vocauerunt, probatissimorum auctorum testimonio, oriri certo scimus, fluminis illius no-
 mine pariter appellatum. Quo fit, vt hac in re non dubitauerim errasse etiam Mesuem: quippe qui inter Rhei genera aluum
 ducentia Ponticum admiscuerit à ceteris tum specie, tum facultate diuersum, quamuis fortasse rectius id Turcicum appel-
 lauerit quam Ponticum. Porro Indicum ab India dictum, vbi frequentissimum prouenit, nemo est qui ambigat. Sed qua-
 nam ratione Scenicum, & Indicum idem esse dixerit Mesues, haecenus compertum non habeo: nisi fortasse Sinicum recti-
 m legendum fuerit, quòd à Sinis extrema India populis (vt arbitror) deferatur, cum plura quoque aromatum genera ea
 regio mittat. Id quod manifestè idem declarat Mesues: quippe qui Scenicum, vel Scenicum Indicum esse affirmat. Sce-
 nitica enim (vt infra dicemus) India populi non sunt, sed potius Sini, à quibus Sinicum vt vulgata habet lectio, mea quidem
 sententia, vocari debet. Sunt tamen qui velint Scenicum, nec Indicum esse, nec à Sinis regione oriundum, quòd à Mau-
 ritanis non Sinicum, sed Scenicum dicatur. Quamobrem eorum quidam, vt Adamus Lonicerus, in Arabia hoc nasci cen-
 set, & à Scenitis illius regionis populis Scenicum, siue Scenicum vocari putat. Fuchsius verò Mesuis opinionem secutus,
 nullam inter Indicum, & Scenicum facit differentiam: quippe qui scripserit libro primo de compositione medicamentorum,
 Rheum Indicum esse vocatum, quòd ex India, aut locis India proximis, nempe à Scenitis populis, vt auctor est Stephanus de
 urbibus Persidis, deferatur. Verum cum Scenita desertæ Arabiae populi omni aromatum genere sint destituti, cumq; asserat
 Mesues Scenicum rheum, & Indicum idem esse, cadit, peritq; Loniceri opinio. Velim tamen si possem Fuchsijs sententiam
 probare. Verum cum Scenita etiam Straboni populi sint è Parthorum collegio Arla, & Martyana mōtes incolentes, distent-
 que ab India sinibus miliaribus plusquam mille & quingentis, nescio profecto, quonam modo Indicum rheum à Scenitis
 Parthorum populis Scenicum dici possit: quo fit vt etiam Fuchsijs opinionem longius sustinere nequeam. Ad hac de Barba-
 rici nomenclatura varia admodum est recentiorum medicorum sententia. Quandoquidem sunt qui velint sic dictū à Bar-
 baria Aphrica prouincia, sic vulgariter appellata, vbi olim Carthago clarissima habuit sedem. Horum opinionem sequitur
 Fuchsius, quòd scripserit lib. 1. de compositione medicamentorum, id verum fuisse Rha barbaricum, quòd superioribus annis
 secum adduxere milites, qui cum Carolo Imperatore Tunetum expugnauerunt. Alij Barbaricum vocari credunt, quòd à Bar-
 bari India ciuitate, quae intra Indi fluij fauces est sita, deuehi censent, rati Indicum, & Barbaricum idem esse. Alij autem
 à Barbaria Erythraei pelagi insula, sic appellatum existimant, quòd India naues, ac liburnica aromata deferentes ma-
 gnum suae mercis, ibi iam pridem habuerint emporium, à quo per Arabicum sinum, traiecto prius angusto mari de
 Mecha, aromatum omne genus in Aegyptum per alias deferrebat nationes. Sed aliter se habet opinio nostra: quippe quòd
 semper

Ruellij, & ali-
 quorū error.

Rhapontici
 vires ex Gal.

Rhei tria ge-
 nera Mesue.
 Rhei Turcici
 nomenclatio.

Rhei Indici
 nominatio.

Ada. Lonice-
 rus reptehen-
 ditur.


Fuchsijs opin-
 non accepta.

Rhei barbari
 ci nomencla-
 tura.

Rhabarbarū
ex Troglody
tica regione
deserri pro-
batur.

semper existimauerim, Rhabarbarum ex Troglodytica Aethiopia regione ad nos deferri, & ibi etiam oriri, quod ea regio Barbarica antiquis fuerit appellata. Siquidem inueni Galenum scripsisse tum lib. 6. de simplicium medicamentorum se- cult. at. tum lib. 4. cap. 6. de tuenda sanitate, Gingiber ex Barbaria ad nos conuehi: quod tamen Dioscorides superiore libro, & Plinius libr. 12. cap. 7. à Troglodytis deferri, & in eorum regione nasci tradunt. Quinetiam reperio, glandem vnguentaria, quam Galenus ex Barbarica regione adferri scribit, Dioscoridem libro sequenti in Aethiopia, vbi est Troglodytica regio, & Plinium libro 12. cap. 21. Troglodytis nasci posteritatis memoria prodidisse. Ex quibus sanè liquido constare potest, Troglodyticam regionem, & Barbaricam antiquis vnā & eandem fuisse. Huc praterea accedit alia Plinij auctoritas, qui libro iam bis citato, cap. 19. vbi raritatis cinnamomi causam reddit, id accidisse scribit, incensis syluis Barbarorum in Arabia cum ipso inibi teste, oriatur cinnamomum in Aethiopia Troglodytis connubio permista, non alias vtiq; gentes Barbaras appellasse credimus, quā Troglodytas. Quamobrem & myrrham Troglodyticam appellauit Barbaram cap. 16. eiusdem voluminis. Nec ab re quidem Galeno, & Plinio Troglodyta Barbari speciatim dicuntur, cum scripserit Pomponius Mela grauisimus auctor libro primo de situ orbis, eos magis stridere, quā loqui, specus tantum subire, & ali serpentium caribus. Quae sanè omnia ita in mea me firmant opinione, vt certò credam, Rheum illud verè esse Barbaricum, quod ex Troglodytica asferatur regione. Sententiam nostram magis adhuc confirmare videtur Strabo, quòd libro 15. sua Geographia aperte testetur, ea omnia in aromatum, & plantarum genere oriri in Arabia, & Aethiopia, quae in India australi proueniunt, quòd haec regiones sola persimiles sunt. Non placet igitur, vt dicam liberè quod sentio, Fuchsij opinio ob praedictas auctoritates, tum etiam quoniam apud nullam vsquam legerim ex ea Africa parte, quae vulgò dicitur Barbaria, Rheum aliquod asferri, quod ibi prouenerit. Quin nec aliorum sententias comprobauerim, quoniam nec illud, quod à Barbari India

III. RHABARBARVM.

*IV. RHABARBARIRA.
dix.*

ciuitate, nec illud, quod à Barbaria Erythraei pelagi insula aduehitur, rectè Barbarum dici potest, cum ex India vtriusque petatur, & quod nullus extet auctor, qui à Barbari ciuitate Rhabarbarum scribat suam duxisse originem. Quare illegitimum esse Rhabarbarum mea demum firma sententia est, quod ex Troglodytica Aethiopia regione fuerit aduectum. Quod facile fortasse Veneti, qui quotannis in Alexandriam nauigant, seligere possent ab Indico: quod certò sciam, multa aromatum genera prater Indica eò ex Aethiopia, ex felici Arabia per Carouanas (vt vocant) comportari. Porro non solum in praescriptis locis Rhabarbaricum prouenit, sed etiam copiosissimum habetur in locis quibusdam, magno Regi Chan, Ca. 60 Ray Domino, subiectis. Regionis (vt illi vocant) Succuir, si Persis negotiatoribus, qui illuc vadunt, est adhibenda fides. Dicunt enim prouinciam hanc adeò Rhabarbaro abundare, vt inde per vniuersum deferatur orbem. Optimum nasci aiunt non longè ab huiusce regionis Metropoli, quae SVCCVIR, quemadmodum plaga tota appellatur, quibusdam in montibus, ipsiq; eminentibus ac saxosis, vbi plurimi scaturiunt fontes, & syluae habentur diuersarū arborum generibus repleta. Terram aiunt ibi esse rubram, lutosamq; tum propter pluuias multas, tum etiam propter fontium riuulos, qui locum irrigant, & madefaciunt. In his itaq; montibus Rhabarbarū prouenit (vt illi narrāt) caule ab radice breui, sed crasso, haud spithame longiore, è quo circūquaq; folia copiosa proueniunt, binū dodrantū longitudine, ex angusta origine in latū desinentia, & deorsum spectantia, vt ex appicta hic imagine apparet. Serrata illi folia nō sunt, sed lanugine quadā pilosa circūquaq; obducta. Haec dū adolescūt, viridia sunt, atq; cōsenescētia lutea fiunt, & in humū concidunt: è medio foliorū stipatu cauliculus sine

Rhabarbari
historia.

gerunt ex crassiori caule prodit, in cuius summitate flores exeunt purpureis violis haud valde dissimiles, colore ceruleo subalbato, odore acuto simul & graui, adeo, vt olfactu displiceat. Radices bipalmare longitudine superant, colore exterius ex rufo nigricante, verum non omnibus plantis aequalis habetur radicis crassitudo. Nam alia crassiores, alia tenuiores, vt in ceteris etiam plantis plerumq; fit. Veruntamen, quae ad summam crassitudinem adoleuerunt, humani cruris molem aequare solent: fibrae vbiq; radix referta est, quibus in humum desixis, alimentum capefit. Internam pulpa aureo colore nitet, rubrus quam plantam intercutantibus venis. Succo madet copioso tum croceo, tum purpureo, qui suo lentore facile manus implicat, & colore inficit, dum radices repurgantur, & secantur in partes: nam simulac fuerint effossa, rizo tomis eas repurgant, & secant. Ceterum haud statim a sectione traiectas filo suspendunt, ne succus guttatim stillans deperdat. Quare ieriatim particulas super asseribus collocant, vertuntq;, ac inuertunt, quotidie pluries: hoc enim modo incrassatus succus non deperditur, sed in sua seruetur radice. Quatriduo deinde transacto, particulas summo traieciunt, & suspendunt in vmbra, locus aperto, quo tamen solus radij accedere nequeant. Siccantur enim hoc modo ventorum flatibus, in libero aere, duorum mensium spatio, & deinde negotiatoribus venduntur. Effodiuntur radices ineunte vere, in ipsa prima foliorum germinatione. Vbi autem adfate radices eruta fuerint, foliosa existente planta, tanquam euanida crocco illo succo carent, quo fit, vt viribus infirmioribus habeantur. Recentes videntur vili admodum pretio: siquidem plenus currus tribus, aut quatuor argenti drachmis emittitur. Quamobrem, nisi plurimi accederent negotiatores, qui Rhabarbarum peterent, illud haud vnquam incola effoderent in proprium medicamentorum usum. Sunt qui putent nusquam, praeterquam in hac regione, nasci Rhabarbarum, quod India, & qui Chinam inhabitant Regionem, eo illud emptum accedant. Sed an id verum sit, cur comprobem non habeo, praeterquam cum Rhabarbarum, quod Alexandriam Aegypti comportatur, non solum ex India, sed ex Aethiopia, & alia fortasse Aethiopia plaga deferatur. Ceterum q; in locis, qui circa Cataium sunt, haud vnquam Rhabarbaro in medicamentum videntur, sed tantum ad sua stultitia Idola, suis thymiamatis admiscet. Recens adeo amarum esse aiunt, vt vix degulari possit. Ceterum antequam de Rhabarbari viribus agamus, illud in primis ignorandum non est, quod falsa, ac vana sit vulgatum, & aliorum quorumlibet opinio, qui sibi firmiter persuadent, Rhabarbarum violentum admodum esse medicamentum, & quod propterea a medicis non exhibeatur, nisi in deploratis serè morborum affectibus. Siquidem (vt inferius clarissime patebit) illud haud dubie tutè & pueris, & vtero gerentibus mulieribus omni tempore, & aetate exhiberi potest. At qui in eiusmodi hominum mentibus inualuit hac inanis opinio: quoniam elapsis temporibus tanta Barbarica huius radicis extitit penuria, (aquali enim cum auro pondere vendebatur) vt ad pretij magnitudinem euitandam, eam tunc non dedissent medici, nisi vbi morbos vel mortis periculo, vel diuturnis Linguoribus non vacare, certis signis coniecissent. Quo factum fuit, vt passim hac reprobanda opinione ducerentur homines ad credendum, quod in morbis curandis valentissimum, & violentissimum omnium medicamentorum esset Rhabarbarum. Huius vires ceteris diligentius, latiusq; descripsit Mesuesius inquitens: Rhabarbarum innocens, clemens, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purgante maxime expetitas complexum. Praecellit in omni genere Indicum, quod recens fit, colore subnigro rufescente, ponderosum, quamuis sua substantia rarum, & quod cum frangitur, rufo, & glauco colore alternante spectatur: item quod mansum croceo inficit colore. Adulteratur autem, quod omnino te animaduertere cautiùs oportet, hoc modo. Accipiunt impostores Rhabarbari multum, totumq;, aqua macerant quinque diebus, exemptum deinde siccant, subtractaq; vi, & quasi animam vendunt. Aquam verò, qua maduit, igne, vel sole similiter siccant, & in pastillos conformant ad regales vsus. Frus cognoscitur, quod syncerum non vehementer adstringat, substantia rarius sit, & colore croceo inficiat. Adulteratum verò contra se habet. Nam coloris interni varietatem amisit, & subnigricat. Calefacit, ac siccatur secundo ordine, etsi nonnulli primo tantum dicant. Constat tum aqueis, tum terreis qualitatibus, quae adstringentem ei facultatem tribuunt, & eius substantiam conseruant. Est & aereis raritatem substantiae conferentibus particeps. Nec igneis quidem expers est, a quibus amaritudinem, concurrētibus etiam terreis qualitatibus, acquirit. Ac ipsa terrestris qualitas in imo delitescit: ignea verò in sublimi fertur: quo fit, vt eius diuidantur qualitates cum aqua, aut vino perfunditur. Operatur autem in obstructionum affectibus igneis tantum facultatibus: terreis verò, vbi adstrictione sit opus. Omni penitus noxa vacat, daturq; omni tempore, & aetate, adeo vt pueris aetate tenellis, & praegnantibus facile exhiberi possit. Auget Rhabarbari vires caprinum serum, vel si maceretur intubi, vel apij, aut plantaginis decocto. Nulli memori excidat quin semper Indicae nardi tantillum ipsi commisceatur, cum maximopere conferat. Addendum etiam semper erit vini albi odorati modicum, praesertimq; vbi ad obstructiones referandas paratur: illud praeterea memoria retinendum est, quod scilicet in adulterato nulla deiectionaria reperitur facultas. Synceri macerati expressio probe conuenit, vbi tantum abstersione, ac infarctus liberatione sit opus. Quod si post haec functiones, viscera adstrictione roborante eguerint, ipsum quidem in puluerem contritum exhibendum fuerit. At illud quod igne torrefcit, vehementer operatur, ac vehementius comburitur. Purum, selectum, ac substantia compactum, abstersione facile euanescit, ac deperditur. Resoluitur item eius vis, cum aqua, vel vino decoquitur. Deicit Rhabarbarum non modo bilem, sed etiam pituitam ipsam. Eiq; propria facultas inest cum abstergendi, tum etiam roborandi tam ventriculum, quam iecur, & eorum compunctiones amouendi. Clarificat Rhabarbarum sanguinem, obstructiones aperit, ac omnes pariter affectus sanat, quos generant obstructiones: nempe aquam intercutem, regium morbum, lienis crassitatem, ac diuturnas febres. Sanguinem reijcientibus, ac eius a qualibet parte manationibus, qualitate ac facultate substantiae prodest. Datur etiam ab alto deuolutis, ruptis, & tam internè, quam externè fractis maximo iuuamento, praesertimq; si vino austero drachma pondere commisceatur, addito syncerae mumiæ momento, ac etiam erythrodani radicis tantundem. Singultientibus opitulatur, dysenteriam cohibet, praesertim quod igne sit torrefactum, addito tamen adstringente vino, & plantaginis succo. Vindicatur a carie, & teredine annis tribus, vel quatuor. Verum si cera oblinatur, vel in melle reponatur, vel psyllij semine, vel milio sepeliatur, diutius integrum, & syncerum seruari poterit. Est & aliud Rhabarbarum, imò potius pseudo Rhabarbarum, quod quidam Monachorum Rhabarbarum vocant. Verum huic genuini Rhabarbari vires non sunt. Est enim (vt mea fert opinio) genuinum Diosc. Hippolapathum, vt superius suo loco latius explicauimus. Non desunt tamen qui huius decoctum, aut dilutum ad exoluendum aluum propinent, sed quo id fiat successu ipsi dicant. Praestat tamen radix contra ex vino albo meraco pota ad expediendos obstructos renes, & ad calculum pellendum: quin etiam diebus quadraginta pota contra canis rabidi morsum, ac etiam simul vulnere illita. Radix, quae pa, & fñor Graecis: Raponticum Latinis appellatur. Arabibus, Raued, seu Rauend: Italis, Rbapontico. At Rhabarbarum, Italis Reobarbaro.

Opinio falsa eorum qui Rhabarbarum violentum dicunt.

Rhabarbari vires ex Mes. Adulterarum Rhabarbarum noscendum.

Vires Rhabarbari vt augenda.

Pseudorhabarbarum.

Nomina.

Rha siue Rheum antiquorum, quod Rhaponticum Latini vocant, ex Rumicis seu Lapathi genere esse volunt, eo quod Hesiodi commentator Lapathi radicem Rheum appellari scribat. Cum quo aliqui
 Si idem

idem statuunt ipsum Rhabarbarum, secuti Arabes: vt qui Rhapontico vim purgatricem tribuant, quæ & Rhabarbaro inest: hoc si sit, tum officinarum Rhaponticum, tanquam facultate hac carens, adiuuandum erit: quare non desunt, qui Centaurij maioris radicem, quæ crassior, multoq; maior est, pro Rhapontico, quæ minor & tenuior, exhibeât. Sic Cordus Rhabarbarum nostrum idem genere cum Dioscoridis Rhabarbaro voluit, quod tantum loco differat. Alij verò Rhabarbarum à Rhapontico diuersum statuunt: & sanè videtur Dioscorides suo Rha non Rhabarbarum officinarum, cuius Mesues meminit, sed Rhaponticam, cuius iconem adiecimus, intelligere. Ast de his in historia. I. Rhaponticum folio Helenij (necnon C.B. Rha, Rhecoma, & Rhacoma Plinij, Dodo. gal. Rhaponticum (nil aliud quam Rhabarbari speciem) Lacu. Cast. Rha, Dodo. fol. Rha capitatum folio Enulæ centaurei maioris facie, Lob. Rha capitatum Helenij folio, Lugd. Rheum antiquis appellatum, ex Lapathi genere videtur, Cæsal. Rhaponticum quatuor, Taber. II. Rha & Rheum Dioscoridis, C. B. Ponticum Rha antiquorum, Aduer. Rhaponticum antiquorum, Lob. icon. Rhaponticum verum officinarum Taber. III. Rhabarbarum à Matthiolo pictum quem imitatus est Tabernæmontanus, hæcenus non vidimus: meminit & Alpinus libro de plantis Ægyptiacis, Rhabarbari quod folijs sit Rumicis latioribus, crassioribus, lanugine alba obsitis. IV. Adiecimus figurâ radicis cuius vltus est, quod Rhabar. nomine Lob. in icon. suis & sub Rhabarbaro 3. Tab. propolat.

GENTIANA.

GENTIANA.

CAP. III.

Gentianæ inuentio prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomen habuit. Folijs partim proximè radicem, iuglandi, plantaginiue similibus, subrubris: partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis, caule cauo, & læui, digiti crassitudine, geniculato, & ex internodijs maioribus foliato, binum cubitorum altitudine: semine in calicibus lato, læui, glutinoso, lato ad sphenodilij semè accedente: radice longè aristolochiæ, longa, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montu iugis, vmbrosis locis, aquosisq;: Vis radicis excafactoria, & adstringens: cõtra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: hepaticis, & stomachicis, pota cū aqua subuenit radix collyrii modo subdita, partus eijcit: imposta, vt lycium: vulneraria est, & vlcærum cuniculatum de palcentium medela. Succus præcipue eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs acris immiscetur. Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ratio hæc est. Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & vbi reflux aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, & stiliq; reconditur.

I. GENTIANA MAIOR.


II. *GENTIANA MAIOR,
Purpurea.*

Gentianæ cõsideratio.

Gentianæ vices ex Gal.

Gentiana planta est vulgaris notitia, trium est generum: maior, minor, minima. Maior frequentissima excelsis Tridentinis montibus prouenit, præsertimq; in Ananys, eorundem montium pratis ac pascuis, in quorum cacuminibus sapor eius effodi radices brachiali crassitudine, & bicubitali longitudine. Hanc a Gentio illyriorum rege inuentam, vnde id nomen, non modo Diosc. sed aliorum etiam veterum monumenta testantur. Plinio li. 25. ca. 7. ea est omnium præstantissima, que in Illyrico nascitur, vbi fortasse primum inuenta est. Gentiana vires paucis admodum perstrinxit Gal. li. 6. simpl. medic. sic inquit: Herba Gentianæ radix valde efficax est, vbi extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionu liberatio: neque opus sit: neque mirum.

III. GENTIANA MINOR. IV. GENTIANA MINIMA.



mirū, si hac possit, cum impense sit amara. Hac (vt Auicenna ait) excalescit ordine tertio, siccatur secundo: Vrinam, & men-
 fo ciet, & aduersus scorpionum ictus ceteris antidotis prestat. Eius aqua, praesertim qua vase duplici balnei vapore vitreis
 organū elicitur, febres (vt ego sapius expertus sum) ab infarctu tum viscerum, tum vasorum excitatas, mirifice pellit. Alui
 tinas necat, maculasq; in facie qualescunque detergit, si ea frequentius macula abluantur. Est praeterea quaedam vulgaris
 etiam planta, aliquibus CRUCIATA dicta, qua non paruam cum Gentiana cognationem habere videtur: quandoquidem
 & noris, & facultatibus illi plurimum respondeat. Vnde eos non longè aberrare crediderim, qui hanc Gentianam mino-
 rem appellauerint. Hac in incultis praecipue locis nascitur, secus itinera in montibus, caule rotundo, dodrantali, ac et-
 iam maiore, in cacumine rufescente, paribus ferè interuallis ab imo ad summum geniculus intersecto: è quorum
 40 singulis alis bina prodeunt folia subpinguia, longa, vulgaris dicta Saponaria amula, & Gentiana foliolis in sum-
 mitate erumpentibus similia. Flores, qui purpureo colore nitent, in summo circum caulem in orbem exeunt. Radix illi al-
 ba, longa, amarissimo gustu, locis pluribus ab utroque latere crucis instar perforata: vnde illi Cruciatæ nomen indiderunt.
 Sunt etiam in hoc genere dua alia planta: sed minor radicibus prouenit numerosis, tenuibus, albicantibus, perquam ama-
 50 ris, caulibus lentis, humi plerunq; accubantibus: floribus ex caeruleo purpurascens, cruciatæ maioribus: & predicta radi-
 ces recentioribus magnis laudibus effertur contra pestilentiam, & venenosorum animalium ictus in antidotis addita.
 Ceterum ego quidem illud experientia compertum habeo, quod radice rufa, & ventri emplastri modo imposta, vermes te-
 60 reter qui in intestinis fuerint, proculdubio necantur: & vlcera & struma sanantur, si ijs eodè modo contusa, qua nuper effo-
 sa sit, vel sicca, & in puluerem contrita adhibeatur: cum melle autem illitus, cutis vitia quacunq; & maculas abstergit. In
 summa non desunt, qui asserant, has ea omnia prestare posse, qua Gentiana, quod ex predictis facile probari potest. Ana-
 70 niasa rura hoc genus vltimum vulgò vocant PETTIMBORSA. Ex quo quis conijciat, si lubet, hanc illis indigenis, corru-
 pta Italica voce Metti in borsa, ideo Pettimborsa nominari, quod tot viribus commendetur, vt perinde ac gemma, crume-
 nis asseruari mereatur: aut quod tantum viribus excellat, vt medici ea vtentes ingentem argenti, & auri copiam crumenis
 sint reposituri. Nascitur in collibus, locis incultis, & in campestribus. TERTIARVM planta sic Græcis, Gentiana similiter Lati-
 nu vocatur: Mauritanis, Gentiana, Genthiana basilica, seu Basateca: Italis Gentiana: Germanis, ENSIANTWURK: Hispanis,
 80 Gentiana: Gallis, Gentiane, Bohemis Horec: Polonis Gonyczka. Gentiana minor, Græcis Τριτάρη μικρά sive Σαυπόριτος:
 Italis Gentiana minore: Officinis, Cruciatæ, Germanis, Kreuzwurz, Sperenstich/oder Madelgeer. Gentiana minima, I.
 talis Gentianella & Pettimborsa, Germanis Lungenblum.

Aque gētia-
 næ facultas
 Matthiolo.
 Cruciatæ cō-
 sideratio.
 Cruciatæ vi-
 res Matth.
 Pettimborsa,
 Metti in bor-
 sa.
 Nomina.

Gentiana duplex est, alia radice perenni, alia fugaci: vtraq; plures differentias obtinet. Illa licet singulis
 annis flores seminaq; proferat, non tamen interit, sed subsequenti anno ex eadem radice germina pro-
 90 tudichæc verò semine disperso hyeme interit, & ex semine renascitur. Et si octodecim differentias nota-
 verimus, hic tamē de quinq; differentijs erit sermo. I. Gentiana maior lutea. C.B. Gentiana, Brunf. Cor. in
 Diosc. & hist. Fuch. Dod. gal. & fol. Ges. hor. Lac. Lonic. Cæsal. Lugd. Gentiana maior, Matth. Ges. hor. app.
 Lob. Cast. Gentiana maior flore luteo, Cam. Gentianæ prima species: Trago. Aloë gallica, Apuleio. Hæc
 communiter flore est luteo: est & pallido punctis distincto sic & caeruleo flore. II. Gentiana maior purpu-
 rea, C.B. Ex radice duos pedes longa, aliquando brachiali crassitudine, in summo diuisa caules, aliquando
 terni, quaterni, quini, & etiam seni prodeunt, quos cingunt folia vulgaribus amula, sed acuminatiora,
 flores gerit puniceos seu purpureos, rarius albos: in reliquis cum priori conuenit, vt & loco natali: vehe-
 100 mentius tamen priore purgare creditur. Dicitur Gentiana punicea, Ges. in Fracto. Gentiana maior alia, Cam.
 purpureo & prima, Cluf. hist. Pann. Gentiana purpureis floribus, Lob. in obs. Gentiana maior alia, Cam.
 Sf 2 ad Matth.

ad Matth. III. Gentiana cruciata, C.B. & Gef. hor. Herba fullonum, Brunf. Cruciata, Trag. Fuch. (cui & Gentianæ species) Gef. hor. Dod. gal. (cui & Chiliodynamis) & fol. Lac. Lon. Lug. Gentiana minor, Matth. Cast. Lob. Taber. Gentiana tertia, Clus. hist. Pann. Gentiana media, Cam. Cruciata Gentianella, Thal. Vincetoxicum alterum, Casalp. Variat hæc quod altera sit procumbens & minor: altera erecta & maior: flores alterius magis cærulei: & illarum altera radicibus non perforatis, ita ut tres huius differentias constituere liceat. Subiungit huic Matthiolus duas adhuc species: maiorem & minorem, illam pingit, hæc v. describit, vtraque eodem tempore reperitur, maior quidem in humidis pratis, at minor in ericetis & montosis locis. IV. Gentiana palustris, C.B. Gentiana minima, Matth. Cast. quoad descriptionem, non iconem. Calathiana viola in pratis vdis, Dod. gal. Calathiana viola autumnalis prima, Gef. hor. Viola Calathiana secunda, Thal. Cruciata siue Gentiana minima Lugd. Campanula pratensis eidem. Gentiana angustifolia vel quarta, Clus. hist. Pann. Pneumonanthe humentibus ericetis proueniens, Lob. Pneumonanthe, Taber. Hæc variat colore floris cæruleo, violaceo, purpureo. V. Gentiana angustifolia autumnalis, C.B. Gentiana minor, Matth. quoad descriptionem. Pneumonanthe, Cord. in hist. quoad descriptionem, Lob. Pulmonis flosculi, Gef. hort. Calathiana viola autumnalis minor, Gef. hort. Calathiana viola, Dod. in 8. Lug. Viola Calathiana siue autumnalis, Thal. Campanula autumnalis, Dodonæo folio. Gentiana angustifolia secunda, Clus. hist. Pann. Flore est cæruleo dilutiore: est & nigro, rarius albo.

Ἀριστολόχεια.

ARISTOLOCHIA


CAP. IV.

Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optime puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ fœmina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab vna radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pili similitudine, in quibus quod rubrum est, grauius olet. Longa mascula appellatur, nonnullis dactylis longiora quam rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauius olente. qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotundæ in orbem conglobata, rari modo: longæ verò digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem. a Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiam nū tertia longa, quæ Clematidis vocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minori semper uiuo similibus: flores rutæ: radices b longiores, tenues, crasso cortice, odoratoq; vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda catens venenis resistit. Longa verò aduersus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur, & illinitur. Pota cum pipere, & myrrha menses, partus, & omnia vuluarum onera eijcit: eadem efficit subdita in peluso. Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos & spicula extrahit: osium squamas illitu adimit: lacerata putrida exest, & sordida expurgat: cana cum iri, & melle explet: gingiuas, & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur: viribus tamen inferior est.

a Car. & Meū
μικρότερα δὲ
τὰ πολλά πύ-
ξοειδὲς ἐνδο-
θεν. i. ambæ
autē plerunq;
buxæo intus
sunt colore.
b Orib. μα-
κροτάτας. i.
longissimas.

I. ARISTOLOCHIA LONGA.

II. *ARISTOLOCHIA longa vera.*



Aristolochia contid.

Aristolochia, quam officina Aristologiam vocant, tria statuuntur genera, nempe rotunda, longa, & clematidis. Hæc vtra admodum, & paucis nota: illa verò omnibus ferè rei herbarie studiosis notissima. Quæ rotunda vocatur, etsi non vbiq; in Italia proueniat, tamē in Apulia mōte Gargano & agro Goritienfi plurima, pulcherrimæq; nascitur præstanti odore.


Longa

Longa vera provenit in Italia: sed tantum in Apulia & Calabria. Vtraque flores edit in toto ferè caule, oblongos, & ex parvo capitulo in auricula modum desinentes, graueolentes, subluteo colore, & internè quadantenus ex atro purpurascen- tes, e quibus oriuntur fructus, qui in longa pyri imaginem referunt, suntq; iuglandibus longè maiores: in rotunda verò ro- tundores, paulòq; minores spectantur. Qua in re nō potui non maxime Pliniū admirari, quod lib. 25. c. 8. vtrāq; ferre baccu Plini; & Leo- niceni lapsus. quā ad summū adoleuissent. Sed certè in eodē loco excusari, meo iudicio, nō potest, quin manifestè hallucinatus, & Græci sermōnis non admodum peritus deprehendatur, cum Aristolochia nomen dedisse grauidas tradat. Quandoquidem non ab vtero gerentibus mulieribus, sed à puerperis Aristolochia (vt Dioscorides scribit) id nominis sibi comparauit. Cuius rei non modo iudicium præbet nomen ipsum ἀριστολογία, quod ni aliud denotat, quàm optima puerperis, non (vt Plinius inquit) grauidis: sed etiam ipsius facultas, quæ ad remorantes à partu secundas, mensesq; citendos magnopere commendatur. Qua- propter fuerit hæc pregnantibus proculdubio exitiale potius, quàm salubre medicamentum, cum ea sanè omnia, quæ secun- dus, & menses educunt, factum etiam trahant, & quandoque interficiant, præsertim cum fuerint amara Aristolochia mo- do. Nec minus præterea Leoniceum virum alioqui nostra ætatis doctissimum, satis admirari possum, quod dum nimio for- tasse aliorum errata corrigendi studio, vel auditu te ductus, de cyclamino, & Aristolochys Plinium accusat, in eandem, in qua Plinius foueam ceciderit, asserens cum Plinio Aristolochiam à pregnantibus sibi nomen adinuenisse. Quod ne sine au- dore pronunciaffe videretur, Dioscoridem quidem adducit, sed eius historiam, quantum equidem sentio, corrumpit, ac per- uertit. Sunt è recentioribus Cordus, Adamus Lonicerus, & monachi illi, qui in Mesuem commentaria edidit, qui sibi certò persuadent, eam esse Dioscoridi Aristolochiam clematitim, quæ officinis omnibus passim longa cognominatur: argu- mento, quod hæc radices proferat admodum longas: & sarmentorum modo prætenuas. Quin & vt suam tueantur, ac ma- gno roborent sententiam, hoc in loco Dioscoridis codicem omnino deprauatum esse contendunt: & vbi vulgata lectio habet, κλωνία ἔχει ἀλεπία, φύλλοις ἑπὶ στρογγύλοις, ἀειζῶν μικρῶν ἐοικῶσι, hoc est ad verbum, ramulos habens tenues, folijs sub- rotundis, semperviuo paruo similibus: non ἀειζῶν μικρῶν, sed ἀσάρων μικρῶν, quod asaro paruo similia sint folia, legendum esse censent. Horum sanè sententiam nunquam probare potui, neque probandam arbitror, pluribus cum rationibus, tum au- doriatibus adductis: quandoquidem Oribasij lectio aliter non habet, quàm communis hæc Dioscoridis, nec aliter legunt Serapio, & Auicenna. Id quod manifestè ostendit, hoc in loco Dioscoridi nullam subesse mendam. Adde, quod cum vnum tantum Dioscoridi sit asarum, nec minori asari is vsquam, quod legatur, meminerit, absurdum sanè videretur, quod mino- ri asaro Aristolochiam clematitim comparasset. Accedit & alia ratio, quod cum vulgaris Aristolochia longa ratæ flores non edat, & folia Asari longè maiora, clematidis esse non potest. Præterea si Dioscoridis lectionem accuratius perpendimus, nil aliud esse videtur longa officinarum, quàm longa Dioscoridis: aut fortasse eius species, cuius nulla, quod extet, ab antiquis facta sit mentio. Quippe quod proferat hæc folia longiora, latioraq; quàm rotunda: ramulos dodrantales: florem grauiter olentem, qui fructum edat pyri modo turbinatum. Nam quod fructum ferat clematidis non scribit Dioscorides: nec folia lon- ga, lataq; vulgaris habet Aristolochia, sed subrotunda, & minori semperviuo similia. At si contra dixerit quispiam, longam vulgarem Dioscoridis longam non esse, quoniam flos illi purpureus non fit, sed melinus, & radix non palmaris, nec digiti crassitudine, sed longior admodum, & longè tenuior. Huic facile responderi poterit, id locorum regionumq; varietate eue- nire posse, & quod natura cum florum coloribus in quàm plurimis ludat: quodq; vidimus etiam nos Aristolochia longa plantam à Calabria allatam, radice (vt in theriacis scribit Nicander) cubitali longitudine, pollicari crassitudine: cui folia erant, quæ à nostrate longa nullo discrimine differebant. At hæc Clamatidis radix Dioscoridi, & Plinio crasso contegitur

Leoniceus arguitur cir- ca nomen A- ristol. Opinio quo- rundā repro- bata.

III. ARISTOLOCHIA longa.

IV. ARISTO. PISTO- lochia,



Aristolochia clematidis

33 3 cortice:

- cortice: quod tamen in longa officinarum, nostratēq; non visitur, cum tenui cortice perpetuo vestiatur, odore potius grati-
quam odorato. Quamobrem inclinare nunquam potuit animus, ut crederem, Aristolochiam longam, cuius hic effigiem
Pistolochia pinximus, esse clematitim. Sed potius eo deductus sum, ut suspicarer hanc fortasse esse Pistolochiam sic Plinio vocatam, quod
& ipsa puerperis commendetur. Nam praterquam quod hac illi quarto Aristolochia generi assignetur, tenuior est, quam
clematitis, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Illud mihi suspicionem auxit, quod viderim etiam pro-
ter hanc aliam, qua radice palmari, & crassitudine digitali constabat: sed in omnibus alijs partibus alteri adeo persimili,
ut nullam inter eas intercedere differentiam compererim. Sunt praterea recentiorum quidam rei herbaria & studiosi, &
Alia opinio refutata. periti, quibus persuasum est, non tamen sine aliqua ratione, quod Aristolochia longa prater clematitim duo habeat gen-
ra: quarum altera sit radice (ut Dioscorides inquit) digiti crassitudine, & dodrantis longitudine: altera vero tenui ac lon-
giore, qua (ut aiunt) ab Andromacho & Gal. lib. 1. de antidotis ἀριστολόχια λεπτή, hoc est Aristolochia tenuis appellatur: cuius
quin & hanc affirmant eam longam esse, cuius hic imaginem exhibuimus, cuiusq; passim est vsus. Quo fit, ut pro certo ex-
istiment hanc esse eam Aristolochiam, qua in Andromachi theriacam addi debeat, Andromachi iunioris, & Democriti
testimonio innixi, quod in theriaces compositione huiusce tenuis tantum meminerint. Id quod (ut diuunt) pra se ferre vi-
detur, alterum etiamnum ipsius Aristolochiae longa genus esse prater clematitim, radice constans tenuiore ac longiore. Hoc
autem comprobatum fuisse putant a Galeno lib. ante citato, ubi docens quomodo nonnulla, qua ab Andromacho seniori
obscurē tradita sunt, explicari debeant, ita scribit: Si quid adhuc aliud superest, quod minus dilucide sit ab Andromacho
seniori elegiacis versibus dictum, planum fiet theriacam legentibus ab eius folio soluta oratione descriptam. Quod enim ille
Cecropium mel obscurius appellat, id Atticum aperte nominat. Cetaurium ille nulla adhibita distinctione in carmine pro-
nunciat, hic vero in prosa tenue apponit, eod quod aliud quoq; centauryum extet crassum appellatum. Idem & in aristolo-
Aristolochia triplex Gal. chia fecit, cum prater tenuem aristolochiam, alia quoq; reperitur, qua crassam radicem habeat, & rursus tertia, qua ro-
tundam: haecenus Galenus. Quibus nimirum verbis illi credunt suam satis firmasse sententiam. Sed ego quidem aliter sen-
Aristolochia tenuis est cle- tio, ut qui putem, Aristolochiam tenuem non aliud Andromacho & Galeno fuisse, quam clematitim cognominatam. Ex-
matitis. enim ut omittam, quod Dioscorides & Galenus non plura, quantum inuenerim, quam tria Aristolochia genera com-
memorant, nempe rotundam, longam, & clematitim: clematitim priuatim a Dioscoride Aristolochia longa subscribitur, &
quod immo eius species constituitur, ramulis tenuibus, radicibus etiam tenuibus ac longioribus. Ut hinc facile nobis liceat
conijcere, Andromachum & Galenum non aliud suprascripto loco per tenuem Aristolochiam intellexisse, quam clematitim.
Adde quod si ad omnium qualitates, & facultates spectes, sanē clematitis dignior est, qua in theriacam recipitur. Haec enim
radicem habet, Dioscoride teste, cortice odorato vestitam, unguentorum spissamentis conuenientem. Plinius deinde lib.
25. cap. 8. clematitim ceteris praeulit ijs verbis: Tertium longissima tenuitatis, vitis nouella, cui sit praecipua vis, qua clema-
titis vocatur, ab alijs Cretica. Et paulo post idem ait: Odor omnium medicatus, sed oblonga radice tenuioriq; gratior: haec
le. Quibus utiq; ad stipulari videtur etiam Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, ubi de Aristolochiarum vrbibus
differuit, ut infra patebit in earum commentatione. Quare non est, meo quidem iudicio, asserendum, quod Aristolochia
Aristolochia tenuis Galeni quartum ge- nus non est. λεπτή Andromacho & Galeno sit aliquod quartum Aristolochiae genus ita vocatum: quandoquidem λεπτή hic nullum so-
cit per se genus: neq; solum tenuem indicat, sed etiam minorem: atq; certē in longarum genere huiusmodi est clematitim.
Ceterum si Aristolochia Graecis λεπτή nominata, esset aliud genus per se, necessario statuendum foret esse tertium quoque
centaurij genus prater magnum & minus, quod peculiariter Graecis λεπτόν vocatur. Sed hoc dupliciter falsum esse conui-
citur. Primo quod apud Dioscoridem, Galenum, aliosq; antiquiores, qui de plantarum historia ac viribus scripserunt, non
quam plura, quod equidem legerim, quam duo centaurij genera scripta reperiantur, scilicet maius & minus. Secundo quod
constet, Plinio lib. 25. cap. 6. centaurium cognomine leptum nullum per se genus esse, sed ea appellatione illud tantum cen-
taurium describi, quod a Dioscoride & Galeno minus appellatur: quinetiam idem de huius cetaurij viribus ea omnia tra-
didit, qua illi centaurio minori reddiderunt. Sed quid tot verbis opus erat, quibus nostram tueremur, & aliorum resellere-
mus sententiam? cum huic difficultati satis ferē facere possint verba ipsius Dioscoridis, quib. Aristolochiae clematitidis radices
expresit in hunc modum: ἰσχυρὰς μακροτάτας (μακροτάτας, quod est, longissimas legit Oribasius) λεπταί. id est, radices
longiores, tenues. Ut vel ex hū intelligi possit, haud absurdum esse, quod aliquis Aristolochiam clematitim etiam tenuem
nominet, quemadmodum ab Andromacho seniori, & iuniori vocatam fuisse existimamus. Ex his itaq; omnibus collige-
dam esse arbitror, quod Aristolochia tenuis dicta ab Andromacho, non sit genus distinctum ab alijs, sed eadem cum clema-
titide & q; sub Aristolochia tenuis nomine clematitim intellexerint Androma. & Gal. Erit igitur, mea quidem sententia, A-
ristolochia clematitis, ut pote tenuior, odorator, & praestantior, in theriaca compos. addenda: non autē illa longa, qua hic depi-
ctā dedimus. Qua tamē a nobis, forte rectius, Plinij Pistolochia cēsetur, ut supra dictū est: aut certē aliud Aristolochiae genus
veteribus incognitum. Verantamen Fuchsi. suis de plan. hist. commentarijs, aliam plantam Pistolochiam posuit: qua tamen
Fuch. opinio reiecta in Pi- (eius pace dixerim) a Plinij Pistolochia prorsus abhorret. Est enim Pistolochia Fuchsi mollis in vniuersum planta, qua ve-
ro primo vnā cum Chelidonio exoritur, & Maio, vel ad summum Iunio contabescit. Crescit haec tenellis, subalbidisq; folijs
stolochia. coriandro, vel ranunculo primi generis proximis: radice tuberosa, inferiori parte sessili, superiori vero monticuli instar elata,
intus vbiq; concava, nigro exterius cortice, buxæ interiori pulpa, odore Aristolochiae, & gustu amara. Quapropter Ger-
manis haec, quod vera Aristolochia rotunda sint destituti, eius vicem infeliciter explet. Non tamen ob id censendum est hanc
esse Pistolochiam, qua a Plinio describitur. Siquidē haec illi tuberosa, & inani radice non constat: sed clematitide tenuior est,
densis (ut dictum est) radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Sed rectius, veriusq; quantum equidem sentio, huius
Fumaria al- tera Plinij. possit, hanc plantam esse Plinio fumaria alterum genus, quod ab eo li. 25. ca. 13. ijs depingitur verbis: Alia est Capnos fruticosa,
pratenera, folijs coriandri, cineracei coloris, flore purpureo: nascitur in hortis, & segetib. De hac etiā Aetium locutum fu-
isse existimauerim lib. 10. cap. 11. in curatione obstructi iecinoris, ubi chelidony Capni meminit, eo quod (ut diximus) vnā
cum chelidonio primum erumpat hirundinum aduentu, ut li. 4. latius differemus, ubi cōsulto fumariae historia tractabitur.
Porro q; huius plantae radix Aristolochiae rotunda vicē supplere possit, atq; in huius penuria illa vti liceat, adnotatū reliquit
Fuch in li. de cōpon. medic. quē nuper locupletatū edidit, in theriaca diatessarō. Attamē si Gal. sequi volumus, pro Aristolo-
chia rotunda longā substituemus. Aristolochiae genera memoria prodidit Gal. li. 6. simp. med. ubi eorū vires explicauit q; ver-
Aristolochiae vires ex Gal. bic: Aristolochiae radix ad medicationes vtilissima est amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda, ad omnia
efficacior. Aliarū verō duarū, qua Clematitis appellatur, fragrantior est. Itaq; ea ad vnguentā vti vti vnguentarii: sed ad san-
tiones infirmior. At longa minus quidē tenuitatis obtinet, quam rotunda, sed nec ipsa inefficax est: verū abstergēdi, atq; excal-
faciēdi potentia possidet, minus quidē quam rotunda abstergit, ac digerit, sed nō minus calfacit, imō forsā plus quoq; itaq;
quibus vsus est modica absterfionis, cōmodior est longa, puta in carniū exulcerationib. & fomentationib. vtri. ac in quibus
atq;

officium humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotunda. Proinde dolores ab infarctu, aut crassitie crudorum...

Vires et Me- sue. Nomina.

Aristolochiam a muliere inuentam scripsisse Arist. Nicandri scholiastes tradit, siquidem partus dolorib. opiruletur. Hæc rotunda est, longa, clematitis, & pistolochia. I. Aristolochia rotunda flore ex purpureo...

Γλυκύριζα. DULCIS RADIX. CAP. V.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto. Fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: foliis lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis: flore hyacinthi: fructu pi-

a Meum πύρι- ρας μακρῆς. i. fuluas, lōgas. b Ca. πύριφοι- δ' ἴσ. i. fuluo colore. c Meum add. μεσὸν ἢ θερ- μὸν ἢ ψυχρὸν. i. medium au- tem inter ca- liditatem. Dulcis radi- cis confid.

Dulcis radix quam Græci Glycyrrhizam, & officina Græcum nomen corrumpentes, vel potius Barbaros secuta, Liquiritiam vocant, & Hetrusci vulgo Regolitia, planta est paucis non cognita. Sed reuera duum est generum. Namque...

Plinii lapsus aculeatam dicentis Gly- cyrrhizam.

I. GLYCYRRHIZA.

II. GLYCYRRHIZA ALTERA.



Scythica
Theoph.
Glycyrrhizæ
vires Matth.

Glycyrrhizæ
vires ex Gal.

Nomina.

in hoc errauerit. Nam huiuscemodi opinio adeo firmiter veritati coheret, vt facile ij quoq; deprehendi possint à veritate
desiscere, qui credant Glycyrrhizam olim spinis fuisse pradiam, sed mangonio longi cultus edomito rigore spinarum aculeos amississe, & tandem mitigatam esse: cum ea etiam, qua hoc euo sponte per se nascitur, nullibi aculeata spectetur. Dulcis
hac radix à Theoph. lib. 11. c. 13. Scythica appellatur, eo quod Scythæ hac contenti absq; alio aliment. presidio decem, duodecimq; dies degant. Nam (vt idem testatur) circa Meotim paludem plurima nascitur. Abstergit, mundat, leuigat, mulcet, dulcis radice humorum acrimoniam: quare ardoribus vrina mirifice auxiliatur. Mansa radix, & praesertim quæ recentis fuerit effossa, non solum sitim, sed etiam famem sedat, seruatq; vires diebus pluribus, idem facit concretus succus, in ore retentus, quousq; eliquescat. Pectus & pulmones iuuat, ideog; datur vtiliter suspensorios, phthisicis, tussientibus, & pleuriticis. Glycyrrhiza meminit Gal. lib. 6. simpl. med. sic inquit: Huius fruticis radicem succus in primis vtilis est, similiter vt cum radicibus dulcis, cum leui quadã adstrictione. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verum etiam vesica scabra, idq; temperatura mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostra temperatura: nam tale monstratum est esse id quod dulce est. Sed cum adstrictio quadam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum, quantum ex caliditate, & adstrictione est, tepida potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad symmetrum, siue temperatum. Porro quoniam temperie quoq; humidum est, quod modicè dulce est, iure sanè etiam sitim extinguens medicamentum est, nimirum modicè humidum simul & humana natura frigidius. Refert Diosc. radicem siccam ad laeuorem redactam, pterygiorum illitu idoneum esse remedium. Γλυκύριζα sic Græcis dicta, Latinis Glycyrrhiza, & Dulcis radix appellatur: Arabibus, Sus: Italis, Regolitia: Germanis, Licetrix, siue Suespholtz: Hispanis, Regaliza: Gallis, Reclisse, seu Reygalisse. Bohemis, Lekorice: Polonis, Lachrycyca.

Glycyrrhiza duplex habetur & quidem vtraq; fructifera, altera quidem fructu aspero, ex plurimis siliquis cõglobatis, vt auctor est Diosc. quæ Italica est: altera siliquosa quæ vulgatio est. I. Glycyrrhiza siliquis echinatis, C. B. Dulcis radix, Matth. in cõpen. Glycyrrhiza, Matth. in magnis figuris. Lac. Cef. Glycyrrhiza cum fructu, Matth. edit. penul. Glycyrrhiza vera Diosc. Dod. gal. & fol. Glycyrrhiza Italica, Gal. hor. Glycyrrhiza echinata Diosc. Lob. Lug. (qui duas habet figuras, alterã subrotundis, alterã oblongis folijs) Tab. II. Glycyrrhiza siliquosa, C. B. & Lob. Liquiritia, Brunf. Dulcis radix, Trag. Gef. hor. Glycyrrhiza, Brunf. in 4. Fuch. Cordo in Diosc. & hist. Gef. hor. Lon. Glycyrrhiza Germanica, Dod. gal. Glycyrrhiza vulgaris, Dod. fol. Cam. in Matth. Glycyrrhiza leuis, Lac. Glycyrrhiza altera, Matth. edit. pen. Glycyrrhiza nõ echinata, Lugd. Glycyrrhiza nostras, Cam. cuius cum non detur à Matth. descriptio, talis esto: Hæc suffruticem æmulatur, & ex radicibus sarmentosis prælogis, tenuibus, foris nigricantibus intus buxei coloris, sub terra latè per trãuersum, & obliquũ repëtibus, dulci succo præditis, virgæ exsurgunt bicubitales & altiores, lignosæ, teneriores tamen quã in præcedenti, rotundæ, striatæ, circa quas folia oblonga alata, ex multis sibi inuicè oppositis collecta, glutinosa, maiora & virentia quã in priore: flores in summitate velut in spicâ, vt in Vicia, digesti, exigui, purpurascens: quibus succedunt siliquæ nõ in orbiculũ collectæ, nec asperæ aut hirsutæ, sed singulæ singulis pediculis adhærentes, aliquanto spacio à se inuicè distantes, lances & Lentiũ siliquis similes, quibus semina parua inclusa. Hæc cū rarius floreat, idcirco sterilis quibusdã, sed malè censetur. Copiosa hæc in agro Bampergensis, in hortis etiam Germaniæ & Belgii colitur. Téperatè calida & humida est, magis tamen recens, quã arida humectat: cortex cū amarus sit, idcirco abraditur. Quæ Diosc. & Gal. suæ tribuunt, hæc etiam præstat & efficacius. Ad omnes thoracis morbos vtilis est, leniendo, maturando, expectorando: in vniuersum omnibus malis ab acris, falsis, & mordacibus humoribus enatis, occurrit.

Κενταύριον μέγα. CENTAVRIVM MAGNVM. CAP. VI.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, ferrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum, aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papaverum, in rotunditate oblonga. Flos caeruleus: semē cnico simile, ceu laneis quibusdam inuolutum. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo praegnans, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubeicens. Amat solum pingue, & apricum, ac sylvas, & colles. Copiosissima est in Lycia, & Peloponneso, in Arcadia, Helide, & Mellenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam, & Smyrnam. Radix conuenit raptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus tria datur, si febris sit, in aqua, caeteris in vino: item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramenta eius in collyrii formam vuluæ subdita, menses, atque partus extrahunt. Succus eadem praestat. Vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glatinat, & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

a Addit Cat. ὁμοίως ὅ καὶ ὁ χυλὸς ἐρυθρός. i. similiter autem & succus rubes. Et idem habet Meum.

CENTAVRIVM MAGNVM.



Centaurium magnum (vt in Rhapontico superius diximus) nil aliud, mea quidem sententia est, quam illa insignis admodum radix, quam praterita nuper etas Rhaponticum esse credidit: quamq; etiam hoc tempore eodem nomine quidam appellant, qui cum imperitis superioris etatis errare malunt, quam cum peritis recentioribus vera cognoscere simpl. med. Caterum contendat licet Musa Ferrariensis medicus clarissimus, radicem, qua Rhapontici loco plerunq; officina vtuntur, Centaurij magni radicē non esse, ut tamen hac in re decipi (pace eius dixerim) manifeste deprehenditur, cum ea radix, qua vulgaribus Rhapontici vicem explet, omnibus sanē notis Centaurium magnum representet. Quippe quod crassa sit, grauis, compacta, tripedalis, & rubeo succo praegnans qui gustui non modo quadantenus sit acris, sed etiam cum aliqua adstrictione dulcis, quinetiam (vt nos quoque obseruauimus) striata, & funiculi modo contorta. Adde quod & folia, caulis, capitula, flores, & semina illi prorsus sint eadem, quibus constare Centaurium magnum Diosc. & Gal. memoria prodidere. Ea, qua hodie ad nos conuehitur, Gargano praclarissimo Apulia monte numerosa nascitur: quin & in aliis Italia locis, nempe in Veronensi agro, Baldo monte, quem Benaci alluit vnda, sed infirma radice, si ad Apulam compares. Non desunt praeterea hac tempestate rei herbaria ignari nebulones, qui bonis quibusdam seplasiariis persuadere conentur, eam plantam esse Centaurium magnum, que in aquosis prouenit, caule quadrato, bicubit ali: foliis salicis modo longis: flore rubenti. spicato, quam quidam pro Lysimachia accipiunt. Neque alio, quod sciam, argumento nituntur, quam quod hac planta flore sit rubro, & caule quadrangulati, quemadmodum & Centaurium minus. Sed quantum isti hallucinentur, quantaq; in erroris caligine versentur, ij quidem iudicet, qui in stirpium historia multum studij, & temporis consumperunt. Porro vtiusque Centaurij vno tantum capite mentionem facit Mesues: sed adeo alterum cum altero miscet, ac confundit, vt mirandum non sit, si a nonnullis atatis nostra diligentissimis rei herbaria inquisitoribus acriter fuerit accusatus, etsi nouus quidam Mesuis ipstus commentator sruuolis satu argumentis, horum doctissimorum virorum censuris refragari nitatur, in tam aperto illius errore. Quin etiam Auienna, qui cum illo pariter errat, & cum vtrisque Serapio. Siquidem is scripsit ex auctoritate Aben Mesuai, Centaurij magni radicem lentam trahere pituitam simul & bilem, & coxendicum doloribus opitulari: qua tamen facultates Centaurij maioris non sunt, sed minoris, vt sequenti capite explicabimus. Caterum neque Plinius ab errore vindicari potest, qui tamen si in Centaurij magni historia lib. 25. cap. 6. in omnibus fere Dioscoridi subscribat, in facultatibus tamen errasse videtur, quod Centaurio maiori amaritudinem cum quadam dulcedine tribuerit: cum amaritudo non in maiori, sed in minori tantum deprehendatur. Datur Centaurij magni radix vtiliter Hydropicis, Ictericis, & Iocinorosis, tum vino macerata, tum in puluerem pota. Radicis recentis succus vncia pondere haustus, ac etiam vulneri illitus, auxiliatur a serpente demorsis. Centaurij magni meminit Galenus libro 7. simpl. medic. de eius viribus ijs differens verbis: Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus demonstrat. Gustu itaque acris simul adstringensq; apparet cum leuicula quadam dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostentat, menses prouocans, & fetum mortuum euellens, vinumque corrumpens, atque eiciens. Adstrictio verò, opera crassa, terrenaque frigiditatis, cum vulnera glutinet, & sanguinem reuicentibus proffit. Exhibentur autem eius drachmae dua, febrientibus quidem cum aqua, scilicet vero liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatuum actionem, ruptis, conuulsis, dyspnae, siue spirandi difficultati, tum inueterata tussi conuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod praeter naturam est, oportet, sed partem quoque euacuatae roborare, ac confirmare. Vacuationi itaque accommodata est acrimonia, vti que cum non sola sit, ac pura, sed aut dulcedini iuncta, aut certe non prorsum amaritudini: si quidem vehementiam tunc, atq; violentiam, mista illi temperata quadam substantia, cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea, qua euacuata sunt, roboranda, contrahendaq; adstrictione est opus. Eadem qua radix, & succus ipsius efficit: vtun-

Centaurii magni cōsid.

Brasauoli lapsus Rhaponticum officina Centaurium magnum esse negantis.

Quorundam hallucinatio Lysimachia Centaurium magnum stuentium.

Arabum lapsus dum vtrumq; Centaurium confundunt.

Plinii error.

Centaurii magni vires Matth.

Centaurii magni vires ex Gal.

Nomina. *cit: vtunturq; eo medicamento quidam vice lycij. Græci κενταύριον μέγα id vocant, quod Latini Centaurium magnum: Mauritanii, Chanturion kibir, Sacurion habre, seu Canthuriū: Itali, Centaurea maggiore: Germani, non sine errore, Rempontic: vt etiam Hispani, Ruipontico: & Galli, Rhepontico.*

Centaurium duplex est: maius & minus: Maius, de quo nunc, triplex, vel est folio in plures partes diuiso rigidoq; flore ex cæruleo purpurascente: vel laciniato nec rigido, luteoq; flore: vel denique folio non dissecto, floreq; cæruleo. I. Cetaurium maius folio in plures partes diuiso, quod communiter officinis est Rhaponticum, C. B. Rhapontica quæ hodie, Centaurea maior censetur, Trag. Cent. magnum, Matth. Dod. gal. & fol. Cast. Cent. maius Cor. in Diosc. & hist. Lac. Lon. Lob. Lug. Tab. Cam. cui & Rhaponticum vulgare. Centaurium vulgare maius, Clus. hist. Hisp. Cent. maius alterum, Ges. hor. Cent. maior, Cæsalp.

Κενταύριον μικρόν.

CENTAVRIVM MINVS.

CAP. VII

Conclusa nō legit Meum.

a Meū. & Ca. ἀπε-Ιηθεϊσα ἕ & πινομένν i. decocta vero & pota.

b Cat. nō habet conclusa. Meum autē habet tantū ἐμφάνη.

Centaurium minus, limnesion aliqui vocauerunt, [quoniam rigua amet loca.] Herba origano, aut hyperico similis, caule anguloso, palmam excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente, foliis rutæ, prælongis, & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit. Bilē, crassosq; humores per aluum exigit, a si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur: trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginē oculorum expurgat: in vellere appositus, menses, & partus extrahit: epotus peculiariter neruorum vitii succurtit. Succus extrahendi ratio. Legitur herba semine prægnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur, donec superemineat aqua: mox vbi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, vsq; dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; contundunt, atq; succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant, quod si quid concretum faucibus valis adhærescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt, noctu diligenter operiunt: namq; ros nocturnus liquores coalescere nō finit: Quæ autem siccis radicibus aut herbis, liquamenta exprimuntur, decocta (vt in gentianæ mentione retulimus) præparantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut confusis herbis factitantur, in sole, vti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisq; similibus succus: b [sic ex acerbis vis melligo elicitur.] Lycium tamen, & absinthium, hypocistis, & consimilia decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

I. CENTAVRIVM MINVS.

II. CENTAVRIVM MINVS spicatum.



Centaurii minoris confid.

Fel terræ.

Vires Matth.

Febrifuga.

Centaurium minus nullis ferè non cognitum, in pratis, pascuis & campestribus nascens: in Hetruria vulgò Biondella nuncupatur: quoniam abstergendis, dealbandisq; mulierum capillis ex lixiuo plurimum præstat. Quod passim in officinis habetur, verum, & legitimum Centaurium minus esse, omnibus, vt arbitror, exploratius est, quã vt à nobis ostendi debeat: quippe quod nullis in vniuersum notis Centaurij minoris historia resergetur. Amara admodū est, nō radice solum, sed etiã tota sui ipsius plãta, adeo vt quidã Fel terra eã appellauerint. Gal. ob ingentes, mirasq; eius facultates, de ipsius viribus integrū librū conscripsit, Papiæq; dicauit. Detrahit hoc bilē, & pituitam, qua sanè facultate Centaurij maius plancarere deprehenditur. Datur foliorū & florū eius decoctum vtiliter potādum tertianariis, quod bilem per inferna depiciat, quo factum est, vt quidam hanc febrifugam vocauerint. Idem, ac pariter succus, iocinoris, ac lienis obstructions, & durities tollit. Alui tineas pellit, ex melle drachma pondere potus, tum vmbilico illitus. Herba comæque decoctum, Lentiginis,

varios, albos, & ceteras cutis infectiones exterit, infectis particulis adhibitu. Instillatur succus vermiculosis auribus, quin-
 etiam illinitur contra papulas, & manantia capitis vlcera. Quo fit, vt non parum aberrauerint inter Mauritanes Mesues,
 Amienna, & Serapio, quod Centaurij minoris vires cum maiori turpiter confuderint. Gal prater ea, qua de Cetaurio mi-
 nori ad Papiam scripsit, eius quoq; meminit lib. 7. simpl. med. sic inquit: Cetaurij minoris radix prorsus inefficax est. Sed
 ramuli eius, & potissimum folia, qua illi inhaerent, & flores, vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululu habens
 & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum admodum exiccatorium est medicamen, expers mordacitatis. Porro
 quod omnia talia vtiliora sint, supra commonui, & nunc nihilo secius tamen nos repetere tepestiuum est, omnes eius par-
 ticulatum actiones memorantes. Vulnere itaque magna herba ipsius recentis illitu glutinantur: & vetusta, quaeq; egre ad
 cicatricem perduc: quocumq; vlcera, cicatrice eodem modo vtetibus obducuntur. Arefacta verò glutinatoria, & desiccatoria
 10 miscetur facultatibus, iis videlicet, qua sinus, & fistulas sanare sunt nata, veteresq; duritias emollire, tum vlcerum mali-
 gna, qua cacoeche vocantur, sanare. Miscetur etiam iis, qua rheumaticis affectibus medentur: in quibus ea medicamenta
 optima sunt, qua vehementer desiccantia, cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem. Decoctu herba quidam
 ischiadici infundunt, ceu biliosa, & crassa ducens: nam & t.ilia purgat: quanquam cum adeo vehementer operabitur, vt
 eruent. euacuet, tunc plus proderit. Succus porro eius, cu adsimilis sit facultatis, hoc est exsiccatore & absterforia, ceteris
 iam dicta pulchre efficere potest: & cum melle oculis illinitur, mensq; & factu appositus euocat. Sunt qui ipsum praebeant
 & q. quibus nerui affecti sunt, vt qui euacuet, & desiccet innoxie qua impleta sunt. Quippe cum iecinis quoque obstru-
 ctiones optime expediat, bonuq; sit lieni indurato remedium, foris impositu, nec secius, si quis bibere sustineat. *Κενταύριον*
 μικρον sic Graece, Latine verò Centaurium minus dicitur: Arabicè, Chanturion sege, & segir, seu Katarion sages: Ital. Cen-
 taurea minore: Germ. Zausent gulden fraut Sieber fraut, Erdgall seu Biber fraut: Hisp. Fel de tierra: Gallicè, Cen-
 20 tauree, aut Fiel de terre, Centauree poulet: Bohemicè, Zemez luc mensly: Polonicè, Centurzya: Ruthenicè, Nerycynik.

Cetaurii mi-
 noris vires ex
 Gal.

Nomina.

Centaurium minus, Theoph. 9. hist. 4. Panax λεπτόφυλλον seu tenuifolium, & Plin. li. 25. c. 6. Cetaurium
 alteru cognomine λεπτόν, quod aliqui Libadion vocant, quonia secundum fontes nascatur: Gallis Exacon
 λεπτόφυλλον a ntedendo, dicitur. Hoc triplex est, vel umbellatum, hocq; vel colore puniceo, vel albo: vel
 spicatu: vel perfoliatu luteu, hocq; vel ramosum vel non ramosu. I. Cent. minus, C. B. Trag. Matth. Fuch.
 Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. Lac. Cast. Cam. Lug. Tab. Thal. Cent. minus, Lon. Cent. paruum, Lob. Ceta-
 30 uria & Centaurea minor, Bruf. Centaurea vulgo & Biondella vulgo, quia ad capillum ruffo colore tin-
 gendum mulieres vtuntur, Cael. Hoc ratione soli variat, vt & Theophr. 4. hist. 5. meminit: si namq; in hu-
 midis proueniat. altius excrescit, & quidem aliquando in bicubitalem altitudinē: si in aridis, vix duos aut
 tres transversos digitos adaequat. Flore est communiter in purpura rubente: aliquando albo, rarius ferru-
 50 gineo. II. Centaurium minus spicatum album, C. B. Ex radice parua fibrosa, caulis exurgit vnicus, qui
 mox in duos palmares & sesquipalmares, striatos, hiq; in alios brachiantur: folia parua pediculis carentia,
 quorum prima lata, subrotunda, superiora angusta, acuminata: flores ab imo sursum per caule sparsi, sin-
 guli ex vna vt plurimum caulis parte sibi inuicem succedentes, qui ex calyculis foliosis prodeunt oblongi,
 albi, ea forma qua non patentes in figura exprimuntur, siquidem patentes sculptor non recte expresserit:
 quibus succedunt siliqua, vt in vulgari, semen minutu continentes. In Italiae montibus Euganeis, & et-
 iam in Gallia Narbonensi circa Monspelium prouenit. III. Centaureum luteum perfoliatu, C. B. Herba
 est centaurii minoris magnitudine, qua ex radice candida & tenui caulem rotundum emittit, rectum,

*III. CENTAVRIVM LVTEVM *IV. CENTAVRIVM LVTEVM
 perfoliatum. * non perfoliatum. *



Chlor. perfoliata
 Centaurium perfoliatum
 Germ. huet. 2. 54

pedalem

pedalem, geniculatū, qui mox in alios brachiatur, quem ex singulis nodis cingūt folia, Centaurii minoris latiora, bina semper inter se opposita, & per longa interualla coherentia, vt caulis per ipsum mediū transire videatur, colore ex viridi & caeruleo albicāte: quæ verò per terram sparsa sunt, saponariz foliis æmula sunt, sed minora & candicantia: ramulorū summis flores Hyperico similes, quorū singuli cōmuniter octo foliis cōstant, aliquando pallidè, aliquando intensè lutei & planè aurei, vel crocei insident: quibus vācua rotunda centaureæ vulgaris maiora succedunt, minuta semina nigra cōtinentia. Duplex est, alterū angustioribus & nō perfoliatis, alterū latiorib. multò, & caulē ambientib. foliis, in summo tantū ramolū: sic quod nō ramosum est à præcedēti in eo differt, quod in summo fastigio florē singularē chrysanthemō similē sustineat, vt apud Lugd. sub centaureo luteo altero habetur. Prouenit apud nos in pratis humidioribus Michelsfeldensibus autumno florens, in ascensu montis ad S. Christianā, sic in collibus circa Tigurum, in agro etiā Bononiensi & Mōspeliensi, in pratis vdis versus Latte & Lupum mōtem obseruauimus: notantur & alii in Hispania & Anglia. Minus amara, quā vulgaris fiet, quare caloris nō nihil possidet & ad vulnera cōmendatur: at efficacius purgationes moliri creditur. Hoc quibusdam censetur Achilleon vera apud Plin. li. 25. c. 5. cuius sub Centaureo floribus citreis pallidis Mesues 2. purgantiū 10. meminit. Dicitur perfoliata Achillea, Ges. hor. Centaurium luteum, Aduer. Clus. hist. Hisp. Centaurium florib. luteis sine citreis pallidis Mesuei, Lob. Centauriū luteum perfoliatum vel diaphyllon, Cam. ad Matth. Centaurium luteū prius Lug. Achilleos, Cetaurea maior vulgo, Cæs. Cent. minus luteo flore perfoliatū, Tab. cuius figura nō respōdet, perfoliatum montanum luteum quibusdam. IV. Centaureum luteum nō perfoliatū.

Χαμαλέον λευκός.

CHAMÆLEON ALBUS.

CAP. VIII.

Chamæleon albus, *ixi* ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis viscum circa radices eius inueniatur: quo pro mastiche vtūtur mulieres. Folia habet Silybo, aut Scolymo similia, asperiora, acutiora, nigroq; chamæleone validiora. Caulem non promit, verū ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo erigit. Flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit: semen cnico simile: radicem in lætis collibus crassam, in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mēsurā, latis interaneorum tineas pellit: bibitur autem in vino austero cum origani feruetacti succo. Hydropicis commodissimè drachma in vino datur, etenim eos extenuat. Contra difficultatem vrinæ decoctum propinatur. Hauſta in vino, serpentium venenis resistit: occidit canes, & sues: mures item necat, subacta cum polenta, aut aqua, & oleo madefacta.

Χαμαλέον μέλας.


CHAMÆLEON NIGER.

CAP. IX.

Chamæleon niger a foliis Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta videretur. Caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues hyacinthi æmulos, versicolores: radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta stætescit, & commanducata mordet: prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti futorii exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit: eadem, cum sibi sulphur, & bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione, dentium dolentem mitigat: cum pari pipere, & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, testes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur: vitia cutis in facie vitiliginesq;

I. CHAMÆLEON ALBUS.

II. CHAMÆLEON NIGER.



a Orib. ὄνεί-
νισι ἑλοφόν ἢ
ἰξίαν ἢ κενό-
μαχος, ἢ κεί-
μονες ἐκά-
λεσαν. i. quæ
aliqui vilo-
phon, siue I-
xiam, siue cy-
nomachum
appellant.

cum sulphure emendat, erodentibus medicamentis admiscetur: phagedænas tetraque vlcera illitu sanat. Quare chamæleon vocetur, à varietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hic viridia, b illic albicantiâ, alicubi cærulea, nonnusquam rubra inueniuntur.


b Orib. add. n' oppa. i. si- ue fulua. Chamæleon- tis vtriusque consideratio.

Chamæleon albus tam ab Hetruscis, quam ceteris serè Italia incolis vulgò Carlinâ vocatur, quòd credat vulgus (vt facile solet) herbam hanc magno olim Carolo regi ad fugandam sui exercitus pestem ab angelo demonstratam fuisse, æquum antidotum omnium præstantissimum. Quo argumento freti vulgares quàm plurimi, ad arcendam pestilentiam huiusce plantæ radices miris magnisq; laudibus commendant, si quotidie drachma deuoretur. Nec quidem ab re: quândo enim pota radix (vt Dioscorides & Gal. testantur) latas interaneorum tineas interimat, & serpētium venenis resistat, mi- rum vtiq; non fuerit, quòd eadem in pestilentia opem ferre valeat. Falluntur nimirum, qui putant, stirpem illam præ- niti non absimilem (nostri eam Carciofo vulgò appellant) aculeis horrentem, cuius flore coaguli vice Hetruria vititur, album esse Chamæleonem. Nam eorum error ex eo maximè diluitur, quòd hac contra Chamæleonis albi descri- ptionem, in longo admodum caule echinatos suos proferat fructus. Porro Chamæleonem album nunquam Fuchsi- um (pace viri alioqui eruditissimi dixerim) vidisse existimauerim: quòd libro suo de plantarum historia primùm scribat, nul- lum hanc edere caulem, subinde huius fortè oblitus, eodem in loco eundem procerò satis caule depingat. Quin nec nigrum idem nouisse videtur, cum depictus ab eo, quem tamen planè non probat, nullis notis legitimo, meo quidem iudicio, respon- deat. Nasctur niger in Tridentino agro, Ananiensibus admodum frequens tum montibus, tum collibus, nullis reclaman- tibus notis. Qua in re hallucinantur monachi reuerendi, qui Mesuem commentati sunt, cum certò sibi persuadeant, Car- linam (vt eorum vtar distinctione) caulem proferentem, eiusdem esse spinam albam, quam Græci ἀκανθα λευκήν dicunt, Mauritani verò Bedeguar: itè Carlinam alteram caule viduam, esse spinam Arabicâ, ab Aphris Suchaa vocatam. Quippe cum spina alba (vt Diosc. est author) bicubitali sit caule, ipsoq; albicante, vnde fortasse nomen traxit, & inani, flore verò

Quorundam error.

Monachorū opin. explosa; quæ fuit Car- linam esse A- cantaleucc.

III. CHAMÆLEON NIGER ALTER.



purpureo nitescat: Carlinâ verò hac caule sit dodrante paulò maiore, pleno, non inani: subrubro, non albicante, floribus hyacinthi æmulis: nulla ratione dici posse putauerim, Carlinâ hanc esse spinam albam, sed potius rufam. Cum nec simili- ter monachi vnquam probare possint, Carlinam alterâ caule vacante Arabicam esse spinam: quòd nusquã Diosc. scripsisse inuenerim, spinâ Arab. caule vacare, sed spina alba potius esse persimile. Ex quo rectè (vt arbitror) cõcludi potest, quòd cum spina alba procul dubio caulem edat, eundè quoq; Arabica pro- mat. Sūt etiã qui velint, Carlinâ caulem gerentè nihil differre ab altera qua caulem nō fert, nisi sexu, nempe quòd altera mās, altera verò femina fortasse fuerit: negatq; omnino has plãtas esse Chamæleones, illamq; præsertim nigrū Chamæleonē esse nolunt, quæ caulem rufum gerit. Hocq; argumētò nituntur, quòd scripserit Gal. lib. 8. simpl. med. Chamæleonis nigri radicem lethale quiddam obrinere: eamq; ob causam in extrinsecis tã- tum venire medicamentis. Sed cum raphani vice à compluri- bus copiosè cum acetariis edatur, nullo penitus incommodo, nec esse hanc nigrum Chamæleonem, nec eius speciem probat. Quibus facile responderi potest, quòd in Græcia, fortasse in Ponto, aliisq; conterminis regionibus Chamæleonis nigri ra- dix sit venenosa, & in Italia salubris, exuta ob cali huius ele- mētiam lethali facultate, quemadmodū & Persea, quæ tam- etsi Persis semper fuerit lethifera, Aegyptiis tamen innocua facta est, soli & cali bonitate. Arum præterea Cyrenis adeò mite est, vt rapi modo in ciborum vsum veniat, cum tamen in Græcia & Italia adeò acerrimum sit, vt nec coctum, nec crudum edi possit. Quin & scorpiones in aliquibus terra- rum orbis partibus icthos interficiunt: in aliquibus verò, vt in Tridentino tractu, nullum icthi venenum relinquunt: quo et- iam in loco nigrū veratrum nulla deiectoria vi pollet. Id quod

Quorundam opinio repro- bata.

in Colchica Ephemero quoque videmus, quòd eo pro Hermodactylo innocuè (quanquam temerè) vtantur Medici. Ceterum illud præter dicta me maximè ad credendum inducit, Carlinam caulem fundentem esse CHAMÆLEONEM NI- GRUM, quòd hac planta omnibus in vniuersum notis nigrum Chamæleonē referat. Quandoquidè foliis constat scolymo minorib; tenuioribusq; subrubra per mediū excurrente costa: caule itè dodrante ali, crassitudine digitali, subrubro, floribus, in umbella spinosis, tenuibus, hyacinthino colore versicoloribus: radice crassa, exterius nigra, densa, & aliquando corrosa, qua fracta intus flauescit, & commanducata mordet: fate vt tamen hanc umbellam non ferre, (vt Diosc. inquit) sed echi- natum capitulum, perinde ac album Chamæleonem. Verum hoc non me omnino à mea dimouet opinione, quòd Dioscori- dem videam in quàm plurimis locis in propriis vti vocabulis. * In qua certè delineatione hæc planta ita ad. sim conue- niunt, vt nemo, nisi sensibus, & ingenio obtusus fuerit, Carlinam, quæ caulem mittit, Chamæleonem nigrum esse non vi- deat, & perspicue intelligat. Id quod equidem certior ob diligentiorē inquisitionem factus, hoc tempore asserere non dubi- tavi, licet alias aliter senserim. Hacq; in sententia permanere decreui, donec aliquis rei herbariæ diligentissimus aequè & do- ctissimus indagator, alios à Carlinis Chamæleones ostendat in Italia, qui rectius suis notis Diosc. historiam representent: tunc enim in hac, vt in aliis quoque, non grauabor mutare sententiam. * Addimus tamen aliam CHAMÆLEONIS NIGRI imaginem, quæ mihi à Doctissimo viro Bartholomeo Maranta, Neapoli transmissa est: quæ tametsi umbellam Hyacinthinis floribus scatentes proferat, cum tamen folia rubris maculis varia non sint, in caule nulla prorsus rubedo spe- ctatur, mansa Radix acediniis tantillum haud respiciat, exesa non sit, non flauescat, nec caules digitali crassitudine videan- tur, cur legitimum Chamæleonem nigrum hanc plantam esse affirmè non habeo. Sed de his diffusius li. 4. nostrarum Epistolarum scripsimus, ad Marantam respondentes. Dixi sententiam meam, quam iis censendam relinquo, qui rei plantariæ maio-

Chamæleo- nis nigri de- scriptio.

Chamæleo- niger alter:

Arabum rur.
pis error dum
Chamæleon
cum Chamæ-
leone con-
fundunt.

Chamæleonū
hist. ex Theo-
phraſto.

Nomina.

rem, quam ego peritiam habent. Caterum hic non respondebo fycophanta cuiusdam calumniis, in Chamæleonte aduersum me promulgatis, cum libro 6. id mihi faciendum proposuerim, vbi de Ixia inter venena scribit Dioscorides. Ibi enim biazice sophista, & rei plantaria pseudoindagatoris malitiam, recordiam, & apertam temeritatem fusus aperiam. Explodendi sunt Arabica factionis scriptores, vt qui non sine detestando errore, Græcorum vocabulorum vicinitate decepti, Chamæleonem, quam sua lingua Mezerion appellant, cum Chamæleone confundant. Nam Auicenna de Mezerio differens libro 6. tractatu 2. cap. 464. circa finem, suum errorem prodidit iis verbis: Mezerion bibitur cum vino ad morsum vermium venenosorum, & est proprie nigrum, venenum mortiferum. Et quando miscetur cum Saucis, & coniungitur cum aqua & oleo, interficit mures, & canes, & porcos: hac ille. In quibus duplici notatur errore: primo quod Mezerio eas tribuerit vires, quas albo Chamæleoni reddidit Dioscorides: deinde quod nigrum, non vtique album ea prestare crediderit contra Dioscoridis sententiam. Meminit vtriusque Chamæleonis Theophrastus lib. 9. cap. 13. de plantarum historia, vbi sic habet. Chamæleonum, vnus candidus, alter niger. Vires autem radicum inter se distant, & ipsa etiam radices specie differunt. Candida enim candida est, & dulcis, & crassa, & grauius olens. Vtilis traditur ad fluxiones, cū consecra orbiculatim modo raphani decoctum est, iunco transfixa in seriem. Valet & ad interaneorum animalia lata, cū passa vna comesa acetabuli mensura vino bibitur austero. Occidit & canes, & sues: canes in farina hordeacea subacta cum aqua, & oleo: sues cum brassica. Et si hominem agrescentem experiri volueris, an viuere possit, lauandum ea radice triduo iubent. Hoc enim si tolerauerit, morturum nequaquam existimant. Nascitur aequè omnibus locis folio scolymo simili, verum ampliori, & terra proximo capite magno, acano simili: vnde quidam acanum eum vocarunt. Niger folio constat adsimili, præterquam quod minori, leuiorq;. Totam autem herbam vmbrauli speciem representat: radice crassa, & nigra extrinsecus, subflaua intrinsecus nititur. Loca gelida, humidaq; amat. Lepra, & vitiliginē abolet trita cum aceto, & ramentis illita: necnon & canes occidere potest: hæc tamen Theophrastus. Illud insuper non ignorandum est, viscum scilicet, quod Ixiam appellant, in Chamæleonis albo dice nascens, venenum esse mortiferum, cū tamen modica tantum quantitate sumptum somnolentos vigilantes reddat. Quamobrem Cretenses mulieres suarum lucubrationum gratia, ne somnum inopere, ex eo tætilum, aut modicum à coena nullo incommodo assumunt. Huius pleriq; locis meminit Plinius, & de eo nusquam non intellexit, vbi contra sumptum viscum aliquod remedium protulit. Χαμαλέων λευκός sic Græcè: Latine verò Chamæleon albus appellatur: Mantanis, Chemeleon leute, seu Chamalium: Italis, Carlina, & Chameleone bianco: Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Carlina, seu Chameleon blanc: Bohemis, Pupauua byla. At planta quæ Χαμαλέων μέλας Græcis, Chamæleon niger Latini vocatur: Arabibus, Chemeleon melamos: Italis, Chameleone nero: Germanis, Ebertwurk: Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Chardnette: Bohemis, Pupauua cerna.

Chamæleon à foliorū varietate dicitur, vt ex Plinio colligere est, qui monet cū terra colores mutare, hic niger, illic viridis, alibi cyaneus, alibi croceus, atque aliis coloribus videtur. Huius differentiæ sunt aliquot ratione magnitudinis, colore floris, ite ratione caulis, quo aliæ carent, aliæ habent. Diosc. album & nigrum; Matth. verò hūc etiam duplicem proponit. I. Chamæleon albus acaulis, C. B. Ixia & Chamæl. albus Theophrasti (Vernilaginem Gaza vertit) & Plinij. Chamæleon albus, Matth. Cor. in Diosc. Lac. Lob. Cast. Lug. Spina Arabica, Dod. gal. Carlina humilis, Dod. 8. Carlina altera, Dod. fol. Carlina minor, Clus. hist. Pann. Carlina herbariorum, Lob. obs. Carlino vulgi, Cæs. Carlina sessili flore σικαλλος, Cam. Cardoparium flore albo caule nullo, Gef. hor. Silybus, vulgò Carlina, Gef. Fracto. Helxine Pliniana, Anguill. Variat hæc quod altera sit flore albo amplo, interdum sine caule, nonnunquam caule pedali: altera minor, flore purpurascens & sine caule. II. Chamæleon albus caule donatus, C. B. Ebertwurk, id est, Apri radix & Cardoparis, Brunf. Chamæl. niger vulgaris, Trag. Chamæl. niger alter, Matth. Lugd. Chamæl. niger, Lac. Chamæl. albus, Fuch. Lob. Chamæl. Lon. Leucacantha, Dod. gal. Carlina seu Leucacantha, Dod. fol. Carlina alia caule cubitali, Cam. Cardoparium flore albo caulem habens, Gef. hor. Carlina maior, Clus. hist. Pan. Crocodilium, Lugd. flore est albicante, rarissimè rubente. Hæc non videtur à præcedente differre, nisi quod caulem proferat. Hanc ex secunda & tertia Matth. edit. vbi tantum hæc duæ habentur, in suum restituimus locum, vt cuius figura in quinque postremis edit. vt & suo in Comp. sub Chamæleone nigro altero Chalco-graphorum iniuria, sit posita. III. Chamæleon niger alter, Matth. Chamæleon niger Dioscoridis Maranthæ, Lob. Cam. Chamæleon niger Cortusi, Dod. fol. Chamæleon niger Dioscoridis, Anguill. & Cast. Chamæleon niger verus Dalechampij, Lugd. Crocodilium, Tabernæmontano.

Κροκοδείλιον.

CROCODILIVM.

CAP. X.

Crocodilium chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui, aliquantulum lata, odore, vt nasturtij acuto. Feruefacta in aqua, & a pota radix, sanguinem copiosum per nares pellit: datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vti scutum: quod suapte vir-
rinam ciet.

α πλωροδύμ.
ita Meum. i
loca. ac Cat.
πλωροδύμ. i
pota.

Crocodilij
consideratio.
Opi. explosa.

Eryngium
marinum nõ
esse Crocodi-
lium.

Plin. de Cro-
cod.

Crocodilij
vires ex Gal.

Sunt qui velint, Carlina vulgò vocatam, eam inquam, quæ caulem proferat, legitimum esse Crocodilium. Sed eorum opinio mihi quidem nullo modo satisfacere potest. Siquidem (vt præcedenti capite retulimus) Carlina, quæ caulem emittit, aded omnibus in vniuersum notis chamæleonem nigrum representat, vt vix vnquam persuaderi possim eam esse Crocodilium: præsertim cū factò periculo iis sanè viribus careat, quibus Crocodilium prestare scribant, nempe quod radicis decoctum potum sanguinem per nares copiosum trahat. Adde quod Crocodilio radix sit longa, leuis, aliquantulum lata, & odore, vt nasturtij, acuto. Illi verò Carlina generi crassa, nigra, densa, exesaq; non autem lata, nec leuis, nec nasturtij odorem spirans. Non desunt aliq; qui Eryngium marinum Crocodilium existiment. Verum cū illud in litoribus maris nascatur, chamæleoni nigro sit absimile, nec sanguinè è naribus eliciat: Crocodilium verò proueniat in syluosis, compluribus aliis reclamantibus notis, ijs etiam haudquaquam ad stipulari possum. O quam magni facerent Medici Crocodilium, si in Italia nasceretur, vbi tamen hæc tamen ipsum videre non licuit, cū eius radice decoctum tanta sit facultate præditum, vt potu tantum sanguinem copiosum per nares pellat. Crocodilij meminit Plinius lib. 27. cap. 8. non tamen plura tradidit, quam Dioscorides à quo illa omnia accepisse videtur: quanquam in hoc ab eo dissentit, quod Crocodilium in sabuleto nasci prodiderit, cū tamen in syluosis nasci scribat Dioscorides. Huius facultates li. 7. simplicium medicamentorum memoria prodidit Gal. sic inquit. Crocodilij semen acere est, atque odoratum, urinam, mensesq; ciet. Itaq; facultas è habuerit calidam,

calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, vt que similis sint facultatis, nephriticos adiuuant. Radix peccatorum excreationibus valenter conducit, minus quidem quam semen acris, non tamen minus amara. Trahit verò etiam per naues sanguinem. Quod κροκιδείλιος Græci, Latini quoque Crocodilium dicunt: Itali, Crocodilio.

Nomina.

Δίψακος

DIPSACVS, SIVE LABRVM VENERIS. CAP. XL

I. LABRVM VENERIS.



Dipsacus aculeatarum generis est. Caulem habet altum, spinis horridum: foliis lactuca, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, ceu qualdam bullas intus & extra aculeatas, in dorso medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber, aut ros asseruetur: vnde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula surculis capitula insunt, oblonga, & echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq; medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasque, si tusa, & decocta in vino radix, vsq; dum sit crassitudo cere, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

a Meum ἐπι-
κεία ἐχίνα
καρβύδος ἐκ. ἰ
similia erina-
ceo sublonga
spinosa.

Dipsacus, quem Latini Labrum Veneris vocant, in Italia vulgaris est planta, in præcipuè locis, vbi lanificia exercentur. Si quidem echinato eius capitulo mangones rudem adhuc pannum peccunt, expoliunt, detrahiq; stocis concinnant. In Etruria Dipsacum vulgò appellant Cardo da cardare, Feroulienses verò Garzo. Seritur is hodie in campis in compluribus Italia locis, præsertimq; in agro Bononiensi, singulari à cultoribus adhibita diligentia: quinetiam spontè nascitur nonnullis in regionibus. Sed & syluestris quoque sponte in campestribus, in agrorum, & scrobium aggeribus, in vis iuxta sepes frequentissimè nascitur, nullis prorsus repugnantibus notis quas illi reddidit Dioscorides. Facie à priori parum admodum differt, syluestris tamen est & spinis longè horridius: Echinata capitula setis quoq; compluribus sca-

Dipsaci con-
sideratio.

tent, aculeis non adeò firmis, atq; aduncis, vt in altero genere. Non differt suis omnibus in facultatibus ab altero. Inuenitur

II. LABRVM VENERIS ALTERVM.

III. VIRGA PASTORIS.



Dipsacus syluestris
Strob

II 2

autumn.

Virga pasto-
ris duplex.

Syluatici hal-
lucinatio.

Dipsaci vires
ex Galeno.
Nomina.

autumni tempore (vt experientia quemq; docere potest) in eius capitulo iam exaresfacto, medullitusq; dissecto vermiculum ille, quem collo adalligatum quartanis febribus remedio esse proderit, piscatoribus hamo affigendus maxime expetitur: et si Marcellus Diosc. interpres, & commentator, vermiculum hunc nunquam sibi compertum fuisse scribat. Dipsacus officinarum, & herbariorum vulgo Virga Pastoris maior nominatur. Quippe minorem etiam illius emulam ostendunt: quaquam non adeo striato caule, ac spinis horrido costet, folius item infirmioribus sit, & capitibus multo minoribus, vt que olma magnitudinem non excedant. Sunt autem huius capitula tenuibus capillis referta, ita vt sericis viridi colore infectis floribus similia videantur. Prouenit umbrosis & vliginosis locis. Non crediderim ego hanc plantam a veneris labro admodum distare, imbecillioris tamen esse facultatis haud negauerim. Caterum animaduertendum est, neutrum Dipsaci genus, quod tunc Serapioni, tum Auicenna describitur, esse Virgam pastoris. Quandoquidem is, quantum ex eorum scriptis colligere potui, Pastoris virgam nil aliud esse putauerim, quam polygonum, cuius tamen femina, quam maris historiam lib. 4. r. r. addit Diosc. Quapropter illud mihi semper persuasum velim, quod non a Mauritanijs Dipsaco Virga pastoris nomen indutum sit, sed a seplasiarijs is, qui suis potius pandectis, quam ceteris castigatissimis, & probatissimis scriptorum monumentis, sudem pre- stare consueuerunt. Namque Matthaus ille Syluaticus pandectarum auctor, Dipsacum Virgam pastoris appellat: qui de- inde in grauiorem errorem lapsus, Dipsacum ipsum cum polygono turpiter confundit, vt pote qui illud assequi non poterit, quod Arabum Pastoris virga, esset Dioscoridis polygonum, non autem Dipsacus: qui quidem tantum a polygono distat, quantum lepores ab vrsis. Dipsaci meminit Gal. lib. 6. simpl. med. his paucis: Dipsaci spina radix secundo ordine existato- ria est, habetq; nonnihil abstersorium. Planta qua Graecis δ' ἄρακος, Latinis Labrum Veneris nominatur: Mauritanijs, Dis- sacos: Italis, Cardo da panni, & Dissaco: Germanis, Kartendistel, Katten Kraut, Quebenstrel, & Weber Kutter: Hispanis, Cardencha, Cardo penteador: Gallis, Cardo à carder, & Verge à bergier: Bohemis, Stietk: Polonis, Szeletki. La- brum veneris alterum iisdem appellatur nominibus, quibus primum appellari diximus. At Virga pastoris: Italis, Virga pastore, & Dissaco minore.

Dipsacus nomen a contrario inuenit, quoniam concauo alarum sinu, rore vel imbre recipiat, quo ve- lut ad abigendas fitis iniurias abutitur. Hic satius est & syluestris: est & folio in lacinias diuiso: in qua clas- sem referenda & Virga pastoris. I. Dipsacus satius albo flore. C. B. Carduus fullonius satius, Trag. Labrum Veneris. Matth. Cord. in Diosc. Cast. Cæs. Dipsacus albus, Fuch. Dipsacus satius, Dod. gal. & fol. Cor. in hist. Ges. hor. Dipsacus, Lug. Card. fullonij, Lob. Galedragon Xenocratis, Anguillara. II. Dipsacus syl- uo purpureo flore. C. B. Carduus fullonij, Bruf. Carduus fullonis efraticus, Trag. Labrum Veneris alterum Mat. Labrum Veneris syluest. Cast. Labrum Veneris, Cor. in Diosc. Lob. Labrum Veneris flosculis purpureis Cæs. Di- psacus, Brunf. Lac. Lon. Tab. Dipsacus purpureus, Fuch. Dipsacus sylu. Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Gein. hor. Thal. Dipsacus sat. alter & Dipsacus sylu. maior, Lugd. Molybdena Plinii, Dalechâpio in Plin. III. Di- psacus sylu. minor, C. B. Cardui fullonij tertium genus, Trag. Virga pastoris, Matth. Lob. Cam. cui & Di- psacus fatuus: Dipsacus tertius, Dod. gal. & fol. cui & Galedragon Plinii. Dipsaci species minor, Gein. hor. Dipsacus syluestris minor & Plumbago Plinii quibusdam, Lugd. Dipsacus minor, Thalyo.

Α κάρδα λευκή.

SPINA ALBA.

CAP. XII

Spina alba nascitur in montibus, & syluosis. Folia fert albi chamaeleonis, angustiora, candidiora, ali- quatum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine, albi-

I. SPINA ALBA.

II. SPINA ALBA ALTERA.



Εχινopsis spinaecephalus

canthem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen, ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & us, qui cruenta extulsiunt, efficax est: vrinam cit: tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

Spinam albam seplasiarj Arabas (vt plerunque solent) imitati, Bedeguar appellant. Sed non parua inter hos, & medi-
 cos oritur contentio, quanam in aculeatarum genere, quas plurimas genuit natura, Spina alba legitime, notis omnibus
 adstipulantibus, appellari possit. Verum etsi tantam litem transigere nequeant, interim tamen pro Spina alba aly alias
 herbas ostentant, & quisque suam veram existimat. Quandoquidem sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent,
 10 Spinam albam eam aculeatam herbam esse, quam aliqui Carduum benedictum vocant, alij verò vulgò herba Turca. Sunt
 alij, qui Carlinam vocatam, id est album chamaleonem, Spinam albam esse contendunt. Inter quos inuenio Monachos
 qui in Mesuem scripserunt, quorum sententiam, superius in chamaleontj vtriusque mentione, vt falsam reprobauimus
 20 Sunt præterea, qui Spinam albam esse velint echinatum Carduum illum, & spinis rigentem, qui Hetruscis in lacte cogen-
 do coaguli vicem explet. Non desunt insuper qui vnam, vel alteram syluestrem, ac spinis horrentem plantam, pro Spina al-
 ba nullo discrimine accipiant. Quo fit, vt omnes ij nullo veritatis lumine ducti, in huiusmodi tenebris oberrent. Errat, meo
 quidem iudicio, hac in re Leonardus Fuchsius: quippe qui vltimo suorum paradoxorum capite, Spinam albam eam acu-
 leatam herbam appellat, qua omnium in vniuersum aculeatarum platarum generum amplissimis constat folijs, latè humi
 se spargentibus, ac crebris, albisq; seu lacteis tota conspersa maculis. Vnde apud quosdam Lactaria herba nomen adinuenit,
 30 et si a quamplurimu, præsertim mulierculis, Carduus diuæ Mariæ dicatur. Hallucinatur inquã, pace eius dixerim, eo quòd
 non animaduertit, hanc folijs albi chamaleonis triplo, quadruploq; maioribus in campestri planitie nasci, vt nostra te-
 statur Hetruria, vbi passim ferè frequens nascitur, non autem in montibus, ac syluis, vbi Spina alba Dioscoridis testimonio
 prouenit. Legitimam Spinam albam, cuius hic primo loco imaginem expressimus, misit ad me Patavio Iacobus Antonius
 Cortusius, rei plantaria admodum studiosus, qua notis omnibus genuinam representat. Siquidem folijs est albo chamaleo-
 ni similibus, angustioribus tamen, ac candidioribus, subhirsutis, spinis rigentibus: caule verò bicubit ali, pollicari, vel am-
 phore crassitudine, subalbo, & inani: in cuius cacumine echinus subalbidus insidet, sed minor, & oblongior, purpureis in-
 trorsibus, & semine cnico simili. Huic planè descriptioni, qua etiam Dioscoridis est, adstipulantur frequentissima planta
 que sui echinis, ac spinis rigentes, in excelsioribus Anania vallis montibus lariceis, abiegnis, & piceis syluis refertis, Iulio
 mense videntur. Quapropter, vt qua ad eos pertinent, rectè agant seplasiarj, videant, sciantq; non in planitie, & conual-
 40 libus Spinam albam prouenire, sed in montibus: quorum si quandoq; tum cacumina, tum syluas adire non grauabuntur,
 procul dubio non magno etiam labore ipsam nanciscuntur. Hac enim non modò seplasiarj maxime cõducent, vt legitimam
 Spinam albam suis comp. med. immisceant: verum & eorum errorem deprehendent (in hoc etiam Ruellius versatur) qui
 sibi persuadent, Spinam albam illud esse cardui genus, quòd à Tuscis, ed quòd (vt paulo ante diximus) coaguli vicem præ-
 50 stet, vulgò vocatur Presura, quodq; nos Scolimum esse putamus. Est & ALTERA ACULEATA plãta, cuius hic quo-
 que imago secundo loco visitur, quam quidam Spinam albam esse censent, sed plura in hac desiderantur. Error autem is
 facile deprehendetur, si illud adnotare voluerint, quòd aculeata hæc planta in hortis passim seratur, folijs albo chamaleõti
 longè maioribus: & capitula ferat, que marinum echinum non parum excedant. Commiscuit Mesues spinam albam, ac
 etiam Arabicam, quarum alteram suo idiomate Bedeguar, alteram verò Succhaa appellauit, syrupo de eupatorio vocato,
 què miris laudibus extulit ad diuturnas febres finiendas, ad eas præsertim, quibus naturalia viscera, nempe vtericulus &
 60 vter imbecillia sint reddita. & vbi à sua naturali temperie recesserint. Cuius tamen sententia non parum refragatur Mu-
 sa Ferrariensis: quippe qui longo sermone contendat, nec Arabicam, nec albam spinam huic syrupo admiscendam esse, quòd
 vitæ, adstrictoria vi polleat, que (vt ipse ait) syrupo huius intentionibus admodum repugnat, cum ad diuturnas obstructio-
 nes tantum referandas, semper huius apud medicos fuerit vsus. Qua in re non solum ostendit Musa auctoris mentem non per-
 cepisse, sed nec etiam in hoc pace viri alioqui clarissimi dixerim) exactam curadorum morborum rationem calluisse. Nam
 cum Mesues syrupo hunc composuisset ad illas curandas febres, quibus naturalia viscera imbecillia sunt reddita, optima
 componendi methodo tam Spinam albam, quam Arabicam illi inseruit, vt pote que adstrictoria vi, qua pollent, languida
 70 illa ac infirma membra, plurimum roborarent: quibus incommodis solent perire, ac docti medici is medicamentis occurre-
 re, que odore, fragrantia, adstrictoria facultate commendantur. Hinc itaq; facile intelligi posse crediderim, quam absurda,
 explodendaq; sit hæc Musa sententia. Quin nec illud consilium eius seplasiarij accipiendum putauerim, quòd spina alba,
 & Arabica loco, silicula radicem, ac sabina folia huic syrupo substituere possint, & debeant, vt magis atque magis tum va-
 sa, tum viscera laxet. Quippe quòd si tantum laxandi, ac reserandi facultate hoc medicamentum debuisset esse præditum, non
 modo harum spinarum radicibus carere debebat, sed etiam rosis, lentiscina resina, Indica nardo, & malabatbro expoliari:
 cum tamen hac omnia maturè, diligenterq; examinata, non sine methodo, vt qua robur his visceribus allatura sint, ab i-
 80 pso Mesue huic syrupo fuerint admista, ne scilicet natura diuturna febre imbecillis facta, & à relaxantibus, ac admodum
 esculantibus medicamentis vexata, totam humorum molem alui profluuiis, ob contentricis facultatis amissum robur, tan-
 quam viribus omnibus destituta, ad mortem vsque demitteret. Meminit Spina alba Gal. lib. 6. simpl. medic. sic inquit:
 Spina alba radix desiccatoria est, & modicè adstringens. Quamobrem & cœliacos, & stomachicos iuuat, & sanguinis re-
 90 iectiones cohibet, & œdemata illita contrahit, ac dentibus dolentibus prodest, si decocto eius colluantur. Semen tenuis es-
 sentia & calida facultatis est. Itaque potum is, qui conuelluntur, conuenit. Quæ planta Α'καρδα λευκή Græcè, Spina alba
 Latine dicitur: Arabicè, Bedeguard: Italicè, Spina bianca.

Spina alba
confid.

Monachorū
error.

Fuch. lapsus
circa Spinam
albam.

Carduus D.
Mariæ.

Spina alba
legitima.

Quorundam
error.

Spina alba
altera.

Brauanoli ca-
lumnia con-
tra Mesuem
depulsa.

Spinae albae
vires et Gal.

Nomina

Circa Spinam albam non leuis cõtrouersia, alibi tractanda. I. que hic primo loco posita in primis non
 habetur editionibus, at in duabus, vbi maiores figuræ, Spina alba altera dicitur: in Italica edit. titulus est,
 Spina alba & nigra: in compendio prætermissa, quare nomine Spinæ albæ alterius Matth. Lugd. historia
 pinxit, Spinam albam Penæ, pronunciando. II. Quæ verò Spina alba altera Matthiolo nominatur, in
 primis editionibus, vt & compendio, pro Spina alba pingitur: editione verò Italica, Spina alba quorundã
 nominatur: dicitur Chamæleõ verus, Trag. Chamæleon niger, Fuch. fol. Spina incognita, eidem in icon,
 Spina peregrina, Dod. gal. Carduus Sphærocephalus, Cord. hist. Dodo. fol. Tab. Crocodilium, Lac. an &
 Cord. in Diosc. Echinopus aliquibus, Spina alba, Ges. hor. Spina alba putata, Camer. ad Matth. Chalceios
 Theop. & Plinii, Lug. Tetralix spinosa, eidẽ. Crocodilium Fuch. & Cordi, Lob. in obser. Ritro seu Ruro
 Theoph.

Theoph. Lob. icon. Huius & alteram speciem Cam. addit suo Matthiolo, quæ à præcedenti potissimum floris colore, qui cæruleus est differt, & quod illo humilior, foliaque candidiora & angustiora habeat.

Ἄραβια ἀραβικὴ.

SPINA ARABICA.

CAP. XIII.

α ποῖος πολὺν
γλυκύτητον.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similē esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, a mentium abundantiam, cæterasq; fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

* SPINA ARABICA.*

Spinam Arabi-
cā non esse
Acaciām.

Ruellii hal-
lucinatio.

Plinius de
Spina Arabi-
ca.



I. CARDVVS ACVLEATVS.

Spinæ Arabi-
cæ vires ex
Galeno.

Nomina.

† Orib. με-
ταξύ χαμα-
λέοντος καὶ
λευκῆς ἀρα-
βικῆς. i. inter
chameleonē,
& albam spi-
nam.

α Cat. μικρὸν
i. paruum, sed
mendosè vt
puto.

β Cat. λευκῆ.
i. alba.



Errasse eos nimirum crediderim, qui sibi persuaserunt, Arabicam spinam, cuius hic meminit Diosc. eam aculeatam Arabia esse arborem, quam Acaciām vocant. Cuius erroris illud in primis indicium est, quod nusquā cōsueuerit Dioscorides alicuius stirpis historiam diuersis capitibus repetere, nec etiam arbores herbis commiscere. Nam cum longa historia Acaciām arborem, qua etiam Aegyptia spina vocatur, primo libro inter arbores descripserit, absurdū quidem videretur, si eandem præter morem hic inter aculeatas herbas repetere. Ad hoc indicium & illa ratio accedit, quod si seorsum harum plantarum historiam tradidit Diosc. diuersas quoque plantas esse necesse est. Quamobrem non parum Ruellius hallucinatus deprehenditur, quod non animaduertit, in sua huiusce Arabica spina mentione, Dioscor. hoc loco aculeatam quandā Arabicam herbam, alba spina in vniuersum emulam intellexisse, non autem (vt ipse putat) Acaciām nuncupatam. Qua in re non satis virum hunc admirari possum, quippe qui nō modò & Græcis & Latinis literis sit habitus peritissimus, ac inter eos, qui hac nostra ætate de stirpium historia scribere facile princeps, sed qui etiā Plinij historia fuerit studiosissimus: quem tamē si accuratius perlegisset, ac sequi voluisset, nunquam arbitror in eum errorem incidisset. Quandoquidem Plin. lib. 24. ca. 12. alteram ab altera separauit, & primò huius, de qua agimus, mentionem faciens, sic inquit: Spina Arabica laudes, in odorum loco diximus: & ipsa stillas, stringitq; distillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensuramq; abundantiam, etiamnum radice valentior. Quæ à Dioscoride verbotenus translulisse perspicuum est. Mox meminit Arabica alterius spina, qua in arborem assurgit, his verbis: Est & Acacia spina. Fit in Aegypto alba, nigraq; arbore, item virdi, sed longè melior est prioribus. Eiusdem meminit etiam lib. 13. ca. 9. postquam Persea arboris materiam miris laudibus commēdauit, vbi hac habet: Nec minus Aegyptia spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam 40
pn aquis durat: candida verò facillè putrescit. Quibus ex locis valam est, non credidisse Plinium, vnā tantum Arabicam, iel Aegyptiam esse spinam, quamuis Ruellius non ita rem acceperit. Qui item Gal. sententiam hac in re non animaduertisse videtur: siquidem Gal. lib. 6. simpl. ar. ed. ita scribit: Spina Arabica radix profluum muliebri iuuat, & alia quæcumque, quibus auxilio est qua apud nos nascitur spina: sed efficacius tamen omnia iuuat tum radix, tum fructus ipsius. Hic verò & columella prodest, & iis, quæ in sede inflata sunt: in vlcera ad cicatricem ducit, mediocrem habens, & non molo- 50
stam adstrictionem: hac Galenus. Qui vt has plantas diuersas habuit, ita etiam seorsum de earum viribus differnit. Plin. 1. ἀραβια ἀραβικὴ Græcis dicta, Spina Arabica Latinè pariter & Italis appellatur: Mauritanis, Suchaha.

Quam pro spina Arabica figuram adiecimus, Spinam Arabicam Diosc. & Plinii censet Cæsar Aduersaria & Lob. Carduum tomentosum nominant: Suchaha Arabum, Guilandino dicebatur, de qua in historia.

Σκόλεμος. **CARDVVS. CAP. XIII.**
Carduus, Græci scolymon vocant, † folia chameleonis habet, & albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem a longum edit, foliosum, capite spinoso: radice b nigra, & crassa. Quæ illita graueolentiam alarum, totiuq; corporis emendat: item si decocta in vino bibatur: copiosam autem vrinam, foetidamq; expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, alparagi modo, transit.

Et si vnum tantum Cardui breuiter etiam hoc loco meminerit Dioscorides, Theophrasto tamen, Plinio, ac alijs probatis Carduorum auctoribus, plura Cardui genera traduntur. Verum vt primum de his, qui natura cultrice sponte proueniunt, sermo fiat, si re sane conuenit, quod eorum diuersa sunt genera: quorum tamen nomina propria, quod sciam, non habentur. At qui Plinio lib. 20. ca. 23. duo tantum eorum genera produntur: vnum fruticosus statim a terra: alterum vero vnicauale, & crassius. Satiuorum autem, qui tum in hortis, tum in agris feruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hetruscus vulgò vocantur Cardoni. Namque ij diligenti cultura adeò teneri, fragiles, albique euadunt, vt magno quidem apparatu, secundis coenis pro bellarijs cum sale, & pipere expetantur. Quo argumento ductus, equidem putauerim de his verba fecisse Theophr. istum libro 6. cap. 4. de plant. vrum historia, cum ita scribit: Quæ autem Cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, Græcia nusquam habetur sui generis planta: hac enim statim ab radice caules repentes in terram mittit, folio lato, atque spinoso: caules hos Cactos appellant, desquamati cibo idonei sunt, paulo amaricantes: & reseruare hos aqua salsa conditos consueuerunt: hac Theophrastus. Nostrates, quibus vbique nunc Hetruria scatet, eò ex Neapoli allati fuerunt, Neapolim verò (vt audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere maximè conuenire videntur, quod scripserit, Cactum Sicilia peculiarem esse plantam. Carduus ACVLEATVS folia gerit non aculeato magna diuisa, magusq; laciniata, tenuibus circumdata spinis, caulem quoq; alteri similem, striatum, subalbicantem, in cuius summitate echinatum, aculeatumq; extuberat caput, flore hyacinthino: semine Cnici minore. Radice nititur crassa, firma, non infuui. Colitur in hortis ad mensarum bellaria. Idem prestare potest, quod alter. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ij, quos in Italia Hetruscum vulgus appellat Carcioffi, alijs verò inibi Archiocchi dicuntur, quorum item meminit Theophrastus eodem loco, cum subdit: alium verò caulem erectum producit, quem pternicem vocant. Is quoque cibus apud extorescit, sed reseruari non patitur: fructus in quo semen, echinata specie est. Verum exemptis lanuginosis seminibus, quoque rescendus relinquitur, & cerebro palma similis est: hætenus Theophrastus. Qui pro palma cerebro illud, quantum equidem reor intelligit, quod Galenus encephalon pluribus in locis appellari tradidit, & quod nunc corrupta voce Neapolitanus, & Siculis vulgò vocatur Cefaglione, de quo libro primo in Edelly mentione abundè differuimus. Carduorum autem, quos vulgò Carcioffi vocari diximus, nobis plura sunt genera, varia capitum forma distincta. Siquidem proferunt omnes echinata capitula, sed aliqui spinis sursum respicientibus constat, alij verò ad terram versis, nonnulli etiam tam in foliis, quam in fructu aculeis vacant, ob idque ceteris in cibus præstant. Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longum fastigentur, quibus verò in globum extuberent, dehiscentibus in altero squamatim spicis, in altero iisdem squamis, veluti corticosis ringuibus in vnum compactis, & coagmentatis, nucis pinea instar. Spinis carebunt, vt hortorum cultores testantur, Carduorum capitula, si priusquam seratur semen, acuminata eius latera retundantur. Sine aculeis etiam nascuntur, si delibratis lactuca radicibus, & dissectis semina integra condantur. Vnde illud facile potuit factum esse, vt ij, qui aculeis non rigent, humano cultu mitiores euaserint, cum natura Carduorum omne genus spinis vacare nequeat. Carduus

Carduorum cõsideratio, & genera.

Cardoni.

Cactus Theophrasti.

Cardui carcioffi.

Palma: Cerebrum quid.

Carcioffi genera.

II. CARDVVS NON ACVLEATVS. III. CARDVVS VVLGA.



qui ACVLEIS caret, folia promit grandia per ambitum laciniata, auersa parte subalbicantia, numerosa que: caulem edis longum, foliosum, capite echinato, sine aculeis tamen: & quadantenus pini cono simile. Seritur passim in hortis & viridarijs. Radicum decoctum potum hydropicos, & ictericos sanat. Echini nondum florescentis pulpa, è carniū iure decocta, pro bellarijs vtimur, vna cum sale & pipere, & qui veneri indulgent, galangam quoque addunt. Itali rarò decoquunt, sed echinata capita cruda cum sale vorant. Cardui meminit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum: nec tamen plura de e- Cardui vites ex Gal. ijs vrbibus tradidit, quam fecerit Diosc. Sed de temperamento differens, ei caliditatis secundū ordinē completum, aut ter- tium incipientem siccitatis verò secundum assignauit. Et libro 2. de alimentorum facultatibus, Carduum Cinarum ap- pellauit,

Nomina

pellauit, ac alimentum, quod corpori prabet, merito damnauit, quod melancholicum succum generet. Σκόλιμος ea planta est Græcis, qua Latinis Carduus, Cinara, & Strobilus nominatur: Arabibus, Raxos, Harxos, siue Sacolomas: Italis, Cardo, Carcioffo: & Archichiocco: Germanis, Strobildorn: Hispanis, Cardo de comer, seu Cardos: Gallis, Artichault, & Carciophe. Carduus aculeatus, Græcis Σκόλιμος ἀκακθίδης: Italis, Cardo & Carcioffo spinoso.

Scolymus satius est & syluestris: Satius duplex, aculeatus & non aculeatus, & rursus capitis figura nunc oblonga, nunc rotunda, hæcque; maximum, mediocre & paruum, cuius squamæ in aculeum definiunt breuem, nunc robustum, nunc infirmum, nunc propè nullum: quorum color nunc subrubens, nunc viridis. Dicitur Carduus Plinio, Cinara Galeno & Columellæ. I. Scolymus aculeatus, C.B. Tab. Scolymus, Trag. Fuch. Cord. in Diosc. & hist. (cui & Carduus satius) Lob. (cui & Cactos Theophrasti) Cam. Carduus aculeatus, Matth. Carduus Lacu. Carduus hortensis spinosus, Ges. hor. Cast. Carduus Scolymus, Lon. Carduus altilis, Lug. Cactus, Matthioli eidem. Cynaræ aliud genus, Dod. gal. Cinara, Dod. fol. à Cinere, vt habet Columella, quo stercoreari amat. Cardones Cæsalpino. II. Scolymus non aculeatus, C.B. Tab. Cardui alterum genus sine aculeis, Trag. Carduus non aculeatus, Matth. Carduus aut Scolymus non aculeatus, Lonic. Carduus hortensis non spinosus, Cast. Carduus hortensis, Scolymus Cactus, vel Cinara vulgo Artischau, folijs sine spinis, Ges. hort. Carduus satius, Cæsal. Cinara, Dod. gal. Lac. Cinara non aculeata, Lug. sæpè ex vno semine vtraque; prouenit, vt speciatim aculeata ex semine non aculeati: quamuis & maiore & minore habeatur semine. III. Carduus vulgaris Matth. quem in compendio omisit Lugd. Carduus vulgarissimus viarum, & Onopyxos Guilandino, Lob. Carduus syluestris alter, Dod. fol. cui & Scolymus Plinij, Scolymus syluestris, Cam. ad Matth. Heracantha Tabernæmontano.

a Meū dape-
vixco; ἐστὶ μὲ
γας. ita ha-
bet meum.
Sed Catac.
Θάμνος μέ-
γας.
b Orib. ἀμ-
μίδης. i.
arenosis.

Ποτήριον

POTERIVM.


CAP. XV.

Poterium, Iones neurada vocant, a largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto, & odorato. Nascitur in baquosis, & collibus. Radices demittit binum ternumue cubitorum, neruosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisus neruis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest

Poterij consi.

POTERIVM.

Cornarij opi-
nio falsa Pru-
num sylue-
stre Potericū
credenti.
Poterij vires
ex Gal.



Nomina.

Poterium adeo Tragacantha proximum habetur, vt illi omnibus suis notis congener esse videatur. Peculiariter autem supremos ramos habet in vertice extuberantes, & tenui lanugine obductos, quod in Tragacantha non visitur. Plantam itaque quam hic pro Poterio appinximus, misit ad me Constantinopoli Clarissimus Augerius de Busbecke Cæsaris Ferdinandi Orator apud Solimanum Turcarum imperatorem. Sed hic nobis admodum mirari subit Ianum Cornarium, virum alioqui atatis nostra insignem, quod prunum syluestrem Poterium esse crediderit. Quæ certè sententia, vt est meo iudicio absurda, ita non im- merito à Fuchso medico clarissimo refellitur. De Poterio scripsit Galenus libro octauo de simplicium medicamentorum facultatibus, his verbis: Neuras, quidam Poterium vocat. Desiccandis absque morsu facultatem possidet, adeo vt & neruos incisos glutinare credatur. Radices eius potissimum sunt eiusmodi: quin & decoctum earum quidam exhibent ijs, quibus affecti sunt nerui. Id Græci ποτήριον, quod item Poterium Latini vocant Itali, Poterio.

Poterium Matth. Cast. Lugd. Tab. videtur eadem cum ea quam Clusius historia Hisp. pro Tragacantha altera proposuit, & an Poterium sit dubitat, quem sequutus Lob. & Lugd. Tragacantham alteram, siue Poterium Clusij nominant, & Tragacanthæ secundæ nomine Tabernæmontanus exhibet, sub quo nomine & Bellonius lib. 1. obser. 17. referre videtur.

Ακανθίδιον. ACANTHIVM. CAP. XVI


Acanthium albæ spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, † & lanugine araneosa obductis, ex qua collecta, & neta, vestes bombicinis similes textit

Folia, vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acanthii cō-
sideratio.

Si plantam Italia nascitur, qua legitimum Acanthium representet, hæc profecto, cuius hic imaginem expressimus, Acanthium mihi rectè representare videtur. Siquidè folijs est & albæ spinæ per extremitates aculeatis, & araneosa lanugine obductis. Id quod non nobis tantum opinionem auxit, sed alijs quoque, rei plantaria studiosis. Nascitur in montibus & la-

ACANTHIVM.



L ACANTHVS.



in cultis. Versantur magno in errore qui pro Acanthio quanda Cardui motani speciem, echino lanugine quadam obducto, demonstrant. Nam praterquam quod hac folia habeat nulla lanugine velata, nullo pacto qua echinatum capitulu circue-

stis, depecti, vel neri potest, vtpote qua tenuissima sit, sine vilis, fragilis, ac omnis lentoris expers.

Quod Graci ἀκανθίων, Latini similiter Acanthium, & Itali Acanthio dicunt. Verba illa de lanugine non leguntur in vulgatis Gracis Dioscoridis exemplaribus: qua tamen hic desiderari ostendit abruptus auctoris sermo. Vnde ea non temere ex Plinio adiecerunt interpretes, eius tantum, vt puto, auctoritate freti. Nos vero eo audacius illa addenda putamus, quod ea legantur in Oribasiy codice manu scripto, in quo ex probatissimo Dioscoridis libro ita transcripta inueniuntur, καθὰ ἀραχνόεις ἢ ἐπιχρῶς, qua ad verbum sonant: circa qua araneosa est lanugo. Id quod meum quoque exemplar manu scriptum habet, vt ex apposita in margine patet.

Spina alba syluestris, C.B.Fuch.Lon.Spina alba tertia, Trag.Spina alba, Cornaro.Acanthium Matth. Dogal.& fol.Lob.Cast.Lugd.Cam.cui & Onopordon alterum.Acanthium vulgare, Taber.Silybum siue Leucacantha Loniceri, eidem. Carduus syluestris, polyacantha Theophrasti, Casal. an Onopordon Athenæi, Anguillaræ. Flore albo & purpureo variat.

ACANTHVS. CAP. XVII.

Acanthus, † Romani paderotam vocant, nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora. cruce diuisura, nigricantia a pingua, læuia, caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope verticem ex interuallis circundarum foliolis, b ceu nucamenta quadam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie: radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ vstis igni, & luxatis artubus illita subueniunt: potæ vrinam ciunt, sed alium cohibent: ruptis, cõuulsis, tabem sentientibus, mire profunt. Nascitur & syluestris Acanthus scolymo similis, aculeatus, breuior quam satius, & is qui in hortis prouenit. Cuius radix ad eadem ad qua superior efficac.

Redunt omnes ferè huiusce temporis rei herbaria studiosi, Acanthum eam esse plantam, qua nobis vulgò vocatur Branca orsina: quorum sententia nec prorsus refragari, nec planè ad stipulari possum. Nam etsi in eorù opinionem multu adducar rationibus, non solum quod y magna sint apud me auctoritatis, sed etiam quod ipse viderim hanc, qua Branca vrsina dicitur, folijs lactuca latioribus, longioribusq;, eruta modo lacrimatis, nigricantibus, ac molli quodam lauore pinguis: caule item læui, bicubitali, pollicari crassitudine, per interualla sub ipsum v; que verticem foliolis quibusdam oblongis, veluti nucamenti, circumdato: è quibus flos prodit candidus, & inde semen oblongum luteumque: atque etiam radice eadem constet, qua Acanthus: aliqua tamen relinquatur dubitatio, an Branca vrsina legitimus sit Acanthus, cum foliola, qua nucamenti instar illius caulem cingunt, nullis spinis horrida conspiciantur, planta que ipsa videatur topiarijs operibus inepta: ad qua Acanthus olim (vt Plinius libro & cap. 22. auctor est) conueniens habebatur: ac etiam ea hodie ab omnibus ferè negligatur, & veluti ignobilis planta, in perpau-

† Ori. ἡ μέλας φύλλον ἢ παίδερος. i. vel melaphyllos, vel paderos. a Meum λη παρά λειαν. i. pingua læuia sed Ca. λη παρά λειαν. i. pingua valde. b Meū, & Ca. διορεῖ κισσῆς ρίσις ἐπιχρῶς ἢ κισσῆς ἢ σακκῆς ἢ θάλασσης ἢ ὄντο ἀνθος. i. velut pileolis oblongis, hyacinthinis, ex quibus flos. Acanthi

Branca vrsina an legitimus Acanthus.

bus fuerit decantatus. Neque illud sushicionem nostram diluit, quod dixerint aliqui Acanthina folia, qua in quibusdam Italico locis marmoris columnis, praesertimq; Corinthias imitantibus, insculpta reperiuntur, nulla prorsus linea a Branca vrsina

vsina folijs differre. Siquidem contra ijs qui spiam facile respondere possent, quod et si vtraq; eandem retineant formam, non ob id tamen ne essario vnam, & eandem speciem representant. Quare quem admodum dubium est asserere, Brancam vsinam ab Acantho non differre: ita idem negare vitium esse videtur. Caterum ad hanc tollendam dubitationem illud non parum, meo iudicio, facit, quod iisdem facultatibus Branca vsina prae dicitur sit quibus pollere Acanthum Dioscorides, & Galenus memoria prodiderunt. Illud insuper addiderim, quod et si dicat Dioscorides, oriri Acanthum caule foliolis spinosis, & aculeamentis, prope verticem vsque ex interuallis circumuectis, potest tamen intelligi, quod non re vera foliola illa aculeum horrent, sed quod adeo acuminata erumpant, vt sanè spinis persimilia videantur. Quinetiam cum Plinius duo Acanthi genera faciat, libro 6 capite vigesimo secundo, alterum crispum aculeatumq;, alterum laue, quod aliqui paderotam vocant, alij melamphyllum, mirum non esse debet, si acanthus, quae in nostris habetur viridarijs, nullis rigeat aculeis. Id quod facile credi potest, cum cateris omnibus notis Branca vsina Acantho à Dioscoride representato adamusim respondeat. Neque impedit, quod loco citato asserat Plinius, Acanthum in hortu crepidinis marginum, assurgentumq; puluinorum toros vestire. Quamuis enim necti haud facile ex se valeat, tamen tum caulis, tum folia ob eorum mollitiem, lentoremq; adeo flecti queunt, vt viximo aliquo nexu topiario operi etiam non incommodè aptari possint. His itaque rationibus innixus, eos equidem non aberrasse existimo, qui Acanthum, & Brancam vsinam, vnam & eandem plantam esse scriptis tradiderunt. Reperitur & syluestris Acanthus, carduo (vt Dioscorides inquit) similis, spinosus, folijs tamè domestico angustioribus. Quocirca non ab re Plinium quoque duo Acanthi genera constituit. Caterum quoniam scribit Dioscorides Acanthum Romanis paderotam vocari, praetermittere sanè non potui quin lectorem admonerem apud Graecos paderotam aliam quoque esse plantam, vt testatur Pansanias libro secundo descriptionis veteris Graeciae, vbi sic habet: Nascitur Paderos herba intra septem Veneris, apico loco, neque alibi vsquam prouenit, ne in ipsa quidem Syria. Folia ei minora fagi, ilicis maiora, forma eadem fere cum quercus folio, altera pars subnigra, alba altera, neque omnino dissimilis color ei, qui in alba populi folijs cernitur. Acanthi meminit Galenus libro 6 simplicium medicamentorum, sic inquit:

II. * ACANTHVS SYLVESTRIS spinosus. *

Acanthi duo genera Plini.



Acanthus syl. Spinolus.

Paderos Pausan.

Acanthi facultas ex Gal. Nomina.

ens: Acanthos, alij quidem Melamphyllum nominant, alij verò Paderota. Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinent. At radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium. Planta, qua Graecè ἀκανθος, Latine similiter Acanthus nominatur: Italicè, Acantho, & Branca orsina: Germanicè, Barentlatw: Hispanicè Terna giguante, & Branca vsina: Gallicè, Branque vsine. Qua verò Graecis ἀκανθα ἀγρία, Latinis Acanthus syluestris vocatur: Italis, Acantho saluatico.

Acanthus siue Acantha, Branca vsina officinis dicitur, à similitudine, quam eius folia cum anterioribus vsorum pedibus habeat. Hæc duplex, folio non spinoso & spinoso. I. Acanthus satiuus læuis, C.B. Acantha inter herbas Theophrasto, vbi Spinam Gaza vertit: Acanthus mollis, Virgilio. Acanthus verus, seu Branca vsina Italica vera, Trago. Acanthus, Matth. Cord. in Diosc. Lacu. Anguil. Lon. Cast. Cæsal. Acanthus vera, Fuch. Cam. Acanthus satiuus, Dod. gal. & fol. Gef. hort. Lob. Lugd. Taber. II. Acanthus syluestris spinosus, C.B. cuius obiter hoc loci Matthiolus meminit, Acanthus syluestris Scolymo firmis aculeatus Dioscoridis, Lob. obs. Acanthus syluestris, Dod. fol. (cui propriè ἀκανθα Spina dici potest) an & Anguil. Branca vsina aculeata Lugd. Chamæleonta Monspeliensium, Lob. in iconibus. Hic caule floribus, & colore & forma, tum & semine satiuum refert, nisi quòd sit humilior: folia ampla quidem sed satiuus angustiora, multis incisuris laciniata, frequentius duris spinis circa margines horrentia. Circa Monspeliem obseruauimus: sunt qui in quibusdam maritimis Italiae prouenire testentur.

† Lenticulae non leg. Orib.

Ca. 1. subal. tibus.

† Ori. an. i. iniucundis

† Ori. add. rura, aut pratenis loti folia accedentibus, subhirsutis, a odoratis, non † iniucundè olentibus. Muria conditur, antequam spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit † candidam, quæ excalfacit, b & extenuat: huius cortex ex vino potus vrinam ciet, calculos comminuit, margines vlcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collatione mitigat. c Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

b Meum non habet neque Cat.

c Meum non habet neque Cat.

Anonidis consideratio.

Resta bouis.

Ανονίς, ἢ ὄνονις.

ANONIS, SIVE ONONIS. CAP. XVIII

Nonis, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantaes, aut maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis: folijs † lenticulae, tenuibus, pusillis, ad rura, aut pratenis loti folia accedentibus, subhirsutis, a odoratis, non † iniucundè olentibus. Muria conditur, antequam spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit † candidam, quæ excalfacit, b & extenuat: huius cortex ex vino potus vrinam ciet, calculos comminuit, margines vlcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collatione mitigat. c Decoctum eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

Nascitur Anonis in pratis, cultis, atque etiam incultis locis, arido praesertim solo: folijs tenuibus lentis modo, pusillis, quadruata, vel pratenis loti effigiem proximè accedunt, ac ceteras omnes notas refert, quibus à Dioscoride depingitur. Rusticis ob id notissima est, quod non modò suo ramorum, ac radicum implexu, atrata inuitis bubulcis in medijs agrorum sulcis sapius remoretur, vnde Resta bouis compluribus nominatur: sed quòd etiam messoribus, & saniscis spinis suis acutis admodum

L. ONONIS.

* II. ANONIS NON SPINOSA PURPUREA. *



admodum sit infesta. Nam etsi pradura, callosa q̄ sit eorum cutis, eam tamen suis perforat aculeis, quibus quasi spiculis, cum maturerit, horrida conspicitur. Insubres hanc vulgò Bonaga vocans. Caterum quamuis floris eius nihil meminerit Dioscorides: constat tamen flore plerunq̄, purpureo subalbicante, interdum tamen aureo. Sed hac quibusdam in locis aculeis vocat flore melino, quanquam in aculeata purpureus flos perpetuò spectetur. Eandem floribus albis vidimus nos parumper extra Pragam, via qua itur ad Diuam Margaritam. Meminit Anonidis, ononidis nomine, Theophrastus li. 6. ca. 5. de plantarum historia, sic scribens: Ononis ramis aculeigera est, anno tantum perdurans, folio ruta similis, sed per totum caulem opposito, ut veluti coronam ex interuallis tota species representet. Florem minutulum, & in siliqua non vndiq̄, septum edit. 4^o Nasitur glutinoso latoq̄, solo, & precipue in segetibus, atq̄, cultis, qua de causa agricolis inimica exit. Viuax admodum est: cum enim altam nocte tellurem fuerit, protinus sua infima pellit: & singulis annis, surculis in latus emissis, rursus postero anno deorsum versus pellere solita est. Ideoq̄, effodienda tota, extirpandaq̄, penitus est. Incipit germinare aestate, perficiturq̄, autumno: hactenus Theophrastus. Huius quoq̄, mentionem fecit Plinius li. 27. cap. 4. vbi sic inquit: Anonim, quidam ononida malunt vocare, ramosam similem feno Græco, nisi fruticosior, hirsutiorq̄, esset, odore iucundo: post ver spinosa: hac Plinius. Qui tamen hac in re errasse deprehenditur: siquidem non post ver Anonis spinosa redditur, sed (ut Theophrastus auctor est) in autumno. Id quod etiam experimento comprobatur. Anonidis radix vim maximam praestat ad renum calculos comminuendos, expellendosq̄, obstructis praesertim vrinae meatibus: quod multorum testimonio compertum est, qui calculo affecti, vbi tantum radice corticum puluerem ex vino diutius bibissent, pristinam sanitatem recuperarunt. Noui ego quendam, qui huiusce radice puluere duntaxat pluribus mensibus sumpto, carnosum ramum absumpsit & sanatus est: licet à medicis nulla alio medicamento, quam sola sectione vstoneq̄, hunc curari posse antea statutum esset. Eroduntur radice puluere callosi ac indurati vlcera margines. Decoquitur eadem ex posca vtiliter ad dentium dolores, mulcet enim hos, vbi iure collatur, & praesertim vbi pituita redudet. Sunt qui putent sanari hemorrhoidas epoto tantum radicum decocto. Caterum id, ut mihi compertum est, praestat potum summopere ad Iocinoris, & vasorum infarctus. Fit è radicibus aqua, qua non solum calculos expedit renes: & vrinam prouocat, sed etiam vesicam, & eius ceruicem glutinosi excrementis obfessam expedit. Sumuntur Corticum recentium radicum libra quatuor: ha minutim concisa, in vini Cretici libris octo macerantur, deinde vitreo alembico in aqua calenti balnei collocato, elicitur aqua, qua in praescriptis affectibus plurimum praestat, pota semilibræ pondere. Anonidis vires descripsit Gal. li. 8. simpl. med. sic inquit: Ononis radicem habet tertio quadantum ordine excalfacientem. Cortex eius maxime est vtilis, habens quippiam & abstersorium, & incisorium. Proinde non tantum vrinam prouocat, sed & lapides cōstringit. Eadē facultate & crustas cito detrahit. Vtuntur porro ea quoq̄, & ad dentium dolores, in exocrato decoquentes, & collui decocto iubentes. Huius planta nomen Græcum est ἀρώνις, & ὄνωνις, Latinum item Anonidis, & Ononidis: Italicum, Anonide Germanicum, Hauthebell vnd Stalltraut: Hispanicum, Gatilbos, & Gatibos: Gallicum, Bugraues, & Burgrundes: Bohemicum Gebbice: Polonicum Tglica, siue listogon.

Bonaga.

Anonidis h̄stor. ex Theophrast.

Plinij lapsus.

Anonidis vires Marth.

Aquæ Anonidis vires.


Anonidis vires ex Gal.

Nomina.

Anonis Dioscoridi & Plinio à non iuuando, siquidem aratoribus impedimento sit, vnde Remora aratri, at Theophrasto & Galeno Ononis, quoddam asinos ad illam sese terentes iuuet. Hanc distinguimus in spinosam & non spinosam: spinosam in purpuream, eamque maiorem & minorem, luteam, albam: non spinosam verò in purpuream & luteam. I. Anonis spinosa purpurea, C.B. Resta bouis, Trag. Lonic. Anonis siue Ononis, Marth. Lac. Tab. Anonis, Fuchl. Dod. gal. & fol. Cast. Ononis, Gef. hor. Cord. in Diosc. Anguil. Lob. Cæfal. Thal. Lugd. Ægyptos Crateux, Anguillatz. II. Anonis non spinosa purpurea, C.B. Tab. Ononis perpetuò læuis, Gef. hor. Anonis non spinosa siue mitior prima, Clus. Pan. cui & trifolium facti.

foetidum. Anonis siue Ononis sine spinis, Cametario. III. Anonis non spinosa lutea, C. D. Hæc ex radicibus

* ANONIS NON SPINOSA lutea.*



a Meum πρ-
xπar iγg ypa-
i. amaram val-
da

ce parua, lignosa & fibrosa, caules emittit pedales & altiores, ramosos, geniculatos, hispidos, vinctuosos, quos folia multa lata basi alternatim amplectuntur, plerumque quina, interdum etiam ternia ex eodem pediculo prodeuntia, quæ molliora & longiora, quam vulgaris, in summo obtusa & crenata, salsuginosa. Flores in summis cauliculis breuiore spica nascuntur, luteopallidi, leguminum specie quibus succedunt siliquæ oblongæ hirsutæ in capreolum finientes, quibus semē pullo colore includitur. Tota planta lento & vinctuoso humore obsita est, non tamen adeo grauius odorato, ita vt attritanti quasi manus visco retineantur, & vbi sponte nascitur candidior, quam si in hortis colatur. Hanc passim circa Monspelium ad agrorum margines, & inter segetes obseruauimus: in Hispania & Lusitania quoque reperitur. Dicitur Natrix Plinij herbariorum, Lobel. cui & Melilotus syluestris pinguis Pennæi. Ononis lutea montana, Cam. ad Matth. Ononis lutea non spinosa, Lugd. Anonis mitior flore luteo, Clus. hist. Pann. qui Hispanis Ciceris genus existimari scribit.

Λευκάκανθα LEUCACANTHA
CAP. XIX.

Leucacantha, prædita est radice cyperi, & valida, & amara. Quæ manducata dolorem dentium sedat, veteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potio. Eadem ruptis, & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eisdem præbet effectus.

IN manifesto errore verjantur, qui sentiunt, Leucacantham, hoc est albam spinam, de cuius historia, & viribus hoc capite tractatur, ab Acantha leuce, id est, spina alba, de qua paulo superius differuimus, nullo pacto differre. Quæ in sententia, vel potius errore, fuere nonnulli ex recentioribus, alioqui rei herbaria periti. In quorum etiam numero Ruellius fuisse ex eo maxime deprehenditur, quod cum debuisset, more suo, post Anonidis tractationem, cuius titulo spinam albam quoque adiunxerat, quam tamen albam nominasse rectius forte erat, eiusdem alba spina historiam referre, ex industria eam silentio præterijt. Nam cum existimasset, alteram ab altera non distingui, non opus esse iudicauit, earum historiam in Alba spina repetere, quam antea in spina alba mentione tradiderat. Quo tamen in loco ab errore vindicari non potest: quippe quoniam postquam spina alba, quam Mauritanii Bedeguar appellant, meminere, alteram eius nominis spinam subdidit: quæ cum in arbusculum vndiq; aculeis armatum assurgat, sepibus extruendis rusticis nostratibus maxime expetit. Non tamen ob id declarat ipse hanc esse Leucacantham: sed lubrico quodam lapsu, quasi sui ipsius, & cuius spina alba mentionem faceret, oblitus, in capituli calce aculeata illius arbusculi radicibus, quæ (ni fallor) candida est Dioscoridis thamnus, omnes tribus facultates, quibus legitima spina alba à Dioscoride commendatur. Qui quidem Ruellij error omnibus euidentior est, quam vt pluribus refelli postulet. Quod autem differant inter se Acantha leuce, & Leucacantha, non modo Dioscorides inter ceteros simplicium medicamentorum scriptores facile princeps ostendit: sed Galenus etiam, & Paulus, qui præterquam quod alteram ab altera diuersis capitibus distinxerunt, earum singularem differentibus facultatibus præditam esse tradiderunt. Quorum sententia subscribit Plinius: nam de Acantha leuce differens lib. 24. ca. 12. sic inquit: Spina alba semen contra scorpiones auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Sed vires longè alias ab his Leucacantha idem retulit lib. 27. ca. 10. vbi sic habet. Leucacantham alij phyllon, alij ischiada, alij polygonaton appellant, radice cyperi, quæ commanducata dentium dolorem sedat: Item laterum, & lumborum (vt Hicelius tradit) semine potio drachmis octo, aut succo. Eadem ruptis, conuulsisq; medetur: hac Plinius. Quæ quidem vidisse debuerat Ruellius, alioqui Pliniana historia studiosissimus: aut certe Hermolao doctissimo viro credidisse, à quo (etsi nunquam illum citet) integra quandoq; capita, imò (pace eius dixerim) integrum fere surripuit opus, ita vt in omnibus illud suum fecisse videatur. Siquidem Hermolao, cum in Leucacantha, tum alias sapenumero commonuit in suo Corollario, hanc ab acantha leuce differre. Porro illud etiam nobis silentio non dissimilandum, vt ingenuè quod sentimus de simplicibus dicamus, quod Leucacantha herba est, non autem arbuscula sepibus conficiendis idonea, vt falso, mea quidem sententia, Musa Brasauolus suo de syrupis libello in eupatorij syrupo existimat. Nam hoc loco de herbis tantum, & non de arbusculis scribit Dioscorides: qui nimirum in stirpium historia peritissimus, arbusculam illam supra libro primo inter Rhamni genera descripsit, & sub candido, vt puto complexus est. Ceterum cum nec Dioscorides, nec Plinius tradant, quibus folijs, quo caule, flore, ac semine Leucacantha proueniat, difficile quidem fuerit inter tot aculeatarum stirpium genera, vnam secernere, quæ verè Leucacantham representet: tamen si damnandus vsquequaque non esset, qui dixerit Leucacantham esse fortasse aculeatum illum Carduum, de quo in Acanthaleuce diximus, cuius folijs albis quibusdam maculis depinguntur, vnde illi nomen apud Italos est lacteus carduus, & apud alias nationes Maria carduus. Nam præterquam quod coniectura quadam dici posset, eam à maculis illis albicantibus sibi Leucacantha nomen adinuenisse, radicis etiã ipsius tū durities, tū amaritudo, et si forma cyperinas non amuletur, cōsentire videtur. Sed hoc potius disputandi, quæ asserendi gratia proponimus: cum adhuc haud vlla nobis comperta sit plāta, quæ legitimam Leucacantham representet. Ceterum cū hac CARDVVM, quem quidam Dina Maria, alij Lactariū ab albis maculis vocant, in mentem reuocauerit, non ab re sanè esse iudicauimus, si eius historiam, & vires hic explicabimus. Est itaq; Carduus huius, quæ ego potius Asminū vocarem quod


Leucacanthæ vires ex Plin. Ruellius Hermolao sua surripuit.

Brasauoli error.

Carduus Maria.

Carduus diuæ Mariæ dicitur.

CARDVVS LACTEVS.



quod eius pabulo Asini delectentur, planta folia fundens magna, pinguis, per ambitum laciniata, & acutis tenuibusque aculeis circumquaque stipata, quin etiam lacteis plurimis resperfa maculis. Caulem profert bicubitalem, tricubitalemque, rotundum, spinis horrentem, brachiatumque, echinatis aculeis in summitate capitulis, quae aestate media florent cinerea modo, floribus purpureis ac capillaceis, semine cardui simili crici minore, papposa lanugine scatente. Radice nititur valida alte descendente, amaro sapore. Nascitur sponte in campis, incultis locis secus itinera, agrorum marginibus, & à quibusdam quoque in hortis feritur. Radix excalfacit, abstergit, aperit, prouocat, & attenuat. Radicis decoctum datur utiliter potandum ad locinoris, & vasorum obstructions & remorantes vrinas: quare confert hydropicis, ictericis, ac nephriticis. Idem ducit menses, tam potum, quam in defensionibus adhibitur. Sunt qui radicis sicca puluerem addito feniculi semine, & longi piperis momento, ex prisana propinent nutritibus, lacti augendo. Stillatitia foliorum aqua vtuntur nonnulli ad lateris dolores, cui alij vt valentius agat, seminis semidrachmam adiiciunt. Leucacantha vires paucis perstrinxit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Leucacanthos, quidam autem polygonaton, alij ischiada nuncupant. Huius amara radix est, ac proinde incidit, & exicat in tertio ordine: in calfaciendo autem ex primo est ordine. *Λευκάκανθα* qua Graecis, Alba spina Latinis appellatur: Italis: Bianca spina. Carduus vero Mariae, & Carduus lactarius, Italis appellatur Scardaccio del latte, & Scardaccio bianco: Cardo del latte. Germanis Mariendistel: vnser Frauendistel: Gallis, Cardon de nostre Dame. Bohemis, Ostropes: Polonis, Ostropest.

Cardui lactei vires Matth.

Leucacanthae vires ex Gal.


Nomina.

Galaxias, eiusdem. Videtur Theophrastus Acani nomine intellexisse, vnde reliqua Carduorum genera Acanacea dicta videntur. Dicitur Carduus albus, Brunf. Chamæleion, eidem in 4. Carduus Mariae, Trag. Fuch. in icon. Ges. hor. Cast. Lon. Cam. Carduus Marianus, Cord in Diosc. Tab. Carduus lacteus, Matth. Lugd. Leucographis Plinij, eidem. Carduus leucographus, Dod. fol. Cardui syluestris aliud genus, Cæsal. Spina alba hortensis, Fuch. fol. Spina alba, Dod. gal. Lac. Leucacantha, eidem & Cornaro. Silybum, Lob. sic & Anguillara suspicatur. Huius est & altera species ex Syria allata à Rauuolffio, & à Camerario, Carduus lacteus Syriacus dictus.

Carduus Mariae, aliquibus Silybum veterum, alijs Leucacantha, alijs Leucographis Plinij, alijs Carduus

TRAGACANTHA.

Τραγάκανθα. TRAGACANTHA. CAP. XX.



Tragacanthae radix lata, & lignosa, summo cespite nititur: vnde surculos humiles, † robustos, latissimè fundit: in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur: quae sub se spinas albas, rectas, & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha lachryma, quae vulnerata radice manans, concreuit. Praestat pellucens, gracilis, a laeuis, syncera, & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius incrementum vsus ad oculorum medicamenta: ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, caeterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguae liquefit. In passo madefacta, drachmae pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicae rosiones, misto cornu cerui vsto, & eloto, aut scissi aluminis momento.

† Ori. addi. πικρὸν ἰ. frequentes.

a Cat. λευκὴ. i. alba.

Tragacantha plantam, à qua effigiem, quam hic exhibemus, deprompsimus, iam pridem ad nos misit quidam rei herbaria studiosus, qui illam attulerat ex Apulia Gargano monte. Ea certe est, qua nullis prorsus notis à Dioscoridis historia dissentiat, vt ex eius pictura omnibus liquido constare potest. Caterum lachryma è vulnerata radice manans, quam seplasiarj vulgò vocant Gomma draganti, passim in officinis concreta visitur, è Creta, Asia, & Graecia aduecta. At non modo hac (vt Dioscorides inquit) è vulnerata prius radice manat, sed etiam sponte (vt Theophrastus est author) ab ea scisso in latere cortice distillat. Sed hanc, qua vtimur, Monachi illi reuertens, qui in Mesuem commentarios ediderunt, veram esse

Tragacanthae confid.

Monachorum erratum.

Tragacantha
vires

Tragacantha lachrymam negant, quod legitima lingua subdita facile, Dioscoridis testimonio, colliquefcit: hec verò non-
quam, cum lingua supposita adeo lenta, tenaxq, euadat, admista salina, vt nullo ferè temporis tractu dissolui liquariq, pos-
sit. Qua quidè in re q (pace eorum dixerim) toto celo aberrant, vt qui Dioscoridis sententiam perperã acceperint. Siquidem
Dioscorides non de sola lachryma lingua subdita, sed in eclegmate cum melle conformata, illud fieri scribit, cum inquit:
Vfus eius ad oculorum medicamenta, ad tusses, exasperatas fauces, retusas voces, ceterasq, destillationes, cum melle in delin-
ctu: liquefcitq, subiecta lingua: hac Dioscorides. Ex quibus palam est voluisse Dioscoridem Tragacantha lachrymam non
solam, & per se tantum, sed in eclegmate cum melle paratam lingua esse subijciendam, vt clarissimorum medicorum: insti-
tutione fieri adsolet cum bechicis catapotys, & diatragacantha trochiscis, quibus ipsa commiscetur. Quippe cum oporteat
medicamenta, quibus aspera arteria, pulmo, ac pectus vniuersum expurgari debent, quadam temporis diuturnitate ore re-
senta, vel lingua subdita, sensim leniterq, liquefcere, vt commodè in tracheam percolentur arteriam, voluit hic Dioscorides
eclegmatis vsum recta methòdo describere. Nam si huiusmodi medicamenta deuorarentur, nihil prorsus proficerent, cum i-
ta non in pectus & pulmones deferantur, sed in ventriculum. Huic & alia accedit ratio, quod si intellexisset Dioscorides la-
chrymam per se tantum lingua submitendam, subiunxisset quidem, vt sui moris est, quibus in morbis id faciendum esset:
quandoquidem planè absurdum videretur scribere, quod aliquod gummi lingua subijciatur, paulatimq, liquefcere cogi-
tur, ac deinde silentio inuoluere, quibus in morbis id faciendum. His itaque rationibus non modò rectè, meo quidem iudicio,
intelligi potest voluisse Dioscoridem eclegma, quod Tragacantha lachrymam acceperit, lingua subijciendum esse, non ipsam
tantum lachrymam, sed etiam Monachos in hoc, vt alias sepe deceptos esse. In collyrijs oculorum addita Tragacantha lachry-
ma non solum humorum acrimoniam in oculos defluentium retundit, sed oculos quoque roborat, & lögè magis adstringit,
quàm sarcocola. Quinetiam lacte macerata, & illita, oculorum vngues, & palpebrarum pustulas, pruritus, & scabiem
sanat. Valet ad pulmònum, pectoris & trachea arteria morbos, & medetur eorum vlceribus. In summa praestat Tragacan-
tha lachryma ad defluxiones omnes, in fauces, guttur, & pectus permeantes, & tussim excitantes, & praesertim in confec-
tionibus addita, qua lingua subijciuntur. Datur vtiliter exulceratis renibus. Auxiliatur quoque dysentericis, qua tosta
fuerit, tum ex vino cydoniorum pota, tum clysmate infusa. In summa vbi laeuigare, obrundere, & reprimere opus est, pra-
stantissimum semper fuerit medicamentum. Tragacantha vires scriptas reliquit Galenus lib. 8. simplicium medicamentor-
um, his paucis verbis: Tragacantha similem gummi vim obtinet, emplastica quaedam, & acrimoniam hebetiorem (le-
gunt aliqui, qua acrimoniam obtundit.) Et sanè similiter illi desiccatur. Τραγάκανθα sic Gracè, vt etiam Latine, & Italicè
Tragacantha vocatur: Arabicè, Chitira, Itica, Chatech, Alcuted, seu Alchathad: German. Dragant: Hispanicè, Alqueira.

Tragacantha vires Matth.

Tragacantha vires ex Gal. Nomina

Tragacanthæ vocem Gaza apud Theophrastum Hirci spinam reddidit: ipsa planta nominatur Tra-
gacantha, Matth. Gef. hort. Clus. in Cord. ad Dod. gallicum, Dod. fol. Lac. Lob. Cast. Lugd. Casal. Traga-
canthum, Cord. in hist. Lon. Tragacantha prima, Tabernæmontano. Ex radicibus colligitur lachryma seu
gummi, officinis gummi Dragacanthi nominatum, glutinosum, quod per cribrum aut rarum linteum
exprimitur, candidum, pellucidum, nitidum, licet & flauescens, subruffum reperiatur. Substantia est glu-
tinosa quæ difficulter teritur, & aquam qua dissoluitur, in densam mucilaginem instar glutinis conuer-
tit. Eligendum candidissimum, parum translucens & cuius minima portio maximam aquæ copiam coa-
gulet. Ex Asia adfertur.

* I. CARDVVS STELLATVS. * Η'ρύγγιον. ERYNGIVM. CAP. XXI



Eryngion aculeatarum generis, cuius folia in prin-
cipio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata au-
tem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica:
sed vbi adoleuerunt, circa complures caulium emine-
ntias in spinas aculeantur: in quorum summitatibus glo-
bosa capitula, durarū, acutissimarumq; spinarū ambitu
a stellatim circumuallantur, quorum colos aliàs viridis
aliàs albus, interdū cœruleus inuenitur. b Radix oblon-
ga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudi-
ne, odorata. Nascitur in asperis, & campestribus. Vim
habet calfactoriam. Pota menses, & vrinas pellit: tot-
mina, inflationesq; discutit: contra iocinerum vitia,
serpentium morsus, & hausta venena, cum vino pro-
dest: bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacz
drachma vna: appensa, illitaue, tubercula discutere pro-
ditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, &
comitialibus medetur.

Longè quidem aberrant seplastarij Senēses in Eryngij cogni-
tione, vtpote qui pro Eryngij radicibus assumant aculeata
cuiusdam stirpis radices, quam Cacatreppola vulgò vocant. Hinc
error omnibus facile deprehenditur, quod nulla penitus illius
planta nota eryngio respondeat. Legitimum Eryngium: quod,
meo iudicio, Dioscoridis descriptioni nihil refragetur, & cuius
hic imaginem appinximus, frequens inuenitur in compluribus
Italia locis, nullis reclamantibus notis. Est & Eryngiū marinum,
quo Veneta litora vndiq; referta spectantur. Assurgit hoc folijs
altero latioribus, circinato ambitu spinosis: & casto resperis to-
lore. Caulem carnosiore, crassiore atq; striatum habet:
capitulis caruleis maioribusq, radicibus longioribus tenerioribus mollioribusq, digitalis crassitudine, saccharo asseruandis
longè magis idoneis, quam alterius. Radix minus siccatur quam altera, sed easdem possidet vires. Huius tamen non meminerit
Dioscorides, Plinius tamen lib. 22. cap. 7 vtriusq, historiam tradidit. Quo sit, vt eorum sententiam non minus probauerim,
qui Eryng-

a στέρε α-
σπ. i. instar
stellæ ita me-
um. sed Cat.
add. σπόρα
i. valde.
b Meom, &
Cat. τὸν σπ
καὶ ἀρωματῖ
ζωα. i. odo-
rata, & αρω-
ματικά.

Eryngij cōsi-
deratio.
Cacatreppola.


Eryng. Diosc.

Eryngium
marinum.

capitulis caruleis maioribusq, radicibus longioribus tenerioribus mollioribusq, digitalis crassitudine, saccharo asseruandis
longè magis idoneis, quam alterius. Radix minus siccatur quam altera, sed easdem possidet vires. Huius tamen non meminerit
Dioscorides, Plinius tamen lib. 22. cap. 7 vtriusq, historiam tradidit. Quo sit, vt eorum sententiam non minus probauerim,
qui Eryng-

II. ERYNGIVM MONTANVM.

III. ERYNGIVM MARI-
num.



IV. ERYNGIVM PLANVM.



qui Eryngium marinum Crocodilium esse existimant, ut in cro-
codily mentione superius diximus. Sunt & qui credant, Eryngi-
um Mauritanis à Secacul non differre. Veruntamen ij quoq; bal-
lucinantur. Nam cum Serapio in capite de Secacul, neque Dio-
scoridem, neque Galenum citet, quos maximè in simplicium hi-
storia sequitur, quorumq; dicta bona fide refert, sed tantum sua
gentis auctoribus nitatur, clarissimum prabet indicium, Seca-
cul diuersum fuisse, & plantam Graecis incognitam. Siquidem
si pro eryngio Secacul scripsisset Serapio, ei sanè non fuisset opus,
paulò inferius de eryngio tractare ex Dioscoridis, & Galeni sen-
tentia, magno virium & notarum discrimine. Re autem vera
Secacul radix est Indica. Hoc enim testatur Auicenna lib. quin-
to, ubi sic habet: Secacul sunt radices Zingiberi similes, quae con-
uehuntur ex India, & fit ex eis, cum sunt recentes, conditum in
loco suo: apud nos autem hameclantur imprimis in aqua calida.
Qua etiam ad vnguem Serapioni, de eo pariter scribuntur, ubi
de pluribus saccharo, & melle asseruandis egit. Quamobrem non
parum falluntur, qui Secacul ab eryngio discernere nescientes,
Eryngii radices tum saccharo, tum melle asseruatas veneris in-
feculiter commiscant auxilijs, ut qui ederint, fortiores, salacio-
resq; reddantur. Quippe hac facultate Eryngium prestare nus-
quam hactenus apud Dioscoridem, & Galenum mihi reperire
licuit, qua tamen pollere Secacul memoria prodiderunt Arabes.
Ceterum animaduertendum est Serapionè Asters Atticum, si-
ue Bubonium cum eryngio confudisse, stellarum similitudine
deceptum, qua caruleo colore se inuicem emulantur: etsi quae
Bubonio insunt, nullis aculeis horreant. Eryngii radicem deco-
ctum expedit locinoris, & lienis infarctus, ideoq; ictericos, &
hydropicos iuuat. Epota radix valet aduersus rubetas, toxica, &
aconita, ex ranarum comestibulum inre pota, vel ex anserino,
ubi rana non sint ad manus: eadem datur utiliter potanda con-
tra cordis affectus, ex buglossi, aut melissophylli decocto. Praestat
quoque ad stranguriam, obstructos renes, & vuluarum praclu-

Quorundam
error.

Secacul hist.
Math.

fones. Illita ex melle infixae corpori extrahit. Quinetiam strumas, parotidas, & panos discutit. Presumpta crapulam ardet,
& aluum sistit. Firè teneris Eryngii folijs stillatitia aqua, ijs quàm maximè utilis, qui morbo gallico affecti vlceribus affli-
guntur, si quotidie ea vtantur in potu, nam mirifice lecur iuuat. Valet eadem ad expugnandas quotidianas, & quartanas
febres

Eryngij vires
et Gal.

febres. Eryngium planum siue laue folijs exit latis, oblongis, minimè laciniatis, in ambitu tamen serratis, caulibus comp-
ribus, ramosis: paruis in summitate capitulis, ipsiq; subasperis. Radice vegeta ceteris crassiore. Prouenit in Austria in Vien-
nensi agro, campestribus locis. Radix minus quam cetera praescripta siccatur, minusq; ad omnia praestat. Meminit Eryngij Ga-
lenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Eryngium caliditate quidem aut parum, aut nihil, quae impera-
ta sunt, superat. Siccitatem verò in tenui essentia consistentem non paruam obtinet. Eius nomen Graecum ἑρύγγιον, Latini-
num item Eryngium: Italicum, Eringio, & Iringo: Germanicum, Brachendistel/Manstren: Hispanicum, Cardo corre-
dor: Gallicum, Patucault: Bohemicum, Mancha, aut Muzska vuyra: Polonicum, Mikolarek. Eryngium marinum, Italia Ir-
ringio marino. Eryngium planum, siue laue: Italia, Iringio liscio, & Iringo senza spine.

Nomina.

Eryngij differentia plures notantur: est enim marinum: est campestre, hocq; folio vel spinoso, vt vul-
garum & pumilum, vel plano & laui: est alpinum, hocq; folijs vel planis, vel campestri similibus, quod E-
ryngium est capitulis caeruleis Dioscoridi: his addunt aliqui & Crithmi speciem & Carduum stellarum,
cuius figuram adiecimus, cum ipsius in principio capitis, vt & capite de Tribulo, fiat à Matthiolo mentio. I.
Carduus stellatus, C. B. Dod. gal. & fo. Ges. hor. Lob. (cui & Spina alba vera Rondeletij) Cam. cui & Stella-
ria Augenij. Eryngium, Brunf. Eryngiu 2. Trag. Lon. Cacatreppola (quasi Cacotribulus, id est infestus tri-
bulus) vulgò, Matth. Cæsal. cui Stæbe & Phleus Theophrasti. Polyacantha, Cord. in hist. Myacanthos
Theophrasti, Lugd. Spina stella, Tab. Hippophæstum vel Hippophæes Dioscoridis, Columnæ. Varias co-
lore florum, fert communiter subrubentes, habet & candidos. II. Eryngium campestre vulgare, C. B. E-
ryngium primū, Trag. Lon. Eryngiu, Fuc. Eryngiu vulgare, Dod. gal. Cam. Eryngiu campestre Dod. fol.
Cast. Eryngium montanum, Matth. Lugd. Eryngium mediterraneum, Ges. hort. Eryngium campestre
mediterraneum, Lob. Eryngium, Cord. in Dios. Lacu. Cæsal. Taber. Erynge, Eryngion & Centumcapita,
Plinio. III. Eryngium maritimum quod cum Acano Plinij lib. 22. cap. 9. non male conuenit, C. B. Dici-
tur Eryngium marinum, Matth. Dod. gal. & fol. Lob. (cui & Drypis Theophrasti quorundam) Cast. Cæsa.
(cui & Crocodiliū Dios. & Plinij) Cam. Lug. cui & Eryngiu folio Apij in litoribus maris Plinij. Eryngium
maritimū, Ges. hor. Glycyrrhiza spinosa & Glycyrrhiza Crateuæ Lacuna. IV. Eryngiu alpinum planū ca-
pire diplaci, quem Carduū nobilem Bernenses, in quorū alpibus frequens, vocitant. C. B. Eryngiu planum,
Matth. (in cuius figura capita Diplaci requiro) Dod. fol. Cast. Lug. Eryngiu aliud montanū Dalechampij,
eidem, quā & sub Spina alba, sed figura vitiosa, posuisse videtur. Eryngium alpinū, Ges. hor. Eryngiu magnis
latisq; capitulis, Eidem in ap. Eryngium montanum tenuifolium, ambitu profundè sinuatū, Lob. obier
Alpinum caeruleum Gencuense, Lob. icon. Eryngium alpinum caeruleum, Tab. Eryngium capite Dipla-
ci, Cam. Herba peregrina folijs acanthi, & Acanthus syluestris Dioscoridi, Cæsalpino.

a Meū, & Ca.
π ἀρ ἐκάτερα
ἢ τὰ μέρη ἑ-
χέει πλάγι-
ως ἀκάνθια ἀ-
ραιῶς ἔχει
τα καλοῦσα.
ab utraq; par-
te hēt ex obli-
quo spinas
rarius emicā-
tes, mutilas.
b Meum, &
Cat. interpo-
nunt κατ-
c Meū. κα-
θαρωτέρως, i.
purioris.
d Cæst in
meo & Cat.
e Cat. addit.
λιπαρά. i.
pinguis.
f Cat. συστά-
θητον. i. re-
tētū difficult.
g Deest in Ca.
h Meū οὐ
γλυκεῖ οἶνω.
i cum dulci
vino.
i Meū ἰσώ-
πια. i. suggil-
lata.

Alon.

A L O E.

C A P. X X I I.

ALoe folium scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrofusum
dum: folia gerit curta, a quæ vtrinque ex obliquo longioribus interuallis striantur, & in spinulas defi-
nunt. Caulis emittitur non dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regiae cognatus: graui tota est
odore, & gustu amarissima: radice vna, ceu palo, in terram depecta. Plurima præpinguisq; in India gigni-
tur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia, & Arabia b in locis quibusdam maritimis: & in
insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si
detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum c purissimæ esse videtur: alte-
rum ad iecinoris imaginem vergit. Eligi debet d boni odoris, e syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, caleu-
lorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facile liquefscens, eximia amaritudinis. Im-
probatur nigra, & f fractu contumax. Gummi eam adulterant: quod deprehenditur gustu, amaritudine,
& valido odore: eoque argumento, quod digitis friata non ad minima vsque frustra resoluitur: nec de-
sunt, qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, g somnum allicere, & corpora densare, al-
uum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut egelida pota: san-
guinis reiectiones sistit: regium in orbem purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu:
deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis perfectæ cau-
sa tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat vt minus stomachum infe-
stent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur: vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;. Eadem peculia-
riter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia iungit, condylomata, rimasque se-
dis h ex passo sanat, hæmorrhoidum abundantiam, & sanguinis eruptiones sistit: pterygia ad cicatricem
ducit: liuores, & i insignita ex melle tollit. Priuatim seabras lippitudines, pruriginisque angulorum per-
mulcet: dolorē capitis sedat, tēporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo capillū fluentē continet cū vino:
retur in munda, & candenti testa, pennaque subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur, vt quod
lit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & læue, ac pinguisissimum assumatur.

k Meū mi-
γνυται. i. mi-
scetur.
l Atoes confi-
si, & Fuchs. ipsū secutus, quod affirmauerit ille, Aloem per os sumptam venarū oscula adeò referare, vt inde postea sanguis
facile exiliat, cum id (vt ipsi aiunt,) tum Diosc. tum Galeni placitis maximè repugnet. Verum quàm longè q, quorum pace
dictum sit, à veritate descuerint, non multo quidē labore demonstrare possem, ni præter institutū nostrum id esse censuerim,
niq; conspectum haberem, illis prius rectè, meo iudicio, responsum fuisse à Iaco. Syluio clarissimo atatis nostra medico in Me-
fues à ca-
lumnia vin-
dicatus.

Non dubium est quin ea legitima sit Aloe, qua passim officina vtuntur. Nam electissima ac purissima (adulterata e-
nim quandoque etiam inuenitur) omnes præstat tum notas, tum vires, quæ syncerissima à Dioscoride assignantur.
Aloe, atate nostra in quam plurimis Italia locis virefcere cōspicitur, præsertim Roma & Neapoli, vbi super adsum fenestris,
ac atrijs in siccilibus vasis terra plenis alitur ac fouetur, ad spectaculum potius, quàm ad medicum vsum. Floribus non mo-
dò albicantibus, vt Dioscorides inquit, sed etiam purpurascensibus. Inuehantur acerrimè in Mesuem Manardus Ferraricus
facile exiliat, cum id (vt ipsi aiunt,) tum Diosc. tum Galeni placitis maximè repugnet. Verum quàm longè q, quorum pace
dictum sit, à veritate descuerint, non multo quidē labore demonstrare possem, ni præter institutū nostrum id esse censuerim,
niq; conspectum haberem, illis prius rectè, meo iudicio, responsum fuisse à Iaco. Syluio clarissimo atatis nostra medico in Me-
fues

60

I. ALOE MUCRONATO FOLIO.*

II. ALOE.



suem scribentem, & à Gratiopolitano quodam, qui tam probatissimis rationibus Mesuem tuentur, ut non amplius Ma-
 nardo, ac Fuchsio hic eum lacerandi locum relictum esse putem. Aloes meminit Galenus lib. 6. simplicium medicamento-
 rum, ubi sic habet: Hac herba non admodum apud nos provenit, & qua nascitur in magna Syria, aquosior est, & facultate
 imbecillioris: attamen usque adeo desiccare potest, ut vulnera conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cale-
 syria, & Arabia, multo est melior. Optima autem Indica, cuius liquor est, id quod ad nos importatur, medicamentum Aloe
 cognominatum, ad plurimas res, propter siccitatem mordicationis expertem, utile. Est autem non simplicis natura, sed ut
 iudicio est gustus, adstringit simul, & amara est: adstringit quidem mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit &
 ventrem, ut puta ex numero medicamentorum, quae Graeci ab excernendo stercore vocant *ἐκκροτική*. Itaque ex dictis
 patet (si quidem memoria tenemus, quae in quarto lib. sunt demonstrata) quod tertij sit ordinis exiccantium, calcificentium
 autem aut primi intensi, aut secundi exoluti. Sed & ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam &
 utile stomacho medicamen est, ut si quid aliud: & sinus glutinat. Sanat & ulcera, quae egre ad cicatricem duci possunt, &
 maxime, quae in ano sunt, & pudendo. Iuvat & eorum inflammationes aqua subacta, & vulnera eundem ad modum glu-
 tinat. Congruit similiter utenti & ad inflammationes in ore, ac naribus, & oculis. In summa, repellere, & digerere simul
 potest, cum hoc, ut paulum extergat, quantum videlicet ulceribus puris non sit molestum. Praeterea idem Galenus lib. 8. de
 compositione medicament. secund. loc. in hieca mentione, de Aloe ita scriptum reliquit: Atqui ipsam aloem Andromachus
 quidem lotam, ex alijs autem aliqui etiam sic, aliqui vero illotam adijciunt. Verum iam nosse operapretium est, ad ventris
 subtractionem illotam aloem aptiorem esse, multum vero de medicamentaria vi deponere lotam, quam etiam febricitantibus
 dare aliquis audeat, si non vehemens, sed valde debilis sit febris. Quidam vero etiam ex illota aloem pharmacum multis sic fe-
 bricitantibus exhibuerunt, deinde cum nihil manifeste lassissent, in alijs rursus maximum experti sunt nocumentum. Infe-
 ssissima est enim aloem, etiam lota, his qui citra vitiatos humores ex intemperie calida & sicca affliguntur. Pro-
 ximum ab his lesionem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, etiam cum frigiditate coniunctam, & in uniuersum
 qui ex sola qualitate particulam aliquam lasam habent. Etenim in humoribus intemperatura, pharmacia ipsas euacuan-
 tibus egent: quae vero absque his consistunt, penitus in tabem deueniunt ex pharmacia: huius ex aloem constantis usu. Itaque
 ubi humiditas vitiosa tunicas ventris exparrigat, aloem picra utilis est, expurgans humiditatem. Omnino autem sic affectus
 accessio nauisae plus aut minus adest. Euacuatio igitur affligentis humoris per solam aloem contingit, quae purgatoriam vim
 non fortem habet, sed ut ea, quae circa aluum sunt, quae etiam contingit, purgare possit. Et si aliquando ampliori pondere ex-
 bibeatur, usque ad locos circa hepar conscendit, non tamen totius corporis purgatoria aloem existit. Caterum ex his quae ei ad-
 miscentur, mastiche ut stomacho commoda & odora, & quae medicamentariam aloem vim frangere queat, admiscetur. Cin-
 namomum vero eadem gratia, & praeterea quod tenuissimarum partium est, ut aperire ventris meatus possit, extergereq;
 ac attenuare, si quid viscosum aut crassum in humoribus feratur. Crassos enim humores ob purgatoriam facultatis imbeci-
 litatem, aloem trahere non potest. Quapropter biliosarum ventris affectionum optimum pharmacum est, adeo ut in vno die
 saepe multos stomachicos creditos persanet. Iuvat autem & hos, & alios omnes affectus ex vitiosis humoribus ortos, cinna-
 momum admistum, utpote quod alterantem habet facultatem vitiosarum qualitatum in id quod secundum naturam ha-
 bet. Haecenus de aloem ex Galeno locis citatis. Deijcit Aloe (ut Mesues auctor est) non modo bilem, sed & pituitam ipsam. Ca-
 put ventriculorum mundat, quorum etiam cruciatibus maxime succurrit. Inflammato, aestuantiq; bilis redundantia ven-
 triculi auxilio est. Quotidianus eius usus à mortiferis morbis tuetur. Vindicat à putredine, addita myrrha, non modo vi-

Aloes vires
ex Gal.

Ex Mesue.

uentiu, sed etiam defunctoru corpora. Cum draconis sanguine, & myrrha ulcera cotumacia sanat, quod sine morfu aliquo exiccare possit. Sensus omnes, intellectumq, acuit, iecur ab infarctu purgat, & regio morbo medetur. Hamorrhoidibus tamen, ac ceteris sedis inflammationibus nocet: quamobrem ijs ab eius assumptione abstinendum est, qui aliquam in illis partibus noxam patiuntur: hac Mesues. Ceterum necat Aloe ventris ex lacte, vel melle sumpta: aut umbilicorum apposta: bubalo felle, & aceto subacta.

Nomina.

Planta, quae Graecis ἀλόη, Latinis etiam Aloe vocatur: Mauritanis, Saber, Paber, siue Sabar: Italis, Aloe: Germanis, Alepatic oder bitter Aloes: Hispanis, Hierua babosa: Aloes, seu Perroquet: Bohemis, Aloe.

Aloë triplex habetur, est mucronato folio, succo dulci, quae cum iam vulgata sit, ipsius iconem adiecimus: est altera succo amaro: est tertia palustris. I. Aloë mucronato folio, C.B.Lob. Aloë, Acoftz. Aloë, ex America, Dod. fol. Aloë Americana, Clul. hist. Hispan. Cast. Lugd. Aloë America, Cam. ad Matth. Tab. Aloë spinosa, Cam. Aloë alterum genus, Cæsal. Valentinis Fil y agulla, id est filum & acis. II. Aloë succo amaro, C.B. Aloë, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. (cui & Sedum amarum Columellæ) Gef. hort. Anguil. Lon. Lac. Cast. Lugd. Lob. Cæsalp. Aloë semperuiua Indica quibusdam, Cord. in Diosc. Aloë, amphibion etiam dicitur, Cord. hist. Aloë communis ex Hispania, Cam. Semperuiuum marinum in insulis Stachadibus, Quiquerano. Huius densatus Succus Aloë etiam dicitur: cuius tres habentur differentiae ex eadem planta. Optima succocitrina, quae purissima, fulua aut ruffa, aut pellucida: amara, adstringens aromatica, odore graui & aromatico. Altera Hepatica quod hepatis modo sit concreta, subruffa minus pellucida, illa denfior & aridior, amarior, magis adstringens, grauiorisque odoris. Tertia Caballina, ponderosissima, densissima, nigra, terra arenisq, plena: amarissima & gustu horribili virusq; olēs, veterinarijs relinquenda. Eligenda pinguis, purissima, hyeme friabilis, æstate molliuscula, in manibus lentescens, fordibus carens, aromaticam amaritudinem respiciens, odore somnum concilians. Affertur pellibus infusum ex India atq; Arabia, per Syriam & Ægyptum: verum etiam in maritimis Apuliae & Hispaniae, sed faciendo succo inutilis, prouenit. Ast nunc Americana quae ex Mexico adfertur, in Germania hortis vulgarior est.

A. J. J. J.

ABSINTHIUM

CAP. XXIII.

Absinthium, aliqui bathypicron, herba vulgò cognita. Præstantius in Ponto, a & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi, & adstringendi. Bilem expurgat, quae & stomacho, & ventri inhæsit: vrinam, cit, & crapulam præsumptam arcer, ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli, b & nardo Gallico potum: fastidia discutit, & arquatos sanat madefacti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur: aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconi marino. Anginæ eo cum melle, & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua.

a Cac. addit.

ψήλαστία

b h. ita Meū

& Cac.

I. ABSINTHIUM.

*II. ABSIN. PONTICVM
Montanum. *

Adia

Ad fugillata, & oculorum caligines, ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium, auriumque dolores decoctum vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordis, & iecinori, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valetudine laboranti cum rosa-cco: cum ficis autem, aceto, & loliacea farina, aquæ inter cutem, lienosilq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod ablinthiteu vocant, præsertim in Propontide, & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cum febris carent: a-lioquin in æstate propinât, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. Insparsum arcis absinthium, velles ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eosdem præstare effectus: attamen potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet do-
lorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

ΑΨίνθιον Θαλάσσιον

ABSINTHIUM MARINUM.

CAP. XXIV.

† [**A**bsinthium marinum, quod aliqui Seriphium vocant,] copiosissimum in Tauro môte, iuxta Cap- † Orib. legi-
padociâ, & in Taphorisi Ægypti gignitur: quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba est tenuis, ab- tantum. Σερί-
rotoni parui similitudine, referta minutulis seminib⁹, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cū φως.
quadam calfactione adstringit. Per sese, aut cum oryza cocta, interaneorum & animalia, teretesq; tineas, a Meum a-
adiecto melle enecat: alium b læuigar: cum edulio autem, vel lenticula decocta, eadem præstare potest. σκαρίδας &
Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo. c Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus fini- ἔλμινθας
tima scætet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis, in qua nascitur, cognomento, absinthio non ερωσύλας, ἰ-
dissimile: verùm subamarum est, non aded seminis fœcundum: eadem quæ Seriphium potest. ασκαρίδας &
lumbricos
rotundos.
b Meū add.
κὺφωσι. Leui-
ter.
c Cat. addit.
ὅτι κατὰ τὸ
δοκίμα.

III. ABSINTHIUM PONTICVM. IV. ABSINTHIUM MARINVM.



Absinthij genera tria hic à Dioscoride traduntur, nempe vulgare nostrum, marinum, quod Seriphium vocant, & Absinthii ge-
Santonicum, quo Gallia alpibus finitima abundat. Vulgare caule exit ramoso, foliis incanis, multipliciter sectis, Ar- nera tria.
temis modo, floribus aureis, paruis: semine rotundo, racematim coherente. Radicem habet diuisam, sed firmam, & li-
guosam. Atqui Absinthium, quod in Ponto nascitur, ceteris præstare ad iecinoris, & ventriculi inflammationes libro 11.
capite 16. Methodi medendi prodidit Galenus, sic scribens: Cum autem duplex in omni Absinthio facultas, & qualitas sit,
veluti in libris de medicamentis est traditum, utiq; in Pontico adstringendi qualitas non parua est. In reliquis omnibus a-
mara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quam saltem gustu agnoscas) aut planè obscura, aut prorsus
nulla sentitur. Preinde Ponticum ad iecinoris, & ventris phlegmonas eligi præstat. Porro id est tum folio, tum flore longè
quam cetera absinthia minore. Odor quoque huic non modo non insuauis, verùm etiam aromatum quid præferens: reli-
quis omnib. est fœdus. Quare hac fugere cōueniet, & Pōtico semper uti: hac Gal. Absinthium autē huiusmodi, quod ceteris
præstantius sit, non solum in Ponto nascitur, verùm etiam in Hungaria, Transyluania, & Bobemia. Huic omnibus planè notis
cū eo conuenit, quod Gal. delineauit. Etenim id folio, caule, flore, ac semine constat longè, quā cōmune nostrū Absinthium,
minoribus. Saporē habet amarissimū, cui non parua adstringendi vis coniuncta est. Odorē etiam spirat (vt Gal. testatur)


Mesues Pon-
ticum Roma-
num vocat.

* V. ABSINT. MARITIMUM
foliis laciniatis.*

Plinii error.

Pontici vires.

Semen san-
ctum Absin-
thii marini nō est.



Canabel Sc-
rapionis in-
tio.

Fuchsius no-
tatur.

bel constat, quā terra tenuissimo sabulo per similitis: qua (vt ipse ait) vna cum pluuia e caelo decidit, cuius non modo apud Arabes ad interaneorum tineas necandis: verum & ad fictilia fracta cōglutinanda increbuit vsus. Absinthium maritimum, siue Seriphium, in quā plurimus tam Tyrrheni, quā Adriatici pelagi litoribus prouenit, praesertimq; Aquileiensibus, & Tergestinis. Sed Fuchsius suspicor illud non cognouisse: siquidem quod in suis clarissimis commentarijs magno volumini

VI. ABSINTHIUM SERIPHIVM,
siue Seriphium Ægypt.

Marini ab sin-
thii historia.

Seriphium
Ægyptium.



Aqua Absin-
thii dulcis.

non insuauem, ita vt odorati non parum respiciat. Mesues, vt Syluius doctissime adnotauit, nescio tamen qua ratione du-
ctus, Ponticum, Romanum appellat. Monachi vero, qui in Me-
suei commentarios scripserunt, putant magno quidem er-
rore, id Mesuei Romanum absinthium esse, quod non modò
in agro Romano, sed etiam in vniuersa Italia prouenit. Pli-
nius li. 27. ca. 7. Ponticum scribit multò Italico amarum esse:
in quo sanè Galeni sententia & refragatur, & errat. Ponti-
cum absinthium efficacē vim continet ad aquam intercutem,
vt mihi iam sepius experimento compertum est. Equidem 10
quosdam noui hydropicos quasi deploratos, qui ex longo usu
comarum eius, qua saccharo adseruata fuerant, sanitate re-
stituti sunt. Paranda ratio hac est: Sumito florentium iam
comarum recentium absinthij Pontici libram vnā: saccha-
ri albisimi libras tres. Comas illas demptis caulibus, & pediculis
tundito in mortario lapideo: deinde in optime tuis sac-
charum in puluerem tritum adijcito: rursus omnia simul co-
tisser tundito, donec in vnum corpus redigantur: max ad 7-
sum recondito. Ex absinthio ita parato, affecto prius purgato,
datur quotidie semuncia tribus horis ante cibum. Sunt porò 20
qui putent semen illud, quod officina SANCTVM cogno-
minant, quodq; saccharo circumdatum coniectumq; necandis
interaneorum vermibus praebent, Absinthij marini esse semē,
sed v planè decipiuntur. Siquidem legitimam seminis huiusce
plantam integram misit ad me Patavio Iacobus Antonius
Cortusius, qua a marino absinthio longè distat, vt ex eius i-
magine patet. Planta est admodum fruticosa, caulibus & ra-
mus numerosis referta, semine minuto, oblongoq; racematim
prodeunte, amarulo gusta, odoreq; non insuauis. Assertur
ex Alexandria Aegypti, ac alijs meridionalibus locis. Ceterum 30
procul dubio hallucinari deprehenduntur qui Canabel & tra-
pionis semen sanctum interpretantur, cum longè admodum
hac inter se differant. Quippe Serapioni nil aliud esse Cana-

bel constat, quā terra tenuissimo sabulo per similitis: qua (vt ipse ait) vna cum pluuia e caelo decidit, cuius non modo apud Arabes ad interaneorum tineas necandis: verum & ad fictilia fracta cōglutinanda increbuit vsus. Absinthium maritimum, siue Seriphium, in quā plurimus tam Tyrrheni, quā Adriatici pelagi litoribus prouenit, praesertimq; Aquileiensibus, & Tergestinis. Sed Fuchsius suspicor illud non cognouisse: siquidem quod in suis clarissimis commentarijs magno volumini
appictum spectatur, absinthium maritimum nō est. Quod cum fortasse & ipse animaduertisset, in paruo simplicium libello sententiam mutauit. Veruntamen non prius ab hoc errore se 40 se vindicauit, quā in alium incidit: quippe quod eandem plantam pro syluestri nasturtio perperam, meo iudicio, depinxerit. MARINVM itaq; absinthij cum primum e terra erumpit, folio est absinthio simili, crassiore tamen. Sed postquam adoleuerit, & caules ediderit, mutatis in longum foliolo, usq; praesertim qua vbiq; caulem ambiunt, abrotoni amulatur, non tamen folijs est adeo paruis. Semen profere exiguum, copiosumq; abrotoni modo inter folia erumpens, atque in summitate caulis ferè racemosum, vt hac pictura eius demonstrat, amari, & adstringentis gustus. Aliam Absin- 10 thij marini plantam à nostrate longè diuersam ex Aegypto allatam, quam AEGYPTIVM SERIPHIVM vocari libuit, & cuius imaginem hic expressimus, nunc primum consecutus sum à Iacobo Antonio Cortusio praescripto: pumila est planta, in Aegypto proueniens: folijs minutis, abrotoni semina ferè similibus: surculis compluribus gracilibus, breuib; ac foliosis, minuto semine, gustu amaro, non tamen rebo- menter. Is omnibus praditum est facultatibus, quibus & I- talicum, è qua colligi quoque SEMEN SANCTVM quidam volunt, est quid certi de re hac affirmem non ha- 60 beam: quidam abrotonum mare esse volunt, sed fortasse mo- lius feminam appellassent. Volunt patres illi reuerendi, qui in Mesuem commetati sunt, tantum superficetens Absin- thium vulgare amarescere, imis verò partibus dulcescere, ob idq; gustus gratum esse. Vnde etiam aquam, qua ab eo i- gnium vi distillat, dulcem potius, quā amarum sentiri contendunt. Qua in re v parum rem naturalem callere de- prehenduntur: nam quòd Absinthij stillatitia aqua sit dulcis, non ex eo fit (quantum equidem sentio) quòd Absinthium 11

data
de
sp

VII. SEMEN SANCTVM,
siue Semenzina.

ipsum constet extrema parte amarum, medullitus vero dulce, sed quoniam cum exteriores illa partes, quibus amaror inest, admodum sint tenues, ac in vaporem facile resolubiles, ignis calore tenuiores facta, non magno quidem labore resoluuntur: euenitq; ob hoc, vt stillatitia, quae inde fluit aqua, omnis sit amaritudinis experta. Praterea dulcedo, quae in ipsa inuenitur, non ab intimis Absinthij partibus emanat, sed eam tantum à plumbeis instrumentis, quibus conficitur (vt diurna docet experientia) prouenire comperimus. Nam ipsius dulcedinis qualitas non modo in Absinthij stillatitia aqua sentitur, sed etiam in quavis alia, quae ex herbis temperamento calidis extrahatur. Siquidem cum plumbeum instrumentum huiusmodi herbarum vaporibus tum actu, tum potentia excalfaciens, terrena quadam substantia superficiem inspicitur, quae actutum in dulcissimam veluti cerussam conuertitur, non mirum quidem videtur, si aqua inde manantes ascititia dulcedine imbuta, gustu dulces percipiantur. Quod quidem ius non euenit absinthij stillatitiae aquis, quae duplici vase vitreis organis, calentis aquae balneo conficiuntur: nam haec sufficienter amarescere cognoscuntur, nec tantillum quidem dulcedinis gustantibus praebeant. Euenit sane hoc, quoniam balneum sua ipsius aquae humiditate, partes tenuiores illas retinet, conseruat, ac cohibet. Quo fit, vt non aded in vaporem vertatur, quem admodum cum illis fieri solet, quae carbonum, & lignorum violento igne in auram euanescere coguntur. Dulcedine praterea carent, eo quod à vitreis organis quibus eliciuntur, nullam ascititiam qualitatem recipiant. Quare satius, mea quidem sententia, esset, vt orium, quod superest, consumerent monachi in re christiana, & medici in re medica, & singuli de arte sua bene mereri discerent: vel saltem quisque quam recte instituit, vitam sequeretur. Absinthij meminit Galenus lib. 6. simpl. medicamentorum sic inquitens:

Absinthij vi-
res ex Gal.

Absinthium adstrictorium, & amarum, & acrem simul qualitatem possidet, excalfaciens pariter, & extergens, & robora-
ns & desiccans. Proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autem
quod in venis est biliosum, per vrinas expurgat. Ob hac contentam in vtre pituitam, oblatum nihil adiuuat. Sic neq; fit

*IIX. ABSINTHIUM SERI-
phium Gallicum.*

*IX. ABSINTHIUM SERI-
phium latifolium.*




thoraco,

Nomina.

thorace, aut pulmone contineatur: nam adstringens in eo facultas, quam amara, valentior est. Porro quod in sic quoque et crimoniam, idcirco maiori portione calidum est, quam frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum primas circumscribere facultates (et si anomæ omnes & dissimilare sit) calidum ipsum dixerim primi excessum tertij. Succus autem eius longè quàm herba ipsa, calidior est. Sed cum de absinthio marino, siue Seriphio ageret lib. 8. simp. med. Seriphium, inquit, specie, & gustu absinthio simile est. Id quod de Santonico scripsit Diosc. cum tradiderit magis cum Abrotano conuenire Seriphium, quàm cum absinthio. Quamobrem relinquitur suspicio, quod aut Dioscoridis, aut Galeni scriptura sit hoc loco librariorum incuria deprauata. Herba, quæ Græcis ἀβρίδιον, Latinis itē Absinthium appellatur: Arabibus, Assinthium: Italis, Assenzo: Germanis, *Bermut* / *Elk*: Hispanis, *Asentios*, *Alosna*: Gallis, *Alayne*, & *Abfince*: Bohemis, *Pelymenk*: Polonis, *Pyolyn*. Absinthium Ponticum, Græcis, Αβρίδιον πόντικον: Italis, Assenzo Pontico. Absinthium marinum, siue Seriphium: Græcis, Αβρίδιον θαλάσσιον, Italis, Assenzo marino: Aquileiensibus, *Santonio*. Semen sanctum: Italis, *Seme santo* & *semenzina*.

Absinthium quasi ἀβρίδιον Comicis, quasi impotabile, propter insignem amarorem, ὅτι ἀντικίνηται πικρότητα. Etsi Theoph. tantum Absinthii in Ponto prouenientis 9. hist. 18. meminerit, eius tamē viginti differentias in Phytopinace recensuimus, de quibus in historia: in præsens tantum de iis, quas Matth. & Cam. in sua edit. exhibuere. I. Absinthium Ponticum, seu Romanū officinarum, seu Diosc. C. B. Absinthium, Brunf. Trag. Matth. Cor. in Diosc. & hist. Lon. Cæs. Absint. vulgare, Fuch. Gef. app. Lac. Lob. Lug. Cast. Tab. Absinthium commune Gef. hor. (cui & Romanum) Cam. Absinth. Santonicum, Dod. gal. Rocard. Absinth. Ponticum Ruellii & Trincauellæ, Absinth. latifolium Dod. fol. Absinth. nostrū rusticum, Thalyo. Absinth. rusticum, Apuleio. Absinth. maius & vulgare, Clus. hist. Pan. Absinth. commune latifolium amarissimum. Joh. Bauhino. II. Absinthium ponticum montanū, C. B. Absinth. commune minus, Gef. hor. Absinth. montanum, Cam. ad Matth. Absinth. mōtanum seu Romanū, Tabernemontano. Hoc vulgari simile, nisi quod exiliora omnia, & amaritudo sapore & odore gratior, in altis montibus proueniens. III. Absinth. ponticum tenuifolium incanum, C. B. Abrotanum minus, Trag. Abrotanū fœmina, Fuch. fol. Lugd. Gef. hor. cui Absinthii potius genus, Abrotanū albū, Cord. in Diosc. Absinth. Ponticum, Fuch. in icon. Matth. Dod. gal. Lac. Lugd. Tab. Absinth. ponticum vulgare, Clus. hist. Pan. Absinth. Santonicum, Ruellio & Cæs. Absinth. Galatium Sardonium Diosc. Lob. Absinth. tenuifolium, Dod. fol. Absinth. Romanum Mesue, Turnero. Absinth. Romanum vulgo, Thalyo. Hoc duum est generum, alterum incanum, alterum cauliculis purpurascens, foliis supina parte viridioribus: mediæ inter Absinth. & Abrotanum naturæ videtur. IV. Absinthium maritimū lauendulæ folio, C. B. Absinth. marinum, Mart. Cæs. Lugd. Absinth. Seriphium, Lac. Absinth. angustifolium, Dod. fol. Lugd. Absinth. latifolium marinum, Cam. Artemisia marina, Lob. Tab. V. Absinth. maritimum foliis laciniatis, C. B. Artemisiam marinæ folia incisa, Lob. Absinthii angustifolii ramulus foliis scissis, Dod. fol. Absinth. marinū Patauinum, Clus. hist. Pan. Artemisia marina Lob. Lugd. Hoc à priore tantum foliis in lacinias diuisis variat, quod potissimum contingit, si ex maritimis locis in hortos transferatur, quemadmodum in horto Medico Patauino notauimus. VI. Absinth. capilli veneris folio, C. B. Absinth. Seriphium Ægyptium, Matth. Lug. Absinthium peregrinum siue Ægyptium Aduers. Lob. Absinthium Ægyptium Lob. Tab. VII. Absinthium Seriphium Alexandrinum, C. B. Semen sanctum, Matth. Lob. Lug. Sementina, Dod. fol. Tab. Santonicū

I. ABROTONVM MAS.



a Meū & Ca.
λεπτόκαρπον.
i. gracili se-
mine. sed O-
rib. λεπτόφυ-
λον legit. i.
tenuibus fo-
liis.

Lon. Absinthium marinum & seriphium, pharmacopæis Alexandrinum semen, quibusdam sanctum semen & Zine semen, Cord. in Diosc. & hist. semē Zedoariæ, Aduers. Abrotanum mas, Anguillaræ, seminis huius contra lumbricos vsus, eligendum magnum non puluerulentum & odoratissimum: ex Ægypto ad nos adfertur. VIII. Absinth. Seriphium Gallicum, C. B. Absinthio pontico simile est, at foliis maioribus, lanugine albis: flosculis croceo rubore variegatis, quibus semen minutum, amarum, acre, succedit. Planta amara est, odorata, in maritimis Massiliensibus proueniens quod etiam in litore Veneto notauimus. Seriphium vulgare, perperā Diosc. Lob. in icon. at Camer. in suo Matth. Absinth. Seriphium vulgò dictum nominat. IX. Absinth. Seriphium latifolium, C. B. Santonici species maiuscula & longiusculis foliis, Cam. in Matth. & Lob. in suis observationibus, Absinth. Xantonicum vulgare,

Αβρότονον. ABROTONVM. CAP. XXV.

Abrotanum duorum est generum. Fœmina quædam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos foliis seriphi modo, minutim incisis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auti, corymbis. Quod per ætatem prodiit, iuuatiter olet, cum grauitate quadam, & amato gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, samentosum, a gracilibus ramulis vti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli. Vtriusque semen crudum


trium,

trium, & feruifacium ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxedicibus, vrinæ angustis, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est: horroibus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu, & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino potum prodest, priuatim efficax contra scorpionum, & phalangiorum venena. Oculorum inflammationibus commode illinitur cum cotoneo cocto, aut pane tritum cum farina hordeacea, decoctumque tubercula discutit. Irini compositionibus admiscetur.

Abrotonum mas planta est vulgaris notitia. Cuius duo obseruauimus genera, hortense, & per se in campestribus nas-
 scens, tenuioribus folijs, & minutiore semine. Mas sarmentosa est planta, caulibus gracilibus veluti absinthium. Fo-
 lia habet tenuia, numerosa, longiusculaq, odore graui, sed medicato. Flores mittit exiguos, semē minusum, rotundum, co-
 piofissimq, ramulos ferē totos comprehendens. Quod verò fœmineo generi adscribitur, non omnibus notum est: non idē,
 quōd & ipsum frequentissimum non seratur in hortis, sed quōd à paucis pro Abrotono fœmina cognoscatur. Quandoqui-
 dem id alij Cypressum, alij Santolinam vulgò appellant, alij verò marinum esse absinthium existimant. Sed ij profectò sal-
 tatur: quippe Santolina vulgò vocata, nil sanè aliud est, quàm Abrotonum fœmina. Quòd primū (vt Dioscor. inquit) Abrot. fœmi-
 nae descript.
 nis speciem quandam representet, vnde & à quamplurimis Cypressus vulgò dicta est. Deinde quòd candicantibus con-
 sis folijs, circum ramulos minutim incis, floribus aureis, orbiculatis, caulem summum, aestatis & autumnī tempore, co-
 rymborum modo com̄tibus. Postremò quòd in vniuersum suauiter oleat cum grauitate quadam, & amaro gustu. Ex hac
 equidem delineatione adducor, vt discernere non dubitem, hanc plantam, quam vulgus Cypressum, siue Santolinam ap-
 pellet, esse Abrotonum fœminā. Hinc itaq, Fuchsum alioqui rei herbaria gnarum, errasse crediderim, quòd pro fœminei ge-
 neris Abrotono plantam subiecerit ab eo longè diuersam. Qui etsi Santolinam seorsum postea depinxit, non tamen eam
 Abrotoni fœmina nomine agnouit, sed herbariorū, vt arbitror, vulgum secutus, eam Chamæcyparissum, hoc est, pumilam
 Chamæcypa-
 rissus.
 cypressum nuncupauit, eiusq, nullam à Græcis factam fuisse mentionem falso credidit. Caterum quòd Goritienses Abro-
 tonum marem Veronicam appellant, ea sanè planta mihi in mentem venit, qua recentiorum quibusdam VERONICA
 Veronica.
 Veronica du-
 plex.
 vocatur, magnis (vt aiunt) insignita viribus. Hac duūm est generum. Mas, qua humi repit, caule est dodrantali aut mino-
 re, rubelescente, lanuginosq, folijs oblongis, nigricantibus, hirsutis, & in ambitu serratis. Flores edit purpureos circa sum-
 mum caulem emicantes, & semen in siliquis, loculi formam referentibus. Radice nititur tenui, qua in plures diuincatur
 partes. Nascitur locis incultis. Fœmina caule exit lanuginoso, folijs rotundioribus, minimè laciniatis, subpinguibus. Flo-
 res profert in luteo purpurascens: semē in vasculis rotundis inclusum: radicē verò maris amulam. Nascitur in locis asperis
 & incultis: floret Iunio mense. Gustu quidē adstringens, & amara est: vnde conijcere licet, eā esse tū excalfaciendi, tū sicca-
 di vi præditā. VERONICA MAS ad omnia efficiacior est. Medetur cruentis vulneribus, ac diuturnis vlceribus. Sunt, qui
 Fœmina.
 Veronica vi-
 rea.

II. ABROTONVM FOEMINA.

III. VERONICA MAS.





dicant quendam Francorū regē elephantibus laborantem, à venatore suo hac tantū herba fuisse saratū. Tumores præterea in
 vniuersum discutit, præcipue qui in ceruice emergunt. Nec desunt, qui illā summis laudibus efferant ad pestiferas febres, &
 ad pestilentia affectos, quibus propinari præcipiunt sicca puluerem, drachmarū duarum pondere, vna cum theriaca dra-
 chma, vino meraco: cum hoc tamen, vt illico sudent affecti. Eadem datur potanda ex sua ipsius stillatitia aqua vtiliter
 contra tussim, & vitia omnia tum pectoris, tum pulmonis, nam & tabidos, & suppuratos iuuat. Aperit quoque iocino-
 ris, & lienis oppilationes, vterum, renes & vesicā expurgat. Sed vt nostrum sequamur institutū, iam Abrotono medicina
 reddenda

*IV. VERONICA MAS

supina.*

V. VERONICA FOEMINA.

Abrotoni vi-
res ex Gal.

reddenda sunt ex Gal. qui li. 6. simpl. med. ita de eius viribus posteritatis memoria scriptum reliquit: Abrotonum calidum, & siccum facultate, in tertio ordine seu recessu post media situm est. Inuenimus autem eius temperamentum non minime quidem & ex gustu ducta cōiectura, utpote cum sit admodum amarum. Porro saporem eiusmodi, cum terrena sit essentia, à largo calore extenuatum ostendimus. Itaque non instrenue & excalfacit, & desiccatur. Nam siue comam cum floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) contusam vlceri puro illinas, mordax, & irritans videbitur: siue eo in oleo macerato, capite aut ventrem perfundere voles, admodum calefacere reperies. Quin & si qui per circuitum rigoribus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc voles conficere, minus utique rigore concutientur: imò & sensus quidem protinus ubi ad motum fuerit, ipsum calefacere percipit. Porro quod lumbricos interimat, par est, nimirum cum sit amarum. Scies autem protinus, quod & digerendi, & incidendi quandam vim habeat: sed & quod magis quam Absinthio id ipsi necessarium insti, in promptu erit colligere. Primum quidem ex gustu: paucissima siquidem acerbitatis particeps Abrotonum est, non paucè verò Absinthium. Deinde ex eo quod inimicum sit stomacho Abrotonum, velut etiam Seriphium: gratum verò & amicum Absinthium. Siquidem de istis supra ostensum est, quod amarum ipsum per se omnifariam inensum sit stomacho: causticum verò, aut acerbum, aut in summa adstringens stomacho vtile & amicum. Porro ubi qualitates hæc inuicem periclitæ fuerint, quæ vehementior fuerit, ea utique vicerit. Caterum Abrotonum vsus, calidum & siccum facultate est, magis adhuc quam cucurbita sicca vsa, & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conueniunt: ac proinde maximè vlceribus, quæ in pudendorum præputiis sunt, competere videntur. At cinis Abrotoni vlceribus omnibus mordax est: ac idcirco cum oleo tenuium partium, cicino scilicet, aut raphanino, aut sicyonio, aut veteri, & maximè Sabino, ad alopecias accommodatur. Barbam quoque, segnius tardiusque, enascentem cum aliquo dictorum elorum elicit: sed nec minus illis, lentiscino maceratum. Quippe pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet, & mordax est, & calidum: quas utique maximè eius facultates nouisse oportet, nec quicquam præterea particulare in hoc tractatu requirere. Hactenus Gal. At qui nobis quoque dicendum est, quod Abrotoni fœmina folia sicca, & in puluerem trita dantur perquam vtiliter ex aqua parthenij semidrachma pondere ad sistenda alba fœminarum profluvia, si continuis decem diebus, aut pluribus sumantur à ieiuniis: & deinde interpolatis diebus. Id Græci ἀβρότονον dicunt, quod etiam Latini Abrotonum: Mauritanii, Catsum, Kesum, seu Gaissum: Itali, Abrotono: Germani, Stabwort, Schofwort, & Gertuwort: Hispani, Abrotono, & Hierua lombriguera: Galli, Auron, Auronne, & Garderobbe: Bohemi, Brotan: Poloni, Bozedrzeuuko. Caterum Abrotonum fœminam vocant Itali Santolina: Germani, Cypressen: Bohemi, Cypressen: Poloni, Cyprii: Galli, Cypres de iardin. Veronica ita Germanorum officinis vocata, Italis, Veronica: Germanis, Ehrenpreis, aut Grundheyl. At Veronica fœmina: Italis, Veronica femina: Germanis, Ehrenpreis Weiblein.

Abrot. fœm.
vites.

Nomina.

Abrotonum διὰ τὸ πρὸς ὄψιν ἀβρόν, ἢ ἀπαλὸν φαίνεται: ἀλλωστερὶ δὲ διὰ τὸ δυνάμειν εἶναι, ut Nicandri testatur interpretes, quod conspectu tenerum, molle, & delicatum appareat: aut quod grauem acremque & difficilem halitum spiret. Aliud mas, cuius quinque differentias: aliud fœmina, cuius octo differentias notauimus. I. Abrotonum mas angustifolium maius, C.B. Abrotonum mas, Brunf. Matth. Lac. Lobel. Dodon. gal. & fol. Lugd. Taber. Cam. Cæsalp. Cast. Abrotonum nigrum seu mas, Cord. in Diosc. & historia. II. Abrotonum fœmina Dioscoridis, C.B. Abrotonum fœmina, Brunf. Matt. Lob. Cast. Lug. C. Tab. Chamæcyparissus & nobilis Chamæpytis, Trag. Chamæcyparissus, Fuch. Dod. gal. Ericio Cord. Lon. Cor. in Diosc. Gesl. hor. Centonia, eidem, Cupressus herba, Cord. in Diosc. Santolina, Anguil. Saronicū minus. Cord.

Cord. hist. Santolina altera, Dod. fol. Sanctolina, Cæfal. cui Abrotanum Theophrasti, & Abrotanum campestre Plinii. Crispula Alexandrina, Herba Cancri, Syluatico. Hæc variat foliis magis minusve denticulatis, crassioribus, tenuioribus: candidioribus, viridioribus: flore maiore & minore: odore iucundiore, minus iucundo & vinctuoso, quare quinque differentias Dodonæus proposuit. III. Veronica mas crecta C. B. Veronica mas. Matt. Cast. Lug. Veronica recta mas, Lob. Veronica vulgaris recta maior, Clus. hist. Pan. Veronica assurgens, Dod. fol. Hæc duplex, maior, quæ latiore folio & longiore spica: minor, quæ angustiore folio & breuiore spica. IV. Veronica mas supina, C. B. Teucrium, Trago. Veronica mas, Fuch. Lon. Tha. Lugd. Veronica vulgò dicta, Gef. hor. Betonica Pauli, Dod. gal. Veronica maior septentrionalium, Lob. obs. Veronica vera & maior, Lob. icon. Veronica mas serpens, Dod. fol. Veronica camuor, Cam. Veronica, Tab. Auricula muris tertia, ad Myosotidem Dioscoridis referenda, Cæsalpino. Cum hæc officinis Germaniæ sit vulgaris, & viribus illa præferenda sit, eius iconem adicere lubuit. V. Elatine folio subrotundo, C. B. Veronica femina, Fuch. Matth. Gef. hor. (cui toto genere à Veronica differre videtur) Lonic. Cast. Lugd. Cæfal. Dod. fol. Cam. Elatine Dioscoridis, Lob. Elatine prima, Taber. Elatine altera folio rotundo, Thalyo. Verbasculum quorundam, Lugdunensi.

Υσσωπος

HYSSOPVM.

CAP. XXVI.

Hyssopum, herba nulli non cognita, duum generum est, montanum, & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi, & calfaciendi. Decoctum cum ficis, aqua melle & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur, crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis manditur: vehementiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deicit: colorem in corpore fouet. Lieni, & aquæ inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoque ex vino illinitur: cum feruente aqua impositum fugillata discutit: cum decocto flicorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione sedat: inflammationes auricularum vaporis suffitu discutit.

I. HYSSOPVM.

Υσσωπος ἡ ἄγρια


* II. HYS. CAERV.

lea folio dissecto. *

* III. HYS. ALBO

vel rubro flore. *

Hyssopus albus



Non modo sunt, qui dubitent, an vulgare Hyssopum legitimum appellari possit, sed & qui certò credant, id ipsum cum Dioscoridis Hyssopo nullam habere cognationē. Horum opinionem sequuntur monachi illi, qui in Meusem commentarios ediderunt, argumento quòd scripserit Dioscorides (vt Marcellus interpretatur) Origanum Heracleoticum folio esse hyssopi, non tamen habere umbellam hyssopi modo rota figura in orbem circumactam, sed multifidam, & veluti diuisam. Quæ quidem nota non visitur in nostrate Hyssopo, vt quod flores spicatos proferat, non autem digestos in umbellam rota modo circumactam. Quo fit, vt non ab re illi dubitauerint, an vulgare Hyssopum legitimum sit: hi verò crediderint, eo omnino nos esse destitutos. Caterum mihi iam compertum esse puto, hos omnes in dubio, & errore versari, peruersa Marcelli interpretatione deceptos, quandoquidem se aliter habet vulgata Dioscoridis lectio (cui etiam Oribasius, & vetusti quidam Græci codices ad stipulantur) quam verterit Marcellus: ita enim Græcè legitur: Ὁ ῥίγανος ἡρακλεωτικὴ, εἰ δὲ κορυθακάνθη, φύλλον ἔχει ἐμφερές ὑσώπω. σκιαδίων δὲ οὐ τροχοειδὲς ἀλλ' ὡσπερ διστημένον id est. Origanum Hera-

Hyssopi comsideratio. Opinio reprobata.

Hyssopum vulgatum esse legitimum.

cleoticum, quod alij Cunilam vocant, folium habet hyssopo simile: umbellam autem non in rotam speciem orbiculatam, sed veluti multifidam: hac Dioscorides. Ex quibus palam est, non comparasse Dioscoridem origani flores ipsius hyssopi flores, ut perperam Marcellus vertit, cum absolute dixerit, nulla facta cum Hyssopo comparatione, Origano umbellam esse non in rotam modum orbiculatam, sed veluti multifidam. Illud insuper hac in re non parvam ambigendi ansam praebet, quod Dioscorides lib. 4 in Chrysocomes capite prodidit, cum inquit: Chrysocome palmi altitudine fruticat, comam habens specie corymborum, hyssopo similem. Veruntamen si quis praestanti iudicio Dioscoridis verba accurate perpendit, illi sane nihil eorum sententia refragari comperiet, qui Hyssopum, quo passim utimur, legitimum esse contendunt. Siquidem in plantis coma, probatissimorum auctorum testimonio non solum de floribus, & corymbis intelligitur, sed etiam de folijs, & ramusculis, dummodo haec hilariter quadam venustate plantam totam, vel summa eius exornent. Vnde recte Plinius lib. 12. c. 25. balsamo folium proximum rutae, perpetua coma reddidit. Item Virgilius lib. 4. Georgicorum perpulchre cecinit. Ille comam mollis iam tum tondebat acanthi.

Coma in plantis quid.

Ex his perspicuum fieri arbitror, Chrysocomen coma, hoc est folijs, & ramusculis hyssopo esse similem, non autem ipsi corymbis, quibus fortasse in vniuersum scateat. Quamobrem hic nullus, quantum equidem sentio, relinquatur amplius dubitandi locus. Sed quod Hyssopum communis vsus, verum legitimumque sit, uolus manifeste demonstrat Symphytum petraeum a me (ut spero) proximis annis repertum, quod folia, vulgari hyssopo similia proferat. Nam cum scribat Dioscorides, Symphytum petraeum folio esse origani, Origanum vero folia habere hyssopi clarissimum praebet argumentum, quod hyssopum, quo passim utimur, sit verum. Quinetiam cum idem auctor tradiderit, Hyssopum duorum esse generum, nempe montanum & hortense, & utrunque genus in nostrate passim habeatur omnibus notis simile, non modo opinionem auget, hoc legitimum esse Hyssopum, sed omnem quoque litem dirimit. Huc praeterea alia accedit ratio, quod cum Dioscoridis congeneres, vel similes plantas seriatim coniuncteque describere consueuerit, statimque post hyssopum stachadem respiciat, uerit, quae folio, & spicato flore hyssopum nostrum admodum emulatur, ostendit quidem hallucinari eos, qui hyssopum hoc non legitimum esse haecenus uerunt inficias. Adde etiam quod idem (ut experientia comprobatur) in omnibus potest viribus, quas illi reddidit Dioscorides. Postremo cum idem scribat Dioscorides, Hyssopum nulli non cognitum esse, uxor, sane, cur quidam, qui vulgare nostrum illegitimum faciunt, legitimum non asserant in medium, & praesertim cum non solum in hortis Dioscoridi habeatur, sed etiam in montibus. Dixi sententiam meam, a qua ne minimo quidem reuocemur, quousque, qui nobis refragantur, utrunque asserant Hyssopum, quibus umbellae insint. Hyssopum montanum in comitatu Goritienji Saluatino monte frequentissimum nascitur, facie floribus, & coma horrensi non absmile, (nisi quod hyssopus syluestriusque, apparet) rudioribus folijs & asperioribus, & gustu amarioribus, nec usque adco acerbis. Nitebit tamen, si transplantetur in hortum, sitque hortensi simile, exuta syluestri natura. Itaque diuinus nos hyssopum plantam vulgarem esse notitia, haberi que ubique, ferè ad manus, non solum hortense, sed etiam montanum. Item si utuam esse iurculis pluribus ab una radice prodeuntibus, lignosis, sesquipedalis: folijs in vniuerso caule oblongi, circumquaque per interualla prodeuntibus, duriusculis, odoratis, & gustatu feruidis, amariusculeque. Flores illi sunt in caulium summitatibus spicati, caules coloris. Radix multifida & lignosa. Tenuius est partium, ideoque incidit, atteruat, aperit, & abstergit. Aduersatur serpentium ictibus, si cum sale, & cumino tritum ex melle vulneri illinatur: et oleo inunctum pediculos necat, & capris pruriginem tollit. Iuuat comitiales, quoquo modo his praebeatur, sed ualentinus id efficit, in catapotijs hoc modo paratis. Sumuntur hyssopi, marrubij, & Castorei, singulorum semidrachma, radice Paonia drachma dua, ass. fetida scrupulus: teruntur deinde omnia, & cum succo eiusdem hyssopi formantur catapota septem, è quorum numero una tantum datur quolibet uesperis, cum se dormitum recipit affectus. Hyssopi paucis neminit, Gal. lib. 8. sim. medicam. sic inquit: Hyssopum defecat, & excalfacit ordine tertio: sed & tenuis est partium. Hyssopi quoque vires, describit Mesues, ita aduensum scribens. Hyssopum hortense pituitam facile dicitur, quod si uis dixerit aliqui, quod & atram bilem educit addito septis sale, aut lido. At ipsum pituitam purgare manifesto experimento constat, praesertim quae in pectore, ac pulmone continetur. Facit Hyssopum ad pituitosos tum cerebri, tum reuorum affectus: quod non modo mundat, sed quod etiam roborat. Quin & pectus, & pulmonem detergit, praesertim si nibus, quorum pectus lnta, crassaque pituita refertum est: quo fit, ut asthmaticis, & tussientibus opituletur. Dicitur hyssopi vsus contumaces insationes, cibi appetentiam inuitat, menses & urinam ciuet, & febrium humores excutit: visum acuit. Melle commistum interaneorum tineas necat, nitri tamen addito momento. Oleum quod tum folijs, tum floribus paratur neruos, algore affectis inunctum sanat, & roborat. Potest eadem & montanum atque etiam hac omnia efficacius praestat: haecenus Mesues. Caeterum nonnulli crediderunt herbam illam, quae vulgo ab aliquibus GRATIOLA vocatur, ab alijs Gratia dei, a quibusdam etiam, ut à Foroiulensibus, Stanca cauallo, quod equi eius pabulum mire defatigentur, esse Hyssopum illud montanum, de quo Mesues in suis scriptis mentionem fecit. Sed ij, omnium ferè iudicio, uidentius hallucinati sunt, quam ut pluribus demonstrare sit eppus. Quoniam uero in Gratiola herba sic dicta sermonem incidimus, hic locus postulat, ut de ea aliquid dicamus. Nascitur haec in locis humidis, praecipue in pratis vliginosis, prouenit etiam in palustribus. Herba est, quae dodrantale altitudine excedit, caule quadrangulari, folijs hyssopi latioribus, et longioribus, flore fert in purpura albicante, inter folia erumpente quae caule ambiunt. Gustu herba haec amarissima est, quo etiam quadaem adstringens sentitur. Excalfacit, siccit, incidit, attenuat, aperit, deicit, abstergit, vulnera glutinat, aluum vehementer purgat.


Hyssopum montanum.

Hyssopi hist. Matth.

Hyssopi vires Matth.

Hyssopi vires ex Galeno, & Mesue.

IV. GRATIOLA.



Gratiola hist & vires.

Gratiola
Sic. hist. 254

Jul. ic. 367

nam recens quam sicca sumpta, bilem pituitamq; trahit. Vulneribus celeriter medetur, trita & superposita. Qui hanc plantam Meues Eupatorium esse contendunt, omnino cacutiunt. Herba *ἰσχυρὸς* Græcis dicta, Latinis Hyssopum appellatur. Arabibus, *Cyfe*, *Iusa*, seu *Iabes*: Italis Hyssopo: Germanis *Kirchen Hyssop vnd Kloster Hyssop*: Hispanis, *Hyssopo hierua*, & *Hissopilho hierua*: Gallis, *Hissope*: Bohemis *Hyssopo*: Polonis *Izop*.

Hyssopum Græcorum, si caput Dioscoridis de Origano Heracleotico & Oniti, caput item de Chryfocome consulamus, longè diuersum esse ab Officinarum Hyssopo, clarum cuiuslibet fiet, vt in historia nostra exponemus: etenim Officinarum Hyssopus ad Symphytum petrarum Dioscoridis referendus videtur: cuius aliquot notauimus differentias. I. Hyssopus vulgaris cærulea, C. B. Hyssopus, Brunf. Trag. Lacu. Lonic. Cord. in Diosc. Taber. Cam. Hyssopum, Matth. Cast. Hyssopus hortensis, Fuch. Hyssopus communis, Dod. gal. Hyssopus vulgaris, Gesl. hor. Dod. fol. Hyssopum vulgò dictus, Cæsal. Hyssopus satiuua, Cord. in hist. Hyssopus satiuua vulgaris, Lugd. Hyssopus Arabum, Mesue & officinarum, Lob. Communiter ex vna parte floret, aliquando vtrinque florifera: aliquando spica breui & rotunda: habetur quæ odore moschi à vulgata differt. II. Hyssopus cærulea folio dissecto, aliàs à vulgari non discrepans, quare tantum ramum exprimi voluimus. III. Hyssopus albo vel rubro flore, C. B. Cam. Hyssopus albis floribus & Arabum flore rubro. Lob. Lug. Hyssopus Arabum, Taber. Rubra flores vno tantum ordine sapius digestos habet, aliquando & vtrinque. IV. Gratiola centauroides, C. B. Gratiola Matth. Dod. gal. (cui Centaurii minoris species videtur) & fol. Lob. Cast. Lugd. Gratia Dei, Lacu. Anguil. cuius semen vult Arabibus *Gilbenech* dici: Gratia Dei altera, Cæsal. *Limnesion* seu *Centauroides*, Cord. in hist. Pappuer spumeum Dioscoridis esse, suspicatur Anguillara. Eupatorium Mesue, ex Cordi sententia. Gesl. de hortis. Variat flore, qui purpurascens, albus, rarius luteus: aliquando integris foliis, aliquando & frequentius crenatis. V. Gratiola minor, ex radice aliquando crassiore, aliquando tenuiore ac fibrosa albida, caules exurgunt erecti, aliquando plures, vt fruticosa fit, aliquando vnica subrufus, rotundus, striatus, cubitalis, quem cingunt folia Polygoni masculæ (aliis Hyssopi) æmula, alternatim disposita, pallidè virentia, pediculis carentia: ex quorum alis singuli flores ex oblongis calyculis prodeunt quadrifolii, eleganter cærulei, quibus succedunt vascula oblonga, semina minuta subfusca continentia. Hæc omnis odoris expers est, & penè insipida, licet aliqui nitrosam, alii subdulcè in ea saporem notarint. Hæc variat foliis, est enim altera latioribus, quæ altius exurgit, altera angustioribus & oblongis, quæ vix palmaris. Iunio Mense florent. Nascitur locis humidis, aliquando & viginosis, quam legimus primum in Patauinis paludibus, vbi latioribus est foliis, & ad portam S. Iustina: dein circa Monspelium in rivulis, vbi Angallidem aquaticam uocant: tum in Alsaria non longe Mulhusio, locis vdis: quæ verò angustioribus est foliis Monspelluli etiam prouenit ad Gramuntium lucum. In Hætsia sunt qui notarint, & Halimum aquaticum uocant: sic & in Franconia Cameraritis, cui Hyssopoides: Ioh. Bauhino, Hyssopifolia: Gesl. in libello de collect. stirpium Gratiola minor: Cordo in obser. Grafe Polen dicitur.

* V. GRATIOLA MINOR. *



10
30
40
fopoides: Ioh. Bauhino, Hyssopifolia: Gesl. in libello de collect. stirpium Gratiola minor: Cordo in obser. Grafe Polen dicitur.

Στοχάς

STOECHAS.

CAP. XXVII.

Stœchas, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur: vnde cognomentum accepit. Herba tenuibus surculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & a aliquantum acris: cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis vtiliter miscetur. b [Viscera omnia, & vniuersum animantis habitum extenuat, confirmat, & ab obstructionibus & farctu liberat].

Stachadem officinarum vulgus Sticados appellat. Nascitur hac non modo in Gallia (vt Dioscorides scribit) ex aduerso Massilia in insulis, quas Stœchadas vocant; sed & in Arabia, vnde cum aliis mercimonijs, quæ ex Alexandria aduehuntur, Venetias comportatur. Quapropter tam à medicis, quam à seplasiarijs, indito ab Arabia cognomento, hodie Arabica nuncupatur: etsi Massiliensis pelagi stœchas plerunq; Arabica vicem expleat. Prouenit præterea in nonnullis Italia locis, verum ea ceteris in Italia præstat, quæ ex Gargano Apulia monte aduehitur: quanquam omnium probatissima est peregrina, quæ ex Arabia defertur, hanc deinde sequitur, quæ in Stœchadibus insulis nascitur, à quibus primum nomen adiuuenit. Est itaq; stœchas Lauendule nõ absimilis, folijs oblongis, crassis incanisq; acruatim in vniuerso caule exeuntibus caulibus pluribus ab vna radice prodeuntibus, lignosis: Flores edit Thymi modo subcæruleis in spicatis, oblongisq; capitulis, in quibus semen oritur melissophylli non absimile. Radix est illi lignosa, ac multifida. De Stœchade vires scripsit Galenus lib. 8. simp. med. vbi sic inquit: Stœchadis gustu quidem qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Ceterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, vnde sanè adstringit: & ex attenuata altera terrena copiosiore, à qua vtiq; amara est. Ob vtrorumq; verò conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum viscera omnia, tum totius corporis habitum est nata. Supra namq; ostensum est, quod qua ex eiusmodi es-

a Meum.
πρόσθετος ἰσχυρὸς
πικρὸς.
quodā modo subamara.
b Conclusa in meo exemplari, & Catacuzeni desunt.
Stœchadis consideratio.
Stœch. de scriptio.
Stœchadis vires ex Gal.

STOECHAS.

Mesit. de
Stœch.

Nomina.



sentijs constant medicamina, dictos effectus reddere possunt. Mu-
tus quoq; meminit Mesues, ita de eius viribus differens. Stœchas
deicit tum pituitam, tum atram bilem: cerebrum, nervos, ac
sensuum omnium organa mundat, ac roborat. Prodest contra
frigidos morbos qualescung; sint, ideog; committibus conueniens
remedium habetur, addita scilla, aut eius aceto. Balnea, fomen-
ta, ac lacrima, qua ex ipsius tum decocto, tum vapore sunt, oc-
clusos narium meatus aperiant: nervorum, & compaginū con-
ciatus mitigant: ac interna viscera frigido humore affecta robo-
rant. Absternendum tamen ab ea biliozis est, praesertim si eorum
ventriculus sit bile refertus: nam eos maxime turbat, nauseam
commouet, sitim accendit, & calore quodam molestissimo vni-
uersum afficit corpus. Quae planta Graecè *στὴχάς*, Latine item
Stœchas nominatur: Arabice Astechodos, Astuborados siue Astu-
chudes: Italice Stech. id. seu Steca: Germanicè Stœchas Kraut:
Hispanicè Cantuesso: Gallicè Stechados: Bohemice Stechas.

Stœchas duplex est Officinis, Arabica, de qua nunc,
& Citrina. Arabica ea est, quam Dioscorides hic pro-
posuit, quae à loco natali Stœchas dicitur: sunt qui recti-
us stachyn, quasi spicam dici velint. Haec habetur foliis
integris, quae vulgaris est, altera serratis & crispis, est
& tertia cuius cauliculi foliis nudi sunt. Dicitur Stœchas
purpurea. C. B. Stœchas, Trag. Matth. Lac. Dod. fol.
Lón. Lob. Cast. Lugd. Stichas, Fuch. Dod. gal. Stichas
Arabica, Cord. in Diosc. & hist. Stœchas vel Stychas,
Gef. hor. Stœchas prima, Clus. hist. Hisp. Stœchas Ara-
bica, Cam. Spica Italica syluestris, Casalp. Quae ex A-
rabia adfertur, densioribus est ramulis, quam sit Gal-
lica vel Italica.

ὀρίγανος

ORIGANVM.

CAP. XXVIII.

a Cat. τριχόμ
sic

b Cat. θαμ-
νοειδῆ i. fru-
ticantibus.
c Deest in
meo & Cat.

Organum Heracleoticum, quod & cunilam vocant, folium habet hyssopo non dissimile: a um-
bellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam: semine in summis virgis
haud quaquam denso. Excalfacit: vnde decoctum cum vino potum demorsis à serpente conuenit: qui au-
tem cicutam, aut meconion hauserunt, iis ex passo: si verò gypsum, aut ephemeron, ex aceto mulso pro-
pinatur: ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico esui datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua
mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. Ad prurigi-
nem, psoras, regiumque morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus virentis, tonsillas, vnam, & oris
vlcera sanat, & per nares ex oleo itino infusum trahit: aurium dolores cum lacte mulcet. Conficitur ex eo
& capis, & rhoe, quo ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per
dies bis vicenos intolatis, dum caniculæ sydus flagrat. Herbae autem substratu serpentes fugantur. Quae
Onitis appellatur candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet.
Vis ei origani Heracleotici, sed multò inefficacior. Syluestre organum, aliqui Panaces Heraclion, alii Cu-
nilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Foliis est origani: ramulis tenuibus, b dodrantem
altis: in quibus c [umbellae anethi insunt] flores candidi, radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis
à serpente folia & flores ex vino poti auxiliantur.

Τραγορίγανος.

TRAGORIGANVM.

CAP. XXIX.

a Meum
θαμνοειδῆ
i. exiguus
frutex. sed
Ca. habet
θαμνοειδῆ
simpliciter.

Origani hi-
storia varia.

Tragoriganum a tenuis frutex est, syluestri serpillio aut origano similis, folio, & ramulis. Quibusdam
in locis latius, virentiusque inuenitur, & latioribus foliis, satis glutinosum. Alterum exilibus suscu-
lis ac tenuibus foliis, quod aliqui prasium vocauerunt. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrnaeum,
& in Chio, Cooque proueniens. Omnia excalfaciunt, vrinam cient, aluo accommodantur. Decocto po-
to bilem deiciunt, lienosis ex aceto bibere prodest: contra pota ixiæ venena in vino bibuntur: menses
trahunt: peripneumonicis, tussientibus ex melle, in eclegmate dantur. Grata, ac mitis eorum potio est:
quare cibum fastidientibus, & stomacho acida ructanti, imbecilloque praebetur: item si à maritima ia-
ctatione nausea, & æstus praecordiorum excitetur. Tumores verò cum polenta illita discutuntur.*

* ποιεί δὲ τὰ αὐτὰ ἄπερ ἢ ὀρίγανος, ἢ ταύτης γὰρ αἱ ρίζαι πινόμεναι, ἢ εἰς ἐγκάθισμα κατεφόμεναι ποιῶσι πρὸς χρο-
νίαν ἐμύμων κατοχὴν, ἢ πρὸς θηριώδητους, ἢ πρὸς δολιχτήριον, ἢ πρὸς ἑξαχρονίαν, ἢ κνησμόν ἢ ψώραν. i. faciunt
hæc eadem quæ & Origanus. Nam radices ipsius decoctæ pro potu, aut infusionibus faciunt ad diurnum soporem, &
ad morsus viperarum & venena, & ad tussim antiquam, & pruritum & scabiem.

Varia ac confusa est apud antiquos rei herbaria auctores Origani historia. Quandoquidem Theophrastus lib. 6. c. 2. de
plantarum historia duo tantum constituit Origani genera, nigrum sterile, & candidum fructuosum. Plinius verò
lib. 20. c. 17. post Onitidis origani, & Tragorigani mentionem, Heraclium organum subiunxit, quod tria habere genera
prodidit. Vnū nigrum, latioribus folijs, glutinosū. Alterum exilibus, mollibusq; sampsocho non dissimile, quod aliqui pra-
sion vocauerunt. Tertium inter hæc mediū, minus quam cætera efficax. In quibus verbis Plinius deprehenditur, non sine errore
Tragori.

Trageriganum cum Origani generibus confudisse, quod Heraclij nomine, quod constat Origani genus esse, duas illas Plinii lapsus, Trageriganum species, quae a Dioscoride redduntur, huius ferè imitatione expresserit: licet tertium quoque addiderit ex alio Tragerigano cum Origano confundentis. forte sanctorum, nisi dixerimus, quod & hanc pro aliquo Origani genere sumpserit, & simul confuderit. Sed dimissis alio-

I. ORIGANVM HERACLEOTICVM.

II. ORIGANVM ONITIS.




* III. ORIGANVM ONITIS folio subrotundo.*

* IV. ORIGANVM VVLGARE.*



V. TRAGORIGANVM.

Brafuoli opi
nio reiecta.Origanum
ex Creta.Tragoriga-
num.Origani vi-
res ex Gal.

Nomina.

deant, hic pictura exprimenda duximus. Tragoriganum vero (ita hanc plantam mihi appellandam proposui) cuius etiam plantam pictam exhibemus, frequens nascitur in Forouliensi agro, solus serpilli amulus, sed gustu pulegy. Unde non abre statim post ipsum pulegy meminit Dioscorides. De omni tam Origani, quam Tragorigani genere differens Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Origanus Heraclotica quidem efficacior est onitide: sed acresis, quam quidam Panaces Heraclium, alij Conylā cognominant, valentior utraq; est. Omnes vero incidendi, extenuandi, excalescendiq; facultatem possident: hæcq; tertio excessu obtinet. Porro ea, quam Tragoriganum appellant, assumsit etiam adfirmatorum quippiam: hæc Galenus. Ex cuius doctrina patet, rectè cum us agi, qui sylvestre ex Creta petitur suum medicamentum infir- runt. Origanum vulgare, excalescit quidem, quod gustu subacris sentiatur, & siccat quoq; similiter, sed hand strenue aperit, digerit, incidit & resoluit, sed longè mitius quam præscripta Origani genera. Planta Græcis ὀρίανος, Latinis pariter Origanum vocatur: Mauritanis, Fandenigi, Fudenegi, seu Faudéngi: Italis Origano: Germanis Wolgemut, Rore Do- sten vnnō Costens: Hispanis Oreganos: Gallis Origan, aut Mariolaine bastarde: Bohemis Dobramisi: Polonis Czynu- nalbeothka. Origanum vulgare vel potius Pseudoriganum: Italis Origano nostrano. Germanis Wolgemut.

Origanum dicitur δία τὸ χαίρειν ὄρεσιν, ut Eustachius habet, aliis παρὰ τὸ ὀρεῖν καὶ γὰρ ὄρεον, quia visus claritati conducit. I. Origanum Heracloticum, C. B. Matth. Dod. gal. & fol. Lac. Gef. hor. Lob. Cast. Lugd. Tab. Cam. Origanum peregrinum primum, vel Origanum sextum, Trag. Origanum alterum, Cæsalp. cui & Cunila Gallicana Plinii. II. Origanum Onitis, Matth. Lac. Lonic. Gef. hor. Cast. Lugd. III. Origanum Onitis folio subrotundo, C. B. Hoc caule purpurascente, & foliis subrotundis hirtutis cum Origano vulgari conuenit, at spicis suis oblongis & elegantissimis Onitidi simile, quæ purpureæ sunt, semen pusillum, ruffum, ut reliqua Origani genera continent. Hoc Monspelio vbi prouenit, à Doctore Ioh. Henrico Cherlero accepimus, cuius figuram primus Camerarius in suo Matthiolo, Origani Monspelienensis nomine exhibuit. IV. Origanum sylvestre, C. B. Fuch. Dod. gal. & fol. Lacu. Gef. hor. Cast. Taber. Cam. qui ad Heracloticum Diosc. refert: Origanus sylvestris, Cord. in Diosc. Origanum, Brunf. Origanum vulgare, Trag. Matt. Lon. Gef. hor. Thal. Origanum vulgare sylvestre, Lugd. Agriori- ganum siue Onitis maior, Lob. Origanum Italicum, Cæsal. cui & Tragoriganum Dioscoridis, Cunila est bubula Plinio. V. Tragoriganum Matth. Lac. Cast. Lugd. Tragoriganum primum, Tabernamontano.

Πλήχων.

PVLEGIVM.

CAP. XXX.

Pvlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit: potum menstrua, secundas, ac par- tus eicit. Pulmonis vitia ex melle, & aloe potum extrahit, & conuulsis auxiliatur: nausæas, sic ma- chiquè erosiones ex posca perinulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in vino vtilissimè con- tra serpentium morsus: defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas aiefecti cinere, corroborat. Illitum cum pollenta inflammationes omnes sedat: podagris per se subuenit, impeditum visque dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit: lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriginis mitigat: conuersas vuluas corrigit: contra inflationes, duritiasque vuluar in de- scissio-

rum placitis, & Dioscoridem, quem nolis ducem, & auctorem proposuimus, duntaxat secuti, dicimus tam Heracloticum, quam Onitum appellatum Origanum, aut in Italia non ori- aut mihi hæc tenus, quod sitam, a nemine fuisse repertum. Et si Brasauolus Ferrariensis medicus nostræ ætatis clarissimus as- ferere videatur, Heracloticum illud herbae genus esse, quod in Italia posim nascitur, quodq; perperam Origanum vulgo ab omnibus vocatur. Verum huic (pace eius dixerim) nunquam assentiri potui: qui potius eam plantam sylvestris Origani ge- nus esse semper existimauit, quod sua sponte in campis, in asperis, cluosisq; locis & montibus proueniat, quod folia mit- tit amaraci maiora, subhirsutaq; caules complures pilosos, fo- res in summitate purpureos in umbella multifida modum ra- dice summa tellure vrigante, purpurascenti admodum vubilla. Nam quamuis a Dioscoride vna tantum sylvestris origani species describatur, floribus candidis. nil tamen obstat, quin in alijs quoq; a Græcia regionibus vna, vel altera eius species floribus differens gigni possit. Atqui si qui tam pertinaces sint, ut nolint illud sylvestre appellare, poterunt, si velint, uem pseudoriganum nuncupare. Siccum origanum, quod Veneti- è Creta, vbi prouenit, ut & in Cypro & alijs Aegæi maris insulis (quem admodum & Onitis) aduchunt, flore est albo, acerrimo gustu, fragrantiq; odore. Quo fit, ut hoc esse putem sylue- stre Dioscoridis origanum, (quanquam apud plerosq; Heracle- otici, vel alterius nomen sibi falso vendicet) non solum quod floribus sit candidantibus, sed etiam quod gustatu linguam ad- modum vellicet. Siquidem hinc facile conyui potest, sylvestre o- riganum ceteris (ut Galenus testatur) esse valentius. Heracle- oticum origanum, itemq; Onitum misit ad me primum clarif- simus medicus Lucas Ghinus (quæ mihi sunt eius non solum præstantis doctrina, sed etiam ingenui, ac liberalis animi certa ac firma indicia) vtrumq; è Creta (ut ad me scripsit) allatum. Quæ duo Origani genera quod satis Dioscoridis historia respon-

excreatu facilia faciat, mens esq; moueat. Hac Gal. quibus addimus nos, pulegij decoctum vrinas ciere, fatum & secundas trahere, ictericos, hydropicosq; iuuare, omnibus capitis & neruorum affectibus, a frigiditate prognatis succurrere, risum a- cuere. Γλήχων herba sic Græcis, Pulegium Latinus dicitur: Mauritanis Alnam, Alnegem seu Aluegen: Italis Pulegio: Ger- manus Poley vnd Hærs Poley: Hispanis Poleo: Gallis Pulege & Poulior: Bohemis Poleg: Polonis Polej.

Nomina.

Pulegium duplex est, latifolium & angustifolium. I. Pulegium latifolium, C. B. Pulegium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. & hist. Lon. Cast. Cæs. Cam. Pulegium fœmina, Fuch. in icon. Pulegium aquaticum, Gef. hor. Pulegium regium, Lug. Pulegium regium vulgatum, Lob. II. Pule- gium angustifolium, C. B. Pulegium ceruinum Gef. hor. Cam. Lugd. Pulegium alterum foliis oblongis, Dod. fol. Pulegium angustifolium siue Ceruinum Monspelienfium odoratus, Aduers. & Lob. Pulegium 10 Massilioticum, Tabernæmontano.

Δίταμονος

DICTAMNVM.

CAP. XXXI.

a Cat. addit. δηλιανθ. id est mordax.

DICTAMNUM, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretensis herba est acris, a leuis, pulegio similis, sed maioribus foliis, quæ tomento quodam, spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum, aut te- men profert. Præstat omnia, quæ satium pulegium, sed efficacius multò: nam non potum modò, sed ap- positum quoq; aut suffitum, defunctos partus euicit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius her- bæ pastu eas excutere: Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedib. reliquove corpori aculeos, illitu refigit: ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. 10 Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit: partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tanta herbe facultas est, vt olfacta abigar bestias, quæ venenato icu læ- uiant, appensaq; contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus infusus succus, præ- sentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur.

Ψευδοδίταμονος

PSEVDODICTAMNVM.

CAP. XXXII.

QVOD Pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile: sed minus, quàm illud. 10 cre. Eisdem effectus præbet, sed ineffacius multò.

Δίταμονος ἕτερος.

DICTAMNVM ALTERVM.

CAP. XXXIII.

a Ca. ὀρμίνω ἀγρίω. i. syl- uestri Hor- mino.

DEFERTUR à Creta alterum dictamni genus, foliis sisymbrii, ramis maioribus: in quibus flores sylue- stris a origani, nigri, molles. Odor foliorum inter sisymbrium & saluiam, iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca vocant.

I. DICTAMNVM CRETENSE.

II. PSEVDODICTAMNVM.



Origanum dictamnium

Dictamnium

Dictamnium legitimum ac probatissimum in Creta insula tantum gignitur: neq; tamen inibi passim, sed in angusto loco duntaxat provenit, ut author est Theophrastus, qui lib. 9. cap. 26. de plantarum historia Dictamnium posterit. i. i. r. memor. & prodidit, his verbis: Dictamnium Creta insula proprium est, vi mirabile, & ad plura perutile, sed ad partum mulierum potissimum pollet. Folio pulegio simili constat, nec sapore ab simile est: ramulis tenuioribus conditur. Vnus soliorum, non ramorum, nec fructus est: valent enim ad multa, & precipue ad difficiles partus mulierum, ut dictum est: aut enim facile posse parere faciunt, aut certe dolores penitus sedant. Dantur bibenda ex aqua. Rara haec herba: locus enim, qui fert, exiguus admodum est, eumq; capra depascunt capessenda causa voluptatis. Quod etiam de telus fertur, verum esse affirmant: capra enim sagitta transfixa: Dictamnio deuorato telum eicere. Dictamnium tale est, viresq; eiusmodi possidet. Falsum Dictamnium folio quidem simili constat, sed ramulis minus, & viribus longe inferius: quanquam enim eiusdem in rebus profici, tamen multo deterius, atq; debilius. Vis Dictamni in ore percipi continuo potest: excalfacit enim paulo vehementer. Manipulos in ferula, aut canna inter ludere solent, ne expiret: est enim imbecillius, cum expirauerit. Non desunt, qui narrantam Dictamni, & falsi Dictamni eandem esse existiment, sed quod locis latioribus exeat, degenerare, falsumq; cognominari: ficui etiam alijs pluribus euenit, ut viribus deterioribus ex loco reddantur. Dictamnium enim asperum solum vehementer amare inquit. Est etiam aliud Dictamnium veluti aquiuece appellatum: nec enim specie, nec vim habet can-
 10
 20
 30
 40
 50
 60

Falsum Dictamnium.

Dictamnium alterum.

Dictamnium fert flores.

III. DICTAMNVM ALBVM.

Hic Venus indigno nati concussa dolore,
 Dictamnium genitrix Cretea carpit ab Ida,
 Puberibus caulem folijs, & flore comantem
 Purpureo: non illa sero incognita capris
 Gramina, cum tergo volucres haesere sagittae.



Plinio Dictamnium non modo flore, & fructu caret, sed etiam caule, quod tamen experientia, & ante dictorum testimonio plane falsum esse deprehenditur. Nasitur in Creta exoluto solo. Pseudodictamnium porro hodie paucis (ut arbitror) notum. Pisis hoc tempore ad me misit clarissimus Medicus Lucas Ghinus, caule dodrantali, lanuginoso, albicanteq;: cui folia e cauibus erumpunt ex intervalis bina subrotunda, Dictamni tomento pubescentia: e quorum omnium exortu flores purpurei prodeunt, marubij vel melissophyll modo verticillati, sapore pulegij, minus tamen acri. Vulgare autem Dictamnium ALBVM vulgo cognominatum, nullam cum Creteni cognationem habet. Siquidem planta est insignis, & gratissimo sane aspectu, spectataq; pulchritudinis, folijs fraxino admodum similibus ut a quibusdam χαμμημεία, id est infima fraxina, sit appellata. Caule gerit bicubitale, rotundum, in cuius cacamine flores sunt Citrei mali non ab similes, odore quadam graueolentia acuto, non tamen iniucundo, ex purpura albicantes, ut in malua. Radice nititur diuaticata, & quandoq; singulari, albicante, crassa pulpa substantia, & tenui intus matrice, amara, & dum recens est, hircum olente, minimi dyiti crassitudine. Flores in quinquebras siliquas abeunt, siliquis seriis cortice, in quibus semen. Nasitur in collibus cliuosis, & saxosis, excalfacit & siccatur. Radix, cuius est vsus, attenuat, aperit, prouocat & abstergit. Additur vtiliter in antidotis, quae aduersus venena, & venenosorum animalium ictus parantur. Necat interaneorum vermes, drachma podere hausta. Datur contra frigidis vteri morbis. Nam & menses, & secundas, & mortuum foetum educit, tum supposita, aut cum pulegio suffusa, tum ex vino

Plinius notatur.

Pseudodictamnium.

Vulgare dictamnium, eius historia Matthiolo.

Vires.

Dictamni vires ex Gal.

Nomina.

metaco pota duarum drachmarum pondere. Valet quoq; ad alui torsiones, & ad eiciendos renu calculos, eodem pondere. Ad datur vtiliter in portione interioru vulnerum. Quidam ea vsi sunt et ad Gallicu morbum, drachma quotidie prabentes ex Galiaci ligni decocto, non sine magno egrotantiu cum nodo: datur quoq; comitia: ib. & in alijs frigidis cerebri affectib. Praestat contra pestilentia contagia, quocumq; modo sumatur: in summa ad ualta vtilis est radix. Siliqua & flores tactu prurum faciunt: & in calidiorib. regionibus cutem exulcerant. Dictamni, a falsi Dictamni vires tradidit Galenus lib. 6. simp. med. si. inquit: Dictamnium tenuiore essentia constat, quam pulegium: cetera illi simile. At quocumque Pseudodictamnium ad omnia imbecillius Dictamnio est. Quae herba Graece δικάμνο, Latine quoq; Dictamnium appellatur: Arabicè Mescatremi, Aegypti Arabae sive Bari: Italicè Dittamo di Candia: Germanicè Wilder Poley: Hispanicè Ditamo & Ditamo real: Bohemicè Diptanebo Treadana. Quod verò Graeci ψευδοδικάμνο, Latini ite Pseudodictamnium, & falsum Dictamnium dicunt:

dicunt: Itali Falso Dittamo. Caterum vulgare dictamnum appellant Itali, Dittamo bianco: Germani Gemenher Diptam: Galli Diptam bastard: Bohemi Treudauua faleffna: Poloni Dyptam trzomdanla. Qui album Dictamnum, Dioscoridis Tragium esse contendunt, delirio procul dubio afficiuntur.

† Hic locus illi prorsus est similis, qui in vulgatis Dioscoridis exemplaribus legitur libro primo in capite Nardi montani, idcirco in hoc similiter, atq; in illo adnotauimus, mendum subesse arbitramur. Ergo communis quoq; erit vtriusq; loci ratio, qua vterq; sua, vt spero, integritati restituatur. Et quoniam superuacuum esset ea referre, qua alibi a nobis dicta sunt, nunc dictam tantum quomodo hic legendum censeam. Vulgata & ea quidem deprauata lectio, quam secuti sunt interpretes, habet ετε δ' αμβρο: ετε καρπον φειει. At illa, quam nos veram putamus, erit ετε δ' αμβρο: ετε καρπος συμφορη, que verba ita Latine reddemus: Neq; vero flos, neq; semen confert. Ex hac castigatione illud facile fiet, quod Dioscoridis auctor grauiissimus non solum erroris suspitione non condemnabitur, sed etiam maxime commendabitur, quod ea scripta tradiderit, qua cum alijs veteribus conueniunt.

Dictamnum, δαδ τῆ τριζων, eod quod vt Dioscorides, δζυ'όκον δζζ. I. Dictamnus Creticus seu Cretensis, C.B. Trag. Dod. gal. Lon. Cam. Cæsal. Dictamnum Cretense, Matth. Dictamnus, Brunf. Lacu. Dictamnum, Lob. Dictamnum verum, Dod. fol. Lug. Dictamnus vera, Cord. in Diosc. Gef. hor. II. Pseudodictamnus verticillatus, C.B. Pseudodictamnus, Matth. Dod. gal. & fol. Lacu. Cast. Lug. Cam. cui καλαμμοθεία hodie in Græcia. Pseudodictamnus floribus verticillatis, Lob. Pro Pseudodictamno ex Creta allata, Cæf. Hic duplex, inodorus & odoratus. III. Dictamnus album, Matt. Cæsal. Cast. Cam. Dictamnus putatus, Brunf. Dictamnus nostra, Cord. in Diosc. Dictamnus vulgaris, Trag. Gef. hor. Pæonia mascula, eidem. Dictamnus officinarum, Lon. Tragium, Dodo. gal. Gef. hor. Chamæmelia, id est Pumila fraxinus, eidem. Fraxinella, Cord. hist. Lob. Cluf. hist. Pan. Lug. Taber. Huius duo genera aliud humilius, breuiore spica, floribus & foliis diluitoribus: aliud elatius, oblongiore spica & saturatiore, foliis nigrioribus.

Ελελίφακον. SALVIA. CAP. XXXIIII

Salvia siue Elelisphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habes quadrangulas, & canas, folia malictoni effigie, a sed longiora, asperiora, crassiora, & qua sensim attritarum quasi vestium scabritem referant, hirsuta, subalbida, b perquam iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus syluestri horto mino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & vrinis decoctum folioru, ramorumq; potum, & partus extrahit, & pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, c vulnerum sanguinem cohibet, tetra vlcera purgat. Testium pruritus sedant rami foliaq; si eorum decocto cum vino foueantur.

a Meum
επιμηκίσι-
ρα δὲ εἰς μι-
κρότερα καὶ
πράχιστα
ληθότως ὡς
περ ἄνα-
τείπια τῶν
ἱμαλιῶν. id
est, longiora
autem & mi-
nora, & aspe-
ra, ταύτην
falsam, ut ve-
stium (ut ita
dicam) attri-
tiones.
b Catac.
ἰνὸς ἢ ὡμ-
βρομα τῆ
γεύσει.
c Catac.
πρᾶγμα ἰκὴ
εἰς ἰσχυρισ-
μὸν. i. vulneribus
conducit, &
sanguinem
sistit.

I. SALVIA MAIOR.

II. SALVIA MINOR SI-
ue Sphacelus.



Aded est vulgaris notitia Salvia hortensis, vt nulli prorsus reperiantur horti, in quibus hodie frequens pefim non fructetur. Est etiam preter hanc Salvia syluestris, qua in campestribus asperis, incultis, & montibus prouenit, salis domesticis similibus, candidioribus: tamen, & hirsutioribus. Quo fit, vt longe aberrant, qui pro syluestri Salvia, agrestem l'cminum vsurpant, quam seplasiarj Centrū galli, & Gallitricū etiā appellant. Verū animaduertiendum est, quod illa, qv. m. hinc

Salvia

III SALVIA BACCIFERA.*

sylvestrem appello, ea sanè non est, quæ in Hispania campestribus, & asperis locis, ac in Massiliensi agro vna cum nostrate nardo, & lauendula frequentissima nascitur. Quandoquidem hæc non sylvestris Salvia est, sed ea ipsa, quam domesticam vocant: nam quæ in hortis habetur alia non est, quam campestris in hortos translata. Ideoq; non scribit Dioscorides Saluiam in hortis nasci, sed in asperis tantum locis. Caterùm Theophrasto Salviæ hist. duæ Salviae produntur genera lib. 6. cap. 2. de plantarum historia ex Theophr. ubi sic inquit: Sphacelus & Salvia inter sese distant, quasi alterum urbanum, alterum genus sylvestre dixeris. Sphacelo folium leuius, contractius, minusq; squalens: Salvia scabrius: hæc ille. Porro genera hæc Salviæ, quæ a Theophrasto redduntur, in Italia quoq; in hortis quam plurimis inueniuntur: in eaq; sum sententia, vt existimem sphacelum marem esse, Saluiam verò fœminam. Sphacelo id peculiare quoq; natura dedit, vt auriculatis, postrema parte, constaret folijs, id quod nusquam in Salvia mihi videre licuit. In Creta, ac etiam in quibusdam Apulia Salvia ex Calabria locis, Salvia in cacumine gignit tubercula quedam Creta. gallarum instar, subalbida: quorum alias mihi copiam fecit Ioannes Baptista Rhamnusius Illust. Senatus Veneti Secretarius, vir moribus ac doctrina præclarus: is enim (quæ sua est humanitas) cum ea ex Creta sibi allata essent, mihi videnda tradidit. Saluiam Græci Eleliphæon vocant. Vnde factum esse puto, Plinii lapsus: vt Plinius libro 22. cap. 25. vocabulorum cognatione deceptus, quod Græcis lens phacos appelletur, crediderit magno errore Eleliphæon lentis speciem esse. Præstat Salvia mirum in modum ad omnes capitis affectus frigidos ac pituitosos, & omnibus Salviæ vires Matth. articulorum doloribus, tam in portionibus, quam in fomentis. Quamobrem comitiales, veterinosos, stupidos resolutosq; iuuat: quinetiam valet ad pituitosas defluxiones, & ad pectoris vitia. Suffita arida Salviæ folia vteri profluuiâ sistunt. Commodè ab



utero gerentibus deuoratur Salvia, quæ abortire ex leui causa solèt, conceptum enim continet & viuificat. Valent ad omnia prædicta Salviæ flores saccharo asseruati. In summa vlt excalfacere, siccare & adstringere opus sit, fuerit semper Salvia commodum admodum medicamentum. Salvia, Galeno lib. 6. simplicium medicamentorum teste, temperamento est eui- Galenus. denter excalfacente, ac leuiter adstringente. De eius virtutibus copiosius differuit Aetius, sic scribens: Salvia manifestè cale- Ex Actio. facit, & leniter adstringit. Tradunt quidam, suffitam saluiam menses immoderatè fluentes, & omninò muliebri profluuium compescere. Agrippa sacram herbam vocauit, quam pregnantès mulieres, si fluida laxaq; fuerint, vtilissimè comedere Sacra herba. reprodicit: continet enim conceptum, vitalemq; reddit. Ac si succi huius heminam cum modico sale, quarto à secubitu die mulier potauerit, deinde viro misceatur, procul cubio concipiet. Aiunt in Copto Aegypti post seuas pestilentias, ab his qui superfuerunt, ad eum succum bibendum mulieres coactas fuisse plurimosq; inde productos fetus. Dato inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi Salviæ cyathos duos, ieiunis cum nelle bibendos, & sanguis illico cohibebitur. Tabidis pilula Pilul. pro ta- in hunc modum parant. Sumito specie nardi, gingiberis, sing. drachmas duas: seminis Salviæ assati, triti & cribrati dra- bidis. chmas octo: piperis longi dr. ich. duodecim, & cum succo Salviæ pilulas conficito, & mane ieiunus drachmam vnâ exhibe- ro, eodemq; modo in vespere, ac postea aqua pura quippiam propinato. Salvia Latinis dicta, Græcis Ἐλελίφαιον nomina- Nomina: tur: Mauritani Aelufacos: Itali Salvia: Germanis Salbey: Hispanis Salvia & Salua: Gallis Saulges: Bohemis Ssaluieg: Poloni Szalvua. Salvia minor, Græcis Σφακέλος: Itali Salvia minore.

Salviæ vnus meminit Dioscorides, at recentioribus plures sunt differentiæ, de quibus suo loco. I. Salvia maior, C.B. Matt. Fuch. Dod. gal. & fol. Lacu. Lob. Tab. Lug. Salvia latifolia, Brunf. Trag. Gef. hor. Lon. Cam. Salvia domestica, Cast. Cæf. cui & Lentis sylvestri: alterum genus folijs cotonei mali sed minoribus, Plinii. Hæc folijs vel albis, vel ipsorum pediculis ac neruis rubentibus: floribus est cœruleis, rarius candidis. Salvia minor, C.B. Matth. Fuch. Dodo. gal. & fol. Lacu. Lob. Tab. Salvia minoribus folijs, Cord. in Diosc. Salvia Brunf. Salvia angustifolia, Trag. Salvia nobilis cognominata siue aurita, Gef. hor. Salvia tenuifolia auriculata, Cam. Salvia acuta: Lon. Sphacelus verus Theophrasti, Lug. Salviæ alterum genus, Cæf. cui Lentis sylvestris species folio minore Plinii. Salvia sylvestris, quæ Sphacelus, Castori, folijs est aliquando pinnatis, aliquando non, floribus aliquando albis, rarius luteis. III. Salvia baccifera, C.B. Huius etiã Matthiolus meminit. Hæc multò cæteris lanuginosior & candidior, folijs crassioribus modò integris, modò pinnatis, cuius ramis globuli adnascuntur Gallarum magnitudine & forma. quibus Cretenses cum pane vesci solent. Salvia baccifera siue baccata Cretensis, Adu. Salvia Baccifera Cretensis, Lob. Lug. Cam. ad Matth. Salvia in Creta, Dod. fol. & Tabernæmontano.

MENTHA. CAP. XXXV.

Mentha cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi atq; exiccandi vim habet. Sistit sanguinem, potu ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat: venærem stimulat. Singultus, vomitiones, choleraq; sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis dolores mulcet: mammas si tendantur, aut lacte turgeant, compescit: cum sale canum moribus illinatur: aurium doloribus cum aqua multa subuenit: vuluæ ante coitum admota conceptioni resistit: linguæ scabritiem conficta lauigat. Lac coire, densariq; in caseum non:


a Meum
κλωϊεια. i.
ramuli.

non paritur, si a folia potionibus lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Latini menthastrum vocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore, quam silymbrii, grauiore odore, quare minus ad sanorum vsus expetitur.

I. MENTHA. I.



II. MENTHA ALTERA.



Menthae cō-
sideratio.

* III. MENTHA CRISPA
verticillata. *



Menthae vi-
res Marth.

Menthae vi-
res ex Gal.

Mentha cum hortensis, tum etiam sylvestris, quam Her-
trusci nostri Latinum nomen retinentes vulgò Mentha-
stro appellant, adeò omnibus vulgaris, notaq; est, vt sine vitio 40
eius delineationem silentio pratermitti posse putauerim. Et
quamuis plures, quã hic scribat Dioscorides, in hortis sint Men-
tha species (vna enim breuioribus & crispioribus constat folijs,
alia rubenti caule & flore, alia verò albicante) huiusmodi ta-
men specierum differentia non sunt, meo iudicio plurimi faci-
enda. Mentha satiuua duum generum est, alterum maius, alte-
rum minus. Maior planta est odorata, folijs satiuua minoribus,
per ambitum denticulatis, caulibus numerosis, floribus in sum-
mitate spicatis, subpurpureis pilosisq;. Altera folijs exit breuioribus
angustioribusq; caulibus rubentibus, floribus quoq; ruben-
tioribus, eximio odore. Vniuax Mentha admodum est: nam
in hortis semel tantum sata, tam restibili fertilitate durat, vt
vix in posterum extirpari possit, quin renascatur: Aqua stillati-
tia & tota Mentha planta, puerperarum mammis cum lin-
teolis admota, illita recens, lactis concretionē inhibet: animum
olfactū excitat: cum amylo & aqua pot. a. cœliacos iuuat: vlcera
manantia infantium capitibus mirè sanat. Singultus & vo-
mitiones sistit, è mali punici vino pot. a. Illinitur temporibus, in
frigido capitis dolore. Impetigines illita prohibet. Aqua stillati-
tia è tota Mentha planta vitreo alembico in feruentis aqua bal- 60
neo parata, si vnciarum quatuor pondere ebibatur, sistit san-
guinem (quod mirum fortasse multis videbitur) è naribus pro-
fluentem. Venereis voluptatibus Mentha commendat. est: est
Plinius non sine errore lib. 20. cap. 14. planè contrarium scriptu
tradiderit. Huius Mentha facultatis causam scite reddidit Ga-
lenus lib. 6. simp. med. vbi de ea ijs differit verbis: Hedi smos, ali
verò Minthen odoratam nuncupant. Est enim & alia quedam
Minthe non odorata, quam Calaminthen vocant. Vtriq; gustu
acris, & facultate calida est, ex tertio ordine excelsificantium.
Infr-

Infirmior tamen est mentha odorata, quam calamintha, & minus excalfacit. Vt enim in vniuersum dicam, haec ceu syl-
 uestris quaedam est, illa ceu domestica. Quamobrem sanè ob eam, quae ex cultu accedit, humiditatem, mediocriter item ad
 reuerem excitat. Id quod omnibus commune est, quae humiditatem semicoctam, & flatuosam continent. Ob talem ipsius
 herba temperaturam in abscessibus ea quidem cum polenta mista vtuntur. Id quod in Calamintha facere nequeat, propte-
 rea quod valentius cum excalfaciat, tum desiccat, quam id genus poscant. Habet verò etiam quiddam amarum in se, & a-
 cerbam: & amaro quidem lumbricos interficit: acerbitate verò si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones re-
 primit. Substantia est, vt si qua alia herba, tenuium partium: haec Galenus. Verùm animaduertendum est, hoc loco Gale-
 num per syluestrem Mentham non intellexisse legitimam Calamintham, quòd is de odorata Calamintha (vt sequenti ca-
 pite dicitur: sumus) initio septimi libri de simplicium medicamentorum facultatibus copiosè tractauerit. Ex quo facile cõ-
 20 gere licet, Galenum in hoc non suam, & veram appellationem retulisse, sed aliorum, & fortè Graci vulgi, qui syluestrem
 Mentham Calamintha nomine appellare consueuerit: id quod etiam Galeni locutio confirmare videtur. MENTHA-
 STRVM folia profert Mentha longè maiora, hirsutiora ac candidiora: caules cubitales & flores spicatos, colore subpurpu-
 30 ro, tenuibus vndequaq; pilis: bene quoq; olet. Nascitur plerunq; vliginoso loco, & prope riuos aquarum. Excalfacit, atte-
 nuat, adstringit, incidit, aperit & suas quoq; peculiare vires obtinet. Siquidem potum foeminas à partu purgat. Datur e-
 im decoctum vtiliter potandum anhelosis, & agrè spirantibus, quin etiam mulcendis torminibus, quae à flatu oriuntur.
 Substratum vel accensum serpentes fugat. Instillatur succus verminosus auribus. Idem tum potus tum testibus illitus, no-
 40 ctum as pollutiones prohibet: auxiliatur potus, morbo regio affectis. Strumosos illitu iuuat, ventris tinea pellit ex aceto
 potus. Folia tam pota, quam illita praestant aduersus venenosorum animalium ictus. Caterùm est & herba passim in hor-
 tu crescens, folio salvia longiore, latioreq; betonica emulo, circumquaq; serrato, in viridi albicàte: caulibus cubitalibus, &
 20 aliquando maioribus: in quorum cacumine flores exeunt corymbacei, colore melino, tanaceti modo. Planta in vniuersum
 amara est, non tamen vehementer subadstringens, & grauiter odorata. Goritiensibus haec vulgò vocatur MENTHA
 graeca: in Hetruria verò Salvia romana, quòd potius folijs saluiam referat, quàm Mentham: quin & herbam diuae Mariae

Mentha syl.
Galenus quid.

Mentha stri
vires.

Menthae Grae
ca historia.

Salvia roma-
na.

IV. MENTHASTRVM.

V. MENTHA GRAECA.



Balsam. L. vulgaris

nominant. Sunt etiam, qui Lassulatam appellant: sed vnde apud hos id sibi nomen asciuerit, nescio: ipsi dicant. Porro Va-
 lerius Cordus in suo dispensatorio, in vnguento Marciati magno, duas profert Menthas, nempe crispam & Saracenicam:
 pro Saracenicam autem Mentha hanc, de qua praesens mentio, imponendam esse censet. Sed quoniam id nulla comprobatur
 20 autoritate vel ratione, eius quidè sententia ad stipulari non tutum esse arbitror: praesertim cum Nicolaus nuper à Fuchio
 Latinus factus, nullam huiusce Saracenicam mentha mentionem faciat, sed rubea & agrestis tantum. Id quod facile nobis
 indicat, vt liberè dicamus, Cordi dispensatorium quàm plurimis scateret mendis, quippe quòd non omnes medicamentorum
 30 descriptiones ex bonorum authoru fonte hauserit Plantam hanc (vt ipse scribit) Germani vocant vnser Frauen Wun-
 id est, Mentham sancta Mariae. Verùm Fuchsius aliam eodem nomine ab hac longè diuersam ostendit. Qui verò horum
 errauerit, in hoc Germanica lingua peritiores iudices erunt: quanquam si Hetruscus Germanica, vel Germanicis Hetrusca
 nomina respondent, Cordo potius (quantum ad vocabulum spectat) quàm Fuchsius accesserim, quòd vt modo diximus, her-
 40 bam diua Mariae eam vocent in Hetruria. Totam plantam excalfacit, siccatur, aperit, attenuat, roborat, abstergit & prouocat, Menthae grae-
 auxiliatur vterinis affectibus. Medetur hydropicis, & praesertim anasarca laborantibus. Siquidem frigesactum iecur ex-
 calfacit, & vasorum obstructions aperit. Illinitur ex oleo Irino aut Nardino liensis, & ex vino feruesfacto vrinam agrè
 reddentibus. Lentigines, alphas, & alia cutis vitia emaculat, illitus noctibus succus. Folia adduntur in placentis, & ita e-
 50 duntur à mulieribus, vteri affectibus obnoxys. Sunt etiam qui eadem tenui pultricula illita figant in patellis in oleo aut
 butyro, & in cibis vtantur. Huius epotus succus alui tinea, & lumbricos enecat: frigido vtero subuenit. Ventriculum
 60 roborat.

Val. Cordus
arguitur.

Menthae grae-
ca vires Mac-
thiolo.

Nomina.

roboret, tam haustus, quam illitus, & vomitiones compeffit. Tota planta tam substratu, quam suffitu serpentes fugat, & eorum venenis resistit: quin & infarctus expedit, & capiti robur addit. Ea Graecis ἰσὺς μινθῶν, Latinis periter & Italis *Mentha* vocatur: Arabibus *Nahanaba*: Germanis *Münz*: Hispanis *Hierua buena* & *Ortelana*: Gallis *Mente*: Bohemis *Muta*: Polonis *Mietka*. *Mentha* verò *Graeca*: Italis vocatur *Mentha Graeca*, *Salvia Romana*, & *herba Santa Maria*, nonnullis *Affulata*: Germanis *Bnser Frauen Münz*: Bohemis *Kzecka Muta*: Polonis *Marzea Mietka*: Gallis *Grand Coq*. *Menthastrum* autem siue *Mentha sylvestris* Graecis ἰσὺς μινθῶν ἀγρῶν, Italis *Mentastro*: Germanis *Wild Münz*: Bohemis *Plana Muta*: Gallis *Mente Chevaline*: Polonis *Kobyła Mietka*.

Mentha, veteribus μινθῶν Plinio auctore dicebatur, at ob odoris suauitatem postmodum ἰσὺς μινθῶν dicta: verum recentiores & *Menthae* & *Menthastrum* multas veteribus indictas nouerunt differentias, ut in Phytopinace monuimus, propositis *Menthae* septendecim & *Calaminthae* sex differentiis. I. *Mentha angustifolia spicata*, C.B. *Mentha Brunf.* *Mentha prima*, Matth. *Mentha hortensis prima*, Ges. hor. *Mentha satiuua tertia*, Fuch. Dod. gal. *Mentha tertia*, Dod. fol. *Mentha Romana officinarum* siue praestantior *angustifolia*, Lob. *Mentha hortensis oblongo folio*, Casl. *Mentha satiuua*, Cast. Lug. *Mentha odorata angustifolia*, Cam. *Mentha acuta*, Tab. Haec aliquando angustissimo & acutissimo reperitur folio. II. *Mentha altera*, Matth. *Mentha satiuua 2.* Lacu. *Mentha minor*, Coston. III. *Mentha crispa verticillata*, C.B. *Mentha satiuua prima*, Fuch. Dod. gal. Lacu. *Mentha prima*, Dod. fol. *Mentha vulgata serpens rotundiore folio*, Pulegii flore coronato. Lob. obs. *Cruciata Mentha*, Iob. icon. *Mentha satiuua crispa*, Lugdu. IV. *Mentha sylvestris longiore folio*, C.B. *Mentha equina*, Brunf. *Menthastrum*, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. hist. Lacu. Lob. Cast. *Menthastrum vulgare*, Lugd. *Mentha sylvestris*, Ges. hor. Lon. *Mentha syluestris altera*, Casl. cui *Calamintha Galeni*. Variat folijs longioribus & nigrioribus, minusve incanis. V. *Mentha corymbifera*, C.B. *Balsamita*, Brunf. *Alisma*, Trag. *Balsamita maior*, Dod. gal. & fol. Lac. *Mentha Graeca*, Matth. Ges. hor. *Mentha corymbifera maior*, Cord. in hist. *Mentha Romana*, Lacu. *Mentha Suracemica*, Erico Cordo, Val. Cordo in Diosc. (qui *Chrysocone* cognatam statuit) *Lonic.* Cam. *Costus hortensis*, Ges. hor. Lug. Cam. *Costus hortorum*, Lob. *Herba S. Mariae*, Casalp. cui *Melilotus* Diocoridis, Plinii & *Amicennae*.

Καλαμίνθη.

CALAMINTHA.

CAP. XXXVI.

EX *Calaminthae* generibus quaedam montibus familiaris, folia ocimi habens, incana: surculos & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam syluestre pulegium deo appellarunt, quod odore ipsum aemuletur: *Nepeta* Latini vocitant. Tertia menthastro cognata est folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia & acria: radix superuacua. Nascitur in campestribus asperis & aquosis. Potu autem litu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnea, torminibus, cholericis, horroribusque auxiliatur: regium morbum expurgat. Praesumpta in vino venenis resistit: tineas, caeteraque interaneorum animalia cum sale, & melle pota, enecat: nec secus cocta, crude, si teratur. Elephanticos esitata adiuvat, si postea serum lactis bibatur. Folia detrita, si in vesere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut subleuata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candelae imponunt, in vino cocta & illita: sugillata tollunt. *Calamintha ischiadis* imponitur, ut ex alto humore, si super, summam cutem exurens. Vermes necat: in oculis attritus instillatur.

I. CALAMINTHA.


bus candelae imponunt, in vino cocta & illita: sugillata tollunt. *Calamintha ischiadis* imponitur, ut ex alto humore, si super, summam cutem exurens. Vermes necat: in oculis attritus instillatur.

Calaminthae consideratio.

Nipotella.

Brafsuoli error.

Gattariae mentio.



Calaminthae, quae Calamentum dicitur, cuius tres numerantur species. Sed eius frequentior est usus, qua Latini *Nepeta* vocatur, secundo loco hic a Dioscoride tradita. Nomen haec apud Hetruscos in hunc usque diem retinet: siquidem nostrates eam, corrupto tamen nomine, vulgo appellant *Nipotella*. Nascitur haec in inculto solo in apricis secus itinera, & sepe, quin etiam in collibus, folijs [pulegio maioribus] subrotundis, hirsutis, & per ambitum [leuiter serratis] laciniatis: caulibus cubitalibus, angulosis, [foliosis] & hirsutis. Flores edit paruos, purpurascens, qui a medio caule usque ad summum verticillatum erumpunt, ut in pulegio, at in cacumine copiosiores habentur: radices tenues, & numerosas multifidasque. Caeterum haec in re *Brafsuolus* (pace eius dixerim) aperte hallucinari deprehenditur, quod pro certo existimet *Calamintham* secundo loco a Dioscoride descriptam illam herbam esse, quam, eo quod catti magna eius capiuntur voluptate, *Gattariam* quidam vulgo nominant. Error hinc manifeste praeditur, quod **GATTARIA**, cuius hic imaginem damus, sit herba folijs verticillata, aut apastro similibus, qua quantum a pulegii folijs distat, non modo caeteris notis, verum etiam odore, in quo *Brafsuolus* nititur, si dyadicent, qui huius differentias rectius norunt. Sunt tamen e vulgaribus, qui *Gattariam* etiam *Nepeta* appellant, quorum nomen claturam magis fortasse scilicet *Brafsuolus*, quam *pulegia* magis nota, habet: matius deprehenditur. *Nepeta* itaque Dioscoride nunc uti vixquam, mea opinione fuerit, quam vulgaris *Calamintha* quae aegina vocatur, quam nos vul-

Thymus calamintha
Slav.

* II. CALAMINTHA MAGNO FLORE. *

III. CALAMINTHA MONTANA.



IV. CALAMINTHA AQUATICA.



nos vulgò vocamus Nipotella : quandoquidem vulgaris vsus Calamintha, non modo folijs pulegium amulatur, sed etiam sapore, & odoris fragrantia. Quo fit, vt mirum non sit, si Dioscoridis testimonio, a quibusdam sylvestre pulegium vocata fuerit: non enim odore tantum (vt Brasauolus velle videtur) Nepeta pulegium imitatur, sed & folijs & caule. Quamobrem dicamus licet, nullo pacto existimandum esse, Gattariam herbam esse Nepetam secundam Calamintha speciem. Neq; etiam putandum, eandem tertiam esse, quemadmodum falsò credidit Ruellius: Quippe quoniam fecerit hanc Dioscorides Mentha-
stro similem, no autem melissophyllo, aut vrtica, quas (vt paulò antè diximus) Gattaria representat. Quapropter non modo ea de causa eius sententiam explodendam putauerim, sed etiam quod sapius ipse in locis aquosis, campestribus & asperis reperirim tertiam Calamintha speciem, menthastrum amulam, subalbidioribus tamen, oblongioribus hirsutisq; folijs, caule & ramis maioribus, quam superior, ac gustu acriori. Non secus & montana mihi frequens olim occurrebat in excelsis vallis Anania montibus, folijs albicantibus, ocimi similibus, surculo & caule anguloso quadrangulo, & flore in purpura rufescente. Quamquam in hoc errore, mea quidem sententia, versantur Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, vt asserere non dubitent, montanam hanc Calamintham legitimam esse Nepetam. Sed ad GATTARIAM venio. Ea enim planta est vulgaris notitie. Folia fert melissophylli, aut vrtica, sed minora & subcandiantia. Caulem edit bicubitalem, quadratum, numerosis ramis, quadrangulis & inanis. Flores edit albos, orbiculatim emergentes, sed qui in summis caulibus habentur, spica figuram referunt. Radices habet multifidas & fibrosas. Odor vniuersae plantae acutus, caput seriens, quinetiam seruidus sapor cur: am:itudine haud obscura. Nascitur in campestribus agrorum aggribus, secus vias, & vliginosis solo. Excalfacit & siccit, Calamintha modo, aded; vt ea vti possint

Ruell. erratū.

Calamintha aquatica & montana.

Monachorū lapsus.

Gattariae histor.

Gattariae vires Marth.

medici Calamintha vice, vbi illa non sit ad manus. Peculiariter autem valet Gattaria ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, & vteri morbos, à pituitosis excrementis, aut flatu genitos. Ideò auxiliatur diutino capitis dolore affectis, vertiginosis, veteriosis, stupidis, resolutis, conuulsis, comitialibusq; quinetiam anhelosis, asthmaticis & suspiriosis. Medetur item

V. HERBA GATTARIA.

Calaminthæ
vires ex Gal.

Herba calamintha
vires

ventriculi torsionibus, à flatu prouenientibus. Totā plantā
menses elicit, tam pota, quam in defensionibus addita. Herba
steriles prolificas facit, vbi sterilitas à frigida, humidāq, cau-
sa proueniat, namq, valenter vterum calefacit. Succus naribus
infusus pituitam valenter eijcit, & visum acuit. In summa vbi
valenter excalfacere opus sit, Gattaria plurimum praestat. Ca-
lamintha meminit Galenus libr. 7. simplicium medicamento-
rum, sic de eius viribus differens: Calamintha essentia est tenuis,
& calida, siccaq, temperie, ex tertio quodammodo ordine v-
traq, qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu
apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris,
& palam calida est, ac paulum omnino subamari habet. Peri-
clitantiis autem, & corpori admouentibus extrinsecus impo-
sita, primum quidem valde excalfacit & mordicat, cutemq, la-
niat, postremò etiam vlcus efficit. In corpus autem intrò assum-
pta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum melicrato, perspicue
calfacit, & sudores ciet, omneq, corpus tum digerit, tum exci-
cat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circui-
tum repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti
corpori inungentes cum frictione non segni, intrò verò assumen-
tes, sicuti est dictum. Quinetiam & coxendicibus eam quidam
in egritudinibus ischiadicis, tanquam strenuum remedium ul-
linunt. Trahit enim qua in profundo herent ad superficiem
externam, totumq, adeò articulum excalfacit, cutemq, non
obscurè adurit, mensesq, tum epota, tum apposita admodum
efficaciter prouocat. Bonum etiam elephantorum remedium,
non eò tantum quòd strenuè tenues humores digerat, verum et-
iam quia extenuet, & incidat valenter crassos, quales sunt qui
hunc morbum procreant. Sic & cicatricibus atris candorem rede-
dit, & sugillata digerit. Sed in talibus in vino coctam catapla-
smatis modo imponere viridem magis, quam siccam praestat.

Quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendū promptior. Porro talis cum sit, ad venenatarum bestiarum morsus af-
sumitur, velut etiam cauteria, & quaecunq, medicamenta calida sunt, & acris, tenuiumq, partium, quaq, facile ex alto
ad sese circumiacentem omnem qualitatem possunt attrahere. Caterum qua illi inest amaritas, planè exigua est: verum
ad quadam ita efficaciter agit, vt qua valentissima est, nimirum, cum coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia.
Quare & ascaridas, & lumbricos succus eius aut infusus, aut epotus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi
in corporis parte sinuosa, aut implicata, qua putredine tentetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptum seu pota, seu
admotā interimit & eijcit. Igitur incidendi quidem ei vis adest, propter calorem eius, tenuitatem & amaritudinem: ab-
stergendi verò propter vnicam amaritudinem. Itaq, asthmaticis ob omnia antè dicta prodest: ictericis verò, siue regio mor-
bo laborantibus potissimum ob amaritudinem, sicut alia serè omnia amara, vtpote abstergentia, & expurgantia in icteri-
nore prouenientes obstructiones. Ad omnia iam dicta efficacior est montana. Καλαμίνθη herba sic Græcè, vt etiam Cala-
mintha Latine dicitur: Arabicè Calamentum: Italicè Calamintha & Calamento: Germanicè Wilder Polen: Hispani-
cè la Neuada: Gallicè Poulliot sauuage: Bohemicè Marulka Polnij. Calamintha montana, Græcis Καλαμίνθη ὄρειν: I-
talis Calamento siue Nipotella montana: Officinis, Calamentum montanum. At Calamintha aquatica: Græcis καλα-
μίνθη ἐνυδρος: Italis Calamento aquatico. Quam verò Gattariam vocant: Italis herba Gatta: Germanis Kattennep:
Bohemis Kocurnijk: Gallicè herbe de Chat.

Nomina.

I. Calamintha (quasi bona & utilis mentha) vulgaris officinarum, C.B. Calamintha, Matth. Dod. gal. Cast. Calamintha altera, Lacu. Calamintha montana, Ges. hor. Dod. fol. Lug. Calamintha montana vul-
garis, Lob. Tab. Calamintha vulgaris, Cam. Nepeta montana, Cord. in Diosc. II. Calamintha magno
flore, an prima Dioscoridis? C.B. Calamintha montana præstantior, Lob. Lug. Tab. Calamintha moun-
na, Cam. Calamentum montanum, Cæsalpino. Hæc ex radice caules emittit cubitales quadratos, quos
ambiunt folia vulgari latiora, profundius crenata, hirsuta: flores quauis Calamintha maiores, forma re-
spondentes, purpureos, semen paruum: gratiores est totius plantæ quam aliarum odor, gustu & olfactu
suauiter acris. In montibus Patauinis legimus, in agri etiam Narbonensis saxosis & vmbrosis reperitur.
III. Calamintha pulegii odore, fortè secunda Dioscoridis, C.B. Calamintha montana, Matth. Lacu. Ca-
lamintha Italica pulegii odore, Ges. hor. Calamintha secunda Dioscoridis, Lugd. & Cam. cui & Nepe-
tella. Calamintha altera odore graui Pulegii, foliis maculosis, Lob. cui Nepeta Dioscoridis & Lugd. Ca-
lamentum quod vulgò Nepeta, Cæsalp. Calamentum aruensis secunda, Taber. Pulegium syluestre siue
Calamintha altera, Dod. fol. Nepeta agrestis, Cord. in Diosc. IV. Calamintha aruensis verticillata, hir-
suta, C.B. Menthastrum, Brunf. Nepeta agrestis vel quarta, Trag. Mentha aquatica exigua, eidem. Nepe-
ta, Lon. Calaminthæ alterum genus, Fuch. Dod. gal. Calamintha aquatica, Matth. Lob. Lugd. Polycne-
mum, eidem. Calamintha aruensis, Ges. hor. Tab. V. Mentha Cataria, quòd ea feles delectentur, C.B.
Nepeta vulgaris, Trag. Herba Gattaria, Matth. Cast. Gattaria vulgò appellata, Cæsalp. Gattaria herba,
Dod. fol. Herba felis, Lugd. Calaminthæ species, Ges. hor. Calaminthæ primum genus, Fuch. Calamin-
thæ tertium genus, Dod. gal. Calamintha montana, Lon. Calamintha 3. Thal. Balsamita maior, Lac. Ne-
peta agrestis fruticosa, Cord. in Diosc. Nepeta Germanica, Cam. Mètha Cataria, Lob. Mentha felina, Tab.
Sunt qui Calamintham tertiam Dioscoridis velint: alii Nepetam veterum: alii Melissa speciem: alii in-
ter Calamintham & Melissa mediam faciunt.

Θύμος

THYMVM

CAP. XXXVII.

Thymum ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus foliis, multis, & angustis circumdatus, capitulis in cacumine, flore purpurascete refertis. Gracili solo, & petrolo a prouenit. Vim habet a Meū addit. hanc, vt cum sale, & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ven tris exigit: menses, partus, & secundas pellit: vrinas ciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissoluit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit. Ischiadicis cum vino, & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam vtile pro condimento, duntaxat ad vñs eorum, qui recte valent.

I. THYMVM.

* II. THYMVM VVLGARE tenuiore folio.*



Thymum duorum generum esse testatum reliquit Theophrastus lib 6. cap. 2. de plantarum historia, vbi de eo disseruit his verbis: Quin & Thymum candidum, nigrumq; reddunt. Serò id admodum floret: nam circa aestiuum solstitium incipit. Mel apes hinc capiunt, & hoc augurio apiarum constare affirmat, an probe melletur, nec ne. Etenim si aliter desoluerit, mellatio minus probe succedit. Destruitur, peritq; flos, si imber incesserit. Semen fecundum satyria, atq; etiã magis origani manifestò sentitur: thymi verò nullũ ostendi potest, sed floribus quodã permiscetur modo. Flores etenim serunt, itaq; oritur thymum: Haclenus Theoph. Caterum nunc Thymum in Italia notissimum est. Praestat autem quod ex Apulia fertur: quanquã laudatissimũ est, q; è Creta insula, aliisq; nonnullis Gracia locis aduehitur. Vnius tantum thymi, minoris videlicet, meminit hic Dioscorides. Verum cum is lib. 4. in epithymi historia, Epithymum florẽ esse scribat è thymo duriore, satyria simili, haud dubie ostendit se non secus ac Theophrastum, duo thymi genera obseruasse. Vnum quod mittit furculos complures exilibus folijs, angustis & numerosis circumdatos: in quorum cacumine sunt capitula flore purpureo referta. Alterum verò lignosius, fruticosius, ac durius, satyria simile. Thymo hoc duriore passim ferè scaturit Goritiensis ager, eius præcipue colles: in eoq; (vt libro quarto suo loco dicitur) legitimũ Epithymũ oritur. Manat ex eo oleum aurei coloris, quod vñ cum aqua elicitur, dum per calentis aqua balneum herba recens viridisq; distillatur. Hoc Citreum malum respicit, & acutissimum est, & ad ea omnia vtile, qua vehementer excalfieri postulant. Thymi meminit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus ita scribit: Thymum incidit, & calfacit manifestè: ob id & vrinam & menses ciet, fetum euellit, & viscera potum expurgat: educendus ex thorace, & pulmone confert. Itaque in excalfaciendo, & exciccando in tertio ordine statuendum est. Præter has autem à Galeno descriptas, alias quoque Thymo vires reddidit Aëtius sermone primo, sic inquit: Hac verò experimentis de Thymo comperta sunt: dato ieiunio articulari morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho. Bilem enim, reliquosq; humores, atque acrem sanie euacuat: facit & ad vesica affectus. Ventre autem inflato, vbi scilicet intumescere cœperit, drachmam vnã dato ieiunio cum cochleari aqua mulsæ. At lumborum coxendicumq; dolorem, laterisq; & thoracis, ac hypochondriorum suspensiones ac inflationes, pondere trium drachmarum cum oxymelite temperato mensura cochlearij ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreq; detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari prabeto. Dato item ieiunio, & ante cœnam aduersus lippitudinem, & vehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagras.

Thymi hist. ex Theoph.
Thymum ex Creta.
Thymi genera duo.
Thymum durius,
Thymi vires ex Galeno & Aëtio.

Nomina.

gram, etiam quæ motum omnino interceperit, cum vino vtilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes ieiunium tri-
um drachmarum pondere exhibeatur. Verum ab atro thymo abstinere oportet: corrumpit enim temperamentum, bilem q-
gignit. Eligendum quod purpureo flore est, præstantius tamen quod album illum habet. Planta, quæ Græcis *Thymos*, Latinis
item *thymus*, & *thymum* appellatur: Mauritanis, *Hafce*: Italis, *Thymo*: Germanis *Römischer Quendel* vnd *Welscher*
Quendel: Hispanis *Tomilho salsero*: Gallis *Thym*, seu *Mariolaine d' Angleterre*: Bohemis *Thym*: Polonis *Dziecielina*.

Thymum ἀπὸ τῆς θυῆς, quòd eo veteres primum vsi sint in sacris, quæ accenso igne fiebant. Quatu-
or agnoscuntur differentia, siquidem vulgaris thymus duplex habeatur, tenuiore & latiore folio, tertiu-
um capitatum, & denique latifoliū quoddam Lobelus in editione Belgica proponit, quod nec dum vi-
dimus. I. *Thymus capitatus*, qui Dioscoridis, C. B. Cord. hist. *Thymum*, Matth. Lac. Lob. *Thymum to*
Creticum, Dod. gal. Cord. in Diosc. Cæs. Lugd. *Thymum cephaloton*, Dod. fol. *Thymum legitimum*,
Clus. hist. Hisp. *Thymus verus capitatus*, Cam. *Thymus secundus*, Alpino. II. *Thymus vulgaris tenuio-*
re folio, C. B. *Thymus*, Brunf. Trag. Fuch. Lon. Cord. in Diosc. *Thymum durius*, Dod. gal. *Thymus*
vulgaris, Ges. hor. *Pepolina* Cæs. Alpino.

Θύμρα


SATVREIA.

CAP. XXXVII.

Satureia triuialis notitiæ est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamen, &
tenerior: defert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadem potest quæ thymum, si modo con-
simili sumptretur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam satiuua, syluestri proxius minor, quæ propter
mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

I. SATVREIA DIOSCOR.

II. SATVREIA ALTERA.



Satureia thymus



Thymi con-
sideratio.

Satureia hist

Satureia Co-
lumellæ.

Thymra duum est generum. Ea autem, quæ à Dioscoride describitur, thymo similis est, minor tamen, & tenerior. Spi-
cam defert florum plenam, coloris herbacei. Gignitur in asperis locis, & tenui solo. His notis maximè ea adstipulatur,
cuius hic imaginem appinximus. Si quidem hæc folijs, ac cauliculis thymum aded representat, vt non desint, qui eam pro
thymo recipiant. Præterea thymo gracilior, longeq, tenuior est, verum capitula thymi modo non profert. Si quidem ca-
culi in spicatos processus desinunt, in quibus flores emicant parui, subpurpureo colore. Quinetiam (vt Dioscorides inquit)
non solum sponte nascens habetur, sed etiam domestica, satiuuæ. Altera (si THYMBRA tamen, aut Satureia rectè
appellari possit) maior fruticosiorq, prouenit, & in hortis frequentior, ramis multis in orbem circumquaq, se diffundenti-
bus, rotundis, atque lignosis. Folia profert Thymo maiora, subaspera, durioraq, quæ circa furculos plura simul per inter-
ualla erumpunt, è quorum exortu spicati quidam processus, foliolis quibusdam cæteris longè minoribus stipati prodeunt:
in quibus flores nascuntur parui, ex purpura albicantes. Radice nititur lignosa, multipliciq, Hæc non solum seritur in hortis
sed etiam, vt altera sponte prouenit, in apricis collibus, & in torrentium alueis, fruticosior tamen, durior ac asperior. Thy-
mo suis in qualitatibus similis est, proinde exalfacit, attenuat, incidit, digerit & aperit, viribus ab altera non
differt, Thymi enim facultatibus omnibus referta est. Hanc eam ego esse censeo, cuius post Thymbram meminit
Columella libro nono capite quarto de re Rustica, de apibus agens his verbis: Eadem regio fecunda sit fruticis
exigui, & maximè thymi, aut origani, tum etiam Thymbra, vel nostratis cunila, quam Satureiam Rustici vocant.
Si quidem

Siquidem nos in Hetruria corrupta à Cunila appellatione, eandem appellamus Coniella: in alijs tamen plerisque Italia locis, quod à Satureia vocem corrupte maluerint, appellatur vulgò Sauoreggia. Non desunt etiam inibi, qui ab acrimonia, quam piperis ferè modo gustu repræsentat, eam vulgò Peuerella, quasi Piperellam nominent. Caterùm quòd in simplicium Piperella. censu vsquam Thymbra meminerit Galenus, nondum compertum habeo. Paulus verò eius mentionem fecit libr. 7. vbi de vitag. specie vs paucis differit. Thymbra sylvestris eadem qua thymum præstat. Hortensis autem altera quidem imbecillior Thymbra vi- res ex Paulo. est, sed ad ciborum vsum gratior & accommodatior. Quæ herba θυμβρα Græcè, Thymbra, Cunila & Satureia Latine vo- Nomina: catur: Arabicè Sahater seu Sahatar: Italicè Thimbra, Coniella, Sauoreggia & Peuerella: Germanicè Kunel / Zwibel. Nomsop vnd Saturey: Hispanicè Segurelhà: Gallicè Sauoreie, Sarriette & Satrea: Bohemicè Saturege: Polonicè Combr.

10 Satureia (quæ θυμβρον Theophrasto fortè διὰ τὴ θυμὸν ob fragrantiam) quibusdam à saturando di- eta, quod cibus loco condimenti addatur. I. Satureia Dioscoridis, Matth. Cast. Lug. qui vult notas omnes Dioscorideas huic plantæ conuenire, licet Aduersaria Polium fœminam recentiorum Matthioli figura exprimi velint. II. Satureia hortensis, Cunila satiuua Plinio, C.B. Hyssopus agrestis, Brunf. Satureia, Tra- go (cui & hortensis Hyssopus) Cord. in hist. (cui & Thymbra satiuua) Lac. Lon. Lob. Dod. fol. Cæsal. Tab. Cam. Satureia satiuua, Fuch. Satureia hortensis, Ges. hor. Lob. in icon. Satureia vulgaris, Dod. gal. Satureia altera, Matth. Satureia sylvestris altera, Cast. Satureia vulgaris hortensis, Lugd. Thymbra vera, Ges. hort: Thymbra satiuua Satureia, Cord. in Dioscoridem. Caule & folijs aliquando cæruleis reperitur.

Ερπυλλος


SERPYLLVM.

CAP. XXXIX.

20 Serpyllum duorum generum est. Hortense odore sampuchum imitatur, atque in coronas addi solet, cuius serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices de- mittet. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, in macerijs multò procerius assurgit. Sylue- stre, zigis appellatum, [non serpit, sed in altitudinem increscit,] ramulos edens tenues, furculosos, fo- lijs refertos longioribus, quàm rutæ & durioribus, a angustis. Flores iucundè olent, gustanti acres. b Ra- dicis nullus vsus. Nascitur in petris, satiuuo efficacius, atq; magis exalfaciens, & ad medendi vsum aptius. Conclufa nō legit Orib. a Me. & Cat. Menses trahit, & vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulsis & iecinoris inflammationibus auxiliatur: & τρωσεν α. i. aduersus serpentes potu. illitue prodest: capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo & madefactum subangusta in aceto: maximè verò phreneticis & lethargicis conuenit. Cruentis vomitus sedat succus, drachmis qua- b Cat. addit. θυμβρον. i. mordacem: mor ex aceto potus.

I. SERPYLLVM.

II. SERPYLLVM AL-
terum.



Thymus sylvestris

Thymus sylvestris var. tenuiflorus
Stem 4

30 Serpyllum hortense in Hetruria haud negligitur, sed in hortis seritur, & magna admodum diligentia colitur, quod et- Serpylli con- iam inibi (vt Dioscorides inquit) in coronamenta additur. Sylvestre duorum est generum: vnum flore candido, odo- sideratio. re citrei mali: quod latius prouenit, humi repens, leuioribus folijs in gyrum sese vnà cum ramusculis diffundentibus: al- terum verò flore purpureo, gustu perquam acri, satureia simili. Vtrunque copiosissimè nascitur apud Goritienses Salua- tino monte, quo mihi hætenus latius nusquam videre contigit, nec item odoratus. Serpyllum à Theophrasto, cui hor- Serpylli hist. ex Theophr. tense nihil aliud esse censeo, quàm sylvestre in hortis satum, describitur libro sexto, capitulo septimo, de plantarum histo-

historia, ubi de eo differit ijs verbis. SERPYLLI sylvestre etiam genus est, quod deferentes ex montibus ferunt, ut apud Syconem fieri solet, atq; etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios vero, ut in Thracia, montes, & plana omnia Serpyllo scatent. Peculiaris huic auctio germinum: quippe cum in quantumuis longitudinis procedere valeat, nactum scilicet adminiculum, aut iuxta sepes aliquas satum. Genera urbana reddere non est, ut retulimus: ferocia esse affirmant. Hoc enim in montibus, tum satum etiam quoddam, atq; vehementissimum: tum gratum odore, molliusq; comperiri. Tempus ferendi plurimum autumnus: hoc enim primum serere nimirum properant: haecenus Theophrastus. Ex cuius etiam verbis satis perspicue colligi potest, duo esse sylvestris Serpylli genera. Quare etsi palam vnus tantum generis mentionem fecerit Dioscorides, duorum tamen obscure meminisse potuit, cum inquit: Sylvestre, zigis appellatum, non serpit, sed in altitudine assurgit. Nam si vnum tantum sylvestris Serpylli genus Dioscoridi notum fuisset, ei sanè necessarium non erat addere zigis cognomen differentia causa. Satiuum radicibus quidem serpit, sed ramulis attollitur, amaraci modo, quemadmodum sylvestris altera species, quae malum citreum olet. Proinde scite Plinius lib. 20. cap. 22. ita de eo memoria prodidit. Serpyllum à serpendo putant dictum, quod in sylvestri euenit, in petris maximè. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increfcit. Serpylli vires paucis perstrinxit Galenus libr. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Serpyllum vsq; ad os exalfacit, ut & menses, & vrinas moueat: est autem & gustu admodum acre. Exalfacit, exsiccat, digerit, incidit & aperit, omnia genera paribus pollent facultatibus, verum tamen sylvestre ad omnia valentius habetur. Eius nomen Graecum ἑρπυλλος, Latinum Serpyllum: Arabicum Hemen: Italicum Serpillo: Germanicum Quendel vnd Hünner Röl: Hispanicum Serpolio & Serpam: Gallicum Serpoulet: Bohemis Materij danska. Serpyllum alterum & Serpyllum sylvestre Graecis ἑρπυλλος ἀγροῖος: Italis Serpollo seu Serpillo saluatico.

Dioscorides
duorum me-
minat.

Serpylli vires
ex Gal.

Nomina.

Serpyllum differentias varias, & ratione odoris, qui pro diuersitate locorum & caeli odorem mutat: & ratione coloris florum, foliorum item glabritiem & hirsutiem, eorundem rotunditatem & angustiam, 20 obtinet, hic de duabus tantum. I. Serpyllum satiuum, C. B. Serpyllum Matth. II. Serpyllum vulgare minus, C. B. Serpyllum Brunf. Trag. Fuch. Lon. Lob. Cæs. Thal. Serpyllum alterum, Matth. Serpyllum vulgare, Dod gal. & fol. Serpyllum sylvestre, Cordo in Dioscoridem Matth. in compen. Serpyllum sylvestre alterum, Cast. Serpyllum minus, Tabernæmontano.

Σάμψυχον.



SAMPSVCHVM.

CAP. XL.

Sampsuchum in Cypro & Cyziceno laudatissimum. Secundum sibi locum vendicauit Ægyptium, Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens: folijs eius calamintha, quæ tenui folio constat, hirsutis & rotundis, suauissimum odorem spirat: ideo coronis inferitur. Vis eius exalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientib. hydropicis, & ijs quos vrinae difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia fugillata tollunt: menses subdita in pefso trahunt: cōtra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur: luxatis, tumoribusq; cerato excepta, imponuntur: aduersus oculorū inflāmationes, cum polline polētæ illini prodest. Acopis, malagmatifq; calfaciēdi gratia cōmiscetur.

I. AMARACVS.

II. AMARACVS SIVE MAIORANA tenuifolia.



Sampsuchi
confideratio.

Cum superius libro primo in Sampsuchini vnguenti commentatione, Sampsuchum & Amaracum idem esse latinostenderim, etsi Galenus & Paulus diuersis capitibus Sampsuchi, & Amaraci memnerint, eadem hic repetere super-natencum

vacuum duxi: quod ea huc facile transferre possint ij, qui rem hanc se aliter fortasse habere existimant. Sampsuchum in Italiae Hetruscis vulgò appellatur Persa, quod fortè illis e Persia fuerit allatum: ceteris verò inibi Maiorana, nomine à Latino mutato. Herba hæc tantam cum mulieribus iniuit gratiam sui odoris iucunditate, vt nulla ferè reperiantur, quæ sunt in hortis, aut fictilibus vasis Amaracum non ferant, vel plantas non transferant, ac diligenti admodum cultura foveant. Quo fit, vt putauerim ego, ex eo Maiorana sibi nomē adinuenisse, quod maiori cura, ac diligentia feratur, colaturq; quam cetera planta. Neq; id ea solum ratione, quod, vt paulò antè diximus, odore perquam iucundo commendetur, sed quod etiam perpetua vireat coma. Duum est generum, maius quod vulgò cognitum est: & minus, quod tenuifolium cognominatur. Est itaq; herba AMARACVS ramosa, surculis tenuibus, obsequiosis, folijs oblongis, incanis, pilosisq; quæ cauliculis circumquaq; ambiunt. Flores edit in summis caulibus numerosos, spicatos herbaceo colore, compactili squamarum congerie oblongos, origini æmulos, è quibus paruum oritur semen. Radicem habet lignosam, multiplicem & superuacuum. Seritur semine, surculo, ac etiam viui radice. Planta est odorata tota, & in medicamentis admodum utilis. Digerit, attenuat, aperit, & roborat. Præstat ad omnes frigidus capitis, & neruorum affectus, tam illita, quam pota: quinetiam ad aurium dolores, grauedines & sonitus, vbi herba succus fuerit instillatus. Idem naribus infusus pituitam à capite trahit, & cerebrum abstergit, & roborat: colluitur ex eo vtiliter os in lingua resolutione, addito pyrethri, & longi piperis decocto, aut aceri, aut origani. Valet herba aut eius decoctum ad omnia pectoris vitia, quæ anhelandi difficultatem impediunt. Stomacho utilis est tam exterius illita, quam interius sumpta. Eadem iocinorosos & lienosos iuuat. Namq; non solum eorum infarctus expedit, sed etiam vasa ipsa roborat ac firmat. Confert ad frigidus vteri affectus omnes, & ad flatus. Habitat aliud quoq; AMARACI genus TENUIFOLIUM, quod nos vulgò vocamus Persa gentile. Id enim folijs floribus, cauliculisq; altero longè tenuius est, & odore præstantius. Hoc non desunt, qui putent legitimum esse marum. Colitur a mulieribus Italis in fictilibus, & in hortis. Ea omnia præstare potest, de quibus in altero diximus genere. Sampsuchi meminit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Sampsuchum tenuiū partium, & digerentis est facultatis: legitur enim, & exi alfacit ordine tertio. Id Græcis σάμψυκον, & ἀμαράκον, Latinis quoq; Sampsuchum, Amaracus, & Maiorana vocatur: Arabibus Merzenius seu Morsangius: Italis & officinis Maiorana: Hetruscis Persa: Germanis Meyeron: Maioran / vud Wrenam: Hispanis Moiorana: Gallis Marone & Mariolaine: Bohemis Maiorana: Polonis Meoram. Amaracus tenuifolia, Græcis Σάμψυκον, ἢ ἀμάρακον λεπτόφυλλον: Italis Maiorana gentile: Hetruscis, Persa gentile.

Amaraci his.
Amaraci vires.
Amaracus tenui folia.
Sampsuchi vires ex Gal.
Nomina.

Maioranam à Græco μάρον deduci volunt ii, qui Maioranam nostram ad Martum veterum reducunt. I. Maiorana vulgaris, C. B. Maiorana, Brunf. Dod. gal. & fol. (cui & Marum) Cæsalp. Maiorana sylu. Loni. Maiorana maior, Tab. Amaracus, Matth. Fuch. Lugd. Amaracus maior, Cast. Amaracus vulgarior, Lob. in icon. Sampsuchus siue Amaracus, Latinis Maiorana, Cord. in Diosc. & hist. Sampsuchus, Lac. Lob. obs. II. Maiorana nobilis, C. B. Maiorana fatiua, Trag. Lon. Maiorana tenuior, Dod. fol. Maiorana tenuifolia, Taber. Amaracus siue Maiorana tenui folia, Matth. Cast. Lugd. Amaracus tenuior, Lob. Amaracus tenuifolia urbana, Cam. Amaracus & Sampsuchum, Gef. hor.

Μελιότα. MELILOTVS, SIVE SERTVLA CAMPANA. CAP. XII.

Sertula campana, laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, a Meū habet boni odoris. Nasctur & in Campania circa Nolam, a colore in luteum languescente, odore infirmo.

I. MELILOTVS, SIVE SERTULA Campana. * II. MELILOTVS ITALICA folliculis rotundis. *



Trigonella campana Vim

Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim, quæ in oculis, vulua, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fœnigraci tan- na, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybove. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut ro- ceo madefacta, capitis dolorem lenit.

- Meliloti con- sideratio. **P**robatisima, legitimaq; Melilotus non modò in pluribus Campania locis, sed etiam Gargano Apulia monte pron- nit. Cuius semen in tenuibus corniculis inclusum nuper Venetias afferri cepit. Quo factum est, vt iam cognouerint medici vulgaris vsus Melilotum illegitimam esse. Meliloti meminit Plinius lib. 21. cap. 9. vbi ita scriptum reliquit: *Ex- in coronamenta folio venere apiastrum, meliloton, quod Sertulam campanam vocamus. Est enim in Campania Italia laudatissima, Græcis in Sunio, mox Chalcidica & Cretica, vbicunque verò asperis & syluestribus nata. Coronas ex hac antiquitus factitatas, indicio est nomen Sertula, quod occupauit. Odor eius croco vicinus est, & flos. Ipsa cana placet, ma- xime folijs breuissimis, atq; pinguisimis. Est itaq; legitima Melilotus planta cubitali altitudine, statim à radice fruticosa, ramis exilibus, folijs trifolio proximis, ex angusta origine in latum se diffundentibus, & longo appensis pediculo, floribus melinis, paruis, siliquis repandis, numerosis, pluribus ex vno ramusculo dependentibus, in quibus semen concluditur mi- nutum subrufum, odoris non ingrati, cuius est vsus. Radix illi inutilis, & superuacua: Excalfacit ordine primo, adeo vt parum absit à temperamento. Ideoq; leniter resoluit, digerit, atq; mollit, & dolores quoscunq; sedat. Melilotum, vt Ga- lenus memoria prodidit lib. 6. simplicium medicamentorum, mista facultatis est: habet enim quiddam adstringens, sed & digerit, & concoquit: copiosior enim in eo est substantia calida, quam frigida: hætenus Galenus. Caterum neminem in- uenio è Græcis auctoribus, qui explicauerit, quæ meliloti pars in vsum medicina recipiatur, an folia, aut radices, aut caulis, an flores, aut cornicula, aut semen. Quod tamen docuerunt Mauritanii, præsertim Serapio, qui ex auctoritate Isa- ac Eben amaram de Meliloto scribit in hunc sensum: Melilotus herba est, quæ folia fert rotunda, viridia: ramulos emittit admodum exiles, in quibus folia rara. Semen gerit in siliquis tenuibus, ac rotundis: quæ grana includunt pauca, glan- ci coloris, rotunda, infra sinapis magnitudinem. Porò in meliloto vsum sibi vendicarunt siliqua & semina, quæ in eu continentur. Quibus facile quispiam conijciat, haud esse mirum, si emplastrum, quod de meliloto appellant, sæpe medicos sal- lat, cum in id legitimi meliloti seminis farina nunquam veniat. Cum verò legitimaq; Meliloti semen cuius vsus esse debet, ad nos non deferatur: nonnulli syluestris loti flores, quidam cuiusdam aurei trifolij ipsius vice vsurpant, sed neuter tamen Meliloti vim possidet. Μελίλωτος ita Græcè dicitur, vt Latine Melilotus & Sertula campana: Arabicè Alchil elmelib: Italicè Meliloto: Hispanicè Corona de rei.*
- Melil. vires ex Galeno.
- Serapionis descriptio
- Nomina.

Melilotum hanc, Trifolium odoratum corniculis reflexis nominamus. Melilotus, Sertula campa- na & Corona regia, Lob. obs. Melilotus Syriaca odora, Lob. in icon. Sertula Campana, Castori. II. Hu- ic adiecimus & alteram speciem, quæ frequenter in hortis colitur, & Trifolium Italicum folliculis rotun- dis nobis, at Camerario, qui primus eam proposuit, Melilotus Italica dicitur. Hæc ex radice fibrosa cau- les emittit plures, cubitales, striatos, qui in alios brachiantur, circa quos folia tripartita, subrotunda, le- uiter crenata, in breue filamentū abeuntia, longis pediculis donata: in summis cauliculis flores meliloti copiosi, quasi in spica alternatim dispositi, lutei: quibus succedunt folliculi, vel vascula rotunda, rugosa cute obducta, in quorum aliquibus bina, in plerisq; vnicum granum continetur. Hoc primum Loti ve- ficariæ nomine, à Doctore Oswaldo Northusa accepimus, dein in hortis plurimis obseruamus, quod in Maris ad lacum propè oppidum Celanum (monente D. Camerario) crescit, vbi incolæ Malatro cornu- pto nomine, & in agro Romano ad antiquorum imitationem, Coronellam appellant.

Μάρου.


MARVM

CAP. XLII.

a Orib. eud- de odorato. **M**Arum herba cognita vulgò surculosa, flore origani, folijs multò candidioribus, flore a odoratiore. Vim habet silymbrio consimilem: substringit enim, & modicè calfacit. Qua de causa illitu serpen- tia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copiosissima gignitur.

Mari mentio ex Galeno. **E**tsi Galenus inter simplicia medicamenta nusquam, quod equidem inuenerim, Mari meminere, libro tamen primo de Antidotis in Hedychoi compositione eius mentionem fecit, cum ita scribit: *Alia Hedychoi descriptiones reperiuntur, quæ neque Amaracum, neq; Marum prorsus habent: quædam alterutrum tantum continent. Neq; enim duo hæc omnes noscunt vnguentarij, eò quod herbas solum è Creta aduectas emant, vnà cum seminibus atq; succis. Ego verò & easdem herbas scio in Asia nasci, ac in alijs quidem regionibus raras esse, in Cyzico autem frequentes. In Italia quoq; vt & alias quasdam herbas, ita & Amaracum vidi, quæ odore multum à Maro superatur. Marum enim valde redolet, putretq; aliquis sola nominis appellatione ductus, vnguentum Amaracinum, quod in Cyzico faciunt, Amaraci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis vnguentum conficiebatur, sed nunc solum Marum imponunt. Hanc herbam aliquoties cum ipse degustassem, ac eam amaram quidem plurimum, acrem verò parum deprehendissem, hortatus sum quendam eorum, qui Amaracinum conficere solent, vt Amaraci tantum compositioni inuitterent, quantum & Mari. Ac mihi visum est id vnguentum minus quidem odoratum, nihil autem viribus inferius. hæc Galeni verba. Ex quibus palam est, Marum ab Amaraco viribus & facie parum admodum disidere, etsi tum amarius sit Marum, tum etiam odore fragran- tius. Quapropter non planè eorum sententiam explodendam putarem, qui Marum Amaracum illam esse arbitrantur, quæ maiorem spirat odorem, maioremq; amaritudinem, gustu præfert: quæq; folijs viret minusculis, candidioribus, & tenuioribus: vnde non immeritò à nostris in Hetruria vulgò cognominatur Persa gentile. Sampsuchum enim, sive Amaracum, inibi Persa vulgò vocari superius indicauimus. Cuius illud genus, quod folijs constat pinguioribus, latoribus, viridioribus, gustuq; acrioribus, minus tamen amarum, legitima omnibus Amaracus esse censetur. Illorum inquam senten- tia ferme adstipularer, nisi eidem aduersari Galenus inueniretur: quippe qui hoc loco citato testatus sit, se in Italia Ama- racum vidisse, nulla quòd inibi Marum viderit, facta mentione, sed tantum quòd hoc in alijs ab Asia regionibus rarum eriat.*

MARVM.



oriatur. Hinc itaq; facile adducor, vt existimem Marum non nasci in Italia. Anget nobis opinionē Plinius, qui quasi Galeno subscriberet, Marum duxit esse rarum inuentu, & Italia peregrinum: quare ipsam collocauit libro 12. capite 24. inter ea duntaxat odoramentorum genera, quae ab externis regionibus in Italiam conuehebantur, sic inquit: In Aegyptio nascitur & Maron peius quam Lydium, maioribus folijs, ac varijs: illa breuia, ac minuta, & odorata, haec Plinius. Caterum non ob id eos errare crediderim, qui graciliorē amaracum Mari loco substituunt. Quandoquidem testatur Galenus, quod vnguentum illud, in quo Amaracum pro Maro admisceri iussit, etsi minus quidem odoratum videretur, non tamen viribus inefficacius erat. Caterum plantam, quam hic excudi curauimus, misit ad me Patauio Iacobus Antonius Cortusus, vir quidem rei plantariae admodum studiosus, & iudicio, & animi integritate praeclitus. Nam cum legitimum marum ea mihi representare omnibus anē notis videatur. Marum ipsam mihi proposui appellandam, siquidem folijs est origano candidioribus, odoratis, & gustu acutis amariusculisq;, ramis tenuibus, lignosis, & floribus subpurpureis; odore eximio fragrantibus. Planta est peregrina, quae in Italia non prouenit, nisi aliunde translata. Quod Graeci μάρον, id Latini pariter Marum nominant; Itali Maro.

Marū Italię peregrinum.

Marum propositum, Tragoriganum latifolium nominamus, ad differentiam angustifolij, cuius triplex differentia. Marum dicitur, Matth. Lugd. Tab. Marum Cortusi, Cast. Tragoriganum alterum, Dod. Gal. Gef. hor. Lob. Tragoriganum, Dod. fol. Lugdun. Helenium Crateuæ Anguillara nominabat.

A. N. V. O.

ACINVS.

CAP. XLIII.

A Cinos, aut aconos à Græcis dicitur, tenui, siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata, sed hirsutior: qua coronæ factitantur, à nonnullis olitoribus colitur. Menses, & aluum pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

I. ACINVS.



* II. ACINVS COLUMNAE. *



Qua.

De Acino opi-
nio quorun-
dam explota.

Manardi opi-
nio non acce-
pta.

Ocimum syl-

Nomina.

Quanquam sunt aliqui, qui Acinum eam ocimi speciem esse existimant, quæ angustioribus constat folijs, quæq; incur- dum efflat odorem, cuius gratia, atq; etiam umbra gratia virentis æstivo tempore passim in figulinis vasis fouetur ex- tra fenestras adium, & in atrijs, quam nos ob eius gracilitatem vulgò vocamus Basilico gentile: horum tamen opinioni apertissime refragatur Plinius lib. 21. cap. 15 vbi Acinum scribit nunquam florere. Id quod minori ocimo non euenit: si- quidem hoc æstate, & autumnò floret, floribusq; ornatur albis, ac odoratis. Illud præterea illis etiam reclamatur, quod idem Plinius scriptum reliquit lib. 21. cap. 27. cum ait: Acinon & coronarum causa, & ciborum Aegyptij serunt, eademq; e- rat, quæ ocimum, nisi hirsutior ramis, ac folijs esset & admodum odorata. Ex his Plinij verbis abunde palam fieri potest, Acinum non esse ocimum tenuifolium, cum hoc nec folia, nec caulem hirsuta proferat. Caterum Manardus Ferrariensis vir acri ingenio, & præstanti doctrina, nil aliud Acinum putauit esse, quam herbam quandam, quæ incultis prouenit lo- cis, sed præcipue in agrorum, & viarum aggeribus, ocimo hirsutior, ac satius suauiter olens: quæ quòd ocimum admodum emuletur, a quibusdam syluestre Ocimum appellatur. Quibus sanè notis alius adductus sum, vt Manardo prorsus assenti- endum putauerim. Sed cum postea animaduertierim, herbam hanc flores emittere contra Plinij auctoritatem, nunc cogor mutare sententiam. Nec me pœnitet, quòd nostra, aut aliorum diligentia futurum sperem, vt de hac, & de alijs rebus du- bjs quandoq; certiora proferantur. Atqui obstantibus his, volui tamen plantam quam Manardus Acinum esse existi- mauit, hic etiam appingi, vt aliorum possit esse iudicium. Herba quæ Græcis ἀκίνος, Latinis item Acinus appellatur.

I. Acini loco adpicta (& in historia Lugdunensi proposita) quid sit controuertitur, alijs Calamen- thum inodoru viatum vbique frequens existimantibus: alijs videtur Calaminthæ montanæ magno flo- re respondere: quòd si verba diligentius consideres, Ocimastrum Fuchsi, quod sub pseudoclinopodio infra posuit, illu exprimere voluisse facile percipies, quare ipse sius figuram mutare, vel cmittere noluit. II. Adiecimus & altera Neapolitanis frequentem, & à Fabio Columna in suo Phytobasano propositam. Hæc ex radice fibrosa, caulem hirsutum & asperiusculum, qui mox in alios brachiatur, emittit, circa quæ folia Ocimo maiori similia, sed tenuiora oblongioraque, per ambitum serrata, hirsuta, longis pediculis donata: flores copiosi purpurascens, ocimi forma, quibus succedunt vascula semen nigricans subro- tundum continentia. Hanc siccam vnà cum seminibus Neapole ad nos misit D. Ferrandus Imperatus, præstantissimus Pharmacopæus, quam quotannis olitores verno tempore apud ipsos serunt, Vrticel- lam appellantes, eo quod Vrticæ hirsutiem quodammodo referat.

Βάχχαρις.

BACCHARIS.

CAP. XLIII.

a Meū addit
λ. παρὰ. i.
pingui.
b Meum, &
Cat. ἰν. μ. α.
i. humectum.

Baccharis herba fruticosa, quæ in coronas additur, cuius folia aspera sunt, media violæ, & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendici- bus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: a radicibus veratro nigro similibus, quibus odor in- est cinnamomo proximus. Asperum b squalidumq; solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, vullis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris: item diurnæ tussis, & vrinæ difficili, mentes pellit: con- tra serpentium morsus vtilissimè datur in vino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerperis eius decoctum in defensionibus prodest. In diapsalmata vtiliter inseritur iucundi odoris gratia. Folia, vt pore quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt: oculorum inflammationibus, mammis tumentibus à partu, ægilopijs incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Olor somnum gignit.

Baccharis
consideratio.

BACCHARIS.

And. Lacunæ
literæ.



Dum eã de Bachari sententiam, quam superioribus an- nis lingua Italica expresseram, nunc demum hu no- stris Latinis commentarijs repetitam, excudendam tradidif- sem, confessus ingenuè me nusquam hactenus veram Bacha- rim reperisse, aut ab alijs repertam vidisse: accidit interea temporis, vt eam ad me Roma miserit Andreas Lacuna Se- cobiensis, medicus hac nostra etate clarissimus. Cuius lre- ras hic referre libet, quòd ea sint, quæ mihi maximum faci- ant argumentum humanitatis & benevolentia sua, atq; et- iam rei fidem addant. Litera autem eius sunt ita ad me scripta. Etsi nos eidem, cui tu, negotio illustrandi, locuple- tandiq; Dioscoridem nauemus assiduam operam, ob idq; no- bis ex vsu hanc ad rem extorquere, facultates alienas potius, quàm dissipare nostras: volumus tamen tibi & amico, & de materia medica quàm optimè merito communicare veram Dioscoridis Baccharim, quam haud ita pridem in hise Ro- manis agris reperimus, quòd possis illam ad vitam formam expressam, in vsu humana salutis inserere tuis luculentis- simis commentarijs, quos iam (vt fama est) primùm Latine scriptos edere instituis. Eam itaq; charta alligatam ad te mitto, aded per omnia respondentem descriptioni Dioscoridi vt in ipsa nulla nota possit desiderari. Quippe folia eius sunt aspera, media viola & verbasci magnitudine: caulis angu- losus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper: radi- ces nigro veratro similes, quæ odore, & sapore imitantur exquisitissimum cinnamomum. Porro flores, quos per incle- mentiam temporis nunc mittere ad te non licet, in nonnul- lis locis purpurei, in alijs lutei videntur: ita vt huius stirpis es- se dua species videantur, vel si meminerit vnus tantum Di- oscorides. Postremò huius planta vires, & facultates sunt o- mnino eadem, quas sua Bacchari diuus tribuit Dioscorides.

Hic comicus literis suis finem imposuit. Sed certè illud mihi permirum accessit, quod eadem die, & ferè hora, qua Baccha-
 rum Romæ accepi, eandem Arimino ad me misit Iulius Moderatus diligentissimus pharmacopola, herbarumq; iudicij
 in quod aperte testatur hortus eius apud herbarios Italia non vulgaris, ut qui sit varijs ac nobilibus plantis refertus. Hanc sa-
 ne comperi nulli prorsus reclamantibus notis, Dioscoridis Baccharim representare. Nam præterquam quòd constaret, ut
 illa, folijs asperis, magnitudinem inter violam & verbascum referentibus, caule anguloso, cubitali altitudine, aliquantu-
 lum aspero, habebat etiam in caule sua adnata folia non colicolas. Hinc obiter suspicor legendum esse παραφυλλάδας
 ut vulgati Graci codices habent: quandoquidem illi lectiōni adstipulatur etiam Oribasij manu scriptus
 comix. Præterea flores, quibus illa carebat, huic in purpura candicabant, odorati. Eius deniq; radices erant veratro nigro
 similes, & odore cinnamomo proxima. Huius igitur plantæ delineatione, qua ad amussim historia Dioscoridis respondet,
 ut eam quoq; effigies, quam piccam damus, affabrè demonstrat, facile adducor, ut affirmare non dubitem, hanc esse veram
 & legitimam baccharim. Ceterum Leoniceus, & Brasauolus ipsum secutus, eam plantam magno errore putarunt
 Baccharim esse, quam quidam Sclaream, nonnulli verò Matrisaluiam appellant. Sed cum huius radices non
 sint veratro nigro similes, neque minimum quidem odore cinnamomum imitentur, planè eorum sententia improbanda
 videtur: præsertim quòd veram Baccharim eam esse censeamus, de qua superius differuimus. Sed non desunt recentiores,
 qui contendunt Baccharim Dioscoridi accreuisse, caputq; hoc adulterinum esse, ut noui aliquid afferre videantur. Siqui-
 de inter hos Anguillarius non paucis contendit argumentis, Baccharis caput haud esse Dioscoridis legitimum, sed ea omnia
 qua de Bacchari in eo authore scripta sunt, ex capite de Asaro esse deprompta. Quod ut in primis probare videatur, Baccha-
 rem inquit, Gracum non esse nomen, sed Latinum, cum nemo extet inter Gracos authores, qui vel ante Dioscoridem, vel
 eum tempore vel paulo post claruerunt, qui Baccharis vsquam meminerit, ut videre est apud Galenum & Aetium. Nec his
 deinde obstare inquit, quòd Athenæus inter vnguenta Baccharis mentionem fecerit, quippe quod illi Baccharis vnguentum
 designet, non plantam: sed quàm magno ducatur errore Anguillarius, quàmq; diligenter legerit autores, aut rectè eorum
 scripta intellexerit, ille iam audiet. Siquidem non desunt Graci authores, ipsiq; antiquissimi, qui ante Dioscoridem Bac-
 charis meminere. Plinius enim testis est lib. 21. cap. 6. de Bacchari scripsisse Aristophanem prisca Comædiæ autorem, ob
 idq; falsò quibusdam Baccharim Barbaricam appellari, quòd à Gracis sibi nomen inuenerit. Deinde negligenter satis
 Anguillarium legisse Athenæum, ex hoc clarissime patet, quòd is non solum Baccharis vnguenti, sed Baccharis quoq; plan-
 ta vel eius radices meminerit his verbis. Est vnguentum quod Baccharis à comicis nominatur. Ac nonnunquam Baccharis
 non est vnguentum. Aeschylus. n. in Amymone separatè & distinctè: Ego, inquit, Bacchares tuas & vnguenta: & Sy-
 monides vnguentis vnctus sum, ac Bacchari. Aristophanes in Cerealia celebrantibus, O Iupiter (inquit) venerande, quo
 pacto nepharium scrinium continuo lotum, vnguenti ac Baccharis odorem emisit? Quibus palam est, non solum eo vn-
 guento ad odoramenta vsos esse antiquos Gracos, sed etiam ipsa quoque Bacchare, & eius radicibus. Sed concedamus An-
 guillario nusquam de Bacchari herba locutum esse Athenæum, ne tam citò erubescat. Vnde tandem dicet denominatum
 vnguentum illud? An negabit à Bacchare, cuius radices exceperat? Neget vel affirmet, comprehensus est. Etenim vbi ne-
 gerit, Plinius eius retundet arrogantiam, quippe qui Aristophanis testimonio scribit ex Baccharis radicibus vnguenta fieri
 solita apud antiquos. Si verò affirmarit, iam suam ipsius falsus fuerit ignorantiam. Baccharis vnguentum à Bacchare anti-
 quis denominari testatur Fauorinus his verbis. Βάκχαρις, μύρον ποιόν ἀπὸ βοτάνης ὀμώουμον, ἔστι δὲ καὶ ξηρὸν διάπασμα
 τὸ ἀπὸ τῆς πίττης. Quibus non modò palam est Baccharim antiquis vnguentum designare, sed etiam puluerem ex Baccha-
 ri radicibus paratum corpori inspergendum, de quo apud Athenæum scripsere Aeschylus, Symonides & Aristophanes: vsq;
 enim antiquitas Diapasmatis, idest, puluerum siccis asperginibus, non solum ad odoramenta, sed etiam corporibus fo-
 uendis, siccandis, laxandis, adstringendis, molliendis, ac durandis, varijs è plantis paratis pro vrentium ratione. Præterea
 ad ea, que dicit, ut autorum testimonia effugiat, qua illi mentem inturbant, quòd in Oribasij, & Pauli libris Baccha-
 ri caput sit additum à quibusdam, eo argumento, quòd Paulus tantum scribat de ijs simplicibus medicamentis, de quibus
 scribit Galenus, qui nusquam de Bacchare meminit: & idem fecerit Oribasius: illi respondendum est, quòd negligenter sa-
 ti legerit de plantis apud Paulū. Quippe quòd is non solum ex Galeno, sed ex Dioscoride transcribat. Agallochi enim Nar-
 caphthi, Cancami, Fraxini, Othonna, Acanthij, Botryos, Geranij, Aethiopidis, Epipactidis, Apios, Alypi, Cinocram-
 be, Heliotropij, & aliorum quorundam non meminit vsquam Galenus, quorum tamen omnium ex Dioscoride meminit
 Paulus, quemadmodum & Baccharis: quo fit, ut infirmum admodum sit Anguillarij argumentum tam de Paulo quàm
 de Oribasio, qui plantarum historias non ex Gal. sed ex Dioscoride transcribant. Ad hac quantum valeat in censendis Asa-
 ro & Bacchare Anguillarij iudicium, conijciet facile quispiam, qui eius annotauerit verba, dum vltimo loco ut probet
 Baccharis caput ab Asaro esse rescissum, dicit id facile deprehendi posse, vbi quispiam Baccharis & Asari caput simul con-
 tulerit. Sed faciamus periculum: Asarum folio est hederæ minore, lauioreq;: Baccharis verò inter Violam & Verbascum
 medio, & tactu aspero. Flores Asaro sunt Cyrimi aut Hyoscyami figura, ac purpurei: Bacchari in purpura albicantes.
 Cauliculos habet Asarum plures, asperos, ac lentos, quibus singulis folia appensa sunt: Baccharis verò vnum tantum cau-
 licum edit cubitalem, angulosum, aliquantulum asperum, non sine adnatis multis. Item radices Asaro insunt geniculata, te-
 nues, obliqua, graminis non dissimiles, longè tamen graciliores odorata, & ut Plinius inquit, & experientia comprobat,
 Nardum redolentes: Bacchari autem radices insunt nigro Veratro similes, quibus odor inest gratissimus, Cinnamomo
 proximus. Postremò Asarum in vmbrosis montibus prouenit: Baccharis in asperis & siccis. Quibus palam est nil minus
 hæc plantas sibi repugnare, quàm sibi ipsi repugnet Anguillarius, dum illud Cratææ fragmentum in medium affert, quo
 probare contendit Baccharis caput in Dioscoride ex Asari capite esse rescissum. Siquidem cum in eo legatur. Βοτάνη ἐυώδης,
 σφραγοματικὴ, καυλιὰ γωνιοειδῆ, φύλλα δασέα ἀσθιδὲ πορφυρὰ, εὐώδης πίττα, ὀμώια τῆ τῆ ἐλλεβορί, ἰοικεῖα τῆ ὀσμῆ
 ὑμαμώου: id est: Herba odorata, cauliculi geniculis intercepti, flores autem purpurei, odorata radix, similis radici Elle-
 bori nigri, odore Cinnamomo accedens. Tyresia cecior fuerit, qui non viderit fragmentum esse Baccharis, non Asari, ut sibi
 persuadet Anguillarius. Quippe quòd Asarum Plinii testimonio, ita vocatum est, quòd in coronis non veniat, quòdq; eius
 cauliculi geniculati non sint, sed tantum radices, qua graminis sunt non Ellebori, nec Cinnamomi odore refertæ, sed Nar-
 di, & ideo Nardum rusticum nonnullis appellatum: quòdq; non in siccis & asperis nascatur locis, sed in vmbrosis ac opacis
 montibus. Hac si diligentius perpendisset Anguillarius, non ita fortasse inconsideratè contra sui ipsius sententiam fragmen-
 tum illud Cratææ attulisset in medium, ut potius fortasse videretur tam præciosa habere fragmenta, quam quòd cura illi
 fuerit, solide de Medica materia differere. Probatur præterea, Baccharis caput Asari non esse membrum, non solum ex
 Oribasio, qui perquam fideliter ex Dioscoride transcribit, sed etiam ex Serapione. Siquidem ij in Asaro ne verbum quidem
 habent, quòd in Baccharis capite reperiri possit, sed id tantum, quod passim legitur, in Ruellij ac Cornarij Dioscoride, qui

Leoniceus & Brasauoli opinio repro-
bata.

Anguillarij opinio repro-
bata.

Baccharis antiquissimi
meminere.

Baccharis & herba & vn-
guentum a-
pud Athenæ-
um.

Combreti
Pliniani
mentio.

cum hac animadvertissent, qua in Asari capite adulterina inuenerunt, non sine ratione amputarunt. Quibus patet modo Asari caput integrum haberi, sed quod hac verba πικρὸν ὄσιν & εὐχρηστικὸν Dioscoridi sint adulterina. quoniam modum alia quam plura que in caput fere omnium principio olim habebantur. Postremo diuinus eandem plantam esse Baccharim, apud Gracos, quam apud Latinos. Nam si quisquam conferat vires, quas fragmentum Crataei illud, & Dioscorides Bacchari tribuerunt, cum ijs quarum de sua Bacchari meminit Plinius, sane illico deprehendet, quam aperte cautiatur Anguillarius. Baccharem similem Combreto idem reddidit Plinius, vbi inquit: Similimum ei Combretum appellatur: foliorum exilitate vsq; in fila attenuata, & procerius quam Bacchar. Quae verba haud recte interpretantur, qui pro Combreto quandam ostendunt plantam, folijs stamineis, veluti filamenta quadam duum trium, & subamarum longitudine protensa. Siquidem Plinii verba eiusmodi foliorum faciem haudquaquam describunt, sed quod substantia Combreti folia adeo sint exilia, id est, tenuia, vt textura filamenta omnino appareant. Nam exilia sicuti proponit Plinius in Epistolis, & Cicero secundo de diuinatione: quo fit, vt nil aliud in ea comparatione sibi velit Plinius, quod quod Baccharis folia sint Combreto solidiora, pleniora ac robustiora: illa verò vt diximus, non quidem in stamineis protensa, sed Baccharis modo lata: quamuis adeo tenuia vt omnis ferè earum appareat textura duntaxat.

Baccharim quam à Lacuna acceptam proponit, sunt qui Verbascum odoratum, cui interdum flores lutei, interdum purpurei, censeant: & sanè cum Verbasco, quod pro tertio posuit, multum conuenire verum existimamus eam figuram competere Conyzae maiori à Matthiolo propositae. Matthiolum imitari Lacuna, Lon. Cast. & Tabernæmontanus, eandem figuram pro Bacchari exhibent.

Πικρὸν ὄσιν.

R V T A.

CAP. XLV.

Conclusa nō
legit Orib.
† Orib non
habet.

† Orib. non
legit.

a Meum
σὺν μυρσίην
κρωτῆ. ἢ
cum Myrteo
cerato.

RVta montana, [sylvestrisq; satiuā,] & hortensi acrior est, & in cibis damnata: satiuā verò quae sub fructu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulcerat, vrinam ciet, menstrua pellit, † [alium sistit] potu, ciboue. Lethalium medicamentorum antidotum est, si semen ex vino acetabuli mensura bibatur. Folia per se praesumpta, aut cum nucibus iuglandibus, aridisq; ficis, inescaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit. Genituram cibo, potuue extinguit, cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris, laterumq; dolores, difficultatem spirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumq; cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, pota, vt antè dictum est. Item ad inflationes coli, vuluæ, rectiq; intestini cum oleo decocta & infusa. † [Fœminas vuluæ strangulatu liberat, si à genitili fedetenus cum melle subuciatur.] Feruefacta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit: articulariis doloribus ex melle, aqua inter cutem cum fias illinitur: eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita. Cruda, conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit trita & indita. Testium inflammationibus cum laureis folijs imposita, & eruptionibus papularum cum a myrto, & cerato prodest: cum pipere autem, vino, & nitro affricata, albi vitiligini medetur: cum eisdem illita formicationes tollit, & verrucas, quae thymi florem repraesentant: contra impetigines cum alumine, & melle vtilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, dolori aurium efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum fœniculi succo, ac melle inunctus opitulatur. Ignem sacrum, vlcera quae serpunt, aut in capite manant,

I. R V T A.

II. R V T A SYLVESTRIS.



Ruta sylvestris
Stem

Ruta parviflora
Stem

eam aceto rosaceo, & cerussa illitus persanat: mansa alliorum, cæparumq; acrimoniã domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione: oportet itaq; eam vinctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum, feles arcere. Adijciunt eam, quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, b viperis scætet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est. In antidota commodè additur. Contra incontinentiam vrinæ tostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris ruta sativæ similis est. Prodest comitialibus & coxendicum doloribus: menstrua movet: partus enecat. Acrior est viribus, quàm hortensis & validior. Sylvestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

b Oribasius
ὄρεων ὀλεῖ-
σας. i. pluri-
bus serpenti-
bus.

* III. RUTA SYLVESTRIS
tenuifolia. *



Ruta utraq; planta est vulgaris notitiæ, tam sativæ in-
quam, quam sylvestris. Non tamen velim de illa sylve-
stri intelligas, de qua capite proximo differendum est, sed de
ea tantum, cuius meminit Dioscorides in presenti capite,
quamq; in eius calce sativæ similem fecit: siquidem hæc ab il-
la plurimum differt. Nascitur hæc sylvestris Ruta in Goriti-
ensi agro copiosissima, adeo ut qui circumstant montes, ea v-
big, scateant, præsertimq; Saluatinus mons, qui eadem fermè
vestitur. Facie hæc hortensi perquam similis est, folijs, cauli-
bus, ramis, floribus & capitulis, graciliori tamen folio, caudi-
ce verò crassiori, lignoso ac firmo, & gustu acriori amarioriq;
Id quod Monachorum in Mesuem scribentium (pace tamen
eorum dixerim) ineptijs prorsus refragatur: quippe qui asse-
rant nullam fere esse differentiam inter hæc, & androsamū
sive hypericum, ut quæ in alterius locum substitui possint.
Qua in re manifestè deprehenditur magna eorum inscitia:
quandoquidem hi (ut equidem arbitror) in triplici versan-
tur errore. Primum quod existimaverint, turpi nimirum la-
psu, sylvestrem Rutam ab androsamo & hyperico non diside-
re. Deinde quod putaverint hallucinati etiam, androsamum,
& hypericum vnum & idem esse, cum tamen Dioscorides de
his seorsum, tanquam de differentibus plantis tradiderit. Huc
tertius accedit error, & is quidem, mea sententia, detestandus,
quod prodiderint, hæc sylvestris Ruta historiam bis à Diosco-
ride descriptam reperiri, magnamq; habere cum hyperico co-
gnationem. Quod potius somniasse, quàm libero sensuum iu-
dicio scripsisse videntur Monachi, cum non huius Ruta caput
sit illud, in cuius fronte in quibusdam codicibus, usq; non pro-
batu, illa legantur, quæ doctissimorum testimonio hic asciti-
tia, hyperici autem propria censentur: sed quod proximè se-
quitur, in quo alterius sylvestris Ruta, quam alij Moly, alij
HARMALAM, alij verò Besasan appellant, tractatur bi-

Rutæ confid.

Monachorū
hallucinatio:

floria. Quare caueant pharmacopola, qui fortasse horum patrum scripta sequuntur, ne vna cacutientes sæpe ducantur in
varios errorum labyrinthos. RUTA planta est perpetuò virens folijs crassiusculis, subpinguibus, pluribus ab vno pediculo
exeuntibus, & ex angusto exortu in latū se diffundentibus, colore saturatè viridi. Ramos mittit copiosos surculososq; & flo-
res in summitate luteos, Hyperici haud absimiles, è quibus capitula oriuntur, quadruplici apice diuisa, in quibus pusillum
continetur semen nigro colore: radix illi lignosa, multiplexq;, acris est & amara, sed acrior & amarior montana. Seritur
in hortis, apricus gaudet & siccis, terraq; maximè lateritiis. Attenuat Ruta, incidit, digerit, resoluit, prouocat & flatus po-
tenter pellit. Seritur Ruta (ut author est Plinius lib. 19. cap. 8.) fauonio & ab æquinoctio autumnii. Odit hyemem & hu-
morem, ac simum. Apricus gaudet & siccis, terraq; maximè lateritiis: cinere vult nutriri, hic & semini miscetur, ut careat
crucis. Sub fici vmbra libentius acquiescit: cuius rei causam suis in problematis reddidit Aristoteles. Mustela cum serpente
dimicatura, in murium venatu Rutam prius edendo se munit, gnara hæc contra venena pollere. Utuntur & ipsa hoc no-
stro tempore ad cacodæmones depellendos, fortasse quòd contra fascinationes eam commendauerit Aristoteles in proble-
matis. Planta Ruta mirabilis magnitudinis visa est (Flauio Iosepho auctore) Macherunti, quod olim fuit munitissimum
Iudææ oppidum. Is enim lib. 7. cap. 25. de bello Iudaico ita scriptum reliquit. Erat autem in ipsa regia Ruta mirabilis ma-
gnitudinis, à nulla enim ficu vel celsitudine, vel magnitudine vincebatur. Ferebant autem eam ex Herodis temporibus per-
seuerasse: mansissetq; vltèrius profecto, sed à Iudæis, qui locum ceperunt, excisa est. Ruta sylvestris & sativæ, meminit Ga-
lenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Ruta agrestis ex quarto est ordine excalfacientium: domestica ve-
rò ex tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ex quo etiam sanè digerere, atq; incidere crassos, lentosq; hu-
mores potest. Ob eandem vim & vrinæ mouet. Quin & tenuium est partium, flatusq; extinguit. Quare ad inflationes
competit, ac veneris appetitum cohibet, digeritq; atq; exiccac strenuè. Est enim eorum ex numero medicamentorum, quæ
valenter desiccant. Porrò quod superius Moly & Besasan nominari diximus, & ipsum utiq; fuerit ruta sylvestris. Πήγανος
Græcis herba est, quæ Latinis pariter & Italis Ruta nominatur: Mauritanis Sadeb seu Sedab: Germanis Raut vnd
Demraut: Hispanis Arruda: Gallis Rue: Böhemis Rauta: Polonis Ruta. Ruta sylvestris, Græcis πηγανός ἄγριος: Italis
Ruta saluatica.

Rutæ hist.

Rutæ vires
Matthiolo.

Iosephus de
Ruta.

Rutæ vires
ex Galeno.

Nominat:

Ruta sativæ est vel latifolia vel tenuifolia: est sylvestris, hæc q; vel sativæ similis, quæ rursus aut maio-
ribus aut minoribus est folijs, aut dissimilis, de qua capite sequenti. I. Ruta hortensis altera, C. B. Ruta
hortensis minor, Trag. Ruta, Matth. Anguil. Lac. Cast. Ruta lativæ tenuifolia, Cord. in hist. Ruta horten-
sis nobilitate præstans, Gel. hor. Ruta tenuifolia, Tab. Quæ verò ab alijs pro Ruta proponitur, Ruta est
horten-

hortensis latifolia. Cultura tres, imò & quatuor cubitos superat, & arbusculæ similem, in Illustris. Ducis VVirttembergici orto Stutgardia vidimus. II. Ruta sylvestris latifolia, C.B. Ruta sylvestris, Math. Dod. gal. Lonic. Aduerf. Ruta sylvestris prima, Lac. Cast. Ruta sylvestris maioribus folijs, Gef. hor. Ruta sylvestris montana, Lob. Ruta montana. Tab. III. Ruta sylvestris tenuifolia, C. B. Cam. Lugd. Ruta sylvestris minoribus folijs, Gef. hor. Ruta sylvestris Lob. Ruta sylvestris minima, Dod. fol. Ruta sylvestris minor, Tab. Ruta montana, Clus. hist. Hisp. cui fortè Ruta mas Pythagoræ apud Plinium. Peganion Narbonensium, siue Rutula, Aduersarijs.

Πύρανος ἀγροί.

RUTA SYLVESTRIS.

CAP. XLVI.

† Orib. addit γερόμενον. i. nascitur.

■ Cat. addit. i. πο- cluditur, cuius est vsus. Semen autumnno maturefcit, quod cum melle, vino, croco & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam harmalam vocent, Syri befasan: qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus & lato solo prouenit.

Vocant etiamnum sylvestrem Rutam, quod † in Cappadocia & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab vna radice multos emittit cauliculos: folijs multò, quàm alterius rutæ longioribus tenerioribusq; odore graui, flore candido: capitulis in cæcumine paulò maioribus, quàm latius rutæ, quæ tribus maximè partibus constant: in quibus triangulum semen, subrufum, gustu a amarum re-

RUTA SYLVESTRIS HARMALA.

Ruta sylvestris, alterius consideratio.



Harmala historia.

Seplasiarioru

grauis error, apothecariorum scripta secuti, huius Ruta siue Harmelloco, foetidis & aggregatiuis dictis catapotijs, alijsq; compositis medicamentis cicutæ semen admiscunt. Quod non solum suis tum qualitatibus, tum facultatibus Harmala omnino repugnat, sed etiam venenum lethale existit. Errandi causam præbuit Quiricus Augustus Tortonenis: quandoquidem vbi in conscribendis foetidis catapotijs, quid sit Harmel explanare contendit, ait Syluatici Pandectarum auctoris testimonio, quòd quotiescunq; reperitur Harmel cum aspiratione, nil aliud apud Arabes designat, quàm semen cicutæ: sine verò afflatu, Ruta sylvestris semen. Quod euidentis ac execrandum est mendacium: siquidem Harmel tam afflatum, quàm nudè scriptum Mauritanis perpetuò agrestem Rutam significat, vt Serapionis & Auicenna auctoritate facile probari potest suis in libris, in quibus simplicium historias, & facultates posteritatis memoria prodiderunt. Nam quæ illi de Harmel scripserunt, Dioscoridi & Galeno Rutam hanc describentibus prorsus adstipulantur. Caterum Auicenna ipsius Harmel etiam meminit lib. quarto sui Canonis, vbi viperarum morsus curationem tradens, sic inquit. Ruta sylvestris (& non est albarmel, secundum quòd existimauerunt quidam, imò est species ruta ipsius) confert morsibus viperarum: hac ille. Sed ne forte quis Auicennam non rectè intelligens, in his verbis decipiatur, vt suis in Paradoxis Fuchsum, in Auicennam acriter agentem, deceptum fuisse deprehendimus, vt qui illum, vt puto, minus intellexerit, sciendum profectò est (quemadmodum etiam antea aliquoties retulimus, & nunc, quoniam ad rem faciat, id ipsum repetere non alienum erit) quòd non eiusdem ritigeneris est sylvestris Ruta, de qua vna cum domestica superius tradidit Dioscorides, & hac, quæm Græcorum quidam Harmalam, Mauritanis verò Harmel siue Albarmel appellant. Ex hac omnibus perspicua Ruta sylvestris distinctione, quantum equidem reor, liquido patebit, Auicennam haudquaquam errasse, vt errorem immeritò illi iniungit Fuchsius. Quippe cum inquit Auicenna, Ruta sylvestris (& non est albarmel, secundum quòd existimauerunt quidam, imò est species Ruta ipsius)

Fuchsilapsus & Auicenna defensio.

Handwritten notes: 1. Harmala, 2. 5m.

10

20

30

40

50

60

ipsum

ipsius) confert moribus viperarum, ijs verbis declarat se illam hic sylvestrem Rutam intelligere, qua domesticam emula-
 tur: non autem illam, de qua hoc loco differit Dioscorides, quamq. sua Arabica familia auctores Harmel, siue Albarmel
 vocant. Eius tamen loco citato, paulo antè meminerat, sic inquit: Et alharmel est de medicinis liberantibus. Vbi per Al-
 barmel eam sanè Rutam sylvestrem intelligit, de qua praesens sermo est: ob cuius differentiam, postea alterius ruta sylvestris
 mentionem faciens, subiungit illa verba, qua iam bis citauimus. Ut hinc palam faceret, se non modò de alio sylvestris
 Ruta genere intellexisse, sed etiam occurrisse, ne quis, si sine distinctione locutus esset, se idem frustra repetisse calumnie-
 tur. Porro non de ijs qui sustinere contendunt, Harmel esse Cicutam, Auerroem in medium adducentes, quem libro
 quinto suarum collectanearum ita scriptum reliquisse volunt. Harmel, id est Cicutam, calida est, & sicca in tertio gradu, Quorundam
 incidit crassos humores, & prouocat vrinam & menses, & valet dolori scapularum, & purgat phlegma. Hac ista nitun-
 tur auctoritate. Quibus ita facile responderi potest, quòd cum Cicutam hoc loco eas Auerroes tribuat facultates, quas et-
 iam Harmela, nomine tamen Moly, reddidit Galenus, manifestè deprehenditur Auerrois codex librorum incuria fuisse
 deprauatus. Neque difficilis lapsus fuit, quòd ij vocum similitudine decepti Cicutam pro Ruta legerint ac scripserint.
 Adde etiam illud (hoc enim medicorum neminem latet) quòd tantum abest, vt Cicutam tertium caliditatis gradum obtine-
 at, cui illam assignat deprauata Auerrois lectio, vt ne primum quidem attingat, cum Dioscoridis, & Galeni testimonio,
 in quarto frigiditatis ordine collocetur: ob idq. eam lethale venenum esse affirmant. Quapropter quàm pessimè agatur ab
 ijs, qui Cicutam formidandum semen iis compositis medicamentis addunt, quorum vsus est ad deijciendos, incidendos, ex-
 tenuandosq. lentos humores, ij dyjudicent, qui veritatis studio dediti huiusmodi cauillationes, qua sepe hominibus perni-
 ciam pariunt, tollerare non possunt. Ruta huiusce semen datur ad purgandum bilem atram magno auxilio, paraturq. po-
 tandum hoc modo. Conijciuntur in mortarium seminis grana 15. prius clarissima aqua ablutis, & deinde ligneo pistillo te-
 runtur, affundunturq. aqua fontana vncia quatuor, eodemq. pistillo aliquantisper miscentur: demum linteolo percola-
 tur cremor, cui adduntur mellis optimi vncia tres, & olei Sesamini, aut amygdalini vncia duae, & id omne propinatur
 Melancholicis. Facit enim copiosas vomitiones. Nec est hoc medicamento aliud valentius ad Comitiales. Scribunt Arabes
 huius ruta semine inebriari homines, adeò vt subinde diutius dormiant. Id quod maximè confert in eo Melancholiae ge-
 nere, quod ij heros appellant. Rutam hanc sylvestrem appellat Galenus Moly, libro 7. simplicium medicamentorum, vbi
 de ea differit his verbis: Moly, hoc quidam vocant peganon agrion, hoc est, Rutam sylvestrem, nonnulli harmolain; Syri
 besasan, sicut Cappadoces moly, quia radicem habet nigram, & florem lacteum. Vis eius tenuium est partium, & calida
 tertio abscessu: vnde crassos humores secat, ac digerit, & vrinam mouet: hac Galenus de altero Ruta sylvestris genere. Cui
 constat & primò sylvestri Ruta genus perpulchrè respondere. Ex quo crediderim, quòd sine vllò errore seplasiarj alteram
 alterius loco subicere possint, quoties Arabum harmel in suis compositis medicamentis admiscendum reperiunt. Est & alia
 Ruta species, qua recentioribus quibusdam CAPRARIA cognominatur, quibusdam verò Galega dicitur, nostrates eam
 vulgò appellant Lauanese. Passim hac secus itinera in scrobium aggeribus, humentibusq. locis & lato solo prouenit, caule
 sesquicubitali, & aliquando maiore, ramoso, in quo folia vtrinque emergunt ab vno pediculo dena aut vndena, oblonga,
 ac subpinguia. Flores in summitate profert ex candido purpurascens, è quibus siliqua oriuntur, semen continentis. Vis
 illi maxima contra pestilentiam, namque plurimos huiusce planta vsu praeseruos scimus. Quidam ad hoc quotidie cru-
 dam in acetarijs vorant, alij olerum modo coctam ex carniū iure sumunt, nonnulli succum extrahunt, & ex vino hau-
 riant. Quinetiam valet non solum aduersus lethalia medicamenta, verum etiam contra ferarum omnium, qua dentibus
 auaculeo venenum emittunt, tum morsus, tum ictus: in quem vsum herbam vel eius succum bibendum praebent, ac et-
 iam emplastri modo vulneratis partibus imponunt. Laudant aliqui succum sesquiuncia pondere haustum pueris comitali
 morbo vexatis. Epotus recentis herba succus datur vtiliter cochlearis mensura ad necandos intestinorum vermes. Idem pra-
 stat herba ipsa in patella calefacta ex oleo amygdalarum amararum, & è lini semine, ventri adalligata. Eiusdem succus
 datur in principio pestilentiae affectis, aut eius decoctum ex aceto factum, addita Theriaca, & Armenio bolo. Verum à
 potu subinde sudare affectum oportet. Idem praestat ad pestilente febres, in quibus exanthemata, siue macula cutanea
 quas petechias vocant, emerferint, & praesertim epoto herba decocto ex aqua vnà cum Tormentilla radice, Cardui bene-
 dicti foliis & Armenio bolo. Quas quidem facultates illi inesse censeo, sua ipsius speciali dote. Caterum apertissimè fallun-
 tur, qui putant Rutam hanc Caprariam dictam Polemoniam esse, vt latius lib. 4. suo loco dicemus. Quae planta πρύανον
 ἄγριον, & ἄρμολα Graecè: Ruta sylvestris altera Latine dicitur: Arabicè Harmel: Italicè Ruta saluatica secunda. At Gale-
 ga siue Ruta Capraria, Hetruscus Lauanese.

Quorundam error, & locus Auerrois restitutus.

Rutae sylvestris alterius vires ex Gal.

Rutae caprariae mentio, & vires.

Nomina.

Ruta sylvestris magno flore, C. B. Ruta sylvestris Harmola, Matth. Ruta sylvestris altera, Cast.
 Cam. Ruta harmola, Lugd. Ruta sylvestris, Cord in Diosc. Anguil. Gef. hor. Harmel, Gef. hor. Harmel
 Constantinopolitanum, Cæsal. Harmala, Dod. fol. Clus. hist. Hisp. Tab. cui & Moly Galeni. Harmala
 Syriaca, Lobelo. De Galega seu Ruta capraria, vide cap. 136. libri quarti.

Mōλυ. M O L Y. CAP. XLVII.

Moly folia habet graminis, latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similem, sed minorem, magnitu-
 dine violæ purpureæ æmulum, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum: in cuius
 cacumine inest aliquid, quod alii speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad
 vuluæ apertiones, si trita cum irino vnguento, in pesto subiciatur.

Moly, vt scriptum reliquit Theophrastus lib. 9. cap. 15. de plantarum historia, apud Pheneum exit, atque apud Cyl-
 lenam esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda, non absimili cape, folio scilla. Vsum eius
 contra veneficia summa, non tamen effodi difficulter, vt ait Homerus. Moly quaque meminit Plinius lib. 25. cap. 4. ita
 scribens. Laudatissima herbarum est, Homero teste, quam vocari à dijs putant Moly. Ast inuentionem eius Mercurio assi-
 gnat, contraq. summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Pheneum, & in Cilene Arcadia tradunt, specie illa
 Homericæ radice rotunda nigra, magnitudine cape, folio scilla: effodi autem difficulter. Graci aut hores folium eius lu-
 teum pinxere, eum Homerus candidum scripserit. Inueni è peritis herbarum medicis, qui & in Italia nasci eam dicerent,
 afferitq. Campania mihi aliquot diebus effossam inter difficultates saxeeas, radice triginta pedes longa, ac ne sic quidè so-
 lida, sed abrupta: hac Plinius. Ex cuius sanè verbis facile cognosci potest, Moly ab eo secundo loco redditum, quod in Cam-
 pania

Moly hist eē Theoph. & Plin.

Moly vires ex Galeno.


pania effossum, & sibi allatum scribit, ab illo plurimum disidere, quod Homerus & Dioscorides notis non plane consentientibus representarunt. Moly cui Dioscoridis delineatio respondeat, misit ad me Patauius vir optimus, & omni humanitate praeeditus, Iacobus Antonius Cortusus, cuius imaginem hic appingi curauimus. Caterum herbam Moly Dioscoridis appellatam, eandem nimirum esse putauerim cum illa, qua Gal. lib. 7. simplicium medicamentorum Myle vocatur, cum inquit: Myles radix paruo bulbo similis est, facultatis contrahentis: nam cum farina arina, (hoc est lolij) apposita, apertam vuluam sanare scribit Dioscorides. His verbis Galenus non solum quidem Mylen suam Dioscoridis Moly acceptam refert, sed etiam nos commonet mendis cuiusdam, quod hoc usque latuit in codicibus Graecis Dioscoridis. Quippe quod vbi in huius capituli calce legitur μετὰ ἰρίνου μύλου, quod est, cum ἰρίνου ὑγνυμένω, Galeni testimonio, legendum sit μετὰ ἀλεούρου, id est, cum farina loliacea. Et certe in id vitium facile librarij quadam scripturarum vicinitate labi poterunt. Sed addamus rationem, qua vulgaris lectio deprauata manifeste deprehendatur. Nam si vnguentum irinum effuaciter aperit, non video quid Moly radix cum eo prestare possit πρὸς ὕψους ἀναγεομώσεως, hoc est, ad vuluam apertiones. Sic enim ex Graeco rectius reddendum puto, quam ad aperiendas vuluas, vt vertentur Marcellus & Ruellius, qui tamen secum facere non poterant, si vnguenti irini rationem habere voluissent. Id μῶλον Graeci dicunt, quod Latini item Moly.

MOLY.

Dioscoridis locus castigatus.


Nomina.

Allium angustifolium



a Meum, & Cat. in Josph. p. i. & in Psophide. b Meum λεπτόν. i. tenui. Idē legit Orib.

I. PANACES HERACLEVM.



c Orib. μικρότερος. i. amarior.

Heracleum lanatum
P. 159. 6. 1596

Asclepias distans
Sp. hist. (See p. 54)

Moly ἀπὸ τῆ μωλίον τὰ ἰρίνα, ab amolendis morbis dictum. Vnius licet meminerit Dioscorides, plures tamen posteriores agnouere differentias, de quibus in historia. Moly minus, C. B. Moly Matth. Lon. Cast. Lugd. Moly Dioscorideum putatum, Lob. Moly Dioscoridis, Clus. hist. Hisp. Cam. Moly angustifolium, Dod. fol Allium vrinum alterum, Cæsalpino.

Πάνακες ἠράκλειον. PANACES HERACLEVM. CAP. XLVIII

PAnaces nonnullis Heracleum dicitur: ex quo popanax colligi solet. Plurimum in Bœotia, & in a Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compendit, & quaestus, qui ex eo liquore facitatur, gratia, studiose colitur. Foliis est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartitò diuisis: caule, vt ferula, altissimo, qui lanugine quadam b incanescit, foliis etiam minutioribus obitus: muscariis, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato, feruenteq;. Radices habet multas ab origine vna, candidas, graeolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libya & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, foliis excuato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mesibus incito, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq;, siccæ, quæ carie non sentiant, aromatica, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolombus, ab vsu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, e quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, lauis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquesens, 60 graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lacte cat. Ex calfacit, mollit, extenuat: horribus febriū, circuitibusq;, vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicido vrinae conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsa, aut vino bibitur: mentes trahit, fortum enecat. Inflationes, quæ vuluam malè habent, duritiasq;, ex melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur acopis

acopis, & capitis medicaminibus admiscetur: carbunculos rumpit. Podagricis, cum vna passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, cauis inditus: oculorum aciem illitu excitat. Ex eo, & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conscissa, vuluæ admota, partus extrahit: ad vetera vlcera efficax est: nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum abinthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia prodest aduersus animalia, quæ venenum eiaculantur: & contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Πανάκι ασκλήπιον.

PANACES ASCLEPIVM. CAP. XLIX.

10 PANACES † Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum: circa quem folia funduntur fœniculo similia, maiora tamen & hirsutiora, † odorata: in cacumine umbella, vbi flores emittant aurei, acris gustus & odorati: radix a parua est & tenuis. Auxiliarem vim habent b flores & semina, contra vlcera, phagedænas & tubercula, si trita cum melle imponantur: aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alij cunilam de qua in origani mentione diximus.

† Ori. Α' σ' κλήπιον καὶ χειρώνιον. i. Asclepium & Chironium. † Or. δ' υ' σ' ω' δ' η. i. male olentia.

a Meum πικρὰ. id est, amara.

b Meum ἔρθετον τὸ ἀνώθεν. i. auxiliarem desuper.

Πανάκι χειρώνιον.

PANACES CHIRONIVM. CAP. L.

20 PANACES a Chironium in Pelio monte maxime prouenit, folium eius amaraco simile: flos aureus radix b parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

a Ca. λεπτόν ἐστὶ χειρώνιον i. exilis, quod & Chironiū. b Me. & Ca. λεπτόν. i. tenuis.

PANACES Heracleum in Apulia frequens nascitur, quemadmodum in Apennini iugis, & in Argentario promontorio in nostris maritimis Scensibus. Habetur & in quam plurimis Italia viridarijs, vbi summa diligentia colitur ab his, qui simplicium medicamentorum studiosi, ad suum alicuiusq, commodum innumera plantarum genera suis in hortis ac viridarijs serunt ac colunt. Verum non ob id affirmauerim, eius lachrymam, quam officina Opopanacum vocant, excipi in Italia. Nam quæ Venetis venalis reperitur, ex Alexandria Aegypti conuehitur. Legitima non desit, etsi adulterata frequentior sit vsus apud eos, qui ex quauis herba manipulos colligunt. In Panacis historia apertissime aberravit Mesues: quippe qui initio capitis omni: eius genera confundat. Quod omnibus iam notius est, quæ ut a nobis ostendi debeat. PANACES ASCLEPIVM


Panacis consideratio.

Mesuelapsus:

II. PANACES ASCLEPIVM.

Thopsea asclepium

* III. PANACES ASCLEPIVM alterum: *



nuper vidimus, eiusq, effigie hic appinximus. Sed CHIRONIVM non prouenit, quod sciam, in Italia. Quanquã nõ desunt, qui pro Chironio panace ostendant plantã, quæ foliũ habet oblongum, hyssopi sere modo, cõcomitantib. minoribus foliolis cumulatim prodeuntib. florem pentaphylli, sed matrem, aureo tamen colore: surculos mittit ab radice numerosos, tennues lignososq, radicẽ item lignosam, rufescentẽ, gustu adstringentẽ nimis acrem. Hac quibusdam recentioribus herbarijs Flos solis appellatur. Verum q, Dioscorides panaci Chironio tribuerit folia amaraco similia, Asclepij vires habet & exaltat. & radicẽ gustu a. r. e. n. non video quomodo ingenuẽ passim corũ sententia subscribere. FLOS itaq, SOLIS mibi


Floris Solis mentio.

Z z +

qui-

IV. FLOS SOLIS, SEV PANACES chironium.

* V. PANACES CHIRONIUM minus. *



Opopanax.

Panacis vires
ex Gal.Panacis vires
ex Mesue.

Nomina.

quidem omnino è symphytorum genere esse videtur, quum facile vulnera glutinet & sanguinem manantem sistat. Verum non hac solum præstat, sed oris & pudendorum ulcera sanat, vbi in vino decoquatur, & eo subinde ulcera abluantur. Datur quoq; potandus ad cruenta sputa, & ad dysenteriam vnà cum radicibus contritus, quinetiam ad mensium abundantiam. In summa vbi agglutinare, cohibere & roborare opus sit, ea omnia perinde præstat, ac cetera symphytorum genera. Panacis genera ab inuentoribus cognominari tradunt, nempe Asclepium ab Aesculapio, Chironium à Chirone, & Heracleum ab Hercule: quare & Herculeum à plerisque est appellatum, cuius tantum lachryma hoc tempore officina vruntur. Semen enim ac radix, etsi in pluribus valeant affectibus, ad nos tamen, quod viderim, non adferuntur. In quorum defectu primi chirurgi, cum denudata ossa carne explere volunt, radicem segmenta, qua lachryma compacta reperiuntur, quæ illa sint, non paruo labore seligunt, & ad hunc vsus in puluerem redigunt. Panacis vires descripsit Gal. lib. 8. simp. medic. his verbis: Panaces Heraclium, inquit, ex hoc fit vocatus Opopanax, radicibus eius, & caulibus excisis. Porro opopanax ipso longè est ad plurimos vsus aptissimus, utpote excalfaciens, emolliens & digerens: ponatq; ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in desiccando verò secundi. Cortex radicis exiccatorium simul, & excalfactorium est medicamentum: sed minus quàm succus: quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoq; vtimur & ad ossa denudata, & ad ulcera maligna & contumacia. Sufficenter enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul, & desiccando, nec ita magnopere excalfaciendo: quæ omnia ad carnem generandam necessaria sunt, velut in libris de curandi ratione ostendimus. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouendis medicamen accommodum. Caterum nescio, quo pacto nunc ferè omnes ex more non panaces, sed panacea herbam hanc vocitent. Panaces autem Asclepium minus est calidum supradicto panace: quamobrem eo, & floribus eius, & semine melli mistis ad ulcera, phymata, & phagedenas vtuntur. Panaces verò Chironium & ipsum similem prædicto facultatem possidet: hæc Galenus. Porro deijcit Panacis lachryma (vt author est Mesues) à remotis corporis partibus, præsertimq; ab articularum compaginibus, lentam, crassam, contumacemq; pituitam. Cerebrum & neruos expurgat, præcipuè cum frigidis torquentur morbis. Πανάξες ἡράκλειου sic Græcis, vt etiam Latinis Panaces Heraclium nominatur: Arabibus Steusir, leusir siue Giausir: Italis Panace Heracleo. Huius gummi Græcis ὀποπανάξ dicitur: Latinis item Opopanax: Officinis Opopanacum: Italis Opopanaco: Hispanis Opopanague. Πανάξες verò ἀσκληπιοῦ sic Græcè vocatur, vt Latine similiter Panaces Asclepium: Arabicè Panax Aschilibet: Italicè Panace Asclepio. Πανάξες denique χείρωνος ita Græcis, Latinis pariter Panaces Chironium appellatur. Mauritaniis Panax carmon: Italis Panace Chironio.

Panax, quasi πάντων ἀκος, omnibus remedium adferens, quasi omnia sanans: cuius genera quatuor Theophrasto 9. hist. 10. Syrium, Chironium, folio simile Rumici: Aesculapium folio Thapsia. Herculanum folio magno & amplo, vt quoquo versus tres palmos perficiat. I. Panax Sphondilij folio quod Heraclium, C. B. Panaces Heraclium, Matt. Lac. Ges. hor. Clus. in Corollario ad Dod. edit. Gallicè. Dod. fol. cui & Sphondylium alterum. Panax Heraclium, Lob. Lug. Cam. Panax Herculeum, Cord. in Dios. Ges. hor. ap. Cas. Tab. qui primū facit. Huius plantæ defata lachryma seu liquor, Opopanax siue Opopanacum dicitur, qui guttis pilis maioribus equalibusve conglomeratur in massas foris croceos, vel in puniceo colore ruffas, intus candidas aut flauescètes. Substantia est pingui, sapore amaro, tenui ligustico vehemèntiori: odore graui: Eligendū q; foris crocèū, intus candidū, pingue, odoratissimū, maioribus grumis cōstans, purum. Purgantur aut à surculis hoc pacto, mediocriter contritum linteo includitur, in fictili suspenditur, superinfunditur quantum satis fuerit.

fuerit vini, aceti, aut aquæ: dein paulatim supra fornacem calefiat: in linteo liquatum exprimito sicque furculi in linteolo remanebunt: Alia ratione etiam purgatur, cum nodus ita suspenditur, ut humorẽ non tangat, sed ut feruentis tantum humoris vapor per linteum penetrans liquorem emolliat, donec exprimi queat, quod calente adhuc eo fieri necesse est. Affertur ex Africa, Aegypto & minori Asia, in monte Cordo. II. Panaces Asclepium Matth. & Lugdunensi, hanc enim à sequenti differentem facimus, cum utramque in horto Patauino collegerimus, & inter nostras referuemus. III. Libanotis ferulæ folio semine plano, C.B. Pânax Asclepium, Aduer. Lob. Cæsal. Panaces Asclepium, Cam. in suo Matth. Cast. Tab. Panaces Asclepium ut existimatur, Dod. fol. Libanotis altera semine lato, Camerario. IV. Panaces Chironium, Matth. Cast. Lugd. Hyssopus campestris, Trag. Hyssopus montanus siue syluestris, Lon. Helianthemum, Cord. in hist. Lob. Thal. Helianthemum vulgo dictum, Cluf. hist. Hisp. Helianthemum Plinii, Cluf. hist. Pan. Helianthemum Germanicum, Tab. Flos solis, Dod. fol. Lob. Cam. Cast. Gratia Dei, Ges. hor. Chironia, Cæsal. Alii ad Panacem, alii ad Symphytum, alii ad Cistum, & rectius referunt. Hoc variat cultura, magnitudine, foliis item latioribus, angustioribus, floribus maioribus, minoribus, albis, pallidis, aureis. V. Panax Chironium minus Camer. in suo Matth. Cistus humilis secundus, Cluf. hist. Hisp. Lob. Helianthemum peregrinum angustifolium, Tabernæmontano, magnitudine solâ & foliorum angustia à priori distat.

Λιγυστιζόν.

LIGVSTICVM.

CAP. LI.

⁴⁰ Ligusticum, [quod alii panaceam, alii panaces vocant,] plurimum in Liguria nascitur, [in monte Apennino Alpibus contermino: unde nomen traxit.] Panaces incolæ non ab re appellant, quoniam & radice, & caule Heracleotico panaci simile sit, & viribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis, asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè à iuxta fluenta. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia Sertulæ campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, solidum, & oblongum, fœniculo proximum gustanti acre, & aroma olens: radix candida, Heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisq; vis excafactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones: itẽ ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgat: & contra serpentium ictus: vrinas, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus ^b admiscetur: b ori per quam vitæ, quare pro pipere vtuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili: quod facile gustu discernitur amarũ enim est. Alii semen fœniculi, aut seseleis admiscen- ^c tes, ligusticum dolo vitiant.

Conclusa nõ legit Orib.


a Meum παρὰ τοῖς διώρυξι. i. circa scrobes.

b Car. εὐσώμαχον. i. gratum stomacho.

c Orib. πικρότατον. i. amarissimũ.

I. LIGVSTICVM.

II. LIGVSTICVM ALTERVM.



⁵⁰ Falluntur aperte, vt mea quidem fert opinio, qui herbarũ vulgò hodie Leuisticum nominatam, quam legitimum Hippocreselinum censemus, putant esse Ligusticum hic à Dioscoride representatum, quod Galenus vnus litera mutatione Libysticum appellauit. Siquide hoc caute assurgit tenui, & folijs Sertulæ campanæ similibus. Illud verò caute profert altũ, crassum, concauũ, & geniculatum: folia apii palustris emula, maiora tamen, ac et crassiora. Cæterum quamuis legitimum ⁶⁰

Ligustici confideratio.

ac verum Ligusticum in Liguria, cuius Genua Metropolis est, vnde etiam nomen inuenit, frequentissimum prouinciat, si-
 q; inibi adeo vulgaris notitia, vt eius semine passim vtantur incola in ciborum condimentis, non ob id tamen per cetera
 Italia loca hactenus, quod sciam, deferri cepit. Plantas autem has duas, quarum hic imagines appingi curauimus, mis-
 runt ad me amici qui rem herbariam iam profitentur. Verum prior Ligusticum magis quam postrema referre videtur: sed
 velim, vt sit quoque aliorum iudicium, quamobrem ambas excudi curauim. Ligusticum alterum, caule exit serulaceo, a-
 lis frequentibus, e quibus rami disparibus exeunt interuallis: folijs quinq; ex vno petiolo prodeuntibus, per ambitum serratis: muscarijs fœniculi similibus: semine quoque simili, sed longiore crassioreq;. Radice nititur vegetiore, exterius subnigra,
 acuto simul & subamaro gustu, odoris non iniucundi. Gignitur in altis montibus, apricis tractibus. Galenus de Libyftico
 differens libro 7. simplicium medicamentorum, sic breuiter inquit. Libyftici radix, & semen ex genere excalfacientium
 sunt, adeo vt menses cieant, & vrinas prouocent, flatuq; discutiant. Quod Græci λιγυστικόν Latini similiter Ligusticum,
 & Libyfticum dicunt: Itali Ligustico.

Libyftici vi-
 res ex Gal.

Nomina,

Ligusticum primo loco positum, Siler montanum vocamus cum Trago. Lob. Dod. fol. Ligusti-
 cum verum, Dod. gal. Gef. hor. Taber. Ligusticum, Matth. Lac. Cast. Lugd. Sefeli Mafsiliense, Cord. in
 Diosc. Sefeli Italicum, Cast. Ser montanum, Cæsalp. Hoc quibusdam videtur apud Dioscoridem Ligu-
 sticum, aliis Sefeli Mafsiliense, aliis eiusdem Peloponense: quod semine variat. II. Ligusticum alterum
 Matth. & Castori. Libanotis Theophrasti maior, Lugd. Angelicæ alicuius syluestris figuram proponi
 censemus: alii Libanotidem Theophrasti maiorem statuunt.

σταφυλίνος.


PASTINACA.

CAP. LII

Pastinaca syluestris folia gingidii habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: umbellam simi-
 lem anethi: in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, fermè croceum, radix di-
 giti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum, vel impositum, menstrua mo-
 uet. Iis conuenit in potione, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cu-
 tem subiit: serpentium moribus, ictibusq; prodest, præsumentes id, nulla affici iniuriâ a serpentibus
 traduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit, venerem stimulat, partus apposita eiicit. Folia trita
 & cum melle imposita, phagedænas vlcera purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen &
 cibo aptior.

I. PASTINACA DOME-
 stica.

II. PASTINACA SYL-
 uestris.



Pastinacæ
 consideratio.

Ruell. Erratū.

Vulgates admodum sunt in Italia tam satiuæ, quàm syluestris Pastinacæ radices, vt qua passim quadragesimali iu-
 niu tempore non ingrati in ciborum vsum recipiantur. Caterum quoniam fortassis in Gallia non seruntur in bor-
 tis, Ruellius manifesto errore putauit Carotas nobis vulgò vocatas, quas coctas, salè, oleo, & aceto additis, hyeme vsurpa-
 mus in acetarijs, satiuas esse pastinacas. Vt hinc maxime admirari subeat Ruellium, virum alioqui doctissimum. siquidem
 hanc

hactenus neminem inueni e rei herbaria scriptoribus tam Græca quam Arabice familie, qui memoria prodiderit, Pastinacam satiuam radice niti adeo rufa, ut sanguineo succo madeat, qualis Carota dicta inesse deprehenditur. Satiua in Italia frequentissima scribitur ab olitoribus in hortis. Caule exit crasso, striato, folijs Elaphobosci maioribus, pluribus utringue ex uno pediculo prodeuntibus terebinthi modo, subasperis, & per ambitum denticulatis, umbellas magnas in summitate gerit, floribus melius, semine feniculi maiore, acuto & amariuscule gustu odoratuq;. Radicem habet crassam, teneram, albam odoratamq;, non sine adnatis. Erratica vero nonnunquam in campis ac incultis, & collibus amœnis, sua sponte nascitur. Vtraq; albicantibus constat radicibus, quæ in locis quam plurimis cocta manduntur: namq; ea in quadragesimo presertim ætate cum farina, & oleo friguntur, & ita saepe, ubi deijunt pisces, eorum vicem supplent: licet pro teinantium instituto, essent potius eorum cibis abdicanda: Venerem enim non obscure stimulant. Falluntur præterea, qui Dauci loco, agrestis Pastinacæ semen accipiunt, illius scilicet, in cuius florentis umbella medio exiguum quid purpurei emicat, cuius semen pilosum, acre & odoratum. Aliud enim est à Pastinaca erratica Daucus, ut paulò inferius suo loco dicitur, ubi eius tres species à Dioscoride redduntur. Nam quamuis tam ex illius, quam Galeni sententia libris tum de simplicium medicamentorum, tum de alimentorum facultatibus, Daucus à sylvestri Pastinaca parum, vel potius nihil viribus differat, ob idq; alterum alterius vice in medicina vti capi possit, non tamen rectè dici potest, Daucum erraticam esse Pastinacam. Atqui cum pastinaca Carotam, ita vulgò appellatam, in mentem mihi redegerit, prætermittere sanè non potui, quin de eius historia, & facultatibus verba facerem. Quam ob rem dicimus CAROTÆ duas passim haberi species. Alteram quidem cui radices insunt sanguinis modo purpureæ ac cruenta, crassitudine hortensis pastinacæ, alteram verò quæ suas profert subflauo colore, alba, napi ferè similis, sapore subdulci, odore non insuavi. Vtraq; autem folia, caules, umbellas, flores & semen profert sylvestris pastinacæ per omnia similia. Seruntur ab olitoribus passim in hortis in ciborum vsum. Purpureæ radices prius elixæ, in ciborum vsum venerunt in acetarijs tantum. At quidem subflaua ex iure pinguium carniū rapi modo elixæ. Matricem intus non habent, sed in vniuersum carnosæ sunt, perinde ac rapum & napus. Vtriusq; radices in cibis placent, quod cum subdulci sapore nonnihil amariuscule habeant ita suauiter contemperatum, ut non paruum cum palato ineant gratiam. Caterum (quantum me fert opinio) carota in pastinacæ genere recenseri possunt, quamuis cum nulla sint acredine prædita, nõ ita valenter aperiant, nec adeo sunt odorata. Ob id eas in principio secundi ordinis excalfacere crediderim: at in siccitate & humiditate à symmetria minimè recedere. Minus nutriunt, quam rapum, nec ita facile concoquantur, cum sint substantia duriore. Quo fit, ut mirum non sit, si gignant & ipsæ stant in vtriculo, & in intestinis, & mali sint succi, quanquam non ut probati succi cibis, sed potius ut medicamentũ vrinam ducant. Porro volunt nonnulli recentiores materia medica professores, ut aliquid fortasse non ui in mediũ attulisse videantur, purpuream Carotam legitimum Mauritanorum esse Behen rubrum, & albam seu subflauam, album. Verum dum Serapionis, Auicennæq; verba de Behen differentium diligenter mihi examinanda propono, nõ possum villo pacto in eorũ concedere sententiam. Namq; scribit Serapio, Behen radices proferre minoris pastinacæ similes,

Past. erratica.

Quorundam error.

Carotæ hist.

VIII. CAROTA.



concoctas, odoratas, & mansu lentas, & in Armenia nasci. Et Auicenna lib. 2 radicum lignosa frustra Behen esse ait, in se contracta, & siccitate exoleta, quibus vis insit excalfaciendi & siccandi ordine secundo: Et libro de viribus cordis: Behen (inquit) radices sunt habentes rugas, & lineationes cum lubricitate, tenuitate & apertione. Caterum ego quidem in primis non video Carotas nostrates radices esse tenues, perinde ac sylvestris, vel minoris pastinacæ: nec mansu lentas, nec contractas, nec insigniter odoratas. Quin etiam nec ex Armenia ad nos comportari, sed passim nostris in hortis seri ac venales haberi. Deinde eorum sententia apertissimè refragatur Auicenna, quippe quod carotæ radix nec rugosa, nec striata, nec contracta, nec lignosa, nec adstringens habeatur. Quanquã enim radix hac longo siccatur tempore, non insignem duritiẽ contrahit: præterea cum parum alimenti præbeant carotæ radices, non video quomodo homines ipsis vescentes, pingues reddere possint, & in ijs, per consequens semen gignere copiosum, ut de Behen scribunt Mauritanii. Hac itaq; cum eorũ opinioni repugnent, non permittam eorum Carotas meo plantari in viridario, præsertimq; cum Behen albi radicem ad manus habeam, Constantinopoli à Guilielmo Quacelbeno eruditissimo Medico mihi missam, quæ notis omnibus cum Arabum descriptionibus conuenit. Pastinacæ meminit Galen. lib. 8. simp. med. sic inquit: Pastinacæ satiuæ imbecillior: Agrestis ad omnia potentior est. Vrinæ mouet, & menses prouocat cum herba quidem tuta, tum maxime semen ac radix. Habet porro etiam absteriorum in se quippiam, quamobrem vlcera phagedenica quidam folijs eius viridibus cum melle, quò pura reddant, illinunt. Planta quæ Græcè & ἀπυλῖνος, Latine pariter & Italicè Pastinacæ domestica vocatur: Arabicè lezar, Gezar seu Giezar: Germanicè Pasteney vnd Pastinachen: Hispanicè Canaoria blanqua: Gallicè Pastenades: Bohemicè Pastinark & ita quoq; Polonicè. Pastinacæ sylvestris Græcis & ἀπυλῖνος: ἄγριος: Ital. Pastinacæ saluatica. Carota Ital. Carota & Carotola.

Carota purpurea, Behen rubrum quibusdam.

Serapio de Behen.

Pastinacæ vres ex Gal.

Nomina.

Pastinacæ à pascendo dicta, duplex est, latifolia & tenuifolia, vtraq; & satiuæ & sylvestris. I: Pastinacæ satiuæ latifolia, C.B. Dodo. fol. Pastinacæ satiuæ, Trag. Lacu. quoad iconem. Cam. Pastinacæ satiuæ vulgi, Lugd. Pastinacæ domestica, Matth. Cast. Pastinacæ domestica vulgi, Lobel. Pastinacæ vulgi, Dodo. gal. Gef. hor. Carl. Sifarum satiuum magnum, Fuchf. Sifer Dioscoridis, Columnæ. Elaphoboscum satiuum, Tab. Hanc alij ad Diosc. Sifer, alij ad Pastinacæ, alij ad Elaphoboscum eiusdem, & Daucum Theophrasti refe-

referunt. II. Pastinaca tenuifolia sylvestris, C.B. & Dod. fol. Pastinaca sylvestris, Matth. Lac. Lon. Cast. Pastinaca erratica, Fuchf. Cord. in Diosc. Tab. Germanica sylvestris Pastinaca Dioscoridis, Lob. in icon. Pastinaca quarta Plinij, Cam. Staphylinus sylvestris, Trag. Dod. gal. Cæsal. Dauci tertium genus, Dodo. gal. Daucus officinarum. III. Pastinaca tenuifolia sativa, radice atrorubente, C. B. Staphylinus tertius, Trag. Staphylinus niger, Dodo. gal. Pastinaca sativa altera, Fuchf. Pastinaca sativa atrorubens, Lob. cui &

I. SESELI MASSILIENSE.



† Statim non legit Cat.

a Meū & Cat. *δάμος δὲ μέγας*. i. frutex verò magnus est. b Meum *σπιθαμῶν*. i. spithamæ longitudine. c Me. *φύλαξ* *ἐν τῇ ἰδῆ*. i. nascitur in Ida.

* II. SESELI MASSILIENSE nonnullorum. *



Daucus niger Theophrasti, Pastinaca sativa rubens, Dod. fol. Tab. Pastinaca radicib. purpureis, Gel. hor. Carota, Matth. Cæsal. Cast. Cam. Carota Matthioli altera, Lugd. Ben rubrum, Anguillara.

Σίσελι. SESELI. CAP. LIIL.

Seseli Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti † statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent. Potu stranguriæ & orthopnœæ medentur: suffocationibus mulierum, comitialibusque profunt: menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent: tussim veterem sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile: contra perfrictiones in itineribus, cum pipere & vino bibitur. Capris, cæterisque pecudibus datur in potu, quò facilius suos fœtus enitantur. Æthiopicum seseli, folia habet hederæ, minora & ad periclymeni modum oblonga: frutex a nigricat, palmitibus in bina cubita extensis: ramis b sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore & acriore, multum suavi. Peloponense folia habet cicutæ latiora & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum: & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum & carnosius pendet. Eisdem viribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus: invenitur etiamnum in insulis.



III. SESELI AETHIOPICVM.



Lac. Lon. Cast. *αἰθιοπικὸν σίσελι* *σπῆρμα*.

SESELI AETHIOPICVM alterum.

V. SESELI PELOPON- nense.



Τορδύλιον.

CRETICVM SESELI.

CAP. LIIII.

TOrdylum, quod aliqui Creticum Sefeli vocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula furculosa: femine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, iubacri. Contra vrinae difficultatem

* VI. SESELI CRETICVM maius. *

* VII. SESELI CRETICVM minus. *



A a a

bibitur

vicia bibitur: vrinæ difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Eo in condimentis, cum cucurbita, & aceto indigenæ vtuntur. In cacumine granula multa gerit.

Sifon, vt hic Dioscorides testatum reliquit, semen est in Syria proueniens, nobisq; incognitum: quandoquidem plantam qua illud profert, apud vllum authorem suis notis descriptam non inuenio: nec semen ipsum, quod equidem sciam, ad nos è Syria defertur. Quapropter illius patria gentibus relinquendam duximus, vbi eius notitia, & seminis vsus. Nam præterquam quòd difficile sit, etiam periculosum iudico, de rebus peregrinis, quarum delineationes latent, aliquam proferre sententiam. Id οἰσων Græcè dicitur, quod Latine quoq; Sifon. Sifon semen incognitum.

ANISVM.

Sifon à Dioscoride propositum hac figura exhiberi credimus, cum notæ propositæ correspondeat, cuius seminis in Officinis nostris pro Amomo vsus est: quare dicitur Amomum Germanicum, Trago, Petroselinum Macedonicum, Fuch. Lon. Dod. gal. & fol. Ammi paruum, Gef. hor. Sifon. Lug. Cam. Tab.

ANISVM. CAP. LVI.

Anisum in summa excalfacit, exiccat. a oris halitum iucundiolem facit, doloris leuamentum præstat. Vrinam ciet, discutiendi vim habet, hydropicis potum sitim extinguit. Animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes: aluum, & alba fœminarum profluuia sistit: lac ad mamas elicit: venerè stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non fursuofum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Ægyptium.

a Meum
ἐύπνως. i. facilem spirationem seddens.

Anisum vulgaris omnibus ferè notitia planta est, seritur enim in campis, hortis & viridarijs, folijs ferè Apij, minus tamen diuisis, præter ea quæ in caulium summitatibus habentur. Caulem edit rotundum, cubitalem, multis brachiatis ramis: umbellam candidam, mellis odore: semen oblongum, iucundi odoris, sapore sanè misto ex dulci acrisq; ac etiam amariuscule, ad multa vtile. Siquidem, aperit, concoquit, digerit, incidit, prouocat, & flatum pellit. Oris anhelitum commendat. Inspergitur panibus odoris saporisq; gratia. Datur tostum cum mentha ad catiacos affectus. Singultum sedat tam haustum, quam olfactum. Somnum conciliat, & calculos pellit. Caterum vt nostrum sequamur institutum, non sunt à nobis silentio prætereunda, quæ de eius viribus scriptis tradidit Gal. lib. 6. simp. medic. vbi sic inquit: Anisi semen maxime vtile est, acre, subamarum, vt propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo. Proinde & vrinam ciet & digerit, atq; etiam ventris inflationes sedat. Planta, quæ Græcis οἰσων Latine item Anisum appellatur: Mauritanis Anisum seu Anexissum. Italis Aniso: Germanis Anis vnd Enis: Hispanis Matabalua & Yerua dulce: Gallis Anis.

Anisi confideratio, & vires ex Gal.

Nomina

Anisum quod aliis Anicetum, id est omnibus aliis medicamentis præcellens, ab herbarijs communi consensu Anisum dicitur, solo Eustachio Ræselin Abfinthium dulce nominatur.

CARVM. CAP. LVII.

Carum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit: vrinam concitat, stomacho vtilis, os commendat, concoctionem adiuuat. Vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo, manditur.

Carum officinis vulgò Carui dicitur, semen omnibus nominissimum. Planta nascitur in pratis & collibus, præsertim in

Cari coald.



CARVM.



in montibus & conuallibus, Pastinaca syluestris non absimilis, caulibus ab vna radice pluribus, quadrangulis, ciliatis: umbella floribus candidis referta, semine aniso longiore, anguloso, subnigricante. Radice longa, sapore amarum, ciliatum & acrum. Semen praeipuum habet in medicina vsum. Id enim aperit, incidit, digerit, concoquit, prouocat & dissoluit. Auxiliatur frigidis vteri affectibus, confert ad omnes frigidos capitis morbos, vsum acuit. Herba pro oleris comeditur. Et si radix cocta perinde ac Pastinaca. Seminis farina admiscetur cataplasmatibus, quae ad sugillata parantur, magno inuamento. Integrum semen pastinacae Germani panis suo subigunt, ciborumque condimentis induunt, quemadmodum nos anisum & feniculum. Sed maxime, meo quidem iudicio, redarguendi sunt Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui non sine magno, & aperto errore crediderint, Carum semen esse rubentis illius radices, quae vulgo Carota vocatur. Quandoquidem Carotum semini nulla Cari qualitas inest: id enim adeo acre non est, vt tertio calfacientium ac exiccantium ordinis adscribi possit. Quod tamen de Caro testatur Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic scribens: Cari semen calfacit, & exiccatur tertio quodammodo ordine, moderate acrem qualitatem possidens. Itaque & flatum extinguit, & vrinam ciere, non semen tantum, sed & planta. Cuius nomen Graecum est κάρυον: Latini Carum: Arabicum Caruia, Karuia seu Karur: Italicum Caro & Caruo: Germanicum Mauffumich vnd Kumm: Hispanicum Alcaraua: Gallicum Carui.

Monachorum error Carui semen Carotaru statuere. Cari vires ex Galeno. Nomina.

Cuminum pratense seu Carum, a Caria regione in qua laudatissimum nascitur, κάρυον Aetio: κάρυον Simeoni Sethi libello de Alimentis. Caros, Brunf. Trag. Dod. gal. Carus, Ges. hor. Carum, Lacu. Cord. in Diosc. & hist. Dod. fol. Lob. Cast. Lug. Tab. Cam. Carum Fuch. qui secutus est Plinium. Carui, Lon. Caes. Thal. Huius inter Staphilinos Atheneus meminisse videtur: hoc cultura vegetius & foliis & semine redditur.

A. vrbat.

ANETHVM.


CAP. LVIII.

Aridi Anethi comae, seminisque decoctum, potu lac euocat: inflationes & tormina sedat: aluum, vomitionesque sistit: vrinam ciere, singultus lenit: oculorum aciem hebetat, genituram restinguit, assidue potum. Decoctum eius foeminis vuluae malo opportunis, ad defessiones vtile. Condylomata illius seminis cremati cinis tollit.

Anethi consideratio.

Anethi vires ex Galeno.

Nomina.



Anethum hortis omnibus frequentissimum, omni adeo ex parte foeniculum amulatur, vt saepius colligentes fallat, nisi gustum consulant: consurgit enim caulibus sesquicubitalibus ramosis, folijs capillorum specie referentibus, floribus luteis, semine, & umbellae foeniculi, radice neque, adeo longa, neque, multo subnixa fibris: seritur in hortis in condimentorum & in medicum quoque vsum. Caterum Anethum, vt auctor est Galenus lib. 6. de simplicium medicamentorum facultatibus, adeo ex-calfacit, vt habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantium vero ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos, & incoctos humores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies promouentibus, & concoquentibus vocatis medicamentis: nisi quatenus paulo illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, ac proinde digerendi facultate praeclitum. Vsum autem tertij ordinis tum ex-calfacientium, tum desiccantium fit: & propterea vlcere nimis humidis, mollibusque praestet, potissimumque, quae in pudendis consistunt. At quae in preputio sunt inueterata, ea probe cicatrice includit. Caterum viride humidius est, & minus calidum: itaque magis quam siccum concoquit, & somnum conciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres in conuiujs vti esse coronis ex eo concinnatis. Planta, quae Graeci κάρυον, Latinis item Anethum appellatur: Mauritani Xebet, Iebet siue Sebet: Italis Anetho: Germanis Dyllen vnd Hechtraut: Hispanis Eneldo: Gallis Anet.

Anethum καλεῖται τὸ ἀνεύ θείον, quod cito crescat, dicitur, quo nomine omnes herbarum donarunt, cuius syluestre quoddam genus, quod grandius satiuo, folijs foeniculi, odore Anethi, umbellis amplioribus, flore luteo, semine exiguo, ferme vt Ammios subacri, radice parua & lignosa, in Sicilia proueniens, nobis adhuc ignotum, Casalpinus refert.

Κύμινον ἡμερῶν

CVMINVM SATIvvm.

CAP. LIX.

† Ori. ἰνδὸμαχον. i. stomacho vtile. a Meū σιωάμηλ ὕστε. i. cum cruda hordeacea farina.

Cuminum satiuum † ori gratum est, sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium, reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia & Terentia, & plerisque aliis tractibus. Ex-calfacit, adstringit, exiccatur: ad tormina, inflationesque conuenit, coctum, & cum oleo inditum, aut a cum hordeacea farina illitum: orthopnoicis datur in polca: demortoue: mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profusio sistit. Colorem bibentium, aut perunctorum mutat in pallorem.

Κύμινον

Κύμινον ἄγριον.

CVMINVM SYLVESTRE.

CAP. LX.

Sylvestre Cuminum, plurimum, efficaciusq; in Lycia & Galatia Asia, atq; Carthagine Hispania gignitur: frutice paruo, dodrantali caule ac tenui: quaternis aut quinis foliis, tenuibus, veluti serratis, & gignidii diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerofum gustu satiuo aciore: nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina, inflationesq;: item contra venenatas bestias ex vino. Singultus ex aceto sedat: stomacho vtile, quem humor vexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & vva passa illinatur: testium inflammationibus, adiectis eisdem, illitum medetur. Est & aliud sylvestris Cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus praesidio est. Calculosis & iis, qui vrinae stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxilia: sed apii semen feruefactum postea bibendum est.

I. CONSOLIDA REGALIS.


III. CVMINVM SATIIVM.



Satiuum Cuminum omnibus notum est. Quamobrem longiori sermone eius historiam prosequi non opera pretium duximus. SYLVESTRE vero quod tam primo, quam secundo generi à Dioscoride assignatur, etsi antehac me illud nusquam vidisse scripserim, factum est tamen, opera & liberalitate Iacobi Antonij Cortusi, rei herbariae indagatoris acerrimi, ut in nostro hoc hortulo id nunc primum vireat & floreat, in studiosorum omnium usum, quorum iuuandorum gratia hos labores insumpsimus. Nihil enim in hac planta desiderari potest, quod Dioscoridis descriptioni non respondeat. Quo fit, ut etiam fateri possim, me vtrunq; cognoscere, cum vtriusq; planta legitimum notis omnibus referat. * Quod vero secundo adscribitur generi, si in Italia gignitur, id equidem cum Ruellio & Gesnero, viris doctissimis, eam plantam esse putauerim, quam Germani vulgò Ritter sporen, hoc est, Equitis calcar, & Consolidam regalem vocant. * Itaq; affirmabo posthac nunquam Consolidam Regalem vulgò vocatam, Cuminum esse sylvestre alterum, ut mihi antea persuadebam. Caterum cum de hac planta hic mentio facta sit, mihi quidem haud pratermittendum putavi, quin hoc in loco eius historiam, & vires describerem. Oritur ergo illa in agris inter segetes. Caulem profert simplicem, ramulis multis, tenuibus, longis, diuisis, sylvestris nigella modo. Flores edit purpureos, nigra viola amulos, ex quorum altera parte prodeunt cornicula sursum spectantia, quae veterum calcaris formam exprimere videntur: vnde & illi nomen à Germanis inditum. Semen fert melanthio simile, in paruis corniculis siliquisve conclusum. Vt ex hac descriptione existimem, vix aliam reperiri posse plantam, quae magis, quam hac, postremum Cumini genus referat. Caterum Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem scripsere, flauo coloris Melanthium, quod officina Nigellam citrinam vocant, primum sylvestris Cumini genus esse contendunt. Sed mea quidem sententia, in magno & aperto errore versantur. Nam, ut vnusquisq; sana mentis per se cognoscere potest, Nigella citrina sic seplasiarijs vocata, nil aliud vnquam fuerit, quam flauo coloris Melanthium: cum omnibus palam sit, non in alio Nigellam hanc, & Melanthium inter se specie differre, quam in seminis colore: cetera namq; in forma, magnitudine, sapore, ac omni deniq; facultate illis maxime consentiunt. Sed quid multa? nonne hoc idem in papauerum semine quotidie comperimus? in quibus tamen varius seminis color non prohibet, quin omnia sint papauera. Id quod etiam perspicuum est in hyoscyamo, lactuca, & alijs pluribus plantis: quarum semina etsi alba & nigra inueniantur, non tamen aliud ab illis plantae genus constituunt. Hinc fit, ut in huiusce sylvestris Cumini historia patres illi, & qui eos sequuntur, plane hallucinari deprehendantur. Quippe primi generis sylvestris Cumini semen in capitulis mollibus, ac rotundis acerofum


IV. CVMINVM SYLVE-

strec. I.



V. CVMINVM SYLVE-

strec. II.



- Cum. sac. hist.** *Clug.* contumax, quod in pimpinella vulgò vocata non visitur. SATIIVM folijs fere feniculum, sed rarioribus representat: vnico, aut altero exit caule, pluribus adnatis ramusculis: floret in umbella, veluti feniculum, in qua copiosum profert semen subflauum: cum grauedine quadã odoratum, fœniculi maior: radix ei albicans est, summo cespite repens. Tra-
- Cumini vires** *Clu* gaudet calido & putrescibili: quã nobrem frequentissimum in maritimis nascitur. Cumino sequenter vritur in a-
bis, & eo sape suffiuntur, qui facies suas exterminant, vt sanctitatem, & corporis macerationem admentiantur. Praestat
tamen ad sœminarum conceptum, si vuluis indatur. Auxiliatur oculorum epiphoris, per se recens admotum, & eorundem
tumoribus cum melle. Datur quoq; ictericis vtiliter illico à balneo, & ex dulci vino vrina ardoribus laborantibus, calculos
ejicit, vulnera recentia glutinat, & vlcera sanat. Cymini vires scriptas reliquit Galenus lib. 7. simplicium medicamento-
rum sic inquit: Cymini semine potissimum vtimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari & petroselini. Est autem & sa-
cultatis excalfacientis, sicut illorum vnumquodq; tum vrinam mouentis, & flatum discutientis: ex tertio ordine excalf-
facientium. Κύμινον ἡμερῶν quod Græcis, Cyminum & Cuminum satiuum Latinis dicitur: Italis Cumino domestico: A-
rabibus Camum seu Kemum: Germanis Rummel: Hispanis Comino: Gallis Comin. Quod verò Græci κύμινον ἡμερῶν
Latini Cuminum sylvestre nominant: Italis Comino seu Cimino saluatico. Consolida regalis: Italis Consolida reale, seu
Sperone da caualiere: Germanis Rutter sporen: Gallis Pie d' Allouette seu consolide royalle.

Capite hoc de Cumino, Consolidæ etiam regalis historia proponitur, siquidem censuerit secunda
editione suorum Commentariorum, esse Cuminum sylvestre secundum, quam opinionem licet penulti-
ma editione improbarit, in Felicis tamen Valgrisii editione, quæ anno 1583. Venetiis prodiit, rursus ver-
ba secundæ editionis (quod in ea editione frequenter fit) repetuntur, cuius nomine & ea verba textui ad-
dere volumus. Veteres sub Hyacintho Consolidam regalem recensuisse videntur (quod Cæsalpinus a-
struit) siquidem Plinius lib. 21. cap. 11. discurrentes notas, figuras. A. I. Græcorum exprimentes inelle di-
cat: quod in Consolidæ hortensis floribus conspicitur, in quibus folium quoddam implicatum in albo
characteres habens occultatos, ex virgulis cœruleis duas literas. A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Huius
Dioscorides infra cap. 70. meminisse videtur: ita vt Consolida regalis hortensis *del. q. v. reser* sit Dioscoridis,
si modò vox *del. q. v. reser* ad flores referatur. Consolida verò regalis segetum, eiusdem alterum Delphi-
nium seu Romanorum buccinum. Variat floris colore albo, incarnato, purpureo, cœruleo, variegato ex
albo & cœruleo: item magnitudine & foliorum textura, habetur namq; non tantum simplici, sed & ple-
no flore. I. Cuminum sylvestre alterum Matth. editione secunda & vltima, Lac. Lugd. Consolida regalis
Matth. Consolida regia siue Calcaris flos, Lob. Consolida regalis flore cœruleo maiore, Cam. Consolida
regalis satiuua, Tab. Delphinium, Dod. gal. Delphinium quartum & maius, Gef. hor. Flos regius, Dod. fol.
Flos quidam vulgò Fior capuccio, Cæsal. cui Hyacinthus poetarum est. Quæ verò in syluestribus prone-
nit, dicitur Consolida regalis, Brunf. Gef. hor. Lac. Lon. Cast. Thal. Consolida regia, Trag. Fuch. in iconi-
bus, Consolida regalis aruensis, Tab. Consolida regalis flore cœruleo minore, Cam. Segetum Consolida
regia strigiosior tota, Lob. Buccinum & Delphinium alterum, Dodo. gal. Delphinium sylvestre, Gef. hor.
Flos regius secundus vel syluestris, Dod. fol. Chamæmelum eranthemum, Fuch. in folio. Anthemis Era-
themus

II. CONSOLIDA REGALIS peregrina, paruo flore.*

themos, Lugd. II. Consolida regalis peregrina paruo flore, C. B. Ex radice fibrosa caulis exurgit cubitalis, rotundus, striatus, leuissima hirsutie albicans, qui in ramos brachiatur: folia cingunt tripartito primum diuisa, quæ rufus ad formam foliorum Ranunculi aruensis echinati diuiduntur, ac in summo caule pauciora, quarum quædam tripartita, quædam integra. Flores sunt subcœrulei, corniculo donati, Consolidæ regalis segetum similes, aut minores: quibus succedunt siliquæ oblongæ, paruæ, semen paruum continentes. Hanc Delphinii Dioscoridis nomine ab Imper. o Ferrando, Neapolitano Pharmacopæo insigni accepimus, quam etiam virentem in horto D. Zuingeri Philosophi & Medici nostratis, legimus. III. Cuminum fœniculi folio, C. B. Cuminum satium, Brunf. Trag. Matth. Cord. in hist. Lac. Cast. Lugd. Cuminum, Lon. Cuminum Dioscoridis, Lob. Cuminum satium, Tab. Cam. Cuminum Romanum, Cord. in Diosc. Cuminum vulgò, quod Cuminum syluestre primum est apud Dioscoridem, Cæsalpino. Cumini genera duo e Melita afferuntur, alterum acrimoniæ vehementioris, lubnigrum, quod Cuminum acie vocant: alterum candicans, gustus lenioris, subdulce, quod Cuminum dulce appellant, & ab Hippocrate regium vocatur, ea diuersitate, quæ in fœniculo dulci satiuo & acri syluestri spectatur. IV. Cuminum syluestre capitulis globosis, C. B. Cuminum syluestre primum, Matth. Cast. Lugd. Cuminum syluestre, Lob. Dod. fol. Cuminum a Me. & Car. syluestre siue erraticum, Tab. Cuminum syluestre globosum, Camerario. V. Hypecoum, C. B. Gef. hor. Cluf. hist. Hisp. Dod. fol. Cuminum syluestre alterum Matth. Cast. Lugd. Tab. Cam. Cuminum syluestre al-



terum Dioscoridis Italorum, Lob. Cuminum syluestre alterum siliquosum, Lob. in icon. Hoc cum Cuminum nil similitudinis, quare Papaueri corniculato subiiciendum censemus.

AMMI. CAP. LXI.

Ammi a Aethiopicum cuminum appellant. Plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgò notum est, semen exile, multò minus cumino, origanum resipiens. Eligendum est purum, minimè suffusum. Vis ei excafactoria, feruens, & exiccans. Facit ad tormina, vrinæ difficultatem, serpen- tium ictus, cum vino potum: menstrua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria vocant, vt inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit: colorem potu, aut illita mutat in pallorem. Saffitum cum vua passâ, aut resina vuluas purgat.

ένιοι κ̄ τέτο
αίθιοπικόν, οί
δ̄ βασιλικόν
καλῶσι, ένιοι
δ̄ ἑτέρα φ̄
σεως τὸ αἰθιο
πικόν ἔφασαν
εἶναι, κ̄ ἑτέ
ρας τὸ ἀμμι.
i. quidam Ae-
thiopicū qui-
dam Regium
vocat. Alii
alterius natu-
ræ Aethiopi-
cum esse dix-
erunt & alteri-
us Ammi.

Vanquam varia, ac diuersa semina viderim, qua legitimum Ammi mentiuntur, nullum tamen ex ijs hætenus mihi sese obtulit, quod animum ad credendum alliceret, verum Ammi ex Alexandria Aegypti ad nos deferri. Quod Ammi meos nomine in officinis passim habetur, cum probatissimum, Plinio teste, cumino sit candidius, id nigricat, adeoq; vulgus petroselini semen amuatur, vt visu ab eo dignosci minimè possit, sed in hoc gustum consulere oportet. Nam cum haud leuiter sit acre, facit atus discrimen gustu facile deprehenditur. Præterea cum hoc nullum organum saporem gustui repræsentet, quem tamen referre verum Ammi Dioscorides est auctor, adhuc clarius sit, id non esse legitimum. Veruntamen contrarium sensisse videtur Ruellius: quippe qui minus fortasse accuratè ea examinauerit, qua de Ammi, Hippocratis testimonio, scriptus tradidit Plinius, ei alioqui familiarissimus, lib. 20. cap. 15. cum inquit: Est cumino simillimum quod Græci vocant Ammi, quidam verò Aethiopicum Cuminum id esse existimant. Hippocrates regium appellat, videlicet quia efficacius in Aegypto iudicauit. Pleriq; alterius natura in totum putant, quoniam sit exilius, & candidius. Similis autem & huc vsus: nam & panibus Alexandrinis subigit, & cum alimentis interponitur: hæc Plinius. Caterum non equidem negauerim, Ammi in Italia nasci, etsi in officinis hætenus verum non reperitur. Siquidem Al. sius Anguillarius Romanus in herbarum cognitione diu versatus, ex Patauio, vbi horti publici curam gerit, nuper ad me misit legitimum Ammi, nulla prorsus reclamante nota. Caulem emittit fœniculaceum, folijs agrestis pistinace, semine in umbellis exili & cumino minoriore, Origanum resipiente, odoratum & acutum. Nascitur in monte Gargano, quod Itatum est: quod verò peregrinum ex Alexandria apportatur, Arabicum est. Verum enimvero huic sanè illud non ad stipulari certum est, quo magno, vt arbitror, errore ducti Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, se vsos fuisse asseuerant: nam præter rationes error satis ex suis scriptis exploditur, vt pote qui suum Ammi nullo origani sapore commendari fateantur. Ammi legitimum semen, quod ex Alexandria offertur, mirificè præstat ad mulierum sterilitatem. Nam compertum est huius tantum seminis auxilio, plures polificas effectas. Siquidem si propinetur manè drachma pondere ex vino meraco, aut carniū iure in tenuem puluerem contritū, alternis diebus, tribus horis ante cibum, futuram pollicetur prolem, sed oportet maritum cum vxore rem habere ijs tantum diebus in quibus illa semen non ebiberit. Quod tamen diutius semini non debet, quàm quatuor, vt quinq; diebus, est enim ad sterilitatem præstantissimum auxilium, & pluries expertū. Herba quam vocant Ammi, semen, vt Galenus testatur reliquit lib. 6. simplicium medicamentorum, maximè est vtile. Facultas est excafactoria, &

Ammios cō-
sideratio.
Ruel. lapsus,
Monachorū
error.
Ammios vi-
res ex Gal.

I. AMMI.

* AMMI PARVUM FOLII
is fœniculi.*



Nomina.

desiccatoria, tenuiumq; partium: sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est, quod & diger at & urinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo, desiccandoq; ex ordine tertio intenso. Planta, quæ Græcè ἀμμὶ, Latine item Ammi vocatur: Arabicè Nanchach, Anazue, Nanachua seu Nanachue: Italicè Ammi, vt etiam Hispanicè: Germanicè Amey.

Ammi triplex habetur, maius, alterum semine apii, & tertium foliis fœniculi. I. Ammi semine apii, C. B. Ammi, Matth. Anguil. Lac. Cast. Cam. Lugd. Ammi maioribus & ferratis foliis, Gesl. hor. Ammi Creticum aromaticum, Lob. Ammum tertium Creticum, Tab. Cuminum satium, Cæsalpini forte. II. Ammi paruum foliis fœniculi, C. B. Ammi paruum, Dod. gal. Ammi verum, Gesl. hor. Ammi perpusillum, Lob. & Lugd. Ammi alterum paruum, vel tenuifolium minus, Dod. fol. Ammiū primum Alexandrinum, Tab. Ammi, Cæsal. Ammi simile Anguillaræ. Herba est exigua, ex radice parua aliquot cauliculos tenues breuesq; emittens: circa quos folia Nigellæ oblonga, tenuissima, capillorum instar dissecta & sensim magis attenuata: umbellas habet paruas, cãdidas, exiguis flosculis quadrifoliis, quibus succedit semen minutissimum, acre & suaue. Ex Alexandria Ægypti in Italiam allatum, nunc in hortis & Italiæ (apud quos & in Ilua prouenit) & Germaniæ facillè prouenit, quod pro Sifone aliqui habent.

Κόριον, ἢ κορίαννον.

CORIANDRVM.

CAP. LVII.


Coriandrum, aut Coriannū vulgaris est notitiæ: vim refrigeratoriam habens. Quare illitum cum pane, aut polenta, ignibus sacris, & vlcibus, quæ serpunt, medetur. Epinyctidas cum melle, vel vva passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat: cum faba fresa, strumas, & tubercula discutit. Tineas interaneorum expellit semen, cum passo modicè potum, & genituram adauget: largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo, & copiosore vsu abstinendum. Succus cum cerussa, spumãve argenti, nec non aceto, & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat.

Coriandr. cõsideratio.

Coriandrum omnibus notissimum, exili prouenit caule, sesquicubitali longitudine, ramis numerosis, folijs infernè Adiantho [Parthenio] proximis, sed quæ in caulibus habentur, & tenuiora sunt, & magis diuisa: flores in caulium summitatibus albicant, è quibus racematim semen oritur rotundum ac striatum. Totã planta virescens grauius spirat, 60 cimum odore, at semen siccum, exuta graueolentia, odoratum euadit, & ad multa vtile. Nasitur sponte in campis, & inter segetes, seriturq; in campis & hortis. Caterum in Coriandri facultate indaganda aded Galenus productus est, ut longum sermonem faceret contra Dioscoridis sententiam lib. 7. simplicium medicamentorum, vbi ita scribit: Coriannon, sue Corion, aut vtcunque vocare lubet. Vtustiores Græci Coriannon nominant: at recentiores medici omnes Corion appellitant, sicut & Dioscorides, refrigeratoriam esse herbam dicitans, sed perperam. Siquidem ex contrarijs facultatibus componitur, plurimum habens essentia amara, quam ostendimus esse tenuium partium, & terrenam. Nec parum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis: habet autem & adstrictionis paucillam. Ex quibus omnibus vni quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, & non tantum ex refrigeratione. Caterum ego cuiusq; particularim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat, mei vnius duntaxat hac in libro sententiam exprimere. Sed fortè nihil obsta- bit.

Coriandri fa- cult. ex Gal.

CORIANDRUM.



bit: imò si verum fatendum est, proderit nonnihil superiores methodos, quæ ad hunc modum in paucis medicamentis sunt dicta, hic repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum, indeterminatè de morbis pronuntiant, sicut sanè hac quoque tempestate non paucos inuenias medicos vel insignes, præter alia, hac in re maximè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaq; reddita parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente medicameta, ceu antea, sed ea quæ infixum parti præter naturam humorem euacuent, ij tamen refrigerare perseuerant. Aliquando autem ad digerentia quidem transeunt: ceterum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt, incipientibus etiamnum, & crescentibus erysipelatus, alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus, ac flaccescentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet, posteaquam inflammatio eius, & feruor, ac biliosum illud abierint: neque quæ facultate sunt frigida, neque quæ huiusmodi affectus sanant, remedio esse putandum est: sed velut si vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quavis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectu existimabis, & quæ digerant excalfaciantq; medicamenta poscere. Ad eundem modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alia appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sanè est, si cui ita placet, vt talis affectio etiam erysipelas vocetur: sed eam etiam calidam dicere, vbi iam refrigerata est, id verò neutrquam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriandrum, quod vt ipse inquit, cum pane, aut polenta illi-

tum, erysipelas curet. Nam quod exquisitum est erysipelas, quod vtique inflammatum est, & flauum, haud vnquam sanare poterat cum pane Coriandrum, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus, cum determinata ac definita experientia, cuiusque medicamenti facultatem explorandam censuimus, quam maximè fieri posset, simplicissimum eligi affectum consulimus. At pl. rique medici, neque quod vel plurimi morborum protinus ab initio compositi inuadunt, norunt, neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius verò is, qui vocatur ab omnibus nobis vrsitate, vt a veteribus quoque, phlegmone: alij autem inter hos medij plurimi, partim, vt sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmone erysipelatedes. Ac inuenias nonnunquam vbi neutrum vincat, sed ad vnguem paria sint. Quinetiam nonnunquam ædem. atodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud schirrhodes, vt compositorum morborum non paruum aeternetur numerus. De quibus copiosius, cum alibi differemus, tum in libris de curandi ratione. Dicitur autem & nunc quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactu erysipelas haud unquam ab antè dicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum a biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longe à refrigeratione absit Coriandrum, vel ex his, quæ ipse scribit Dioscorides, discere licet. Nam strumas, inquit, tum lomento dissoluit. Quod verò nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit dissoluendis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror: quippe qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quæ omnia: tum temperie calida, tum actionibus digerentia esse confessus est. Hactenus Galenus a Dioscoride in Coriandri facultate dissentiens. Porro verò hac in re Galeno maximè refragatur Auicenna, qui in ipsum aperte inuehitur lib. 2. cap. 144. sic inquit: Scripsit Galenus Coriandrum esse compositam ex diuersis facultatibus, etsi terra facultas in eo ceteris excellat, simul cum aqua quadam tepida, & adstrictoria pauca. Verum, vt ego conijcio, aqueitas, quæ in ipso reperitur, absq; dubio frigida, non quidem tepida existit: nisi ei forsitan admisceatur aliquid excalfacientis substantia, quæ sui tenuitate velociter in auram euanescat. Quapropter dixit Hunsym, remouet Galenus frigiditatem à Coriandro, & Dioscoridi repugnat. At ego quidem aliter sentio, cum frigida eius substantia meminerint Archigenes, Rufus & aliorum posteriorum nonnulli. Frigidum igitur est Coriandrum natura in sine primi, & vsq; ad principium secundi, & sicum in secundo: quanquam, sententia mea, & sicum est, & ad caliditatem aliquo modo vergit. Sed Galenus ipse sentit, Coriandrum esse ex omni parte calidum. Id quod fortasse euenisse putandum ex ea caliditatis particula, quæ dum bibitur, aut comeditur, ab ipso disperditur. Aliter nec necessarium foret, si homines sua frigiditate interficeret, vt in multa exhiberetur quantitate. Illud præterea subdidit Galenus, si Coriandrum strumas dissoluit, quoniam igitur pacto frigidum erit? Cui facile responderi potest, id agere Coriandrum sua quadam occulta facultate, ac forma: aut quod reperitur in eo aliqua tenuis facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigida substantia exterius relicta, sed cum bibitur caliditas illa resoluitur: quo fit, vt sola frigida remaneat, & in corporibus

Coriandri facultas ex Auicenna.

agit. Hac Auicenna in Coriandro Galeni dicta refellens. Quæ etsi aliquid in se rationis, ac veritatis habere videantur, tamen cum omnibus compertum putem, Galeno neminem adhuc parem extitisse, qui diligentius stirpium tum naturarum facultates inuestigauerit, partim saporis gustu, partim odoris olfactu, partim substantia, & coloribus, partim deniq; ex longa experientia profundissima philosophia coniuncta, operapertium est eius potius acquiescere sententia, quam reliquorum omnium. Veruntamen Brasauolus in hoc maluit fortasse cum Auicenna errare, quam cum Galeno recte sentire. Qui præterea cum nesciuerit, Coriandrum in Hetruria passim in pratis, & campestribus sua sponte nasci, asserit in suo simplicium volumine, satiuum tantum reperiri Coriandrum. Ceterum quod hoc in capite Dioscorides auctor sit, Coriandrum sumptum mentem non sine periculo commouere, quoddq; alij tum ex Græcis, tum ex Mauritaniis memoria prodiderint, eiusdè succu potum, interimere, ideo factum est, vt multi, quorum ego sententiã antehac secutus sum, coriandri vsum prorsus damnauerint. Sed id nunc certè mihi videtur iniuste factum. Siquidẽ Coriandru mentẽ non commouet, nisi largius

Brasauoli error. Coriandri feminis vsus.

& im.

Sethi de Coriandro.

Nomina.

Et immoderate sumatur. Quid queso mirum erit de coriandro copiosius sumpto, si vinum etiam, cuius tamen est usus quotidianus, liberalius eorum, dolores, morbos graues, strangulatus, & mortem denique inferat? quod si moderate bibatur, prater alias utilitates, quas humano corpori prabet, ventriculum roborat, concoctiones adiuuat, excrementosa pellit, cor exhilarat, intellectum acuit, spiritus claros reddit & viuificat. Quare non equidem video, quid obftet, quo minus simili ratione credamus, tantum abesse, vt Coriandri semen noceat, vt etiam maxime prosit, si tamen parce & modice sumatur. Quippe ab eius vsu moderato non abhorruisse Galenum puto: nam lib. 8. cap. 4. de compositione medicamentorum secundum locos, ex Archigene refert, ructu acido affectis coriandrum cochlearij mensura exhibendum esse. Galeno autem apertissime adstipulatur e recentioribus Græcis Symeon Sethi, vt pote qui in coriandri mentione scribat, id stomacho locum esse, & eundem corroborare: cibum in ventriculo retinere, donec probe concoquatur. Quæ auctorem hunc de temperato coriandri vsu tradidisse, nulli dubium est. Ex his igitur facile colligamus licet, quod non sit admittenda, sed potius exploranda illorum recentiorum opinio, qui Coriandri vsu omnino fugiendum esse censent: nos enim iam non omnem eius vsu, sed immoderatum tantum vitandum esse existimamus. Semen tritum & recentibus carnibus aspersum prohibet ne putrescant tam citò, quàm solent, aestatis tempore. Ex aqua autem potum celiacos iuuat, & alui fluxiones cohibet. Attamen semen in ciborum, aut medicamentorum vsu nunquam admitti debet, nisi prius triduo aceto fuerit maceratum. Id Græcis κόριον & κόριαννον appellatur: Latinis Coriandrum: Mauritanis, Rusbor, Rasbera, Kuzibara: Italis Coriandro: Germanis Coriander vnd Soliander: Hispanis Culantro & Ciliandro. Gallis Coriandre.

Coriandrum dictum aliqui putant, quod folia eius & caules cimices redoleant: est maius vulgatum, est minus testiculatum, est & syluestre, in Hispania nuper repertum, licet Plinius lib. 20. c. 20. inter syluestria non inueniri scribat, attamen Nicandri Scholiastes duo genera proposuit, alterum satiuum, alterum syluestre. Coriandrum maius, C. B. Coriandrum ab omnibus herbariis appellatur, cui sanè in calidioribus regionibus semina maiora sunt, & in viridariis Alexandriae vbiq; prouenit & Cusbara nominant.

Ἱεράκιον.

HIERACIUM

CAP. LXIII.

a Memm
Ἱεράκιον
i. subcauum.

Hieracium magnum caulem emittit asperum, subrubrum spinosum, acauum: folia ex intervallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores, in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum, stomacho aestuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex intervallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos teneros virentes: in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eam, ad quæ superior impendit.

I. HIERACIUM MAIUS.

II. HIERACIUM MINUS.



Sonchus aureus
Linnæus

Hieracii consideratio, & vires ex Plinio.

Hieracium maius, frequentissimum vbiq; in Italia, in campestribus & collibus incultis locis, & aliquando inter segetes nascitur, Soncho aut syluestri lactuce non admodum dissimile. Minus autem cichorium ferè refert, sed asperius ei folia sunt, cauliculi tenues, virentes, subasperi: in quorum cacumine flores vtrig; aurei, cichorea figura, qui tandem post effecti in auram euolant. Maius radice nititur vnica, recta, lactuce, aut sonchi modo. Minus verò multiplici, tenuiq; vtrig;

donia prouenit, in præruptis locis, semine ammii odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam ciet, ac menstrua: contra stomachi, & coli inflationes, & tormina prodest. Laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur Antidotis vrinam cicientibus. Hippofelinum Latini olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quamuis aliud sit, quod propriè Smyrnion dicitur, vt paulò post referemus. Est autem maius, & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habente veluti lineas: foliis latioribus, in puniceum vergentibus: coma rotis marini, florù plena: dependentibus in cacumine corymbis antequam deflorescat. Ea semine turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix dimittitur tenuis, odorata, candida, e qua os commendat. In vmbrosis, & palustribus nascitur: olerum generis, vt apium. Radix cruda, coctæ estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudeq; muria condiuntur. Vim hanc habet, vt potu semine ex mulso vino menses ciet: argentes calfacti potu, aut illitu: vrinæ stillicidio auxiliantur. Radix eisdem præstat effectus.

e Cat. iug.
max. i. fo
machograta.

I. APIVM HORTENSE.



* II. APIVM CRISPVM. *



Apii hortensis confid.

¶ Vt aut dubio procul omnes ferè ætatis nostræ medici, quæ præsertim, qui diu versati sunt in simplicium medicamentorum inquisitione, quibus multum laboris ac studij impenderunt, vt hanc medicina partem penè abolitam restituerent, nil aliud apud antiquos satiuum fuisse apium, quam vulgare nostrum Petroselinum, hodie hortis omnibus frequentissimum. [Exit folijs Coriandri æmulis, compluribus ex vno ramulo prodeuntibus, per ambitum frequenter laciniatis, sed que in caule sunt mutata forma, longa angustaq; spectantur. Flores habet exiguos candidantes, & semen Aniso simile. Radice nititur digitali, dodrantali longitudine, albicante, dura intus matrice, raro diuarcata, qua carniū iribus passim incoquitur. Folia concisa, & cum vino & oleo de scorpionibus in patella seruesacta, pubiq; calida admota, remorantem vrinam ciet] Quorum equidem sententiam nunquam ausim improbare, cum nostrum hoc notis omnibus sit præditum, quibus constare Apium veteres tradidere. Plinius siquidem lib. 20. cap. 11. naturalis historia ita scribit: Apio gratia vulgò est: namq; rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Hoc etiam confirmare videtur Galenus lib. 2. de alimentorum facultatibus, cum inquit: Apium inter cetera familiarissimum est, & ori stomachoq; gratissimum. Quæ sanè omnia in vulgari nostro Petroselino cernuntur: quippe quod nobis omnium olerum familiarissimum in ciborum condimentis perpetuò habeatur. Ceterum quamuis id varios nostrarum mensurarum cibos frequentissimè commendat, scripsere tamen tum Chrysippus, tum etiam Dionysius (vt Plinius auctor est) Apium ad cibos non admittendū, imò omnino nefas, nam id defunctorū epulis ferilibus dicatū. Ipsius quoq; vi us claritati inimicum. Caule femina vermiculos gigni: ideoq; eos, qui ederint, sterile scere mares, feminaq;. In puerperis verò ab eo uso comites fieri, qui vbera hauriant: innocentior tamen esse marem. Ea q; causa est, ne inter nefastos fructus damnentur: hac Plinius. Quare mirum non fuerit, si recentiores quoq; Apio comitalibus interdixerunt. Cum igitur his tum rationibus, tum auctoritatibus, notis præterea suffragantibus, constet vulgare Petroselinum legitimum esse apium, putandum quidem fuerit, quin potius affirmandum, id quod officinis omnibus satiuū Apij vicem explet, nil aliud esse, quam Paladapium, sive Apium palustre, Eleoselinum Dioscoridi vocatum. Quandoquidem hoc in humentibus, palustribus, & vliginosis locis nascitur, feritur quoq; in hortis. Folia gerit hortensis maiora solidioraq; caulem quoq; vegetiorem, odore etiam acutiore, gratiore, & qui caput feriat. Radice tamen, floribus & semine ferè similibus, caule, & folijs satiuo maioribus, rari-


Plinius de Apio.

Eleoselini consideratio.

legit. eaq. propter Theophrastus lib. 7. cap. 6. de plantarum historia, de eo differit his verbis: Paludapium, quod apud aqua ductus, & in paludibus provenit, folio raro, nec hirsuto consistit, sed simile quodammodo Apio est, odore, sapore, figura. Hoc Columella lib. 11. cap. 3. de re Rustica non aquaticum apium, sed apium simpliciter appellatur: vli sic legitur.

Apium Colu-
mellæ.

III. APIVM PALVSTRE.




Apium quoq. plantis serere, nec minus semine, sed præcipue aqua latatur, & ideo secundum fontem commodissime ponitur, quod si quis id velit latifolij facere, quantum seminis possint tres digiti comprehendere, raro linteolo inliget, & ita in areolas dispositum religet: vel si crispæ frondis, semen eius inditum pila, & saligno palo pinsitum expoliatumq. similiter in linteolo ligatum obruet. Potest etiã circa hanc operam fieri crispum, si cum est natum incrementum eius superuoluto cylindro coercetur, hac ille: A quo nonnulli hortorum cultores edocti, aquaticum apium crispum hoc quoq. tempore faciunt, habentq. spectaculi gratia in hortis. Caterum Ruellio haud mihi subscribendum est, quippe qui plantam nobis Italis Macerone vulgò appellatam, Paludapium esse putat. Quippe (vt paulo post, atq. etiam in proxima Smirny commentatione dicitur) non parua sanè inter vocatum Macerone, Eleoselinum, & Hipposelinum intercedit differentia. Apij porrò in montibus nascentis, quod ideo Græcis Oreoselinum dicitur, nulla à Dioscoride reditur foliorum delineatio, nisi in eo scriptura fuerit deprauata, vt fermè suspicor. Verùm Theophrastus, & Plinius Oreoselinum descripserunt folijs cicuta, radice tenui, & semine vnus, alter verò caule anethi, minutiore tamen. Vnde factum est, vt nonnulli crediderint Theophrastum hoc in loco deprauatum esse, & quod vbi in Græcis codicibus legitur ἡ τὰ φύλλα ἔχει πικρῶς ἐμφερῆ, id est, folia habet cicuta similia, legendum sit, κεφάλια ἔχει μικρῶς ἐμφερῆ, hoc est, capitula habet papaueri similia. In quam opinionem hos facile potuit adduxisse vulgata Græca Dioscoridis lectio, in qua nimirum capitulorum papaueris, non autem foliorum cicuta mentio est. Veruntamen ego potius (vt modo dixi) Dioscoridis lectionem vitiatam putauerim, quam Theophrasti, licet contra senserit Hermolaus. Nam præterquam quod Theophrasto subscribat Plinius, est Orisbasij codex, in quo non μικρῶς, sed πικρῶς legitur. Præterea ipse sæpenumero vidi Apium in montibus nascentem, quod à Theophrasti & Plinij pictura nullis prorsus notis disidet. Provenit enim folijs cicuta, radice tenui, & semine in umbella anethi modo: qua omnia Apij generi maximè adstipulantur. Illud insuper addiderim, quod Apij longè magis proprium est folijs confurgere cicuta modo per ambitum laciniatis, semine in umbella anethi instar, quam capitulis papaueri similibus incluso.

Apium aquat. crispum: Ruellii opin. non accepta.

Oreoselini confid.

V. PETROSELINVM MACE-
donicum.



Nam præterquam quod Theophrasto subscribat Plinius, est Orisbasij codex, in quo non μικρῶς, sed πικρῶς legitur. Præterea ipse sæpenumero vidi Apium in montibus nascentem, quod à Theophrasti & Plinij pictura nullis prorsus notis disidet. Provenit enim folijs cicuta, radice tenui, & semine in umbella anethi modo: qua omnia Apij generi maximè adstipulantur. Illud insuper addiderim, quod Apij longè magis proprium est folijs confurgere cicuta modo per ambitum laciniatis, semine in umbella anethi instar, quam capitulis papaueri similibus incluso. MACE-
DONICVM autem PETROSELINVM, etsi antehac in Italia haud cognitum fuit, factum est tamen quorundam diligentia, vt petito è Macedonio semine, iam quibusdam nostris habeatur in hortis. Huius copiã primùm mihi fecit Iacobus Antonius Cortusus Patritius Patavinus, cuius liberalitate complures cum peregrinas, tũ raras sum consequutus plantas. Exit itaq. Macedonicum petroselinum, folijs vulgari, siue aquatico apio similibus, sed minoribus, caule crasso, ramoso, frequentibus alarum cavitatibus, floribus albis, semine hortensi petroselino [ammi] haud absimile, odorato, sapore acri & amarescente, aroma olente. Quamobrem aberrant toto calo, qui vulgare nostrum petroselinum, nihil à Macedonio differre contendunt, sua tantum auctoritate, ne dicam temeritate nixi. Quod verò Hipposelinum vocatur, si quod LEVISTICVM vulgò vocant, non est, plantam sanè non habeo, qua legitimum referat.

Petroselinum Macedon.

Hipposelinum Levisticum.

Si enim foliorum, caulium ramorum ceterarumq. partium magnitudinem, proceritatemq. respicimus, etsi Dioscoridi Hipposelinum legitimum non sit, quod coma, & semine illi non respondeat, cum tamen ceteris selinis grandius sit, & tota facie simile, nemo nobis succensere debet, si hanc plantam Hipposelinum appellauimus. Caulibus exit crassis, bicubitalibus fruticosisq. ramis multis, multisq. alarum cavitatibus, folijs palustris apij, sed longè maioribus, muscarijs in cacumine grandioribus, albis refertis floribus, semine oblongo fœniculi maiore, tota planta grauius olet. Seritur in hortis. Excalfacit & siccatur ordine tertio, quo fit vt aperire, incidere, digerere & provocare valenter possit: perinde ac cetera selinorum genera. Ea omnia

V LEVISTICVM VVLGARE.

Libanotis
fructifera.
Theoph.
Marcelli, &
Braf. lapsus.



Fuch. error
Leuisticum
Smyrnum
caesent.

Apii generū
vires ex Gal.

Nomina.

xerit. Idem praterea errasse deprehenditur in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctam edidit. Nam etsi primum recte scribat, illud quo officinae hodie pro apio hortensi vtuntur, non esse nisi eleoselinum, id est apium palustre, tamen postea perperam (meo quidem iudicio) scriptis tradidit, petroselini semen seplasis apij semen vocari, atq; in eum locum vsurpari. Etenim Eleoselini semine, non petroselini, apij seminis loco vtuntur omnes fere pharmacopae, idq; etiam apij semen nuncupant. Apij meminit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Apium vsq; aded calidum est, vt & vrinas, & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis semen, quam herba ipsa. Sed & oreoselini, & hipposelinum similis vis est: verum hipposelinon imbecillius est, oreoselinum valentius. Eodem quoq; libro superius tamen, de Petroselino differuit his verbis: Petroselini semen maxime vsui est, cum tota etiam herba vna cum radice similem, sed imbecillitatem facultatem sortiatur. Est autem vt gustu acri cum amaritudine, sic & in operibus calidum, vna cum incidendi effectum. Hinc menses, & vrinas largè prouocat: flatus quoq; discutit. Fuerit itaq; & ipsum tertij ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium. Sed de Petroselino Macedonico fusius differens libro primo de antidotis, ita scribit: Quod ad Petroselinum attinet, laudatissimum Macedonicum est omnibus cognitum: quod Estreaticum etiam quidam appellant, à loco in quo nascitur, nomen imponentes. Verum exiguum est prorsus, quod ibi prouenit, cum & praeceptus, & angustus ille locus sit. Estreaticum itaq; Macedonicum hoc, quod à Macedonibus in omnes gentes affertur, paucum & ipsum in Macedonia terra gignitur. Sed idem in petroselino Macedonico accidit, quod in Attico melle, & vino Falerno contingit. Mercatores siquidem in omnem ferme orbem terrarum, vt mel Atticum, vinum Falernum, sic Petroselinum Macedonicum aduehant, cum tamen in Macedonia petroselini tantum non oriatur, quantum gentibus omnibus satis esse queat. Verum in Epiro petroselinum plurimum gignitur, quemadmodum in Cycladibus insulis mel: atque vt mel ex insulis Athenas affertur: sic petroselinum ex Epiro prius in Macedoniam comportatur, plurimumq; & propè totum in Thessalonicam: inde verò tanquam Macedonicum exportatur. Idem in vino Falerno contingit: nam cum in exiguo quodam Italiae agro Falernum proueniat, complura alia vina in Falerni speciem à vini magistris concinnantur, quae perinde atq; Falernina, in omnes prouincias Romano imperio subiectas importantur. Tibi verò si petroselinum Estreaticum quandoq; deerit, ne peioram existimes theriacam futuram, si alium imposueris. Non enim si mortiferis venenis, si venenatorum moribus aliud ad Estreatico petroselinum minus congruit, propterea reliquis etiam morbis, vt torminibus, ventriculo debili, aqua intercutem, & id genus alijs, segnius opitulatur, quos in primis sanare theriaca non promittit. Adhuc Estreaticum petroselinum theriacam planè amariorem facit, praesertim cum recens adhuc imponitur: differt enim ab alijs petroselinis, quod vt acerrimum, ita quoq; amarissimum est. Σελίνον κηπάρον id Graeci, quod Latini Apium hortense, nominant: Mauritanii, Charfi, Charfi seu Chares: Itali, Apio domestico, & Petrosello & Petrosello: Germani Peterfilien vnd Peterlin: Hispani Perexil: Galli Persil de iardin. Id verò ελιόσεινον Graeci dicunt, quod Latini Apium palustre, & Paludarium: Mauritanii, 60 Afili: Itali Apio palustre, Apio aquatico: Germani Eppich vnd Eppich: Hispani Perexil dagoa, & Apio: Galli Persil del eau. Quod autem ὀρεοσεινον Graeci, Apium montanum Latini vocant: Mauritanii, Acraselinum: Itali Apio montano: Hispani Perexil montesino: Galli, Persil des montaignes. Πετροσεινον deinde id Graecis dicitur, quod item Latini Petroselinum, & Italis, Petroselino. Postremo ἰπποσεινον id Graecè vocatur, quod etiam Latine Hipposelinum: Arabicè, Sals: Italicè Hipposelino: Germanicè Liebstöckel: Gallicè Ache, & Ache large.

L. Apium hortense seu Petroselinum vulgi, C.B. Petroselinum, Brunf. (cui & Apium hortulanum) Trag. Cord. in Diosc. Petroselinū syluestre siue apium montanum, Fuch. in icon. Oreoselinum, eidem in fol. Petroselinum vulgare, Anguil. Lon. Apium hortense, Matt. Lac. Dod. gal. & fol. Lob. Cast. Lug. Apium commune vel mas Plinii, Ges. hor. Apium domesticū, Casalp. Apium fatiuū, Taber. II. Apium Crispū, quod à superiore

prastare valet, quae de palustri apio dicta sunt: sed eo imbecillius est: verum ne mordicus opinionem hanc retinere videat, uerbenter in eorum concedam sententiam, qui aliter sentiant, ea exceptione tamen, vt interim hac planta mihi tantum Hipposelinum vicem praestet. Sunt qui hanc Laserpitium, quia fructifera Theophrasti libanotidem esse contendunt, sed plerumque sunt nota, (quantum video) quae horum opinionibus refragantur. Brasauolus Ferraticensis herbam Maceroneam vulgo vocatam falso Hipposelinum existimat, à peruersa fortasse Marcelli interpretatione deceptus, qui praeter Dioscoridis sententiam, Hipposelino radicem intus candidam, foris verò nigram reddidit, cum tamen in Graecis Dioscoridis exemplaribus nulla nigredinis fiat mentio. Quo quidem argumento Maceroneam Hipposelinum non esse, satis superq; comprobatur praesertim cum hac coloris radicem opposita qualitate inter se discrepent. Huius Marcelli lapsus illud causam fuisse arbitror, quod legerit apud Theophrastum, nasci Hipposelinum solis paludario proximus: caule magno, ac hirsuto: radice raphani modo crassa, sed nigra, nigroq; etiam semine, magnitudine eruo ampliore. Qua fortasse autoritate fatus Marcellus, nigram Hipposelino radicem inesse addidit in Dioscoride. Sed animaduertendum est Theophrastum eo loco non descripsisse Dioscoridis Hipposelinum, cum alterum ab altero pluribus differat notis, sed Smyrnum potius. Id quod ex eo conijci potest, quod Dioscorides, itemq; Galenus asserant, nonnullos inueniri qui Hipposelinum à Smyrno non separent. Quibus verbis nil mirum inter eos, qui ita sentirent, Theophrastum quoq; ab illis comprehensum fuisse. Caterum hac in re etiam Fuchium, cuius tamen pace dixerim, aperte hallucinatur quippe qui legitimum Hipposelinum Leuisticum vulgo vocatum, Smyrno loco in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs depin-

* III. APIVM HORTENSE maximum. *



à superiore foliorum crispatis oris & minoribus incisuris distat. III. Apium hortense maximum, C. B. Ex radice oblonga albida, & pro magnitudine plantae, tenui, folia prodeunt pediculis palmaribus & sesquipalmaribus, striatis, pallide virentibus, tripartito primum diuisa, quorum quodlibet rursus tripartitur, ipsaeque particulae triplo quadruploque quam in Petroselino vulgo dicto maiores per ambitum incisae, pallide virentes: inter haec caulis exurgit cubitalis & sesquicubitalis, tenuis, striatus, in cuius summitate folia oblonga, angusta, minimè incisa. Umbellam habet paruum, albam, exiguis flosculis refertam, quibus succedunt semina Petroselini forma, sed duplo triploque maiora, gustu nonnihil aromatico donata. Nomine Apii Anglicani primum apud nos satum. An fortè de hoc Anguillara, opinione septima, dum de Selino agit, quod in vniuersa Graecia, potissimum in Chio & Creta, pro Selino habeatur, intelligendus? IV. Apium palustre, C. B. Matt. Cord. in Dioic. Ges. hor. Cast. Lugd. Apium, Brunf. Fuch. in folio. Lon. Apium vulgare, Trag. Apium agreste, Cord. in hist. Eleoselinum, Fuch. in icon. Dod. gal. & fol. Lob. Tab. Apii aliud genus, Cæsalp. cui apium latiore folio, caule verficolori Theophrasti. V. Petroselinum Macedonicum, C. B. Matth. Lob. Dod. fol. Cast. Lugd. Tab. Cam. Apii alterum genus peregrinum, vel Apium Latifolium, Cæsalp. VI. Leuisticum vulgare (an Libanotis fertilis Theophrasti?) C. B. Matth. Dod. fol. Cæsalp. Leuisticum, Brunf. Ligusticum eidem. Ges. hor. Lon. Tab. Ligusticum satium, Trag. Cord. in hist. Libysticum vulgare, Fuch. in Icon. Ligusticum vulgare, Dod. gal. Cam. Leuisticum & Germanicum Lalerpitium, Lob.

a Drag. *ὑώ-
δη συνδραμό-
τητι, φαρμα-
κώδη τε κῆ-
ρομυλίζον-
τα. i. odora-
ta cum acri-
monia, medi-
cata; & co-
lore submeli-
no.*
b Meum *πολύχειλα-
i. multi succi.
c Me. & Dra-
κῆ ενίαιμοις κῆ
γανίαις χερ-
σεύσαι. i.
humectis, &
angulis in-
cultis.*

Smyrnium, Fuch. in fol. Lac. Hipposelinum, Matth. Lugd. Leuistici loco habita herba Anguillara.

Σμύρνιον.

SMYRNIVM.

CAP. LXV.

Smyrnion, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apii & stolonum multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta a odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis vt anethi: semine brassica, rotundo, nigro, acri myrrhae sapore, ita vt alterum alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. Cortex eius foris niger, intus viridis aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae, & seminis exalface-re. Foliis muria maceratis ad obsonia vtuntur: aluum fistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit: tusses, & orthopnoeas mitigat: urinae difficultati medetur. Illita recentes tumores, collectiones, duritiasque discutit, vulnera ad cicatricem perducit: partus abortu vitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen lienis, renum, & vesicae vitis prodest: menses, & secundas pellit: commodè datur ischiadicis in vino: inflationes stomachi lenit: sudores ciet, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.


Smyrniij singula nota, qua illi à Dioscoride tribuuntur, rectè diligenterque expendantur, facile quidem perspicere poterit, Smyrnium ei herba simillimum esse qua à nostris in Hetruria vulgo vocatur Macerone. Siquidem hanc nasci clarum est caule apii, stolonibus multis referto: folijs latioribus, subpinguibus, robustis, ad terram versis, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundis, colore in luteum languescente. Præterea in caulium cacuminibus umbellam gerit anethi modo: semine brassica maiore, oblongo tamen, nigro, acri, odore myrrham referente. Radice denique nititur odorata, acri, fauces mordente, succosa, ac molli, qua exteriore cortice nigricat, interiore verò parte ex albo virescit. Quas quidem notas ferè omnes constat Smyrnio Dioscoridem reddidisse. Verum quispiam, cui fortè hac nostra sententia minus arrideat, obtrudet nobis semen, vt quod Macerone nostro non insit rotundum, brassica modo. Huic illud responsum volumus, quod cum cetera in vniuersum nota illi respondeant, facile in seminis delineatione mendum subesse potest. Vel quod non in rotunditate, sed in alio vni cum altero semine intercedat similitudo. Porro quamuis memoria non prodiderit Dioscorides, quod Smyrnium seratur in hortis, in quibus hodie nostrum illud seritur, sed quod sponte in Amano Cilicia monte gignatur, tum etiam in collibus incultis, ac saxosis locis, Plinij tamen ætate passim in hortis serabatur. Id quod ipse Plinius manifestè demonstrat lib. 19. cap. vltimo, vbi Smyrnium inter hortensia referens, inquit: Et Smyrnium olus vsdem locis seritur, myrrhæ amque radice respicit. Idem quoque testatur Galenus, quod ipsum inter olera connumeret lib. 2. de alim. facultatibus, & de eo scribat in hunc modum: Smyrnium non est insuaue: ideoque Roma plurimum vanit. Multò autem acrius est & calidius, quam apium: quin & odorati quidpiam habet. Quapropter efficacius urinam ciet, quam apium, hipposelinum, & sion: & mulieribus menses mouet. Veris tempore caulem producit, qui crudus edendo est, haud aliter quam folia, quae sola per hyemem inerat planta, nondum caulem habenti, sicut neque tum apium habet. Postea verò caule accedente, tota planta incundior redditur, siue quis crudam ipsam, siue coctam mandat, siue ex oleo, & garo, siue vinum, siue acetum velit adijcere. Nonnulli cum aceto, & garo tantum edunt, veluti apium: alij verò paulum olei vs adijciunt: hac Galenus. Ex cuius sanè verbis liquidò apparet, Smyrnium veteribus etiam inter olera fuisse receptum. Galeno nimirum ad stipulantur ea,

Smyrniij con- sideratio.


Plinii Smyr- nium. Galenus.

qua de Smyrnio mihi retulerunt Siculi: namq; q affirmant, plantam Maceronem appellatam passim coli in suis hortis, atque eam veris tempore (vt etiam Galenus perhibet) caulem tenerrimum emittere, qui non solum edendo fit, sed gratiam quoq; ineat cum ore, praesertim si cum sale & pipere cinara modo comedatur. Hus itaq; fortasse, vel etiam validioribus rationibus adductus Manardus Ferrariensis, vir quidem ingenio & doctrina celebris, Smyrniū esse nostrum dictum Maceronem, constanter asseruit. Quo fit vt minus dubitem, Ruellij opinionem improbandam esse, quod suspicetur (vt proxima commentatione diximus) Maceronem esse paludarium: Smyrniū verò eam esse stirpem certò putet, quam in Gallis vocant vulgò Leuecchia. Est & alia planta, quā in CRETA SMYRNIVM vocari dicunt. Fert hac folia nostrate Smyrnio cretici historia.

I. SMYRNIVM.



II. SMYRNIVM CRETICVM.




Smyrniū vi.
res ex Gal.

Quorundam
hallucinatio.


Imperatoria
plantae descri-
ptio, & vires.

flora, quina ab vno pediculo dependentia, & per ambitum serrata, quin etiam in alteta parte ab exortu mutila. Longè autē diuersa spectantur, qua in caule sunt. Ea enim rotunda spectantur, & caule & ramis, in quibus nascuntur, persolita vocata modo transfiguntur, nullis ab ambitu denticulis. Caulem edit firmum, striatum, & subter folia geniculatum, è quo in latere, vbi folia perforantur, ramuli exeunt è singulo foliorum sinu, strijs in longum protensis. Umbellam in caulium ramorumq; summitatibus gerit racematim dissectā, floribus albicantibus, semine haud brassica simili, sed rotundo, anguloso, & in acutum desinente. Colore ex flauo nigricante, sapore acuto & amariuscule, pediculis longis striatq;. Radicem recentem videre non licuit, sed qui plantam miserunt, eam Smyrnio nostro ferè similem faciunt, non modo facie, sed etiam sapore, odore ac viribus. Nasitur in Creta insula, & feritur nunc in Italia. Verum enimvero (quantum ego iudicare possum) Smyrniū nostrum magis admodum ad Smyrniū historiā accedit, quæ à Dioscoride describitur. Smyrniū tum historiā tum facultates descripsit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Smyrniū quidem Hipposelinum agreste cognominant. Ex eodem genere & ipsum cum apio est, & petroselino: fueritq; apio quidem validius, petroselino autem imbecillius. Menses itaque, & vrinas mouet, calidum siccumq; tertio ordine. Cilices petroselinum nominant, quod in Amano monte nascitur. Est quidem, & ipsum Smyrniū, minus verò petroselino & Smyrnio acre, proinde & vlcibus imponi potest, quia videlicet sine molestia desiccet, sed & digerere, quæ indurata sunt, valet. Reliqua vis eius apio, & petroselino similis est. Quocirca & semine eius vtimur ad menses, vrinas, & asthma, siue anhelationes: haec enim Gal. Caterum non desunt ex recentioribus, qui contendunt, plantam Imperatoriam vulgò vocatam legitimum esse Smyrniū, argumento quod eius radices exterius nigricent, interius verò virescant. Verum q; ex eo aperte decepti deprehenduntur, quod non animaduertent an hæc planta ceteris inter se notis conueniant. Sed postea, quæ de Imperatoria herba incidit mentio, ob sui nominis maiestatem, viriumq; præstantiam, praterendum sane non duximus, quin hic eius tum historiā, tum facultates edisseramus. Præstantissima igitur IMPERATORIA in An. niensibus montibus supra Tridem tum frequentissima nascitur, folijs sphondylis minoribus, solo accubantibus, robustis, hirsutis, ac asperis: caule bicubitali, purpurascete, rotundo, hirsutoq;: in cuius cacumine umbella floribus candidis ornatur: è quibus postea semen prædit sesilis modo acutum, pariterq; odoratum. Radix inest ei non longa, mediocriter crassa, rugosa, dura, lignosaq;: qua foris nigra est, intus verò iubar viridis. Ea gustu admodum acris deprehenditur, ac mordax, subamara & odorata. Ex quo non temerè aliquis conijcere potest, Imperatorie radicem excalfacere tertio excessu completo, vel quarto inchoante: siccare verò secundo. Incidit, trahit, aperit, digerit, attenuat, prouocat, resoluit, venena dissipat, Zedoariaq; facultatibus pollet. Descendit hæc mirifice tum ventriculi, tum intestinorum, tum etiam vteri flatus. Quapropter coli cruciatibus, ac ventriculi torminibus maximè utilis est. Cit item menses, atque vrinam. Fouentur eius decocto vtiliter in dolore dentes, praesertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota vteri strangulationibus prodest: conceptum adiu-

III. IMPERATORIA.



* IV. IMPERATORIA Alpina. *



adiuuat, quem frigiditas intercipit: concoctionem roborat. Commansa est veluti prestantissimus apophlegmatismus, vt qua efficaciter cerebri pituitam expurget. In puluerem contrita, vinoq; ex saluia decocto subinde pota, frigidis occurrit morbis. Quamobrem resolutis, comitialibus, veterosis, conuulsis, auxilio est. Aiunt nonnulli quartana eos sanari, qui pulueris cochlearij dimidium, hora vna ante accessionem, ex mero biberint. Oris halitum commendat, & omnes roborat sensus. Epidemys morbis, venenis ferè omnibus, ac venenosorum animalium, tum morsibus, tum ictibus opem prestat. Asthmaticos, seu anhelosos iuuat, obstructions aperit, aqua intercute laborantes sanat, itemq; liene affectos. In summa excalfacit vniuersas corporis partes, quas frigus occupavit. Vt hinc palam fiat, herbam hanc non immeritò sibi Imperatoria nomē asciuisse, cum tot tantiq; viribus pradiata sit. *Σμύρνιον* id Græci, quod Latini item Smyrnum, & Olusatrum, nominant: Mauritanii, Seniriuon: Itali Smirnio & Macerone: Hispani Apio Macedonico. Gallis Maceron. At Imperatoria, Italis quoq; Germanis; Meisterwurk: Officinis Germanorum, Magistrantia. Gallis Otruche, seu Imperatoire.

I. Hippofelinum vel Smyrnum vulgatum, C.B. Petroselinum Alexandrinum, Trag. Hippofelinum, Fuch. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lac. Cord. in hist. Lob. Tab. Smirnum. Matth. Gef. hor. Cast. Cam. Olus atrum, Cord. in Diosc. Gef. hor. Lon. Cæs. Hippofelinum Theophrasti, Macerone aut Alexandrinum vulgo, Anguillaræ. II. Smyrnum verum peregrinum, C. B. Smyrnum Creticum, Matth. Cast. Lugd. Cam. Smyrnum Dod: gal. Gef. ap. Lob. Tab. Smyrnum verum, Gef. hor. Lugd. Smyrnum Atmani montis, Dod. fol. Olusatri alterum genus peregrinum, Cæsalpino. III. Imperatoria, quæ mediæ naturæ inter Lalerpitium & Panaces est, dicitur Afrantia, Brunf. Gef. hor. Dod. fol. Magistrantia, Cam. Imperatoria, Matth. Lac. Gef. hor. Lob. Cast. Lugd. Tab. Smyrnum hortense, Trago. Lalerpitium germanicum. Fuch. Ostrutium, Dod gal. Lon. Struthion, Cord. in hist. Herba Rena, Cæalp. Ligusticum, Anguillaræ. IV. Imperatoriam hanc alpinam D. Camerario acceptam referimus, de qua hæc habet in suo Matthiolo. Minor est quàm præcedens omnibus suis partibus, nam & angustiora folia & pedicellos teneriores profert, ex radice non absimili nostræ Imperatoriæ & æquali etiam, gustu acriori & magis vrente. Prouenit in alpibus apud Heluetios. Calida est & sicca, vt vulgaris Imperatoria, qua superior esse facultatibus omnibus videtur, & ad agendum promptior. Vtuntur hac planta ad quartanas, partus eruendos, & cerebrum expurgandum, flatus discutiendos, colicosq; dolores sedandos, id quod vulgaris nostra quoque prestare potest.

Ελαφοβόσκον. ELAPHOBOSCVM. CAP. LXVI.

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, aut torinarino similis, geniculatus, foliis duum digitorum latitudine, vt terebinthi, prælongis, aliquantū asperis, circumfractis. Adnata multa habet, ferentia umbellas anethi similes, & semina eiusdem: florem subluteum, radice ternum digitorum longitudinis, & a crassitudinis vnus, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olere manditur. Contra serpentium ictus datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo cernas serpentium morsibus resistere.

a Meumi πάχος δ' ε' πλάτος i. crassitudine verò seu latitudine.

Quamquam aliqui profitentur, se Elaphoboscum in Italia inuenisse, atque etiam quibusdam in hortis ostendere: herba tamen, quam pro eo demonstrant, folia profert incisuris multis diuisa, leniaq; Adeò vt hinc perspicue intelligi possit, eam legitimo Elaphobosco plurimum dissidere, si Dioscoridi magis, quàm Plinio fides est adhibenda. Plinius siquidem libro, & cap. 22. Elaphoboscum folijs smyrny, & semine corymbaceo depinxit his verbis: Elaphoboscum ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine: semine corymbis dependentibus simili effigie, sed non amaris: folijs olusatri, & hoc laudatum

ELAPHOBOSCVM.

Ruellii opin.
suspecta.

Gratia Dei.

Elaphobosci
facul. ex Gal
Nomina.



FOENICVLVM.



a Meū. & Cat.
α φύλλον. Ι.
& foliis.

Foeniculi cō-
sideratio.

Foeniculum tam erraticum, quam satium omnibus in Hetruria notum est. Seritur domesticum Februario mense yere ineunte, locis apricis, & modicè saxosis: quippe quod non minus in ciborum condimentis gustui acut, a quadam dulcedine placeat, quam vtile sit in medicamento. Caulem edit anethi, sed crassiores, nec proceriores, striatum, geniculatum, que, folijs numerosis, capillaceis, cauis alarum multis. Umbellis cacumina occupantibus, anethi emulsi, melinis floribus, & semine oblongo, gustu acuto, quadam cum leniscula amaritudine, odorato. In quodam vero genere horti

Italico

in cibus: hac Plinius. In quibus verbis, quod ex plantè à Dioscoride dissentiant, Manardus Ferrariensis Pliny codicem depravatatum esse existimat. Ceterum Ruellius tradit Elaphoboscum legitimum paucis hodie cognosci, et si frequens ubiq; reperitur, illud, esse censet, quod vulgo officinis simul & herbarys Gratia Dei nominatur, è qua sui nominis vnguentum conficiunt. Sed hanc Ruellij sententiam non admittendam, quin potius explorandam putauerim, si per Gratiam Dei eam plantam intelligi, de qua nos superius differuimus in hyssopi commentatione, & qua Officina vtuntur. Quippe quod hac caule, & folijs hyssopi sit per similes, non autem faniulo, ac terebintho. Quamobrem aut aliam in Gallia plantam esse eodem nomine appellatam, aut Ruellium omnino deceptum existimauerim. Ipse equidem herbam quandam sapius vidi, tum in Tridentino, tum in Gornensi agro, cuius etiam hic picturam damus, que ita notis omnibus Elaphobosco respondet, vt non poterit animus non inclinari ad credendum; hanc aut legitimum esse Elaphoboscum, aut plantam illi similem. Paucis admodum Elaphobosci facultates perstrinxit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Elaphoboscus facultatus est calida, & tenuium partium, & ac proinde exicatoria, secundo maxime excessuum ordine. Erus nomen Gracum est ελαφοβόσκον Latinum similiter Elaphoboscum, & cerui ocellum: Italicum Elaphoboscò.

Elaphoboscum hoc, & Lacuna & Castor propofuere: cuius & Tabernæmontanus nomine Elaphobosci Matthioli meminit: Pastinacam erraticam, quæ Bascia dicitur, esse suspicantur.

Μεράθηρον. FOENICVLVM CAP. LXVII.

Foeniculum, si herba edatur, aut semen cum prissana bibatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod vrinam excitet: contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur: menses ciet: in febribus nauscam, & stomachi feruorè ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices, & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule, & folijs exprimitur, & in sole sic catus, in medicamenta adiicitur, quæ ad excitandam oculorum acie commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, a ramulisq; & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demunt, igniq; admouent, quo facilius vi caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Ἰππομέραθηρον. FOENICVLVM ERRATICVM. CAP. LXVIII.

Est & syluestre fœniculum, magnum: fert autem semen cachryi simile. Cuius radix iacundè olet, potaq; stranguriæ medetur: menses imposta ciet. Ventrem listit, radice, aut semine potò: contra serpentium morsus auxiliatur, calculos comminuit, regium morbum expurgat. Lactis abundantiam facit, decoctum foliorum haustum feminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio: semine coriandri, rotundo, acri, odorato. Excalfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo respondet, sed ad omnia infirmius.

Italicis familiare, semen dulce percipitur, & crassieri quoque mole spectatur. Radice nititur longa, digitali crassitudine, ac
 onto ac amariuscule sapore, cum dulcedine quadam. Fœniculi meminit Plin. lib. 20. cap. 23. sic inquit: Fœniculum nobis Plinius.
 tamere serpentes, gustatu senectam exuendo, oculorumque aciem succo eius reficiendo. Vnde intellectum est, hominum quoque
 caliginem præcipue eo releuari. Colligitur hoc caule turgescente. In sole siccat, inungiturque, ex melle. Vbiq; hoc est: lauda-
 rissimum tamen in Iberia è lachrymis fit, & ex semine recenti. Fit etiam è radicibus prima germinatione incisis. Est & in
 hoc genere sylvestre, quod alij Hippomarathron, alij Myrsineum vocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, brachiali
 crassitudine, radice candida: nascitur in calidis, sed saxosis. Diocles & aliud Hippomarathri genus tradit, longo & angu-
 sto folio, semine coriandri. Hæc Plinius, qui ea ferè omnia à Dioscoride mutuatus esse videtur. Porro alterum sylvestris Fœ-
 niculi genus, cuius semen coriandri effigiem refert, à nemine hætenus, quod sciam, in Italia cognoscitur & ostenditur. A
 10 gressu fœniculi radicem serpentium morsus sanare scribit Dioscorides à Nicandro edoctus, quippe qui in Theriacis ubi hanc
 plantam ἰππεῖον μαράθρον vocat, ita habet:

Ἡ ἐ καὶ ἰππεῖος μαράθρον πολιαυρέα πίζαν.

Fœniculum, vt memoria prodidit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, tam valenter excofacit, vt ex tertio ordi-
 ne excofacientium censeari possit. Desiccatur verò non aequè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit, proinde lac-
 procreat: quod si admodum desiccaret, non sanè generaret. Suffusis eadem ratione auxiliatur. Vrinæ mensesq; ciet. Est &
 alterum Fœniculum sylvestre, quod præ magnitudine Hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm
 domestici, desiccandi vim obtinet, quocirca ventrem quoque eo nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inest adstri-
 ctio. Huius non radix modò, sed & multò magis semen cachryi adsimile est: potestq; & calculos frangere, & auriginosos sa-
 nare, mensesq; mouere, & urinam excitare: non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est Hippomarathrum, cu-
 20 nus seme rotundum est & acre, simile semini coriandri, facultate quidem Hippomarathro simile, sed debilius. Planta Gra-
 cis μαράθρον, Latinis Fœniculum appellatur: Arabibus Raienigi: Italis Finocchio: Germanis Fenchel: Hispanis Hinoio &
 Funcho: Gallis Fenouil. Nomina.

Fœniculum, quod satium cum magno fœnore semen reddat, satium est & sylvestre: Satiuum variat
 quòd aliud magis (caule breuiore, semine maiore albido, verumq; fœniculum creditur) aliud minus (vt
 vulgatum nostrum, quibusdam Hippomarathrum) dulcescit: sæpius tamen hortense secundo anno in
 sylvestre tranlit, quod in incultis montosis semine exiliori, radice crassiore nascitur. Satiuum, Fœniculi
 nomen apud Herbarios retinuit.

Δαυκός. DAVCVM. CAP. LXIX.

DAUCUM aliqui Daucium vocant. Creticum folijs fœniculo simile, minoribus & tenuioribus: caule
 dodrantali, umbella coriandri, flore albo: semine acri, candido, hirsuto, a suauissimi odoris in man-
 dendo. Radix digitali crassitudine, & dodrantis longitudine adolescit. In saxosis nascitur, & locis sole il-
 lustratis. Aliud eius genus, sylvestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Pro-
 batissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs coriandri, floribus albis, b capite & semine

a Meū. ἐν τῷ
 δαυκῶσ ἀδὲ
 καὶ ἐν ὠδῶσι. ἰ.
 in mandu-
 cando, odo-
 ratum. at Ca.
 δριμύς ἐν τῷ
 δαυκῶσ ἀδὲ
 καὶ ἐν ὠδῶσι. ἰ.
 acre in man-
 ducando &
 odoratum.
 b Meum
 σπέρμα καὶ κε-
 φάλην ὀμγι-
 αν ἀνάθη ἐφ'
 ἢ σιτάριος. ἰ.
 semen & ca-
 put anetho,
 simile, in quo
 sit vinbella.

I. DAVCVM. I.

* II. DAVCVS SECVNDVS
 Dioscoridis. *



Bbb + anethi,

Meum album ambrosium n. 107. 1. 2.
Meum album n. 107. 1. 2.
Meum album n. 107. 1. 2.

anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini, acri. Omnium semen excalfacit: potum vrinam, menses & partus extrahit: torminibus liberat: veterem tussim mitigat: phalangiorum moribus potum in vino, auxiliatur: tumores illitu discutit. Seminis duntaxat in aliis generibus inualuit vsus: in Cretico etiam radice, quæ maximè contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

III. DAUCVM. II.

Dauci consideratio.

Daucus & Pastinaca agrestis non idem esse ostenditur.



Dauci tria genera.

Dauci vires ex Galeno.

Nomina.

Hoc enim in Senensi agro, præsertim in maritimis, frequentissimum nascitur. Creticum autem legitimum ex Creta tantum afferri existimaui. Porro Daucus, qui coriandri folijs prouenit, & semine cumino simili, in quam plurimis non tantum Italia locis sed etiam Germania Bohemique reperitur. Huius planta in herbario nostro Germanico chalcographorum negligentia, dum ego Praga, grassante Pestilentia abessem, secundum Peucedani genus representat: quod omnino præter meam sententiam accidit. Dauci vires tradidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum supra citato, ubi ita scribit: Daucus, quem quidam staphylinum nuncupant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus, ceterum in omnibus vehementior. At domesticus comestibilis quidem, sed imbecillior. Acrem & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certè radix præter iam comprehensa flatuosum quiddam obtinet, ac venereum. Semen autem domesticus quidem & ipsum quandam ad venerem stimulandi potentiam possidet. Agrestis verò planè flatu caret, quod ἀποου vocant: ac proinde vrinam mensesque ciet. Atque hæcenus de facultatibus Dauci Galenus. Qui subinde de semine eiusdem scripsit, eius seorsum vires suas reddidit his verbis: Dauci herba semen excalfaciendi vehementer facultatem habet, ut inter prima efficacissimum sit tum vrinam mouende medicamen, tum mensibus prouocandis. Multum etiam digerere per halitum potest, foris impositum. Ipsa verò herba similem quidem vim obtinet, tamen semine infirmiore, nimirum ob aqueam humiditatis misturam: quanquam vtiq; & ipsa calida sit temperie. Δαῦκος ita Græcis, ut etiam Daucus Latinis appellatur: Mauritanus Δαῦκος, Gezar seu Ciezar: Italis Dauco: Germanis Berwurh: Hispanis Dauco Cretico: Gallis Carote sauuages. Daucum alterum Græcis δ' αὐκὸν ἑτερον: Italis Dauco d' altra specie.

Dauci differentias nouem in Phytopinace proposuimus, de quibus in historia. I. Daucus folio feniculi, C.B. Daucum primum, Matth. Lug. Daucus Creticus, Cast. Tab. Cæf. Daucus Cretensis verus Dioscoridis, Lob. II. Aduersaria non solum ex Creta legitimum adferri statuunt, sed & alpes Germaniæ, Geneuensium colles, & Geneuensium circa Iuram rupes, hoc Cretico abundare, vnde Lugd. & ad alia emporia deferatur, placuit tamen Dauci huius, quem non solum in alpibus Helueticorum, sed & in Baldo legitimus, figuram, etiam à Camerario propositam, adicere, quem Daucum montanum umbella candida nominamus, & Daucum secundum Dioscoridis censemus: Daucus Creticus, Gesl. hor. Cam. in suo Mart. Clus. hist. Pan. Daucum montanum, Cæf. alpino dicitur. III. Daucus montanus apii folio maior, C.B. Daucum alterum, Matth. Lug. Daucus secundus Selinoides, Lob. Dauci tertium genus, Fuch. fol. Dauci secundum genus, Trag. Sefeli secundum, eidem. Sefeli Peloponesiacum, Fuch. in icon. Gesl. hor. Cam. Sefeli Pannonicum secundum, Clus. hist. Pan. Libanotidis alterum genus, Dod. gal. Lug. Libanotis nigra, Gesl. hor. Thal. Libanotis Theophrasti nigra, Tab. Elaphoboscum nigrum, Lon. an Polychreston Cordo in historia?

Δελφίνιον.

DELPHINIVM.

CAP. LXX.

Delphinium surculos emittit à radice vna sesquipedales aut maiores: à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphinorum effigiem representant: vnde tractum nomen est. Flos violæ alba


T Ametsi nonnulli inueniantur plantarum exploratores, qui Daucum ab erraticâ pastinacâ nihil prorsus differre contendunt, affirmantes, hoc idem sensisse Galenum, & post ipsum Paulum, qui tamen, quantum equidem sentio, manifestè falli deprehenduntur. Nam etsi rectè dici possit, Daucum esse syluestris pastinacæ genus: non ob id tamen illa, meo iudicio, fuerit vnquam syluestris pastinacæ, cuius paulo superius meminit Dioscorides. Quandoquidem si vnâ & eandem plantam esse Daucum, & agrestem pastinacam credidisset Dioscorides, de ijs sanè seorsum non differuisset, neq; alterum ab altera proprijs capitibus distinxisset. Ceterum cum non desint, quibus videatur Galenus inter has plantas nullam facere differentiam, videndum est, an ita se res habeat. Mihi quidem inter eas discrimen fieri voluisse Galenum, illud maximum argumentum est, quod Dioscoridem secutus, & ipse varias vtriusque tribuerit vires, easque diuersis locis descripsit. Dauci siquidem lib. 6. Pastinacæ verò lib. 8. mentionem fecit in simplicium censu. Hinc itaque fit vt aperte coniciam, Galenum inter illa discrimen nouisse: atque eos decipi, qui in hoc Marcellum, & Ruellium secuti, contrarium asserunt. Quorum præterea sententiam, ipsius Galeni testimonio, facile explodi posse putauerim, nec solum quod diuersis capitibus vtriusque vires speciatim tractauerit, sed quia lib. 6. simplicium medicamentorum, Daucum non esse pastinacam clarissime ostendit, cum inquit: Daucus, quem quidam staphylinum nominant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus. In quibus sanè verbis Galenus perspicuè satis declarare videtur, Daucum non sibi, sed alijs pastinacam agrestem appellari. Quamobrem cum Dioscoride non modo dixerim, sed etiam affirmauerim tria Dauci genera inueniri, quorum illud Italis frequentius est, quod syluestrem pastinacam emulatur.

Le albe non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum: quo non aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba scorpiones resolui, atq; a ignavos torpescere: se-
mota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est Delphinium, quod Romani
buccinum vocant, superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non
ita efficacibus.

a Meum
vapores
efficaces, &
stipidos fieri

I. SENA.

* II. SENA ACVTIORIBVS
foliis seu Alexandrina.*



40 **Q**uanquam scribit Ruellius, herbam in Gallia nasci, cui vura nullum adhuc nomen imposuerunt, qua omnibus pro-
sus notis Delphinio respondet: in Italia tamen nemo haecenus, quod sciam, legitimum ostendit. Ex quo tantum abest
n putauerim vnquam, illud Ruellij verum ac legitimum fuisse Delphinium, vt etiam sim plerunq; suspicatus, hoc Delphi-
nii caput in Dioscoride sparium ac asutitium esse. Nec temere, vt arbitror: nam suspicio inde ortum suum habuit, quod
Delphinium nusquam, quantum equidem legerim, describatur à Galeno & Paulo. Caterum non desunt qui velint, eam
plantam Delphinium esse, quam Germani vulgo vocant Ritterstorn, id est, Equitis calcar: herbariorum verò vulgus Con-
solidam regalem: quam nos inter syluestris Cumini genera superius retulimus. Verum cum haec folia non ferat Delphino-
rum effigie, nec flores albae violae amulos, horum sententiam cur probem, non habeo. Fuchsius atatis nostra medicus pra-
stanti eruditione & rerum peritia, antedictorum opinionem sequitur in libro de componendorum medicamentorum ra-
tione. Sed ipse quoq; (si recte sentio) vna cum illis in errore versatur: quandoquidem non solum (vt diximus) nusquam,
quod ego inuenerim, Delphinij meminerunt illi praestantissimi medicinae authores, quos nominavi, qui tamen simplicia ex
Dioscoride transcribunt, & mutuantur: sed neq; etiam eius caput legitur in antiquissimo Dioscoridis codice Longobar-
dis litera scripto, cuius saepe fidem citat & probat Marcellus Virgilius, vt mihi licuit videre in eo, cuius copiam mihi fecit
Viennae clariss. Iurisc. Ioannes Albertus Vuidmanstadius Austriae orientalis cancellarius. Quod certe manifesto satis ar-
gumento esse potest, Delphinij historiam planè fabulosam esse, vel saltem Dioscoridi adscriptam & illegitimam. Non de-
fuerat praeterea, qui Senam Mauritanis vocatam, siliquarum conuexitate freti, Delphinium esse crediderint. Quorum gra-
uis error ita euidentis est, vt iam ab omnibus explodatur. Idq; non iniuria, quod in Delphinio (demus eius caput legitimum
est) folia, non siliquae quae delphinorum formam representent, requirantur: foliaq; sint tenuia, longa, diuisa: flores verò
purpurei & tota deniq; Delphinij facies ea depingatur, qua cum Sena quam maxime pugnet, vt mox patebit. Nam quo-
niam Delphinij occasione in Sena sermonem incidimus, cum huius nusquam, quod inuenerim, meminerit Dioscorides, Ga-
lenus, Paulus, & veterum Graecorum alij, sitq; in repurgandis humoribus non modò innoxium, sed etiam summè vtile me-
dicamentum, hunc locum nò transeundum duximus, quin de Sena differamus, eiusq; historiam, & vires cum ex alijs, tum
ex eo quod nobis compertum est, describamus. Constat itaq; SENA, Mauritano nomine dicta, folijs glycyrrhizae proxi-
mi, crassius, suppinguibus, fabarum recentium sapore: caule cubitali, à quo ramuli exeunt in lori modum flexiles. Flores ei
emittant aurei, veluti brassicae, purpureis intercurrentibus venulis: quibus succedunt folliculi falcati, adeoq; natura com-
pressi, vt superior membrana inferiori cohareat: in quibus semen continetur in nigro subuirescens, vuarum vinaceis vsq; a-
deo simile, vt non facile primo oculorum intuitu alterum ab altero discernatur. Folliculi è ramusculis prominent, tenui
pediculo appensi: quo fit, vt maturescentes, paruo ventorum flatu facile discutiantur. Planta est frigoris impatiens, ob idq;
seri vult Maio, nec vltra autumnum perdurat. Siquidem (vt pluries expertus sum) prius sata, facile frigore deperditur, se-
ri verò hyemem similiter non tolerat. Meminit Sena Serapio in suo de simplicium medicamentorum volumine, vbi sic Sena
habet

Delphinii
consideratio.
Consolida
regalis non
est Delphi-
nium.
Senam non
esse Delphi-
nium.
Sena deli-
neatio.

Serapio de
Sena


Ruellii hanc
civitate Colu-
team Senam
ceniens.

habet ex auctoritate Abohanifa. Sena asseruatur sicca, siliquas lunatas, & oblongas profert, in quibus semina in ordinem digesta clauduntur. Siliqua tenui pediculo pendent, ob idq; facile ventorum imperu deturbantur: caducas opiliones colli- gunt: hac Serapio. Cuius postremis verbis fortasse deceptus Ruellius, Senam eam esse arborem existimavit, quam Theo- phrastus libr. 3. cap. 17. de plantarum historia Coluteam appellat: quandoquidem haec antiquis pastoribus fuit saginac- tis ouibus exposita. Vnde facile Ruellius, qui nunquam forsitan in Hetruria fuerat, ubi passim legitima Sena feruntur, pre- sertim in Florentino agro, magno errore putavit, Senam non herbam esse, sed arborem Coluteam vocatam, rarus easdem plantas esse. Sed eius error hinc praeterea apertissime diluitur, quod Colutea siliquas proferat colore in purpuram primo ver- gentes, mox albicantes, statim turgentes, quae si premantur, crepitum magnum edunt: semine intus paruo, rotundo, len- tus effigie. Sena vero siliquatur folliculis lunatis, qui nullo spiritu tumido distenduntur, quibus semen includitur vinacea- rum instar. Adde etiam, quod Colutea arbor sit multis perdurans annis, Sena vero non nisi paucis mensibus vivat. Quo fit, ut iam omnibus palam sit, Ruellium hac in re manifeste ca- cutiuisse, & inter Senam, & Coluteam non parvam inter- cedere differentiam. Et quamvis asserat Fuchsius in suis de plantarum historia commentarijs, has plantas facultate in- ter se minimè differre: eum tamen in errore versari putaverim, quod certo sciam Coluteae semen potum non minus, quam ge- nista vomitiones ciere: & aluum quoq; citat, non sine incom- modo tamen, quanquam pecudibus nil tale efficiat. COLY- TEA, ut de ea quoq; hic aliquid dicamus, Theophrasto au- ctore loco paulò ante citato, Lipara propria traditur, arbor magnitudine praestans, fructum in siliqua ferens, magnitudi- ne lentis, quo oves mirum in modum pinguescunt. Nascitur semine, & fimo praecipue ouillo. Tempus serendi cum Arctu- rus occidit. Serendum semine praemadefacto, cum iam in a- qua pullulare inceperit. Folium habet non absimile semo graco. Germinat primò unicaulis triennio maxime: spargi- tur deinde in ramos, quartoq; anno arborefcit: hac Theo- phrastus. Ex quibus sanè verbis liquidò apparet, quam ma- ximè à Colutea differat Sena. Fuchsius & medicina, & Gra-eci sermonis peritissimus, plantam hanc non Colyteam, sed Coluteam a suo se errore vindicans, appellandam censuit: & recte quidem, meo iudicio: nam Colytea longè alia est ab illa, Theophrasto teste loco modo citato: ubi eam ijs depingit ver- bis: Arbor circa Idam proveniens, quam COLYTEAM vocant, genus aliud est. Est autem fruticosa, ramosa, alba, inuentu rara, non crebra: folio laurino, lauri latifolia, sed rotundiori, ampliori, ut vel vmeo simile appareat, oblan- gius tamen, colore parte altera herbido, tergo autem albido, nervosq; cortice non laui, sed quasi vitigineo: radicibus per summa gracilibus, & solutis, verum vibratis, & admodum flavis. Fructu, flore, carere putatur. Ex his Theophrasti ver- bis perspicuum est, Colyteam à Colutea plurimum differre.

III. COLVTEA.

Fuchsi circa
Coluteae vires
error.

Colutea ex
Theophrasto
historia.



Colytea The-
ophrasti à Colu-
tea differt.

Mesuis & Bra-
sauoli lapius.

Senae folliculi
virentes pur-
gant.

Senae dilutū
cur tormina
sequantur.

Qua tamen etsi Theophrasti auctore Lipara peculiaris fuerit, hoc tamen tempore pluribus in locis sponte natam vidimus praesertimq; in Tridentino agro apud Ananos, ubi ego primum eam quam plurimis ostendi. Sed ut eò vnde digressus est, iam nostra redeat oratio, credidit Mesues Sena folliculos in deicienda aluo folijs longè praestantiores esse. Huic vero redam- mat non solum Manardus Ferrariensis vir doctissimus, sed etiam diuturna medicorum experientia: etsi Brasauolus, qui Mesuem tueri videtur, contrarium putet. Caterum ne quis ex altercationibus confundatur, dicam ingenuè quid hac in re sentio, nec quicquam ab eo recedam, quod experimento pluries comprobavi. Sciendum igitur est, Sena folliculos, qui siccati asseruantur, duum esse generum: alterum per se caducum, & in planta arefactum, à quo semen eximunt, nigrum, & pro- fusum euandum: alterum verò, quod ante maturitatem demetitur, crassum, ponderosum, succo praegnans, & tegeribus ex- sum in umbra siccatur, sed hoc venundatur rarum: cui sanè, ut iam millies periculum fecimus, non minor deiectiona vni- est, quam folijs. Primum verò genus, quo Venetijs omnes ferè officinae scatent, non modo minorem huiusmodi vim habet, sed prope nullam: ut hinc planè colligere liceat, Mesuem hic non esse sine limitatione damnandum: quandoquidem is, ut arbitror, de folliculis decerptis intelligat, non autem de caducis, quibus tantum vtuntur ij, qui Mesui falso reclamant. In quorum numero ego quoq; quandoq; fui, verum cum postea integrum Sena campum seuissem, ut folliculos decerptos viren- tes, & succo praegnantes, mox siccatos experirer, rem aliter factò periculo se habere facile comperi. Quare nostro exempla, qui folliculus vii voluerint, Senam serant, ut folliculos optimos habeant, vel saltem probatissimos emiant, si tamen eiusmodi reperiri poterunt: sin minus, folijs tutius, & efficacius vtantur. Obest Sena (ut idem Mesues inquit) nonnihil ventricu- lo: quamobrem ut hac tollatur noxa, & eius roboretur facultas, gingiber addendum praecipit: quin & ea, quae cor, & ven- triculum corroborant. Veruntamen non desunt, qui hanc reprobent sententiam: quod degustatis Sena folijs, aliquid adstri- ctionis, nonnihil siccitatis, atq; etiam tantillum amaritudinis perceperint, quae omnia potius Senam roborare ventricu- lum indicant, quam ipsum perturbare, ac imbecillum reddere. In quorum sententiam ego quoq; pedibus eo, nam etsi qui- busdam, praesertimq; mulieribus, quandoq; contingat, ut epoto Sena diluto, eorum intestina torminibus vtantur, id nun- quam ex Sena facultate provenire existimaui, sed ex crassis, pituitosisq; excrementis, ab hoc pharmaco eò impulsis, quae sua crassitie intestinorum meatus adeò replent, ut in eis non parvam extensionem faciant, dum viam ad exitum quaerunt. Neq; tamen me vnquam aliquem inuenisse memini, qui diceret se epota Sena, ventriculi dolore laborasse. Proinde aeternam, qui selus, quantum extat, inter Graecos Sena vires descripsit, Senam citra noxam bilem, & pituitam deicere memorat. Mandat- uit. Id quod non sine erubescencia silere coegit quendam Philippum de Ser medicum, qui (ni fallor) ut vnquam potius tueretur sententiam, quam veritatem, pharmacum quoddam improbauerat ex Sena diluto, rhabarbaro, atq; agarico constari, quod

cudam

quidem Illustris, ac Reuerendis. Cardinalis Tridentini nepoti in quadam quotidiana febre dederat clarissimus medicus Andreas Gallus Tridentinus. Is autem pharmacum illud damnandum esse censebat, quoniam Sena dilutum, agaricumq; excipiebatur, argumēto quod hac duo (vt ipse asserbat) maximè ventriculum laderent, immemor, ne dicam ignarus, quantum præstat, ac virium agarico tribuerint in febrib. diuturnis finiendis, à pituita præsertim insarctu exortis, Dioscorides Galenus & Mesues, quantuq; ludibris Senam extulerit Actuarius. Caterum è Sena, ea magis præstat, quæ ex Alexandria Senæ & eius diluti vireæ. Aegypti, vel ex Syria affertur, quæ nunc è nostrate adhuc in agro virente, & rosarum diluto ego quotannis Syrupum parare consueverim, qui tuto largèq; omnes purgat humores. Daturq; commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscunq; ætatis hominibus. Dilutum tamen magis præstat, quàm decoctum, quod nulla ex parte exhælet: cuius vncia quinq; vel sex aluum modestissime, & sine molestia soluant. Quod tuto dari possit prægnantibus, & pueris, experientia docuit, cui subscribit Actuarius, qui Senam citra noxam purgare tradidit. Redditur medicamentu hoc in deicienda aluo præstantius, atq; valentius, si castie nigre aut manna, aut rhabarbaro, aut rosarum diluto, aut rhodopharmaco, quod officina Syrupum rosatum solutuum vocant, commisceatur, aut si maceretur Sena caprino sero. Præstantissimum dilutu hoc modo paratur. Sumuntur foliorum electissima Senæ drachma sex, gingeris, aut cinnamomi contriti drachma vna, florum buglosi drachma dua: miscenturq; omnia, & fictili vitro circumlito, siue stanneo vase angustis orificij excipiuntur, & affusis feruentis aquæ, aut seris caprini vncijs decem, v. sis osculum adeò occluditur, vt nullus penitus spirandi pateat exitus. His peractis pulu. in vniuersis planis asserius sarcto, igniq; calefacto vas inuoluitur, reponiturq; in arca, vbi pernoctare finitur. Sic enim conseruato calore dilutum omnem facultatem in se recipit. Sunt præterea, qui vindemia tempore Sena folia in mustum coniungant, vinum inde conficietes, quod alui deiectionem vim obtinet ad multa vtile. Est enim domesticum valde medicamentum. Eddicit Sena per inferna (vt Mesues testatur) bilem tum atram, tum flauam, & (vt Actuarius ait) non bilem tantum, sed et pituitam: quod sane experientia comprobatur. Mundat Sena cerebrum, cor, iecur, lienem, pulmonē & omnes corporis sensus, confertq; omnibus eorum incommodis. Viscerum obstructions aperit, auget iuuentutem, seniumq; retardat, & animi hilaritatem affert. Folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquuntur, præsertim addita anthemide. Roborat enim hoc modo cerebrum, ncruos, oculorū aciem, & auditoriam facultatem. Optima demum in vniuersum est medicina morbis omnibus diuturnis & melancholicis. Quamobrem Serapio, Sena, inquit, mirifice prodest delirio, amentia, scissuris totius corporis, resolutioni neruorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu & epilepsia. Cor etiam roborat, si tamen ijs potissimum commisceatur medicamentis, quæ ipsum maximè confirmant, veluti viola.


Sena & eius diluti vireæ.

Diluti præparatio.

Senæ vires ex Mel, & Sera.

Planta, quæ Grecis δελφίνιον, Latinis quoq; Delphinium appellatur: Italis Delfinio. Quæ vero posterioribus Grecis Nomina. Sena, Latinis item Sena vocatur: Arabibus Sene: Italis Sena: Germanis Senet: Hispanis Sen de Alexandria: Gallis Sene de Leuant. At Collutea Grecis κολλυτεια: Italis Collutea.

* IV. COLUTEA SILLIQUOSA. *



Cum Delphinio magnam esse similitudinem Confolidæ regali, capite de Cumino ostentum, nunc de Sena, quæ veteribus Grecis indicta videtur, cuius inventio Arabibus debetur, quam Mesues sariam & syluestrem fecit. Duplex habetur: altera, acutioribus angustioribusq; foliis quæ ex Alexandria Aegypti affertur: altera, quæ latioribus rotundioribusq; est foliis, in Italia frequens, quæ vilior est & Orientali longè inefficacior. I. Sena rotundifolia, C.B. Sena, Matth. Lac. Dod. quoad iconem, Fuch. Cord. in hist. Lon. Lob. Cast. Sena cõmunis & vilior, Gef. hor. Sena herba nostras, Cæsal. Sena Italica, Cam. Tab. II. Sena acutioribus foliis, C.B. Sena Alexandrina, Tra. Gef. hor. Cam. Sena Orientalis, Cæsal. Cam. Sena, Do. quoad descriptionem. III. Colutea Corniculata, C. B. Colutea Theophrasti, Trag. Dod. gal. (cui & Cytisus Latinorum) Gef. hor. Lob. Colutea, Matth. Fuch. Lac. Lon. Dod. fol. Cast. Tab. Colutea vesicaria, Eug. (cui & Liparea Theophrasti) Cam. Emeri alterum genus, Cæsal. IV. Colutea siliquosa, licet quatuor sint species, de vulgatiore hoc loco. Frutex hic ex radice buxæ longè lateq; dispersa, saporis amarodulcis, caules plures bicubitales, cortice modò subalbido, modò viridi tectos, graciles, lignosos, in plures ramos diuisos emittit, circa quos folia in vno pediculo septem aut nouem coniugatim disposita, virentia, læuia, subrotunda, gustus ingrati & amari: flores lutei Genistæ figura, longis pediculis propendentes, quibus succedunt siliquæ oblongæ, tenues, articulatae scorpioidi similes, semina oblonga, ruffa, singula in singulis articulis continentes. In montibus nostris vt Muteto obseruauimus: apud Gallos locis nemo-



rosis inter buxos, sic & in Valena sylua agri Mon peliensis & cis Lanum prope fluminum crepitudines. Dicitur Colutea scorpioides, Aduers. Lob. Cam. in Matthiolum Lugd. Colutea scorpioides prima, Clus. hist. Pan. Tab. Emerus Cæsalpino.

Πύρεθρον. PYRETHRVM. CAP. LXXI. Pyrethrum Romani saliuarem vocant. Folia, caulemq; emittit, vt daucum syluestre, & fœniculum: vim bellamq; Anethi, circinata rotunditatis, radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit.

trahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo torpore: diuturnis horroribus efficax: contra perfrictiones membrorum, re olutionesq; eximie conducit.

I. PYRETHRVM VERVM.

II. PYRETHRVM ALTERVM



Pyrethri con-
sideratio.

Pyrethrum
in pratis.

Pyrethri vires
ex Galeno.

Nomina.

Pyrethri radix officinis omnibus nota, in frequentiq; usu habetur, praesertim in dentium cruciatibus. Eius autem planta non omnibus nota est, quod rara fortasse apud nos proueniat. Nos plantam cuius hic imaginem expressimus, non sine labore consequuti sumus. Atqui aliud etiam est Pyrethrum, vulgare notitia planta, quod umbellas non gerit, sed flores Anthemidis maiores: Folia fert Libanotidis seu Anthemidis crassiora, caulem ramosum, foliosumq;, florem maiorem Bellidii grandiorem, colore intus aureo & per ambitum candido: radicem pollice crassiorem, multifidamq;, & acutam, alterius forte Pyrethri modo, adeo ut iam mihi persuasum habeam, plura Pyrethri genera haberi: non desunt etiam rei herbariae indagatores, qui nouum quoddam Pyrethrum ostendant, passim fere in pratis, ac incultis nascens, folijs hortensi pastinaca proximis. Cuius radix etsi primo statim gustu acris non sentitur, postea tamen cum diutius manditur, tum linguam, tum fauces sua feruente acrimonia mordet, ac quodammodo insendit. Sed tamen huius acrimonia non est (nisi fallatur gustus) cum legitimi Pyrethri sapore comparanda: quippe, qui & amarior, & multo acrior, & feruentior percipitur. Quod autem secundo loco appinximus, primum vidimus in Bausano Tyrolensium Emporio, in hortulo quodam Blasij Sbaicher Medici, & rei herbariae studiosissimi. Caterum copiosissimum deinde in Bohemia reperimus, vbi non solum in hortu passim feritur, sed sponte quoq; in montibus prouenit. Pyrethri meminit Galenus lib. 8. simpl. med. vbi eius vires ijs descripsit verba: Pyrethri radice potissime vrimur, causticam, vrentemve facultatem obtinente: qua vtiq; etiam dentium refrigeratorum dolores lenit: & ad rigores ante peridum cum oleo confricatur. Ad haec stupidos quoq;, quos *καρπιδες* vocant, & resolutos adiuuat. Alterius radix vrentis est facultatis, quadam cum leuicula amaritudine. Ideoq; fuerit ex quarto excalescentium ordine. Etsi viribus videatur altero infirmioribus, potest tamen eius vicem commode explere. *Πύρεθρον* Graeci, Latine vero Pyrethrum & Saliuaris herba vocatur: Arabice Macharcaraha seu Hacharlarha: Italice Piretro: Germanice Bertram: Hispanice Pelitre: Gallice Pyrethre. Pyrethrum alterum, seu Pseudopyrethrum: Italis Piretro secundo, siue Piretro falso.

Pyrethrum, ab igne nomen habet, ob radicis eius feruorem igneum. I. Pyrethrum umbella candida, C.B. Pyrethrum verum Matth. Lugd. Pyrethrum alterum, Lob. Cast. Pyrethrum Dioscoridis primum Cam. Pyrethrum forte Cæs. Pyrethrum primum, Taber. II. Pyrethrum flore Bellidis, C.B. Pyrethrum, Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. Ges. hor. Lac. Pyrethrum alterum, Matt. Lug. Tab. Cæs. Cam. Pyrethrum officinarum, Lob. Pyrethrum maius, Lonicero.

Λιβανώτις.

ROSMARINVM.

CAP. LXXII.

a Meū κάρυ-
280. i. can-
chrys.

Dvo Rosmarini genera. Vnum foecundum, frugiferumq;, cuius semen a cachrys vocatur. Folia feniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucunde olentia: caulem cubitali altitudine, aut maiorem, multis concuum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylis simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit: radix

thus

thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum, uti
 sphondylium, odoratum, minimè exurens: radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verùm id quod ste-
 rile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promit. Nasci-
 tur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluua sistit: sedis inflam-
 mationes, & condylomata mitigat: concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem ægrè perdu-
 cuntur. Siccæ radices cum melle vlcera purgant: torminibus medentur cum vino potæ, b & contra ser-
 pentium morsus conueniunt: mensès & vrinas cient: veteres tumores illitu discutiunt. Tam radices,
 quam herbæ succus, adiecto melle, illitus oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si
 comitiale malum sentiat, aut vetus pectoris vitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cum vino,
 10 & pipere datur: sudores mouet, cum oleo perunctum: ruptis & conuulsis prodest: podagris, cum lolia-
 cea farina, & aceto tritum, illinitur: purgat vitiliginis, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potioni-
 bus vtendum, eius quidem quod cachryn non ferat: quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Ros-
 marinum cum erica nasci, foliis lactucæ syluestris amara asperiorib. candidioribusq;, radice breui, Theo-
 phrastus author est: potuq; id ipsum alterutra parte purgare. Cachrys vim habet excalfaciendi, & vehe-
 menter exiccandi: quare abstergentibus medicamentis inferitur: contra oculorum fluxiones capiti illi-
 nitur, ita vt tertio die soluat.

b Me. λ. θ. ε.
 εως ηελος ερ
 μοζει σω ει-
 να πινόμεν
 i. & cōmoris
 à bestis vene-
 natis proliut
 cū vino potæ.

Λιβανώτις & φανωμάλικη

ROSMARINVM CORONARIVM. CAP. LXXIIL

20 Rosmarinum, quo coronarii vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia a [minuta, densa] longa,
 exilia, subter incana, supernè virentia, grauiter odorata. Excalfactoria vi præditum est. Regium sanat
 morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & vbi laborans exercitationi se crediderit, in
 balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinoq; vnguento admisceri solet.

a Me. λεπτά
 i. tenuia Ori.
 aut nō legit,
 minuta deſa.

I. LIBANOTIS SEV ROSMA-
 rinum.

II. ROSMARINVM CORO-
 narium.



Cachrys Libanotis

Primum ac summum Libanotidis siue Rosmarini genus, quod mas appellant, sub duplici differentia à Dioscoride repre-
 sentatum, aliquoties vidi Venetijs in horto amænissimo Maphæi medici excellentissimi, nullis sanè deficientibus no-
 60 tis, quas illi Dioscorides assignauit. Idem quoq; frequens satis nascitur in agro Goritiensi supra Salicarium in monte Gar-
 garo, in via qua ad eadem diuæ Virginis sacram ascenditur. Verùm alterum genus, quod feminam dicunt, hæctenus in Ita-
 lia nusquam mihi videre licuit, tametsi id inibi nasci non negauerim. Sed certè Cordum in suo dispensatorio hallucinatum
 crediderim: quippe qui existimauerit syluestrum Angelicam esse Libanotim. Ceterum variat, mea quidè sententia, in Ro-
 smarini descriptione Theophrastus, qui lib. 9. cap. 12. de plantarum historia, de Rosmarinis hæc posteritatis memoria pro-
 didit. Rosmarini genera, inquit duo, alterum sterile, alterum fertile: & alterū tam fructu, quàm folio vtile, alterum tan-
 tum radice. Fructus cachrys vocatur. Fertile folium habet palustri apio simile, sed multò maius: caulem ad magnitudinem
 cubiti, aut maiorem: radicem magnam, crassam, candidam, & veluti thus redolentem: fructum candidum, scabrum, ob-
 longum. Nascitur potissimum solo squalido atq; saxoso. Radix medicamento vlcerum vtilis, & mensibus pota in vino ni-
 gro austero. Fructus ad vrinae stillicidia, & aures, & argemam, & ad oculorum morbum lippitudinem nuncupatum, &

Rosmarino-
 rum confid.

Cordus no-
 tatur.

Rosmarini
 hist. ex Theo-
 phraſto.

Rosmarinū
coronarium.

Rosmarinū
non esse
Cneoron.

Rosmarini
vires Matth.

Rosmarinū
sylvestre.

lactis vbertatem mulieribus facit. Sterile illud folio lactuca amara constat, sed scabriore candidioriq, radice breui. Nascitur id quoq, predicto solo (aliis, vt Hermolaus legendum censet, & hic a Dioscoride commonemur, vbi erica) letifimum. Radix partim superius, partim inferius purgat. Quod enim germen versus consistit, superius purgat: quod terram versus, inferius. Prohibet & vestibis interposita vermiculos noxios. Colligitur per messem tritici: hac Theophrastus. Porro Coronarium Rosmarinum, nostrum nimirum vulgare est, quod in hortis & vineis passim habetur. Id in frequentiori vsu est. sicut bonensis Gallia, adeo copiosum sponte prouenit, vt illud perinde, ac alia ligna vrant. Tanta enim crassitudine caudice prouenit, vt ex eo cum cithara, tum mensa parentur. Apud Italos hortorum parietes ornatur, & eorundem areas circumuestrit. Floret non solum vere sed etiam Autumno, floribus odoratis, in purpura albicantibus. Hallucinantur recentiores quidam, qui Cneoron, Rosmarinum Coronariū esse contendunt. Excalfacit, attenuat, digerit, resoluit, aperit, roborat. marit. ab- 10
stergit. Praestat ad frigidos ventriculi affectus, ad coeliacas passiones, & vomitum cibi, si cum pane deuoretur, aut bibatur in puluerem contritum ex meraco. Prodest & lienosis & iocinorosis, nam non solum excalfacit, extenuat, & obstructions reseruat, sed sua adstringendi vi, etiam roborat. Valet ad capitis fluxiones, & ad eius frigidos morbos omnes, nempe ad cernitiales, stupidos, veteranos resolutosq. Additur vtiliter in capitis lotionibus, quinetiam in articularum somentis. Cohibet alba vteri profluvia, si diutius quotidie sumatur. Visum acuit, si toto tempore, quo floret, quissiam ieiunus flores vna cum circumstantibus folijs cum pane & sale quotidie vorauerit. Mansum oris halitum commendat. Sistit dentium, & gingiuarum fluxiones in aceto, & vino austero feruesactum, vbi hoc decocto calido os colluatur. Sicci farina, recentia vulnera glutinat, verum operapretium est ea prius vino in quo ipsum fuerit coctum, abluere, & deinde farinam inspergere. Parentur è virgis dentiscalpia, & carbones ad picturas delineandas. Flores saccharo asseruati valent ad omnia praedicta, peculiariter autem ad frigidos cordis affectus, ad pectoris vitia, & ad arcenda pestilentiae contagia. Praestat etiam admodum in ob- 20
soniorum vsu. Nascitur in Bohemia & Polonia vlginosus locus, planta, quam SYLVESTRE ROSMARINVM ap-

III. ROSMARINVM SYL- uestre.

* IV. ROSMARINVM SYLVE- stre minus. *



pellare libuit, quod Rosmarini coronarij faciem quadantenus representet. Crescit haec planta cubitali altitudine, fruticosa, virgis tenuibus, lignosis, materie fragili, rufescentibus, minij ferè colore. Folia in his erumpunt numerosa, Rosmarini coronarij amula, prona parte viridia, transuersis vtrinque lineis dispari ordine ductis obsignata, supina verò rubescētia, & rubro appensa pediculo. In surculorū summitatibus corymbacea coma visitur rubro colore, e qua flores panduntur sublutei. Radice nititur infirma & superuacua. Planta est odorata, siquidem folia, & flores citreū malum oient, quinetiam gustu aromati nonnihil resipiunt, adstrictione quadā relicta. Praesertur hac planta Bohemis cōtra tineas & blaetas, quae vestes lacerāt, quare eam interponūt. Atqui mea quidē sententia, ad ea omnia efficax est, ad qua Rosmarinū Coronariū praestare diximus, praeterquā ad ciborū condimenta. Sunt, qui hanc plantā Dioscoridis Ericam esse contendunt, sed hallucinantur, cum nullā cum Myrica cognationē habeat. Libanotidis siue Rosmarini tum historiam, tum facultates descripsit Galen. lib. 7. simp. med. sic inquit: Libanotides tres sunt, vna fragilis, dua fructum ferentes: omnes verò eiusdem facultatis, emollientis & digerentis. Succus tum radice, tum herba, mistus melli, obrusam oculorū aciem ab humorū crassitudine curat. Porro eius Libanotidis, quae ad coronas est vtilis, quā Romani Rosmarinū nuncupant, decoctū, regio morbo laborātes potū adiuuat. Omnes n. Libanotides abstergetis, & imidentis facultatis participes sunt, hac Galen. Ceterū Cachrys nō modò Rosmarini semen significat, sed etiam quorundam arborū nucamenta, vel potius excrementa, quod nec fructus, nec flores proprie dici possunt: quae tamen ante fructus erumpunt & decidunt, qualia visuntur in corylo, cui sunt longo piperi similia, item in nuce ac quercu. Nisi

Rosmarini
vires ex Gal.

Cachrys
quid.

576
Lectura
Sicut
Sfr.

Nisi inter hac veteres Græcos auctores aliquam nouisse differentiam sit iudicandum, quod apud plerosq; non cachrys sed canchrys, pro Rosmarini semine scriptum reperitur, quas tamen voces hæcenus à recentioribus confundi inuenio. *Planta, quæ λεζανώϊς Græcis: Libanotis & Rosmarinum Latinus dicitur: Maurit. anu Xaier almeriem, Alpitalsach & Cachola: Nomina: Italus Rosmarino. Qua verò λιβανώϊς & ροζανωμάϊκη Græcè, Rosmarinum coronarium Latine vocatur: Arabicè Elki-al-geber: Italicè Rosmarino coronario: Hetruscis Ramerino: Germanicè Rosmarin: Hispanicè Romero: Gallicè Rosmarin.*

Libanotis ab odore thuris nomen habet. I. Libanotis ferulæ folio semine crasso, C.B. Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Rosmarinum primum, Cast. Libanotis prima, Dodo. fol. Libanotis candida, Cæsalp. Libanotis prior vel Cachryfera, Cam. Cachrys verior, Libanotis Galeni, Lob. Lugd. II. Rosmarinus hortensis, C.B. Rosmarinus, Brunf. Trag. Fuch. Lon. Rosmarinum coronarium, Matt. Dod. gal. Lac. Lob. Cast. Lug. Cæf. C. um. Rosmarinus Coronaria, Dod. fol. Rosmarinus minor seu tenuifolius, Cord. in hist. Libanotis coronaria, Cor. in Dios. Gef. hor. Cneoron nigrum Theophrasti, Anguillara. Hic & latiore (qui in syluestribus Gallia, vt Monspelii prouenit) & angustiore folio, qui in hortis colitur. III. Rosmarinum syluestre, Matth. Cast. Lug. Chamæpeuce, Cord. in Diosc. & hist. Cam. Lug. Ledū Silesiacum, Clus. hist. Pan. Tab. Ledum foliis Rosmarini alterum, Lob. IV. Rosmarinum syluestre minus, Camerarius suo Matthiolo iunxit, qui priori multò minor & tenerior, lignosis tenuibusq; virgis, palmi altitudinē vix superans: foliis est acuminatis, infernè cæsiis: furculorum summitatibus flosculi insident rubelli, quibus semen priori simile succedit. Hoc in Borussia syluis vmbrosis, vliginoso solo prope priorem prouenire, Camerarius testatur.

20


Σφονδύλιον.

SPHONDYLIVM. CAP. LXXIII.

Sphondylium folia quadantenus Platani, & Panacis habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes: in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum. grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen a pituitam per aluum extrahit: medetur iocineris vitiis, regio morbo, comitia- a Meum libus, orthopnoicis, vuluarum strangulationi: veterinosos suffitu reuocat. Cum oleo commodè infundi- φλεζ μαλω- tur capitibus phreneticorum & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentina vlcera δε. i. pitui- colubet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrasa eadem, & iniecta callos fistu- tam educens. larum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus purulentisq; accommodatur, qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

SPHONDYLIVM.

Κεραλλιον



Rara admodum sunt prata, vligine madentia, quæ inter Sphondylii alias complures herbas, innumeras quoq; Sphondylii confid. plantas non habeant: eaq; præcipuè, quæ in montibus potius, quam in planitie virent. In his sanè Sphondylium copiosum nascitur, folio platani, aut panacis, caule fœniculi, cubitalem longitudinem excedente: in cuius cacumine umbrella insidet, albis floribus referta: e quibus semen prodit, seseli non ab- simile, latius tamen ac squamosum, sapore iniucundo, vt quod cimices ferme respiciat. Radicem profert albam, raphani emu- lam, gustu non ingrato. Huius semine vtuntur quidam seselis vice, quod alterum alterius effectus præstare existiment. Suc- cus incidit, digerit & aperit: idem capiti inunctus, crispas ca- pillos facit. Porro Fuchsius non videtur satis Sphondylium Fuch. error, nouisse, quod ipsum vnà cum Acantho depingat, vocetq; A- Acanthum canthum Germanicam. Cui facile imposuerunt officina Ger- vocantis. mania, quæ foliorum similitudine decepta, pro Branca vrsi- na Sphondylium vsurpant. Sphondylii facultates memoria prodidit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic in- quiens: Sphondylii fructus acris, & secantis est facultatis. Ita- que ad asthma, & comitalem morbum aptum est medica- mentum: prodest & regio morbo. Et radix nimirum ad simi- Sphondylii vires ex Gal. lis facultatis, ad eadem accommodatur. Sed & insuper fistu- larum callos tollit: cæterum imponere eam oportet circumra- sam. Porro floris etiam succus ad diuturniora aurium vlcera conueniens reponitur. Quod Græci σφονδύλιον Latini simili- ter Sphondylium vocant: Itali Sfondilio. Nomina.

Sphondylium duplex habetur, hirsutum hoc loco positum, & glabrum, de quo in historia vniuersali nostra. Sphondyliū hirsutum, C.B. Branca vrsina, Brunf. Trag. Cord. in Diosc. (cui & Bupleuron Nicandri)

Thal. Branca vrsina Germanica, Dod. gal. Acanthus Germanica, Fuch. fol. Sphondylium, Matth. Lon. Lac. Gef. hor. Cast. Tab. Cæf. Sphondylium, Lob. Dod. fol. Lugdunensi.

Νεφθηξ.

F E R V L A.

CAP. LXXV.

Viridi Ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationes, cœliacosq;: contra viperarum mor- sus in vino datur: erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur: C c c 2 sudor

sudores ciet,uncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt: muria condiantur. Ferula itaq; caulem profert ternum saepe cubitorum: folia foeniculi, longe asperiora & latiora, qua ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur.

Ferulae hist.

F E R V L A.

Ferulae histo. ex Theoph.

Ferulago.



Mira Ferularum natura.

Ferulae vires ex Gal.

Nomina.

† Orib. ὀπιθεῖσα. i. succatione (vt ita dicā.)

a Mc. ὀπιζονται ὅτι καυλοὶ αὐτοῦ λίσσονται ἢ ὡς μανδραγόρα, ἢ τὸν ἐνεργεῖ τὴν χυλῶσιν καὶ τὰ χυλῶσιν ἐκπνέει. i. colligitur item succus, & liquor é caulis, & radice sicut ex mandragora expressus, & hoc expresso succo minus efficax est ille, qui ex ipsa radice manat, & citius expirat.

b Meum ἐγερπύρος. i. fuluus,

rum, tum caulis, vt etiam in ceteris fieri solet. Radice altè descendit, eademq; singulari innititur: talis Ferula est: hac Theophrastus. Porro Ferula (vt Plinius est author lib. 24. cap. 1.) asinis et asinis infestissima est: tacta liquidem ea moriuntur. In insula quadam ex fortunatis nomine Monon, ferulas in arborum amplitudinem grandescere, scripsere quidam. Apuli lignorum vice, quibus maxime carent, ferulis ad ignem vtuntur. Quòd Dioscorides scribit è viridi ferula medullam viperarum morsibus opitulari ex vino potam, à Nicandro depromptit. Is enim ita in Theriacis habet:

Καὶ χλοερὴ νάρθηκος ἀπαίμεσον ἢ ὀλόφας.

Ferula meminit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Ferula semen excalfacit & attenuat. At interna eius pars recentis adhuc, quod medullam vocant, adstringentem qualitatem participat. Cuius nomine sanguinem spuentibus, & caliacis conuenit. Νάρθηξ Ἰταλίας ea planta vocatur, qua Latinis Ferula: Italis Ferola: Hispanis Cananhera.

Ferula foemina Plinii, C. B. Ferula, Matth. Lac. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lon. Lob. Dod. fol. Cast. Lug. Tab. Cam. Ferula mas, Cas. Libanotis prima Dioscoridis ferulacea, Gef. hortis.

Πευκέδαμος.


PEUCEDANVM.

CAP. LXXVII.

Peucedanum caulem emittit tenuem, gracilentum, foeniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa: gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur: in sole liquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius, & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiat. † Assatione radix inutilis fit. a Tam lac quam succus, radice & caulibus extrahi solet, sicut è mandragora: verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhærens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace colore b rufo, odore graui, feruens gustu. Ex aceto & rosaceo illitum Peucedanum prodest lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus in vniuersum vitiis neruorum, ex oleo & aceto illitum, prodest. Eius olfactu respirant vultu strangulatus, & veternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissime ex oleo assumitur: suspiriis, torminibus & inflationibus subuenit. Ventrem leniter emollit, lienem abiat, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum: vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

Quoniam

PEUCEDANVM.



Quoniam nullis prorsus foliorum, ac seminis, & paucis Peucedani admodum floris notis Peucedanum representavit Dio- consideratio scorides, utpote plantam, qua omnibus fortasse suo tempore notior erat, quam ut longiorem descriptionem postularet: idcirco nobis quidem perdifficile esse iudico, decernere quodnam genus herbae hodie in medium afferri possit, qua legitimum Peucedanum referat: praesertim cum Theophrastus, Plinius, Apuleius, ac antiquorum alij, qui simplicium historias descripserunt, plura, quod legerim, de Peucedano memoriae non prodiderint. Veruntamen cum scribat Dioscorides, Peucedanum nasci coma, statim a terra copiosa ac spissa, hinc plane coniectandum videtur, Dioscoridem ipsum innuere, quod Peucedanum constet multis folijs, capillaribus, tenuibus ac longis, fœniculi aut anethi effigie. Huic coniectura illud et accedit, quod cum Peucedanum, Diosc. testimonio, florere proferat melinum siue luteum, non temere credendum arbitror, hunc non in alio, quam in umbella sustineri, cum omnes ferulacea stirpes, et qua fœniculo & anetho similes habentur, cuiusmodi sunt qua hoc in loco a Diosc. recesentur, umbellas in caulium cacuminibus gignere conspiciantur, e quibus semen prodit fœniculi modo. Quod si ita se res habet (ut equidem existimo) asserere non dubitauerim, me saepenumero Peucedanum vidisse in Ananiensibus montibus, ubi huiusmodi planta frequentissima proueniunt, qua non solum praedictis notis Peucedano adstipulantur, sed et radice, quam habent nigram, crassam, succi plenam grauiusque olentem. In hac itaque sententia persistam, ut hanc herbam, quam etiam pictam damus, verum Peucedanum putem, donec aliam naetus ero, qua certioribus notis illud exprimat. Caterum radices, quibus pro Peucedani radicibus vulgo officina vtuntur, legitimas ementiuntur: nam praeter id quod Peucedanum officinarum adulterinum.

crifacultate sunt praedita. Cuius vero planta haec sint radices, ego quidem proferre non possum: eas siquidem haecenus non nisi siccas, & sine caule, ac folijs mihi videre licuit. Praetulit Dioscorides Sardonium Peucedanum, quod non magno quidem negotio ad nos aduehi posset, cum frequens, nec longa sit mercatoribus in Sardiniam nauigatio. Vnde seplasiarijs, si rerum legitimum studio caperentur, facile Peucedani radices conueherentur. Peucedani meminit Galenus lib. 8. simp. med. Peucedanivires ex Gal. vnde eius viribus differit in hunc modum: Peucedani radice quidem maxime, sed tamen etiam succo, & liquore vtimur. Saut autem haec omnia eiusdem specie facultatis: sed valentior succus, admodum excalfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone, & thorace ex crassitudine & viscositate humorum prouenientibus. Atque intro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat & extenuet, saepe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedauit, quia videlicet tenuium est partium & excalfactorius. Quinetiam lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo atque extenuando crassos humores. Sed & radice ad haec uti licebit, qua & squamas celerrime ab ossibus detrahit, quia videlicet valide desiccet, minus tamen quam succus excalfaciens. Et vlcibus malignis remedium est optimum arida illita: ipsa enim expurgat, carnem gignit, & ad cicatricem perducit. Excalfacit quidem ordine secundo iam completo: desiccet vero tertio iam incipiente. Planta, qua Nomina Graece, Peucedanum Latine dicitur: Arabice Harbatum: Italice Peucedano.

Peucedanum a pinu nomen habere videtur, siquidem folia cum pini folijs similitudinem quandam habeant, vnde & Pinastellum aliqui vocant. Habetur Italicum, quod maius, latioribus longioribusque folijs: habetur Germanicum, angustioribus folijs: hocque maius & minus. Peucedanum maius Italicum, C.B. Lob. Lugd. Peucedanum, Matth. Lac. Cast. Lugd. Caes. Peucedanum Italicum, Tab. Peucedanum folijs longioribus, Dod. in folio.


Melanthium. GITH SEV MELANTHIUM. CAP. LXXVIII.

Gith a exilibus surculis fruticat, saepe binos dodrantes excedens: folijs, ut Senecionis minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurfantibus intus membranarum: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capituli doribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias tumoresque; vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum vetere b vrina impositum. Dentium doloribus, cum aceto & teda decoctum, & collutum prodest: teretes ventris tinea expellit; peruncto ex aqua umbilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo & olfactum. Vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum, leuat: phalangiorum moribus ex aqua, drachmae pondere haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum cnecare.

a Meū θαμνίσκος ὄστι, λεπτόκαρπος διαπίθαμος ἢ χαίμεζον. i. frutex paruus est, exilib. ramulis duorum palmorum altitudinis, aut etiam maior. b Meū αἶμα. i. cum vino. Melanthii confid.

Gith, quod Graeci Melanthium appellant, officinis Nigella vocatur. Duum Melanthium est generum, satium & spon-tenaescens. Satium exilibus surculis exit, cubit. alibus, folio senecionis amulo, magis tamen diuiso; floribus in cacumine caeruleis, & in stella modum radiantibus, e quibus capitula oriuntur parua, oblonga, pluribus coronata apicibus, internam


I. MELANTHIUM SATIUM.



II. MELANTHIUM SYLVESTRE.



III. MELANTHIUM SYLVESTRE II.



Melan. sylvestre duplex.

Error credere Gittonē esse Melanthium sylvestre.

Pseudomelanthii descript.

Brasauoli errorum Gittonē legitimū esse Melant.

Githago.

ternam capitis partem respicientibus, intercurrentibus in membranis ut in papaveris capitibus. Semen in his continetur paruum, nigrum, & quandoq; subflavum, odore eximio, ac amariusculo sapore, simul & acuto. Seritur in heris SYLVESTRE duum est generum, utrumq; folijs sat in tenuioribus, multifidis & capillaceis, quin etiam caulibus fere similibus, quemadmodum & floribus. Verum capitula differunt: siquidem alterū capitula gerit satiuo maiora et facie haud longe dissimilia: semper intus nigro, acuto, amariusculo & odorato. Alterum vero longiora in quinque sexve diuicata cornibus. Nascentur utraq; in campestribus, in incultis praesertim agris. Semen excofacit, incidit, aperit, attenuat, extergit. Ad omnia efficax habetur perinde ac satiuum. Itaq; errant toto caelo, qui inter Melanthij sylvestris genera, Gittonem vulgo vocatum annumerant. Quod cum ante nos probe animadvertissent Hermolaus & Ruellius, asseruerunt omnino hallucinari eos, qui putant eam stirpem legitimum Melanthium esse, quae inter segetes in aruis passim nascitur, folijs fere portici. [Caulē edit bicubitalem, pilosum, in quo utrinq; per intervalla bina exeunt folia oblonga hirsutaq;: in cacumine stipes exeunt purpurei rosetq;: semen in calycibus oblongis condiditur, nigrum Melanthio simile, sed amarum, nullog; odore praeeditum]. Et recte, mea quidem sententia, iudicaverunt: siquidem herba illa cum Dioscoridis historia quam maxime pagnat, utpote quae folijs, caule ac floribus, nulla ex parte Melanthium referat, sicuti neq; etiam semine: quod etsi nigrum Melanthij modo gignatur, non tamen gustus aliud representat, quam amaritudinem simul & asperitatem. Hinc itaq; perspicuum esse potest, Brasauolum, alioqui medicū clarissimum, in suo simplicium volumine Roma excuso, manifeste caecitasse: quippe qui affirmare non dubitauerit, illud verum legitimumq; esse Melanthium, quod in segetibus passim sponte nasci superius diximus, quodq; vulgo Gittonē à Ferrariensibus appellari scribit. Cuius error non solum praedictarationibus, sed ea quoque herba appellatione facile deprehenditur, quod etiam ij, qui ita eam appellant, illegitimum esse Melanthium existiment. Quandoquidem nil aliud Italis hoc nomen Gittonē denotare videatur, quam spuriū Gith, quod idēd Githago, & Pseudomelanthium vocari potest: quemadmodum & id, quod rura Tridentina appellant forner.

formetone, nil aliud significat, quam spuriam tritici speciem. Quod cum postea ipse Brasauolus animaduerneret, non
 sicut fort. esse, aut aliorum commentarijs admonitus, suam reuocauit sententiam: quare posthac Brasauoli quoque sententia
 in laudandi erant, qui in hac persistunt opinione. Iam igitur constituamus licet domesticum verumque Gith in hortis, &
 vidualis satum prouenire, in quibus frequentissimum seritur in Germania. Syluestre vero in campestribus incolitur locis.
 Ex quo quidem plane colligere possumus, PSEUDOMELANTHIVM sponte inter segetes nascens, quod vocant vul-
 g. Githone, cuius huc effigiem d.imus, nullo modo syluestre Melanthium esse. Non desunt quoque, qui velint hanc plantam
 syluestrem lychmidem coronaria esse, quibus cum ego vtrumque nouerim, subscribere nequeo. Sed longe minus id fuerit Loli-

Pseudomes-
lantium.

V. PSEUDOMELANTHIVM



um, vt apertissime hallucinatus credidit Fuchsius, cuius error
 a nobis explosus est lib. secundo in loly mentione. Porro & illud
 semen odoratum, subrubrumque, quod aliqui pro minori Car-
 damomo perperam vsurpant, seplasiarjs Nigella citrina voca-
 tum, Melanthij genus est: quippe ipsa seminis forma, odor, ac
 sapor nihil prorsus à Melanthio discrepant. Verum si modo in
 aliquo disident, color est, qui in altero niger, in altero vero
 subflauus conspicitur. Quo fit (quod etiam superius de Cumi-
 no differentes diximus) vt magna in errore versentur Mona-
 chi illi, qui in Mesuem commentarios edidere, quod prater ra-
 tionem asserere sint ausi, Nigellam subflauam, nil aliud esse quàm Ca-
 minum syluestre primo generi à Dioscoride assignatum. Porro
 [Pseudomelanthium excalfacit, attenuat, aperit, abstergit &
 resoluit] semen in farinam tritum, & ex melle illitum, lenti-
 gines, albos & maculas cutis quascunque delet, & ventris a-
 nimalia pellit, tampusum, quam ex bubulo felle, & aceto
 ventri illitum. Vrinam ciet & menses. Melanthij meminit Ga-
 lenus lib. 7. simplicium medicamentorum, his verbis: Melan-
 thium excalfacit, atque desiccatur tertio ordine. Videtur etiam re-

Fuch. error
Pseudom.

Lolium statu
entis.
Cardamoni
minoris no-
minis vsurp.

Monachorum
error.

Melanthii vi-
res ex Gal.

* IV. NIGELLA CRE-
tica.*



in linteo adnotum, atque assiduum olfactum. Quin etiam si intro
 in corpus sumatur, vel maxime status extinguit. Hinc constat
 essentia ipsum esse subtilis, & ad vnguem à caliditate ela-
 borata, propterea sanè etiam amarum est. Ostensum vero in
 quarto horum voluminum est, quod cum ad extremam tenui-
 tatem, atque elaborationem terrena pertingit substantia, a-
 mara proueniat qualitas. Itaque mirum non est, si lumbricos in-
 terimat non esum modo, sed etiam foris ventri impositum. Si-
 quidem & id prestare posse saporem amarum monstratum est.
 Neque sanè etiam mirandum, si lepras, clauos, myrmecias eici-
 at, ei præsertim, qui in superioribus libris comprehensorum
 haud est immemor. Sic vero etiam orthopneam iuuat, et men-
 ses prouocat, qui vtrique ob crassitatem, aut viscositatem humorum
 retenti fuerint. In summa, vbi incisione, extersione, desiccati-
 one, excalfactione est opus, præsantissimum id remedium est.

Nomina.

Melanthium quod Melanspermium Hippocra-
 ti, à nigro seminis colore, Latinis Nigella: alia satiuua
 est, alia syluestris: satiuua vel simplici & quidem
 magno, vel paruo flore, vel pleno flore: semine i-
 tem nigro, subflauo, luteo. I. Nigella flore mi-
 nore simplici, C. B. Nigella hortensis, Trago. Ni-
 gella satiuua, Lon. Nigella, Cord. in hist. Ges. hor. Ni-
 gella altera, Casalp. Melanthium satiuuum, Matth.
 Dod. gal. Lac. Cast. Tab. Lugd. Melanthium pri-
 mum, Fuch. icon. Melanthium, Dod. fol. Lob. cui &
 Nigella Romana odora: Gith Anguillaræ. Hoc semi-
 ne est nigro, pallide flauescente, luteo, rarius candi-
 do. II. Nigella flore maiore simplici, C. B. Nigella
 Damascena, Trago. Cord. in hist. Ges. hor. Nigella
 hortensis altera, Fuch. in fol. Nigella satiuua secunda,
 Lon. Nigella, Cord. in Diosc. Melanthium syluestre,
 Matth. Lac. Lob. Lug. Melanthium alterum Dama-
 scenum, Fuch. in icon. Melanthium Damascenum,
 Dod. gal. & fol. Cam. Melanthium agreste Tabernæ.
 montano. III. Nigella aruensis, C. B. Nigella syl-
 uestris, Trago, Lonic. Gesnero. hor. Camerario
 Nigella Cornuta, Cordo in historia Nigella

Nigella cretica

vulgò dicta, Cæs. Melanthium sylvestre alterum, Matth. Lugd. Melanthium sylvestre, Fuch. in folio-
 Dod.galli.& fol.Cast. Melanthium sylvestre alterum, capitulis reflexis Aquilegiæ, Lob. Melanthium a-
 greste alterum, Tab. Cuminum sylvestre alterum, Fuch: in icon. Cord. in Diosc.IV. Nigella Cretica C. B.
 Hæc ex radice tenui, longiuscula, parum fibrosa, caulem emittit cubito minorem, striatum, viridem, gla-
 brum, procumbentem, in alios brachiatum: folia circa radicem per terram sparsa, alterius nigellæ modo
 in lacinas diuisa, quæ verò in caulis summo, oblonga, tripartito diuisa vt in Nasturtio, latiora & longiora
 reliquis Nigellis, ex virore nigricantia: flos vnicus cuilibet cauliculo infidet, subcæruleus, ex quinque
 foliolis compositus, forma Nigellæ aruensis, quo tamen multò minor, respondens: cornicula succedunt
 quina sena simul iuncta, quæ in longa cornicula instar cornuum hirci intorta finiunt: semen minutum
 nigricans. Huius semen ex Creta primò allatum, & à Doctore Leonhardo Doldio vnà cum planta transf-
 missum. V. Lychnis segetum maior. C. B. Nigella, Brunf. Githago, Trag. Pseudomelanthium, Matth.
 Lac. Lon. Lob. Cast: Lugd. Thal. Lolium recentiorum, Fuch. Cord in Diosc. Anthemum, Dod. gal.
 Anthemum foliosum Theophrasti, Ruell. Nigellastrum Dod. fol. Lychnis alia inter triticum, Cæs. Lych-
 nis aruensis Tabernæmontano.

† Orib. μά-
 σίερον.

† Orib. add.
 φυλλώδες

καλείται μα

γύδαρι. i.

folioso quod

magydaris

vocatur.

a Meum

βάμματα. i.

intinctus.

b Meum

ὑπερυθρος. i.

subrufum.

c Me. & Dra-

λυσοδ'ήκ-

των δ'ε' ὄφρ-

λεῖ ἐπιτιθέ-

μενος τοῖς

τραύμασι. i.

in rabidi ca-

nis morfu iu-

uat vulneri-

bus imposi-

tus.

d Meum

προκατά-

σχθέντων. i.

prius scarifi-

catis.

e. Meum.

σαρκώματα.

i. excrecen-

tem carnem.

f. Meū addit.

ἐπι ἡμέρας

τινας. i. per

aliquot dies.

g. ἢ μέλιτι ἢ

ὕδατι. i. aut

melle, aut a-

qua.

Laserpitium

seu Laser non

esse Belzoi-

num.

Strabo de
 Silphio.

Cyrenaicus
 succus Plini.

Σιλφίω.

LASERPITIVM.

CAP. LXXVIII

Laserpitium in Syria, Armenia, Media & Lybia nascitur: caule ferulaceo, quem † masperum vocant:
 foliis apio similibus, lato semine. † Radix exalfacit, in cibis agrè concoquitur, vesicæ noxia. Sugilla-
 tis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato medetur: ischiadicis conuenit cum irino, aut cy-
 prino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici & aceto decocta.
 Venenis pota resistit: os commendat, a cibis, aut sali permista. Laser è radice, atque caule scarificatis col-
 ligitur. Præfertur autem b rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suauis
 gustu, quod dilutum facillè albescit. Cyrenaicum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet: blan-
 dissimo odore, adeò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum, & Syriacum minus viri-
 bus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequàm siccescat, adulteratur sagapeno,
 aut fabæ lomento, quod maleficium deprehenditur, gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui sil-
 phion, radicem magudarin, & folia malpeton vocauerunt. Efficacissimum laser, mox folia, postremò cau-
 lis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere, & vino alopecias sanat: oculorum
 aciem exacuit: & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore indi-
 tur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, & ficis coctis in posca, os colluitur: iis pro-
 dest, quos c bestia in rabiem efferata momorderit, vulneribus immissum. Valet aduersus venena telorum,
 & animalia omnia, quæ virus ei aculantur, potum, aut illitum: scorpionum plagis oleo dilutum circumli-
 nitur: gangrænis d præcoercitis immittitur: & cum ruta, nitro, & melle, vel per se carbunculis. Clauos
 callosq; prius circumtafos vellit, cerato, aut aridorum ficuum carne præmollitum. Recentes lichenas ex
 aceto sanat: & e excrescentia in carne, polyposq; , si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut arugine
 illinatur: fextuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritiis opitulatur: grauem, subuoq;
 irraucescentē vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: vnam illitum cum melle reprimit an-
 ginis ex aqua mulsa vtilissimè gargarizatur. Vescentes latiore colore mangonizat: tussi commodè in sor-
 bili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis.
 Horrores discutit cum vino, pipere, & thure potum: neruorum contractionibus, opisthotonicisq; da-
 tur oboli pondere deuorandum: hærentes gulæ hirudines gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus
 coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere, & myrrha potum:
 coeliacos adiuuat, in acino vix sumptum: cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis, ruptisq;
 prodest, ad potiones resoluitur amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane. g Foliorum succo eadem præ-
 stantur, sed multò inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum vor
 retunditur. Eo cum lactucis vtuntur, exitq; in vicem eruca. Fertur & altera Magudaris in Lybia nasci,
 radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris, & fungosa, ex qua non proficit succus. Eiusdem cum la-
 serpitio facultatis.

Credidimus iam dudum Laserpitij lacrymam nihil aliud esse, quam illud iucundi ac suauis odoris gummi, quod pha-
 macopæis atq; vnguentarijs Belzoinum nominatur. Neq; certe hæcenus præter rationem in ea persistimus opinio:
 nam cum id mihi deprehenderetur odoratum, rufum foris, intus candidum, translucens, & quod dilutum albesceret,
 non poteram non adduci, vt crederem hoc esse legitimum Laser. Huc illud quoq; accedebat, quod complures erant viri do-
 cti & rei medicæ studiosi, qui idem mecum sentiebant. Verum cum postea cepissem Laserpitij ac Laseris historiam dili-
 gentius examinare, atq; plura ex Strabone, Theophrasto, Dioscoride, Galeno, & Plinio collegissem, qua prius nostra opi-
 nioni aperte aduersari videbantur, facile in aliam deductus sum sententiam: etenim sic animum induxi meum, vt malum
 veritati cedere, quam pertinaciter (quod multi faciunt) falsa tueri. Strabo itaq; libro vltimo Geographiæ testatur, Sil-
 phium suo vsq; tempore Cyrenis defecisse his verbis. Cyrenis finitima est regio, quæ Silphium gignit, & Cyrenaicum suc-
 cum, quem Silphium posterius effert. Id propemodum defecit, cum aliquando barbari odio quodam ingruissent, ac radices
 eius penè omnes eruisent: Fuerunt hi Nomades viri: hæc ille. At Plinius Cyrenaiici succi defectum non in barbaris vt Stra-
 bo, sed in publicanos quosdam refert lib. 19. cap. 3. vbi de eo ita scribit: Ab his proximum dicitur auctoritate clarissimum
 Laserpitium, quod Græci silphion vocant, in Cyrenaica prouincia repertum: cuius succum vocant Laser, magnificum in
 vsu, medicamentusq; & ad pondus argentei denarij pensum. Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam publi-
 cani, qui pascua conducunt, maius itæ lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus autem canis nostra re-
 pertus memoria, Neroni principi missus est: hæcenus Plinius. Huius verò cum Theophrasto sermè conuenit, quod hic scribit
 pecus silphio purgari, pinguescereq; vehementer, & carnes mirabilem in modum suaves reddi. Cum igitur Strabon &
 Plinij testimonio constet, Silphium Cyrenis eorum vsq; ætate defecisse, neq; ibi inueniri, nil mirum videri debet, si nostra
 etiam tempestate defecerit, atq; nullum iam ad nos aduehat, quod legitimum dici possit. Quare id gummi, quod septu-
 sies Belzoinum dicunt, meo quidem iudicio, verum silphij liquorem mentietur potius quàm sit. Sed his illud quoq; addi-

quod Strabo auctor est, Silphium adeo Cyrenensibus olim custodibus fuisse asseruatum, ut inde aliud deferri non potu-
 rit, nisi clam à mercatoribus qui vinum asportabant. Plinius item Silphium ad pondus argenti pendì solitum tradit:
 quoniam & rursus factum fuisse à Casare, ut illud inter aurum argentumq; protulerit ex arario. Ex quibus omnibus haud in-
 firmum argumentum sumi potest, quod Belzoinum nostrum non sit Silphij liquor, quandoquidem id quotidie copiosum impor-
 tatur non solum in Italiam, sed in vniuersam ferè Europam. Ad hac càm Dioscorides Cyrenaico succo vim acrem tribuat,
 atq; Galenus eundem & calidissimum, & maximè tenuium partium faciat, non equidem video, quomodo vulgare Bel-
 zoinum possit legitimum Laser exprimere: quoniam illud nullam prorsus gustantibus acrimoniam relinquit. Præterea
 validi cortices, qui plerumq; Belzoino implicati reperiuntur, arguunt id arboris magna potius, quàm ferulacea planta lá-
 crimam esse. Quod etiam nuper retulit mihi quidam medicus Cyprius, qui Belzoinum nostrum in Cypro ex arbore satis
 præcisa manare affirmavit: vbi tamen Silphium nasci qui memoria prodiderit, hætenus inueni neminem, quemadmo-
 dum neque in Ionia, neque in Peloponneso id gigni, sed prope Cyrenas tantum, literis mandauit Hippocrates. Atqui illud
 nobis obicit aliquis, quod Laserpitium non modo in Cyrenensium agro quondam prouenerit, sed etiam (ut scribunt Theo-
 phrastus, Dioscorides & Plinius) in Perside, Media, Syria, & Parnaso monte: & quòd ubi id ad nos aduehi possit. Nos huic
 ita facile respondebimus, quod Silphij illius liquor ad nos adferatur quidem, sed qui foetidus sit, virosq; odor: atq; eum ef-
 fe dixerim, quem officina medicorum assam foetidam vocant. Namq; Laser (ut Dioscorides testatur) Medicum, & Syria-
 cum nimis viribus valet, & magis virosam reddit odorem: quin etiam, eodem teste, Laser omne antequàm siccescat, ad-
 alteratur sagapeno, aut sub lomento, id quod post ipsum scriptis tradidit Plinius libro superius citato. Quocirca mihi qui-
 dem videtur non temerè colligendum esse, quod præstantissimum Laser, quale Cyrenaicum habebatur, à nobis omnino de-
 sideretur. Cæterum quid veteribus fuerit gummi illud elegantissimum, quod Belzoinum apellant, mihi hætenus incomper-
 tum est. In qua certè re non possum eorum opinioni subscribere, qui id putant esse probatissimam myrrham. Hac siquidem
 quæ optima sit (ut Dioscorides inquit) præter alias notas esse debet vndiq; concolor, quæ confracta venas vnguium modo
 candidas & laues ostendat, minutis glebis, amara & acris, quas tamen notas in Belzoino haudquaquam reperies. Nam
 et vndiq; maculis conspergatur, tamen fractas amygdalas representat magis, quàm vnguium quorumuis imaginem.
 Quam & macula illa tam interiores, quàm exteriores partes obsident, adeo ut Belzoini gleba nihil aliud referat, quàm de-
 lectatium amygdalarum acruum, copioso melle exceptum. Adde insuper, quòd nusquam, quantum equidem inuene-
 rim, memoria proditum est, myrrham in Cypro & Syria suis è plantis emanasse, sed in Arabia duntaxat (ut perhibent
 Theophrastus, Dioscorides, & Plinius) in syluis, in quibus thus etiam prouenit: quanquam Plinius myrrham quandam
 ex India adferri tradit, quæ omnibus myrrhæ generibus deterior est. Sed quoniam non iniucundam, quamuis longam, de
 Laserpitio historiam tradidit Theophrastus libro 6. cap. 3. de plantarum historia, ideo eius verba hic subiiciam. De Laser-
 pitio, inquit, nunc indicandum est. Laserpitio radix multa, crassaq;: caulis quantus ferula, & crassitudine ferè proximus:
 folium, quod massetum vocant, apio simile est: semen latum, foliaceum, quale quod folium appellatur: caulis annuus,
 sicut ferula. Ergo vere ineunte massetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitq; vehementer, & carnes mirabilem in-
 modum suas redduntur. Posthac caulem edit hominum cibo idoneum omnibus modis, elixum, assumq;: corpora eo quo-
 q; purgari ferunt, quadraginta diebus. Succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice: qua de causa alterum scapa-
 rium, alterum radicarium vocant. Radix nigro cortice tegitur, eumq; detrabere solent. Sunt veluti certa mensura caden-
 de radice, quibus quantum conferre putetur ad futuram casuram reseruantes, reliquum abscindunt. Nec enim deuie,
 neq; plus constituto cadere licet, corrumpitur enim, putrescitq; si diu mansit. Preparant id, consciuntq; in Pyreum por-
 tum aduectum hoc modo. Cum in vasis coniecerint, farinamq; admiscuerint, quatiunt longo spatio temporis: hinc etiam
 colorem capessit, & conditum iam incorruptum perdurat. Preparatio, casuraq; ita se habet. Locum Aphrica amplum oc-
 cupat, ampliorem quàm quatuor stadiorum millia in hortis Hesperidum ferunt. Sed maiorem partem colligi apud Syrtes.
 Peculiare huius culta fugere loca proditur: quamobrem, si colatur mitescatq; folium, deuieat, atq; omnino degenerat, ut-
 pote natura cultura aspernans, ferocitatisq; constans vernaculum. Cyrenenses annis septem prius, quàm ipsi urbem habi-
 tarent, Laserpitium extitisse affirmant. Habitant verò annos maximè trecentos vsq; ad Simonida Athenis magistratum:
 illi sic referunt. Alij radicem Laserpitij cubitalem fieri tradunt, aut paulò maiorem: hanc in medio extuberare in caput,
 quod sublime penitus extat, ut fere super terram esse appareat. Vnde primum quod lac appellant, erumpit: dein caulis as-
 surgit, ex quo magydaris, & quod folium dicitur, exeunt. Folium id semen est, quod cum auster ingenuè post caniculam fla-
 uerit, discutitur: atq; ita Laserpitium nascitur, eodemq; anno radix consummatur, & caulis. Sed hoc haud quicquam peculi-
 are notetur: nam alijs quoq; idem tribuitur, ni dixeris, quod discussum id protinus nasci potest, ortum peculiarem sorti-
 ri, supra dictisq; propterea diuersum accipi posse. Ad hæc circumfodiendum id annum censent. Nam si relinquantur semen
 omne, caulemq; totum proferri, & deteriora tam hæc, quàm radicem reddi existimant: defossa autè fieri meliora, scilicet solo
 subacto, beneq; giuto. Sed huius contrarium illi volunt, qui culta recusare id inquirunt. Mandi quoq; radices in aceto recens
 decimas referunt. Folium colore aurum emulatur. Contrarium etiam, quòd pecora folio estato purgari minimè indicant.
 Nam & vere, & hyeme, pecus ad montem dimitti affirmant: cibus non solum hoc, sed etiam altero quodam abrotono si-
 mili administratur. Vim ambo calfactoriam sortiri planè videntur, & purgare quidem nequaquam valere: exicare au-
 tem & concoquere vnice posse. Quod si qua pecus agrestis, aut aliàs minus bene se habens ingressa sit, mox eam sanari,
 aut emori aiunt, sed magna ex parte posse seruari. Hæc igitur vtro tandem sint modo, querendum. Quod vero Magydarim
 vocant, nimirum à Laserpitio differt: tenerius enim, minusq; vehemens, & sine Lasere est, nec non & aspectu manifesta
 experto homini constat. Nascitur in Syria: nam apud Cyrenam, & monte Parnaso largè prouenire eandem affirmant.
 Sed quidam Laserpitium id appellant. An culta id quoq; modo Laserpitij fugiat, querendum. Quin & si quid simile, aut
 proximum habeat, ad folij, caulisq; rationem, & si quam villo pacto emitat lacrymam, id inuestigandum. Ergo naturam
 ferulaceam, hisce contemplari oportet: hæc Theophrastus. Meminit Galenus Laserpitij lib. 3. simplicium medicamento-
 rum, sic inquit: Laserpitij saccus calidissimus est. Verum enimvero & folia, & caulis, & radix sat strenuè excalsa-
 ciunt. Sed omnia statulenta magis essentia sunt, ac proinde concoctu difficilia. Foris tamen imposta corpori efficaciora,
 & omnium potissimum succus, admodum trahentem facultatem possidens. Attamen & excrescentias amolendi, &
 liquandi vim quandam, propter prædictam eius temperiem obtinet. Laseris quoque mentionem fecit idem Gale-
 nus libro citato, sed antea seorsum, & sub absoluto ὀρεῖ, hoc est, succi titulo, ita scribens: Opus, siue succus Cy-
 renaicus quidem omnium & calidissimus, & maximè tenuium partium est: ac proinde omnium maximè dis-
 scuti: quanquam sanè & reliqui admodum calidi sunt, & spirituosi: siquidem plurima eorum pars essentia aerea
 est, & ignea. Porro complures habentur succi: quatuor namque radice incisa, aut caule, quod ex sectione crassum,
 ac len-

Belzoinum non esse Myrrham.

Laserpitii histor. ex Theophrasto.

Laserpitii vi- res ex Gal.

Nomina.

ac lentum effluit, succus est. Caterum specialius, & velut per excellentiam quandam Cyrenaicum ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum. Planta qua Græcis *σίλφιον*, Latinis *Laserpitium* appellatur: Mauritaniis *Sylphon*: Italis *Laserpium*. Eius caulis *μάσπετον* Græcis dicitur: Arabibus *Mascastes*. Folia verò quandoq; *μάσπετα* Græcè dicuntur: Arabice, *Amaden* & *Mascasten*. Liquor seu *Lacryma* Græcis *λάσπερος*, Latinis *Laser* nominatur. Radix *μαζύδαρις* Græcis vocatur,

* LASERPITIUM GALLICVM. *



απαχὺ τὰ ἐν
ἀνεύμονι. i.
crassa in pul-
mone hæren-
tia

Laserpitium ferulaceæ herbæ densatus liquor est & multis *Assâ*, detorto ex *Lafere* vocabulo, censetur: quidem aliis *Assâ* dulcis officinarum, quæ & *Benzoinum* dicitur: aliis verò *Assâ* foetida censetur: Alii verò *Benzoinum* arboris lachrymam, quod trium sit generum censent, quæ & Græcis & Arabibus fuerit indicta: alii *Benzoinum* Myrrham volunt, sed de his in nostris in *Dioscoridem* prælectionibus. Nunc de *Laserpitio*, quam *Masilia* habemus, cuiusquæ figuram adiecit. Ex radice magna *Ferulam* superante, cortice cinereo tecta, substantia alba, succo prægnante, pingui & odora, caules ferulæ crassitie & altitudine exurgunt, circa quos folia *Apii* palustris æmula, sed crassiora, rigidiora, nigrioraq; , aliquando profundius laciniata, vt ex adiecto ramulo (quem ex nostra depingi curauimus) colligere est: *Umbellæ* magnæ *Anethi* latitudine: sementum foliaceum, odoratum, buxei coloris. Hæc è regione *Masiliae* ad insulas *stachadas* peruenit, vt *Aduersaria* testantur. Appellamus *Laserpitium gallicum*: *Laserpitium*, *Silphium*, *Aduers.* *Lob.* *Lugd.* *Laserpitium Masilioticum*, *Tabernæmontano*.

Σαγάπενον SAGAPENVM. CAP. LXXX.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est. Quæ in *Mediana* nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter *laser*, & *galbanum* redolens: gustu acri. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis & ruptis: crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item contra neruorum resolu-

tionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu. In vnguenta probè admittitur: menses pellit, sed foetum exanimat, cum *hydromelite* potum. Prodest ex vino haustum, serpentium ictibus: olfactum et acetum vuluarum strangulatus excitat: oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur vt *Laser*, *ruta*, *aqua*, & *amaris amygdalis*, aut *melle*, aut *calido pane*.

Sagapeni cōsideratio.

Sagap. in Apulia.

Sagapeni vires ex Mesue.

Sagapeni vires ex Gal.

Sagapenum officina interpolato vocabulo *Serapinum* appellant. Caterum etsi eius adulterari frequentior, & communis ferè sit vsus: tamen *Venetis* præstantissimum quoq; venditur, idq; illi præcipuè comparant *Seplasiarij*, qui honorem *diuitijs* anteponunt. *Ferulaceas* plantas, è quibus *sagapeni lacryma* emanat, etiam in *Apulia* nasci auctor est *Musa Ferrariensis*: id quod equidem hætenus compertum non habeo. Ex orientabilibus siquidem regionibus allatum, vt constat, caterum præstat. *Arabica* familia auctores inter deiectoria medicamenta *Sagapenum* referunt: quanquam ea *Sagapeni facultas*, quantum extat, à *Græcis* silentio prætermissa est. *Sagapenum* itaq; (vt *Mesues* tradit) crassos, lentosq; humores deicit, crassamq; pituitam, & aquam intercutem educit. Porro facultate quidem propria cerebrum mundificat, ac neruos, crassosq; hæc excrementa detrahit. Confert item eorum morbis frigidis, nempe doloribus capitis diuturnis, *hemigræijs*, comitialibus, vertigini, *paralyti*, orisq; distentioni. Pectus valentissimè expurgat, eiusq; ac etiam lateris dolores tollit, præsertim si bibatur ex *helenij*, aut *rutæ decocto*. Foris emplæstri modo impositum, aut intus assumptum tussi diuturna vexata, ac difficulter spirantibus, opem maximam fert. *Aqua* intercute laborantibus singulare remedium est, si tamen *flaxis myrrhalanis* duplicato pondere additis exhibeatur. Discutit compaginum duritiam, emplæstri modo impositum, addito *acetum*, & *capparum succo*. *Rutæ succo*, & *auium rapacium felle* diutius maceratum, & in *collyrijs* additum, oculorum caliginem disijcit, aquamq; in eo destluentem cohibet. *Palpebrarum* item *hordeolos* vocatos sanat, si cum *acetum* superponatur. *Articularum compaginibus* quomodo libet admotum, dolores eorum mirificè sedat: quippe quoniam valentissimè humorum lentores in his cruciatus excitantes radicitus euellit, etiam si in *coxendicum aliarumq; partium* remotis, profundisq; locis delitescant. Potum, aut *clysteribus* inditum coli doloribus à frigiditate, ac flatibus prouenientibus maxime auxiliatur. Menses cit, sed foetum interficit, tam haustum, quam suppositum: contra vteri dolores, strangulatusq; prodest. *Ventriculo* tamen officit, verum noxa corrigitur *lentiscina resina*, & *Indica nardo*. *Sagapeni* meminit *Galenus* libro 8. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus disserit ijs verbis: *Sagapenum liquor est calidus, & tenuium partium, sicut & alij liquores. Sed & abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat, atq; extenuat. Quin & suffusionibus, & hebetudinibus oculorum, qua ob humorum proueniunt crassitiem, non malum est medicamentum. Porro planta ipsa, ex qua prouenit, ferula assimilis, imbecilla & inutilis est. Sane ipsa primùm Sagapenum appellatur: at liquor eius abusuè hoc nomen obtinet, ceu alia quoq; multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectus namq; sicut ipsum cognominare non Sagapenum, sed Sagapeni succum. Sagapeni plantam, etsi viderim appictam, & quodam in libro impressam, non libuit tamen eam hic excudere, quod nesciam an Mercator ille *Persa*, cui acceptam illam referunt, vera rei fabula, &*

Sabalosa natri. 527 ἰππύριον Græcis dicitur, quod Latinis etiam Sagapenum: Arabibus Sachabenigi siue Sechbenegi: Nomina Septentrionalis. pariter & Hispanis Serapino: Italis Sagapeno.

Sagapenum commendatur, quod pellucidum, foris rufum, intus cum frangitur candicantibus aut flauis guttis compactum, inter digitos si tractetur lentescit, medium inter Assam foetidam & Galbanum odorem emittens: quod ad liquida medicamenta aqua aut aceto, aut vino supra prunas incoctum, ut Assa resoluitur.

Euphorbium


EUPHORBIVM.

CAP. LXXX.

Euphorbium Lybica arbor est, ferulæ speciem habens, quæ in Tmolo iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos ventres elutos arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atque vase quodam in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus eiacularur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ventriculis concrefcit, atq; vitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adè vt quicquid ori obiciatur, planè Euphorbium relipiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libiæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit: potus, tota die exurit: quare melle collyriisq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus, squamas ossium eadem die eximit: verum eo vtentes, necesse est linamentis, aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molestiæ passuros, si incisa offetenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

* EUPHORBII TENELLA
planta. *

* ANTEUPHORBIVM. *



Non equidem dubitandum censeo, quin illud legitimum sit Euphorbium, quo passim officina vtuntur, cum tam gustu, quam olfactu acerrimum deprehendatur: ob cuius violentissimam acrimoniam nunquam, nisi inuito animo, à seplasiatis tunditur. Quandoquidem tametsi sibi nares, & os omni prorsus ingenio, gossipio, & linteis aqua rosarum madefactis muniant, tanta tamen est acrimonia vis tenuissima, vt omnibus vnà cum aere penetratis munimentis, in eorum tandem perueniat nares, vbi molestissimum excitat ardorem, qui non facile tollitur: quanquam etiam medicamentis admodum refrigerantibus succurratur. Quo fit, vt solertissimi pharmacopola baiulis, ac alijs victum quarentibus hominibus id muneris obeundum tradant: interim tamen certo sciunt, non absque conuicijs, & maledictis opus hoc ab illis peragi posse. Quamobrem mirum sanè non fuerit, si qui ab arbore recentem colligunt, eximium acrimonia feruorem expauescentes, e longinquo corticè feriant. Hanc plantã (vt Plinius quoq; testis est) adinuenit primum Iuba Lybiæ Rex in monte Atlante ultra Herculis colūnas, appellauitq; Euphorbiũ medici sui nomine, & fratris Musæ, à quo diuus Augustus fuit conseruatus. Euphorbij plantã nunquã mihi videre licuit, sunt tamẽ qui illã pingant, & à Saraceno acceptã scribãt: cui credam fortasse, si plantã viuã ostenderet, in qua Euphorbij nonnihil inesset. Euphorbio deiectoria inest facultas, cuius nomen, quod equidem inueneri in, meminere Dioscorides, & Galenus: tametsi eam minimè silentio inuoluerint Aëtius, & Actuari-

Euphorbii
consideratio.
Euphorbii
inuentio &
nomen.

Euphorbii vi-
res ex Actio
& Actuatio.
Ex Paulo.

Ex Mesue.

Euphor. quā-
do utendum.

Ex Galeno.

Nomina.

Actuarius, qui concordēs de eo his verbis differuerunt: Euphorbium non modò pituitam trahit, sed etiam aquam, hancq; validius educit. Est autem acerrimum omnium, quæ ego nouerim, ardentissimumq; propterea colicis, & ventrem frigidum habentibus datur, ceteros vehementer conturbat: sitim maximè ciet: Nonnihil ex odoratis seminibus, ei est commiscendum. Modus triobolaris, ex aqua mulsa. Præstat tamen cum melle cocto ipsum in catapotia redigere. Id quod etiam Paulus annotauit libro septimo, vbi inter ea Euphorbium recensuit, quæ aquam & pituitam deiciunt. Verum in simplicium censu Dioscoridem Galenumq; secutus, de hac deiectionis facultate ipse quoq; nihil memoria prodidit. Ceterum inter Arabes Mesues fufius Euphorbii vires tradidit in soluentium medicinarum mentione, vbi ita, ad sensum saltem scribit. Euphorbium gummi est, quod vsque ad excalfacit extenuatq;, vt in hoc cetera gummi genera præcellat. Excalfacit enim ordine quarto: quo fit, vt exulceret, ruborem inflammationemq; inferat, penetret, & violenter abstergat: Euphorbium noxiarum admodum est medicamentum, ita vt non sine labore, animi defectu, ac sudore frigidum aluum deiciat. Iocinori ob id, ventriculoq; sua ingenti acrimonia magnam infert noxam. Quapropter exhiberi minimè debet, nisi prius ijs commiscetur medicamentis, quæ acerrimam eius vim retundere valeant. Extrahit potum à profundis corporis partibus tum crassam, tum lentam pituitam, mundatq; compaginum cavitates à crassis contumacibusve excrementis, quæ in re omnium valentissimum est medicamentum. Nervos expurgat ab infarctis iam diu humoribus. Proficit ad hæc resolutis, conuulsis, stupidis, tremulis, orisq; distentionibus, & ceteris neruorum morbis à frigore obortis, si ex leucioj oleo laugatum exterius inungatur. Iocineri leniq; inunctum, mirificè eorum dolores tollit à frigore, & flatu prouenientes. Sternutamenta valentissimè cit. Occipiti autem confricatum, veteranos obliuiososq; iuuat. Aquam inter cutem facillimè extrahit duorum obolorum pondere potum. Sed drachmarum trium pondere haustum, (vt Serapio & Auicenna scriptum reliquerunt) potantem interficit, trium dierum spatio erosus ab eo intestinis, & ventriculo. Euphorbium, teste Mesue, quatuor edurat annis: neque eo prius utendum est, quàm annum integrum consenuerit, namq; recens ob ingentem acrimoniam reprobatur. Seruatur commodè milio aut fabis, aut lentibus sepultum. Euphorbii facultates paucis perstrinxit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Euphorbium caustica siue vrentis, & tenuium partium facultatis est, alijs succo similiter. Et lib. 2. de compositione medicamentorum localium, cap. 3. tradens curam hemicrania, idem de Euphorbia ita scribit: Porro de Euphorbii facultate iam mihi relatam est, quod citò exoluatur, quare in eiusmodi pharmaca non vetus conijcere oportet. Dictum etiam recens albidius esse: quod verò inueteratum est, flauioris aut pallidioris coloris reddi. Planta, quæ Græcis εὐφώβιον, Latinis item Euphorbium nominatur, quemadmodum succus eius: Mauritanis Euforbium seu Farbium. Italis Euforbio: Hispanis Alforuiam, Alforfion & Euforuo: Gallis Euphorbe.

Euphorbii tenellam plantam ex Dodonæo effigiatam adiecimus: folia illi sunt oblonga, crassa, virentia, rotunda, ac tereti figura, angulosa Cucumerem referentia, quæ angulis & eminentioribus & albicantibus spinis duplici ferè ordine donantur: ex quibus vulneratis, liquor acris & mordax, facileq; concrefcens effluit: fructum parit in trifido folliculo, ternis vtriculis coniunctum: femina vtriculis singula clauduntur, colore foris flaua, intus candida ac pinguis, gustu liquorem æmulantia, Cordo monente. Folium terræ commissum, instar Opontia, seu Ficus Indica, in plura multiplicatur, & radicè in obliquos ramos diuariatam demittit. Huius figuram Euphorbii nomine, Dod. fol. Lob. Lug. Tab. & Lonicerus proposuere. Eligere oportet grumos puros pellucidos, candidos aut flauos: quibus verò plantæ aculei permixti, reprobantur. Adfertur ex Africa syncerum, rarissimè adulteratum, gummi aut Sarcocolla, aut Tithymallorum liquore. Aduersus Euphorbii acrimoniam remedio fertur esse herba, quæ ex radice crassa, multis propaginibus donata, cauliculos complures emittit, rotundos, virentes, circa quos folia portulacæ, quæ succo lento & refrigerante turgent, Euphorbii ardorem retundente, quare ab effectu & contrariis facultatibus Anteuphorbii nomen accepit, vt videre est apud Dod. fol. Lob. Lug. & Tabernæmontanum: malè enim apud Castorem Durantem pro Euphorbio positum.

Χαλβάν.

GALBANVM.

CAP. LXXXI.

2 Meum
τα ἐπιπέλα. i.
serpentia.

Galbanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant. Maximè laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neq; valde humidum, neq; nimis aridum. Adulteratur faba fresca, resina & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositum vel suffitu. Lentigines aceto & nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, potum cum vino & myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus & furunculis: comitiales & vuluæ strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur. Si vratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. 2 Serpentes cum oleo, & sphondylis circumpositum necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditum, mitigat: vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaræ amygdalis, aqua aut ruta, aut calido pane, mulsa: aliàs meconio, ære vsto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum voles, in feruentem aquam demittito: namq; cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo, raroq; alligatum in fictili, aut ærea pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat, opertoq; vase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Galbani con-
sideratio.

Galbani vi-
res ex Gal.

Quamuis legitimum optimumq; Galbanum in pluribus Italia locis, præferrimq; Venetijs venale reperiat, id tamen quo passim officina vtuntur, nihil, vel sanè parum Galbanum refert, quod in laudatissimi genere à Dioscoride representatur. Siquidem illud non modò ab impostoribus adulteratum est, sed etiam lignorum ferularumq; ramentis, Lupulibus ac alijs compluribus recrementis vitiatum. Querant itaq; probi seplasiarj, quod optimum est: alij verò, qui parsimonia, ne dicam auaritia student magis, quàm honori, vt qui probatissimum vix vnumquam assequi possint, id saltem, quod impurum est, purgare deberent à Dioscoride edocti: quippe quod ea ratione facile ab aduentitijs sordibus expurgari possit. Galbani vires tradidit Galenus libr. 3. simpl. medic. sic inquit: Galbanum succus est planta ferulacea, mollienda & digerenda.

vendit. Fucitq; sanè ex tertio ordine ex calcificientium incipiente, aut secundo completo: in desiccando verò ex secundo in- Nomina. apicite. Id Græce γαλβαν. Latine Chalbanum & Galbanum appellatur: Arabicè Chene & Bezard: Italicè pariter & Hispaniè Galbano.

Galbanum liquor est, grumis flavis aut candicantibus compactus, substantia molli, pingui, digitis adhzrente, sapore amariusculo, odore graui. Eligendum purum, pingue, cum accenditur flammam nutriens, mediocriter viscosum, colore flauum, tale enim recens est.

Ἀμμωνιακόν.

AMMONIACVM.

CAP. LXXXII.

Ammoniacum ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice ag- a Meum sylim vocant. Probatur bene coloratum, ligni, & calculorum expers, a thuris similitudine, minutis λιθανωτίζον glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus τοῖς χάνδροις thrausam, id est friaturam appellant, quod verò terram, & calculos collegit, b phryama. Gignitur in A- ἢ ἀλιθεῖ. i. phrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calcificat, tubercula, granum thu- duritiasq; discutit, potum aluum soluit, partus extrahit: lienem consumit, drachmæ pondere haustum: tis referens articulorum, coxendicumq; doloribus liberat: Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus: non lapido- item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptissanæ succo sorbeatur. Cruen- b Meum tam vrinam pellit, albugines oculorum abstergit, genarum scabritiam absumit: tritum autem cum aceto φύραμα. i. & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat: discutit tophos, qui in artubus concalluerunt, cum mixturam. melle, aut cum pice illitum. Lasisitudines, & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, & cy- prino oleo, vice acopi.

Ammoniaci lacrymam officina, mutata vna litera, Armoniacum vocant: cuius tamen syncerissima parum ad nos Ammoniaci conuehunt, qui ex Alexandria Aegypti cum mercimonijs Venetias redeunt. Quandoquidem rarissimum Ammonia- consideratio. cum visitur, quod suis minutis glebis thuris referat. Nam omne ferè, quo officina vtuntur, picea resina modo in massam compactum cernitur, impurum, ac quam plurimis impostorum adulterijs vitiatum. Vt hinc facile dici posse putauerim, hoc vel illegitimum, vel saltem deterius esse, idq; fortasse, quod Dioscoridi phryama nuncupatur. Cuius etiam meminit Ex Plinio. Plinius lib. 12. cap. 23. vbi de Ammoniaco ita scribit. Ergo Aethiopia subiecta Aphrica Ammoniaci lacrymā stillat in arenis suis. Inde etiam nomen ab Ammonis oraculo, iuxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant, resina modo, aut gum- mi. Genera eius duo, thrauston masculi thuris similitudine, quod maxime probatur: alterum pingue, & resinofum, quod phryama appellant: hæc Plinius. Caterum Ammoniaci vti sunt antiqui (vt Paulus est author) in sacrificiorum odo- rantis, ac suffimentis. In quem sanè vsus illud ab ijs receptum fuisse conijciendum est, quod electissimum, & thuri per- simile extitit. Huius rei illud maximo est argumento, quod ab ipso Paulo, itemq; Aëtio in suis medicamentis Ammonia- cum thymiana, hoc est, suffimentum cognominatur, quasi Ammoniacum præstantissimum ita intelligere voluerint. Ammoniaci Ammoniaci meminit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum sic inquit: Ammoniacum liquor est ferulæ cuiusdam. vires ex Gal. Hoc habet emolliendi facultatem intensam, adeo vt & articulorum tophos dissoluat, & lienes induratos sanet, & chæ- radas discutiat. Quod Græci ἀμμωνιακόν, Latini item Ammoniacum dicunt: Mauritanii Raxach, sine Assach: Itali Am- Nomina. moniaci & Armoniaci: Hispani Aguaxaque, & Armoniaque.

Ammoniacū seu gutta Hammoniaca, densis solidisq; grumis in massas, Thuris non dissimilibus, com- pactum est, coloris ruffi, aut in fusco flauo, intus candidi, nitidum, splendens, Galbanum odore referens, amarum. Eligendum syncerum, purum, maioribus grumis, foris flavis intus candidis, & manu tracta- tum cum lentore mollescens, accensum in plures splendidas micæ dissiliens.

Σαρκοκόλλα

SARCOCOLLA.

CAP. LXXXIII.

Sarcocolla lacryma est arboris in Perside nascentis, a pollini thuris similis, b rufa, gustu amara. Vulne- ra glutinat, oculorum fluxiones inhibet: emplastris inferitur. Adulteratur admisto gummi.

Lacrymam hanc Sarcocollam dixerunt Græci, quoniam sicuti glutinum lignum, ita hæc sauciatam, exulceratamue corporis carnem agglutinet. Quæ autem ad nos aduehitur, non omnis legitima est: quippe quod ea plerunque (vt de alijs quoque pluribus lacrymis, resinis, & liquoribus fieri superius diximus) gummi, & alterius generis lacrymis adulte- rata deferatur, & talis in officinis inueniatur. Verum fraus gustu facile apprehenditur: quandoquidem quæ amara non est, adulterium sensit. Plin. lib. 13. cap. 11. albam ceteris prætulit, sic inquit: Fit & ex Sarcocolla (ita vocatur arbor) gummi vtilissimum pictoribus, ac medicis, simile pollini thuris: & ideo candidum, quàm rufum melius. Et lib. 24. cap. 14. idem ita scribit. Sunt qui & Sarcocollam spinæ lacrymam putent, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dul- cem. Cum vino tusa sistit fluxiones, illinitur infantibus. Vetustate & hac maxime nigrescit: melior quò candidior: hæc Plinius. Qui tamen in Sarcocolla historia à Dioscoride, & Galeno maxime dissentit, cum hi Sarcocollam gustantibus amaritudinem relinquere asserant, ille verò contra dulcedinem. Vidi Sarcocolla arboris imaginem ab Andrea Marino medico insigni appictam in eo Mesuis libello, qui de aluum ducentibus medicamentis inscribitur. Eam cur probem, aut improbem sanè non habeo, cum mihi non abs re sit ambigendum an Mercator ille Persa historiam aut fabulam attulerit. Sarcocolla Mauritanis pituitosas cruditates, ac crassos, & glutinosos deijcit humores, præsertim qui in compaginum, & Sarcocollæ vi coxendicum cavitatibus delitescunt. Cerebrum mundat, item nervos, & pulmones: proinde tussientibus, & difficulter res ex Arabi- spirantibus auxiliatur. Est etiam ex medicamentis, quæ senes iuuant, præcipuè pituitosos. Caluescunt tamen, qui frequen- bus. tim ea vtuntur. Præstat mirum in modum ad oculorum albugines, nubeculas, cicatrices, & id genus impedimenta, si in cratere vitreo asinino lacte maceretur quinque diebus, interea tamen nouum lac quotidie est infundendum, priore effuso. Valeriana præterea penicilla hydromelite prius madefacta, ac inde Sarcocollæ puluere circumlita auribus exulceratis vri- liter int-

ἀλιθεῖται ὁ μικρῶ. i. thu- ri paruo. b Meum ἢ τοῖς χάνδροι. i. subrufa.

Sarcocollæ confid.

Ex Plinio.

Sarcocollæ vi res ex Arabi- bus.

liter imponuntur. Cruentis vulneribus, ac diuturnis vlceribus mirifice medetur, quippe qua proprio suo munere ea à foribus mundet, carne repleat, cicatriceq; obducatur. Aluum tardè deicit, perturbatq; eos, quorum ventri ulius bile redundat, quare cauendum est, ne ijs exhibeatur. Roboratur eius deiectoria facultas, gingibere, & cardamomo additis. Hac ex Arabibus deprompsimus, qua sanè tam antiquis, quam recentioribus incognita fuerunt, utpote qui ea nusquam, quod equidem legerim, scriptis tradiderunt. Sarcocolla vires retulit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit. Sarcocolla lacryma est arboris persica, mistam vim habet ex emplastica quadam substantia, & paucula amara. Itaque citra morsum desiccatur, ac proinde glutinare vulnera valet. Lacryma qua σαρκόκωλλα Græcis, Sarcocolla item Latinis, & Italis appellatur: Arabibus Ansarot, Anazaron, seu Auzurur: Hispanis Lancarotes: Gallis Sarcocolle.

Sarcocolla lachryma est ruffa aut candicans, minutis veluti friatis grumis constans, amara, acris, nanquam, cum deglutitur prouocans, glutinosa, in aqueo humore dissolubilis. Eligendum rarum veluti spumosum, candidum (ruffum enim inueterascentis indicium est) amarissimum, glutinosum.

Γλαυκίον.

GLAUCIUM

CAP. LXXXIII.

Glaucium succus est herbae, quæ ad Hierapolim Syriae nascitur, foliis serè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram Iparis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili, semifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, vsq; dum flaccescant: deinde contusis succum exprimunt. Cuius est vsus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

Glaucii consideratio.

Glaucium medicorum, & officinarum vulgo, qui barbarorum, & Arabum nomina usurpare solet, Serapionis, & Auicenna modo, Memithe dicitur. Id autem, quo passim seplasiarij vtuntur, meo quidem iudicio, verum sincerumq; Glaucium est: quippe quod omnibus serè notis, & facultatibus legitimo respondeat. Præter id enim, quod factio periculo, oculorum vitijs opitulatur, forinsecus rufescit, intus verò croceo colore spectatur, & gustu amaro sentitur cum quadam graueolentia: tamen si pharmacopolas nonnullos quandoque deprehenderim, qui è maioris chelidony succo Glaucium conficiunt. Sed animaduertendum est, quod in Serapionis codice, præter proprium Memithe caput, quod Dioscoridis est Glaucium, legitur etiam in capite de Curcuma (nisi fortasse interpretis fuerit lapsus) Chelidonium minus vocari Memithe. Quod in Serapione vel interpretis, vel alterius culpa, mendum subsit, inde mihi quidem orta est suspicio maxima.

Memithe.

Glaucium ex Chelidonia.

Glaucii vires ex Galeno.

Nomina.

quod Dioscorides, cuius verba ad vnguem refert Serapio, Glaucij non meminere in Chelidonyjs. Quo factum est, vt illi Seplasiarii deprauata Serapionis lectione decepti, in hunc & alterum errorem inciderint: quod non solum ex chelidonyjs suum Glaucium eliciant, sed etiam maius chelidonium minoris loco sumant, quandoquidem illud succum croceum mittat Glaucio similem. Glaucij facultates memoria prodidit Galenus lib. 6. simp. med. sic inquit: Glaucium adstringit cum quodam fastidio. Tum adeo manifestè refrigerat, vt solum saepe erysipelata, vti que si valentia non fuerint, curare possit. Mistura eius composita est ex aquea terre, q; substantia, vtraque sanè frigida, verum non summè, sed ceu aqua fontana. Γλαυκίον sic Græcè, vt etiam Glaucium Latine dicitur: Arabicè Memithe.

Κόλλα.

GLVTINVM.

CAP. LXXXV.

Glutinum, quod xylocollam, alii taurocollam vocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis coriis conficitur. Id candidum est, & translucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto impetigines, leprasq; cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum, illitumque pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle, cum aceto madefactum.

Ίχθυόκολλα.

PISCIVM GLVTINVM.

CAP. LXXXVI.

Piscium gluten, venter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefcit. Vtile emplastris capitis, & leprarum medicaminibus, & tetanorthris, quæ cutem faciei erugant, & extendunt.

Glutini consideratio.

Glutina libræ.

Nomina.

Nemo est, qui taurinum, & piscium Glutinum non cognoscat: quare hac in re, non pluribus verbis opus est. Verum sciendum, quod Glutinum taurinum hac ætate non modò è taurinis corijs conficitur, sed ex omnium quadrupedum pellibus. Huius neque alterius non reperio meminisse Galenum in simplicium censu: quanquam inibi lib. 7. illius glutinis librarij mentionem fecerit, quod ex polline farina, & muria paratur, sic scribens: Gluten, quod ad libros præparatur ex similagine, & garo, emplastica concoctoriaq; facultatis est, quibuscumq; ipsum partibus illinas. Ceterum illud gluten, quod è piscibus fit, inter cetera simplicia Paulus quidè retulit, sed ea tantum serè de eo scribit, qua Dioscoridis accepta referri possunt. Id græci κόλλα, Ίχθυόκολλα, & ταυροκόλλα vocatur, quod Latinis Gluten & Glutinum: Italis Colla di carniccio: Hispanis Colla & Grudel. Quæ verò Græcè Ίχθυόκολλα Piscium Glutinum Latine dicitur: Italicè quemadmodum & Hispanicè, Colla di pesce. Arabicè vtrumque gluten Zire, seu Gara nominatur: Germanicè Leim: Gallicè Colla.

Ίξω.

VISCVM.

CAP. LXXXVII.

a Meum

i. υπόζαυθος. i. subflauum.

b Meum

i. επιείνης

i. τλω δύναι

i. μιν αὐτῶν. i.

vires ipsorū

intendit. Idē

habet.



Vicum optimum recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut furfurosi conceptit. Fit ꝑ acinis in quercu nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisq; aliis arboribus: quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturitatem perducit, cum resina & pari ceramistum: epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera, abscessusq; quos cacoethes vocant, ex thure mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, & impositum absomit: cum sandaracha, aut auripigmento illitum, vngues extrahit: mistum cum calce, & vini facie, suam vim intendit.

Viscum

VISCVM.

* VISCVM POLYCOC-
con Camerarii. *

Viscum album
Camerarii



Viscum planta est brevis, ramusculis in crucis modum prodeuntibus, folijs binis in ramusculorum summitatibus vtrin-
q; emergentibus, oblongis linguarum instar, crassis, solidisq; colore submelino. Baccas fert copiosas, pisorum magnitu-
dine, albicantes, tenui tunica obductas, substantia intus tenaci, glutinosaq; ac molli, in qua semen est paruum. Viscum fit
pluribus ac diuersis modis: verum omnium praestantissimum est, quod e granis in quercu nascentibus conficitur. Huius pra-
ter id, quod inualidum in pyris, malisq; nascitur, ingens in Hetruria prouentus. Siquidem inibi non modo in quercu lau-
datissimum prouenit, sed etiam in cerro, ilice, & castanea, in nostris praesertim maritimis Senensibus, vbi vastissime assur-
gunt syluae, quae non paruo pretio vsolocantur, qui viscum efficiunt. Scandunt autem illi arbores inmensas, non sine magno
vita suo periculo, saepiusq; funibus adalligati id muneris in aere pendentis obeunt. Grana, quae legerunt, in aqua decoquunt,
donec destrumpantur: postea contundunt, & tamdiu lauant in aqua, quousq; surfuracea excrementa eximant. Refert Pli-
nius, nasci Viscum in quercu tantum, robore, ilice, syluestri pruno, terebintho, pinu, & abiete. At in Hetruria gignitur
etiam in castanea, quod optimum est, malo, ac pyro, non tantum syluestri, sed etiam domestica, quamuis penitus inutile.
Visci maxima Hetruscis utilitas est: nam praeter eius vsum in aucupijs, quibus mirum in modum delectantur ob ingentem
turdorum copiam, qui autumnii tempore, in syluis quibusdam ex iuniperis arte constructis, eo capiuntur, id etiam in pri-
mis utile est vitibus muniendis, ne prima germinatione ab erucis, quibus omnia scatent, gemma deuorentur. Siquidem
agricolae visco vites circumdant, quo postea erodentes vermiculi, qui tam praestantissimo laticis insidiantur, e terra
sursum petentes, merito implicantur. Quod cum perspexisset natura omnium rerum parens, visci multum Hetruria lar-
gita est, ne haec ob pestem vino destitueretur. Visci fructu vescuntur turdi, praecipue magni, quos nostri vulgo turdellas
appellant. Quorum stercore visci semine pleno insciantur & seruntur arbores, in quibus pernoctant, & victitant: e quo
tandem semine nascitur planta, quae viscum creat. Vnde scite a Plauto dictum est: Turdus exitium sibi cacat. Caterum
per se non est arbor, sed in arboribus viuut, fronde plerumque perpetua. Id quod etiam testatur Virgilius lib. 6. Aenidis
cum inquit.

Visci confid.

Visci confe-
ctio.

Visci utilitas
in Hetruria.

Visci genera-
tio.

Viscum ar-
bor non est;

Quale solet syluis brumali frigore Viscum

Fronde vivere noua, quod non sua seminat arbos.

Proinde Plinius lib. 16. ca. vltimo ita scriptum reliquit: Quaedam enim in terra gigni non possunt, & in arboribus nascun- Ex Plinio.

tur. Namq; cum suam sedem non habeant, in aliena viuunt, sicut Viscum. Omnino enim satum nullo modo nascitur, nec
visi per alium auium redditum, maxime palumbis & turdis. Hac est natura, vt nisi maturatum in ventre auium non pro-
ueniat: hac Plinius. Quae ante ipsum memoriae prodidit Theophrastus lib. 2. cap. 23. de plantarum causis, vnde illa mutua-
tus est Plinius. Porro id, quod in pinu, & abiete nascitur, quod (vt Plinius inquit) Stelm Euboea dicit, Hiphear Arcadia,
frequentissimum in Tridentino agro in vallis Anania syluis conspicitur, vbi ingens turdellarum copia victitat. Sed hoc ad
aucupia prorsus inutile est: decoctum enim, & deinde elotum omnem amittit lentorem. Quod autem in pinu, abiete, a-
mygdalo, malo, pyroq; prouenit, perpetua fronde viret. Id vero contra, quod quercui, roberi & castanea innascitur, vt po-
te cui appetente hyeme omnia folia decidant. Huius rei causam reddere tentauit Theophrastus loco paulo ante citato, cum
ita scribit: Viscum aliud folio esse perpetuo, aliud deciduo, haud quaquam absurdum est. Siquidem aliud virentibus sem-

per arboribus, aliud frondem amittentibus insidet: fit enim, vt his careat alimento, in illis habeat, quantum abunde sit. Theophrasti
Causa enim perpetua, deciduae frondis haec est, quemadmodum diximus: haecenus Theophrastus. Verum enim uero haec accepta.

Theophr. sententia non omni ex parte probanda videtur: quippe quoniã vniuersũ Viscũ, quod in Amygdalo, pyro, maloq; in Italia prouenit, tam astate, quam hyeme fronde perpetua viret, cum tamẽ hæc arbores hyeme frondibus destituantur. Quo fit, vt aliunde huius rei causam petendã existimem. Fit præterea Viscũ auiculus tantum capiendus commendatum. in Syria ex myxus, quæ Aphrus Sebestena dicuntur, vt libro primo in prunorum mentione de his differentes retulimus. Vtuntur hoc

Viscum Damascenum.

Viscum ex radicibus.

Visci querni vires.

Quorundam error.

Visci pyri syluestris vires.

Visci vires ex Galeno.

Nomina.

Insufres suis in aucupijs, quod arborum visco careant, illudq; e Venctys deferunt, quo primum ex Damasco Syria aduehitur, vnde Damascenum vocatur: sed id querno bonitate cedit. Fit quoq; Viscum e quarundam arborum radicibus, agrifolij præsertim, & viburni, quarum etiam arborum historiam libro primo paliuri & rhois commentarijs inseruimus. Qui autem ex huiusmodi arboribus viscum conficiunt, cortices radicem sumunt, effossaq; scrobe inter suarum arborum fondes humido solo sepeliunt, ibiq; tanto tempore dimittunt, quoad computrescant: mox eximunt, & tamdiu in pila contundunt donec lentorem concipiant: deinde aqua calida lauant, & manibus commiscent. Hac etiam ratione quibusdam in locis fit ex visci radicibus. Sunt qui querni visci lignum in tenuissimum puluerem redigant, & comitialibus hauriendum præbeant: quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant. At qui operapretium est, vt eo ita vtantur comitiales quotidie in quadragesimum diem vsq;, & caueant ne lignum ab arbore rescissum terram contingat. Idem collo, aut brachio pro amuleto suspensum, cum suo cortice, grauidarum conceptum adiuuat. Sed noui ego complures, morbi & medicamenti prorsus ignaros, qui ligni loco viscum ipsum in catapotijs deuorandum dederunt. Viscum quod in Pyro syluestri nascitur, contractione membrorum laborantibus maximo esse auxilio scimus: contunditur id vna cum folijs & ramis, & cum pinguedine capi recenti. Visci meminit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus differt, vt verbis: Viscum ex plurima aerea, & aqua calida, paucissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaq; etiam affectus substantie respondent. Siquidem valenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosq; diffundit, ac digerit. Est autem ex eorum genere, quæ non protinus post primam appositionem excalfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut thapsia. Sed & supra commonuimus, inesse calidam facultatem medicamentis, vbi largum continent humorem recrementitium Nomen illi Græcum, ἰζός, Latinum Viscum: Arabicum Dabach, seu Dibach: Italicum Vichio & Pania: Germanicum Bogelien oder Mistel: Hispanicum Visco: Gallicum Guy.

Nulla hic in Græcis codicibus fit acinorum mentio, sed hæc tantum leguntur: ἰβηταί ἐξ τινὸς καρπῶν ὡς ἔπειτα hoc est, fit ex quodam fructu rotundo. Cui etiam lectioni adstipulatur Serapio. Sed interpretes videtur secutus Plinium qui lib. 16. cap. vltimo, sic inquit: Viscum fit ex acinis, qui colliguntur aestiuo tempore immaturi.

Viscum polycoccon, Camerarius proposuit in sua editione Matthioli, quod à vulgari differt bacarum racematim coherentium copia, in reliquis cum vulgari Visco conueniens: quod rarum & in Heluetia repertum.

Ἀπαρίνη

APARINE.

CAP. LXXXVIII

ἄ ἐκ μέσῳ ὀμφαλῶς, i. e. medio velut umbilicus, ita Meum. b Meum μετὰ οἴνου i. cum vino. Aparines consideratio. Speronella.

A Parine ramis multis, & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per interualla orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concuum a album, vmbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice vtuntur ad eximendos e lacte pilos. Seminis caulium, ac foliorum

APARINE.

succus, potu b contra viperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita, strumas discutit.

A Parine nusquam non prouenit, sed præsertim (vt Theophrastus inquit) inter lentes, in agris, secus itinera & prope sepes. Itali hæc vulgò vocant Speronella, quod folia circa caulem ad calcarium stimuli modum, asterisci instar profert. Tactu hæc asperissima est, quapropter cum adoleuerit, attingentium vestibus pertinaciter hæret. Huius succum magnificum quidam ad recentia vulnera glutinanda, & ad papillarum rimas. Stillatitia eius aqua datur vtiliter potanda dysenterici. Sicca farina vulnera glutinat, & vlcera sanat. Aparines meminit Galenus lib. 6. simp. med. vbi sic breuiter inquit: Aparine, quidam philanthron, alij omphacarpum cognominant, modicè extergit & desiccatur: habetq; nonnihil subtilium partium. Herba hæc Græcis ἀπαρίνη vocatur: Latinis similiter, Aparine: Italis Aparine & Speronella: Germanis Riebttau: Hispanis Presera: Gallis Grateron.

Aparine quomodo primò prodeat, figura nostra expressimus, floribus tamen variat, etsi namq; sit albus ex Baldo, tamen purpurascens habemus. Dicitur φιλακάρπιον Hippocrati: aspera Lappago siue Asperugo (ab asperioribus folijs) Plinio: Lappà Gaza apud Theophrastum vertit: Aparine, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & Cord. in Diosc. Lon. Anguil. Lac. Lob. Cast: Lugd. Cas. Aparine aspera, Thalyo.

Ἀλύσσον ALYSSVM. CAP. LXXXIX.

A Lysson exiguus frutex est, vnicaulis, subasper, rotundis folijs: fructu duplici scutorum effigie, in quo est semẽ quadantenus latũ. In montibus, & asperis locis



Aparine vires ex Gal.

Nomina,

Salicum aparina stans.

locis emicat. Eius decoctum singultus, sine febre, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita vitia cutis in facie, & lentigines emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur: domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus, atque brutis fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

ALYSSVM.



Alyssi varia est apud authores historia. Nam si Plinio est adhibenda fides, Alyssum ea plane fuerit herba, quam Rubiam minorem vocamus, quae quidem, praeterquam quod folia ferat longe minora, prorsus Rubia similis constat. Quod autem Plinio haec Alysson sit, eius verba declarant lib. 24. cap. 11. ubi de erythrodrano ita scribit: Erythrodranus, quam aliqui erythrodanum vocant, nos Rubiam, qua tinguntur lanae, pellesque perficiuntur, in medicina vrinam ciet. Morbum regium sanat ex aqua mulsae: & lichenas, ex aceto illita: & ischiadicis, & paralyticos, ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix, semenaque trahunt menses, aluum sistunt, & collectiones discutunt. Contra serpentes rami cum folijs imponuntur. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum. Distat ab eo, qui Alysson vocatur, folijs tantum & ramis minoribus. Quippe nomen accepit, quod a cane emorsos rabiem sentire non paritur, potus ex aceto, adalligatusque: haecenus Plinius. Quem facile quis suspicari posset, Dioscoridis Alyssum reddidisse, eo ductus argumento, quod is statim post Aparinem, quam rubia similem fecit, Alyssum descripsit: nisi omnibus ferè notis hoc a rubia minore differre perspicuum esset. Siquidem Dioscoridis, alyssum folijs est rotundis, fructu duplicitum scutorum effigie, in quo semen quadantenus latum: in montibus, & asperis locis nascitur: quae sanè omnia in minori Rubia desiderantur. Quod praeterea Dioscoridis, ut Plinio, Rubia minor non sit Alyssum, ex eo aperte cognoscitur, quod is infra de maiori, & minori Rubia eodem capite tractauerit, id quod minimè quidem fecisset, si nullam iudicasset inter minorem rubiam, & Alyssum intercedere differentiam. Quare vel Plinium hac in re hallucinatum, vel diuersum à Dioscoride Alyssum accepisse crediderim. Porro magis adhuc Alyssi historiam ea confundere mihi videntur, quae de eo posteritatis memoria prodidit Aëtius, cum inquit: Alyssum eam herbam esse aiunt, quam Heracleam sideritum vocant, quae

Alyssi confi.
Alysson Plinii est Rubia minor.

Alyssum Aëtii est Sideritis.

Alyssum Galeni.

Alyssum Ruelli est Cannabis syl.

Alyssi vires ex Gal.

Nomina.

propter vias ubique nascitur, purpureo flore, folijs crassioribus. Nomen traxit, quod a cane rabido emorsis mirum in modum optulerit. His verbis Aëtius non solum non refertur Dioscoridis Alyssum deprehenditur, sed neque etiam satis exprimere, quam sideritum pro Alyssum intelligat. Nam cum tres sint siderites a Dioscoride monstratae, quarum duae, prima scilicet, & vltima, heracleae vocantur, non equidem scire possum, an primam, vel vltimam in suum Alyssum receperit Aëtius. Huic postremo, ut alijs quoque, non consentiunt quae de Alyssum retulit Galenus lib. 2. de antidotis, ubi nonnulla Asclepiadis medicamenta ad rabidi canis morsus commemorat. Alyssum, inquit, herba est marrubio adsimilis, asperior tamen & magis acalescata circa orbiculos, florem ad caeruleum vergentem profert. Hanc sub canicula aestu colligere oportet: exiccata contundi, cribari, & seruari debet, ne dissetur. Ex his Galeni verbis palam est, Alyssum ab eo ex Asclepiade descriptum, potius primam, quam vltimam sideritum referre. Cum igitur varia admodum sit de Alyssum authorum sententia, cumque eius historia tam varia, incertaque habeatur, difficile quidem fuerit asserere, quamnam planta Alyssum legitime vocari possit. Non desunt sanè nobis aliquot plantae, quae pro Alyssum ad nos à rei herbaria peritis transmissae sunt, verum cum earum nulla legitimum mihi Alyssum referat, eas potius supprimendas, quam hic appingendas existimaui. Ruellius tamen eam plantam, quam herbarij (ut ipse ait) syluestrem cannabim vocant, putat esse Dioscoridis Alyssum, vel ad ipsum propius accedere. Quod, ne semper aliorum errata corrigere videar, his diiudicandum relinquo, qui in simplicium et historia mediocriter versati, haec & maiora diiudicare possunt. Caterum Alyssum à Galeno ex Asclepiade representatum, in Italia provenire non equidem inficior, neque illud similiter, cuius meminit Aëtius. Sed quod horum in usu medico probandum, vel reprobandum sit, non facile decernere ausim, quanquam à Galeno nunquam discedendum putauerim. Qui praeterea Alyssi facultates tradidit lib. 6. simplicium medicamentorum, his verbis: Nuncupata est haec herba Alysson, quod mirifice inuict demorsos à cane rabido. Sed & rabienti quoque data, saepe in totum sanauit: atque hoc ex totius substantiae similitudine efficit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia, & plane nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experietur cognoscat facultatem habere mediocriter siccificam, & digerentem, cum hoc, ut abstersorium nonnihil etiam obtineat. Haec ratione & vitiliginem, & maculas faciei à sole prognatas expurgat. Herba, quae αλωσον, Graecè Alyssum quoque Latine dicitur: Italice Alisso.

Alysson à Matthiolo & Anguillara propositum, Thlaspios generibus adnumerandum, quare Thlaspi Graecum propinquius fortè Dioscoridis, polygonati folio, aut Olex, Lentis semine, Lobelo dicitur, ac Tabernamontano Thlaspi Graecum polygonati folio. Verum cum hoc neutiquam confundendum Thlaspi Narbonense centunculi folio apud Lobelum.

Ἀσκληπίας.

ASCLEPIAS.

CAP. XC.

Asclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa, radices numerosas, tenues, odoratas: floris viri. Longa, Ori. non leg.

rus graue, semen securidacæ: nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ, mammaramq; vlcera, quæ cacoethe vocant, illinuntur.

Hedera terrestri non est Asclepias.

Fuch. error.

Vincetolsici hist. Matth.

FAlluntur, mea quidem sententia, qui Asclepiadis vice, quam in montibus nasci tradidit Dioscorides, nec non etiam Plinius, eam herbam accipiunt, quam vulgares quidam chirurgici Hederam terrestrem nominant: quæ plerumque seculis vias nascitur, & perpetuo humi serpit folijs rotundis, asperis, per ambitum quadrantenus serratis, longo tenuiq; funiculo appensis: floribus exiguis, in purpura albicantibus: radicibus tenuissimis. Siquidem præterquam quod Dioscorides scriptum non reliquit Asclepiada in vjs publicis nasci, nusquam etiam, quod legerim, prodidit eandem tam longo repete tractu & folia rotunda proferre. Nec minus etiam, vt equidem arbitror, hallucinantur ij (pace tamen Fuchsy eruditissimi Vincetoxicum Asclep. censentis, dixerim, quem constat ex suis commentarijs hanc habuisse sententiam) qui putant Asclepiada eam esse plantam, quam vulgus herbariorum Vincetoxicum vocat. Quandoquidem huius cum folia, tum radices nullo odore commendantur: flores virus aliquod non redolent: semen non est securidacæ simile. Adde etiam quod ex Orbani lectione Asclepias non profert folia longa: cui subscripsit Marcellus interpres, fretus fortasse, vt solet, probatissimis exemplaribus. Præterea antiquissimus codex manu scriptus, de radicibus non legit πολλάς, hoc est, multas, sed tantum λεπτάς, eodẽ id est, tenues, odoratas. Caterum VINCETOSSICVM prouenit folijs laurinis, sed in cacumine acutioribus, firmis ac leuibus, caulibus pluribus, setis, viridibusq; circa quos folia per interualla vtrinque, bina spectantur. Flores edit tenues

I. VINCETOXICVM.

* II. ASCLEPIAS NIGRO flore.*



Vincetoffici vires Matth.

ex pallidæ albescentes, è quibus acutæ tenuesq; proueniunt siliquæ, candida intus lanugine, & semine, vt in Nerio. Radicibus nititur numerosis, in girum se circumquaq; fundentibus, tenuibus, longis, albicantibus, haud odoratis, & mansu subdulcibus, quadam cum leuicula acredine, quarum est vsus. Nascitur in incultis locis, secus itinera, in montibus, collibus, & saxosis, & aridis locis. Radices excalfaciunt, & siccant ordine primo, digerunt, aperiunt, & resoluunt. Vis eis magna ex totius similitudine substantiæ aduersus omnia venena, vnde illi nomen. Quare dantur magno auxilio potanda ad venenorum animalium ictus. Demorsis quoque à serpentibus & cane rabido vtiliter præbentur diebus 40. continuis sesquidrachma pondere, ex cardui benedicti decocto. Bibuntur quoq; quotidie ex vino aduersus pestilentia cõtagia. Dantur eadem vtiliter ex oxalidis, aut buglosi aqua ad omnes cordis affectus drachmæ pondere, vnà cum citrei mali semine. Eadem ex vino meraco potæ, tormina mulcent. Earundem ex vino albo decoctum selibra pandere potum diebus pluribus, hydropicos iuuat: verum statim à potu sudor prouocandus est. Auxiliatur idem ictericis, namq; cutis nitorem præstat, vrinam prouocat, & tussi, & pectoris vitijs opitulatur. Dantur trita radices vnà cum Paonia semine comitalibus, & Melancholicis cum ocimi semine, aut cum citri cortice, aut cum margaritis. Præstant potæ additis dictamni albi radicibus ad interaneorum vermes. Adduntur vtiliter in desefionibus, quæ fiunt ad mulcendos vteri dolores, & ad menses ciendos. Non desunt, qui Vincetoffici radices laudibus efferant ad fractos, & ab alto deuolutos, vbi dentur potanda ex vino aut Symphyti maioris decocto. Sunt & qui illam humi repentem herbam, de qua antea diximus, pluribus celebrent facultatibus, præsertim ad thoracis & intestinorum vulnera: quamobrem potiones ex ea magna opinione faciunt, & succum eius in vnguentis admiscunt: namq; vulneraria est, & glutinatoria. Præterea oleum quod insusis maceratisq; in eo folijs, ac diutius insolatis paratur, præstat plurimum potum ad colicos dolores: namq; præsentaneo auxilio eos iuuat qui hoc morbo laborant. Asclepiadam meminist quidem Galenus lib 6. simplicium medicamentorum, sed nihil de eius viribus differens, sic tantum inquit: In tertio Diosc.

Dioscorides de hac herba conscripsit: at nos eius nondum periculum fecimus. Ea Græcè ἀσκληπιὰς, ut etiam Latine Asclepias nominatur. Italicè, Asclepiade. Nomina.

Asclepias nostrum, Apocyno cognata herba videtur, & *ῥινότοξικον* seu Vincetoxicum vulgò dicitur, quod duplex, albo (quod vulgatum) nigroq; flore. I. Asclepias albo flore, CB. Hirundinaria, Brunf. Trag. Ges. hor. Lon. Vincetoxicum, Mart. Dod. fol. Lug. Cast. Hederalis, Ruellio, Asclepias, Fuch. Dod. gal. Cor. in Dios. & hist. Ges. hor. Lacun. Lob. Cæs. Taber. Cam. II. Asclepias nigro flore, C. B. Vincetoxici altera species, Dod. fol. Asclepias altera flore nigro, Lob. Asclepias nigra, Clul. hist. Hisp. Lugd. Asclepias tertia flore nigro, Tab. Apocynum, Columnæ: alii tamen Periplocam minorem vocitant.


† Orib. add. ἢ *ῥινότον ἀσκληπιὰς*. i. vel Cnycus syl. a Orib.

Ατράκτυλις. **ATRACTYLIS.** CAP. XCI.

Atractylis, † spina est cnico similis, folia multo a longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, [asperaq;] qua scemina pro fusis vtuntur, b capitula in cacumine spinis horrent, flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere & vino teruntur vtilissimè contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quamdiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

μικρότερα. i. minor. Cocl. non habet exemp. b Or. *κόμην* i. coma.

I. ATRACTYLIS.



Errent haud dubie, ut mea quidem fert opinio, Ruellius & Hermolaus: quippe qui existimauerint Atractylida esse Cnicum sylvestrem, cuius primo loco meminit Theophrastus lib. 6. cap. 4. de plantarum historia. Siquidem magnam ego inter sylvestrem Cnicum, & Atractylida inuenio apud Theophrastum esse differentiam. Quod ut omnib. perspicuum esse possit, ijs praesertim, qui aliter sentiunt, hic Theophrasti verba de Cnico, Acarna & Atractylide subiiciam. Cnicum, inquit: sylvestris urbanoq; discernitur. Sylvestris genera duo notantur: alterum urbano admodum simile, recticaulus tamen: quamobrem eo mulierum priscarum nonnulla pro colu vtebantur: fructum nigrum, masculinum amarumq; parit. Alterum genus densum constat, caulesq; soncheos profert, quodammodo humicaule fit: nam propter foliorum molliam declinatur, procumbitq; ad arua: fructum amarum, frequentem, barbaq; modo hirsutum gignit. Sunt ambo seminosa, verum sylvestre copiosius fert. Eius peculiare pra alijs sylvestribus est, quod illa duriora spinosioraq; urbanis proveniunt: hoc autem mollius ac leuius constat. Acarna quoad simplicem ratione exprimi licet, aspectu Cnico urbano similis est, colore flavicans, succo pinguis. Fusus agrestis (sic enim Atractylida Latini nominarunt) hic candidior est: habetq; peculiare, quod in folijs euenit: decerpta enim, carnig; allata, succum sanguineum effundunt: qua de causa φόνος, id est cruor a quibusdam spina hac est nominata: grauis etiam odore, cruoremq; representans. Serò percipit fructum, autumnis enim & quidem in totum (ut summatim proponam) vniuersa spinacearum natura fructus serotina existit: hac Theophrastus. Ex quibus verbis facile cognosci potest, in Atractylidis historia aperte aberrasse Ruellium, cum in tertio suo de natura stirpium

Atractylidis confid. Ruell. & Hermolai error, Atractyl. Cnicum syl. esse credentium. Cnicus Theophrast.

Acarna Theophrast. Atractylis Theoph.

libro asserit, Fusum agrestem, hoc est Atractylida, nil aliud esse Theophrasto, quam primum Cnici sylvestris genus, vtpote qui non animaduertit, quod Atractylis Theophrasto alia est, a Cnico sylvestri planta, quanquam illi fortasse non absimilis, & cui ea tantum insit proprietas, ut e folijs succum sanguineum fundat, id quod nullo Cnici generi tribuitur. Erandi ei occasionem, meo quidem iudicio, praebuit Plinius, quod lib. 21. cap. 15. sylvestrem Cnicum a quibusdam Atractylida vocari tradiderit. Vbi postquam commemorasset nonnullas spinosas plantas, quibus Aegyptij in cibis vtantur, & Cnico tandem in hunc modum differuit. Multas praeterea, inquit: ignobiles habent plantas. Sed maxime celebrant Cnicon Italiae ignotam, ipsis autem oleo, non cibo gratam. Hoc faciunt ex semine eius. Differentia prima sylvestris & satiuæ. Sylvestrium dua species, vna mitior est, simili caule, tamen rigido, exilis. Itaq; & pro colu antiquæ mulieres vtebantur, quæ quidam Atractylida vocant. Semen eius candidum, & grande, amarum. Altera hirsutior, torosiore caule, & qui penè humi serpat, minuto semine: hac Plinij verba: Quæ etsi quidem certam fidem faciant, primum sylvestris Cnici genus a quibusdam Atractylida fuisse vocatum, non tamen propterea affirmant, Atractylim esse Cnicum sylvestrem. Atractylidis deinceps speciatim meminit ipse Plinius cap. 16. eiusdem libri, cum inquit: Acarna colore tantum rufo (a scolymo scilicet) distinguitur, & pinguiore succo. Idem erat Atractylis quoque, nisi candidior esset, & nisi sanguineum succum funderet: qua de causa φόνος vocatur a quibusdam. Odore etiam grauis, serò maturescente semine, nec ante autumnum, quam id de omnibus spinosis dici possit: hactenus Plinius. Ex ijs igitur omnibus merito colligendum esse putauerim, legitimam Atractylidem nullum esse sylvestris Cnici genus, sed aliam per se plantam, nempe illam, qua pro fusis prisca vtebantur mulieres. Quod sane animaduertens Theodorus sui Græci idiomatis peritissimus, in Theophrasti versione, Atractylida fusam agrestem interpretatur, non autem colam, ut primum agrestis Cnici genus vertendo, ex antiquo ad calos vsu, id Colam agrestem rectè cognominari posse monstrauit. Qua in re is planè declarasse videtur, priscas mulieres agresti Cnico coli vice fuisse vsas, fusorum verò loco ipsa tantum Atractyli. Caterum sunt, qui plantam cuius hic nos imaginem expressimus, Atractylem esse existiment, quorum ego probarem opinionem, si folia sanguineum succum funderent, & caules rectiores essent: sit itaq; de ea aliorum quoq; iudicium. Credidit Ruellius alteram Cnici sylvestris speciem eam nimirum esse stirpem, quæ herbaturum vulgus Carduum benedictum, vel sanctum appellat. Quam profecto opinionem haudquaquam improbandam puto,

Cnicus Plin.

Atractylis Plinii.

Colus agrestis.

Cnici syl. altera species, Card bened.

quandoquidem Carduus benedictus vocatus solo procumbit, densa foliorum coma, & quodammodo humiculis cernitur: quinetiam fructum gignit amarum, barbaq, modo hirsutum: & caules profert sonchi modo rabentes. Vt ex his notis rarius expensis, quibus prorsus conuenit Carduus benedictus cum altero Cnici syluestris genere, nil mirum si cogar mutare sententiam, & hoc quod alias negaueram, nunc planè asserere non dubitem. Sed certè Ruellium mirari subit, quod tam facile asseruerit Carduum benedictum vocatum sanguinem ex se fundere. Nam etsi ego millies periculum fecerim, nunquam tamen euulso folio, vel ramulo sanguinem è vulnere profuere comperi. Præterea si concedamus, quod Ruellius vera referat, id maxime ipsius repugnabit sententia, cum tam Theophrasto, quam Plinio nullū Cnici genus sanguinè fundat, quoniam id Atractylidis est proprium. Hinc itaq, palam fieri arbitror, Ruellium, alioqui doctissimum, turpiter confudisse Atractylidis historiam. Quippe si, vt suam tueretur sententiã, asserere voluisset Atractylida esse primum syluestris Cnici genus, illud quidem succum fundere sanguinis instar scribere debuisset, non autem hoc, quod Carduum benedictum esse censemus. Neg etiam mihi, vt liberè liceat quod quisq, sensit dicere, placet Fuchsij opinio, qui libro primo de compositione medicamentorum & in suis de plantarū historia commentarijs, Carduum benedictum vulgò nominatum Atractylidem hirsutiorẽ esse existimat: hirsutiorẽ dixi, quoniam is duas esse cõstituit Atractylidis species, nempe mitiorẽ alteram, alteram hirsutiorẽ: tametsi tum Dioscoridi, tum Theophrasto Atractylis vnum duntaxat sit genus, quod, quantum reor, Carduus benedictus non est. Siquidẽ hic nec sanguineũ succum fundit, nec in imis virgis vnquã visitur nudus: quinimò virgas non profert, sed caules lentos, quibus humi ferè reptat, vel potius solo procumbit. Sed postquam in hac nostra Atractylidis, & Cnicorum sylue-

Ruell. lapsus


Fuchsij opin. reprobata.

II. CARDVVS BENEDICTVS.

Cardui benedicti descript.

Vires.

Nomina.



strium disquisitione, sermo incidit de Carduo benedicto, non ab re hic de miris eius atq, excellentibus dotib. nobis differendum est. Est igitur CARDVVS benedictus ita vulgò nuncupatus, planta nullus hoc tempore non cognita. Caulibus est rotundis, flexilibus, lentis, pilosis, humi accubantibus, folijs longis, vtrinq, laciniatis, hirsutis, & cum adoleuerint per ambitum aculeatis. Capitula habet in caulium summis partib. longis, ac pungentibus aculeis rigentia, & folijs circumquaq, stipata. E quibus melinus flos emicat, papposo intus semine cinarea simili & albicante. Radice nititur alba multifidaq, Tota planta vehementer amara est, ideoq, excalfacit, siccat, aperit, abstergit & digerit, sed ad multa vrilis. Seritur passim in hortis, sapore admodum amaro, quod terreis constet partibus calore quodam attenuatis. Magni nominis, magnaq, estimationis planta est non modo apud Italos, sed etiam apud exterarum nationes, præsertim contra pestilentiam: item aduersus venena lethalia, tam interius sumpta, quam venenosorum animalium ictibus, aut morsib. imposta. Sanantur hac herba quartana laborantes, aut alijs febribus detenti, quarum accessiones cum frigore adueniunt. Id enim præstatur hausto eius decocto, aut stillaritia aqua, aut pulueris drachma pota. Præstant eadem comitialibus infantibus eodem modo bibita. Herba decoctum ex vino sumptum ilium, & renum dolores mulcet, & cetera ventris tormina sedat: sudorem cit, alui tineas necat, & vteri virijs auxiliatur. Herba ipsa tam recens quam sicca & pota, & exterius admota, contumacia vlcera, & qua cacœthe vocantur, sanat, cuteq, obducit: quamobrem decoctis miscetur, quæ è ligno Guaiaco, ex vino & aqua ipsa parantur, quos lues Gallica corripuit. Planta, quæ Græci ἀτρακτύλις, Latinis item Atractylis, & Fusus agrestis appellatur: Italis Atrattile, & Cartamo saluatico. Carduus benedictus: Italis Cardo benedetto, Cardo santo, siue herba Turca.

Atractylis flore est luteo, quandoq; purpureo, vtramq; caulibus rectis, non reflexis, assurgere obseruauimus. I. Atractylis lutea, C.B. Atractylis Matt. Dod. gal. & fol. Lac. Lob. Cast. Lug. Tab. Cam. II. Carduus benedictus, Brunf. Trag. Matth. Lacu. Gef. hor. Lob. Dod. fol. Cast. Lugd. Tab. Cam. Atractylis hirsutior, Fuch. Dod. gal. Acanthion, Cord. in Diosc. (cui & Cnicus syluestris alter Theophrasti) Lon. Cnicus supinus, Cord. in hist. Carduus sanctus Cæsalpino.

Πολύκνημον.

POLYCNEVM.

CAP. XCII.

a Or. καρπὸν i. semine.

Polycnemon, frutex est surculosus, foliis origani: a caule, vt pulegii, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum, cum aqua efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet: ad vrinæ stillicidia, ruptaque cum vino bibitur.

Polycnemi confid.

Polycnemon hætenus, quod ego quidem ipsum cognouerim, non reperi, neq, vidi in Italia. Caterum etsi inibi nonnulla inueniantur, atq, etiam à quibusdam pro eo ostendantur plantæ, quæ aliquibus notus Polycnemon quadantenus referre videntur, cum tamen plura etiam ijs desint, quæ in Polycnemo requiruntur, quam vt pro vero probari possint, non equidem quicquam in hoc certi statuere ausim. Vnde satius ipsum inter alias ignotas plantas collocandum esse dixerim, donec aliud certius compertum fuerit. Sed si quis interim Polycnemi vires ex Galeno quoq, scire desiderat, is lib. 8. simp. med. illas ita paucis retulit: Polycnemon desiccatur, & excalfacit secundo excessu. Itaq, & ob id vulnera glutinat. Huius plantæ nomen Græcum πολύκνημον: Latinum similiter Polycnemon: Italicum Policnemo.

Vires ex Gal.

Nomina.

Clinopodium frutex est foliis serpyllo similis, furculosus, duum dodrantum altitudine. Nascitur in petrosolis. Flores, marrubii modo, ex interuallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur a Meum herba, & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & peniles verrucas, quas acrochordonas vocant, euicit, aliquot diebus potum. Aluum sistit decoctum ad tertias potumq; , si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

L CLINOPODIVM VVLGARE. I. PSEVDOCLINOPODIVM.



De sunt planta, que à quibusdam rei herbaria indagatoribus, pro Clinopodio ostenduntur. Prima folijs exit serpyllo haud ab similibus, latioribus tamen, caulibus quadrangulis, tenuibus & hirsutis: floribus purpureis: caules verticillatim ambientes. Altera folijs est serpylli modo oblongis, in cacumine mucronatis, & in ambitu serratis, floribus inter folia subpurpureis, balaustrij effigie, caulibus exilibus, angulosis, è quibus folia per interualla exeunt vtrinque bina, sapor illi acutus. Nascitur in campestribus inculto solo, & saxosis locis. At illa longe magis, quam hac (quantum mea fert opinio) Clinopodium refert, tum quod folia magis serpyllum referant, tum quod flores, qui in summis caulibus sunt, lectica pedis basim quadrantenus referre videantur. Id quod maxime me adduxit ad credendum, hanc plantam legitimum esse clinopodium, verum degustata tractu temporis herba, non iudem ab re mihi à sententia recedendum fuit. Siquidem cum à Galeno scriptum esse animaduertierim, Clinopodium ad eò tenuium esse partium, vt ex tertio excalfacientium siccantiumq; ordine habeatur, ac operapretium esse haud me lateat, vt qua in huius censu sunt planta, aut gustu acres, aut admodum amara percipiantur, cumq; neutra qualitas in hac, aut illa planta cuius imagines dedimus, reperiatur, non ausim primam, nec alteram legitimum scire Clinopodium, sed prius alteram statim sequentem, cui præter acredinem & odoris fragrantiam, cetera ad stipulantur notæ. Cum non dubitem, quin hac planta legitimi Clinopodij faciem referat, fateri ac affirmare cogor eam viribus esse præditam, de quibus diximus de Clinopodij viribus. Nectamen ob id prætermittere volui, quin in studiosorum gratiam ea hic excuderentur. Huius meminit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Clinopodium excalfaciendi vim obrinet, sed nondum adurendi: est verò etiã essentia tenuium partium: ponatq; ipsum quispiam in tertio ordine tum excalfacientium, tum resiccantium. *Κλινόποδιον* sic Græce, vt Lat. pariter Clinopodium vocatur: Italicè Clinopodio. Clinopodii facultates ex Galeno. Nomina.

Clinopodium sic dictum, quod orbiculato florum ambitu speciem pedum lecti præbeat. I. Clinopodium Origano simile, C.B. Origanum quartum, Trag. Origanum verticillatum, Tha. Clinopodium vulgare, Matt. Clinopodium, Lac. Cord. in Diosc. Ges. hor. Cast. Clus. hist. Pan. Tab. Clinopodium maius, Cam. Clinopodium prius, Lugd. Pulegium montanum & Origanum syluestre, Lonic. Acinos & Betonica Pauli quorundam, Lob. Acinos siue Clinopodium syluestre, Lug. Herba Origano vulgari similis, Cæs. Alterum est altius maiore folio, alterum humilius minore folio, floribus purpurascens, rarius albis. II. Clinopodium siue Ocimum syluestre, C.B. Basilicum tertium, Trag. Pseudoclinopodium, Matth. cui & Clinopodium alterum in Iconibus, & Lugd. Clinopodium Anguill. Clinopodium vulgare, Lob. Clinopodium secundum, Tab. Clinopodium Diosc. & Plinii Cæs. Clinopodium maius & minus Thal. Ocimastrum Fuchs. fol. & Lugd. Acinos Fuch. in Iconi. Dodo. gal. Lac. Ocimum syluestre, Dod. fol. Ocimum paruum, Lon. Cala-

Calamentum montanum, Trag. edit. Lat. Palegium petræum, Ges. hor. Calamintha quædam Ocimi fe-
re foliis. Cord. in Diosc. Variat foliis latioribus. angustioribus, usq; hirsutissimis, aliquando pene lauibus,
quæ res facit, vt Clinopodium alterum Matthioli dissimile videatur: floribus etiam albis reperitur.

λεοντοπέταλον. LEONTOPETALVM. CAP. XCIII.

a Car. non
habet.
b Meū. κα-
θαπερ κωνδύ-
λε τινα. i.
velut nodos
quosdam.
Leontopeta-
li confid.

Ex Plinio.

Leontopetali
vires ex Gal.

Nomina.



Leontopetalon caulem emittit dodrantalem,
aut altiorem, plurimis alis concuum, & in cacu-
mine semina parua duo, aut tria, in siliquis, cicercis
modo: flores anemonæ similes, puniceis coloris: fo-
lia brassicæ, sed papaueris diuisura: radicibus nigris, &
a rapæ similibus, b strumosis. Nascitur in aruis & fe-
getibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vi-
no pota, nec alia: es celerius dolorem finit: miscetur
ischiadiorum dysteribus.

Leontopetalum, eiusq; nigram extuberantemq; radi-
cem, rari instar magnitudine, non modo Venerijs, &
Patauij in quibusdam hortis vidimus, verum etiam in He-
truria aruis, alijsq; Italia locis. Nascitur frequens in Apulia.
Leontopetali meminit Plinius lib. 27. cap. 11. vbi ipsum q; de-
pingit verbis: Leontopetalon, alij Rhapeion vocat, folio bras-
sica, caule semipedali, ala multa, semen in cacumine in sili-
quis cicercis modo, raris rapæ similis, grandis, nigra: nascitur
in aruis. Leontopetali facultates paucis perstrinxit Galeus
lib. 7. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit: Leontopetali
radice maximè vimur. Digerendi facultatem, & ex-
iccandi excalfaciendi, in tertio ordine possidet. λεοντοπέτα-
λον quod Græci, Leontopetalum quoq; Latini dicunt: Leontopetalo Itali.

Leontopetalonid est leoninum folium, floribus
puniceis dixit Dioscorides, luteis solum obseruau-
imus, quod Anemone olim vocatū fuisse, testis est
Gesnerus, libro dehortis Germaniæ. Leontopeta-
lon Matth. Ges. hor. Lac. Anguil. Lon. Lob. Dod. fol.
Cast. Lugd. Cæs. & Camerario.

I. TEUCRIVM.

Τεύκρον. TEUCRIVM. CAP. XCV.

a Onib.
χυρία. i. Ly-
cia.

Teucrui con-
sideratio.

Teucrui du-
plex Plinio.

Splenion.



Teucrium, siue, vt alijs placet, Teucris, herba est
virgæ referens effigiem, trislaginis similitudine,
tenuifolio, non nutrū à cicere alieno. Hæc in a Ci-
licia iuxta Gentiadem, Cissademq; vbertim prouenit.
Recens cum pota, aut aridæ feruefactæ eius potu li-
enem potenter: bsumit. Lienosis cum aceto, & ficis
illinitur: ite serpentiu morsib. ex aceto solo sine ficis.

Herba quadam nascitur pluribus in locis, folijs quidem
cicercis, sed aule, & facie trislagini adeo similis, vt sa-
pe extempore vis: oculos decipiat. Hanc esse verum Teucrium
mecum semper exstimauit, (si Teucrium nostrum in regionibus
nascitur) quod eamibi plane notis respondere videatur, quæ
Dioscorides Teucrio reddidit. Qui tametsi scribat vbertim
nasci Teucrium in Cilicia iuxta Gentiadem & Cissadem, id
tamen nihil impedit, quin etiam alibi prouenire queat. Si-
quidem folijs ex cicere non absimilibus, tenuibus & caulis
& facie Trislaginis spectatur. Plinio duo Teucrui produ-
tur genera lib. 25. cap. 5. vbi ita scriptum reliquit: Inuenit &
Teucer eademate Teucrium, quam quidam hermion vocant,
spargentem iuncos tenues, folia parua asperis nascentem, au-
stero sapore, nunquam florentem, neq; semen gignit. Medetur
lienibus, constatq; sic inuentam Cum exta super eam pro-
iecta essent, fertur adhasisse lieni, eumq; eximansse: ob id à
quibusdam splenion vocatur. Narrant sues, quæ radicem eim
edant, sine splenion inueniri. Quidam ramis byssopi plantam,
surculosam, foliosam, eodem nomine appellant. Et colligi flo-
rentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximè
ex Cisticjs, & Pisdia montibus laudant: hæc Plinius. Cete-
rum non desunt, qui putent alterum Plinio Teucrium eam
esse plantam, quæ Itali vulgari sermone vocatur Fava gras-
sa, quæ-

Teucrium charvatiensis
Herb.

II. TEUCRIVM ALTERVM.



sa, quanquam hanc alij falso, vt opinor, Telephium esse contendunt. Teucry vires descripsit Galenus libr. 8. simplicium Teucry vires ex Gal, medicamentorum, sic inquit: Teucrium incidentis, & tenuium partium facultatis est: quare lienes sanat. Ponatq; ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo vero excalfactientium ordine. Hanc herbam Græci τευκρίον, Latini item Nominata Teucrium nominant: Itali Teucro.

I. Teucrium, Matthiolo (verum in penultima editione figura posita sub Teucro altero, vt & ap. Lug.) Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Lob. Cæsal. Cast. Teucrium verum, Gef. hor. Teucrium vulgare, Cam. Teucrium primum, Tab. Chamædrys altera siue assurgens, Dod. fol. II. Chamædrys spuria maior, C.B. Chamædrys altera, Trag. Chamædrys vulgaris mas, Fuch. & Lugd. Chamædrys sylvestris, Dodo. fol. Pseudochamædrys, Gef. hor. Teucrium alterum, Matt. Tab. Teucryum primum, Lugd. Hierobotane fœmina, Dod. gal. & Lug. Veronica supina facie Teucry pratenfis, Lob. Auricula muris quinta, Cæsalpino.

Χαμαίδρυς. TRISSAGO. CAP. XCVI



Chamædrys Græcis, alijs Chamædrops, Latinis trissago dicitur. Sunt qui eam Teucryon appellauere, propter eam quam cum teucro seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex est dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, a penè purpureo. Carpitur semine pregnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, b indurato lieni, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: cit menses, partus extrahit: lienem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos, ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est calfacere.

a Ori. χαμαίδρυς. i. subrufum. b Meū addit. αιδμασι. i. conuulsionibus.

Trisa digeritur in pastillos, ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est calfacere.

I. TRISSAGO SIVE CHAMÆDRYS.

II. CHAMAEDRYS ALTERA.



Chamædrys herba est vulgaris notitia. In Hetruria, Senensibus præsertim, vulgè appellatur Querciuola. Quo nomine Chamædrys Græcos imitari videntur, quib. nil aliud per Chamædryn significatur, quam humilis & terrestris quercus. In subribus considerauo. vulgè

Nomen Chamædrys

- Febrifuga.** vulgò Calamandrina vocatur. Alijs herba februm, vel Febrifuga dicitur, eo quòd epoto eius decocto diebus aliquot tertianis fuget & finiat. Magnificiunt Chamædryn Hetrusci, quòd (vt affirmant ij, qui rem hanc experimento comprobauerunt) ieranis acetarj modo sumpta, pestilentiam arceat, nò minus quàm scordium planta ei cognata. Praestat quoq; Chamædry ad frigidos omnes cerebri morbos, nempe ad diurnos capitis dolores, ad comitiales, veterinosos melancholicos, stupidos, conuulsos, ac resolutos. Semen drachma pondere potum bilem per vrinas ducit, ideòq; conuenienter datur potandum ictericis instillatur foliorum succus ad vermiculosas aures. Datur idem aduersus intestinorum vermes: id quòd etiam vinum praestat bibitum, in quo florens herba die & nocte fuerit macerata. Caterùm quamuis Dioscorides, aliq; veteres vnum tantum, quòd extet, Chamædryos meminerint, tamen Fuchsius quatuor eius genera depinxit. De Chamædry siue Trissagine differuit Theophrastus lib. 9. cap. 10. de plantarum historia, vbi ita scriptum reliquit: Trissaginis folia ad rupta & vulnera, in oleo trita valent, & ad depascentia vlcera. Semen bilem extrahit, & oculis quoq; beneficium est. Folium ad albugines tritum, in oleo prodest. Habet hac herba folia quercus: & statura vix palmum excedit: & odorata atq; suauis est. Sed partes quidem omnes herba eiusdem minimè ad idem vriles fore, haud quicquam absurdum fortasse appareat. Radicis vero eiusdem partem vnã superius, alteram inferius purgare mirabilius sit, vt thapsia & ischiadis, quam alij Apion appellant: hac Theophrastus. Quibus mirum nulli esse debet, quòd Chamædry tertiana correptos liberet: siquidem ea, Theophrasto auctore, bilem deicit. Est & altera CHAMÆDRYS, folijs quercus effigie, sed magis quàm in praescripta laciniatis tenuibusq; subnigricantibus, numerosioribus & densioribus. Caules edit quadrangulos, tenues, lignosos, sesquidrantales, ramis, surculisq; plurimis refertos, in quibus flosculi purpurei per interualla, inter folia rutilant, & caules ipsos ambiunt, alterius Chamædry modo: Radicem habet multifidam albicantemq;. Est autem planta aspectu iucundo & elegantissimo: Amara tamen est, sed odore non iniucundo, resinam olente. Quo factum esse puto, vt Tragus Dioscoridis Chamædry hanc plantam esse existimauerit, sed an rectè senserit notabunt rei plantaria periti. Mihi autem Chamædry altera perceptuò fuerit, cum folia quercus, non pini gerat: & cum altera Chamædry cognationem habeat, non solum folijs, caulibus & floribus, sed sapore quoq; & facultatibus. Cum aded amara non sit vt altera, ea quidem minus calida, siccaq; fuerit, itaq; ad omnia munia imbecillior, non tamen multò. Trissaginis vires memoriae prodidit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Chamædry vincentem habet qualitatem amarã, & est quodammodo acris. Quocirca merito lenem colliquat, & vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions expurgat. Penatq; eam quispiam in tertio ordine excalfacientium & desiccantium: plus tamen desiccet quàm calfacit. Hac planta, ut iudicatur Græcè vocatur: Latine Chamædry & Trissago: Arabicè Damederios, Chamædry seu Kemædry: Hetrusci Chamædryo & Querciuola: Italis cateris Calamandrina: Germanicè Chamanderle vnd Bathengel: Hispanicè Chamædryos: Gallicè Germandree. Chamædry altera, Italis Calamandrina secunda, & Querciuola secunda.

* III. CHAMAEDRYS SPINOSA. *



Chamædryos differentias duodecim in Phytopynace recensuimus, quam verò hic primo loco poluimus, Chamædrym maiorem repentem cum Dodonæo, vocamus: Chamædry vera, Trag. Trissago siue Chamædry, Matt. Trissago, Lac. Cast. Chamædry maior, Clus. hist. Pan. Chamædry, Angui. Lug. Lob. cui & Quercula minor, & Tab. II. Botrys Chamædryoides, C.B. Chamæcyparissus agrestis, Trag. cui & Sideritis Crateuæ: Chamædry altera, Matth. Casto. Thal. Lug. Chamædry vera foemina, Fuch. Chamædry foemina quibusdam, Dod. gal. Lugd. Cam. Chamædry laciniatis folijs, Lobel. Chamædry altera, Dod. fol. Chamædry altera fortè Dioscoridis, Czf. Chamædry tertia, Clu. hist. Pan. Trissago vera, Lon. Iua muscata Tab. III. Chamædry spinosa: Planta est palmaris & sesquipalmaris, hirsuta, cauliculis quadratis, lanuginosis, multis geniculis donatis, virgulis hinc inde sparsis, folijs oblongis, subrotundis leuiter ferratis, summis tamen integris: flores Chamædryos ex flauo rufescentes, singulis ferè geniculis iuxta folia adponuntur, calyculis lanuginosis donati, quibus aculei bini, aliquando plures, modò breuiores, modò longiores iunguntur: aliquando ex geniculis vnicum virgultu prodit, cuius summitati spina infidet: semen rotundum, subnigrum, calyculis inclusum. Ex horto Bembiano, Patauio accepimus.

Λευκάς. LEUCAS. CAP. XCVII

Lucas montana, latioribus, quàm vrbanã folijs, 60
semine acriore, amariore, ori ingrato: efficacior,
tamen quàm fariua habetur. Vtraq; ex vino contra

nimalium venena, præcipuè marinorum, opitulatur.

Leucadis
consideratio.

Tametsi Hermolaus & Ruellius contendant scriptis testatum relinquere, herbam quandam in vinetis nascentem, mercuriali congenerè, esse Leucada: ego tamen eam mercuriali consimilem facere profectò non ausim, cum nullum hactenus ex rei herbarie authoribus inuenerim, qui eius faciem representet, pluraq; de eius notis tradat, quàm fuerit Dioscorides: qui certè, quantum extat, nullis prorsus notis ipsam descripsit. Caterùm rectè, meo quidem iudicio, putat Marcellus Florentinus huic Leucadis capiti decurtatum esse principium. Id quòd nobis indicare videtur ipsius Dioscoridis sermo: nam cum statim ab ipso capitis initio montanã Leucada vrbanã comparauerit, nimirum ostendit, à se prius vrbanã fuisse descriptam.

Neque hac de causa tantum adducor, vt Marcello adstipuler, sed quia etiam se habuisse testatur Latinum Dioscoridis co-
 docem vetustissimum, in quo initium huius capituli ita legebatur: Leuca duo sunt genera, vna est montana, & altera hor-
 ia. Montana latiore quam sativa folio est, &c. Quae omnia maximo sunt argumento, quod hoc in loco Dioscoridis codices
 sint deprauati, quodq; in ijs plura adhuc desiderantur, quae faciunt ad perfectam huius plantae historiam. Leucas, herba sic
 Graecis, Leucas item Latinis appellatur. Leucas du-
plex.
Nomina.

Λυχνίς.

LYCHNIS.

CAP. XCVIII.

Lychnis coronaria, flore est albae violae simili, sed purpureo, quo corollae factitantur. a [Contra scor-
 pionum ictus semen in vino potum auxiliatur.] Lychnis syluestris, omnia urbanae similis. Bilem per
 alium detrahit, semine duabus drachmis potio: ictus a scorpione subuenit. Aiunt huius herbae appositu
 scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi. a Conclufa
meum non
habet.

LYCHNIS.



Quanquam non facile est hac aetate plantas in Italia o-
 stendere, quae legitime referant vtranzq; Lychnidē, hor-
 tensem scilicet, & syluestrem, cum earum folia, & caules tā
 a Dioscoride, quam ab alijs rei herbaria scriptoribus, quod
 inuenerim, nullis prorsus representetur notis, vrpote planta-
 rum, quae fortasse olim omnibus erant notissima ob frequen-
 tem earum vsum, tum ad lucernarū lumina, tum etiam ad
 coronas contexendas: attamen in Tridentino, & Goritienfi
 agro planta quadam in hortis, ac ficitilibus feritur, coronis ne-
 ctendis accommodata, quam equidem non dubitauerim pro
 legitima Lychnide in medium asserre. Siquidē flore exit pur-
 pureo, alba viola simili: folijs togis, tomentosis, albicatibusq;
 caule lanuginoso, incano, cubito maiore, in cuius cacumine
 flos emicat, vt dixi, purpureus, inodorus tamē. Quod prater-
 ea plāta hac vera sit Lychnis coronaria, illud mihi fidē auget,
 factiq; vt in hoc nihil serē addubitem, quod alteram eiusdem
 generis frequentissimam apud Ananienses syluestrem repere-
 rim, illi sativa aded per omnia similem, vt cum natalis dun-
 taxat discrimen intercedat, hac meritō Lychnis syluestris ap-
 pellari queat. Sunt qui Pseudomelanthium in segetibus nas-
 cens, syluestrem Lychnidem faciant. Atqui cum Dioscorides
 agrestem Lychnidem urbanae per omnia similem esse scribat,
 eamq; saepius viderim in inculto solo, non possum horum pla-
 citis subscribere. His accedunt tomentosa earum folia, quae ad
 lucernarum vsum pro elychnis commodē vsurpari possunt:
 vnde apud veteres Lychnidis sibi nomen asciuit: quippe lucer-
 na Graecis λυχνίς dicitur, quemadmodum & ἐλλυχνίον funi-
 culus, qui ē gossipio nobis hoc auo paratur, lucernisq; inseritur
 ad lumen edendum, flammamque nutriendam. Quare cum
 gossipio, vt puto, carerent antiqui, tomentosis herbarum qua-
 rundam folijs ad hoc munus obeundum vtebantur, nempe ly-
 chnidis, verbasci, aliarumq; nonnullis. Illud deniq; addiderim, vt nostra melius firmetur opinio, quod flos plantarum, quas
 Lychnides esse opinor, mirum in modum ruralibus, vrbansq; virginibus expetitur ad coronas factitandas: quae in re priscam
 imitantur aetatem. Caterum Plinius lib. 21. cap. 4. Lychnidem inter rosas retulit, sic inquiens: Est & rosa, quae Graeca ap-
 pellatur a nostris, a Graecis verō Lychnis, non nisi in humidis locis promeniens, nec vnquam excedens quinque folia, viola
 magnitudine, odore nullo. Lychnidis coronariae semen, vt Galenus est author lib. 7. simplicium medicamentorum, calidum
 est secundo quodammodo ordine, aut iam etiam tertio: siccum sanē eodem quoq; modo. Quae herba Graecis λυχνίς: Lychnis
 quoque Latinus dicitur: Italis, Lychnide coronaria. Lychnis sylu-
consideratio.

Lychnis (cuius triginta tres species in Phytopinace recensuimus) dicitur quasi Lucernula, haecque Ly-
 chnis est coronaria Dioscoridis, & Theoph. Pliniiq; Lychnis, non autem Iouis flos Theophrasti, neque
 Verbasci species. Dicitur Rosa mariana sativa, Trag. Lychnis, Matt. Lac. Lychnis sativa, Dod. gal. Ges. hor.
 Lychnis coronaria, Lon. Lob. Dod. fol. Lugd. Caes. Flos Iouis noster, Ges. hor. Flamma vel flammula Iouis
 quibusdam, eidem. Verbascum coronarium, Cordo in Diosc. Haec flore est simplici & pleno: illa intense
 vel dilute rubro, albo: haec verō rubro. Rosa graeca
Plinii.
Lychnidis vi-
res ex Gal.
Nomina.

Κείρον.

LILIVM.

CAP. XCIX.

Lilia coronamentis se dedunt, Liria a quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur, quod a-
 liqui lirinum, alij susinum appellant, neruos, & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbae illita,
 contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta ambustis proficiunt: aceto condita vulneribus opitulā-
 tur. Succus adiecto inelle, aut aceto in creto vase coquitur a conuenienti medicamento vetustati vlcerum,
 & ad recentia vulnera. Inaffata radix, & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vuluam emollit, menses ciet,
 vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis praecisis, luxatisq; medetur: vitiligines, surfures, & le-
 pras emendat: vlceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem, & erugat: teritur in aceto cum hyo-
 kyami folijs, & farina tritici mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium
 Ece aduersatur. a υγγρον ζιβε-
τας φάρμακον.
i. liquidū
fit medica-
mentum, ita
meum.

aduerfatur. Ignibus facris fermen, & folia cum vino illinuntur. Tradunt & purpurea esse lilia. In Syriaa. tem, & Pfidia Pamphiliae efficaciffima vnguenti nafcuntur.

I. LILIVM.



II. MARTAGON.



Liliorū con-
sideratio.

Liliorum hi-
storia ex Pli.

Lilia vt totū
annūvireant.

Martagon, &
eius delineatio.

Lilium omnibus notum, folia fert longa, nunquam non virentia, leuia, pingua, Pancratio similia. Caule profert bi-
cubitalen, rotundum, rectum, leuem, pinguem, firmum, foliis ab imo ad summum circumuestitum: è cuius cacumine
terni, quaternive ramuli exeunt, è quibus oblonga prodeunt capitula, herbaceo colore, quæ tractu temporis lilia sunt exi-
mij candoris, calathi figura, extrinsecus striata, resupinis per ambitum labris. Luteis aliquot, ex calathi fundo vt in croco
sursum spectantibus apicibus, puluerulentis, & lingua effigiem imitantibus, alterius quam flos odoris, è quorum medio li-
gum producitur germē, rotundo in cacumine capitulo, herbacei coloris. Radice nititur bulbosa, albicante, compactili squa-
marum serie sursum spectantium. Huius squammatiles bulbi crassiusculi sunt, & lento succo pregnantes. Seruntur lilia
dissectis bulbis Martio mense passim in hortis & viridariis. Florent astate circa solstitia. Alba lilia vt purpurea fiant docuit
Plinius lib. 25. c. 5. his verbis: Lilium rosa nobilitate proximum est, & quadam cognatione vnguenti oleiq, quod lirinon
appellatur. Et impositum etiam maxime rosas decet, medio prouentu earum incipiens. Nec vlli florum excelsum maior,
interdum cubitorum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, foliis foris stri-
tis, & ab angustis in latitudinem paulatim sese laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq, filo, &
semine stantibus in medio crocis. Ita odor, colorq, duplex, vt alius calycis, alius staminis: differentia angusta. In vnguenti
vero, oleiq, vsu folia non spernuntur. Est flos non dissimilis illi in herba, quam conuoluulum vocant, nascens per fruticem,
nullo odore, nec crocis intus, candorem tantum referens, ac veluti nature rudimentum lilia facere condiscens. Alba lilia
iisdem omnibus modis seruntur, quibus rosa: & hoc amplius lachryma sua, vt hipposelinum: nihilq, est fecundius, vna-
dice quinquagenos saepe emittente bulbos. Est & rubens lilium, quod Græci crinon vocant. Alij flore eius cynorrhodon. Lau-
datissimum in Antiochia, & Laodicea Syria, mox in Phaselide, quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpu-
rea lilia aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisq, bulbi, sed vnius. Narcissum vocant. Huius alterum
genus, flore candido, calyce purpureo. Differentia à liliis est & hæc, quod narcissus folia in radice sunt, probatissimis in Lycis
mōtib. Tertio generi cetera eadem. Calyx herbaceus: omnes serotini: post arcturum enim florēt, ac per equinodiam au-
tumnū. Inuenta est & in his ratio inserendi, monstrificis hominum ingenii. Colliguntur namq, mense Iulio scapi ar-
scentes, liliaq, suspenduntur in fumo. Dein mundantibus se nodulis, in face nigri vini vel Græci mense Martio macerantur,
vt colorem accipiant, at qui ita in scrobiculis seruntur, heminis facis circumfusis. Sic sunt purpurea lilia, mirumq, ita tin-
gi aliquid, vt nascatur infectum: hæc Plinius. Lilia (vt Anatolius testatur reliquit) totum annum viridia durabūt, si cum
occlusa silent, necdum patentia dehiscunt, decerpta, nouis fictilibus non picatis indito diligenter operculo recondantur: sic
enim clausa perpetuum annum vegeta manebunt. Sed vt intermedio tempore ad vsu promuntur, statim ad solem pro-
ducta, cum senserint eius calorem, aperta panduntur. Porro vt vicissim, & variis temporibus flores pariant lilia, bulbis
seruntur, vt aliqui duodecim digitorum altitudine obruant, alij octo tantum, alij quatuor dūt axat profunditate mergā-
tur: sic diuersis diebus dabunt lilia, quod & in alijs floribus fieri pollicetur. Ceterū & illud inter lilia merito annumerari
potest, quod MARTAGON chymista appellat. Hoc enim radice, et si croceo colore infecta sit, à lilio candido nō distat, sic-
uti nec caule. Foliis vulgarem saponariam imitatur, quæ in stella, vel rose modum intercedēte spatio orbiculariter caulem
ambiant

ambiant: in cuius cacumine tenui pediculo appensi flores emicant liliorum effigie, minores tamen: quorum folia etiam reflexa cernuntur, colore purpureo, punctis quibusdam rubentibus respersa, & ipsi odorati sunt, aspectuq; iucundi. Prouenit in montibus & clivosis locis. Radix ad ea omnia commoda est, ad qua Liliij. Liliij genus hoc in suis de stirpium historia commentarijs Fuchsius asphodelum foeminam putauerat esse, pro eoq; depinxerat. Sed quia sui erroris conscius factus, hanc ipse suam mutauit sententiam, nō est cur iam nos eam pluribus resellamus. Caterum, vt de liliorum facultatibus nos quoq; differamus, hac qua sequuntur, habeto. Elixa radix vetere axungia excepta, & illita, pedum clauos euellit, sed ante triduum remoueri non debet. Eadem ex adipe, & oleo adhibita, defluxos pilos replicat, cum mulso autem pota sanguinem extra vasa concretum per aluum eicit, suppuraciones molitur, & concoquit, & duritias quascunq; emollit. Stillatitia floribus paratur, vteri duritias commodissime emollit, valet ad omnes frigidos neruorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutiones. Praestat item ad emollienda articularum impedimenta: & scirrhosos quoscunq; tumores. Illinitur quoq; maximo iuuamento puerperis vteri dolore lanquentibus, addito oleo è lini semine, & praesertim vbi succida, lana ijs calida imbuta, vteri superponatur. Additur in clismatibus, vbi induratas faeces emollire sit opus: Lilia qua diu in oleo macerata fuerint, illita, prius calefacta, calida apostem. ita citra dolorem maturant, ac digerunt, & peculiariter ea, qua in articulis sunt. Liliorum facultates posteritatis memoria prodidit Gal. lib. 7. simp. med. sic inquit. Liliij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtiq; in gustu amaritudinem habet, partim ex aqua, eaque temperata. Itaque etiam quod ex eo conficitur oleum, & vnguentum, citra morsum digerendi, simulq; emolliendi facultatem obtinet: vnde fit, vt vteri duritiis sit aptissimum. Porro radix, foliaq; per se trita desiccant, & abstergunt, & digerunt moderate. Proinde quoque ambustis competunt: siquidem haec quoque moderate desiccantem, extergentemque facultate postulunt. Radicem ergo tostam, ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix; imponunt: quippe cum alioqui & aliorum vlcera omnium bonum sit inducenda cicatrici remedium. Quinetiam vteros emollit, mensq; prouocat. Folia vero praecoquentes, & ipsa ad obductam vsq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed alijs quoque vulneribus. Sed sunt etiam, qui aceto ea condentes ad vulnera suo tempore vsantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice, quam in folijs: quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest, sicut praediximus, nam primi ordinis abstergentium est medicaminum. Itaq; cum aut vitiligines, aut psoram, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est mel. Caterum si id moderate illi, ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa, qua valenter exiccari postulant, absq; morsu. Imposuimus vero etiam quandoque & foliorum succum cum aceto, & melle. Quintuplus autem erat succus ad vtrunq; atque insigne medicamen fuit ad omnia ea, qua exiccari postulant absq; morsu, seu vulnera omnia ingentia, & maxime qua in capitibus musculorum eueniunt, & quacunq; vlcera humida flaccidant, & diuturna sunt, quaq; egre ad cicatricem perducuntur. Sed haec iam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, a quo quantum licet abstinere in praesentia adnotor: caterum rerum ipsarum natura sepe numero vt attingam adigit, celeriter vero relinquenda sunt, atque ad propositum reuertendum. Planta, quam Graeci λεῖον, & λείον dicunt, Lilium Latinis nominatur: Mauritanijs, Susen: Italis, Giglio: Germanijs, Eilgen: & Bilgen: Hispanijs, Azucena, & Lirio blanco: Gallijs, Lis. Martagum chymistis, Italis, Martagon & Giglio saluatico.

Liliorum facultates Matthiolo.

Liliorum vires ex Gal.

Nomina.

Lilium bulbosum est & non bulbosum: bulbosum vel vno bulbo, vt Lilium album, Martagon &c. vel pluribus Asphodeli bulbis, vt Lilium luteum, & rubrum. Non bulbosum, vt lilium couallium. I. Lilium album vulgare, quod Diosc. Theoph. & Plinii Lilium, C.B. Lilium, Brunf. Matth. Dod. gal. Cord. in Diosc. Lac. Casf. Cast. Lilium album, Trag. Fuch. Ges. hor. Anguill. Tab. Cam. Lilium candidum, Lob. Dod. fol. Lilium siue rosa Iunonis, Apuleio. II. Lilium montanum minus, C.B. Affodillus, Brunf. Hyacinthus poetarum, Trag. Martagon, Matth. Lac. Lugd. Casf. Asphodelus foemina, Fuch. fol. Lilium purpureum, Eidem in icon. Ges. hor. Lilium sylu. Cord. in Diosc. Dod. fol. Clus. hist. Pan. Lilium syluestre purpureum, Casf. Thal. Lilium montanum, Lob. Hemerocallis, Dod. gal. Cord. in Diosc. Ges. hor. Lonicero.

BALLOTE.



Βαλλωτή. BALLOTE CAP. C.

BAlloten, nomine alio nigrum marrubium vocat. Caules edit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex vna radice: a folijs maioribus, quam marrubij, hispidis, per interualla in caule dispositis, subrotundis, graueolentibus, apiastro proximis: vnde aliqui apiastro eam vocauerunt: candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, vt condylomata reprimat: purgant & sordida vlcera cum melle.

a Me φύλλα ἰπποκράσιος ἢ μοῖα μείζονα ἢ ἰσχυροτέρα ἰσο- λία marrubio: similia, sed maiora & rotundiora.

Ballote, siue Marrubium nigrum, quod etiam ob odoris grauitatem a quibusdam Marrubium fetidum cognominatur, frequens in agrorum marginibus nascitur, & passim secus vias. Est autem hoc apiastro adeo simile, quod facile legentis falleret, nisi naves consulerentur: ita enim sua graueolentia

Ballotes consideratio.

Ballote nigra

Ballotesvires
ex Paulo.
Nomina.

veolentia citò innotescit. In Italia nullis non cognitum est, appellaturq; ab aliquibus Marrubiastrum, ab alijs Marrubium spurium. Huius meminit Paulus (etsi vires eius silentio preterierit Galenus) libro 7. sic inquit: Ballote, quod alijs marrubium nigrum dicunt, acris est, & absterforia facultatu. Illud cum sale canum morsibus medetur. Huius planta nomen Græcum Βαλλωτί, & μέλαν παράσιον: Latinum, Marrubium nigrum, & Marrubiastrum: Italicum, Marrubiastro, & Mattochio bastardo: Germanicum, Schwarz Andorn: Hispanicum, Marroio negro: Gallicum, Marrubin noir.

† In Oribasi codice manu scripto hic interiectum legitur verbum μέλανα, quod folia quoque Ballote nigra reddidit. Nos temerè fortassis illud quis addiendum putabit, quòd pulchrè alteri eius nomini conueniat: quodq; ipsius meminerit Plinius libro 27. cap. 8. cum inquit: Ballote foliis est marrubij maioribus, & nigrioribus.

Marrubium nigrum duplex est, vulgare & peregrinum: hocq; vel rotundifolium, vel longifolium. Marrubium nigrum fœtidum, C. B. Ballote, Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Cordo in Diosc. Lob. Lug. Czf. Cast. Marrubium maius, Trag. Marrubium nigrum, Ges. hor. Lon. Thal. Marrubiastrum Tabern.

Μελισσόφυλλον.


APIASTRUM.

CAP. CI.

Melissophyllon, siue melittana, id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. Cauliculi, & folia ballotæ, de qua paulò antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta spectarentur: citreum malum olent. Folia cum vino pota, aut illita profunt contra ictus phalangiorum scorpionumq;: item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest: defessionibus fœminarum ad ciundos menses conuenit: dentes eodem in dolore colluuntur: dysetericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

I. APIASTRUM, SIVE
Melissa.

II. MELISSA CONSTAN-
tinopolitana.



Apiastri con-
sideratio.

Melissophyllon, quod Latinis Apiastrum, & Citrigo dicitur, Hetrusci ab odore citri vulgò vocant Cedronella, itemq; Melissa, sicut etiam Insubres. At permulta profectò Dioscorides à Nicandro poeta descripsit: vt etiam hic in Melisso- phyllo palam est, in ipsius capitù principio. Nicander enim eadem habet in Theriacis, his versibus.

Τὴν ἤτοι μελίφυλλον ἐπιλείουσι βοτῆρες
Ὅτι ᾗ μελίπτερον τ' γὰρ πτερί φύλλα μέλλισσαι
Ὅδ' μὴ φελομένην μέλιτος φοιζήσ' ὄν' ἰενται.

Idem paulò post hanc plantam μελισσοφότον vocat, dum ricini corticem cum ea temperari iubet.

Λαζεο ἢ ἐρχλοα φλοισὲν ἐλαμίνετα κρότωνος
Συμμίγ' ἔλκε' ἰππετάοισι μελισσοφότοιο δασείης.

Herba est vulgaris, æquè notitia Melissophyllū atq; odorata. Seritur passim in hortis, ac etiam sponte per se nascitur in colli-


in montibus. Duo eius habentur genera, vnum satiuum, alterum syluestre. Fuchsius tamē Melissophyllum in tria genera digessit lib. illo de comp. med. quem nuper auctum excudit. Sed cur is duo prima genera, quae (vt scribit) grauius odorata sunt, & cimices verius quā citrum redolent, inter melissophylli genera connumerauerit, ego nescio, ipse dicat. Mihi quidem (vt dicam ingenuē quod sentio) planē absurdum videtur, quod melissophyllum odore suo aliud referat, quā citreum malum, cuius tantū odorem spirare Diosc. memoria prodidit. Melissophyllum, ad cuius facultates iam nostra progreditur oratio, in cordis affectibus Mauritanī miris laudibus efferunt, tametsi id Graci, quod extet, silentio praterierunt. Proinde haec Serapio retulit: Melissophylli, inquit, proprium est animum hilarem reddere: humenti, ac frigido ventriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructiones reserare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem robore, eamq; praesertim, qua somnus frequentius nocte intercipi solet, quin & eius pulsum reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quae tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. His praeterea facultatibus pollere Melissophyllum, comprobatur Auicenna quoq; testimonio, qui libro medicinis, quae cordi conueniunt, dicato, ita de eo scribit: Melissophyllum excalfacit, siccataq; ordine secundo. Cor exhilarat, vitalesq; facultates roborat, odoris fragrantia, saporis auferitate, partiumq; tenuitate. Quibus facultatibus ceteris etiam visceribus competit. Vires deiectorias possi-

Melissophylli duo genera.

Apiastri vires ex Arabibus.

Auicenna de Melissoph.

*III. MELISSA MOLVCANA IV. MELISSA MOLDAVICA. foetida.



det, nec aded imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiritibus, & à sanguine, qui cordi, & arteriis inest, educere queat: quod in ceteris corporis partibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit. Ceterum superioribus annis plantam conspeximus Praga, in horto Inuictissimi Caesaris Ferdinandi, è Constantinopoli allatam, quam Melissophyllum Constantinopolitanum appellare libuit, quod folia Melissophyllo similia proferat: verum haud quaquam citreum pomum oletia. Est etiam amara tota, & magna (vt aiunt) facultatis aduersus venena, & ad cordis affectus. Hanc folijs admodum aculeatis, misit nuper ad me Clarissimus Medicus Alphonsus Pantius Ferrariensis, quam antea nusquam videram. Sunt qui hanc plantam Molucham appellant, quod à Moluchis Insulis allatam putent. Vtraq; folio est Melissophylli quadantenus simili, breuiore tamen, & minus denticulato, sed in altero genere circūquaq; aculeato, amaro sapore, nec vlllo citrei mali odore: profert cathyses quosdam tintinnabuli effigie herbaceo colore, in quibus semen oritur. Aperit, attenuat, excalfacit, abstergit, venenis resistit, & animalium venenosorum ictibus mirifice auxiliatur, tum pota, tū quoque illita. Ictericos iuuat, interaneorum animalia necat. Datur vtiliter succus pestilentibus febribus affectis. Est & Melissophyllum alterum quod caules edit bicubitos, quadrangulos, subrufescentes, ramososq; folia in ramis ipsis vrtice figura: sed longè minora: flores in summitate purpureos, salua amulos, verticillatimq; inter folia emergentes. Tota planta citrei mali odore quā belle spirat. Radice nititur vnica, sed fibrata. Seritur in hortis. Sed cuius hic imaginem damus ex Moldavia mihi allata, vbi sponte per se prouenit. Quae vltima viribus pollet quibus & vulgare nostrum melissophyllum. Excalfacit, siccataq; ordine secundo, aperit, attenuat & incidit. Melissophylli meminit Gal. lib. 7. simpl. med. his verbis: Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec vtitur eo quispiam. Superuacaneum siquidem foret praesente marrubio, cuius tantus est vbique terrarum prouentus, velle vti melissophyllo. Ceterum si cui forte ad manum quandoq; marrubium non fuerit, illo vti licebit ad eadem, modò quantò ab hoc exuperetur, cognitum habuerit: haec Gal. Apiastrū, Plinio lib. 20. c. 11. authore in confessa damnatione est venenatum in Sardinia. Sed vereor, ne Plinius hic, vt in aliis nonnullis, deceptus sit, & ne Sardiniam herbam, quam quidam apium risus vocant, pro Apiastro acceperit. Ea planta Gracis μελισσόφυλλον dicitur, quae Latini Melissophyllum, siue meliterna, aut Apiastrum: Arabibus, Bederangie, Bedarungi, Cederenzegam, Turungen, seu

Melissophyllum Constantinop.

Molucha.

Melissophyllum alterum.

Ex Galeno.

Nomina.

Trungian, & Marmacor: Italis, Melissa, & Cedronella, & Aranciata: Germanis, Melissen/ & Binenkraut: Hispani, Torongil, & Hierua cidrera: Gallis, Melisse, & Pom cirade. Moluca, Melissa moluca, siue Constantinopolitana. Italis, Melissa Constantinopolitana. Melissa Moldauica: Italis, Cedronella di Moldauia.

Melissa, ab apibus, quæ μέλισσαι dicuntur, nomen habet, & quod ea delectentur apes Apiastrum dicitur. I. Melissa hortensis, C.B. Lon. Apiastrum, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lob. Melissa, Brunf. Dod. fol. Anguil. Cef. Cam. Melissa domestica, Trag. Melissa vulgaris, Dod. gal. Gef. hor. Clus. hist. Pan. Melissophyllum, Brunf. Matth. Cast. Lug. Tab. Melissoph. vulgare vel adulterinum, Fuch. Citrago, Gef. hor. II. Melissa Moluccana odorata, C.B. Melissa Constantinopolitana, Matth. Molucca eidem in compen. Cam. Lug. cui & Melissa Turcica: Molucca Syriaca, Aduers. Molucca laeuis, Dod. fol. Moluccha prima, Cast. Cæsal. 10 Melissophyllum Constantinopolitanum, Lug. Cardiac Syriaca, Tab. Cardiac melica sine Moluca Syriaca minus aspera, Lob. Hæc dicitur minus aspera respectu sequentis, neutra enim aculeis caret. III. Melissa Molucana fœtida, C.B. Moluca aspera, Aduers. Lob. (cui & Mafeluc. Turcarû) Cam. Melica siue Moluca asperior Syriaca, Lob. in icon. Molucca spinosa, Dod. fol. & Lugd. Moluca vel Melissa Constantinopolitana secunda, Cast. Moluccha altera Alyfso Galeni congener, Cæsal. Cardiac Syriaca aspera, Tabernamontano. IV. Melissa peregrina Moldauica, C.B. Melissa Moldauica, Matth. Cast. Lugd. Melissa, vel Cedronella, id est Citrago Turcica, Gef. hor. Melissa Turcica, Cam. Tab. Lug. Melissophyllum Turcicum Lob. Melissa genus peregrinum ex Oriente, Cæsal. Variat magnitudine & paruitate, flore cæruleo, purpurocæruleo, & albo.

Πράσιον.

MARRUBIVM


CAP. CII.

Marrubium, frutex est ab a radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interval-
lis: flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. b Huius folia sicca cum
ab vna radice semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem
b Meum. φύ- redactis. Crassam è pectore pituitam cum sicca Iri eiicit: mulieribus à partu non purgatis datur, vt men-
ταυ πειετ redactis. Crassam è pectore pituitam cum sicca Iri eiicit: mulieribus à partu non purgatis datur, vt men-
οικόπεδα, & strua, & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi
ἐρέπια. i. Na sunt: vesicam, renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis vlcerebus purgandis: pterygia, nomalque
scitur circa a- sistant: laterum dolores mitigant: Succus foliis contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum
reas domorû, vino, & melle illitus oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus
& rudera. conuenienter instillatur per se, aut cum rosaceo.

Marrubii cõ- sideratio.

Theophrasto duo genera.

MARRUBIVM.



Marrubii vi- res Matth.

Marrubium vulgare est planta, notiorque omnibus, quam vt pluribus indicanda sit. Eius duo genera constituit Theoph. lib. 6. cap. 2. de plant. hist. vbi ita scribit: Sunt & Marrubij duo genera. Aliud enim folio herbido, serrato, incisurisq; profundioribus, & proinde conspectioribus discreto constat, quo vnguentarij vii, ad nonnulla consuevere. Alterum rotundius, squalesq; vehementer, sicut sphaceli, incisuras habens obscuriores, minusq; serratum: hac Theoph. Ex quibus vtiq; constare potest, Theop. alterum marrubium non aliud esse, quam Dioscor. Balloten. Marrubij decoctum datur commodè iocinorosis, & aqua intercute laborantibus: eo quoque, aut foliorum puluere, necantur interancorum vermes. Recentia folia cum veteri axungia trita & illita, canum morsus persanant, & mammarum tumores resoluunt. Lichenas purgant, sanantq; ex aceto illita. Decoquantur Marrubij bina vncia, vnà cum buglossi, helenij, & eupatorij radicem sesquidrachma, Rhabarbari drachma, & agallochis 10 pari pondere, ex vini albi generosi libris tribus, ad tertiam usque, sitq; hoc modo medicamentum prastantissimum ad ichoriam, a vasorum obstructione prouenientem, vbi diebus decem continuis huiusce medicamenti binas vncias in diuiculis potauerint affecti, admisso tantillo sacchari, quod dulcorem addat: verum si febris adsit, ea omnia aqua incoquenda sunt. Quod aut marrubij virides rami in vino decocti usque dari possint, qui à serpentibus demorsi sunt, testatur etiam Nicander in Theriacis, & admirandum effectum etiam alium is subijcit, à nemine hæctenus animaduersum, dum prastium 60 mammæ pecoris à σόργω lacte replere ait, his versibus.

Ἡ μέλι τὸ παρασίσιον χλοανθεὸς ἔρπει κόλας
Χρᾶσι μίσησις ὀφείεσι πικρὸν ἀργῆτι σὺν οἴνῳ
Ἡ πικρὸν ἀσόργωιο κατέρυσεν οὐδατα μύσχοι
Πρωτογόνου, ἔρπει τὸ πειροσφαρσεύσα γαλάτι.

Marrubii vi- res ex Gal. Marrubij vires tradidit Gal. lib. 8. simpl. med. sic inquit: Marrubium vt gustu amarum est, ita si quis vtatur, consentientem huic saporis actionem possidet, iecur, ac lienem obstructione liberans, & thoracem, pulmonemq; expurgans, ac mensas promouens. Sed & illitum detergit, ac digerit. Ponatque ipsum quispiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi: in siccitate verò tertij medij, aut completi. Succo eius cum melle ad visus acumen vtuntur. Quinetiam & per nares morbum

morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus sanè obstructions diuicere, meatumq; impium, & ramos membranarum expurgare est vsus. Id Graci *σπάσιον*, quod Latini Marrubium nominant: Mauritanii, Fasio siue Farasium Itali, Marrobio: Germani, Andorn, vnd Eungentraut: Hispani, Maruio: Galli, Marrubin. Nomina.

Marrubium album duplex est, vulgare & peregrinum: hocq; vel latifolium, vel angustifolium. Marrubium album vulgare, C.B. Marrubium, Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lacun. Cord. in Dioscor. Lon. Cast. Cret. Marrubium femina, Brunf. Marrubium candidum, Trag. Marrubium album, Gef. hort. Lob. Lugd. Marrubium siue Prasium album, Taber. Prasium Anguillarç.

Stachys

STACHYS. CAP. CIII.

Stachys, frutex est marrubio similis, sed longior, folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi: & complures virgas ab vna radice exeuntes, marrubio candidiores. Nascitur in montibus, & asperis. Vim habet excalfactoriam, & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua, & secundas. vnde.

I. STACHYS.

II. PSEVDOSTACHYS.



Nihil mihi verendum est, quin planta, cuius hic imaginem appinximus, legitima, genuinaq; sit stachys. Est enim frutex Marrubio non absimilis, sed longioribus folijs, numerosis, hirsutis, raris, incanis, præduris, & odoris non iniucundis: quinetiam complures ex vna radice caules Marrubio candidiores profert. Flores spicatos, subpurpureosq; quo factum est vt plantam, quam antea Stachym legitimam esse putabam, Pseudostachym nunc appellauerim, qua frequentissima in Italia nascitur: assurgit virgis compluribus, angulosis, ab vna tantum radice exeuntibus, hirsutis, oblongis, præduris, odorisque iucundi. Flores gerit in purpura albicantes, qui per interualla verticillato ambitu caulem circumdant marrubij modo. Siquidem non video quomodo Sphacelus esse possit, vt quidam somniauit impudens Archiri Zotomus. Nam (vt Theophrastus est auctor) sphacelus, quam ego minorem saluam appello, folium gerit vrbana salua contractius, minusq; squalens: sed contrario modo se habent Pseudostachyos folia, cum salua sint duplo, triploue latiora, ac etiam longiora, quinetiam multò squallidiora. Plinius libro 24. cap. 15. Stachyn porri similitudinem habere tradidit, Græcarum vocum affinitate deceptus, pro prasion legens. Siquidem *σπάσιον* perrium significat, *σπασιον* verò marrubium, cui Stachys est similis. Stachyos meminit Gal. lib. 8. simpl. med. sic inquit: Stachys frutex est marrubio similis, gustu acris, & amaro: tertij est ordinis excalfacientium. Quamobrè rationabiliter non solum menses mouet, sed & abortum affert, & secundas eicit. *Στάχυς* vt res ex Gal. Græcè, ita etiam Stachys Latine vocatur: Italicè, Stachi: Gallicè, Saugè molle. Plinii lapsos. Stachyos vi.

Stachys habetur Germanica, Italica, Lusitanica, Cretica & palustris foetida. I. Stachys minor Italica, C.B. Stachys, Matth. Gef. hort. Dod. fol. Lugd. Tab. Stachys minor, Cam. Stachys spuria Flandrorum, Lob. in obs. Stachys Lychnitis, Lob. in icon. salua syluestris tertia, Cæsalpino. II. Stachys maior Germanica, C.B. Marrubium agreste & Galliticum agreste, Trag. Marrubium montanum alteru, Thal. Pseudostachys, Matth. Lugd. Stachys, Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. & hist. Lac. Lon. Cast. Lugd. Tab. Stachys Germanica, Gef. hor. ap. Stachys Dioscoridis, Lob. Stachys maior, Cam. Salua syluestris, Cæsalpino.

Ecc 4 605

†Ori.le. in-
 ta. i. interi-
 ore.
 a Meū φύ-
 ται εν παλι-
 σιας: χαί πα-
 ραδ είσοις. i.
 naicitur in
 umbrosis lo-
 cis & hortis.
 Phyllitidis
 consideratio.
 Scolopendri-
 um quid.

Φυλλίτις

PHYLLITIS.

CAP. CIV.

Phyllitis folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, sena, aut septena, recta, quæ parte anteriori læuia cernuntur, à tergo autem penfiles quasi vermiculos tenues ostendunt. In umbrosis, & opacis hortorum locis emicat: gustu acerbis. Neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium moribus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria, aut re- soluta aliis exercet, potui datur.

PHYLLITIS.



Manardi,
 Leonic. Ruel-
 lij, & Fuch-
 lapsus.

Qui notas omnes, quæ Phyllitidi à Dioscoride tribuuntur, diligentiſſime expendere voluerit, haud difficile quidem fa- teri cogetur, Phyllitim esse eam herbam, quam aliqui Linguam ceruinam, nonnulli verò Scolopendriam perperam appellant: Perperam dico, quòd legitimum Scolopendrium (vt infra suo loco dicitur) illa nimirum sit herba, qua Græcis Ασπληνος, Mauritanis verò Ceterach dicitur. Quod autē ita se res habeat, hinc in primis ad credendum impellor, quòd umbrosis, opacis, humentibusque locis proueniat: quòdque folijs sit rumice maioribus, longioribus, ac viridioribus, rectis, anteriore parte lauius, à tergo autem eminentijs quibusdam transuersim per interualla signatis, subrubentibus, qua (vt Dioscorides inquit) penfiles vermiculos referunt. Opinionem deinde auget acerbis sapor, qui gustu percipitur. Huc postremò accedit, quòd caule, flore, & semine vacet: tametsi non desint, qui credant, eius semen è pensilibus illis vermiculis prodire. Neque illud sententia nostra quicquam obstare crediderim, quòd huius herba complures reperiantur planta, qua præter Dioscoridis auctoritatem, vel quinquaginta emittant folia. Quippe (vt experientia compertum habeo) effodientibus nobis è terra hanc herbam nunquam ab vna tantum radice tot folia erumpere visa sunt, sed à quam plurimis se simul tangentibus, ita tamen vt vna ab altera separari possit. Vnde facile cognoui, quòd si singula radices abinuicem distincta considerentur, non pluribus, quam senis, aut septenis folijs referta inueniuntur. His itaque rationibus, mea quidem sententia, hac in re planè hallucinati deprehenduntur Manardus, Leonicensis, Ruellius, & Fuchsius, omnes alioqui clarissimi nominis viri, quòd tam facile crediderint, Linguam ceruinam vocatam Phyllitim nequaquam referre, sed Hemionitim. Nam etsi Hemionitis caule, flore, & semine vidua sit, non tamen folijs constat rumicis, sed dracunculi, curuis, noua luna instar. Illud insuper addiderim,

quòd iam reperta sit Hemionitis, qua omnibus prorsus notis legitimam refert. Sed ijs fortasse errandi occasionem præbuit vulgi opinio, qui Linguam ceruinam non magno quidem negotio ad omnes lienis affectus assumere suadet, quòd tamen Hemionitidis est proprium. Cuius forte vulgi opinionem ij potius secuti, quam quòd Phyllitidis lineamenta, notasiq; diligentius perpenderit, in hunc facile lapsum inciderunt. Atqui non ob id negauerim ego, Phyllitim lienosis auxiliari, cum id vulgari experimento constet. Non desunt quoque, qui Phyllitidis stillatitia aqua vtantur ad cordis affectus, atque in animi deliquijs & contra singultum. Eandem gargarizandam quoque præbent ad prolapsam columellam, refrigeratq; iocundam, & ventriculi ardores siccorum foliorum farina, ex earundem aqua excepta, & illita. Eadem quoque aqua os abluendum præcipiunt ad palati desquamationes, & cruentas gingiuis. Phyllitidis meminit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum sic inquit: Phyllitis cum qualitate sit acerbis, nõ absurdè diarrhæas, siue profluvia, & dysenterias pota iuuat. Planta qua φυλλίτις Græcis, Phyllitis item Latinis appellatur: Italis, Lengua ceruina ac pariter Phyllite: Officinis falso Scolopendria. Germanis, Nirtzungen: Hispanis, Lengoa ceruina: Gallis, Lang de cerf.

Phyllitidis
 vites.

Phyllitidis vi-
 res ex Gal.
 Nomina.

Lingua ceruina officinarum, C.B. Phyllitis (quasi foliosam dicas) Matth. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. (qui idem cum Hemionitide dicit) & hist. Angu. Ges. hor. Lac. Lob. Lug. Cast. Tha. Phyllitis vulgaris, Cam. Scolopendria, Brunf. Scolopendria vulgaris, Trag. Hemionitis, Fuch. Lingua ceruina, Lon. Casalpino. Habetur latifolia & angustifolia, sæpè namque in fontibus exigua reperitur: Latifolia rursus vel integro vel multifido laciniatoue folio, sed rarius reperitur.

Φαλαγγίον

PHALANGIUM.

CAP. CV.

Phalangium, à quibusdam phalangites, ab alijs leucacantha vocatur. Ramuli sunt ei duo, aut tres, resue, in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, laticulo dimidiata figuram, multo tenuiore, radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur, prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum vino pota, auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumque ictus: tormina quoque discutiant.

a Memm hic
 addit. 55
 φονζ αρσωελ
 κεταλ i. po-
 στεα enim cõ-
 trahitur.
 Phalangij cõ-
 sideratio.

Ealem ferè, qua hic de Phalangio posteritatis memoria prodidit Dioscorides, retulit Plinius libro vigesimo septimo, capite duodecimo, vbi ita scribit: Phalangites à quibusdam phalangion vocatur, ab alijs leucanthemon, vel, vt in quibusdam exemplaribus inuenio, leucacantha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes. Flos candidus, libo

I. PHALANGIVM.

II. PHALANGIVM RAMOSUM MAIUS.



lilio rubro similis: semine nigro, lato, ad lenticula dimidia figuram, multo tenuiore: radice herbacei coloris. Huius folio, vel flore, vel semine auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumque, & serpentium ictus: item contra tormina: Hac Pliniam referunt, unde illi nomen. Prouenit in montibus. Phalangij vires tradidit Galenus libro 8. simplicium medicamento- rum, sic inquit: Phalangites sic appellata est, quod morsis a phalangijs auxiliatur. Est etiam facultatis tenuium partium, deficcantur: quamobrem & tormina patientibus succurrit. Quod φαλάγγιον Græci, Phalangium quoque Latini dicunt: Phalangio, It. sli.

Phalangij vi-
res ex Gal.
Nomina.

† Si quis Græca Dioscoridis exemplaria consulat, hic non πλατὺν, hoc est latum, sed παχὺν quod est crassum, scriptum reperiet. Quod si præterea ea legat, quæ ex Plinio in commentario retulimus, deprehendet Ruellium in vertendo secutum fuisse Plinium, ex eoz, vocem illam reddidisse.

Phalangium aliud ramosum est, aliud non ramosum: illud vel maius, vel minus. Non ramosum, aliud magno, aliud paruo flore est. I. Phalangium magno flore, C.B. Phalangium, Matth. Cast. Taber. Lugd. Phalangium Dalechampij, eidem. Phalangium maius, Ges. hort. Sunt qui Lilia parua vocent. II. Phalangium ramosum maius, C.B. Moly Plinij, Dod. gal. Ges. hor. Phalangium ramosum, Lob. Dod. fo. Lug. Tab. Phalangium, Cæf. Camer. apud Matth. Phalangium Cord. in Diosc. Ges. hor.

Τρίφυλλον.

TRIFOLIUM.

CAP. CVI.

Trifolium, Græci triphyllon, alij oxytriphylon, alij menyantes, alij asphaltion, vocant. Frutex † supra cubiti altitudinem attollitur, virgas habens tenues, iunceas, & nigras, vnde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, lato arbori similia: ijs recenter enatis ruz odor inest, vbi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florem edit purpureum: semen quadantenus latum, subhirsutum, a ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens: radix tenuis, longa, b valida. Semē, & folia in aqua pota pleuriticis, vrinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ intercutem principia sentiunt, sceminis quoque vuluæ vitijs opportunis, auxiliantur: menses ciunt: ternæ drachmæ e semine dari debent, e folijs verò quaternæ. Contra serpētium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes percusserint: qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vicus habuerit, perinde afficitur, vt a serpente demorsus. Quidam terna folia, aut semina in tertianis, cum vino potui dedere, & in quartanis quaternæ, vt quæ febrium circuitus discuterent. Radix antidotis inferitur.

† Ori leg.
πήχως ἢ καὶ
μείζον. i. cu-
biti altitudi-
nis vel etiam
maioris.
a Μεῦ. ἐκ τῆς
ἐπιπέρας
τοσ ὡσπ. πρε-
ραίαν ἔχον. i.
ex altera ex-
tremitate ve-
lut cornicu-
lum habens.
b Catac. pro
isto habet.
ισχυρὰ στερεὰ
i. robusta, so-
lida, idem le.
Orib.
Trifolij con-
sideratio.

¶ Amesi plura in Italia passim in pratis, ac viridarijs Trifolij inueniantur genera, omnibus planè nota: non tamen de his tradidit hoc capite Dioscorides, sed de eo tantum genere, quod a bituminis odore Asphaltitis dicitur, de quo etiam scribit Galenus. Verum non ob id putandum, Trifolium pratense omne genus Dioscoridis fuisse ignotum: siquidem

I. TRIFOLIUM ASPHAL-
tite.

Lotus sylv.

Trifoliū tri-
plex Plinij.

Trifoliū acu-
cutum Scri-
bonij.





siquidem eius meminit libro quarto in sylvestris loti capite, dum
ita scribit: Sylvestris lotus plurimū in Lybia gignitur, caule bicar-
bitali, & saepe maiore, alis multis, folijs trifolij pratensis. Ex qui-
bus utique Dioscoridis verbis liquet, eos maxime hallucinari, qui
recenter contendunt Trifolium pratense esse lotum sylvestrem,
vel urbanam. Plinius libro vigesimoprimo capite nono, de trifolij
trifolij generibus differuit in hunc modum: Folio coronat & tri-
folium. Tria eius genera: menyantbes vocant Greci, aliq asphalti-
on, maiore folio, quo vtuntur coronarij. Alterum acuto, oxyp-
phyllon cognominatum. Tertium ex omnibus minutissimum. 10
hactenus Plinius. Trifolij acuti meminit quoque Scribonius Lar-
gus, qui ita scriptum reliquit: Trifolium acutum, quod oxyp-
phyllon appellant, nascitur in Sicilia plurimum: nam in Italia
regionibus nusquam eam vidi herbam, nisi in Luna porta, cum
in Britanniam peterem cum Claudio Cesare. Est autē folijs, &
specie communi trifolio similis, nisi quod pleniora sunt folia, &
quasi lanuginem quandam super se habent, & in extrema par-
te velut eminentem aculeum. Sed frutex huius duum pedum, in-
terdum altior conspicitur, & odorem grauem emittit, quorum
nihil circa pratense trifolium inuenitur: hac ille. Vt autem Scri-
bonius Largus atate Galeno superior, hac prodidit, ita quoque
Nicander medicus & poeta, tum Scribonio, tum ipso Dioscoride
vetustior, elegantissimo Carmine Trifolium celebrauit asphalti-
um. Idque μινυανθες, neque, vt vulgatum habet Dioscoridis, &
Plinij exemplar μινυανθες, appellari ait, comam alere loto ar-
bori similem, cui ruta (ρυτις, alias πυράνη Grecis vocata) odor in-
fit, atque vbi adoleuerit, grauem bituminis odorem mittit.
Versus Nicandri & ob summam antiquitatem, & propter admi-
randam vetustatem suspiciendi, sunt eiusmodi.

Ναὶ μὴν καὶ τριόφυλλον ὀπάζω κω-
λιν ἀρωγῶν
Ἡ ἔπου ἐν τριχῶντι πάγω ἢ δόπος φαρ-
μίθου.
Τὴν ἢ τοὶ μινυανθες ὁ δ' ἐτριπέτυλον ἐπίπυ.

Καὶ τὴν μὲν λωτὸν ῥυτῆς μὲν ἐκελον ὀδ μιν
Ἡ τοι ἔστ' ἀνθεα παύλα καὶ ἐπιπύλα ποικίλα τεύχε
Ὅϊον τ' ἀσφάλιον ἀπερεύγεται ἐνθα κολούσας
Σπέρμαθ' ἄσον κύμβουιο τραπέζην ἑνός ἐλέσθαι
Καρδὸ πω ἐν τριπέτας πύσσιν ὀφίεσιν ἀρωγῶν.

II. TRIFOLIUM ACE-
rosum.

III. TRIFOLIUM ACE-
rosum Luteum.



Handwritten notes in the left margin, possibly identifying the plant or providing additional botanical information.

IV. TRIFOLIUM PRATENSE.

V. TRIFOLIUM PRATENSE alterum.



Est & aliud trifolij genus sapore acetoso, quod quibusdam Panis cuculis, nonnullis vero Alleluja vocatur. Nos autem cum Plinio Oxyn appellandum censemus, siue trifolium acetosum. Opacis plurimum prouenit locis, propter sepes & itinera. Cauliculis exit pluribus ab vna radice surgentibus, pusillis, rotundis ac tenuibus, quorum singulus terna in summitate sunt folia cordis figura, & in pediculum fungi modo plerumque reflexa, mollia, acido gustu, flores edit albicantes, in quinque diuisos apices, stella figura: At qui ij peculiare cauliculos habent, singulique, singulo cauliculo nituntur. Radicem habet subterram, squamis contactam, qua nucamenti speciem referunt. Tota planta refrigerat oxalidis modo, proinde deuorata sitim extinguit, & ventriculi ardores extinguit. Iecur refrigerat & cor corroborat. Stillatitia eius aqua datur vtiliter potanda acuta pestilenti que febre laborantibus: at qui longe magis prestat succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se Erysiipelatis, & inflammatis locis, colluiturq; ex eo os, vbi lingua, palatum faucesue calida fluxione laborent. In summa ad ea omnia censetur vtilis Oxys, quibus oxalis auxiliari queat. Plinius (vt quidam putant) hoc oxyn nominat lib. 27. cap. 12. vbi sic inquit: Oxys folia terna habet. Datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui enterocelen habent. Nec plura de hac herba Plinius. Ceterum Trifolium pratense in Italia trium est generum, foliorum & florum diuersitate differentium. Primum folijs exit subrotundis, & amplis: maculosis, longo pediculo nitentibus, obsequioso, flexilique: floribus in capitulis subpurpureis, aut albicantibus, in cauliculorum summitatibus emicantibus. Nascitur in pratis & herbofo solo. Sunt qui Trifolij pratensis succum miris laudibus efferant ad oculorum nubeculas, vulnera & cicatrices. Vniuersa florentis planta decoctum potum, alba vteri profluua cohibet. Semen & flores ex aqua decocti, & ex oleo admoti, duos emolliunt abscessus. Secundum cauliculis assurgit lentis, obsequiosisq; folijs in vnoquoq; pediculo ternis, varia tamen facie perinde ac bituminosum: namq; quadam que ad radicem sunt Acetosi trifolij modo quod Oxym vocatur, trina ex vnico pediculo emergunt, cordis faciem quadantenus imitantur, cetera vero longa sunt & in cacumine acuminata, vt in Asphaltite: flores in capitulis sunt illi purpurei in flocci modum. Prouenit sponte in pratis & viridarijs & herbofis locis. Idem prestare potest quod alterum. Tertium vt primum circinatis, sed breuioribus. Distant & florum colore, quod in vno flores albicent, in altero rubescant, in tertio lutei spectentur. Pratense trifolium tempestates prauunciat. nam (vt Plin. est author) inhorrescit, & folia contra tempestatem subrigit. Habetur praterea herba, de qua ideo hic inter trifolij genera differendum duximus, quod folio exeat triplici cornu diuiso: vnde etiam apud quosdam herbarios sibi Trinitatis nomen comparauit. Hac itaq; herba TRINITAS Trinitatis herbæ merito. vulgo vocata, in locis prouenit vliginosis, & inter fruteta: gaudet enim opacis. Folia fert triquetra, hederæ minoris magnitudine, longis pediculis appensa, que auersa parte cyclamini modo subpurpurascunt, superiore vero albis quibusdam maculis resperguntur. Caules habet tenues, in cacumine primo statim vere flos emicat ceruleus in stella modum, è quo capitulum eritur echinata quadantenus specie, in quo semen oblongum subcaruleo colore. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, subrubentibusq;. Sunt qui hanc plantam Hepaticam vocant, quod (vt illi putant) iocinosos iuuet. Huiusce meminisse Gracos, nec pariter Mauritanos, hactenus compertum non habeo. Probatur maxime recentioribus medicis ad vulnera glutinanda, tam exterius illit. quam interius sumpta. quinetiam & ad enterocelas mirifice prestat: in quem vsu puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero diebus pluribus continuis propinant. Tota planta decoquitur in vino austero, ad columella. fauciumq; inflammationes. Sed vt ad trifolij nostra redeat oratio, eos in apertissimo errore versari existimaucrim, qui Andacocæ Aphris vocatâ, ad quamuis trifolij speciem referunt. Quandoquidē Andacoca (vt testatur Serapio) nil aliud est, quam Dioscoridis Aegyptia lotus. E cuius semine, quod papauerum modo capitibus quibusdam includitur, Arabes sibi oleum conficiunt, quod miris laudibus efferunt in neruorum morbis, praesertimq; tremoribus: illudq; oleum de Andacoca appellant.

Trifolij acetosum.

Trifolij acetosi vires Matthiolo.

Oxys Plin.

Trifolij pratensis genera tria.

Trinitatis herbæ merito.


Hepatica quodrunda.

Andacoca quid.

* VI. TRIFOLIUM PRAT.

Luteum.*

VII. TRINITAS.



Galenus fontē-
tia damnata.

Galenus lib.
ad Pisonem
spurius.

pellant. Id enim non desunt, qui credant è vulgaris trifolij semine fieri: sed quàm aperte decipiantur, vel ipsi videant, vel aliud iudicent. Trifolium scriptis tradidit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Triphyllum, quidam oxyphyllon, nonnulli minyanthes, sunt & qui cnicium vocitent. Prima quidem tria ab accidentibus fructus, reliqua duo nomina haud scio vnde. Vis plantae est calida, & sicca vt bitumen, cui odore est similis vtrinque tertio ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinam mensesq; prouocat: hac Galenus. Sed animaduertendum est, an Galenus ipse in Trifolij facultatibus rectè perceperit Dioscoridis sententiam. Quippe is in libro de theriaca ad Pisonem, vbi plurimum medicamentorum facit mentionem, quibus contraria insunt facultates, hac de eo memoria prodidit. Trifolium herba, quae hyacintho similis est, cum vere parturit, & semen agresti cnico persimile obtinet, decocta admodum, deinde morsibus aranei, vel vipera quoque ex aqua fotu adhibita ipsis medetur, & dolores statim sedat. Sin autem in alio non commorso sanum locum eodem fotu circumdederis, similem sensum, similesque dolores ipsos, quos morsus iniecit, omnes efficit. Vt re vera miraculo dignum opus esse videatur, videlicet herbam & morsum sanare, & ferarum modo sanam partem prauè afficere: haecenus Galenus. Verùm id, si Dioscoridis verba rectè expendantur, nullo miraculo fieri facile constabit, sed potius secundum ipsius naturae ordinem. Siquidem (vt Dioscorides scribit) non omne trifolij decoctum illud efficere potest, sed tantum id, cuius fotu quispiam à ferarum morsibus liber euaserit, si eo alterius loci vlcere affectus perfundatur. Id quod aperte Dioscoridis verba declarant, cum inquit: Tradunt aliqui totius fructus, radicis, foliorumq; decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua sanatus qui fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde afficitur, vt à serpente demorsus. Ex his Dioscoridis verbis clarè fieri puto, hanc rem in se nihil admirationis habere. Nam cum trifolij ipsius decoctum, quo demorsi fouentur, venenum à vulnere extrahat, eiq; permisceatur, haud dubiè id venenosum redditur. Quamobrem minimè quidem mirum videri debet, si idem decoctum, quo quispiam non demorsus fouetur, vbi perfusa partes aliquo vlcere laborauerint, veneno per vlceris poros ingrediente, ac sanguini se commiscere, ea omnia exciter mala, quibus demorsi vexantur: idem enim venenū cum sit, eosdem quoq; praebeat effectus necesse est. Vnde liquidò colligi potest, quod virus à Trifolij decocto euocatum, nō autem Trifolium, sit illud, quod similem sensum, similesq; dolores faciat. Quod autem venenū exuctum à ferarum morsibus, vlceratis partibus contactum necem asserre possit, complures tam Graeci, quàm Arabes authores, manifestè demonstrant. Quandoquidem scribentes ore demorsos sugere praestantissimum esse remedium, serid nos admonent, ne id ore vlceribus affecto fiat: quoniam si venenum illud vlcus inficeret, sugentem in mortis discrimen duceret. Hac itaque sunt, quae me maximè mouent, vt credam Galenum hac in re Dioscoridis mentem non accepisse, atque etiam si licet dicere, cacutiuisse. Caterum non desunt, qui velint, vt Galenum tueantur, librum de theriaca ad Pisonem non esse legitimum, idq; pluribus rationibus comprobant. Quibus an assentiendum sit, iudicent ij, qui Graecam Galeni phrasim profitentur, quiq; eius volumina diutius euoluerunt. Ego certè, vt dicam quod sentio, non possum illis subscribere, qui librum illum spurium esse censent. Inter quos hic mihi honore gratia nominandus venit, Iulius Alexandrinus Tridentinus, vir quidem singularis ingenij & eruditionis, ac propterea maxima existimationis medicus apud Caesarem Ferdinandum Rom. Imp. Huius ergo viri iudicium, vt quod multu & ipsi quidem firmis argumentis nitatur, & laudamus libenter, & probamus. Caterum, cum scribat Dioscorides trifolium asphalites folia ferre loto arbori similia, non desunt, qui putent arborem lotum folia ferre ordine, & numero ternario, sed procul dubio hallucinantur, cum nullus extet author, qui lotum arborem scribat terna simul edere folia, siquidem cum Theophrastus, cum

Aut, cum Plinius folia illi inesse liciis haud dissimilia scribit. Quare censendum est Dioscoridem trifolij huiusce folia loti arboris comparasse folijs, non quod terna folia loto, perinde ac trifolio, ex vno pediculo exeant, sed quod vnumquodq; per se trifolij asph. alt. itis folium, loti arboris folium referat. Τριφυλλον Graeci vocant, quod Latini Trifolium: Itali, Trifoglio bituminoso. Trifolium pratense: Italis, Trifoglio. Germani, Wossentlee: Hispani, Treuol. Trifolium pratense alterum, Italis Trifoglio indifferenter dicitur. At Trifolium acetosum, Graecis: Τριφυλλον ὄξις: Barbaris, Alleluia, siue Luloia, siue Panis cuculi: Italis, Trifoglio acetoso: Trinitas, Italis, Herba trinita.

Nomina.

Trifolium sic dictum, quod singulis germinationibus terna exeant folia, cuius differentias ultra septuaginta in vniuersali nostra historia vna cum iconibus proponemus, hoc loco nouem tantum species ob oculos ponuntur, quorum. I. Primum Trifolium est bitumen redolens, quod Trifolium Asphaltite, Matth. Lac. Lugd. Trifolium asphalticum, Lob. Trifolium, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gef. hort. Lon. Trifolium bituminosum, Dod. fol. Cast. Catal. Tab. Cam. Oxytriphylum, Gef. hor. Folia quae ante caules prodeunt, rotunda sunt, vt figura Matthioli minores ostendunt, cum vero caulescit & adulta est, acuminata redduntur, quare neutiquam binae figurae proponendae, vt fecit herbarij Lugdunensis auctor, alterum rotundis, alterum longioribus folijs nominans, idcirco vna figura exprimere voluimus. II. Trifolium acetosum vulgare. C. B. Trifolium acetosum, Brunf. Matth. Dod. fol. Cast. Lugd. Thal. Oxytriphylon, Trag. Lac. Oxys, Fuch. Dod. gal. Cord. in hist. Tab. Oxys Pliniana, Gef. hor. Lob. Oxys flore lacteo, Cam. Aleluia, Lac. Lon. Panis cuculi, Brunfelsio. Hac flore habetur albo, nonnunquam venis purpurascensibus distincto & femina ceteris: est & toto purpureo, rarior inuentu, mas existimatur. III. Trifolium acetosum corniculatum, C. B. Oxys, flore luteo, Clus. hist. Hisp. Cam. Tab. Oxys lutea Corniculata, Lob. Lugd. Oxys, Catal. Oxys siue trifolium acetosum floribus luteis, Dod. fol. Trifolium acetosum flore luteo, Castori. Hae differunt a priori quod serpat, folijs sit hirsutioribus breuiori pediculo annexis, flosculis flauis, quibus succedunt cornicula seu siliquae, sursum spectantes, oblongae, crassiusculae, foliosae ex quinque loculis confiturae, quae vbi ad maturitatem peruenere laeuissimo, tactu semina flaua & aspera e lateribus expunt, oculis quam primum conuenientibus, vt non appareat siliquas diffilijisse. IIII. Trifolium pratense purpureum, C. B. Trag. Fuch. Trifolium pratense, Matth. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lac. Lob. Cast. Lugd. Tab. Cam. Catal. Trifolium pratense vulgare, Thal. V. Trifolium pratense album, C. B. Fuch. Dod. gal. Tab. Trifolium album, Brunf. Trifolium pratense alterum, Matth. Trag. Lac. Lugd. Trifolium vulgare albo flore, Gef. hor. Trifolium acutum, Lon. VI. Trifolium pratense luteum capitulo breuiore, C. B. Melilotum minus, Brunf. Meliloti exiguae species prima, Trag. Lotus syluestris minor, Dod. gal. & Lugd. Lotus syluestris, Lon. Trifolium pratense tertium, Matth. Cast. Trifolium pratense luteum, Fuch. & Lugd. Cam. Trifolium agrarium, Dod. fol. Trifolium aruense, Tab. Trifolium luteum primum, Thal. Trifolij genus Medicae simile, Gef. de hortis. VII. Trifolium hepaticum, C. B. & Cam. Trifolium aureum, Brunschvig. Lon. Dod. fol. Trifolium magnum seu aureum, Trag. Hepatica, Brunf. Dod. gal. Hepatica aurea, eidem, Gef. hort. Thal. Tab. Hepaticum trifolium, Lob. Trinitas, Matth. Gef. hort. Cast. (cui & Trifolium aureum magnum) Catal. Herba Trinitatis, Lugd. Epimedium, Cordo. in Diosc. & hist. Folijs aliquando maioribus, magis minusve hirsutis, aliquando maculatis: floribus est caeruleis, violaceis, purpureis, rubris, albis: rarius flore pleno. VIII. Trifolium peltatum Creticum, C. B. Ex radice tenui, oblonga, fibrosa, cauliculi

* VIII. TRIFOLIUM PEL-
tatum Creticum. *

* IX. TRIFOLIUM SPI-
nosum Creticum. *



*Trifolium creticum
Stomach.*

exsurgunt palmo minores, nudi, folia parua tripartito diuisa, parum crenata, oblongis pediculis
caulicorum summis flosculi quaterni, quiniue, ordine succedentes, forma ornithopodij, luteo
insident: quibus succedunt siliquæ latae, planæ, membranæ, quasi semicirculares in filamentum abeutes,
num vel alterum paruum compressum semen continent: quæ dum molles sunt, dulcissimæ, e. in apertæ,
at ubi induruerint amarissimæ. Hoc rusticis Cretensibus *μαρωριαν* dici auctor est D. Honorius Belli Vi-
centinus, qui aliquot nunc annis in Creta medicinam exercet, qui Trifolij Cretici odorati nomine
transmisit. IX. Trifolium spinosum Creticum, C. B. Ex radice parua caules sesquipalmares angulosi
inclinati, in alios brachiati, prodeunt: ramulos cingunt folia pediculis in hærentia, quorum quod-
libet constat tribus foliolis oblongis, acuminatis, in minimam spinam abeuntibus: ad ramulorum diuisio-
nem supra infraq; spinæ parua aduncæ: vnde flos campanulæ aruensi similis pediculo breui insidens. pro-
dit, ex quinq; foliolis cæruleis compositus, quos foliola viridia excipiunt, in florum medio apices aliquot
lutei: succedunt siliquæ triangulares compressæ, semen ruffum compressum continent. Iulij principio
floruit, apud Iohannem Bauhinum fratrem Montembelgardi, cui semen Orbilochorto nomine missum
prius acceperamus à Laurentio Rosenau nomine Trifolij spinosi semper virentis Cisti flore.

Πόλιον

POLIVM.

CAP CVII


† Orib. leg.
λεπτόφυλλον.
i. tenuifolio.
αΜε. πολιάν
πρίχα. i. ca-
no capillo.

Duo genera polij. Montanum, cui teuthrio nomen est, & cuius est vsus: † tenuis frutex est, candidus
dodrantal, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente,
paruo, a cano hominis capillo simili, grauius olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius,
non vsque adeo valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium iectibus, hy-
dropicis, morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachum male habet, caput doloribus afficit: aluum, &
menses ciet: substratum, suffitumve serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

I. POLIVM.



II. POLIVM ALTERVM.



Polij cõside-
ratio.

Polium Montanum planta est candidans, folijs oblongis, per ambitum serratis, & per intervalla caulem ab imo ad sum-
mum vestientibus, pluribus minoribus inter maiora subnascens. Caules habet copiosos, rectos, rotundos, lignosiq;
albicantes, & qui in cacumine capitula edunt, florida, candidantia, thymi figura. Tota planta odorata est, odore tamen a-
cuto, & subgravi. Est & alterum quod herbariorum quidam luam muscatam vocant. Id ego inter poly genera recensẽ-
tam esse secundum poly genus a Dioscoride descriptum. Siquidem altero fruticosius non est, nec minus odore, & viribus præ-
stans. Prouenit hæc planta in collibus, aridis præsertim locis, foliosa, humi procumbens, folijs coronarij rorismarini minori-
bus, duriusculis, auersa parte incanis: cauliculos gerit tenues, rotundos, subalbicantes, flexiles: capitulis in cacumine albi-
cantibus, alterius poly capitulis haud longè dissimilibus. Radice niritur simili. Tota planta bene olet, & minus quam alte-
rum, nares ferit. Caterum vtrunque polium notum est, & copiosum in Italia cum montibus tum etiam collibus pronent.

Polium alte-
rum & eius
historia.

Polij Plinij.

Polij meminit Plinius libro 21. cap. 7. vbi ita scriptum reliquit: Apud Græcos Polion herba incluta Musæi, & Hesiodi laudat-
ur, ad omnia vtilem predicantium, superque cetera ad famam etiam dignitatis: prorsusque miram, si modo (re-
tradunt) folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspicuntur. Duo genera eius, campestris ma-
ius, sylvestre quod minus est: quidam teuthrion vocant: folia canis hominis similia, à radice protinus, nunquam p. 1160
el. 1178

altiora: hec Plinius, quorum plura à Theophrasto mutuatus est. Caterum in ijs Plinius aperte hallucinatus deprehenditur, quod turpiter Polium cum tripolio confuderit, cuius historiam libro quarto pertractat Dioscorides. Siquidem Tripolij proprium est, non autem Poly, teste Dioscoride, ut colores ter in die mutet: neque id quidem à Dioscoride, ut a Plinio, folijs, sed floribus adscribitur. Præterea capitulum Polio inesse cano hominis capillo simile scribit Dioscorides, non autem folijs, ut ipse Plinius tradit. Caterum polio vis inest reserandi, incidendi, attenuandi & abstergendi. Ad alligatur fronti contra oculo- rum infusions, protinus ubi inuentum sit, nec alia herba magis conuenit. Polij vires memoria producit Gal. lib. 8. simplic. Polij vires ex med. v. i. inquit: Polium amarum est gustantibus, & modice acre. Itaque viscera omnia obstructione liberat: urinamq; Galeno. & menies iter. Ac vitide etiamnum magna vulnera glutinat, maxime species eius fruticosa. Aridum cum fuerit maligna thera sanat illitum, & magis hoc præstat quod minus est. Polium minus quo etiam vtitur ad antidota, & acrius, & a- 10 maris est quam maris, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalescentium. Planta Græcis Nomina. πολιον, Latinus item Polium appellatur: Mauritanus, Cahade, lahade, seu Giade: Italicus, Polio. Gallus, lue muscate. At Poli- um alterum, Græcis πολιον ἑτερον: Italicus, Polio secundo: Herbarijs nonnullis Iua muscata.

Polium dictum propter canitiem, quæ in folijs secundum Plinium, in capitulis secundum Dioscoridem apparet. I. Polium maritimum erectum, C. B. Polium primum, Matth. (in maioribus figuris, in minoribus enim transpositæ sunt figuræ & pro altero positum) Dod. fol. Clus. hist. Hisp. Polium, Lac. Lugd. Cam. Polium montanum, Lonicero. Hoc distinguimus in rectum, quod in littore Mediterranei maris Mòspessuli, in quo & Epipolium obseruauimus: & in supinum, quod in littore Adriatici maris apud Venetos legimus. II. Polium Lauendulæ folio, C. B. Polium alterum, Matth. (in maioribus, non autem minoribus figuris) Lacu. Lugd. Polium alterum Lauendulæ folio, Cam. Polium recentiorum sæmina. Lauendulæ folio, Lob. Polium Germanicum, Ges. hor. ap. Polium campestre, Lon. Tabernæmontano.

Σκόρδιον.

SCORDIVM.


CAP. CVIII.

Scordium in montibus, & palustribus nascitur, folijs triflaginis, maioribus, nõ sic in ambitu diuisis, ali- quantam allia redolentibus, gustu amaris, & adstringentibus, quadrangulis caulibus: subrubro flore. Herba vim excalescentiam habet: urinam cit. Cocta recens, arida cum vino, a aduersus venenatos ser- pentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem, binis drach- mis cum hydromelite, crassamen purulentum pectore expellit. Facit aridæ farina ad veterem tulsim, ru- 30 pta, conuulsa, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat: cum aceto acri, aut aqua, podagris conuenienter illinitur: menses imposita mo- uet, vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca b excrescentias in carne cohibet. c Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumque.

a Meū πρὸς ἐρπετῶν δ' ἡγ- ματα καὶ θα- νάσιμα. i. Cō- tra serpentiiū morsus, & læ- thalia.
b Cat. ἑπο- σαρκώματα. supercrescen- tem carnem.
c Meū χύλι- σμα. i. suc- cus expressus.

I. SCORDIVM.

II. ALLIARIA.



Erysimum allianæ
Staub.

Scordium non ita pridem inueniri, & cognosci cepit in Italia. Siquidem præterita nuper ætate omnes tum medici, tum Scordij con- sepiarij Mauritanorum monumentis decepti, syluestri tantum allio, quod à Dioscoride ophioscorodon vocatur, pro sideratio. legitimo Scordio utebantur. Neque ys solum rerum imperitia, sed etiam vocabulorum vicinitas imposuerat, ut qui Scordi- um a Scorodo, quod Græcis allium significat, distinguere nescuerint, pro vnoque acceperint. Sed illis potissimum errandi oc- 40 casionem dederat Auicenna, vel eius interpres, quod in alteram theriaca compositionem Scordium, in alteram verò sylue- 45 stre al-

Errores inter pretis Auicen- næ.


stre allium addiderit. Quod cum vidissent superioris aetatis medici nonnulli, rei & prioris vocis ignari, hanc ex altera expulerunt, & Auicennam in hac re sui ipsius interpretem fecerunt. Unde adducti sunt, vt certo crediderint, syluestre allium & Scordium nihil inter se differre, atque vnam, & eandem plantam esse. Quo postmodum factum est, quod syluestre allium apud omnes in Scordij locum illegitimè successerit. Verum enimvero in hunc nunquam fortasse incidissent errorem, si Dioscoridis & Galeni scripta diligenter perlegissent. Porro verum legitimumque Scordium, trissagini adeo simile, vt Trissago palustris merito dici queat, humentibus ac palustribus locis proueniens, alij odore prae ditum, recentiorum diligentia iam omnibus magis innotuit, quam vt sit à nobis longiori historia representandum. Prætulit Galenus lib. 1. de antidoto Scordium, quod ex Creta aduehitur ijs verbis: Scordium optimum ex Creta defertur: quanquam non sit improbandum quod in alijs quoque nationibus reperitur. Scriptum autem est, à quibusdam viris grauisimis, cum in bello interemptorum caedua multa dies insepulta iacuissent, quacunq; supra Scordium fortè fortuna ceciderant, multò minus alijs computruisse, ea præsertim ex parte qua herbam contigerant. Ob quam rem sanè omnibus persuasum est, tam putrescentibus animalum venenis, quam medicamentorum deleterijs Scordium aduersari. Præterea Scordij meminit idem Gal. li. 8. simpl. medic. vbi de eius viribus ita scribit: Scordium ex multiformibus id tum saporibus, tum facultatibus constat: nam & amarum quid obtinet, & acerbum, & acre, & maximè scorodo, hoc est, allio adsimilis eius est acrimonia: vnde sane, measentia, nomenclaturam sortitum est. Expurgat igitur, simulq; excalfacit viscera, tum menses, vrinamq; mouet. Præterea conuulsa, ruptaq; & laterum dolores ab obstructione & frigore natos, sanat epotum. Denique viride quidem illitum magna vulnera conglutinat: sed sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum: hætenus Galenus. Caterius herba quedam iuxta sepes, & in agrorum marginibus nascitur, quæ & odore, & sapore ita abunde allium refert, vt non temerè valgò ALLIARIS siue Alliaria vocitetur. Huius folia cum primum erumpunt, serè rotunda spectantur viola similitudine: postquam verò adoluerint, per ambitum in serræ modum laciniata visuntur, vt quadantenus melysophyllis effigiem representent, leuiora tamen sunt, nec adeò rugosa, & prope caulem latiora: quæ digitorum attritu gustatq; allij odorem, & saporem reddunt. Caulem proferit bicubitalem, rotundumq; flores albos, & semen nigrum, minutumq; irrationi modo tenuibus siliquis inclusum. Radix, quæ longuscula est, eundem cum folijs odorem retinet. Vt plantæ huic calfactoria & desiccatoria, verum non adeò vehemens est, vt in allio: aperit, incidit, digerit, prouocat. Attamen hinc certo colligi potest, quod ea crassos humores extenuare, & lentos incidere valeat. Semen emplastri modo impositum, vuluæque admotum, mulieres vteri strangulatu oppressas liberat, & excitat. Quæ plantæ ἐν ὄρει τῶν Γραίων Scordium similiter, & Trissago palustris Latinè vocatur: Arabicè, Scordeon, seu Scordeum: Italicè, Scordio: Germanicè Wasserbarrenig vnd Knoblauchstraum: Hispanicè, Scordio: Gallicè, Chamaraz. Alliaria, Italis Alliaria: Germanis, Knoblochstraum: Gallis, Alliaire.

Scordium quòd aliquantum Allium redoleat Dioscoridi: at Galeno propter acrimoniam Allio admodum similem, nomen habere videtur: quibusdam, Crateua autore *μυθριδάτιον* ab inuatore dicitur. Præfert Dioscorides cum Galeno Creticum, quod sanè à communi (circa Montembelgardum frequens) varietas, non solum magnitudine, sed maximè lanugine frequenti. I. Scordium Trago. Matth. (cui & Trissago palustris) Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Dios. Lac. Lob. Cast. Lon. Tab. Cæs. Lugd. Cam. Scordium verum, Ges. hor. Scordium primum, Anguillaræ. II. Alliaria, dicta quòd folia digitis comminuta Allium, seu porrum sectiuum cum nasturtio redolent: quod quibusdam Thlaspidium secundum Crateuam censetur: alijs Alektorolophos Plinij libro 25. cap. 5. Alliaria, Trag. (cui & Thlaspidium cornutum) Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. (cui & pes asininus) Lac. Lo. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Tab. Thal. Cam. Alliastrum vel Alliaris, Ges. hor. Rima maria, Anguillaræ.

I. TVSSILAGO.

Βίχρον. TVSSILAGO. CAP. CIX.

a Meū ὄχρον
i. pallidus.
b Meū, & Catacuz. φύεται περὶ λιβάδας καὶ ἐν ὄρει, τὸ πρῶτον. i. nascitur circa riuos, & a quosdam, locos.
c Meū ὑποχρῶδες. i. subficcus rufus. Tussilaginis confid. Plinius Tussil. sine flore scribit.



Tussilaginis folia sunt maiuscula, quam hederæ, sex aut septem à radice, subalbida à terra, supernè virentia, in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus: flos a luteus, vere prodit, quo vnà eum caule confestim exiit: inde nonnulli his vacare existimant. Radix tenuis est, & superuacua: nascitur in amœnis, & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffitu, ita vt fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanant qui sicca tussi, atque orthopnoea infestantur: pectoris vomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix: decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eicit.

Tria Bechij numerantur genera, quamuis Dioscoridis vnum tantum sit genus. Tussilago Hetruscis vulgò dicitur Farsafara, & Farsarella, nomine à Romanis fortasse deducto: hanc enim ab ijs Farsariam vocatam fuisse testantur nomina Dioscoridis falsò adscripta Officina hos vel illos secuta eam Farsariam appellant, nec non etiam Vngulam caballinam. Herba est vulgaris notitia. Caule & flore exit adeò fugacissimus, vt Plinius, qui eorum tam subitam iacturam non animaduertens, deceptus, Tussilaginem sine caule, & sine flore nasci memoria prodiderit: cum tamen ea vere prima & caulem, & flos proferat, sed qui enati breui admodum tempore dantur.

quo non nisi etiam à peritis, vel ab ys, qui tunc sese fortè fortuna tulerint obviam, conspici possint, eoq, magis, quòd ydem
 canas & fios prodeant, priusquam folia emuent. Quare sicut scripsit Dioscorides, Tussilaginem confestim exui cum flore,
 cum canis. atque inde nonnullos hu vacare existimasse. Sed certe vel hæc non legit, vel illa nõ observavit Plinius, quod Tussilaginem
 aperto errore & caule, & flore viduam fecerit. Is Pliny error deprehenditur lib. 26. cap. 6. vbi ipse de Tussilagine
 dicit ys verbus: Tussim sedat Bechion quæ & Tussilago dicitur. Duo eius genera. Sylvestris vbi nascitur, subesse aquas cre-
 dunt. & hoc habent signum aquileges. Folia sunt maiuscula, quàm hederæ. quinq, aut septem, subalbida a terra, supernè
 pallida sine caule, sine flore, sine semine: radice tenui. Quidam eandem esse bechion, quam alio nomine chamaleucen pu-
 tant. Huius arida cum radice fumus per arundinem haustus, aut deuoratus, veterem tussim sanare dicitur: sed in singulos
 haustus passum gustandum est. Altera à quibusdam salvia appellatur. similis verbasco: hæc Plinius. Verum altera Tussilago,
 cui nulla sit mentio à Dioscoride, vt pote qui vno tantum eius genere contentus fuerit, mihi hætenus incomperta est: nisi
 ea fortasse sit, quam aliqui herbariorum Centrum galli vocant. Porro nascitur in Tussilaginis radice quadam sub:lbida
 lanugo, quæ a radicem segmentis prius repurgata, & deinde linteolis inuoluta, & in lixiuo parum decocta, addito salis ni-
 tri aliquantulo, ac demum sole siccata, omnium optimus est fomes ad ignem è silice excussum excipiendum. Quippe adeo i-
 gnu est rapax, vt statim primo tantum chalybis concussu accendatur. Caterum ego plantam, quam omnes ferè, qui herba-
 ria scripserunt, perperam Petasitem vocant, MAIOREM esse TVSSILAGINEM non ambigo. Namque crescit hæc
 humidis, & vliginosis locis, & præsertim propè riuos aquarum, perinde ac altera Tussilago, Caulem edit quoque, ante-
 quam folia emergant, in ipso Veris principio, concavum, dodrantalem, pinguem, purpurascens, paruis oblongisque cir-
 cundatum solys, in cuius cacumine flores exeunt spicati, ex purpura albicantes, qui vna cum caule paulò post flaccescentes

Plinio Tussi-
lago duplex.

Fomes ignis
ex tussilag.

Tussilaginis
maioris hist.

20 IL TVSSILAGO MAIOR.

*III. PETASITES FLO-
re candido.*

Tussilago alba



contabescunt, & in pappos disiliunt Eodem ferè tempore folia è terra emergunt altera parte incana, quæ anteaquam ado-
 lescent, Tussilagini antea scripta similia spectantur: atqui post hæc in tantam crescunt amplitudinè, vt personata folia am-
 plitudine superent. Horù singula pediculo nituntur purpureo, alba lanugine obducto, qui a radice prouenit. Radicè edit lon-
 gam brachy quandoq, humani crassitudine, intus candida, materie fungosa, amara, atq, odorata. Hanc plantã, qui putant
 Petasite esse, proculdubio hallucinantur, quòd Petasites pediculũ proferat cubito maiore, crassitudine pollicis, à quo prægrã
 de solitudo fungus è suo medio pediculo dependeat, id q, in maiori Tussilagine haudquaquã visitur, cum eius foliũ non in
 medio, vt fungus pediculũ habeat, sed perinde ac Tussilago in folij latere, quod ad radicem spectat. Ad hæc alia quoq, habetur
 60 planta, quæ nõ ab re inter Tussilagines annumerari potest. Hæc folijs exit nigra: populi ampliorib. ad tussilaginis figurã incli-
 nantibus, sed non tot prominentibus in circuitu angulis, nec à terra tam saturatè albicantibus. Caulem edit sesquidodrã-
 nalem, a quo plures oriuntur rami, in quorum summitate flores exeunt aurei, magni, rosarum figura. Radicem habet al-
 bam, & subamarã. Floret vere, Aprili præsertim mense & Maio quoque. Nascitur circa riuos aquarum, in conuallibus
 & pratis vliginosis. Non desunt qui hæc Caltham esse contendunt, quorum sententiam non probamus. Verum qui cen-
 sent hæc Pliny esse chamaleucen, Faranum, FARFVGIVM ve cuius ipse meminit libro 24. cap. 15. eos haudquaquam
 hallucinari putauerim, & huius eundem meminisse quoque crediderim loco superius citato, vbi de Tussilagine disieruit.
 Nam cum inquit, postquam de Tussilagine egit: Quidam eandem esse Bechion, & alio nomine chamaleucem putant: ys sa-
 ne verbis facile quissiam coniectari poterit, non desuisse Pliny tempore, qui hæc plantam inter tussilaginu genera repone-

Petasites
quid.

Tussilago
tertia, & eius
histor.

Chamaleuc
teu Faragiũ
Plin.

IV. TUSILAGO SIVE
Farfugium.* V. CALTHA PALVSTRIS
flore pleno.*Tusilag ma-
ioris vires.Tusilaginis
vires ex Gal.

Nomina.

rent, quòd ambas viribus pares noscerent. Nam Plinio Chamaeleuce, siue Farfugium veterem tusum perbellè curat, si radicè cupressi carbonibus imposita fumus per insudibulum imbibatur. Vbi vulgaris, ac vera Tusilago non fuerit ad manum, Farfugium eius loco belle substitui potest: nam is ferè viribus præstat. Maioris tusilaginis radix excalfacit, & attenuat, incidit, quinetiam abstergit, vt eius euidentis indicat amaritudo. Constat autem multorum quoque experimentis, præstare hanc contra pestilentiam, & pestilentes febres, vbi in puluerem contrita radix duarum drachmarum pondere ex vino propinetur, & deinde sudare cogantur agri: quamobrem Germanis pestilentia radix appellatur. Præstat eadem ad veteri præso cationes, & cruciatus, eodem modo sumpta. Propinatur item veterinarijs, & pastoribus, contra quadrupedum verminem, sed peculiariter equis qui anhelandi difficultate laborant. Reliqua cum Tusilagine communia habet. Tusilaginis facultates posteritatis memoria tradidit Galenus li. 6. simpl. medic. sic inquitens: Bechium ideo sic nuncupatum est, quod *βήχιον* hoc est, tusses, & orthopnoas iuuare creditum sit, si quis videlicet folia arida sumens, aut radicem in prunis accedens, ascendentem inde fumum inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, vt sine molestia noxave omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia virentia partes cruda inflammatione obsessas illitu extrinsecus adiuuant, propter aquea humiditatem admissionem: qua omnia viridia, teneraq; participant, alia plus, alia minus. Nam si ca Bethij folia acriora sunt, quam vt partibus inflammatione laborantibus conueniant. Quæ planta *βήχιον* Græcis, Tusilago Latinis vocatur. Officinis. Farfara, & Ungula caballina. Italis, Farfara, Farfarella, & Vnghia di cauallo: Germanis, Koshuech/ vnd Brandelauch Hispanis, Vnha de asno, Gallis, Pas de asne, siue Tacconnet. Tusilago maior Græcis *βήχιον μέγα*: Italis, Farfara maggiore. Germanis, Pestilenswurk. At Tusilago altera, siue Farfugium, aut Farranum, aut Chamaeleuce: Italis, Farfugio.

† Nulli dubium est, quin hoc loco in Dioscoride mendum subsit. Quomodo enim radicem Tusilaginis *αχριστον* hoc est, inutilem rectè vocauerit Dioscorides, si paulò post ei nonnullos vsus tribuit? Errorem hunc à nemine interpretum, quod suam animaduersum, vidit Manardus, vidit item Fuchsius, sed vterque tamen locum inemendatum reliquit. Equidem, vt dicam quod sentio, verbum illud vt adscititium delendum esse puto, Oribasy testimonio nixus, in cuius codice manu scripto illa dictio non legitur.

Tusilago, quòd tusi medatur. I. Tusilago vulgaris, C. B. Clus. hist. Pann. Cam. Ungula Caballina (cui & Personata) Brunf. Trag. Tusilago, Matth. Fuch. Cord. in Diosc. Gef. hort. Lac. Anguill. Lon. Lob. Cast. Lugd. Cæsal. (cui & Chamaeleuce Plinij) Thal. Bechion, Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Nenufatum terrestre Arabum. Rarius reperias folia cum floribus, communiter enim flores cum caulibus, antea quàm folia prodeant, pereunt. II. Petasites à forma folij, quod *πετασίτης* galeri modo amplum, Petasidem Dioscoridis, & Chamaeleucen Plinij existimamus. Petasites flore punicante, C. B. & Thalyo, Petasites (cui & Costi genus, & Galerita) Trago. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. & hist. Gef. hor. Ang. Lon. Lacu. Lob. Clus. hist. Pan. Lugd. Tab. Cæf. Cam. Tusilago maior, Matth. & Castori: Perfolata Plinij, Dalechampio. Distinguuntur floris colore & odore, quæ punicante & odorato mas, quæ candido & inodoro femina creditur: verùm Lugdunensis candidi quoque odorati meminit. III. Petasites flore candido, C. B. & Thalyo, non solum colore differt à superiore, sed folijs maioribus, Tusilagini æmulis, floribus item minoribus: Petasites flore albo, Cam. in suo Matth. Petasites femina flore candido, Eadem in herbo

in horto. IV. Caltha palustris simplici flore, C.B. Caltha Vergilii, Trag. Caltha palustris, Dod. in icon. & fol. Gei. hor. Lob. Lugd. Fulfilago altera, siue farfugium, Matth. Farfugium, Cast. Chamaleuce, Anguill. Chelidonia palustris, Cord. in hist. Dotterblumen, Dod. gal. Epimedium, Dod. in octavo. Chrysanthemum, Lon. Malacocissus maior dicebatur Fuchsis. Amellus Vergili seu Butomon Constantini, Thalyo: Populago, Tab. Flore simplici in syluestribus, pleno in hortis Germaniæ habetur: in Angha verò & plenis & odoratisipente prouenire volunt. V. Caltha palustris flore pleno, C.B. & Cam. Caltha palustris floribus dentis, Gei. hor. Populago multiflora Tabernæmontano.

ARTEMISIA. CAP. CX.

10 **A**rtemisia magna ex parte in maritimis nascitur a absinthii modo fruticosa, maioribus, & pinguiori-
bus foliis, & ramisq;. Huius quidem genera duo. Vnum latius, habitiusque, foliis, virgiltq; latioribus.
Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vni-
caulis nomine appellant e tenuem herbulam, simplici caule, & a minuto, floribus scatente tenuibus, fla-
uo colore: h.æ. iucundiozem, quàm præcedens efflat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruefactæ
conuenienter in muliebres detestus adiciuntur, ad detrahendos menses, partus secundæq;: item ad præ-
elutiones vniuz & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remoratum vrinam cient: menses
pellant pubertitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha eadem, quæ infessio trahit. Coma tribus drachmis eo-
rundem educendorum gratia bibitur.

a Me. ἀρτεμισία
μενείδης παρ
ραϊσός ἀρτε
μισία herba
fruticosa, ad-
similis absin-
thio.

b Deest in
meo exempl.

c Me. λεπτό-
καρπον. i. te-
nuisemine.

d Me. σφόδρα
μικρόν. i. val-
de paruum.

ARTEMISIA TENVIFOLIA. CAP. CXI.

10 **A**rtemisia tenuifolia in sepibus, & cultis iuxta aquarum ductus nascitur. Eius flores, & folia contrita
simpliciter odorem reddunt. Si quis stomacho laborans, herbam cum amygdalino oleo bene cõtun-
dat in malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui neruorum quoque dolore
cruciat, si succum eius cum oleo rosaceo miscens illinat, sanatur.

ARTEMISIA.



Tria à Dioscoride recensentur Artemisia genera. Vcrum
priora nullis inter se notis certant, nisi quod in vniuer-
sum altera maior est: altera vero minor, qua priuatim flo-
rem gerit candidum, paruum, tenuem, ac graueolentem.
Qua autem tertio generi ascribitur, herbula est simplici, te-
nuiq; caule, floribus plurimis referto, flauo colore. Id quod et-
iam confirmat Plinius lib. 25. cap. 7. sic inquit: Artemisia
absinthii modo fruticosa est, maioribus foliis pinguibusq;. I-
psius duo genera: altera latioribus folijs: altera tenuioribus, &
non nisi in maritimis nascens. Sunt qui in mediterraneis eo-
dem nomine appellant herbam simplici caule, minimis folijs:
fiores copiosi erumpentes, cum vna maturefcit, odore non in-
iucundo, quam quidam botryn, alij ambrosiam vocant. Talis
in Cappadocia nascitur: hac Plinius. Qui tamen si in prioribus
Artemisia generibus, nihil à Dioscoride dissentiat, disidet ta-
men, & errat in tertio, quod in eius locum ambrosiam sequē-
ti capite ab ipso Dioscoride descriptam subiecerit, credideritq;
deceptus hic ambrosiam, & tertium Artemisia genus, vnam
& eandem esse plantam. Ceterum prima duo Artemisia ge-
nera Hetruscis frequentissima sunt, neque in alio inter se di-
stant, quam quod in maiori omnes partes maiores spectentur,
in minori vero minores: alias facie, & forma similia constāt,
quinetiam idem sapor, & odor, eademq; facultas vtriq; in-
est. Quare equidem nescio, qua ratione duellus Brasauolus
Ferrariensis in suo simplicium examine pro certo crediderit,
eam herbam minorem esse Artemisiam, qua in Hetruria of-
ficinis Matricaria, & vulgò mulieribus Amarella vocatur.
Sed eò magis virum hunc alioqui celebrem admirari subit,
quod scriptis tradiderit duas alias esse Ferraria Artemisia
species, nullis prorsus notis distinctas, præterquam quod al-
teri vnus tantum sit ramus, alteri vero plures. Eius verba
subijcere lubet. Non dubito, inquit, vt nonnulli fecere, cam

Artemisiz
consideratio.

Artem. duo
genera Plin.

Plinii lapsus.

Brasauolus
arguitur.

que apud nos corrupto vocabulo Arcemise dicitur, ac si Artemisia dictum sit, veram Artemisiam esse, que sola absinthio
familia habet, vt Dioscorides inquit, & eius duo genera facit, Monoclonon, & Polyclonon, id est vnum ramum, & plures
ramos habentem. Ambas species Ferrariense vulgus nouit, si aptè distinguere sciret, quoniam & ipsis indiscriminatim vti-
tur. Quam nos Matricariam, & Marellam vocamus, Artemisia species est, illæ scilicet, que male olet. Nec obstat, quod Fer-
raria dua species Artemisia sint per vnum, & plures ramos distincta, quoniam & hac in specie est, que plures habet ramos: Plura Bra-
sæuolus. In quibus sane verbis eius plura, meo iudicio, deprehenduntur errata. Quorum primum illud est, quod non
scripserit Dioscorides, alteram primi generis Artemisiam multiplici constare caule: alteram verò simplici tantum consur-
gere, vt Brasæuolus suo modo interpretari videtur. Sed author is duntaxat tradidit (vt etiam Plinius refert) quod ali-
qui reperiuntur, qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellant tenuem herbulam, simplici caule, & minuto, flo-
ribus scatente tenuibus, flauo colore. Verum hac tertio Artemisia generi assignantur, nõ autem secundo, vel primo, vt Bra-
sæuolus existimat. Altero deinde errore notatur, quod asserat Matricariam, siue Marellam, quam legitimum Dioscoridis
parthenium

Plura Bra-
sæuolus
uoluerat.

parthenium censemus, esse graucolentem Artemisiam. Quandoquidem minor illa, quae Dioscoridi secundo loco videtur, grauiter olens, non quidem florem profert in medio luteum, & per ambitum albis foliis cinctum, Matricariae vel Amarellae modo: sed candidum, paruum, ac tenuem. Tertius huic accedit error, quod non assentire videatur, duas illas Artemisiae generis, quae Ferrariae persimilia habentur, ea esse, quae a Dioscoride primo loco representata sunt, magnitudine & paruitate differentia. Sed cum porro seipsum hac in re deceptum deprehendisset Brasauolus (vt legitur in suo ultimo volumine Venetis impresso) dum longa oratione contendit, Amarellam seu Matricariam inter Artemisiae genera reponendam esse, Cotulam vero foetidam Ferraricisibus Brusciaculo vulgò vocatam, esse legitimum parthenium, adeò seipsum peccatus dixerim; & sua scripta confundit, vt nullo pacto (dicam liberè quod sentio, alys tamen iudicandum relinquo) quod tandem decernat, percipi possit. Nam cum asserit Amarella, siue Matricaria succum vnciarum quatuor pondere hauriam, vtramque bilem, ac pituitam deicere, aperte quidem fatetur hanc esse Parthenium, cui priuatim ea vis inest. Attamen paulo post eorum forte oblitus, argumentis quibusdam satis, mea quidem sententia, leuibus, contra asseuerat, nil aliud esse Parthenium, quam suum Brusciaculum. Ruellius praeerea quamuis in primis Artemisia generibus plane Dioscoridi subscribat, in tertio tamen hallucinatus deprehenditur, quod tertij generis Artemisiam eam esse putet, quam alij Arbanasiam aly Tanacetum appellant. Siquidem Tanacetum nostrum stolonibus compluribus ab vna tantum radice profertur, caulisque altis, ac firmis: folijs longis, amplis, crebris diuisuris dissectis: floribus luteis, in caulium cacumine gregatim emicantibus. Porro Artemisia, quae tertio adscribitur generi, tenuis herbula est, vno duntaxat caule, ipsoque minuto confurgens. Hanc equidem (vt ingenue fatear) haecenus in Italia non inueni, neque ab aliquo inuentam vidi. Quin potius eam inuictu difficillimum duxerim: quippe cum tam Dioscorides, quam Plinius satis obscure, perplexè, de ea scripserint, & caulis, foliorum, florum, seminis, & radicis notas silentio inuoluerint, non modò difficillimum videtur, sed vix etiam fieri posse putauerim, vt vnquam hanc Artemisiam legitime demonstraret. Neque tamen in hoc audiendus est Plinius, qui (vt supra diximus) hanc esse Ambrosiam falsò memoria prodidit. Nam praeterquam quod rationi consentaneum non est, quod Dioscorides eandem tam propinquas capitibus vnus & eiusdem planta historiam tractauerit, euidentissimum est, Ambrosiam sequenti capite descriptam, huius tertiae Artemisiae descriptioni haudquaquam respondere. Ad haec non in minori, quam Brasauolus, & Ruellius, versantur errore Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentati sunt, quippe qui & hunc & illi secuti, duplici hallucinatione scriptis tradiderint, Matricariam vulgò vocatam omnino esse minorem Artemisiam, Tanacetum vero eam, quae vnicaulis dicitur. In horum denique opinionibus, vel potius erroribus, ipse quoque Fuchsius implicatur, vti alioqui ingenio, & eruditione praclarus, adeò vt etiam nemini dubitandum esse censèat in suis de stirpium historia commentariis, quin Matricaria sit alterum Artemisiae genus, Tanacetum vero tertium: qua in re vix fortasse fuit, qui maluerit cum alys errare, quam solus rectè sentire. Caterum facile credere nonnulli diligentissimi simplicium medicamentorum inquisitores, ac etiam Dioscoridis studiosi, qui sanè nulli vnquam labori pepercerunt, vt hanc medicinae partem supereritanti obscuram, nostra illustrem redderent, tertium Artemisiae genus in Dioscoride ascriptum esse, quod in huius capituli notitia non tria, sed duo tantum esse Artemisiae genera scribat Dioscorides. Quod praeterea reperiantur huius auctoris codices antiquissimi, in quibus illa de tertio Artemisiae genere non leguntur: quemadmodum etiam in nostro ex impresso libro, in quem castigationes ac veterum exemplarium manuscriptorum Dioscoridis, & Oribasii collatione excerptae colligimus: quae acceptas refero Gabrieli Falloppio Mutinensi, medico clarissimo, nunc Patavij summa cum omnium laude, & admiratione, corporis humani, & rei medicae materiam profitenti. Cui certè ob eius singularem in me amorem ac liberalitatem, atque etiam in omnes humanitatem, me plus debere scio, quam aut re, aut verbis respondere possim. Cum itaque (vt ed redeam, vnde obiter digressus sum) in Dioscoride suspecta sit tertia Artemisia, nil mirum videri debet, si in eius historia caecutiuit Plinius. Neque item mirandum est, si eius non meminerunt Galenus, & Paulus: qui tamen alioqui simplicium censu Dioscoridis scripta bona fide referre solent. Non desunt in super doctissimi viri, & in plantarum historiae diutius versati, qui Artemisia tenuifolia caput Dioscoridi accreuisse, atque adulterinum esse censeant, hoc ducti argumento, quod cum superiore capite de omni Artemisia genere differuisset Dioscorides, absurdum quippe esset, quod seorsum Artemisiae genus aliud subiungeret. Addunt etiam, quod huius Artemisiae inter simplicia nusquam meminerint Paulus, Oribasius & Serapio: qui tamen (vt paulò antè dixi) illa ex Dioscoride transcribunt. Horum sententiam etsi planè probandam existimem, cum tamen vulgati Graeci codices hoc loco Artemisia tenuifolia caput habeant, illudquae à quibusdam reddatur, nobis quoque adijciendum, eiusque aliquam saltem mentionem faciendam duxi: praesertim quod non desint, qui id Artemisiae genus inueniri tradant. Siquidem Ruellius est auctor, ipsum in Gallia nasci circa riuulos, aggregè, item in frumentis agris, atque inibi vulgò diu Ioannis herbam nominari. Verùm cum difficillimum esse putem, vt haec planta ab aliquo cognoscatur, & legitime demonstretur, quod nullis prorsus notis depingatur, nescio equidem quomodo Ruellius viro alioqui fide digno, in hoc quis rectè ad stipulari debeat, aut meritò possit. Caterum vulgaris Artemisia passim vbique prouenit, in libris pluribus, recis, sesquicubitalibus, rubentibus, rotundis, striatisque. Folia gerit absinthio latiora, pinguiora, supina parte candicantia, sed quae in caule sunt longè minora spectantur. Flores copiosissimi in caulium ramusculis racematim exerunt, parui, pilosi, odorati, albicantesque, è quibus minutum oritur semen. Radicem habet lignosam, multifidamque, minimi digni crassitudine. Tota planta odore spirat haud ingrato. Ideoque non desunt, qui placentis eam commisceant. Est & altera vno tantum caule consistans; alteri per omnia similis, praeterquam quod omnibus suis partibus priori humilior, tenuiorque spectatur, quam minorem Artemisiam appellamus. Vtriusque recentia folia cum oleo Irino, myrrha, & sicibus trita, vtiliter mulieribus supponuntur ad vterinas affectiones: siquidem & menses, & secundas euocant. Earundem radix postea ad vterum expurgat, vt enecos quoque partus extrahat. Illinitur cum axungia strumis, quae circa ceruicem, & gulam erantur. Quinetiam ad ceruicis dolores efficax est: atqui valentius id praestat, si cum belli herba in pratibus nascente imponatur. Bibitur utiliter foliorum succus, aut ipsa herba recens aduersus epotum opium. Aridorum foliorum farina trium drachmarum pondere ex vino pota, medicamentum est optimum ad coxendicum dolorem: Adalligatam Artemisiam (vt quidam putant) qui defert viator, negant idem lassitudinem sentire. Suspensam autem super limine domus veneficas prohibere incantationes. Duum tantum generum Artemisiam fecit, eorumque vires reddidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, his verbis: Duplex quidem est herba Artemisia. Vtraque excalfacit, & modicè desiccatur: & sunt, quod ad calfaciendum attinet, excessus secundi: quod vero ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi incipientis. Sunt autem & modice tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commoda sunt, & ad fomentationes vteri. Herba, quae a quibusdam Graecis, Artemisia item Latinis, pariter & Italis dicitur: Germ. Benfuch; & Sant Johannis Burtel: Hispanis, Artemisia: Gallis, Armoise.

Ruellii hallucinatio Tanacetum Artemisiam statuentis.

Monachorum & Fuchsi error, Matricariam Artemisiam statuentium.

Artemisia tenuifolia Dioscoridi adulterina.

S. Iohannis herba.

Artemisiae historia.

Artemisia altera.

Artem. vires.

Artemisia vires ex Gal.

Nomina.

Artemisia, ab Artemisia Mausoli Cariae Regis vxore dicta, cum antea *αρθύρις*, id est, virginalis diceretur, quare Apuleio etiam *αρθύρις*, quae colore caulis & floris variat: in altera enim caulis cum flore rubet, quae etiam praefertur: in altera, caulis viridis, aut subpallens, flore flauo, cuius nomine aliqui inutiliter duas species proponunt. Dicitur Artemisia vulgaris maior, C.B. Artemisia & Parthenii octaua species. Brunf. Artemisia, Trag. alia purpureo, alia viridi caule Matth. Lac. Lob. (cui & Mater herbarum Cast. qui secutus Matthiolum maiorem facit & minorem, quae vnum caulem proferat, in reliquis cum maiore, nisi quaedam omnia sunt minora, conueniat) Cam. Artemisia latifolia, Fuch. & Lon. qui eam quae caule est albo, teuissiam nominat: Artemisia latioris folii, Dod. fol. Artemisia communis rubra & alba, Dod. gal. Artemisia rubente & candicante caule, Cor. in Diosc. Artemisia maior caulibus purpureis & spadicis, Cor. in hnt. Artemisia frutice candido, alia rubicundo, Gesl. hor. Artemisia prima vulgaris, Lugd. Artemisia rubra & alba, Tab. Artemisia vulgaris candida & rubra, Thalyo. Sub Artemisiae radice pridie festi S. Iohannis in ipsa meridie. sunt qui carbones colligant (quos vidimus) verum prius & posterius multos aut minutissimos reperiri aiunt, quos Epilepsiae amuletum faciunt.

Αρθεύρις



AMBROSIA.

CAP. CXII.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, trium palmorum altitudine: foliis rure, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, inani: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoce. Vis eius reprimere, ac repellere, & illuc adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

I. AMBROSIA.

II. AMBROSIA ALTERA.



Et si planta, quam hic primo statim loco appinximus, genuinam referat ambrosiam, aded vt nihil in ea desiderari possit, non dicam tamen alteram, quam antea pro Ambrosia ostendimus, Ambrosiam, aut plantam illi congenerem non esse, cum & ipsa notis fere omnibus Ambrosiam referat. Quamobrem, haud fortasse aberraret, qui dixerit, alteram maiorem esse, alteram feminam: aut omnino congeneres esse plantas. Illam nisi ad me Patavio Iacobus Antonius Cortusius rei plantariae acerrimus indagator. Prouenit in montibus & collibus, amoenis locis. Hanc ego mihi comparavi. Et si in nostris illis commentariis, quos primum superioribus annis Italica lingua conscriptos edideram, ingenuè confessus essem, me nunquam vidisse Ambrosiam in Italia, postea tamen ea variis in locis se mihi obtulit inspiciendam, praesertimque secus maria arcis Vipaci (locus enim is distat à Goritia circiter viginti millia passuum) inter durissimos lapides orta. Cui cum mihi extempore obuiam factus essem, eamque conspexissem, botryos modo, racemosa semine refertam, statim inclinavit animus, vt certò ducerem hanc esse Ambrosiam. Ea quamuis à Dioscoride, & Galeno non alijs representetur viribus, quam vt reprimere, repellere, & illuc adstringere valeat humores, qui in aliquam partem decumbunt, dixere tamen non poeta solum, sed plantarum quoque scriptores non contemnendi, nulla alia de causa praestantissimam hanc plantam a veteribus Ambrosiam fuisse vocatam, quam quòd suo in cibus vsu longè nos faciat homines, quemadmodum ambrosiam illam, qua Deorum fertur cibus, Deos immortales, perpetuosque conseruare fabulantur. Ambrosia meminit Plinius libro 27. capit. 4. vbi eam iis verbis depinxit: Ambrosia v-

Ambrosia
consideratio.

Ambrosia al-
tera.

Ex Plinio.
gino-

Ambrosiæ vi-
res ex Gal.
Nomina.

gi nominis est, & circa alias herbas fluctuans, fruticem vnum habens densum, ramosum, tenuem, trium serè palmorum, tertia parte radice breuiore, foliis rura circa inuicem caulem. In ramulis semen est vnu dependentibus, odore vniuso, quade cau, Botrys a quibusdam vocatur, ab aliis artemisia. Coronantur illa Cappadoces. Vfus eius ad ea, qua discuti opm fr. bot Plinius. Ambrosia quoque facultates, sed quam breuissime, tradidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, scilicet: Ambrosia cataplasmate imposita vim habet adstringentem, ac repellentem. Ea vt Græcè Ἀμβροσία, ita etiam Latine, & Italicè, Ambrosia nominatur.

Ambrosia veteribus Græcis τὸ τῶν θεῶν βρώμα, id est Deorum cibus, dicitur. I. Ambrosia syluestris, C. B. Ambrosia, Matth. Ambrosia spontanea (trigofior, Lob. Ambrosia prima, Lug. Pseudoambrosia Cam. ad Matth. cui & Nalturtium verrucarium: Coronopus Ruellii, Dod. gal. Gef. hor. Lugd. Coronopus repens Ruellii, Lob. Lac. Coronopus repens, Lugd. Tab. Cornu cerui alterum repens, Dod. fol. Caraca C. Galpino. II. Quæ pro Ambrosia altera hoc loci ponitur, in secunda editione Matthioli pro Ambrosia ponitur: vocamus Abrotanum campestre tenuifolium. Ambrosia altera, Matth. Lugd. Cam. Ambrosia, Lac. Lon. Cast. Ambrosia tenuifolia, Lob. Abrotanum campestre, Trag. (cui & syluestre) Tab. Artemisia leptophyllos Gef. hor. Artemisia tenuifolia Dod. fol. Thal. Artemisia tenuifolia 2. Clus. hist. Hisp. Artemisia tertia Dioscoridis leptophyllos, Aduers. Lob. Artemisia tertia leptophyllos, Lugd. Hæc variat culiculis albicantibus & rubentibus.

Βότρυς

BOTRYS,

CAP. CXIII.

a Meū. δια-
κεχυμένη,
πολλὰς ἄκ-
σα μαση-
λα. i. diffusa,
multas habes
alas.

b φύεται ὁ
μαλισα πει-
εὶ παραδα
ἢ χιμαρῶν.
i. Nascitur ve-
plurimum
circa fōllas,
& torrentes.

c Meum add.
cum oīno. i.
cum vino.

Botryos con-
sideratio.



Botryos vires
Matth.

Botryos vires
ex Paulo.
Nomina.

7. Purulentæ exuentibus mirificè auxiliatur: id quod ego attestari possum. Herba ipsa recens facit quoque ad ventri dolores, si in calenti tegula Cretico vino irrorata calescat, & ventri imponatur. Ideoq; eadem vnà cum parthenio, & anthemidis floribus puerperarum à partu cruciatibus auxiliatur, vbi simul omnia concisa in oleo lilino in patella parumper coquantur, & deinde eius gallinaceis excipiantur, & simul misceantur, coquanturq; quousq; placenta formam referant, & castida ventri superponantur. Est enim hoc presentaneum auxilium. Suffiuntur eiusdem herbe vapore vtiliter femina ad partus ciendos, & emortuos fetus eiciendos. Herba ipsa arida vestibis interposita non solum eas à tineis & blattis tuetur, sed odoratas quoque reddit. Ceterum huius herbe, quod equidem legerim, non meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Eius tamen facultates ex Dioscoride retulit Plinius lib. 7. vbi sic inquit: Botrys, quam aliqui Ambrosiam, & l'ij Artemisiam vocant, plura est admodum odorata. Hac cum vino pota nō nisi recta ceruice spirantibus, quos orthopnoicos appellat, auxiliatur. Ea Græcis βότρυς, Latinis item Botrys dicitur: Italis, Botri: Germanis, Trauben fraut, & Krauttraut: Gallis, Pjment, Migraine, Millegraine, seu Patience.

Botrys, quod racematim semen ramulis adnascatur: quam cum Artemisia lib. 25. cap. 7. Plinius confundit. Botrys ambrosioides, C. B. Botrys, Trago, Matt. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Cord. hist. Gef. hor. Lon. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Tab. Cam. Botrys altera Ambrosiæ species, cuius semen Amomum Officinarium quibusdam, Cordo in Dioscoridem.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem odore spirat, quare vestimentis interponitur. b Inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Potu c orthopnoicas mulcet. Hanc Cappadoces Ambrosiam vocant, alii Artemisiam.

Legitima, & vera Botrys sabulosis & aridis gaudet, quin & glareosis fluuiorum alueis. Ideoq; Tridenti frequentissima nascitur secus Fersinam, & Lanisium rapidissimos torrentes, & in aliis quam plurimis locis. Goritiae mulieres Botryn in hortis serunt, quod eam vteri affectibus opulari existiment. Fruticat hæc folijs cichorij, laciniatis, sinuatisque quercuum foliorum similitudine: ramis numerosis, tenuibus, semine copiosissimo, racemosoq; refertis. Planta tota resfca & succo quodam resinoso madet, adeo vt comprehensa resina modo manibus hereat. Odorem quidem acrem spirat, & qui nares graueolentia quodammodo feriat, sed tamen in sinuatis retinet. Plinius videtur ex Dioscoride Botryn reddidisse lib. 27. cap. 3. vbi eam in hunc modum descripsit: Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis: semen circa totam nascitur. folia cichorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis: hæcenus Plinius. Botrys itaque excalfacit, & siccatur, attenuat, incidit, abstergit, expurgat, & aperit, & crassa excrementa expectorat. Prestat eadem ad omnes pectoris, & thoracis affectus pituitosos, quinimmo & suppuratos adiuuat, quinetiam asthmaticos, & suspiriosos, tum herba ipsa ex decocto dulcis radice pota, tum ipsius herbe tantum decoctum pluribus diebus haustum, addito violaceo melle, aut saccharo.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice a subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota vuluæ inflationes discutit. b Geranium alterum caulibus c minutis, & pilosis, sesquipedalibus: folijs malua; in summis alis iunctim spectantia gruum capitula intunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

a Me. & Ori. σπογγύλη. i. otunda.

b Meū καλή-ται ὅ ὑπ' ἑ-νιον κ' ἑτέρον γερανιον. i.

appellatur & alterum Geranium.

c Meύλετῖα. i. tenuia.

Geranii con- sideratio ex Plinio.


I. GERANIVM PRIMVM.



SEX Geranii genera nobis reperta sunt, vt inferius patebit. Duo tantum genera a Dioscoride traduntur. Verum Latini, Plinio auctore, tertium genus addere videntur, quod alterum quidem eorum a Græcorum descriptione differat. Id quod ipse Plinius aperte testatur lib. 26. cap. 11. vbi de Geraniis disserit his verbis: Geranion aliqui myrrhim, alij mirthida appellant. Similis est cicuta, folijs minutioribus, & caule breuiori, rotundo, saporis, & odoris iucundi. Nostri sic eam tradunt. Græci folijs candidioribus, paulo quam malua minoribus: caulibus tenuioribus, pilosis, ramosam ex interual- lis, binum palmorum, & in ys folijs, inter qua in cacumini- bus capitula sunt gruum. Alterum genus folijs anemones, di- uisuris longioribus: radice mali modo rotunda, dulci: hac Pli- nius. Ex quibus facile colligi potest, tria esse Geranii genera, Romanis vnum, Græcis verò duo: qua omnia passim ferè vi- suntur in campestribus, secus vias, & iuxta sepes. Porro non desunt, qui putent eam herbam, quam scribit Plinius Gera- nium a Latinis vocari, a Dioscoridis myrrhida non differre. Ipse tamen non dubitandum existimo, quin hac illa sit her- ba, quam quidam: Rostrum tum gruis, tum cicenia appel- lant, quidam verò Acum muscatam, eo quod (vt Plinius inquit) odorem iucundum spiret. Namque assurgit hac so- lijs cicuta, minoribus tamen diuisuris: caule breui, ac ro- tundo: semine gruum capitulis contento, a quibus Gera- nij nomen omnibus inditum est. Ceterum Geranium, quod Dioscoridi secundo loco proditur, caulibus minutis, pilosis, sesquipedalibus, folijs malua, in summis alis gruum capi- tula gerens sursum spectantia cum suis rostris, nunquam du-

Geranium Plinii seu A- cus muscata.

II. GERANIVM TVBERO- sum maius.*




III. GERANIVM II.



bitaucrum

IV. GERANIVM III.

V. GERANIVM CICYTÆ folio.




VI. GERANIVM CICYTÆ folio supinum.

Geranium alterum.

Ruellii erraticum.

Ruberra.



bitauerim eam esse herbam, quæ Pes columbinus vulgò nominatur, quod nullis prorsus reclamantibus notis hæc illi respondeat. Alterum verò, primo scilicet loco descriptum, & in Anania vallis agro, & vbiq; ferè locorum passim prouenit, folijs anemones modo laciniatis: floribus in purpura albucantibus, è quibus gruum capitula prodeunt: radice alba, fetida, ac dulci. Quapropter Ruellium hallucinatum crediderim, quod Acum muscatam dictã, quam ipse herbarum etiam Acum pastoris appellari ait, primi generis Geranium Dioscoridi esse opinetur. Quandoquidem Acus muscata radice non nititur rotunda, ac dulci, nec folijs visitur Anemones emulis: sed eam planè representat, quam Plinij testimonio, Latini Geranium vocant. Præterea aduersus Hermolaum eos reprehendit Ruellius, qui putant secundum Dioscoridum Geranium eam esse herbam, quam quidam à rubro foliorum colore Rubertam appellant. Sed ipse mihi magis reprehendendus videtur, quod crediderit Rubertam esse legitimam Myrrhim. De Ruberta autem, vt dicam quod sentio, eam quidem illud Geranium genus esse arbitror, quod Plinius ad Latinos referat, cum ipsa tota illi sit similis, odorem inuicundum reddat, flores proferat subpurpureos, & gruinis capitulis scateat, reliquorum Geraniorum more. Verum hanc non ita myrrhidem referre cõperio, vt Ruellius existimat. Siquidem Myrrhim folijs admodum rubentibus, & gruino capite nasci, nec Dioscorides, nec alij quod legerim, memoria prodiderunt. Myrrhis enim folijs

est cicutæ: radice rotunda, molli, cibus non insuauis: at his omnibus Ruberta caret, vt libro quarto clarius patebit. Porro tamen Hermolaus ab errore, quantum reor, vindicari non potest, quod scripserit, Geranium id esse Latinis, quod Dioscoridis Myrrhis, Plinij fortasse lectione deceptus, qui loco supra citato Latinis vocatum Geranium à quibusdam Myrrhim appellari scriptum reliquit, quanquam legitime Myrrhidis historiam tradidit lib. 24. cap. 16. Nec sanè mirum est, Plinium scripsisse Geranium aliquibus vocari Myrrhim, cum etiam è Græcis fuerint, qui Geranium, quod secundo generi adscribitur, Myrrhim appellauerint, vt videre est in ijs Dioscoridis exemplaribus, in quibus cuiusque capituli initio innumera plantarum nomina leguntur. Fallitur quoque hac in historia Brasauolus, asserens nullo modo ijs esse adstripiendum, qui Pedem columbinum vocatum Geranium esse contendunt, quod Geranium folijs exeat maioribus anemones incisuris. Sed in meo quidem iudicio, ignorasse videtur, quod secundum Geranium genus, non autem primo generi à Dioscoride assignatum, est illud, quod Pes columbinus censetur. Vel fortasse dum hæc scriberet, alterum Geranium genus non animaduertit in Dioscoride, quod tunc

Hermolai lapsus, Geranium Myrrhim, cenlentis.

Brasauoli error negantis Pedem Columbinum esse Geranium.

quod tunc lectio impatiens totum illius caput non perlegerit. Aliam ab his Geranij plantam vidimus in pluribus hortis, ac r. idem fatam, folis rotundis, secundi Geranij modo per ambitum laciniatus, malvam magnitudine a quantibus. fru- tu gruinis capitulis simili. Hanc Herbariorum nonnulli Momordicam nuncupant, quemadmodum & Balsaminam, aly e. am nomine vocant: eamq; ceteris preferunt in potionibus ad interna vulnera glutinanda. Hæc, mea quidem sententia, magis respondet alteri Dioscoridis Geranio, ut que folijs ad malvam propius accedat: quare & hanc magis eandem esse cū illo putaverim. Veruntamen haud eam inficias quin Pes columbinus dictus idem sit Geranium: sed eum quis rectius fortè Geranium minus dixerit. Primum itaque Geranium Dioscoridi descriptum, folia gerit anemones, longioribus tamen di- uisuris, in quoquoque folio senis. Caulcm mittit ab ipsa radice rectum, tenuem, geniculatumq;. Flores e geniculis in caule prodeunt punicej vna cum folijs, rosarum syluestrium serè figura, sed longè minores, & quinque tantum folijs rescti: è qui- bus rostellis oriuntur inferna parte lunati. Radice nititur rotunda, nuce pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore præ- dita. Nascitur in incultis locis: copiosum in Dalmatia prouenit, nam inde allatam plantam ad me misit Vlyxes Aldrou. d. Medicus apprime eruditus & Medica materia indagator non postremus. Secundum folus est malua minoribus: pedicu- la tenuibus, longis, & subrubentibus appensis: caulibus gracilibus, flexilibus ac rotundis: floribus puniceis, e quibus acumi- nati apices oriuntur, gruinis capitibus similes. Radicem habet tenuem, palmarem & filiosam. Nascitur secus itinera, locis incultis, & etiam in hortis. Tertium cuius meminit Plinius, folijs viret Cicutæ minoribus, seu Myrrhidis proximis, minus tamen laciniatis, humi accubantibus, que senescentia rubescunt. Caules habet breues, rotundos, pilosos, rubentesq;: in quo- rum summitatibus flores spectantur purpurei, punicej, parui, stella figura, è quibus acuti oriuntur apices gruinis rostris simi- les, sursum spectantibus capitulis balausty effigie. Radice nititur candida tereti ac dulci, vegetiori quam altera. Nascitur in rudibus, circa sepes, secus itinera, & saxoso & extenuato solo. Ceterum præter hæc alia tria sunt quoque Geranij genera, quorum primum quod copiosum in pratis in Germania & Bohemia prouenit, folijs habetur ceteris grandioribus, ranun- culi amulo, octonis circumquaq; diuisuris, numerosis, humi accubantibus, prælongis ac firmiter nitentibus: cau- les edit pinguisculos, & articulatos, ramis copiosis, in quorum cacuminibus flores emicant ceterorum maiores, in gyrum sese pandentes rosarum modo, colore caeruleo ad purpuram violaceam inclinante. Quibus deciditibus, grina, vt in cete- ris, prodeunt capita, maiora quam in ceteris generibus, prono in summitate rostro, triplici apice, in corona modum rescisso. Radicem quoque ceteris longiorem habet, crassio- rem, robustioremq;, multisisidam, colore rufescente, & lignosa intus matri- ce. Vulneraria est herba, & præsertim radix tam in potionibus addita, quam exterius admotæ. Secundum folia gerit pen- taphylli modo diuisa, magis tamen per ambitum laciniata, subhirsuta, & prælongis pediculis, ipsiq; pilosis nitentia. Cau- les habet palmares, tenues, lanuginosos. Flores ex purpura rufescentes, è quibus parua acutaq; oriuntur siliquula, hirsuta ac subsæpera, in quibus semen cõcluditur. Radicem habet palmarem, sed tenuem. Nascitur arido solo. Germanorum medici hanc tritam recentemq; peculiariter commendant ad Erysipelas, ad inflammationes mammillarum, & oris, & pudendo- rum vlcera. Tertium, quod ad me Verona misit Franciscus Calzolarius, folia profert Althææ proxima: caules plures lentos, geniculatos, hirsutos: flores paruos rubentes, balausty sine Cytini figura: è quibus grina prodeunt capita, rosario vt in cate-

Momordica.

Geranii pri- mi Diosc. hi- storia.

Geranii secū- di histor.

Geranium tertium.


Geranium quartum.

Geranium quintum.

Geranium sextum.

VII. GERANIVM IV.

VIII. GERANIVM V.



ru acuminato Radix illi est sesquidrantalis, digiti crassitudine, que humotenus rubescit. Nascitur in montibus, & præ- fertum in Balæo monte in agro Veronensi. Viribus præstat vulnerariis, & ijs omnibus, quibus & cetera genera. Primi Gera- Geranii vires ex Plin. ny radix (vt Plinius est author) rescientibus se ab imbecillitate vtilissima est. Radix drachma pondere in vino pota, vulua inflaciones discutit. Bibitur contra phthisim drachma in vini cyathis tribus, bis die: item contra inflaciones: que & cruda idem præstat. Succus radicis auribus medetur. Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere, & myrrha potum auxi- liatur.

IX. GERANIVM VI.



Nomina.

liatur. Secundum verò Geranium etsi nullius esse in medicina vsus scriptus tradiderit Diosc. non desunt tamen hodie herbarii. [chirurgi] qui in internis vulneribus glutinadu. & fistulis sanandis ipsum in potionibus sumptum mirifice comendant: quinetiam radicibus & foliis ad recentia vulnera & vitæ sananda vtantur. Fotu quoque vsurpantur ad articulorum dolores. Sed equidem vereor, ne hi decipiantur, Serapionu interpretem secuti, qui Amomum Pedem columbinum appellavit: quippe quoniam propria sit Amomi facultas interu corporum vulneribus mederi. Tertium isdem cum secundo genere viribus pollet. Gerani non reperio meminisse Galenum in simpl. med. libris. Eius quidem meminisse Paulus, sed ea tantum de Geranijs posteritatis memoria mandauit, que ex ipso Dioscoride sumpsit.

Quod Græci γεράνιον, Latini similiter Geranium vocant: Itali, Geranio: Germani, Stercken schnabel: Hispani, Pico de cinguenta: Galli, Bec de cigoigne, bec de Græ, aut Herbe Robert.

Geranium à gruini capitis imagine in summo eius cacumine visenda, nomen habet: recentioribus à Ciconiæ rostri effigie, Rostru Ciconiæ, dicitur. Prima & secunda figura est Geranii bulbosi, sed prima id proponit, vt Matthiolus, Castor, Lug. Geranii primi & Taber. Geranii bulbosi nomine expressere: altera verior est. II. Geranium tuberosum maius, C.B. & Cam. Geranium subrotunda radice Diosc. Ges. hor. Geranium bulbosum, Lob. Geranium tuberosum, Dod. fol. Lug. Tab. III. Geranium folio maluz seu alterum Dioicor. C.B. Geranium secundum, Brunf. Matt. in posterioribus edit. in prioribus tertium cit, Lon. Cast. Thal. Geranium alteru, Trag. Fuch. Dod.

gal. Lac. Lug. Geranii species vulgaris, Ges. hor. Pes colubinus, Lob. Cæs. Geranium columbinu, Tab. Geranium maluaceum siue Balsaminu, Cam. Hoc maus est, foliis mollioribus: est minus, foliis asperioribus fissuris modò profundioribus modò brevioribus. IV. Geranium Robertianum primu, C.B. Geranium tertium, Brunf. Matth. Fuch. Lac. Lon. Geranium Robertianum, Lob. Dod. fol. Tab. Cam. Geranium secundum Dioscoridis, Lugd. Herba Roberti, eidem. Rubertiana vulgo, Cæs. Sideritis tertia, Dod. gal. Ges. hor. cui & Gratia Dei. V. Geranium Cicutæ folio, C.B. Geranium tertium, Matth. in maioribus figuris, at in prima secundaq; editione, pro primo ponitur. Geranium primu & maius, Lac. Geranium supinum maius: Cord. hist. Geranium primum, Fuch. & Dod. gal. Geranium supinum, Dod. fol. Geranium myrrhinu, Tab. Geranium tertium Plinii, Lugd. Geranium στανδιόφυλλον Thal. Myrrhida Plinii, rostrum Ciconiæ, Lob. Acus muscata vulgò, Cæs. Hoc enim habetur in odorum & odorum. VI. Geranium Cicutæ folio supinum, C.B. Huius iconem adposuimus, quia pro Geranio tertio Cam. in suo Matthiolo posuit: Geranium 4. Brunf. Geranium minus, Trag. Tab. cui & aruense. Geranium septimum siue gruinum. Dod. fol. Geranium supinum paruum, Cam. Myrrhida Plinii & Rostrum Ciconiæ in odorum, vulgatum, Lob. icon. Matthiolus in magnis figuris videtur proposuisse. VII. Geranium Batrachiodes, C.B. Geranium quartum, Matth. Trag. Cast. Lugd. Geranium quintum, Fuch. Lac. Lon. Geranium batrachiodes, Dodo. gal. & fol. Lob. Lug. Thal. Cam. Geranium sanguinarium, Tab. Balsamina vulgo, Geranium Balsaminu, Cæsalpino. VIII. Geranium Robertianum secundum, C.B. Geranium quintum Matthiol. Geranium quartum Fuch. Lacun. Geranium gruinale, Dodo. gal. Geranii Robertiani alia species, Aduerf. Gruinalis, Lug. Geranium Violaceum, Tabernamontano. IX. Geranium folio altheæ, C.B. Geranium sextum Matth. Cast. Lugd. Geranium malacoides, Lob. Geranium althæodes, Cam. Geranium Monspehanu, Tab. Geranium à Calceolario Matthiolo nissum, Dod. fol. Pes columbinus tertius, Cæsalpino. Hoc ad secundum Dioscoridis referendum, de quo Plinius sub Geranio foliis candidioribus maluz.

Γναφαλίον.

GNAPHALIVM.

CAP. CXV.

Gnaphalii foliis albis, mollibusque aliqui pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino u-
stero ad dysenteriam.

Gnaphalii
consideratio.
Ex Plinio.

Gnaphalii historiam adeò paucis perstrinxit Dioscorides, vt nobis non modo difficile, sed etiam impossibile videatur, vt quisquam conicere, ac discernere possit, quanam planta sit, qua verum Gnaphalium representet: præsertim cum antiquorum hæcenus repererim neminem, qui Gnaphalii faciem longiori historia expresserit. Etenim Plinius eadem, qua Dioscorides, breuitate vsus, Gnaphalii notas reddidit libr. 27. capit. 10. Gnaphalium planta est incana tota, tomentosaq; caulibus compluribus fruticans, circa quos totos folia insunt crassiuscula, oblonga, lanuginosa, ac mollia: qua verò in caulium summitate spectantur, in rose modum orbiculata sunt. Radicem habet multiridam ac lignosam. Provenit variis in locis in Italia, & gaudet apricis & siticulosis. Ad diarrhoeam & eolicas passiones folia bibuntur. Profunt quoque enterocelis in puluerem hausta. Fuchsius tamen in suis de stirpium historia commentariis hæc quendam

bam quandam pro Gnaphalio ostendit, quam ideo fortasse Gnaphalium existimavit, quod incana, tomentosaque conspiciatur. Sed mihi plane eam Fuchsius pro Gnaphalio depinxisse videtur, quam Plinius lib. 24. cap. 19. Herbam impiam vocari tradit: quae merito IMPIA Pliny dici posset, quod eius è veteribus nomen, quantum equidem legerim, praeter ipsum meminerit. De qua u differens loco modo citato, eam us notus, & viribus descripsit. Herba impia vocatur incana, roribus arimi aspectu, thrysi modo vestita, atque capitata. Inde aly ramuli assurgunt, sua capitella gerentes. Ob id impiam appellauere, quoniam liberi super parentem excellant. Aly potius ita appellatam, quod nullum animal eam attingat, existimauere. Haec inter duos lapides trita feruet, praecipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admisto. Mirumque traditur, nunquam ab eo morbo tentari, qui gustauerint. Itaque, & suis duri, qui id medicamentum noluerint haurire, es morbo interire. Sunt qui & in aurum nuda inferi aliquid ex ea putent, atque ita non strangulari pullos auidius deuorantes: haecenus de Impia Plinius. Caterum quoniam Gnaphalium ob eius tomentum, illud candidissimum vellus, quod vulgo nos appellamus Bambagia, & aly Cotone, Latini verò XTILON, & Gossipium, mihi in mentem redegit, à veteribus Graecis nusquam, Xyli historia, & vires.

I. GNAPHALIVM.

II. GNAPHALIVM VVLGARE.



quod sciam, descriptum: nisi asserere velimus de τοφόρον de qua Theophrastus egit libro 4. cap. 9. esse Xylon: ideo hic de eius historia, ac viribus latius differendum duxi, quam fecerim in lini mentione, ubi eius quoque memini. De hoc itaque, Plin. li. 19. ca. 1. sic loquitur. Superior, inquit, pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem aliqui Gossipion vocant, plures Xylon, & ideo lina inde facta xylinæ. Paruulus est, similemque barbatæ nuci defert fructum: cuius ex interiore bombice lanugo necur. Nec vlla sunt ei in candore, mollitiæve praeserenda. Vestes inde sacerdotibus Aegypti gratissima: haec Plinius. Hac etate Xylon feritur etiam in Cypro, Creta, & Sicilia insulis, ubi copiosissimum prouenit: quin & in Apulia, aliisque regionibus calidioribus nascitur. Huius lanugo manifestè excalfacit, ac siccatur: quæ si comburatur, mirum in modum manuum e vulneribus sanguinem sistit: eadem accensa, & naribus suffita, vteri strangulatus auertit. Seminis medulla quæ excalfacit & humedat, tussi & difficulter spirantibus auxiliatur: genitale semine procreat, proinde venerem stimulat. Oleum ex ea exprimitur, quo tum lentigines in facie, alphi tum etiam catera cutis macule in facie optimè delentur, & palpebrarum asperitates leniuntur. Sed ut iam Gnaphalio suas ex Galeno reddamus vires, eas ipse libro 6. simpl. med. his verbis retulit: Gnaphalium ideo sic nominatum est, quod folijs eius mollibus ἀρτί γναφάλιον, hoc est, pro tomento vtantur. Sunt autem candida, & mediocriter adstringunt: ac proinde quidam id exhibent, ex austerorum vinorum quopiam dysentericis. Herba Graecis γναφάλιον, Latinus etiam Gnaphalium appellatur: Italis, Gnafalio. Xyli vires Matth. Gnaphalii v. ies ex Gal. Nomina.

Gnaphalium dictum, quod folijs ἀρτί γναφάλιον pro tomento, vtantur. I. Gnaphalium maritimum, C.B. Gnaphalium, Matth. Lug. Gnaphalium marinum, Ges. hor. Aduer. (cui & Cottonaria vulgi, sine Bō-bax humilis) Lob. Dod. fol. Tab. Cam. Gnaphalium marinum tomentosum, Lugd. Meminit Matth. Gnaphalu Fuchsi, quare & figuram eius adiecimus. Nec hoc, nec subsequens Matth. in prima secundaque edit. habet: at in maioribus figuris vtramque expressit, in postrema ab ipso data edit. & in suo cōpendio: vulgaris figuram non habet. II. Gnaphalium vulgare, C.B. Matth. in maioribus figuris, Lob. Lugd. Tab. Thal. Impia herba Plinii, Matth. in Commentariis, Ges. hor. Gnaphalium Fuch. Ges. hor. Lac. Cast. Heliochrysolosyluestr. Trag. Filago, Dod. gal. & fol. Tomentum, Cor. in hist. (cui & Centunculus) Lon. Herba impia vocatur Incana, Cæs. III. Gnaphalium latifolium peregrinum, C.B. Ex radice prodeunt caules plures, versus terram primū reflexi, cubitales, etiā breuiiores, striati, lanugine obducti (quod sculptor & in caule & folijs omisit) circa quos folia oblonga angusta salicis forma, supernè ex viridi nigricantia, prona parte incana


* III. GNAPHALIVM LATI-
folium peregrinum.*



Typhae con-
sideratio.

Typhae usus.

TYPHA.



Typha Theo-
phrast.

Nomina.

a M. u. i. K. et
ca. i. p. i. a. s.
p. n. d. i. r. a. d. i. c. e. s.
p. a. l. m. i. l. o. g. i. t. u. d. i. n. e.
t. r. e. s. a. u. t. q. u. a. t. u. o. r.
h. d. e. e. s. t. i. n. m. e. o. e. x. e. m. p. l.
c. m. a. d. i. s. a. j. e. t. p. a. r. t. e. s.
e. i. i. m. a. x. i. m. e. i. n. p. e. t. r. o. s. i. s.

Circae con-
sideratio.

est quadruplici, canata, b odorata, excalfacient. Nascitur in apricis, c saxis, & vento perflatis. Radicis ru-
la pondo quatuor, in sextariis tribus vini dulcis per diem, & noctem macerantur, potuque triduo valuas
expurgant. Semen in forbitionibus datum lacte mammas nutricum explet.

Haud equidem ausim affirmare, an Circae hodie inueniri possit in Italia: quauis ea antiquis fortasse notissima fuerit.
Siquidem nulla haecenus se mihi obtulit planta, neque alys, quod sciam, qua Circaeam representaret. Ceteru credi-

in circumferentia lanuginosa: ramuli singuli in sum-
mo brachiantur, & veluti comam florum gestat: flo-
res globosi, ex singulis pediculis dependent, qui ex
pluribus foliolis argenteis sibi inuicem incumben-
tibus constant, quae comunititer ita reflectuntur, ut in
medio staminula plura subflauescentia, lanugine in-
termixta instar pappi contenta, quae facile in auras
auolant, conspiciantur, ut figura exprimitur, in qua ta-
men staminula sculptor non expressit. Ex nouo orbe
delatum scribit Clusius, cui Gnaphalium America-
num & Α γ γ ρ ο ρ ο δ ο μ ο n dicitur: quod in horto Illustrissi-
mi Ducis Wirtembergici, quae ipsius Archiater Ioh.
Bauhinus frater meus, Montembelgardi colit, legi-
mus. Xyli figura in editionibus plerisque; & libro 2. ca.
de Lino & hoc loco habetur: verum sufficiat semel
posuisse, supra capite de Lino.

Τύφη. TYPHA. CAP. CXVI.

TYpha folium edit cyperidi simile: caule albim,
laeuem, & quabilem: florem in cacumine ambi-
rem, densum, qui in pappos soluitur, quod panicu-
lam aliqui nominant. Huius herbae flos suillo adipe
eloto exceptus ambustis medetur. Gignitur in palu-
stribus, & aquis stagnantibus.

TYpha planta est in Italia vulgaris, notiorq, omnibus
quam ut eius effigies explicari debeat. Ea in paludibus,
stagnis, & lacubus frequentissima prouenit, ita ut rare ad-
modum sint stagnantes aqua, qua Typha non scateant. Cla-
ua, quam in lauisisso caule gerit, a nostris Hetruscis Maza
sorda vulgo dicitur, quod eius lanugo, si in aures decidat, sur-
ditatem asserat. Expetuntur clauarum pappi infima gentis
hominibus plumarum vice ad grabatos faciendos. Foliorum
vero usus ad conuestienda vitrea vasa, & ad muliebra ca-
thedras texendas: quin & ad tegetes parandas. Typha pappi,
additis betonicae foliis, & gladioli, ac hippoglossi radicibus, o-
mnibus in puluerem tenuissimum reductis, & assatu ouorum
luteis exceptis, utitur quidam feliciter ad enterocelas. Id au-
tem medicamentum exhibent quotidie ieiunis drachma p-
dere triginta dierum spatio: cog, non modo pueros, adolescen-
tesq, sanari pollicentur, sed etiam inuenes iam etate confes-
tes: si iamem interim praestanti ligatura, ac emplastro glan-
nantibus ima pubis pars probe muniatur. Typha meminisse
Galenum in simp. med. censu, non inuenio. Eius tamen me-
minit Theoph. lib. 1. ca. 13. de plant. hist. vbi inter enodes palu-
strium locorum plantas Typham quoque recensuit. Et nomen
Graecum est Τύφη: Latinum item Typha: Italicum, Maza
sorda: Germanicum, Mosskolben/ & Narrentolben: Hyspa-
nicum, Bohordo, & Iunco amacoracado: Gallicum, Mache
& Masse de ionc.

Typha duplex, aquatica & cerealis: aquatica ma-
ior, media, & minor. Typha palustris maior, C. B. Ty-
pha, Matth. Fuch. Lac. Lon. Lob. Cast. Typha aqua-
tica, Trag. Lug. Typha palustris, Dod. gal. & fol. Cor.
in Diosc. Cael. Tabernamontano.

Κίρκα. CIRCAEA. CAP. CXVII.

CIRCAEA, quam & Dircaem aliqui vocant, foliis est
hortensis folani, agnatis crebris: flore nigro, pu-
sillo, copioso: semine milit, nascente in quibusdam
veluti corniculis: a dodrantali radice, triplici ferme,
Nascitur in apricis, c saxis, & vento perflatis. Radicis ru-
la pondo quatuor, in sextariis tribus vini dulcis per diem, & noctem macerantur, potuque triduo valuas
expurgant. Semen in forbitionibus datum lacte mammas nutricum explet.

Haud equidem ausim affirmare, an Circae hodie inueniri possit in Italia: quauis ea antiquis fortasse notissima fuerit.
Siquidem nulla haecenus se mihi obtulit planta, neque alys, quod sciam, qua Circaeam representaret. Ceteru credi-

Adde nonnulli hanc sibi Circaea nomen comparasse, quod Circe venefica in suis ea uteretur veneficiis, vel quod fortassis e-
 im fuerit inuentrix, a Sole patre plantarum omnium genitore edocta. Quod etsi nonnullis verisimile putetur: cum tamen
 a nemine Circaeam his pollere viribus proditum sit, aliunde potius id nominis sibi vendicasse existimandum. Meminit Cir- Plinii Circaea
 cae Plinius lib. 27. ca. 8. ubi eam his notis, ac viribus depinxit. Circaea strichno (hoc est. solano), utiio similis est: flore nigro,
 pusillo: paruo semine, ut mily, nascente in quibusdam corni-
 culis: radice semipedali, triplici ferme, aut quadruplici, alba,
 odorata, gustus calidi. Nasctur in apricis saxis. Diluitur in
 vino, bibiturq; ad dolorem vulvae, & vitia. Macerari oportet
 in sextariis tribus quadrantem radice tusa per noctem, &
 diem. Trahit eadem potio secundas. Semine lac minuit in vi-
 no, aut mulsu aqua pota. Hac Plinius, qui illa omnia ferè ab Plinii lapsus.
 ipso Dioscoride mutuatus est. Etsi ab eo in hoc magno, ut pu-
 to, errore dissentiat, quod Circaea semen in vino, aut mulsu a-
 qua potum lac minuere tradat, cum potius, teste Dioscoride,
 ipsum eliciat. Qua in re Plinius non modo Dioscoridi refraga-
 tur, sed ipsi quoque Galeno: qui de Circaea viribus differens li-
 bro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Circaea herba
 radicem scribit Dioscorides ex vino dulci potam secundas ex-
 purgare. Est enim boni odoris, & excalearia. Semen autem
 eius in sorbitione exhibitum, ad lactis generationem condu-
 cit. Quae Graecè κίρκαία, Latine similiter Circaea, & Italicè, Nomina.
 Circaea vocatur.

I. FILIPENDULA.



Oivάνθη OENANTHE.
 CAP. CXVIII.


Oenanthe folia habet pastinacæ: florem candi-
 dum: caulem crassum, palmi altitudine: semen
 atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capi-
 tula extuberantem: nascitur in petris. Huius semen,
 caulis, & folia cum mulsu vino pota, secundas eii-
 ciunt. Radix è vino vrinæ stillicidio conuenit.

Oenanthem, cuius hic Dioscorides meminit, Theoph. lib. Oenantes
 6. cap. 7. de plant. hist. & Plin. libro 21. cap. 24. putant, consideratio.
 Fuchsius, & recentiorum herbariorum pleriq; eam esse herbam,

II. OENANTHE I.



III. OENANTHE II.



Ranunculus bulbosus

Ggg 3

qua

Filipendula.

que hodie p[er]sim FILIPENDULA vocatur. Foliis est numerosis ab vno pediculo vtrinque, seriatim dependentibus. p[er] pinella siue sanguisorbe modo, magis tamen sese stipantibus, oblongis & per ambitum denticulatis, caulibus sesquicubitalibus: in quorum fastigio flores sunt albi, in umbella ferè speciem coherentes, atque odorati. Radices habet multifidas, summi modo exiles, sed globulis numerosis refertas, perinde ac in pœonia fœmina, sed longè minoribus, oblongis & variisculis. Nascitur in pratis & herbosis locis. Radix potè vrina remoratur, eiusq[ue] stillicidio auxiliatur: item renū tum calculi, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit. Medetur suspiriosis & agrè spirantibus, omnibusq[ue] in vniuersum morbu, quos pituita excitauerit. Radicum siccarum puluis, vtiliter inspergitur comitialium cibi. Quorum certe sententia quamuis virorum magnè apud me auctoritatis, nunquam potui subscribere, quòd Filipendula hac magna nusquam, quòd inuenim, radice nitatur, quæ rotundis extuberet capitibus: quòd semen non ferat atriplicis: quòd denique non in petra, sed in pratis, & lato vbiq[ue] solo proueniat. Quibus sane rationibus non potui non adduci, vt apud Dioscoridem aliam omnino

Oenanthes
tria genera à
Cortuso.


Filipendula Oenanthem semper esse crediderim. Caterùm tria Oenantes genera, quæ post Filipendulam hic expressimus, misit ad me Patavio Iacobus Antonius Cortusus Patavinus, vir vt rei plantaria admodum peritus, ita ingenia liberalitate præditus. Quorum secundum foliis est pyrethri aut pastinacæ sylvestris non absimilibus, caule fœniculacæ, qui umbellas in summitate gerat, è ramis dependentes. Radicibus per omnia filipendulæ similibus. Prouenit in collibus, & locis à Sole illustratis. Creditur iisdem esse viribus, quibus filipendulam præstare diximus. Oenanthem tertium, folia promit Ginguidij, caulem fœniculatum, striatumq[ue], è cuius ramis umbella oriuntur candida. Radicibus numerosis filipendulæ similibus sed vegetioribus globulis. Nascitur in amœnis tractibus, & in montibus. Nihil differt suis in viribus a præscriptis. Oenanthem quartum, herba est humi serpens, foliis tertij ferè similibus, exilioribus tamen, & magis laciniatis, caule sinuoso, striatoq[ue]. Capitulis in summitate hirsutis, in quibus semen. Radices mittit plures, rapunculi ferè effigie, non solum in vna caulis parte, sed etiam in ramis, qui humi serpentes, radices quoque faciunt. Nascitur in incultis locis. Etsi nihil certi de eius virtutibus nobis constet, putamus tamen à cæteris Filipendulis nõ multum differre. Vltimum hoc accepi à Clarissimo Medico Bernardino Terusano, qui nunc simplicium medicamentorum facultatem, & vniuersam materiam medicam, magna cum laude, in famosissima Patavina Academia publicè proficitur. Quod autem tuberosa est radice, pluribus sane notis germanam Dioscoridis Oenanthem referre videtur: quod si huic caules inessent crassi, assererem profectò legitimum esse Oenanthem. Cætera verò cum radicibus nituntur Filipendulæ similibus, quinetiam umbellis, non paruam cum ea habere cognationem ostendunt. Nec interim alicui mirum esse debet, quòd cunctas has species sub Oenanthem nomine appinguntur.

Oenanthem
quarta à Tri-
uesano.

IV. OENANTHE III.



V. OENANTHE III.



mus, siquidem id temere à nobis factum non est. Nam tametsi legitimi Oenantes species non sint, cum actenus fuerit: 60
mo, qui has plantas proprio appellauerit nomine: non prater rationem esse existimaui, si sub Oenantes nomenclatione,
nunc primum prodirent in lucem, ad rei plantaria studiosorum commodum. Oenantes vires, quas descripsit Galenus in
simpl. censu, non licuit mihi reperire. Caterùm Filipendulam non vulgaribus pollere viribus testantur recentiores. Ea enim
vrina remoratur, eiusq[ue] stillicidio auxiliatur: item renū tum calculi, tum doloribus. Eadem stomachi inflationes discutit.
Medetur suspiriosis, & anhelantibus, omnibusq[ue] in vniuersum morbis, quos causa frigida excitauerit. Prodest comi-
tialibus insperso cibi radicum puluere. Planta, quæ Græcis Οὐρανός, Latinis etiam Oenanthem appellatur: Italu, Enanthe.

Filipendulæ
vires.

Nomina.

Oenanthem quasi flos vinosus, quòd odore & quadantenus colore non sit viti dissimilis, in quâ classem Filipendula refertur, sic dicta à numerosis illis & rotundis in radice capitibus, quæ quasi ex filo pendere videntur.

videntur. I. Filipendula vulgaris, C.B. Filipendula. Matth. Trag. Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Ges. hort. Lon. Calt. Thal. Tab. cui & Saxifraga rubra, Cæsal. Lugd. Oenanthe. Fuch. Cord. in Diosc. Lac. Lob. II. Bulbocastanum (quod figura radicis bulbos, sapore gustuq; Castaneas scite exprimat) apij folio, C.B. Oenanthe primum, Matth. Calt. Lugd. Bunium. Dod. gal. Lac. Ges. hort. Bulbocastanum, Ges. hor. Dod. fol. Taber. Calt. Cam. Bulbocastanum mas Tralliani, Lug. Bulbocastanum grandius, Eidem. Nucula terrestris septentrionalium, Lob. Ornithogali species, Lon. Pancascolus vulgò, Cæsal. III. Oenanthe apij folio, C.B. Oenanthe secundum, Matth. Lugd. Oenanthe angustifolia, Lob. Filipendula, Calt. Filipendula tenuifolia, Tab. IV. Oenanthe Chærephylli folijs, C.B. Oenanthe tertium, Matth. Lugd. Oenanthe Cicutaefolia, Lob. Oenanthe alia Ienç Lugd. Filipendula altera species, Ges. hort. Filipendula tertia & Oenanthe Scrophyllos, Tab. V. Oenanthe aquatica, C.B. Oenanthe quartum, Matth. Lugd. Oenanthe aquatica, Lob. Filipendula aquatica, Tab. Lauer minus, Dod. gal. Iuncus odoratus aquatilis, Dod. fol. Sium, siue Lauer minus Dodonæi, Lugd. Sifer palustre eidem. an Petroselinum sylvestre, Cæsalpino: Hæc in hortis adoleſcat & folia terræ proxima Chærefolio similia acquirat, vt figura Matthioli exprimit.

Κόνυζα.

CONYZA.

CAP. CXIX.

Conyza duo genera: quæ parua vocatur, odore præstantior est: maior verò frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia oliuæ similia, hirsuta, pingua: in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur, in minore pedem aquat: flos fragilis, lutei coloris, a qui in pappum abit: radices superuacua. Suffitu, substratuque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flores, & folia cum vino ad menses, partusque eiciendos bibuntur: item contra vrinæ stillicidia, arquatum morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in defensionibus medetur vuluæ malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium Conyzae genus, caule crassiore, ac molliore: folijs mediæ inter maiorem, & minorem amplitudinis: minimè pinguis, multò tamen grauioris odoris, & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis humentibus.

a Meū addit.
Κόνυζα μικροί.
subamarus.

I. CONYZA MAIOR.

II. CONYZA MINOR.

Conyza squarrosa Sium



Inula viscosa or pulicaria. Schæub.


Conyza omne genus non in Hetruria solum, sed alibi quoque passim serè prouenit, nullis prorsus reclamantibus notis, quæ earum singulis a Dioscoride tribuuntur Conyza maior vulgò Pulicaria dicitur, quia substrata (vt Dioscorides inquit, pulices necat. Qua fortasseratione adductus Theodorus in Theophrasto, Conyza... Pulicariam interpretatur. Meminit autem Conyza Theoph. lib. 6. cap. 2. de plant. hist. vbi de eius generibus differit his verbis: Conyza mascula, & femina constat. Distant quemadmodum cætera, quæ sic discerni desiderant. Fæmina enim tenuiori vestitur folio, & compressior est, atque in totum minor. Mas. amplior, crassiorq; caule, atque ramosior, & folium amplius pinguiusq; habens, nec non & fiore spediidior est. Ambo fructifera sunt, in totum serotina germine, floreq; constant: quippe cum circa arcturum, & post arcturum incipiant. Mari grauior odor: semina acrior, ideoq; contra bestiarum morsus commodior est: hac Theophrastus de duplici tantum Conyza genere. Conyza maior nascitur in campestribus, in collibus & amaris locis. Conyza minor folijs prouenit alterius angustioribus, frutice breuiore, pedali longitudine & odore quidem præstantiori:

Conyza con- sideratio.

Conyza duplex Theo- phrasto.

II. HEMEROCALLIS altera.

III. LILIVM CONVAL-
lium.



mè deprehenditur, qui Lilium conuallium vulgò dictum Hemerocallim esse existimant. Namque illud folijs constat ferè
plant. nus, tenuioribus tamen, leuioribus minusq. striatis: cauliculis iuncis, triangulis, tenuibus, ac mollibus, obsequiosisq. Liliij conual-
in quibus cacumen versus plures prodeunt flores albicantes, balastij, aut arbuti effigie, odore eximio & perquam iucun- lu descrip.
do, e quibus bacca enascuntur virides, quæ per maturitatem Iunio & Iulio mense rubra. Radices demittit laxas, longas, fi-
bra, capitamentisque refertas, nullis adiacentibus bulbis. Nascitur in montibus & in eorum conuallibus. Hemerocallis ve-
ro, Dioscoride teste, folia & caulem profert lilio similia: flores colore admodum pallido: radicem magnam, bulbosamque. Non est He-
Quæ sanè nota, si diligenter conferantur, manifestissime indicabunt, eo: hallucinari, qui Lilium conuallium Hemerocal- merocallis.
lim esse contendunt. Liliij Conuallij magnus apud Germanos in medicamentis est vsus (abundat enim eo maximè Germa-
nia) ad varios corporis morbos. Flores excofaciunt, attenuant, digerunt, prouocant. Aiunt eo roborari cor, cerebrum, & o- Liliij conuallij
mnes principes facultates. Idcirco resolutis, comitialibus, conuulsis, vertiginosis, veterosisque, animi deliquio correptis, & vires.
cordis pulsatione concussis, ipsum exhibent. Quin & icteris, seu commorsis à venenosis animalibus præbent. Item agere partu-
rientibus stillatitiam florum aquam vtiliter potandam censent: oculorumq. inflammationibus maximo esse auxilio prædi-
cant. Conficiunt autem ex floribus per æstatem siccatis vinum vindemiarium tempore, ipsos calcatis vuis admiscentes, quo
postea vtuntur ad prædicta. Sunt & qui recentes flores vetere vino macerent, & in vitreo vase diu insolent, admixtis lauen-
dula vocata & roris marini floribus, additisq. odoramentis nonnullis: deinde ex ijs stillatitiam aquam in calentis aqua
balneo vitreis organis eliciunt, eamq. aureis argenteisq. vasculis reponunt. Hanc aquam auream appellant, qua vtuntur ad
omnes prædictos corporis affectus. Quinimò eam iamiam animam expirantis ori inserunt, rati ex eius assumptione homi- Aqua aurea.
nes morientes in vita retineri posse per plusculum temporis spatium. Sed quàm vana isti ferantur opinione, mihi quidem
sæpen-mero experimento deprehensum est. Quod etsi ijs quoq. irritum conperitur, ea tamen est huiusce aqua apud omnes
authoritas, vt plerique ab eius exhibitione abstinere nequeant, etiam in morbis calidissimis. Caterùm non sine errore Euch-
sui, vir alioqui doctissimus, putat Lilium conuallium esse Ephemerum, de quo Dioscorides agit libro sequenti. Sed quàm is
aperte decipiatur, nos suo loco discemus: qui Ephemerum alterum faciunt ijs mens sana non est. Hemerocallis meminit Gal. Hemerocal-
lib. 6. simp. medic. sic inquit: Hemerocallis radicem habet liliij radici similem, non figura tantum, sed & viribus. Prodest Galeno.
non secus atque illa, igni ambustus: quippe quæ leuiter digerentem facultatem habeat, & cum hoc repulforium quiddam.
Quæ Grecis ημεροκαλλις, Latinis quoque Hemerocallis, & Lilium sylvestre vocatur: Italis, Hemerocalle, & Giglio saluati-
co: Germanis, Heydnisch Eilien: Hispanis, Lirio amarillo: Gallis, Lis iaulne. Hemerocallis altera, Italis, Giglio saluatico se-
condo. Lilium conuallium, Italis, Lilio conuallio: Germanis, Weyenblumlin: Gallis, Muguet. Nomina.

I. Lilium Croceum maius, rubens Plinij, fortè Hemerocallis Dioscoridis, C.B. Lilium rubens, Brunf. Fuch. in icon. Gef. hor. Lilium ru. um, Trag. Dod. gal. (cui & Hyacinthus Ouidij) Lilium croceum, Fuch. fol Lon. Lilium croceum maius, Tab. Lilium purpureum maius, Lob. (cui & Bulbus cruentus Hippocra-
tis, Dod. fol Lug. Cam. Lilium sylvestre croceo flore, Cæsal. Lilium purpureum siue rubrum maius non
bulbiferum, Clus. hist. Pann. Hemerocallis, Matth. Lacu. Gef. hor. Cast. Lugd. Martagon Chymistarum,
Lob. in icon. Martagon, Gef. hort. Cast. II. Martagon purpuro sanguineum polyanthos, C.B. Hemerocal-
lis altera, Matth. Lugd. Hemerocallis Chalcedonica purpuro sanguinea polyanthos, Lob. Lilium rubens
vel cro-

vel croceum montanum, Ges. hor. Liliū sylvestre alterum, Dod. fol. Hemerocallis Chalcedonica Com. Liliū rubrum Zufiniare polyanthon Cluſi. hiſt. Pannonica. III. Liliū conuallium á natah ſaio no- men habet, Oenantha videtur apud Theophrastum, hoc flore est albo, vel rubente: illud maius vel mi- nore, quod frequentissimum. Liliū conuallis vel sylvestre Liliū, Brunf. Liliū conuallium, Trag. Matth. Lac. Ges. hor. Dod. fol. Lob. Cast. Ges. Lugd. Tab. Cam. Ephemerum non lethale, Fuch. Libani vernum Theophrasti, Dod. gal. & Lob. Callionymus & Chamæcitimus, Ges. hor. Cacalia, Lonicero.

λευκόιον LEVCOIVM, SIVE ALBA VIOLA. CAP. CXXI

Leucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia quædã: namq; aut cœrulei, aut albi, aut purpu- rei, aut lutei inueniuntur. Luteū verò præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruefacti in deſei- sionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cū melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menſes, secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

α Καρυειν, Nomina.

λευκόιον θαλάσσιον, οὐδὲ ἰὸν θαλάσσιον ἰομαϊστικόν, ἢ ἰαμαρινά. Διὼ χμιν ἔχει αὐτὸ τὴν αὐτὴν τὴν πρὸ αὐτῆς λευκόιον.

I. Leucoium marinū, alii violam marinā. Romanis viola marina vim habet eã dem etiã ip- sum cū prio- re leucoio.

I. LEVCOIVM ALBVM, & Purpureum.



II. LEVCOIVM AVREVM



Leucoii con- sideratio.

Cheiri.

Dioscoridis locus susce- ptus.

Leucoij hist.

Leucoij artes ex Gal.

Leucoion etsi Latinis albam tantum violam ipso nomine significat: tamen à rei herbaria authoribus & pro ceteris vio- larum generibus, luteo scilicet, purpureo, cœruleoq; colore distinctis, sepe vsurpari solet. Id hodie officinis, atque etiam medicis ijs, qui Arabum factionem sequuntur, horum voce Cheiri nuncupantur. Leucoium omne ferè genus in Italia in her- tis, ac virid. xys, in adium fenestris, parietibusque frequentissimum visitur: vbi illud in sigulinis, ac ligneis vasis muliere studiosè colunt, ac fouent. Namque eius flores cum coloris varietate, tum odoris suauitate tantam cum oculis, & naribus ineunt gratiam, vt in coronamenta frequentissimè addantur. Porro non temerè omne ferè genus Leucoij in Italia nasci mo- do diximus: quandoquidem cœruleum inibi, quod sciam, non prouenit. Quamobrem Marcello Dioscoridis interpreti sub- scribendum puto, qui Leucoium cœruleum hoc loco accreuisse suspicatur, vetustissimi Latini Dioscoridis, Longobardis literis scripti, testimonio nixus, in quo nullum planè de cœruleo Leucoij colore verbum legebatur. Suspicionem hanc argent, itaq; esse improbant Oribasius, & Serapio, quos item id verbum hoc loco non habere comperio in simplicium censu, cum alio- qui reliqua Dioscoridis referant. Profiliunt omnia genera cubitali altitudine ramosa, caule brassica exiliore, sed foliorum sa- faie variant. Siquidem tamen si omnibus folia sint oblonga, id tamen, quod luteis exit floribus, folijs est longioribus numerosioribus, viridioribus, & magis in acutum desinentibus: cetera verò, nempe album & purpureum, folia gerunt breuiora, latiora, & non vt in luteo mucronata: quinetiam supernè inferneq; canescentia. Caterum ex Leucoio, sive ex albis viola floribus, vtpote qui ceteros odore præcellant, Persæ odoratum illud vnguentum parant: quod Iasminum appel- lant, vt primo libro in ipsius Iasmini vnguenti mentione ostendimus, vbi eorum sententiam refutauimus, qui è floribus Gelsimini vulgè vocati id fieri contendunt. Leucoij vires tradidit Galenus libro septimo simplicium medicamentorum, sic inquit: Leucoij frutex vniuersus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium est: plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciore, magis etiam quam virides, adeo vt & oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoq; detra- ctum eorum mouet, & secundas factumq; emortuum elicit: & si bibatur, factum vinum perimens, & abigens est medica- mentum.

mentum: est enim id, ut si quod aliud, amarum. Quod si quis virium eius vehementiam multa aqua admista retundat, ac...

Nomina.

Leucoium, id est, viola alba, potius foliorum, quam florum ratione: aliud enim est folijs candidioribus & mollioribus, quod Candidum a foliorum colore dicitur, habetur enim maius & minus & quidem floribus candidis, cinereis, puniceis, variegatis: aliud folio plane viridi, quale est luteum dictum, quod simplici...

Κραταίγονον. CRATAEOGONVM. CAP. CXXII.

Cratægonum, siue, ut alijs placet, cratænon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumque geniculorum: semine milij. Nascitur in opacis, & frutetolis parte plurima: summopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & vir modo consumili, totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Quamuis putent nonnulli Cratægonum esse quandam Persicaria vocata speciem, ego tamen eorum sententia non assensim subscribere, quod Persicaria nullis fere notis Cratægonum amulari mihi videatur. Neque, vero aliam herbam, que Cratægoni epigramma representaret, hactenus reperi, aut repertam vidi in Italia, ubi tamen ipsum nasci non negauerim. Sed certe id inuentu difficile suspicor, quoniam eius descriptio, que admodum & sequentis, ab omnibus, qui extant, rei herbarie authoribus, obscura satis & confusa traditur. Κραταίγονον sic Graecè, ut Cratægonum item Latine vocatur: Cratægonum, Italicè.

Cratægoni confid.

Nomina.

Φύλλον. PHYLLON. CAP. CXXIII.

Phyllum, quod elæophyllum vocatur, in saxosis nascitur: duum generum est. Quod autem thelygonum appellant, prouenit musci modo, folio oleæ, sed colore magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: semen papaueris, maiusculum. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosam quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut thelygonon fæminei, proditur: horum Cratæus author est. Sed huiusmodi historiam mihi produxisse visum est.

Aliter sanè mihi persuadere non possum, (ut etiam sibi persuadet Marcellus Vergilius) quam in hoc Phylli capite subesse mendam, peruersamque esse lectionem scriptorum (ni fallor) negligentia, præsertimque in his verbis. τὸ μὲν θηλυγόνον λέγεται ὡς περὶ ἐρύοι ἔχον χλωρότερον ἐλαίας τὸ φύλλον. Siquidem ὡς περὶ βέρβρον nulla ratione hoc in loco conuenire videtur, cum olearum folia, nullam cum musci capillamentis conformitatem habeant. Videtur præterea nobis non parum astipulari Theophrastus: quippe qui de Phyllo scribens libr. 9 capite 19. de plant. histor. ita scriptum reliquit. Thelygoni siuctus similis est muscosis olea floribus, pallidior tamen. Quo fit, ut mihi persuadeam in Dioscoride esse legendum: φύλλον εἰς ἐλαίφύλλον καλεῖται, φύεται ἐν πέτραις, τὸ μὲν θηλυγόνον οἱ δὲ καρπὸς κατὰ πρὸς ἐλαίας βέρβρον αἰθερώτερος δὲ ἔχον χλωρότερον ἐλαίας τὸ φύλλον. Hoc est Phyllum quod Elæophyllum vocant, nascitur saxosis locis Thelygonum fructum edit olearum floribus similem, pallidiorem tamen: folia verò olearum viridiora. Quod verò Phyllo folia inijunt olearum similia, videtur dubio procul. affirmare Dioscorides cum inquit: φύλλον οἱ δὲ ἐλαίφύλλον καλεῖται. Quo fit, ut asserere iam non verear plantam, cuius hic appicta est imago, à nobilissimo Iacobo Antonio Cortuso, materia medica peritissimo mihi missam, legitimum esse phyllum Thelygonum, omnibus astipulantibus notis. Ruellius legitimum phyllum eam putat esse plantam, quam maiorem Persicariam vulgò vocant, sed mea quidem sententia fallitur. Cum Persicaria locis humentibus, vliginosis que proueniat: Phyllum verò siccis, aridis, & petrosis ut Dioscorides testatur. Qui tamen, si eius verba accuratè expenduntur, nullam huius herba cognitionem habuisse deprehenditur, nisi eam quam ex Cratæus herbarij historia habere potuit, unde sortè ea omnia sumpsit. Quo fit, ut mirari non liceat si nobis quoque Phyllum cognitu sit difficile, quin & flores minime respondent. Phylli (quod viderim legerimque) non meminit Galenus, nec Paulus, nec Orbasius. Quod quidem sane arguit, aut quòd in eorum Dioscoridis exemplaribus hoc phylli caput non legeretur, aut quòd fortè assererent phyllum esse Dioscoridi adulterinum, imò ipsis fuisse incognitum. Caterum non desunt qui velint Phyllum


Phylli confideratio.

Phyllon Theophrasti.

Phyllon Ruellij est Persicaria.

I. PHYLLVM TESTICVLATVM.

II. PHYLLVM.



Phyllum à Linozosti, hoc est Mercuriali, non differre, quòd pluribus tum notis, tum facultatibus sibi inuicem respondeant. Verùm quòd cum ijs non possim liberè consentire, hæc me maximè animo suspensum detinent, quoniam Mercurialis folia habet ocimi, helxinæ cognata, non autem oliuæ: florem herbaceum non album: quòd præterea Mercurialis nascatur papum in hortis & vineis, non in saxosis tantum: quòd de his denique seorsum diuersisq; capitibus scripserint Dioscorides & Plinius, utpote de rebus inter se differentibus. Equidem hoc anno plantam inueni inter saxa in Saluatino monte non longe a Goritia, folio mercuriali crassiore, breuiore, aliquantulum in ambitu serrato: semine iam deflorentis oliuæ simili. Quam utique notis ea mihi visa est satis Arrhenogono suffragari. Sed an verum fuerit Arrhenogonum pro certo affirmare non est: quo factum est, ut hic imaginem pingendam neglexerim. Phylli meminit Theophrastus lib. 9. cap. 19. de plantarum historia, ubi ita scriptum reliquit: Quædam ad procreandum marem aut fœminam valere traduntur. Quamobrem Phyllon tum arrhenogonum, hoc est, marificum, tum thelygonon, id est fœminificum vocat. Ambo inter se similia sunt & ocimi speciem referunt. Fructus thelygoni modo musci oleaginei, verùm pallidiori, arrhenogoni verò sicut oliuæ, cum primum ex muscoso flore emergit, geminus modo testiculi hominis: hæc Theophrastus. Ex cuius nimirum verbis colligi potest, Dioscoridæ codicem hoc in loco deprauatum esse: quandoquidem Theophrasto thelygonum non nascitur musci modo, neque folium habet oleæ viridius, ut in Dioscoride scriptum legitur: sed fructum quidem fert in modum musci oleæ, pallidiorum tamen. Quæ certè thelygoni notarum diuersitas facit, ut planè suspicer in Dioscoridis potius, quàm in Theophrasti verbis mendam aliquod subesse. Atque ad eò sit, ut quasi non dubitem asserere eam plantam, quam ego reperi (ut ante dixi) in Saluatino monte, verum Arrhenogonum esse: non solum quòd descriptioni pulchrè respondeat, sed etiam quòd in notis fere non dissentiant auctores illi grauissimi.

Nomina.

Herba, quæ Græcis φύλλον, Latinis & Phyllum, & Folium appellatur: Italis, Phillo, & Folio.

Phyllon, aliud mas, aliud fœmina: at Matthiolus sua figura fœminam exprimere videtur, quare utriusque figuram adposuimus. I. Phyllon testiculatum, C.B. Phyllon Arrhenogonon, Aduers. Lob. Icon. Lugd. Phyllon marificum Clus. hist. Hisp. Tab. Phyllum mas, Lob. & Dod. fol. Cast. II. Phyllon spicatum, C.B. Phyllon, Matth. Ges. hor. Phyllon thelygonon, Adu. Lob. Dod. fol. Lugd. Phyllum fœminificum, Clus. hist. Hisp. Tab. Phyllum fœmina Castori.

ὄρχις

TESTICVLVS.

CAP. CXXIV.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocant, folijs circa caulem, & ima eius parte in terra stratis, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, læuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior, ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. Ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam verò ad inhibendos, & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis, & fabuletis.

ὄρχις ἰσχυρὴ

I. TESTICVLVS I.

II. TESTICVLVS II.



III. TESTICVLVS III.

IV. TESTIC. IV. IN maioribus figuris.



Ὁρχις ἄτερως

TESTICVLVS ALTER

CAP. CXXV.

Testiculus alter a alio nomine Serapias, Andrea auctore vocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. Folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus pene

ἄνθη καὶ ὄσπερ
πιδε καὶ ἄ-
σιν ἐστὶν ὡς
καὶ Ἀνδρέας
ἰνὸν ἐστὶν
καπνὸν ὡς
cantalis, ὡς
luteam An-
dre s. r. u. u.
oct meum.

Hhh

purpu-

V. TESTICVLVS V. IN maioribus figuris.

VI. TESTICVLVS IV.



VII. TESTICVLVS V.



purpureis: radice testiculis simili. Quae illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur: abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridae radices nomas inhibent: sanantque putredines, & oris ulcera cacoethe: alium sistunt e vino potae. De hac, eadem quae de testiculo canis, produndunt.

Σατύριον. SATYRIUM. CAP. CXXVI

Satyrium aliqui trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici, aut libo similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudam: florem hlij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus ut eorum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratis. Quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. a Vt edum ea dum concumbendi incessit cupiditas: siquidem ea proniores aduenerem fieri affirmant.




Σατύριον ἐρυθρόνιον. SATYRIUM ERYTHRONIUM. CAP. CXXVII

Est & alteram Satyrium erythronium, sine erythraicon, id est rubrum, semine lini, mare cauduro, leui, splendente: quod fertur non secus ac scincus libidinem excitare. Cortice radice grauiore, bruso, intus autem album includitur, sapore dulci non ingrato ori. In montosis, & apricis enaicitur. Venerem, ut produnt, si omnino manu teneantur radix stimulat: eoque magis, si bibatur in vino.

† Ori. add. ως τὸ πολὺ. i. ut plurimum a Pro ista periodo meū tā tū habet. καὶ συνείσαν φασι παρρημάν. i. & coitū dicunt incitare.

α βρωμαλιόν. i. robusto, ita Cat. b Crib. leg. σατύριος. i. de b.

Errant, mea quidem sententia, omnes ferè huius aetatis medici, ac seplasiarj: quippe quod Canis testiculis legitur. Satyrij, & Testiculi, vice papim in medicamentis utantur. Nam haec planta (si Dioscoridi credimus) notis, ac facie maxime inter eosstant, quamuis viribus, & facultate non longe dissimiles. Testiculorum enim radices, praeter id quod animalium testiculos praesentant, oblongae sunt, binae utrinque pendent: superior tamen altera, quae plenior est: inferior altera, quae mollior est.



X. PALMA CHRISTI
maiori.



*O maculata
su. ust.*

rugosior. Satyrj verò radix bulbosa, malig, modo extuberans describitur, colore exterius fulua, interius vt ouum candida, gustanti dulcis, & ori non ingrata: cui per omnia fere similis est alterius Satyrj radix, quod Erythronium appellatur. Caeterum verum Satyrium, vt ingenuè fatear, haecenus in Italia videre mihi non licuit. Atqui Erythronij vocati radicem mali effigie, cortice tenui, & rufo, candida intus pulpa, sapore dulci, orig, non ingrato, Damasco Syria misit ad me Cechinus Martinellus Rauennas, Pharmacopœus præstantissimus, & rei herbaria admodum studiosus: in montosis & apricis nascitur, cuius imaginem hic excudi curauimus, vt discant, qui Orchim Satyrium esse contendunt, quantum à scopo aberrauerint. Testiculorum itaque plura habentur genera folijs & floribus differentia, vt ex appictis hic imaginibus, quis facile discernere poterit: qua in pratis montium collibus, & herbosis pascuis nascuntur. Vires vniformes habent. Testiculi species quinta, folia gerit plantagini proxima, supernè striata, caulem dodrantalem, glabrum leuemque: flores spicatos, tum candidos, tum quandoque purpureos: radices (vt ceteri) duas olea magnitudine. Prouenit in montibus herbofo solo. Ea omnia potest, qua cetera genera. Quibus & illud addendum esse existimauerim, cuius radix humana manus similitudinem refert. Vulgus prædicta radicis figura id Palmam CHRISTI Palmæ Christi appellat. Auicenna hæc radices Digitos citrinos nuncupat, si consid. et si eos digitos citrinos esse perperam, nullaq, quod in libro suo legerim, ratione ducti negent Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt. Huius duo in Anania vallis montibus habentur genera. Vnum maius, quod folia alio latiora, nigris respersa maculis, caulem rotundum, leuem: florem spicatum, variū, in purpura albicantem, odore non ingrato: radices duas, qua sanè testiculos caninos referrens, nisi ramis quibusdam quasi digitis, humanam manum exprimere viderentur. Alterum minus, quod folijs constat croci: caule do-

Satyrium Erythronium.

...

...

drantali, innceo, lauiq, in cuius cacumine flos emicat purpureus, amar anthi amulus, saturatori tamen purpura splendens, qui recens odorem quam suauissimum reddit. Huius exiccati floris puluis ex aqua ignitum chalybem experta, epotus (vt perhibent n, qui ita esse experimento comprobant, dysentericis maxime prodest. Idem aquam præstare aiunt, qua per virtutem organa ex us elicitur. Radices huius similes, sed qua alteri magnitudine cedunt. Excalfaciunt vtraque (vt antea est A-

* XI. SATYRIUM BASILI-
cum pratense maculatum.*XII. PALMA CHRISTI
minor.

Fuch. errata.

Monachorū
lappus.Herbæ vene-
rez Theoph.
mentio.Canis testicu-
li vires ex Ga-
lino.Satyrij vires
ex Gal.

Nominia.

nicenna) siccantq; secundo recessu, crassa corporis excrementa pellunt, faciemq; detergunt. Dantur maniacis magno iun-
mento: quin & in nervorum affectibus. Seminis pulvis drachma pondere ex vino potus, comitialibus subuenit. Item radice
decoctum vino diutius commistum, quod bibendum paratur tam in prandio, quam in cœna. Radices Nicolai Florentini te-
stimonio, febrem quartanam fugant: is namque earum tantum vsu Biliotum quendam curatum retulit. Fuchsius Pal-
mam Christi non recte, pace eius dixerim, inter Satyrij genera depinxit: siquidem ea potius, meo iudicio, inter Canis testi-
culos erat representanda. Quinetiam in eo mihi planè errasse videtur, quòd Satyrium triphyllum, perinde atque canis testi-
culos, cum duabus radicibus pictura expresserit contra Dioscoridis delineationem, qui vnā tantam radicem Satyrio ma-
gnitudine reddidit. Nisi fortasse is potius fuerit pictoris lapsus. Hallucinantur præterea vnā cum Mesue Patres illi reue-
rēdi, qui in eius antidotarium commentati sunt: quippe qui malè sibi persuaserint, tot esse Satyrio radices, quot Canis testi-
culis. Verūm ij Dioscoridem consulant, & hinc quam apertè decipiantur, intelligent. Sed his facile errandi occasionem po-
tuit dedisse Plin. quem lib. 26. cap. 10. Orchin, id est, testiculum, cum satyrio turpiter confudisse constat. Ceterum quoniam
legitimo Satyrio deficiamus, officina ac medici eius vice Testiculi radices suppeditant, infeliciter tamen, nec pari successu. Nam
etsi ad prolem gignendam testiculi radices prætulit Dioscorides, quòd maior à viro deuorata masculum gignat, minor ve-
rò à femina feminam: deturq; mollis feminis bibenda in lacte caprino ad stimulam venerem, arida verò ad inhiben-
dam, non tamen ob id vnquam comperi quenquam, qui ex earum largiore esu referret, se magis ad venerem fuisse excita-
tum, quam esset priusquam eas comedisset. Sed id fortè fortuna illis accidit, quòd vtrasque simul radices ederint medic-
orum imperitia, quo factum sit, vt altera alterius vim destruxerit, cum alteri vsu insit, vt venerem stimulet, alteri verò vt
andem inhibeat. Id quòd fortasse is non eueniret, si legitimum haberemus Satyrium: vel si herba inueniri posset, que homi-
nes salacissimos reddit, cuius Theophrastus meminit libro 9. ca. 22. de plantarum historia, vbi ita scribit: ad rem autem ve-
neram mirum in modum herba pollebat, quam Indus attulerat. Non enim solum edentibus, sed etiam tangentibus tan-
tum genitalibus vim dixere vehementem ad eò fieri, vt quoties vellent, coire valerent. Et quidem qui vsi fuerunt, illud
egisse dixerunt. Indum autem ipsum, qui vel magno atque robusto corpore erat, septuagesies aliquando coruisse fatentem
licuit audire: verum emissionem seminis guttatim fuisse, demumque in sanguinem deuenisse. Mulieribus verò vehementer
etiam citari libidinem, cum eo medicamine vsa fuerint, dicebatur: hætenus Theophrastus. Canini testiculi vires postera-
tie memoria mandauit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Orchis nuncupatur & Cynos orchis
dem herba. Radici eius bulbosa ac gemina, vis inest humida, & calida, ac gustantibus dulcior apparet. Ceterum maior
dix multam videtur habere humiditatem excrementitiam, & flatuosam: quapropter epota venerem excitat. Altera verò
minor videlicet, contra admodum elaborata est, ita vt eius temperamentum ad calidius, & siccus vergat. Vnde hæc
non modo non stimulat ad coitum, sed etiam planè contra cohibet, ac reprimat. Eduntur tosta bulborum more. Orchis verò,
quem & Scrupiada nuncupant, sicciorē facultatem obtinet, quam vt primi ordinis haberi mereatur: quocirca ad vene-
rem non similiter accommodus est. Oedemata illius discutit, & vlcera sordida purgat, & herpes sanat. Siccam multo
etiam magis desiccet, ad eò vt & putrescentia, contumaciaq; vlcera sanat. Habet etiam quippiam subadstringens, ac pro-
inde ventrem ex vino potus sistit. Meminit item Satyrij Galeodē libro. Satyrium, inquit, aut Triphyllum humidum, & ca-
lidum temperata est: quā obrem gustu quoq; apparet dulce. Attamen recrementitiam, & flatuosam humiditatem pos-
sidet: quocirca ad venerem incitat. Hæc verò & herbe ipsius radix præstare potest. Porro, vt quidam scribunt, ex vino nigro
austero potum sanat opisthotonon. Planta, qua Græcis ὄρχις & κύνος ὄρχις & ἀππανάριον, Latinis Testiculus, & Testiculum

cau nominatur: Arabibus, Chasi alkeb: seu Chasi alchelh: Italis, Testiculo di cane: Officinis, Testiculi vulpis, Germanis, Anabentraut: Hispanis, Coyon de perro: Gallis, Coullion de chien. Qua verò planta σατύριον Græcè Satyrium quoque Latine dicitur: Arabicè, Gasi alchaleb, Chasi altraleb, siue Tatarich: Italicè, Satirio, & Satirione: Germanicè, Stendel. Dicitur: Hispanicè, Satyrium, & Supinos de Raposa: Gallicè, Satirion. Palma Christi maior: Italis, Palma di Christo maggiore. Palma Christi minore: Italis, Palma di Christo minore.

Magna est Orchidum & Satyriorum sylua, in historia explicanda, monuisse in præsens sufficiat hanc esse posteriorum inter ea distinctionem (licet contra veterum placita) vt Orchidis, seu Cynosorchidis, vel Testiculi nomen, tribuant ijs, quæ radices habent rotundas, Testiculorum instar geminas, rarius enim ternas iunctas videas: Satyrium is verò, vel Palmæ, quæ radices habent manus effigies aliquo modo exprimentes. I. Testiculus primus, Matth. sed in eius Compendio quartus: Cynosorchis maior primus, Taber. II. Orchis apem referens, C.B. Testiculus secundus, Matth. Lac. Lugd. Satyrium, Brunf. Orchis sexta & Satyrium alterum Dioscoridis, Trag. Triorchis fœmina, Fuch. Lon. Tab. Orchis serapias fœmina, Dodo. gal. Orchis serapias secundus minor, Dod. fol. Lugd. Orchis melittias siue apis cadauerulum exprimens, Lob. Orchis melittias, Lugd. Tab. Orchis siue testiculus minor violaceis floribus, Cord. in histo. Testiculus figura & colore apem flori infidentem æmulante Cæsalpino. III. Testiculus morionis fœmina, C.B. Dodo. fol. Lugd. Testiculus tertius, Matth. in minoribus figuris, at in maioribus hunc cum præcedenti sub testiculi secunda specie posuit: Cynosorchis, Brunf. Cynosorchis morio fœmina, Lob. Lug. Cynosorchis morio alter, Tab. Testiculo alteri adiungit Lacuna, an Orchis fœmina maior vel angustifolia, Fuchio & Orcheos tertium genus, Dod. gal. Satyriumque primum Dioscoridis, Trago. IV. & V. Has duas figuras in maioribus iconibus Matthiolus habet, quibus Testiculi speciè tertiam inscripsit, quem sequitur Lugdunensis historia. Verum. IV. dicitur Triorchis maior mas, Taber. & Triorchis maior mas, Tab. & Triorchis trifolia, Eidem: at V. Testiculus est decimustertius Tabernamontano. VI. Testiculus morionis mas folijs maculatis, C.B. Testiculus quartus, Matthiolo: at in Compendio sub primo positus, vt & à Lacuna & Castore, Satyrium mas. Brunf. Cynosorchis mas nostra Trag. Orchis mas angustifolia, Fuch. Orchis secundum genus, Dod. gal. Thal. Cynosorchis morio, Lobe. Testiculus morionis mas, Dod. fol. Lugd. Orchis mas minor, Lon. Cynosorchis morio mas, Tab. VII. Testiculus quintus Matthiolo. IIX. Satyrium primum, Matth. Lugd. Satyrium trifolium, Castori. IX. Satyrium Erythronium, Matth. Lugd. Castori: de utroque quid sit ambigitur, nec in prima, secundaue editione proponuntur: sic & in maioribus figuris primò exculis Satyrium Erythronium non habetur. X. Satyrium basilicum angustifolium, C. B. Palma Christi maior, Matth. Palma Christi alia, Cord. in histo. Palma Christi fœmina, Taber. Satyrium basilicum mas, Lon. Satyrium basilicum mas tenuifolium maius, Thal. Satyrium basilicum maius, Lugd. Verum Matthiolus figurâ quidem hanc expressit, at descriptio conuenit sequenti figuræ vndecimæ, quam eius nomine adposuimus. XI. Satyrium basilicum pratense maculosum, C.B. Orchis fœmina altera, Trag. Satyrium basilicum fœmina, Dod. gal. & fol. Lonic. Satyrium basilicum mas alterum, Fuch. Satyrium basilicum, Lac. Serapias fœmina pratensis Lob. Lugd. Palma Christi, Cord. in histo. Cæsalp. Palma Christi minor, Cast. quoad iconem. Palma Christi maculata, Taber. Satyrium fœmina, Thalyo. XII. Satyrium Basilicum angustifolium alpinum, C. B. Palma Christi minor, Matth. Lugd. Cast. quoad descriptionem: Satyrium basilicum alpinum, Ges. hor. Orchis serapias minima alpina, Cam Satyrium basilicum mas tenuifolium minus, Thalyo. Satyrîū basilicū minus, Dod. fol. Palma Christi minor fœmina, Tabernamontano.

Opinion

HORMINVM

CAP. CXXVIII

Horminum satium herba est folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siquidem in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur: in altero nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque: illitum ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis viribus pollet: quare vnguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Rvellius, & hunc, vt arbitror, secutus Fuchsius, in suis quisque de stirpium historia commentarijs, certè credunt Horminum satium eam perquam odoratam herbam esse, quæ vulgò aliquibus Sclarea, quibusdam Marrisalua, & nonnulla Herba sancti Ioannis appellatur. Sed certè horum, licet doctissimorum virorum, sententiam vt minus probem, multa mihi occurrunt. Primum quod contra Hormini descriptionem illa planta constat caule plerunque bicubitali, folijs marrubio quam longè maioribus, & calyculis, in quibus semen recluditur, sursum spectantibus. Deinde quod in Sclarea ipsa rotundum semen inueniatur, non autem oblongum. Illud præterea addiderim, quod Dioscorides nunquam, meo iudicio, Hormini odorem prætermisisset, si ei Sclarea dicta Horminum satium fuisset, vt illi existimant: ea enim adeò odorata est, vt eius odor insignis sine vitio præteriri non possit. Huc denique illud accedat, & eos planè, vt puto, refellet, qui secus opinantur, quod plantam, cuius hic effigiem damus, Pifis ad me Misit Lucas Gbinus medicus clarissimus, & rei herbaria peritissimus, quæ ad amussim Horminum satium representat, vt pictura affabrè demonstrat. Ea enim folijs est Marrubio similibus, sed maioribus, & asperiusculis: caulibus semicubitalibus, quadrangulis: floribus in caule secundum folia per interualla prodeuntibus purpureo colore: quibus decidentibus, eminentia, siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant. Flores edit in caule secundum folia per interualla prodeuntes, purpureo colore, in quibus nigrum, & oblongum recluditur semen. Caterùm SYLVESTRE folio est salua fere simili, caule sesquipedali, aspero, quadrangulo, leuiter hirsuto, striatoq; flore salua, colore purpurascente, siliquulis pluribus in humum reflexis, in quibus semen rotundum, fusco colore, Gallitico passim vocato haud longè ab simile. Prouenit in campestribus, in pratis, secus itinera & herbosis locis. Eadem omnia præstat, quæ de domestico scribuntur. Sclarea autem folijs exit Hormino quadruplo maioribus, ac latioribus, subasperis, crispis, humi accubantibus: caule sesquicubitali, & quandoque maiore, hirsuto, firmo, quadranguloq; à cuius medio plures oriuntur rami, in quibus speciatim exeunt flores ex purpura albicantes, odore eximio præditi & quadam cum grauitate iucundo: ex his receptacula

Hormini consideratio.

Ruel. & Fuchsi op. reprobata.

Hormini satii descriptio.

Hormini syluestris historia Matth.

Sclareae historia Matth.



IV. SCLAREA.

Sclarea vires
Matth.Horminum
Plinij.Horminum
frugis genus.

Nomina.



oriuntur, in quibus nigrum, pellucidum, ac rotundum inciditur semen. Radicibus nititur multifidis, subnigricantibus. Seritur in hortis, & viridarijs. Excalfacit, attenuat, discutit, aperit, resoluit. Hanc et si Dioscoridis Horminum non sit, ego tamen Horminum maius, aut odoratum Horminum appellationem. Huius folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutunt: item surunculos priusquam caput faciant, vel acuminetur. Itala mulieres odorati Hormini seminis granum oculis caligantibus imponunt, nec ex oculo auferunt, nisi caligine soluta. Hormini utriusque meminit Plinius lib. 22. cap. ultimo ubi in eum errorem lapsus deprehenditur, in quem & in stachy eundem incidisse superius ostendimus. Nam ut Horminum folijs marrubio similibus depinxisse opus erat, et folia porri tradidit, nimirum Græcorum nominum translatate deceptus: $\pi\rho\alpha\sigma\iota\omega\upsilon$ enim marrubium significat, $\sigma\rho\alpha\sigma\iota\omega\upsilon$ vero porri, quod Plinius legisse videtur. Est & Hormini genus a Theophrasto, Galeno, & Plinio inter fruges annumeratum: quod (ut Galeus auctor est libro 1. de alimentorum facultatibus) inter erysimum, & cuminum mediam naturam obtinet. Ceterum Hormini, de quo hic nobis est sermo, meminit Galenum in libris simplicium medicamentorum, non reperio: quamvis eius mentionem fecerit Paulus, qui tamen illa tantum refert, qua à Dioscoride mutuatus est. Græci eam plantam $\sigma\rho\alpha\sigma\iota\omega\upsilon$ vocant, ut etiam Horminam Latini: Itali Hormino. Horminium sylvestre, Græci $\sigma\rho\alpha\sigma\iota\omega\upsilon$ $\alpha\gamma\rho\rho\rho$: Itali Horminio saluatico. At Sclarea, Itali, Sclarea, Scarteggia, in herba di san Gioianna: quibusdam Matrisalua: Germani Scharlach-Gallus, Orzoli, seu Toutebonne.

Horminum, quod impetu in Venerem agas, se-
stimulet, cuius plures sunt differentiæ: hic de faciu-
sylvestri & Syriaco. I. Horminum fatium, C.B. Dod.
num verum quorundam, Gel. hor. Orminum minus, Lonicero. II. Horminum sylvestre saluifolium, C.B.
Horminum sylvestre, Matth. Cast. Lugd. Cas. Hormini sylvestris tertij altera species, Clus. hist. Pann. Or-
uala altera, Dod. fol. Verbascum saluifolium, Lob. in iconibus. III. Horminum Syriacum. Planta est Scl-
rea forma, caulibus cubito altioribus, angulosis, laevissimè hirsutis, in alas dimisis, foliis inferioribus parvis
longis, latis, subasperis, sinuosis, superioribus angustis, oblongis leuicioribus: flores, forma florum Scl-

• III. HORMINVM SYRIACVM. *

alb. semen parvum & compressum rubris costis donatum, cinereum, nigris lineis sine ordine conspersum, in odori, quod sub lingua vt Ocymi semen lenescit, in valculis concluditur. Huius semen Bisfarmar nomine, D. Bernhartus Paludanus, dum Pataviuni ex Syria redisset, exhibuit. Sunt qui Aman vociter, at Cam. in suo horro Bisermas nominat. IV. Horminum Sclarea dictum, forte Tussilago altera Plinij, & si seminis formam vsuq; perpēdas, Alektorolophos Plinij statuere poteris, C.B. Sclarea, Matt. Cast. Cam. Taber. Cæsalp. cui & Scopa regia Plinij & Baccharis Diosco. Scarlea, Lobel. (cui & Centrum galli) Clus. hist. Pan. Gallitricū sativum, Trag. Gallitricum, Dod. gal. Lugd. Horminum, Gesner. hor. Orminum sativum, Fuch. Cord. in Diosc. Orminum maius, Ges. hor. ap. Lon. Oruala, Dodo. fol. Cast. Scordium alterum Plinij, Dalechamptio in Plinium.

H d'v Capor.

HEDYSARVM.

CAP. CXXIX.

Hedysaron, quodd vnguentarij pelecintm, id est, securidacam vocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim amulatur, vnde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitum subditum, concipiendi spem adimit. Nascitur in segetibus, & hordeis.


Quoniam Securidaca inter triticum & hordeum quandoque proueniat, frequentior tamen inter aphacani nascitur, id quod etiam refertur Theophr. lib. 8. de plant. hist. vbi Securidacam in aphacu gigni, eaq; aphacem a securidaca vnius similitudine vocauerunt deceptus lib. 18. c. 17. Securidaca lentem complexu strangulati scribit. In eadem etiam id preuenitur, quod phacon pro aphace legerit, & verterit: nam Græcis lens quædam vocatur, non quædam quæ vni generis est, sed et quoque Plinio refragatur Theophrastus, qui loco citato aracum, nō autem securidacam lenti innasce, & imitari tradidit. Duo Hedysari siue Pelecini habentur genera, etsi Dioscorides vni tantum meminit, alterum, quod minus, alterum, quod minus appellauerim. Maius folijs exit ciceri proximis, vndecim ex vno processu erumpentibus.

Hedysari
consideratio.
Plinij lapsus.

Securidaca
maioris hist.

I. SECVRIDACA MAIOR.

II. SECVRIDACA MINOR.



Hbb 4

Cauliculus

Nomenclatura

NYMPHÆA ALTERA



CAP. CXXXII

Et altera nymphæa, [cuius flos blephara dicitur,] foliis antedictæ: radice alba, scabra: flore luteo nitente, rotæ simili. Huius semen, & radix contra fœminarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Meari
gr. concit.
a Meari:
flos ad op-
tore con-
Nomenclat-
2m dicitur
et dicitur
Nomenclat-
opphæa
i. dicitur
quam Nym-
phonam vo-
cât, cuius flos
Nymphæa dicitur.

I. NYMPHÆA ALBA.

II. NYMPHÆA LUTEA.




Nymphaea utraque seplasiariis Mauritano nomine Nenuphar appellatur. Nascitur ubique frequentissima in paludibus, lacubus, & aquis stagnantibus. Vnde non mirum, si ea sit vulgaris admodum planta, & omnibus notior, quam ut indignari deceat. Veruntamen Fuchsius in libro illo de compositione medicamentorum, quæ nuper auctum edidit, putat alias esse Græcorum Nymphaas, alias Arabum, ut eius verba, quæ hic subiiciam, aperte satis declarant. Nymphaea, inquit, seplasiu Nenupharis. Facultatis tamen florum eius Dioscorides & Galenus non meminerunt. De illorum itaque sententia semine potius, & radice medicis utendum erit, quæ, ut idem testantur, refrigerandi & exiccandi potestatem obtinent. Arabes contra floribus esse utendum præcipiunt, illisq; refrigerandi in tertio, in secundo autem humectandi vim tribuunt. Atque hos quidem flores quarta species Nenupharis producit: quandoquidem illi præter binas, quas Græci commemorant, duas alias recensent. Ut hinc constet, eam Nymphaeam, cuius flores humectare Arabes memoria prodiderunt, hodie esse omnibus incognitam. Quapropter toto cælo errant nostri temporis medici, quod suæ Nymphae, quæ sunt Græcorum, humectandi etiam facultatem assignant, ita Aralum scripta sapenumero errandi occasionem medicis præbent. Et mirum plane est, Serapionem etiam inter Nymphaas numerare, quam calidam esse & tenuium partium scribit. Adeo nihil est in vniuersa Arabum doctrina certum, ac solidum: hæc tenet Fuchsius. Huius equidem viri alioqui eruditi iudicio tantum abest ut hac in re subscribere velim, ut potius cogar ipsum refellere, atque Arabum doctrinam tueri: utpote qui Græcorum scripta bona fide referant, atque his etiam addant si quid boni habent sua industria & experientia compertum. Id quod vel hic fiet perspicuum omnibus, qui æquo animo rem iudicabunt. Quod igitur Arabum nymphaea, etsi eas humectare tradant, vbi de earum floribus mentionem faciunt, eadem sint cum nymphaeis Græcorum, qui vim illam intactam reliquerunt, facile probari potest Serapionis, ac Auicenna testimonio. Hi namque, ut omittam quod omnia fere ex Dioscoride transcribunt, non solum utuntur floribus, vbi humectandum sit, sed etiam semine & radice, vbi adstringere & refrigerare sit opus. Neque mirum certe, quod Arabes suis Nymphais frigidum & humidum temperamentum adscribant, quando sic illis, ut etiam nobis, experimento compertum est, illarum flores humectare & refrigerare. Paratur enim è floribus oleum ipsis in eo insolatu, quo utuntur medici vbi refrigerare ac humectare sit opus. Soporiferi enim quidpiam illi inest, folia recentia venibus admota, seminis profluvia sistunt. Atque adeo hoc mihi non videtur Græcorum sententia aduersari: quippe Græci scribunt nymphaas exiccandi quidem & refrigerandi vim habere, sed de semine & radice intelligunt. Arabes verò nymphaeis humectandi & refrigerandi facultatem tribuunt, quam tamen flores sortitos esse volunt, ut clarissime scribit Auicenna. Illud addam, quod nihil prorsus sit alienum à ratione, ut vna eademque planta suum variet temperamentum, pro diuersa vniuscuiusq; partis natura. Huius rei Gal. testis esse potest in mædragora mentione, vbi scriptam reliquit eam radice refrigerare & exicare, fructu verò refrigerare & humectare. Quare, meo quidem iudicio, Arabes erunt in hoc laudandi potius, quam odiosæ (quod videtur facere Fuchsius) exprobrandi: ut qui non sine magna mortalium utilitate Nymphae flores in usum medicum asseruerint: quod à veteribus Græcis, quantum nobis constat, prætermisum est. Porro verisimile non est, quod Arabes ignorauerint, quæ in nymphaeis fuerint seminis & radice facultates. Nā si Auicenna

Nymphaeae
consideratio.
Fuch. opinio
reprobata.
du alias Græ-
corum, alias
Arabum Nym-
phaas statuit.

exij. affec

III. NYMPHÆA PARVA.



Nymphaea minor & eius hist. Matth.

Vires ex Gal.

Nomina.

† Me. exemp. ita legit.

Ανδρόσακες ἡρώταρ εν Συρία εν παρλίον το ποικ, τὸ χῆθι λεύκη λεωῶ κερφος, σίκρα, ἀφύλλος θυλλάκιον ὄπ τ κερσελῆς ἐχέω.

i. Androsaces nascitur in Syria in maritimis locis. Est autem herba alba, tenuib. virgultis, amara, sine foliis, folliculū in capite habens.

Androsaces consideratio. Androsace altera.

Androsaces vires ex Gal. Nomina.

... Ad albos vero macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hac aptior est ea, cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba. Νυμφαία Græcis, Nymphaea item Latinis appellatur: Mauritanis, Nilofar, Ninofan, seu Nofar: Barbaris, Nenufar: Italis, Nimphea: Germ. Westf Seebluemen & Haarwurk: Hispanis, Escudetes del rio. & Higos del rio: Gallis, Blanc d'eau, Lunet d'eau, & Lis d'estang. Nymphaea altera, Græcis, Νυμφαία ἑτέρα: Italis, Nimphea gialla. At Nymphaea parva, Græcis, Νυμφαία μικρά: Italis, Nimphea piccola.

Nymphaea maior est, eaq; albo, vel luteo flore: est & minor, eaq; luteo, eoq; vel magno, vel paruo flore: aut albo quæ triplex, cum & morsum ranæ Nymphaeam minorem faciamus. I. Nymphaea alba flore maiore, C.B. Nenuphar album, Brunf. Nymphaea, eidem Cor. in Diosc. Nymphaea alba, Matt. Anguil. Cor. hist. Lac. Lob. Lon. Tab. Thal. Dod. gal. & fol. Nymphaea candida, Trag. Fuch. Cæf. Nymphaea maior alba, Lugd. Cast. Lotus Ægyptia, Alpino. II. Nymphaea lutea maior, C.B. Lug. Nenuphar luteum, Brunf. Nymphaea lutea, Matt. Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Lob. Lon. Tab. Thal. Nymphaea Citrina, Cord. in hist. Nymphaea altera, Cord. in Diosc. Cæf. Nymphaea flore luteo, Anguil. Cast. III. Nymphaea alba minor, C.B. & Tab. Nymphaea parva, Matth. Lugdunensis Matthioli figuram habet, sed Nymphaeam alteram luteam minorem vocat.

Ανδρόσακες. ANDROSACES. CAP. CXXXIII.

Androsaces herba est amara, † tenues spargens iuncos, sine foliis, folliculos in capitulis habes, in quibus semen continetur. Gignitur in Syria maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini pota, & herbæ decocto: podagris vtiliter illinitur.

Androsaces ex Syria, quod sciam, non defertur in Italiam. Verum, quia eam herbam inibi etiam nasci posse nihil prohibeat, quoddam planta genus nuper inuentum est in Hetruria maritimis, cuius hic picturam ideo exhibere libuit, quod id à quibusdā Androsaces existimeretur. Id ipsum ad me misit hoc anno Pisis Lucas Ghinus medicus clarissimus, & rei herbaria peritissimus: à quo (si is illi opinioni subscriberet, & Androsaces in Italia nasceretur) non mihi ex eo dissentendum esset, quod præter alias notas hac planta (vt Oribasius ex Dioscoride transcribens habet) tota candida spectatur. Ceterum aliam quoque plantam ex Syria maritimis allatam ab hac longè diuersam, misit ad me sub Androsaces nomine Jacobus Antonius Cortusus patritius Patauinus, cuius quoque hic imaginem excudi curauimus, vt de ea quoque aliorum sit iudicium. Sunt qui putent hanc plantam Androsacem legitimam esse: verum cum folia in summitate gerat, non possum ego facile eorum subscribere placitis. Androsacis meminit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit: Androsaces humida, & acris herba est. Potest autem resiccata, exhibitaq; tum ipsa, tum fructus eius magnopere urinam mouere, & nimirum discutere, & desiccare. Hec planta vt Græcis ἀνδρόσακες, ita Latinis Androsaces dicitur: Italis, Androsace.

† In vulgatis exemplaribus hoc loco scriptum reperitur λεπῖν, hoc est tenuis: quam vocem, vt superuacaneam, misit Ruellius. In Oribasio verò λευκῖν, id est, alba legitur: & hanc ex aliquo fortè antiquo codice vertit Marcellus. Ceterum desunt, qui, vbi paulo post ἀφύλλος, hoc est, sine foliis legitur, ἄφυλλος, hoc est, cum foliis legendum putent.



Androsace

In lib. Tertium Dioscoridis.

643

I. ANDROSACES.

II. ANDROSACES ALTERA.



10
10

Androsaces

Androsace duplex est, alia foliis carens folliculos habens, quæ vel petrae innascitur, ut nobis ante viginti annos Cl. Vlyllès Aldroandus Bononiae exhibuit: vel Chamaeconchæ, ut ante annos nouemdecim, cum Monspelio Frontignanum nauim ueheremur, ad montem Cetum studiosos herbarum inquirendarum causa deducturi, stagnis innatantem copiosè vidimus & legimus. Dicitur Androsaces, Matth. Lac. Cast. Lon Lugd. Androsaces Cotyledon foliolatum marinum, Aduers. Lob. Androsace Matth. primum. Taber. Fungus marinus minimus, Cas. Umbilicus marinus Montpelienfibus. II. Androsaces altera, Matth. Lugd. Clus. hist. Pan. Tab. Cam. Morfus gallinae vel Allines species, non ex Syria, sed quadam antiqua marerie, Aduersariis: verum Aduersaria falluntur, cum hanc elegantem plantulam ante vigintiduos annos in horto nostro coluerimus, cuius elegans apud Clusium descriptio & apud Camerarium figura, cum in hac folia minus rectè sint expressa, quæ plantagini angustifoliae amula, & in ambitu dentata sunt: qua de re plenius in historia.

Ασπλην

ASPLENUM

CAP. CXXXIIII

A Splenum aliqui scolopendrium vocant, alii splenion, alij hemionium: foliis est multis, scolopendreae animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subtet flauescencia hirtutaque, supernè viridia. Vim hanc habent folia in aceto feruifecta, ut per dies quadraginta pota lienem absumant: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet: straguriae, & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per se, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

A Splenum, siue Scolopendrium tam à medicis, quam pharmacopolis, qui planè Mauritanorum scripta sequuntur, Cetrach barbara voce vocatur. Nec diu est, quod nouere rei herbariae periti Arabum Cetrach esse legitimum in Scolopendrium. Quandoquidem antea vniuersa herbariorum schola Aspleni loco phyllitum, quam etiam vulgò Linguam certinam appellant, suis immiscebant medicamentis. Verum enimvero quanquam hoc adeo clarum est, ut nullus amplius dubitandi locus relinquatur: adhuc tamè inueniuntur è veteribus nostris seplasiariis, qui ut suam potius pertinaciam, quam veritatem ipsam tueantur, nullo pacto sibi persuasum esse volunt, phyllitum non esse legitimum Scolopendrium: eo tantum argumento pertinaciter innixi, quod sui maiores phyllitum Scolopendrium appellauerint, quodq; eam spleni semper maxime profuisse experimento cognouerint. Qua tamen in re prorsus aberrant, ut ex Aspleni notis facile ab omnibus intelligi potest: ex quibus apertissime cognoscitur, nil aliud esse Asplenum, quam ipsum Cetrach vocatum. Nec desunt praeterea, qui obnixè contendunt, Cetrach non esse Asplenum, quod scripserit Dioscorides nasci Asplenum folijs polypodij, siue filiculae, Cetrach non quibus tamen ipsius Cetrach folia non vnde quaque respondere videntur. Verum si h, qui u. a. obiciunt, eam viderent si est Asplenum filiculae, qua in montibus prouenit in itinere, quo Goritia per montes in Carniolam itur, folijs angustioribus, & admodum virentibus, iis in posterum, quantum equidem reor, omnis dubitandi occasio sublata esset. Siquidem filicula hae folio exit Cetracho perquam simili, quanquam paulò ampliore. Tantaq; est similitudo, ut mihi primum hanc herbam in Asplenti ea feruè visa sit verum Asplenum: qua tamen effossa radice statim pro filicula agnoscitur. Praestantissimum asplenum in Creta nascitur, vbi repertum Vitruuius affirmat circa Potereum amnem, qui duae vrbes Gnoson, & Cortynam interlabitur: parte qua ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis, quia herbam hanc roderent: altera vero parte, qua ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi herba illa non appareat. Caterum aurens puluis, qui in aspleno auer, jo- Aspleni vires ex Gal. liorum parte inuenitur, drachma pondere vna cum albi succini farina semidrachma, ex succo portulacae potus, aut plantaginis, gonorrhoea laborantes mirifice inuat. Herba autem totius decoctum datur vtiliter potandum ad omnes melancholicos affectus, & ad eos praesertim, qui Gallica lue affecti sunt. Aspleni vires paucis perstrinxit Galenus libro sexto simplicium medicamentorum, sic inquit: Asplenum tenuium quidem partium, non tamen calida herba est. Hac vtrique ratione & lapides frangit, & lienes liquat: hac Galenus. Caterum sunt qui existiment Asplenum, & Scolopendrium Graecis non idem, sed diuersas omnino plantas representare, Galeni auctoritate freti. Quippe qui libro quinto cap. 7. simplicium

Aspleni et Cetrach. Cetrach non est Asplenum. Aurens puluis Aspleni & vires. Aspleni vires ex Gal. Asplenum & Scolopendrium quibus dicitur.

ASPLENVM.



Nomina.

plicium medicamentorum de his differens, qua obstructio lie-
ni conferunt, Scolopendrium ab Aspleno segregasse manifeste
videtur, cum inquit: Maiores lienis obstructions vehementi-
ora desiderant medicamenta, nempe capparum corticem, sa-
marum radices, scolopendrium, & scillam, & eam, que idem
ipsius nomine representat, asplenos appellat. Hac certe veritas
differentiis fieri aperte declarat. Sed, meo quidem iudicio,
credendum esse suspicor, quod hoc in loco prater Galeni sen-
tentiam accreuerit Scolopendrium, deprauatque in eo sit in-
scriptura vel librariorum incuria, vel nimia alicuius scilicet di-
gentia: quod in sequentibus libris, in quibus de simplicium o-
mnium, quorum cognitionem habuit, facultatibus Galenus
differit Galenus, nusquam, quod inuenierim, Scolopendrium me-
mnerit, sed tantum Aspleni, cuius etiam vires (ut supra re-
tulimus) sane quam paucis perstrinxit. Aut rectius forte re-
diderim, quod eo in loco per Scolopendrium, vel per asplenum
hemionitum intellexerit Galenus, de qua in sequenti com-
mentatione dicemus: quandoquidem hemionitis (ut ipse Ga-
lenus scribit lib. 9. c. 2. de comp. medic. secundum locos, vti ea
pharmaca ab Andromacho conscripta recenset, que epota
splenis siue lienosis opem ferunt) ab aliquibus ex antiquis
Asplenium, ab aliis Scolopendrium appellata est. Quare non
esset mirum, si loco predicto Galenus accepisset asplenium pro
hemionitide: praesertim quod haec herba quoque eam vim for-
tita est, qua lienem absorbere potest. Illa planta, qua Graeci
ἀσπληνον, Latinis quoque Asplenium, & Scolopendrium ap-
pellatur: Mauritani, Scolopendrium, seu Sculufendrium: Of-
ficinis, Cetrach: Italis, Aspleno, Scolopendria, & Herba indo-
rata: Hispanis, Doradilha: Gallis, Ceterach.

Asplenon, quod splenem iuuat, dicitur: Scolopē-
dria vera. Trag. Bon. Asplenium, Marth Dodo. gal. & fol. Lac. Lobel. Cast. Lugd. Cam. Asplenion Cora. in
Diosc. Asplenus, Ges. hor. Scolopendrium, Cord. in hist. Anguil. Ceterach, Ges. hor. Caelalpino.

Ἡμιονίτις.

HEMIONITIS.

CAP. CXXXV.



Hemioniti-
dis confid.

HEMIONITIS quam aliqui splenion vocat, folium
emittit Dracunculi, lunatum: radicibus cohaeret
multis, tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque
caulem gignit: in petrosis nascitur, austero sapore.
Ea ex aceto pota lienem absorbit.

FALLUNTUR procul dubio (ut in Phyllitidis commentatione
superius diximus) Leonicens, Ruellius, & Manardus:
quippe qui sibi certo persuaserint, Hemionitida eam esse splen-
tam, quam seplasiariorum vulgus Linguam ceruinam, per-
peramque Scolopendriam nominat. Sed quoniam in predicto
loco hos viros alioqui doctissimos, & Fuchsum praeter om-
secutum errare, euidentissimis, ut puto, argumentis ostendi-
mus: idcirco superuacaneum esse duximus hic eadem repe-
re, praesertim quod neminem futurum sperem, qui eo se con-
ferre grauetur, si cupiat nostras contra viros tam celebres ra-
tiones audire. Porro non modo iam nobis compertum est ve-
ram Hemionitidam, quae a Dioscoridis historia nihil prorsus dis-
fidet, Romae nasci in quibusdam rudibus, adificiorumque
ruinis prope magnum Amphitheatrum, vnde quidam rei bar-
baria studiosi eam in suos transtulerunt hortos: sed nos quoque
hoc anno eam accepimus ab Aloysio Anguillario, qui Hemio-
nitidis plantam, cuius picturam damus, ad nos Patavio mis-
sit. Equidem credidimus iam dudum vna cum Hermolae, &
Ruellio Teucrium, & hemionitidam vna tantum Plinio plan-
tam esse, deprauatis eius exemplaribus decepti, qua lib. 25. c.
5. ita scriptum habebant: Inuenit & Teucer eadem aetate
teucrion, quam quidam hemionion vocant. Veruntamen
cum postea tractu temporis Plinij codex mendis quam plantam

Hemionitum
& Asplenium
Plinio idem.
mi expurgatus ad manus esset, non hemionion legendum fuisse comperi, sed hemion. Quo factum est, ut omnino fuerim co-
actus in hac mutare sententiam, contraque asserere Teucrium a Plinio descriptum a Dioscorido teucrion nullis non differre.
Ceterum inter hemionium, & Asplenium Plinio nulla intercedit differentia, quod scripserit lib. 27. cap. 5. Asplenium sunt.

qui d.


qui hemioniam vocant. Sed equidem vereor, ne & ipse in errore versetur: quandoquidem Dioscorides non modo vtriusq;
 hemioniam in diuersis capitibus descripsit, sed etiam asplenium nusquam, quod sciam, hemioniam appellari ait: tamen si contra
 Hemioniam non asplenium, sed splenion a quibusdam vocari tradiderit. Sed posteaquam Hemionitidis lunata folia mihi
 ad memoriam reuocant herbam illam, quae a chymistis LVNARIA minor, & ab alijs ob semen racemosum Lunaria
 locum cognominatur, cum & ipsa miris in medicamentis polleat viribus, non praterendum duxi, quin hic de ea aliquid
 differerem. Hac itaque breuis est planta, dodrantali ferè altitudine. Caule consistat simplici, dodrantali, rotundo, lentis, ac
 gracili: e cuius medio in latus exit ramusculus, costis effigie, cui folia sunt vtrinque septem aut plura annexa, h. n. nata, crassa
 firmisq; brassicae marinae modo. Flores profert in summitate caulis, oxalidis minoris instar: semine rufo, rotundo, minutis-
 que, in una modum racematum coherente. Nascitur in altis montibus herbofo loco. Vis totius planta mirè efficax vulneri-
 bus recentibus glutinandis, itemq; pota intrinsecus, atque illita extrinsecus corporis fracturis sanandis: quare miris celebra-
 tur laudibus ad puerorum enterocelas. Datur vtiliter commodeq; dysentericis, planta tota in puluerem contrita ex vino
 affecto pota. Albas vteri fluxiones supprimit, quemadmodum & rubentes. Ferunt equos, qui in montibus herbas depa-
 scuntur, vbi haec copiosè prouenit, auulsis ab ea clauis, suos ferreos calceatus amittere, & ob id vulgò à nonnullis Sferraca-
 uallo appellari. Sed perperam, meo quidem iudicio, quòd alia sit planta, quae vel ab ipso effectu legitimè sic fuerit appella-
 ta, vel quòd semen proferat ferreus equorum calceus simile. Verum, cum à chymicis haec planta inter Lunaria genera recen-
 seatur, adeo, vt quidam eam ipsam Lunariam maiorem appellent: praterire quidem non potui, quin de ea quoque hic ver-
 ba facerem. Est itaque planta, quam nos SFERRA CAVALLO appellamus, herba in altis montibus proueniens, fo-

Lunaria mi-
 noris descri-
 ptio, & vires.

Sferra caval-
 lo.

II. LVNARIA MINOR.

III. LVNARIA MINOR RAMOSA.



10
 20
 40
 60
 80
 100
 120
 140
 160
 180
 200
 220
 240
 260
 280
 300
 320
 340
 360
 380
 400
 420
 440
 460
 480
 500
 520
 540
 560
 580
 600
 620
 640
 660
 680
 700
 720
 740
 760
 780
 800
 820
 840
 860
 880
 900
 920
 940
 960
 980
 1000

lunaria minori Securidaca proximis, pusillis, cordisq; faciem referentibus, incurua secundum longitudinem excurrente linea,
 pluribus vtrinque è longo pediculo emergentibus siliquis, oblongis, pressis, numerosis, altera parte incuruis incisuris diuisis
 & foraminum rotundorum speciem referentibus, prominente vtrinque foraminum orificio, adeò vt non parum opificij in
 hisce fabricandis natura adhibuisse videatur: caules habet angulosos, striatosq; ramulis compluribus refertos, sed flores ha-
 denus mihi videre non licuit. Semen è siliquis prodit lunatum, bicornè, vnde illi Lunaria nomen apud chymistas, qui eam
 magnis eferunt praconijs ad argentum consiciendum, hac tantum ex argendo viuo argentum purum fieri fabulantur, sed
 quam suis opinionibus deludantur ij, saepe suo magno dāno experiuntur. Radice nititur gracili quatuor digitorum longi-
 tudine. Hanc ego plantam Securidacam montanam appello, cum non paruam videatur habere cum minori securidaca co-
 gnationem, cum facie, tum viribus. Quod autem equi, qui diu hanc plantam virentè calcauerint, ferreis calceatibus protu-
 nus exuantur, quid certi asseram non habeo. Verum cū scribat Plinius lib. 10. c. 18. Picum martium adactos cauernis eorum
 cuneos a pastoribus, admoda quadam herba extrahere: & Trebius antiquissimus author illi subscribat, cogor quidem ijs
 haud omnino refragari, qui huic planta id virium tribuunt. Nullum quod sciam habet in medicina vsum, quamuis non
 defint herbarij, qui eam potionibus vulnerum addāt. Est & alia herba, quam aliqui similiter Lunariam minorem nomi-
 nant, quae in scrobium ripis, & aggeribus vligine madentibus, secus vias plerunq; nascitur. Serpit hac humi iunceis cauli-
 culis, cubito longioribus, clematidi illi similibus, quae Vinca peruinca vulgò vocatur, in quibus à radice ad summum ex v-
 troque latere breuib; interstitijs folia exeunt crassiuscula, rotunda, paruorum nummorum speciem referentia: vnde à
 nonnullis Nummularia dicta est. Sunt qui existiment, hāc esse Elatinem. Verum quia Nummularia dicta folia pilosa non
 sunt, sed leuia: quia prater ea non nascitur in segetibus & cultis, sed in scrobium aggeribus & vliginosis locis, ideo ijs non
 possam ad stipulari. Hac quoque glutinandis, & cohibendi facultate praedita est. Sed iam, vt nostri moris est, Hemionitidis
 sua reddantur vires ex Gal. qui eas retulit lib. 6. simplicium medicamentorum, his paucis verbis: Hemionitis simul & ad-

Lunaria mi-
 nor alia.

Hemioniti-
 dis vires ex
 Gal.

Nomina.

IV. SFERRA CAVALLO.



Ανθυλλίς.

ANTHYLLIS.

CAP. CXXXVI

strictionem & amaritudinem possidet: quomobrem cura acro-
pota lienosis auxilio est. Ea ut Grecis ἡμιονίτις. ita etiam He-
mionitis Latinis, & Hemionite Italia vocatur. Lunaria mi-
nor, siue Lunaria Botrytis: Italia, Lunaria del grappolo.

I. Hemionitis, Matth. Anguil. Dod. gal. & fol. Lac.
Lon. Ges. hor. Cal. Hemionitis siue sterilis, Lob. He-
mionios Theoph. vbi Gaza Mulam vertit. Sunt qui
dubitant, an hæc à Lingua ceruina vulgò dicta specie
differat, siquidem ei valdè similis sit. II. Lunaria mi-
nor racemosa, quæ Lunaria dicitur à foliorum forma
subrotunda & lunata, quæ totidem censentur, quæ
Lunæ dies, quæq; cum Luna augeantur & decrescant.
Lunaria, Trag. Dod. fol. Lunaria minor, Mart. Fucii
Dod. gal. Ges. hor. Lon. Lugd. Clus. hist. Pan. Cæf. Lu-
naria racemosa, Lob. Lunaria minor botrytis, Thai.
Lunaria petræa, Gesner. de Lunariis. Lunaria maior,
Cast. Epimedium Diosc. Fabio Columnæ. III. Lu-
naria minor ramosa, C. B. Hanc D. Cam. in suo Mart.
proposuit, quæ pluribus est foliis, pluribus racem-
lis, quæq; in Anglia reperta, cui Lunariæ rarior spe-
cies dicitur. Hæc vel similem expressit Thalyus in sua
Harcynia, cui dicitur Lunaria botrytis καλύφαλα.
IV. Ferrum equinum, Ges. hor. Lob. Dod. fol. Sferra
Cauallo, Matth. Ges. hor. app. Sferra Cauallo Italici,
Cam. Solea equina, siue Securidaca montana, Luge.
Securidaca minor, Cast. Medicæ species, Gesn. hort.
Securidacæ species, Cæf. Hedyсарum siue ferrum e-
quinum, Tabernæmontano.

α ὑφαλλος. i.
subfalsus. ita
meum.
Orib. non le-
git conclusa.

ANthyllis duplex est: quædam enim lenti simillima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine
radice parua, tenui. Nascitur in falsis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est foliis, ra-
mulisq; aiugæ similis, hirsutioribus tamen, [breuioribus, & asperioribus] flore purpureo, odoris admo-
dum grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor, vrinæ difficultati, renibusq; plurimum prodest. Tri-
tæ, vuluæ pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte impositæ vulneribus medentur. Quæ autem aiugæ li-
militudinem refert, præter alia pota cum aceto mulso, comitiales sanat.

Anthyllidis
consideratio.
Fuchsi opin.
damnata, dū
Kali Anthyl-
lidem censet.

Primam, aut alteram Anthyllida, qua Dioscoridis historia respõdeat, non equidem hæcenus in Italia reperi, aut reper-
tam vidi: quanquam non negauerim, quin ea inibi proueniat. Ruellius hanc posteritati Salsolam vocatam fuisse tra-
dit, quòd ex ea salem fieri memoria proditum sit. Fuchsius verò in libro de comp. med. quem locupletatum nuper excudit,
patat eam herbam, quæ Kali Mauritani dicitur, de qua nos differuimus libro superiore in Atriplicis commentatione. An-
thyllidem esse: nam vbi Aluminium genera expendit, in sine fermè sic inquit: Alumen, quod Catina appellant, ex herba cõ-
bussa conficitur, Cali Mauritani dicta, Grecis Anthyllide & Trago. Sed, meo quidem iudicio, in hoc aperte hallucinatur
Fuchsius vnà cum Amato Lusitano, à quo illum hanc vanam opinionem accepisse facile suspicor. In primis namq; non vi-
deo ego, quomodo fieri possit, vt Cali Mauritanorum duas possit legitime Græcorum plantas representare, Anthyllida &
Tragum, quæ quidem genere, forma, notis ac viribus inter se maxime differunt, vt in ea Apologia, quam in illi Lusitanum
scripsimus, latius ostendimus. Deinde nobis planè subit mirari Fuchsum, virum alioqui doctissimum & in re medica a lo-
clarum, vt primas ferat in Germania, quòd Lusitani illius ineptias tam religiosè sit secutus, vt hic contentus protulisse An-
thyllidem esse herbam Cali, neglexerit præterea Anthyllidis genera, quæ Dioscoridi duo sunt, expendere: atque genus expu-
care, quòd Cali esse putabat. At reuera Cali (quantum ego sentio) nec primam, nec alteram Anthyllidem exprimit, neque
etiam Tragum. Etenim hoc sine foliis nascitur, sed eorum vicem explent aculei, adeò vt tota planta spinis horrida spectetur.
Illa verò Anthyllis, quam primo generi adscribit Diosc. lenti simillima est. Porro alterum eius genus (teste Diosc. foliis ra-
mulisq; aiugam emulatur, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis. Quæ
nimirum nota in herba Cali, gustanti salsa prorsus desiderantur. Vtriusque Anthyllidis meminit Gal. lib. 6. simpl. medi-
sic inquit. Anthyllis duplex est, sed vtraque modicè desiccata, vt & vlcera glutinat. Ceterum altera, ea scilicet quæ Cha-
mapiryi adsimilis est, quadantenus subtiliorum est partium, quàm altera, adeò vt & comitialibus competat. Quin & i-
psa magis quam altera extergere potest. Quæ herba Græcè ανθυλλίς, Anthyllis itè Latinè, & Anthyllide Italicè nominatur.

Anthyllidis
vires ex Gal.
Nomina.
† Orib. legit.
τριπικρον. i.
tricubitali.
Meum exep.
ενδοθεν μω
λευκον κχ
σιζον ανδυλ-
λιον έχοντα
εξοθεν ο
πειτακυκλω
τερως λευκα,
η πορφυρα. i.
intrinsecus
quidem albū,
& aurei colo-
ris florem ha-
bet, extrinse-
cus verò per
ambitū albos
aut melinos,
aut purpu-
ros.

Ανθεμίς.

ANTHEMIS.

CAP. CXXXVII.

ANthemidis genera tria tantum flore distantia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis concavi: ce-
nibus foliolis, paruis, numerosis, rotundis capitulis: † floribus in medio aureis, forinsecus orbi-
culato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ. Nascitur in asperis & iuxta
lèmitas: colligitur vere. Vim habent radices, flores, & herba excalfaciendi, extenuandique. Potu, & inie-
sione, pellunt menstrua, partus, vrinam, calculosque: aduersus inflationes, & ilei tormenta bibuntur: bi-
lem suffusam expurgant: iocinerum vitia sanant. Decocto earum vesicæ fouentur. Ex omnibus his gene-
ribus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc
proprie heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo nomè est, itè quæ chrysanthemon dicitur, vehemen-
tius

a Meum. οπερ τοις αλοις εστι μειζον. i. quod & per omnia maius est.


I. ANTHEMIS, SIVE CHAMÆM.

tius vinam ciunt. Ægyptiis illitæ medentur: com-
manducatæ ulcerum eruptiones in ore sanant. Non-
nulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturq; in fa-
rinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores, & fo-
lia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos dige-
ri: radix quoque sicari, dumq; ingruit necessitas, bi-
næ partes herbæ dari, modò floris aut radice pars v-
na, modò contra floris partes duæ, & herbæ vna, per-
mutatim duplicato pondere, alternis diebus, bibere
autem oportet in vino mulso diluto.

Anthemis, quæ & Chamamelò ab odore mali Græcis di-
cta est, officinis, & vulgò corrupta voce Chamomilla vo-
catur. Verùm quamuis tres Anthemidis species florum colore
tantum differentes, memoria prodiderit Dioscorides, eamq;
ceteris ad calculos præstare tradiderit, cui flores in medio au-
rei, per ambitum verò purpurei bubonij modò insunt: phar-
macopola tamen in Italia illam duntaxat sibi comparant,
quæ floribus constat intus aureis, foris foliis albicantibus cir-
cumseptis: quòd hæc ceteris frequentior, copiosiorq; inter sege-
tes in campis proueniat, oleatq; suaviter. Quandoquidem ce-
tera eius genera, à paucis sane cognita, in raris Italia locis re-
periuntur: vnt qui putent plantam, quam quidam Vergilij
ADONIDEM esse censent, purpureum Dioscoridis esse
Anthemidem, sed re vera hallucinantur, quòd huiusce Anthe-
midis genus, Diosco. teste, flores proferat in medio aureos, &
forinsecus orbiculato ambitu purpureos, vt in [Amello] Belli
qualam videmus, à quibus maxime differunt vulgari Ado-
nidis flores, qui papauerorum syluestrium flores amulantur.
Ceterum Anthemis cuius vulgaris est vsus, caules edit cubi-
tales, foliis est paruis, capillaribus, tenuibus, ac numerosis: flo-
res fert in caulium, ramorumq; summitatibus Parthenio,
quod Matricariam vocat, similes. Radicibus nititur tenuibus,

Anthemidis
consideratio.

Adonidis
mentio.



nec aise descendentes. Tanta est Anthemidis cum COTULA foetida similitudo, vt nullo fere oculorum intuitu, sed ol-
factu tantum altera ab altera dignosci queat. Namq; altera, nẽpe Anthemis per quã bellè ac suaviter olet, altera vero foetet,
& alto acris est, vt cutim exulceret adalligata. Quo fit vt qui in campis aluum exonerant, & deinde hæc herba sedem ab-
stergunt, paulò post intolerabili vexentur ardore. Ceterum Anthemidis decoctum potum lateris dolores sanat. Idem præstat

Cotula foeti-
da.


Anthemidis
vires.

*II. CHAMÆMELVM NOBILE *flore multiplici.*

*III. CHAMÆMELVM FOE-
tidum, seu Cotula.*



IV. ADONIS.

Anthemidis
vires ex Gal.

Nomina.

aqua è floribus distillata. Anthemidis flores absque foliis de-
cerpti, tustiq; in mortario, & ex oleo in pastillos conformati, &
ex eodem oleo dissoluantur iisq; febrientes à vertice capitis, &
que ad pedes illinantur, moxq; stragulis, vt sudent, ritegan-
tur, quasunque febres sanant, si sudor copiosus fluxerit. Ita
enim scriptum reliquit Nichessor Aegyptius. Anthemidis me-
minit Gal. li. 3. simp. med. sic scribens. Chamamelum tenuitate
quidem rosa per simile est, calore vero ad olei facultates magis
accedens, animali tñ familiares, tum tēperatas. Quapropter
lasitudinib; vt si quid aliud cōfert, doloresq; sedat. murg. 2. 2.
Præterea tēsa remittit, & laxat, quæq; mediocriter dura sunt
emollit, quæque constipata rarefacit. Ad hæc febres, quæ circa
visceris alicuius inflammationes infestant, discutit, ac dissoluit,
ac præsertim quæ ex humorib; biliosis, aut cutis densitate pro-
ueniunt. Quæ de re & ab Aegyptiorum sapientibus Soli cōje-
cratū est, febriumq; omnium remedium putatur. Verum hæc
quidem in re à veritate aberrant: solas enim, quæ dicitur febres
sanare potest, easq; quæ iam concocta sunt. Iuuat tamen pal-
chre reliquas etiam omnes, quæ melancholica sunt, aut pini-
tosa, aut ex viscerum inflammatione prognata. Nam & hæc
remedium Chamamelum vel strenuissimum est, vbi iam
concoctis adhibetur: quapropter, & hypochondriis, vt si quid
aliud, gratum existit. Meminit etiamnum libro 6. eorundem
simpl. med. sic inquit. Dicitur quidem in 3. libro de hac her-
ba copiosius est, diciturq; nunc summatim, quod calefacit, &
desiccet in primo ordine. Est & tenuium partium, ac prouide
digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Plā-
ta, quæ Græcis ἀνθεμίδις, & χαμαίμηλον, Latinis pariter An-
themis, & Chamamelum appellatur: Arabibus, Debonigi, seu
Babunegi: Italis, Camamilla: Germanis, Camillen: Hispanis
Manzanilla: Gallis, Camemina, & Camomille.

Chamamelum aliud odoratū, quod vel gratum, idq; flore simplici, quod vulgatum, vel peregrinū: aut
flore pleno est: vel ingratum spirat odorē. Aliud inodorū Cotula, & quidē aruense, marinum, & calpinum.
I. Chamamelū vulgare, quod Leucanthemū Diosc. C. B. Chamamelū tertia Parthenij species Brunf. An-
themis siue Chamamilla, Matth. Cor. in Diosc. Chamæm. Lac. Cast. Cæf. Tab. Thal. Chamomilla terua,
Trag. Chamæm. leucanthemum, Fuch. Ges. hor. Chamæm. sylu. Dod. gal. Lugd. Chamæm. vulgare, Dod.
fol. Ges. hor. ap. Chamomilla vulgaris, Lon. Chamamalū verū, Ges. hor. Chamæm. aruense, Cam. Anthe-
mis vulgator, Lob. II. Chamæm. nobile flore multiplici, C. B. Anglorū niueum Leucanthemum flore
multiplici, Aduers. Lob. Anthemis leucanthemum niuea Anglorū flore multiplici, Lugd. Chamæm. leu-
canthemum odoratū multiplex, Dod. fol. Chamæm. Romanū flore multiplici, Cam. in Matth. Tab. Cna-
mæm. flore pleno, Cam. Hoc tenerioribus est cauliculis humi sparsis, foliolis breuioribus, florib; ex pu-
rimis foliolis densè cōpactis: tota plāta cæteris suauius olet, quare & facultatibus superat: sunt qui ex plāte
succo, floribus & vino albo, Syrupum ad icterū & hydropē splenis vitio causatum, conficiant. Circa Aure-
lias Galliarum spontē quidē prouenit, alibi in hortis cultioribus reperitur. III. Chamæm. fœtidū, C. B.
Cotula fœtida, quarta species Parthenij, Brunf. Camomilla secunda & sylu. Trag. Cotula fœtida, Matth.
Dod. gal. Ges. hor. Lob. Lac. Lon. Cast. Lug. (cui & Parthenium leptophyllum Hippocratis, Cam. Parthe-
nium, Fuch. Cotula alba, Dod. fol. Cotula, Tab. Cota vulgo in Hetruria, Cæf. cui & Bupthalmum Diosc.
Gal. & Plinij, Bupthalmum minus, Cord. in Diosc. Chamæm. album seu fœtidum, Thalyo. IV. Adonis
hortensis est & sylu. hæc flore vel maiore vel minore, hæcq; rursus rubro, pallido, luteo, in medio nigri-
cante, rarius albo. Adonis flore minore, C. B. Anemone agrestis, Trag. Anemone, Cor. in Diosc. Anemone
tenuifolia, Cord. in hist. Adonis, Matth. Lugd. Flos Adonis, Lob. Adonidis flos, Cam. Chamamelum E-
ranthemum, Dod. gal. Ges. hor. Eranthemum, Dod. gal. & fol. Chamamelum rubrum, Ges. hor. Anthe-
mis Eranthemum, Lug. Chamamelum cuius folia florem cingentia sunt purpurei coloris, Cast. Chama-
melum purpureum, Tab. Aculeata, Lon. Ranunculus aruensis floribus rubicundis, Cæsalpino.

Παρθένιον.

PARTHENIUM.

CAP. CXXXVIII


Parthenium, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus me-
lino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatum, cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atque epi-
thymum, & bilea, & pituitam detrahit: suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculi-
sis, & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vularum, & in-
flammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus cum flore.

Parthenij
consideratio.Matricariam
non esse Arte-
misiæ cōtra
Brafau. Fuch.
& Monach.

Seritur Parthenium in Italia in hortis serè omnibus, neque modò in iis satum, sed in aliis quoque locis sponte prouenit.
Folio est coriandri, amaro sapore, odore graui: floribus per ambitum albis, intus melinis. Hetruscū Matricariam, & ab
amaro sapore, Amarellam vocant. Caterum hallucinantur, mea quidem sententia, in Parthenij historia Brasauolus, &
Fuchsius, viri alioqui doctissimi: quin & Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, quod concu-
des sibi persuaserint (vt superius in Artemisia commentario, eorum errorem explodendo, diximus, Matricariam, siue
Amarellam vulgò vocatam, esse illud Artemisia genus, quod secundo loco à Dioscoride representatur: vt pote qui non re-
exponderint banc esse legitimum Parthenium. Porro contendunt Brasauolus, & Fuchsius eam omnino plantam
verum

I. PARTHENIVM, SEV MATRICARIA.

II. TANACETVM.



verum referre Parthenium, quam herbariorum vulgus Cotulam foetidam appellat. Sed quam isti clarissimi medici magno in errore versentur, iudicent y, qui probe sciunt Cotulam foetidam folio esse fœniculi, aut anthemidii potius, quam coriandri: neque sapore vsque ad eum amaro, vt in Parthenio requiritur, sed acutissimo, & exulcerandi vi prædito, id quod nusquam Parthenio tribuit Dioscorides, neque Galenus. Sunt præterea antiquorum nonnulli, qui Helxinem quoque Parthenium vocauerunt, illam scilicet, quæ in parietibus nascitur detergendis vitreis vasis aptissima, vt Galenus ipse testatur lib. 6. simpl. med. & Plin. lib. 22. cap. 17. naturalis historia. Nec desunt etiam, qui velint matricariam appellare Athanasiam, quam

Helxine, Parthenium.

& TANACETVM vocant septasarij, cuius etiam superius de Artemisia differentes mentionem fecimus, & hic modò

Tanacetum, & eius medicinz.

40 Tanacetum esse contendunt. Foliis est maioris millefolij amulis, aliquantò tamen maioribus, amaro sapore, & odore graminis, caulibus bicubitalibus, floribus melinis, aureis globulis similibus, umbellatim quadrantibus micantibus. Radice nititur unica compluribus adnatis fibris. Prouenit in hortis, ac etiam alibi sponte per se nascitur. Excalfacit, exiccat, abstergit, aperit, status pellit. Vtuntur Tanaceto recentiores ad ventriculi, vteri & alui status discutiendos, item ad lumbricos ex ventre pellendos. Vtuntur & ad frangendos renum calculos, & ad ciendam vrinam & menses: obstructions viscerum aperit. Sed id viris magis, quam mulieribus commendant: contra verò Matricariam dictam fœminis tantum exhibendam præcipiunt. Parthenij in simpl. med. censu Galenum meminisse non reperio. Excalfacit, siccit, aperit, abstergit, prouocat, resoluit, status pellit. Epotus succus drachma pòdere cum saccharo ventris tineas perimit: illitus impetigines, alphas, & lentiginis emaculat. Peculiariter autem auxiliatur omnibus vteri affectibus, quos status, aut pituitosus humor excitauerit: menses ciet, & secundas: calefit recens super tegula, & irrorata vino veteri illinitur còtra vteri dolores. Eius nomẽ Græcum

Nomina.

30 est $\alpha\rho\theta\epsilon\iota\sigma\iota\upsilon\varsigma$, Latinum similiter Parthenium: Officinis, Matricaria Arabicum, Achuen, Vchuen, Achuan, siue Alachuan: Italicum, Parthenio, Matricaria, & Amarella: Germanicum, Mutter Kraut, & Mettram: Gallicum, Matricaire. Tanacetum siue Athanasia: Italis, Tanaceto siue Daneda.

Parthenium quasi virginialis, quòd morbis mulierum vterinis medeatur, vnde vulgò Matricaria dicitur. Hęc folijs est latioribus, & angustioribus: illa vel odorata, vel inodora: odora vel simplici, vel pleno flore: inodora, peregrina est & altera alpina. I. Matricaria vulgaris, C. B. Cam. Matricaria, prima Parthenij species, Brunf. Parthenium, Matth. Cord. in Diosc. & hist. Dod. gal. Ges. hor. Lac. Cast. Thal. Amaracus Galeni, Ericio Cord. Matricaria, Trag. Dod. fol. Lon. Cæs. Lugd. Matricaria nostras, Lob. Artemisia tenuifolia Fuch. fol. Tab. Artemisia ramosa altera species, Fuch. in icon. II. Tanacetum fortè à Tannaco, quo nomine Parthenium appellatum fuisse testatur Plinius. Hoc odorum est, vel inodorum: odorum, aut maius, quòd 60 folius est vel planis, floreque; aut luteo, aut albo, vel crispis: aut minus, hocque; vel capestire, vel alpinum: inodorum, flore minore, vel maiore. Tanacetum vulgare, quòd Parthenium microphyllon Hippocratis videtur, C. B. Tanacetum, Brunf. Matth. Cord. in hist. Ges. hor. Lon. Dod. fol. Lob. in obs. Cast. Cæs. Tanacetum vulgare luteum, Trag. Tanacetum maius, Dod. gal. Tanacetum citrinum, Thal. Tanacetum millefolij folius, Lob. in icon. Athanasia, Lugd. Athanasia vulgaris, Lac. Artemisia tenuifolia, Fuch. in icon. Artemisia monoclonos, eidem in fol. Artemisia Dioscoridis, Taberna montano.

$\beta\upsilon\phi\theta\alpha\lambda\mu\omicron\nu$.

BVPHTHALMVM.

CAP. CXXXIX.

BVphtalmon, quidam cachlam vocant, caules emittit tenues, mollesque: folia fœniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, vnde nomen traxit. Circa oppida nascitur, & in campestribus.

stribus. Flores cum cerato triti, tumores, duritiasque discutunt. Aiunt epotam post exitum à balneo, re-
gio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

I. BVPHTHALMVM.

II. BVPHTHALMVM ALTERVM



Buphthalmi
consideratio.

Cotula non
fœtida nō est
Buphthal-
mum.

Buphthalmi
vires ex Gal.

Bellidis hi-
storia.
Maior.


Media.

Minor.

Non parum profecto inter se variant de Buphthalmo recentiorum sententia, vt herbam, qua ipsum legitime repræ-
sentet decernant, & ostendant. Nam aliqui putant, herbam quandam cubito altiore, in pratis & agrorum mar-
ginibus nascentem, qua (vt equidem opinor) Bellis maior est, folio nonnihil in ambitu serrato, flore intus melino, extra ve-
rò candidissimis foliolis vndique circumdato, anthemide maiore, esse legitimum Buphthalmum. Alij verò, quibus ad stipu-
latur Fuchsiaz aliam ab hac herbam verum Buphthalmum esse contendunt, vulgaris anthemidis cognatam, quam officina
Cotulam non fœtidam vocant. Sed cur horum sententias comprobem, sanè non habeo: quippe quamuis Cotula non fœ-
tida dicta foliorum facie quadantenus Buphthalmum referat, flores tamen in medio melini, & in ambitu anthemidis ma-
do candidi, Dioscoridis pictura non vtiq; respondent. Quemadmodum & hinc perspicuum est alteram plantam, cuius
primo loco meminimus, non esse Buphthalmum. Si quidem cum diligentissime scripserit Dioscorides vulgaris anthemidis,
tum etiam parthenij flores intus aureo micare colore, per ambitum verò candido, dubitandum quidem non est, quin e-
adem fuerit vsus diligentia in describendo Buphthalmi flore, quem tamen luteum in vniuersum facit, non autem in ambi-
tu candidum, qualis in vulgari parthenio conspicitur. Cum itaque Buphthalmum luteo planè flore præditum esse debeat,
haud dubiè errant, meo quidem iudicio, qui pro Buphthalmo prædictas, aut similes plâtas accipiunt. Caterum legitimum,
ni fallor, Buphthalmum ad me attulit hoc anno Patavio Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus, iuuenis spectata in
philosophia ac medicina eruditionis, mihiq; perinde ac filius charissimus, quod in nullis prorsus notis a Dioscoridis descri-
ptione disidet, vt eius effigies, quam hic damus, abundè demonstrat. Buphthalmi vires retulit Galenus libro 6. simplicium
medicamentorum iis verbis: Buphthalmum, inquit, sic appellatum est à floribus, qui figura quidem boum oculi videatur
ad similes, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò illis tum maiores, tum acriores. Proinde & vehementer
discutiunt, adeò vt duritias sanent cerato misti: hac Galenus. Vbi ne quid nobis obstet, animaduertendum est, quod
Galenus, qui Buphthalmi flores anthemidis floribus simillimos reddit, de ea tantum anthemide intelligit, qua luteus flos
profert. Sed quoniam de Buphthalmi flore differenti mihi BELLIS sic à Plinio vocata occurrit, cuius etiam initio com-
mentarij memini, non alienum esse iuxta, hoc in loco eius historiam, & vires recensere. Bellis igitur quinquam plura sunt
genera, tria tamen communiter numerantur, nempe maius, medium, & minus. Maius folia gerit ex angusta origine: &
latum ambitum sinientia, subrotunda, crassiuscula, & circumquaq; quercus modo serrata, humi circa radicem in tota modò
accubantia. Quæ autem in caulibus habentur angustiora, oblonga magis sunt senecionis modo, caules emittit ab vna ra-
dice plures, cubitales, teretes, robustosq; è quorum summis partibus flores exeunt Anthemide, aut Parthenio maiores, qui
estate ferè tota perdurant, colore intus aureo, & per ambitum candido. Radix illi est multisida, haud valde descen-
dens. Nasitur in pascuis, pratis, secus itinera, & in agrorum marginibus. Alterum autem, quod medium ap-
pellamus, plerumque in pratis & pascuis prouenit, folijs alterius minoribus, nec adeò per ambitum incisus, minime
sinuatis, in terra iacentibus. Cauliculos edit tenues, flexiles, rotundos, palmari longitudine: radicem altero tenuiorem, sed
multisidam: flores mittit maiori per omnia similes, sed longè minores. Minus quod in hortis & fœtilibus feritur, vni
spectatur generibus, qua florum varietate dignoscuntur. Nam tametsi folia in omni ferè genere habeantur longiuscula,
in cau-

III. BELLIS MAIOR.

IV. BELLIS ALPINA.



V. BELLIS MEDIA.




in cacumine subrotunda, crassiuscula, solo procumbentia, & in rota modum radiantia, atque per ambitum sensim serrata. flores tamen coloribus, & foliorum numero inter se variant. Siquidem in vno genere centrotenus aurei, & per ambitum rubentibus foliolis stipati cernuntur: in altero verò ex candido rufescentibus, aut versicoloribus numerosioribusq; Sunt etiam qui intus rubri sint, & in ambitu albi, quinetiam qui vbiq; foliolis exilibus admodum versicoloribus adeò stipati habeantur, vt sericinos stoccos penè referant. Omnes hoc tempore in coronamenta venere. Nam ob cauliculorum mollitiem, & colorum præstantiam, texendis coronis aptissimi sunt. Florent anno ferè toto si cultorum diligentia non desit. Facultas omnibus eadem: nam (vt recensiores perhibent) valent flores in strumis, & capitis fracturis: quinetiam in vulneribus thoracis, qua in pectoris cavitate usq; penetrarunt, in quem usum Bellis potionibus inserunt. Sunt & qui Bellidis omnia genera laudent ad ischiada, & paralyfin. Sanant commansa folia cum oris, tum lingua exulceratas pustulas: eadem tusa genitalium inflammationes extinguunt, ac etiam resoluunt. Herba ipsa recens in acet. aris ex oleo & aceto deuorata, aluum adstrictam lenit: id quod etiam præstat ex iure pinguium carni-um decocta & vnà cum iure sumpta. Βύφθαλμος sic Græcè Nomina Latinè verò Bupthalmum, & Oculus bouis dicitur: Arabicè, Bihar: Italicè, Buphalmo, & Occhio di bue: Germanis, Rindsaug: Gallis, Oiel de Beuf. Bellis maior, Italis primo flore maggiore, & fior di primavera, nonnullis Primula veris maior, dicitur. Bellis minor, Italis primo flore minore, fior di prima vera: Germanis, Wasstieben: Gallis Marguerites, seu Rasquette. Bellis minima, Italis, Margarite: & fior di prima vera gentili.

Bupthalmum, quodd flore similis sit boum oculis. I. Bupthalmum Dioscoridis, C. B. Bupthalmum, Matth. Trag. Lac. Gesner. hort. Lobel. Lugd. Cast. Tab. Bupthalmum vulgare, Clus. histo. Pan. Chamæmelum Chrysanthemum, Fuch. Cotula lutea, Dodo. gal. & fol. Cotula non fœtida, Lotnicero Chrysanthemum, Cordo in Dioscorid. Gesner. hort. Aster atticus, Cord. in histo. quo ad iconem, quam tamen ipse non apposuit. II. Bupthalmi nomine hoc videtur Camerarius in suo Matthiolo pro-

VI. BELLIS MINOR.

VII. BELLIS MINIMA.



VIII. BELLIS MINIMA.



posuisse. Bupthalmi altera species, Ges. hor. Bupthalmum alterum folio & facie Cotulæ fertidæ, Advers. Lob. Bupthalmum alterum Penz., Lug. Bupthalmum Narbonense, Clus. hist. Pan. Bupthalmum verum, Tab. Chrysanthemum primum Cæs. Munc de Bellide. Bellidem licet aliqui velint apud Theophrastum esse Anthemidis foliacei speciem, ceterum tamen Græcis indictam, & à Plinio primum positam, quæ sylvestris est & sativa: illa maior, media, & minor: maior alba, vel lutea: alba pratensis, simplici, rariss. pleno flore, & alpina, hæcque maior vel minor: lutea, folijs vel profundè incisiss, eaque maior & minor, vel subrotundis. Sylvestris minor alba, vel mixta, vel cærulea, hocq; vel frutescens vel nõ: hæc; caule nudo vel folioso. Sativa verò minor est pleno flore, eoq; maiore vel minore, albo, rubro niuco: huius generis est & prolifera suave rubes, rarius viridis. III. Bellis sylv. caule folioso maior, C. B. Oculus bouis vel vaccinus, Bruf. Bellis maior, Mart. Trag. Fuch. in fol. Dod. gal. & fol. Lacu. Lob. (cui & Consolida media vulnerariorum.) Cast. Lugd. Cæs. Cam. Bellis maior sylvestris, Fuch. in icon. Ges. hor. Bellium maius Tab. Bupthalmum maius, Lonicerò. IV. Bellis alpina maior, C. B. Hæc ex radice serpente, lignosa, nigricante, & ab vna parte fibras spargente, caulem emittit vnicum, cubitalem altitudinem excedentem, rotundum, striatum, ad radicem leuiter hirsutum, circa quem folia pediculis cartilaginea, quinque vel sex transversorum digitorum longa, angusta, rigida, ex rotunditate acuminata, per circumferentiam crenata, nullo ordine disposita: in caulis summo, flos vnicus, medio luteus, quem plurima folia alba cingunt, rotusq; flos priori multò maior est. Hæc in Baldo, monte Veronensi provenit: à qua diuersa quæ in Euganeis provenit. V. Bellis sylvestris media caule carens, C. B. Bellis media, Matth. Clus. hist. Pan. Lugd. Tab. Cam. Bellis sylvestris media, Ges. hort. Dod. fol. Bellis maior sylvestris, Lob. Bellis minor, Cast. VI. Bellis sylvestris minor, C. B. Ges. hort. Lugd. Solidago, Brunf. Primula veris, eadem. Cæs. Bellis minor, Matth. Bellis minor sylvestris, Fuch. Dod. gal. & Tab. VII. Bellis hortensis flore pleno C. B. Pri-

C.B. Primula Veris Trag. Gefhort. Caf. Bellis minor, Matth. Cam. Lugd. Bellis minima Matth. in Compendio. Cast. Bellis minor hortensis Fuch. Dod. gal. Lac. Gefhort. Taber. Bellis hortensis Dodo. fol. Bellis hortensis multiplici flore, Lob. VIII. Hanc etiam sub Bellide minima habet Matthiolus, quam Bellidem minorem hortensem Tabernæmontanus nominat.

Γλυκύσιδη.

PÆONIA.

CAP. CXL.

Pæonia, siue glycyfide, Græcis aliquibus pëtorobon dicitur, sunt qui Idæos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: ¹⁰ **M**as folia ruglandis habet: in fœmina verò smyrnij more diuiduntur. Summo caule siliquas emittit amygdalis similes: in quibus, cum dehiscunt, multa grana, exigua, rubra, acinis punicorum similia inueniuntur, & in medio nigra, purpurea quinque aut sex. Radix maris digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens. alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhaerent, vt in hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses amygdalæ magnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino pota auxiliatur: valet contra regium morbum, & renum, ac vesicæ dolores: decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubentes menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero, & nigro: stomachicis, & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vuluæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus, & præruptis.

a Catecuz addit. $\pi\alpha\iota$ $\pi\iota\upsilon\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\eta$. i. & pota.

I. PÆONIA MAS.

II. PÆONIA FŒMINA.



Pæonia fœmina planta est vulgaris notitia: mas verò contrà, quòd paucis in Italia locis proueniat. Hanc Pisis ad me Goritiam misit hoc anno Lucas Ghinus Forocorneliensis, vir & doctrina, & rei medica cognitione præclarus: sed & eam antea è Germania allatam vidimus Pæoniae historiam, & vires descripsit Plinius lib. 27. cap. 10. his verbis. Glycyfide, quam aliqui Pæoniam aut pëtorobon vocant, caulem habet duum cubitorum comitantibus duobus, aut tribus, subrutulum, cute lauri, folia quali. Isatis pinguiora, rotundioraq; ac minora. Semen in siliquis, aliu. l. grano rubente, aliud nigro. Duo autem genera sunt. Fœmina existimatur, cuius radicibus ceu balani longiores circiter octo aut sex adherent. Mas plures habet, quoniam non vna radice nixus est, palmi altitudine candidaq; ea gustu adstringit. Fœmina folia Myrrham redolent, & densiora sunt: nascuntur in syluis. Tradunt noctu effodiendas, quoniam pico martio impetu in oculis faciente, interdum periculosum sit. Radix verò cum effodiatur, periculum esse, ne sedes precipitent. Magna id vanitate ad ostentationem res situm arbitror. Hæc Plin. in quibus à Dioscoride dissentit, quòd mari plures scripserit esse radices quàm fœminæ, quo sit vt suspicer Plinij lectione vitio haud carere. Pæonia vires posteritatis memoria tradidit Gal. li. 6. simpl. med. vbi ita scriptum reliquit. Glycyfida, quæ pëtorobon, & pæoniã nuncupant, radicem habet leuiter adstringentem cum quadã dulcedine: etsi pluresculi dentibus mandas, acrimoniã item quãpiã subamarã subesse percipies. Proinde menses ciet ex melocrato amygdala pota quãtuor. Sanè tũdere eã oportet, ac cribrare, & sic inspergere. Expurgat porrò etiã iecur obstructũ, & renes. Sed hæc efficere nata est, quæ acris, subamara est: quæ verò quiddã etiã adstrictoriũ obtinet, ventris fluxiones sistere potest. Verum eã tunc in austerorũ vinorũ quopiã decoctã bibere cõuenit. Est autẽ facultate omnino resiccatoriã vehementer, ita vt nõ desperauerim eam etiã ad alligatã q; merito creditum est, puerorum epilepsias sanare. Equidẽ vidi puellum quandoq; octo totis mēsi- bus morbo comitiali liberum, ex eo quo gestabat radicem tẽpore: vbi verò fortè fortuna: quod a collo suspensum erat decidisset, pro-

Pæoniae consideratio. Ex Plinio.

Pæoniae vires ex Gal.

Galeni histo.

* III. PAEONIA FEMINA
flore pleno. *



Peoniae vires
Matthiolo.

Nomina.

Arteri. Hac planta Graecis γλυκυσίδης, & παιονία, Latinis item Paonia nuncupatur. Arabibus, Feonia; Italis, Peonia: Germanis, Peonien: Hispanis, Rosa del monte, & Rosa albardeira: Gallis, Penoesne, & Pinoine.

Peonia authoris nomen retinet, quæ à Peone medico inuenta creditur, quæ in marem & faminam diuiditur: mas folio est nigricante, splendido: femina variat, est folio vtrinque virente & glabro, calyce hirsuto, flore vel simplici eoq; purpureo, vel nigricante, vel pleno: altera folijs infernè albicantibus, nonnihil hirsutis, calyce hirsuto, flore vel purpurascente, vel albo, vel pallido: alia folijs supernè virentibus, glabris, infernè nonnihil virentibus, calyce glabro: alia folijs infernè albicantibus, hirsutis, calyce glabro: est denique pumila folijs in lacinas dissectis pluribus, floreque minore. I. Peonia folio nigricante splendido, siue mas, C. B. Peonia nobilior, Trag. Peonia mas, Matth. Cord. in Diosc. Ges. hort. appe. Lob. Dod. fol. Cast. Cæsal. Taber. Lugdun. Peonia mas folio nucis, Ges. hort. II. Peonia femina. Matth. Lacun. Cast. Cam. Peonia femina prior, Dodo. fol. Lugdun. Peonia promiscua seu neutra, Lobel. Peonia altera vel femina Dioscoridis, Cæsalpino. III. Peonia femina flore pleno, C. B. Peonia femina multiplici flore, Ges. hort. Dod. fol. Peonia femina Polyanthos, Lob. Lugd. Tab. Peonia flore pleno, Lonic. Peonia πολυανθῶν Clus. hist. Pann. Peonia Polyanthos, Camerario.

Λιθόσπερον.

LITHOSPERMUM

CAP. CXLI

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit. Folijs est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus, iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis, & editis locis. Vim hanc habet, vt semine cum vino albo potu calculos frangat, pellatque vrinam.

Lithospermi
confid.

Lithospermon bodie seplasiarij, & omnes ferè medici Barbaros secuti Milium solis nominant. Licet rectius fortasse Mauritiorum quoque imitatione ab illis Milium Soler vocaretur. Quandoquidem hæc plāta (vt scribit Serapio testimonio Aben Iuliel) frequens nascitur in montibus Soler: vnde illi aptius fortè à loco, quam à sole cognomentum imponeretur.

Genera duo.

Huius milij, vt cunque cognominetur, duo ostenduntur genera: maius, quod legitimum est Lithospermon, quoue Hermetius satis refert. a est: prouenit ex oluto solo, & propè sepes. Minus, quod longè frequentius vbiq; in Italia gignitur arido, & sabuloso loco. Hoc humi minimè repit, sed arbuscula ferè instar sursum caules plures mittit brachiatos rotundosq; lignosos, firmos, sesquipedales, in quibus folia sunt vt in maiori oblonga, minora, & firmiora, è quorū exitu semē oritur candidū, pellucidū margarit. crū modo, oblongū tamen, & facie, & quantitate milio simile, quo factum est, vt Milium Soler appellari cepit: sed lapidea ferè duritia. Radices habes tenues, numerosasque. Caterum Fuchsum, Lithospermium Dioscoridi omnibus propè nunc compertum, non cognouisse arbitror, quod in suis clarissimis de stirpium historia commentarijs pro vero Lithospermo, illud quod officinis Milium solis minus appellatur, depinxerit. Idē nihil minus deinde mihi quidem videtur esse

Fuchf. error.

Lithosper. ha
ruadinaceū.

in libro de compositione medicamentorum, quem nuper auctum edidit: vbi scriptis tradidit Lithospermi genus esse plantam illam harundinaceā, ex cuius seminibus quæ nos Lachrymas vocamus, sunt orbiculi quib. filo traictis vntur mulieres ad suam pre-

I. LITHOSPERMUM MAIUS. II. LITHOSPER. MINUS.



III. LITHOSPER. HARUNDINACEUM. *



suas preces numerandas. Hanc autem opinionem quoniam confutauimus in Apologia, quam aduersus Amatum Lusitanum, quem forte secutus est Fuchsius, scripsimus, hic vt satis alibi explosam relinquimus. Lithospermon, vt herbam summa admiratione dignam, eleganter descripsit Plinius lib. 27. ca. 11. cuius hic verba subiiciam. Inter omnes herbas, inquit, Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui egonychon vocant, alij diospyron, alij heracleon. Herba quincuncialis fere, folijs duplo maioribus, quam ruta, ramulis surculosis, crassitudine iunci. Gerit iuxta folia singulas veluti barbulas, & earum in cacuminibus lapillos candore, & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia vero lapidea. Ipsi, qua pediculi adhaereant, caernulas habent, & intus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquam inter herbas maiore quidem miraculo conspexi. Tantis est decor, velut aurificam arte alternis inter folia candicantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Iacere atque humi serpere auctores tradunt. Ego vulsam, non haren-

Lithospermi hist. ex Plin.

Lithosp. vires

Nomina



officinis. Miliun solis: Graecis λιθόσπερμον μικρόν: Italis, Lithospermo minore, Miglio saluatico, seu Miliun solis: Germanis, Klein Meerhirschen oder Steinsamen.

Lithospermum maius est, minus, & minimum: illud, vel folijs oleæ, vel arundinaceis: minus vel latifolium, vel angustifolium: minimum passerina dictum, quod vel Germanicum, vel Monspeliacum. I. Lithospermum maius Matth. Lacun. Cast. Lugdunensi. II. Lithospermum maius erectum, C. B. Miliun solis latium, Trag. Lithospermum minus, Matth. Dodonæo gal. Gesnero de hort. Lacun. Lob.

Lob. Castor. Lugd. Lithospermum, Fuchf. fol. Cord. in Diosc. & hist. Lonic. Lugd. Lithospermum facinum
Fuchf. icon. Lithospermum legitimum, Clus. lusto. Pann. Lithospermum alterum fruticosum, Thal. Litho-
spermum aruense, Tab. Lithospermum vulgare minus, Cam. Saxifraga tertia, Brunf. III. Lithosper-
mum harundinaceum, C. B. (an Dioscoridis & Plinij) Lugd. Lithospermum maius, Trag. Gesl. hor. Arua-
do lithospermos, & Lachryma Christi, Trag. Gesl. hort. Lithospermum fruticosum, Eidem. Lachryma,
Matth. Cæs. Lachryma Iobi, Clus. hist. Hisp. Dod. fol. Lob. Cast. Cam. Lachryma Iodoci, Gesl. hort. app.

* IV. LITHOSPERMUM frutescens angustifolium.*

* V. LITHOSPER. ARVENSE radice rubra.*



IV. Lithospermum frutescens angusto folio, C. B. Hoc radice est crassa, lignosa repente, ruffo & rugoso
cortice recta, à qua statim rami palmares, rarius sesquipalmares, lignosi, crassi, qui mox in alios lignosos
brachiantur, qui rigidi, fragiles, & hirsutie asperi: quos folia dura hispida, oblonga, angusta inordinate dis-
posita cingunt, per quæ nervus medius elatus fertur: flores ramulorum summis insident, aliquando inter
folia & cauliculos, ex pediculis hirsutis predeunt, oblongi, angusti, eleganter cœrulei, albi, aliquando ru-
bentes: quibus succedunt semina, communiter bina iuncta, oblonga, acuminata, alba & dura: Monspelu-
li prouenit. V. Lithospermum aruense radice rubra, C. B. Lithospermum syluestre, Trag. Fuchf. Dodo-
gal. Cam in Marthiolo. Lithospermum tertium, Dod. fol. Lithospermum nigrum, Lugd. Anchusa dege-
ner facie milij solis, Lob. Anchusa tertia Lithospermo similis, Cæs. Anchusa aruenis minor facie milij
solis, Tab. Hoc ex radice rubente succosa, caules cubitales asperos emittit, qui in alios tenues & asperos
brachiantur: folia habet subnigra Milij solis, sed minora, nec ita dura, at aspera, inordinate disposita: flores
ramulorum summis albi, parui, milij solis forma, quinquefolij, insident: quibus succedunt semina nigra,
terna vel quaterna in pericarpio iuncta, forma seminum Echij aut Buglossæ. In agris inter segetes frequis.

Conclusa nō legit Orib. a Orib. legit. ισχυρότερα. i. validiores. b Orib. addit τῆς γούσπερας τὰ φύλλα δὲ ὁμοία τοῖς τῆς ζουσί. i. gu- f. & folia et iam fert zea similia. Phalaridis cōsid. utio. Phalaridis vires ex Gal. Ex Plinio.

Nomina.

Φάλαρις

PHALARIS.

CAP. CXLII.

PHalaris cauliculos emittit zea culmis similes, a minutis, ac nullius vsus radicibus, multos, [duum pal-
morum] geniculis cinctos a graciliores tamen, ac dulces b: semen candidum, oblongum, milij magni-
tudine. Tunditur & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissime bibitur. Semen cochlearis men-
sura potum, ad eadem efficax est.


PHalarim genuinam referre hanc plantam, cuius hic imaginem excudi curauimus, quin credam nihil est quod prohibe-
at. Si quidem calamos emittit zea semen in spicatis capitibus usque oblongis, candidum oblongum milio simile. Quin-
etiam radicibus nititur minutis, & superuacuis. Phalaridis meminit Galenus libro octauo de simplicium medicamento-
rum facultatibus his verbis. Phalaridis herba tum semen, tum succus, tum folia potu auxiliari creduntur vesicae doloribus
ceu in se habeant quidpiam tenuium partium, & calidum. Scripsit de eadem & Plinius libro 27. cap. 12. sic inquit: Pha-
laris thyrsus habet longum, tenuem ceu calamum, in summo florem inclinatum, semē simile sesamæ: Et hoc calculus pra-
git, potum ex vino, vel aceto, & melle, & lacte. Idem & vitia vesicae sanat. Hec ille. Phalaris, Græcis, Φάλαρις, Italis Falari.

Phalaris, Matth. Dod. gal. & fol. Cord. in Dioscorid. & hist. Gesl. hort. Lac. Lonic. Lobel. Cast. Lugd. Cæs. Tab. (cui & Græthen Canariense) Camecario.

Et pulpid. an.

PHALARIS.

Ἐρυθρόδανον RVBIA. CAP. CXLIII.



ERythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lanae. Vna spontè provenit: altera seritur, ut in [Thebaena Galliae.] & Rauenna Italiae: [in Caria] inter oleas, & in aruis, solo creditur. Hanc non sine quaestu ferunt: namque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules, & quadranguli, longi, aparinæ non dissimiles, robustiores, & multò profus maiores: folijs per interualla circum articulos, stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubram, postea cum ematuruit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsâ: item ischiadicis, & reholutis. Crassam, copiosamque vrinam pellit, nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauare oportet, [& excrementorum quæ redduntur differentiam spectare.] Aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs vino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasque, albæ vitiligini illita ex aceto medetur.

Conclusa in meo exēplari delunt.



Rubia, quam Græci Erythrodanum dicunt, duum est generum, alterum Agreste, & spontè nascens: syluestribus locis, secus itinera, in frutetu & propter sepes. Caules & folia minorâ longè spectantur quàm domestica & minus quoque aspera. Radix etiam illi est non adèd rufa, multifida tenuisque. Eius vires longè imbecilliores sunt quàm domestica. Alterum domesticum folijs maioribus, & longioribus, crassioribusque caulibus. Hætrusis Rubia nullis non cognita: vbi domestica etiam spontè nascitur circa itinera, sepes & fruteta. Seritur quibus-

Rubia duplex

dam in locis in campis, neque medicis solum, ac seplasiarijs cognoscitur: sed etiam mulierculis, ac rusticis, ijs præsertim, qui in locis habitant, vbi lanificio opera impenditur: quandoquidem inficiendus tingendique lanis aptissima est. Quapropter rustici, & agrestes mulieres, quod lanarum infectores Rubia quotannis plurimum emant, huius

I. RVBIA SATIVA.

II. RVBIA SYLVESTRIS.




kkk radices

radices effodiunt, & vendunt, vnde tantum quæstus faciunt, vt sibi suisq; victum suppeditent. Mittit hanc abunde Herria, præcipue Senensis ager. Expetuntur folia nostratibus mulieribus, quod asperima sint, ad stannea vasa detergenda: siquidem mirum dictu quam pulcherrime nitecant, qua Rubiam fuerint experta. De ea autem differens Plinius li. 19. ca. 3. In primis, inquit, Rubia tingendis lanis, & corijs necessaria. Laudatissima Italica, & maxime suburbana, & omnes penè prouinciæ sicut ea. Sponte prouenit, feriturg; similitudine erulia: Verum spinosus ei caulis, geniculatusq; hic est, quæ circa articulos in orbe folijs. Semen eius rubrum est. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adligatus spectetur tantum. Rubia meminit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, vbi sic scribit: Est autem Rubia tinctorum radix acerba, & gustu amara. Itaque quacumq; agere dictum est superiore libro, vbi in vnum eiusmodi conuertit facultates, ea omnia in hac radice luculenter conspiciet. Quippe cum & lienem, & iecur expurget, & vrinas crassas, multasq; ac nonnunquam etiam sanguinolentas vacuet. Quin & menses ciet, ac mediocriter qua extersionem postulant, extergit: prouide vitiligines albas cum aceto illita tuat: sunt qui eam ischiadicis, hoc est, coxendicum doloribus afflicti, & resoluti, in potu cum melicrato exhibeant. Id ἐρυθρόδανον Græcè dicitur, quod Erythrodanum, & Rubia Latine: Pauer, Fae alfabagin, Arabicè: Erythrodano, & Robia, Italice: Serbertò, Germanicè. Ruina, Hispanicè: Garance, Gallicè. Rubia glabru, Græcè ἐρυθρόδανον ἀγροίτης, Robia saluatica.

Nomina.

Rubia alia satiuia est, alia syluestris: hæc q; maior, vel minor: maior, vel campestris, vel maritima: hæcque vel spicata, vel non spicata: minor, vel montana, vel aruenfis. I. Rubia satiuia, Brunf. Matth. Trag. Fuc. Dod. gal. Gef. hort. Lac. Lon. Cast. Lugd. Rubia & Rubea tinctorum. Cord. in Diosc. Cæsal. Rubia maior: Lob. Erythrodanum, Gef. hor. Cam. Thapsia Asclepiadis, Anguillare. II. Rubia syluestris, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hor. Lac. Lob. Lon. Cast. Tab. Lugd. Cam. Rubia erratica, Trag. Mollugo prima, Dodo. fol. Lappago Plinij & Aparine læuis Cæsalpino. III. Rubia maritima, C. B. Rubia marina Narbonensium, Aduers. Lob. Rubia marina, Clus. hist. Hisp. Dod. fol. Tab. Erythrodanum marinum, Lugd. Crucialis maritima, Cæsalpino. Ex radice pedem longa, crassa, dura, arida, rubra, Anchusæ colore, caules quadranguli palmares, geniculati, lignosi, inclinati prodeunt, ad quorum genicula folia vt plurimum quaternaria, albicantia, mucronata, rigidiuscula, stellæ modo adnascuntur, quorum medio minora folia conglomerata infident, ex quorum medio flosculi oblongi, ex herbido lutei, aut pallidi prodeunt. In litore Veneto, & ad litus maris Mediterranei, non longè Monspelio, collegimus.

* III. RUBIA MARITIMA. *



Cœclusa Cat. exemplar nō habet, sed meū habet, & pro sitientibus leg. ἐρυθρόδανον i. humectis.

Cruas...
Sicut

Λονχίτις. LONCHITIS. CAP. CXLIII.

Lonchitis folia habet porri, latiora rubetia, plurima, ad radicē circūfracta, veluti in terrā procumbentia, pauca in caule: in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen in uolucris clausum lanceæ simile, triangulum: vnde sibi cognomentum arrogauit: radix dauci. [Nascitur in sitientibus & asperis.] Radix ex vino pota vrinam ciet.

Λονχίτις ἑτέρα. LONCHITIS ALTERA. CAP. CXLV.

Alterata est Lonchitis, quam aliqui asperam lonchitim dicunt: folia scolopendrij emitit, sed asperiora, maioraque ac multò magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absunit.

Lonchitis cōsideratio. **E**tsi in compluribus Italia, ac Germania montibus, alijsque asperis, & aridis locis, diu multumque perquisierim primum Lonchitidis genus, ipsum tamen hæcenus mihi non licuit reperire, neque etiam ab alijs inuentum videre. Ceterum aspera lonchitis, de qua cum Bartholomæo à Maranta Venusino iam dudum mihi longa fuit contentio, folio est Scolopendrij proximo, longiore tamē, ac magis diuiso, & ad polypodij faciē potius accedente, spithama longitudine, vtrinq; distans, incisuris dissecto, tenuibus, aculeatisq; denticulis serrato & vbiq; aspero, vnde illi nomen. Cautem nullum profert, neque flores, neque semen, quemadmodum polypodium & asplenium, quorum imaginem refert. Radice nititur multiplici, tenui, subrubicante perinde ac in Phylliti. In Italia quibusdam tantum nascitur locis ijsq; humectis, opacis ac vliginosis: sed alibi nusquam à me visa est. Duo eius vidimus genera. Maius q; ad me primū misit vir clarissimus Lucas Ghinus: & minus, quo dimitiora, tenuiora, angustiora, que folia promit, & magis Polypodio similia, hirsuta & aspera. Nascitur in opacis, & frutetis, vliginoso solo, quod à Iacobo Antonio Cortuso Patauino sum consequutus, in quo nihil desiderari potest. Est quoque altera planta, quam Maranta asperam Lonchitim esse legitimam contendebat, quam nos PSEVDOLONCHITIM vocamus, cum iam Maranta ipsius sententia opinione à nobis aded firmis rationibus sit explosa, vt nihil prorsus illi sit arguementi reliquum, quo se tueri possit. Qui rem omnem audire cupiunt legant Epistolas nostras medicinales. De prima Lonchitide differuit Plinius libro 25. cap. 11. vbi sic inquit: Lonchitis non, vt pleriq; existimarunt, eadem est, que xyphion, aut phalga-

Lonch. aspera maior.



Lonchit. duo genera.

Pseudolonchitis.


Lonchi. Plin.

I. LONCHI. ASPERA MAIOR.

II. LONCHI. ASPERA MINOR.



III. PSEVDOLONCH. ASPERA.



phasgation, quanquam cuspidi similis semine. Habet enim fo-
lia porri rubentia ad radicem, & plura quam in caule, capitu-
la personis comicis similia, parvam exerentibus linguam, radi-
cibus prelongis: nascitur in sitientibus. Hactenus Plinius, qui
horum pleraque a Dioscoride mutuatus est. Lonchitidis vtrius-
que meminit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum,
vbi de earum viribus ita scribit: Lonchitis, eius videlicet, qua
semen habet triangulare, figura lanceae simile, radix potissi-
mum quodammodo similis est radici dauci: promde vrinam
ciat. Porro eius, qua scolopendria similia habet folia, ea ad
glutinanda vulnera idonea sunt viridia: sed sicca cum aceto
pota, lienes induratos sanant. Λονχίτις τραχηία vt Græcis, ita
etiam Lonchitis aspera Latinis, & Lonchite aspera Italis voca-
tur. Pseudolonchitis aspera, Italis, Lonchite aspera falsa.

Lonchitidis
vires ex Gal.

I. Lonchitis aspera maior, Matth. Cam. Lugdun.
Lonchitis altera, Cord. in Dioscorid. Gesnerus hort.
appen. Lacun. Lon. Cast. Lonchitis altera mas, Tab. II.
Lonchitis aspera minor, Matth. Lugdun. Cam. Asple-
num sylvestre, Trag. Lug. Lonchitis aspera Dod. gal. &
fol. Lugd. Thal. Lonchitis altera Dioscoridis, Gesner.
in Fracto, Lob. Lonchitis altera femina, Tabe. Scolo-
pendrium maius Lonic. Struthiopteris, Cord. in hist.
quo ad iconem additam, vbi tamen Cordus longè a-
liam intelligit. III. Pseudolonchitis aspera, Matt. Lug.
Lonchitis Maranthæ & Ceterach ramosum quorun-
dam, Lob. Lonchitis aspera Iluensis, Lugd. Lonchitis
adulterina, Tab. Ceterach genus in Ilua nascens. Cæs.
Filiculæ genus quæ Lonchitis altera Maranthæ, Clu-
sio hist. Pannonica.

Althæa.

ALTHÆA.

CAP. CXLVI.

Althæa, quam alij Ibisum vocant, in sylvestrium maluarū genere est, cui folia vt cyclamino rotunda,
lanugine canescunt: flore rosaceo † bicubitali caul. radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quòd
inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua multa, & per se cū im-
ponitur rufa, efficax est cōtra vulnera: itē ad strumas, parotidas, abscessus, mammarū inflāmationes, fracta
ledis. inflationes, neruorū rigores: siquidē discutit, & excoquit: rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta,
vt dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, vt malagmaris lentor fiat, facit ad vuluē in tem.



Meum vō
rō exemplar
leg. πικρι-
vov. i. cubita
in tem.

Kkk a flamma-

flammationes, præclusionesq; in pefsis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vultus, reliqui
asq; à partu extrahit. Decoctæ radicis succus ex vino potus, succurrit vrinæ difficultati, calculosorum cra-
ditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentiû mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto ir-
de ore. Viride semen ficcumq; tritum vitiligines in sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cum oleo
& aceto peruncti, à venenatis nõ feriuntur: valet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; pro-
fluuium. In posca aut vino decoctum, bibitur contra omnes vesparum, apum, similiumque aculeatos i-
ctus. Folia cum olei momento, morfibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita,
sub diuo addensari.

I. ALTHAEA.

II. ALTH. ALTE. SIVE ABUTIL. AVIC.



Althææ con-
sideratio.

Maluaniscû.
Ex Theophr.

Abutilon
mentio.

Althææ vites
ex Galeno.

Nomina.

Althæa à Latinis posset Medica simpliciter dici, quoniam ab ἀλθαία, quod Græcis mederi significat, etymon habere vi-
detur. Quocirca merito scriptum reliquit Dioscorides, Althæam id nomen traxisse à multitudine medicum, & fre-
quenti eius usu. Ea vulgaris herba est, nulliq; non cognita. Nascitur in campestribus, humecto solo. Latini hanc Ibis (cum no-
minant. Italis verò, corrupta à Latinis appellatione, & præposita malua, quod cum ea quâdam habeat cognationem, com-
posito nomine Maluanisco vulgò vocatur. Althæam memoria prodidit Theophrastus lib. 9. cap. 19. de plantarum historia, v-
bi de ea differit ijs verbis. Et radicem Ibis aquam posse addensare aiunt, si tritam inieceris, sub diuoq; humorem posuerit.
Constat Ibis folio malua maiori, pilosioriq; caule molli: flore luteo: radice nervosa, alba: fructu malua: caulis quoq; gustu
maluam reddit: Vsus eius ad rupta, & tusses è vino dulci, & ad vlcera in oleo. Aliam quandam si carnibus concoquas, in-
dem aggregare, ac veluti cõglutinare posse affirmant: alias vim attractoriam possidere, modo magnetis lapidis, atq; succini:
hæc in inanimatis: hæcenus Theophrastus. At ego flore luteo me nunquam Althæam vidisse recordor. Roseo flore facit eam
Dioscorides, verum coloris non meminit. Est & planta, quam quidam Althæam alteram Theophrasti, quidam verò AB-
UTILON Avicennæ esse censent. Folia habet cucurbita, minora, tactu leuia, sed tenuissima obducta lanugine, caulem edit ses-
quicubitalem, & aliquando maiorem: flores in toto caule aureos, è quibus semen oritur nigrum. Radice nititur longa fibre-
saq;. Nascitur in campestribus, ac etiam spontè in hortis. Atqui nos neq; his, neq; illis subscribimus, cum neq; vni, neq; alteri
(quantum mea fert opinio) correspondeat. Verum non obid prætermittere libuit, quin eius hic imaginem adderemus, ut et-
iam aliorum iudicium esse posset, & ut eius quoq; innotescat facultas. Siquidem experimento constat semine epoto sesqui-
drachma pondere ex vino, calculos in renibus frangi educiq; arenas pelli, vrinæ eici, & dolores finire. Meminit Ibis Galie-
nus libro 6. simplicium medicamentorum, vbi eius vires ita descripsit. Ebiscus, siue althæa (est autè malua agrestis) facultate-
tem habet digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi difficilia coctu tubercula. Radix porò em-
& semen cetera quidem similiter agunt, vt herba viridis, sed tenuiorum partium, magisq; exicatoriam, ad hæc magis ex-
terforiam quam illa facultatem ostendunt, vt & vitiligines detergant, & semen renum calculos confringat. Radix verò è
decoctum dysenteria, alui profluuiio, & sanguinis reiectioni vtile est, nempe cum adstringentem quandam facultatem possi-
deat. Planta quæ Græcis ἀλθαία, ἰβίσκος & ἑβίσκος, Latinis Althæa, Ibis, seu Ebiscus nominatur: Mauritanis, Chami,
Chathmi, siue Chathmie, & Rosa Laueni: Italis, Maluanisco. Germanis, Ibis, vñnd Heystwurf: Hispanis, Hierua can-
namera, & Marmæ: Gallis, Guimauues. Althæa altera, quibusdam Abutilon vocatur: Italis, Maluanisco bastardo.

I. Althæa, Matth. Brunf. Trag. Fuch. Dodo. gal. & fol. Cord. in Dios. Gef. hort. (cui & Ibis) Lacun.
Lon. Lob. (cui & Anadendromalache Galeni) Cast. Lug. Tab. cui & Bismalua. Althæa seu Malua palustris,
Cor. in hist. Althæa vulgaris, Clu. hist. Pan. Thal. Cam. Malua agrestis genus, Gef. hor. Malua syl. prima. &
Vulmalua, quasi malua viscida, Cæsalp. II. Althæa Theophrasti flore luteo, C. B. Althæa altera, Matth.
Lugd.

Lugd. Ibis Theophrasti, Dod. gal. Althæa luteis floribus, Lob. Albutilon Auicennæ, Ges. hort. Abutilon, Anguil. Dod. fol. Cam. Abutilum, Cast. Malua Theophrasti, Ges. hort. Tab. Althæa Theophrasti, Ges. hort. Czfal. Lugdunensi.

Ἀλκία.

ALCEA.

CAP. CXLVII.

Alcea syluestrium maluarum generi assignatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxima: caules tres aut quatuor, cortice cannabino vestitos, florem rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex cum plurimum cubitales. Quæ cum vino, aut aqua potæ; dysentericis, ruptisque medentur.

ALCEA.



Alceam hodie passim ferè in Italia aliqui Bismaliam, alij Maluam syluestrem, nonnulli etiam Maluauiscum agreste nominant. Herba est caule, floribus, ac semine hortensii [syluestri] malua perquam similis, sed folijs longiori incisura laciniatis, rannunculi modo. Caules edit tres, aut quatuor, cannabino cortice vestitos: flores malua, tum facie, tum colore similes, pauloq; maiores, quemadmodum & semen. Radicem longam, latam, albam ac multifidam, malua similem, sed lignosam intus matricem. Nasctur in incultis, campestribus, & agrorum scrobium, & marginibus, iuxta sepes, vias, ac semitas. Alcea radicibus non desunt, qui althæa loco vtantur, cum huius copiam non habeant, ad tumores tum soluendos, tum emolliendos. Alcea historiam scribit Plinius libro 27. cap. 4. in qua aded cum Dioscoride concordat, vt ex eo historiam totam transcripsisse videatur: Peculiariter autem Alceam pratulit ad spasticos, tremulos, & Opisthotonos, vbi eius radix ex malsa propinetur: quinetiam impositam ad collectiones discutiendas commendauit. Porro Alcea peculiari capite meminisse Galenum non reperi, nisi hanc syluestrem maluam appellauerit, dum malua facultates lib. 7. simplicium medicamentorum describit, his verbis. Malua syluestris quidem digerentis paululum, & emollientis leniter est facultatis. Hortensis verdò quanto plus habet aquea humiditatis, tanto facultate imbecillior. Fructus eius tanto validior est, quanto & sicciior: hac Galenus. Ceterum Paulus seorsum Alceam retulit lib. 7. vbi sic inquit. Alcea syluestri malua genus est. In vino pota dysenteria, & erosio- nibus medetur, potissimum eius radix. Huic herba nomen Grecum, Ἀλκία: Latinum, Alcea: Barbaris, Bismalua: Italicum, Bismalua, Malua saluatica, Maluauisco saluatico, & Buon vischo: Germanicum, Sigmarß Kraut: Hispanicum, Malua de Vngria, & Malua montesina: Gallicum Bimauue.

Alcea consideratio.

Ex Plinio

Alceæ vires ex Paulo.

Nomina.

40 **g**aris maior, C. B. Alcea, Brunf. (cui & herba Simeonis) Matth. Trag. Fuch. (cui & Maluæ rosæ syluestre genus) Dod. gal. Cord. in Diosc. Ges. hort. Lac. Lon. Cast. Lugd. Czfal. Tab. Alcea vulgaris, Lob. Dodo. fol. Lugd. Cam. Maluæ agrestis genus, Ges. de hortis.

Κάνναβις.

CANNABIS.

CAP. CXLVIII.

Cannabis satiuæ, planta magni in vita vsus, ad robustissimos funes factitandos: folijs fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo: quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium doloribus instillatur. Syluestris cannabis, virgas fert althæa similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquant: folio satiuæ, nigriore, & asperiore. flore lychnidis, subrubro: semine, & radice althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.


Cannabis satiuæ planta est aded vulgaris notitia apud omnes Europa nationes, vt omnino superuacuum sit eius faciem verbis representare. Quæ etsi vulgaris admodum sit planta, est tamen magni in hominum vita vsus, non solum ad robustissimos funes parandos, quibus in fabricis magnis ad sustinenda, trahendaq; ingentia pondera, & nauigia regenda vtimur, sed etiam ad lintea constanda, e quibus infima plebecula indumenta, aliaque multa sibi parat. Inuisa tamen furibus & latronibus, quod cannabis tanta aduersus eos sit facultas, vt non solum huic planta adalligati suar ipsorum malefacta detegant, & ore proprio patefaciant, sed quod etiam subinde sinanche cannabina affecti, succocentur penduli. Ea simpliciter adolescit caule, sed in marem & feminam distinguitur. Mas plures e caule fundit ramos, arbuicula speciem referens, aded vt non desunt, qui e stipite carbones faciant, ad bombardarum puluerem parandum. Femina longè tenuiores caules edit, nullis ramis brachiatis, nulloque semine proliscat: folia vtrisque fraxini, sed minora, & graciliora, sensimque serrata, atque in mari maiora spectantur, & nigriora, quina, senaue ex vno pediculo prodeuntia. Radice nititur vnica sed multifida & fibrosa. Semen tantum in mari gignitur, rotundum, cinereo colore, cuius medulla dulcis est, & alba. Syluestrem autem, quanquam a multis in Italia prouenire dicatur, paucos tamen esse puto, qui legitimum ostendant. Mibi certè hætenus legitimam videre non licuit. Ceterum satiuæ semen in cibo sumptum plane contrarium efficit in gallinis, & in nobis: siquidem largius commanducatum nobis genituram extinguit, gallinas verdò ouiferiores reddit. Experientia enim compertum habeo, gallinas, quæ hyeme, quo tempore algoris sæuitia raro oua parere solent, Cannabis semine vescuntur, numerosiore ouorum partu gaudere: id quod frequenti cantu suo declinant. Illud præterea mihi non abierit inditum, quod Cannabis recentis decoctum, expressa deinde fortiter herba, terrestrium lumbricorum cauernulis inspersum, statim eos euocat. Quod piscatoribus acceptum referendum est, qui hoc ingenia verum: alios capiunt suis hamis insigedos. Verum non

Cannabis consideratio.

Cannabis mas & femina.

Cannabis vires ex Matth.

CANNABIS.



Cannabis vi-
tes ex Gal.

Tragema
quid.

Mulierum
error.

Nomina.

tiali morbo laborantibus Cannabini seminis decoctum exhibent, quo tantum abest, ut morbum curent, ut etiam eius en-
gen. si occasionem praebeant. Quae planta *κάνναβις* Graecè, Cannabis item Latine dicitur: Arabicè, *Sebedeneji*, & *Canab:*
italicè, *Canape*: Germanicè, *Zamer Hanff*: Hispanicè, *Canhamo*: Gallicè, *Chanure*.

Cannabis sativa est & sylvestris: sativa, mas, & femina. Cannabis, Brunf. Matth. Lacun. Lon. Lob.
Cast. Cæsal. Tab. Cannabis maior, Trag. Cannabis sativa, Fuchf. Cord. in Diosc. Cannabis mas, Dodo gal.
Lugd. Cannabis secunda, Dod. in folio.

Ανάγυρις.

ANAGYRIS.

CAP. CXLIX.

A Nagyris frutex est arboris instar, perquam grauis odore: folijs viticis, virgisque: flore brassicæ: semen
in corniculis non breuibus gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod du-
rescit vna maturescente. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si partus hæreat & secundæ, menses-
que morentur, drachmæ pondere bibuntur in passio: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in
vino: difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis,
discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet.

Anagyris con-
sideratio.

Eghelo.

Gesneri opi-
nio reproba-
ta.

Laburni men-
tio.

Quamuis veteres vnius tantum Anagyris meminerint, duo tamen in Italia visuntur genera. Maius in Apulia frequen-
tissimum nascitur, & eo Campania tractu, quo Terracina itur Fundum ad Tyrrheni litus: folijs vitici proximo, flo-
re brassicæ racemoso: fructu hortensi similaci simili, amplioribus tamen & breuioribus paulo, siliquis incluso, colore purpura-
scente, usque adeo duro, ut aqua macerato, sua in pertinaci duritie consistat. Minus, quod rura Tridentina vulgò vocant E-
ghelo, Maio & Iunio mensibus grato in montibus spectaculo floret. Folia prodeunt ex vno pediculo terna, oblonga, in cac-
mine mucronata, viridia, lauiusq; trifolij latiora. Micat aureo flore, alteri omnino simili, racematim dependente, odore ta-
men ingrato. Hinc cornicula prodeunt genista amula: in quibus semen continetur eiusdem genista magnitudine, sed oblon-
gum, phaseoli modo, colore subnigro. Quod comedentes quandoque ignari pastores, veluti legumina, crebris adeo vomitio-
nibus afficiuntur, ut nonnunquam viderim ego quosdam, qui sanguinem usque euomuerunt. Materies ligni durissima, qua
guaiaci modo exterius lutea est, interius verò nigra. Incorrupta diu durat: proinde vinitores ex Anagryi palos faciunt su-
stinentis vitibus aptissimos, hosque cateris præferunt ex alijs arboribus factis. Quin & sagittarij ex ea validissimos arcus
conficiunt. Hac planta oritur in syluis montium, scater vallis Anania, ac vniuersus Tridentinus ager. Caterum non desunt e-
recentioribus herbarijs haud obscuri nominis (quorum opinionem tuctur Conradus Gesnerus Tigurinus vir magna lectione
in suo libro animalibus dicato) qui putant, ac potius pro certo affirmant, alterum Anagryi genus, quod in montibus Tri-
dentinis vulgari sermone Eghelo appellari supra diximus, eam sine controuersia arborem esse, quam Plin. libro 16. capite 18. La-
burnum vocat, vbi ita scribit. Aquas odere cupressi, iuglandes, castaneæ, laburnum. Alpina & hac arbor, nec vulgò nota:
dura ac candida materie: cuius florem cubitalem longitudine apes non attingunt. Ex ijs Plinij verbis abunde, nisi faller,
cognoscitur, quod ut falsa, reprobanda sit illorum opinio. Siquidem Laburni materies à Plinio candida describitur: non
contra medullis nigra, corticetenus lutea, in modum Guaiaci, qualis Egheli vocata materies planè cernitur. Præterea Eg-
helus arbor est omnibus ferè cognita, quod frequentissima in syluis reperitur: non ea quidem vulgò incognita, ut de Labur-
no refert Plinius. Ad hac Egheli flores, qui in arbore racemorum instar pendent, palmi longitudinem non excedunt: quos
tamen Laburno Plinius cubitales reddidit. Illud insuper experientia compertum habeo (et si contrarium asserat Gesnerus)
quod a-

I. ANAGYRIS.

II. ANAGYRIS ALTERA.



quod Apes Egheli flores attingunt, nec eos aspernantur. Hec nimirum sunt, quæ, meo quidem iudicio, resagantur tum Ges-
 nero, tum omnibus us, qui cum eo hac in re sentiunt: quin etiam ostendunt, quam magna sit differentia inter Laburnum
 & Eghelum. Hanc tamen plantã idem Gesnerus montani cytisi genus esse censet, argumento quod folia ferat terna veluti
 cytisi, quodq; cytisi modo sit apibus ingrata. Sed us (pace viri eruditi dixerim) in hoc maxime hallucinatus deprehenditur,
 Marci Varronis, Columella, & Plinij testimonio: vt qui inter cetera seri iubeant iuxta aluearia cytisum, quod huius flore
 magnopere delectentur & alliciantur apes. Hoc similiter testatur Galenus lib. 1. de antidotis, vbi cytisi historiam & vires
 decribit. Et miror certè, Gesnerum illa non vidisse, quæ tamen debuerat, si omnes, qui extant in Europa, libros perlegit, vt
 perlegisse conicitur ex Bibliotheca, quam edidit. Quare equidem non possum non in ea perflare sententia, quam iam pridè
 habui de planta Eghelo vocata, cum nulla sit firma ratio, quæ me cogat illorũ subscribere iudicio, qui eam Laburnum Plinij
 esse existimant. Quantũ igitur ego sentio, Eghelus erit Anagyris minor, aut Anagyris montana, si ita nobis liceat eam no-
 minare. Namque non solum foliis, floribus, corniculis, semine & omnibus denique notis Anagyrim prorsus emulatur, vt e-
 ius effigies, quam hic damus, pulchrè demonstrat: sed etiam viribus & odore, vt pote qui in tota planta teter & grauis ad-
 modum sentitur. Anagyris vires memoria prodidit Gal. lib. 6. simpl. med. his verbis. Anagyris frutex est grauis olens, &
 acribus, & exsiccans, & facultatis. Sed folia etiamnum videntur, cum propter humiditatis admistionẽ minus sint
 acris, & tumentia reprimunt. At siccata incidentis sunt exsiccantisq; valenter facultatis. Similem ferè facultatẽ ha-
 bet radice eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium: sed & vomitum prouocat. Planta quæ ἀνάγρις, Gra-
 cu, Anagyris etiam Latinis dicitur: Anagiri, & Faua inuersa, Italis. Anagyris altera siue minor, Græcis ἀνάγρις ἡ μικρά:
 Italis, Anagiri minore.

Gesnerus at-
guitur.

Anagyris mi-
nor.

Anagyris vi-
res ex Gal.

Nomina

I. Anagyris folio fœtido, C. B. Ges. hor. Anagyris prima, Matth. Tab. Cam. Anagyris maior, eid. edit. I-
 talica. Anagyris, Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. & hist. Lon. Cæs. Lugd. cui & Nautea Plauti propter fœti-
 dũ odorẽ. Anagyris vera, Clus. hist. Hisp. Anagyris fœtida arborescens, Lob. II. Anagyris altera, Matt. Lac.
 Tab. Cam. Anagyris minor Matt. edit. Italica: Anagyris, Ges. hor. Faba inuersa, Trag. Lon. Laburnũ. Dod.
 gal. Cæs. cui & Alpina arbor quæ aquas odit Plinij. Laburnum alterum, Lugd. Eghelo, Dod. fol. Anagy-
 ris minus fœtens, vel Laburnum, Lob. Aburnium Plinij, Anguillaræ.

Κεραία

CEPÆA.

CAP. CL.

Cepæa portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota vrinæ stil-
 licidio, & vesicæ scabie laborantibus opitulatur: maxime id præstat, si cum decocto radicem aspa-
 ragi eius, quem myacanthon, hoc est, corrudam vocant, bibatur.

Cepæam, quam antea in nostris commentariis Italica lingua conscriptis, ingenuè confessus eram me nondũ comperisse,
 aut ab aliis compertam vidisse, hoc tempore Venetiis ad me misit Ioannes Odoricus Melchiorius Tridentinus me-
 dicum pro arate sua non imperitus, rei q; herbaria non ignarus, mei ad eò studiosus, vt si aliud non esset, hoc nomine tantũ
 mihi plurimum diligendus sit, atque etiam in filium habendus. Nascitur in incultis locis. Ad Cepæam hanc redeo. Ea sanè
 mihi visa est ita ad amussim Diosc. descriptioni respondere (id quod eius pictura, quam hic damus, graphice ostendit) vt non
 dubitandum putem, quoniam hac sit vera ac legitima Cepæa. Huius quod equidem legerim, Gal. non meminit in simpl. censu.
 Veruntamen Paulus eius mentionem fecit li. 7. inter simplicia, vbi eam retulit his verbis. Cepæa portulacæ similis est. Folia
 ipsius contra vesicæ scabies vtiliter bibuntur. Radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, Corrudã appellant, pota,
 Kkk

Cepæa con-
sideratio.

Respondens & scribitis tractatũ d.
est Cepæam esse berberisgam

Cepæa vires
ex Paulus

vina

Nomina.

CEPÆA.

vrina stillicidia, qua ex obstructione sunt, abigit. Κορυμβία ἢ Græcis, ita Cepæa Latinis, & Cepea Italus appellatur.

Cepæa, Matth. Lac. Lon. quoad iconem, Lob. Call. Cæfalp. Lugd. Tabernæmontano.

Ἄλισμα. ALISMA. CAP. CLI.

Alisma, alij Damasonion appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, † laciniola, conuexaq; in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, [palescente: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acrib⁹, odoratis, modice pinguibus:] aquosos amat tractus. Radix, si drachma vna, aut altera bibatur, his cōuenit a, qui leporem marinum deuorarūt, aut à rubetis ranis demorsū sunt, aut opium hauserunt: torminibus, atque dysenteria, per se, aut cum pari modo b feminis dauci, potui datur, conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Quoniam affirmat Ruellius, cui etiam Fuchsius subscribere videtur, Alisma sibi cognitum esse, vocariq; a nonnullis Pastorem fistulam, à quibusdam vero Plantaginem aquaticam, tamen plantago hac, quam etiam aliqui Barbam sylvaniam appellant, nullis notis cum Alismate conuenire deprehenditur. Siquidem Alisma folia fert plantagini similia, sed angustiora, & in terram reflexa: caulem mittit simplicē, ac tenuem. Plantago autem aquatica foliis prodit plantagine maioribus, lancearum cuspidum instar acuminatis, sursumq; spectantibus: multiplici caule, adnatis pluribus referto. Cum itaq; ex iis notis collatis cōstet, Alisma, & Barbam sylvaniam inter se plurimum differre, non temerè facere videor, quod illorum sententia non ausim adstipulari. Porro plantam, quam hic pro Alismate depingi curauimus, mihi primum Prage ostendit Adamus Leonurus, iuuenis spectata doctrina, & rei herbarie studiosus. Quod enim hac pluribus, ni fallor, notis Alisma representet, meruē sit, vt iam non dubitem affirmare eam esse legitimum Alisma aut genus Alismatis: quare non piguit eius effigiem exhibere, vt aliorum quoque de ea sit iudicium: praestat ea ad omnia, ad que valere Alisma tradidit Dioscor. quo fit vt hac planta Alisma mihi perpetuò expleat, quousq; alia mihi sese offerat, que certioribus notis Damasonium (ita enim quibusdam Alisma vocatur) referat. Ceterum duo Alismatis genera Plinius constituit li. 25. c. 10. vbi de vtroq; differit his verbis. Alisma inquit, alij damasonion, alij Lyron appellant: folia ei plantaginis, nisi angustiora essent. & magis laciniola, conuexaq; in terram, alias etiam venosa similiter: caule simplici, & tenui, cubitali: capite thyrsi: radice densa, tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibus: nascitur in aquosis. Alterum genus eiusdem in syluis, nigrius, maioribus foliis: hac Plinius. Alisma memoriae prodidit Gal. libro 6. simpl. med. sic de eius viribus differēs. Damasonium, aut Alisma. De hac herba in 3. lib. tradidit Diosco. quod radix eius epota dysenterias sanat, & aluum sistat, atq; edematā mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus. Quod autem constitutus in renibus calculos, aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quod absterforiam quandam facultatem obtinet. Huius herbae nomen Græcum ἄλισμα: Latinum pariter & Italicum, Alisma.

† Hac vox non legitur in Græcis codicibus, neque ab Orbesio refertur, neque etiam à Marcello vertitur. Vnde plant. suspicor, quod Ruellius ita verbum hoc ex Plinio adiecit, vt reliqua etiam ex eodem reddidit.

Alismatis hæc figura à Matthioli discrepat solum foliorum, quas ipsius sculptor omisit, vt qui vnam tantum medium folium percurrentem pinxit: nostra foliis & caule est hirsutis (quod in hac figura sculptor neglexit), foliaque plurimis nervis donantur, flores item lutei sunt. Variæ huius figuræ apud auctores, etenim historici Lugd. auctor, quatuor figuras vnus Alismatis proposuit sub diuersis nominibus, modo: puta Damasonij Matth. Ptarmicæ montanæ, Nardi Celtici alterius Penæ & Chrysanthemum Matth. Dicitur hoc Alisma folio hirsuto, C. B. Alisma. Mat. Cast. Cam. Alisma alpinū, Ges. hor. Thal. Caltra alpina Ges. hor. Tab. Nardus Celtica altera & Plantago Alpina, Lob. Chrysanthemum latifolium, Dod. p. 10.



ALISMA.



Coclusa meū exemplar nō habet, nec Oriba. legit. α πορός οἰς λα γών βεβρω κός καὶ τοῖς φρύε .i. his qui leporem vorarunt, ve ranam rube tam. b Meū. σω ἰσῶ δ αὐκῶ. ἰ. cum pari dauco.

Alismatis consideratio. Plantago aquatica.

Alisma duplex Plinij.

Alismatis vires ex Gal.

Nomina.

tantum medium folium percurrentem pinxit: nostra foliis & caule est hirsutis (quod in hac figura sculptor neglexit), foliaque plurimis nervis donantur, flores item lutei sunt. Variæ huius figuræ apud auctores, etenim historici Lugd. auctor, quatuor figuras vnus Alismatis proposuit sub diuersis nominibus, modo: puta Damasonij Matth. Ptarmicæ montanæ, Nardi Celtici alterius Penæ & Chrysanthemum Matth. Dicitur hoc Alisma folio hirsuto, C. B. Alisma. Mat. Cast. Cam. Alisma alpinū, Ges. hor. Thal. Caltra alpina Ges. hor. Tab. Nardus Celtica altera & Plantago Alpina, Lob. Chrysanthemum latifolium, Dod. p. 10.

ὄνοβρυχίς.

ONOBRYCHIS.

CAP. CLII.

Onobrychis folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum; radicem parvam: nascitur in vliginosis, & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Nascitur Onobrychis, Plinio lib. 23. c. 16. authore, circa fontes. Folia habet lentis, paulò longiora: florem rubentem: radicem exiguam, & gracilem. Sunt qui Onobrychin velint eam esse herbam, quam aliqui Rutam caprariam, alij Gallegam vo. ant: nos vero vulgò Lauanese. Verùm hæc notis, quæ Onobrychi tribuuntur, haudquaquam respondere deprehendunt: quippe quæ folia ferat lentis quadruplo maiora, caulem plerumq; bicubitalem. flores purpureos, & radicem non parvam. Et hinc mihi plane videatur, quòd illorum opinioni nemo rectè possit, aut debeat ad stipulari. Onobrychidis vires tradidit Gal. lib. 3. simpl. med. sic inquit. Onobrychis rarefaciendi, digerendiq; vim obtinet: proinde folia eius virtutis etiam nam: illita ad morem cataplasmatis tubercula discutunt: arefacta verò, si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quin etiam sudores elicit cum oleo inuncta. Quæ ἐνοβρυχίς Græcè, Onobrychis item Latine, & Onobrychi Italicè vocatur.

Onobrychis consideratio.

Onobrychis vires ex Gal.

Nomina.

ὑπερικόν.

HYPERICVM.

CAP. CLIII.

Hypericum alij androsæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam semen odore a resinam unitatur: surculaceo frutice, dodrantali, rubescente: folio rutæ: flore luteo, † leucoio simili (qui digitis attritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur:) subhiriuta sinqua, & in rotundo oblongo, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur in locis incultis, & asperis. Vinam cit, menstrua pellit appositum, tertianis, quartanisque cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

a Me. exemp.

πυρίον ἰνδόν

i. pineæ resina.

Oribasius nō legit cōclusa.

ἄσσυρον.

ASCYRVM.

CAP. CLIIII.

Ascyron, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosus, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesque: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, hyperico nō absimilem cuius attritu digiti serè cruentantur, qua de causa androsæmon vocauerunt. Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydromelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assiduè dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ἄνδρῶσαμον.

ANDROSÆMON.

CAP. CLV.

Androsæmon ab hyperico, ascyroque differt, quòd fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: † tubentibus virgis, & foliis rutæ, triplo (aut quadruplo) maioribus, quæ trita vinoso succo manant: complures alas habet in cacumine, vtrinque expansas, pinnatasque: circa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semen papaueris nigri, insigne lineis. Huius comæ tritæ resinofum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excremèta pellit: ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

† πρεπονής ἰκκ

vo: ἄνδρῶσαμον

i. virgis puniceis cōlons.

ita leg. meū.

Meum conclusa non habet.

I. HYPERICVM.

II. ASCYRVM.



κόρις.

CORIS.

CAP. CLVI.

Coris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac mihiore, non aliorum dodrant-

a *Hypericum* i. origratus: ita meum.
 b Hæc omnia in meo exemplari non habentur.

dodrante a, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & vrinas: contra phalangiorum morfa, ifchiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur b. [Radix vino decocta potaque, defectis opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quam optime cooperiri licet: siquidem corpus totum defudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.]

Hypericum, Ascyrum, & Androsamum, eiusdem planè generis planta (vs Dioscorides inquit) esse videntur. Verum earum caulibus, & foliis aliqua notatur differentia: nam hæc folia habet rubentiora, illa viridiora, vni maiora sunt, alteri minora. Similis discriminis ratio in caulibus. Omnes hæc congeneres planta hodie ab omnibus vulgo cognoscuntur: ea namque Iunio, & Iulio mensibus, diuersis in locis aureis floribus ornata conspiciuntur, iis ad amussim distincta et prædita notis, quæ singulis à Dioscoride tribuuntur. Ceterum quæ Coris vocatur, nõ ita Hypericum refert: quemadmodum Androsamum, & Ascyrum: quippe quæ non altior dodranti altitudine assurgat: foliis erica, minoribus tamen, & subpungibus: caulibus rufescentibus, odore suauis, ac grato. Flores habet hyperici amulos, luteo colore, sed minores. Hæc ad me pluries allata est à nostris herbariis: nascitur frequentissima in Italia, arido solo in collibus atque montibus. Aperit, excausat, extenuat, digerit, expurgat. Hypericum à perforatis foliis à nostris vulgò Perforata vocatur: folia enim innumera sitientia foraminibus, iisque adeo minutis, vt visum effugiant, nisi ipsa folia sole obiecta inspiciantur: id quod silentio videtur inuoluisse Dioscorides: quinetiam Plinius, alioqui rerum omnium diligentissimus indagator. Qui tamen hæc in historia dubiè falli deprehenditur, quod scripserit libro 26. cap. 8. Hypericum nasci semine in siliqua, nigro, maturescere cum hordeo. Siquidem Dioscorides non tradit Hypericum cum hordeo maturescere, sed contineri eius nigrum semen siliqua subbruta, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine. Constat præterea annua experientia maturescere hordeum plerumque abeunte Maio: verum Hyperici semen non perficitur, nisi Iulio, & Augusto mensibus. In hac quoque Hyperici historia Brasauoli error, hyperico album flore tribuentis.

Coris. Brasauoli error, hyperico album flore tribuentis.


Hypericum. Brasauoli error, hyperico album flore tribuentis.

Plinij lapsus. Brasauoli error, hyperico album flore tribuentis.


Brasauoli error, hyperico album flore tribuentis. Brasauoli error, hyperico album flore tribuentis.

Monachorū hallucinatio. Nec secus quam Brasauolus hallucinantur, pace eorum dixerim, Monachi illi reuerendi, qui in Mesuem commentariis diderunt, quod non rectè cum illo sentiant, Hypericum, quo vtimur, primum esse sylvestris ruta genus. Quorum sententia cum fuerit à nobis superius in ruta mentione rationibus & authoritatibus abundè explosa, & improbata, superuacuum esset idem nunc repetere: eò enim accedet, qui plura horum errata cognoscere volet. Hyperico vis inest referandi, resoluendi, agglutinandi, atque etiam cohibendi. Epotum semen ex vino calculos eiicit, & venenis aduersatur quinetiam venenosorum moribus resistit, tum idem potum tum herba ipsa deuorata, haustave, tum moribus illita. Aqua stillaritia florecentis iam herba, maxime quibusdam præfertur, si potetur, comitialibus, & resolutis. Datur seminis farina commodè ex polygoni succo ad sanguinis reiectiones. Idem aluum exonerat. Inest floribus, & semini nua facultas ad vulnera omnia sananda, præter ea quæ in capite sunt. Ideoq; oleum, in quo diu flores atque semine pregnan-

III. ANDROSÆMVM. *IV. ANDROSÆMVM FOETIDVM.*



V. CORIS.



tes siliqua macerata fuerint, diuq̄ insalata, mirificè recentia vulnera sanat. Sed per quam belieid efficit, si cum laricea, aut abiegna lachryma oleo misceatur. Idem per se ventri illitum, dysentericos iuuat: potum verò cochlearis mensura lumbricos necat. Scripsere quidam Hypericum ad eò odisse daemones, vt eius suffitu statim auolent: quare quibusdam fuga demonum vocari cœpit. Hyperici vires memoria prodidit Gal. li. 8. simpl. med. sic inquit. Hypericum calefacit, & desiccatur, tenuisque substantia est, ad eò vt & menses, & vrinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum foliis illitus viridis ad cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Ceterum si sicca contusa inspergas, sanabis humida & putredinosa vlcera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant. Idem lib. 6. de Androsamo ita scribit. Androsamum planta fruticosa, natura duplex: vnum enim Ascyron, & Ascyrordes nuncupatum est, species hyperici. Alterum verò à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium. Foliorum verò facultas modicè extergens & desiccans, vt & ambusta sanare credantur. Ceterum in vino austero decocta, vinum ipsum magnorum vulnerum glutinatorium efficiunt. Sed quod de Cori mentionem fecerit Galenus in simp. medic. censu, mihi incompertum est. Planta, quæ Græcis ἰσχυρὸν, Latinis similiter Hypericum nominatur: Mauritania, Reiosicon, seu Reiosaricon: Italia, Hiperico, & Perforata: seu Herba di S. Giouanni: Germanis, Sant Johannis Kraut: Hispanis, Coraioncillo: Gallis, Millepertuis, & Trucheran. Quam verò Græci ἄσχυρον, Latini quoque Ascyrum dicunt: Arabes, Asbirach: Itali, Asciro. Quæ deinde Græcis ἀνδροσαμῶνος, Androsamon item Latinis appellatur: Arabibus, Androsaman, Androsion, siue Androsagian: Italia, Androsamo. Quæ denique ἰσχυρὸν Græcè, Coris etiã Latinè & Cori Ital. vocatur.

Hyperici vires ex Gal.

Nomina.

† Quoniam hoc loco in vulgatis exemplaribus Græcis nulla sit alba viola mentio, idcirco sunt qui illorum testimonio freti, verò illud auferant ex interpretibus. Sed quomodo id rectè factum sit, non video: siquidem in Oribasio legitur, ἀνδροσαμῶνος λευκοῖο ὁμοίον, hoc est. florem habens luteum leucio similem. Adde etiam, quòd Hypericum ita adamussem floribus colore luteum violam representat, vt nihil melius. Nos autem vsi sumus voce Græca, ne ex albo, quòd fortè Marcello impo, sit, aliqua possit oriri difficultas. † Quæ hic sequuntur, in Græcis codicibus impressis non hoc loco, sed in fine inter notia, & Dioscoridi falso adscripta leguntur, vt quæ adsciticia sint habita. Nos verò illa huc admisisimus Ruellij, vt facimus, interpretationem secuti: nec non etiam fidem codicis manuscripti.

I. Hypericum vulgare, C. B. Hypericum, Matth. Brunf. Fuch. Lac. Lon. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Tab. (cui & fuga daemou) Cam. Herba perforata, Trag. Ascyrum, Dod. gal. Cord. in Diosc. II. Hypericum Ascyrum dictum trifolium, C. B. Ascyrum Matth. (sed in compendio & penult. edit. Androsamon, quia figuræ transpositæ) Fuch. Lac. Lon. Lob. Dod. fol. Cast. Lugd. Cæs. Cam. Ascyrroides, Gef. hor. Hypericum, Dod. gal. Hypericum in dometis nascens secundum, Trag. III. Hypericum Androsamum dictum, C. B. Androsamum, Matth. (in compendio & penult. edit. Ascyrum, figuræ enim transpositæ) Fuch. Cord. in Diosc. Lac. Lob. Cast. Lugd. Thal. Androsamum quibusdam, Gef. hor. Hypericum in dometis primum, Trag. Ruta. IV. Hypericoides, Dod. fol. an. Ascyr. species ramosa, Cæs. I V. Androsamum fetidum, C. B. Tragium Creticum, Bellonij Androsamum minus siue angustifolium, & Androsamum fruticosum ex Ilua, Camer. V. Coris lutea maior, C. B. Cons. Matth. Gef. hor. Lac. Lon. Lob. Cast. Lug. Cæs. Tab. Camerano.

Χαμαπίτυς

AIVGA.

CAP. CLVII.

Aiuga herba in terra repens, subcurua: foliis semperuui minoris, multò tenuioribus, hirsutis, & pinguioribus, circum ramis frequentibus, odore pinus: flore tenui, luteo, vel candido, radicibus cichorij. Folia septem diebus in vino pota regio morbum medentur: & quadraginta diebus ex hydromelle, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter vrinæ difficultatibus, ictericis, & renum vitis. torminosis profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto, contra aconitum vruntur, bibentes decoctam. Ad autedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, alium emolliat: excepta melle, cum æris squama, & resina deicit: apposita ex melle, vuluæ viria extrahit: mamarum duresas ducit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpunt, cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus: coma supradictæ, flore candido, semine nigro: hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, foliis exilibus, albis, scabris: caule aspero, candido: luteis floribus, semine iuxta alas: respicit & hæc pinum. Hæc duæ vim superioris obtinent, sed non vsque ad eò efficacem.

Aiugam quam Græci Chamapityn vocant, quoniam foliis, & odore pinum refert, herbariorum vulgus tuam arthritidem appellat, quòd ischiadicis, & aliis articularum doloribus opem ferat non obscuram. Vulgaris est notitia Aiuga, quæ primo generi adscribitur. Si quidem planta est per terram repens, foliis oblongis, angustis, rosmarino coronario proximus, minoribus tamen, mollioribus, & hirsuta canitie subalbicantibus, circa ramulos totos, qui tenues, & obsequiosi spectantur, sessilibus, odore pinum, quemadmodum & facie referentibus, vnde illi Pinus infima nomen. Flores edit aureo colore subæter in vniuerso serè caule, sed tenues, & exiguos. Radicibus nititur palmaribus, pluribus adnatis fibris. Nascitur tenui, ac arenoso solo, incultis præsertim locis, & in aruis nulla satione virentibus: sapore est amaro, non sine acredine quadam, quæ tamen ab amaritudine superatur. Ideoq̄, excalfacit, incidit, extenuat, abstergit, & expurgat. Verum postrema, quam lepius etiam vidimus, non ad eò omnibus est nota: quemadmodum nec media, quam hæctenus mihi quidem videre non licuit. Ceterum in aperto errore versabatur Germanus ille pharmacopola, qui Brasauolum docuit Aiugam Germanica lingua vocari Bergis mein nicht. Quandoquidem herba huius nominis mihi cum Germanis iamdiu versanti notissima est: quæ tamen nulla prorsus ex parte quamuis Aiugam representat. Herba tota vnà cum floribus, & radicibus in puluerem contrita, si diebus 40. sumatur & resina terebinthina, siue Lariceæ quaternis drachmis, ischiadicos sanat. Eadè res in aceto decocta, & pota

Aiugæ confideratio.

Cuiusdã Germani error.

Chamapitynos vires.

I. CHAMÆPITYS.

II. AIUGA, SIVE CHAMÆ. ALT.

*III. CHAMÆPITYS MONS-
peliaca foliis serratis.*

Pilulae è Cha-
mæpityde.

Chamæpityos
vites ex Gal.

Nomina.

cū melle. Sed & vrina mouēda aptū est medicamen. Sunt autē qui etiam eū exhibent decoctā in melicato iis, qui coxalibus dolorib. torquentur. Herba porro ipsa viridis vulnera magna cōglutināt & vlcera putrescentia sanat. Præterea māmatarum durities discutit. Est. n. in siccando ordinis tertij, in calcaciendo verò secundi. Quæ herba Græcis χαμαίπιτος, Latinis Chamæpityos, Aiuga, & Abiga nuncupatur: Mauris, Hamestheos, seu Chamasthius: Italis, Chamæpityo, & Iua: Ger. Zelenie lieber: Hisp. Pinilho, & Yua artetica: Gal. Iue muscate, aut arthetique. Chamæp. siue Aiuga altera: Italis, Iua saluatica.

I. Chamæpityos prima, Matth. Lac. Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Lugd. Chamæpityos altera, Lon. Chamæp. tertia, Trigo Fuch. Chamæp. vera, Cord. in Diosc. Chamæp. Gef. hor. C. ref. Chamæp. maior, Abiga & Iua arthritica, Tab. Aiuga, Cast. Aiuga siue Chamæmas Diosc. Lob. Iua, Gef. hor. II. Aiuga siue Chamæp. altera Matt. Chamæp. tertia eid. in Ital. comen: Dod. gal. & fol. Lac. Lugd. Chamæp. prima, Fuch. Lon. Lob. Alij hirsutis, alij glabris folijs pingunt, quate nostra utrūq. exprimit. Nisi sit Anthylloides, Thal. quid sic ignoramus. III. Chamæp. Mōspel. folijs serratis, C. B. Chamæp. species Mōspeliaca, Gef. hor. Anthyllis Chamæpitydes minor, Aduer. Lob. Anthyllis altera, Clus. hist. Hisp. Cast. Anthyllis secunda herb. rarior. Lugd. Chamæp. spuria prior, Dod. fol. Chamæp. altera, & maior, Cas. Iua Moschata Mōspel. Tab. Ex radice lignosa, crassa, & albida, amara, plures prodeunt caules tenues, sarmētosij, duri, humi procūbentes, incani, hirsuti, quos cingit folia copiosa, oblonga, hirsuta, externo ambitu serrata, gustu feruente, odore graui: flores purpurei Chamæpitydis forma in linguas, quibus succedunt in singulis calyculis quaternæ semina simul iuncta, oblonguicula, cinerea. Nasitur circa Mōspel. in rudibus, ad Castellneuf collegimus, sic & in oliuetis, & aridis agrorū marginibus Narbonæ ac Gallo prouincij.

PETRI

& pot. a mortuos satius extrahit, vniuersa planta decoctū facit ad omnes cerebri, neruorū, & articularum affectus a pituita provenientes, si plurib. propinetur diebus ex Rhodomelle, & oxymelite. Nā & comitiales, & resolutos, & podagricos inuat. Fis è febribus & saccharo medic. (officinæ & conseruam vocant) ad paralyticos, quo qui vrūtur cū vesperi se dormitū recipiunt, reuocant. Atqui ad hoc sumuntur quotidie huiusce medicamenti drachmae dua ex acori radicibus decocta, & florum salviae binis scrupulis. Parantur è chamæpity catapotia ad idem per quam vtilia, hoc modo. Sumito chamæpityos, Betoniam, Stachadam, florum roris mariani, cutusq. drachmā: turpeti sesquidrachmam, agarici drachmas duas, Colocynthidis semidrachmā, Zingiberis, salis sopilis, cinisq. grana decē: Rhabarbarici sesquidrachmā, spicae Indicae grana septē, pulueris hierae simp. semuncia, diacridij drachmam vnam: Excipe chamæpityos succo omnia in mortario, & in massam redigito, e qua catapotia conformato: ex qualibet drachma noue: quibus si quotidie tria sumuntur a paralytico cū se dormitū recipiunt, presentaneū ferè sentient auxiliū. Chamæpityos meminit Gal. lib. 8. simpl. med. vbi de eius viribus ita scriptū reliquit. Chamæpityos gustu quidē amarū sapore acri validiorē obtinet. Effectū verò expurgat, abstergitq. viscera plus quā calefacit. Proinde regio morbo laborantibus, & omnino quibus facillē iecur obstruat, bonū est medicamentū. Quin & menses ducit tū pot. tū apposta.



PETRI ANDREAE
MATTHIOLI, MEDICI

Senensis Commentarij,

IN LIB. QVARTVMPEDACIIDIOSCORI-
DIS ANAZARBEI, DE MEDICA MATERIA.

Ribus antè libris, amantissime Aree, tradidimus odora menta, olea, arbores, vn-
guenta, animalia frumenta, olera, radices, succos, herbas seminaq;. In hoc au-
tem quarto differemus de radicibus, & eis, quæ restant, herbis.

Κίσπος.

BETONICA.

CAP. I.


ESTRON psychotrophon vocitatur, quoniam frigidis locis inueniatur. Latini Betonicam
appellant. Herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: fo-
lia quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora: in summis cau-
libus semen, veluti satyriæ, spicatum est. Decerpta huius folia siccantur, plurimos ad vsus.
Radicibus nititur, vt veratri, tenuibus, quæ ex hydromelite in potu, pituitosam vomitio-
nem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus vuluæ malo opportunis, & ad laxandos vteri
strangulatus, denarij pondere cum hydromelite: tres in vini sextario drachmæ contra serpentium morsus
ebibuntur. Herba magna vtilitate illatis à serpente vulneribus illinitur: aduersus etiam venena drachma
ex vino pota conuenit: præsumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit: urinam ciet, aluum subducit.
Medetur comitialibus, & insanis pota ex aqua: & iecinoris, lienisque vitij drachmæ pondere in aceto
mulso: concoctionem adiuuat, si quis fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto deuoraue-
rit, modo consimili acida ructantibus propinatur: stomachicis eam manducare, & succum deuorare pro-
degit, si postea dilutum vinum sorbeat. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum diluti vini cya-
thonichiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua: aquæ inter cutem binis drachmis ex hydromelite, si
febricitat, sin aliter ex mulso: regio morbo laborantes recreat: menses pellit drachmæ pondere cum vi-
no pota: aluum purgant drachmæ quatuor potæ in hydromelitis decem cyathis: facit cum melle ad ta-
bem, & purulentam excreationem. Folia sicca, tritaque fictili vase reconduntur.

^a μετὰ ὄξειος
καὶ μελιτος.
i. cum aceto,
& melle, ita
meum.
Cateuz. au-
tem legit vt
Ruellius.

^b Μεύ δινο-
μελιτι. i. vi-
no mulso.
Betonicæ cõ-
sideratio.
Vires ex An-
tonio Musæ

Betonica herba est nullis non cognita, nascens in pratis, & montibus, & in pascuis & innumeris prædita viribus. Unde
Itali, cum aliquem laudibus familiariter extollere volunt, vulgari prouerbio dicunt: Tu hai piu virtu, che non ha la
Betonica, id est, Tu pluribus præditus es virtutibus, quam Betonica. Scripsit de Betonica viribus proprium libellum Anto-
nius Musæ, clarissimus Augusti Casaris medicus, in quo hæc de ea memoria prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, &
montibus mundis, & opacis. circa frutices. Animas hominum, & corpora custodit: & nocturnas ambulationes a maleficis
& periculis. Loca quinetiam sacra, & busta a visibus metuendis tuetur, & defendit: & in omni denique res sancta est. Ce-
stron vocatur, & psychotrophon, siquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrsi pariter tenuis, cubiti altitu-
dinem excedente, quadrangulo. Folia pro vt quercus, odorata: semen in summitate thyrsi spicatum, thymbræ modo. Pollit v-
niuersa planta dotibus sepe innumeris, quandoquidem tusa capitisque vulneribus illita, ea mira celeritate conglutinat.
Præstat id tamen efficacius, si tertia quoque die iterum, atque iterum imponatur. Aiunt præterea tam valentioris esse fa-
cultate, vt ossa quoque fracta extrahat. Radicum ex aqua decoctum ad tertias fotu oculorum doloribus medetur: quod i-
tem præstant contrita folia, & sicuti superimposita. Succus a folijs per se tritis expressus, aut prius aqua maceratis, aurium
dolores mulcet, si tamen addito rosaceo in aures egelidus instilletur. Idem drachmæ pondere haustus in aqua calida cyathis
quatuor, sanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantia caligines oculis offundit: quo fit, vt etiam visum acuant
comesta folia. Eadem cum salis momento contusa, naribusq;, immissa sanguinem inde fluentem sistit. Betonica decoctum
ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo os sæpius colluatur. Herba ipsa ex tepenti aqua pota, suspiriosis &
anheiosis maxime proficit. Folia mille excepta tabidos viuunt, præsertim qui purulenta exustunt. Eadem tribus continuis
diebus deuorata à drachmarum quatuor pondere, aut ex frigida aqua cyathu quatuor ebibita, ventriculi dolores mulcet: ie-
cinoris

I. BETONICA. *II. BETONICA FLORE ALBO.



III. SERRATVLA.



tinoris vero, si ex calida hauriatur. Ex vino decocta lienis vitia
medetur. Sanat & renum vitia ex mulso bibita, duarum dra-
chmarum pondere: ex vino autem veteri trium drachmarum
pondere, additis piperis granis septem & viginti, ad lateru lum-
borumq; dolores vtilissimè bibitur. In duobus aqua calida cy-
this sumpta, alui & intestinorum tormina remouet, si tamen
à crudis non fiant succis. Foliorum quatuor drachma in aqua
mulsa cyathis octo epotis, commodè citatur aluus: sanaturq; si
ex vino sumptis coli inflammatione vexati. Betonica in ebrieta-
te ex melle sumpta nouem diebus, tussim sedat. Potu in aqua
calida cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita
plantaginis drachma, febres quotidianas expellit; quod tamen
in accessionibus tantum fieri debet. Idem praestat etiam in ter-
tianis, si cum pari pulegio assumatur. Sanat ipso quoque ortu-
ne etiam quartanas in tribus aqua calida cyathis hausta, tri-
um drachmarum pondere: addita mellis uncia, calculi frag-
guntur. Betonica ex tepenti aqua feliciter bibitur hydropi.
Pariendi celeritatem affert, vteriq; cruciatus à frigiditate con-
ceptos mulcet, si ex calida aqua, aut mulso duarum drach-
marum pondere propinetur. Contrita folia & illita, pres-
sos glutinant nervos, & resolutos inuuant. Eadem trium drach-
marum pondere ex caprillo lacte sumpta tribus diebus, sangui-
nem ore reiectum cohibent, & ex pari vini veteris mensura,
medentur ruptis, & ab alto deuolutis. Presumpta ebrietatem
arceat. Ex vino frequenter hausta, ictericos sanat: & snillo adipe
admista, carbunculos curat. Potu ex aceto mulso vnius drach-
ma pondere, viatoribus longo itinere defatigati vires mitissime
reficit. Fastidia abstergit, & stomachicos recreat. Aduerjat
venenis, & serpentum, & venenosorum rabidorumq; quorum-
cunque animalium morsibus, non modo intus sumpta, sed et-
iam extra emplastri modo imposta. Cuniculosa, si in oleo, etiam

nat vlcera cum sale indita. Ex vino hausta menses ciet. Potu dolores podagricos lenit, praesertim radicum decoctum potum:
idemq; praestant contrita folia imposita. Caterum sunt qui Betonicam à serratis circumquaq; folijs serratulam vocant. Sed
SERRATVLA cuius hic imaginem appinximus, quaeque copiosa in Bohemia nascitur in syluis, & pratis longe aita ha-
beret.

betur. Siquidem hac caule constat purpurascens, tenui, & in multos ramulos diuiso: Folia gerit anteaquam caulescat. Betonica familia, toto ambitu tenuiter serrata, sed ubi caulem protulit, eadem faciem immutant. Nam exortis profundioribus in iuris, maioris Phu familia fere redduntur: quæ verò in caule sunt, minora multò, & breuiora spectantur. Flores edit in ramulorum summis partibus, è capitulis quibusdam, purpureos. Radice nititur multifida, Phu minoris modo fibrata. Herba est insectoria, pannis colorandis expetita. Datur vtiliter potanda ex albo meraco conuulsis, ruptis & ab alto deuoluto: dissoluit enim potenter sanguinem, qui extra vasa concreuit. In vino decocta, ac deinde illita, vlcera mirificè mundat, & carne replet, & ad cicatricem perducit. Hemorrhoidum quoque dolores mulcet fotu adhibita. Folia, & radix simul confusa, & emplastri modo imposta, enterocelas sanare creduntur. Betonica vires memoria prodidit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Cestron, aut Psychotrophon, Romanè verò Betonica, vim habet incidendi, vt gustus indicat. Amarior enim est, & subactis ipsa herba: id quod & particulatim edita actio ostendit. Nam consistentes in renibus calculos diuidit, & pulmonem, & thoracem, & iecur expurgat abstergitq; mensis quoque ciet, & comitialibus prodest, tum rupta, conuulsaq; curat, & omnibus bestiarum moribus vlceri illita auxiliatur. Postremò acidum ructantibus, & ischiadici bibita, auxilio est. Planta, quæ ῥέσπον, & Λυχότροπον Græcis, Betonica, & Vetonica Latinis dicitur: Arabibus, Chastara: Italis, Betonica: Germanis, Betonien: Hispanis, Bretonica: Gallis, Betoesne: & Betoine. Serratula, Italis Serratula.

Serratula vires.

Betonica vires ex Gal.

Nomina.

BETONICA, quæ Græcis ῥέσπον à remedium copia & varietate dicitur, Plinio Vettonica, quam in Italia Serratulam vocari auctor est, duplex est, altera purpureo flore, quæ vulgarior est, altera candidis floribus, quæ rarior & non solum floris colore ab altera variat, sed & multò altera hispidiore, minoribusq; folijs, vt ex adiecta figura colligere est. Purpurea duum quoque generum, altera breuiore spica, altera longiore & molliore, quæ altius excrescit & serius floret, vtraque tamen eodem loco prouenit. I. Betonica purpurea, Trag. Fuch. Betonica, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Ges. hor. Lacu. Lon. Lob. Cast. Lugd. Casal. Thal. Tab. Betonica purpureo flore, Clus. hist. Pan. Vetonica, Cord in Diosc. & hist. II. Betonica alba Brunf. Taber. Betonica candida, Trag. Betonica floribus candidis. Lob. obser. Betonica flore albo, Dod. gal. & fol. Clus. hist. Pann. Cam. Vetonica alba, Cordo in historia. III. Serratula, à folijs minutim circumquaque ferratis, nomen habet: dicitur Serratula, Matth. Dod. fol. Lob. Cast. Lugd. Cam. Serratula tinctoria, Taber. Tinctorius flos secundus, Trago, vt Kyberus vertit, Tragus namq; Schartam nominat Cerretta, Casal. Centauroides, aut Centaurium maius syluestre Germanicum, Thalyo: an Solidago Sarracena quarta, Lonicerò. Huius ratione foliorum quatuor differentia: prima folijs omnibus per circumferentiam ferratis, incisura carentibus: altera folijs ad radicem quidem tantum ferratis, at reliquis profundè incisis ceu in lacinias diuisis: tertia folia habet vtrinque diuisa: quarta, primum folium ad radicem per circumferentiam ferratum habet, reliqua verò omnia dissecta.

Βριτανική

BRITANICA.

CAP. II.

BRITANICA, aut Vetonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem, & breuem: caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris, & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Quamquam tradit Ruellius Britannicam esse plantam Italia cognitam, atque ibi vulgò appellari Piatamano, mibi tamen haec nomen non solum nomen illud incomperum est, sed nullam etiam inuenire obtigit, qui Britannicam ostenderet. Hanc autem scriptis celebrauit Plinius libro 15. cap. 3. hisce verbis: In Germania trans Rhenum castris à Germanico Casare promotus, maritimo tractu fons erat aqua dulcis solus, qua pota dentes intra biennium deciderent, compagesq; in genibus soluerentur. Stomacacem medici vocabant, & sceleribus ea mala. Reperta auxilio est herba, quæ vocatur Britannica, non neruis modo & oris malis salutaris: sed contra anginas quoque & serpentes. Folia habet oblonga, nigra: radicem etiam nigram. Flos ei, qui (vt certò proditur) collectus priusquam tonitrua audiantur, & deuoratus securos in totum reddit homines. Frisij, quæ castra erant, nostris demonstrauere illam: hac Plinius. Ceterum non desunt, qui Britannicam censent eam esse stirpem, quam herbariorum vulgus ideo BISTORTAM appellat, quòd radice contorta nitatur, sed eorum planè error facile deprehenditur. Quandoquidem etsi Bistorta rumicis constat folijs, non tamen ea nigra sunt, neque pilosa quinimo leuia apparent, supernè rufescentia, & à terra quad. intenus caesa. Ad hac Britannica radix subest tenuis, breuisq; Bistorta verò crassa, serpentis iacentis modo contracta, & intorta. Caterum vt Bistorta integram enarrem historiam, nascitur hac in altis montibus, folijs primo statim exortu in acutum desinentibus, colore subrufo, quæ ubi adoleuerint, rumicis folia referunt, sed leuia sunt, inferna parte subpurpurea & per ambitum sinuata. Caulem edit rotundum, tenuem, cubitalem, in quo folia longè minora spectantur. Flos in caulis summitate prodit spicatus, ruber aut subpurpureus, è quo semen oritur oxalidis proximum. Radice nititur arundinacea facie, sed succosa, serpentis modo contorta, cortice obducta subrubra intus pulpa, adstringentis saporis. Copiosissima oritur in altis montibus & pascuis prouenit in Bohemia, vsq; praesertim montibus, qui regionem hanc, à Silesia diuidunt, & ex quibus Albi fluius suam ducit originem. Sed praeterea non desunt etiam qui Tormentillam sic officinis, & vulgò vocatam, Bistorta generi adscribant, quòd non facie, sed fortasse viribus illi respondeat: quæ quoniam hic nobis occurrit, & quàm plurimis effertur laudibus, ideò hic locus exposcere visus est, vt de ea aliquid disseramus. Est itaque TORMENTILLA folio pentaphylli minore, septenis incisuris diuiso: radice breui, nodosa, compacta, rubeo colore, sapore adstringenti: cauliculis tenuibus, subrubetibus: flore melino, adeò vt in pentaphylli genere sit reponenda. Sunt qui à septenis foliorum diuisuris Heptaphyllon hanc vocent. Herbarij compertum habent, hanc isdem pollere facultatibus, quibus Bistorta pradita est. Quamobrem vtraque refrigerant, exsiccant, cohibent, roborant, abortum prohibent bibita, ac ventri pubi renibusque ex aceto illita: vrina incontinentiam supprimunt, cum succo plantaginis pota: si stur: menses, si in earum decocto ad vmbilicum vsque confederint faemina. Idem praestant (de radicibus tamen intellige) si vrina, & ex melle atque spica subacta, ventri ac pubi illinantur. Sanguinem è vulneribus manantem cohibent, superasper-

Britanica cōsideratio.

Ex Plinio cōtra stomacacem.

Bistorta mentio.

Tormentille historia.

Tormentille & Bistorta vires.

I. BISTORTA.

II. *BISTORTA MINOR.*



III. TORMENTILLA.



Britanica vires ex Gal.

Nomina.

inueniuntur, in quibus post Britanicā alterū per se de Betonica caput legitur. Quod, quoniā pluribus iudicys in Dioscoride ascititium esse constat, atq; in hunc authorem ex libello Antonij Musæ Augusti Cæsaris medici fuisse translatum, idcirco illud abdicauimus, neque alia commentatione idem dignum censuimus. Quæ planta Græcè ΒΑΤΑΥΡΑΝ, Brit. & Lat. nō pariter & Italicè appellatur. Bistorta seu Colubrina, Italis Bistorta: Germanis, Watterwurth at Tormentilla, Italicè Tormentilla: Græcè, Επὶ σφύλλων: Germanis Tormentill: Gallis, Tormentillè.

se earum puluere. Qui item ex punicorum malorum vino potus biliosas coarctet vomitiones, & si onorum albo exceptus super fictili tegula inassetur, mox comedatur. Aqua, quæ ex his duplici organo elicetur, siue è radicibus decoctum, venenis omnibus remedio est. Ex quo tantum apud nonnullos Tormentilla inualuit vsus, vt ex eius radicibus etiam medicamentâ componant aduersus pestilentiam, & ad pestilentes febres, & præsertim vbi exanthematū nota emerferint. Datur quoq; earundem radicum tū puluis, tum decoctū vtiliter potandum pueris, qui vermibus laborant. Vtraque tum cæteras alui functiones, tum dysenteriam sanant, & vulnera glutinant, præsertim quæ intestinis, & visceribus fuerint illata, non modo ipsis vulneribus illata, sed & in potionibus hausta. Rebelia contumaciâq; vlcera curant & ea sistunt, quæ serpendo corpora erodunt. Radicum puluis sanguinis reiectiones prohibet. Idem ex symphyti maioris aqua potus, iuuat contractos, & ab alto deuolutos: siquidem non solum intrinsecas fracturas sanat, sed etiam sanguinem extra vasa concretum discitit. Causis dentium inditus cum aluminis, & pyretbri memento, non modo dolorem sedat, sed fluxiones eò decurrentes cohibet. Peculiariter autem valent Bistorta radices ad omnes venenosorū serpentium ictus & morsus, è vino sumptæ vnde Colubrina quibusdam dicta est. Sed vt iam ad Britanica vires redeamus, eas scriptis tradidit Gal. li. 6. f. m. med. vbi sic inquit: Britanica herba folia adstringentia sunt, & vulnerum glutinatoria, similia folijs syluestrium lapathorum, nisi quatenus atriora sunt, magisq; hirta. Sed & expressus ex illis succus perinde natus est adstringere: itaq; coctum quidam reponunt, tanquam inter stomatica medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare iam etiam putrescentia: hæc enim Gal. Cæterum non est silentio prætereundum, quod Dioscoridis coctus

Bistorta

Bistorta quod radice in se contorta constat, cuius Plinius inter Dracontia meminisse videtur, eiusdemque forte Molybdana: duplex est, maior & minor: illa radice magis minusve intorta, folijs in altera rugosioribus & maioribus, in altera leuibus & minoribus: minor similiter duplex. I. Bistorta mas, Brunf. Bistorta minor, Dod. gal. Lacu. Tab. Bistorta, Lonic. Colubrina minor, Brunf. Trag. Serpentaria mas, Fuchfio. II. Bistorta minor, Camerario in suo Matthiolo & Thalyo: Limonij species minor, Ges. de hortis. Hac priore multo minor est, cuius folia subrotunda per marginem veluti serrata & punctis distincta: quae in altioribus tantum Heluetiorum montibus & Iura prouenit. III. Tormentilla, quod tormentum dentium sedet, quam alij Pétaphyllis, alij Bistortis, alij Chrytogo Diofcoridis, adnumerant: duplex est, altera communis, quae aliquando quina, non septem folia obtinet: alia alpina, radice vulgari maiore, rubicundiore & odoratiore. Tormentilla, Matth. Brunf. Trag. Dod. gal. & fol. Cord. in Diofcor. & hist. cui & Pentaphyllum rectum; Lacu. Lon. Lob. Casto. Cæfal. Lug. Thalyo, Taber. cui & Confolida rubra, Heptaphyllum, Fuchfio, Ges. de hortis libro.

Λυσιμάχου.

LYSIMACHIA.

CAP. III.

LYsimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresue, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatum folijs tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus a flore rufo, aut aureo, gignitur in aquosis, & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi, sanguinis reiectionem suppressit: dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pelfo: sanguinis profluuium subuenit, si nares ea herba obturentur: vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit: quae de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

α πύρρον. i. fuluus.
b παρα ταύτα. i. iuxta aquas.
c εἶσι δὲ καὶ τραυματικὴ καὶ ἰσχυριστικὴ. i. est & vulneraria, & sanguinem sistens.

I. LYSIMACHIA.

II. LYSIMACHIA ALTERA.



Lysimachia a Lysimacho rege inuentore nomen accepit, vt Plinius est auctor libro 25. cap. 7. vbi de ea ita scriptum reliquit: Inuenit Lysimachus herbam Lysimachiam, quae ab eo nomen retinet, celebrata Erasistrato. Folia habet salicis, viridia: florem purpureum: fruticosa est: ramulis erectis, odore graui: gignitur in aquosis. Vis eius tanta est, vt iumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat: hac Plinius. Ruellius Lysimachiam eam herbam putat esse, cuius est vsus apud insectores ad insiciendos viridi colore pannos: vbi enim hos glasto tinxere, eam superinducentes viridem colorem efficiunt. Hanc Hetrusci, qui lanificio dant operam, vulgò appellant Cerretta, siue Braglia: Foroiulienses verd Cosaria. Sed hac in re Ruellius, meo quidem iudicio, aperte fallitur: siquidem Cerretta, quam ipse rusticis Corneolam vocari ait, caules proferit, & folia lino maiora, non autem salicis: florem luteum, semen folliculis genista effigie inclusum: nascitur in pratis, nullaq; est, quod gustu perceperim, adstrictione praedita. Non desunt praeterea alij, qui pro Lysimachia aliam plantam ostendant, quae quadrato, recto, bicubitaliq; exit caule, folijs salicis, flore in purpuram rubescente spicato: nascitur prope fluentes aquarum riuos & vliginosi locis. Adstringit, refrigerat, cohibet, & omnia potest quae & altera, quae etsi Dioscoridis Lysimachiam non referat, eam tamen Lysimachiam alteram appellare libuit. Lysimachiam legitimam, ni fallor, Roma ad me Goritiam misit Vincentius Cantonus conciuus meus, medicus eruditus, & rei herbariae studiosus: quae mihi planè singulis notis, quas Dioscorides Lysimachia tribuit, videtur adstipulari. Sed eadem posthac inuenimus nos in Bohemia copiosam, & circa Pragam, prope Mult. suiam fluuium, & in alijs quoq; locis. Caterum quamuis Ruellius in mentione Lysimachiae existimauerit

Lysimachia
confid.
Ruellij erratum.
Lysimachia altera.
Vincentius Cantonus.
Ruellij altus lapsus.

Lysimachia vites ex Gal. Nomina.

(vt supra diximus) Corneolam esse veram Lysimachiam, in sine tamen eiusdem capituli quandam aliam herbam a se sibi demonstratam fuisse testatur, ad fugandam pestilentiam efficacissimam, buboni tantum adalligatam, quam etiam Lysimachia asseruit. Ex quo palam est, Ruellium duas pro Lysimachia plantas designasse, ea fortasse ratione adductum, quod Dioscori les flore rufo, aut aureo constare Lysimachiam memoria tradiderit. Lysimachia meminit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum. vbi de eius viribus in hunc modum disseruit. Lysimachios superantem habet qualitatem adstringentem, per quam & vulnera glutinat, erumpentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita compefcit: quin & reliquas sanguinis eruptiones sistere potest cum ipsa, tum succus eius multo magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac maliciorum profluuium sanat. Huius herbe nomen Græcum est λυσιμάχου, Latium, & Italicum Lysimachia. Germanis Weidenkraut.


Lysimachia, quæ & Salicaria à foliorum similitudine dicitur, quatuordecim differentias notatimus: alia est spicata, & quidem purpurea, vel cærulea: alia siliquosa, hæcque hirsuta, vel glabra, illa vel in agro, vel paruo flore: at glabra maior, minor, & angustifolia: est non siliquosa rubra, lutea, maior & minor, & etiam floribus globosis: quibus addimus Chamænerion latifolium & angustifolium, hocque vel in planis vel in rupibus proueniens. I. Lysimachia lutea maior vel Dioscoridis, C. B. Lysimachia, Matth. Trago, I. cu. Len. Cæsal. Lugd. Lysimachia lutea, Fuch. Turn. Lob. Taber. Lysimachium luteum, Ges. hor. Thal. Lysimachia flore luteo, Anguil. Lysimachia flore luteo minore, Cam. Lysimachia vera, Cord. in Diosc. Lysimachia falsa, Castori: Lysimachium verum, Dod. gal. seu legitimum, Dod. fol. Salicaria, Ges. hort. cui & Virgo terreæ quorundam. Variat folijs nunc ternis, nunc quaternis, & etiam binis ex singulis nodis prodeuntes. II. Lysimachia spicata purpurea, C. B. Lysimachia altera, Matth. (sed in hac figura folia plus iusto longa) Lacu. Lugd. Lysimachium purpureum, Ges. hor. Lysimachium purpureum alterum, Dod. gal. Lysimachia purpurea, Lob. Tab. Cast. Lysimachia flore purpureo, Anguil. Cæsal. Cam. Lysimachia tertia, Turn. Piccolysimachium purpureum alterum, Dod. fol. Solidaginis Sarracenicae alia species, Trago.

Πολύγονον. SANGVINARIA. CAP. IV.

Meu δὲ τριμίνδεξις συπικνή και φυτικὴν: ὁ δὲ χυλὸς πινόμενος ἀρμόζει αἰμοστικῶς. I. vim adstringentē habet, & refrigerantē: succus verò potus auxiliatur sanguinem spurientibus. Catec. autem cum Rueilio concordat. b καὶ πρὸς ἐπιπέδιον πρὸς τὴν ἰσχυρίαν καὶ λαμβανέριον. I. & contra periodos vna hora ante accessione sumptus: ita Meu & Cat. c θαλασσιῶδες ἰσχυρὸν καὶ πρὸς μαλακῶδες. I. Frutex est parvus, vnicaulis tener, submolli, ita Meum

Polygonum mas ramos habet teneros, & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, vt gramin repunt, folia rutæ, sed † molliora, longioraque: femine sub omnibus folijs turgescente: vnde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus a. Vis eperi succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruentæ excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & vrine stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur b: datur in febribus per horam ante significationes: foeminarum profluuia impositu sistit. Idem succus aurium doloribus, iisdemque purulentis instillatur. Facit eximie ad genitalium vlcera, cum vino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, viceribus que serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. Sanguinata foemina c fruticat vno caule, arundini teneræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo faretis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes: radicis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandique natura ad eadem valens, sed inefficacior.

I. POLYGONVM MAS. II. POLYGONVM FOEMINA.



III. POLYGONUM MINUS.

Polygonum minus, quod ab Italijs vulgo vocatur Coreggiola, & Centinoia, in campis ad flororum arces, & vis pallicis frequens ubi que nascitur. Fœmina vero, qua non adeo frequens est, & copiosa, in riguis humentibusq, locus inuenitur. Mari polygono Proserpinace nomen tribuit Apuleius, quod humi cauliculis rep. at. Est & plant. 2, quam POLYGONUM minus appellare libuit. Ea enim ramulos edit humi repentes, tenues, geniculatosq, foliis exiguis, oblongis, semine puuilo, rotundo, minutis, albicante, racemosoq, ac adeo copioso, ut vniuersa plant. a semine referta conspicatur: quo fit ut a quibusdam millegrana vocetur. Nascitur arido solo & in siccis torretium alueis. Sunt etiam qui ab effectu hanc ipsam Herniolam vocant, quod ad enterocelas praestantissimum sit auxilium in potionibus sumpta. Audio à viris fide dignis cū hac tantum herba, a Gabriele Faloppio Mutinense, plures intestinorum ramice laborantes esse sanatos. Vis illi est conglutinandis, siccandis, refrigerandis. Vniuersa planta puluis ex vino haustus, non solum suppressam cit vrinam, sed & renum calculos comminuit, ac pellit, vbi diutius sumatur. Quinetiam, ut quidam affirmant, vesica quoq, lapides atterit, & paulatim eicit: vbi diutius quotidie eius puluerem è vino bibant affecti drachma vnius pondere. Nascitur locis aridis, sabulosis, &


Polygoni considerano.

Proserpinaca Polygonon minus, & eius hist. & vires.

Millegrana. Herniola.

Polygoni vires ex Gal.

Nomina.



incaulis. Polygoni meminit Galenus libro 8 simplicium medic. vbi eius vires reddidit his veris: Polygonum, inquit, vti adfrictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium aut etiam quodammodo in initio tertij. Proinde sanè quibus stomachus seruet astu. foris frigidum illitum prodest velut etiam erysipelata, & calida: phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit, & hac ratione videtur esse exiccatorum. Quare cum herpetum tum vlcerum, aliorumq, bonum est remedium: efficacissimum autem inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & trienterum vlcerum glutinat. nam. ad & aurium vlcera prodest: si vel plurimum insit purus, hoc tamen etiam desiccet. Easq, em obiaculatas & profluum muliebri sistit, & dyfenteriam & sanguinis reiecti mes, & vndeunque aliunde immoderatiores impetus. Refert Dioscorides, quod & vrinam prouocet exhibitum stillicidio seu stranguria affectis: non tamen affectum exacte discriminat, in quo ipsum dari expediat. Porro minus ad omnia dicta. quam sumina, validioris est effectus. Herba, qua Græcis πικρόν ἄνισον, Latine Polygonum minus vocatur. Arabibus, Basila abagi: Italis, Polygono maschio, & Coreggiola: Germanis, Weagr. s: Hispanis, Corriola: Gallis, Coregiole. Quæ verò Græce πικρόν ἄνισον, Latine, Polygonum sumina dicitur: Italis, Polygono & Coreggiola sumina: Germanis, Ranten kraut: Gallis, Fin aquatic. Polygonum minus, Græce πικρόν ἄνισον: nonnullis Millegrana, quibusdam Herniola: Italis, Corregiola minore.

IV. POLYGONUM MARITIMUM latifolium.

V. POLYGONUM POLIONICUM cocciferum.



† Impressi codices Graeci tum Venetijs, tum Basilea hic male habent $\delta\pi\epsilon\iota\kappa\epsilon\iota\varsigma$ $\epsilon\pi\epsilon\alpha$, hoc est, mitiora, cum legendum sit $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omega\tau\epsilon\pi\epsilon\alpha$, id est, longiora. Hoc praeterea loco in ijs addendum est $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omega\tau\epsilon\pi\epsilon\alpha$, hoc est, molliora. Huic, & alteri lectioni ad stipulatur Orbasius, quem secuti videntur interpretes.

Polygonum, quod à multitudine seminis, aut dēfite fruticis dictum vult Plinius, sed potius a copiosis geniculis, & à Scribonio Calligonon nominatum, duplex est, maius & minus: illud vel vulgare, quod latifolium candidis aut rubentibus floribus varians, & angustifolium: hocq; aut repens, quod vel oblongo, vel breui folio, aut fruticas, vel maritimū, quod latifolium & angustifolium: vel cocciferū. Minor etiā suas differētiās habet, est vulgatū, vel repens, vel erectū: est peregrinū, foliolis vel maioris, vel serpylli, vel deniq; minimis, Herniaria dicta, cuius differentia in hirsutie & foliorum glabritie. I. Polygonum latifolium vel mas Diosc. & Plinii, C.B. Centūnodia, Brunf. Polygonū mas, Matt. Fuch. Dod. gal. & fol. Angu. Gef. hor. Cast. Lugd. Thal. Polygonum masculū, Trag. Lac. Polygonum, Lob. Cæs. Polygonum primum, Turn. Polygonum mas vulgare & Sanguinaria, Lob. in ico. Polygonum maius. Lō. Tab. cui & Corrigiola: Polygonū vulgare Cam. II. Equisetum aquaticū breuioribus letis, C.B. Polygonū fœmina, Matt. Dod. gal. & fol. Anguil. Gef. hor. Cast. Lugd. Tab. Polygonū fœmina semine vidua, Lob. in icon. Polygonū fœmina Thal. Sanguinalis fœmina, Cordo in Diosc. an Limnopeuce, Cordo in sua hist. III. Polygonū minus seu Millegrana maior, C.B. Polygonū minus, Matth. Cast. Polygoni genus herniaria vulgo, Clus. hist. Pan. Empetron, Trag. Lon. Millegrana, Cord. in hist. Herba Cancrī minor, eius scholiasti: Epipactus, Anguil. Herba Turca, Aduerl. Lob. Cæs. Herniaria, Gef. hor. Lug. Thal. Tab. Cam. Huius aliquot species notauimus, aliā foliis subrotundis, glabris, aliam hirsutis, aliam foliis angustissimis, albicantibus, viticulis copiosis repentibus. IV. Polyg. maritimū latifoliū. Hoc vulgo breuius, crassius, totū candidū & humi strati ex cuius radice nigra, crassa, palmari, cōtorta & lignosa, viticuli subrubētes prodeūt, internodijs distincti, squammulis tenuissimis albidis donati, folia habet dēfā viridia, quibus foliola cādida, glabra, lucida, secundum nodos adponuntur: flosculi rufescentes, aliquando albi, quadrifolii, quibus succedit semē nigrum triangulum, thecis foliaceis candidis inclusum. Hoc in Adriatici maris littore circa Venetias legimus: eorū longe maius & speciosius toto maris Mediterranei tractu in Gallia Narbonensi, ad Cerium mōrem obseruauimus. Salso & adstringente gustu est. Dicitur Polygonum marinum maximum. Aduerl. & Lob. in ico. Polygonum marinum, Lob. Cam. in Marth. Polygonum marinum prius Dalechāpii, Lug. Polygonum tertium in maritimis nascens, Cæs. V. Polygonum Polonicum cocciferum. Hoc ex radice minore, cauliculos emittit breuiorē, nodosos, albescentes, circa quos folia tenuissima, mucronata: flosculi candidi, inter squammas virentes in cauliculorum summis. Ad huius radices, Coccum elegantissimo rubere commendatum nascitur, quod in arenosis Polonię locis reperitur: de quo primus, D. Camerarius in suo Matt. Polygoni Cocciferi nomine, quod Polonis Kosmatzek dicatur.

Πολυγόνατον.

POLYGONATVM.

CAP. V.



a Meum. d. a. i. hirsutam.

Polygonati consideratio, & hist.

Aq. Polygonati.

Sigillum Salomonis.

Manardi erratum Polygoni. Secaculifluentis.

asserant, veluti Manardus Ferrariensis, eam plantam Polygonatum esse, quam nomine Secacul describūt Mauritan. Sed haud dubie, meo iudicio, falluntur: siquidem Pisi folia, vt Secacul Polygonatum non habet, nec flores purpurascētes videntur maiores, albicantesq;. Praeterea Secacul Serapioni radicibus nritur pollicis crassitudine, & indicis longitudine. Contra

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, foliis lauri, latioribus, & lauioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadam adstrictione. Flores per singulos foliorum exortus promittuntur candidos, foliis numerosiores, incepta à radice septuaginta. Radicem habet albam, mollem, longam, crebrò geniculatam a, densam, graueolentem, digitum crassitudine aequantem. Quae vulneribus efficaciter illinitur: quinetiam maculas in facie delet.

Polygonatum Heruscis vulgò Frasinella nominatur. Alij verò Italia populi quasi a Graecis docti, id Ginochuato vulgari sermone appellare didicerunt, ac si geniculatam radicem dicerent. Est itaque Polygonatum planta caule cubitali, & quandoq; maiore, rotundo, ac leui: circa quem folia exeunt lauri effigie, sed latiora, numerosis secundum longitudinem venis, firma, dispari exortu prodeuntia, sapore quodantenus adstringente. Flores edit candidos à quacunque foliorum cauitate in vniuerso caule emergentes, & ternos ex vno pediculo dependentes. Floribus excussis, bacca exortuntur pisi magnitudine, ex nigro subvirescentes, & quandoque rufescentes. Radice nritur candida, arundinacea, tenax, summa tellure vagante, longa, crebris geniculis articulata, digiti crassitudine, densa, & odore quodantenus graui. Nascitur in montibus, & collibus. Mulieres è polygonati radicibus aquam stillatitiam studiosè consciunt, qua ad faciem detergendam, poliendamq; pro fuco vtuntur. Sunt praeterea, qui Polygonatum sigillum sanctae Mariae, & qui sigillum Salomonis vocitent: verum ipse quidem harum nomenclatorum causam adhuc assequi non potui. Nec desunt etiam, qui

verò Polygonatum, quòd multò longioribus sit radicibus. Adhac (vt testatur Mesues, ac etiam Serapio, vbi de Secaculo saccharo, vel melle asseruando scribunt) eius radices cinereo exterius sunt colore, solida intus matrice, atque nervosa, quae omnia in Polygonati radice desiderantur: quippe candida haec est, & nulla intus matrice. Re autem vera Secacul radix est Indica. Hoc enim apertissime testatur Auicenna libro 5. vbi sic habet: Secacul sunt radices Zingiberi similes, quae conue-
 10 bantur ex India, & fit ex eis cum sunt recentes conditum in loco suo, apud nos autem humectantur in primis in aqua calida. Id quod etiam scribit Serapio, vbi de pluribus saccharo, aut melle asseruandis egit. Ne vsquam Polygonatum, & Secacul eisdem viribus pollere constat inter authores: quandoquidem illud Graeci commendant ad vulnera, & ad maculas in facie delendas. Hoc autem Arabibus laudatur ad prolifici seminis vbertatem, & ad venerem conciliandam. Quae in re nonnulli falsa Manardi opinione ducti, se delusos inuenerunt, qui Polygonati radices saccharo conditas ad venerem
 20 excitandam auidissime deuorant, nullo tamen rei successu: Atqui conserunt tamen, (vt quidam volunt) & experientia comprobant, ad albas vteri fluxiones, si diu vs vtantur foemina eo morbo laborantes. De Polygonati viribus differunt
 30 Caelenus lib. 8. simpl. med. hunc in modum: Polygonatum mistam habet tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstringentis pariter & acrimoniae, & amaritudinis quippiam, & indicit illis cuiusdam insuauitatis. Quocirca nec admodum est vtilis, sed tantum quòd radicem eius quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam qui neuos maculasq; in facie illo detergant. Haec planta vt Graece πολυγονατον, ita etiam Latine Polygonatum nominatur: Italicè, Frasinella, & Gmouheto: Germanicè, Weiswurz: Hispanicè, Frasinella: Gallicè, Genjculiere.

Secacul quid

Polygonati vires ex Gal.

Nomina.

Polygonatum à radice geniculata dictum, vulgò Sigillum Salomonis à vestigijs sigilli impressionem in radice referentibus, duplex est, latifolium & angustifolium: illud & longioribus, & breuioribus, & latioribus, & angustioribus folijs, flore maiore, minore, odoro & inodoro: floribus singulis, vel pluribus: bac-
 10 cis maioribus, minoribus, rubentibus, purpureis, nigris: est deniq; & ramosum. Sic & angustifolium duplex est, non ramosum, quod vulgatius, & ramosum. Polygonatū latifolium vulgare, C.B. Polygonatum, Matth. Angul. Lac. Lob. Cordo in Diosc. & historia (eius Scholiasti Polygonatum curuū dicitur) Turn. Gesl. hor. Dod. fol. Caist Polygonatum latifolium, Fuch. Dod. gal. Tab. Polygonatum maius, Lonic. Lugd. Thalyo: Polygonatum vulgare, Clus. hist. Pann. Cam. Sigillum Salomonis, Brunf. Gesl. hor. Sigillum Salomonis latifolium, Trag. Secacul Arabum, Manardo: Frasinella vulgò, Cæs. Vulgares herbarii Germanici cum Dictamno & Elleboro albo confundunt.

Κληματις.

CLEMATIS.

CAP. VI.


Clematis humi serpit: lato, pinguiq; solo prouenit, viticulas spargens a crassitudine iunci, exiguas: b
 folia lauri figura & colore, sed multò minora. Ea cum caulibus in vino pota alui profluvia, & dysen-
 10 terias sedant: subdita in pessò cum lacte, & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vuluæ incedunt: dolores dentium commanducata finit: imposita serpentium moribus iuuamentum praestat. Fertur etiam contra apidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.

a Cateuz.
 δασχάινε. i.
 instar iunci.
 β φύλλον μι-
 κρόν δάφνη
 ἐμφερές. i. fo-
 lium paruum
 lauro simile:
 ita hincum.

I. CLEMATIS PRIMA.

II. CLEMATIS DAPHNOIDES flore pleno.

Vincetoxicum



Κληματις

Κλεματίς ἑτέρα.

CLEMATIS ALTERA.

CAP. VII.

Est & altera Clematis, quæ viticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre ac exulcerans: repit per arbores, vt Smilax. Semen tritum pituitam, bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Clematis
prima.

III. CLEMATIS ALTERA.

Clematidis
vires Matth.Quorundam
error Vincam
Chamadaphnem stat.Clematis al-
tera.

Clematis, qua primo loco describitur, aliquibus Vincæ peruinca dicitur, nobis vulgò appellatur Prouenca, cuius fronde mulieres pueris ac puellis, virginibus, funestas texunt corollas. In hac enim nullam reperi notam, qua Clematidi primi generis reclamare videatur. Siquidem viticulosum mittit iunci modo tenues, lentas, flexilesque, iuncto tamen exiliiores, laues, & qua humi iaceant: in his folia exeunt per interualla pari vtrinque exortu, oliua modo oblonga, laui minor, robusta, colore saturate viridi, è quorum origine primo statim vere flores emicant caerulei, aspectu pulcherrimo, quin distincti foliis, ex oblongo viridique, calyculo sese pandentes, & longis nitentes pediculis. Radices habet numerosas, graciles, albicantes, humique repentes. Vires perpetuo & nunquam folijs exuta spectatur. Refrigerat, siccatur, roborat, cohibet. Hac femoribus adalligata [viridia folia], mensum abundantiam cohibent, & abortum prohibent, & conceptus adiuuant. Capiti recens superposita, & collo, gulaque circumducta, sanguinem è naribus manantem sistunt. Additur quoque vulnere vulnerariis emplastris, & ptdionibus. Quamobrem eorum sententiam explodendam putauerim, qui nostratam Peruinicam chamadaphnem esse sibi persuadent, quam vulgò Leureolam appellamus. Nam hac virgas emittit cubitales, singulari stipite à radice exeuntes, rectas, tenues, lauesque: semen rotundum, rubens, inter folia residens, qua facie laurina emulantur. Porro Clematis, quam secundo loco reddidit Dioscorides, nimirum à prima quam maximè dissidet. Illa enim vt diximus, frigida, siccaque, existit, & adstringens omnino facultatis: hac verò adeo calida acrisque, habetur, vt admodum facile exulceret. Ipsa itaque, ab radice viticulosas emittit pratogas, lentas, rubescetes, quibus lupuli vocati modo, aut hortensis smilacis, sepes, & arbores scandat, & clauiculis vinciat. E viticulis

IV. CLEMATIS TERTIA.



V. FLAMMVLA.



43

50

60

folia

folia prodeunt bederacea, è lateribus vna plerunq; aut quãdoq; duobus incisuris dissecta. Flores edit purpureos, alterius longemiores, sed quatuor tantũ foliis constantes, in crucis modum protensis, è quibus semen nascitur acerrimum, & feruentissimi gustus. Radicem habet crassam, quæ paulo post in numerosas diuincatur fibras, sapore pariter acri. Oritur in syluis, & in prætis, dumetisq;. Est & alterum huius genus, quod nos VITALBAM vocamus in Hetruria. Quandoquidem Vitalba hæc viticulis exist rubentibus, ac lentis, folijs alteri quadantenus similibus, etsi per ambitum magis laciniatis, acri gustu, & exulcerandi facultate præditis, sed floribus longè diuersis. Si quidem hæc flores profert in racemi modum, albos, odoratos, & Myrti ad id similes, vt differentia ferè nihil agnoscat. Quibus deciditibus capillacea, incan. aq; oritur coma, quæ tãdem ventorum flatibus excussa, nudum relinquit fructum, triangulari ferè figura, simulq; compactum, subnigro colore, acerrimi omnino saporis. Nascitur passim in sepibus, & in syluis arboribus se circumuoluens, & per eas repens: viribus ysdẽ præsit, quibus & superior. Quo fit, vt mihi haud dubitandum sit quin vit. alba nobis vocata alterius clematidis sit species, vel potius ipsa eadem clematis. Fuchsius tamen medicus doctissimus nostrat vit. albam, vitem nigram esse existimat. Sed error, mea quidem sententia, vt infra suo loco dicemus. Caterum herba, quam quidam FLAMMULAM dicunt, folijs floribus, ac semine nihil ab hac clematide differt, quemadmodum nec acerrimo gustu. Attamen neque sepibus circumuoluitur, neque arborescendit, cum recticaulus assurgat. Plures autem hæc ex se mittit caules bicubitales, subrubentes, & in his folia simlacis, quibus intolerabilis inest acrimonia, vnde Flammula sibi nomen asciuit. Nascitur in campis, collibus & frutetis. Ex hac ego sæpius aquam eliciui, demisso vitreo organo in calentis aqua balneo: quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimonia. Hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (vt Platearius est author) excalfacit, siccatq; ordine tertio. Sed quod semiciontusa imposta carnem non secus exulceret, ac ignis, calidam ordine quarto re-
~~dius crediderim. Sunt qui Flammulam quæ in aris edendam parum aut accessionem præbeant, magno (vt ferunt) iu-
 uentur. Ischiadicis iuuat imposta. Alij eius oleum commendant ischiadicis, articulorum iliumq; doloribus, vrina angu-
 sty, & renum calculus, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus insundunt. Id autem præparant hoc
 modo. Flammula folia tenuissimè concisa in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, ac inde per astatem insolat
 obturato vase. Datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Sed vt iam ad Clematidum vires re-
 uertamur, ea de his subiiciam, quæ Galenus libro 7 simpl. med. adnotata reliquit. Clematidis folia, inquit, acrem & adu-
 rentem siue causticam facultatem obtinent, ad id vt & lepras excoriant. Fucrit itaque in quarti ordinis excalfacientium
 inuis. Vocatur autem clematis & daphnoides, quod quidam myrsinoides, alij polygonoides appellitãt. Caterum id nec ex-
 ulceratorum est, nec acre, sicut quod antè dictum est, immò profluuijs, & dysentericis cum vino potum prodest, dentium-
 que dolores mansum mitigat: tum vteri quoque doloribus in pello admotum, vsui est, tantum abest, vt perinde vrat, ac vl-
 ceret, cum illud superius. Sed summe nobis suspiciendus Pamphilus ille, sicuti in reliquis nugatur de iis, quæ nunquam vidit,
 utru ea mandans sic hæc ambo in vnum confudit. At Dioscorides vtriusq; in quarto meminit, & eius quæ simpliciter vo-
 catur Clematoides, idq; in fine libri, & alterius, sed in principio. Quamobrem necesse non est, me etiam describere species
 ambas, sicut nec in aris fuit: hæc Galenus de vtraque Clematide. Ex quibus palam est exulcerantis Clematidis caput ab a-
 liquo curioso ex huius quarti libri calce, vbi commodè inter aluum de ycientia medicamenta sibi locum adinuenerat, ex-
 emptum fuisse, & hic alteri Clematidi adiunctum, ob eam quam inuicem habent nominis conuenientiam. Prima Clema-
 tis Græci κληματὶς δ' ἀφροειδὴς appellatur: Latinis, Clematis, & Vinca peruinca: Italis, Clematide prima, & Prouenca: Nomina.
 Germanis, Singiten: Hispanis, Peruinqua: Gallis, Lyseron. Secunda verò κληματὶς ἑτέρα Græcè: Clematis altera Latinè:
 Lynen Germanicè vocatur. Italis, Vitalba porporea, At Clematis tertia, Italis, Vitalba. Flammula, nonnullis Flammula
 Iouis: Italis, Flammola.~~

Clematis ter-
 tia quæ Vit-
 alba.

Fuch. error.
 Flammulæ hæ
 stor. & vires.

Clematidum
 vires ex Gal.

Clematis quasi Sarmentaria, quod flagella vitigineis flagellis similia emittat, arboresq; scandat, quod nomen plurimis tribui potest. Verum alia humi serpit, alia arbores scandit, est denique mediæ naturæ: de quibus omnibus in nostra historia vniuersali. I. Clematis daphnoides minor, fortè Ægyptiaca Plinio C. B. Clematis prima, Matth. Clematis prima Dioscoridis, Anguilla. Clematis prima minor, Cast. Clematis, Cord. in Diosc. Lac. Turn. Clematis daphnoides, Fuch. Dod. gal. & fol. Lob. (qui an Centunculus Plinii sit dubitat) Thal. Tab. Cam. Clematis Ægyptiaca syluest. Gef. hor. Vinca peruinca, Brunf. Gef. hor. Lon. Lugd. Peruinca, Trago: Prouenca vulgo, Cæl. Chamaedaphne altera, Brunf. edit. germanica. Floribus est cæruleis, candidis, rubris. II. Clematis daphnoides flore pleno: à præcedenti tantum flore differt, qui duplicata foliorũ textura peramœna constat, & coloris est purpuro rubentis, ex sarmentis terra coopertis propagatur, cum semine careat. In Germaniæ hortis habetur ex Austria. Dicitur Daphnoides polyflora, Lob. Clematis flore multiplici, Cam. in Matth. Clematis maior flore duplicato, Lugd. Clematis purpurea Austria flore pleno, Cam. in suo horto. III. Clematis cærulea repens, C. B. Clematis altera, Matt. (in cuius compendio figura transposita, & sub clematide tertia habetur) Dod. fol. Cam. Clematidis alterius altera species, Dodo. gal. Clematis secunda flore purpureo, Cast. Clematis peregrina cærulea & purpurea, Lob. Tab. Pothos cæruleus, Lugd. Flammula, Cæs. Variat flore simplici, & pleno: colore est non solum cæruleo, sed etiam purpureo. IV. Clematis syluestris latifolia ad Arragene Theop. referenda, C. B. Clematis tertia, Matth. Cast. Thal. Clematis altera, Lac. Clematis altera prima, Cord. in Diosc. Clematis siue vitis syluestris, Cluf. hist. Panno. Vitis syluestris, Trag. Vitis syluestris caustica, Gef. hor. cui & Viburnum quorundam: Vitis nigra, Fuch. Turn. Lon. Vitis nigra secunda, Tab. Vitalba, Dod. gal. & fol. Cæs. Viorna, Ruellio & Lobelo. V. Flammula erecta, C. B. & Cam. Flammula, Matth. Cluf. hist. Pann. Lugd. Flammula altera, Dod. fol. Flammula frutex, Cordo in Dioscor. Flammula altera surrecta, Lob. Flammula Iouis, Tab. Clematis altera, Turnero.

Πολεμόνιον.

POLEMONIA.

CAP. VIII.

Polemonia, alii philetæriam, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, vtrinque pinnatis: folijs paulò quàm rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ, aut sanguinariæ proximis: quibus in summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radiculæ simili: nascitur in montosis, & asperis. Bibitur in vino radix contra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus vrinæ difficultatem, & coxendicum cruciatus: datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur.

alligatur. Tradunt eum, qui radicem gustauerit, à scorpione non feriri: eumq; si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

Polemonia
confid.

Quamquam ego plantam pluries vidi in altioribus, asperioribusq; vallis Anania montibus, *tenui & quadrangulari caule, utrinque pinnato: foliis effigie Nepetae, corymbis quadantenus dependentibus, nigro semine refertis, radice pro- longa, albicante, * que Polemoniam quadantenus pra se ferebat, cum tamen corymborum nota & alia quaedam Polemo- nia non essent, eius hic imaginem apponere non libuit. Caterum Brasauolus Ferrariensis eã censet esse Polemonia, quam nostrum Hetruria vulgus appellat Lauanese: alij verò Galegam, alij Rutam caprariam nominant. Quandoquidem haec e- mnibus fere notis scenum graecum refert, in cuius ramorum summitatibus cornicula dependent, in quibus semen recluditur subrubeum, non autem corymbi. Radix illi inest breuis. Nascitur lato solo, & plerunq; in scrobium marginibus, alijsq; vici- ginosis locis: non autem in montibus asperis, vbi nasci Polemoniam tradidit Dioscorides. Verum Fuchsius libro 1. de comp. med. eam Polemoniam putat esse, quam officina Ben album vocant. Sed ab eo planè dissentio, quòd hoc ramulus non sit v- trinque pinnatis: quòd corymbos nullos proferat, sed siliquam, vel calycem oimoidis modo: quòd denique non solum in montibus, & asperis proueniat, sed vbique, praesertim in pratis. De Polemonio differens Gal. lib. 8. de simpl. medic. facult. sic inquit: Polemonium quidam philetarium, quidam (velut Cappadoces) chiliodinamon: tenuium partium est, & deficcandi vim obtinet. Quamobrem quidam radicem eius cum vino ad ischiadicos, dysenteriam, lienemq; induratum potui exhibet.

Fuchsi opin.
Ben albū esse
Polemoniū.

Polemonii
vires ex Gal.

Nomina.

πολεμώνιο: sic Graecis, vt etiam Latinis Polemonium, & Polemonia nominatur.

Σύμφυτον.

SYMPHYTVM.

CAP. IX.

a Με. κλωνία
ἔχει ἐμπε-
ρῆ, λεπία φύλ-
λα, κεφάλω
ἡ ὡς θύμω. i.
Ramulos ve-
rò habet ori-
gano similes,
tenuta folia,
& capitulā ve-
lut thymus.
fca Car. cum
Ruellio con-
cordat.

b Meū. ὑπο-
κόρρυρον. i.
subpurpureā.
c Meū addit.

δασία. i. δέ-
sum.

d Meū. & Car.
ἔχει ἡ ὡς
ἑσ γωνίας ὁ
καυλὸς ἐξο-
χὰς ἴνας πα-
ρὰ τὰ μέγας.
i. habet verò
& caulis emi-
nentias quas-
dam iuxta
angulos ad-
haerentes.

Symphyton petraeon nascitur in petris a, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis, & † foliis thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulce, † saluam ciens: longa radice b, subrufa, digitali crassi- tudine. Decoctum in aqua mulsā & potum, pulmonis vitia purgat: sanguinē reicientibus, & renum malis ex aqua datur: ad dysenteriam, rubraq; sceminarum profluuia in vino decoctū: ad conuulsa verò & rupta, ex aceto mulso bibitur. Quin & comanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vulnera recēta, enterocelaq; conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & al- terum symphyton, quod aliqui pecton vocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem c, crassum, le- uem, angulosum, vt sonchi inanem: circa quem breui interuacante spatio, folia exeunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta: d caule secundum angulos quosdam striato, foliis tenuibus, ex alarū sinu pro- deuntibus: in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tam caulis, quam folia aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candida, viscosae: quarum est vsus. Tritæ, & potæ cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt: recentia vulnera illu- ta conglutinant: carnes quoque si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus praesertim sedis, cum senecionis foliis, vtiliter illinuntur.

I. SYMPHYTVM PETRÆVM.

*II. CORIS CÆRVLEA
maritima.*



Symphytum
petraeum.

Quamuis in nostris commentariis, quos multò ante tem- pore Italicè conscriptos edidimus, ingenue cōfessus essem me non antea adinuenisse symphytum primi generis petraeon cognominatum: id tamen postea reperi mense Septembris suis floribus emicans, longè à Goritia circiter viginti millia passuum, in latere magni mōtis Vipaci, paulò supra arcem, & deinde in alijs ipsius montis partibus, alijsq; Iapidia locis, praesertim eo tractu, qui vulgò Sclanis dicitur Gabernich, qui

& in monte illo eiusdem tractus, quem vocant S. archi Urbani, nullis prorsus deficientibus notis qua illi à Diosc. tribuuntur.

Est pro-

Est profecto planta, praesertim ubi floruerit, visu iucundissima, ita ut maxima cum voluptate ad se videndum viatorum oculos alliciat, argumento quidem quod etiam viribus polleat insignibus. Porro Symphytum alterum, quod secundo loco reddit Diof. nulli dubium est, quin ea sit herba, qua hodie passim CONSOLIDA MAIOR nominatur, qua etiam nonnulli herbarios Alu falso appellant. Quippe quod eius nota singula Diof. historia ad vnguem herere deprehendantur.

III. SYMPH. MAIUS, SIVE Consolidamajor.

*IV. SYMPH. MAIUS TUBE-
rosaradice.*



V. CONSOLIDA MEDIA.

*VI. CONSOLIDA MEDIA
caerulea alpina.*



Quorundam
errores.

Solidaginis
minoris, &
mediæ vires.
Consolida
minor.

Consol. med.
Pruaella.

Saniculæ vni
genus.

Saniculæ vi-
res Matthio.

Dentaria mi-
nor.

Dentaria ma-
ior.

Saniculæ
liud genus.

Auricula vifi.

Saniculæ al-
terius vires.

Hæc frequentissima nascitur in pratis, floribus non modò luteis, vt Diosc. inquit, sed & candidis & purpureis, eadem san-
facie, ac forma. Caterùm hallucinantur, meo quidem iudicio, qui Symphytum petraum putant eam esse plantam, nullo
non cognitam, quam officina CONSOLIDAM, & Solidaginem minorem vocant. Si quidem eam nihil prorsus Sym-
phyti petrei notis respondere, omnibus rei herbaria etiam mediocriter gnaris euentius est, quam vt à me indicari debeat.
Neque etiam statuendum censeo idem Symphytum esse eam aliam herbam, cuius folia auersa parte purpurascunt, qua ab
herbariis vulgò CONSOLIDA media nuncupatur, ab aliquibus verò Laurentina, & à Senensibus Morandola. Ve-
rum postquam in harum plantarum sermone incidimus, earum quoque hic attexere historias voluimus. SOLIDA-
GO itaque minor, quam Germani Prunellam vocant, caulibus exit quadrangulis, hirsutis, spithama longitudine: folijs
mentha proximis, ac etiam subasperis. Flores gerit in caulium, ramusculorumq; fastigijs spicatos, purpurascens, & quã-
doque candidos. Radix illi inest multifide capillata, vt in plantagine Prouenit in montibus, collibus, & fere vbiq;e. Cata-
rum qua media SOL'D.IGO à Rixotomis appellatur, rectius fortasse Prunella à Germanis dici potuisset à foliorũ colore.
Siquidem folia, que minori latiora & molliora sunt, auersa parte cyclemiris modo purpurea spectantur. Caulem edit pe-
dali longitudine, pilosum, quadrangulum, inangulũ. Flores mittit caruleos, qui partim inter folia, qua caulem ambiunt,
partim in cacumine spicata congeri prodeunt. Radix illi est vt alteri multifida, haud altè descendens. Nascitur in herbis,
& vineis, alijsq; in locis. Harum modò dictarum stirpium, et si nusquam, quod hæcenus inuenierim, meminere Greci, vt
Mauritani, ea tamen mirũ in modũ prodesse existimantur disruptis, fractisq; internis & externis corporis partibus. Idem
vtiliter datur foliorũ succi potandi ab alto deuolutis, ac etiã is, qui interna, intestina vè vulnera acceperint: nã, illa, si
vel exterius, vel interius illata, mirificè sanant. Tradidit re non nulli, qui verũ experimenta profitentur, Consolida median
vocatã potu sanguinis grumos in ventriculo, vel in alia corporis parte concretos dissolvere, & dissoluere. Illa verò folia re-
corũ succũ efficax medicamentũ esse prædicant vlcibus omnibus in ore manantibus, exedentibusq; ac etiam testũ, pudẽ-
dorũq; virilium, & muliebriũ. His omnibus facultatibus ea quoq; prædita est, quã Solidaginẽ minorem vocant, vt quidem
existimant. Etenim vbi vulnera glutinare, adstringere, & reprimere sit opus, minorem vsurpãt, quam etiã altera longè præ-
stantiorẽ esse sæpenumero cõpertum est. Recensetur præterea Germanis inter Symphyti genera quadã ipsis vulgari herba,
quam SANICVLAM appellant. Exit hæc folijs pentaphylli maioribus: radice candida, tã miro natura ipsius artificio no-
dulis, ac lacinis quibusdam laborata, vt non parum admirentur, qui tantum natura opus diligenter intuentur, atq; exa-
minãt. Nascitur in motilis, & vluosis locis. Radix glutinat, cohibet, roborat. His vtuntur in potibus ad enterocelas, quo-
tidie drachma pōdere ex vino austero diebus 40. continuis: præstat quoque & ad interna vulnera, præsertim ad ea, qua in
thoracis cavitatẽ penetrauerint, tũ etiã intestinorũ, ex aqua equiseti eodẽ pondere sũpta. Hanc quidã Dentariã minorem
vocat quod radices dentũ spectũ quãdam representent. Caterũ alia quoq; planta est, que quibusdã DENTARIA MAIOR
appellatur. nonnullis verò à πολλὰς, quod sine folijs proueniat. Nascitur hæc in opacis syluis, aut alijs vmbrosis locis. Gen-
nat primo statim vere. Quippe caules profert dõdrãtales, teneros, fragiles, succosos, Orobãcha amulos, in quo à medio ad sũ-
mũ flores exeunt in purpura albicãtes, & hirsuti, foliolis eiusdẽ ferè coloris in latere cõcomitantib; è florib; calyculi ornun-
tur, in quibus parũ cõcluditur semen, p. p. p. modo. Radice nititur albicãte, magna, succosa, fragili, cõpactili squama-
rũ cõgerie, miro sanè nature artificio elaborat: gustu est acerbis, amaritudine quadã concomitante. Adstringit, refrigerat,
& abstergit: deuorata verò soporẽ facit. Plura in vni per Saniculæ ostenduntur genera, quorũ vnum, quod aliquibus herbarys
AVRICVLA vrsi nominatur, folia fert plantaginis magnitudine, sed crãtiora, veluti sabarie vulgò vocata, lacinis etiam
magno artificio factis à natura. colore in albũ flauescẽte, caulẽ edit & flores primula verus vocata per omnia similes, odore
eximij. Radice nititur multifida, albicãte, Ellebori modo fibrata. Nascitur in altis & saxosis montibus, inter ingentia saxa.

VII. CONSOLIDA MINOR.

VIII. DENTARIA MINOR.




hæc genus copiosè nascitur in agro Goritiensi monte Saluatino. Refrigerat, siccatur, glutinat, cohibet. Potam herbam cum radicibus cæteris præferunt ad enterocelas, & thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia vulnera, tam inter sumptum in potionibus, tum herba ipsa deuorata, quam exterius illitum. Folia recentia vnâ cum radice tusa, atque supposita, non solum mensium abundantiam cohibent, sed vuluam mirum in modum concludunt. His aliam denique annuntiant Solidaginem, quam vulgus medicorum Consolidam regalem, & ipsi sua vulgari lingua Nittersporn vocant, quod sonat nobis Sperone da caualliere, & Latinis equitis calcar. Huic sunt caules cubiti altitudine: folia oblonga, tenuia: flores planè purpurei, magnitudine violæ: quorum basi corniculum eminet, antiqui calcaris effigie, vnde illi à Germanis inditum est nomen. Laudantur flores ad rubentes, & inflammatos oculos triti, & aqua rosacea illiti. Herba auxiliatur ar-
 10 alium citat. Verùm hoc Solidaginis genus magis, quantum equidem reor, Cuminum syluestre, quod à Dioscoride secundo loco describitur, representat, quam aliam quamuis plantam, vt superius in Cuminum commetatione diximus. Meminit v-
 20 tritum, & Symphyti Gal. lib. 8. de simpl. med. facult. vbi ita scriptum reliquit: Symphytam petraeam ex contrariis constat viri-
 30 bus: habet enim incidendi vim quampiam, qua collectum in thorace, & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam quã-
 40 dam contrahendi vim, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quedã nõ immodicè calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu incundum. Commanducatũ sitim extinguit, & arteria asperitates sanat.

Solidago re-
galis.

Solidaginis
regalis vires
Matthiolo.
Symphyti v-
triusque vires
ex Gal.

IX. DENTARIA MAIOR.

X. SANICVLA SIVE AVRI-
cula vrsi.



Porrò secundum omnium dictarum virium missionem, simul digerere abundè potest, simulq; corpora contrahere, & con-
 10 stringere: proinde enterocelis imponitur, & ad cõuulsa, & rupia cum oxymelite bibitur. Porrò qui ipsum in vino decoctum
 20 ad dysenteriam, & rubrum profluuium exhibent, vtuntur tanquam desiccante, & contrahente. Qui verò ad nephritin re-
 30 numve dolorem, t. inquam expurgante, & incidente. Symphytam verò alterum, puta magnum, similem dicto vim ha-
 40 bet: non tamen gustantibus dulce est, nec odorantibus odoratum, sed his sanè à modò scripto diuersum est. Cæterum quate-
 nus viscositatem quandam, & mordacitatem obtinet, Scilla simile est. Vtuntur eo ad omnia, ad que iam dicto: osiũ fractu-
 ras sanant radices, si contrite imponantur, & stricta fascia ligentur. Quod σύμφοτον αετρεζιόν Græci, pariter Latini Sym-
 50 phytiũ petraeum, & Itali Simphito petreo vocant. Quod verò σύμφοτον έτερον Græci, Symphytum alterum Latini appellat:
 Ital. Cõsolida maggiore: Ger. Wallwurk, siue Schwarzwurk: Hisp. Suelda maiore, & cõsuelda maior: Galli, Oreille d'af-
 60 ne. Cõsolida minor: Italis, Consolida minore: Ger. Brunellen. Consolida media, Hetruscis, Morandola, seu vt aliis, Con-
 solida Mezana, siue Herba Laurentiana. At Dentaria minor, siue Sannicula quinquefolia, Italis, Dentaria minore: Ger-
 manus, Berg Sannicel. Dentaria maior, Græcis Α φολλο, quod sine foliis proueniat. Auricula vrsi, siue Sannicula alte-
 ra. Italis, Orecchia de Orso. † Ne quis commoueat, quod nos sic folia adieciimus præter Ruellij, & Marcelli interpreta-
 tionem. Id enim ea ratione fecimus, quoniam in Aldino codice hoc loco φύλλα, hoc est, folia habetur. Tum verò quia folia
 thymi pulchrè illi herba quadrant, quam verum Symphytum petraeum censemus.

† Illud præterea hoc in loco adnotandum est, quod vbi communis lectio habet αὐτὸν ὀροειαντικόν, hoc est saluam pro-
 nocens, in Orbasio legitur σπυλικόν, quod est adstringens, quam lectionem magis probamus.

Symphytum à glutinandi facultate dictum, vnde & Consolida, duũ generũ Diosc. I. Symphytum pe-
 10 træum à Matth. propositum, etiam nomine & icone proposuere Lac. Lon. Lug. & Tab. quod non agno-
 uimus priusquã Doctor Nicolaus Agerius Argentinẽsis, in studio hoc insigniter versatus, apud Goritiẽ-
 ses collectam à se moneret: quare minimè cum Coride cærulea maritima confundendum, quod dubitã-
 ter in nostro Phytopinace suspicati sumus: manifesta tamen, vt monuimus, obueniẽte differentia in sa-
 20 pore,

pore, siquidem Coris amara sit & non adstringens: Symphytū verò hoc dulce & adstringens esse, gustus testatur. II. Coris cærulea maritima, herba est fruticosa, ex radice pro magnitudine plantæ crassa, longa, palmari, rubra, succo purpureo, quo aliquando panni infici solent, scate: ramulos plures palmares, partim erectos, partim repetes, firmos, rotundos emittit, quos folia ericæ maioris crassiuscula, amariuscula, plerūq; inordinata, desè cingūt: in ramulorū sumis quasi spicæ calyculis quinq; partitis, singulis macula nigris notatis, plenè: è quibus flores quatuor foliolis bifidis, quorū duo superiora maiuscula sunt, cōstantes, prodeunt, purpureo cærulei, rarius purpurei, amarissimi & elegitissimi & quasi perpetui coloris, ut in planta etiā ante 20. annos siccata, vegetus color appareat. Succedūt in calyculis nō nihil aculeatis, semina rotunda, pulla, tenuissimis glumis inuoluta. Hanc florentē, Maio mense frequentē circa Monspelū, & ad radices mōtis Ceti, & in maritimis, ramulis in arena latitantibus, legimus: & Martio mense Clus. in Hisp. 19 obseruauit. Coridis à Diosc. & Plinio propositi notas plures habet. Coris Monspeliaca, Aduer. Lob. Tab. Cam. Coris quorundā, Clus. hist. Hisp. III. Symph. seu Cōsolida maior, C. B. Symph. maius, Matth. Cord. in hist. Cast. Tab. Cam. Symph. magnū, Fuch. Dod. gal. & fol. Lugd. Symphyt. alterum, Lac. Cor. in Dietic. Symph. Lon. Turn. Symph. Alum seu Alus, Lob. Conf. maior, Brunf. Trag. Cam. Thal. Consolida vulgo, Cæs. IV. Symph. maius tuberosa radice, C. B. Foliis & caule prædictæ similis, sed minoribus, flore luteo, radice serpente & nodis quibusdā extuberantibus inæqualibus: in hortis Martio florens spōte prouenit in hac figura hirsuties neglecta est. Symph. tuberosum, Lob. Dod. fol. Clus. hist. Pann. Lug. Symph. radice tuberosa, Cam. in Matth. Symph. maius flore subluteo tuberosa radice, Eidem in horto. Conf. altera minor, Cæs. Conf. tuberosa vel nodosa, Cam. V. Consolida media cærulea pratensis, fortè Chamæcissos spicæ Plinii, C. B. Conf. media, Matth. Brunf. Fuch. Cast. Thal. Cum. Tab. Bugula, Dod. gal. & fol. Lob. Clus. hist. 19 Pann. Lugd. Prunella cærulea vel prior, Trag. Prunella, Lon. & Symph. mediū. Chamæcissus quorūdam, Lug. Chamæcissi alterū genus, Cæs. Arterica Pædect. Anguillaræ. VI. Conf. media cærulea alpina. Ex radice fibrosa caulis cubitalis, quadratus, striatus, leuiter hirsutus, inanis exurgit, quæ folia oblongis pediculis donata, angusta, trium vnciarū longa, per ambitū incisa, leuiter hirsuta, cingūt: flores galericulati, cærulei, è quorū medio filamenta quædā prodeunt, in cacumine quasi spica congesti sunt. In mōte Baldo prouenit. VII. Brunella (quod malo castrensi die Breune medatur) maior folio nō dissecto, C. B. Conf. minor, Matth. Cast. Conf. minima, Cam. Brunella, Brunf. Dod. gal. & fol. Lob. Prunella vulgaris, Trag. Thal. Prunella, Fuch. Lugd. Cæs. Tab. Cam. Symph. petræum, Lob. in icon. VIII. Dentaria Pentaphyllos, est enim & heptaphyllos, & triphyllos, & baccifera, C. B. Dentaria minor, Matth. Lug. Dentaria Matth. Pentaphyllos, Clus. hist. Pann. Dent. altera, Tab. cui & Dent. corallina altera. Dentellaria rubra, Lugd. Dent. minor 20 altera forte, Cæs. Viola Dentaria prima, Dod. fol. Conlloides, Cord. in hist. Thal. cui & Rhizocorallum. Saxifraga mōtana quinis foliis, Ges. hor. Sanicula alba, eidē, & Pulmonaria quorundā: Nemoralis alpina herbariorū Alabastrites, Lob. in icon. IX. Dentaria squāmata, C. B. Dent. maior, Matth. Lob. Lug. Cam. Dentaria Matth. Tab. cui & Crocodilea. Dent. absq; foliis, Cast. Dent. ἀουλλοc prima, Clus. hist. Pan. Anblatū, Cord. in hist. Dod. fol. Thal. Squāmata, Lon. Arachnida, Cæs. X. Sanicula (à sanandis vulneribus) alpina lutea, C. B. Sanicula siue Auricula vrsi, Matthioli Auricula vrsi siue Sanicula altera, eidem in compendio & Castor. Auricula vrsi Dodon. fol. Auriculavrsi prima, Clus. histor. Pannonic. Auricula vrsi seu Lupi, Cæs. Auricula vrsi floribus luteis, Tab. Cam. Lunaria arthritica, Ges. de Lunariis, in fracto & horto. Arthriticæ genus alpinum, eidem & Primula veris quorundam, Paralytica alpina Sanicula, Lob. qui Britannicam Anguillaræ statuit: Alisma seu Damasonium Dioscoridis, Columnæ.

O'x' 5' 156

HOLOSTIVM.

CAP. X.

Holostion quadrantalibus herba est, pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terram: foliis viticulisq; coronopo, aut gramini proximis, gustu adstringentibus: radice alba, præ tenui vlc; in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad ruptam vino pota: nam & carnes coguntur decoctionibus addita.

Holostij consideratio.

Quorundam error.

Pilosellæ descriptio, & vires Matthioli.

Tametsi, cum antea legitimum holostium nusquam vidissem, inclinabat animus ad credendum, holostium eam esse plantam Serpentinam Goritienibus appellatam, de qua superius lib. 2. in Coronopi mentione meminimus, * quod mirū in modū serpentium moribus opituletur. Hac siquidē herba est exigua, humi procubens, quæ foliis, calyculisq; coronopi modo exit, gustu adstringentibus: radice tenui, lignosaq;. Nascitur ipsa quoq; in collibus, ac etiam sabulosis locis. Ex huiusmodi que quispiam facile posset hanc herbulā pro Holostio habere: quamuis hoc ego pro certo affirmare non ausim*, attamen verū holostium, cuius hic imaginem expressimus, misit hoc anno mihi videndum excellentiss. medicus Alphonsus Pantius Ferrariensis, quo postea factum est, ut à priori desisterem sententia. Recensetur Holostium inter Symphyti genera. Sed haud dubitanter haud dubie qui credūt eam herbā esse Holostium quam PILOSELLAM vocāt. Siquidē tametsi hæc frequē nascatur in collibus, facie tamen à Coronopo & notis omnibus distat. Humi hæc perpetuò decumbit, radiantibus circumquaque foliis, iisq; oblongis, incanis vbiq; pilis obductis. Caules quibus humi repit, funiculi faciem representant. Sunt enim sexiles, tenues, teretes, & vbiq; hirsuta canitie scateantes. I. dum humi repunt, radices ex se mittunt, è quibus nouelle propagantur planta. Flores illi sunt aurei, stipato foliorum ordine, qui maturescentes in papposam lanuginem euolant: Radicibus nititur numerosis, tenuibus, sed humi pertinaciter inhaerentibus. Nascitur extenuato, & arido solo, & præsertim in collibus. Amarū lac secta planta mittit: id quod extenuatū atq; abstergentis indicium est facultatis. Totā Pilosella plantā vehementer adstringit, glutinat, cohibet, refrigerat, siccatur: quapropter huius rei non ignari pastores maximè cauent, ne orium greges in illis pascuis immorentur, vbi huiusce plurimū gignitur: quandoquidē depascentes oues tanta alui adstrictione efficiuntur, ut inde facile emoriantur. Hinc didicerunt medici, eā mederi dysentericus, & vteri profluuiis: quin & ex vino afferto potā vulnera glutinare, tã scilicet exterius, quàm interius, illatā, caliacisq; magno esse auxilio, & bitiosis vomitionibus: cruentu itē sputis, enterocelis, & omnibus in vniuersum fracturis opē ferre, sed præcipuè caluarie. Non desunt etiam recentioribus qui eam maximè commendent ad Iocinoris & splenis affectus, nepe ad regium morbū, incipientem hydroperum, & lienis tumores, quod viscera hæc roboret. Additur quoq; vtiliter in potionibus intrinsecorū vulnerum, & in vulnerum emplastris, atq; vnguentis: foliorū succus non solū recentia vulnera glutinat, sed vlcera quoq; contumacia, phagedæna quoque sanat: & præsertim oris, & pudendorū. Ceterū ut ad Holostium nostra redeat oratio, ingenuè fateor, nullā hæc hactenū plantam

I. HOLOSTIVM.

Juncus bulbosus

*II. HOLOSTIVM HIRSVTVM

albicans maius.*



Holistivires
ex Gal.

Nomina.

10
20
30
tam se mihi obtulisse, quae magis Holestium referat, quam ea, qua Serpentina, ut diximus, à Goritiensibus vulgò vocatur. Holestium (ut author est Gal. lib. 7. simpl. med.) desiccandi vim habet cum adstrictione: quamobrem ipsum adrupta potui exhibent. Quod Graeci Ολίσιον, Latini item Holestiū & Holestium dicunt: Itali, Holestio. Pilosella, Italis, Pelosella: Ger. Weusphohr: Gallis, Piloselle, seu Oreille de Rat.

Holosteum sine duritie est herba ex adverso à Graecis appellata, Plinio auctore: cuius plures differentias suo loco exhibebimus: quod hoc loco à Matth. proponitur, Graminei est generis, quod aliquando ramis est in terram reclinatis, aliquando verò erectis: quod Gramen ὑπὲρ γονεὶ κάυλον vocamus: Holestium Matt. Lob. Lug. Gramen iunceum, bufonium, Tab. II. Adieci mus & Holestei figuram cum in edit. Cam. Holostu quorundam nomine simile habeatur. Possit ad Plantagine referri. Ex radice longa, tenui, lignosa,

III. PILOSELLA.

IV. PILOSELLA MAIOR REPENS, minus hirsuta.

Ulex acuminatus



40
50
60
Ulex acuminatus pilosella

M m m 3 quaterni,

quaterni, quini, caules nudi palmares exeunt, circa quos folia crebra per terrā sparsa, angusta, plantaginis angustifolię minora, trium quatuorve vnciarū longa, incana, lanuginosa, subadstringentis guttus: florum quadrifolii (ex quorū medio filamenta aliquot prodeunt) ex herbaceo candidātes coronopo similes, sepe mutuò contingentes, quasi in spica summitatē cauliculorum ornantes: quibus succedunt theculę semen plantaginis simile continentes. Hoc in aridis collibus Salmanticę vicinis Maio florens Clus. legit: quod enim Monspessuli legimus, minus est prædicto. Vocatur Holoosteū hirsutū albicās maius, C.B. Holoosteum Salmanticū prius, Clus. hist. Hisp. Lob. cui maius dicitur: Holoostiū Salmaticense, Lugd. Cam. Holoosteum maius, Tab. Plārago angustifolia albida, Dod. in fol. III. Pilosella à copiosis quibus vestitur pilis, nomen sortita est: est maior & minor, quæ ad Gnaphaliū refertur: maior repens est & erecta: illa hirsuta, vel penę glabra: erecta, vel vulgaris vix hirsuta, vel Syriaca hirsutissimis foliis. Pilosella maior repens hirsuta, C.B. Pilosella, Matt. Lac. Lob. Cast. Tab. Pilosella maior, Fuch. Dod. gal. & fol. Lug. Pilosella media, Thal. Auricula muris, Bruf. Auricula muris minor, Trag. Lon. Auricula muris alia, Intybi minima species est, Cor. in Diosc. Pilosella vulgo, Cæsal. IV. Pilosella maior repens minus hirsuta, C.B. Huius folia & supernè & infernè læuia, glabra & virentia sunt, ad quarum latera lenissimi pili, cauliculus vnus aut alter rectus, palmaris, nudus, aut nullis, aut raris pilis donatus: modò vnū maiorem, modò binos ternosve minores flores luteos sustinens: cæteri cauliculi vt in præcedēti repūt, à radice rufescēte fibrosa prodeuntes. In herbosis aggeribus prouenit. Dicitur Auricula muris minor secunda, Trag. Pilosella maior, Cam. in Matthiolo.

ΣΤΑΒΗ

S T O E B E.

CAP. XL

STæbe vulgaris est notitiæ. Cuius semen, & folia stringunt: quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis imperus cohibent.

I. SCABIOSA MAIOR.



II. SCABIOSA MINOR.



Stæbes consideratio.

STæben Dioscoridis tēpore omnibus vulgò cognitam fuisse, illud maximo argumento est, quòd eam nullis prorsus nec repræsentauerit. Hinc certè nobis facessitur negotium, quòd minus scire possumus: quamam sit illa inter tot plantas, cuius nomina, & facult. ignorantur. Plin. lib. 21. c. 15. Stæben inter aculeatas herbas retulit (id quòd à Theoph. li. 6. c. 4. de plant. hist. mutuatus est) sic inquit: Quædam sunt herba. quæ spinas in folio habent. & in caule, vt phleos, quòd aliqui Stæben appellauerunt. Idem lib. 22. c. 11. Stæbe, inquit, quam aliqui phleon vocant, decocta in vino præcipuè auribus purulētis medetur: itē oculis ictu cruentatis: hemorrhoidi quoq; & dysenterie infusa: hæc Plin. Ex quibus equidem verbis plane asserere possum, Phleon, & Stæben eandem plantam esse. Hanc in Orchomeno lacu nasci semine placētaceo, & molli, colore rufescente, author est Theoph. lib. 4. c. 11. de plant. hist. Hinc itaque Matthæi Syluatici error manifestè deprehenditur, qui in suis pantheis Stæben eam herbam interpretatur, quam vulgus Scabiosam nominat: cuius, quòd sciam, nec Græci, nec Mauri meminerunt. Quanquam non desunt, qui Scabiosam eam esse cõtendant, quæ ab Aërio vocatur Psora: quam tamen nō nomine tantum expressit, nulla adiecta descriptione, ex qua aliquid certi constitui possit. Ceterum Scabiosam vocatā non esse Stæben manifestò demonstrant, quæ statim ex eius descriptione sequētur nota. SCABIOSA itaq; duas habet species, nempe Maiorē, & minorē, cuius plurimus est vsus. Crescit hæc folijs circa radicem per ambitū laciniatis, humi accubantibus, subalbicantibusq; oblongis & subhirsutis: verū, quæ in caule sunt, frequentioribus, tenuioribusq; incisuris diuiduntur: caulem mittit tenuem, rectū, teretemq; in quo rami oriuntur: flores habet foliosos, carulei coloris, aut pallidos, qui trāitu temporis deflorescentes, capitulum relinquunt subuiride, rotundis ocellis refertum, colore pauonum per nas imitantē, tanto sane natura

Matthæi Syluatici error.

Scabiosa.

Scab. minoris descript.

tura officio, ut diligenter rem intuentes in admirationem trahat. Radix est illi palmatis, ac fibrosa subcandicansq. Na- Scabiosæ ma-
 scatur in agris non cultis, secus itinera, & in collibus terrenis, sapore est amaro. Caterum quam maiorem nos Scabiosam ions descrip-
 volumus primo statim exortu folia profert longa, nullis in ambitu lacinijs, atque qua his succedunt Phu minoris modo dis-
 secta, etnuntur, quæ verò in caule, & ramis sunt, longè minora habentur, & magis laciniata. Caules gerit astate sesquicu-
 bitales, seretes, striatos, incanosque, qui circa cacumen suos fundunt ramos, in quorum fastigijs capitula oriuntur in acu-
 tum desinentia, compactili squamarum ordine contacta cyani modo, è quibus flores prodeunt ferè etiam similes sed sex pur-
 pura subrubentes) rufescentes. Hos denique sequitur semen paruum, & subnigrum, lychnidis coronaria simile. Radice niti-
 sur polli. ari crassitudine & saepe maiore, brachiataq, sapore subdulci, pastinaca proximo. Nasitur inter fruges, & in cam-
 pu non cultis, argillito præsertim solo. Quæ quidem nota maxime arguunt magnam inter Scabiosam, & Stæben interce-
 10 dère differentiam. Siquidem Stæbe folia fert aculeata, & in lacubus stagnis, paludibus, alysq, locis aquosis nascitur. Vnde
 Aristophanes comicus rectè in comædia ranas inter se loquentes adducit, quæ admodum letabantur, quòd totam consum-
 phissent diem inter cyperum & phleum saltantes. Caterum ut de Scabiosa quoque viribus agamus, sciendum est, quòd vtra- Scabiosæ vi-
 que excausat, extenuat, abstergit, aperit, digerit. Ideoque præstant ad expediendos pulmones & pectus à crassis, & pitui- res.
 tosis excrementis, cum ipsa herba in pulvere pota, tum succus cum melle delinctus, tum eius decoctum diebus pluribus hau-
 stum. Vnde quoque mirum in modum aduersus scabiem, vnde illi nomen: in quem vsus non modò eius decoctum quotidie
 potandum præcipiunt, sed & herba ipsius succo, per se aut in vnguentis addito, scabiosa corpora illinunt. Prodest omnibus
 pectoris vitijs, & respirationi in seruentibus organis: quippe quæ & eorum inflammationes purulentas disiciat, & omnia
 pectoris excrementa expurget. Folia cruda contusa, Anthracibus, siue Carbunculis pestiferis vtiliter illinuntur: adeò ut illita
 20 bus lethales abscessus trium horarum spatio prorsus abolere existimetur. Datur vtiliter Scabiosa succus quatuor vnciarum
 pondere, cum theriaca drachma, pestilentia affectus, prima statim die, verum subinde sudorem in lecto prouocare oportet, &
 iterum, atq, iterum medicamentum repetere. Id quod & præstat plurimum ad venenosorum serpentium morsus, quemad-
 modum & herba ipsa contusa, recèsq, imposta. Illitus Scabiosæ succus cum chrisocolla farina, & caphura momento, lenti-
 gines, varos & ceteras cutis infectiones abstergit, & oculorum albugines per se, & cum succo farniculi tollit. Peculiariter
 autem valent maioris Scabiosæ radices ad lichenosos, etiam si morbus à Gallica lue prouenerit. Siquidem earum decoctum
 30 sex unciarum pendere quadraginta diebus potum, vt ego mihi testis esse possum, præstantissimum expertissimumq, est ad
 hoc medicamentum. Idem præstat earundem radicum puluis quotidie drachma pondere ex sero haustus. Sed iam ad Stæbes
 vires redeamus, de quibus Galenus li. 7 simp. med. differuit his verbis: Stæbes fructus, & folia maximo sunt vsui, adstringen-
 di vim habentia mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente. Quamobrem decoctum
 eorum dysentericis inicitur, & auribus pure fluentibus, tum vulnera magna conglutinat. Euidentiùs hæc præstat cum vi-
 40 no atro castero: valenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates. Præterea folia viridia, si illinantur, vim ha-
 bent erumpentis sanguinis supprimendi: denique & oculorum ex icctu suffusiones illita iuuant. Quæ planta & in Græcis,
 similiter Stæbe Latinis, & Stebe Italis appellatur. Scabiosa, Italis, Scabbiosa: Germanis, Apostementtraut. Gallis Scabieu-
 se. At Scabiosa minor, Græcis Φόρα: Italis, Scabiosa minore: Germanis, Apostementtraut. Nomina.

*III. SCABIOSA OFFICI-
 narum.*

*IV. SCABIOSA ARGEN-
 tea angustifolia.*



Scabiosa, alijs à scabro herbæ habitus, quod vulgatè conuenit: alijs quòd scabiei medeatur, vltra viginti
 differentias obtinet, de quibus in historia: hic quinq; proponuntur. I. Scabiosa maior squammatis capi-
 tulis. C. B. Scabiosa maior, Matth. Lug. Cam. Scabiosa quinta, Trago. Scabiosa montana calidarum regio-
 ni, Lob. & Lug. Scabiosa maior flore purpureo, Tab. Cyanus syluestris maior aru. Ætis Thalyo. II. Scabiosa

* V. IACEA INCANA
Laciniata.*



capitulo globofo maior, C. B. Scabiosa minor, Matth. Lob. (cui & Columbaria) Cast. Lugd. Scabiosa minor laevis, Gef. hor. Scabiosa quinta & sexta, Trago. Scabiosa media, Dodo. Scabiosa folijs bellidis syluestris maioris, maior Thalyo: Scabiosa vigesima quae pro foemina habetur, Tabernamontano. Phyteuma Dioscoridis, Columnae. III. Scabiosa officinarum, quae hirsutissima est, cum adeo sit vulgata & notissima, omnibus in pratis & etiam inter segetes proueniens, iconem addere placuit, quam folijs modò tenuius, modò profundius laciniatis, floris etiam colore variat. Dicitur Scabiosae primum genus, Trago: Scabiosa vulgaris Fuch. Scabiosa communis, Dodo. gal. Scabiosa, Lacu. quoad descriptionem, Lonic. Scabiosa maior, Cast. Taber. Scabiosa altera campestris, siue segetum & satorum, Lobe in ico. Scabiosa aruenfis siue segetalis, Taber. Scabiosa folio scisso, Caesalpino. IV. Scabiosa argentea angustifolia. Ex radice lignosa, caules bini, terni, sesquipalmes, rotundi, parum reflexi, prodeunt: circa radicem folia quatuor & quinque vnciarum longa, angusta, graminea, albicantia, inordinate disposita, in superna caulis parte nulla: caulis vnicum discum orbiculatum planum sustinet, qui plures flosculos caeruleos vel pallidos simulq; factos, vna cum staminibus ex membranis calyculis prodeuntibus continet. In monte Sumano prope Vincentiam prouenit. V. Iacea incana laciniata, C. B. Haec ex radice crassa, lignosa, caulem profert palmarem angulosum, incanum, nudum: folia habet multa ad radicem per terram sparsa, lata, strabes instar laciniata, molli lanugine incana: flos vnus vel alter, lacee vulgari similis, ex capitulo squarroso prodiens, caulis summitate infidet. In montibus prope Capuam prouenit.

Κλύμενον.

CLYMENVM

CAP. XII.

αἰσχροτάτη ἰρι-
δι, καὶ πολυ-
πόδος πλε-
στάται, ἰ. ἰ-
μιλίβους ἰριδι
& πολυπόδῳ
cirris, ita Meū
& Catec.

Clymenum caulem fert fabae, quadratum: folia plantaginis: folliculis supra caulem sese inflexis, a vti in polyporum cirris. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur: qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coeliacos, rubraq; foeminarum profluvia, refrigerando infirmitat: sanguinem naribus erumpentem supprimit. Tota folia, aut siliquae recentibus vulneribus impositae, ea ad cicatricem perducunt.

CLYMENVM.



Clymeni con-
sideratio.

Ruellij, & Pli-
nij lapsus.

Nomina.

Si caules itemq; folliculi herba, quae Saponaria vulgo vocatur. Clymeni delineationi responderent, quemadmodum folia illi quadrare videntur, quippe quae plantaginis profusus referat imaginem, cum Ruellio vti que sentirem, fatererq; Saponariam legitimum esse Clymenon. At certe neq; caulis, quem rotundum profert, & per interualla geniculatum, neque flores illi quicquam ad stipulari deprehenduntur. Quamobrem quamquam herba Clymenum in Italia hodie referat, haecenus non satis conpertum habeo. Verum his non obstantibus plantam hic addere volui, alijs quoque contemplandam: nam cum caulem habere faba non absimilem, folia plantaginis amula, & folliculos supra caulem in sese inflexos, incuruosq; belle satis Clymenum imitari videtur. Hanc mihi dono dedit Iacobus Antonius Cortusius, nobilis Patavinus, cui id acceptum referre debent omnes rei herbariae studiosi. Hanc (vt Plinius memoria prodidit libro 25. cap. 7.) inuenit rex Clymenus, vnde & nomen herbae. Quo in loco idem Plinius clymeno perpetam illa omnia reddidit, quae Dioscorides periclymeno assignauit. Huius nusquam, quod inuenierim, meminit Galenus, sicut nec post ipsum Paulus. Planta haec xxij. v. ro. Graecè, quemadmodum & Latine Clymenum dicitur: Italicè, Climeno.

Clymenum Matthioli Castori, quo ad descriptionem, & Claf. hist. Pann. Lathyrum maiorem flore purpureo, seu Cicerculam Latinorum vocamus. Lathyrus syluestris siue Cicercula, Dod. fol. Lathyrus satius lathyrifolius

folius Lugd. Lathyrus syluestris latifolius, Camer. Lathyrus syluestris maior, Thial. Lathyrus latiere folio. Lobel. Cicercula, Czfalpino.

Περικλύμενον

PERICLYMENON.

CAP. XIII.

Periclymenon simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt, in quibus bacca hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus & quasi in folium procumbens, semen durum & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuolvens se adminiculis propter asidentibus. Semen eius postquam ematurus collectum, & in umbra siccatum, sidrachmæ pondere detur in uino, quadragenis diebus, lienem absumit, lassitudinem discutit: sed urinam ceter, statim a sexto die cruentam: orthopnæa, & singultui prodest partu accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita: quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatē facere produntur: perunctis ex oleo, febriū algore abigunt.

I. PERICLYMENVM.

II. * PERICLYMENVM

Germanicum.*



Unus qui Periclymenum perperam Caprifolium appellant: officina Matrisyluam vocant. nos vero quæd propinquas uincias plantas, vulgo appellamus Vincibosco. Caterum id potissimum nos ad credendum impellit, vulgaram Matrisyluam esse Periclymenon, quod non solum omnes huiusce ætatis rei herbaræ peritissimos in hanc sententiã deuenisse compererim, sed quod etiam ex notis, quas isti reddidit Dioscorides, ita esse cognouerim. Quandoquidem Matrisylua unico tantum caule fruticat, qui ex interuallis gemina tantum folia mittit, ipsum amplectentia, subcandida, hederaceaq;. Flos ei faba non dissimilis, candidus cum adoleuerit, in folium procumbens. Semen hederaceum, pradurum, & quod difficile euellitur, in surculu quibusdam conuexum, qui inter folia erumpunt. Constat præterea eius caulem, qui ab radice simplex assurgit, arbusculis & fruticibus mire sese conuoluere, vbi in sepibus, & frutetis nascitur, aded vt saepe tam pertinaciter inhereat, ligetque adminicula, vt in ea manifestum imprimat vestigium: vnde à nobis merito Vincibosco dicitur. Porro planè, mea quidem sententia, hallucinantur, qui Caprifolium, & Matrisyluam seu Periclymenum idem esse existimant: in quorum numero esse deprehenduntur Ruellius, & Fuchsius. In hunc autem lapsum hos fortasse deduxit Matthæus Syluaticus pandectarum auctor. Siquidem is suum Caprifolium Matrisyluam nominat, eam amen, vt subinde legitur, nil aliud Syluatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridi pyxantha, seu lycium, non autem periclymenum, de quo seorsum sub titulo Matrisyluæ Syluaticus ipse disseruit. Quod fortè non animaduertetes ij, Caprifolium, & Periclymenum idem esse putarunt. Ceterum Matrisylua in eorum vnguentorum vsum venit, quæ ad capitis vulnera parantur: namq; hac in re efficacissimum est medicamentu: quãuis è veteribus neminem hæctenus inuenerim, qui Periclymenon ea vi potèere, memoria prodiderit. Hanc etiam herbam commendauit Ioan. de Vigo clariss. chirurgus, ad crurum vlcera, quòd eam ad hoc (vt ipse inquit) vtilè esse tradiderit Gal. lib. 8. simp. medic. Veruntamen id non legitur in meo Galeno: nam loco citato Galenus de Periclymeno ita scriptum reliquit: Periclymeni tum fructus vtilis est, tum folia, aded uehementer incidentis, simul & excofacientis facultatu, vt si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant: principio quidem urinam tantum mouent, porro foris cum oleo illa excofaciunt. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est, drachma vnus pondus cum uino. Porro desiccatur quoq; semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnino bibentibus asserre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem præsumunt, vt Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam urinam cruentam reddi à sexto die memorat. Planta, quæ Græcis Περικλύμενον, Latinis quoq; Periclymenon dicitur: Italis, Matrisylua: Germanis, Geißblatt: Hispanis, Madresylua: Gallis Vincibosco.

Periclymeni confid.

Caprifolium & Periclymenum differunt.

Periclymeni vires ex Gal.

Nomina.

Periclyme-

Periclymenum, quod se ad miniculis conuoluat, triplex est: perfoliatum, non perfoliatum, & humile. I. Periclymenum perfoliatum, C.B. Lugd. Tab. Cam. cui & Italicum. Periclymenum, Matt. Lac. Cast. Periclymenum alterum, Dod. gal. Periclymenum perfoliatum calidarum regionum, Lob. Caprifolium Italicum, Dod. fol. Vinciboscum vulgo, Cyclaminus altera Diosc. Cas. II. Periclymenum Germanicum adpositum, cum ipsius apud eos vltus sit. Caprifolium, Brunf. Ges. her. Lon. Caprifolium Germanicum, Dod. fol. Periclymenos vel Periclymenum, Trag. Fuch. Dod. gal. (cui & Liliun inter spinas & Mater sylvia, Cordo in Diosc. (cuius Scholiastes addit Cyclaminum alterum, Vitim syluestrem & Periclymenum apud Diosc. idem esse) Turn. Ges. hor. Thal. Cam. Tab. Periclymenon non perfoliatum, Lob. Lugdunens.

Τριβόλος.

TRIBVLVS.

CAP. XIII.

Tribuli genus vnum terrestre, foliis ad effigiem portulacae, tenuioribus: viticulis in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, praeduris: iuxta amnes, & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiaris, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: foliis latis, & pediculo longo, caule pariter summa, quam ima crassiori: adiunt ei & capillamenta quaedam spicacea: semen durum, ab altero non horrens. Vterque refrigerantis, & inspissantis est natura: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat: vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillaeque, perfanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestri tribuli pota, illitave, ictos a vipera recreat: contra venena cum vno aptissime bibitur: decoctum eius sparsum pubes necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant virenti tribulo equos saginant: & e dulci semine, & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

I. TRIBVLVS TERRESTRIS.

II. TRIBVLVS AQUATICVS.



Tribulus terrestris

Tribuli consideratio.

Tribulus ter.

Ruell. error, Cacatreppola Tribulum faciētis.

Tribuli aqua in historia Matthioli.

Et si vnum duntaxat Tribuli terrestris genus descripserit Diosc. duo tamen genera a Theoph. redduntur lib. 6. ca. 5. de plant. histor. his verbis: Tribulo peculiare est, ut factum gerat aculeatum. Eius duo sunt genera: vni folium est ciuem, alteri aculeatum. Vt inque terrestre, & surculosum serius germinat, cui in foliis sunt aculei, magisque, hoc apud septa villarum erumpit. Semen praecoci sesame figura cernitur alteri, hoc est serotino, rotundum, nigrum, siliquis inclusum. Haec duo terrestris genera Theoph. Tribulum, cui folia portulacae Dioscorides assignauit, memini me vidisse Venetiis in maru litore prope diui Nicolai sacellum. At hunc, cuius hic figuram exprompsimus, Pisis misit ad me Lucas Ghinus Ferocorneliensis, medicus rei herbariae peritissimus. Ruellius Tribulum aculeatum Theophrasti eam plantam esse arbitratur, quam Hermetici vulgo vocant Cacatreppola, ea fortasse ratione ductus, quod prope torrentium, & fluminum ripas proueniat. Verum cum lateat nos foliorum effigies, qua a Theophr. illi tribulo non redditur, atque etiam constet hanc plantam surculos non mittere, neque siliquam ferre, in qua intus claudatur senes, cogor omnino a Ruellio dissentire. Nostrates seplasiarum huiusmodi melle, & saccharo condiunt, eryngij eas esse existimantes. Qua in re haud dubie illi falluntur, ut superiori libro inter ryngio ostendimus. Sed ad Tribulos redeamus. Aquaticum genus in plerisque Italiae fluminibus, & lacubus prouenit, praesertim in agro Mantuano, & Ferrariensi: neque solum in dulcibus aquis gignitur, sed etiam in mari. Hos tribulos Venetiis foro vendunt, quos marinos appellant, ut qui in lacunis illis vicinis enati inueniantur. Foliis hic prouenit latis, subrotundis, crassis, & auersa parte maculosis, nervosisque, & per ambitum serratis, praelongis, & crassis pediculis nitentibus: caulem edit crassum pinguemque, sed in summitate longe vegetiorem, quam ab radice. Radix illi longa, comantibus spicaceis capillamentis. Fructum profert nigrum castanea magnitudine, triplici armatum mucrone, vnde illi nomen, cortice membranoso, &

alba

*Abiatis medulla, gustu castaneis haud absimili, vulgus aquaticas castaneas vocat, & non secus ac castaneis eo in cibis v-
ritur. Quoniam qui u. d. in locis, e siccis tribulus in farinam redactis. per annonam inopiam agrestis plebecula panes par-
rare solet. perinde ac ex castaneis parantur. ab alijs. Sunt etiam qui eosdem tribulos sub cineribus assatos. pro beliaris ed. int-
er non parvo qui peregre proficiscuntur. verticillos faciunt. quibus suas preces entant. ceterosq. gestant, ut maiorem pra se
ferant religionem. ne dicam hypocrisim. Tribuli vtriusque facultates pers. inxit Galenus lib. 7. simplicium medicam. vbi sic
inquit Tribulus ex humida e. entia modice frigida, & sicca non mediocriter & ipsa frigida componitur. In terrestri tamen
superat terreum rigidum, quod & adstringens ostendimus: in aquatico vero aqueum. Propter vtrunq. itaq. & contra ple-
gmonam generationes. & omnino contra omnes influxus congruunt. Porro terrestri succus cum tenuium sit partium,
petus lapides in renibus comminuit. Τριβόλος χερσαίος sic Grauis, Tribulus terrestris Latine dicitur: Italis, Tribolo terrestre
Germanis, W. A. Elecklein: Gallis, Saligorz terrestres. Τριβόλος υδροΐος Graeco, Tribulus aquaticus Latine vocatur: Italicè,
Tribolo aquati. o: Germanice Wasserriß: Arabice simpliciter tribulus Hasach, seu Haserk appellatur: Hispanicè, Abroyos,
& Abrolhos: Gallicè, Castagnes d' Eau, Escarbotz.*

Tribuli vires
ex Gal.

Nomina.


† Hoc in loco ita equidem legunt vulgata Graeca exemplaria. sed Orib. lib. 12. itemq. vetustus Diosc. codex habent μαρμα-
ρα, qua voce Tribulum terrestrum viticulus longis repraesentant. Id quod etiam satis plantae pictura demonstrat.

Tribulus à triplici cuspidè in fractu aquaticae maxime conspicuo, alius terrestris. Alius aquaticus. I.
Tribulus terrestris folio Cicentis Theophrasti, C. B. Tribulus terrestris, Matth. Lacu. Cord. in Diosc. Ges.
hort. Lobel. Turn. Clus. histo. Hispa. Dod. fol. Castor. Lugd. Casal. Camerario II. Tribulus aquaticus ma-
ior, C. B. & Clus. hist. Panno. Tribulus aquaticus, Matth. Trag. Turn. Dod. gal. Cord. in Diosc. Ges. hot. Lac.
Lob. Lonic. Castor. Lugd. Casal. Tribulus aquatilis Dod. fol. Tribulus Lacustris, Cord. in historia.

Σαρξίφραγος ον. SAXIFRAGA. CAP. XV.

Saxifraga, alij saxiphragon alij empetron, Romani saxifragam vocant: frutex est surculosus. in pe-
tris, & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur:
stranguria prodest, singultum sedat, calculos vesicae frangit, & urinam ciet.

I. SAXIFR. VERA DIOS. II. SAXIFR. ALTERIVS SPECIEI.




Licet omnibus huius aetatis rei herbaria peritus satis superq. persuasum esse non ignorem, hoc Saxifragia caput Dioscoridi
illegitimum esse, quod Latina nomenclatura contra scriptoris more Graecè proferatur: tamen cum in omnibus fere Gra
eis exemplaribus habeatur, nihil sane vetat. quin & nos credamus hoc Saxifragia caput Diosc. esse legitimum. Sed secit de-
pnan. a huiusce loci lectio, ut non solum ego, sed alij quoq. dubitarint quam plantam legitimum Dioscoridis Saxiphra-
gon esse referre possit, quae epithymi faciem imitaretur. Verum cum postea reperti sint antiqui Dioscoridis codices, qui non
tribulibus, sed tribulis inscriptum habent, non magno sanè labore Saxifraga reperta est, cuius hic primo loco imaginem
sumus. Ea enim frutex est surculosus, in petris & asperis locis proveniens, adeo thymo similis, ut nisi gustatu fere ab eo digno-
ri nequeat. Habetur & aliud genus quod folia in caudiculis per intervalla gerit, parva, longiuscula, angustaq. vtrinq. sin-
gula unile amula, concomitantibus alijs longè minoribus, quae cateruatim eadem ex origine prodeunt: in cacumine tamen
numerosiora sunt, & angustioribus internallis distincta. Flores edit in summis caulis purpureos, odoris non iniucundi.
In eodem Roma inuenis agerem, memini me legisse sub capitolino monte, non longè à Templo D. Mariae virginis, quod Ita-
licè appellant La còso. atione, super lapidibus quibusdam magnis, qui è regione habentur. Duxerat me ad hunc locum Medicus
quidam, qui Saxifragam hanc amico cuidam meo iam senescenti aduersus renum calculum commèdauerat, ut vbi ille hac
herba vti veller. locum ipsum scirem, vbi reperiri possit. Sed ego tum temporis nihil de materia medica fueram sollicitus.
Hic tamen post haec superiuri anno ad me transmissa a Francisco Partino Roboretano, Casar. Ma. Camiliani secundi Archia-
tro: quin

Saxifragae et
sideratio.

Saxifraga al-
tera:

Pro: quinetiam ab alijs quoque amicis. Cit vrinam, calculos in renibus frangit & eicit, visum acuit, si edatur. Huius meminit Galenus libro, & cap. 5. de sanitate tuenda sic inquit: Iis vero, qui calculo laborant, etiam aliquid Betonice: & Ceph. quod in Gallis nascitur, est admiscendum. Vocant autem herbam eam Saxifragon. Hac ille: a quo suam quoque Betonice: eduxit Saxifragam desumpsit Paulus. Atqui preter hanc tria alia Saxifrage genera nouimus, qua frangendo: eduxit disq; renum calculis, plurimum prestare videntur. Primum illud est, quod nos antea Dioscoridis Saxifragam esse suspicauimus.

III. *SATVREIA MONTANA.* IV. SAXIFRAGIA III.



V. SAXIFRAGIA IV.

VI. SAXIFRAGIA MAGNA.



mur. No.

Nascitur hæc in magnis, ac durissimis lapidibus in Hetruria pluribus locis, aut suco, & admodum excreuato solo, folijs capillaceis epithymo non dissimilibus, præsertim Argentario promontorio in maritimo nostris. Inuenitur quinetiam in agro Goritiensi, quibusdam saxis emascens, iuxta Sontij fluminis ripam, qua Salicano rure itur Canalum. Sed aliquis fortasse obijciat hanc plantam non esse legitimum Saxiphragon hoc loco descriptum: quod ea nullis ferè notis epithymum repræsentet. Neque id quidem temerè obijciatur: etenim non video ego, quomodo Saxiphragon rectè epithymo assimilari possit, quod illud frutex sit surculosus, hoc autem tantum ab sit à frutice surculoso, ut videatur potius esse quoddam capillamentum. Idcirco facile adductus sum, ut scriberet codicem hoc in loco deprauatum esse: aut Saxiphragon frutex erit, qui folijs duntaxat epithymum amuletur, ut illa folia satis ostendunt, qua in hac planta, cuius imaginem hic expressimus, capillorum instar tenuissima conspiciuntur feniculi modo, sed longioribus, tenuioribus, & rarioribus. Caule pariter prodit feniculaceo, sed tenui, ac pumilo, umbella in summitate emergente: semine vulgaris petroselini amulo, sed longiusculo, & odorato. Radice albicante, pastinaca sapore. Tota planta subacris est, & subdulcis. Excalfacit, attenuat, aperit, prouocat, abstergit. Tota planta subacris est & subdulcis. Radix vrinam cieat, & menses quouis modo sumpta: visum acuit & obstructions iecoris reserat. Secundum genus folijs est vulgare terrestris hederæ, minoribus tamen, & circumquaq; laciniatis, humi accubantibus. Caulem profert tenuem, rotundum, rectum, pilosum, cubito minorem, à quo rari oriuntur ramuli, in quorum summis partibus flores panduntur candidi, ocnoidis amuli: hi paulò post flaccescentes, nullum post se relinquunt semen. Radix illi est tenuis, in pluribus diuaticæ capillamentis: inter quas granula quedam rotunda, coriandri seminis magnitudine habentur, & ipsa quidem amara, albicantis & purpurascens. Hæc non desunt, qui credant huiusce plantæ esse semen, tum quod planta nullum in caulibus semen gerat, tum quod sata radicum grana perinde ac semen nascantur. Mira sanè planta natura, quod semen in radicibus gerat. Excalfacit, extenuat, aperit, abstergit, & expellit. Herba, & radicis decoctum ex vino albo meraco paratum, rennum calculos frangit, & educit, vesicam abstergit, & vrinam prouocat: efficacius tamen si ex eodem decocto radicis granosa farina drachma pondere propinetur. Quinetiam datur eadem farina per se ex vino duarum drachmarum mensura. Atqui felicius hæc potio sumitur, dum affecti in labro balneo se fouent. Reperitur hæc herba desinente iam vere, aut æstate inchoante, & præsertim mense Maio, arido, & exoluto solo inter saxa, aut sabuloso tractu. Tertium autem, quod ego cum à forma, tum ab effectu SAXIFRAGVM maius appello, mihi missum est Verona à Francisco Calzolario Pharmacopæo, & rei herbaria studiosissimo. Id in Monte, quem Baldum vocant, nasci, & ex viuo, ac durissimo lapide prodire scribit, & antiquis urbium manijis. Frutex est caule lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, densis, ac rimosis surculis, ipsisq; tenuibus stipato, subalbicante exterius libro: folia fert exigua, oblonga, in acutum desinentia: flosculos edit albos, & calyculos pallidos, ocnoidis modo, ore circumquaq; serrato, in corona modum, sed admodum pusillos, in quibus semen continetur rubrum, papauerino minus. Radix in petris adeò pertinaciter concluditur, ut euelli nequeat nisi mucronatis ferramentis. Mirificè tota planta calculos comminuit & expellit. Miris laudibus hanc plantam mihi commendauit Calzolarius ad calculos rennum educendos, & ut re ipsa id mihi quoque constaret, misit is ad me numerosos calculos, quorum plures saba magnitudinem superabant, qui huiusce plantæ potu eiectioni sunt ex vno tantum ciue Veronense, Hieronymo de Tortis nomine, quos adhuc apud me ad spectaculum seruo. Caterum id magis me in admirationem ducit, quod aliquot inter hos spectentur, qui è vesica potum, quam è renibus expulsi videantur. Herba ipsa iam apud me copiosa est: verum hæcenus nullum eius periculum feci. Caterum sunt & alia herbarum genera, quæ sub Saxifragæ nomenclatione vulgaribus demonstrantur, nempe Trichomanes, Adiantum, Asplenium, Filipendula, Massiliense seseli, Pimpinella quæ hircum redolet, & alia plures herba: quæ ideo Saxifragæ nomine insigniuntur, quod omnes vrinam cieant, & calculos frangant pellantq;. Planta quæ Græcis σαξίφραγος (Saxifragos) & Latinis Saxifraga, & Italis Saxifragia nominatur. Germanis, Steimbred: Gallis, Perce pierre. † Quæ in primo impressi sunt Græci Dioscoridis codices, non hic, sed in fine separatim scriptum habent hoc caput de Saxifragæ, inter cetera relatum, quæ in hoc authore adscititia censentur. Hoc dictum sit, ut omnibus constet, illud non solum Latine, sed etiam Græcè scriptum reperiri.

Saxifraga quarta.

Saxifraga maior.

Saxifraga in totis vites.

Planta Saxifragæ dictæ.

Nomen

Saxifragæ nomen diuersis plantis ab effectu conuenit, hoc loco quinque species Matthiolus proposuit. I. Satureia spicata, quæ duplex est in Italia, foliorum latitudine solum differens: Iuliana etenim quæ primo loco pro Saxifragia posita, angustissimis est folijs: altera verò quæ Romæ & Neapoli in tectis & parietibus prouenit, latioribus est folijs: quam forsitan pro secunda proposuit Matthiolus, cui Cameraarius in suo Matthiolo Satureiam duriorē substituit. Dicitur prima, Saxifragia vera Dioscoridis, Matthiolo & Lugd. quo ad iconem. Saxifragia prima, Castori. Thymbra S. Iuliani, siue Satureia vera, Aduer. Lob. Thymbra vera, Lugd. Taber. II. Saxifragia alterius speciei, Matth. Saxifragia altera, Castor. Lugdunens. Saxifragia Matthioli, Tabernæ. III. Satureia montana, C. B. Thymbra Dodonæo gallico & folio Cord. in Diosc. & hist. (cui & syluestris Satureia) Taber. Lugd. Thymbra agrestis, Gef. hor. Satureia siue Thymbra altera, Lob. in icon. Satureia altera, Lacu. Satureia durior, Lugd. Satureia hortensis, Lob. Cæsal. Saxifraga secunda, Camerario in suo Matthiolo. Hæc à radice lignosa plurimos ramos tenues foliosos emittit, folia duriora quàm Satureia vulgaris & minorâ, aliquando tamen latiora, aliquando angustiora, pro ratione loci natalitij, flores habet albos Satureia: totaq; plâta Satureia viridior. Prouenit in montibus Italiæ, non longè etiam Monspelio: Hyssopum verum Guilandinus nominabat in horto Patauino natam. IV. Peucedanum minus. C. B. Saxifragia tertia, Matth. Lugd. Castor. Saxifragum, Lacu. Peucedanum Pannonicum, Cluf. hist. Pann. V. Saxifraga rotundifolia alba, C. B. Saxifragia quarta, Matth. Castor. Saxifragia maior. Brunfel. (& Saxifragia) Fuch. Lacu. Saxifraga alba, Trag. Fuch. in icon. Dodo. gal. & fol. Gef. hort. Lugd. Thal. Tab. Cam. Saxifraga alba Chelidonides, Lobel. Saxifraga, Lonic. Thelygono affinis herba, Cæsalpino. Hæc præter granula quæ ad radicem plurima, quibus propagatur, etiam semen minutum copiosum in vasculis oblongis continet. VI. Caryophyllus Saxifragus, C. B. Saxifragia magna, Matth. Lobel. Lugd. Camer. Saxifragia quinta, Castori.

Λεμόνιον. .LIMONIVM. CAP. XVI.

Limonia folia habet beta, tenuiora, & longiora, decem, & sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis, cæliacisque prodest: rubra feminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis, & palustribus.

Nomen Prouenit

I. LIMONIVM.

II. LIMONIVM ALTERVM



Limoniij con-
sideratio.
Behen rubrū
offic.

III. PYROLA.



Pyrolae histo-
Matthiolo.

in eorum sententiam haud concedam, qui PYROLAM herbam, quam Germani vocant Wintergrün: Limonium genuinum faciunt. Quippe folia pyri modo subrotunda, vnde illi nomen, paruaque & natale solum non conuenit Pyrolam esse Limonium: Siquidem oritur hac haud humectis, aut palustribus locis, sed in montibus, vmbrosis, & in syluis, folio pyri minore, robusto, & perpetuo virescente, caule spithama longitudine, tenui teretique, in quo per interualla flores spectantur candidi, stella figura, capillamentis numerosis e medio emergentibus, vt in rosa. Radix

Prouenit Limonium, nullis prorsus reclamantibus notis, cum innumeris ferè platis, in paludibus qua Timani fontibus irrigantur, ac etiam Tergestino tractu. Hæc autem plantam seplasia falso Behen rubrum appellant, quam si quis diligenter expendit, eam ni fallor, inueniet omnibus notis Limonio adstipulari: vnde cogetur fateri, aut hanc verum Limonium esse, aut saltem eius genus. Siquidem herba est (vt imagines dua, quas hic damus, aperte demonstrat) folijs breuioribus & longioribus, dactylis, & saepe pluribus: caulibus item tenuibus, in quibus semen rubrum, quod gustatum edstringit: Radix est illi vegeta, rubraque. Præterea in pratibus, præsertim vliginosis, & palustribus prouenit. Addam etiam quod experimento compertum est, Behen hoc adulterinum præditum esse facultatibus & viribus, quas Limonio redderunt Dioscorides & Galenus. Quare non temere mesurum putauit, si pro vero Limonio huic eas plantas depictas exhiberem, qua in officinis Behen rubri nomen perpetuo acciperunt: quod mihi iam persuasum sit (vt in glandis vnguentariae commentatione dicitur) eas planè Behen illud ementiri, de quo à Mauritanis mentio facta est. Plinius libro 20. cap. 8. Limonium syluestrem betam vocari tradit. Sed huius, vt in Beta notauimus, refragatur Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, vbi se nullam vnquam syluestrem itam nouisse scribit: nisi quis pro ea rumicem accipiat. Atque adeo hinc colligamus licet, Limonium esse per se genus betae cui tametsi caulis nota, qua in Ben rubro vulgari habentur, non omnino adstipulentur, cum tamen cetera Limonio deesse respondeant, & vires eadem sint, manebo ego in sententia, quousq; nouus aliquis appareat rei plantaria indagator, qui aliam vobis plantam demonstrat, qua legitimum Limonium a Dioscoridis notis omnibus magis præ se ferat. Interim autem

ca naitur subalbicante, haud altè descendente. Vis illi est exiccare, adstringere, & agglutinare: quo fit, vt ad vulnera glutinosa plurimum praestet vñum apud Germanos. Namque nò solum illa folia, aut eorum succus vnguentis vulneratys adhibetur, aut per sese recentia vulnera sanant, sed etiam eorum decoctum ex vino potum, ea quoque curat, quae in thoracis carnitatem, in viscera, aut intestina penetrarint, quare additur commodissime vuln. rar. potioribus. Mirum sane vis est in huiusmodi potioribus. Parantur enim non ex hac sola planta, sed ex multis alijs ex vino, & aqua simul decoctis, nempe ex Pyrola ipsa, Alchimilla, Betonica, Fragaria, Equiseto, Agrimonia, Caryophyllata, Tormetilla, Vinca peruinca, Pimpinella, quam Sanguisorbam vocant, Pilosella, Vinca aurea, & Symphyti maioris & Rubia radicibus. Eiusmodi enim potioribus videt ego cum Thoracis, tum intestinorum vulnera sanari, quae lethalia, & nullo prorsus auxilio curari posse censebatur: quo fit vt haec chirurgis gratia esse debeant. Limonij vires memoria prodidit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Limonij semen vtpote austerum, coeliacis, dysentericis, & sanguinem spuenticibus cum vino exhibent. Iuuat & ad profluuium muliebri. Satis autem est acetabuli mensura. Quod Graeci λειμωνιον, Latini item Limonium dicunt: Itali, Limonio: Officina falsò Behen rubrum. At Pyrola, Italia, Pirola, Germanis Wintergrün.

Pyrolae vires Matthiolo.
Vulneraria pouo mirifica.
Limonij vires ex Gal. Nomina.

Limonium, quod ἐν λειμωνίῳ in pratis proueniat, est maius, minus & laciniato folio. I. Limonium maius, C. B. Limonium, Matth. Lacu. (cui & Been rubrum) Castor. (cui & Caprinella) Lugd. Cæs. Limonium primum, Taber. Camer. Been rubrum, Limonio seu Bistorta cognata, Ges. hor. Valerianae rubrae similis. Dod. fol. II. Limonium alterum Matthioli quid sit ignoramus, cum sequuntur Lugdun. & Tabernmontanus & nomen & figuram referuantes. III. Pyrola vulgata rotundifolia, C. B. Pyrola, Matth. Brunf. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. (cui & Beta syluestris) Ges. hort. Lon. Lobel. Castor. Lugd. Cæs. Tab. Pyrola vulgaris, Clus. hist. Pann. Pyrola minor, Thal. Limonium syluestre, Trago, Limonium, Fuchs Turn. Lonicero. Altera est amplo & molli, altera minore & duriore folio.

Λαγόπυρος. LAGOPVS. CAP. XVII

Lagopus herba fistit aluum in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur in inflammatione. Nascitur in segetibus.

† Meū & Ca
ἐν παρασίαις
i. in areolis.
Lagopi confu
deratio.
Syluatici opi
nio explorat.

Sane tam paucis Lagopum perstrinxit Dioscorides, vtpote qui ne vllam quidem eius imaginis notam designauit, vt arduum aequè atq; difficile sit asserere, quinam statuendus sit in tam ingenti plantarum multitudine, quorum nulla apud homines extat cognitio. Caterum Mattheus Syluaticus parum rectè, meo quidem iudicio, tradidit Lagopum eam esse herbam, quam herbariorum vulgus Caryophyllatam appellat: quandoquidem hac non gignitur in segetibus, sed in montibus, & in vñ, iuxta septa, quòd mirum in modum sepibus opacari gaudeat. De hac veteres, quod sciam, nihil memoria prodiderunt. Nisi fort. asse fuerit Geum à Plinio descriptum lib. 26. cap. 7. cui radículas reddidit tenues, nigras, & bene olentes. Porò CARYOPHYLLATA planta non est vulgaris, neq; viribus inefficax, argumento quòd eius radices manifestè caryophyl-

I. CARYOPHYLLATA. II. CARYOPHYL. MONTANA.



li spirent odorem: vnde illi nomē. Ea folia fundit subaspera, hirsuta, tripartita, duobus etiam longè minoribus eodem in pediculo auricularum instar posteriori parte adnatis, omnibus tamen per ambitum laciniatis: caule est ramoso, rotundo, haud crasso, septicubitali, geniculato, subasperoq; floribus aureis pentaphylli amulis, villosis succedentibus inde capitulis, in quibus semen continetur. Radicibus nititur copiosis, tenuibus, subruis, Caryophyllorum odorem spirantibus. Nascitur secus viciniam agrorum, & hortorum sepimenta, & opacis potius locis, quàm à sole illustratis. Radix, cuius est vsus, exalfacit &


Caryophyllae vires
N n n 2

Caryophylla montana siccat, aperit, & roborat. Est & alterum CARYOPHYLLATAE genus montanum, quod à me repertum est in Bohemia in monte quodam Bohemico Carconio appellato, ex quo Albi fluvius suam ducit originem. Folia hoc gerit alterius crassiora, crispiora, hirsutioraq; plura ab una radice prodeuntia, longisq; pediculis inhaerentia, tactu subaspera, & circumquaq; latantia, & hinc proceduntia. Caules edit tenues, haud ut in comitum brachiatos, in quibus parva, sed rara folia spectantur. In caulis summitatibus vniustantam flos emicat, visu iucundus, & triplo fere maior quam in vulgari: aureus color est, qui tandem flaccidus, pinnatum efficit visum, magno natura opificio. Radice nititur spithama longitudine, & minimi digiti cras, subaequali haud in altera fibrata, rufo colore, odore Caryophyllorum, & gustu adstringenti. Praesertim longe valentioribus facultatibus, quam vulgari. Sed de Caryophyllatis haecenus. Quarum gratissimus odor aliam multam plantam reuocavit in mentem non minoribus fortasse viribus insignitam, CORTVSAM hanc appellare libuit, quod

Cortusa herba.

* III. CARYOPHY. AQUATICA. *

IV. CORTVSA.



Cortusae vires.


Lagopi histic & vires.

Lagopi vires ex Gal. Nomina.

CORTVSO viro optimo, primum haec planta reperta sit. Prouenit haec folijs fere vitiginis, sed longè minoribus, subrotundis atq; subasperis, adstringenti quadantenus sapore, & longis nitentibus pediculis. Caules edit tenues, rectos, glabrosq; foet nullis refertos, sed qui in caeruleo magno natura artificio flores gerant, extrema parte purpureos, intima vero aureo fulgore splendentes, aureisq; staminibus intus refertis. Radicibus nititur nitentibus, tenuibus, ac prolixis. Est etiam qua violaceo, & qua candidos flores gerit, sed prima frequentior. Nascitur locis vmbrosis nunquam à sole illustratis, cretaceo, & albicante solo. Nasquam haec planta ab eius inuentore CORTVSO visa est, praeterquam in agro Vicentino, in eo tantum vultu quem vulgò appellant Valle Stagna. Tota planta dum recens est gratissimo spirat odore, mellis fauis fere simili, sed longè admodum gratiori, ac vehementiori: sed in sicca odor, qui subtilium est partium, euanescit. Expertum est valere hanc plantam ad mulcerantium nervorum & articulorum cruciatum à quacunq; causa exortos. Nam ipsius floribus in Amygdalino oleo recter presso, & rosaceo, quod completum vocant, pari pondere commistis, diu insolatis, sit ad hoc medicamentum praestantissimum, vbi egelidum illinatur. Nec ambigo quin tota cuiusque Caryophyllata (ut ad eas redeat oratio) planta adstringere ac roborare, & vulnera, vlceraq; sanare valeat. Ea recentiores vtuntur pota ad thoracis interna vulnera. Quin & eius succum admixta arugine, cuniculosis, contumacibusq; vlceribus vtiliter inungunt. Eadem olfactu vitales spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. Earundem paluis epotus prodesse celiacis, dysentericis, faeminarum profluuijs, & cruenta exuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ei excalfaciens, & exiccans, vt manifestum sunt indicio eius radices: quippe qua gustu odorata, adstringentesq; deprehendantur. Quibus qualitibus non modo attenuare, discutere, & adstringere valent, sed etiam roborare. Sed, vt ad nostrum institutum reuertamur, Germanorum vulgus Lagopum appellat herbam, qua folia habet trifolio similia, oblonga: caulem tenuem, rotundum, hirsutumq; semina in paniculis paruis muscosis, lanuginosisq; & tactu mollibus, perinde ac leporini pedes, cui non obscura adstringendi virtus est. Nascitur haec quidem in segetibus, verum an ea legitima sit Lagopus non ausim affirmare: nullus enim, quod sciam, Lagopi faciem representauit. Dantur Lagopi huiusmodi folia, quinetiam panicula, & semen in farinam trita, contra dysenteriam, & ceteras alui fluxiones, contra biliosas reiectiones & celiacos affectus ex vino austero, aut succo Punici mali. Vniuersa planta decoctum, additis malua folijs è dulci vino paratum, datur vtiliter ad vesicae morbos, & praesertim ad vitae attores. Semen auxiliatur cruenta exuentibus, particularum cinis illitus haemorrhoidales fluentes sistit. Sunt qui lagopi paniculis vtantur ad abstergendam dysentericorum sedem, putantes inde fluxionem cohiberi. Lagopi vires scriptas reliquit Galenus lib. 7. simplic. medic. his paucissimis verbis: Lagopus facultatis est desiccantis, adeo vt fluxus alui probe exiccet. Haec planta nomen Graecum λαγώπιον, pariter & Latinum Lagopus, sine Pes Leporinus: Italis, Lagopo, seu Pie di Lepre. Caryophyllata. Italis, Garofanata: Germanis, Benedikten Wurk: Gallis, Benoiste, Calliot, seu Resite. At Caryophyllata montana, Italis Garofanata saluatica.

Caryo-

V. LAGOPVS SIVE PES
Leporis.



Caryophyllata ab odore radice, quem Vernali tem-
pore spirat. I. Caryophyllata vulgaris, Geum Plinij
fortè & Argemonia thus redolens, C.B. Caryophylla-
ta, Matth. Fuch. Dod. fol. Gef. hor. Lacu. (cui & Chry-
sogonum) Castor. Lugd. Thal. Taber. Caryophyllata
vulgaris, Lobel. Clus. hist. Pann. Camer. Caryophyl-
lata, Brunfel. (cui & herba benedicta) Trag. (cui &
Nardus rustica & Sanamunda) Dod. gal. Lonic. Bene-
dicta, Gef. hort. cui & Geum urbanum: Geum, Turn.
Gariofilato vulgo, Cæfalpino. II. Caryophyllata
alpina lutea, C.B. Caryophyllata môtana, Matth. Do-
do. fol. Lugd. Taber. Caryophyllata montana secun-
da, Clus. hist. Pann. Caryophyllata maior rotundifolia
Lobel. Caryophyllata alpina, Cam. Gariofilatæ alter-
rum genus montanum, Cæf. Geum alpinum & quar-
tum, Gef. de hortis. III. Caryophyllata aquatica, C.
B. & Camer. in suo Matthiolo. Caryophyllata monta-
na tertia, vel Geum aquaticum Gesneri, Clusio histo.
Pannonica. Hæc radicem habet: dodrantalem, fibro-
sam, digiti crassitudine, purpurascens, amariuscu-
lam, vix odoram: caules sesquipalmes, leuiter hirsu-
tos: circa quos folia vulgaris Caryophyllatæ: flores in
summo caule ex pediculis dependentes reflexi, cam-
panæ figura, pallidi, subpurpurei, qui aliquando foli-
orum textura multiplici elegantes, magis rubentes,
aliquando sanguinei, quibus quina aut sena folia her-
bacea, subijciuntur: his succedunt capitula, villosa quàm
in vulgari maiora, semen continentia. Locis humidis
prouenit. IV. Sanicula montana Cortusa dicta, quod
nomen propter authorem, qui etiam ad nos plantam
misit, referuare placuit, C.B. Cortusa, Matth. Castor.
Lugd. Camer. Caryophyllata Veronensium flore Sa-
niculæ vrsinæ, Lobel. Sanicula montana altera, Clus.

hist. Pann. Sanicula alpina, Taber. V. Trifolium spicatum humile, Lagopyron Hippocrati, C. B. Lagopus
(sive pes leporis) Matth. Trag. (cui & Lotus campestris) Fuc. Turn. Dod. gal. (& Trifolium humile) & fol.
Lacu. (cui & Trinitas) Lon Lobel. Lagopus maior, Cæf. Lagopus minor, Camer. Lagopus vulgaris, Lug.

Thal. Lagopodium, Taber. Leporinus pes, trifolij spe-
cies Cordo in Dioscoridem.

MEDIUM SIVE VIOLA
Mariana.



MEDIUM. CAP. XVIII.

Medion a in faxis, & opacis nascitur, folia habet i-
ridis: caulem tricubitalem, & in eo florem gran-
dem, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto: ra-
dicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo.
Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros men-
ses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sum-
pto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

Medion in Media duntaxat nasci quibusdam proditum est:
quod si ita se res haberet, mirum profecto non esset, si non
proueniret in Italia. Sunt qui eius folia insubo similia faciant,
non autem iridi, vt communis habet lectio, quibus etiam Ori-
basius adstipulatur. Et certe facilis potuit esse libratorum la-
psus, vt qui vocabulorum affinitate decepti ipsi, pro cypis in
Dioscoride scripserint. Hac itaque Oribasijs autoritate fretus,
plantam imaginem hic appingi curavi, quæ belle satis MEDIUM
representare videtur. Siquidem non solum aridis, saxosis, & o-
pacis nascitur locis (vt vir optimus Iacobus Antonius Cortusus
testatur, qui ad me hanc plantam misit) sed folio est intubi, cau-
le procero, floribus grandibus, & semine paruo, Cnici haud absi-
mili. Medij facultates tradidit Galenus libro 7. simplicium me-
dicamentorum, sic inquit: Medij radicem contra atque semen
ipsum, temperatam esse contingit: nam illa quidem austera est,
& fluxiones cohibet cum alias, tum profluum muliebri quod
vocant. At semine tantum abest, vt tale quid efficiat, vt etiã men-
ses creat, vt pote quod tenuium partium, & incidentis est facul-
tatis. Vt Græci hanc plantam μέδιον, ita etiam Latini Medi-
um vocant: Italis, Medio, nonnullis Viola mariana.

a Vtrunque
excm. èy
πέδ' εστ. in
petrosis.

Medij consti-
deratio.

Dioscorid. re-
stitutus.

Medij vires
ex Gal.

Nomina

Campanula mediana, herb.

Nnn 3. Viola

Viola mariana, C.B. Medium siue Viola mariana, Matth. Viola mariana, Dod. gal. & fol. Caster. & Rapum sylvestre Dioscoridis) Ges. hort. Lobel. Taber. Rapi sylvestris genus maximum, Ges. hort. & Medion. Rapunculi alterum genus grandius, Cæsalpino. Flore est albo, cæruleo: habetur & pleno citre jaciniatis folijs peregrina.

Επιμηδιον

EPIMEDIUM.

CAP. XIX.

Epimedium, caulis non est magnus, hederæ folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, in pato cataplasmate, mammas increfcere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis post menstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus, ne concipiant.

Epimedij cōsideratio.
Trinitas non est Epimedium.

Epimedij vires ex Gal.

Nomina.

Qui Epimedium in Italia, quantum mihi perquirere licuit, hoc tempore cognoscit, demonstratq̄, hæc tunc reperit neminem. Quare putauimus alys in regionibus hanc plantam prouenire: vel si fortasse nascatur in Italia, non tamen ad nostram peruenisse cognitionem. Non tamen nos fugit medicum esse in Italia materiam medicam profertem, nunc nomen libet silentio dissimulare, qui Epimedium eam plantam esse censet, quæ à triquetra foliorum figura quorundam recentioribus Trinitas appellatur, idq̄, illis constanter affirmat, & persuadet, quæ maiorem forsitan ei fidem præstat, quam ipsi Dioscoridi. Sed quod us aperte hallucinetur, et si vnicuique mediocriter etiam in re herbaria versato perspicuum esse possit, pro alijs tamen iam nobis ostendendum est. Quod facile constabit, si expendatur vtriusq̄, plantæ descriptio: siquidem Epimedium, Dioscoridis testimonio, caulis est non magnus: folia habet hederæ similia, dena aut duodena Trinitas vnicuique constans, sed folijs tantum modo vicenis, modo tricenis, modo quadragenis, pluribusq̄, à radice cylamini modo exsurguntibus. Præterea Trinitas primo statim vere florem edit cæruleum, mox semen. Epimedium verò, Dioscoride authere, neque florem, neq̄, semen profert. Adde quòd Trinitas radice nititur multifida, odore non ingrato, & sapore adstringente. Epimedij verò tenuis describitur, graui odore, & insipido ac fatuo gustu: ex quibus omnibus, ni fallor, harum plantarum discrimen luce clariùs ostenditur, & medici illius opinio vana apertissimè exploditur. Caterum Plinius libro 27 cap. 1. Epimedij historiam ad verbum fermè à Dioscoride mutuatus est: cui item Galenus suam acceptam referre potest lib. 6. simplicium medicamentorum vbi ita scribit: Epimedij vis est moderatè refrigeratoria cum aquea humiditate: quare nullam habet insignem qualitatem. Mammas cataplasmate impositum rectas seruare potest. Aiunt verò epotum concipere: si adimere. Plantæ, quam Græci ἐπιμηδιον, Latinis similiter Epimedium appellatur.

* EPIMEDIUM *



Επιμηδιον

GLADIOLVS.

CAP. XX.

Xiphion, alij phasganon, alij machæronion, Romani Gladiolum vocat: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus, & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruosumque. In caulem exit cubitalem † in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna paruorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, superna vberior: nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeos e corpore extrahit: panos cum Lolij farina, & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi em-

† Ori. add.
ὁτον μεσεν. l.
succo plenū.

Epimedij nomine ostendunt alij Trifolium aureum, alij Lunariam racemosam: Patauini eam cuius figuram adposuimus, pro Epimedio exhibent, notis omnibus apud Dioscoridem conuenientibus, licet florem & fructum ferre neget, quod etiā de Dictamnio & alijs pronunciauit, in quibus contrarium obseruatur. Hoc radice rufescente, fibrosa, multas propagines in obliquum spargente, grauis odoris, ex quo communiter caulis vnicus, teres, dodrantalis exurgit, qui vt plurimum, in ternos pediculos teretes, tenues, abidos, diuiditur: singulis sectionibus in summis quasi aulis, in terna, rarius quatuor folia desinentibus, quæ Hederæ figura, lata, acuminata, in ambitu quasi aculeis exornata, leuia, dilute virentia, auersa parte albicantia, duriuscula, odore ingrato, sapore fatuo & subadstringente. Flosculos habet perelegantes, quadrifolios & quadtangulos, singulos singulis pedicellis insidentes, marginibus rubentibus, interioribus luteis, medijs apicibus virentibus: at auersa parte rubent, & strijs candidis rectis discurrentibus variegantur: his succedunt techæ teneræ, siliquis similes, semen continentibus oblongum quasi semilunatum & subruffum. At flores vna cum seminibus (communiter) folijs prodeuntibus vel ijs auctis, decidunt: sic vt ne vestigium eorum appareat. In Euganeis montibus circa Patauiū, circa Bononiam, & in horto Patauino legimus: circa Vincentiam, locis vmbrosis vdis (vbi Lunaria nominatur) in Liguria montibus & in Illyria obseruatur. Epimedium primus nominauit Anguillara, quem imitati sunt Aduersaria (quæ an Epimetron Plinij sit dubitant) Lob. Dod. fol. Lug. Taber. Camerarius. In montibus Liguria planta proueniens, dicitur Cæsalpino.

di emplastris inferi solet: menses imposita trahit. Superiori radice ex vino pota, venerem stimulari, & infenore sumpta sterilefcere tradunt. Superiorem quoque vtiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari precipiunt.

I. GLADIOLVS.

II. ARVND IND. LATIFOLIA.



Nascitur Gladiolus, quem Graci xiphion vocant, frequens in Hetruria, & in comitatu Goriciensi in pratis, & in aruis inter segetes: vnde Segetalis plerisq; dicitur: huius flores nostri vulgo appellant Monacucce. Folia ei iridis, breuiora tamen, & angustiora, lines neruorum modo striata, mucronataq;. Caule attollitur cubitali, leui, succoso: in quo flores emittant purpurei, paribus inter se spatijs distantes, qui etiam iridis flores forma effigieq; plurimum amulatur, quanquam Gladiolo minores sunt, & vno tantum colore constant: prodit ex his semen (vt Dioscorides inquit) rotundum. Radicibus cohaeret geminis, bulbosis, rotundis pressisq; verticillorum modo, vna super alteram insidente, albicantibus, bulbosisq;. Haec obteguntur capillaneo muolucro, in nigrum purpurascete, veluti croci radices. Caterum quamuis tradiderit Dioscorides, quod superior radix magnitudine inferiorem superet, plerunq; tamen contrarium visitur. Plinius porro hac in historia a Dioscoride dissentit: siquidem Gladiolum, quem in aruis nasci scribit Dioscorides, in palustribus is & aquosis inueniri existimat. Ex quo facile crediderim, Plinio illum vocari Gladiolum, quem passim officina Acorum nominant. Gladioli meminit Galenus li. 8. simpl. med. vbi sic inquit: Xiphii radix, & maximè altera, quae superior est, attrahentem, digerentem, & exiccantem scilicet facultatem etiam possidet. Hac planta Xiphion Gracè vocatur: Latine Gladiolus: Arabice, Kafstion: Italicè, Gladiolo: Senensibus, Monacucce: Germanicè, Schwertel: Gallicè, Glas, & Glayent.

Gladioli historia.

Plinius a Dioscoride dissentiens.

Gladioli vires ex Gal. Nomina.

Gladiolus duplex est, alter vtrinq; floridus, Italicus: qui alibi procerior, alibi breuior: alter ab vna parte caulis flores digestos habet, qui Gallicus & Germanicus: vterq; flore variat rubro, incarnato, rarius albo. I. Gladiolus vtrinq; floridus, C.B. Gladiolus, Matth. Dod. gal. (cui & Lingua ceruina Apuleii) Lac. Cast. Lugd. Cæs. Gladiolus Italicus binis florum ordinibus cinctus, Lob. Gladiolus vtrinq; floriferus, Dod. fol. Gladiolus Italicus, Tab. Gladiolus verus, Ges. hor. cui & Victoralis rotunda: Xyphium, Ges. hor. Cam. II. Arundo Indica latifolia. Ex radice nodosa in capita rotunda protuberante, & crassioribus fibris stipata, caulis primum vnus, deinde plures prodeant, digiti minoris crassitie, recti, arudinacei, lques, herbacei, nodosi: circa quos multa folia Hellebori albi modo ampla, neruosa & firma, tenuia tamen in mucronem collecta & ex herbaceo pallida, circa caulem conuoluta, quæ cum primò erumpunt, chartacea cornicula referunt, quod & in Elleboro albo conspicitur: sapore primò herbaceo, dein nonnihil acri: extremo cauli flores minij colore nitentes, singuli capitulo hirsuto insident, Gladioli figura, ex pluribus oblongis folijs compositi, qui nondù aperti cancrorum forpiculas & forma & colore (vnde quibusdã Flos cancri) referunt: quibus delapsis capitula augentur, & quasi triangula redduntur, aspera, parui cucumeris figura, semen pisorum magnitudine & forma, nigrum, macula fusca notatum, continetia. Ex India Occidua seu America semen primum in Lusitaniam (in quorum monasterijs frequens sub stillicidijs ad muros fertur) delatum, inde in alias regiones, ita vt apud Germanos, Gallos, Italos & Anglos passim ab rei herbarie studiosis elegantiae gratia in pensilibus Adonidis hortis colatur. Apud nos non semper floret, nec ad frugem peruenit, nisi hortulanorum diligentia in fictilibus hyeme assuetur, serò enim germinat. Dicitur Canna vel Arundo, quia caulis veluti arundineus est. Canna Indica, Gesnero de hortis German. Clus. histor. Hispan. Camerar. cui & Xyphium Indicum. Canna Indica, Cæsalp. Arundo

Indica florida, Aduer. Lob. cui & Cannacorus. quorundam. Arundo Indica latifolia siue florida, Tab. Papyrus, Castori: Gladiolus Indicus Cam. in suo Matthiolo. Huius foliis Gummi Elemmi inuolutum adfertur: ex semine, Hispani & Lusitani sphaerulas precatorias conficiunt, quare à numerando, Cuentas dicitur Germanis Indianisch Bluomenrohr dici poterit.

Σπαργάνιον.

SPARGANIVM.

CAP. XXI

α Μενμ ωτ κληνέσρα. i. magis inclinata.

Sparganii consideratio. Ruellius male Spatulam, Sparganium credit.

Syluatici extractum.

Sparganii fasciatum ex Gal.

Nomina.



XYRIS.

Sparganion, aliqui xiphidion vocant: folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis a procumbentia: in summo caule veluti pilulae prominent, in quibus semen. Contra serpentis venena radix cum vino datur.

Existimat Ruellius eam plantam esse Sparganium, quae in aquosis locis provenit, quam herbariorum vulgus Spatulam foetidam appellat. Verum haec, ut in proxima commentatione dicitur, nihil aliud est, quam Dioscoridum xyris. Quare mihi plane refellenda videtur in hoc Ruellij opinio. Siquidem herba haec, quam ideo Spatulam foetidam cognominant, quod grauem exhalet odorem, folia quidem habet gladioli, sed latiora, longioraq, minime in terram procumbentia. Adde etiam quod illa in summo caule non pilulas, quae semen contineant, sed folliculos, aut siliquas profert. Syluaticus Spatulam foetidam describens, eius historiam Paulo Aegineta perperam acceptam refert: id enim ipse in Paulo nusquam potui reperire: sed ad Sparganium nostra redeat oratio. Dubitamus nos, an planta quam hic pro Sparganio expressimus, quamq, ferè omnes, qui hoc aeo de re plantaria scripserunt, Sparganium faciunt, legitimum genuinumq, Sparganium sit. Siquidem haec folia xyphio latiora gerit, non quidem arctiora, eaq, sursum spectantia, non humi procumbentia: quo fit ut ego facile crediderim vix plantam hanc Sparganium dici posse. Nascitur ad montium radices, humecto solo, & inter scrobes. Sanè quam paucis de Sparganio differuit Galeus lib. 8. simplicium medicamentorum sic inquit: Sparganium & ipsum desiccantis est facultatis. Nomen Graecum habet planta haec Σπαργάνιον: Latinum item, Sparganium: Arabicum, Safarheramon: Italicum, Sparganio.

Sparganium, quasi fasciola, quod foliis eius pro fasciis vterentur, duplex est, ramosum, & non ramosum. Sparganium ramosum, C. B. Sparganium, Mart. Trag. Cordo in Dioscor. Lacu. Turn. Lobel. Castor. Taber. Camer. Casal. Butomon, Dodo. gal. Platania, Dod. fol. Thal. Carex, Loni. Phleos femina, herbario Lugdunensi.

XYRIS. CAP. XXII

† Orib. ὄροβοις. i. eruis.

Xyridis consideratio.



Xyris folia habet iridis, latiora & in cacumine mucronata: quorum medio caulis erumpit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquae triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis, rotundum, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera, fractaq, efficax est: aculeos, & spicula omnia, citra molestiam extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radice centaurei, ac mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias, & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, vrinam vehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

Xyris pluribus locis provenit in Italia, praesertim in Hetruria, in aquosis & humectis locis. Nam etsi non desunt, qui plantam quae hic nobis Xyridem exprimit, legitimam esse negent, quod radice non constet longa, rufa, geniculata, sed multifida, graciliq, nos tamen non ob id, cum ceteris notis cum Dioscoridis

Handwritten notes: Xyris foetida dicitur a Xenia. Sternb.

Dioscoridis Xyride conveniat. eam legitimam faciemus, si quidem variare radices in plantis facile scimus pro diverso solo
 regionum stata. Aucto quoque quendam suspitionem ipsum quoque semen quod rotundum cum sit, fabis haud simi-
 li. sed suspitionem hanc auclit Oribasius, qui eposeu legit, id est orobis simile. Quo argumento fiet us, cum xyridis se-
 men utriusque effacientis palam se edere sabaceo habeatur, Dioscoridi legendum esse puto: Semen in folliculis est faba-
 rum saore. Eam vulgus Spatulam fetidam appellat. quod eius folia, si manibus atterantur, grauem & ingratum reddant
 odorem. Sunt qui huiusce succo vtantur ad scabiem, vitiliginem, & lichenas. Hanc memoria prodidit Galenus libro 8.
 emplatum medicamento. vbi de eius viribus ita differit: Xyris tenuium partium, attractoria, digerendi, ac nimirum
 etiam de sicandi est facultatis, cum radix, tum multo etiam magis eius fructus: qui quidem & urinam uet, & lenes in-
 duratos sanare potest.

Locus Diosc.
 restitutus ex
 Oribasio.
 Xyris vices ex
 Gal.

10 Planta Græcè Ξυρίς, Latinis quoque Xyris dicitur: Arabibus, Casoras: vulgò, Spatula fetida: Germanis, Wandseuf Nomina.
 Span: Hispanis, Lirio spadanal: Gallis, Glaieul saunage.

Xyris, ob folii similitudinem, quasi rasorium cultrum diceret, duplex est: alia vulgaris, alia maritima.
 Xyris dicitur Marthiolo, Dodo. gal. Cordo in Dioscor. & histor. Turn. Lacun. Gesner. hor. Lobel. (cui &
 Insagra Theophrasti) Castor. Lugdun. Camer. Spatula fetida, Trag. (cum & Gladiolus Italicus) Fuchf.
 Spatula fetida. Getn. hor. Dodon. fol. Clus. lutt. Hispan. Lonic. Taber. Camer. Catalpino. Huius radices
 pro ratione ætatis variant, dum enim adhuc iuuenca est, radicem habet fibrosam: æuultior reddita, cras-
 sam. vt nostra figura exprimit.

ΑΨΥΡΙΔΑ

ANCHUSA.


CAP. XXIII.

ANCHUSA, que et alio nomine calyx, aut onoclea appellatur, folia habet lactuce, a in acumen falligiata,
 hirtuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquoerium humi sparsa, spinis horrida: radice crassitudo
 digitalis, que ætate prouenit, & manus inficit sanguineo colore: læto solo nascitur. Radix adstringit: ad
 ambusta, & vetera vlcera, b ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: lepris, & vitiligini-
 bus illinitur, ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctum renum vitis, lieni, & bile suffusus da-
 tur: & si febris sit, ex aqua multa. Situnt aliam folia in vino pota. Radice pigmentarii vtuntur ad vnguen-
 torum spissamenta. Est & altera quam al. qui alebiadion, aut onochiles appellant. Hæc à priore distat,
 quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles, in quibus flos purpureus c in puniceu
 vergens conspicitur: radices habet rubras, prælongas, que messibus sanguineum succum fundunt: d in sâ-
 bulosis nascitur. Vis ei foliisque ineit, que contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime
 viperarum auxilietur, sine cibo, sine potu, sine alligatu: nam si quisquam mandes, in serpentis os inspuit,
 cum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in
 serpentis fauces inspuitur, eum interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyslopo, & nasturtio pota, la-
 tas ventris tineas excutit.

a Me. & Cat.
 b Oribasius
 i. acutifolia
 similia.
 c Oribasius
 d Oribasius
 e Oribasius
 vel pu-
 nicum.
 d Oribasius
 e Oribasius
 i. i. i. i.

ANCHUSA I.

ANCHUSA II.



Tria

Anchusarum
confid.

Anchusarum
vires ex Gal.

Tria sunt Anchusæ genera, quæ hic à Dioscoride scribuntur: quanquam Plinio libr. 22. cap. 20. quartum quoque genus additur, quod pseudoanchusam ob id appellatam ait, quoniam primo aliarum generi quadantenus similis est, vtriusque tamen hac, lanuginosior, & minus pinguis, folijs tenuioribus, & languidioribus. Sed hanc nusquam equidem vidi, cum tamen alias omnes locis compluribus in Italia inuenisse me certò sciam. Anchusæ omne genus, in toto fere caule pureos explicat flores à vulgari buglosso non longè dissimiles, quamuis Anchusis magis subrubentes, magisq; expansi spectantur. Galenus inter Anchusas Lycopsim quoque recenset lib. 6. simpl. medic. vbi ita scriptum reliquit: Anchusæ quadruplex species est. Quarum Onoclea quidè radicem habet admodum refrigerantem, & desiccantem, tum adstringentem, & subamaram, tum quæ sufficiat extenuandis, & extergendis humoribus biliosis, corporibusq; condensandis. Ceterum folia habet imbecilliora quidem radice, adstringunt tamè & ipsa, & desiccant. Porro Lycopsis cognominata refrigerat, & desiccant, magisq; radix eius, quàm Onoclea adstringit. At Onochelis validior est, & magis medicata: nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimonia. Hac verò etiam validior est parua, quæ & amarior, & magis etiam medicata est. Anchusæ non omnes easdem vires obtinent. Nam Onoclea quam vocat radicem habet simul adstringentem, & subamaram, corporibus condensandis, & modicè extenuandis idoneam: tum abstergendis quoq; & abluendis biliosis, & salsis succis: dictum enim suprâ est, quòd qualitas acerbata mista amaritudini ea prestare queat. Sic sanè regio morbo, & lienosis, & renum affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est: & sanè cum potè illita iuuat erysipelata, & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitiligines, & lepras sanat cum aceto. At radice quidem hac opera sunt, & operum facultates, quas diximus. At folia ipsius herba radice quidè sunt imbecilliora non tamen aliena sunt à resiccatione, & adstrictione. Itaque etiam profluuium sanant pota cum vino. Et quæ Lycopsis nominatur eodem modo erysipelatis congruit, & radicem habet quàm onoclea magis adstringentem. At Onocheli, & Alcibiadi cognominata vis magis est medicata. Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à viperis morfi sunt, admodum iuuat tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua verò, nempe quarta, quæ parua est, & fere nomine caret ex illis sola, Alcibiadio quidem persimilis est: verum & amarior, & magis medicamentosa: ac proinde ad latos lumbricosi-

ANCHUSA III.



Nomina.

donea oxybaphi mensura cum hyssopo, & nasturtio epota. Quæ ἀρχυσα Grace, Latine pariter & Italice Anchusa vocatur: Germanicè, Rot Ochsenzung: Hispanicè, Soagem: Gallicè, Orchanette.

Anchusa à florido radicis colore dicta, eius enim succo sanguineo manus inficiuntur, quo sanè ab Echio Buglosso & Lycopside distinguuntur. I. Anchusa prima, Matth. Lac. Cast. Lugd. Buglossa rubra, Lon. II. Anchusa puniceis floribus, C.B. Anchusa secunda, Matth. Lac. Lugd. Buglossa rubra secunda, Lon. videtur Anchusa parua Aduersariorum, & Lobeli. III. Anchusa maior lutea, C.B. Anchusa tertia, Matth. Lac. Lugd. Cam. Anchusa, Ges. hor. Anchusæ prima species, fortè Cordo in Diosc. Anchusa lutea, Aduer. Lob. Lug Buglossa rubra tertia, Lon. Anchusa quarta siue Pseudoanchusa, Dod. fol. Anchusa flore exalbido, Clus. hist. Pannonica. Floris enim color modò luteus, modò albus, modò ex albo pallefcens.

Αρχυσα

LYCOPSIS.

CAP. XXIIII

Conclusa nõ
legit Orib.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs est lactucæ, longioribus, asperioribus, [latioribusque,] crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore in iis paruo, purpurascens: radice rubra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Lycopsis con
sideratio.

Opinio re-
probata.

Ego quoque vnà cum Ruellio, & Fuchsio viris doctissimis, crederem Lycopsin eam esse plantam, quam officina legitimi Cynoglossi vice passim vsurpant, vocantq; Cynoglossam, si tamen hac radice rubra, non autem candida niteretur: si folijs viresceret asperis, non autem leuibus, ad terram recidentibus, non sursum spectantibus: si caule assurgeret scabro, non molli: si denique Plinius huic sententia non prorsus refragaretur. Porro cum Plinium videam libro 27. cap. 11. de Lycopsi seorsum tractasse, & similiter de hoc Cynoglossi genere priuatim scripsisse lib. 25. ca. 8. cogor omnino, vt ingenue dicam, ab illis dissentire. Potius enim adducor, vt credam, Lycopsin herbam esse anchusæ non ab similem: quam ideo non temerè Galenus, & Aëtius eum secutus in anchusarum genere retulerunt, vt superiori commentatione diximus. Lycopsin, quam ego legitimam esse existimo, vidi sepius in campestribus, sitientibus, aridissq; locis enatam, anchusæ adeò similem, vt vix ab ea discerni possit. Ceterum quoniam in huius libri quarti progressu, Deo iauante, nobis de Cynoglossa differendum est suo proprio capite, idcirco disputatio quodnam verum sit Cynoglossum, & nunquid illud esse possit, quo officina vulgò vtuntur, in illud tempus commodius differetur: Lycopsis, vt Plinius est author loco citato, folijs est longioribus, quàm lactucæ, et asperi-

floribusque: caule longo, hirsutis, adnatis multis, cubitalibus: flore parvo purpureo: nascitur in campestribus. Ilae herba Nomina
 Graecis λίκυσις, Latinis item Lycopsis, & Italis Lycopside appellatur.

Εχίον

ECHIVM.


CAP. XXV.

EChion folia habet prælonga, aspera, aliquantulum tenuia, Anchusæ proxima, minora tamen, subtubra, & pinguia. somulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minuta, que utroque latere folia expansa, pinnataque, nigra, in summo caule proportionem minora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capitibus viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quae non percussis modo serpentibus ex vino prodest: sed eos qui antea biberint, ferri non patitur. Folia & semen idem præstant manus. Lumborum dolores sedat: in vino, aut sorbitione sumpta, ꝑ lac extrahit.

† Me. & Cas.
 ἢ φαρίματος
 λικεΐσα. τὰ-
 rum habent.

I. ECHIVM.

* II. ECHIVM FLORE ALBO. *



EChion a viperis omnino nomen advenit: viperæ enim Græcis ἰχθυίς dicitur, vel quod semen proferat capitibus viperinis simile, vel quod viperarum morsibus præstantissimum sit medicamentum. Hanc herbam ab Alcibio quodam Iussæ inuentam auctor est Nicander in Theriacis, & proinde à posteris cognomine Alcibiacum appellatum. Is enim dum per aream dormiret, a viperâ in extremo inguine ictus est: excitatusque a somno, ex hac herba succum commanducando palato & dentibus expremit, hauriitque in corpus. Mansa verò herba reliquum vulnere superimposuit contra dolorem, quo medicamento liber euasit. Unde postea Echion nomen inditum est Alcibion, ab eo qui primus ostenderit, quantum viribus polleret contra viperarum ictus. Numenius scriptor grauiusimæ duo Echij genera inueniri scriptum reliquit, quorum alterum Ocimoides appellari inquit, quod folia ocimo similia habeat, alterum vero, quod folio est spinoso, priuatim Echion nominari. Id sanè quod in Theriacis ante ipsum scripserat Nicander. Quibus videtur etiam Dioscorides adstipulari, quippe qui Echion statim subiecerit Ocimastum. His quoque subscribit Plinius libro 25. cap. 9. sic inquit: Echios duum est genus: altera solys coronata, pulegio similis: altera lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt. Sed tamen ignorasse Plinium Alcibion, & Echium idem esse, satis manifestum est: siquidem in libr. 27. cap. 5. Alcibios, inquit, qualis esset herba, apud auctores non comperi. Ex cuius verbis illud facile colligi potest, quod scilicet Plinius non satis accurate Nicandrum legerit. Cæterum non parua admiratio eum capiet, qui in Echio diligenter opus prudentissimæ naturæ perspexerit, nempe quod ipsum genuit viperinis capitulis, ut ita apud homines, quorum potissimum curam gerit, testatum relinqueret, eam herbam præstantissimam esse ad huiusmodi lethalium ferarum morsus. Echium, quod ubique fere proveniat, secus itinera, in agrorum marginibus, & sicco, inculto & exoluto solo, aridis præsertim locis, sæpe in Hetruria, in agro Tridentino, & Goritiensi vidimus, semenzque eius viperinum decepsimus ad antidota. Herba est anchusa, quæ secundo loco Dioscoridi redditur, non absimilis. Vocant quidam sylvestre Buglossum. Flores profert hæc in rubeum purpurascens inter minuta folia a medio caule ad summum: e quibus semen prodit nigrum, hirsutum, spinosisque, inuolutu incusum, viperarum capitibus simile. Non inuenio Galenum ullam Echij mentionem fecisse in libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus edidit. Paulus tamen eius vires describit Dioscoridem secutus lib. 7. vbi hæc refert: Echion, alij Doriada, nonnulli Alcibiadion vocant. Spinosa herba est, quæ non modo a serpente commorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque ex ictu nihil molestum pati sinit.

Echii congd.
 Plinii lapsus.
 Echii desert.
 Echii vires ex Paulo.

Quod

Nomina.

Quod ἰχθυόεις Græci, Latini quoq; Echium dicunt: Itali, Echio: Germani, Wild Ochsenzung: Hispani, Terna de la lina: Galli, Buglosse sauvage, vel, Langue de Bouc.

Echii aliquot sunt differentiæ, hic de vulgari. I. Echium vulgare, C.B. Echium, Matth. Ges. hor. Lac. Dod. fol. Cast. Lugd. Echium siue Alcibiacum, Dod. gal. Echium floribus purpurantibus rubellis, Lobel. Lycopsis, Cor. in Diosc. Buglossum sylvestre, Lon. Anchusa sylv. Thal. Anchusa maior, Cæs. II. Echium flore albo Cam. in suo Matthiolo proponit, quod præcedente maius est & asperius, & in multos ramos brachiatum: in montosis arenosis Germaniæ, & in horto Patauino legimus.

ἰχθυόεις

OCIMASTRUM

CAP. XXVI.

OCimoides, Latini Ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos: filiquas hyoscyamo similes, semine, vt Gith, nigro prægnates. Vim habet semen in vino potum, qua viperarum, cæterorumq; serpentium moribus medeatur. Datur ischiadicis, cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & superuacua.

I. OCIMASTRUM, SIVE
Ocimoides.

*II. LYCHNIS SYL.
alba multiflora.*

Ocimastrum
consideratio.


OCimastrum, siue sylvestre Ocimum id ipsum nobis appellare liceat, passim copiosè nascitur in Italia, præsertim inter segetes, prope septa, & in agrorum marginibus, foliis sanè satiuo similibus: ramulis hirsutis, quadratis, dodrantali, vel cubitali longitudine: in quorum summo flores emicant candidi, quandoq; verò purpurei, id quod silentio præterit Dioscorides: è quibus vascula erumpunt hyoscyami figura, capaci ventre, arctis faucibus, per ambitum denticulatis, viperinis capitibus similia: in quibus semen includitur nigrum, melæthio ferme simile. Hac vascula ita à natura facta pueri nostrates colligunt, vt exaruerint: siquidem cum semen exciderit, ij intus sufflantes acutissima edant sibila: sic enim natura pueri interdum ludendi præbuit instrumenta. Meminit huius Nicander in theriacis inter echij genera, sic inquit: Echij generi duo, alterum spinoso folio, anchusa simile: alterum minoribus foliis, & purpureo flore, aspero lanuginosq; caule, capitulis viperarum figura. Ocimastrum vires tradidit Galenus in calce libri 8. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit: Ocimoides quidam Philitarium cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantur circa mordacitatem facultatis est. Herba Græcis ἰχθυόεις, Latinis, Ocimoides, & Ocimastrum appellatur: Itali, Basilico saluatico: Hispanis, Albahaqua montesina: Gallis, Basilico sauvage.

Ocimastrum
ex Gal.
Nomina.


I. Lychnis sylvestris alba, quæ Saponaria hirsuta Italis, C.B. Ocimastrum siue Ocimoides, Matth. Lon. Taber. Ocimoides. Ges. hor. Lac. Cast. Cam. Ocimoides maius, Lugd. Cæsa. Rosæ marianæ similis quinta, Trag. Lychnis sylvestris alba, Dod. gal. Ges. hor. Cam. Basilicum sylvestre, Castori. II. Lychnis sylvestris alba multiflora, C.B. Lychnis sylvestris flore multiplici, Dod. fol. Lychnis albus sylvestris, Lob. in icon. Ocimastrum multiflorum, Tab. ab altera non differt præterquam floribus, qui multiplici foliorum textura constant.

ERINVS.

II. GRAMEN MANNAE.



III. GRAMEN ALTERVM.

* IV. CARYOPHYLLO ARVEN-
si Glabro similis, sed minor. *Graminis vi-
res ex Plin.

Sanguinella.



Manna gra-
minis.

bam Hetruscū ab effectu vulgò appellant Sanguinella, alij Capriola. De qua latius in Coronopo diximus, vbi Leonardi & Raelij sententiā reprobauimus, qui hanc & Coronopum Diosc. vnam & eandē herbā esse asseruerunt. Verū de Coronopo separatim disseruit Pintus lib. 22. cap. 19. suae naturalis historiae. Postremā hanc in aliquib. Germania locis seri ac. cū in campis audio, nō minori cura, quam caetera frugū & leguminū genera. Siquidē eius semine quod MANNAM appellant, frequen-

densius, quā vsquam fruticante: flore odorato, candido, lumentis herba non alia gratior siue viridis, siue in sano pucata. Tunditur aspersa aqua. Succum quoq; eius in Parnaso excipi tradunt propter vbertatem: dulcis enim hic est. In vicem eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum ad vulnera conglutinanda. Quod & ipsa herba rufa praestat illis, quae tueturq; & ab inflammationibus placat. Decocto adijcitur vinum ac mel, ab aliquibus & thuris, & piperis myrthaeq; tertiae portiones: rursusq; coquitur in aere vase, ad dentium dolores & epiphoras. Radix decocta in vino torminibus medetur, & vrina difficultatibus, vlcibus vesicae: calculos frangit. Semen vehementius vrinam impellit: aluum, vomitionesq; sistit, priuatim autem draconum moribus auxiliatur. Quod ē graminum genere septem internodia habet, efficacissimē capiti contra dolores adalligatur. Sunt qui & multatum gramen vocant trium generum, cum in cacumen aculei sunt plurimum quini, dactylon vocant. Hos conuolutos naribus inserunt, extrahuntq; sanguinis eiciendi gratia. Altero q; est Aizoo simile, ad paronychia & pterygia vnguium, & cum caro vnguib; excreuerit, vtuntur cum axungia. Tertium genus, quod tenuius est, nascitur in parietibus & tegulis. Haec caustica vis est. Sistit vlcera, qua serpunt. Gramen capiti circumdatum, sanguinis ē naribus fluxiones sistit: haec Plinius de graminibus. Caterū hinc omnibus planē perspicuum ē puto, Gramen, q; in Babylone, non gigni in Italia: quāquā illud primum ac vulgatū genus nobis passim in campis & incultis locis frequentissimum nascatur. Neq; illud quoq; omnibus non cognitum & vulgare est, quod solys ac radicibus ex alterius tenuioribus, caule geniculato, praelongo, cui in caumine caulium quini sunt aculei, veluti digiti, quos pueri naribus inserunt extrahuntq; vt sanguinem eliciant. Hanc her-


V. GRAMEN PARNASI.

* VI. MONOPHYLLON. *



VII. GRAMEN ACULEATVM.

Cyperus aculeatus



frequenter vescuntur in cibus, quod in iure pinguium carniū decoctum, non minorem cum palato ineat gratiam, quā oriza, cui ego facillē praposuerim: est enim semen panico, milioq; longē minus, album oriza ferē modo: sed in pila ipsum quoq; tundere oportet, vt à suo resiliat putamine. Semen oryzae qualitates habet, quare mediocriter vētrem adstringit. Semen ex pingui iure decoctum & illitum, mammarum duritias resoluit. In cibus mediocriter alit. Est & alterum Gramen, quod floridum appellari potest, folijs & caulibus ceteris similibus: floribus in summitatibus stellarum instar radiātibus candidisq;. Radice tenui minimē geniculata. Ceterum GRAMEN quod in Parnaso prouenit, ego Iacobo Antonio Cortuso viro optimo acceptum refero, nam antea à me visum non est. Gramen aculeatum folia, caules, radices primi graminis modo profert: in caulibus tamen singulis è folijs aculei peculiariter exeunt, triplici apice constantes, ac suis nixi pediculis, tribulorum terrestrium instar. Prouenit inter rudera & in muris vetustate collapsis. Vires easdem habet, quibus pollet primum graminis genus. Sed iam Graminibus suas reddamus vires ex Galeno, qui de his agens lib. 6. simplicium medicamentorum, ita scriptum reliquit: Graminis radix mediocriter frigida est & sicca, mordacitatem quandam exiguam, & partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate verò, & siccitate moderata. Porro semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso verò desiccatorium & tenuium partium & subacerbum. Gramen esculentam habet radicem, vbi mollis fuerit, dulcem quidem instar aquae, sed acre quiddam exiguum, & subacerbum obtinentem. Hac herba planè aquae gustantibus est. Ex quibus apertum est, radicem modicè esse tum frigidam, tum siccam: ac proinde cruenta vlcera glutinare. At

Graminis vires ex Gal.

ipsa herba illita, non vehementer refrigerat, in medio constituta humiditatis & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas, quae radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen lapides frangere afolet, si quis eam decoctam ebibat. At semen alterius quidem imbecillum est, eius verò quae in Parnaso nascitur, vrinam ciet: & fluxus ventris & stomachi resiccat: vis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacerba. Herba, quae Graecis ἀγρωσίς, Latinis Gramen appellatur: Nomina

Arabibus Vagem, Negen seu Negien, Thel, Kel & Negil: Italis Gramigna: Germanis Grassi: Hispanis Grama & Gramenya: Gallis Dent de chien.

Gramen à gradiendo dictum, infinitas differentias obtinet: in Phytopinace nostro, est centum & viginti duas differentias proposuerimus, plures tamen adhuc vniuersalis historia nostra exhibebit. I. Gramen pannicula crispa, C.B. Gramen, Matth. Gramen vulgare, Lug. Gramen minimum Xerampelinum, Aduer. & Lob. Matthioli figuræ adiecimus panniculam adultam, quo glumorum crispitudo rectius conspiceretur. II. Gramen dactylon esculentum, C.B. Gramen mannae, Matth. Cast. Tab. Camer. Gramen mannae primum, Dod. fol. Lugd. Gramen mannae esculentum, Lob. Sanguinella, Matth. editione Italica. Capriola ac Sanguinaria, Ruellio. Coropopus Dioscoridis, Lonicero. Gramen album seu hirsutum aliquibus Dens Canis, Ges. hor. cui & Manna Polonorum: Gramen aculeatum Plinij primum, Thal. Graber flore maiore, C.B. Gramen alterum, Matth. Gramen, Fuchs. Lac. Gramen à Fuchsio exhibitum, Ges. hor. Gramen leucanthemum, Dodo. fol. Lugd. Thal. Gramen floridum maius, Tab. Gramen floridum, Cam. in Matth. Euphrasia gramen, Trag. Euphrasia maior, Lonic. Crateogonum, Dod. gal. Holostium Ruellij Lobel. Centunculus montanus, Cæsalpino. IV. Caryophyllo aruensi glabro similis, sed minor, C.B. Hoc exigua est capillacea radice, ex qua cauliculus vnus vel alter tenuis, plus minus palmaris prodit qui mox in paruos ramulos brachiatur, qui copiosissimos & minutissimos flosculos albos, singulos singulis ramulis capillaribus insidentes, sustinent: folia habet pauca, oblonga, angusta, alternatim ex geniculo prodeuntia. In montibus Euganeis prouenit. V. Gramen Parnasi Matthioli, cuius figuram referunt Castor, Lugdunensis, Tabernæ montanus, nil aliud est quàm Monophyllum malè pictum, quare altera Monophylli figura adposita. VI. Monophyllum, eò quod cum primo prodit vnico sit folio, cum caulem acquirit gemino est, & vltra vnus anni ætatem, vt & cum baccas profert: rarius ternis folijs reperias. Vnifolium, Brunfel. Dod. gal. & fol. (cui & fortè Cyclaminos tertia Plinij.) Lugd. Cast. Camer. Tab. Monophyllum, Lob. Thal. Henophyllum, Ges. de hor. Cotyledon syluestre, Trag. Cyclaminum vnico folio, Dalechampij in Diosc. Bifolium primum, Lonicero. VII. Gramen aculeatum Matthioli, Castori, Lugdu. Hoc cum malè ab his pingeretur, veram eius figuram proponere voluimus, ex integra planta quam Doctor Io. Neudorffer Noribergensis Arimini collectam, vnà cum alijs obtulit.

α εν τω πεπερωσι χειρις i. in subpectro fis locis, ita omnia exemplaria. a Meum φύλλα δ' επι μύσχωι μακράν, ὁμοία τοῖς τῆς πλειδός, ἀκροσχιδῆ πολυλά εκατέρωθεν. i. folia in pediculis longis, similia folijs filicis, in summo vtrinque incisuris diuisa.

Σιδνεῖτις

SIDERITIS.

CAP. XXIX.

Sideritin aliqui Heracleam vocant: folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluiae accedentia, minora tamen & aspera: cautes edit quadratos, dodrantem altos, aut etiam maiores, non iniuncti gustus, aliquantunq; subadstringentis: in quibus per interstitia orbiculata vertebz, vt in marrubio spectantur: & semen in eis nigrum: nascitur in a petrosis. Illita folia, suapte vi vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

α Μετρίχοις i. parietibus.

Σιδνεῖτις ἑτέρα.

SIDERITIS ALTERA.

CAP. XXX.

† Οἱ μικροὶ i. paruis.

Altera Sideritis binum cubitorum ramulis, exilibus a folio filicis, numerofo, vtrinque per oras diuiso, pediculo longo, prodeuntibus è summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero: in quo semen continetur, quàm betæ rotundius aliquantò ac durius. Huius vis foliorumq; ad vulnera præcipua est.

b Vtrinque ἐξέρχεται τῆς ἡδύωμις ἑπιτιθεμένη, κολλητικὴ ἐν ἀίματι, & νεοτραυμάτι. i. & huius vis est, vt imponita, glutinet vulnera recetia & crueta.

Σιδνεῖτις τρίτη.

SIDERITIS TERTIA.

CAP. XXXI.

Sideritis con sideratio & genera. Siderit secundæ descript. Fuchsi Sideritis.



Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateus Heracleam vocat, in a macerij & vineis nascentem: folijs ab vna radice multis, coriandro similibus, f circa coliculos dodrantales, laues, teneros, subcandidos atq; subrubicundos: flore puniceo paruo, gustanti amaro & lento. b Huius ea vis est, vt quamuis recepti vulneri imposita, sanguinem supprimat.

Sideritis con sideratio & genera.

Tria Sideritis genera præter Achilleam, de qua sequenti capite dicetur, hic à Dioscoride representari constat. Quorum est illam, qua secundo loco describitur, antea in nostris Italicis commentarijs me nunquam inuenisse ac vidisse tradiderim, eam tamen hoc anno Pisis ad me misit Lucas Ghinus Forocorneliensis, vir rei medicæ peritissimus. Reliqua verò genera iamdiu nouisse nos putamus, quòd ea omnibus notis suam quæq; historiam sequi deprehenderimus. Caterum nemini mirum sit, quòd tam varia effigie prima Sideritidis folia reddiderit Dioscorides, vt qui ea modo marrubij, modo quercus, modo saluiae figura depingat. Quippe eorum longitudo saluiae accepta referatur oportet: scabrities deinde superficiei, ac subalbidus color tum eidem saluiae, tum marrubio: quercui postremo, qua in ambitu est diuisura. Talis profecto mihi esse videtur, quam nos primo fixim loco expressimus. Quippe omnibus notis primam refert Sideritim, nec aliud quidpiam obflare videtur, quàm quòd ea frequentius nascatur humidis quàm siccis locis, quanquam saepe eandem virentem in locis quoq; siccis inuenimus. Id itaq; tantum in causa est, vt hanc non ausim omnino legitimam facere Sideritim, & præsertim tum aliam nunc repperim plantam in Viennensi agro, ac in alijs Austriae locis, arido in solo, qua Sideritim primam perbellè refert. Exit enim hac quadrato caule, ipsoq; dodrantali aut maiori, ramosoq; folijs Marrubio longioribus, & ad saluiae faciem accedentibus, crispis & albicanibus, & per ambitum laciniatis: sapore haud ingrato: Floribus verticillatis in caule & ramis prodeuntibus, Marrubij modo, vt ex appicta hic imagine, quis certior fieri poterit. Eadem illi sunt vites quas primo Sideritis generi tribuit Dioscorides & Galenus. Sed ea mihi quidem nihil prorsus primæ Sideriti ad stipulam videtur, cuius imaginem expressit Fuchsius in suo de stirpium historia commentario. Siquidem perspicuum est, quòd eius pictura

I. SIDERITIS I. HERACLEA.

II. SIDERITIS. II.



* III. SIDERITIS VULGARIS hirsuta. *

IV. SIDERITIS. III.


Fig. Sideritis vulgaris hirsuta



pictura non solum non pra se fert folia, & caules, quae Sideritum veram referant: sed etiam flores eius sicuti in c. 10. v. ne,
 non in caulis inter folia marrubij modo, plane vera Sideriti refragari conspiciuntur. Ruellius porro Sideritum hanc non- *Florba lu-*
 nullis herbam Iudaeam appellari tradit. Verum si is Iudaeam illam intelligit, cuius lib. 2. meminit Avicenna, nullo mo- *Arca.*
 000 3 doer-

V. SIDERITIS IIII.

VI. VIRGA AVREA

* VII. VIRGA AVREA LATI-
folia ferrata. *Auicen. her-
ba Iudaica.Virgæ aureæ
facies & vi-
res.Pimpinell. I-
talica.Sideritidis
vires ex Gal.

Nomina. }

dem etiam abstergendi quandam facultatem: sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula vero
inest adstrictio: quare phlegmonem sedat & glutinat. Hac Galenus, de vna tantum Sideritide scribens. Sed cum ex
tribus meminerit, non facile est discernere. Sed ætius sic Græcè, ut etiam Sideritis Latine vocatur: Arabicè Siderite.

do erroris culpa vacare potest. Nam Auicenna Iudaica herba
nil sanè aliud designat, quàm eruum. Sunt tamen aliqui, qui
herbam Iudaicam, itemq; Paganam eam nominant, quæ her-
barijs & medicis quibusdam VIRGA aurea dicitur, caule
rubente, bicubitali, leui, folijs oliua latioribus, circum min-
tissimè serratis, in superficie leuibus: floribus in summitate
caulium spicatis, colore aureo, flores ij, vbi maturuerint, fla-
uescentes in pappos abeunt. Nascitur in collibus, in agrorum
marginibus & vineis. Subamara est, absterforia facultate
glutinativa. Hanc chirurgi in Germania, alys quibusdam
additis, ijs feliciter potandam exhibent, quibus intrinsecum
inflicta sunt vulnera & ad fistulas. Quinetiam eam in un-
guenta, quæ ad id conficiuntur, vtiliter addunt: nam vt ipsi
referunt, glutinandis vulneribus tam intrò in corpus sumpta,
quàm exterius illita, efficax admodum est medicamentum.
Extulit hanc Arnaldus inter recentiores clarissimus author:
ad vrinam ciendam comminuendosq; calculos: quod tamen
apud alium scriptorem hæcenus mihi non licuit reperire. Po-
ta hæc alui fluxiones cohibet, id quod etiam præstat clysterib.
infusa. Eius decocto sanantur fori oris vlcera, firmiturq;
dentes. Idem gargarizatu anginam, & columella inflam-
mationem arceat, & faucium morbis medetur. Veruntamen
hæc, vt ad institutum nostrum redeamus, non erit Sideritis
primi generis, vt fortasse Ruellius existimauit. Sunt quoq;
qui Italicam Pimpinellam tertiam faciunt Sideritim, quibus
ego haud adstipulari possum: quippe quòd illi folia cortandri
non sint, nec eadem circa caules orientur, sed pinnata, è longo
vtrinq; pediculo exeant. Item quod caules pradueros gerat,
non teneros, ac etiam quòd flores, capitulaq; nec amaro, nec
lento gustu habeantur, sed adstringenti & austero. Sideri-
dis vires memoria prodidit Galenus libr. 8. simplicium medi-
camentorum, vbi ita scriptum reliquit: Sideritis habet qui-

Sideri-

Sideritis (à ferro dicta ob vim vulnera glutinantem) triplex Dioscoridi. Plinius sub Achillea sex species recensuit: plures agnoscimus differentias. I. Marrubium palustre, C. B. Sideritis prima, Matth. Lac. Cast. Lugdun. Cam. Sideritis prima secundum Matthiolum, Gef. hor. cui & Lancea Christi aliquorum: Sideritis secunda, Lonic. Marrubium aquaticum Trago, Dod. fol. Lob. Lugd. Thal. Marrubium palustre, Dod. gal. Lon. Verbenæ alterum genus, Cæsalp. Hoc in palustribus provenit, at Dioscorides suam sideritidem in petrosis nasci docet. Huius in Austria altera est species, quæ altius multo exurgit, folia habet magis incisa & aspera, hirsutiora, ac odoratiora, quam à Doctore Nicolao Agerio Argentynense, materiae Medicæ studiosissimo & doctissimo, unâ cum aliis accepimus, ut plenius in nostra historia. II. Sideritis secunda Matthioli & Castori, videtur ex Cannabinis spuris esse: verum cum Sideritis de arvensi glabra flore pallido tantum similitudinis habet, ita ut eam esse alicui facile concesserim. III. Sideritis vulgaris hirsuta, C. B. hanc adiecimus cum eam Camerarius in suo Matthiolo secundam censet, & est Sideritis prima, Fuch. Cord. in Diosc. Gef. hor. Turn. Lug. Heraclea, Co. d. in hist. Sideritis quarta, Lon. Sideritis siæ Ferruminaria. Aduer. & Lob. Sideritis vulgaris, Cam. Tetrahit & Herba Iudæica, Lugdunenti. IV. Sideritis tertia. Matthioli Camer. Lugdu. Castor. Sideritis altera, Lac. Taber. Sideritis prima, Lonicero. Videri posset propter folia inferiora Tanacetum in odorem esse, at Ruta camina Lobeli hac figura proponitur, sed pictoris incuria minus rectè expressa, quæ licet apud nos proveniat, nuper tamen à Nestorino Cortulo Sideritis tertiae nomine accepimus. dicitur Galeopsis tertia, Dod. gal. Ruta camina, J. J. Taber. Scrofulariae similis planta maior, & Sideritis secunda Dioscoridis, Cæsalpino. V. Sideritis quarta, Matth. Lugd. Sideritis tertia, Cast. Taber. Hac figura videtur voluisse Geranium aliquod exprimitere quoad folia, maxime cum Geranium Roperianum Sideritis nomine donetur: at flores non Geranio sed Alchimillæ conveniunt. VI. Virga aurea, quæ & Solidago, seu Consolida à viribus nominatur, alia est latifolia, alia angustifolia, serrata & non serrata, Matthiolum suam foliis dicit ferratis, at pingit non ferratis, quare utramque adposuimus. Virga aurea non serrata, C. B. Virga aurea, Matth. (quo ad iconem) Dod. gal. & fol. Lon. Cast. Lugd. Virga aurea foliis non ferratis, Cam. in Matth. Aurea virga Villanouvani, Lob. Virgæ aureæ alterum genus, Cæsal. Virga aurea Brocemburgensis Thal. Symphytum petraeum tertium, Taber. Leucographis Plinii, Anguillarae. VII. Virga aurea latifolia ferrata, C. B. Virga aurea, Matth. quod ad descriptionem. Cam. in Matth. Cæsal. Thal. Virga aurea altera ferrato folio, Lobel. Virga aurea margine crenato, Dod. fol. Virga aurea ferratis foliis Taber. Virga aurea altera, Lugdunensi.

α Μενμ
ἀτακτεῖσθ
i. inordina-
tos.
† Orib. addit.
ὑποπικρα.
i. subamaris
b. Cat. add.
ἢ κρατεύας
εἰς τὸ αὐτὸ
προεξημέσα
πάντα, ἢ ἄλλο
κοπέεισα με-
τὰ ἀξυγγίε
παλαῖα τὰ
παλαῖα ἰών
ἐλκῶν, ἢ δὲ
ἐπέλοτα
θεραπείαις ἔ-
ρα δ' ἐ κοπέ-
σα ἢ μέλιτι
μυρνεῖσα
ἔστιν ἀνακα-
θαρτικὴ. I.
Et Cræteus
affirmat hæc
omnia, quod
q; tota con-
tusa cum ax-
ungia veteri,
antiqua vice-
ra, quæ diffi-
culter cicat-
ricem admit-
tunt, sanat,
quodq; arida
contusa, &
cum melle
mista vlcera
purgat.

Ἀχιλλεύς

ACHILLEA

CAP. XXXII.

Achillea, quibusdam Achillea sideritis, dodrantales, aut maiores gerit scapos, fusorum effigie minu-
tuli, foliis circumdatos, ex obliquo crebras incisuras habentibus, coriandri similitudine, † subfulvo
colore, lentis odore multo, non infuani, verum medicato: umbella in cacumine rotunda: floribus can-
didis, parpa reis, & aurum æmulantibus: provenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab in-
flammationum periculo tuetur: erumpentem san-
guinem inhibet, & cruenta vulvæ profluvia in vel-
lere. Decocto quoque insident fœminæ fluxione
vulvæ laborantes: ad dysenteriam bibitur. b

ACHILLEA.



Quæ vulgaris vsus Millefolium Achilleam esse existi-
mant, haud dubie, mea quidem sententia, decipiun-
tur. Siquidem id (ut infra latius dicemus de Stratiote mil-
lesolio differentes) falsia non profert crebris ex obliquo secti-
onibus, coriandri similitudine, sed auicularum pennas
æmulantia. Porro tamen constat, Millefolium umbella
coronari modo alba, modo purpurea, modo aurea, non ta-
men propterea colligendam esse Millefolium, & Achilleam
vnam & eandem herbam esse. Quandoquidem non puta-
verim ego fuisse Dioscoridis institutum (ut Ruellio placet)
quod hæc Achillea umbellam ferat candidam, illa vero
purpuream, alia denique auream: sed quod omnibus in uni-
versum Achilleæ plantis eadem insit umbella, quæ tantum
predictis coloribus distincta spectetur. Nascitur in Hetruria
planta, nascitur in Goritiensi agro, scapis ferè cubitalibus:
foliis coriandri proximis, odore quadantenus gravi, non
tamen ingrato: umbella in cacumine rotunda, ampleque,
colore in purpura candicante, punctis quibusdam aureis
depicta, quam semper putavi esse legitimam Achilleam.
Atque in hac persistam sententia, donec quis certio-
rem plantam protulerit: quod hæc mihi planè omnibus notis A-
chilleam Dioscoridis representare videatur. Cateram in
hunc forte errorem, ut crederent nostrum millefolium esse
Achilleam, illos deduxit Plinius, qui lib. 25. capite 5. Achil-
leam Latinis millefolium vocari tradidit. Veruntamen is,
quantum videre est, eo in loco non Achilleam hanc describit,
sed eam omnino plantam, quam Dioscorides myriophyl-
lum

Achilleæ cō-
sideratio.
Mulcorum
error.

Sanguis dra-
conis.Achilleæ vi-
res ex Gal.

Nomina.

lum appellat. Quare paulo post hac verba subiunxit. Sed alij inquit, fatentur veram Achilleam esse scapo caruleo, pedibus sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis eleganter vestitam. Ex quibus verbis liquido apparet dubitasse Plinium, qualis legitima esset Achillea: & ideo ita indeterminatè locutum fuisse, vt nihil in eo perpetuum statui possit. Serapio, auctoritate Constantini, Achilleam, quod (vt ipse ait, licet falso) rubeum succum fundat, Sanguinem Draconis appellat: sed fortasse hic interpretis lapsus suus factus est. Siquidem succum rubeum fundere Achilleam non tradidit Dioscorides: neque etiam (vt omnes compertum habent) lacryma, quam officina Sanguinem Draconis appellant, herba succus est, sed Arabica cuiusdam magna arboris gummi, vel, vt aliqui volunt, draconis animalis est sanguis ab elephante collisi. Cuius loco illius plurimum vendunt impostores, quem hirci sanguine cum resina quauis, sorbis siccis, alijsq; nonnullis adulterant, & in rotundas placentas conformant. Achillea meminit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus scribens. Quidam etiam vocant Achilleam sideritim, quæ proposita quidem, quod ad iam dicta attinet, viribus non est dissimilibus: ceterum adstrictione exuperat: quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebri profluuium congruit. Planta Græcis ἀχιλλεύος, Latinis pariter & Italis Achillea vocatur: Arabibus Sichritis & Egilos: eius vero succum Demalochotten.


Achillea, Matth. Cord. in Diosc. & hist. Lacu. Taber. Thal. Castor. Cæsal. Achillea sideritis, Lugd. Millefolium nobile & stratiotes vera, Tra. Gef. hor. cui & Stratiotes: Tanacetum minus, Dod. gal. & fol. Lob. Lugd. Stratiotes millefolium Matthiolo in tertia & etiam postrema editione. Scopa regia Plin. Dalechampio in Plinium.

Βάτος.

RVBVS.

CAP. XXXIII.

I. RVBVS.



a Meum
μείος πέπε-
ρος, i. media
maturitate.

Ruborum
consideratio.

Rubus notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum fistit, & foeminarum profluvia: præteris mor sui accommodatissimum. Gingiuas firmant, & oris vitiis medentur folia commanducata: cohibent vlcera quæ serpunt: vlceribus in capite manantibus, oculisq; præcidentibus, remedio sunt: condylomatis, & hæmorrhoidibus folia illinuntur: cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia, quæ modò dicta sunt. Mori in rubo nascentis, quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Siftitur aliis a præmaturi cibo, nec non flore in vino potu.

Βάτος ἰδαία.

RVBVS IDAEVS.

CAP. XXXIIII.

Idaeus Rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supra dictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus illinitur: ignem sacrum extinguit, stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Rubi vulgaris planta, plura apud nos reperiuntur generata: quod etiam testatum reliquit Theophrastus libro 3. cap. 18. de plantarum historia. Alius namq; arboris instar crassescens, in altum attollitur: alius sepibus frutescens, implicatur: alius humi serpit, radiceatq; graminis modo, quem

ideo humirubum appellant: alius deniq; alijs modis in syluis, & montibus vagatur. Cæterum qui passim in sepibus, lumentis & frutetis nascitur rubus, virgas edit quadrangulas, subrubentes, obsequiosas, aduncis, minantibusq; aculeis vbiq; refertas. E ramis pediculi prodeunt aculeati, è quibus terna dependent folia, aspera, & in acutum desinentia, fragaria herba haud dissimilia: prominente altera parte dorso, aduncis & minoribus spinis armato: flores profert in ramisculorum summis partibus racemosos, albicantesq;, è quibus mora oriuntur. Radix illi est longa, & longo tractu repens, graminis modo. At IDAEVS RVBVS, etsi ab Ida monte denominari cæperit, quod ibi copiosissimus fortasse habeatur, nascitur tamen in alijs etiam montibus. Nam in Bohemia non solum habetur in montibus vbi sponte eum frequenter inueniadeso reperies, vt montes quidam eo solo syluescant, sed etiam in hortis translatum videas. Est itaq; altero longè ceterior. Siquidem latiora, mollioraq; profert folia, virgas rotundas, fragiles: spinis nullis, aut omnino raris. Flores edit albos vulgaris rubi amulos, quemadmodum & fructus, qui facie rubi mora inuitatur: intercedente tamen coloris ac saporis differentia. Quippe is tenerior est: sapore subdulci pariter ac subadstringenti, & quadam cum insipiditate iucundus. Color quoq; illi est perpetuò rubicundus, nunquam nigrescens, & in superficie subalbicans, ac si esset rore frigido perfusus. Ananienfes, & Tridentini hos fructus Ampomele vulgò vocant, usque fragorum vice vescuntur. His autem fructibus vix maxime delectantur, qui hac de causa, eo potissimum tempore, quo maturescunt, à venatoribus captantur. Sunt & pastorum cibis, qui in montibus ouium caprarumq; greges custodiunt. Fuchsius rubi mora (vt libro primo in lignis mentione diximus) vaccinia esse putat. Sed quare ab eo dissentiam, ibidem diffusius ostendi, quod scilicet vaccinia flores, non fructus esse existimem. Rubi vires descripsit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Rubi folia, germina
flos,

II. RUBVS IDAEVS.

flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, ea-
 q; non obscura. Sed hoc iuter se differunt, quod folia, mollia
 potissimum & recens nata, plurimum in se habent subst.in-
 tia aquea, parum vero adstrictionis: eadem ratione &
 germina. Itaque si mandantur, aphthas, & alia ori vlcera
 sanant: quin & alia vuln era glutinare valent. Est enim eo-
 rum temperies, & ex terrea frigida essentia, & aquea tepida.
 At fructus si quidem maturus fuerit, non parum habet
 succi calidi temperati, qui dulcis est, vti monstrauiimus. Pro-
 inde ob hoc, & propter modicam adstrictionem, esui non in-
 suauis est, at immaturus à frigida substantia terrea vincitur
 & propterea acerbus est, & valde exiccatorius. Et sane vter-
 q; siccatu reconditur, validius quam recens desiccans. Sed &
 flos eandem fructui immaturo facultatem possidet: vtraque
 ad dysenterias, & ventris profluuium, tum robur deperdi-
 tum, & sanguinis expuitiones idonea remedia. Porro radix
 prater adstrictionem non paucam in se habet substantiam re-
 nuem, propter quam & lapides renum comminuit. Hac plan-
 ta Graecis Βάτος, appellatur: Latinis Rubus: Mauritanis Bu-
 leich, seu Haleich: Italis Rouo: Germanis Bramen oder
 Craa: Hispanis Craza: Gallis Ronce. Eius vero fructus Graecè
 Βα-ίνα & Βατίνα dicuntur: Latine Mora rubi: Italice More
 di rouo: Germanice Brambeer vnd Krasbeer: Rubus Idæus
 Graecis Βάτος, Ιδαία: Italis Rouo montano.

Nomina.

Rubi variae sunt species, aliae enim in altum cre-
 scunt, aliae humiles sunt, aliae se arboribus circumuol-
 uunt, aliae per terram repunt. I. Rubus vulgaris, C. B.
 Gef. hor. Thal. Rubus, Matth. Brunf. Fuch. Turn.
 Dod. gal. & fol. Lac. Lob. Anguil. Lon. Cast. Lugd.
 Casal. Rubus grandis, Trag. Rubus primus, Cordo
 in Diosc. Rubus aruensis, Tab. II. Rubus Idæus,
 Spinosus est & non spinosus, fructu item rubro &
 candido. Rubus Idæus spinosus, C. B. Lugd. Rubus
 Idæus, Matt. Trag. Cor. in Diosc. Dod. gal. & fol. Gef.
 hor. Anguil. Lob. Tur. Lon. Rubus Idæus maior,
 Lacuna, quoad descriptionem. Rubus tertius Cæs-
 alpina.

ΕΛΞΙΝ. HELXINE. CAP. XXXV.

Helxine cognomento cissampelos, foliis est he-
 deræ: minoribus ramulis & exilibus, quibus cō-
 plectitur quodcunque contigerit adminiculum.
 Nascitur in sepibus, vinctis, & legetibus. Foliotum
 succus potu deicit aluum.

a Meum
 μακρὰ. i. lon-
 ga' atque eo-
 dem modo
 habet Care-
 taz. sub no-
 mine εὐξίνα.


NVllicertè dubium esse putauerim, quin Helxine cogno-
 mine Cissampelos, quasi hederaceam vitem dixeris spe-
 cies sit Conuoluuli. Sed quæ ea sit, non facile explicari potest.
 Vt cum eam reddiderit Dioscorides, folijs hederæ simili-
 bus, minoribus tamen ramulis exiguis, quibus quodcunque
 contigerit, complectatur: Flores edens albos, cui tamen pur-
 pura perfusus, calathi figura, è quibus semen dicitur nigrum,
 nascaturq; in sepibus, vinctis & segetibus, satis mihi declaras-
 se videtur, eam esse Helxinem, quæ quidem in aruis tum sege-
 tes ipsas, tum limum, tum legumina omnia irretit ac vinct,
 & in vinctis, palis & vitibus circumuoluitur. Hanc He-
 truscum vulgus suo idiomate nominat Vilucchio minore,
 Tridentinis verò Minutola dicitur. Quanquam non desunt,
 qui putent Helxinem eam esse herbam, quæ crebra reuolu-
 tione septa, & vicinos implicat frutices, flores illos candidos
 aestate ostentans, quos nostri vulgò appellant Campanelle.
 Hanc Plinius conuoluulū vocat lib. 21. cap. 5. vbi eam bis verò

Helxinis con-
 sideratio.

Quorundam
 opinio.



HELXINE CISSAMPELOS.



bis depingit. Est, inquit, flos non dissimilis lilio in herba, quem conuoluulum vocant, nascens per fruteta, nullo odore, nec
 crocintus, candorem tantum referens, ac veluti natura rudimentum lilia facere condiscens. Sunt qui aberrantes,
 hanc herbam, & eius florem ligustrum vocent: in qua appellatione deceptus fuit Seruius grammaticus. Hunc errorem ex-
 plosimus libro primo, vbi veri Ligustri mentionem fecimus. Helxinem perpauca perstrinxit Galenus libro sexto simplici-
 um medicamentorum sic inquit: Helxine, quæ & Cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet. Ea Gra-
 te nomi-

Helxinis vi-
 ces ex Gal.

Nomina.

co nomine ἐλατίνη κισσάμπελος: Latino item Helxine cissampelos: Arabico, Acfin: Italico Vilucchio minore: Germanice Mittelwind: Hispanico Campanela yerua.

Conuoluulus minor aruensis, C. B. Helxine Cissampelos, Matth. Fuch. Cast. Lugd. Cam. Helxine hederacea, Lac. Helxine species altera, Ges. de hor. Helxine in segetibus, Cord. in Diosc. Smilax lauis alba minor, Dod. gal. Smilax lauis minor, Dod. fol. Volubilis minor, Trag. Lon. Thal. Volubilis aruensis, Tab. Conuoluulus, Turn. Conuoluulus maior, Ges. de hor. Cæs. Conuoluulus minor purpureus, Lob. Scammonium primum Plinii, Anguil. Cammerario.

Ελατίνη.

ELATINE.



CAP. XXXVI

a Meum
κοιλίαν χ. i.
ventrem, &

Elatine folia habet helxinæ similia, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus, & dodrantalibus ramulis, quinis, senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus: nascitur in segetibus, & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, foliis cum polenta tritis & impositis. Eadem cocta sorbitionis vsu a dysenteriam sistit.

I. ELATINE.

II. NUMMULARIA.



Elatines con-
sideratio.

Rapistrum.

Elatines vires
ex Gal.

Nomina.

Sunt qui velint Elatinen eam esse plantam, quam quidam Nummulariam vocant. Alij verò non hanc volunt, sed eam quam nos vulgò vocamus Sorbastrella, Officina Pimpinellam, & alij quidem Sanguisorbam dicunt. Sed mihi quidem, ut dicam quod sentio, neutrorum placet opinio. Siquidem nummularia imprimis non fert folia pilosa, neque in segetibus, neque incultis prouenit, sed plerumque in scrobium marginibus, præsertim vlgine madentibus. Deinde Pimpinella vocata ramulis exit longè pluribus, quam senis in terram procumbentibus, & folia habet vndique in ambitu laciniata, affrici modo. Ruellius porò Elatinen in Gallia vulgò Rapistrum vocari ait, eòq; ut rapo syluestri in vernis acet. aris raris uti. Verum si rapistrum id Hetruscis est, quod Gallus, certò scio, Elatinen esse non posse. Quæ tamen quod nascatur in Italia, nec negare quidem, nec affirmare ausim, cum hætenus plantam non viderim, quæ illam legitime referat. Atqui veram elatinen, cuius hic imaginem damus, misit ad me Patauio Iacobus Antonius Cortusius, cui nihil deest quod desiderari possit. Galenus de Elatine quam breuissimè disseruit libro 6. simplic. medic. sic inquit: Elatine modice tum refrigeratum adstringit. NUMMULARIA, serpit humi iuncea cauliculis, cubito longioribus, in quibus à radice ad summum breuib; interstitijs vtrinque folia exeunt crassiuscula, rotunda paruorum nummorum instar, vnde illi nomen: flores ferre aureos ac speciosos. Nascitur in scrobium ripis, & vlginosi aggeribus secus vias. Glutinandi, cohibendiq; facultate prædita est. Herba ipsa illita, recentia vulnera glutinat. Idem præstat eorum succus. Præcipua autem vis eius est, ad puerorum enterocelas, cum illita, tum in puluerem hausta. Numularia siue Lunaria minor: Italis Lunaria minore. Huic nomen Græcum est ἐλατίνη: Latinum similiter Elatine: Arabicum Athin.

Elatine duplex est, rotundo, & acuminato, de quo nunc, folio, hæcque in agris hirsutior, in hortis glabrior. I. Elatine, Matth. Cast. Lug. Thal. Cam. Elatine altera, Dod. fol. Lob. in icon. Tab. II. Nummularia duplex est, vulgaris, quæ luteo flore est & ratione loci, maiori vel minori est folio: altera vero parua

parua purpureo flore, de qua in Historia vniuersali. Dicitur Nummularia, Matthiola (cui & Lunaria minor Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Ges. hor. Angul. Lobel. Cast. Lugd. Cam. Casal. Thal. Serpentaria tercia Brunel. Centimorbia, Ges. hor. Hirundinaria minor, Tab. cui & Nummularia minor.

ΕΥΠΑΤΩΡΙΟΝ.


EVPATORIVM.

CAP. XXXVII.

Eupatorium fruticosa herba est, vnicum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, interitum cubitalem, interdum ampliorem: foliis per interualla quinquefolii, aut cannabis potius similibus, quinquepartitò, aut amplius diuisis, nigricantibus & ipsis per ambitum serratis: semen medio caule erumpit, pilosum deorsum spectans, quod siccatum vestibus inhæret. Contrita huius folia, & cum alio adipe imposita, vlceribus, quæ agrè cicatricem trahunt, medentur. Herba, aut semen in vino potum, dynteria, iecinoris vitis, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt, qui aberrantes argemonem hanc appellarint, cum tamen longè alia sit, vti exposuimus.

I. EVPATORIVM.

II. EVPATORIVM VVLGARE.



¶ Sunt nonnulli, immo vniuersa sepe seplasiuriorum turba, legitimi Eupatorij vice quandã aspectu insignem plantam, Eupatori
 5. quæ plerumq; in vlig: nois locis, & in scrobium marginibus enascitur, tricubitali longitudine, folijs cannabinis amulis, considera
 minoribus tamen, quòs albidis, hirsutis, & amaro gustu, & odore medicato, haud insuauis, caute subrubeo, rotundo. Huic
 flore in summitatibus in umbellam exeunt, non tamen simul coherentem, sed diuisam, origani vulgaris modo, colore in
 purpuream albescit, qui mature scentes in pappos abeunt. Radix quæ in plures diuiscatur partes, illi inutilis est, nulluq;
 in medicina vsus. Et quonquam g sciunt, legitimum Græcorum Eupatorium eam esse plantam, quæ vulgè Agrimonia vo- Agrimonia
 6. catur, eorum fortè inimitatione, qui Dioscoridis ætate eandem perperam Argemonem appellabant: cum tamen animis im- est Eupato-
 bitiorum illud errorem rejicere nequeant, vel potius nolint, difficile quidem adduci patiuntur. vt vulgarem Agrimonia- rium.
 Græcorum medicamentis, quæ Eupatorium excipiunt, admisceant. Non tamen hæc propterea dicimus, quòd omni ex parte
 illud Eupatorij vsum damnemus. Palam etenim est, vt ex foliorum amaritudine, & odoris præstantia, quo huius Eupato-
 rij tota redolet planta, percipi potest, id & obstructions aperire, & crassos, lentosq; humores mirifice incidere posse: quine-
 6. am sua plura auxilia præstare, vt paulò inferius explicabimus. Veruntamen nunquam eò deueniam, vt asseuerem hoc
 apud Græcos legitimum Eupatorij nomen sibi asciuisse: tantum illud abest, vt etiam à nullo, quantum equidem inuenerim,
 veterum sub alio nomine posteritatis memoriæ proditum sit. Ruellius tamen nescio qua ratione ductus, in suis de natura
 Herpium commentarijs non sine magno errore sibi persuasit, vulgare hoc Eupatorium dubio procul hydropiperis Hydropiper
 esse, à Dioscoride libro secundo descriptum. Sed nos ibi in nostra hydropiperis commentatione Ruellij errorem latius
 explicauimus, quam vt quicquam supersit addendum. EVPATORIVM à Dioscoride descriptum, flores gerit
 fructos, atroces, radicem lignosam, subrusam pentaphylli modo. Nascitur secus sepes itineraq; in agrorum margi-
 niis, & incultis locis. Caterum Mesues quoque habet suum peculiare Eupatorium, quod vt ex eius descriptione ap- Eupator
 6. pare a prædictis longè diuersum est. Id namque plures ab radice emittit caules: folijs minori centauro similibus: Mesues.
 per ambitum laciniatis: floribus aureis, in umbellam coherentibus, helictrysi modo. Hoc nostratibus Senensibus vulgè
 vocatur

vocatur herba Giulia. Huius comam mulieres per noctem vino albo macerant, ac subinde dilutum pueris potandum praebent dimidij cyathi mensura ad necandos vermes admirabili successu. Nascitur hac in campestribus: atq; ut mea opinio, ea est planta, quae Dioscoridi Ageratum dicitur: quippe quae omnibus notis illi respondeat, et si non desint quibusdam dissentiant: quorum vnus est Andreas Marinus, qui in Mesuis libellum de simplicibus medicamentis aluum exortentibus quasdam nouas edidit annotationes. Verum an is recte Ageratum examinauerit, inferius suo loco narrandum retinquimus, vbi de Agerato differemus. Atqui interim admonendi sunt lectores, vt imaginem quam in pro Mesuis Eupatorio commentarijs nostris in suum transplantauit Mesuem, diligenter intueantur, quod si fecerint illico sane agnoscent, quam ipse in simplicium medicamentorum censu se exercuerit: siquidem is non Mesuis Eupatorium illuc ex Dioscoridi nostro transtulit, quod nos in Agerato primo loco appinximus, quodq; herbam Iuliam a nostris appellari diximus: sed alteram quandam plantam facie, sapore, odoreq; ab ipsa Iulia herba, siue Mesuis Eupatorio valde diuersam, quam nos Ageratum alterum nominauimus. Itaque saepe fit, vt dum alios erroris arguere nitimur, nos ipsos longè magis redargueret in medium offeramus. Hinc itaque addiscant Mauritanorum sequaces, cum tres habeantur planta nomine Eupatory, in medicamentis à Mesue relicta suum interponere Eupatorium: in Auicenna remedys suo item vti: & in Gracorum compositionibus Agrimoniam vulgò vocatam addere. Sed animaduertant velim, ne in hoc Valerij Cordi dispensatorium sequantur, quod perperam, meo quidem iudicio, scribat in confectione pilularum aggregantium, quin & in syrupo de Eupatorio, proprius Mesuis Eupatorio admiscendam esse Gratiolam. Siquidem hac praterquam quod aluum magno incommodo dequirit, nullis etiam planè notis, ac reliquis facultatibus illud representare deprehenditur. Nempe sua deiectione vi, qua magno cum impetu ventrem soluit, iecur imbecillum, atque infirmum reddit. Cordum secutus videtur Fuchsius, in libro de compositione medicamentorum, quem postremò auctum edidit, vbi in antidoto è Lacca magna, illud Eupatorium vt praedictum esse tradit, quod à Mesue describitur, & Gracis Ageratum, Italis verò Gratia Dei nominatur. Quia in re illud de duobus viris (pace eorum dixerim) dici posset, quod est in communiprouerbio: Cæcus cæcum ducit & ambo in senem cadunt. Caterum, vt ad vulgare Eupatorium redeam, viribus sanè pollet id non negligendis. Namque excalfacti fuerit, extenuat, abstergit, incidit, & aperit, & subtilium est partium. Exiritur è contusis recentibus folys succus, & in celam cogitur in pastillos, quorum in medicamentis est vsus. Praestat foliorum Eupatory vulgaris decoctum, aut epotus succus iunioris doloribus, & ceteris eiusdem affectibus ab obstructione proueniens, quo fit, vt perquam commode propinetur hydropicis, malo habitu, ictero, & vasorum insarctu laborantibus: quinetiam contra splenis tumores, & obstructions. Datur quoque succus ad ventriculi apostemata, à frigiditate prognata: in quo casu conuenit etiam herba exterius illita. Foliorum decoctum auxiliatur diurnis, & praesertim pituitosis febribus, ab obstructione proueniens. Idem vrinas, & menses pellit, & scabiem, & pruritus sanat si cum fumaria fuerit decoctum è caprino sero, sed succus fortior est. Is enim potus incipienti Elephantiasi medetur. Flores illiti vulnera recentia, & vlcera sanant. Fugantur venenata animalia herba sicca suffitu. Dicunt obseruatum esse à venatoribus, Ceruos tels vulneratos, deuorata hac planta procul dubio sanari. Datur eadem vtiliter pecoribus tussientibus, & anhelans equis, quorum etiam dolores finit. Succus binum obolarum ponder in catapotys deuoratus intestinorum vermes necat. Idem recenter expressus illinitur commodè ex aceto, & sale aduersus scabiem. Eupatory meminit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, vbi ita scribit: Eupatorium herba tenuis partium, incidendi extergendiq; facultatem circa manifestam caliditatem obtinet: quocirca obstructions icterionis expurgat. Inest ei & adstrictio medica, propter quam robor visceri addit: haecenus Galenus: Ex vino albo decoctum paratum, cum saccharo sex vnciarum pondere tribus diebus potum, mirifice stranguriam sanat, & vrinas pellit. Additur herba in potionibus, quae ad intrinseca parantur vulnera. Est & herba Agrimonia non dissimilis, quae nonnullis POTENTILLA vocatur, tamen si hirtutioribus sit folijs, supernè virentibus, infernè verò albicantibus. Cauliculus profert, qui humi repunt, Pilosella vocata modo: autem floribus ornatur, singulari pediculo pendentibus, ranunculo hortensi amulis. Radice nititur exterius purpurascens, interius verò candicante, austero gustu & adstringenti. Nascitur in vliginosis locis, & propter semitas. Vniuersa hac planta refrigerat, adstrictoria & exiccatoria facultate pollet, replet, roborat. Idcirco mulierum profluvia, dysenterias cohibet, & ceteras alui fluxiones. Id quod & praestare dicitur si recens in calceis, nudis pedibus supponatur. Datur quoque vtiliter potanda sanguinem reijcientibus. Herba decoctum ex vino paratum, praestat potum ad intestinorum tormina, & dorsu dolores. Sicca farina, ex sua ipsius aqua stillatua pota, alui vteri fluxiones cohibet, sed valentius addito Corallio, & eboris ramentis. Sunt qui eam ad enterocelas & bubonocelas praeserant, tum in cibis, tum in potionibus. Namque beluæ vulnera conglutinat, & vlcera sanat, & praesertim quae pudenda inuasere, & oris partes erodunt. Firmat commotus dentes, & laxas cohibet gingiuas, vbi in aceto decoquatur, & eo os saepe colluatur: item dentium dolores mulcet. Prolapsam tumellam restituit, addito aluminis momento. Mirum dictu, quod pedum plantis, manuumq; volis admotus februm qualiumcumq; calores remittit: Herba, quae Gracis ἄγριμονία & ἰπτατόριον, Latinis item Eupatorium & Hepatorium appellatur: Arabibus Casat, Cistit, seu Gaset: Italis & Officinis Agrimonia: Germanis Odermeng: Hispanis Agrimonia: Gallis Agremoine. Eupatorium vulgè, & Officinis, Eupatorium Auicenna: Italis Eupatorio: Germanis Sumquidtraut: At Potentilla quibusdam Anserina: Italis Potentilla: Germanis Brensing: Gallis Agremoine saunage.

Cordi & Fuchsi error.

Vulgaris Eupatory vires.

III. POTENTILLA.

Eupatory vires ex Gal.

Potentillæ descriptio & vires.



Nomina.

Arabis Casat, Cistit, seu Gaset: Italis & Officinis Agrimonia: Germanis Odermeng: Hispanis Agrimonia: Gallis Agremoine. Eupatorium vulgè, & Officinis, Eupatorium Auicenna: Italis Eupatorio: Germanis Sumquidtraut: At Potentilla quibusdam Anserina: Italis Potentilla: Germanis Brensing: Gallis Agremoine saunage.

Eupatorium

* III. QVINQVEFOLIUM
erectum, incanum.*



* IV. QVINQVEF. PALV.
stre rubrum.*



V. DIAPENSIA.



Manardi et
rarum.

Diapensia v.
fus.

quit, fuerit oriundus, verum non ob hoc ambos arguere desinam, donec offeratur mihi pentaphylli planta, qua fraga proferat. Caterum de quarta Quinquefolij specie, qua Diapensiam vocari diximus. Refrigerat & succat, cohibet, reprimat, glutinat & roborat. Germania chirurgi maxime vtuntur ad intrinseca vulnera, enterocelas, & fistulas, eius puluerem, vel decoctum

um marginibus, cauliculus tenuibus, floribus aureis, è quibus subinde semen oritur. Pediculos è se mittit, & in singulis quina folia oblonga, mentha ferè amula, in ambitu tamen magis serrata. Radix illi subrubens apparet, quod quamuis vocat Brasauolus, id tamen alijs, vt mihi eam effodienti, verum esse deprehendetur. Hac in plures radicales diuiditur, elleboro nigro crassiores. SECUNDVM seu album, solus est incanis, hirsutis, per ambitum sensim denticulatis, quibus ex quoque pediculo dependentibus cauliculis mollibus, obsequiosisq; flore candido, radice squamosa, agratis ex obliquo proceduntibus. Nascitur in saxis ingentibus, & saxosis locis. Hinc autem mirari subit Manardum Ferrariensem virum aliqui huius nostrae aetatis ingenio, & doctrina insignem: cuiuspe qui tam facile sibi persuaserit, id legitimum esse Quinquefolium, quod Graeci heptaphyllon, officina vero herbariorumq; vulgus Tormentillam dicunt. Siquidem hac septem ex vno tantum cauliculo profert folia: Pentaphyllum vero quinque, vnde & illi nomen. Hoc radices elleboro similes habet, crassiores tamen, oblongas: illa vero admodum breues, striamosas, simulq; in vnum compactas globum. Gignitur hac plerunque in incultis, siticulosisque locis, in altis praesertim montibus: illud vero in campestribus, & prope aqua ductus, & in riguis. Quae sanè omnia aperte declarant, hac in re Manardum cacutiuisse. Caterum non possum non mirari simpliciter se Plinium lib. 15. capite 9. Quinquefolium nulli esse ignotum: cum etiam fraga gignendo commendetur: Quippe id perpetuo esse falsum, ipsamet quinquefolij planta apertissime testatur. etsi asserat Brasauolus, cui nos minime subscribimus, in Veronensi agro nasci Fragariam, cui quinque vnicuique pediculo insunt folia, & qua fraga gignit, in cibus gratissima putetq; de hac intellexisse Plinium, quod a Verona, vt ipse in-

VII. FRAGARIA.

* VIII. FRAGARIA FRV-
ctu albo. *



IX. EUPHRAGIA.



decoctum vniuersa planta potui exhibentes. Idem quoq; praestat foliorum & radicum farina. Quinetiam ad morbos omnes, vbi adstringenti, solidantiq; medicamine sit opus. Est tamen non ignorandum, hoc non esse Saniculam illam, qua etiamnum quinis exoritur folijs, radice alba, miro natura artificio laciniata, de qua superius in symphyri mentione disseruimus: sed aliud longè differens. Quinquesolij vires retulit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, his verbis: Pentaphylli radix, inquit, desiccatur vehementer, minimum verò acris est. Quare in multo est vsu, velut alia quoq; omnia, qua cum sint tenuium partium, citra morsum desiccant. Est enim haec radix desiccatoria ex tertio quodammodo ordine, minimum habens euidentis caliditatis: haec Galenus. Quinquesolium album adstringit, siccatur, roboratur, repellit: radix subtilium est partium. Ea omnia prestare potest qua alterum, quo tamen adstringentior est. Caterum quoniam Pentaphyllum Fraga nobis in mentem redegit, cum ea sint tam cibus, quam medicamentis idonea, ideo & res, & locus mihi expectere videtur, vt hic tum planta, tum fructus eius vires perstringamus. FRAGARIA itaq; planta est nemini ferè non cognita, aded vt hoc nomine superuacuum putem, eius faciem repraesentare. Planta est humi repens, folijs pentaphylli maioribus, ternis ex vno pediculo prodeuntibus, & per ambitum serratis: floribus candidis, rubi amulis, è quibus fraga oriuntur: cauliculos habet tenues, hirsutos, obsequiososq; radices habet numerosas & tenues, adstringentis gustus. Proveniunt in montibus, collibus, syluis, secus itinera, & prope sepes. Refrigerat ordine primo, siccaturq; secundo. Folia, & radix vulnera, & vlcera sanant: muliebres fluxus, & dysenterias cohibent, vrinam cient, & lieni conferunt. Herba, & radicem decoctum potum, auxiliatur iecinoris inflammationibus, mundaturq; renes, & vesicam. Idem ore contentum, col-

Quinqueso-
lii vires ex,
Gal.

Fragariae &
fragorum vi-
res.

lacionisq; modo agitarum, gingiuas roborat, dentes commotos firmat, & destillationes sistit. At Fraga praeter id quod gustui astate in cibus arrideant, bilosis astuantibusq; ventriculis profunt, siticulosissq; sitim sedant. Vinum, quod ex his elicetur, vlcusculis, qua in facie à caliditate proueniunt, mirifice medetur: itemq; varos, & oculorum nubeculas, calidasq; defluxiones impositum tollit. Neq; etiam hic silentio dissimulanda videtur EUPHRAGIA, quam nobis Fraga nunc ob Euphrasiae
vocalorum vicinitatem ad memoriam reuocarunt, cum & ipsa miris ad oculorum morbos viribus praedita sit: etsi à delineatio & Veteribus vires.

Vinum Euphragiatum.

Nomina.

veteribus Græcis nusquam, quod legerim, descripta reperitur. Est itaq; Euphragia tenuis planta, qua ad palmi altitudinem assurgit: solys minutis, crispis, per ambitum serratis, gustu adstringentibus, paululumq; amaris: caule exit tenui, rubentiq; flore inter purpuram & aurum albicante, quem emittit abeunte æstate: nascitur in pratis & in sylvis. Et sic hac quocunque modo sumatur tam in cibis, quam in medicamentis recens, vel exiccata ad omnia impedimenta, que oculorum claritati officiant, præsertim cum in cibis aut potu diutius sumitur. Fit ex ea vinum vindemiarum tempore, tum & musto macerata, de quo Arnaldus in hunc modum disseruit: Euphragia vinum, inquit, fit ad oculos, ponendo herbam in musto donec fiat vinum. Cuius vsu oculi senum reiuuescunt, & aufert impedimentum eorum, & defectum visus in quocunq; cuiusvis ætatis homine, præsertim ubi pinguedo, & pituita redundent. Et est qui permansit nihil videns per longum tempus, & infra annum eius vsu restitutus est ad visum. Ipsa enim herba calida est, & sicca magis, abstergit & cohibet: & habet hoc à proprietate, quod quando puluis eius comeditur cum ouorum vitellis, idem mirifice præstat, vel quando puluis idem recipitur cum vino. Et supersunt testes fide digni, qui fecerunt in se ipsis, & qui non poterant legere sine ocularijs, & legerunt postmodum absque ipsis, etiam literam subtiliorem. Et vsus vini Euphragiatum non habet parum proficiendo visui. Si autem vinum esset nimis forte, temperetur cum aqua fœniculi: & si opus est, addatur zuecharum necessarium. Hæc Arnaldus in libro de vinis. Herba πεντάφυλλον Græcè, Quinquifolium Latine dicitur: Italice Cinquefoglio: Germanicè Weis sünnß Jünger fraut: Hispanicè Cinco en rama: Gallicè Quintesueille. Quinquifolium album, Græcis πεντάφυλλον λευκόν: Italis Cinquesoglio bianco. Ar Diapensia siue Sanicula, Italis, Cinquesoglio maggiore: sic Fragaria, Italis Fragolaria. Fraga verò, Italis Fragole & Frage: Germanis Erdbeere. Sic Eufragia, Italis Eufragia: Germanis Augentrost: Gallis Eufraise.

Quinquifolium, quoddam quina sint singulis pediculis folia: quindecim species nouimus, hic quatuor proponuntur. I. Quinquifolium maius repens, C. B. Quinquifolium, Matth. Cord in Diosc. Lacu Cæsal. Pentaphyllon minus, Brunf. Gef. hor. Pentaphyllon vulgare, Trag. Pentaphyllon luteum maius, Dod. gal. Pentaphyllon primū, Lon. Pentaphyllon Diosc. Tab. Pentaphyllon maius flore subluteo, Lob. Pentaphyllon fragariæ cognata, Gef. hor. Pentaphyllū repens, Cam. Quinquifolium luteū maius, Fuch. Lug. Quinquifoliū secundum, Turnero. II. Quinquifolium albū maius, C. B. Pentaphyllū album, Mat. Dod. gal. Pentaphyllon verū ac nobile, Trag. Pentaphyllū, Gef. hor. Pentaphyllon maius flore albo, Lob. in icon. Pentaphyllon albo flore, Camer. Quinquifolium maius candidum, Fuch. Quinquifolium primum, Turn. Clus. hist. Panno. Quinquifolium album, Matth. in comp. Lugd. Quinquifolium syluaticum, Taber. III. Quinquifolium erectum incanum, C. B. Hoc à Matthiolo inter figuras maiores nomine Pentaphylli albi, sed sine descriptione, proponitur. Quod ex radice obscure rubra, oblonga, altè descendente, adstringente, vnum alterumvè caulem sesquipalmarem erectum, rotundū, inferne rufo cortice tectū, superne albicantem, in alios brachiatum profert, quem folia angustiora, minora, profundioribus incisuris diuisa, supernè ex virore nigricantia, auersa parte incana, cingunt: flores quinquifolij, quorum medium aliquot stamina lutea occupant, cauliculorum summis & quidem pedicellis incanis, singuli ex singulis calycibus prodeuntes, lutei, parui, insident, quibus delapsis, semen minutum fuscum, in fragi rudimentum congestum, succedit. Spontè apud nos locis asperis circa vias & ad agrorum scrobes, locisq; arenosis præuenit. Dicitur Pentaphyllum exiguum alterum, Tra. Pentaphyllum tertium, Lonic. Pentaphyllum rectum minus, Camer. Pentaphyllum canum, Thal. Quinquifolium minus, Fuch. in icon. & Turn. Quinquifolium luteum minus, Lugd. Quinquifolium minus, Fuch & Camer. in Mat. Quinquifolium petræum maius, Taber. IV. Quinquifolium palustre rubrum, cum suo Matthiolo addiderit Camerarius, de eo paucis. Hoc radice est nigricante, longa, geniculata, à qua sarmenta longa, gracilia, striata, per terram sparguntur, in quibus ramuli dodrantes, glabri, reclinati, pentaphyllo similes: folia oblongis pediculis donata quina, septena vni pediculo in hærentia, supernè viridia, auersa parte in cinereo candicantia: flores profert in caulium fastigio, vt plurimum geminos, in quinque aut sex folia diuisos, obscure rubentes, eiusdem coloris staminibus in medio paruum capitulū cingentibus, quod paulatim augetur, donec in capitulum durum frago simile, sed obscurius rubens, nulloq; intus succo, seminibus factum, excrefcit. Nascitur vliginosis locis, in scrobibus & iuxta stagnantes aquas, medio vere & post florens. Tota planta astringentis est facultatis. Dicitur Pentaphyllum rubrum, Dod. gal. Lugd. Pentaphyllum palustre, Cord in hist. (& eius Scholiasti Heptaphyllum Plinii fragiferum) Thal. Camer. Pentaphyllum rubrum palustre, Lobel. in icon. Quinquifolium palustre, Gef. hor. Camer. in Mat. Taber. Quinquifolium quartum, Dod. fol. Quinquifolium rubrum, Lugd. Heptaphyllum Cordi Camer. Quinquifolium palustre fragiferum vel Heptaphyllum Porphyranthemum, Camerario in suo Matthiolo. V. Sanicula à sanandis vulneribus dicta, dicitur Diapensia, Matth. Brunf. Castor. cui & pentaphylli quarta species, Sanicula, Brunf. Trag. Dod. gal. & fol. Lacu. Gef. hor. Lonic. Lobel. Cæsal. Thal. Cam. Taber. cui & Consolida quinquifolia. Sanicula mas, Fuch. Lugd. Sideritis tertia Dioscoridis, Fabio Columnæ. VI. Sanicula montana rotundifolia maior, habetur enim & minor & altera longifolia, C. B. Ex radice crassiuscula, minimum digitorum sæpè longa, subruffa, multis fibriscandicantibus donata, caulis exurgit pedalis & altior, viridis, hirsutus, cui folia subsunt circinata ferè rotunditatis, oblongis pediculis pilosis in hærentia, per ambitum crenata, supernè viridia, prona parte exalbida & valde hirsuta, quæ tamen cultura penè euanescit: quæ in caule superioribus respondent: summi caules in plures ramulos brachiantur, singulisq; ramulis terni aut quaterni insident flosculi albi, quinquifolij punctis sanguineis notati, Oxyacanthæ odore, staminibus pluribus medium florem occupantibus: succedunt capitula saxifragiæ albæ similia, semen minutum & nigrum continentia. Iunio floret, at in hortis maturius. In montibus Rheticis legimus, & in Fracto locis vmbrosis & humidioribus. Sic & in omnib. Pannoniæ alpebus. Adstringit & ferè insipida. Monet Camer. in suo Matth. ex prona parte folij cutem decorticari, & illud vulneribus imponi: elici etiam aquā ex planta minutim concisa ad vulnera glutinanda, aut flores in puluerem redigi: itemq; folia & vlcibus vulneribusq; inspergi. Dicitur Sanicula alpina alia, Gef. hor. Sanicula montana prima, Clus. hist. Panno. Sanicula alpina siue guttata quibusdam. Italis vmbilicus Venetis. Septentrionalium aliis Hepatica montana: Valefius l'herbe sante Condria, vel sans Contura Germa-

* VI. SANICVLA MONTANA rotundifolia minor. *



PHOENIX.

Germanis *Wild Scheltraut / oder Weisse Sanicel /* Camerario in suo Matthiolo. Caryophyllata siue Geum alpinum recentiorum folio hederaceo, Adu. Lob. in icon. Caryophyllata siue Geum Alpinum, Lugd. Cotyledon tertium Dalechampii, eadem, VII. Fragaria, ab odore fragrante, quem mora ipsius spirant: mora terrestria dicta Seruio. Dicitur Fragaria, Matth. Brunf. Trag. Fuch. Turn. Dod. gal. & fol. Lonic. Lobel. Castor. Lugd. Cæsal. Thal. Fragula, Cord. in hist. Fragum & Trifolium fragiferū, Tab. Sunt syluestria, hortensia: variant fructu maiore & minore, rotundiore, longiore: colore rubra, alba, media, sanguinei coloris. VIII. Fragaria fructu albo, C. B. Priori minor est planta, magisq; cana, fructu aliquando toto candido, minus granoso, dulci, aliquando parte superiore rubicundiore. Hanc in hortis tantum notauimus. Dicitur Fraga candida, Trag. Fraga alba, Camer. in Matth. Fragum album, Tabernamon. IX. Euphrasia *εὐφρασία* dicta, eò quòd oculos eorum caliginem discutiendo, deletet. Euphrasia Officinarum, C. B. Euphrasia, Matt. Castor, Thal. Euphrasia alba, Brunf. Euphrasia vulgo, Cæsal. Euphrasia Augustinensium, Trag. Euphrasia, Fuch. Lacu. Lonic. Lobel. cui & Euphrosyne & Ocularis. Euphrasia. Dod. gal. & fol. Lugd. Taber. Alia ramosa, alia non: flore ex luteo albido, aliquando ex cæruleo purpurascete.

Φόινιξ. PHOENIX. CAP. XXXIX.

Phœnix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora: spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasve spicas. In aruis, tectisq; recenter illtis nascitur. Harum virium compos, vt in vino austero pota alui profluuium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrinae impetus infrenet. Sunt qui adalligatam in puniceo velere, & suspensam sanguinem suppressere prodant.

Phœnix Hetruscis syluestre Lolium dicitur, quod spicas Phœnicis proferat lolio similes. Nascitur frequens in vicis secus vias in agrorum marginibus, & in templorum plateis: quae quidem nulla prorsus repugnante nota Dioscoridis descriptioni adstipulari deprehenditur. Plinius lib. 22. cap. 25. Phœniceam herbam ita à Graecis appellatam, à Latinis lolium murinum vocari ait, quod fortasse mures derodent spicas illius, qua in adificiorum tectis prouenit. Hac frequentissima visitur Goritia in cœmiterio diui Francisci, & Venetis in litore maris prope sacellum diui Nicolai. In summa eius vber vbiq; prouentus. Huic herbae nomen Graecum *φόινιξ*, Latinum *Nomina: similiter Phœnix, Lolium murinum, & Hordeum murinum: Italicum Giglio saluatico: Germanis Walde Rohr / oder Winkenhelmer: Gallis Taraye sauage.*

Phœnix (à phœniceo colore) Dioscoridis, seu Lolium spica breuiore, Herba Phœnicea Graecis, & Hordeum murinum Plinii, C. B. Phœnix, Matth. Turn. Dodo. gal. & fol. Cordo in Diosc. Lac. Lon. Lob. Castor. Lugd. Thal. Cæsal. Lolii quartum genus, Trago: Hordeum murinum, Lobel. in icon. (cui & Lolium rubrum) Taber, & Lolium syluestre.



Lolium perenne
Idaia piza *Staub.*

IDAEA RADIX.

CAP. XL.

Idae radici folia sunt ea, quae rusco: adherent iis veluti exigui capreoli, è quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Potatam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Idææ radicis
consideratio.

Idææ radicis
vires ex Gal.

Nomina.

Idææ radix hodie, quod sciam, ad nos non conuehitur: nec quenquam hætenus reperi, qui scribat, ubi hæc planta prom-
nascatur: etsi cognomine natale eius solum facile indicari videatur, quod scilicet in Ida monte, qui ad Troadem spectat,
tradidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Idææ radix gustu admodum acerba est: ac si opera pe-
riculum facias, eandem vim præferet, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, dysenterias, profluvium mulierum. &
quacumq; eius sunt generis tum pota, tum foris imposita curans. Ea ut Græcis Ἰδαία ῥίζα, ita etiam Latinis Idææ radix vo-
catur: Italis, Radice Idæa.


Ῥοδία ῥίζα

RHODIA RADIX

CAP. XLII

Rhodiæ radi-
cis confid.

Rhodiæ rad.
descriptio.



Gignitur Rhodia radix in Macedonia, costis si-
milis, leuior, inæquabilis: quæ contrita rosas
redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta
fronti, & temporibus cum rosaceo momento im-
ponatur.

Rhodia radix planta est non omnibus planè vulgaris, &
cognita in Italia: etsi ea facile in Apennino, & Gargano
montibus nasci, & inueniri possit. Que in nostro bello
Goritia viret, iamdiu eam Græzio Styria oppido Petrus
Salicetus medicus clarissimus, & in simplicium facultate
non imperitus, ad nos primum videndam misit: quem ta-
men postea frequentissimam reperi in monte magno supra
Vipacum, qui circiter viginti millia passuum à Geritina di-
stat. Caterum quoniam paucis sanè notis eam perstrinxit
Dioscorides, ut ab omnibus facilius & cognosci, & reperi
possit, nos non temerè facturos duximus, si eius historiam hic
diffusius tradamus. Radix itaq; Rhodia caules emittit rotun-
dos, quadantenus concauos, cubitales, à quibus circumqua-
que folia prodeunt longiuscula, in acutum desinentia, por-
tulaca, aut minoris sedi instar pinguis, minutimq; per an-
bitum serrata. In caulium cacumine umbellam profert, vin-
dem tithymali cyparissij modo, sed quæ, ubi destiterit, ru-
bescat. Radix ei inæqualis, strumosa, crassa, qualis pseudon-
sto, quod ex Gargano Monte aduehitur, leui cortice obducit
quæ recens est, exterius splendescens, & intus subalbida: quæ
verò sicca est, leuis percipitur, intus substantia rubens, &
foris squamosa. Mansa hæc recens, aut trita odore mirum in
modum rosas refert: vnde meritò ei Rhodia nomen. Præterea

omnium radicum viuacissima est: quippe quæ à terra effossa, nisi locis perquam siccis reponatur, post multos menses, ut
plantata statim repullulat. Nascitur in altissimis montium rupibus saxosis, præruptisq; locis, ubi vix tantum terra in-
cum habet, ut illi inherere possit. Valet hæc ad capitis dolores à quacumq; causa prouenientes, si recens confracta, & rosacea
aqua perfusa, ubi calidus sit affectus: aut cum amaraci aqua, si frigidus sit morbus, fronti temporibusq; illinatur. Cere-
brum roborat odoris iucunditate, conuenitq; (ut diximus) omni capitis dolori, utpote quæ temperatis sit qualitatibus præ-
dita: id quod indicat rosaceus eius odor, quo mirificè redolet. Rhodiæ radicis meminit Galenus lib. 8. simplicium medica-
mentorum, sic de eius viribus scribens: Rhodiæ radix ea videlicet, quæ in Macedonia nascitur, tenuium partium, & di-
cutientis est facultatis. In calfaciendo verò secundi recessus censenda est, aut certè tertij incipientis. Hæc planta Græcis
Ῥοδία ῥίζα Latine Rhodiæ radix nominatur: Italicè, Radice Rhodiæ: Germanicè Rosenwurzel.

Rhodiæ radi-
cis vires ex
Galeno.
Nomina.

Rhodia radix, Matth. Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord in hist. Lacu. Gef. hor. Lobel. Clus. hist.
Panno. Lugd. Camer. Radix Rhodia, Castor. Gef. hor. appen. Rosea radix, Fuchl. in icon. Lonic. Tab.
Verum non solum radix contrita rosas spirat, sed & flores odorati, qui rubentes quadrifolij, singulis in
acumen desinentibus, intusq; pallidi sunt.

Ἐκίσητον

EQUISETVM.

CAP. XLIII



a Cat. xxi-
λοι. i. cau-
les. At me-
cum Ruello
concordat.
b Vtrunque
exemplar
Ἐκίσητον i. so-
lidos.

Equisetum in riguis, & scrobibus nascitur a cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se facti, rubes-
centes, leniter scabri b & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublimè attollitur, vicinos arbor-
um caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix in-
gnosa, dura. Vis herbæ spissare, quare sanguinem naribus erumpentē succus ipse sistit: prodest dysente-
ricis in vino potus: urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tritis folijs, & illitis. Radix cum iun-
herba tussim, orthopneam, ruptaque adiuuat. Folijs in aqua potis, dissektiones vesicæ, & intestinorum,
enterocelæq; in vnum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum Equisetum caulis est rectus, cubito mace-
inanis: comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, vulneribus
remedia est, eademq; fungitur facultate.

Equisetum


I. EQUISETVM I.

II. EQUISETVM II.



III. EQUISETVM III.

IIII. EQUISETVM IV.



Equisetum perenne & integrifolium

Equisetum, officinis & herbarijs plerisq; verbum Græcum reddentibus Cauda equina nominatur. Cuius tamen si Dioscoridi duo tantum describantur genera, nos tamen quatuor hæcenus obseruauimus, quarum omnium hic expressimus imagines. Primum autem Caudam equi omnes ferè appellant, quòd facie equorù caudas referat, vnde & Græcis Hippurus dicta est. Profert hæc, cum primum è terra erumpit, quoddam tenerrimum germen oblongum, iuglandium iulo non absimile.

Equifeti consideratio.

ab simile, subnigricanti colore: & deinde caules inanes geniculati, subrubescetes, leniter scabri: iuncea circa eos coma
 spera, exilis, setarum instar, adeo vt equorum instar cauda appareat. Radicem lignosam, duram. Nascitur humecta &
 quosis locus, in riguis & scrobibus. Hoc quod rura nostra vulgo vocant Paltrus, alo, in cibumq; assumunt, ut uny quasar ay
 malis tempore. Etenim illud prius elixant, mox farina circumspargunt, & oleo in sartagine frigunt, manduntq; p
 vice. Ex quo cibo alius quandoq; eorum adeo constringitur & constipatur, vt in coli cruciatum facile incurrant. Quippe quod aqua
 primum hoc Equiseti germen siccum asseruent per annum, quo subinde estate vtantur ad dysenteriam. Quippe quod aqua
 calida nocte maceratum eo modo decoquunt, quo dictum est, & in cibum magno successu exhibent. Vtrunq; Dioscorid
 Fuch. lapsus. Equisetum eleganti admodum pictura expressit Fuchsius in suis magnis de stirpium historia commentarijs. Sed ne
 postea ratione ductus is in primo libro, in quem plantarum imagines duntaxat depingi, & imprimi curauit, primum genera
 Equisetum pro Polygono sœmina aperto lapsu reddiderit. Equisetum tertium caule edit geniculatum striatumq; ma
 fragilem, à quo complures oriuntur rami: & ipsi quoq; geniculati ac asperi, nulla circumstante coma. Prouenit & hoc pa
 lusri solo. Iisdem cum alijs pollet viribus. Equisetum quartum, recto prouenit caule, firmiore, minusq; geniculato. a qu
 rami procedunt, iuncea quasi processibus stipati, isq; asperis, geniculatis, tenuibus. Prouenit isdem in locis, & eadem vi
 res habet. Expetitur Equisetum malieribus ad stannea vasa detergenda illustrandiq;, nec non etiam materiarum fabri
 is presertim qui torno opera sua conficiunt. Siquidem huius herba asperitate illa suis vasis splendorem nitoremq; conser
 ant, isit verò similiter suorum operum ruditatem expoliunt. Omnium decoctum aut stillatitia aqua, pota vlcibus renam
 ac vesica mirifice medetur. Equiseti meminit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, vbi eius vires retulit hu
 Hippuris, inquit: adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde valenter simulq; citra mordacitatem
 exiccantem. Itaq; vulnera maxima cataplasmate imposita conglutinat, etiamsi praesectos esse nervos contingat: praeter
 vocatas enterocelas glutinat. Caterum ad sanguinis reiectionem, ad profluum muliebrem, potissimum rubrum, ad d
 terias, & ad alios ventris fluxus generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua, aut ex vino pota. Sunt qui de ea scriptu
 reliquerunt, quod nonnunquam etiam vesica, ac tenuium intestinorum vulnera succus ipsius sanauerit. Prodest etiã pro
 fluuiio sanguinis ex naribus, tum fluxui obnoxys in ventre affectibus, ex austerorum vinorum quopiam potus: ac si febre te
 neantur, ex aqua. Quae planta Graecis ἵππυρος, Latinis, Equisetum appellatur: Arabibus Dhenben alchail, Dhenb alcha
 siue Daneb alchail: Italis Coda di cavallo: Officinis cauda equina: Germanis Rosschwanz: Hispanis Coda de mula &
 Rabo de mula: Gallis Queue de cheual & Prela. Equisetum alterum, Graecis ἵππυρος ἑτέρος: Italis Coda di ca
 uallo minore.

Fuch. lapsus.

Equiseti vires Matth.

Equiseti vires ex Gal.

Nomina.

Equiseti nouem agnoscimus differentias. I. Equisetum aquaticum longioribus setis, C.B. Equisetum primum, Matth. Lacu. Cast. Lugd. Equisetum secundum, Tab. Equisetum maius cum asparagis nouellis, Lob. Equisetum, vulgo Asprella, Cæs. Hippuris maior Brunf. Dod. fol. Hippuris. Lob. in iconibus. Hippuris Dioscoridis, cauda equina, Tab. in icon. Caucon Plinii, Anguillaræ. II. Equisetum pratense longissimis setis, C.B. Equisetum secundum, Matth. Lac. Equisetum longius, Fuch. Equisetum, Cordo in Diosc. Equisetum minus, Dod. gal. Equisetum alterum, Lugd. Cæs. Equisetum palustre maius, Tab. Cauda equina, Brunf. Hippuris maior altera, Trag. Hippuris maior vel prima Lonic. Hippuris fontalis, Lob. Hippuris minor, Dod. fol. Thal. Polygonum fœmina, Fuch. in iconibus. III. Equisetum iuncea ramosum, foliis nudum, C.B. Equisetum tertium, Matth. Lugd. Hippuris minor, Lob. Dod. in folio. qui

* V. VVA MARINA MINOR.



cum præcedenti iungit: cum equiseto iuncea Tragum quod ramosum non est, idem esse nequit. IV. Equisetum quartum, Matth. Lugd. Videtur Matthiolus voluisse Vuam marinam Monspelienfium exprimere, cuius geminam figuram adposuimus. V. Vva marina maior, aut Tragum Dioscoridis. Radice est, aliquot pedes longa, latè serpente, dura, lignosa: ramulis ab eadem radice prodeuntibus, frequentibus, tamentosis, gracilibus, iuncum referentibus, pedibus & nigricantibus, cuius virgulæ in iuncea cuspides abeuntes, multis internodijs distinguuntur: quibusdum adhuc tenellæ sunt, ad quodlibet internodium duò foliola pusilla, quæ in adulta planta non obferuantur, adposita: flores pallidi, herbidi, minuti, conferti instar florum corni, secundum internodia sunt, quibus succedunt copiosi fructus rubentes, ex granulis ternis aut quaternis, tritico paribus, exigui mari effigie, furculenti, acidi, esui grati, vrinam multum cientes: hi granum vnum aut alterum duriusculum triquetrum, vtrinq; acuminatum, foris nigrum, intus album medullosum & perquam adstringens continent. Maio floret & Augusto fructus maturefcit Monspelluli inter stagnum Volcarum, & mare mediterraneum, & ad montis Ceti radices copiosissimè, vbi piscatoribus Rasins de mar, hoc est, Vva marina vocatur. Hanc alii Bellonium secuti ad Androsfacen: alii ad Croton Nicandri: alii ad Polygonum quartum Plinii, vel eiusdem Ephedram referunt. Dicitur Croton Nicandri, Anguillaræ. Racemosa Equiseti fatie plantæ, Aduersariis. Vva marina Monspelienfium, Lobelo in iconibus: Polygonum quartum minus, Clusio, historia Hispanica: Polygonum mari-

maximum secundum, Tabernamontano: Tragus siue Scorpio maritimus, Lugdunensi. Tragos, Catalpi-
no libro sexto & Camerario in horto.

Κόκκος: Βερεκίνη.



COCCVM INFECTORIVM.

CAP. XLIII.

Cocum, quo infectores vtuntur, frutex est surculosus, paruus, cui grana ceu lentes adhærent, quæ
electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia: deinde Asia & Cilicia: vltimum ex
omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulneribus, neruisq; præcis, conuenienter ex aceto tritum il-
linatur. Nascitur quoq; in Cilicia è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis
mulieres ore legunt, & cocum vocitant.

I. COCCVM INFECTO-
rium.



* II. ILEX COCCIFERA. *



ET si Cocum seu granum tinctorium seplasiarijs, & infectoribus notissimum sit, quod & medicamentis admisceatur, Cocci infe-
& coplurima tum fericea, tum lanca stamina insici soleant, nescio tamen an eius arbuscula in Italia proueniat. Fru-
ctus est surculosus, folijs oblongis per ambitum aculeatis aquisoly modo, sed longe minoribus, bacis rotundis, inanibus, puni-
ceo colore. Nos autem eam, cuius picturam damus, vidimus ex Byzantio allatam. Porro Cocum tinctorium communis
v. us, constat rotunda inaniq; bacca, quæ nullam profecto lentis faciem refert, vt Dioscorides asserit. Vt hinc planè conijcere
liceat, Cocum hoc diuersorum esse generum, nostrumq; facile illud esse, quod Plinius in Attica & Aphrica prouenire tra-
dit. Sædlection ideo vocatum, quoniam ex eius medulla tenues exoriuntur vermiculi: argumento, quod hoc mane intus de-
prehendatur. Huius puluere non infelicitè vtuntur mulieres Italica ad sextum roborandum & prohibendum abor-
sum, ipsum grauidis in ouo sorbili propinantes, pauco addito thure, vel mastube. Quod in quercubus nascitur cocum (vt
Dioscorides in Cilicia nasci scribit) copiosum quoq; in Bohemia prouenit. Primum quod a me visum est, truncum serè to-
tum occupabat non infima quercus, non longè a Poggibrot in Leporario quod Parcum ferarium vocant Casaris Ferdinan-
di, ac deinde in alijs etiam locis, sed cum ab incolis non agnoscat, quotannis perditur. Atqui in Polonia vbi etiam copio-
sum prouenit, non desunt, qui illud diligenter legunt. Ceterum contendunt Monachi illi reuerendi, qui in Messem com-
mentarios ediderunt, aliud esse Cocum, aliud verò Chermesinum vulgò vocatum, quo serua stamina roseo colore insici-
untur. Etenim asserunt y legitimum chermesinum è quibusdam fieri granulis, quæ vt plurimum vulgari Pimpinella radi-
cibus adherentia reperiuntur, vocariq; hæc propriè Mauritanus Chermes: & hinc isti deinde colligunt, minime credendum
esse, quod Græcorum Cocum vulgò grana tinctorum nuncupatum, sit Mauritanorum chermes: quandoquidem magna o-
mnino inter colorem coccineum, & chermesinum intercedat differentia. Sed hos patres hallucinari (pace tamen eorum di-
xerim, ex eo equidem euidentissimum fieri arbitror, quod hæctenus neminem Arabica secta inuenerim, qui eorum adsti-
puletur sententia. Siquidem Serapio per chermes nil aliud intelligit, quam Cocum tinctorium à Græcis appellatum, cum
de Chermes agens ea sanè omnia in eius historiam referat, quæ Dioscorides suo Cocco tribuit. Quapropter scirem libentissimè
quæ ratione, quæve auctoritate nixi y reuerendi Monachi in hanc vanam, & erroneam deuenierint opinionem. Verum
non ob id negauerim ego nostrum Chermesinum à Cocco minime differre, quod certò sciam, aliud esse Cocum, aliud Cher-
mesinū, vnde & infectores differentia causa Cocum Granam nuncupant, Chermesinum verò, quod è pimpinella radiib.
accipitur: sed negauerim quidem Mauritanorum chermes nostri vsus chermesinū esse, quod nil aliud Chermes esse putem,
quam
Cocci infe-
ctorii vires
Matthiolo.
Cocum in
Quercu.
Monachorū
opi, explota.
Cocum in-
fectorium a
chermesino
differre.

I. PIMPINELLA SAXI-
fraga.

* II. PIMPINELLA MI-
nor.



III. PIMPINELLA SIVE SAN-
guisorba maior.




nullusq; eius ad dysentericos vsus, tametsi ad ciendam vri-
nam, expediendosq; viscerum infarctus plurimum praestet.
Huius PIMPINELLÆ duo habentur genera, maius & Pimpinellæ
minus. Maior radice nititur longa: folijs, qua ad radi- genera & vi-
cem sunt circumquaque solo procumbentibus (pluribus ex res.
vno pediculo vtrinque emergentibus) dissectis, per ambi-
tumque serratis: caule quadrangulari: floribus, in um-
bellam coherentibus, tenuibus, albicantibusque. (Ra-
dix illi longa, digitali crassitudine, acri sapore) MINOR
caule exit rubenti: folijs minoribus, minus dissectis, minuti-
usq; serratis, (ac tenuiore etiã radice, saporis eiusdem) vtraq;
tamen hircum redolet. (Nascitur in montibus, collibus & in-
cultis locis.) Radix in qua vis tota consistit, excalfacit siccatq;
ordine secundo completo, aut sanè tertio incipiente. (Aperit,
prouocat, attenuat, digerit, inuidit. Sed maior acrior est atq;
valentior. Vtriusq; radix) praestat ad renum & vesica mor-
bos, quorum calculus est causa. Ob id enim calculos in renib.
genitos frangit & eicit, & urinam romoratum pellit. Pro-
dest expressus è radicibus succus ex vino haustus, deleterijs
medicamentis & venenosorum animalium morsibus. Qua
ratione non desunt, qui ad pestilentiam radicem hanc miris
laudibus efferant. Est & alia PIMPINELLA, qua à no- Pimpinellæ
stris vulgo SOLBASTRELLA nominatur. (Duum est vulgaris quæ
generū: minor & maior. Minor folijs pronenit ab vna radi- Solbastrella
ce numerosis, compluribus ab vno tenui pediculo vtrinq; pra- coasid.
deuntibus, subrotundis, pusillis, vbique in ambitu crenatis,
firmis, humi in orbem accubantibus, adstringente gustu: cau-
liculos edit plures, tenues, subrubentes, rotundos, dodranta-
les atque maiores: in quorum summitatibus capitula exeunt
squamosa, subpuniceo colore: in quibus semen. Radice nititur
lignosa subruscescente, adstringentis gustus. Nascitur in agris
non cultis, in collibus, & seritur in hortis,) nullis non cognita, utpote qua acetarjs frequentissimè inseratur. Verum
hec ab antedictis longe distat viribus, etsi soliorum facie satis inter se conueniant. Siquidem vltima hac gustata
non

Sanguisorba affrenata

non cultis, in collibus, & seritur in hortis,) nullis non cognita, utpote qua acetarjs frequentissimè inseratur. Verum
hec ab antedictis longe distat viribus, etsi soliorum facie satis inter se conueniant. Siquidem vltima hac gustata
non

IV. PIMPINELLA SIVE SANGUIFORBA MINOR.



Pimpinella vulg. non est Elatine.

Tragi vires ex Gal.

Nomina.

non leuiter adstringens percipitur, & mansa lenior copia prabet, glutinat, siccat, resoluit & cohibet. Vnde facile conicitur, eam esse adstrictoria facultatis. Hinc itaq; fit, vt pua muliebre profluuium, rubrum albumq; efficacissime sistat: dysenteriam, & ceteros alui fluxus cohibeat: quin & biliosa vomitiões reprimat. [sanguinis reiectiones sistit]. Herba ipsa vulnera, & vlcera sanat: misceturq; vnguentis, qua cum ad capitis vulnera, tum ad carcinomata parantur. Natas sepe in poculis vino repletis, quod gratiam quandam, incunabulemq; potantibus asserat. Hanc Mathew Curtius clarissimus etatis nostra medicus, contagiosis, pestilentibusq; febribus maxime commendauit. Sunt qui eam Elarimen esse putent. Sed ij, meo quidem iudicio, aberrant, vt supra etiam in sua mentione docuimus. Caterum duum Pimpinella hoc est generum. Maior in Bohemia in pratis, pascuis & inculto solo plurima nascitur, folijs, ramis, caulibus, capitulis & radicibus alterius longe maioribus, folia longiora latioraq; profert: caules proceriores, & capitula crassiora oblongioraq; Sed eadem vtriq; facultas. Tragi meminit Galenus libr. 1. simplicium medicamentorum, vbi hac de eius viribus tradit. Tragi, inquit: folia, semen & lachryma, trahentis digestisq; sunt facultatis. Est verò & tenuiu partium, & facultate in principio tertij ordinis calida. Corpori infixa extrahit, lapides frangit, menses mouet drachma pondere potum. Pura in Creta sola nascitur tragion lentisco simile. Caterum aliorum Tragium hoc minus, cuius folia scolopèdio similia sunt, visitur quidem multis in locis: sed non parum habet facultatis adstringentis, vt & ad fluxionum affectus conueniat. V. trag, planta Græcis τράγιον, quemadmodum & Latini Tragium appellatur. Pimpinella seu Saxifraga hircina: Italis Saxifraga di becco: Germanis Bibernel. At Pimpinella Sanguisorba: Italis Pimpinella seu Sorbastrella: Germanis

Herrgotts Bärlein: Gallis Pimpenelle. Pimpinella seu Sanguisorba maior, Italis Pimpinella seu Sorbastrella maggior.

I. Pimpinella maior umbella candida, C.B. Pimpinella saxifraga, Matth. Pimpinella saxifraga maior, Lugd. Camer. Pimpinella Brunf. Sardo, Lonic. Cordo in Diosc. cui & Daucus veterum & Pastinaca Gallica Plinii. Pimpinella maior, Trag. Fuchf. Turn. Gef. hor. Lobel. Pimpinella nostras communis maior, Thal. Bipennula, Lacu. Petrasindula, Ianuensi. Saxifraga maior, Dod. gal. Saxifraga magna, Dod. fol. Saxifraga vulgaris maior, Clus. histo. Pan. Saxifraga hircina maior, Gef. hor. Cast. Cam. Saxifraga prima, Cæs. Tragofelinum maius, Taber. Variat in foliorum colore & laciniis: ad huius radices in quibusdam locis Lagrana notantur, quorum medulla in colorem rubeum muratur, cuius vsus ad tincturam Carmesini Lacuna monente, in quibus & vermiculi Costæo auctore, nascuntur, quare Coccus radicum dici poterit. II. Pimpinella minor, C.B. & Cam. in Matth. Hæc radice tenuiore, prolixiore, acriore à maiori differt: caule, folijs & florib. magnitudine tantum ab illa recedit, aliquando varia est foliorum diuisio, sic interdum Carui instar minutissime laciniantur: flosculi quandoq; rubescunt vt & cauliculi cum neruis, semen Ammi minus refert. Frequens apud nos ad vrbis mœnia, locis enim arenosis & petrosis gaudet. Dicitur Daucus Selinoides, Cordo in histo. Dauci tertium genus, Lugd. Saxifraga hircina minor, Gef. hor. Camer. Saxifraga minor, Dodo. gal. Saxifraga prima, Dodo. fol. Saxifraga secunda, Cæs. Saxifraga vulgaris minor, Clus. hist. Pan. Bipinella, Lob. Pimpinella saxifraga minor, Lugd. Cam. Pimpinella nostras communis minor, Thal. Tragofelinum minus, Tab. Tragium, Columnæ. III. Pimpinella seu Sanguisorba maior, Matth. Lugd. Cast. Cam. Pimpinella maior, Dod. gal. Pimpinellæ Italicæ secundum genus, Trag. Pimpinella Italica maior, Thal. Pimpinella syluestris, Dod. fol. Sanguisorba maior, Fuchf. Tab. Sanguisorba altera maior, Lob. IV. Pimpinella siue Sanguisorba minor, Matth. Cast. Pimpinella minor, Dodo. gal. Lug. Pimpinellæ Italicæ primum genus, Trag. Pimpinella Italica, Lonic. Pimpinella Italica minor, Thal. Pimpinella minor syluestris, Gef. hor. Pimpinella sanguisorba, Dod. fol. Pimpinella, Lob. Cæs. Sanguisorba minor, Fuchf. Cord. in hist. Tab. cui & Sorbaria minor: Sideritis secunda, Anguillaræ. Hæc hircina est, at hortensis glabra, quod cultu euenire potest.

a Meū & Car.
 Σαρμίνοςκος
 κειμένος ὄπι
 γης ὀπρμίνης
 ἰ μέγας ὀπρ
 θαρμίνης με
 ζων φύλλα
 δὲ ἐκ ἔχει. i.
 Frutex par
 uus, hærens
 humi, oblon
 gus, non ma
 gnus: spitha
 mæ altitudi
 ne, aut ma
 ior: folia verò
 non habet.
 b Vtrumque
 ἐξ ἑ. τὸ τὸ
 καρπὸς ὡς
 ῥάγες δ' ἔχει. i.
 ipsius fructus
 nempe bacce
 decem.
 Tragi consi.

Tragos


TRAGVM

CAP. XLVI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui scorpion, aut traganon vocant: maxime in maritimis nascens, a palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs: pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. b Racemorum acini decem ex vino poti, celiacis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliatur. Tunduntur à plerisq; & in pastil los digesti asservantur: quibus vsuntur, cum opus est.

Tragum aliquibus Scorpion vocari non modo tradidit Dioscorides, sed etiam Plinius libr. 27. cap. vltimo, his verbis: Est & herba Tragos quam aliqui Scorpion vocant, semipede alta, fruticosa, sine folijs: pusillis racemis, rubentibus, grano

TRAGVM.



grano tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascens. Et lib. 21. ca. 15. Spinofarum, inquit, multa species. In totum spinosa est asparagus, scorpio: nullum enim folium habet. Id quod ante ipsum posteritatis memoria prodiderat Theophrastus lib. 6. cap. 1. de historia plantarum, cum inquit: Aculeatorum alia ex toto aculei sunt, cen corruda, & scorpius, hac enim nullum prater aculeum folium gerunt. Hinc itaque omnibus abunde constare arbitror, herbam, cuius hic effigiem damus, legitimum esse Tragum: etsi non desint, qui aliter sentiant, quos omnino nihili facio, quod sciam hos esse longe magis addictos evertenda, quam restituenda veritati. Siquidem in hac planta nihil desiderari potest quod Trago non conueniat. Est enim frutex paruus, humi procumbens, spithama altitudine, in maritimis nascens, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multus, acuto cacumine, vel potius vt Plinius inquit, ac etiam Theophr. planta est spinosa tota. Ea siquidem in Tergestino littore prouenit, & ad Argentarium promontorium in Hetruria, nulla prorsus reclamante nota ex ijs, quas rei herbaria authores Trago reddiderunt. Huius tamen nusquam, quod inuenerim, meminit Galen. in simpl. med. censu. *Herba hac τράγος καὶ σκόρπιος* Nomina: *Græcè dicitur: Latine item Tragus & Scorpio: Italis Trago.*

Que pro Trago proponitur a Matthiolo, Kali spinolum nobis dicitur: at in figura folia minus recte expressa: hæc quidem foliis est aliquando longioribus (vt figura Lobeli & Lugdunensis, Tragi Matthioli nomine, exprimit) aliquando breuioribus, latioribus item & angustioribus variat, quemadmodum in littore Veneto obseruauimus: Drypis nomine, & quidem alia figura, expressit Tabernæ-

montanus. Tragum Dioscoridis supra tertio ab hoc capite posuimus.

Σκόρπος.


IVNCVS.

CAP. XLVII.

Iunci duo genera: vnum læuis nominati: alterum acuti, qui in nu cronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera: Vnum sterile: reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat cala-

I. IVNCVS.

II. IVNCVS FLORIDVS.



Q 99

mo car-

mo, carnosioreq;. Tertius est iuncus, qui vocatur Oloſchænos, prioribus carnosior aſperiorq;. ſe-
lem ſupradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriuſq; toſtum, ex diluto vino potum, ſi-
rubra fœminarum profluvia: vrinam cit, capitiſq; dolores facit. Quæ proxima ſunt radici ſchæno-
conuenienter illinuntur aduerſus phalangiorum morſus. Æthiopici iunci ſemine ſomnus allicitur: ſed
modus in portione ſeruandus eſt, ne ſopor fiat.

Iunci conſi-
deratio, &
vires ex Gal.

Iuncus caule eſt laui, viridi, in cacumine aculeato, alba intus medulla. Semen gerit in ſuperiore caulis parte, è latere pro-
diens racemoſum, ſubrubicum, adſtringentis guſtus. Alter conſimilis eſt. Sed ſine ſemine prouenit, & tenuioribus ca-
mis. Omne genus vulgaris eſt notitia, quandoquidem propter ſtagnantes aquas, cum in mari, tum in fluminibus, lacubus
paludibus, ac cæteris aquoſis locis, omnes eius reperiuntur ſpecies. Naſcitur in Bohemia iuncus circa aquas, qui ſolus exi-
vno ceſpite numeroſis cyperi ſimilibus, ſurſum ſpectantibus, caulibus pluribus, lauibus, iunci modo glabris, in quorum ca-
cumine flores emicant ſpecioſi, ſubpurpurei, è quibus ſemen gignitur, quem à floribus ſpecioſis, quos edit, nos floridum iun-
cum vocare voluimus, eiſdem cum alijs facultatis. Creditur ea omnia præſtare poſſe, quæ cætera præſtant genera. Iunci ge-
nerum meminit Galenus lib. 8. ſimplicium medicamentorum, vbi de iſis ita ſcriptum reliquit: Schænos lea, hoc eſt, iuncu
lani, quadam oxyſchænos, alia oligoſchænos, nuncupatur. Gracilior duriorq;, oxyſchænos, craſſior laxiorq;, oligoſchænos.
Fructus oligoſchæni ſomnum affert. At oxyſchæni dua ſunt ſpecies: altera ſterilis, cuius quidem in medicina nullus uſus eſt,
altera verò ſemen fert, cuius etiam ſemen ſomnum conciliat, ſed minus quàm oligoſchæni: quanquam tamen hoc capu-
tentet. Vtrumq;, ſi frictum cum vino bibatur, ventris fluxus deſiccet, & muliebri profluum rubrum ſiſtit. Ex quibus ſa-
rum eſt, quòd composita eorum temperies eſt ex terrena videlicet eſſentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida: vt & in-
ferna deſiccare poſſint, & ſenſim frigidus ad caput vapores ſubmittere, quibus ſomnolentos efficiant. Συόμες ſic Græci, iun-
cus verò Latinis vocatur: Arabibus Di: Italis Giunco: Germanis **Bingenshmelen**: Hiſpanis Iunco: Gallis Ionc. Iuncu
floridus, Italis Giunco florido.

Nomina.

Iuncus alius odoratus, qui aliquando ramosus reperitur, de quo libro primo, alius inodorus, hicq;
acutus vel lauis: vtriuſq; rurfus generis habentur differentia. Figura primo loco poſita, Iuncum acutum
duplicem exhibet, pannicula ſparſa & non ſparſa. II. Iuncus floridus Matth. Caſtor. Lugd. Calamogro-
ftis altera, Trag: Sparganium, Dod. gal. Gladiolus, Cord. in Dioſ. Gladiolus paluſtris, Cordo in hiſt. cuius
Scholiaſti Gladiolus Theophraſti videtur: Gladiolus aquatilis, Dod. fol. Iuncus Cyperoides floridus pa-
ludofus, Lob. Iuncus Cyperinus floridus, Tab. Butomus Theophraſti Caſalpino.

Acyr.

LICHEN.

CAP. XLVIII.

Lichen, qui ſaxis eſt familiaris, aliquibus Bryon appellatur, aſperginofis petris adhæret, vt muſcus. Is il-
litus ſanguinis profluvia ſiſtit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo corre-
ptos, cum melle illitus: oris & linguæ defluſiones inhibet.

Lichenis cõ-
sideratio.

I. LICHEN.




Lichenis ge-
nera ex Plin.

Pulmonaria
depictio &
vires.

Lichen procul dubio ea eſt planta, quam officina, & her-
barij hodie Hepaticam vocant. Hanc autem Græci Li-
chena appellarunt, quòd Lichenas ſerpentis morbi genus, im-
poſita ſiſtat & ſanet. Lichen in aſperginofis, & rotulentiſ
prouenit locis, nudis petris adherens, muſci modo. Folio con-
ſtat ſuppingui, aſpero, robuſto, cartilagineo, prope radicē an-
guſto, in latum ſe pandente, nullis adnixis pediculis, in cacu-
mine tripliſi vel quadrupliſi laciniis interſectis, radicibus nu-
meroſis perquam exiguis aduerſa foliorum parte emergenti-
bus. Prodeunt à radice cauliculi tenues, quibus capitula in-
ſunt parua, floribus paruis, ſtellarum effigie. Lichenis Plinio
lib. 26. cap. 4. duo produntur genera, quæ hijs verbis depingit:
Lichen, inquit, herba omnibus hijs præfertur: vnde nomen
inuenit. Naſcitur in ſaxoſis, folio vno ab radice lato: canle v-
no, paruo, longis folijs dependentibus. Hac delet & ſtigmate-
teritur cum melle. Eſt aliud genus Lichenis petris tantum ad-
hærens, vt muſcus, qui & ipſe illinitur. Hic & ſanguinem ſi-
ſtit vulneribus inſtillatus, & collectiones illitus. Morbū quoq;
regium cum melle ſanat ore illito & lingua. Qui ita caran-
tur, aqua ſalfa lauari iubentur, vngi oleo amygdalino; her-
tenſibus abſtinere: hac Plinius. Cæterum eſt herba Licheni
non longè diſſimilis, quæ in quercuum aliarumq; ſylueſtrium
annofarum arborum caudicibus naſcitur, in denſis & opus
præſertim ſyluis: hac tamen maiora latioraq; ſundit folia,
varijs modis per ambitum laciniata, ac ſi à vermibus erofa
fuerint, aridior, & ambitu latior, ſuperiore parte viſcens,
inferiore verò pallescens, maculis quibusdam ſubalbican-
reſerta, aded vt formã pulmonis referat: vnde pleriq; Pul-
MONARIA dicta eſt. Adſtringit, ſiccas, abſtergit, vulnera
glutinat. Vtuntur hac nonnulli magis fort aſſe nomine, quam
ipſis viribus freti, ad tabem, pectoris & pulmonum vlcera &
cruenta ſputa. Nec deſunt, qui laudibus eam efferant ad
vulnera ſananda, ad pudendorum vlcera, & ad vtrumq; mu-
liebre

II. PVLMONARIA.

III. PVLMONARIA ALTERA.



liebre profluuium, cui mirificè mederi aiunt. Quin & eam dysentericis exhibent, & biliosa euomentibus. Sunt quoq; qui ea vtatur ad suppiriosos, anhelatores & Asthmaticos, cum glycyrrhizæ succo, hyssopo, elenij radice, & scillino oxymelle: valet eadem ad ouium, & cæterorum quadrupedum tussim & respirandi difficultatem. Quamobrem pastores eam in primis tundentes, mane morbosis ouibus cum sale propinant. Est & alia herba, quæ etiam Pulmonaria vulgò nominatur, ab illa Pulmonaria tamen maxime differens, in opacis locis proueniens, prope vliginosas sepes, folio buglosi, Boraginis quadatenus emulo, non alia. tamen crispo, nec hispido, oblongo, aspero, hirsuto, albis maculis (superna parte) circumsperso (Boraginis sapore) Caulem gerit hac ineunte vere (angulosum atq; tenerum) in cuius (adnatorum) cacumine flores erumpunt purpurei, perinde ac in vulgari Cynoglossò. Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit. Huic planta rei herbaria periti non contemnendas vires tribuunt, ad pulmonis vlceris sananda, tum cæteras infectiones. Quam in re, itemq; in sanguinis reiectione mirabili successu se eam exhibuisse mihi sepius retulit Iulianus à Marostica Teruisiensis medicus peritissimus: decoquitur enim ad medias, daturq; decoctum potandum addito saccharo: vel succus ex folijs expressus serapy modo cum saccharo paratus, maiori successu prestat. Præstant hæc omnia herba ipsa, & flores, quoquo modo à tæbe affectis sumantur decocta. Lichenis meminit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Lichen, qui in petris nascitur, est velut muscus quidem, sed rectè ex plantarum genere censi potest. Sic autem nominatus videtur, quòd lichenas seu impetigines curet. Extergentem, ac modicè refrigerantem facultatem habet, vtrinq; verò resiccantem. Abstergentem quidem, atq; exiccantem a petra obtinet, refrigerantem verò ab humore aqueo: nascitur enim in humidis, & grauiter olentibus saxis. Porro quod ex talibus substantijs componitur, aduersum esse inflammationi nihil mirum est. Cæterum an sanguinis profluvia sistat, vt refert Dioscorides, id neutiquam dicere queo. Quod Græcis λεχηλον, Latinis item Lichen dicitur: Arabibus Arzezalsacher: Italis Lichene seu Epatica: Officinis Hepatica: Germanis Stein Lebertraut vnd Brunnen Lebertraut: Hispanis Epatica & Figadella: Gallis Hepatique & Porcorau. At pulmonaria, Italis Polmonaria: Germanis Lungenkraut: Gallis Herbe aux pulmons.

Lichenis vires ex Gal.

Nomina.

I. Lichen, Matth. Fuchf. Turn. Dodo. gal. & fol. Cordo in Dioscor. Lacun. Lobel. Thal. Cæsal. Hepatica, Brunf. Lonic. Hepatica prima, Taber. Iecoraria seu Hepatica fontana, Trago. II. Pulmonaria Matth. Trag. Fuchf. Dodo. gal. & fol. Lacu. Gef. hor. Lonic. Taber. Thal. Pulmonaria prima, Castor. Mucus pulmonarius, Lobel. Pulmonaria fungosa, Lugdun. Lichenis genus, Cæsalpino. III. Pulmonaria latifolia maculosa, C. B. Pulmonaria altera, Matth. Castor. Pulmonaria, Dodo. gal. Thal. Cæsalp. cui & Callæ alterum genus Pliniij. Pulmonaria maculosa, Lobel. Taber. Camer. Pulmonaria maior, Lugdun. Pulmonaria Plinii, Gef. hor. Symphytum maculosum Dodonæo historia Latina in folio.

Παρονυχία

PARONYCHIA.

CAP. XLIX

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychiis, atq; fauis remedio est.


299

Paro-

PARONYCHIA.



PARONYCHIA ALTERA.



Paronychia
coasid.

Adiantum al-
bum Theop.
non est Pa-
ronychia.

Paronychia
vires.

Paronychia
altera.

Paronychia
vires ex Gal.

Nomina.

Paronychia, cuius hic primo loco imaginem damus, non modo in saxis gignitur: sed etiam in veterum adificiorum parietibus, folijs adeo ruta similibus, vt non desint qui eandem parietariam, siue muralem rutam appellant: verum cum Dioscorides Pepli folijs nasci paronychiam scribat, non desunt nasuti, qui sententiam hanc nostram impugnent. Atqui eorum vitilitigatorum calumnias ridere soleo, quod sciam Peplum Dioscoridis testimonio, folijs ruta paulo latioribus prouenire. Itaq, potius ydem accusandi sunt, qui hanc plantam alterum Theophrasti Adiantum faciunt, nempe quod album ipse appellauit. Siquidem is nullam inter nigrum, & album Adiantum interponit differentiam nisi coloris tantum, qui in huius caule niger, in illius vero albus apparet. Folia in Adianto coriandrina esse debent, & qua in aqua nunquam madescant. At Paronychia nostra folia sunt ruta, nec aquam respuunt. Præterea cauliculi sunt illi virides, non albicantes, nec setis suillis similes, quin etiam nec pellucidi. Nec vnquam locis humidis asperginosisq, prouenit, in quibus Adiantum maxime nascitur, Theophrasti ipsius testimonio: sed in aridis & siccis, cuiusmodi saxa sunt, & parietes: quo fit vt hallucinetur, qui hac ducuntur opinione, & dum me erroris coarguunt, ipsi longè magis sese damnandos offerunt. Quamquam non desunt, qui hanc plantam vnà mecum Paronychiam faciunt, quum tamen sint qui reclamant, ne dissensio vltius protrahatur, non Dioscoridis, sed nostram Paronychiam eam esse volumus. Nascitur frequens in Italia, quam Paronychiam nobis appellare libuit, sed copiosissimam vidimus in ingenti sylua, qua iter is est, qui Goritia discedentes Labacum Carniole metropolim petunt, vbi in ingentibus saxis, spretis algoribus, perpetuè virescit. Caterum hac vrinam ciet, & arculus, & renum calculos pellit, vnde inter saxifragorum genera quibusdam reponitur. Peculiariter autem præstare hanc compertum est ad puerorum enterocelas. Scimus enim nonnullos esse sanatos, hausto tantum huiusce planta puluere, continuè quadraginta diebus, quibus manifestè collapsa intestina in scrotum cernebantur. Est & ALIA planta cuius quoq, hic imaginem appinximus, quam quidam legitimam Dioscoridis Paronychiam faciunt. Horum ego sententiam nec probare, nec improbare ausim: sit itaq, de ea aliorum quoq, iudicium. Habet hac folia Peplo longiora, flores paruos, copiosos, racematim coherentes, albo colore. Sed qui Paronychiam florere scribant hætenus non legimus: quin etiam mihi incompertum est an in petris oriatur. Meminit Paronychia Galenus libr. 8 simplicium medicamentorum, ita de ea scribens: Paronychia ab effectu nominata est: sanat enim paronychias, & vt refert Dioscorides, fauos quoq, Vis eius est tenuium partium, & exicatoria morsu vacans: talia enim sint oportet, qua Paronychias sanant. Porro satis constat tale esse idoneum ad digerendos affectus omnes, qui digeri postulant. Siquidem eiusmodi sunt, qua cum ex tertio sint ordine excalficientium, & desiccantium, velut & hoc, essentia insuper tenuium partium sunt. Planta Græcis *παρωνυχία*, paronichia Latinis & Italis Paronychia nominatur.

I. Paronychia, Matth. Lacun. Capillus Veneris, Brunf. Trag. Saxifraga minor secunda, Brunf. edit. post. Saxifragum seu Empetrum, Fuchf. in icon. Ruta muraria, Dodo. gal. & fol. Gesn. hort. Adiantum candidum, Cordo in Dioscor. & histor. Thal. Adiantum album, Lonic. Tabernæmon Camer. Adiantum nigrum, Gesn. hort. Cæsalpino. Salvia vita, Lobel. & Lugdunenſi. II. Anthyllis maritima Alfinefolia, C. B. Paronychia altera, Matthiol. Lugdunen. Paronychia Matthioli, Taber. Paronychia Dioscoridis, Anguil. Gramen secundum Plinii, eidem. Marina incana Alfinefolia Narbonensis, Aduerf. Anthyllis marina incana Alfinefolia, Lobelo in icon. Lugdun. Centumgrana vulgò, Cæsalpino.

Χρυσόκομη

CHRYSOCOME.

CAP. L.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborum, hyssopo simili: radice hirsuta, verrati nigri modo, tenui, cyperum aequante: gustu non inuicundo, ex dulci austero: in petrosi, opacisq; nascitur. Radix excalfacit & adstringit: his conueniens, quos iecur, aut pulmonis inflammatio male habet: contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Qui Chrysocomen in Italia mihi ostenderet, haecenus reperi neminem. Quamobrem in eo natura viridario, plantis compluribus nobis incognitis referto, quod tantum in sui ipsius vsum colit natura, ne omnibus exuta medicamentis, seu etiam languoribus mederi nequeat, eam & virefcere, & florescere mittamus, donec nobis, aut alijs compertam in communem quoq; cognitionem, & vsum proderet contingat. Interim tamen, vt nostrum institutum sequamur, vires eius ex Galieno subiiciam: quas ipse lib. 8. simplicium medicamentorum, vs verbis descripsit: Chrysocome vocatur & chrysites. Radix vniuersae acrem simul, & adstringentem qualitates habet: quare neq; multi vsus est. Vsi tamen est decocta in melicrato in peripneumonijs, & morbis hepaticis. Sed & mensurae purgationis prouocanda vim quandam obtinet. Χρυσόκομη sic Graecè, vt etiam Chrysocome Latine dicitur.

Chrysocomes confida

Chrysocomes vires ex Gal.

Nomina,

Χρυσόγονον

CHRYSOGONVM.

CAP. LI.

Chrysogonum dense fruticat, quernis foliis, flore coronarii verbasci: radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quae trita cum aceto, atq; impolita, muris aranei moribus auxiliatur.

Chrysogonum, nisi aliunde in Italiam deferatur, inter plantas, quae minimè cognoscuntur, & ipsum perpetuò recensendum esse putauerim: vel nobis in abditissimis natura hortus, vbi delitescit, inuestigandum erit. Siquidem haecenus mihi neq; inuenire, neq; ab alijs compertum videre licuit in Italia. Quod χρυσόγονον Graeci, Latini quoq; Chrysogonum dicunt.

Nomina.

Ἑλίχρυσον

HELICHRYSVM.

CAP. LII.

Helichryson, quidam Chrysanthemon, nonnulli & id Amaranthon vocant, quo deorum simulacra coronant. Ramulum habet candidum, virentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatiis angusta, abrotono similia: comam aureæ lucis, in orbem: umbella rotunda, veluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium a luicis. Contra serpentium ictus, coxendiculi dolores, vrinæ stillicidia, ruptaq; coma è vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac vesicæ absumit, pota cum mulso: ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in vino albo diluto. Vestibus inseritur, vt eas ab erodentium iniurijs tueatur.

a Meū & Cat, χαραδρον ἐστὶ τόπος, i. torrentium locis.

I. HELICHRYSVM.

II. HELICHRYSVM ITALICUM.



Q 99 3

Helichrysum

Handwritten note: Helichrysum italicum

III. HELICHRYSVM CRE-
ticum.

IV. STOECHAS CITRINA



Helichrysi
consideratio

* V. HELICHRYSVM ORI-
entale. *



Fuch. error.

Helichrysum
alterum.

Helichryson copiosè provenit in Hetruria in pratis, graci-
li solo, incultisq; locis, striculis collibus, nec non etiam
in fluminum alveis. Caule constat recto, aequali ac lignoso,
cubitalem longitudinem non excedente: folijs per intervalla
emergentibus, abrotani amulis: comantibus in cacumine fo-
ribus, aureo colore fulgentibus, & in orbem umbella modo
coherentibus, corymbacea facie, veluti myriophylli, vel age-
rati: qui exiccati aureum colorem diutius retinent. Proinde
commode hyeme, quòd eo tempore flores deficiant, pueri sic-
cum Helichrysum coronamentis suis inserunt, quemadmo-
dum & Amaranthum purpureum, quod nostris Hetruscis
vulgò dicitur Fior velluto. Helichrysum depinxit Fuchsius in
suis de stirpium historia commentarijs, folio echy aculeato, &
floribus bupthalmi. Qua in pictura ipsum deceptum suspi-
cor, quòd ea Helichryso minimè respondere deprehendatur.
Helichrysi meminit Plinius lib. 21. cap. 25. ubi de eo disserit
his verbis: Heliochrysum, inquit, quod alijs Chrysanthemon so-
vocant, ramulos habet candidos: folia subalbida, abrotano si-
milia: ad solis repercussum aurea lucis in orbem veluti corym-
bis dependentibus, qui nunquam marcescunt: qua de causa
deos coronant illo. Quod diligentissimè observavit Ptolemæus
rex Aegypti. Nascitur in frutetis. Est & alia planta, in Italia
quoq; nascens, quam nobis HELICHRYSVM alterum I-
talicum vocare libuit, quòd plurimum in Italia proveniat,
quòd folia illi quoq; sint angusta, & aurei in summitate flo-
res, & isdem sit facultatibus preditum quibus & praecedens.
At HELICHRYSVM CRETICVM planta est exilis, 60
folijs longis, angustis, hirsutis striatisq;, caulibus angulosis,
umbella in summitate aurea, divulsaq;, radice tenui ac su-
peruacua. Nascitur in Creta insula. Ea omnia hoc quoq; qua
supradicta, prestare posse creditur. Sed hallucinantur, qui

Stoechadisci-
tunæ vocata
descriptio.

plantam, quam quidam STOECHADA CITRINAM vocant, legitimè Dioscoridis Helichrysum esse censent. Si qui-
dem folia illi tenuia abrotani modo non sunt, sed longa, albicantia & hirsuta. Caules palmares, aut maiores, lignosif
& incani, in quorum summitatibus flores sunt aureo colore fulgentes, globosi, odorati, in umbella divulsa modum sese pen-
dentes. Radice nititur breui & subnigra. Nascitur locus incultis, & in pascuis: excalfacit & siccit, aperit & abstergit, et
amariusculus indicat sapor: qui etiam nec adstringenti facultate vacat. Decocti flores, aut ex vino macerati, socinoru
obstru-

Stoechas citrina orientalis

Helichrysones aperiant: proinde datur ut iliter eorum decoctum, aut dilutum regio meri o. aut malo balnu efficit. Idem
 peram insectarum vermes necat. Medetur tota planta omnibus cerebri morbis à frigido prouenientibus, nempe pituito-
 sa, onibus, lucturnis doloribus, comitalibus, resolutis, & id genus alijs. siue eius decoctum in uino, utur in petu, siue her-
 pax in puluerem trita, rhodomelle bibatur, aut oxymelite. In luxurio addita non solum praeterpit: meri, sed et anxi-
 ositate, cuius caput albuatur, sed furfures quoq; abstergit, & pediculos necat. Datur cum herba ipsa, tum eius decoctum, ad
 vicia, & apertiones liquorem renes expurgat, & urinam pellit. Adduntur flores in fomentis, quae ad vteri morbos frigidos,
 & vicia, parantur. Helichrysi sub Amaranthi nomine mentionem fecit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum.
 inquit, in Amaranthum facultas est incidens, & extenuans. Coma igitur eius menses cum vino pota educit:
 & grammas, arguunt liquere creditur, non solum in vena, sed & in vicia: sed tunc potius cum mulso bibenda. Et omnes
 vicia, & fluxiones potius efficit. stoma. ho infesta. hac Galenus. Ceterum cum Helichrysum in Dioscoridi, quam Ga-
 leno Amaranthum dicitur, opportuna non se offert occasio, ut hic AMARANTHI purpurei, quod, ut paulo ante di-

Stæchad. cit.
v. l. c.

Helichrysi
vires ex Gal.

Amaranthi
purpurei con-
sideratio.

VI. AMARANTHVS.

* VII. AMARANTHVS
pannicula incurua.*



ximus, à nostris vulgè vocatur Fior vellato, historiam, & vires tradamus, praesertim quòd puellis gratissimum: sicut hyeme in
 suo texendo corollis, utpote quod tam recens, quam siccam, purpureum ac flammèum colorem diutius conferuet. Hoc ita-
 que solia profert omni maiora: eadem etiam, pinguem, subrubentè, striatum: florem spicatum, admodum purpureum:
 cuius quum diu siccatius (ut supra dictum est) asseruatur, haud quaquam tamen suum deperdit colorem. Amaran-
 thus hoc, quantum e iudiciorum reor, memorie prodidit Plinius lib. 21 cap. 8. cum sic inquit: Amarantho non dubitè vici-
 mur. Et autem spica purpurea, verius quam flos aliquis, & ipse sine odore. Mirumq; in eo gaudere decerpi, & letius con-
 se. Prouenit Augusto mense: durat in autumnum. Alexandrino palma, qui decerpit asseruatur. Mirumq; postquam de-
 fecerunt flores, in defectus aqua reuoluit, & hybernas coronas facit. Summa eius natura in nomine est appellata,
 quoniam non intercescit: haecenus de Amarantho Plinius. Huic facultas inest (ut recentiorum quorundam fert opinio)
 frigida & sicca, repellit, cohibet: proinae flos eius potus calidos, & dysentericos iuuat. Mensum abundantiam cohibet, &
 aliter fluxiones. Quinetiam cruenta exuentibus prodest, praesertim si in pulmone, vel pectore, vas aliquod fractum
 fuerit. Planta, quae Graecis ἐλάσι χρυσόν & ἐλάσι χρυσόν, Latinis praeter Helichrysum & Heliochrysum, appellatur: Italis, ite-
 lio. Stæchas citrina. Italis, Amarantho giallo. At Amaranthus, Graecis ἀμαρανθός: Italis Amarantho, seu fior vellato:
 Germanis Sammet Blum: Gallis Passe velours.

Amar purp.
vires.
Nomina.

Helichryson quasi aureum colorem habens, quare Gaza apud Theophrastum Aureliam reddidit.
 I. Elichryson foliis Abrotani, C. B. Helichrysum, Matt. Castor. Helichrysum Creticum, Matth. in com-
 pendio, sed figura transposita est. Helichrysum verus, Ges. hor. Helichrysum secundum, Taber. Elichry-
 son. Lacu. Clus. hist. Hispa. Dod. fol. Lugd. Camer. Elichryson siue aureis flos, Lobel. Millefolium
 luteum tomentosum vocamus id quod dicitur Helichrysum Italicum, Matthiolo & Lugdunensi, Cam.
 Stratiotes millefolia, Dod. gal. Stratiotes lutea, Clus. hist. Hispa. Lug. Millefolium luteo flore, Ges. hor.
 Cam. Millefolium luteum, Lobelo. Tabernæ. Helyochrysum secundum, eidem. Millefolium minus
 siue Stratiotes Chilliophyllus, Dodo. folio. Ad Achilleam Dioscoridis, quam flore luteo esse dicit,
 forte referri posset. III. Elichryson foliis Stæchadis citrinae angustioribus, C. B. Helichrysum
 Creticum, Matthiolo & Lugdunensi. IIII. Elichryson seu Stæchas citrina angustifolia, C. B. Stæchas
 citrina

citrina, Matth. Ges. hor. Dod. fol. Lacu. Castor. Lugdu. Amaranthus & Heliochrysis prima, Trag. T. nearia lutea, eidem. Amaranthus luteus, Fuch. Lacu. Lonic. Amaranthus citrinus, Turn. Helichry. Cord. in Diosc. Cæsal. Ageratum, Dod. gal. Chryfocome, Lobel. Taber. Coma aurea, Lob. in icon. Elichryson orientale: Caule est prædicto lanuginosiore (in vtraque sculptor lanuginem omisit, vnde crassioribus, in caulis summitate quasi in umbella, octo & nouem cauliculi, vnciales incani, quibus in gulis flos vnicus, rotundus, rarius oblongus, quasi ex plurimis squamis compositus, quintuplo præ maior, flauus, splendensq;). An hæc sit Chryfocome Dioscoridis & Plinii, cui & Chryfitis: nostræ enim Corymbi fulgore auri splendent. VI. Amaranthus (eò quod huius flos non marcescat) pannicula sparsa, C. B. Amaranthus purpureus, Cord. in Diosc. Lac. Lonic. Dod. fol. Lobel. Amaranthus primus, Cæsal. Amaranthus Plinii maior, Ges. hor. Amaranthus, Cæsalp. Amaranthus purpureus maior, Taber. Amaranthus saturatius purpureus, Camerario. VII. Amaranthus pannicula incurua, C. B. Huius panniculae in summo latiores, compressæ, hilariore aspectu, reticulares, cristas imitantes: folia quam priora longiora, maculis rubentibus sæpe aspersis: semen puillum atrorubens & splendens. Amaranthus purpureus secundus, Dod. gal. Amaranthus holosericeis, sanguineis, reticularis floribus, Lobel. Amaranthus holosericeus, Lugdunensis. Amaranthus Cristatus, Germanis *Hanen Ramm* Camerario in suo Matthiolo.

Χρυσάνθεμον.

CHRYSANTHEMUM

CAP. LIIL

Chrysanthemum aut caltha, nonnullis bupthalmos, herba est tenera, fruticosa, læues proferens caules, & multifida folia: flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, vnde bupthalmi nomen traxit: propter oppida nascitur: cuius caules oleris vice manduntur. Flores cum cerato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis, colorem bonum breui reddunt, si sequente longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

CHRYSANTHEMUM.



Chrysanthemum caput restitutum.

Quoniam non desunt, qui crediderint Bupthalmum & Chrysanthemum vnam & eandem plantam esse, quod paribus notis inter se certare videantur: tamen si particulares quadam nota in vtriusq; diligenter expendatur, facile inter has plantas discrimen aliquod notari apprehendetur. Quod cum optime sciret Dioscorides, diuersis libris, diuersisq; capitibus de his speciatim differuit. Quod vique minime fecisset, si comperit habuisset, nullam inter eas intercedere differentiam. Qua tamen hinc cognoscitur, primum quod Bupthalmo folia insunt feniculo similia, quæ planè capillaria constant: Chrysanthemo verò tenera, multifida, minutimq; per ambitum laciniata. Deinde Chrysanthemum caules in cibis mandu aliorum olerum modo, scribit Dioscorides: id quod de Bupthalmo agens silentio præterit. Præterea flores Bupthalmo reddidit anthemidis similes: Chrysanthemo verò luteos, & vehementer splendentes. Ceterum de horum viribus differens, Bupthalmi flores, cum cerato tritos, tumores, duritiasq; discutere tradidit in vniuersum, & affirmatiuè locutus. Verum postea de Chrysanthemo scribens, huius flores, inquit, steatomata discutere produntur, particulariter & dubiè locutus. Hac sanè harum plantarum manifesta discrimina faciunt, vt credam, quod aliquis antiquorum curiosus, nimisq; sciolus, Bupthalmum & Chrysanthemum vnam tantum referre plantam forte existimans, omnia in Chrysanthemo adiecerit, & confuderit. Quæ libro tertio de Bupthalmo memoria prodidit Dioscorides: quemadmodum imprudenter de Ruta & Hyperico, Asaro & Bacchari ab alijs factum esse in præcedentibus ostendimus. Hoc itaq; argumento fretus, crediderim ego hoc modo Chrysanthemum caput esse legendum. Chrysanthemum herba est tenera, fruticosa, læues proferens caules, & folia multifida: flores luteos, admodum splendentes. Eius caules manduntur olerum modo.

Flores cum cerato triti steatomata discutere produntur. Hinc itaque, sic Chrysanthemum capite restitutum, facile patebit, quantum aberrauerint y qui Chrysanthemum cum Bupthalmo confuderunt. Chrysanthemum, cui nulla proferens ex modo traditis reclamet nota, frequentissimum prouenit in Senensi agro, prope Montem nigrum, oppidum ita appellatum. Quin etiam copiosissimum in Bohemia, Morauia & Austria in campis prouenit: cuius folijs infima plebecula in Hetruria pro oleris vescitur. Bupthalmum verò etsi antea à me non visum, in nostris commentarijs Italica lingua conscriptis confessus essem, ad nos tamen hoc anno verum Patauio allatum esse superius in sua mentione indicauimus: quod etiam postea accepimus Pisis à Luca Ghino medico clarissimo, & rei herbaria peritissimo, omnibus prorsus ad stipulantibus notis, quæ illi tribuuntur. Quo factum est, vt certius ausim affirmare Chrysanthemum auctam, deperatamq; esse in Dioscoride. Credidit Leonardus Fuchsius in suo de plantarum historia commentario, Chrysanthemum illud esse Ranunculi genus, quod folio apij, luteis floribus, in pratis plurimum nascitur. Quæ in opinione quantum, pace eius dixerim, habetinetur, euidentius omnibus esse puto, quam vt à nobis ostendi debeat. Chrysanthemum meminisse Galenum in libro de simplicibus

Fuch. error circa Chrysanth.

Simplicium medicamentorum facultatibus, hactenus incompertum habeo. Eius nomen Græcum est χρυσάνθεμος: Latine uero Chrysanthemum: Ialicum Chrysanthemo.

* II. BELLIS LVTEA maior.*

* III. BELLIS LVTEA minor.*



Chrysanthemum (seu aureus flos) foliis matricariæ, C. B. Chrysanthemum Matthioli, Lac. Lug. Taber. Huius elegans species in hortis nostris, floribus partim candidis, partim luteis, nulloq; alio discrimine, cuius Gesnerus libro de hortis nomine Buplithalmi alterius meminit. II. Bellis lutea foliis profundè incisus maior, C. B. Bellis maior lutea, Trago. Chrysanthemum, Dod. gal. & fol. Castor. Chrysanthemum segetum, Lob. Chrysanthemum aruente, Taber. Chrysanthemum species quarta, Cæsalp. Hoc adiecimus eò quod herbarii Lugdunensis auctor eandem cum Matthioli Chrysanthemo statuat, qua in re lapsus, cum non parua inter vtramque differentia intercedat. Hæc enim radice est fibrosa, ex qua caules aliquot sesquicubitales, teneri, glabri, virentes, rotundi & ramosi prodeunt: circa quos folia oblonga semunciam lata, in plures partes laciniata & scissa, pallida & tenera: in summo flores, Belli syluestri maiori similes, non modò disco lutei, sed & folia quæ orbiculatim circumposita & crenata sunt, auri fulgore splendent, odore non insuauis: semen in disco medio continetur, oblongum, flauescens, carinatum. Variat folio: in altera magis virente & plus diuiso: in altera folio magis caruleo & minus dissecto. Est & altera foliis subrotundis tantum à præcedenti varians, de qua in historia nostra. In Germaniæ quibusdam locis inter auenam & triticum prouenit, in Italiæ hortis notauimus. III. Bellis lutea minor à præcedenti magnitudine potissimum differt, cuius semen amarissimum, licet in flore & folio nulla, aut minima sit amaritudo, monente Do. Camerario in suo Matthiolo, cui Chrysanthemum minus, & Germanorum Klein Goldblum dicitur.

Αγέρων.

AGERATVM.

CAP. LIIII.

Ageraton a fruticosa herba est b, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano maxime similis: umbellam gerit, in qua c flos bullis aureis emicat, helichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens, huius vstæ nidor vrinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Nascitur Ageratum passim in vniuersa Hetruria, in inculto solo & in pascuis, folijs origano proximis: floribus aureis, in umbella emicantibus, helichrysi modo. Hanc herbam Mesues Eupatorium existimat, vt superius in Eupatorij commentatione abundè diximus. Ea à nostris Senensibus vulgò appellatur herba Giulia. Sententia huic nostra refragatur Andreas Marinus Medicus etatis nostra non postremus, in suis in Mesuem annotationibus, his verbis, vbi in Eupatorij caput commentatus est. Cæterum hanc ipsam herbam (Eupatorium scilicet, aut Iuliam intelligens) Dioscoridis Ageratum esse vix adducor vt credã. Nam insignè amaritudinē, quæ cuius vel imperito herbario, prima occurrit, nullo modo Dioscorides, alioqui diligentissimus, tacuisset, quæ tamē in hac planta adeò insignis est, vt ob hanc ipsam maximè, præ cæteris notis, ad Eupatoriū Mesue sit referēda. Folia præterea nō sunt origano, sed centauryo potius ininori similia, quæ folia quantū inter se differant, omnes norunt. Ad hæc vrinā citere, vuluæq; duritias mollire Ageraton, Dioscorides est autor, quorū effectuum ne

a Meum & Drag. βάρμοσι. Frutex. b. Orib. Διασιδάμοσι. i. duum palmorum. c. άνθος πομφολυγώδες χρυσοειδές. i. flos bullis aureis similis. Agerati consideratio. Andreae Marini opinio.

meminit

I. AGERATVM.

II. AGERATVM ALTERVM.



Marini opi-
nio refuta-
tur.

meminit quidem Mesues, qui ab eodem Dioscoride multa diligenter sumpsit. Huc accedit, quod Ageraton, Galeno attribuitur, vim habet digerendi, & quadantenus Phlegmone liberandi, quod tamen Mesues non scripsit: adde, si placet, quod nullum caloris, aut siccitatis gradum ei Galenus adscribit, cum Mesues calidum in primo, siccum in secundo constituat. Quares tantum fuere apud me momenti, ut ab eruditissimi Matthioli sententia, quamuis inuitum, me recedere coegerint: interim dum ab eo meliora super eo capite, ut spero edentur, quod ut facilius facere possis, aliam herbam hic pingi iussimus, quam Petrus Antonius Michaelius Patritius Venetus, harum rerum diligentissimus indagator, pro agerato habet: cum profecto opinioni non possum non assentiri, cum videam notas omnes Agerati huic planta mirum in modum conuenire. Siquid tamen vel Matthiolus ipse, vel alij praestantes in re herbaria viri, aduersus eam opinionem habuerint, lubens eorum iudicium, & censuram subibo. Hac ille. Quibus an recte Ageratum examinauerit, & an eius Argumenta, quibus contra me utitur, firma ne an infirma habeantur, ex his qua nunc dicturus sum, non facile intelligent, qui materiam Medicam tenent. Quod itaque Dioscorides amaritudinis in Agerato non meminerit, cum ea tam euidentem in hac planta gustantibus sese offerat, id ne tantillum quidem me a mea dimouet opinione, cum illi plurima describantur planta, quae insigniter amara degustantur, & nihil tamen in ijs describendis, amaritudinis meminit. Amara sane sunt Scylla, Cyclaminus, esculentus Bulbus, Absinthium, Ruta, Hamula, Hieracium, Senecio, Fumaria, Conyza, Bryonia, Eruum, Caparis planta, Hedera, Marum, Polium, Chamepitys, Verbenaca, Betonica, Papaueris cum folia, tum capita, Opium, & alia quidem nonnulla, de quarum tamen amaritudine nihil memoriae prodidit Dioscorides: quo fit, ut nihil prorsus Marini argumento dimoueat, si etiam in Agerato amaritudinis notam silentio inuoluit. Folia praeterea, inquit ille, non sunt Origano, sed Centaurio potius minori similia, quae folia quantum inter se differant, omnes norunt. Hac si quis crebrauerit verba, facile hic Marinum haud diligenter duas hasce plantas examinasse, aut inspexisse iudicabit. Minori enim Centaurii folia, & onitis origani, parum admodum facie inter se differunt. Itaque recte dixisset is differentiam hanc nouisse omnes, si se excepisset. Deinde quod suum Eupatorium vrinam ciere non scripserit Mesues, id ab eo fortasse praetermissum censemus, quod hanc plantam ignorauerit esse Dioscoridis Ageratum. Verum cum Eupatorium scribat calidum esse in primo gradu, & siccum in secundo, quinetiam compositum ex substantia calida, subtili, quis unquam medicorum negabit Eupatorium hoc haud vrinam ciere? & idem quoque muliebrium locorum duritias emollire? Nam & Iris, & Agrestis cucurbitae, quae quoque calidiora sunt, & sicciora, id efficaciter praestant. Ad haec quod Mesues suo Eupatorio vim digerendi, & quadantenus Phlegmone liberandi non reddiderit, cum tamen Galenus Ageratum hisce facultatibus refertum esse scribat, repeto Dioscoridis Ageratum haud unquam nouisse Mesuem, suum esse Eupatorium. Siquidem nihil retat quomodo id Eupatorium praestare possit, cum ipse asserat Mesues, quod subtiliatium est & resolutiuum, conueniens sine attractione. Postremo quod Galenus Agerato nullum caloris aut siccitatis gradum adscripserit, ut Eupatorio adscribit Mesues, nihil prorsus momenti hoc argumento habet. Galenus enim non semper simplicium medicamentorum qualitates (plures Galeni possem adducere locos) per gradus explicat, & praesertim ubi breuitati studet. Sed quis adeo Medica materia tam rudis, tamque ignota fuerit, qui non putet nouisse Galenum, caloris & siccitatis haud expers esse Ageratum, cum scribat esse illi digerendi potestatem? Siquidem facultas hac fieri nequit nisi a calidis & siccis temperamentis. Id quod Dioscorides non praetermisit, cum ait Δύραμα δ' ἐξ ἐξ ἀπὸ ἰσχυρῶν αὐτῆς πικρῶν ἰσχυρῶν, id est vim habet decoctum ipsius feruidam. Hac itaque, cum Marini Argumenta infirma admodum reddant, manebo ego in sententia: & praesertim cum Iuliam herbam videam cum folia tum caules edere origano haud dissimiles, quin etiam umbellam aureis bullis micantem Helichrysi modo, cuius aureus color.

Herba Iulia.

ficca quoque planta diutissime conseruatur, unde (vt recte Dioscorides inquit) Agerati sibi nomen adinuenit. Nam hac tantam notam quibus iam certior fieri poterit, vnam & eandem esse plantam Ageratum & Mesus Eupatorium. Caterum non potest non iritari Merini ingenium, qui, vt facilius (vt ipse inquit) meliora super Agerati capite scribere possim, plantam a se pictam mihi offert, quam a Petro Antonio Michaelio Patritio Veneto pro Agerato haberi ait, cum ea Agerato adeo habeatur dissimilis, vt nihil dissimilius esse possit. Siquidem hac origani nullas omnino notas habet, & umbellas quoque, nullas, sed stilos ramentim coherentes balaustrorum effigie. In summa vbi plantam totam expendere, nihil prorsus reperies, quod minimam Agerati particulam referat. Ago tamen Marino gratias, quod eum non dubitem hanc mihi obrulisse plantam, quod putauerit eam legitimum esse Ageratum, magis fortasse (vt video) aliorum opinioni addictus, quam explorandis Agerati notis. Verum ego ingenerosum mihi esse putarem, ex commentario tantum fieri Naucletus, vt recte Galenus admonet libro primo de alimentorum facultatibus in ipsius prefationis calce. At sane hac inuitus admodum scripsi, quod tanta sit plantae illius cum Agerato disparitas, vt in ea censenda opus mihi non fuisset tantam facere temporis iacturam. Atque Marini verba hucusque me protraxerunt, quippe qui scribat, si quid contra eius opinionem habuero, se lubens iudicium & censuram meam subiturum. Quae verba (vt sua est humanitas) ad respondendum me impulerunt. Medicam matricam non assequuntur, qui negant Eupatorium Mesus, non esse Dioscoridis Ageratum. Agerati vires paucis perstrinxit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquitens: Ageratum digerit, & inflammationes leuiter quodammodo resoluit. Florum dilutum ex albo merulo paratum puerorum vermes necat duarum vnciarum pondere potum. Excalfacit ordine primo, & siccat secundo, bilem & pituitam facile purgat, tenuat, incidit, terget, expurgat, putredinem prohibet: resoluit sine attractione, obstructions reseruat, & earum affectus sanat, diuturnis febribus mirifice medetur. Adstringit, quare ventriculum, iecur & cetera viscera roborat: cum sero lactis efficacius purgat. Quae herba ἀγέρων Græcè, Ageratum quoque Latine dicitur: Italicè Herba Giulia.

Agerati vires
ex Gal.
Nomin.

Ageratum (quasi senectutis expertis) foliis serratis, C. B. Ageratum, Matth. Lacu. Castor. Lugdu. Taber. Camer. Ageratum septentrionalium, Lobel. Eupatorium Mesuæ, Trag. Gef. hor. Lonic. Balsamita minor, Dod. gal. & fol. Mentha Corymbifera minor, Cord. in hist. Camphorata, Cæsalpino. II. Ageratum alterum Matthiolus in maioribus figuris duplex proposuit, vt figura hac exprimitur: aut in minoribus, solum id quod foliis est non serratis: in suo compendio neutrum posuit. Sic Lobelus vtrumque habet, quod serratis est foliis, Agerati floribus candidis nomine (quod Ageratum tertium minus Taber.) alterum verò Ageratum minus nominat: Tabernæmontanus, Ageratum secundum candidum: sic Lugdunensi, secundum & tertium. At Camerarius in suo Matthiolo, Ageratum minus proposuit, quod spontè in Hetruria prouenit, multò priore minus, foliisque minus crenatis est, quod distinguit ab ea agerati specie, quæ prorsus candidas umbellas gerit & cæteris est rarior.

Περίσπερον

VERBENACA

CAP. LV.

Peristereon, siue verbenaca, nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columbæ circa hanc perquam libenter versari soleant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adolescit. Folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radiceque sola constare sæpius inuenitur. Folia cum suilla adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant, veteraque ex melle ad cicatricem perducunt.

Ἱερὰ βοτάνη

† SACRA HERBA

CAP. LVI.

Sacra herba, quæ & peristereon a nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos: in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora, angustioraque, eisdem diuisuris, in ambitu, colore aliquatenus cæcio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitave aduersus serpentes pollent: eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragesimo diebus, ieiunio ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores, & inflammationes mitigant: sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt si aqua spargatur trichinium, qua maduerit, latiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum, cum foliis circumdanibus: quartanis quartum. Sacram vocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesque commendetur.

† Antiquus manuscri-
ptus codex
περί Ἱερῆς
περί σπερον
rog. i. De su-
pina Ver-
benaca.
a Idem
Ἱερῆς. i. su-
pina.
b Meum.
περί μυσ-
τα. i. iustra-
tiones.

Verbenaca dua habentur species, recta, & quam supinam vocant. Hanc eam esse volunt, quæ Ἱερὰ βοτάνη, illam quæ περὶ σπερον Dioscoridi dicitur. Recta hac dicta est, quod singulari caule, ipsosq; dodrantali sine ramis assurgat. Supina altera, quod caules, & ramos non ita rectos erigat, sed circumquaque diffundat, cuiusmodi est vulgaris Verbenaca, quæ legitima Ἱερὰ βοτάνη mihi perpetuò fuerit. Caterum quam περὶ σπερον nuncupant, vnico tantum caule, & vnica radice constantem (si vera fateri debeo) ea à me nusquam visa est, quæ notis omnibus legitimam referat, etsi non desint qui velint verbenacam hanc eam esse plantam, quam nos de Siderite superius agentes, primo ibi loco pinximus. Verum cum videam hanc plantam ab vna radice plures edere caules, ipsosq; non dodrantales, sed sesquicubitales, folia haud subalbicania, & flores in caule verticillatim prodeuntes, vt in Marrubio, ac nulla in parte aliquid gerere, quod cum vulgari Verbenaca cognationem præ se ferat, ego quidem ad credendum adduci nequeo, hanc herbam esse Verbenacam, περὶ σπερον dictam; obseruauit ego sæpe, vbi vulgaris Verbenaca plurimum prouenit, esse quasdam ipsius plantas, quæ caules rectos edant, quasdam verò quæ humi ferè procumbant: quo factum est, vt suspicarer, hinc fortasse harum differentiam sumpsisse eos, qui rectam Verbenacam, & supinam faciunt. Mouit me ad hoc Plinius, qui parua inter has intercedere differentiam scribit: Verum id mihi nunquam certum statuere volui. Videant & examinent quoque alij differentiam hanc, & eorum sit quoque iudicium. Hinc sit, vt in suo insigni de stirpiam historia commentario Fuchsum aperte errasse existimem: quippe qui discriminis causa Verbenaca recta florem luteum tribuat. Quod tamen in Dioscoride mihi nunquam licuit inuenire: quemadmodum neque

Verbenacæ
consideratio.
Sideritis pri-
ma malè qui-
busd. Verbe-
naca.
Fuch. erro. i.
Verbenaca.

I. VERBENACA.

Plin. de verbenaca.



Brunfelsius male Erigeron pro verbenaca ponit.

Verbenacae vires ex Gal.

Nomina.

quiens: Verbenaca ideo peristereon appellata est, quod in ea peristera, hoc est, columba versentur. Vim habet adeo deficiatam, ut vulnera conglutinet. Et libro secundo de compositione pharmacorum secundum locos, de antiquo capitis dolore scribens, sic inquit: Omnium porro longe maxime discutit, & perfecte corroborat verbenaca recta, maxime viridis: & arida cum radicibus, & simul cum serpyllo, oleo incocta. Conyctenda etiam ad ea crocodiliadis maxime iuxta aqua nascentis radix. Quin & ipsam per se verbenacam, si oleo incoxeris, caputq; inde rigaucris, omni capitis dolori antiquo: frigiditate, aut ex crassis humoribus oborto medebers. Primum Verbenaca genus Gracis περιστερεων, & περιστερεωνος vocatur: Latinis Verbenaca recta. Alterum vero genus Gracis ιερὰ βοτάνη, & περιστερεων ὑψηλος, appellatur: Latinis verbenaca supina. In vniuersum Italis Verminacola, Berbenca, & Berbenaca nominatur: Germanis Eisen Kraut.

* II. VERBENA NODIFLORA. *



Verbenam duplicem proposuimus, vulgatam & nodifloram, a nemine prius descriptam. I. Verbenaca communis, C.B. Verbenaca, Matth. Lacu. Calt. Verbenaca vulgaris, Lug. Hierobotane mas, Brunf. Sacra herba, Turn. Verbena mascula, Brunf. Verbenaca recta, Trag. Verbenaca recta, Dod. gal. & Lug. Taber. Verbenaca supina, Fuch. Cordo in Dioscor. Verbena femina, Cæsalp. Camer. Verbenaca. Ges. hor. Lon. II. Verbenaca nodiflora. Ex radice tenui, fibrosa, caulis sesquipalmaris, tenuis, quadrans exurgit, & folia obtinet vngue non multum longiora, quæ in ramulis breuiores, oblonga, per extremum crenata, per geniculos bina, inter quæ pediculi, duos tresve transversos digitos longi, nudi, quibus singulis singula capitula subrotunda, ad formam capitulorum Ranunculi insident, ex quibus flosculi vulgaris Verbenacæ similes, prodeunt. Ea sicca ad nos ab Imperato insigni Pharmacopæo Neapolitano Italiae missa, quam descripsimus & delineari curauimus.


Ἀστράγαλος. ASTRAGALVS. CAP. LVII.

Astragalus parvus est à terra frutex, foliis, & ramis eiceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter

inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in ventosis, opacis, & in niualibus. Eo b Memphis Ar- b eanib...
 cadia scaret. Aluum sistit radix in vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceribus sicca efficaciter inspargi- P heneas, ita
 tur. sanguinem supprimit: ægrè propter duritiam tunditur. Orbatius.

* **A**STRAGALVS frequens nascitur in agro Tridentino, in vallis Anania montibus, folio ciceris maiore, floribus pur- Astragali cõ
 purcis: radice raphani emula, adnatis appendicibus firmis, nigris, praduris, inter se implicatis. & gustu adstringen- sideratio.

ASTRAGALVS.



tibus. * Astragali planta, quã in commentarijs nostris antea editis appingi curauimus, cum diligentius à nobis inspecta sit, & quadam in ea desiderari videantur, quæ Astragali propria sunt, non libuit hic eam recudere. Astragalus aliter à Plinio, quam à Dioscoride describitur. Plinius siquidem libro 26. cap. 8. Astragalum his notis representauit: Astragalus, inquit, folia habet longa, incisuris multis, obliqua, circa radices: caules tres, aut quatuor: florem hyacinthi: radices villosas, implicatas, rubras, praduras. Nascitur in petrosis, apricis, & yssdem niualibus, sicut Pheneo Arcadie. Meminit Astragali Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit: Astragalus frutex est exiguus, radices habens adstrictorias, quamobrem etiam in numero est non instrenue exiccantium. Nam vlcera vetera cicatrice obducit, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus huius fruticis prouentus est in Pheneo Arcadie. Is Græco nomine ἀσράγαλος dicitur: Latino similiter Astragalus: Italico Astragalo.

Astragali vires ex Gal.

Astragali figuram ex secunda Commentariorum editione adiecimus, siquidem & Lugdunensis

historia eam exhibeat, sed qualis sit planta ignorare nos fatemur, etsi non desint qui eiusdem Pseudoapios esse censeant.

Υ δεινός.

HYACINTHVS.

CAP. LVIII.

HYACINTHVS folia habet bulbi: dodrantalem caulem, lauem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem florum purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatem coerces, & non patitur erumpere: sistit aluum pota. & vrinam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentiùs est, theiacis expetitur: regium morbum emendat cum vino potum.


HYACINTHVS.

HYACINTHVS ORIEN-
 ralis.



Rrr

Hyacint.

Hyacinthi
confid.HYACINTHVS ORIEN-
TALIS ALTER.Hyacinthus
orientalis.Hyacinthi vi-
res ex Gal.

HYACINTHUS in vniuersum in campestribus fere vni-
ter segetes, & in syluis prouenit. Nobis duo obijerunt
sunt genera, vulgare alterū, alterū Orientale: quod duplex est:
folijs, & radicibus bulbaceis, caule dodrantali, viridi, tenui-
leuiq;: floret cum violis circa finem Martij, & Apulij in-
um: florentem emittit comam, ab ipso caulis medio vsq; ad
summum purpureis circumdatum floribus qui mature, ven-
tes ad terram incuruantur, perdurantq; diu anteaquam
contabescant. Hetruscis nostris Hyacinthi vulgo vocantur Cy-
polle canne. Flores primo statim exortu nostrates pueri cal-
ligunt ob purpurei coloris prestantiam. Aliud HYACIN-
THI genus, quod ORIENTALE appellare placuit, in-
fit ad me Iacobus Antonius Cortusus, rei herbarie studiosis-
simus, quod sibi missum ex Orientalibus regionibus fateba-
tur: vnde nos illi Orientalis nomenclationem addidimus.
Folys exit lily, minoribus, angustioribus, sursum spectanti-
bus, pinguioribus, & in acutum desinentibus: caulis crasso in
quo flores exeunt caerulei, lily figura, sed parui. Radix illi bul-
bosa, squamosaq;. Seritur in hortis, & colitur in siccilibus
vasis. Est & alter folijs latioribus, pinguioribus, & in san-
mitate retusis: cetera ceteris perquam similia sunt. Hyacin-
thi vires memoria prodidit Galenus libro 8. simplicium me-
dicamentorum, sic inquit: Hyacinthi radix bulbosa est, or-
dinis primi in desiccando: secundi vero completi, aut certe
terty incipientis in refrigerando. Itaque pueros diuissime
seruare impuberes illi a cum vino creditur. Semen leuiter ex-
tergit, & adstringit: quamobrem & ipsum regio morbo labo-
rantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio quad ante-
nus desiccans, ceterum in medio consistens caliditate, ac fi-
giditate. Planta Græcis *κίανθος*, Latinis item Hyacinthus
appellatur: Italis Hiacinto: Germanis Wertsen Blumen:
Hispanis Mayos flores: Gallis Vaciet. Hyacinthus orientalis,
Italis Hiacinto orientale.

*IV. HYACINTHVS TRI-
POLITANUS.*

Hyacinthi species viginti octo in Phytopinace
nostro exhibuimus, hoc loco tria proposuit Matthi-
olus. I. Hyacinthus racemosus maior, forte Bulbine
Plinii, C. B. Hyacinthus, Matth. Jacq. Hyacinthus
quartus & maior, Trag. Hyacinthus caeruleus maior
mas, Fuch. Hyacinthus maximus, Tur. Hyacinthus
magnus, Lonic. Hyacinthus syluestris, Cord. in hist.
Hyacinthus comosus spurius tertius, Dod. fol. Hyac-
cinthus comosus maior, Lobek. Lugd. Clus. histo.
Panno. Cam. Hyacinthus maior. Lugd. Tab. Hyac-
cinthus nostras, Castor. Bulbi esculenti genus, Dod.
gal. Lugd. Bulbus syluestris, Cæsalpino. Pancrati-
um, Gef. hortis. II. Hyacinthus caule Serpentinae
instar maculoso, C. B. Hyacinthus orientalis, Matth.
Gef. hor. Castor. Hyacinthus orientalis Græcus,
Lob. Lugd. Hyacinthus orientalis minor, Dod. fol.
Hyacinthus orientalis caeruleus, Taber. Hyacinthus
Constantinopolitanus, Camer. Hyacinthus Cæsal.
III. Hyacinthus orientalis maximus, C. B. Hyacin-
thus orientalis alter, Matth. (sed figurae transpositæ
erant figuraq; mutila) Lugd. Hyacinthus orientalis
maior, Dod. fol. Hyacinthus orientalis maior poly-
anthos, Lob. Lugd. Tab. IV. A Camerario in suo
Matthiolo primo fuit Hyacinthi Tripolitani nomi-
ne propositus, qui ex radice bulbosa mediocri cau-
lem profert gracilem, oblongis angustissimisq; fo-
liis, flore caeruleo, phalangiiq; forma, ex sex foliolis
composito, è quorum medio staminula aliquot pro-
deunt.

Minceor posep. PAPAVER ERRATI-
CVM. CAP. LIX.

PAPAVER erraticum, quod Rhoëada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur: flore protinus
deciduo, vnde & nomen apud Græcos accepit. Folia eruca, aut origano, aut cichorio, aut thymo
familia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra: iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris
anemo-

anemones, puniceus, interdum albus: oblongum caput, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque, aut sex in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accendendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua multa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præstandum mellitis placentulis, & dulcarius libis admiscentur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem fotu, & perfusione somnus allicitur.

Μήνον ὄπιοσ.

PAPAVER SATIVVM.

CAP. LX.

¹⁰ **E** Satiui papaveris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in usu sit: eo etiam ex melle pro sesam. a vtuntur: thylacitin vocant. Capitulum habet a longum, & semen candidum. Sylvestre verò caput habet insidens, demissumq; , & nigrum semen: quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valentius, multò his longius, productiore capitulo. Omnium incommune natura refrigeratrix: quare si capita ipsa, & folia de coquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Calvees cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & celiacorum affectu, doloris leuamentum præbet: efficacius tamen redditur, addito hipocistidis succo, & acacia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bibitur, contra citam aluum, & fœminarum profluvia: in perurgiliis fronti, temporibusq; illinitur ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturq; . Sumptum erui magnitudine, dolorem finit, con-
²⁰ coquit, & somnum allicit: tussi, atque celiacorum valetudini auxiliatur: verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis cum rosaceo perfusum, efficax est: aurium dolori cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur: inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit: igni sacro, & vulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mulieris, & croco: somnum accendant subditum sedi pro balano. Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neq; grumotum, quod inter colandum non tæcia coeat, & in sole diffundatur: dein ad motum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique odoris vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactucæ succo adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucæ succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum splendescit, & infirmum est. Nec desunt, qui eò dementiæ deuenierint, vt adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, vt Erasistratus autor est, usum eius damnauit, oculorum lippitudinibus, & aurium vitis infundi vetans, quoniam visus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo pro-

a Meum.
ἐπιμανές. ἰ.
oblongum.

Opium.

I. PAPAVER ERRATICVM.

II. PAPAVER SATIVVM.



Papaver rhœas
G. Bauh.



Rrr 3

tinus ex

tinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus vsus duntaxat olfactandi probavit, quoniam ad conciliandum somnū conueniret: alioqui nobis vt noxio interdicit. Quæ commentitia esse experimento deprehenduntur: siquidem effectus, virium huiusce medicamenti fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonā modo is excipiatur succus. Aliqui capita ipsa, & folia tundūt, & prelo exprimunt, reterentesq; in mortario digerunt in pastillos: id meconiū vocatur, multum opio ignauius. Porro opū faciendi ratio hæc est. Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lacrymā exeuntem digito in concham abstergere: nec multo post redite, vt concreta inueniatur: etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in vetere palati debet, & in pastillos cogi: cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibis succus deradatur.

* III. PAPAVER POLY-
anthos. *

Papaueris erratici confid.



Papaueris satiu confid.

Papaueris satiu tria genera Plinio.

Papaueris succi siue Opii facultas.

Et leguminum modo. Rem autem se ita habere testari videtur Plinius lib. 19. cap. 8. cū sic inquit: Papaueris satiu tria genera. Candidum, cuius semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos edebatur. Hoc & panis rustici crusta inspergitur adfuso ouo inbarens, vbi inferiorem crustam apio gitq; cereali sapore condiant. Alterum genus Papaueris nigrum, cuius scapo inciso lacteus succus exprimitur. Tertium genus Rhæam vocant Græci, id nostri erraticum dicunt. Sponte quidem, sed in aruis cum hordeo maxime nascitur: hactenus Plinius. Papauere candido passim abundat Hetruria. Vtrisque vero nigris scætet vniuersa Insubrium tellus, sed præcipue apud gentes, que Tridentinas incolunt valles, vbi Papauera hac copiose seruntur in campis, & inter legumina, præsertim inter fabas. Ibi siquidem eius semine vescuntur boues, immisto placentulis, quas ex pasta foliosa multiplis inuolucro conficiunt. Comedunt illi quidē hæc placentas ad saturitatem vsque: non ob id tamen vnquam (quod mirum alicui fortasse videbitur) diuturniore somno capiuntur, neque veteratosi sunt. Quin nec illi etiam, qui Stiriam, superioremq; Austriam incolunt, in veteribus incurrunt: etsi oleum è nigri Papaueris semine expressum in cibis continuè assumant, oliuarum olei vice. Ea demum experientia fecit, vt intripide quandoque ausus sim Papaueris seminis cremorem hordei decocto expressum in ardentissimis febribus ad sitim extinguendam somnumq; conciliandam etiam largius exhibere. Hinc præterea factum est, vt cum metum excusserim, & depauperis, quem mihi olim præceptorum meorum graues admonitiones inuasserant, & ingesserant. Caterum ex incisis Papauerum capitibus opus, siue succus manat, qui in Opiū vocatum addensatur, vt scite docuit Dioscorides. Et quamuis Opiū quarto excessu frigidum statuatur, tamen si ex sapore, & effectu rerum temperamenta, & qualitates cognoscantur, opium nostri vsus (quantum equidem deprehendere potui) non modò gustu amarum percipitur, sed etiam acris, acedens vt paululum in ore detentum linguam, & palatum exculceret. Vnde haud dubie colligi posse putauerim, calidissimas ibi inesse qualitates. Cuius rei fidem augere potest, quæ ex eo prodit odoris grauitas. Veruntamen ne impudentis, atque arrogantis nomen subeam, quod in hoc omnium ferè medicorum sententiam destruere velim, eorum iudicio rē hæc asserendam relinquam, qui ante nos opij tum qualitates, tum facultates diligentissimè expenderunt. Sed forte ea acris, amaraq; facultas in opio facile inuehitur ex glaucij adulteratione, quod illi sapius admiserunt, vt Dioscorides adnotauit. Illudq; argumento esse potest, quod aqua colliquatum croceum colorem reddat. Adde quod opium, quod hodie ad nos conuenitur, non est illud verum & legitimum è lacryma, quæ ex inciso papaueris capite exierit, concretum, sed potius hoc è foliorum, & capitum contritorum succo confectum est: idq; meconiū vocatum erit, opio longè deterius. Papauerum virtus memoria prodidit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Papauer alterum Rhæam nuncupatur, quod

Spectantur Maio mense Papauera erraticæ rubentibus floribus nitentia, in aliquibus campestribus locis, inter fœgetes adeò numerosa, vt deceptis oculis, campi videantur cocineis velaminibus vestiti. Horum flores non desunt qui esument lateris dolori, qui Græcis πλεοπτερος dicitur, miseri mederi: in quem vsus eos siccatas in puluerem redigunt, & in potu ex aqua dulci exhibent. Ab hoc experimento nonnulli medicorum edocli, ex ipsorum florum recentium succo ter, aut quater iterato diluto, serapiū conficiunt: quo postmodum magno, ac prospero successu in pleuriticis vtuntur. Tridentina rura Papaueris erratici folia prima statim germinatione olerum modo decoquant, sumuntq; in cibum, caseo & baryro admistis. Nec mirum sanè, cū etiam Theophrasti auctor (vt ipse scriptum reliquit lib. 9. cap. 13. de plantarum historia) eadem sumerentur in cibo. Loco enim citato ita de eo scribit Theophrastus: Papauer erraticum vocatum non ab simile intubo erratico constat: quare in vsus venit cibarium. Nascitur in aruis potissimum inter hordea. Florem rufum producit: caput pollicari vnguis magnitudine. Legitur ante hordei messem, atque viridius etiam: purgat inferius: hæc Theophrastus. Sed iam de papauere satiuo, siue domestico nobis differendum est. Videtur Dioscorides eum satiuo duos syluestris Papaueris genera tradidisse, & hoc nomine hæc ab illo distinxisse. Qua in re animaduertendum est, ne aliqui fortasse desipiatur, quod omnes hæc papauerum species ab agricolis seruntur. Verum illud duntaxat, mea quidem sententia, hortense appellauit Dioscorides, quod albo constat semine, quoniam hoc frequentius in vridibus, & horre propades seritur. Cætera verò syluestria nominauit, non quod sponte, & per se nascantur (seruntur enim omnia) sed quod asperiora, hirsutioraq; proueniant tum caule, tum capitibus, tum etiam folijs: quod præterea nigrum, asperumq; proferant semen: quod denique serantur in campestribus, iegerum

10
20
30
40
50
60

rat. quod scilicet celeriter flos eius defluat. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & altera dua sunt præter
bas: papaveris sylvestris papaveris: alterum velut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quam illud calycem obli-
tatis totum autem procerius, ac squalidius. Ab hoc succus defluit, atque hinc est, quod hanc speciem quidam Rhebenda no-
munt. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Caterum sativi semen, quod & thylacite cognominant, medicorum so-
mnum conciliat, visu candidum: proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At eius, quod primo loco re-
censuimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, validius semen refrigerat, ita ut nequaquam eo quis innoxie solo uti
possit, sicut sativo siue domestico melli admiscens. Admodum verò, si ita sumptum sit, somnum conciliat. Caterum pusil-
lum eius inspergunt hijs, qui ex melle conficiuntur bellarijs, atque placentis, panibusq;. Porro tertio loco dicti semen atrum
etiam medicamento sum est, admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnium est medicatissimum, tum in se-
mine, tum in calyculis, tum in folijs, tum in succo. Valde enim refrigerat, ad stuporem vsque & mortem producus: quare
medici quò probe eo utantur medicamentis miscentes, frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto, & ultimo
refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime ex methodo misionem facere oporteat, non est presentis tractationis
proprium. Et libro 2. de compositione medicamentorum secundum locos, de dolore capitis agens citra manifestas causas
eberto, ita de opio differit. Raro, inquit, cogimur pharmacia ex opio uti, cum videlicet præ doloris vehementia homo de vi-
ta periclitatur. Quanquam & tunc solida partes ex eius usu offendantur, adeò ut post hac correctione opus habeant. Sic &
ex opio collyria multis detrimento fuerunt, adeò ut debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem, amblyopiam
Græcis appellatam, induxerint: velut etiam auditus gravitatem inducunt quacunque ad vehementem aurium dolorem
ex papaveris succo sunt composita. Idem Galenus lib. 3. eiusdem tractatus, de aurium inflammationibus agens, sic inquit:
Pharmacia ex papaveris succo omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè necessariò cogimur ipsis uti ubi nullum aliud mi-
stigiatum opem tulit: hæc Galenus. Ex quibus sanè omnibus admoniti esse debent medici, ne temerè aut inconsultè ad usum
opij se conferant. Sed ratio, qua id corrigendum, administrandumq; sit, ex ipso Galeno colligi potest, libro 8. de compositi-
one pharmacorum secundum locos, ubi ita scriptum reliquit. Calfaciencia miscentur, qua refrigerantium stupefactionem
deducere possunt, cum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur, ubi quis inaudiuerit, quantitatem consideret
simplicium pharmacorum, qua in compositiones miscentur. Ex hac enim sciet num magis, an minus efficere possit com-
positum pharmacum, ea qua promittit. Si namque refrigerantia plura apparuerint, sensum affectorum magis obtundit,
& quantum caloris in ipsa particula fuerit, etiam hunc extinguit. Vbi verò calfacientia fuerint aucta, minus quidem
hæc efficiet ipsum pharmacum, innocentius autem reddetur. Nosse enim oportet, corpora viventium mortificationi simi-
le quippiam perpeti ab omnium ex opio, hyoscyamo, & mandragora compositorum pharmacorum usu: nimirum causis
dolorem insipientibus insensibilibus factis, & multi sanè qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem par-
ticulas perducunt. Papaver erraticum sic Latinis, *μῆκων ποικίλ*; Græcis appellatur: Italis Papauero saluatico: Germanis
Klapperrosen: Hispanis Amapollia, & Papoulla: Gallis Coquelourdeis, Pauot sauvage, siue Confanons. Papaver verò
sativum Latine dictum, *ὀπίον ἡμερος*; Græcè vocatur: Arabicè Thaxthax, Thaytha, seu Chaschas: Italicè Papauero dome-
stico: Germanicè Magsamen: Hispanicè Dormidera: Gallicè Pauot blanc, seu Pauot priuè. Quod denique Græci *ὀπίον* &
μῆκων ποικίλ; Latini item Opium & Meconium dicunt: Mauritanis, Afium: Itali Opio.

Opium ut
administran-
dum.

Nomina.

Papaver sativum est & sylvestre: floris & seminis colore, & florum textura multiplices differentiæ.
I. Papaver erraticum maius, C. B. Papaver erraticum, Matth. Brunf. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lac.
Lon. Cast. Thal. Cæsalp. Taber. cui & rubeum & floridum: Papaver erraticum primum, Fuch. Lugd.
Papaver Rhœas alterum, Dod. gal. Papaver rubrum, Brunf. Papaver Rhœas, Lobel. Cam. Argemone
vulgaris Trago. Rarius pleno flore, item & albo inter segetes apud nos Doctor Iacobus Cargillus Sco-
tus lectum, exhibuit. II. Papaver hortense flore & semine albo, quod sativum Dioscoridi & album Pli-
nio, C. B. Papaver sativum, Matth. Dod. gal. Lugd. Taber. Papaver, Brunf. Lon. Papaver album, Trag.
Dod. fol. Papaver sativum, Dod. gal. Papaver album sativum, Gef. hor. Lob. Cast. Papaver sativum
thylacite, Cord. in Diosc. Papaver candidum, Cæsalp. Papaver pithitis, Lacuna. III. Papaver Polyan-
thos, C. B. Papaver multiplici flore, Cam. in suo Matthiolo. Papaver album & nigrum Polyanthum,
Lob. à vulgari solùm multiplici textura foliorum in flore variat: Variorū item colorum, purpurei, satura-
tè rubri, violacei, albi mixti: sic & folia in floribus aliquando fimbriata, quædam integra obseruantur.

Μῆκων κερατίτης. PAPAVER CORNICVLATVM CAP. LXI.

50
60

Papaver ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, verbalco similia, in ambitu sylue-
stris papaveris more ferrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo fæni græci, in corniculorum
modum inflexo, vnde nomen mutuatur: semine papaveris, pusillo, nigroq;: radice per summa cespiti-
um, nigra, crassa: nascitur in maritimis, & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, co-
xendicum, & iecinoris affectus potu sanet: prodest his, qui crassa quædam, & arenosa cum lotio red-
dunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulla potu. Crustas emarginant, illita ex oleo folia
fioresq;: argema in nubeculas iumentorum, perunctas abstergunt. Sunt qui glaucium hoc papaveris ge-
nere factitari existimarunt, falsi quodam foliorum cognatione.

a Meum
βίζα δ' ἐλεπ-
τή. i. radice,
tenui ita
Meum.
b Meum, &
Orib. & ἔρ-
ραυθὲς ἀπο-
τίθεται. i.
& exiccatum
reponitur.

Μῆκων ἀφροδῆς. PAPAVER SPVMEVM CAP. LXII.

Aliud Papaveris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dodrantali: fo-
lis admodum paruis, radiculae similibus: fructu inter ea candido: nam herbula alba est, & spumea to-
ta: radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, deciditq;: exiccatum. Datum
acetabuli mensura in aqua mulla, vomitione expurgat: priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus
prodest.

Papaver Corniculatum in maritimis nostris Senensibus Crassetano, & Orbetellano agro, & circa Herculi portum Ar-
gentario promontorio, itemq; in Adriatici maris litore non longè à Timauo fonte, & Tergesto saxoso litoris tractu, ubi
sapius

Papaveris
corniculari
considerantur.

I. PAPAVER CORNICULATUM.

Papauer cornicularum rubrum.

Papauer spumeum.

Plinii lapsus.



Papaveris corniculati vires ex Gal.

similia reddidit. Quem admodum & Theophrastus, qui de eo loco citato ita scriptum reliquit. Papauer heracleon nuncupatum folio constat struthy, hoc est radicle, qua linteis candorem conciliant, radice candida, in summa terra eunte: fructu albo. Huius radix purgare superius nata est. Non desunt, qui contra comitiales ea utuntur in vino mulso. hac Theophrastus. Papaveris corniculati meminit Galeus libro 7. simplicium medicamentorum, de eius viribus in hunc modum differens. Papauer corniculatum nominatum quidem est a semine leuem inuersionem habente, veluti & fanum graecum. ut

* II. PAPAVER SPINOSUM. *

Notina.



sepius ipsum legimus frequentissimum prouenit: quoniam etiam in alys Italia locus nascitur, sed quod potissimum in hortis, & viridarijs ad publicum omnium commodum, & spectaculum fuerit satum. Quod in prescriptis locus nascitur: florem aureum profert, siue (vt Dioscorides inquit) palidum. Sed alterum quoque habetur genus, folijs minus asperis, & minoribus, quod florem rubrum edit. Hoc in Moravia & Bohemia, in campestribus copiosum vidimus. Corniculati papaueris meminit Theophrastus lib. 9. cap. 14. de plantarum historia, sic inquit: Papaueris quoque syluestri genera plura notantur: quoddam enim corniculare appellatum: quoddam autem nigrum est, folio constans verbasici nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis: radix breuis, per summaque usque spatum: fructus inflexi, vt cornicula figurantur. Legitur circa messes. Alium purgare potest: folium albuginem oculi aufert: nascitur iuxta mare, saxosis locis: hac ille. Creditur nonnulli Glaucium, quod Mauritanis meminit vocari. fieri è corniculati Papaueris loco. Verum h (vt Dioscorides est author) procul dubio decipiuntur. Caterum Papauer spumeum, quod aliqui heracleum vocant, nondum mihi conuictum est, neque etiam haecenus aliquem reperi, qui illas legitimas ostenderet. Quo fit, vt ipsum quoque inter tot alias nobis incognitas plantas relinquere malim, quam aliquid incertum proferre, vt quidam faciunt. Veruntamen non mihi videtur silentio praterendum fatalis ferè Plinii lapsus: in Papaueris spumei mentione lib. 20. cap. 19. Quippe qui hanc papaueris folia speciem passerum auium representare tradiderit, deceptus nimirum duplici eiusdem nominis Graeci significatione: ἰσχυρὸν enim Graecis non modo passerem auiculum significat, sed & plantam eam, qua Latini radiculam, siue lunariam herbam appellant: cui quidem Dioscorides, non ante auiculis, quas passeres Latini dicunt, Papaueris spumei folia

bouis cornu videntur esse simile. Vocatur porro a quibusdam paraliu, quandoquidem vt plurimum iuxta mare nascitur. Vim habet incidendi, & abstergendi. Itaque radix herba in aqua decocta, ad dimidium, hepaticos affectus adiuuat. Porro folia, & flores sordida admodum, & maligna vitia iuuant. Sed ab his abstinere oportet, vlcibus iam expurgatis: adeo enim abstergere valent, vt & pura quoque carum nonnihil eliquent. Hoc virium robore non sordem dant, sed & crustam vlcibus detrahit. Papauer vero Herculeum, quod & aphrodes, hoc est, spumeum vocatur, eo quod totum sit candidum, & spumosum, exile est. Semen habet pituitam expurgans. Μήκρον κεραιτίνης id Graecis vocatur, quod Latine Papauer corniculatum: Arabibus Almacharam: Italis Papauer cornuto: Germanis Gelb Delmagen Mön vnd Gelb Delmagamen: Hispanis Dormidera marina: Gallis Pauer Cornu. Id vero μήκρον ἀφροδίνης Graecè dicitur, quod Latine Papauer spumeum: Arabice Dabre, & Zebeolij: Italice Papauer spumeo.

I. Papauer Corniculatum luteum, habetur enim violaceum, item phaniceum, hirsutum, vel glabro folio. Papauer Corniculatum, Matt. Lac. Cast. Cæfal. Papauer syluestre corniculatum, Trag. Papauer corniculatum luteum, Fuch. Turn. Papauer corniculatum maius, Dod. fol. Papauer cornutum, Dod. gal. Costi in Diosc. & hist. Ges. hor. Lon. Lug. Tab. Cam. II. Papauer spinosum elegantissimum: hoc papauer, cum nemo eius meminisset, in Phycopinace ante sesquiannum descripsimus, iam cum ipsius genuina effigie addere placuit. Ex radice tenui, oblonga, fibrosa, caulibus sesquipalmaris, rotundus, striatus, minimis aculeis armatus, mollis, alba medulla plenus exurgit, qui

qui in summo in alas brachiatur, Foliis est glaucis, papaueris Corniculati instar laciniatis, non hirsutis, sed mollibus & nitidis, trium quatuorve vnciarum longis, per margines flavescentibus aculeis armatis, aliquibus etiam ipsi neruo parte auersa, minoribus tamen, adpositis: parte superna nerui quasi leui puluere obsiti albicant: hæc ex leui vulnere tuberoceum succum fundunt. Flos in caulis summitate quinquefolius luteus, cui succedit capitulum oblongum, quinquangulum spinis flauis horridum, semina plura nigra sextuplo aliorum maiora, rotunda in apicem desinentia elegantissime striata, continens. Ex Anglia primùm semen allatum, quod vna cum planta, Figo del inferno, id est, Fici infernalis nomine, Doctor Doldius Norinberga primùm misit: quo nomine ante paucos dies etiam Nobilis. Cortusus Patauio transmisit: in hortis nostris habuimus. Notæ aliquot à Dioscoride Glauio tributz, huic etiam conueniunt.

Υπνκοον.

HYPECOVM.

CAP. LXIII.

Hypocoon, aliqui Hypopheon vocant: nascitur in segetibus aruisq;, folijs rutæ, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

HYPECOVM.



Hypocoon ijs facile sese offeret, qui inter segetes, & legu-
mina ipsum perquirere non grauabuntur. Hoc pro syl-
uestri ruta olim Petrus Spezzalancia Clesij vallis Anania op-
piduli pharmacopola compater meus, mihi ostendere solebat.
Quandoquidem id prouenit in aruis, folijs rutæ paulò maio-
ribus, si singulatim expendantur: caulibus exiguis, mollibus,
birsutis: in quibus sunt flores, qui in luteum pallefcunt, et si
prope calycem purpurei spectentur: in horum medio flocculus
erumpit colore aurum emulans, visu iucundus. Floribus suc-
cedunt capitula, tenui inuolucro contecta: in quibus semen
clauditur nigrum, tactu asperum, pseudomelanthio proxi-
mum. Caterum scio non deesse nasutos, qui iam diu plantam
hanc nostram impugnant, dicuntq; folia illi non esse rutæ, sed
potius Alceæ. At qui si singulatim examinentur, non facile so-
gnoscent, à rutæ parum admodum distare. Adhuc si vires ex-
pendantur, nihil sanè obstat, quin ea in hac planta reperi-
antur, quæ in ipso quoq; sunt papauere. Quo fit, vt horum
susurronum bombo nihil à priori mea sententia dimoueat,
quousq; aliam plantam, quæ magis facie & viribus Hypocoon
referat, in medium afferant. Nullam hactenus plantam mi-
hi videre licuit quæ magis Hypocoon referat: tametsi id mihi
per omnia non satisfacit. Meminit huius Galen. lib. 8. simplici-
um medicamentorum, his paucis verbis: Hypocoon, inquit, re-
frigerandi vim habet, ex tertio serè refrigerantium ordine, a-
deo vt parum absit à papauere. Quod Græci ὑπνκοον, Latini
quoq; Hypocoon vocant: Itali Hipecoo.

Hypocoi vi-
res ex Gal.

Nomina.

Alceæ vesicaria, C.B. Hypocoon, Matt. Lac. Cast. Lugd. Cæs. Hypocoon alterum spurium, Ges. hor. Alceæ Veneta, Trag. Dod. gal. Lugd. Alceæ peregrina, solisequia, Lobel. Alceæ vesicaria, Dodo. fol. Malua Veneta, Ges. hort. Lonic. Herba Vngarica, eidem.

na Ges. hor. Taber. Alceæ Bononiensis, Ges. hort. appen. Alceæ peregrina, solisequia, Lobel. Alceæ vesicaria, Dodo. fol. Malua Veneta, Ges. hort. Lonic. Herba Vngarica, eidem.

Υοσκιανος.

HYOSCYAMVS SIVE APOLLINARIS.

CAP. LXIII.

Hioscyamus frutex est caules emittens a crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è la-
tere caulis, ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulic septi seminum plenis, vt papauere.
ris. Tres eius differentia. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, smilacis folijs, cytinis præduris &
spinosis. Alterius semen subflauum vt irionis: flores lutei, folia & siliquæ b simpliciores, ambo insaniam
gignunt, & soporem, ideo in communi vsu damnantur. Tertium genus, vt quod mitissimum esset, me-
dici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq;, in maritimis ruderibusq; nascens: c
cuius occasio si non adfit, rusum vsurpari oportet: niger, vt deterrimus, improbatur. Recenti semine, cau-
libus folijsq; tuis succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum vsq; prorogatur: nam fa-
cile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso & expresso. Li-
quamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita d
trimestri farina, digeritur in pastillos & reconditur. Liquamentum primum, & quod à sicco semine ex-
emptum est, collyrijs, quæ doloris sensum auferunt, commodissimè inferi solent: contra acutas calidasq;
fluxiones, dolores aurium: atque vuluæ mala prosunt: cum farina autem, aut polenta, oculorum, pedum
caterarumq; partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tussi, destillationibus, oculorum
fluxioni, & doloribus efficac: contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli
pondere cum papaueris semine, & aqua mulsa bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammisq; tu-
mentibus à partu, tritum ex vino illinitur. Alijs quoq; cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant,
admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta utilissimè im-
ponuntur: recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur: cum vino terna, quaternave pota
sanant

a Orib. addit.
σάλλα. i.
multos. Et i-
ta quoque
meum.

b Orib.

απαλώμενος.

i. teneriores.

c Orib. addit.

χρυστόν εν

τῷ λευκῷ. i.

cadido itaq;

vtendum est.

d Meum

στανιφάλας.

ρω λυπη ἀνω

i. cum frume-

ti horni fari-

na & rutæ

fanant algidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura mandantur, mediocrem in aniam gignunt: idem efficere tradunt, si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

I. HYOSCYAMVS.

Hyoscyami
confid.

II. HYOSCYAMVS ALBVS.

IV. HYOSCYAMVS TER-
tius.Hyoscyami
lutei descri-
ptio.Hyoscyami
albi delinea-
tio.Hyoscyamus
tertius.

HYOSCYAMVS (vt Dioscoridi placet) tres habet differen-
tias. Prima, nigrum fert semen: secunda, subflorum:
tertia album, qua omnia vt semine differunt, ita & floribus.
Siquidem in prima purpurei, in altera lutei, in postrema ve-
ro candidi spectantur. At hyoscyamum purpureo flore refer-
tum nusquam haecenus videre licuit. Cetera vero genera &
vidimus, & saepe legimus. Qua flore luteo, & subflano semine
prouenit, vbiq; fere locorum nascitur, locis incultis, secum iti-
nera, & in agrorum limitibus, folio brassicae, lato, venoso,
pingui, nigricante, oblongo, in acutum desinente & secto, A-
canthi modo, circumquaq; ambitu hirsuto; sed tactu molli.
Caules habet teneros, teretes, pilosos, pingues, subalbicantes,
quibus a medio rami prodeunt numerosi, in quibus flores in
altera tantum parte & latere prodeunt. Hos calyces quidam se-
quuntur Punicorum Cytinis similes, serrato, ac pungenti ca-
cumine ocimoidis fere modo, in quibus semen concluditur, ru-
tundis quibusdam scutulis, caliculos occludentibus. Nam
ijs maturitate exclusis, protinus semen decidit. Radice nitida
spithama longitudine, alba, molli, succosaq;. Tota planta gra-
uiter olet, adeo vt olfactu mentem afficiat. Qua autem alba ve-
catur, folijs crescit alterius fere similibus, sed subrotunda, pin-
guiorib; mollioribus, hirsutiorib; rarioribus & albicantib;. Flo-
res profert alteri similes, sed candidos, aut subpallidos, sub-
teos, e quib; eode ordine quo in ceteris Cytini oriuntur, sed ra-
riores & clementiores, in quibus albu concluditur semen. Na-
scitur sponte & feritur in hortis. Non desunt qui noua qua-
dam in Italiam attulerunt plantam, spectatu sane pulcher-
rimam, quam inter Hyoscyami genera connumerant. Cae-
les edit hac sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lan-
gineramososque, folijs amplis, pinguis, tenui pilo refe-
tis, mollibus, solani soporiferi speciem quadantenus refe-
rentibus, odore etiam graui. Flores edit pallidos, luteos
Hyosya-

Hyoscyami annulos, è quibus capitula subrotunda oriuntur, quae nonnullam Hyoscyami speciem praeferunt. Nam & similibus fere scutulis concluduntur, coronato circumquaque orificio, & semine intus subflavo colore. Radice nititur alba, spiramine longitudine, numerosis vbiq; fibris, & digiti crassitudine. Hanc iam pridem ex Italia ad me transmisit in Bohemiam, Iacobus Antonius Cortusius: feritur in hortis. Hyoscyami meminit Scribonius Largus, inquit: Altercum, quod Graeci Hyoscyamus vocatur, qui biberint, capitis gravitate, & venarum distentione laborant, mentesq; abalienantur cum quaedam verborum altercatione: unde & nomen apud Latinos. Hoc idem equidem testari possum, quod viderim in Anania viliu manibus pueros, qui Hyoscyami semen comederant, adeo desipientes factos, ut parentes, & vicini eos crederent a caeco leporebus vexatos esse. Hinc est, quod eius regionis incola Hyoscyamum vulgari sermone appellant Disturbio, ut quod nuncem maxime turbet. Aves, quae huius herbae semen ederint, praecipue quae in gallinaceo habentur genere, non multo post tempore pereunt, quemadmodum & pisces. Hyoscyamus videtur Graecis dicta, quasi faba suilla: propterea quod (ut Helianus inquit) huius herbae pastu resoluantur, & conuellantur apri. Sed remedium novere: aquas enim statim adeunt, & canthos venantur, atq; ita protinus saluti restituuntur. Hyoscyami vires recensuit Galenus lib. 8. simp. med. his verbis: Hyoscyamus, cui semen atrium est, insaniam, ac soporem affert. Huic autem is, cui semen mediocriter flavum est, propinquam facit item obtinet. Verum utriq; fugiendi sunt, ut inutilis, & venenosi seu deleterij. Caterum cuius semen, ac flos candidus est, ad sanationes vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro flos eius quidem, cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: eius vero, cui est subflavum, leuiter mali colorem refert. haec Galenus. Hyoscyamus tertius, refrigerat ordine tertio completo: soporem inducit, adeo ut ea sit ei natura, quae ceteris Hyoscyamis. Caterum, ut ad Hyoscyami historiam nostram revertatur oratio, mihi quidem non videtur praetermittenda suspicio, quae est, quod in huius capituli initio, vbi de floribus sit mentio, mendum aliquod subsit. Ea namq; inibi floribus tribuuntur, quae siliquis legitime debentur. Etenim siliquis sunt, quae scutulis conteguntur, atq; semen intus continent, non autem flores. Auget hanc nobis suspitionem Serapio: quippe qui illud de fructibus Hyoscyami Dioscoridi acceptum referat, quod hic de floribus scriptum legitur. Qui ne non temere, meo iudicio, conycere possumus, hunc locum in Dioscoride deprauatum, aut mutilatum esse. Planta, quae Graecis Ἰοσὴμα, Latinis appellatur Hyoscyamus, Apollinaris herba, Altercum: Arabibus Bengi: Italiae Iusquiamo: Germanis Willkommen vnd Willen: Hispanis Velenho: Gallis Iusquiamo & Hanebane. At Hyoscyamus albus Graecis Ἰοσὴμα λευκός: Italiae Iusquiamo bianco. Sic Hyoscyamus tertius, seu potius quartus, Italiae Iusquiamo nuovo seu Iusquiamo maggiore.

Hyoscyamis
cur altercu
dicatur

Hyoscyami
vires ex Gal.

Nomina.

Hyoscyamus, id est, faba suilla, quod eius pastu resoluantur apri, ut Aelianus prodidit, praesenti mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus polluerint. I. Hyoscyamus vulgaris, vel niger, C.B. Hyoscyamus, Matth. Brunf. Turn Lac. Lug. Cas. Hyoscyamus secundus Galeni, Trago: Hyoscyamus flavus Fuch. Hyoscyamus niger, Dod. gal. & fol. Lon. Lob. Cas. Hyoscyamus vulgaris, Gef. hor. Thal. Hyoscyamus primus, Tab. Apollinaris, Altercum, Symphoniaca, Cord. in Dios. II. Hyoscyamus albus maior, (habetur enim & minor) vel tertius Dioscoridis, & quartus Plinii, C.B. Hyoscyamus albus, Matth. Turn. Dod. gal. & fol. Gef. hort. Lon. Lob. Cas. Cam. Hyoscyamus candidus, Trag. Hyoscyamus secundus, Tab. Apollinaris tertia, Cord. in Dioscot. III. Hyoscyamus Creticus luteus. C.B. planta est pulcherrima, folia

* III. HYOSCYAMVS CRE-
ticus luteus. *

* V. NICOTIANA MAIOR
latifolia. *



N. aureus
Stemms.

habens

Nicotiana glauca
Stemms

habens lata, subrotunda, sinuata & circumrofa, non vt in vulgari laciniata, sed hyofcyami albi minoris folius multum similia, hirsuta, longis pediculis hirsutis, ex caule robusto, rotundo, hirsuto prodeūna. Flores habet in summitate ex calyce hirsuto prodeuntes, oblongos, Lamii melissophylli seu Nicotiana ferma luteos, ex quorum medio stamina quaedam prodeunt, quibus delapsis ipsorum calyces oblongi hirsuti in quinque apices abeuntes indurantur, semenque minutum subrufum continent. I V. Nicotiana minor seu Hyofcyamus luteus, C. B. Hyofcyamus tertius, Matth. Lugd. Hyofcyamus niger, eidem in Ital. Castor. Lugd. Hyofcyamus luteus, Dod. gal. & fol. Lonic. Ges. hor. Cam. Hyofcyamus dubius luteolus Solanum lius, Lob. Hyofcyamus Peruvianus, Taber. Priapæia, Ges. hort. Tarnabone congener, Cæsalp. V. Nicotiana maior latifolia (habetur enim & angustifolia & etiam minima) ex radicibus albis in multos ramos fissis, caulis surgit ad trium & plurius cubitorum altitudinem, viridis, villosus, ramis brachiatis: folia habet ampla, nonnunquam sinuata, latiore basi caulem amplectentia (rarius exigua è pediculo prominentia) sensim in mucronem se colligentia, pinguis, dilute virentia, molli lanugine pubescentia: flores in summo caule oblongi, concavi, patentes, pentagoni, dilutiore purpura rubentes & ad marginem albicantes: quibus succedunt vascula oblonga acuminata, interstitio diuisa, minutissimo pullo semine referata. Huius semen ex Occidentali India, apud quos locis humidis & vmbrosis leuique solo provenit, primum in Europam allatum, vbi in hortis autumnis satum feliciter sequenti anno adolescit. Americanis Perum, vt habet Theuetus: Picielt, Monardi: Petebecenus, Ouiedo: Tabacum, ab eius nominis Insula dicitur. Hyofcyami tertia species, Ges. hor. Hyofcyamus Peruvianus, Dodo. fol. Camer. in Marth. Tabacum, Monardi, Tabacum latifolium, Cam. cui & vulgò Vulneraria planta Indica, Sana sancta Indoria, Aduersariis & Lob. Nicotiana & Herba Regina, Lugd. Nicotiana maior, Tab. Nicotiana, Lon. Torna bona, Cæsalp. Herba S. Crucis, Castori, Hispanis Petun & Tabaco: Gallis Herbe de la Roine mere, Germanis *Indiansch Wundkraut*. Diuersis facultatibus prædita est, calidam esse foliorum acrimonia ostendit, quæ & saliuam elicit: narcoticam autem & stupefacientem vim ei inesse, mentis perturbatio, quæ ex fumo attracto causatur, declarat: foliorum item applicatio podagricorum cruciatibus medendo, matricis tormina discutiendo, succi denique collutio diros dentium dolores tollendo etiam declarat. Ad infinitos morbos commendatur, cuius nomine peculiarem de hac planta libellum Egidius Euerardus, Herbam Panaceam nominans, scripsit: plurima de eius viribus etiam Carolus Stephanus in suo de Agricultura libro. Sunt qui Syrupum ex hac ruffientibus & Asthmaticis vtilem conficiant. Vnguentum paratur ad vlcera, scabiem & scrophulas præstantissimum: Exemplum ꝛ. Foliorum Nicotianæ libram vnam, Axungia porci recentis libram semis. Herba trita in vino rubro per noctem maceretur: manè lento igne cum axungia ad vini consumptionem bulliat: cola exprimendo: colato adde succi Nicotianæ quartarium vnum, Resinæ abiegnæ vncias duas: coquantur ad succi consumptionem, addendo circa finem radicis Aristolochiæ rotundæ puluerisatæ vnciam vnam, ceræ nouæ quantum sufficit, fiat vnguentum.

Ψύλλιον.

PSYLLIVM.

CAP. LXV.

Meum
χορτάδι. i.
fœni modo
furculosa.

PSyllion foliis est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: a sarmentosa fœni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili, vnde & nomen: in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua acetato: enterocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto medetur: teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, vbi concreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat: contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe rufum sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.


Psyllii consi.
& genera.

PSyllium, quod & Pulicariâ herbam nuncupant, duplici recensetur genere, foliorum capitulorumque differentia. Alteri folijs est incanis, longis, hirsutis, coronopo æmulus, non tamè corniculatis. Ramos gerit numerosos, dodrantales, rotundos, graciles & foliosos, humotenus potius quàm in altum sese diffundentes, in quorum cacuminibus capitula oriuntur, compacti squamarum cogerie à natura fabricata, vt in scabiosa, & longis pediculis nitentia. Flosculos edit pusillos, pratenuos, lanuginosos, pilorum specie referentes, albo colore, plantaginibus angustifolia modo. Semen pusillum & nigrum, pellucidumque habetur, puluiffi effigie, in ipsis capitulis continetur. Radice nititur subalbicante, dodrantali, numerosis striata fibris. Nascitur locis incultis, & à multis quoque seritur. Alterum longè sarmentosius est, & numerosioribus refertum folijs, longioribus, angustioribus densioribusque, pilosis pariter, atque incanis, & inter se complicatis: capitula illi sunt alteri similia, sed minoris paulo, & numerosiora, in quibus semen progignitur alteri simile. Radicem habet multisidam, & numerosis scatenem fibris. Nascitur in campestribus, sed in maritimis frequentius. Septasia semen recondunt ad glutinosos liquores conficiendos, quibus in infrigidandis inflammationibus, prohibendisque calidis defluxionibus, & ad extinguendam sitim, lenigandamque linguam, & faucium scabritiem, in ardentissimis febribus vtuntur medici: quinetiam ad aluum emolliendam. Psyllij vires retulit Mesues inter ea medicamenta, quæ deiectione vi pollent, vbi hæc ad ieiunium saltem habet. Psyllium de his est, quæ temperamentum immutant, & quæ emolliendo aluam citant. Huius seminis tria habentur genera, candidans, subtilissimum, & ad purpuram vergens. Præstantius perfectè maturum, ponderosum, & quod in aquam demissum statim immo petit. Contrarijs constat cum viribus, tum substantijs: ea siquidem, quæ in medulla continetur, calida est, & sicca ordine quarto, admodum acris, incidens, exulcerans, septica, & deleteria facultatis. Quæ verò in cortice residet, teste Ruso, infriigidat, humectatque, tertio excessu. Infunditur Psyllij semen in aqua fontana frigida, agitaturque rudicula tam diu, quousque aqua lentorem contrahat, percolaturque, deinde a seminibus, & admiscetur oleo, aut syrupo violaceo: hoc enim modo Psyllium potu aluum mirifice emollit, & deicit. Verum si fruxum prius semen rosaceo admixtum eodem modo agitur, tuus

Psyllii vires
ex Mesue.

I. PSYLLIVM.

II. PSYLLIVM ALTERVM.



tunc sumptum dysentericis remedio est, & ceteris alii fluoribus, presertimq; hys, qui dieclorio medicamento extiperant
 hausto superueniunt, sed prescipue acris, quale est scammonium. Caterum maxime animaduertendum est, ne Psyllij semen
 (ad quod tamen detestantur recentiorum quidam) tusum in puluerem potandum exhibeatur. Quippe quod, attrita me-
 tallari substantia, ventriculum, & intestina exulcerat: iecur & sanguinem inflammat, & omnia deniq; viscera ledit.
 Integri seminis dilutum eo modo, quo diximus. paratum, bilem deicit: eaq; propter ardentissimis febribus, intolerabili si-
 tu inflammatis valde spiritibus, & sanctum & pectoris asperitatibus mirifice medetur. In aceto diu agitatum inflamma-
 tione, igni sacro, & herpete laborantibus auxiliatur, exterius illitum: priuatim prodest capite dolentibus fronti imposi-
 tum, si tamen dolor à causa calida facit exitatus. Hac ex Mesue decerpimus. Psyllij vires paucis perscrinxit Galenus Psyllij vires
 lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Psyllij semen admodum vtile est, ex secundo refrigerantium ordine: in
 deficcando vero & humectando medium quodammodo est, & symmetrum. Herba ψύλλιον, Psyllium item Latine dicitur. Nomina
 ter: Arabicè Βαζαράχαθωνα, seu Βαζερ cothume: Italicè Psillia: Germanicè Psyllienkraut: Hispanicè Zargatona:
 Gallicè Herbe a pulces.

Psyllium duplex est, maius quod duplex (alterum enim, ramosius) & minus Gotne dictum in Phy-
 topinace (cum nemo prius proposuerit) descriptum & pictum. I. Psyllium alterum, C. B. Psyllium, Matt.
 Trag. Fucht. Turn. Dodo. gal. & fol. Cordo in Diosc. & histo. Ges. hort. Lob. Castor. Lugd. Tab. Psyllium
 minus, Casal. Cynops Theophrasti. Ges. hort. Pulicaris herba, Lob. in Iconibus. II. Psyllium maius, C. B.
 & Celsalino. Psyllium alterum, Matth. Castor. Lugd. Taber. Psyllium Plinianum forte radice perenni
 supinum Lobelo.

Στρούχνος κηπάιος. SOLANVM HORTENSE. CAP. LXVI.

Hortense Solanum frutex est cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore
 quam ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigricat aut fuluescit: herba in-
 nocentis gustus. Natura ei refrigeradi: quare folia vlcerebus quæ serpunt, & ignibus factis conuenienter
 cum polline polentæ illinuntur: agilopia, capitifq; dolores, trita & imposita per se sanant: astuanti sto-
 macho auxiliantur: parotidas cum lase detrita illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum
 atq; vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad ægilopas cum pane: infantium adu-
 stioni, quam syriasm vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyriis, aquæ vel oui vicem exhibet,
 contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest: mensuram abundantiam sistit in vellere
 subditus. Succus fuluo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopiis presentaneo
 est remedio.

Στρούχνος ἀλμυράκος. SOLANVM HALICACABVM. CAP. LXVII.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabon aut Physalida, id est vesicariam vocant, fo-
 liis antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona ter-
 ram spe-

ram spectant: folliculis orbiculatis, vesiculis similibus: in quibus semen continet fuluum, rotundum, & acinorum vix figura: quo coronarii vtuntur, corollis intexentes. Vim vsuq; hortensis Solani habent, verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine potu, & vrinam pellit. Ex vnaq; herba succus extrahitur, qui siccatu in vmbra reconditur, ad eadem valens.

I. SOLANVM HORTENSE.



II. SOLANVM HALICACABUM



Στρυχνος ὑπνωτικος.

SOLANVM SOMNIFERVM.

CAP. LXVIII

Solanum somniferum, aliqui etiam Halicacabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæq; mali similibus plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul a mari. Radicis cortex in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer vrinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur. si quid numero adiiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulla, potui data. † Succus pastillis inferitur, & medicamentis, quæ doloris leuamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

† Me. φλοιός
i. cortex.

Στρυχνος μανικος.

SOLANVM FVRIOSVM.

CAP. LXIX.

Solanum manicon, aliqui per sion, alii thryon appellauere. Huic folium erucæ simile, maius aliquanto, fatis acantho, quam pæderota vocant, accedens: caules a radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed vt platani pilulæ hirsutius, verum maius latiusq;: florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, dens aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt vix mollibus: radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali: gignitur in montibus vento perflatis & plataneatis. Radix drachmæ vnus pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginationesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres vsq; dies mentis alienationem affert: quadruplicatus interimit. Remedio est aqua mulla copiosius pota, & vomitione reiecta.

Solanum generum confid.

Hortensis Solani descriptio.

E Quatuor Solani generibus, quæ hic à Dioscoride describuntur, etsi in commentarijs, quos antea Italico sermone composui, me duo tantum genera nouisse prodiderim, hortense scilicet, & quod aliqui Halicacabum, alij Vesicarium vocant: hoc tamen anno tertium, quod Somniferum appellant, Pisis ad nos misit vir rei medica eruditione clarus Lucas Ghonus Forocorneliensis: idq; mihi planè omnibus notis legitimo respondere videtur. Verum quartum Solani genus, quod Manicum cognominant, hætenus me non vidisse fateor. HORTENSE apud veteres concessit in ciborum vsu, & pro obre habitum est: folijs exit Ocimo maioribus, Vesicaria æmulis, sed angustioribus nigrioribusq;, mollioribus & oblonga. Plures circumquaq; fundit ramos, non sine alarum cavitatibus, floribus albis, & in medio luteis, stella figura. Bacis edat rotundas, racematim dependentes, vinoso succo pregnantes, iuniperinis haud minores, orobis quantitate, in quibus album minutumq; semen continetur. Variat in ijs color: siquidem in hac planta nigra, in illa lutea, in altera subvirides habentur. Radix

III. VESICARIA REPENS.

IV. SOLANVM SOMNI-
ferum.



V. SOLANVM SOMNI-
ferum.



Radix illi est alba, pluribus diuaticata fibris. Nascitur in hortis & viridarijs, secus publica itinera, & praesertim propter sepes, & adificiorum muros. Praestat cum foliorum, tum baccarum succus addito rosaceo, & aceti momento, aduersus capitis dolores a caliditate exortos: quinetiam phreneticos iuuat, vbi illitis in eo linteolis ex aceto & rosaceo syncipiti superponatur. Illinitur fronti eodem modo ad calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoq, vtiliter cum aceto ad faucium, & columella inflammationes, & additur conuenienter in vnguentis & emplastris, quorum ad vlcera contumacia est vsus: cibus idoneum est. In summa vbi refrigerare, exiccare, cohibereq, opus est, hortense Solanum mirifice conuenit. Quod autem HALICACABVM siue Vesicariam vocant, quodq, Arabes & officina Alkekengi nuncupant, folijs est hortensi similibus, sed latioribus firmioribusq, subasperis, nec adeo, vt in illo nigricantibus. Caulibus lentis, qui vbi adoleuerint, facile sese in humum prosternunt. Flores illi sunt candidi, hortensis modo: e quibus vesica oriuntur iuglandium magnitudinis, & quandoq, maiores, turbinatae facie. Haec octonus compaginantur costis, equalibus inter se spatijs distantibus. Recenter edita virides sunt, sed per maturitatem rufescunt, baccis intrus uinosis, quae singula, singulis inhaerent in a folliculi parte, rubicunda vna acino [rusci baccis] similis, sapore austero simul & amaro, ac numerofo, minutoq, intrus semine, ipsoq, albicante. Nascitur propter vliginosas sepes & locis vmbrosis. Baccarum vis est praestantissima non solum ad renum vitia & ad ciendam vrinam, sed ad eius quoq, ardorem mulcendum. Siquidem earum succus ex papaueris albi cremore, aut seminum melopeponum, aut cucurbita cucumerisve, aut ex malua decocto, aut hordeacea prissana potus mirifice vrina ardoribus auxiliatur. Aspidibus adeo aduersissimum est Halicacabum, vt ad mota propius eius radice, solum

Hortensis Solani vires Matthiolo.

Solani Halicacabi deli- neatio.

Solani Halicacabi vires.

pore inexpugnabili necentur. Bacca musto diluta imponuntur efficaciter incipientibus oculorum carbunculis. Calcantur eadem in tina vna cum maturis vuis, & diebus aliquot simul effervesce sinuntur, sitq, inde vinum calculosis admodum vtile. Siquidem arenas mirifice pellit, & renes mundat vnciarum quatuor pondere potum. Est & aliud VESICARIAE genus, ab hoc tamen valde diuersum, quod hac tempestate seritur in hortis ac fictilibus, scilicet, ategias, pergulas, & fenestras in-

dieq; qui sumpsit ad cibum. Iocus est magnus, ubi qui gulosis parasitus hoc apposuerit vinum, cum mensis optimis cibus re-
 ferat, nihil prorsus cibi ingerere queant. Id quod Francisco Calceolario Veronensi acceptum refero, utpote qui
 primus hoc vniuerso plantae secretum propalauit. Somnifici & manici Solani meminit Theophrastus lib. 9. cap. 12. de plan-
 tarum historia, sic inquit: Solanorum genera duo. Alterum somnificum, radice rubra, sanguinis modo, sed candida cum
 faeces fructu loco radice: folio tithymalo simili, aut malo dulci, sed piloso. & parte ima magno. Huius corticem radicis
 tunden. tes admodum. & in vino miraculo madefactentes dant. atq; ita dormire faciunt. Nasitur in rupibus & faucibus,
 atq; pulchris. Alterum genus insanire facit: id alij Bryoron vocant, alij Perisson. Constat radice candida, & longa ad cu-
 bitum usq; caua. Dabitur eius radicis drachma pondus, si ut quis ludat, seq; pulcherrimum putet, placuerit: at si magis
 insanit, ut drachmis duabus opus est: sin autem nunquam insania solui malueris, tres dabis: & quatuor si interimen-
 dam sit. Habet folium cruce proximum, maius tamen: caulium longitudine ferè quatuor cubitorum: caput gethyi, sed
 minus atq; pilosius, nec fructus platani absimile constat. Solani singulis generibus vires reddidit Galenus lib. 8. simplicium
 medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit: Solanum esculentum, quod in hortis nascitur, notum est omnibus, utunturq;
 ad omnia ea, quae refrigerari, & adstringi possulant: potest enim hac duo ordine secundo. Caterorum verò non esculento-
 rum vnum quidem nuncupatur Halicacabum, fructum habens rufum, acino vna tum figura, tum magnitudine adsimi-
 lem: quo etiam ad coronas vtuntur. Alterum autem fruticosum & πικρόν, hoc est somnificum: & tertium est prater hac,
 quod μανικόν, id est, furiosum appellant. Halicacabum igitur in foliorum facultate hortensi solano simile est, fructum
 habens ciende vrinae iuoncum: proinde multis compositis facultatibus, quae ad iecur, ad vesicam, & renes accommo-
 dantur, miscetur. Solani verò somnifici cortex radice, si cum vino bibatur, somnum accersit drachma pondere sumptus.
 Sed & ad cetera quoq; papaueris succo persimilis est: nisi quod eousq; imbecillior est, ut ipse tertij habeatur ordinis refrige-
 rantium, cum hic in quarto sit constitutus. Huius Solani semeni vrinam ciendi vim habet. Verum si plus duodecim corym-
 bus hauseris, dementiam furiamve adsciscet. Porro quod reliquum est ex dictis Solanis ad medicationes, quae intrò in corpus
 adhibentur, inutile est. Nam si quatuor eius drachma sumpta fuerint, mortem inferent: si pauciores insaniam. Vna certè
 innoxie sumitur: ceterum nec ipsa vrile quid obtinet. Verum si foris corpori emplastri modo illinatur, vlcera maligna, &
 depascentia curat. Sed ad talia radicis cortex optimus est, desiccans secundo ordine iam completo, & tertio incipiente: re-
 frigerans verò secundo incipiente. Illud Solani genus, quod Graeci σπύγγος κριπταίοι, Latinis Solanum hortense nominatur:
 Arabibus Hamebathanaleb, Hameb alchaharib siue Hanab althaleb: Italis Solatro hortolano, seu Herba morella: Germa-
 nis Nachtschade: Hispanis Yerua mora: Gallis Morelle. Quod verò Solanum Graeci ἀλικακάβος καὶ φουσαλί: Latinè Ha-
 licacabus & Vesicaria appellatur: Arabicè Kekengi, Alkekengi siue Kekenegi: Italicè Alcachengi, Halicacabo: Germanicè
 Judentirschen: Hispanicè Bexiga de perro: Gallicè Beguenaudes. At Vesicaria siue Halicacabum repens, Italis Vilucchio
 forestiero. Quod deinde Graeci σπύγγος ὑπνωτικόν, Latinis Solanum somniferum dicitur: Italis Solatro sonnifero. Quod
 deniq; Graeci σπύγγος μανικόν, Latinè Solanum furiosum vocatur: Italicè Solatro furioso. Sic Solanum somniferum alte-
 rum: Italis Solatro sonnifero minore. Verum Solanum maius dicitur Italis Solatro maggiore, siue Herba bella donna.

Solani So-
 mnifici Ma-
 ticis, hist. ex
 Theophrast.



Solanorum
 vires ex Gal.

Nomina.

Solani viginti differentiae habentur, de quibus in historia Vniuersali. I. Solanum officinarum, C.B. Solanum
 horrense, Matth. Fuchf. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lacu. Lob. Cast. Lugd. Thal. Cam. Solanum,
 Brunf. Lon. Solatrum vulgare, Trag. Solanum nigrum & puniceum, Cordo in histo. Solanum quod c-
 dendo est, Cordo. in Diosc. Solanum fatium, Tab. Solanum hortense circae aut phaseoli folio, Lobelo
 in icon. Solatrum minus, Cæsalpino. Variat foliis magis minusq; laciniatis, acinis fuscis, puniceis, luteis.
 II. Solanum Vesicarium, C.B. Gef. hor. Solanum halicacabum, Matth. Trag. Lacu. Lob. Lugd. Saxi-
 40 fraga rubra, Brunf. Halicacabum vulgare, Fuchf. Turn. Halicacabus, Cordo in histo. Gef. hort. Castor.
 C. mer. Vesicaria, Cordo in histo. Gef. hort. Cæsal. Vesicaria vulgaris, Dodo. gal. Alkakengi, Lonicerò.
 III. Vesicaria repens, Matth. Vesicaria nigra, Trag. Vesicaria peregrina, Dodo. gal. Vesicaria altera,
 Castor. Halicacabum peregrinum, Fuchf. Gef. hort. Dodo. fol. Lonic. Lugdun. Taber. Camer. Dory-
 cnum, Cordo in Diosc. & histo. Gef. hort. Caput monachi, eidem. Solanum peregrinum, Lacu. Pisum
 Cordatum, Lob. Faba inuersa, Cæsalpino. IV. Solanum somniferum verticillatum, C. B. Solanum so-
 mniferum, Matth. Gef. hor. Lacu. Clus. hist. Hispa. Dod. fol. Cast. Cæf. Lug. Cam. Solanum somniferum
 Hyocyami lutei foliis Lobelo in iconibus. V. Solanum somniferum alterum, Matth. Gef. hort. Castor.
 Lugd. Solanum somniferum, Lonic. Solani lethalis aliud genus, Dod. folio. An non idem cum sequen-
 ti? VI. Solanum maius siue herba bella donna, Matth. Solanum hortense nigrum, Trag. Solanum so-
 50 mniferum, Fuch. Turn. Lob. Lug. Solanum lethale, Dod. fol. Solani genus syluaticum, Gef. hort. Solanum
 maius, Cam. Cast. Solanum syluestre, Thal. Solatrum maius, Cæsal. Mandragora morion, Fuch. in icon.
 Mandragoras Theophrasti, Dod. gal. Anguillaræ, Mandragoræ genus, Gef. hor. Mandragoræ tertia spe-
 cies, Cord. in Diosc. Morion, Lon. Bella donna, Clusio hist. Pannonica. VII. Solanum tuberosum escu-
 lentum, haectenus a nemine propositum, in Phytopinace ante sesquiannum exhibuimus, cuius hic figu-
 ram damus. Stirps est caule sesquicubitali, aliquando bicubitali, subrotundo, striato, aliquantum foliato,
 leuiter hirsuto, viridi, succi pleno, brachiato, nonnunquam in viri altitudinem exurgente & valdè ramo-
 so: foliis primis ad radicem prodeuntibus Barbaræ similibus, cæteris palmum longis, pallidè virentibus,
 subhirsutis, in sex, octo, plures & pauciores partes, ex vna costa dependentibus (quibus vnum semper nu-
 60 merum claudens additur) diuisis, ex rotunditate oblongis integris, quibus duo sextuplo minora inter-
 jiciuntur. Flores ramulorum summis insident, alii clausi, terni quaternive aperti, Malorum insano-
 rum forma magni, ex cœruleo purpurascens, calathi instar diuisi, quinquanguli, lineis subflauis
 per longum discurrentibus, ex quorum medio staminula communiter quatuor rufescens prodeunt.
 Hos excipiunt fructus rotundi, plures simul quasi ex racemo dependentes, longis pediculis vt in Solano
 vulgari donatis, quorum aliqui nucis magnitudine, alij auellanae, alij minores, immaturi atrovirentes,
 maturi atrorubentes, rarius striati: medulla intus albicans, seminibus paruis, planis, rotundis, Solani so-
 mniferi secundi forma fuscis, conferta. Radix est tuberosa, aliquando pugni magnitudine, aliquando
 palmum longa, aliquando minima succulenta, cute fusca aut atrorubente tecta, cuius medulla albica:
 ad caulis exortum prodeunt radices fibrosæ plures, oblongæ, albicantes, quæ per terram sparguntur, ex
 quibus primo vere alij caules exurgunt, aliaque tuberosæ radices adnascuntur: quemadmodum ele-
 gant

* VII. SOLANVM TUBEROSUM ESCULENTUM. *

* SOLANI TUBEROSI RADIX & FRUCTUS. *



ganter hac figura noua germina exprimuntur : antèquam notior esset, hyberno tempore radices eximebantur, ne putrescerent, vernaliq; tempore rursus terræ committebantur, ast nunc non item, siquidem tot se tuberosis propaget, ita vt ad vnam plantam hyberno tempore erutam vltra quadraginta tubera notarim, quamuis etiam ex ramis reclinatis terra tectis, Burgundi propagare soleant, quò plura tubera acquirant, cum apud ipsos, vt & Gallos, in cibos veniant: aliquando enim Tuberosum modo sub cineribus assant, & cum pipere (alias palato, meo enim fatuus videtur gustus, vix arrideret) comedunt: alij verò assata in taleolos dissecant, & ius pingue cum pipere affundunt, ad Venerem excitandam, semenq; augendum commendantes: alij & tabidis vtiles volunt. Italis Tartuffoli (quo nomine & tubera nominare solent) Germanis Grübling Baum, id est Tuberosum arbore dicitur. Solanum vocamus propter formam aliquam foliorum, cum Malis aureis: florum cum Malis inanis: fructuum, cum baccis Solani vulgaris: seminum, cum Solanis penè omnibus: deniq; propter totius plantæ odorem, quem cum Solanis communem habet. Vulgò Pappas Hispanorum, vel Indorum dicitur. Nobilissimus Iacobus Antonius Cortusus patricius Patauinus, Pycnocomen Dioscoridis censet, motus exemplari Dioscorideo manuscripto, cui similis figura adpicta, quod Clarissimus Pinellus nobilis Vincentinus, Patauii in sua Bibliotheca habet: & sane foliorum & radicum Pycnocomi Dioscoridis notæ, huic Solano conueniunt, floris verò & seminis non item. Ex Insula Verginea primum allata in Angliam, inde in Galliam, ali-

a Meū ἐπ' ἀγρῶν δ' ἐπιπύλας θυλάκια ὡς περ ἐρεβίνθου, ἐν οἷς ἀπὲρ μάλα στρογγύλα. i. in similitudine verò habet densos folliculos, velut ciceris, in quibus semina rotunda

Dorycnii consideratio.

Dorycnii vires ex Gal. Nomina.

Δορύκνιον

DORYCNIUM.

CAP. LXX.

Dorycnion Crateuas Halicacabon, aut Caleam vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis. Nasctur in petris non procul à mari, ramis cubito minoribus: folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flore candido, a siliquis in cacumine ceu ciceris, densis, rotundis: quinibus intus aut senis seminibus, exigui erui magnitudine, læuibus, firmis, versicoloribus, radix ad digiti crassitudinem, & cubiti longitudinem adolefcit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in amatoria expeti.

Dorycnium, Crateua testimonio, inter saxa in maritimis nascitur, folijs cum forma, tum etiam colore oliuæ proximis. Verùm mihi hæcenus non contigit ipsum inuenire, aut inuentum videre: quamuis in eo quoque inquirendo multum laboris insumpserim. Non defuerunt tamen amici qui plantas mihi miserunt, quas ij Dorycnium facebant. Verùm cum ea non satis mihi fecerint, hic illas appingere non libuit. Caterùm hallucinantur, meo quidem iudicio, qui putant Dorycnium esse eam Vesicariam, qua semine est rotundo, albo, macula cordis effigie insignito: cuius historiam inter Solani genera præcedenti capite retulimus. Siquidem hæc Dorycnio omnibus ferè notis repugnare deprehenditur. Dorycnium metainit Galenus lib. 6. simp. med. vbi de eius viribus ita scribit. Dorycnium temperamento papaueri simile est, & Mandragoræ, & ijs que sic refrigerandi vim habent: excellit aquea frigiditate admodum efficaci. Quamobrem modicum quidem soporem conciliat: largius verò sumptum interimit. Id δ' ορύκνιον Græci, quod Dorycnium quoq; Latini vocant.

M. J. P.

Mandragoram, aliqui Antimelum, alii Circæam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ fœmina existimatur, tridacias appellatus, angustioribus folijs ac minoribus quàm lactucæ, virosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit a forbis similia, pallida a Orib. w. c. i. ouis. odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inhæret benè magnis, binis, ternisve, inter se conuolatis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur nonnullis Morion vocitatur: huius folia magna, alba, lata, leuia vt betæ: mala quàm alterius duplo maiora, colore in erocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo ali-
 10 quantum opiliones soporantur: radix alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Succus fit e cortice recentis radicis taso, & prelis subiecto: qui insolatus, vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus lepromitur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspendunt. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defœcatum ius seruant, cyathoq; vno vtuntur in perungijs & doloribus, & ante sectiones vitionesque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit: verùm potu largiore vita ad-
 20 mitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque emollientibus, admisce-
 tur: semioboli pondere inditus, per se menses, & partus expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix ebur emollire fertur quæ semis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam quam effingere op-
 30 taueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera citantur, cum polenta illinuntur: duritias omnes, suppuraciones, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisve diebus sensim perfricentur: folia seruantur in murijs eisdem ad vsum. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle, aut oleo medetur: strumas atque tubercula cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum e cortice radicis, ad hunc modum. Ternæ minæ in vini dulcis me-
 40 tretam conijciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut amburi debent, vt antè dictum est: si-
 quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterno quodam pressi torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra fœmina-
 rum profluvia sistit. Scarificata, punctisq; multifariam aperta radice erumpens lacryma, cauo vase reci-
 50 pitur. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, sed non vbiq; , vt experientia docet, radices lac-
 teum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est, & cãdida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniove dra-
 60 chmæ pondere deuoratam, vsum rationis intercipere: obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur cum scindendi, vren-
 diue necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potum.

I. MANDRAGORA MAS & Fœmina.



Mandragora vtrumq; genus frequens nascitur in com-
 pluribus Italia locis, præsertim in Apulia Gargano
 monte, vnde radicem cortices, & poma herbarij quotannis
 ad nos conuehunt. Habentur & in viridarijs spectaculi gra-
 tia: etenim Neapoli, Roma, & Venetijs vtramq; Mandrago-
 ram in hortis & vasis fictilibus satam vidimus. Sed profectò
 vanum ac fabulosum est, quòd Mandragora radices ferant,
 quæ humanam effigiem representent, vt ignarum vulgus,
 & simplices muliercula certò credunt & affirmant. Quibus èt
 persuasum est, eas effodi haudquaquã posse, nisi cum magno
 vita periculo, cano qui effodiat, radicib. adalligato, & auribus
 pice obturatis, ne radice clamorem audiant effodientes, quòd
 audita voce periclitentur pereantq; fossores. Quippe radices
 illa, quæ humanam formam referunt, quas impostores ac
 nebulones quidam venales circumserunt, infœcundas mulie-
 res decepturi, factitia sunt ex harundinum, bryonia, alia-
 rumq; plantarum radicibus. Sculpunt enim in his adhuc vi-
 rentibus tam virorum, quam mulierum formas, infixis hor-
 dei, & milij granis, ijs in locis, vbi pilos exoriri volunt: deinde
 facta scrobe tamdiu tenui sabulo obruunt, quousq; grana illa
 radices emittant: id quod fiet viginti ad summum dierum
 spatio. Eruunt eas demum, & adnatas è granis radices acu-
 tissimo cultello scindunt, aptantq; ita vt capillos, barbam, &
 ceteros corporis pilos referant. Huius sanè rei certam fidem
 facere possum, quòd cum Roma essem, impostorem quendam
 circumforaneum lue Gallica correptum nobis curare contigit,
 qui præter alias innumeras imposturas, quibus circumuentis
 hominibus multam pecuniam extorquent, docuit & artem,
 qua factitias sibi comparabat Mandragoras, quarum com-
 plures mihi demonstrauit, asserens vnam tantum interdum
 diuitibus vendidisse quinq; & viginti, nonnunquam etiam
 triginta aureis. Quamobrem nos, qui omnium vtilitati &
 8 ff 3 salutè

Mandragoræ vtriusq; consideratio.

Mandragoræ humana forma, factitiæ. Quorundam impostura.

Anthropo-
morphon Py-
thagoræ.

Baaras admi-
rabilis facul-
tatis planta.

Mandragora
Morion vo-
cata.
Hermolai
turela.
Mala vulgò
Melongena.

Hermolai
Barbarus de-
fenditur.

Mal. infan.
descriptio.

Malorum in-
fanorū vires.

Mala aurea.

saluti quantum possumus consulimus, hac silentio haudquaquam inuoluenda duximus, vt palam omnibus fiat, quibus fallacis ac fraudibus maximo cum detrimento, & vite sepe discrimine, homines ab his impostoribus & rebus inuolutis decipiuntur. Qui vt antiquorum quoque autoritate suas imposturas adstruant, predicant Pythagoram vocasse Mandragoram Anthropomorphon, quod eam humanam formam reddere voluerit. Verum sciendum est, non sine ratione Mandragoram ita à Pythagora dictam fuisse: quippe quod in vniuersum omnes ferè Mandragore radices à medio adimum videntur, quæ proueniunt, adeo vt crura hominum modo habere videantur. Quapropter si eo effodiantur tempore, quo fructum gerunt, qui mali instar super folia ad terram procumbentia breui pediculo appensus, parum a radice distat, homines, cuius brachia desunt, effigiem quædam antenus representant. Hanc quidem rem nulli, quod sciam, vel pauci sunt, qui recte acciperint. Quin potius plerique huius sententia ignari adducti sunt, vt Pythagora, & Columella id maxime vitio verterint, vt qui eos de Mandragora fabulatos esse crediderint. Sed vt ad fabulam illam redeamus, que periculum denunciat ignarus radices Mandragore effodere volentibus, ijs cane qui effodiat, non adalligato, ea mihi quidem desumpta videtur à Flama Iosepho: qui etsi de alio radice genere scribat, ea tamen potuerunt facile ab impostoribus in Mandragora radices transferri. Quod vt omnes clariùs intelligant, hic Iosephi verba subiiciam, quæ lib. 7. cap. 25. de bello Iudæico ita scripta sunt: Vallis inquit, qua ciuitas à parte Septentrionali cingitur, quidam locus Baaras appellatur, vbi radix eodem nomine gignitur, quæ flamma quidem adsimilis est colore, circa vesperam verò veluti iubar fulgurans. Accedentibus eamque euellere cupientibus facilis non est, sed tamdiu refugit, nec prius manet, quam si quis vrinam muliebricam, vel menstruum sanguinem super eam fuderit. Quinetiam tum si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi forte illam ipsam radicem ferat de manu pendente. Capitur autem alio quoque modo sine periculo, qui talis est. Totam eam circumfodiunt, ita vt minimum ex radice terra sit conditum: deinde ab ea religant canem, illoque sequi eum à quo religatus est cupiente, radix quidem facile euellitur, canis verò continuo moritur, tanquam eius vice, à quo tollenda erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter vnam vim capi eam operæ pretium est. Nam qua vocatur demonia pessimorum hominum spiritus, viuis immersa eosque necantia, quibus subuentum non fuerit, hac citò, etiamsi tantummodo admoueatur egrotantibus, abigit: hæc tamen Iosephus. Ex cuius vtrique verbis omnibus perspicuum esse potest, quod hinc impostores occasionem acceperint, qua postea vanam ac falsam de Mandragora radicibus commenti sunt historiam. Ceterum tertium Mandragore genus, quod Dioscorides Morion appellari tradit, in opacis iuxta specus proueniens, qui mihi ostenderet in Italia hæcenus reperi neminem. Brasauolus itemque Fuchsius Hermolaium immerito, meo quidem iudicio, damnant, quod virum hunc in ea sententia fuisse velint, vt putauerit mala illa, quæ in subribus MELONGENA vulgò vocantur, nostris verò Ietrusis Petranianis, esse huius tertie Mandragore fructus. Sed quod hæc non fuerit certa ac firma Hermolai sententia, eius verba abundè testari poterunt, quæ in suis corollarijs de Morio ita scripta inuenio. De Morio, inquit, Mandragora nihil habeo quod addi possit ijs, quæ à Dioscoride notantur. Sed quoniam mala terrestria & canina Mandragora fructus appellantur, in mentem subeunt, quæ vulgò Melongena vocitamus, hoc est, vt ipse puto, mala insana: de quibus nihil veteribus scriptum fuisse iam desino mirari, quod multa huiusmodi reperio, sicut hæc multa quondam fuerunt, quæ modo vel ignorantur, vel certè non habentur. Mala ergo insana è frutice vulgari sunt, passim nascente, vt meloni & cucurbitæ: pari quoque cultu, folijs propè ficulneis, flore oblongo, specioso, candido. Manditur vulgò pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Hæc ad verbum Hermolai. Ex quibus equidem omnibus palam fieri arbitror, quod perperam tum Brasauolus, tum Fuchsius hæc in re Barbarum in simulauerint. Ceterum nos Mala insana è planta omnibus seruauimus, cui folia insunt stramonie, aut maioris Solanæ, haud absimilia, subaspera tamen, hirsuta & per ambitum sensim sinuata: caule vnico, semicubitali, ramofo, tereti, firmo, subpurpureo, & perinde ac folia hirsuto. Flores edis albicantes aut subpurpureos, in stella modum radiantes, è quibus oblongi oriuntur fructus cucumeris magnitudine, colore candido purpurascente, videntesque, & leuissimo cortice cortice, succosa albicanteque intus pulpa: semine numerofo, paruo, siliqua stri amulo. Radice nititur multifida, haud altè descendente: seritur in hortis & viridarijs, & vasis siccilibus primo statim appetente vere: flores aestate, & Autumnos fert fructum. Planta est frigoris, & algoris impatiens, quo fit vt in

II. MELONGENA.



Germania & Bohemia vbi Aestas frigidiuscula fuerit, raro fructum ad maturitatem perducit. In Italia, vbi Mala insana copiosa proueniunt, frequentè in cibum veniunt. Elixæ enim à cortice mundant, & in particulas dissecant, & deinde farina aspersa, in oleo aut butyro feruenti in patellis frigunt, & mensis apponunt, sale & pipere condientes: sunt enim gustui non ingrata. Sunt è nostratibus, qui Malus insanus vescantur ad venerem excitandam: quod fortè ideo præstant, quoniam nam flatu gignunt, concoctumque contumacia existunt. Verum cum frequentius manduntur (vt testis est Auicenna, bilis generant humores. Quinetiam pariunt viscerum obstructions, carcinomata, elephantiasin, capitis dolores, tristitiam, & iecinoris & lienis infarctus: vnde postea diuturna proueniunt febres, & habitus malus. Hinc itaque fit, vt Auerroem mirari subeat, quod libro 5. collectaneorum, mala insana commeudauerit suo quodam modo parata. Iam & aliud horum genus importari cepit, pressum, orbicularum malorum modo, melopeponum more sectum, colore primum viridi, deinde vbi maturitatem senserit, in quibusdam plantis aureum, in quibusdam verò rubeum visitur, ideoque vulgò appellatur Mala aurea. POMI d'oro, hoc est, mala aurea. Eduntur & hæc quemadmodum illa, sed nauseam & vomitum sepe mouent. Man-

III. SOLANVM POMIFERVM, fructu rotundo, molli. *

gora vires descripsit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, hu verbi: Mandragora vincentem habet facultatem refrigeratorem, adeo, vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen & caliditatis cuiusdam particeps est, & in pomis humiditatis: proinde seipsum conciliandi vim ea habent. Radicis cortex, cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed & deficiat: reliquum quod intus est, imbecillum existit. Hac planta qua Graeci μανδραγόρας, Latinis item Mandragoras appellatur: Arabibus, Iabora, seu Tabrohach: Italis Mandragora: Germanis Alraun: Hispanis Mandracola: Galis Mandragore, & Mandegloyre. At Melogena, seu Mala insana, Italis Petr. miciani seu Melanzane.

Mandragore vires ex Gal.

Nomina

Mandragora duplex est, alia flore minore & quidem mas & femina: alia maiore caeruleo, cuius figuram in historia nostra dabimus. I. Mandragora fructu rotundo mas & candida, quae verò fructu Pyri, femina & nigra herbariis dicitur. II. Solanum pomiferum fructu oblongo, C. B. Melongena, Matth. Cordo. in hist. Camer. Castor. Lugd. Melangena vel Melanzana, Lobel. Mala insana, Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Latu. Lonic. Tabernæ. Pomum amoris aliquibus, Gef. hor. Solanum pomiferum, eadem. Solanum hortense & Pyra insana, Cæsalpino. Variat floris colore, fructus item colore & figuram. III. Solanum pomiferum fructu rotundo molli, C. B. Poma amoris, Dod. gal. Lob. Lugd. Cam. in Matth. Taber. Pomum aureum, Gef. hor. Aurea mala, Dod. fol. Cast. Mala insana, Cæsalpino. Solani pomiferi genus aliud, Gef. hor. Lycopersicum Galeni & Poma Peruviana, Anguil. aliis Glaucium Dioscoridis: fructus aureus, ruber, rarius albus.



Solanum pomiferum
Ακόνιτον.

ACONITVM.

CAP. LXXII.

Aconitum aliqui pardalianches, alii cammoron, alii thelyphonon, alii myocctonon, alii theriophonon † Meum vocant. Folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora, & † subhirsuta: caulem palmo altum: radix scorpionis caudam æmulat, & alabastrum modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpionis adnota radice, stupentque: qui rursus ellebori contactu, excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adicitur. Enecat pantheras, feras, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.



Ακόνιτον ἕτερον.

ACONITVM ALTERVM.

CAP. LXXIII.


Est & alterum Aconitum, quod aliqui cynoctonon, alii lycocctonon appellant. Huius genera sunt tria: vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suum vertere medicis: quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliolem: tamen in filiquis oblongis recondit: radices in modum squillæ marinæ citrorum nigrescunt. Quibus ad venationem Luporum vtuntur: insertæ siquidem crudis carnibus, & deuoratæ lupos enecant.

Duo Dioscoridi produuntur Aconiti genera, quæquam postremum triplici distinguit differentia. Primum, quod Pardos enecat, Pardalianchen: alterum verò, quod canes, luposque conficiat, Cynoctonon, Lycocctononque, vocari ait. Hoc (vt diximus) in tria genera distribuit: veruntamen postremum tantum describens, duorum priorum historiam, & vires silentio præterijt. Quo fit, vt Hermolai, & Marcelli sententiam probandam putem: qui non temerè quidem suspicantur, in altero capite plura desiderari, quibus & priorum historia, & quoniam pacto tum medici, tum venatores huius anti-
quitus vtentur, palam fieret. Huius diminuta lectio illud non parum suspicionem auget, quòd in tertio genere, quod Ponticum appellauit, nihil sit ab ipso Dioscoride prætermisum: ex quo quis fortè conijcere potest, in cæteris quoque, eam quicquam non prætermisisse. Tertium hoc genus passim in Italia omnibus ferè montibus nascitur, folijs qua platani quadantenus æmulantur, magis tamen per ambitum serratis, albis quibusdam maculis resperis: caule filicis, bicubitali: folijs sublateis, acutis galericulis facie similibus: è quibus filiquæ prodeunt, semen continentes: radice multiplici, ac nigra. Habetur & aliud genus huiusmodi ferè folijs, & caule, floribus tamen melius, ranunculo non dissimilibus, longè tamen maioribus, adeo vt syluestres rosas hic æquet amplitudine. Quæquam Gesnerus in suo magno libro de animalibus inscripto (in quem is mihi quidem videtur, vt multa vera docet, ita non pauca etiam falsa ac vana ineptè concessisse) negat inueniri Aconitum, cuius flores lutei sint, atque rosas æmulantur: vt qui sibi fortasse persuaserit
Dioscoridis lecto diminuta.
Dioscoridis locus suspèctus.
Gesnerus deceptus reprehenditur.

I. ACONITVM PARDAL.
Diosc.Luparia.
Vulparia.Aconiti
pardal.Medici clari
qui Aconitū
pardalīches
apud Matthi-
olū viderunt.II. ACONITVM PARDAL.
Plinii.Aconiti par-
dalianches
dehneatio.

mani, Borussi, Vngari, Galli & Hispani, & quotquot ferè sequuntur Casaream aulam, Regum, & principum vatorum ac multi quoq; peregrini, rei plantaria, & bonarum artium studiosi, qui hanc per Bohemiam iter facientes, me (qua eorum est humanitas) inuisere solent. Quibus omnibus dicere soleo. Palpate, & videre, quoniam Matthiolus fabulas non describit. Hanc plantam ego thesauri loco iam mihi asseruo aduersus vitiligatorum calumnias, & omnibus, & singulis demonstrandam, tam amicis, quam inimicis: his quidem, vt inspecta veritate ad mentem redeant: illis, vt de Matthioli integritate vbiq; testari possint. Est itaq; ACONITVM PARDALIANCHES, cuius hic primo loco imaginem expressimus, planta in nudis, & arduis montium summitatibus cautibusq; proueniens, vmbrosis tantum locis: solis cuiusvis proximus, sed maioribus, ad summum quatuor usq; subhirsutis: caulem edit, quem ego caducum vidi, palmatam, pariter hirsutum, quemadmodū & foliorū pediculos. Florem videre non licuit, verum (si me mea non fallit opinio) Dorenci amulum illum esse existimo [Chrysanthemi similibus, sed minoribus.] Radicem edit alabastrum modo splendentem, dum recens est, digitali crassitudine, ex lata crigine in acutum desinentem, incuruam, geniculatam, & tota facie scorpionum caudam emulantem, vt ex hac imagine quam ex viuapianta pinxit Vvolfgangus Meierpeck, è Friburga Misnia oriundum

omnia natura opera se nouisse & vidisse. Attamen in hoc parte eius dixerim, decipitur: siquidē plures extant montes, quicū hoc Aconiti genere scateant, nos hic vera scripsisse. Genitum contra veritati refragari, posteris omnibus testamur relinquent. Sunt qui hoc Aconitum ab effectu Lupariam vocent: at rura Tridentina, in quorum montibus copiose prouenit, ipsum passim vulpariam nominant, vtpote quod pater lupos, vulpes etiam interimat. Quin & canes occidit, & feles & mures, & omnia denique animalia, que suo exortu tanquam ceca producantur. Primum genus thelyphonon appellatum, quo venatores pantheras, & pardos interficiunt, vidimus legimusq; nos tantum in Ananiensibus montibus, Tridentino agro, locis ferè inaccessis, & praeceptis. Plantae admodum rara, & à paucis alijs fortasse visa, quam ab alijs quibus à me eius videndi copia facta est. Nam plurimi sunt rei plantaria studiosi, & clarissimi viri, qui eam viderunt, & palpauerunt, quib; hoc perpetuo testabuntur: e quorum numero sunt Caesaris Ferdinandi, & Romanorum Regis Maximiliani Medici omnes, nempe vir Clarissimus Iulius Alexandrinus Tridentinus, Stephanus Laureus Belga, Doctus Ribera Hispanus, Ioannes Crato Vratislaviensis, Franciscus Parthinus Roboretanus, & Ioannes Odoricus Melchiorus Tridentinus, & alij quam plures Medicina Doctores rei herbariae haud ignari, non Itali solum, sed Bohemi, Poloni, Ga-

III. ACONITVM PARD.
Theophr.

quod si certior fieri poterit. Refert enim haec omnibus suis notis adamussim Dioscoridis Aconitum pardalianches. Est & Aconitum huiusmodi genus, radice fere simili, sed superiori parte vtrinque brachiata, alba, splendente, geniculata, & in parte Scorpionum caudam referente, minime tamen incurva: folijs praescripto similibus, sed paulo rotundioribus, & minus hirsutis, caule & floribus Doronico similibus. Nascitur in altissimis montium praeruptis, & fere inaccessibilibus locis. Partes sunt ei qualitates & vires cum praescripto. Hoc genus PLINII ACONITUM esse censeo. Quippe, is marino Camhiato sui Aconiti radicem similem reddidit, cuius effigiem hac haud parum imitatur. Huic tertium accedit, quod omnino Theophrastus: THELIPHONVM facio. Siquidem hoc non solum habet radicem scorpionem integrum praesef-

Plinii aconitum pardalianches
Thelyphon
Theophrasti.

IV. ACONITUM PARDALIAN.

minus, quod falso Doronicum vocant.

V. ACONITUM IL



rentem, sed folia Cyclamini haud dissimilia, radices fibras geniculatas, graninis modo, & eiusdem quoque more sese propagantes, & alios quoque scorpiones effigiantes. e quibus postea & folia & germina erumpunt. At caules & flores nihil fere ab altero differre videntur, sunt enim aurei omnes, chrysanthemii modo. Nascitur in altissimis montibus, praescriptis locis. Ea omnia potest, quae de ceteris scripta sunt. Duo haec Aconiti genera misit ad me ex suo viridario vir insignis Iacobus Antonius Cortusius Patritius Patavinus, acerrimus plantarum indagator, vna cum Doronicorum vulgari plantae illeg, me primum admonuit, Doronicum inter Aconita esse recensendum, quod certo sciret, factis a se pluries periculo, extinguis facile canes, qui horum radices deuorant. Vix ego id credere poteram, sed interim datus cuidam meo canu vulgari Doronicorum quaternis drachmis, crudis carnibus occultatis, is post septimam horam obiit. Sed id mirum profecto mihi fuit, quod ipsemet canis toto illo tempore, quo supercruixit, alacer, latus, ac hilarus se semper habuit, nihilque symptomatum passus est: immo, quod maius dici potest, quadam cum domestica canicula pluries Venerem exercebat, & canantibus nobis audissime comedit. Quo factum est, vt ego profecto crederem, me hoc facto periculo frustratum iri. Atqui paulo post praeter omnium nostrum sententiam, & repente admodum, ac si morbo comitiali percussus esset, totus in terram cecidit, vbi horrendo spasmu correptus, spumanti ore paulo post convulsus interijt. CORTUSIO itaque nobilissimo, hoc amplissimum munus futura posteritas acceptum referat, ipsumque nouum vita nostra custodem appellat. Huius Nympha violas, & lilia fundant: hunc suauissimis vestiant rosas, & baccharum cingant. Ac interim desinant Medici, quibus hominum vita cordi est, exitioso & pernecabili Doronico vti. Expellant & illum Pharmacopaei sui e Myropolijs, & interdiciant pij, & optimi principes, qui Rempublicam gubernant, ne posthac venenum hoc praesentissimum vaneat. O quam misera fuit eorum conditio, qui superiori aetate nos praecesserunt, quorum fere nemo simplicia medicamenta recte nouit, quique saepe venenosus auxilijs vsi sunt, vbi saluberrimis antidotis vti putarant, vt quam pluribus in locis horum nostrorum commentariorum docuimus. Erit itaque Doronicum posthac Demonicum, non Doronicum appellandum, quod Diabolus in huius locum thelyphoni genuit hoc intruferit. Hinc autem fit, vt ego errorem quoque meum iam agnoscam, quod noluerim Maranta concedere, Doronicum vulgare vsus esse Aconitum pardalianchen, cum viderem id innocue sumi in medicamentis ab hominibus: verum non ob id fieri puto, quod canibus sit venenum, homini vero salubre medicamentum, vt quidam mihi respondent, quibus cum de huiusmodi Doronici extrahi facultate sum locutus, sed quod non tanta quantitas propinetur a Medicis quae homines necare valeat, aut quod raro exhiberi soleat absque alijs antidotis, quae venenosam vim dissipant, & extinguunt. Qui enim aliter sibi persuadet, rem ita esse intelliget, vbi a nobilissimo Cortusio impetrare poterunt, vt is quosdam Gesneri literas sibi legendas concedat: siquidem is apertissime fatetur, cum hac fabulosa putaret, et Doronicos vorasset in se ipso facto periculo, incidisset profecto in magnum vitae discrimen, nisi sudatorijs Lacocicis, et antidotis nonnullis sibi opem tulisset. Na quae canes occidunt et lupos, facile adducor

Doroniceum vulgare de genere aconitorum.
Historia.



VIII. ACONITVM IIII.



Aconiti spe-
cies sex.

Thelyphoni
historia ex
Theophr.

habet cyclamino simile: radicem, ut dictum est, scorpionis effigie. Nascitur graminis modo, & geniculis constat: loca amat
umbrosa. Quod si vera sint, quae de scorpione narrantur, iam & reliqua eiusmodi haud quaquam incredibilia, & fatu-
sa diu debent. Hæc Theophrastus de thelyphono, qui alterius quoq; Aconiti mentionem fecit cap. 16. eiusdem voluminis,
sic inquit: Aconitum nascitur in Creta, atq; Zazintho, sed plurimum, optimumq; in Heraclia Ponti. Constat id folio
intrat.



ut credam, eadem homines quoq; necare, vel (si non necem)
plurimum ledere, ut de vomica nuce ego fateri possum: quæ-
pe qui sciam hac tantum mulierem iam senescentem esse ex-
tinctam, quæ caseum è quo sibi cibum parauerat, super in-
strumento ferreo ad hoc parato attriuerat, super quo eius sibi
superioribus diebus nuces vomicas aliquot in particula
confecerat, quibusdam necandis canibus, qui cum nocte ob-
latrabant. At Aconitum Pardalanches minus, quod officii-
nis falso Doronicum, folia, caules & flores gerit, cæteri-
rum generum similes, radicem quæ graminis modo serpi, &
quæ hinc inde numerosa edit tubercula scorpionum effigem
pra se ferentia, candida, tenera ac dulcia. Nascitur & hoc in
altissimis montibus, ubi sylvestres caprea inhabitant. Cæteri-
sunt nobis sex alia Aconiti species, de quibus qui meminere,
habeo neminem. Harum imagines, quas hic appingi cur-
uimus, misit ad me Hieronymus Donzellinus medicus in-
gnis, qui tamen Dominico Monteforo Veronensi Medico
praclarissimo has acceptas referebat, atq; etiam Francisco
Calceolario qui primus eas in Monte Baldo in Veronensi
agro adinuenit. Horum historias hic describere opere pretium
non duximus, quod appictæ hic imagines, eas ad viuam re-
presentent. De floribus tantum dicam, qui in quarto, & no-
no aurei sunt, in reliquis vero purpurei. Primi generis Aconi-
ti, quod thelyphonum vocant, meminere Theophrastus libro
9. cap. 19. de plantarum historia, ubi ita scribit: Thelypho-
num, quod alij scorpionem appellant, quia radicem scorpio-
ni similem habet, admotum, scorpionem occidere tradunt:
& cum reuiuiscere posse, si elleboro candido linatur. Eneat
idem & oues, & boues, & iumenta, & ad summum omnes
quadrupes eodem die, si genitibus folium, vel radice
imponatur. Proficit potum contra scorpionum ictum. Felium

IX. ACONITVM V.

X. ACONITVM VI.



XI. ACONITVM VII.

A. veratrum L. Sp. hist.





intudaceo, radice tamen specie, tum colore nuci proxima: vim illum mortiferam in hac esse, folium, & fructum nihil nocere affirmat. Fructus herbae est non humilis materia: herba ea brevis est, & nihil superuacui habens, sed humento similis: semen non spicuum. Nasitur ubique, & non in Aconis solum, a quibus habet appellationem, us autem vicius est Perianthiorum. Amat autem loca potissimum saxosa. Pascitur eo neq; pecus, neq; vllum animal. Preparari ad afficiendum modo quodam enarrant, nosse quenquam: quamobrem Medicos, quoniam componere nesciant, pro putrefactorio vti. Hec ille de secundo Aconiti genere, quod duorum alterum Dioscoridi esse potest, & illud sortasse, quod (vt ipse inquit) in vsum suum vertere medici. Sed & de tertio Aconiti genere dixi cruisse Theophrastum equidem crediderim, cum eodem loco paulo post haec verba subdit: Aliud quoq; venenum vim diurnariam enecandi sortiens compertum affirmant: esse namque radiculam quandam, quae eodem die possit occidere: folium hanc habere Ellebori, notamq; omnibus esse: haecenus Theophrastus. In quo nihil moueor, quod huic Aconito, quod tertium suspicor, veratri folia tribuerit: nam & Dioscorides nigra veratro folia platani reddidit, quemadmodum etiam tertio Aconitorum generi. Scripsit de aconito pardalianche diligentissime etiam Plinius libro vigesimo septimo, capite secundo, sic inquit: Sed antiquorum curam diligentiamq; quis possit satis venerari, cum constet omnium venenorum ocysimum esse Aconitum, & tactus quoq; genitalibus feminei sexus animalium eodem die inferre mortem? Hoc fuit venenum, quo interemptas dormientes a Calphurno Bestia uxores M. Caecilius accusator obsecit. Hinc illa atrox peroratio, eius in digito mortuas. Fabula narrauerit e spumis Cerberianis, extrahente ab inferis Hercule, ideoque apud He-

Aconiti pardalianches consideratio ex Plinio.

racleam Ponticam, vbi monstratur is ad inferos aditus, gigni. Hoc quoque tamen in vsus humana salutis vertere, scorpionum ictibus aduersari, experiendo datum in vincto calido. Ea est natura, vt hominem occidat, nisi muenerit, quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur velut pari intus inuento. Sola hac pugna est, qua venenum in visceribus reperit: mirumque exitiale per se auro cum sint, duo venena in homine commortuntur, vt homo



XII. ACONITVM VIII.

XIII. ACONITVM IX.

XIV. PSEUDOACONITVM
pardalianches.Pseudoaco-
nitum parda-
lianches.

Fuch. error. errore h̄ versetur in Aconiti huiusce censura, ipsimet iam agnoscere potuerunt, cum tot illius imagines hic a nobis editas pacatis oculis inspexerint. Nec in minori versari errore Fuchsum deprehendimus: quippe qui in suis de plantarum historia Commentarijs, Aconitum pardalianchen eam plantam esse censet, quam herbariorum vulgus HERBAM PARIS, appellat:

vt homo superfit. Immo verò etiam ferarum remedia anti-
qui prodiderunt, demonstrando quomodo venenata quoque
ipsa sanarentur. Torpescunt scorpiones Aconiti tactu, stupent
q̄, pallentes, & vinci se consentunt. Auxiliatur eis elleborum
album tactu resolvente, ceditq̄, Aconitum duobus malis, suo
& omnium. Quod si quis illa fortè ab homine excogitauerit
potuisse credit, ingratis deorum munera intelligit. Tangunt
carnes Aconito, necantq̄, gustatu pantheras, nisi hoc fera,
repletur as illos situs. Ob id quidam pardalianches appellau-
re. At illas statim liberari morte excrementorum hominu
gustatu, demonstratum. Quod certè casu repertum quis du-
bitet? & quoties fiat etiam nunc, vt nouum nasci, quoniam
ferus ratio, & vsus inter se tradi non possit. Folia habet Cy-
clamini aut cucumeris, non plura quatuor, ab radice lenius
hirsuta. Radicem modicam Cammaro similem marino. Qua-
re quidam Cammaron appellauere, alij Thelyphonon, ex qua
diximus causa. Radix incuruatur paulum scorpionum modo,
quare & scorpion aliqui appellauere: nec desuere, qui My-
etnon appellare vellent, quoniam procul & è languino od-
re mures necat. Nascitur in nudis cauitibus, quas Aconis no-
minant, & ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iuxta, ne pul-
uere quidem nutriente. Alij quoniam vis eadem in morte ef-
fet, qua cotis ad ferri aciem deterendam, statimq̄, admota
velociter sentiretur. Hac de Aconito pardalianche Plinius.
Hallucinantur itaq̄, qui putant plantam quandam, hinc
tantum folijs, ipsiq̄, rotundis, firmis, & per ambitum cramo-
tis, à medio caule exortis, floribus melius in caulium sum-
mitatibus, & radicibus asphodeli modo numerosis, sed quam
longè minoribus, gustu acerrimis ac lethiferis refertā, quam
nos hic etiam appingi curauimus aliorum quoq̄, iudicio ex-
pendendā, Aconitum esse Pardalianchen, quam nos Pseudo-
aconitum Pardalianchen appellamus. Siquidem quanto in



appellat: siquidem hac vno tantum constat caule, rotundo, duorum palmorum altitudine: è cuius medio quatuor erum-
 punt folia, eodem ambitu, crucis instar patentia, sanguinea virga similima: alia præterea quatuor eodem modo prodeunt,
 prope caulis summitatem, sed hæc minima sunt, acuta & longiuscula: in quorum medio purpureus, vinosusq; extat glo-
 bulus vnicus, acino vna similis, in quo semen concluditur album, minutum, copiosumq; halicacabi modo. Radix, qua illi
 subest tenuis, in capillares serè particulas dissecta, pallescit, nulla scorpionis cauda effigie, nec alabastris modo aliqua ex
 parte nitet, vt primum Aconiti genus à Dioscoride representatur: cuius folia (vt etiam Plinius lib. 27. cap. 4. est author)
 40 præter id quod cyclamino, aut cucumeri similia sunt, nunquam, quod viderim, in caulis medio suam habent originem,
 sed statim ab ipsa radice exeunt hirsuta, humiliq; recumbentia. Semen huic nullum, quod sciam, à rei herbaria scriptori-
 bus redditur. Sed ex herba Paris acino semen colligitur, cui non modo nulla deleteria vis inest, sed etiam contra veneficia
 præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, inquit ille qui pandectas auctas edidit, quorum aliqui mor-
 borum diuturnitate, alij vero veneficis semistulti facti erant, hoc tantum Paris herbe semine ad vigesimum vsque diem
 in puluerem hausto drachma pondere, pristina sanitati omnino restitutos esse: id quod ego quoq; fateri possum. Bacca
 antidotis admiscetur, qua contra deleteria pharmana parantur. Herba recens tusa & illita, genitalium tumores & in-
 flammationes sanat, ac pariter oculorū phlegmōas: paronychys quoq; medetur. Herba cū baccis refrigerat & siccatur. Prouenit
 in montibus, in conuallibus, & sicutetis. Porro idem Fuchsius in suis paradoxis nil aliud Aconitum esse putat Mauritania,
 & præsertim Auicenna, quam Napellum. Qua in re rursus, meo quidem iudicio, fallitur: quippe tamen non negauerim
 50 Napellū esse è genere Aconitorum, quorum numerosa sunt species, vt ex appictis hic imaginibus videri potest, reperio tamen
 Auicennam de vtroq; Aconiti genere scripsisse, & alterū appellasse strangulorē Adib, alterū verò strangulorē le pardi,
 qua nomina eadē sunt, qua apud Græcos lycostonos, et pardaliāches: atq; eundē prius magna differētia speciatim & Napello
 egisse constat. Caterum cum nobis de Napello nunc sermo sit, eius etiā hic historiam, & vires attextere voluimus. Est itaque
 NAPELLVS planta folijs quinis ex vnus pediculi apice prodeuntibus, pentaphylli modo, vsq; anteriori parte diuisis, &
 auersa subalbicantibus: caulem edit bicubitalem, subrubentem, fragilem, striatumq; in cuius fastigio flores exeunt spicati,
 colore purpureo, homini sylvestris modo, qui anteaquam dehiscat mortui serè hominis caluariam representant: at iam pa-
 tet facti lami flores emulantur. Hos sequuntur corniculata siliquula, sursum spectantes, terna ex vnus tantum pediculo exo-
 rientes, in quibus semen concluditur nigrum, ac minutum. Radice nititur turbinata, vulgaris rapunculi modo, subni-
 gricanteq; a qua numerosa oriuntur fibrae adeo inuicem contexta, vt retis speciem referant. Nascitur in montibus, & in
 60 conuallibus. Excalfacit & siccatur ordine quarto ipsi Auicenna. Tota planta pernecabilis admodum est. Sed radix ceteris
 partibus atrocior, adeo vt manu aliquandiu retenta, quousq; concalescat, tenentem perimat. Quineriam pastores neca-
 tos scimus, qui assandis auiculis, Napelli caule pro veru temerè vsi sunt. Napelli vis in necandis hominibus adeo immanis,
 seuq; existit, vt nullus serè antidotis occurrere possit, nisi quam primum, & statim succurratur, quod tamen Aconitum su-
 mentibus non euenit. Huius immanitatem vidimus nos Roma anno à Christo nato 1524. mense Nouembri in Capito-
 lio, Clementis 7. Pont. max. anno primo. Nam cum decreuisset experiri olei cuiusdam præstantissimi vires, quod Grego-
 rius Carauita Bononiensis Chirargus tunc præceptor meus, contra deleteria medicamenta, & venenosorum animalium
 quorumcunque morsus parauerat, iussit Pontifex venenum dari duobus latronibus, quos leges damnauerant, quo su-
 orum facinorum pœnas luerent, laqueo vitam finire, vt in huius olei huius experimentum fieret. Horum alterum, qui pluri-
 mum Napelli sumpserat, dulciarijs panibus commistum, pontificij medici statim oleo inungendum præbent, qui post terti-
 um di-

Herba Paris delineatio.

Napelli delineatio.

Vires.

Historia.

XVII. NAPELLVS.

Historia altera.



Historia tertia.

Aucenna de-
fenditur à Fu-
chsi calūnia.

retur, nullo sanè mentis incommodo, & viuidis me intueretur oculis, cum tamen frontem inspicere frigidò iudore madentem, & arterias iam serè obdormiscere, antidotum propinari iubeo, quo epoto illico inuersis oculis, atq; ore in latum distracto, capiteq; in scapulas rigente, ingenti admodum animi deliquio correptus est. Itaq; totus collapsus decidisset in terram, nisi à carceris custode retentus esset. Iubeo interim cum vino irrorari faciem, & anterioribus capillis excuti. Quo ingenio statim reuixit, emissis interim per sedem excrementis. Posthac iubeo illum iacere super straminibus ibi ad hoc paratis, vt quid inde sequeretur, animaduertentem. Ille verò de frigore conquerens, paulo post putrida, biliosa, & liuida quædam vomitione reiecit, qua se non parum adiutum fatebatur. Interim se ad sinistrum conuertit latus, ac si dormire vellet. Prohibeo ne dormiat. Dum hac aguntur, nullo alio exorto symptomate, tandem obmutuit, & obijt simal, liuida facie ac si laqueo suspensus. Caterum longè aliter se habuerunt symptomata in altero pariter ad furcam damnato, cui data fuit eiusdem Napelli drachma, vt de lapide, quem Bezoar appellant Arabes, periculum fieret, an huiusmodi veneni immanitatem expugnare posset. Agebat latro annum circiter 27. qui epoto lethali pharmaco, piperis omnino saporem illi inesse dicebat. Hora subinde peracta, cum vomere cepisset, lapidis illius grana septem ex albo meraco data sunt. Vomitus ab ebibito antidoto, varijs, & acerbissimis symptomatibus exagitatissus est. Euomit enim frequenter biliosa, porraceo colore. Quendam quoque ueluti globum, circa umbilicum se sentire dicebat, qui inde superna petens, in supremam & postremam capitis partem frigidam auram quandam diffundebat. Accessit paulò post stupor quidam paralyti haud absimilis, qui sinistri lateris brachium, & crus occupauit, adeò vt vix summam manum mouere potuerit, motu iam in ceteris partibus extincto. Interim non multo post tempore hac morbi vis sinistra corporis parte incolumi relicta, in dextram repente se contulit, eandemq; simili modo occupauit. Vagum profectò symptoma hoc fuit, nam cum dextrum brachium atollere potuit, sinistram non potuit, & e contra. Tandem vtrumque eleuauit. Aiebat quoq; vniuersas corporis venas frigescere. Non defuerunt vertigines, quas sequuta sunt cerebri commotiones adeò feruentes, vt aqua in caldario bullienti similes esse diceret. Accepit quoq; oris, & oculorum conuulsio, atque acutissimus mandibularum dolor. Quare saepe manibus affectas illas partes perstragebat, veritus ne exciderent. Forissecus turgentes oculi, liuida facies & nigra labia cernebantur, quinetiam ventris tumor videri poterat, perinde ac hominis aqua intercute laborantis. Varia admodum extitit arteriarum pulsatio, & varia quoq; mentis perturbatio, pro symptomatibus recurrentium acerbitate. Nam iam prorsus de vita desperare, mox in spem se erigere videbatur, modò delirans, nunc ploranti, nunc cantanti similis. Aquam frigidam dari sibi potandam antepere appetebat, vt ea subito se liberatum nisi consideret. Toto hoc tempore se ter exaccatissimè, in mortis agone colluctatum affirmabat, lingua tamen perpetuò constitit, nullo vnquam symptomate affecta, siquidem nunquam intumuit, nunquam is balbutire auditus est. Caterum septima post ebibitum Napellum hora, veneni talem vi ab Antidoto extincta, omnia euanescere symptomata: arteria ad rectam rediere normam, naturalis reuixit color, & breui quoq; virum constitit robur. Atque in hunc modum miser ille, magno conflictu, atque certamine periculum superauit. Id quod manifestò fatetur, de Napelli immanitate Aucennam non scripsisse fabulas, quem tamen in seclis Fuchsi loco superius citato, Leoniceni testimonio nixus, in eum acerrimè inuehitur, nec sanè eum, vt nostri recentiores primò scripserit (vt ipse inquit) Napellam perniciosum esse venenum: mox subdidit, quòd linitum, & bibitum delectat albae cutanei morbi genus. Qua in re non possum non admirari Fuchsum, virum alioqui ingenio & eruditione clarum, quem etiam hoc nomine plurimum diligo, quòd in tam celebrem & antiquum scriptorem paulò acrius & intrepidius egredi-

um diem sapius oleo perunctus euasit incolumi: quæquam non sine magna formidabilium symptomatum accensione. Alterum vero, cui longè minus venenati parati exhibuerat, oleo inungi vetant, vt assumpti veneni effectum, scerrimè cernerent. Id quod illis rei exitus facile comprobauit, quòd quidem paucis post horis obijt infelix, q̄ omnibus inmodis, cruciatibus, & symptomatibus correptus, quæ de epoto Napello prouenire scribit Aucenna. Vidimus ad eam Praga Metropoli Regni Bohemia, anno M. D. LII. Mense decembri in Latrone quodam suspendio damnato, cui Napelli radix à carnifice data est drachma pondere rhodosacharo excepta, Casareis Medicis presentibus, vt antidoti famosi cuiusdam vires explorarentur, an contra Napellum id prestaret, quod antea in altero damnato, qui Arjau drachmas duas ebibit, efficacissimè prestiterat. Lubens itaq; sciauit ille lethiferum Napelli pharmacum, vitæ qui nescium sibi conducibilis censebat, veneno in carcere uocari, quàm laqueo publicè in patibulo suspendi, sed quòd etiam speraret se à nobis seruari posse. Interim transacta iam septima altera hora, cum nihil symptomatis appareret, vt etiam omnes, ne fortasse in Bohemia aliqda regionis causa, Napellus venenosus nasceretur, aut quòd ipsa radix sacro deserta, ob editos iam caules, flores & semen, nihil operaretur. Quo factum est, vt alterum illi pharmacum propinatum sit, ex eiusdem Napelli caule, folijs, floribus, & semine paratum. At ibidem duabus adhuc horis nobis omnibus permancibus, misero illi mali prorsus nihil accessit. Reducitur ille ad carceres, abeunt ceteri, & mihi soli totum committitur negotium. Hora transacta carceris custos me admonet, illum iam egrotare. Ego statim adsum, audioq; ipsum de vniuersi corporis lassitudine vlcerosa, imbecillitate magna, & crasso grauedine conqueri: tunc itaq; quamuis audacter sum loque-

Hominum enim eruditorum partes esse semper existimaui, et si ego eas usquequaque seruare non potuerim, ut non vanis contentionibus, neque conuicijs aliorum scripta refellant, sed rationibus, quibus, probatissimus, praesertim cum eos accusant, qui multum ante seculum vita decesserunt, nec amplius a calumnijs se tueri possunt. Qui praeterea considerare debent, an in quo aliquem reprehendunt, in eo proprius sit author lapsus, aut interpretis, aut librarij, antequam vllum iurgys potius, quam rationibus inuadant. Quippe relictus tam Mauritanorum, quam Graecorum seclis, quarum vni magis quam alteri adhibere nolo, mihi quidem non videtur existimandum, quod Auicenna vir sane singulari doctrina, & admirabili ingenio ab omnibus recentioribus nostris maxime commendatus, eodem in loco sibi omnino contraria scripserit in veneno tam sauo, cui exitiales formidandisq; vires tribuit. Cuius rei firmissimum praebet indiciu scriptura Auicenna ab Andrea Bellunensi castigata, in qua nusquam legitur Napellum bibitum albaras delere, sed quod hoc efficit quaedam eius confectio in potu sumpta. Verba enim Auicenna secundum castigationem Bellunensis ita sonant. Napellus delet albaras linitum, sicut & confectio eius dicta alberzacali in potu sumpta. Ex quibus verbis plura mihi sese offerunt conicienda, ut tuear Auicennam, aut quod confectio illa tam exiguam Napelli partem excipiat, aut ea quam recipit, adeo antidoti correcti sit, ut non solum necem non inferre possit, sed ne tantillum quidem obesse. Aut quod Napellus in illam additus, is forte est, quem Auicenna appellat Napellum Moyse, aliqui vero Antoram: quandoquidem haec planta antidotum sit admodum efficax contra Napelli venenum, praesertim quod dicat Auicenna, messe similiter huic planta vim ad albaras, & lepras: aut in eadem confectioe fortasse mus ille interponitur, qui Napelli radicibus videtur, a nobis pluries inuentus in Ananiensibus montibus, quod etiam mus iste Napellus Moyse ab Auicenna dicatur, quoniam ydem contra Napelli venenum polleat viribus, quibus & eadem nominis planta. Haec fortassis suscipis, quam decebat, persecuti sumus. Sed tamen eo consilio id libenter fecimus, primum ut quantum per nos fieri posset, Auicenna a calumnia vindicaretur. Deinde ut ingenue dicerem quod deus omnibus sentio, qui optimos etiam quosque authores, praesertim Arabas, laerant ac discerpunt, quorum plerisque magna est habenda gratia: tantum abest ut eos odio perpetuo prosequi debeant. Verum cur id faciant, non video, nisi quod tutum sit: mortuos inuehi, quando hodie pauci sunt, qui eos tueri velint. Caterum existimarunt Manardus Ferrariensis, & Iconicus, quod Napellus, & Toxicum Graecis vocatum inter se non differant. Sed quantum & isti viri grauissimi aberrauerint, inferius libro sexto in toxici mentione laus ostendimus. Sed de Napello hactenus, qui cum Antoram quae cum illo conuascitur, in mentem mihi redegerit, non praetermittendum esse existimaui, quin de ea hic quoque differerem. Est itaque planta, quam ANTORAM, vel ut melius fortasse, Antitoram vocant, quae (ut referunt rei plantaria


Napellus & Moyse.

Napellus & Toxicum differunt.

Antore mentione & vires.

XIIX. ANTORA.

* XIX. ANTORAE RADICES variae.*



indagatores) vna cum Napello crescit, vel propè ipsius plantas prouenit, in Liguria, & Gallia Cisalpina montibus, vnde ad nos affertur, magnarum contra venena virtutum. Caulem edit sesquipalmarem, & quandoque cubitalem, rotundum, firmum, in quo multifida ac tenuia, disparibus interuallis, oriuntur folia numerosa, in latus sese diffundantia. Flores edit summo caule numerosos, purpureos, Napelli amulos, sed paulo minores. Radices duas solidas oblongas, turbinatas oliuae quantitate, ac saepe maiores, cortice subnigricanti, sed alba intus carne, Nardi montanae modo. Hanc putauerim ego esse Zedoaria Auicennae, quod scribat hanc cum Napello crescere, & quod radices sunt, siue portiones similes Aristolochiae. In quam sententiam duxit me Gulielmus Quacelbenus Belgae, medicus insignis, & rei plantaria studiosus, qui superiori- bus annis antequam moreretur, misit ad me Constantinopoli Antora radices aliquot, quas mercatores a quibus emerat magno satis pretio, Zedoariam appellabant. Quae si non sunt, alterius quidem planta radices esse non poterunt quam eius,

Zedoaria Auicennae.

Zedoaria &
Napellus
Moyfi apud
Auccen. idē.

Aconiti vires
ex Gal.

Nomina.

de qua sub Napelli Moyfi nomine meminuit Auicenna, cum scribat is Napellum Moyfi etiam cum Napello crescere, & tunc maiorem esse theriacam. Ideoq; haud eos male sentire crediderim, qui Zedoariam, & Napellum Moyfi, idem esse Auicenna censent. Praestant Antora radices, non solum ad epotum Napellum, sed & cetera quacumq; venena, quae etiam ad viperae & reliquorum venenosorum morsum. Ligures (vt audio) Antora radicibus felicissime vtuntur, ad intestina uersus pestilentiam, & omnes internos dolores. Auxiliantur omnibus cordis affectibus, nec minus praestare dicuntur quae febribus pestilentibus, cum quibus exanthemata lentium figura exoriuntur. Et cum legitimo Doronico careamus, tunc loco perquam belle supponi possunt. Aconitorum vires tradidit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum ubi ita scriptum reliquit: Aconitum pardalianches putrefaciendi facultatem obtinet, & lethale est. Itaq; in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendum externas corporis partes, aut circa sedem idoneum est. Herba vero radix ad has vires est. Quod autem Lycoctonon vocatur, similem alteri facultatem habet, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos interficere consuevit. Haecenus Galenus. Aconiti primum genus Graece vocatur ἀκόνιτον παρδαλιανχης ἢ ἀνδροπέρας: Latine, Aconitum interficiens pardos ac pantheras: Italicè, Aconito Pardalianche: Germanicè Wolffsbeer vnd Döllwurz: Hispanicè Centelha: Gallicè Herba de la tora. Alterum verò genus Graeci ἀκόνιτον κυνόκτονον dicunt: Latini, Aconitum Cynoctonum & Lycoctonum: Itali Aconito cynoctono: Germani Wolffswurz: Hispani Yerna mata lono, & Yerna de balhesteros: Galli Patelouine. Verum Herba Paris, quibusdam vna versa, sine vna Lupinus: Italis Herba Paris: Germanis Wolffsbeer oder Sterntraut: Gallis Raisin de Renard. At Napellus, Italis Napello: Chymistis Herba tora.

APPENDIX.

Conradi
Gesneri ca-
lumnia retu-
ditur.

Gesneri la-
plus.

Gesnerus no-
tatur.

CONRADVS Gesnerus hac aetate eruditione, ac copia rerum clarissimus medicus, suo quem de raris & admirandis herbis appellauit, libello, de primo Dioscoridis Aconito disserens, quod ipse vulgus sequutus Toram appellat, non solum imaginem nostram in huius capituli initio appictam pluribus impugnare nititur, sed (vt arbitror) inuidorum potius quorundam suasionibus, quam sui ipsius genio excitatus, ad immodestia iniuriarq; peruenisse demonstrat, quo haudquaquam decere crediderim honestos quosq; viros despectere. Quamobrem non possum non admirari, Gesnerum, quem haecenus modestissime de omnibus scripsisse constat, nunc primum longe aliter se gerere, praesertim cum certo sciat, se iam plura magna edidisse volumina, quae censuris innumeris non vacabunt. Ecquid profecto turpius, detestabiliusq; Gesneri euenire potuit, quam infidelitatis illum arguere hominem, cuius autoritas, integritasq; tanta iam dudum fuit apud ipsam, vt innumeris ferè locis in libris de animalium historia, alijsq; voluminibus, non solum illum laudauerit, probauerit, ac etiam obseruauerit, sed illius scriptis inuentisq; pro sui commodo vsus sit, ac multa illi accepta referre possit? Etenim non abest suspicio, quin eius sinceritatem vaser quispiam labefactauerit maleuolus (nam & alios synceros ac probos viros ab ipso deceptos scimus) quo postea factum sit, vt dum is immerito nostram accusat imaginem, aliam ipse in medium afferat, qua (pace eius dixerim) merito damnari possit, quum plantam quam ipse pro primi generis Aconito pingit, de quo Dioscorides, & antiquorum alij meminere, nullis prorsus notis legitimum illud Aconitum referat: adeo vt à genuino non minus differre videatur, quam coruus à cygno. Nam vbi hirsuta folia? vbi Cucumeris aut Cyclaminis facies? vbi plura quam vnum tantum folium? vbi radix cauda scorpionis emula? vbi (Dij boni) alabastris splendor? Nullum penitus talium notarum apparet vestigium. Quamobrem plurimum mirari subit, quod quasi fascinatus maluerit Gesnerus imperitissimi olitoris, cuius balista se telum effecit, contra nos probare sententiam, quam Theophrastum, Dioscoridem, Plin-um, Oribasium, & alios quotquot sunt clarissimi nominis autores, admittere. Adhuc non video, cur ea ratione adducatur Gesnerus, vt non putet imaginem nostram nisi fictitiam, quod scilicet inis artificiosa sit radix, & quod absq; vlla videatur fibris, quum aliarum etiam plantarum habeantur radices omnino glabrae, artificio edita longe maiori, vt in Dentaria vocata, & in eo Sanicula genere, quod album Germani vocant, cuius superius inter symphyta meminimus, videri potest. Sed dicat Gesnerus, obsecro, quotnam in suis de animalibus libris fictitias appinxit imagines? longum sane esset recensere. Recensebo fortasse alias. Quippe nil minus ferendum, quam rationem ab altero reposcere eum, qui sua reddere non possit.

Sunt enim in promptu doctissimi viri, & in plantarum historia, ac facultate exercitatissimi, qui rerum veritatem optime norunt, quorum nomina, etsi copiosum non efficiant numerum, satius mihi fuerit his commendari labores nostros, quam à ceteris improbari. Equidem Gesnero alioqui viro doctissimo nostri Aconiti stirpem mitti possem, nec me taderet ad montes illos me iterum recipere, licet magna intercedat itineris distantia. Atqui quam plantam non requirat, sed duorum aut trium eruditorum testimonia, haec semper in promptu erunt.

Matthioli te-
stimonium
aduersus Ges-
nerum.

Melchioris
Guilandini
explofa
temeritas.

Viuuunt Georgius Liberalis pictor, qui plantam delineauit: Viuuunt Petrus Spezzalancia, qui eam effodit: Viuuunt Franciscus Melchiorius medicus Tridentinus, qui nobiscum ierat: Viuo ego (Dij boni) qui adhuc fidei aliquid praestare possum, & montes viuunt & extant, qui tales nobis alunt plantas. Mirum sanè, quod tam iam morosi sint homines, vt nil aliud extare terris, maribusq; censeant, quam quod ipsi tantum viderint. Verum enimvero non possum satis explorare Gesneri mentem, quippe qui haec & alia nonnulla aduersum me prius scripserit, & nunc primum nos honestè, benigneq; defenderit, aduersus Guilandinum quendam Borussum, qui ad ipsum epistolam quandam scribens de Bulbo Castaneo, Trasis, Moly, alijsque nonnullis barbara quadam inuidia sauciatus citra causam omnem ac rationem, temulenti hominis instar, acrius, immodestiusq; quin etiam iniquius quam par fuerat, in nos inuehitur. Sed licet etiam nobis, obsecro, parumper vnacum Gesnero, quem tamen suis mendicis fautorem sperabat, tam impudentis hominis rabiem repellere. Nam quis hoc pati possit? Quis non modestia fines pratergrediatur, vbi tantum contumelijs, calumnijs & imposturis fuerit lacepsitus? Nihil est, quod bono doctoquè viro grauius, molestiusquè contingat, quam si senserit labores suos ab imperitissimis hominibus rabidis morsibus carpi, & prater equum impugnari. Id quod si aut nostro tantum auro, aut mihi soli exire perspectum haberem, dolerem quidem primum horum temporum nequitiam, inde verò fortunam meam deplorarem. Verum quum id omni tempore fuisse commune animaduertam, eamquè fuisse semper bonorum, doctorumquè virorum conditionem non ignorem, vt inuidorum tela euitare, rabiemquè effugere neutrum possim.

possint. facile equo animo patior quorundam audaciam, insignemq. temeritatem. Inter quos nulli mihi secundus videtur hominibus ille, quem potius (ut ita dicam) Marassum vocauerim. Quid? Mihi blatero invidiam parere credit, quod me herbariorum Decem appellat? An nescit rabula, non aliam ob causam labores nostros in omnium ferè studiosorum manibus florere, & legi, laudari, foueri, ab omnibus, quam quod de re herbaria bene meritum me iudicent? quin etiam ob id mihi tantas agunt habeantq. gratias, quantis mihi vix meritis esse videor. Atqui is, tametsi stultissimus sit, in hoc tamen (me hercule) sapere videtur, quod corium illud suum tanti faciat, ut Matthioli pelli anteferendum iudicet, quod sibi aliquando ex usu fore putat. Seruet ille suum corium diligenter inunctum, & magno existimet pretio. Quippe nisi proprio fuerit adiutus corio, parum aberit, quin liuoris intumescencia rumpatur medius. At videant candidi pii, lectores, qua hypocrisis inceperit in nos inuehi Guilandinus, quum primum inquit: Non is sum, qui cauillis, & imposturis inanem gloriolam aucupari velim. Mentiri nescio, nec si scirem, velim, quum tamen nil magis profiteatur, quam calumnijs, maledictis, & imposturis synceritatem, & modestiam nostram impugnare, & id me scripsisse asserat, quod nusquam in nostris legitur commentarijs. Sed nescio quomodo turpiora sint vitia, quam qua virtutum specie celantur. Porro si quandoque fortasse nonnullas bonas horas male consumpsero, ut huic impudentissimo conuicatori respondeam (id enim non hic exoptulat locus, ne huius sutilitate, & friuolis ineptijs nostra defœdentur commentaria) rogatos velim studiosos omnes, ne id à me factum putent, ut aliquam mihi exinde laudem requiram, qua nulla mihi tam diu esse potest, quam diu cum homine tam impudenti negotium est, qui tanquam lutulentus sus cum quouis volutari cupit: sed si quam ille maledicendo voluptatem accepit, eam male audiendo amittat, ceterique eius simillimi aperte omnes intelligant, plus esse bonis eruditisque virus se defendendo presidij, quam varijs obtrectoribus in calumniando fraudis.

20 Aconitum duplex est, aliud folio Cucumeris, quod Pardalianches, aliud foliis Platani instar diuisis, quod Lycoctonum vtriusq. plures sunt differentia. I. Aconitum Pardalianches primo loco positum, multi, præsertim Gesnerus in Libello de Lunariis, falsum & commentitium existimant: at Lugdunensis herbarum autor in appendice suæ historiæ, plantam integram à Treuirensi seplasiario se nactum testatur, in cuius horto plantæ iam aliquot annis viuant, & in Allobrogibus nasci: qui figuram huic similem habet, sed ramulum floribus onustum adpingit. Dicitur Aconitum pardalianches, Matth. Dodo. gal. Lugd. Taber. Aconitum primum, Lac. Cast. Aconitum Matthioli an in rerum natura dubitamus, Gesnero de hortis. Placuit ex secunda Matthioli editione appendicem, quæ capiti de Aconito subiunxit, huic etiam editioni inferere, cum suam contra Gesnerum conetur sententiam tueri. II. Aconitum Pardalianches Plinii, Matth. Dod. gal. Lugd. Taber. Aconitum pardalianches alterum, Dod. fol. Doronicum brachiata radice, Lob. Lugd. III. Aconitum Pardalianches Theophrasti, Matth. Lugd. Aconitum Pardalianches Matthioli, Taber. IV. Doronicum radice Scorpii, C. B. Aconitum Pardalianches minus, Matth. Lugd. Cast. Aconitum pardalianches primum, Dod. fol. Doronici tertii varietas, Lobel. Doronicum latifolium, Clus. hist. Panno. Doronicum, Cord. in hist. Ges. hor. Lonic. Cæsalpinus. Doronicum primum, Taber. Doronicum minus, Cam. Doronicum Romanum, Ges. hor. Clusio in Corollario Dodonæi Gallicè à se redditi Lugdu. Doronicum Scorpioides, Gesnero in libello de Aconitis. Triplicem hanc Aconiti Pardalianchis differentiam, triplicem esse Doronici varietatem, non sine causa suspicari licet: & quod secundo loco positum, videtur esse Doronicum, quod apud Heluetios prouenit, & ipsius radices ante octodecim annos in Pharmacopolio Iohannis Haintzmanni, Graffoy nomine accepimus, ex cuius horto dum hoc scriberemus, plantam cum floribus mutuauimus, de qua plenius in historia nostra vniuersali. V. Aconitum lycoctonum luteum, C. B. Thal. Camer. Aconitum secundum, Matth. Cord. in Diosc. Lacu. Aconitum Lycoctonum, Fuch. Lonic. Aconitum Lycoctonum luteum maius, Dod. fol. Lugd. Lycoctonum ponticum, Dod. gal. Aconitum Lycoctonum secundum, Lugd. Aconitum luteum, Ges. in fracto, Taber. Aconitum luteum ponticum, Lobel. Aconiti secundum vel Lycoctoni species prima, Ges. hor. Luparia, Trago. Napelli primum genus, Cæsalpino. Flores huic purpureos Matthæolus, at Camerarius in sua Matthioli epitome, luridos aut luteos pallefcentes, tribuit. VI. Aconitum tertium, Matthio. Lacu. Thal. Tabernæ. Aconitum Lycoctonum tertium, Lugdu. nil aliud est, quam Ranunculi species, quem supra sextum fecit. VII. Quod septimo loco posuimus, in Aconiti tertio locum Camerarius in suo Matthiolo substituit, Aconitum etiam hyemale nominans, quod habet Aconitum vnifolium luteum bulbosum nominare, quod fortè Theophrasti Aconitum est. Hoc ex radice candida, ex pluribus tuberculis Anemones instar composita, & quasi geniculis articulata, quæ acris & feruens, nullos quidem cauliculos, sed plures pediculos palmares nudos & tenues emitit, quorum summo foliū rotundum, circumscriptione quidem vnicum, sed in plures partes Geranii Columbi. ni, aut Napelli figura, in profundiores, minusque profundas lacinias diuisum: foliorum singulorum medio flos vnicus luteus, Ranunculi æmulus sex foliis compositus, insidet, ex cuius medio apices plures singuli minutam capitalum subflauum sustinentes, emicant: quod si flos maior longioruè sit, obscure flauescit, si minor, saturatiùs flauet. Huic succedunt siliquæ quaternæ & etiam senæ, pediculis insidentes, sursum erectæ, Hellebori nigri tenuiores, quibus semen rotundum, compressum, rufescens, inclusum. Hoc alii in collibus agri Fæsulani, nos verò in Euganeis iuxta Patavium Aprili florens, & in nostris hortis Ianuarii fine, legimus. Dicitur Bulbosus vnifolius aut bifolius batrachoides, Elleboracea herbula, Aduersariis. Aconitum hyemale Belgarum, & Ranunculus monophyllos, siue Anemone Bononiensis, Lob. Camer. Aconitum Lycoctonum luteum minus, Dod. fol. Lug. Aconitum aliud Dalechampii, Lugd. Bulbus paruus vnifolius Penæ, Lugdunensis historiæ auctori, qui huius plantæ tres figuras proposuit quod illi vitatum, ita ut ex eo opere (ferè dixissem farragine) & quidem sine ipsius damno ultra trecentas figuras, bis teruè, & quidem sub diuersis nominibus positas, auferre possis. Aconitum hyemale Cam. in suo Matthiolo. Elleborina Cæsalpino. VIII. Aconitum quartum, Matth. Lacu. Lugd. an fortè Aconitum Lycoctonum flore Delphini cæruleo (quod Lobelus & Dodonæus proposuere) exprimere voluit? Floribus aureis magnis Matthæolus, cæruleis caudatis Camerarius in Epitome Matthioli dicit.

IX. Aconitum quintum, Matth. & Lugd. cui ex Matthioli sententia, flores insunt purpurei, ut Camerario in Epitome crocei, addens folia vitigineis aut ficulneis accedere magnitudine ac figura seu diuisione, quæ maculis albis & liuescentibus venis deformentur, radice nigricante, cuius magna copia in monte Baldo inueniatur. Videtur Ranunculus montanus albus, simplici flore, quem idem Matthiolus pro quarto Ranunculo posuit, exprimi. X. Aconitum sextum, Matth. Lugd. Taber. quod floribus splendet purpureis Matthiolo: verum Camerarii in Matthio. hæc sunt: Napello simili folio sed multo maiore con- spicitur, & albis quibusdam seu pallidis liuescente venulis, floris figura ad Lupariam nostram accedit, colore pallefcente luteovè. XI. Aconitum septimum, Matth. & Lugd. An Aconitum Lycoctonum quar- tum, Clusii historia Pannonica? XII. Aconitum octauum, Matth. Lugdu. hoc floribus nitet purpura- scentibus Matthiolo: at Camerario in Matthiolum, floribus prouenit rufescentibus, folio fere vitigineo, radice quadruplici ab vno capite crasso. Quid si Matthiolus, id quod à Lobelo, Dodonæo & Lugdu- nensi pro Aconito Lycoctono caruleo paruo, & à Clusio hist. Panno. & Camerario Thora Italica no- mine exprimitur, intellexisset? XIII. Aconitum nonum Matthiolo & Lugdunensi: floribus aureis Mat- thiolo, Luteis Camerario in Matth. qui hæc addit: radice duplici diuaticata sustinetur, minora & grac- liora, quàm alii Napelli folia & magis dissecta promit: quod Antoram fortè aliquis non male existimaret, nisi maior & longior, vt videtur, hæc esset. XIV. Thora maior, C. B. Pseudoaconitum Pardalianches, Matth. Aconitum primum Dioscoridis, Ges. hor. Cyclaminus tertia Plinii & Limeum eiusdem. Ges. Libello de Aconitis. Phthora Valdensium, Aduer. Lobel. in icon. Thora Valdensis, Dod. fol. Lugd. Clus. histo. Pan. Camer. Tab. Tora maior & Toxicum Valdensium, Cam. in suo Matthiolo. XV. Thora minor, quæ minoribus foliis constat circinatis, asperis, non hirsutis, per ambitum crenatis, ad plura- rum tribus, sæpius verò singulari folio: floribus luteis sed minoribus forma vt & feminibus, Ranun- culo similibus: radicibus pluribus coniunctis asphodeli instar ex vno capite prodeuntibus, albis, quibus sæpe appendix longiuscula scorpionis caudæ æmula, qua se forsan propagare solet, additur. Aconitum pri- mum minus, Ges. hor. Tora minor, Ges. Lobel. de Aconitis, Camer. in Matth. Thora montis Balet & Thora Sabaudica, Taberna montano. XVI. Solanum quadrifolium bacciferum, C. B. Herba Paris. Matth. Dod. gal. & fol. Lugdu. Cast. Thal. Casal. Paris herba, Lonic. Camer. Asper sed non Atticus & Vualupina, Trag. Aconitum Pardalianches, Fuch. Taber. Aconitum seu pardalianches monococcum, Cordo. in hist. Aconitum pardalianches thelyphonon, myophonon Theophrasti, Cord. in Diosc. Aco- nitum salutiferum, Taber. Solanum tetraphyllum, Ges. hor. Lobel. Solanum sylvaticum, Ges. hor. ap- pen. Foliis communiter quatuor, vno aliquando, & etiam tribus cum primum prodit, quinque & sex re- peritur. XVII. Aconitum caruleum seu Napellus, C. B. Napellus, Matth. Ges. hor. Lonic. Castor. cum & herba Tora) Dod. fol. (cui & Toxicum) Lug. Camer. Napellus verus caruleus, Lobel. Napellus ma- ior, Taber. Napellus reticulatus & Napellus Auicennæ, Casal. Eisenhütlin / Brunf. Trag. Lycoctonum caruleum, Cucubus siue Cappa monachi, Dod. gal. Lycoctonum satium tricarpum, Cord. in hist. Aco- niti secundi vel Lycoctoni species altera, Ges. hort. Aconitum caruleum, Thalyo. Flore communiter caruleo, rarius roseo, rarissimè albo reperitur. XVIII. Aconitum salutiferum seu Anthora, quasi ἀν- θορα, quod Thoræ alexipharmacum sit. C. B. Zedo- aria & Napellus Moysis Auicennæ, cui & Algiedrar. Antora, Matth. Ges. hor. Casto. Casalp. Cam. An- thora, Dodo. fol. Lobel. Lon. Taber. Lugdu. quam herbam Colicis doloribus vtilem indigenæ Allobro- gum vocant: Aconitum salutiferum & Antora, Gesnero de hortis Germaniæ. XIX. Hoc cum ludæ radicem forma, earum varietatem, D. Camerarium imitati, figura expressimus: aliæ enim singularem & quasi bulbosam radicem obtinent: aliæ geminis, vel oblongis, vel turbinatis, coherent: nonnunquam scorpionem aliquantum reterunt: sed & triplices inueniuntur.

CICUTA.



Κάυερος.

CICUTA
CAP. LXXIII.

Cicuta caulem edit geniculatum, vt feniculi, grandem: folia ferulæ, angustiora, grami odora- tu: rami, mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoque albicantes, & semen aniso candidius: radi- ce non alta, concaua. Cicutæ lethale venenum inest, suaquæ vi refrigeratoria necat. Remedio est visu meraculi potus. Succus exprimitur contulis cacu- minibus, priusquàm semina, & coma siccescant, qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendi rationem vsus est aridi: commodè miscetur colly- riis, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt, illitu restinguit. Her- ba cum coma trita, & testibus circumlita, libidi- num imaginationes in somno compefcit, sed geni- tale resoluit: lac puerpurarum mammis appetita extinguit.

extinguit: in virginitate mammas coerces, & increſcere non patitur, pueris præſtat, vt eorum teſticuti
 eorum non ſentientes intabefcant. a Efficaciſſima vis Creticæ, Megarenſi, mox Atticæ, & in Chio,
 & Cibica naſcenti.

ἐνεργεῖται
 δὲ ἐστὶν ἡ κρη-
 νικὴ καὶ τὸ ἐν
 τῇ Ἀσίᾳ γε-
 γόμενοι, καὶ τὸ
 μὲν περὶ τὴν
 καὶ τὸ ἄττι-
 κὴν καὶ τὴν κρη-
 νικὴν. ἡ ἐfficaci-
 σσιμὴ ἐστὶν Cretē-
 σις, & quæ in
 Ἀσίᾳ naſcitur,
 & Megarica,
 Attica &
 Choa.
 Cicutæ cōfid.
 Cicutæ vires
 ex Gal.
 Nomina,

Cicutæ vulgaris notitia: 7 plantæ, vt pote quæ plerumq; prope urbium, & oppidorum mœnia, & ſæuis itinera proue-
 nit. Cicutæ ad ſimilis odore tamen admodum graui. Maximæ vis Cicutæ, vt Plinius refert, quæ naſcitur in terra Par-
 thorum, mox Laconicæ, Creticæ, Aſiaticæ. In Græcia vero Megaricæ, deinde Atticæ. Caterum in Italia conſtat Cicutam
 non adeo exitialem eſſe. Eam in Hetruria ſi aſini depaſcantur, profundiffimo ſomno, & torpore capiuntur, ita vt non tan-
 tam lapidi, & plane mortui videantur. Id quod aliquando ruſticos huius rei ignaro, ſecellit: nam dum aſinis, quos mor-
 tuoſo credebant, pellem ad vſum detraherent, accidit mirum, quod in medio ſere operis aſini expreſſi ſunt, non ſine magno
 exhorantium terrore, atq; ingenti ſpectantium ritu. Cicutæ breuiter meminit Galenus lib. 7. ſimplicium medicamento-
 rum, vbi tantum omnibus notum eſſe ſcribit, quod ea extreme refrigerantis ſit facultatis. Et in libro quod animi mores cor-
 poris temperaturam ſequantur, Cicutæ potu illam fieri amentiam tradidit, quam a Cicutæ ipſa Græci conion appellant.
 Hoc nobis contigit videre, vt latius libro ſexto explicabimus, in quibusdam, qui imprudenter Cicutæ radices paſtinacæ vice
 de octis comederant. Plantæ, quæ Græcis τὰ κικύδα, Latinis atq; etiam Italus Cicutæ vocatur: Arabibus Sucaram: Germanis
 Bizertraut, Schwing vnd Witterich. Hiſpanis Ceguda: Gallis Cigue, Cocue & Segue.


Cicutæ maior, cuius caulem viridem à pleriq; edi, ſcribit Plinius lib. 25. cap. 13. verum qui ſapiunt
 ab huius eſu, Socrateo exemplo edocti, abſtineant. C. B. Cicutæ, Marth. Trag. Fuchſ. Turn. Cordo in
 Dioſcor. Dodo. gal. & fol. Lacu. Lon. Lob. Caſtor. Lugdun. Cæſalp. Taber. Cicutæ maior, Cordo in
 hiſto. Cam. Cicutæ vera, Gef. hort. Thal.

Σμύλαξ. TAXVS. CAP. LXXV.

Smilax à Græcis, Taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiufdem figura, in
 Italia, & Narbonenſi Gallia Hiſpaniæ contermina naſcens. Auiculæ quæ Italicæ Taxi baccas deuo-
 rant, demigrantur: & qui ederint eadem homines, alii profluuium corripiuntur. Narbonæ tam præſentis
 eſt veneni, vt ſi qui dormiant ſub ea, aut in eius vmbra ſubſideant: lædantur, & ſæpenumero morian-
 tur: quare de Taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.

TAXVS.
 Τάξυς βασιλική

* TAXVS GLANDIFERA. *



Naſcitur Taxus frequens in Ananie vallis montibus, ſaxoſis ac præruptis locis, inter abietes & piceas, quibus folio, ac
 formæ non longè diſſimilis viſitur: quanquam hæc illarum proceritate non niſi rariffimè æquet. Baccas fert ruben-
 tes, aquifolij modo, dulces vinoſaq;: quas quandoq; mandentes tum paſtores, tum qui in ſyluis arbores cedunt, ſtatim in
 febres incurrunt, & dyſenterici fiunt. ſanguine & ſpiritibus inde admodum inflammatis. Ligni materies, quod ruſceat
 quam plurimis intercurſantibus venis, in corruptaq; ſit, lignarius ſabrus maximè expetitur, & plurimi ſit, præſertim con-
 ſtruenda menſis & baſtis, arcubus teliq; conſtruciendis. Quamobrè Germani huius arboris aſſeres ad ſua conſtruenda hypo-
 cauſa

Taxi historia
ex Theophr.

causta non exigua sibi comparant pecunia. Taxi meminit Theophrastus lib. 3. cap. 10. de plantarum historia. sic inquit: Taxus quoque genere simplex, procera, aucta insignis similisque abieti, nisi quod non pariter excelsa, magisque alis firmata est: folio quoque Abieti similis, sed pinguior molliorque ligno. Quae in Arcadia nascitur, nigro ligno, aut puniceo constat. quae autem in Ida, flavo admodum, & cedro simili: propter quod vendentes fraudare dicuntur, tanquam cedrum venundent. Totum enim cor esse, cortice detracto: corticem similem cedro habere tum scabritia, tum colore: radices breves, graciles, per summaque cespitum: rara haec circa Idam. At in Macedonia Arcadiaque, vel fructum abunde proferre, rotundum, faba paulo maiorem: colore rufum tactuque mollem. Aiunt, quod si iumenta folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil patiuntur. Fructus & ab aliquibus hominibus manditur, suavisque est, atque innoxius: haec tenus Theophrastus. Cuius sententia illud obstare videtur, quod nostra Taxus fructum ferat non innoxium, ut ipse ait, sed noxium, ut supra diximus.

Ex Plinio.

Taxi Plinius quoque meminit lib. 16. cap. 10. ubi de ea ita scribit: Abieti & picea similis etiamnum aspectu est Taxus, minus virens gracilisque & tristis, ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera. Mas noxio fructu: lethale quippe bacca, in Hispania praecipue, venenum inest. Vasa etiam viatoria ex ea vinis in Gallia factis mortifera fuisse compertum est. Hanc Sestius smilacem a Graecis vocari dixit: & esse in Arcadia tam praesentis veneni, ut si qui dormiant sub ea, cibumve capiant, moriantur. Sunt qui & taxica hinc appellata dicant venena, quae nunc toxica dicimus, quibus sagitta tingantur. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clavis aereus adigatur: haec Plinius. Foliorum fumo mures necantur. Bovis joliorum pastu necantur. Taxi praeterea nocumenta tradidit Dioscorides libro sexto, ubi de noxijs medicamentis pertractat, quod cum peruentum fuerit, de ijs diffusis nobis differendum erit. Taxi vires quam paucis reddidit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Smilax, aut Taxus arbor est venenosa facultatis. Huic arbori nomen Graecum est σμυλάξ Latinum Taxus: Italicum Tasso seu Nasso: Germanicum Eiben Baum: Hispanicum Texo: Gallicum If.

Taxi vires
ex Gal.
Nomina.

Taxi figuram Matthiolus proposuit, quae solum baccas cum foliis exprimit: at Lobelus & flores adpinxit, eo modo quo figura nostra prima ostendet. Verum lubuit & alteram figuram addere, quae & flores & glandes exhiberet una cum nucamentis. Elapso etenim anno Nobilissimus Iacobus Antonius Cortusius, Taxi ramum glandibus onustum transmisit: qui scribit se praecedentis anni Octobri & Novembri mensibus in montibus circa Vincentiam qui Tridentum spectant, legisse: quod sane dignum observatu, cum nec ab antiquis, nec a recentioribus, quod quidem legerimus, quicquam de Taxo glandiera memoriae sit proditum, merito ergo haec de glandibus observatio Nobilissimo Cortusio debetur. Dicitur Smilax Dioscoridi & Galeno: Milos, Theophrasto: Smilos, Nicandro: Taxus, Plinio & Matt. Dod. gal. & fol. Turn. Cordo in Dioscor. Ges. hort. Lacu. Lon. Lob. Cast. Lug. Thal. Cam. Cæfal. Milax arbor, Cordo in Dioscoridem.

Ἀπόκυνον.

APOCYNVM.


CAP. LXXVI.

A Pocynon siue Cynocrambe, Brassica canina, frutex est longis viticulis constans, male olentibus lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. a Siliquæ ceu fabarum, folliculari specie, digiti lon-

a Meum
καρπος δ' ἐὼς
λοβός κυάμιν.
i. fructus verò
velut siliqua,
fabæ.

I. APOCYNVM.

Cynocrambe cretensis. spec. heder.



II. APOCYNVM REPENS.

Periploca graeca. spec. heder.



gitudis

gitudine protenduntur: semine intus duro, paruo, nigro. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes & pantheras enecant in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

A Apocynum, quod & Brasicam caninam appellant, etsi iamdiu mihi quidem incognita fuerit, aded vt inter alias in- Apocyni cō- sideratio.
compertis stirpes in amplissimo natura viridario posteris reliquerim explorandam, hoc tamen anno e Pisis medicus e-
ruditione. & in re herbaria clarus, Lucas Ghinus Forocorneliensis duas ad me misit plantas, quarum vna per omnia Dio-
scoridis Apocynon representat. Scribit enim vir ille, duas a quodam nobili amico siliquas dono accepisse e Syria allatas,
quarum alteri inscriptum erat Periploca repens: alteri vero Periploca non repens, fortasse quod ita Syri eas plantas nomi- Apocynura
nent. Subdit praeterea, has siliquas rhododendri siliquis admodum fuisse similes: inter quas tamen hac erat differentia, quod duplex
repentis Periploca siliqua ea sane longitudine constabat, qua & rhododendri, gracilior tamen erat: alterius vero breuior.
E longiori siliqua plantam prouenisse ait, qua non modo humi repit, sed & arbores quantumuis proceras scandit: e breuiori
vero aliam, qua notis omnibus Apocynon refert. Vtraque, porro non minus lacte turget, vt scribit, quam tithymali omne ge-
nem: verum id repenti omnino album inesse: non repenti vero subcroceum. Est & in siliquis differentia. Siquidem etsi ha
in vtraque, rhododendri perquam similes sunt, in non repenti tamen simplices, ac tiores, ac recta ex vno pediculo proueni-
unt: in repenti vero, qua folia promit alterius longiora, caules, seu potius viticulas obsequiosas & fractu contumaces, len-
taeque, binas, ex vno pediculo in origine coniunctae prodeunt, & in sese inuicem inflexae, nec aded, vt illa in acutum desinentes.
Prouenit repens in Apulia & Calabria copiose. Creditur isdem pollere viribus, quibus & alteram. Dioscorides Apocynon
siliquis facit faba similes, quod in his qua hic imaginem expressimus, maxime repugnare videtur. Nam inter harum, &
fabarum siliquis non parua intercedit differentia. Verum cum scribat Plinius Apocynum semen (siliquam intelligo) ferre
autum, & videam statim post Apocyni caput de Rhododendro, illi siliquis simili, scripsisse Dioscoridem, non possum mihi
non persuadere, hanc plantam legitimum esse Apocynum. Itaque in hac mea persistam opinione, donec aliam videro plantam
qua clarioribus notis Apocynum referat. Interim si quis in censendis plantis tam morosus reperiat, vt has Apocynos face-
re nolit, poterit is id tamen condonare, vt liceat nobis (vt Ghinus ille optimus faciebat) easdem Periplocas appellare. Apo-
cyni vires memoriae prodidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Apocynum aut Cynocrambe: Vo- Apocyni vi-
cant autem quidam eam Cynomorum, quandoquidem canes celerrime interimunt, sicut Lycoctonon lupos. Est autem ho- res ex Gal.
minibus venenum. herba multum grauiter olens: proinde omnino calida est non instrenue, non tamen proportione defic-
cat. Itaque illius admodum digerentis est facultatis. Quae planta δρόκοννον Graece, Apocynum item & Brasica canina Latine
dicitur: Italicè Apocino siue Periploca. At Apocynum repens, Italicè Apocino serpeggiante.

I. Apocynum folio subrotundo, C.B. Apocynum, Matt. Anguil. Lac. Cast. Lug. Apocynum primum, Clus. hist. Hisp. Apocynum siue Periploca Graeca, foliis latioribus hederacis, Lob. Amphocynum hodie in Graecia, Gef. hor. Cynocrambe, Lon. Periploca non repens, Cae. II. Apocynum repens purpurascete flore (quoddam enim albo flore folioque angustissimo Alpinus proponit) C.B. Apocynum repens, Matth. Lug. Cam. Apocynum secundum, Clus. hist. Hisp. Periploca Nerci folio, Anguil. Periploca altera, Dod. folio. Periploca serpens angustiore folio, Lobel. Periploca, Caesalpino.

Νέριον ἢ Ρόδονδρον. **NERIVM SIVE RHODODENDRVM. CAP. LXXVII.**

NERIVM SIVE RHODODENDRUM.

Nerion aliqui Rhododaphnen, alii Rhododendron vocant: frutex est vulgaris notitia, longioribus quam amygdala foliis crassioribusque: flore in rosam conformato: a fructu amygdalae simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, b spinarum pappos representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salia: nascitur in amoenis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia multis, canibus, asinis & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus vero contra serpentium morsus praesidia, e vino pota, eò magis ruta addita. Imbecillae etiam animantes, vt pecus & caprae, si aquam bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Nerium, quod flores rosarum effigie proferat, laurinusque folijs constet, Graecorum quidam Rhododendron, alij Rhododaphnen appellant: Italicè Oleandro vulgò dicitur. Vidimus nos hoc primum ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis nostris. Planta est lauri facie, spectabilis, & visu non iniucunda, praesertim cum roseis emicat floribus. Horum similitudine deceptus quondam fuit Lucius Apuleius sub asini metamorphosi, dum rosas quere- ret, quarum pastu in pristinam formam restituendus erat. Nam cum procul vidisset Nerium suis floribus refertum, ratus eos esse veras rosas, eò aperto ore accurrit tanta aviditate, vt parum defuerit, quin eas primo occurfu imprudens deuoraret. Verum is, vt qui in plantarum historia, & viribus earum indagandis diligentissimus author extitit, non immemor Nery flores depastos asinis venenum praesentaneum esse, ita deceptus labra submouit, demissusque ad terram auribus abiit. Nery vires descripsit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, Nery vires ex Gal.



Nerium oleander

a Catecu.
καρπὸν δὲ
φίρες κεραιαί
i. fructu fert
vel cornu.
b Meum
ἀκανθίως
ἀπὸ ποικί-
Acanthinis
pappis.

Nery confid.
Nery vires
ex Gal.

Conciliatio
Dioscoridis
cum Gal.

Nomina.

torum, sic inquit: Nerium, vt Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem corpori illitus, discutiendi vim obtinet. Intra autem in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus non tantum hominibus est, sed plerisque etiam pecudibus. Galenus. Qua maxime repugnant Dioscoridis & Plinij placitis: quippe qui Nerium potum commendauerint nominatum contra serpentium venenosorum morsus. Nisi dicere velimus, quod Nerium sumptum secundum Galenum sit hominibus non demorsis perniciosum: secundum vero Dioscoridem idem vis remedio sit, quos serpentes momorderint. Idque ea ratione fiat, qua & cantharides (vt inquit Auicenna) a cane rabido demorsis medentur, & euphorbium a scorpionibus ictu, & alia denique, lethalia medicamenta alijs item venenis aduersantur, vt inferius libro sexto latius dicitur. Siquidem mihi non videtur verisimile, quod prater rationem id prodiderit Dioscorides, in simplicium materia omnium facile princeps. *Nescio quid aliud et quod aliud dicitur: sic Græcè planta dicitur, qua Latinus pariter Nerium, Rhododaphne & Rhododendrum: Italis Oleandro: Germanis Oleander: Hispanis Adelfa & Eloandro: Gallis Rosagine seu Rosage, Oleandre.*

Nerium Matth. Trag. Fuchf. Turn. Dodo. gal. Cordo in Diosc. Gef. hort. Lacun. Lon. Lob. Lugd. Castor. Camer. Taber. Neris, Nicandro: Oleander, Anguil. Lob. icon. cui & Laurus rosea: Rhododendron, Gef. hort. Dodo. fol. Rhododaphne, Gef. hort. Cæsalp. Rosa laurea, Apuleio. Vulgò flore est rubefcente, habetur & albo.

† Orib habet tantum
βλαπτικὰς. i.
noxios.

† Onb conclusa vno tantum verbo explicauit. *ἰδωδμο. i. esculentu.*

a Meum

καὶ χολέραν ἰπάχοντε. i.

& cholera sursum ac deorsum ducunt.

† Or. *ἐλαίω. i. olei.*

Fungorū genera & cōlid.


Μυκήτες.

FVNGI.

CAP. LXXVIII.

Fungorum differentia duplex: aut enim manduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gnuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit: aut si iuxta terrentis cauernam, arboresve, que priuatim pariunt noxios fructus, erumpant. Continent qui tales iunt, nescio quod strigmentum concretamque pituitam, terraque eruti, quam celerrime computrescunt, arque marcore vitiantur. † [Sed qui veneno imbuti non sunt], suauem in iuribus gratiam habent, largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangulant, a aut choleram morbum citant. Remedio est † nutri potus, aut lixiuum cum acida muria, aut feruefactæ satureiæ, aut origani iusculum: debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægrè dissoluntur, cum magna ex parte integri ipsi cum recrementis alui deiciantur.

FVNGI.



Fungi malefici vt dignoscendi.

Fungorum alia genera.

sur. Quandoquidem cum lenti admodum, crassissimiq; succi existant, articularum oracula vsq; adeo obstruunt, vt conclusis intus spiritibus suffocent. Quod cum probe norint agrestes in Hetruria mulieres, rarissime Fungos mandunt, nisi alio & pipere adiectis. Afferuantur Fungi muria, praesertim qui vulgò Porcini dicuntur: namq; hoc modo parati innocentes redduntur amisso lentore. Prater hac multa alia Fungorum genera apud nos inueniuntur, vt ij qui nobis vulgò appellantur Pratioli, Turini, Boleti, Orcele, Cardarelle, Mamne, Ordinali, Parigioli, Vescie di lupo, & complura alia, qua, cum nihil vel parum ad rem faciant, silentio inuoluenda duximus, vt enim varia spectantur facie, ac colore, ita hominibus maxime noti sunt fungi, plurimi tamen galeri modo formantur, palmari ac etiam minori pediculo nitentes, vario superim. insertuq; colore. Nascuntur quidam in pratis, pleriq; in pascuis, nonnulli in syluis, quidam in frutetis. Ceterum Fungi non tantum humi proueniunt, sed & in arborum caudicib. qui omniferè periculo vacant (dummodo non sint arbores naxia) quod

T Ametsi duo tantum Fungorum genera hic videatur recensere Dioscorides, ad Fungos duntaxat innocuos, & perniciales respiciens: tamē, vt omnib. palam est, plura ac diuersa eorū, qua in cibis expetuntur, discrimina notantur. Horū inter omnes Italia regioes feracissima est Hetruria, vbi & Fungi ceteros antecellunt, qui vulgò dicuntur Prignioli, quidam singulis annis primis Aprilis imbribus erumpunt, neque solum odorem eximium spirant, gustuq; gratissimi sunt: sed etiam omnino innocui habentur. Secundum vero locum apud nostros Hetruscos tenent ij, qui vulgò Porcini, hoc est, silli, nuncupantur: quippe qui prius elixi, ac demum satina circumliti, & oleo vel butyro fixi, magnam cum palato inuolant gratiam. Verum hi non adeo tuti sunt, quod in suo genere perniciosi plures, quam in alijs reperiantur. Ceterum periculosi ac malefici à peritis & oculatis viris facile dignoscuntur, cum à terra & cortice purgantur, incidunturq; decoquuntur. Nam cultello dissecti illico (vt Plinius inquit) dilutus cum aduenit rubor, rancidus subinde aspectus, liuidus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrum: postremo accedit nigredo, & ita protinus computrescunt. Quamobrem rectè scribit Auicenna lib. 4. sen 6. eos nocentiores esse, qui nigri, vel virides, vel in nigro purpurascetes visuntur. Proinde amens quidem, & planè stupidus, & stipes fuerit is, qui tantarum repentinis mutationes viderit, & non cognouerit his notis eorum virus patefieri. Sed accidit plerumq; vt illos potissimum Fungi interimant, aut saltem in magnum discrimen adducant, qui eos super ferrea craticula, aut prunis calentibus quibusdam assatos deuorant. Hoc enim modo decocti, cum in taleolis non secantur, non tam facile cognosci possunt, vt ij qui dissecti parantur. Ad hac non semper efficiunt Fungi, quod per se lethiferi sint, sed quod copiosius, quam par sit, ingerantur.

quod e cortice profiliant, cui nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpentis cadauer subesse potest. Ex hoc genere quidam, praeter agaricum, Laticibus innascuntur in An. antienfibus montibus triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum diffusi. in cibis gratissimi, nullo amarore praditi, licet agaricus ab eadem arbore productus sit amarissimus. Hic certe mirari subit, quod tantis hominibus inseritur gula libido, luxus & incontinentia, vt adeo inconsulto, auideq; Fungus vescantur, in quibus sapius immatura mors delitescit. Tanta hodie interceptis gratia Fungus cum mensis in Italia, vbi eorum frequentissimus est vsus, vt Neapoli inuenti sint lapides, qui desosi, & in cellis vinarijs translati, terra aliquantulum operiti, & subinde tepida aqua inspersi, intra quadriduum Fungos non ingratos procreant. Hos & Roma & Neapoli vidimus, vbi magna seruantur diligentia, nempe quorum merito quolibet tempore Fungos edant. Sunt & lucernarum Fungus, qui in ellychnio sicut praesertim cum aer humorem contraxerit, & ad pluuiam preparatur. Fungus itaq; lucernarum, meo quidem iudicio, fuerit is carbonis globulus, qui Fungus faciem representans, in ellychnij extremitate concrefcit, & flamma lumen obumbrat. Neq; enim in hoc subscribam Cornario, viro alioqui ingenio & doctrina celebri, qui in commentarijs, quos in tertium Galeni librum de compositione medicamentorum secundum locos edidit, censet Fungum illum esse ellychnium lucernarum ex quodam fungi genere factum, quod facie (vt ipse inquit) marinas emulatur spongas. Siquidem apud veteres nusquam me legisse memini, e fungo ellychnia fieri: cum tamen legerim apud Virgilium & Plinium, cum fungi generantur in lucernis, futura pluuias esse praesagium. Namq; Virgilius libro primo Georgicorum, vbi futura pluuias signa dicens, id apertissime testatur, hjs carminibus:

Tum cornix plena pluuiam vocat improba voce:
Et sola in sicca secum spatiatur arena.
Nec nocturna quidem carpentes pensa puella
Nesciuere hyemem, testa cum ardente viderent
Scintillare oleum, & putres concrefcere fungos.

Eorum porro generationis causam scire quidem reddidit Seruius Grammaticus in commento hisce verbis: Nam (vt inquit Plinius) cum aer humidus esse coeperit, fauilla, qua cum fumo solet egredi, prohibita aeris crassitate in lucernis residet, & quasdam velut fungorum mutantur imagines: hac ille. Sed praeterea ipse Plinius Virgilio, & nobis quoq; ad stipulatur libro 13 cap. vicimo, cum ita scribit: Palladi namq; ignes, murmurantesq; tempestatum nuncij sentiuntur: pluuias etiam, si in lucernis fungi: haecenus Plinius. Ex quibus omnibus luce clarius fieri puto, hac in re Cornarium cecutiuisse. Fungus praeterea apud Hippocratem & Galenum lib. 3. de morbis vulgaribus, sunt excrescentia, qua quandoq; in palpebris, quandoq; in pudendis enascuntur. Quin & Fungus dicuntur a Galeno libro primo de locis affectibus, adnascencia capitis, vbi hoc fracto, meninx, qua est membrana cerebrum custodiens, fuerit affecta. Nec alia sane de causa hos affectus μύκητας, id est fungos, vocari crediderim, quoniam quod fungorum imaginem referant: quemadmodum & ij qui in lucernis concrefcunt. Fungorum vires memoria prodidit Galenus libro octauo simplicium medicamentorum, sic inquit: Fungus frigida humidusque admodum planta est: quamobrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemve facultatem accedit: & sane inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mistam habent qualitatem putredinosam. Et libro secundo de alimentorum facultatibus, idem de fungo ita differit: Inter fungos Boleti, si belle in aqua elixi fuerint, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic solus ipsis vulgè vtuntur, sed adparant variè & condiunt, vt alia omnia, qua nulla insigni qualitate sunt pradita. Alimentum autem ex ipsis est pituitosum, & frigidum videlicet, prauiq; est succi, si quis ipsis largus vtatur. Omnium igitur fungorum ij minimum sunt noxij. Secundi autem post hos sunt Amanita. Reliquos verò cuius est omnino ne attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu interierunt. Equidem noui quendam, cui post Boletorum non satis elixorum (qui innocentissimi esse putantur) vsus largiorem, os ventriculi pressum ac grauatum, coarctatamq; fuit, diffuilemque, habuit respirationem, & in animi deliquium incidit, sudoremq; frigidum sudauit, ac demum seruari agere, sumptis hjs qua humores crassos incidunt, potuit: cuius generis est oxymeli ipsum per se, & cum hyssopo, & origano ipsi mediocriter incoctis. Is enim tum hac sumpsit, tum nitri spumam ipsis inspersam: post qua fungos, quos comederat, vomuit, qui tam quodammodo in succum pituitosum frigidumq; admodum ac crassum erant mutati. Μύκητες qui Graeci, Fungi Latini appellantur: Arabibus Hajar seu Father: Italis Fonghi: Germanis Pfifferlung vud Keschten: Hispanis Hongos, Cogomelos & Cylherquas: Gallis Campignon, & Potyron & Moucerons.

Fungorum differentiarum plurimae sunt, in vniuersali nostra historia explicandae, hoc loco vulgatissimi & qui esculentis sunt, proponuntur, qui dicuntur Fungi, Marth. Lacu. Lonic. Castor. Dodo. fol. Lugdun. Celsalp. Fungi vulgatissimi esculentis, Lob. in icon. Amanitae vel Boleti, vel Fungus secundus, Trago: Fungi primi, Cordo in Diosc. Fungi boliti, Tabernamontano.

Κολχικόν.

COLCHICVM.

CAP. LXXIX.

Colchicon, aliqui Ephemeron, sunt qui agrestem bulbum vocant. Autumni exitu florem edit croci, candidam: b ab eo tempore folia bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris e nigra rufescentem, quae delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atq; gustatu dulcis inuenitur: bulbus eius c mediam habet rimam fissuramq; qua stros erumpit: plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesta, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne a quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quae fungis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

a Meum
επωλευκόν. i.
subalbicans.
b Meum
εσπερον δ' ε. i.
postea verò.
c Meum
φουσιμίον. i.
discrimen in
medio.

Εφήμερον.

EPHEMERVM.



CAP. LXXX.

Ephemeron, aliqui syluestre ita appellant. Folia habet lilii, sed tenuiora: caulem parum: florem candidum, amarum: semen molle: radicem vnam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam: nascitur in frutibus & opacis. Huius radix dentibus praecipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutiunt tumores & tubercula, quae nihil adhuc humidi contraxerunt.

Epheme-

I. COLCHICVM.


II. COLCHICVM ALTERVM
Orientale.



III. HERMODACTYLVS
verus.

Colchici & Ephemeris consideratio.

Mauritanorum & sequacium error.



Serapionis lapsus.

Ephemeris duo genera constituisse videtur Dioscorides: unum, quod Colchicon, & agrestem bulbum: alterum, quod Iridem sylvestrem cognominant. Quod primo loco describitur, adeo perniciosum affirmant, ut vno die sumptum interficiat unde illi Ephemeris nomen. Ea autem ratione illud se deprehendit tradit Dioscorides, ne ab aliquo imprudenter bulbi vice deuteretur: mirum enim, inquit, quantum saporis voluptate imperitos alliciat. Verum cum hoc diuinum Dioscoridis institutum non animaduertent, vel forte neglexerint Mauritani, & secuti medici superioribus nostrae aetatis, non modo seipso, & quos miserè deceperunt, sed & ceteris omnibus errandam facile praeberunt. Siquidem Colchicum ephemerum dicitur medicamentum, si eius nota diligentissime expendatur, nil aliud, meo quidem iudicio, representare deprehenditur quam candidum illum bulbum, quem vulgò officina Mauritanos secuti falsò Hermodactylum appellant. Sed quantum destandus sit error is, & abolenda prava ac perniciose haec consuetudo, quantumve discriminis, & incommodi nostrum corpus hinc imminet, aestimabunt illi, qui rectè diligenterque ea perpendent, quae non solum Dioscorides & Galenus, sed & Paulus & Nicander, & Plinius de Colchico Ephemero posteritati memoria prodiderunt: quippe qui affirmauerint, id deuoratum eadem die homines interimere. Quem effectum etsi hac tempestate ab hoc manifestè praestari non constat experimento in his, qui ipsum in medicamentis assumunt, id tamen non alia de causa fieri putauerim, quam quòd fortasse in Italia, ut in Colchide, mortiferum non proueniat: aut quòd ea, quae sumitur quantitas, exigua sit, neque ad perdendum sufficiens. Sed non propterea dubitandum est, quin hoc sumentibus grauis & perniciose incommoda inferre valeat. Erroris occasionem dedisse videtur Serapio, utpote qui confusè vno tantum capite de vtroque Ephemero, & de Hermodactylo scripserit, nomine duntaxat Hermodactyli omnibus inscripto, immemor, vel potius ignarus, apud Graecos, à quibus tamen quicquid ferè boni habet, mutuatum est, eas plantas inter se maxime differre. Quod autem in hoc deceptus Serapio has herbas turpiter confuderit, fidem manifestam facit Paulus Aegineta, qui lib. 7. de Ephemeris, & de Hermodactylo separatim, tanquam de uerbis differuit, & primum


Hermodactyli omnibus inscripto, immemor, vel potius ignarus, apud Graecos, à quibus tamen quicquid ferè boni habet, mutuatum est, eas plantas inter se maxime differre. Quod autem in hoc deceptus Serapio has herbas turpiter confuderit, fidem manifestam facit Paulus Aegineta, qui lib. 7. de Ephemeris, & de Hermodactylo separatim, tanquam de uerbis differuit, & primum

Fuchsius de-
ceptus.

emicat albus, stella figura. Radices habet binas, bulbosas, candidas, teneras. Prouenit in frutetis, & propter similitudinem & se-
pes. Sunt, qui radices probent ad ea omnia, ad quae legitimus Hermodactylus conferre potest. Nos vero horum sententiam
nec probamus, nec improbamus, cum nullam certam de eo habeamus experientiam. Nec illud sane hoc loco praeferendum
duximus, quod Hermodactyli Actuario & Nicolao Myrepsico, qui albi & rubri Hermodactyli meminere, nil aliud repre-
tant, quam Behen album, & rubeum Mauritius appellatum. Siquidem ex descriptione aurea Alexandrinae apud Nico-
laum & Diamoschi antidoti apud Actuarium id liquido constat. Sed non ob id diendum est, Hermodactylum Pauli & Se-
rapionis idem cum illis esse: his namque alterius generis radix est, quae vim habet deiectionem ad articularum deiectionem
praeipuum. Fuchsius in libro de compositione medicamentorum, quem non pridem locupletatum edidit, Hermodactylum
Pauli describens, inquit: Vnus habet radicem albam, crassam ac modice duram: atque is est, qui in hodiernum diem nomen
Hermodactyli in officinis medicorum retinet. A Paulo quoque Hermodactylus appellatur. Ex his nimirum verbis Fuchsius si-
bi persuasisse videtur, Hermodactylum communis vsus eundem esse cum Pauli Hermodactylo: cum tamen omnibus fere con-
stet, illum non aliud esse quam Colchicum. Quocirca nulli equidem dubium esse puto, quin Fuchsius hac in re deceptus sit:
nisi seplasia Tubingenses pro Hermodactylo aliam vsurpent radicem ab ea, quam hactenus in reliquis Germania pharma-
copolis vsurpari vidimus. Caterum Ephemerum, quod syluestrem Irin appellant, in Ananienfibus montibus tam in pra-

* VI. HERMODACTYLI
Officinarum radices. *

VII. EPHEMERVM.



Fuch. erratū,
lilium conuallium E-
phemerum
vocantis.

is, quam in syluis copiose nascitur, vbi indigenis vocatur vulgò Giglio matto, hoc est, Lilium stultum. Huic certe nisi ma-
fallit iudicium, omnes prorsus nota conueniunt, quae alteri Ephemero à Dioscoride tribuuntur. Hinc itaque fit, vt in hoc Fu-
chsius aperte errasse deprehendatur, qui plantam vulgò Lilium conuallium vocatam, Ephemerum alterum, & non lethale
esse contendit. Quandoquidem illud folia lilio latiora, non autem angustiora, & dissimilia profert: caulem non lily modo,
sed gracilem, & staminis instar tenuem: radicem item exilem, quae capillaribus diuiditur fibris, tantum abest, vt digiti
crassitudinem aequet, qualis in Ephemero requiritur. Praeterea neminem adhuc reperi, qui tradat Ephemerum flores fere
suauiter olentes: cum tamen Lily conuallium dicti flores adeo iucundum spirent odorem, vt eius gratia ab omnibus maxime
expetantur: id quod nunquam silentio praeterisset Dioscorides in re herbaria grauissimus author, praesertim quod ea nota
fuisse Ephemero insignis & notabilis. Ex his igitur colligendum esse putauerim, non solum Fuchsiū in aperto errore re-
sari, sed reliquos etiam, qui Lilium conuallium vocatum Ephemerum esse contendunt. Sed ad Colchicum reuertamur. Flo-
ret hoc autumnali tempore floribus croco emulis, nullis tamen emissis folijs, nisi appetente vere, quo tempore subrubrum gi-
gnit semen, quibusdam folliculis inclusum, iuglandium similitudine. Verum hoc tempore radix ei dulcis non est,
quemadmodum in autumno, sed lacte pregnans, & amara inuenitur. Quare hic cogimur dicere & fateri, quod
hoc non obseruauerit Dioscorides, vel saltem, quod indictum id omiserit. Plantam, quam hic excudi curauimus,
quamque Colchicum Constantinopolitanum vocauimus, misit ad me vir clarissimus Augerius de Busbecke, qui cum
Bizantio secum detulit Viennam: libuit itaque hanc appellari Colchicum, quod bulbosam radicem habeat manife-
ste fissura diuisam: folia vulgaris Colchici, & flores etiam fere similes. Porro in communem illam hallucinationem
antè explosam deducti sunt & Patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui nullam
faciant differentiam inter Colchicum & Hermodactylum, idque aperte asserunt. Quorum etiam auctoritate fieri
pharmacopola adduci possunt, vt cum maximo humanae vitae detrimento Colchicum catapotys immiscant. Quare
CAMEL

Monachorū
hallucinatio,
qui Colchicu
& Hermoda-
idē faciunt.

cauant meo consilio Epilastari, neq; facile fidant ijs, quos magis decet libros sacros, quam medicos euoluere. vt animalis potius quam corporalis medici sciant. Caterum Colchici floribus, vt audio, vtuntur iherosolimitani velunt: ce. e. r. m. v. o. m. e. o. n. t. e. o. j. p. o. t. e. o. a. d. e. o. s. t. u. p. i. d. i. r. e. d. d. u. n. t. u. r. v. t. i. n. e. c. l. a. s. t. i. n. a. b. e. a. n. t. Vtuntur Ephemerum: menunt Galen. lib. 6. Ephemerum: v. res ex Gal.
 Imp. med. sic inquit: Ephemerum non illud lethale seu deleterium, quod & Colchicum vocant, sed alterum. quod & I-
 r. m. a. p. e. t. e. m. e. g. n. m. a. t. i. s. t. e. l. l. a. & caulem luto similem ol. tiner: radicem oblongam non rotundam seu Colchicum, agi-
 ti potest inueniri in iherosolymis: autem adstringens, & boni odoris. Ex quibus palam fit, quod in de sit facultatis, tempera-
 tione, temperata, & habitu digerentis. Testificatur vero ad opera, quae particulatum edat. siquidem non in officina
 eret radix eius in dentium doloribus colluitur: & folia tuberculorum tum augmento, tum vigori congruunt. Oportet au-
 tem ea in vino decocta, priusquam pus moueas, illinere. *Planta, qua Graeci $\rho\epsilon\delta\chi\iota\alpha\varsigma$, Latinis Colchicum siue Ephemerum,*
 10 *& Tubus agri, vocatur: Officinis falso Hermodactylus: Arabibus Surugen: Italis Colchico & Zaffarano saluatico: Ger-* Nomina.
manis Zetsloß vnd Wudsaffranblum: Gallis Mort au chin, chien & chiennee. Quam verò Graeci $\epsilon\phi\acute{\eta}\mu\epsilon\rho\varsigma$, Latini t-
em Ephemerum dicunt, & aliqui syluestrem Irim appellent: Itali Ephemero, Giglio maro: Gallis Flambe blanche
sanage. At quae recentioribus Graeci $\epsilon\pi\iota\sigma\tau\acute{\alpha}\nu\tau\epsilon\varsigma$, Irimus quoq; Hermodactylus appellatur: Italis Hermodattilo: Mau-
ritanis, Surugen vel Surengiam, ita tamen vt hanc cum colchico aperte confundant.

Colchicum à loco natali dictum, plurium est specierum, vt suo ostendetur loco. I. Colchicum com-
 mune. C.B. Colchicum Matth. Trag. Fuchf. Turn. Dodo. gal. & sol. Lacu. Gef. hort. (cui & Hermoda-
 ctylus Arabum) Cordo in Diosc. (cui & officinarum Hermodactylus) Lon. Castor. Thal. Colchicum siue
 Strangulatorium & Ephemerum Crocifolium, Lob. Colchicum masculinum & foemininum, Tab. Col-
 chicum nigrum Cord. in hist. Primula veris, Brunfel. Ephemerum, Gef. hort. Castor. quoad iconem i Her-
 modactylus vulg. seu Hermodactylus rotundus niger Meisner. Casalpino. Flore est purpureo, ramis al-
 bo, radix siccata alteri nigra, alteri inalbicans, alteri candidissima, alteri subrubens: Sic et quod flore albo
 est radix siccata alteri inalbicat, alteri candidissima videtur, nulla alia differentia obuemente. II. Colchi-
 cum Alexandrinum. C.B. Colchicum alterum Orientale, Matth. Lugdu. Colchicum Syriacum Alexan-
 drinum. Lob. Colchicum Syriacum Alexandrinum Orientale, Tabernæmontano. III. Iris radice ex
 multis tuberculis composita. C.B. Hermodactylus vetus, Matth. Lugd. Taber. Hermodactylus. Matt.
 in Compen. Camer. Iris tuberosa, Dod. fol. Lugd. Lob. cui & Lonchitis prima Dioscoridis secundum
 Aldroandum. Lonchitis maior, Cast. Satyrium, Casalpino. IV. Pseudohermodactylus, Matt. hunc
 imitari sunt Lugdunensis & Tabernæmontanus: at videntur nil aliud exprimere, quam Dentem caninū,
 30 cuius figuram adposuimus: etsi enim binæ iungantur radices, haec tamen singulas in singulis plan-
 tis notauimus. Dens caninus primus, C.B. Hermodactylus Meisner, Gef. hort. Satyrium erythronium,
 Lob. Tab. Satyrium rubrum, Lugd. Satyrium trifolium sine album. eisdem. Satyrium Dalechampii, ei-
 dem. Dens Caninus, Dod. fol. Casal. (cui & Mithridation primum Crataeum apud Plinium) Cam. Den-
 tale primum, Clusio histo. Pannonica. Variat colore floris candido, purpurascete, aut utroq; colore
 mixto: folia aliquando maculata, communiter bina, nonnunquam terna: Italicus speciosiora habet fo-
 lia quam Sabaudicus. VI. Hermodactyli officinarum radices. C.B. Hermodactyli non venenati officina-
 rum, Lob. in icon. Hermodactylus officinarum, Taber. Hermodactylus orientalis, Casalpino. Haec
 radices albæ, ruffæ & nigrae reperiuntur, sed eligen-
 dæ, quæ foris & intus veræ albæ sint, crassæ modi-
 ceq; duræ: de quibus Meisner Hermodactyli candi-
 di, crassi & pleni nomine: at Serapio sub Hermoda-
 ctulo albo, & Paulus Aegineta sub Hermodactulo,
 explicarunt. VII. Ephemerum, Matth. Lacu. Ta-
 ber. Ephemerum non lethale, Lugdunensi: Lobe-
 lus plantam quandam proponit Ephemerum Matthio-
 li nomine, minimè Matthioli figuræ conuenientem:
 vtramq; necdum vidimus.

HELXINE.



ΕΛΞΙΝ. HELXINE. CAP. LXXXI.

HElxine nascitur in parietinis, sepibus & mace-
 riis: folia ei mercurialis insunt, hirsuta: caulicu-
 li subrubentes, & circa eos veluti semina aspera, ad-
 haerentia vestibus. Folia refrigerandi, spissandiq; na-
 tum habent: qua ex causa sanant illitu sacros ignes,
 adusta, condylomata, panos incipientes, tumores,
 inflammationesq;. Succus eius cum cerussa, ignibus
 sacris & vlceribus quæ serpunt, commodè illinitur:
 imponiturque podagris cum hircino adipe, aut ce-
 rato cyprino: veterem tussim emendat, instar cyathi
 haustus: tonsillis inflammationem sentientibus vri-
 liter & gargarizatur, & oblinitur: aurium dolorem
 cum rolaceo, instillatus leuat.

HElxinen, quæ hic à Dioscoride describitur, officinarum Helxines
 vulgus Parietariam appellat. quod in adificiorum pa-
 rietibus, sepibus & maceris, arido solo nascatur. Alij, quod
 detergēdis vitreis poculis sit aptissima, Vitreolam nominant.

Parietariam officinalem

Helxine Plin.

Helxines vires Matth.

Helxines vires ex Gal.

Nomen.

Hæc planta omnibus notissima est, quare superuacuum esset, eam longiore historia representare. Verum alia ab hac, & longe diuersa est Helxine, quam Plinius lib. 21. cap. 16. inter aculeata retulit, & depinxit his verbis: Helxine vera vis est, nec in omnibus terris est: radice foliosa, ex qua media veluti malum extuberat, contextum sua fronde. Huius vertex summus lacrymam continet, iucundi saporis, acanthum in misfichen appellatam: hæc Plinius. Helxina vis est magna ad valnera recentia sananda. Siquidem si recens semicontusa vulnere adalligetur, & tertia die soluat, non erit opus alio medicamento. Eiusdem succus defecatus potus trium vnicuarum pondere cum saccharo, remorantem suppressamq; urinam in modum prouocat, adeo, vt miraculum videatur, & renes abscegit. Eadem super regula ignita calefacta, vniuerso cretico irrorata, & pubi illita, calculosis, & urinae malo affectis misfice auxiliatur. Additur in clysteribus vtiliter, qui ad ventris & vteri dolores parantur. Succus in ore detentus dentium dolores mulcet. Stillatitia eius aqua faciem abstergit, & claritatē addit. Helxines vires tradidit Galen. lib. 6. simp. med. sic inquit: Helxinem aliqui Perdicium nominant, alij Partheniū, alij Sideritum, sunt qui Heracleā appellent. Caterum vis ei inest alstergendi & leuiter constringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrē phlegmonas omnes in initio & augmento sanat vsq; ad statum, & maxime si calida fuerint. Quinetiā incipientibus phygethls cataplasmatu ritu illinitur. Succus quoq; eius cum rosaceo ad aurium dolores phlegmonos, mediocriter prouerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhmia. Sunt verò etiam ex medicis quidam, qui hys, qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerint. Certe euidentis extergendi experimentum prebet, & in vasis vitreis. Herba, quæ Græcis ἐλξίνη καὶ περιειρία, Latinis item Helxine appellatur: Italis ac vulgo Parietaria & Vttriola: Germanis Tag vnd Nacht: Hispanis Terua del muro: Gallis Paritoire vel Parietaire.

Parietaria, ἐλξίνη ab aspero semine dicitur. Helxine, Matt. Brunf. Anguil. Fuchf. Dod. gal. Ges. hor. Lacu. Lob. Castor. Lugdu. Cæsalp. Camer. Helxine altera & muralium, Cordo in Dioscor. Parietaria, ut Brunf. (cui & septima Parthenii species) Trag. Turn. Cordo in histo. Dodo. fol. Taber. Herba muralis, Celso. Helxine & Perdicium Galeno & Plinio. Huius maior & minor species est: cui fluuiatilem maiorem & minorem Thalyus addit:

Ἀλσίνη.

ALSINE.

CAP. LXXXII.

† Orib. ita legitur conclusa. ἔχει παραμοία ἐλξίνης φύλλα ἀπειριότερα δὲ καὶ μικροτέρα. i. habet ad similia helxine folia, humiliora tamen & longiora.

Alsine, aliqui Anthyllion, nonnulli myosota vocant, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis, opaciq; gaudet, vnde Alsine dicta est. † [Hæc erat eadem, quæ helxine, nisi humilior esset, & foliis longioribus], nec hirsuta: cum teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur: quibus & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

I. ALSINE.

* II. ALSINE ALTISSIMA. *



Alsines consideratio.

Alsine ea nimirum herba est molliscula, quæ Hetruscis Centone, alijs verò Pauarina, alijs Pizaga gallina, alijs Centonice vulgo appellatur. Et quamuis Dioscorides vnã tantum Alsinem representauerit, plura tamen eius reperuntur genera, quæ in maiora & minora diuidi possunt. Porro habentur quedam Dioscoridis exemplaria, in quibus caput hoc legitur in calce libri secundi statim post Muru auricula mentionē. Sed nos, vt eo in loco latius diximus, hanc suã veram ac genuinã

germanam selem esse censemus: ex oleo chamamelino seruesceta illinitur vtiliter ventri contra tormina, & vteri dolores. Alines meminit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, ita de eius virtute scribens: Alfine aut Myosota similem virtutem faciliatem obtinet. nempe refrigerantem & humectantem: est enim essentie aquea frigida: quare & vtra ad frictionem refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas, & mediocriter visipelata competit. Hac ἀλίνη Graec. vt etiam Alfine Latine dicitur: Italicè Centone & Pauarima: Germanicè Hünerdarm vnd Vogelkraut: Gallie Mouron.

Alfines vires ex Gal.

Nomina.

Alfines vnus licet Dioscorides & Plinius meminerit, attamen differentias viginti quatuor in nostro Phytopinace proposuimus. I. Alfine media, C. B. & Dod. gal. Tab. Alfine Matth. Lac. Geshort. (cui & mortas gallinae femina. laeuis & alba) Lon. Lob. Castor. Lugdu. Alfine maior, Fuchf. Alfines primum genus, eidem in iconibus. Alfine minor, Dod. fol. Alfine minor recentiorum, Lob. in icon. Morius gallinae primum genus, Trag. Hippiam minor, Cord. in historia. II. Alfine altissima, C. B. Ex fibrosa radice plures caules bicubitales, saepe etiam humanam altitudinem aequantes, si sustentacula quibus niti queant, consequantur, exurgunt: quos folia ampliora longioraq; quam in praecedenti, cingunt: flores candidi stellati ex quorum medio stamina ruffa emergunt, oblongis cauleculis insident: quibus vascula oblonga, semen minutum luteum continentia, succedunt, frequens est in frutetis, locis humidioribus. Dicitur Alfine maior, Dodo. gal. & fol. Lugd. Camer. in suo Matthiolo, Taber. Alfine maxima, Lobelo in iconibus. Alfine media, dici poterit aquatica, Thal. Morsus gallinae maius, Brunf. Morsus Gallinae secundum genus, Trago. Centunculus viticulis cubitalibus, Celsalino. An Alfine genuina Dioscoridis, & Centunculus Plinii?

20

καρὸς δὲ τῶν τελευμάτων.

LENS PALVSTRIS.


CAP. LXXXIII.

LENS PALVSTRIS. **L**ens palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulae similis, refrigeratoriae naturae. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta: glutinat & prociencia puerorum interanea.

I. LENS PALVSTRIS.

II. LENS PALVSTRIS

altera.



60 **P**alustris lens, quam officina, & herbariorum vulgus Lenticulariam appellant, notior omnibus est, quam vt pluribus describi mereatur. Ea plerumq; stagnantibus aquis innatat, usq; praesertim, qua vrbes & oppida cingunt. Folio crescit rotundo minuto, lenticula simili, paruo ac tenui inherens capillamento. Hac si, vt quandoq; fieri solet, aquarum inundationibus & resistentibus aquis in fluentes transferatur, simul ac littoribus inherit, mirum in modum propagatur. Nam subnatis quibusdam capillamentis, qua radice vices prestare videntur, sese terra committit, & subinde adolescens, tandem cre, ut in plantam aquatico sifimbrio haud absimilem. Id quod natura operum indagatores non sine admiratione obseruarunt. Magnificiunt quidam pumile huiusce plantula stillaritam aquam, ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres. Quinetiam eandem praeserunt ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum, & testiculorum collectiones, anteaquam augeantur: namq; illa non obscure fluentes humores repellit. Herba ipsa recens ex aquis allata & froeti adhibita, capitis dolores mulcet, vbi a calore prouenerint. Vescuntur ea anseres & anates magna

Lentis palustris confid.

Lentis palustris transmutatio.

Lentis palustris vires,


Lens palustris altera.

Facultas ex Galeno.

Nomina.

voluptate, ac pariter gallina, ubi ex aquis exempta, fursuribus admisceatur. Est & ALIA planta in palustribus, lacibus & ceteris stagnantibus aquis quoque nascens, quam palustrem quoque lentem appellare libuit, à seminis figura. Hæc caulem gerit aquæ repentem, angulosum, à quo per intervalla plura cateruatim oriuntur folia, longis ac tenuibus pediculis nictaria, quæ quaterna, crucis in modum sese pandunt, rotundo cacumine. Semen profert in racemi modum in ipso caule, intrapensum, densum durumque. Ego hanc plantam acceptam refero Iacobo Antonio Cortuso. Nihil habeo, de qualitatibus & viribus, quod probare possim, non tamen ambigo, quin sit frigida humidaque, temperaturæ. Lentis palustris non nisi temporaturæ est, vtringque ex secundo quodammodo ordine. Quæ lens palustris Latinis: φακός ὀβρι τῶν τελευμάτων Græci vocatur: Arabibus Tabaleb seu Thaleb: Italis Lente de paludi: Lente aquatica & Lenticularia: Germanis Wasser lensen: Hispanis Lenteya dellagoa: Gallis Lentille de mer. At lens palustris altera, Italis Lente palustre del seme.

* III. LENS PALVSTRIS tertia. *



Lentem palustrem triplicem exhibemus. I. Lens palustris, Matth. Anguil. Dod. gal. Turn. Lacu. Cor. do in Diosc. Lonic. Lobel. Castor. Lugdun. Lens lacustris, Dodo. fol. Lenticula aquæ, Brunnf. Lenticula aquatica, Thal. Lenticula palustris, Trago. Tabern. Cæsalpino. II. Lens palustris quadrifolia (quamvis sex foliis in Sungouia stagno reperimus) C. B. Lens palustris altera, Matth. Lugdu. Lens palustris, Castor. Lenticula alterum genus, Cæsalp. Lenticula palustris secunda, Tabern. Lemma Theophrasti, Lugdunensi. III. Lens palustris tertia, cum in Italia fossis frequens sit, & à nemine præta, ipsius hircionem (meliorem ea quam in Phytopinace exhibimus) cum descriptione addere placuit. Hæc foliis est copiosis subrotundis, coniugatis in ramulis digestis, eleganter virentibus, punctis minutissimis superne notatis, quibus inferne copiosæ lenticulæ adhaerent, quæ aliquando singulæ, aliquando ternæ & quaternæ, rugoso & tenui cortice donatæ, quæ semen copiosissimum minutissimum & flavescentes continens ab ipsis ramulis filamenta radices constituentia, deorsum spectant: sapore est aqueo. Aquis supernatur ut in fossis Patauinis videre est: meminit Cæsalpinus hanc fluitare & cum aqua incidere Pisis in Auxenti fluuio, qui aquas thermales ex monte Sancti Iuliani recipit, qui Stratiotem aquaticam esse apud Dioscoridem, censet.

a Meum legit tantum. ὀβρι τῶν ὀφθαλμῶν. i. in oculorum lippitudine ut Cateuz. ὀφθαλμῶν ἰφαίμων. i. oculorū suffusione. Neuter autem legit sanguinis vitio conceptis. a Cat. addit. ἐν τάφοις. i. in sepulchris. b Cat. legit μακρὰ. i. longa. c Or. πολλά. i. multis.

Ἀείζων μέγας

SEDVM MAIUS.

CAP. LXXXIIII.

SEMPERVIUM magnum ideo nominatur, quoniam perpetuo folia vireant: cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virentes, characiæ tithymali modo infecti: folia pingua, carnosæ, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi: nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feritur. Eius vis refrigerare & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus, cum polenta, aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam aluique profluvia: teretes tineas potus in vino excutit: subditus invellere, mulierum abundantiam sistit. Succus a oculorum lippitudinibus: sanguinis vitio conceptis, inungitur.

Ἀείζων μικρὸν

SEDVM MINUS.

CAP. LXXXV.

SEMPERVIUM paruum in petris, parietinis & maceriis, necnon a scrobibus opacis nascitur, caulis ab vna radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus foliis, b rotundis, pinguibus, mucronatis: caule a medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidosque flores, c & tenues gerente. Folia eadem cum priore viribus prædita sunt.

Ἀείζων εἰδος τρίτον

SEDI GENVS TERTIVM.

CAP. LXXXVI.



TERTIVM videtur Semperuii genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion vocaverunt. Romani illecebram, pusillis crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ proximis: nascitur in saxis. Vni ei excafactoria, acris, exulcerans: illita cum axungia strumas discutit.

Sedi genera & confid.

EX tribus Sedi, siue Semperuii generibus, quæ hoc loco à Dioscoride pinguntur, primum & alterum omnibus nota sunt. Vtrunq; officina Semperuium appellant, addita maiorum & minoris differentia: quamvis non desint, qui minus



I. SEMPERVIVVM
maius.

III. SEMPERVIVVM
minus, mas.



II. SEMPERVIVVM MI-
nus femina.

IV. SEMPERVIVVM MI-
nimum.




Sedum sempervivum

*Sedum acer-
rimum*


60 *nus Vermicularem, Crassulamq; herbam vocent. Minoris duo visuntur genera. Alterum, cuius Dioscorides meminit, fo-
lyis crassioribus, longioribus, rarioribusq;, facie nucleus pineus a putaminibus repurgatis similibus, vnde quibusdam vul-
go etiam Pignola dicitur. Caules fert tenues, pluresq;, in quorum caumine flores exeunt herbacei, seu subcandidi, um-
bella diuulsa modo. Alterum folijs breuioribus, angustioribus copiosioribusq;, floribus melius, eodem ordine prodeuntibus.
Hoc marem, illud feminam recentiorum quidam existimant. At tertium, quod mihi iamdiu incompertum exitit,
cum vsq; adeo excalescat, vt carnem exculceret impositum, a ceteris longe facultatibus distidet. Huius varia in Dioscori-
dis locis legitur historia: ceterum nos Aldinum exemplar secuti, hinc ea abdicauimus, quae adulterina censentur. Nec
de, ut qui crederent, tertium hoc Dioscoridi esse spurium, quod duorum tantum meminerit Galenus. Veruntamen ePisis *Sedum acer-
rimum.*
hoc anno tertium Sedi genus, gustu sane acerrimo, adeo vt linguam exculceret, ad me misit Lucas Ghinus Forocorneliensis
medicus rei herbariae peritissimus qui illi planta hac verba subiecerit, quae hic referam eius humanitate fretus. Visitur, in-
quit, in viridario Illust. Ducis Florentiae quoddam tenuissimum Sedi genus, gustu nihilo minus acri, quam ranunculi omne genus
quod etiam in antiquis adfictorum parietibus, & saxorum rimis prouenire conspexi. Hoc, meo iudicio, tertium est Sedum. Sed cum*

Dioscoridis verba hoc loco obscura sanè, & intellectu difficilia habeantur, iamdiu vnà cum alijs plerisq; qui hac simplici-
 cium facultate maximè delectantur, plurimum laboris impendi, vt tertium Sedum consequi possem, cui folia inueni-
 suta, & facie portulacæ similia. Caterùm cum postea attentius, diligentiusq; Dioscoridis verba perpenderem, sic Latine
 nare videntur: Est & tertium sedi genus, quod portulacæ respectu, folia edit pinguiora, densioraq; &c. Quibus cum hanc
 dederim sensum, qui, mea sententia, propriam Dioscoridis mentem explicat, tertium hoc sedum facile mihi se se obtulit
 cognoscendum, vt omnibus quoq; id ipsum euenire haud quaquam dubitauerim, qui Græcam dictionem δασία δασία non
 hirsuta exposuerint, interpretatiq; fuerint πρὸς τὰ τῆς ἀνδρῶν πύχνης ad folia portulacæ collata. Nam huiusce tertij sedi folia,
 portulacæ folijs comparata, ijs densiora, crassioraq; facile cernuntur. Hactenus amicus ille. Cuius certè sententia non pos-
 sum non adstipulari, quippe qua doctissimis rationibus nitatur, & ipse sit apud me grauis testis. Semperuiui mentionem
 fecit Theophrastus lib. 17. cap. 9. de plantarum historia, sic inquit. Semperuiuo datum à natura est, quod humidum
 virideq; semper durare valeat. Folio carnosio, leui atq; oblongo id constat. Planis parietinis nascitur, nec non & in regu-
 lis, cum terra confluuium quoddam arenaceum factum est: hac Theophrastus. Caterùm duas ARBORESCENTIS
 SEMPERVIVI plantas, quarum imagines hic appingi curauimus, alteram, que maior & fruticosior est, Clarissimo vno

V. SEMPERVIVUM ARBO- rescens.



VI. SEMP. ARBORE- scens alterum.



Sedi vires ex
Galeno.

Nomina.

Augerio de Busbeke Flandro, qui eam Constantinopoli secū adduxit, cuius patet forma, ex hic appicta imagine: altera vero
 Iacobo Antonio Cortuso, viro optimo atq; doctissimo, cui Corcyra allata est, acceptas refero. Sedi vires descripsit Gal. lib. 6.
 simplicium medicamentorum, his verbis: Αειζον vtrung; tum maius, tum minus, desiccatur quidem leuiter, quandoqu-
 dem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers, quare in eo plus ceteris abundat essentia
 quea. Caterùm non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipela
 & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. Semperuiuum siue Sedum maius quod Latini vocant, Græci
 ἀειζων μέγα: Mauritanii, Bei alhalen, seu Hai alhalez: Itali Semperuiuo maggiore: Germani Groß Hauswurk: His-
 pani Semperuiua & yerua puntera: Galli Ioubarbe. Quod vero Græci ἀειζων μικρόν, Latini Semperuiuum, siue Sedum
 minus dicunt: Itali Semperuiuo minore: Germani Klein Hauswurk: Galli Ioubarbe petite. Quod deniq; Græci ἀειζων
 εἰδος τρίτον Latinis Semperuiuum minimum Semperuiui siue sedi generis tertium appellatur: Arabibus, Alsebram, Ham-
 drachabara & Tilafon: Italis, Semperuiuo terzo: Herba grassella siue Semperuiuo minuto. At semperuiuum arborescens:
 Italis Semperuiuo arboreo.

Et si Semperuiui species viginti quinque in Phytopinace recensuerimus, plures tamen in historia
 vniuersali nostra enarrabimus. I. Semperuiuum maius vulgare, C. B. Semperuiuum maius, Matt. Brunf.
 Dod. gal. Cæf. Lob. in icon. cui & Sedum maius crenatum Myrtifolium. Semperuiuum, Gef. her. Len.
 Castor. Semperuiuum maius alterum siue Iouis barba, Dod. fol. Aizoon siue Semperuiuum maius. Lob.
 Camerar. Thal. Aizoon seu Sedum flosculis purpureis, Trago. Aizoon maius, Lugdu. Sedum maius
 Fuch. Turn. Cordo. in Dioscor. (cui & Vitalis maior) Lacu. Taber. Sedum seu Superuiuum vulgare ma-
 ius, Gef. hort. Umbilicus Veneris alter, Anguil cui & Onobletum Hippocratis. Hoc quidam Cotyledo-
 nis speciem faciunt: at Aezoon magnum Dioscoridis, & Aizoon Theophrasti & Plinii & Ζωσβαλμο
 Apuleii censemus. II. Sedum minus teretifolium album, C. B. Semperuiuum minus famina,
 Matthioli. Semperuiuum famina, Brunfelsio: Semperuiuum minus album, eidem. Semperuiuum minus
 alterum

... Dodonæo folio. Semperuium minus. Anguillare, Castor. Semperuium quartum. Lonic.
 ceto. Sedum minus primum, Trago. Sedum minus femina, Fuchio. Sedum minus Lacuna. Se-
 dum minus alterum, Gef. hor. Sedum femina, Turnero. Crassula minor, Dodonæo gal. Vermicula-
 ris. Illecebra maior, Lob. Lugd. Vermicularis flore albo, Camer. Aizoon minus femina, Lug. Tra-
 go. herba, Cor. in Dioscoridem. III. Sedum minus acuto folio, flore luteo seu Sedum minus Dioscoridis,
 C. B. Semperuium minus mas, Matth. in Commentariis non addita figura. Semperuium minus. Dod.
 gal. Semperuium minus primum, Dod. fol. Sedum minus mas, Fuch. Sedum minus, Turn. Sedum mi-
 nus hamatoides, Taber. Aizoon hamatoides. Lob. in icon. Aizoon minus. Lugdunensi. IV. Sedum
 minimum acre. seu Sedi tertium genus Dioscoridis. C. B. Semperuium minimum, Matth. Lob. Cast.
 10 Cast. Semperuium minus flore luteo, Brunf. cui & mas. Semperuium secundum, Lonic. Sedi mino.
 minus tertia species & Vermicularis, Trago. Sedi tertium genus, Fuch. Lacu. Turn. Sedum tertium Di-
 oscoridis succo acri & erodente, Gef. hor. cui & Telephium dictum. Sedum minimum, Taber. Aizo-
 minoris species altera, Cord. in Dioscoridē. Aizoon minus acre, eidem in histo. Aizoon minus alterum
 ferudi gustus. Thal. Aizoon minimum repens, Lugd. Illecebra, Dod. gal. & fol. Gramen tertium Plinii
 Anguillare, cui & Semperuium tertium. Hoc duplex habetur, aliud gustatum paulò post fauces exurit:
 aliud verò penè insipidum est. V. Semperuium arborescens, Matth. Castor. Semperuium maius, An-
 gual. Semperuium siue Sedum arborescens maius, Dod. fol. Semperuium maioris alterum genus. Cæfol.
 Sedum maius verum, Gef. hor. Sedum maius, Clus. histo. Hispa. Sedum arborescens maius Græcum,
 Lobel. Aizoon arborescens, Lugd. Camerario. VI. Semperuium arborescens alterum, Matth. Castor.
 20 & Lugd. hoc an à priori diuersum sit dubitamus.

Κοτυλιδών.

VMBILICVS VENERIS.

CAP. LXXXVII.

Cotyledon, siue Umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, a ineuidenter concauo, αλειθότως:
 breui [in medio] cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. i latenter ca-
 circumlitus infillatasve, contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernioni- uum.
 bus, illi auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comela, calculos frangunt, urinam Conclusa νό
 cent: hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. legit Oris.

Κοτυλιδών ἕτερος.

VMBILICVS VENERIS ALTER.



CAP. LXXXVIII.

EST & alterum Umbilici Veneris genus, cymbalion aliqui vocant, pinguibus foliis, latioribus, lig-
 larum modo, dentis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperui-
 no, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores, & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem,
 quæ Semperuium.

δ ταύτης ἐ-
 τῶν φύλλων
 ὀχυλός. i.
 huius & foli-
 orū succus:

I. VMBILICVS VENERIS.

II. VMBILICVS VENERIS alter.



Cotyledon Umbilicus Veneris

Cotyledon altera Umbilicus Veneris

Vmbilici Veneris vtriusq; consideratio.

Officinarum error

Cymbalaria mentio.

Vmbilicus veneris, quem primo generi assignant, frequens nascitur in vniuersa fere Hetruria, saxis, & vetula aliorum parietibus. Huius folia, quod fictilium operculis similia sint, vulgò Senensis appellant Copertouole. Verò eius genus à quibusdam Cymbalion vocatum, vidimus primum in Foro iulienſium ciuitate Austria, in horum excellentissimi medici Iuliani à Marostica Teruſiensis. Hanc porro plantam in pluribus montibus saxu & petri harentem inuenimus. Cui, meo quidem iudicio, omnes prorsus conueniunt nota, quæ alteri vmbilico Veneris tribuuntur. Caterum apud Insubres officina legitima Cotyledonis, siue vmbilici Veneris loco herbam quandam in antiquis, vnguentisq; edificiorum parietinis, & maceris & saxis nascentem vsurpant, quæ ex ijs eminet, & come modo dependet, cuius folia numerosis, tenuibus, funiculi instar prelongis, lentis, è quibus folia prodeunt hederacea, pingua, longis tenuibus pediculis nitentia, flosculis paruis, lutescentibus, qui è tenuissimis quoq; pediculis emergentes, clauicularum modo implicant. Facultatis est humida, frigidaq; cum adstrictione quadam. Hanc forte quod Cymbalaria vulgò

III. VMBILICVS VENERIS alter.



IV. CYMBALARIA.



Fuchſii hallucinatio.

Vmbilici Veneris vires ex Gal.

Nomina.

cetur, putant à Cymbalio corruptè nomen traxiſſe, & ideo verum Veneris vmbilicum eſſe. Non deſunt tamen rei herbaria periti, qui ijs pollere facultatibus hanc herbam velint, quibus & Cotyledonem, quarum opinioni ego haud reſiſtens. Atqui valere eam ad alba vteri profluua certò ſcimus, vbi herba ipſa recens pluries in acetarijs deuoretur. (vt Itali ſolent in ipſius cana principio. Fuchſius quoque in hac re hallucinatus deprehenditur, quòd in paruo ſuo libro, in quo plantarum duntaxat imagines expreſſit, pro vtroq; Vmbilico Veneris eas nimirum plantas depinxerit, quæ nonnullis vulgò Fabaria & Fabæ crasſe appellantur: quas tamen prius in ſuo de ſtirpium hiſtoria commentario pro Telephio oſtenderat. Verum tam prima, quam altera eius opinio, vt dicam quòd ſentio, mihi plane reprobanda videtur. Quemadmodum & tenuis eiusdem de eadem ſententia, quam non ita pridem protulit in eo libro de compoſitione medicamentorum, quem poſtmodum auctum excudit. Ibi enim putat Fuchſius, Acetabulum alterum, ſiue alterum Vmbilici Veneris genus, eſſe Fabariam, quam vulgus & ſeplasia Crasſulam maiorem nominant. Sed quòd is in magno verſetur errore, manifeſtum ſit ſaxa Dioſcoride. Quippe qui Cymbalio, ſeu alteri Veneris Vmbilico, folia reddiderit denſa circa radicem, quæ medium eius ambitum deſcribant, vt in maiore ſemperuiuo: cauliculum verò tenuem, in quo flores & ſemina hyperici. Quæ tamen nota in Fabaria, aut Crasſula maiore deſiderantur. Siquidem hæc folijs conſtat horteniſis portulacæ maioribus, quæ cum ſemperuiuo nullam habent fere ſimilitudinem, nec oculi formam deſcribunt: caulem præterea emittit crasſum & firmum: radicibus deniq; nititur pluribus, aſphodeli proximis. Vmbilici Veneris meminit Galenus lib. 7. ſimplicium medicamentorum, ſic inquit: Cotyledon facultatis miſta eſt, nempe humida ſubfrigida, & cuiusdam obſcure adſtringentis: & cum ea leuiter amara: vnde refrigerat, repercutit, abſtergit, & diſcutit. Itaq; phlegmonas eryſipelatodes, & eryſipelas phlegmonode curat: & maxime ſtomachi ardore aſtuantis admodum vtile eſt epiploica. Putantur folia cum tarta manducata calculos confringere, & vrinam mouere. Κοτυλὸν δὲν ſic Græce, Latine vero Acetabulum, & Vmbilicus Veneris nominatur. Italice Ombilico di veneri: Hiſpanice Scudetes: Gallice Eſcudes. Quæ verò Κοτυλὸν δὲν ἑτέρα Græcis, i Vmbilicus Veneris & Acetabulum alterum Latinus appellatur.

Cotyledon à figura folii nomen accepit. I. Cotyledon maior, C. B. Vmbilicus Veneris, Matth. Lac. Turn. Lob. in icon. Caſt. Tab. Cæſal. Lug. Vmbilicus Veneris maior Lonic. Vmbilici Veneris prima ſpecies, Angul. Cotyledon vera, Dod. gal. Cotyledon, Lob. Dod. fol. Cluſ. hiſt. Hiſp. Herba Cotyledon

etiam nonnullis, Scutum caeli, Manlio. II. Cotyledon media foliis subrotundis, C. B. Umbilicus Veneris alter, Matth. in prima editione, & iis quæ minores figuras habent, Lacu. Cotyledon altera Dodo. Gallico & folio quo ad iconem, tertia quo ad descriptionem. Cotyledon altera Matthioli, Clus. hito. Panno. Lugdu. III. Cotyledon media foliis oblongis serratis, C. B. Umbilicus Veneris alter, Matthiolo in maioribus iconibus quo ad folia, caules enim & flores adpositi, sunt præcedentis plantæ, Umbilicus Veneris minor, Lon. Taber. cui & Palmaria. Cotyledon minus Sedi folio, Lob. Cotyledon minus montanum Sedi folio, eidem in icon. Aizoum serratum, Cord. in hist. & Thal. cui & Crassula serrata Phyllon theligonum Dalechampii, Lugd. Phyllon primum, Casalpino. IV. Cymbalaria, Matt. Cat. Lugd. Cam. Casal. Cymbalaria vulgaris, Lac. Cymbalaria Italica folio hederaceo, Lob. Capnos prima Plinii, Hermolao: Umbilicus Veneris officinarum, Lon.

Αραλίφα.

VRTICA.


CAP. LXXXIX.

Dvo vrticæ genera. Altera syluestrior, asperior: latioribus, nigrioribusq; foliis: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, a minuto semine: Folia vtriusq; illita, canis moribus addito sale, medentur gangrenas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cum cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium cum faeco trita, & naribus indita: menses ciunt eadem detrita cum myrrha, & imposita: procidentes vulvas recortia contactu resiliere cogunt. Semen potum ex passo venerem stimulat, & vulvæ ora patefacit: cum melle delinctum orthopnææ lateris, & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia aluum emolliunt, urinas mouent, inflammationes discutiant: decocta cum pitana, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrha modico pota. Inflammatione turgentem vuam, gargarizatus succus reprimit.

a Meum.
λεπτοκαρπός
i. tenuiore semine.

I. VRTICA. I.


II. VRTICA. II.



Vrtica ad eò vulgaris notitie est, vt non modo interdium, sed etiam noctu in tenebris solo tactu ab omnibus facillimè cognoscatur. Proinde oper. pratium non est, vt hic pluribus eius faciem depingamus. Veruntamen ignorandum non est, quod etsi duo Dioscoridi tantum Vrtica assignentur genera, tria tamen in Italia reperiuntur. Prima asperior, altera non æquè aspera, & tertia omnium minima. Prima caule est rotundo, aspero, hispidoq;, ac pungenti: pilulas in caule gerit bifuturas, ac vrentes, in quibus semen gignitur. Prouenit calidis tractibus, aridis & incultis locis. Altera folijs prouenit, alterius similibus, verum non æquè asperis: semen profert racemosum ac minutum: caulem quadrangulum, asperumq;, tactu acuto, ac pungente. Nascitur vbiq;, iisdem cum altera est facultatibus: atqui peculi.riter seminis puluis, sanguinem cerebri membran. in anantem supprimit. Siquidem præter Vrticas à Dioscoride traditas, alia est, quam aliqui syluestrem appellant, ceteris acrior, & mordacior, folia profert ceteris similia, sed longè minora, acutiora, vrentioraq;: caule dodrantali, hispidiore, ac vrente, densioribus folijs, & in ambitu serratis. Nascitur secus edificiorum muros, in hortis, ac fere vbiq;, omnibus est hac nota. Vrtica vires memoria prodidit Gal. lib. 6. simp. med. vbi sic inquit: Vrtica, & huius herbe semen, tū folia (nā hac potissimum in vsū veniunt) digerentis sunt facultatis, ad eò vt et phymata, et parotidas sanent. Sed &

Vrticæ conf.

Vrticæ vires
ex Gal.
Sed &



Cardiacæ hi-
storia, & vires

Nomina.

Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & Venerem extimulant, & maximè vbi cum musto semen bibitur. Porro quod non vehementer calfaciat, sed admodum tenuium sit partium, testimonio est crassorum, viscosorumq; humorum ex peccare, pulmoneq;eductio, tum quòd partes, quas contigerit pruriant. Caterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta eadem concoquitur, nascitur: non enim actù flatuosa est, sed potestate. Ventrem autem modicè subducit duntaxat abstergendo, ac veluti titillando, non purgando. Et gangrenosa, & cancrosa, & in totum qua exiccari citra mordicationem possunt, ea conuenienter sanat: nimirum cum subtilium sit partium, & temperatura sicca, non tamen tantum habens caliditatis, vt iam mordicet. Et lib. 2. de alimentorum facultatibus, idem de vrtica ita scribit: Vrtica, herbarum agrestium vna etiam hæc est, tenuium vim partium obtinens. Iure itaq; nemo ipsa vt alimento vritur, nisi maxima premaxur sanu. Vtile autem est obsonium ac medicamentum, quod aluum deicit: hæcenus de vrtica Galenus. Sed quoniam herba quam hodie herbarij CARDIACAM nominant, nunc ob cognationem, quam cum Vrtica habere videtur, imbricamentem venit, ideo non alienū puto, quòd hic de ea quoq; aliquid disseramus. Hæc itaq; vrtica proxima est, tametsi quæ prope terram prodeunt, rotundioribus constet, ranunculi modo per ambitum laciniatis. Ei caulis est quadrangulus ramis copiosis pariter quadratis, in quo bina vtrinque folia paribus interuallis, ab imo ad summum exeunt, oblonga, vrtice similia, sed minora, & per ambitum serratoria. Flores, qui in purpura albicant, vrtica foetida, de qua sequenti capite dicturi sumus, non dissimiles profert, minores tamen: qui verticillato ambitu marrubij modo caulem circumdant ipso foliorum exortu. Radix in rubro pallefcit, alijs pluribus paruis radicibus adnatis. Prouenit vbiq; in rudibus iuxta cimitas, circa sepes, & post vrbium mœnia. Gustu vsque adeo amarescit, vt facile existimari possit ad secundum excalfactum ordinem, & ad tertium siccantium accedere. Præstat hæc, vt recentiores quidam tradunt, ad cordis affectus: vnde etiam apud vulgares nomen accepit. Medetur item conuulsis, ac resolutis. Obstructiones aperit, quas causa frigida induxit: vrinam ciet, & menses. Pectus à pituita detergit, & lumbricos necat. Caterum in puluerem folia contrita, & lamisfici cochlearis mensura ex vino hausta, difficile parientibus mirum in modum opitulatur. Vrtica sic Latinis dicta ἀλάφην Græcis nominatur: Arabibus, Huniure, Vraithlatum & Angiara: Italis, Ortica: Germanis Dreffel: Hispanis Ortiga: Gallis Ortie. Vrtica altera, Græcis ἀκαλύφνη ἑπίρα: Italis Ortica vulgare. At Vrtica tertia, Græcis ἀκαλύφνη τρίτη Italis Ortica minore. Sic Cardiaca, Germanis Herzhgespann: Gallis Gripaume, seu Cheneuse.

Vrtica ab vrendo dicta, quòd pruritus & pustulas igni similes acutissimis suis aculeis pungendo excitet. Sunt autem duplices, pungentes & non pungentes: pungens maior, minor, & tertia pilulas habens: non pungens alia fatida, alia non fatida: & hæc aut maculata, vel punctis aspersis, vel lineis folium diuidentibus: aut non maculata, flore albo, luteo, purpureo. Vrtica pilulas rotundas ferens, vel prima Dioscoridis, C. B. Vrtica prima, Matth. Lac. Cast. Lugd. Cæsal. Vrtica Romana, Trago. Fuch. Turn. Lonic. Lob. (cui & Vrtica syluestris semine Lini, in Iconibus) Cam. Taber. Vrtica vera, Fuch. in icon. Vrtica syluestris, Dod. gal. Vrtica mascula vel Romana, Gef. hor. Vrtica vrens prior, Dod. fol. II. Vrtica vrens maxima, vel secunda Dioscoridis, C. B. Vrtica secunda, Matt. Lac. Lug. Cast. Cæsal. Vrtica maior. Brunf. Fuch. Turn. Dod. gal. (cui & Vrtica femina & communis) Lonic. Thal. Taber. Vrtica syluestris asperior, Lobel. Vrtica syl. maior, Gef. hor. Vrtica vulgaris vrens, Trag. Vrtica vrens altera, Dod. fol. Vrtica Cordo in Dioscoridem. III. Vrtica vrens minor, Cania forte Plinii, C. B. Vrtica tertia Matth.

Matth. Lac. Lugd. Cast. Vrtica maior, Trag. Vrtica minor, Brunf. Fuch. Turn. Dod. gal. Cord. in hysto. Lon. Taber. Vrtica minor acrior, Lob. Vrtica vrens minima, Dod: fol. Vrtica exigua, Casalpin. o. IV. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophrasti, C. B. Cardiaca, Matth. Fuch. (cui & Lycoplis, Dod. gal. (cui & Sideritis prima) & fol. Lac. Lon. Lob. Cast. Lug. Caf. (cui & Alyssum Galeni & Aceti) Thal. Tab. Marrubium mas, Brunf.

Γαλιόψις



GALIOPSIS.

CAP. XC.

Galiopsis, frutex in totum caulem, & folia habet vrticæ, lauiora, & a quæ grauem odorem trita red- a Méum
dant: flore purpureo, tenui: nascitur circa sepes, ædificiorum areas, & semitas vbique. Folia, caules, *μαυρός*
semen succosus, duritias, & carcinomata dissipant: strumas, panes, & parotidas discutunt. Oportet *σεία*. i. vehe-
bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentia, gangrænas, & *μυή*. i. menter den-
tomias, cum sale efficaciter illinuntur.

I. GALIOPSIS.

II. SCROPHULARIA.



Galiopsin, eam equidem plantam crediderim esse, quam nos in Italia Vrticam fetidam appellamus, qua vbique ferè **Galiopsis**
prouenit, in ædificiorum areis, in plateis, iuxta semitas, & circa hortorum sepes, odore ingrato: vnde & fetida **consideratio.**
cognomen adinuenit. Quandoquidem hæc folijs, & caule constat vrticæ similibus, tactu tamen non mordentibus: floribus
uero purpureis, tenuibusq;. Hinc itaque fit, vt ij, mea quidem sententia, in errore versentur, qui putant Galiopsin esse **Scrophularia**
herbam illam vulgarem, quæ officinis, & herbariorum vulgo Scrophularia maior, Millemorbia, Ferraria, atque etiam **maior non**
Castriangula dicitur: hoc fortasse argumento mixti, quod ea flores edat, quæ galea similitudinem referunt. Sed eorum **est Galiopsis.**
error ex eo, vt arbitror, aperit diluitur, quod Scrophularia maior dicta folijs non proferat vrticæ admodum emula, nec ea
gravi odore prædita sentiantur. Adde quod huic radix subsit magna, alba, vndique strumosa, vnde fortè Scrophularia
nomen traxit, adeo notatu digna, vt non videatur verisimile, quod eius faciem non depictam relinquisset Dioscorides,
quando sensisset hanc herbam esse Galiopsin. Caules ab vna radice Scrophularia mittit plures, sesquicubitales, angulosos,
subrufescentes, in quibus folia insunt nigricantia, robusta, ad vrticæ faciem accedentia, per ambitum leuiter denticulata.
Flores mittit in caulium ramorumq; summitatibus pusillos, purpurcosq;, galeæ faciem referentes, & semen in capitulo,
vt in lino, & lactaria herba, rotundo, acuto summa parte apice. Radicem habet magnam, albicantem, strumosam. Huc **Scrophularia**
etiam illud accedit, quod illa vt plurimum in scrobium marginibus, & riguis, & vltiginosis locis nascitur, non autem (vt **descriptio.**
Dioscorides inquit) circa sepes, & in ædificiorum areis. In hac sententia fuisse inuenio Fuchsum, qui à galea, cuius effigi- **Fuch. erratū.**
em Scrophularia flores representant, hanc sibi nomen ascriuisse existimat. Id quod mihi planè non videtur esse rationi con-
sentaneum, quod non sit ex more Græcorum, veterum præsertim, apud quos nulla verborum inopia fuit, vt ex Latinis, &
Græcis dictionibus plantarum, & aliarum rerum nomina componant: Galeam enim Græcum nomen non esse constat.
Ex hu igitur adducor, vt in hoc neque Fuchso. neque alijs adstipulari possim, quorum potius sententiam ex supra dictis
reprobendam esse censeo. Cacutiant ad summum vsque, qui Scrophulariam, Dioscoridis Ocimastrium faciunt. Est præte- **Vrtica lactea.**
rea alia plantæ Vrticæ fetidæ non abssimilis, quæ à lacteis maculis singula felia in longum precurrentibus Vrticæ lacteæ à
nostris Sen: nsijs vulgo cognominatur, quam rectius fortè quis Galiopsin dixerit, si a γάλα, quod vocabulum Græcis lac
significat

Lamium
Plinii.Scrophulariæ
vires.

Nomina.

significat Galiopsin dictam esse statuat. Quod autem res hæc ita esse possit, ex Dioscoridis ordine coniectura quadam colligi
posset, nam quod statim post Galiopsin Galion descripsit, cui ex eo nomen inditum esse tradidit, quod in cogendo lac
coaguli vicem expleat, videtur innuisse, inter vtrumque magnam esse nominis cognationem. Hanc itaq; legem in
Galiopsin quasi affirmare non dubitarem, nisi Plinius lib. 22. cap. 14. eam Lamium appellari prodidisset, laudatq; ex
tulisset album, quod habet in medio folio, ad sacros ignes, & foliorum reliquum cum vniuersa planta, addita mica scilicet
ad contusa, incussa, ad ambusta, strumas, tumores, podagras & vulnera. Quibus sanè Pliny placitis discernere cogitur,
primam, quam Vrticam foetidam diximus, esse Galiopsin: alteram vero Pliny Lamium. Sed si persistere velimus hanc se-
cundam esse veram Galiopsin, dicere nobis liceat, Plinium non cognouisse Galiopsin: neque id fortasse temere dixerim.
quod in multis alijs Plinius euidenter errasse deprehendatur. Caterum quamuis ex rationibus superius adductis perspicuum
ni fallor, factum sit, SCROPHULARIAM non esse Galiopsin, ea tamen viribus pollet non contemnenda. Desiccat,
extenuat, discutit, abstergit: est enim gustu amara & subtilium est partium: eius radix recens, strumas, & hæmorrhoida
sanat: in quem vsus radix effoditur autumnali tempore, & repurgata tunditur cum recenti butyro, operculatq; ficta
in vliginoso loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liquefit, & percolatum
seruatur, quo prædicti morbi vtilissimè illinuntur. Idem illitum scabiem sanat: Aqua ex radicibus destillata, faciei rubi-
rem illita tollit. Sicca radice puluis impositus hæmorrhoidas ficit. Idem drachma pondere potus, lumbricos ventris pe-
nt. Planta, quæ Græcis γαλιόψις, Latine item Galiopsis, Vrtica labeo & Vrtica foetida nominatur: Italicè Ortica foetida:
seu Ortica morta Hispanicè Ortiga Muerta: Germanicè Welsch Nessel. At Scrophularia, Millemorbia, Ferraria seu Ca-
strangula: Italis Scrofolaria: Germanis Brauntourg: Gallis Grande Scrofaire.

Lamium purpureum foetidum, seu Galiopsis Dioscoridis, C. B. Galiopsis, Matth. Trag. Lac. Lugd. Thal. Vrtica labeo, Brunf. Vrtica iners, Dod. fol. Lac. Fuch. Turn. Dod. gal. Lamium siue Archangelica, Lob. Meminit Matthiolus Vrticæ lacteæ, quam Lamium maculatum vocamus, quam Mizarellam (id est, Lienarem, quia lienosis egregie opituletur) vocat Casalpino, & Leucos à Dioscoride dici suspicatur: Vrtica fatua λευκός κρητός Thalyo dicitur: at Solinandro, Lienaria. II. Scrophularia nodosa foetida, C. B. Scrophularia, Matth. Lac. Dod. fol. Cast. Scrophularia maior, Brunf. Gef. hor. Turn. Lob. Lon. Lugd. (cui & Chrysippea Plinii quorundam) Thal. Cam. Casalpino. Taber. cui & Castrangula Ocimastrum alterum, Trago. Galeopsis, Fuch. Dod. gal. Galeopsis minor, Fuch. in icon. Clymenum mas, Gef. hor. III. Scrophularia palustris: hæc radicibus est fibrosis (apud nos tuberculis caret) ex qua caulis ex-

* III. SCROPHULARIA
palustris. ** IV. SCROPHULARIA
flore luteo. *

urgit à priori magnitudine discrepans & colore, quicaule & foliis prorsus viridis est: foliis, floribus & se-
mine, priori similis. In nostris palustribus, sed minimè foetens, prouenit. Meminit Dodonæus editione
Gallica & Latina, Scrophulariæ alterius, quæ radice sit fibrosa. Dicitur Scrophularia famina, & Germa-
nis Weisse Nachtschat, Camerario in suo Matthiolo, quam dicit vlcera curare & contusa, si mane & sero
continuis diebus in foco calefacta & contrita imponatur: idem morum succum, si cum melle decoquantur,
melius præstare. IV. Scrophularia flore luteo. Hæc ex radice fibrosa scrophulis carète, caules plures emit-
tit cubito altiores, quadrangulos, subrubentes, leuiter hirsutos, vacuos: folia habet viridia, hirsuta.

Lata, subrotunda, per margines crenata, longissimis pediculis donata, duplo quam in vulgari latiora: ad quemlibet geniculum, ad foliorum pediculos, ab imo ferè ad summum pediculi oblongi nudi prodeunt, copiosos flores quasi conglobatos, luteos, forma vulgari similes sustinentes, quibus succedunt capitula subrotunda, quam in vulgari maiora, acuminata, cuius acumini filamentum instar capreoli insidet, quibus semen nigrum includitur. Hanc à nemine descriptam à Doctore Doldio Norinberga primum sicam accepimus, dein in horto Doctoris Zuingeri obseruauimus sæpius.

Γάλιον.


GALION.

CAP. XCI.

Galion nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum, foliumq; habet aparinae similitudinem, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus illinitur, & sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, in solutum vsque dum albescat, & sic lasitudines reficit. Radix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

GALION.

Gallium aparina



Galium vbiq; copiosè nascitur prope sepes, & secus vias, folijs aparina minoribus: flore tenui, spicato, partim luteo, partim albo. Verum non propterea omnibus nota est vis, quam coagulandi lactis habet: nam si ea pastoribus innotuisset, non minus apud eos huius herba inualuisset vsus, quam cinara apud Hetruscos: qui eius flore, vt dulcior suauiorq; caseus euadat, tum ouillum, tum etiam caprinum lac cogunt, ac spissant. Galio vires reddidit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, sic inquit. Galium inde adeo nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Ad simile autem est aparina, facultatem obtinens exiccatoriam, & subacrem. Flos eius sanguinis profluuijs competere videtur, & combustu mederi. Est autem boni odoris & caloris lutei. Huius herba nomen Græcum Γάλιον: Latinum Galium: Italicum Galio: Germanicum Unser Frauen Wegstro/ Wegertraut: Hispanicum Coia leche yerua: Gallicum Petit muguet.

Galii confid.

Galii vires ex Galeno.

Nomina.

Galium aliud aruense, quod vel luteum vel album: aliud palustre: nunc flore rubro & tenuissimo folio habetur. Vulgatum dicitur Gallium Matth. Lac. Cast. Gallium, Fuch. Dotl. gal. & fol. Lon. Galii primum genus, Trag. Lon. Galium luteum, Lob. Lugd. Thal. Galion luteo flore, Cord. in Diosc. Cas.

Ἡριζέρων. SENECIO. CAP. XCII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro: foliis a continuis, per extremitates eruca modo diuisis, sed minoribus multò: luteis floribus, qui celeriter dissecti vanescunt in pappos. Nomen verò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu canescant: radice superuacua. Nascitur maximè in b macerijs, &

a Meum Ἡριζέρων. i. senecio. b Cat. ἐπιτορχών. i. in parietibus.

circum oppida. Folia cum floribus refrigerant: quare illita cum vini modico, vel per sese, testium & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris medentur, cum reliquis vulneribus, tum iis quæ nerui acceperunt. Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant: verum recentes epoti, strangulant. Totus caulis, si coctus in passò potui detur, stomachi dolores à bili contractos perfanat.

Senecio, qua Græcè Erigeron dicitur, aliquibus vulgò Cardoncello, alijs verò spellicciosa vocatur. Planta est vulgaris notitia. Cauliculis exit (vt Dioscorides inquit) subrubentibus: folijs laciniatis, eruca æmulis, minoribus tamen, & asperioribus: floribus luteis, qui dehiscetes in pappos abeunt. Nascitur passim, aded vt etiam super vrbiū mœnia, & in parietinis proueniat: virefcit anno toto, & quolibet ferè mense floret. Ideoq; non desunt, qui hanc quoque vocent nostro Idiomate, Fiore d' ogni mese. Hanc herbam Otho Brunfelsius esse Verbenacam supinam, magno & aperto errore existimauit. Videtur etiam Senecionis esse genus herba, quam Germani DIVI IACOBI FLOREM appellant. Namque & ipsa folia fert Eruca syluestris æmula, per ambitum laciniata, nigricantia, amaro sapore, qua anteaquam caulem edant humi procumbunt: caulis illi est sesquicubitalis Artemisia similis, à medio ramosus surculosusq;. Flos in summitate aureus Bupthalamo minor, qui tandem flaccescens in papposam euolat lanuginem. Radice nititur breui & fibrata. Floret Julio & Augusto. Nascitur in campestribus inculto solo. Sunt qui scribant Senecionem præstare plurimū ad alba vteri profluvia, si in acetarijs deuoretur, at nos his haud facillè subscribimus, cum sciamus hanc herbam remoratos ceteros menses, epoto foliorum succo totius planta decocto: cum enim euidenter sit amara, vt siccet, abstergat, aperiatq; necesse est. Sic & Senecio maior excoalfacit, siccatur, aperit, abstergit, digerit, & reliquas Senecionis minoris vires obtinet. Senecionis quàm breuem mentionem fecit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, eius tantum facultatem referens his verbis: Erigeron, siue Senecio facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modicè digerentem. Herba hac Græcis Ἡριζέρων dicitur: Latinis Erigeron & Senecio: Italis Cardoncello seu Spellicciosa: Germanis Eruck Wurk: Hispanis Bonaron: Gallis Senesson. At Senecio maior, Italis Cardoncello seu Spellicciosa maggiore: Germanorum officinijs, Flos S. Iacobi: vulgari verò sermone S. Jacobs Blum.

Senecionis consideratio.


Brunfelsii error.

Floris Diui Iacobi mētio.

Senecionis fā cultas ex Gal.

Nomina.

I. SENECIO.

II. SENECIO MA. SIVE
Flos S. Jacobi.

Senecio minor. C. B. Senecio, Matth. Lac. Fuch. Turn. Cord. in Diosc. Gef. hor. Loni. Anguill. Lob. Caf. Lugd. Tab. Senecio vulgaris, Trag. Senecio minor, Cast. Erygeron, Thal. Erygeron secundum. Dod. gal. Erygeron minus, Dod. fol. Verbena foemina, Brunfelsio, qui in postrema editione se errasse fatetur. II. Iacobeae vulgaris, C. B. Senecio maior, Matth. Cast. Lugd. Herba S. Jacobi, Fuch. Caf. Flos S. Jacobi, Brunf. Trag. Lon. Herba Iacobaea, Tab. Iacobaea, Dod. gal. & fol. Iacobaea Senecio, Lob. Artemisia polyclonos, seu Flos Iacobaeus, Thal.

Θάλικτρον.

THALICTRUM

CAP. XCIII

Thalictron folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Quæ tria illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Thalictri cõ-
sideratio.Thalictri vi-
res Gal.
Nomina.

Thalictron, si Ruellio credimus, herbarij in Gallia Argentinam appellant, quod argenteo micet coloratu, ceteris vero Thalictri pictura adstipulantibus. Hæc (vt ipse scribit) inuenitur vbique, sæpe in campestribus, & maceris. Verum cum mihi hæcenus non contigerit eam herbam videre, idcirco Ruellij sententiam non ausim probare, neque etiam resellere. Thalictron Thalietron nominat Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, vbi de eius viribus in hunc modum differit. Thalietrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Vis ei inest exiccatoria citra morsum: itaq; ulcera inueterata ad cicatricem perducit. Quod Græci Θάλικτρον, Latini item Thalictrum & Thalietrum appellant.

Βρύον θαλάσσιον.

MVSCVS MARINVS.

CAP. XCIII


Marinus muscus nascitur in scopulis testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, & collectiones colubendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

Musci marini
consideratio.
Corallia.

Muscus marinus duum est generum: Dioscoridis alterum, alterum verò Plinii. Non possum eorum non probare sententiam, qui dicunt Muscum marinum eam capillaceam esse plantam, quam officina corallinam appellant. Muscus hic gracilis capillaceusque provenit, caulis expers, colore cum siccatur subrufescente, salso sapore, odore concharum marinarum simili. Hanc circumforanei in puluerem contritam in plateis venditant ad puerorum vermes necandos, mirisque laudibus efferunt. Qua in re nimirum ceteris præstat medicamentis: siquidem non modo interficit lumbricos, sed eos quoque eadem die expellit, magna sæpe cum astantium admiratione, quod quandoque visus sit puer, qui ex assumpta huius pulueris drachma centum vermes excreuerit, potissimum si detur ex passo, aut cum Aegyptiæ siliquæ pulpâ. Crediderim itaque Corallinam hanc esse muscum marinum, quod certò sciam, eam ab us reperiri, qui corallia expiscantur, corallijs, sicuti et scopulis, & piscium testis inhaerentè, eo sanè modo, quo arboreus muscus arboribus ipsis innascitur. Is utiq; ceteris præfertur, qui corallijs adnascitur, vnde ei nomen. Probatum secundo loco, qui saxis adheret, colore rubicundo: cinereus verò improbatum. Sed marinum muscum hac pollere facultate non nouere veteres: quandoquæ

I. MUSCVS MARI. SIVE
Corallina.

II. MUSCVS MARINVS
alter vel Plinii.



30 nusquam apud ipsos legerim marino musco interaneorum vermes necari. Musci marini historiam (longè tamen ab ea di-
 nerjam, quam paucis perstrinxit Dioscorides) prosecutus est Plinius libro 27. cap. 8. his verbis: Bryon marina herba sine
 dubitatione lactuca folijs similis, rugosa veluti contracta, sine caule ab imia radice exeuntibus folijs. Nascitur in sco-
 pulis maximè, testuque terra comprehensis. Præcipua siccandi ei spissandiq; vis, & collectiones omnes inflammatio-
 nes, prohibendi, præcipuè podagra, & quicquid refrigerare opus sit: hæc Plinius. Cuius Musci imaginem hanc omnino esse
 censemus, quam hic excuâi curauimus: nam omnibus notis illi perbellè respondet. Viuam plantam concha cuiusdam teste
 inhaerentem, misit ad me Patavio Iacobus Antonius Cortusus. Caterùm Marinus muscus iam mihi in mentem redegit
 plantam (si tamen plantam appellare licet) musco haud multò absimilem, in fluminibus, & alijs dulcibus aquis nascentem,
 viridi colore, & serici staminis fere modo villosam, quæ Plinio lib. 27. cap. 8. circa finem conferua appellatur: nobis
 verò in Hetruria vulgo Lima. Hæc cum Plinii testimonio ad ossium fracturas præstantissimum sit medicamentum, præter-
 mittere quidem non potui quin hic de ea Plinii verba adderem. Ille enim ita de Conferua meminit. Peculiari est alpinis
 maximè fluminibus Conferua appellata a ferruminando, spongia aquarum dulcium verius, quàm muscus aut herba vil-
 40 losa densitatis, atque fistulosa. Curatum ea scio, omnibus fere ossibus contractis, prolapsis ex arbore albo putatorem, cir-
 cumdata vniuerso corpori, quam suam inspergentibus quoties inaresceret, raroq; nec nisi deficientem herbam mutatio-
 nis causa resoluens conualuisse vix credibili celeritate. Caterùm Musci marini meminit Galenus lib. 6. simplicium
 medicamentorum, sic inquit: Muscus marinus compositus est ex terrena, & aquea essentia, vtraq; frigida. Siquidem &
 gustum adstringit, & calidus quibusvis illitus, ea euidenter refrigerat & adiuuat. Posse quidè marinum muscum, qui recens
 fuerit, refrigerare, facile cum Galeno & Dioscoride concedam: quòd verò siccus id efficere possit, quòd gustu salso senti-
 atur, non ita facile mihi concedendum videtur. Id Græcis Ἐρίον θαλάσσιον quòd Latinis Muscus marinus vocatur: Thaba-
 50 leb siue Thabel Arabibus, quibus tamen muscus is cum lente palustri, confunditur: Italis ac Officinis, Corallina: Germa-
 nis Weermies oder Weermösz: Hispanis Malhorqui ana yerua: Gallis Coralline.

Muscus mari-
nus Plinii.

Conferuæ
mentio & vi-
res ex Plinio.

Musci mari-
ni vites ex
Gal.

Nomina.

30 Musci marini plures differentie proponuntur in historia nostra, hic de duobus. I. Muscus Marinus
 siue Corallina, Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Lugd. Tab. Muscus marinus primus, Dod. fol.
 Muscus marinus herbaceus mollior, Cæsal. Corallina, Lon. Lob. Lemnio. Fucus Capillaceus, Lugd.
 II. Lactuca maritima, C. B. Muscus marinus alter, Matth. Cast. Muscus marinus Theophrasti, Dod.
 gal. Muscus marinus Plinii, Lugd. Fucus marinus prior, Dod. fol. Fucus siue Alga Intybacea, Lugd. Bry-
 on Thalassion, Turn. Bryon lactucæ folijs Plinii, Lob. Bryon Theophrasti, Cæsalpino.

Ἐρίον θαλάσσιον

FVCVS MARINVS.

CAP. XCV.

60 E Phuci marini generibus, quoddam latum, & alterum a sublongius, & rubens: tertium b candidum,
 nascens in Creta, floridum valdè quòd nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refri-
 geratoriam non podagræ modò, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter vtilem: verùm
 is vti humidis conuenit priusquam exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fuce
 quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua se se
 fucant.

a Orib.
ἐπιμακί. i.
oblongum.
b Orib.
ἔλος. i. cri-
spum.
c Orib.
ἑυπλίαν. i.
adstringen-
tem.

D E fuce marino locutus est Plinius libro 13. cap. 23. vbi ita scriptum reliquit. Nascuntur in mari frutices arboresq;
 minores in nostro. Rubrum enim, & totius orientis Oceanus refertus est syluis. Non habet lingua alia nomen quòd
 Græci vocant phycos, quoniam alga herbarum magis vocabulum intelligitur: hic autem est futex. Et lib. 26. cap. 10.

Fuci marini
hist. ex Plin.

Tria inquit, Phyci thalassij, id est, Fuci marini genera, latum, & alteram longius, quadantenus rubens: tertiam confolis, quo in Creta vestes tinguntur: haecenus Plinius. Caterum cum Fuci genera mihi plane incomperta sint, quae dicam non habeo. Non tamen deest suspicio, quum Fucus marinus, si Alga non est, in eius saltem genere recenseri potest: debeat: nam Theodorus in Theophrasto non aliter Fucum marinum interpretatur, quam Alga nomine. Adde quod Plinius alijs in locis Fucum marinum, Algam maris aliquando vocavit, ut etiam adnotavit Marcellus. Sed non ob hoc existimaverim, Fucum marinum eam vulgarem esse Algam, qua Veneti vasa vitrea recondunt, ne inter vehendum collidantur & confringantur. Quod praeterea Fucus marinus Alga esse possit, illud argumento sit, quod nullam aliud, quod sciam, apud Latinos nomen inuenierit. Alga species est quae vluva dicitur, hoc tantum inter se differentes, quod haec palustris, lacustris, fluuiatilisq; sit: illa vero tantum in mari proueniat. Quod discrimen illo vulgari versicato indicatur.


Alga Veneta.

* ALGA VENETA. *

Vluva.

Fuci marini vires ex Gal.

Nomina.



Alga venit pelago, sed nascitur vluva palude. Vnde etiam Virgilius libro sexto Aeneidis ita cecinit. Tandem trans fluuium incolumes, vatenaq; vitruuq; Informi limo, glaucaq; exponit in vluva. Et libro secundo eiusdem. Limosq; lacu per noctem obscurus in vluva Delitui.


Fuci marini mentionem fecit Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, his verbis: Phycos humens etiamnum, & vires ex mari exemptus desiccet, & refrigerat ordine secunda. habet enim quiddam modicè acerbum. Nominatur Graeco Φύκος θαλάσσιος: Latinis Phucus seu Fucus marinus: Italo Phuco marino.

Algae Venetae cum mentio fiat in Commentariis, idcirco eius figuram addere placuit, quam Algam marinam, Lobelus: Fucum marinum, Lacuna: Fucum marinum alterum, Dod. historia Latina, Fucum siue Algam marinam gramineam, Lugdunensis: & Algam, Caesalpinus, Monspeliensium vulgus paleam marinam, vocat. Videtur apud Dioscoridem sub Fuco secundo, apud Theophrastum sub primo exprimi.

I. POTAMOGETON.

Ποταμόγετον. POTAMOGETON. CAP. XCVI

Potamogetonis confid. Sagittae vtriusq; confid.




Potamogeton, folium fert betae simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus vtile, & contra veterum vlcera nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

Potamogeton lacubus & paludibus innasci amat, vbi folijs betae proximis, super aquam expansis in completis locis emicare inuenitur. Hanc herbam nos saepe vidimus & legimus, priuatim in lacubus quibusdam in Anariensi agro, quam ibi vna cum nymphaea aquis supernat. Antem deprehendimus. Facit Potamogeti mentio vi Sagittam quoque ob foliorum formam Plinio vocatam, in mentem redegerim, quod ipsa in fluminibus nascatur, & stagnantibus quoq; aquis. Haec ita duum est generum. Maior & Minor. Huius folium sagittae cuspidis figuram ad amussim refert, superne in vnum apicem, inferne in duos desinens. Pediculo nititur triquetro, spongioso, intus cauo, sesquicubitali & quandoque maiore, aut minore, pro aquarum profunditate, in quibus viuit. Caudam gerit rectam, lauem, rotundam, vacuum, superum in ramulos diuisum, in quibus flores exeunt albi, singuli tribus foliolis constantes, haerentq; in pedunculis pari exortu a caudae prodeuntibus. Ex his tandem capitula nascuntur subpurpurea hirsuta, nucis Pontica magnitudine, in quibus minutum concluditur semen, rotundo intus globulo inherens. Radicem habet albam, multifidam, & fibrosam Plantagini aquatica similem, cuius cognationis ego sagittam facio. Maior minori per omnia respondet, sed omnia maiora in ea spectantur. Folia quoq; non ad eum acuminatum fastigium desinunt. Nascuntur vtraq; in aquis cum stagnantibus, tum decurrentibus copiose.

II. SAGITTA MAIOR.

III. SAGITTA MINOR.



in Bohemia, cum in Muldaua flumine. tum in alijs pleriq, locis. Temperamento amba sunt frigido & humido: & ijsde cum
 planta, que aquatica varibus pollent. Potamogeton, vt testatur Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, adstringit &
 refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior quam polygonon est. Huic herba nomen Gracum ποταμογετον, La-
 tinum similiter Potamogetum: Italis Potamogeto: Germanus Eechalten Kraut vnd Sam Kraut: Gallis Herbe des
 estagnes. At Sagitta, Gracis σάγαια: Italis Saetta.

Potamogeton
 vires ex Gal.
 Nomina.

MILLEFOLIUM AQUA-
 ticum.



Potamogeton latifolium aliud, aliud tenuifolium: latifolium aliud rotundis, aliud oblongis folijs est, hecque vel crassis salignis, vel tenuibus & splendentibus, & hoc vel planis vel crispis. I. Hic proponitur Potamogeton rotundifoliu, quod Dioscoridis est: & dicitur Potamogeton, Matth. Trag. Fuchs. Lac. Dod. gal. Lonic. Castor. Taber. Potamogetoni similis rotundiore folio, Cordo in Dioscoridem. II. Sagitta aquatica maior, C. B. Sagitta maior, Matth. Dodo. fol. Castor. Tab. Pistana Magonis, siue Sagittaria aquatica Plinij, Lob. Phleomas latifolia, Lugdun. Barba fyluana recentioribus medicis, Casal. III. Sagitta aquatica minor, C. B. Sagitta minor, Matth. Dod. fol. Cast. Lob. Lug. Tab. Sagittaria minor, Lob. in icon. Sagitta & Sagittalis, Cordo in historia.

Στρατιώτης. STRATIOTES. CAP. XCVII.


Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentum traxit. Herba semperiuuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant: sanguinem, qui defluit a renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Non est profecto quod miremur, si Stratiotes in Italia non prouenit. Quandoquidem ea, vt lib. 24. cap. 18. Pli-

nus testatum reliquit, est in Aegypto tantum, & inundatione Nili nascitur, aizoo similis, ni maiora haberet folia, & ceterum plantam quandam misit ad me Pisis Lucas Ghinus Medicus clarissimus in aquis nascentem, quam ille aquaticum Millefolium appellabat. Hanc ego aquatica Stratiotes genus aliquod esse puto. Esto tamen aliorum quoque iudicium examine, quam hic appingi curauimus. Folijs est coriandri, sed tenuioribus, caulibus tribus aut quatuor, angulosis, in quibus per interualla pusilla habentur folia, auicularum pennis similia: in cacumine singulis caulibus bina exeunt umbellae subpurpurascensibus floribus. Vocatur Graeco *στρατιώτης*, & *χιλιόφυλλος*. Latine Stratiotes aquaticus. Millefolium aquaticum. Italis Millefoglio aquatica.

Nomina.

* IL. EQVISETVM OLLIDUM. *



I. Millefolium aquaticum à Matthiolo propositum, & à Lugdunenſis herbarij auctore, sub Stratiote millefolio aquatico Matthioli enarratum, haecenus non vidimus. Ast ne duæ diuerſæ vna figura imitæ ad Commentatorem ſint miſſæ, veremur. Siquidem caules optimè reſpōdeant (ſi umbellas adimas) Equiseti ſpeciei, cuius iconè adiunximus. I. Quod al bicat omnibus ſui partibus, odoris ſulphurei & cluſi, caulibus pluribus, longis, rotundis, oblique ſtriatis fragilibus, qui in plures cauliculos brachiantur, folijs aliquot ſimul ad geniculum iunctis, breuib; aliquot apicibus tanquam particulis donatis: quæ ſi ſicca ſint leuiſſimo digitorum contritu in puluerem comminuuntur. Nascitur in aquis, præcipuè cœnoſis, communiter in ijs demerſum, rariùs ereditur quod in foſſis Thermarum Aponenſium notamus, & non longè Lucerna Heluetiorum. An floreat ignoramus: nec de ea quicquam hæctenus apud auctores legimus, quod propter grauem odorem, Equisetum olidum vocamus.

στρατιώτης χιλιόφυλλος. STRATIOTES MILLEFOLIVM. CAP. XCVIII

Concluſa in meo deſunc.

I. MILLEFOLIVM MAIVS.



Stratiotes millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius affurgit: folijs auium pulli pennas imitantibus, breui admodum diſſectis; foliorum exortu. Folia ſylueſtre cuminum ſimulant, præſertim breuitate, [atq; ſcabritia] breuiora paulò: denſiore umbella & pleniora. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos & candidos. Nascitur in aſperis agris, præcipuè circa ſemitas. Eximij vſus ad vlcera vetera recetiaq; profluente in ſanguinem & fiſtulas.

Stratiotes in hunc vſq; diem Millefolij cognomen retinet. Planta eſt officiis notiſſima, in incultis promeniens, in pratis, & circa ſemitas, lignoſis caulibus, dodrante maioribus pluribus ab vna radice prodeuntibus, quibus folia inſunt auium nouellarum pennis ſimilia, ſylueſtriq; cumino emula. Flores eius denſiore umbella ſuſtinentur, candidi, eſi nouemquam in purpura rubescant. Ex his vtiq; notis palam eſt, à comuni vſus Millefolium nil aliud dici poſſe, quàm Stratiotes, de quo hic agitur: non autem, vt Braſauolus exſtimat, Myriophyllum infra à Dioſcoride deſcriptum. Siquidem Myriophyllum caulis eſt tener, ſingularis, vnica nixus radice: folijs plurimis, leuib; ſceniculo ſimilibus. Qua ſanè omnia, in ſalor, apertiſſimè oſtendunt, Braſauolum hac in re hallucinatum eſſe. Millefolij genus quoddam naſcitur in Geritienſi agro Saluatiſino monte prope ſacellum diuæ Mariæ virginis, in tantum ſaxoſo tractu, quo ad Sontium ſtadium deſcenditur. Id quoniam aliud præſtat magnitudine, vt eius eſſigies, quam hic damus, aperte oſtendit, ideo nobis iure liceat ipſum nominare Millefolium maius. Folia præfert minoris ſimilia, ſed maiora. Tanaceto quadantenus proxima, caules quoq; maiores, ſubhiſutos atq; grandiores umbellas: floribus in purpura albicantibus, odore medicato. Præſtat eadem que mirum. Dicitur vtiliter millefolij ſuccus ad ſanguinis reiectiones. Idem præſtat ſicci farina ex Symphyti maioris, aut plantaginis a-

Stratiotes millefolij conſideratio.

Brasauoli opinio non eſt accepta.

Millefolium maius.

II. MILLEFOLIUM MINUS.



qua pota. Eadem naribus indita, fluentem inde sanguinem compescit. Dysentericis utiliter infunditur, una cum suis ipsius succo. Herba recens tusa & supposita, pubiq; illita, mensibus profusa compescit. Millefolium cui candida inest umbella, una cum floribus tusa, & cum sua ipsius aqua, aut caprino lacte pota, gonorrhœam in viris, in feminis alba vteri excrementa tollit. Atqui id valentius praestat, ubi cum corallo, succino albo, & eboris scobe propinetur. Praestat mirum in modum Millefolij, & foliorum & florum farina ad sanguinis mictum, ubi uncia pondere una cum Armenia terra drachma, ex vaccino lacte propinetur ieiunis diebus tribus continuus. Commanducata folia, & praesertim recentia, dentium dolores mulcent. Idem facit commanducata radix, & diu sub dente dolente recentia. Datur herba decoctum cum Labrusca floribus utiliter potandum contra vomitum. Stratiotes hunc, & superiorem perstrinxit Galenus libr. 8. simplicium medicamentorum, ubi de utriusq; viribus ita differit. Stratiotes aquaticus quidem humida & frigida facultate est: terrestri verò nonnihil habet adstrictionis: proinde sanè & vlcera glutinare potest, & vlceribus esse utilis. Sunt qui eo & ad sanguinis eruptiones utantur, & ad fistulas. Herba, quae Graecis *στρατιώτης χιλιόφυλλος*, Latinis *Stratiotes millefolium* appellatur: Italis *Stratiote millesoglio*: Germanis *Garben*: Hispanis *Milhojas yerua*: Gallis *Millefeuille*. * Cumin vel Anet sauvage. * At *Millefolium maius* Graecis *στρατιώτης χιλιόφυλλος μέγας*: Italis *Millesoglio maggiore*.

Stratiotes vires ex Gal.

Nomina

I. Millefolium vulgare album, C.B. Millefolium maius, Matth. Millefolium album, Brunf. Camer. Millefolium vulgare, Trago, Ges. hort. Millefolium Stratiotes, Cord. in Diosc. Millefolium terrestre maritimum, Tab. Millefolium terrestre vulgare, Lob. in icon. Millefolium siue Achillea. Dodo. fol. Millefolium maius, Casalpino. Stratiotes millefolium, Fuchf. Lac. Cast. Stratiotes millefolia maior, Lugd. Militaris, Lob. Achillea, Dod. gal. Lonicero. II. Millefolium vulgare purpureum minus, C.B. Millefolium minus, Matth. Millefolium vulgare, Trag. Millefolium, Lonic. Millefolium purpurei floris, Dodo. fol. Millefolium terrestre purpureis floribus, Lob. Millefolium purpureum, Taber. Millefolium paruum, Casalp. Stratiotes terrestris minor, Cordo in hist. Stratiotes millefolia minor, Lugdunensi.

Φλάμος

VERBASCUM.

CAP. XCIX.

40 **V**erbascum differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & femina intelligitur. Feminae igitur folia sunt brassicae, pilosiora multo & latiora, a candida: caulis albus, cubitalis aut amplior, tuberculatus: flores albi, aut b ex luteo pallecentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerbata, crassitudine digiti nascitur in campestribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; constaret folio. Sylvestre [folia] fert [salvia]: altas virgas & lignosas c, & circa eas ramulos d quales marrubium flores luteos, aut æmulos. Sunt & phlomidēs duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis aut quaternis, vel paulò pluribus, hirsutis, crassis, pinguibusq;: apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum aquet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum rupijs, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxiliatur: dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocunque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia aduersus tumores, & oculorum inflammationes illinuntur: syderatis vlceribus ex vino & melle, cum aceto autem vulneribus medentur: contra scorpionum ictus sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam feminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

a Orib. λευκότερον. i. candidiora. b Orib. εσπέρια λευκότερα. i. subulmaria. Orib. εσπέρια λευκότερα. i. subulmaria. c Or. φλόδιον. d Or. αβραμύτιον. i. quema-modum.

60 **P**lura Verbasci numerantur genera, ut ex appictis iconibus palam fiet. Prima verbasci genera, domestica scilicet duo, nulli non cognita sunt. Verbascum mas siue secundum, oblongius est, albis folijs, angustioribusq;: tenuiore caule. Floribus in cacumine minoribus, pallido colore. Radice minori minusq;: carnosa. Nascitur in campestribus, exoluto solo. Iisdem viribus praeditum est, quibus & femina. At Verbascum tertium, folia profert nigriora, oblongiora: salvia fere modo aspera, sed latiora: caulibus rotundis, robustis, tenuioribus floribus in cacumine spicatis, aureo colore. Prouenit & hoc quoq; in campestribus: easdem cum alijs habens vires. Verum sylvestre, quod folijs salviae similibus, aureisq; floribus prouenit, non omnibus sanè notum existimo. Viret tamen hodie Patavij in nobilissimo simplicium horto, quem ad commune studiosorū commodum illustrissimus Venetorū Senatus construi curauit. Nascitur in campestribus & apricis montibus. Quin nec fortasse Lichnitem, cuius etiam figuram hic damus, nouere multi, q; folijs est hirsutis, crassis, tomentosis pinguibusq; atq; idoneis ad lucernarū lumina: floribus numerosis & ramusculis eminentioribus, prodeuntibus aureo colore. Est Verbasci quoq; genus, cuius folia corniculati pauperis faciē exprimūt, per ambitū sinuata. Ideoq; nil mirū si Diosc. eiusmodi papaueris folia Verbasci folijs coparauerit. Reliqua verò, qui mihi demonstrauerit in Italia, haecenus reperi neminē. Et quāuis sint, qui putent, ut Ruelchij opin. Herba paralytica. Fuch. & recentiorū alijs placet, eas vulgaris notitia plantas, quae quibusdā Bracha cuculi, officinis Primula veris, Germ. clānes S. Petri, nonnullis verò herba paralytis appellatur, esse Diosc. Phlomidēs, quae hirsutis rotundisq; folijs, humiles psittunt: eorū tamen

Verbasci genera & conu. Ruellij & Fuchij opin. reprobata. Herba paralytica.

I. VERBASCUM I.



III. VERBASCUM III.



II. VERBASCUM II.

IV. VERBASCUM IIII. SI-
ue fyluestre.

zamen sententia, licet eruditorum virorum, haudquaquam ad stipulari possum. Siquidem plantis ijs folia non in sumo bir-
futa, nec etiam rotunda, sed alteri leuia, alteri verò crissa, lactuca aut dipsaci modo. Adde quòd florum, quos hac Phleg-
dum genera proferant, nusquam, quod sciam, meminit Dioscorides, neq; è veteribus aliis, qui Verbasci genera recensent
Id quod

V. VERBASCUM LYCHNITE.

VI. VERBASCUM ALIUD.



VII. PRIMULA VERIS.

* VIII. VERBASCULUM HORTENSE MULTIPLEX. *



Id quod in herba paralyfi, meo quidem iudicio, silentio inuoluendum non fuerat, cum hac omnium prima suis aureis floribus emittet, verq; nouum pronunciet: vnde illi officina nomē imposuerunt. Duum est generū, alterum odoratum, alterū inodoratū. Prima folia profert lactuce quad. antenus similia, oblonga, rugosa, Labri veneris ferè modo humi iacentia, è querū med:o

Herbæ para-
lysis vires
Matthiolo.

Verbasci vi-
res Matth.

medio cauliculus exit dodrantalis atq; incanus, è cuius fastigijs flores exeunt complures lutei, per ambitum sphericati ed-
ratiq; ut in vrſi auricula, quam & radice quoq; imitatur. Prouenit secus vias, propter sepes, & in pratibus. Altera folia pro-
fert latiora, & in cacumine rotundiora, humi pariter accubantia, crispa rugosaq;, ac magis tenera: caule vero floribus ac
radicibus, ab altera non differt. Nascitur yſdem in locis, & frequenter in syluis herbosis. Easdem, quas prior possidet vires,
imbecilliores tamen. His recentiores vim efficacem tribuunt ad articularum dolores. Radicis earum decoctum ad venum,
& vesica calculos commendant. Succum quoq; tum potum, tum exterius illitum, fractis luxatisq; ossibus vtilem esse tra-
dunt. Ceterum prestat earundem decoctum additis salvia & amaraco, aduersus frigidos neruorum, & cerebri morbos.
Quare commodissime datur potandum resolutis, ac ijs, qui membrorum tremore, stupore vè laborant. Stillatitia florea
iam herba aqua datur vtiliter potanda in animi deliquijs, & vbi corpus imbecillitate virium affectum sit. Nam vrſi
quiunt experimentatores) mirifice cor confortat ac roborat. Flores illinuntur vtiliter aduersus scorpionum, & phalangio-
rum icus. Siquidem facile tumores dissolunt. Herba ipsa, aut flores, aut radices tusa & illita, vulnera sanant. Stillatitia
a. p. s. que à tota fluxerit planta, fronti illita, capitis dolores mulcet. Mulieres, qua fuco delectantur, flores in albo merace
macerantes, vna cum polygonati radicibus, stillatitiam ad alembicum conficiunt aquam, qua deinde à lecto resurgentes
faciem lauant, eiq; nitorem conciliant: vbi autem rugas tollere student, stillatitiam limonum aquam admiscunt. Sed ad
legitima verbasci genera redeamus. Hac omnia in vniuersum, sed foemina magis, vt plurimis factis periculum constat, omni-
bus ferè sedis morbis mirifice subueniunt: adstringunt enim & exiccant. Quamobrem seminis & florum puluis, additu cha-
memeli floribus, & laricis resina, procurrentem sedem suffitu cohibet, & tenasium, præcipue dysentericis, tollit. Verbasci
foemine folia inter lapides contusa, si equi claudicantis ex clauorum noxia vngui prius excavato imponantur, mirum di-
ctu quam breui tempore is liber euadat. Radicis eiusdem succus, anteaquam caulem proferat, duarum drachmarum por-
dere ex Cretico vino haustus, in ipsa accessionis hora (vt Arnaldus refert) quartanam fugat, cum hoc tamen, quod tribus
aut quatuor iteratis viabus hauriatur. Succus tam florum, quam foliorum asperis verrucis illitus, eas facile delet, et si leu-
ibus nihil proficiat. Idem facit sicca radice farina confricata. Dantur flores commodissime in puluerem triti, contra tormen-
ta ventris, & colicam. Gargariatur vtiliter radicum decoctum contra tonsillarum inflammationes. Folia tusa & cime-

IX. PRIMVLA VERIS altera.



X. BLATTARIA.



Gutta rosa-
cea.

Blattariae hi-
stor. & vires.

ribus calefacta, sanant panos, quos bubones vocant, emplastri modo imposita. Tanta vis verbasco inest, vt iumentis no-
tusientibus modò, sed ilia quoq; trahentibus, auxilietur potu. Semen ex vino decoctum & contusum impositumq;, lu-
xatis medetur, dolorem & tumorem auferens. Folia conferunt strumosis, si ex aceto imponantur. Semine ac folijs in
vino decoctis, ac subinde tritis & impositis, omnia infixæ corpori extrahunt. Folia & summitates in aqua decocta, & co-
illita podagricis auxiliantur, sed eius Verbasci ea esse oportet, quod minoribus crescit folijs. Si illa aqua ocu-
lis iniecta, distillationes cohibet: aufert eadem illita faciei ruborem, quam Mauritanii Guttam rosaceam vocant, & præ-
sertim addito caphura momento. Illinitur eadem ad Erysipelas, & ignis combustiones, serpigines, vitiligines, impetigines
& ceteras cutis infectiones. Verbasci flores vna cum oui vitello, & mica panis, & porri folijs illiti, perbelle præstant ad
cohibendas tumentes, doloris, casq; hæmorrhoidas. Idem præstant eiusdem folia suffusa, ex molari lapide auriflo. Est &
herba similis Verbasco, qua BLATTARIA Plinio nominatur lib. 25. cap. 9. vbi eam ijs verbis depingit. Est similis Ver-
basco herba, qua sæpe fallit pro ea capta, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hac abiecta Blattaria in se
contrahit, ideoq; Roma Blattariam vocant: hæc Plinius. Eandem verò effectum Dioscorides illi Verbasco generi assigna-
nit, quod floribus aureis descripsit. Quæ certè res facit, vt credam, quod non aberrarent ij, qui sibi animum inducent,
blatta-

*Blattaria Plinij, & Verbasum illud Dioscoridis, cui flores insunt aurei, unam & eandem plantam esse. Porro Blattaria passim fere nascitur in campestribus: folijs oblongis, per ambitum serratis: floribus tertium Verbasci genus maxime emul-
lantibus, quibus deciditibus circa caulem folliculi exoriuntur parvi, lini instar, duriores tamen, ac leuiore, in quibus
semen continetur. De hac herba plures, quoad inuenerim, facultates non produuntur. Sed cum ea gustu amara deprehendatur,
hinc certo colligere licet, quod eadem excelsa sit & sicca, & aperire & abstergere possit. Verbasci genera, & vires me-
moriam tradidit Galenus libro octauo, simplicium medicamentorum, ubi ita scribit: Verbasum, quoddam folijs allu-
est, quoddam vero nigrum. Et albi aliud quidem mas est, cuius folia angustiora, aliud foemina, cuius maiora. Est
praeterea aliud Verbasum syluestre cognominatum, quod floribus constat aureis, & luteis. Sed & praeter has species alia
est, quam proprie phlomida, & thryallida nominant. Priorum itaque duarum radix gustu acerba est, & fluxionis affecti-
bus prodest: sed & ad dentium dolorem eam quidam colluunt. At tamen seha digerendi vim habent: sic & aliarum folia,
& maxime eius, qua aureos flores obtinet: qua etiam capillos rufant. Omnium enim folia desiccandi, & digerendi moderatè
vim possident. Quae planta Graecè φλόμος, Verbasum Latine dicitur: Officinis, Tassus barbatus, Italis, Verbasco, & vulgò
Tasso barbasso: Germ. Wulltraut: Hispanis, Verbasco: Gallis, Bouillon. At Verbasum mas siue secundum, Graecis φλόμος
ἀπὸ λευκῆ: Italis, Tasso barbasso maschio. Sic Verbasum tertium, Graecis φλόμος ὀρθῶν μελάνη: Italis, Tasso barbasso
minore. Verum Verbasum syluestre, Graecis φλόμος ἀγρία: Italis, Tasso barbasso saluatico. Sic Primula veris, nonnullis
Brache cuculi: quibusdam Herba paralytis: Italis, Fior di prima vera: Germanis, Schlüssel Blumen: Gallis, Primeuere,
feu Brayes de Cocu. Isdem nominibus appellatur & altera. Tandem Blattaria, Dioscoridi, Verbasum aurei floris: Italis,
Blattaria.*

Verbasci ge-
nera, & vires
ex Gal.

Nomina.

Verbasum, φλόμος dictum, à φλόγω vno, quasi φλόγος flamma, quia hac herba pro ellychniis vtuntur. Sic
Verbascula seu Primula veris φλομίδες Dioscoridis censentur, alii Dodecatheon Plinii volunt. Fabius
Columna, Alimatis secundum genus apud Plinium facit: cuius vt & Verbasci plurimae differentiae.
I. Verbasum mas latifolium luteo flore, C.B. Verbasum primum, Matthiol. Caesalpini. Lugdunensi.
Verbasum candidum mas, Lacun. Lonice. Verbasum, Cordo in Diosc. Castor. Verbasum mas, Lobel.
Taber. Verbasum aut phlomos vulgaris mas Dioscoridis, Thapsus barbatus officinarum, Lob. in icon.
Verbasum latius, Dod. fol. Verbasum album mas seu Candela regia, Thalyo. II. Verbasum mas
angustioribus folijs, floribus pallidis, C.B. Verbasum secundum, Matth. Lacun. Castor. Lugdunen.
Verbasum mas, Matth. in Epit. Verbasum syluestre maius, Lonicero. III. Verbasum nigrum flore ex
luteo purpurascens, C.B. Verbasum tertium, Matth. Lac. Cast. Lugdu. Verbasum nigrum, Trag. Dod.
gal. & fol. Tab. Verbasum nigrum Dioscoridis, Lobel. in icon. Verbasum nigrum salui folium purpu-
reo flore, Lobel. Verbasum syluestre, Fuch. Turn. Gesner. hor. Verbasum syluestre minus, Lonic.
Verbasum nigrum latifolium, Thalyo. IV. Verbasum latis saluicæ folijs, C.B. Verbasum quartum siue
syluestre, Matth. Lugd. Verbasum sylv. Matthiolo in epit. Lac. Ges. hor. Clus. hist. Hisp. Cast. Verbasum
sylv. alterum, Dod. fol. Verbasum saluifolium fruticosum luteo flore, Lobel. Verbasum syluestre folijs
Saluicæ, Cam. Verbasum quartum Matthioli, Lob. in icon. Verbasum septimum, Caesalpino. V. Ver-
basum Lychnites flore albo paruo, C.B. Verbasum Lychnite, Matth. Lacu. Tab. Verbasum primum,
Brunf. Verbasum candidum foemina, Fuch. Ges. hor. Verbasum album foemina albo flore, Dodon. gal.
Lugd. Verbasum foemina, Lob. Lugd. Verbasci tertii altera species, Cast. Verbasum quartum, Caesalp.
Phlomos mas alter, Lob. in icon. Phlomis Lychnitis, Lugdunensi. VI. Verbasum folio papaueris
corniculati, C.B. Verbasum aliud, Matth. Verbasum sylv. tertium, Dod. fol. Verbasum laciniatum, Lu-
gdun. Verbasum intubaceum, Tab. Verbasum folijs papaueris cornuti, Camerario. VII. Verba-
sculum pratense odoratum, C.B. Primula veris, Matth. Loni. Tab. Primula veris prior, Lugdun. Primula
pratensis, Lob. Primula veris hortensis, Thal. Herba Paralytis, Brunf. Trag. Cast. Clus. hist. Paanno. Herba
Paralytis altera, Caesalpin. Verbasum odoratum, Fuch. Dod. gal. Verbasculum quorundam, Gesn. hort.
Arthritica eidem. Arthritica simplici luteo flore, Camerar. Alyssma pratorum, Columnæ. IIX. Ver-
basculum hortense multiplex, C.B. Arthriticae genus dasypodium seu Densifolium, Gesn. hort. Arthriti-
ca pleno flore, Cam. Primula hortensis Anglica, Lob. Lugdun. Primulae veris flos multiplex, Dodon. fol.
Primula veris multiflora, Tabernæmontano. IX. Verbasculum pratense inodorum, C.B. Primula
veris altera, Matth. Lugd. Primula veris syluestris, Thal. Primula sylv. tertia, Tabern. Herba Paralytis alba,
Brunf. Herba Paralytis sylv. Trago: Verbasculum non odoratum Fuch. Verbasculum album, Dod. gal.
X. Blattaria lutea (est enim & alba, viridis purpurea, &
maximo flore.) folio laciniato, C.B. Blattaria Matth. Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Ges. hor. Lon. Lob. Cast.
Lugd. Blattaria flore citrino, Ges. hor. Blattaria lutea, Cam. Verbasum Leptophyllum, Cordo in histor.
Verbasum nonum, Caesalpino.

a Meum. δα-
σεία χυλεία
i hirsuta, den-
ta.

b Meum, &
Cat. παχέας
i. crassas.

c Meum &
Cat. non legit
monte Troa-
dis.

Me. pro con-
clusis αιμα-
τος πύσει. i.
Sanguinis spu-
to, vt Cat. le-
git αιμοσπί-
κος. i. sangui-
nem excrean-
tibus.

Aιθιοπία.

ÆTHIOPIS.

CAP. C.

Aethiopsis folia habet verbasco similia a, perquam hirsuta, densaque, in orbem circa radicem imam
redacta: caulem quadrangulum, f scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concavum alis: se-
men erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, b
plenas, glutinosas gustu: quae siccae nigrescunt, duranturque, vt cornua possint videri. Plurima nascitur
in Ida c monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur [purulentis excreationibus,] ischiadicis, pleuriticis,
arteriae scabritiis, decocta radix, & pota: quin & cum melle, eclegmatis vicem praebet.

Tamet si iam pridem existimauerim, Aethiopidem herbam in Aethiopia, & Ida Troadis tantum nasci, quod eam ini-
bi plurimam gigni testentur Dioscorides, & Plinius: hoc tamen anno legitima, ni fallor, Aethiopsis ad me allata est
Patavio ab erudito iuvene medico Ioanne Odorico Melchiorio Tridentino, quam, nulla prorsus reclamante nota, Aethio-
pidem referre deprehendi, vt eius pictura, quam hic damus, pulchre demonstrat. Aethiopidam non reperio meminisse Gale-
num in simplicium medicamentorum censu: quanquam eam memoria prodidit Paulus lib. 7. vbi non plures de hac herba
vires tradit, quam quae Dioscoridi accepta referri possunt, cum ita scribat: Aethiopsis similia verbasco habet folia. Radicis
decoctum potum auxiliatur ischiadicis, pleuriticis, & sanguinem reijcientibus: arteria etiam asperitate cum melle lenis.

Aethiopidis
consideratio.

Aethiopidis
vires ex Paul.

Nomina

ÆTHIOPIS.



Arctii cōsid.
Ruelli error

Arctii
ex Gal.

radicem teneram, ac dulcem. Ex quibus sanè notis repugnantibus Ruelli opinio evidentissimè refellitur. Nullam equidem hactenus herbam reperi, ac vidi, quæ Arctium legitime referat. Huius meminit Galenus libro 6. simplic. medic. ubi de coina scriptum reliquit: Arctium illud, quod verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci: caule oblongo, & molli: semine cumino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exiccantis, extergentisq;, tamen modicè. Quamobrem radix, ac semen eius cocta cum vino, quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta, & chimebla, non horum modo decoctum perfusum, sed & caules teneriores sanari possunt. Quod ἀρτίου Græci, Arctium quoque Latini dicunt: Itali, Arctio.

I. PERSONATA, SIVE Lappa maior.

Nomina

a Meū. & Car.
ἀστέρα. i. hirsuta.



Personata
consideratio.

Vt Græci hæc planta ἀρτίου: ita etiam Latini Æthiopia nominatur: Itali, Etiope & Etiopide.

† Hoc loco in vulgatis Græcis codicibus legitur ἄρτιον, hæc est, crassum. Quam vocem interpres Plinius forte, ut solet, secutus omisit. Sed cur nos eam non adiecerimus, scit Orb. quem in hoc Plinio adstipulari inuenimus.

Æthiopidem foliis sinuosis, & in profundas lacinas diuisis (cuius figura in vniuersali historia) obseruauimus. Dicitur Æthiopia, Matth. Ges. hor. Dod. gal. & fol. Lac. Lon. Lob. Cast. Lugd. Tab. Casalp. Æthiopia phlomitis, Lob. in iconibus.

Αρτίου. ARCTION. CAP. CL

Arction, aliqui potius Arcturon vocant, similitudo est verbasco foliis, nisi quod hirsutiora, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta, pernionemq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam è vino.

Creddidit Ruellius, Arction eam esse plantam, quæ & semper vias, & in scrobium marginibus nascitur, quamq; officinarum vulgus Lappam minorem appellat. Sed Ruellius in hoc haud dubie, meo quidem iudicio, fallitur, neque credendum est. Siquidem, ut diligenter notas expendentibus perspicuum fiet, Lappa minor aliud profectò non est, quam Xanthium: inferius à Dioscoride representatum. Etenim Lappa minor folio verbasci, eoque hirsutiora non visitur: neque caulem profert longum, & mollem: qui nec semen cumino simile, neque id exiccantis, extergentisq;, tamen modicè. Quamobrem radix, ac semen eius cocta cum vino, quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta, & chimebla, non horum modo decoctum perfusum, sed & caules teneriores sanari possunt. Quod ἀρτίου Græci, Arctium quoque Latini dicunt: Itali, Arctio.

Αρτίου. PERSONATA. CAP. CL

Personata folia habet cucurbitæ, maiora tamen, & hirsutiora, nigriora, & crassiora: caulem albicantem, quæquam & interdum vidua caule reperiamur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ vnius pondere pota cum pineis nucibus, purulenta, & cruenta extus sufficientibus auxiliatur: trita dolores a contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlcibus alinuntur.

Tametsi de vna tantum Personata meminerit Dioscorides, nos tamen duo in Bohemia obseruauimus genera, Echinatorum tantum capitum facie differentia. Siquidem in altero maiora, duriora, & rigidioribus asperioribusq;, aculeis spectantur: in altero verò minora, molliora, & mitioribus aculeis, alba quadam lanugine circumquaque obtectis extant. Maior folia habet cucurbita maiora, nigriora, hirsutiora, crassioraque: caulem crassum angulosum, albicantem, sesquicubitalem, atque ramosum: fructu copioso echinato, non magno, aculeis repandis, vestibis pertinaciter sese innectentibus ac inherentibus. Floribus purpureis, semine cnicis minore. Radice longa, vegeta, intus candida, foris nigra. Nascitur passim in agrorum marginibus, secum itura & fructu

et fere ubique. ALTERA folys exit minoribus paulo, caule ramoso: capitulis pariter echinatis, sed minoribus, alba lanugine oblectis: mitioribus aculeis flore capillaceo, purpurascens: semine alteri simile. Nascitur ubi & prior: & eadem cum illa praestat. Hanc eam sane esse crediderim quam Plinius libro 25. cap. 9. non Personatam, sed Perfoliatam vocat his verbis: Perfoliatam, quam nemo ignorat, Graeci vero Arcion vocant, folia habet et maiora etiam cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraque, & crassiora: radicem albam, & grandem. Haec Plinius. Ex cuius notis facile cognosci potest, Plinium hic secundum Personatam genus descripsisse. Nam de altera Personata scripserat quoque eodem capite & libro, sic inquit: Personatam quidam Arcion vocant, cuius folio nullum est latus, grandes Lappas ferentem. Ex quibus Pliny verbus planum fit, illi personatam designare, qua maioribus cum folys, tum lappis, siue Echinis habetur. Perfoliatam vero quae minoribus est lappis sine echinatis capitulis. Quo fit, ut maxime redarguendum putem Leoniceum, utpote qui Plinium in hoc perperam denuciaverit, afferens non nisi unum Personata genus reperiri. Caterum Brasauolus in suo simplicium examine, Lappam credit esse Dioscoridis Aparinen, in hoc euidenter hallucinatus, quam ut eius error explodi debeat, ut etiam y diiudicare poterunt, qui in re herbaria etiam mediocriter versati fuerint. Caterum cum Perfolata in mentem mihi redegerit plantam, quam quidam Perfoliatam vocant, praetermittere quidem non potui, quin de ea hic mentionem facerem. Est itaque PERFOLIATA planta, quae folia profert pinguis, subrotunda, sed in acutum desinens, pisi fere modo, venis pluribus crassius-

Plinii tutela.

Brasauoli hallucinatio.

Perfoliatæ mentio & vires.

II. PERSON. SIVE LAPPA MAI. ALT.

III. PERFOLIATA.



Arctium Bardana
 culis secundum longitudinem protensis. Haec priusquam caulem edat, humi procumbit. Caulis subinde erumpit gracilis, glaber, rotundus, atque etiam ramosus. Folia quae in caule sunt, & in ramis, ab his magno natura artificio umbilicatenus perfoliata sunt. Quo fit ut ego Personatam potius, quam perfoliatam appellandam hanc plantam esse censeam. Flores gerit aureos, & capitulis quibusdam proeuntes, & in stella modum radiantibus, foliosos, odore non ingrato: semen nigrum, pellucidum, piliis semine maius. Radice n. ritur unica, sed fibrosa. Nascitur in vineis, arvis, inter segetes, in pratis, & agrorum limitibus. Floret aestate. Gustu est sibi amaro, & adstringenti. Datur herba ipsa in vino decocta, aut in pulverem trita ad internas affectiones & ad rupta. Ideo libitur vtiliter ad umbilici eminentiam, & ad Enterocelas. Strumas etiam resolvit, & curat, si emplastri modo imponatur. Illinitur quoque vtiliter ad omnes inflammationes. De Personata sub alterius Arctij nomine differuit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, his verbis: Alterum verò Arctium, quod Prosopida vocant, cuiusq; folia cucurbitae simillima sunt, nisi quatenus tui maiora, tum duriora, discunt simul & desiccant, sed & adstringit mediocriter. Quamobrem folia eius veteribus viceribus mederi possunt. Semine potum calculosis auxiliatur: idem facit radice decoctum infusum. Quae planta Graecis ἀρτίον, Latinis Personata vocatur: officinis, Bardana: Italis, Lappola maggiore: Germanis, Groß Kletten: Hispanis, Bardana, & Pagamaceramayor: Gallis, Gloteron, & Bardana. At Personata altera: Plinio, Perfolata: Italis, Lappola. Sic Perfoliata: Italis, Perfogliata: Germanis, Durchwachs.

Personata vires ex Gal.

Nomina.

Arction ab Arcio Dioscorides distinguit, illud Lappa maior est montana, hoc Lappa maior vulgata.
 I. Lappa maior vulgata, Arcion Dioscoridis, C.B. Personata seu Lappa maior, Matth. Lugd. Lob. Personata, Lac. cui & Bardana maior, Lon. Cast. Personatia Fuch. Lappa maior, Brunf. Trag. Turn. Casal. Arctium, Dod. gal. Cord. in Dioscor. Arctium, Thalyo. II. Lappa maior montana, Arction Dioscoridis, quae eadem cum ea quam Lappam maiorem lanuginosis capitulis in Phytopinace nominatumus, C.B. Personata siue Lappa maior altera, Matth. Lugd. Arction montanum & Lappa minor Galeni, Lob. Arctium, Casalp. Bardana siue Lappa maior, Dod. hist. latina in folio. III. Perfoliatæ, quam aliqui Coptyledonem Diosc. suspicantur, septem species in Phytopinace fecimus: hæc quæ vulgaris est, dicitur Perfoliata.

a Meū. ἐφ' ἧ
κύλλον τε-
τασώδες μέ-
γας προσκεί-
μενον ὡσπερ
μύκη. i. in
quo folium
instar galeri
magnum, in-
cumbens vel-
uti fungus.

foliata, Matth. Brunf. Cord. in hist. Ges. hort. Dod. fol. Lon. Cast. Lugd. Tab. Perfoliatum Fuch. Dodo. gal.
Perfoliata maior, Trag. Cam. Perfoliata vera, Thal. Perfoliatum vulgatus flore luteo, folio umbilicato,
Lob. Cacalia, Lac. Sefeli Æthiopicum Dioscoridis, Cæsalpino.

Πετασίτες.

PETASITES.

CAP. CIII.

Petasitis con-
sideratio.
Ruelli, & Fu-
chsi opinio.

Petasites pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis a quo prae grande folium, galeri modo am-
plum, ceu fungus dependet. Cōtra phagedanas, & vlcera quę cacoethe vocantur, efficaciter illinitur.

Petasitis vires
ex Gal.
No mina.

Quanquam scribit Ruellius, nasci Petasiten in Gallia, non tamen video, quomodo quis recte eius sententia subscribere
possit ac debeat. Quandoquidem maiorem Tusilaginem, de qua libro tertio disseruimus, pro Petasite sumpsisse vult-
tur, quam etiam ipsum forte secutus Fuchsius pro eadem depinxit. Sed quoniam Petasites pediculum fundit cubito proce-
riorem, a quo amplum folium, galeri figura, tanquam fungus dependet: cui folium huius Tusilaginis minime respondere
deprehenditur, hinc fit, vt horum alioqui doctissimorum virorum sententiam improbandam existimem, vt libro tertio
nostrarum Epistolarum ad Hieronymum Heroldum Norimbergensem Medicum scribentes, fusius declarauimus. Nobis ha-
ctenus veram Petasiten non licuit inuenire. Atque adeo mea sententia est, quod hac non nascatur in Italia, argumento,
quod tam grande folium tam diu nunquam latere potuisset. Petasitis vires paucis reddidit Galenus lib. 8. simplicium medi-
camentorum, sic inquit: Petasites ex tertio est ordine desiccantium. Quamobrem ad maligna, qua cacoethe vocantur,
& phagedanica vlcera, ea vtuntur. Non secus Latinis Petasites, ac Graecis πετασίτης, nominatur.

Ἐπιπακτίς.

EPIPACTIS.


CAP. CIIII.

a Meū. ταμ
νίσκος μικρός.
i. frutex par-
uus.

EPipactis ab aliis elleborine, a parua herba, exiguis foliis. Iocineris vitis utilis, & contra venena pota.

I. EPIPACTIS.

II. ELLEBORINE.



Epipactidis
consideratio.

EPipactida adeo paucis perstrinxerunt Dioscorides, ac ceteri, qui ante & post ipsum de plantarum historia scripserunt,
vt difficile admodum sit discernere, quam plantam sit hac in Italia, vbi fortasse ea non prouenit. Nam, vt Plinius lib.
13. ca. 20. commemorat, Epipactis in Asia, & Graecia nascitur. Verum enimvero si Epipactis Elleborine ex eo dicta est, quod
cum Elleboro nigro similitudinem habeat, ea quidem nobis Epipactis erit, qua nascitur in Goritiensi agro, quam Ep-
pactida appellare libuit, non quod ipsam Dioscoridis Elleborinem esse censeamus, sed quod Elleborum nigrum quadantem
representet folijs, floribus, atque etiam radicibus. Epipactidis inter simplicia, quod inuenerim, non meminit Galenus. Sed
Paulus idem, quod Dioscorides, de eius viribus tradidit. Hac Ἐπιπακτίς Graecè dicitur: Latine item Epipactis, & Elleborine.

Nomina.

I. Helleborine Saniculæ facie, C. B. Epipactis Matt. Lac. Elleb. Matt. in Epito. Lugd. Tab. Alpina Elle-
borine Saniculæ, & Ellebori nigri facie, Lob. Hac nobis nondū cōspecta. D. Cam. eius loco Elleb. vulgō
dictā substituit: ex cuius radice fibrosa & albicante, caulis penē cubitalis exurgit, quę complectitur folia
Ellebori

Hellebori albi similia, lata, acuminata, vena striata: caulis summo flores ordine digesti foliacei, Orchidum forma. oblongo calcari donati, albicantes, medio prominente tubulato. ex quorum ternis foliolis oriuntur oblonge & striatae silique, semine minutissimo natar serobis et ferta. Provenit locis umbrosis, montosis & paludosis. Plures differentias & ratione foliorum, & ratione tam forme quam coloris florum, notavimus. Dicitur Helleborine & Epipactis. Dod. gal. & fol. Lob. Helleborine prima, Tab. Elleborine recentiorum prima, Clus. hist. Pann. Elleborine. Lugd. Cam. in hno Matth. Satyrium octavum, Trag. Damasonium tenuifolium, Cordo in histo. Sigillum S. Mariae primum, Cæsalpino.

Κατρίε

FUMARIA.



CAP. CV.

Fumaria fruticosa herbula est, pratenera, coriandro similis, foliis candidioribus, vndique numerosis, cinerea et coloris: flore purpureo. Huius succus acris est: claritatem facit oculis, de lacrymatione, que inde nomen traxit. Illius cum gummi, equalis palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam urinam trahit.

a Meum. Bo-
an. i. herba.
b Meū. addit.
ὄστρον ἢ κρηταίς
εὐκρίσσο. i.
in hordeo na-
scens.

I. FUMARIA.

II. FUMARIA ALTERA.



Fumaria, herba vulgaris admodum notitia, qua in hortis, vineis & capis nascitur, officinis passim vocatur Fumus ter-
ra. Fumarie vero nomen sibi ascriuit, quod eius succo oculis immisso, quibus mirifice claritatem conciliat, lacrymas,
quemadmodum & fumus, creat. Debet hac Mauritania longe magis, quam Graecis, quod illi eam pluribus comendauerint
vribus, nec eus quidem contemnendis, ut Serapionem, Auicennam, & Mesuem legentibus facile patebit. Fumaria Plinio
duo traduntur genera lib. 25. cap. 13. vbi ita scriptum reliquit: Capnos prima, qua pedes gallinaceos vocant, nascens in pa-
rietinis. & sepius, ramis tenuissimis, sparsisq; flore purpureo, viridis, succo caliginem discutit: itaque in medicamentis o-
culorum additur. Similis & nomine. & effectu alia est Capnos fruticosa, pratenera, foliis coriandri, cineracei coloris, flore
purpureo. Nascitur in hortis, & segetibus hordeaceis. Claritatem facit iniectis oculis, de lacrymationemq; ceu fumus, vnde
nomen accepit: eadem euulsas palpebras renasci prohibet: haec Plinius. Caterum quamnam altera sit Capnos, qua etiam ab
Aetio describitur, superius lib. 3. de Aristolochia, & Pistolochia differentes latius explicauimus. Figitur illos remittamus,
qui plura de altero Fumaria genere scire desiderant. Huic satis nobis sit eius tantum imaginem exhibere, Fumaria alterius
nomine inscriptam, atque eius notas, quas loco citato retulimus, omittimus, ne idem frustra repetere videamur. Porro in
notis, & Dioscoridi adscriptis simpl. nomenclaturis, reperio Capnos quibusdam Corydalion appellari. Vnde factum est, ut
creuicium de Capno intellexit Gal lib. 11. simp. med. vbi de Galerita scribes, qua Graecis corydos dicitur, Corydalis herba
meminit, sic inquit: Adici hac sermoni, quod vellem clare hoc animal, nempe galeritam, manifestare, quos ferat in ca-
pite pilos cretos: quandoquidem expertus sum eius aduersus colicos vtilitatem, velimq; qui ipsum non norunt, his bene mo-
stratum. Nam & ipsa CORYDALIS appellata herba colicis conuenit. Et hoc quoq; tibi obiter sit notatum: haecenus Gal.
Verum an de vulgari capno intellexerit is, an de aliqua altera eius specie, ego quidem haud discernere ausim. Nam de Ca-
pno scribens lib. 7. de simpl. med. fac. nullam prorsus aduersus colicos affectus illi facultatem tribuit. Quo fit, ut non parua
mibi oriatur suspicio aliam capni speciem Gal. CORYDALIM designare. Quare non mihi displicet quorundam opinio,
qui plantam, quam hic sub Corydalis nomenclatione appingi curauimus, quamq; Split nonnulli vocant, quod maiori Ca-
pno hanc congenerem esse videant: quodq; eandem colicos curare sciam, legitimam Galeni Corydalis faciunt. Huic accedit
stosculorum facies, qua Corydali auicula fere similis est. Crescit hac planta folijs coriandri emulus, sed minoribus tenuiori-
busq; caulibus exilibus, ramosis, foliosisq; floribus in summitate auicularum speciem referentibus: radicibus numerosis, te-
nuibus,


Fumarie co-
sideratio.

Fumarie ge-
nera ex Plin.

Corydalis de-
scrip.
Split.

III. FUMARIA CORYDALIS.

Fumaria vi- res ex Mesue.



nubibus, praelongis, ac subalbicantibus. Provenit in collibus... tis & agris. Prestat uniuersa planta ad colicos dolores... cens deuoretur, siue sicca in puluere sumatur ex vino... bus diebus. Sed iam ad Fumaria vires redeamus, quas primis... ex Mesue sic ad sensum referam. Fumaria inter mitiora, in- nocentioraq; recensetur medicamenta, quibus deiectiona va- inest: verum nimia huius herba copia facit, ut eius quope- auctoritas & pretium plurimum diminuat. Hec non mo- do aluum soluit, sed & viscera roborat, contrahitq; disten- eorum villos. Omni prorsus noxa caret: quo fit, ut hanc ex- bus nullum inferat incommodum. Roboratur deiectiona cu- facultas, quod non admodum sit valentior, additu myrroba- lanis, sena, caprino sero, infectorio cocco, aut vuis passu. Pra- stat qua virentior, foliis extensis, non sane crispis, & que va- laceo sit flore. Colligi debet verno tempore, & ex eo succus ex- primi. Sunt qui hanc in uniuersum temperamento frigidum dixerint, sed aberrarunt, quoniam in ipsa foliorum super- cie reperitur & caliditas, que tamen eius frigiditatem non superat. Siccat praterea ordine secundo, sed semen calidum est. Deprehenditur sane eius caliditas ex amaritudine, & a- credinis parte quadam modica, qua gustu percipiuntur. Qua- propter attenuat, penetrat, obstructions aperit, ac deiectiona est facultatis. Sicuti frigiditatis, & acerbæ qualitatis admi- culo cohibet, aggregat, & roborat. Aluum facile deiectione trahit, & adustos humores. Eius vis non modo ad hepar, sed & ad venas diffunditur. Quamobrem sanguinem expurgat, omnibusq; incommodis medetur à bile, aut exustu humori- bus prouenientibus. Proinde elephantiasis medetur, aduersus carcinomata efficax est, lichenas, & alia cutis vitia mirisimè emendat: quin & omnibus morbis auxiliatur, qui ex vi- rum infarctu originem ducunt. Roborat Fumaria venterum iecur, & cetera interna viscera, biliosaq; finit febres, quen-

Fumaria vi- res ex Gal.

admodum & eas, que ex vasorum obstructione excitantur. Fumaria meminit Galenus lib. 7. simpl. medic. ubi de eius vir- bus disserit his verbis: Capnos, hoc est Fumaria, acris simul, & amara qualitatis est particeps, nec tamen plane exersa est a- cerba. Quamobrem vrinam biliosam multum prouocat, sanatq; iecinoris obstructions, & debilitates. Succus eius oculo- rum aciem acuit, non paulum trahens lachrymarum, vult ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea vti solebat ad stomachum roborandum, vnaq; ventrem lubricandum. Siquidem herbam primum desiccata condebat: porro cum vti volebat, subductionis quidem gratia, melicrato inspergebat: at roborare volens stomachum, vino nimirum diluto. Fumaria alterius radix amara est, & ea omnia potest vna cum herba, qua altera Fumaria. Radix ex vino pota- venenis, & pestilentia medetur: sudorem & vrinam ciet, & ictericos iuuat: semen bibitur ad diuturna alui profluvia. Ra- dicis farina, manantia qualibet vlcera exiccat & mundat. Herba, que Græcis καπνός, Latinis quoque Capnos & Fuma- ria nominatur: Arabibus, Scheiterig, siue Sabeteregi: Officinis medicorum, Fumus terra: Italis, Fumaria, & Fumoterra: Germanis, Erdtrauch: Hispanis, Palomilha: Gallis, Fumeterre. At Fumaria altera, Græcis, καπνός ἑτέρα: Italis, Fumo- sterno maggiore: Germanis, Holtwurk. Sic Corydalis, Græcis, κορύδαλις: quibusdam Split: Italis, Coridala.

Nomina.

Fumaria non bulbosa & bulbosa proponitur. I. Fumaria officinarum & Diosc. C. B. Fumaria Mat. Trag. Fuch. Lac. Cordo in Diosc. Gel. hor. Lon. Dod. fol. Lug. Cef. Tab. Fumaria maior, Cast. Fumus terre, Brunf. Cam. Thal. Capnos, Turn. Dod. gal. Anguil. Lob. II. Fumaria bulbosa maior radice caua, C. B. Fumaria altera, Matth. Cast. Fumaria bulbosa, Lug. Tab. Capnos phragmitis, Turn. Capnos Chelidonia, Lon. Chelidonia phragmitis altera, Cor. in hist. Chelidonia Capnitis quorundam, Thal. Aristol. rotunda. Brunf. Aristol. rotunda vulgaris, Trag. (cui & Hyacinthus tertius) Fuch. in ico. Gel. hor. Cam. Pistoloch. Fuch. Radix caua maior, Dod. gal. & fol. Cast. Radix caua herbariorum, Lob. Clus. hist. Pan. Leontopetalon alterum, Cef. Hæc duplex est, altera radice caua, altera solidâ, nunquam eodem loco reperias: notanda et- iam differentia manifesta in foliis: folia etenim, quæ flores intercedunt, in ea quæ radice caua est, integra sunt, at in altera quæ radice solida vericillata, diuila sunt: nil dicimus de diuersitate colorum in floribus ra- dicis cauæ, hæc fusissimè in uniuersali hist. pertractaturi. III. Fumaria lutea (rarius enim alba) C. B. Fuma- ria corydalis, Matth. Fumaria montana, Gel. hor. Tab. Fumaria phragmitis altera, Gel. hor. Fum. lutea mo- tana, Lob. (cui & Chelidonium capnites Actij) Lugd. Corydalis, Cast. Cam. Split vulgo, Cam. Cefalipino.

Λωτὸς ὕμπερος.

LOTVS VRBANA.

CAP. CVI.

a Meum. κα- λυπωματα. i. & albugi- nes.

Lotum urbanam alij trifolium vocant: nascitur in hortis. Extractus succus addito melle, oculorum as- gema, nubeculas, a cæterisq; caligines discutit.

Λωτὸς ἄγριος.

LOTVS SYLVESTRIS.

CAP. CVII.

Sylvestris Lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Lybia gignitur, caule bicubitali, & se- pe maiore, alis multis: foliis trifolij pratensis: semine fœni græci, multo minora, gustu medicato. Vm calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cum maluæ semine, in vino aut passo, bibitur aptissimè contra dolores, qui velicam male habent.

I. LOTVS VRBANA.

II. LOTVS SYLVESTRIS.



N^olla certè haecenus nobis sese obtulit herba, cui meritò subscribi possit, hac est vera ac legitima Lotus sativa. Caterùm non desunt è recentioribus, quorum opinionem tuetur Gesnerus vir doctissimus, in suo libro animalibus dicato, qui putant, Lotum sativam esse Trifolium illud, quod in pratis passim atque alibi etiam provenit: eo sorte argumento adducti, quòd Dioscorides scripserit, Lotum tam urbanam, quam sylvestrem ab aliquibus trifolium appellari. Sed quod errent, qui ita sentiunt, ex eo manifestè cognoscitur, quòd à Dioscorido Loto sylvestri folia trifolij pratensis tribuantur. Nam si Dioscorido Lotus sativa fuisset trifolium pratense, us nimirum scriptus tradidisset, eam in pratis nasci, non in hortis: atque satis illi fuisset Lotum sylvestre sativæ similitudine reddere, ommissa trifolij pratensis mentione. Hinc ergo colligendum arbitror, Lotum esse plantam altam à Trifolio: eosque in errore versari, qui jecus opinantur. Sunt porro alij, qui existimant, eam plantam esse Lotum urbanam, quam vulgares herbarij, & officina Melilotum falsò appellat, utpote quæ folij consitet trifolij effigie, nascaturque non in pratis tantum, sed etiam in viridarijs ac hortis. Verum horum sententiam cur plane probem, aut refellam, nihil equidem habeo, cum y sua potius opinione duci, quam rationibus aut auctoritatibus niti videantur. Ego vero Urbanam lotum eam trifolij odoratam plantam esse censeo, quam antea Cytisum faciebamus, quæque Roma vulgò Tribolo dicitur, & alibi in Italia Trifoglio cavallino, quod eius pabulo maximè delectentur equi. Siquidem hac omnino Trifolij genus est, odore sanè eximio ac suavi. Quo fit, ut unguentarij, & qui odoratis aquis consiciendis dant operam, ex hac quoque planta stillatitiam consiciant aquam. At qui non solum adducor at credendum, hanc herbam esse Lotum urbanam, quòd folia gerat trifolij adeo similia, ut Trifolium quoque dicatur, sed quòd sciam, eius succo oculorum nubeculas deleri. Lotus urbana caules edit bicubitales, ac etiam maiores, rectos, firmos, ramosos, & in his folia trifolij pratensis amula, leuiter per ambitum denticulata, beneque olentia: flores edit racemosos, tenues paruosq, luteo colore, aut albo, odoratosq. Nascitur in hortu, pratu, agris & vbiq; fere locorum. Germani huiusce flores colligunt, & pro meliloto passim utuntur, quemadmodum Bohemi consultius sortasse, quam Itali. SYLVESTRIS verò Lotus, quam copiosam in Lybia gigni tradidit Dioscorides, an nascatur in Italia, non ausim affirmare, quòd non meminerim ibi eam me vsquam vidisse. Verùm in Bohemia copiosa admodum provenit, folijs Trifolij pratensis: caule cubitali & saepe maiori, ramoso, alis multis: floribus in capitulis caeruleis: semine fenograci: sed paruo, & odorato. Loti utriusque vires reddidit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Lotus domestica, quam quidam triphyllon, hoc est, trifolium nominant, ut mediocriter concoquendi vim possidet, sic etiam exiccandi: in caliditate, frigiditateq, conjugatione medica quodammodo est, & temperata. Lotus autem agrestis plurima in Lybia provenit. Semen eius secundi est ordinis excalfacientium, habetq, nonnihil absterforium. *ἄρτος* quæ Græcè ἄρτος, Latine Lotus urbana cognominatur: Italis, Loto domestico. Tribolo, seu Trifoglio cavallino. Quæ verò *ἄρτος* Græcis, Lotus sylvestris Latinus vocatur: Italis, Loto saluatico. Arabes utrunque cum Aegypto etiam indifferenter vocant Handachocha, Garch, & Thusf.

Loti utriusq; consid. Ge. neri, & aliorum opin. reprobata.

Melilotus Germanorū Lotus syl.

Loti utriusq; vires ex Gal.

I. Trifolium odoratum seu Melilotus officinarum, C. B. Lotus urbana. Matth. Lotus sativa Castor. Camer. Lotus sativa altera, Lugd. Lotus sylvestris. Fuch. in icon. Casalpino Taber. Loti sive Trifolij species. Cordo in Dioscorid. Melilotum, Lacu. cui & Saxifraga altera. Melilotum maius, Brunf. Melilotus maior vulgaris, Trag. Melilotus vera, Gesl. hort. Taber. Melilotus Germanica, Dod gal. Lob. Camer. Melilotus vulgaris, Lugd. Melilotus alba & lutea, Loni. Trifolium odoratum, Dod. fol. Thal. Saxifraga lutea, Fuch. II. Trifolium odoratum alterum, vel Lotus hortensis, C. B. Lotus sylvestris, Matthiolo Castori.

Lotus satiua, Fuchsin icon. Cord. in Diosc. & histo. (cui & Andacocha Arabum) Dod. gal. Geshort. Cam. Lotus vrbana, Turn. Lacu. Lotus syluestris altera, Lugd. Lotus hortorum odora, Lobel. Trifolium Diosc. Trago: Trifolium odoratum, Fuchsin, Turn. Lonic. Trifolium odoratum alterum, Dod. fol. Lugd. Trifolium Caballinum Gesnero de hortis Germaniæ.

ΚΥΤΙΣΟΣ

CYTISVS.

CAP. CVIII

Cytisi confideratio.



Cytisus fruticosa est, non herba.

Cytisus arbor Straboni.

Cytisi historia ex Col.

Etus etiam, vt existimarem, illud Trifolij genus odoratum, quod postea Lotum esse vrbana agnouimus, omnino esse Cytisum. Verum enimvero cum postea rem hanc accuratius rectiusque expendissem, me in errore versari deprehendi. Proinde presentia non grauabor priorem mutare sententiam, constanterq; affirmare, aliam ab illa planta Cytisum esse nec tam quidem herbam, sed fruticem, qui cultura arborefcit. Non enim is sum, qui opinionis alicuius sustinenda gratia adeo pertinax esse velim, vt falsum magis, quam verum tueri contendam. Sed quod iure putem in aliam me deuenisse sententiam, scit imprimis Galenus libro primo de antidotis, vbi Cytisum fruticem esse myrti magnitudine scribit, his verbis: In Syria quoque, qua parte nostra prouincia finitima est, tractus occurrit, quem Britton nominant, in quo mel Attico persimile magna cum admiratione conspexi. Extabat enim ibi quoque collis quidam non magnus, saxeus totus, thymo, & origano fertus: alibi locus erat Cytiso plenus. Apes plurimum mellis ex Cytisi floribus excerpere scriptores vno ore tradunt. Fruticosa vero planta Cytisus est, eam altitudinem attingens, ad quam myrti crescunt: hac Galenus. Est deinde Plinius, quem Galen subscripsisse inuenio libro 12. ca. 3. cum inquit: Alterum est ebeni genus fruticosum, Cytisi modo & tota India dispersum. Et libro 16. cap. 38. vbi inter arbores Cytisum enumerat, scribens: Tota ossa est, ilex, cornus, robur, Cytisus, morus, ebenus, & que sine medulla esse diximus. Sed hac prius a Theophrasto scripta sunt lib. 5. cap. 4. de plantarum historia, huic verba Ergo grauissima, spississimaq; Buxus tota. Ebenus sua tantum medulla, in qua & coloris nigredo constat. Neutra in aqua fluitat. Ex reliquis ceteri primus indubie datur. Spissa & roboris medulla, q; atrum cognominant, atq; etiam magis Cytisus quippe cum hac proxima ad Ebenum accedere videatur. Constat prater id Cytisum esse arborem Strabonis testimonio. Ipse enim de Balsamo scribens lib. 16. sua Geographia: Balsamum inquit, arbor est odorata, & fruticosa, Cytiso, & Terentibus similis. Accedit his etiam Columella, qui idem testari videtur in cal. e libri 5. vbi cum longius de Cytiso differuisset, demum inquit: Hactenus de arboribus precepisse abunde est. Horum itaque probatorum authorum testimonio planum fieri arbitror Cytisum arborem esse fruticem myrti modo, vt Galenus scriptum reliquit. Porro Cytisi plantam cuius imaginem hic excudi curauimus, mihi dono Iacobus Antonius Cortusius, patritius Patavinus. Eam quidem legitimam referre Cytisum omnibus suis notis conspicuum est. Nam non solum ipsius folia, & totius planta color Cytisum referunt, sed & ipsa ligni materies, qua nigra est, & Ebeni modo firmissima. Nascitur (vt audio) copiosa in Regno Neapolitano, ac etiam fertur alibi in Italia, quanquam a me nusquam visa sit antea. Caterum non desunt, qui sibi persuadeant, atq; etiam scripta mandant, vt Gesnerus in libro magno, quem de quadrupedibus edidit, se Cytisum vidisse, legisseque in Italia in syluis, alioque syluestribus locis, qui per se tantum proueniat. Sed equidem dubitauerim, ne & ipsi decipiantur: quandoquidem q; quorundam ex eorum scriptis colligi potest, Coluteam sic Theophrasto vocatam sumunt pro Cytiso. Neq; propterea illud dixerim, quod putem Cytisum sua sponte no prouenire, cum teste Columella li. 9. ca. 4. de re rustica, duplex sit Cytisus, vna satiua, & altera sua sponte: sed quod scribat Plinius, rarum esse in Italia. De satiua autem Cytiso diligentissime scripsit idem Columella li. 5. de re rustica, capite vltimo, cuius hic verba subiiciam. Cytisum, inquit, in agro esse quam plurimum maxime refert, quod gallinis, apibus, capris, bubus quoque, & omni generi pecudum utilissimus est, quod ex eo cito pinguescit, & lacte plurimum

Cytisus frutex est albus in totum, vt rhamnus, & mos spargens cubitales, & maiores: in quibus folia feni graeci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, guttaq; cicere recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur: decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli, quod aperit liciat, prope aluearia serunt.

Redidimus iam dudum Cytisum, si tamen in Italia proueniret, non aliam esse plantam, quam eam Trifolij odorati speciem, qua Romanis vulgo appellatur Tribolium: verum Trifoglio cauallino, hoc est, Trifolium equinum, a quod equis gratissimum sit pabulum, cum nulla sane non occurreret planta, qua magis notis omnibus Cytisum praeferre videretur. In hanc opinionem me primum deduxit Plinius, quod scripserit, iumenta degustato Cytiso hordeum spernere. Nam cum certo scirem, equos adeo huius Trifolij genere avidos esse, vt eo magis delectentur, quam hordeo, ana, & reliquis frugibus, idcirco videbar non temere adhaerere, vt crederem, hanc stirpem legitimam esse Cytisum, praeterquam cum pluribus constet notis, qua Cytiso respondent. Hinc praterea alia accedebat ratio, quod cum Dioscoridem videmus Cytiso inter herbas, non autem inter frutices, & arbores inserere, non aliud quidem mihi persuadere poteram, quam quod Cytisus esset herba potius, quam arbor: praecipue cum palam sit, iumenta herbas, & fornum potius depasce, quam arborum frondem. Siquidem eruo, & medica herbis antiquitas armenta & pecora alebat ac saginabat. His itaq; rationibus fretus (tunc enim plura neglexeram inuestigare, adhaerere)

præter quibus: tum etiam quòd octo mensibus viridis: copalulo vti, & postea arido posui. Præterea in quolibet agro, quattuor macterrimo: celeriter comprehendit: omnem iniuriam sine noxa patitur. Mulieres quidem si lactis inopia precuntur, Cytisum aridum in aqua macerari oportet, & cum tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico vino, atque ita potandum dari: sic & ipsa valebunt, & pueri abundantia lactis confumabuntur. Satio autem Cytisi, vel autumno circa idus Octobris, vel vere fieri potest. Cum terram bene subegeris, areolas facito, ibique velut ocymsi semen Cytisi autumno serito. Plantas deinde vere disponito, ita ut inter se quoque versus quatuor pedum spatia distent. Si semen non habueris, cacumina Cytisorum vere deponito, & stercoreatam terram in cumaggerato. Si pluuia non inceserit, rigato quindecim proximo diebus: simul atque nouam siondem agere capere. Satio, & post triennium deinde cadito, & pecori præbeto. Equo abunde est viridis pondo 15 bubus pondo viciena, ceterisque pecoribus proportione vnum. Potest etiam ante Septembrem satio comimode ramis Cytisus serri, quoniam facile comproueniat, & iniuriam sustinet. Aridam si dabis, parcius præbeto, quoniam vires maiores habet, priusque aqua macerato, & exemptum paleis permisceto. Cytisum cum aridam facere voles, circa mensem Septembrem, vbi semen eius grandescere incipit, cadito, pauusque horis, dum siccum fiat, in sole habeto: deinde in umbra exiccato, & ita in condito: hacienus Columella. Plinius quoque Cytisi historiam copiose profertur libro 13. cap. 24. vbi hæc habet. Frutex est & Cytisus ab Aristomacho Athenicensi miris laudibus prædicatus pabulo ouium, aridus vero etiam suum: spondet que iugero eius annua H. S. M. M. vel mediocri solo redditus Utilitas qua eruo, si d. o. uior satietas, per quam modico pinguescente quadrupede: ita ut iumenta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior super omnia pecorum medicina a morbis omni usu præstante. Quam & nutruius in defectu lactis aridum: que in aqua decoctum, potur cum vino dari iubet, & firmiores celsioresque infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit madefactum. Apes quoque nunquam defore, Cytisi pabulo contingente, promittunt Democritus, & Aristomachus. Nec aliud minoris impendy est. Seritur cum hordeo, aut vere semine ut portum, vel caule autumno ante brumam. Si semine madidum, & si defint imbres, satum spargitur. Plantæ cubitales seruntur scrobe pedali. Seritur post æquinoctia tenero frutue: perficitur triennio: demetitur vero æquinoctio, cum florere desyt, vel pueri, vel anus vilissima opera. Canus aspectu, breuiterq; si quis exprimere similitudinem velit, angustioris trifolij frutex. Datur animalibus post biduum semper, breue vero quòd in aruit, madidum. Satiant equos denæ libra, & portione minora animalia: obiterque inter ordines allium & cape feri fertile est. Inuentus hic frutex in Cythno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas magno casei prouentu Propter quod maxime miror rarum esse in Italia. Non æstiuum, non frigorum, non grandinum, aut niui iniuriam expauescit: hæc Plinius. Ex quibus hæc certe subit nobis mirari Gesnerum, virum alioqui eruditione clarum, quòd in suo magno libro de quadrupedibus, vbi probare contendit ardetem, quam rura Tridentina Eghelum vocant (nos Plinius. Anagyris generi adscripsimus) esse Laburnum, scribat ex autoritate Democriti Cytisum apibus aduersari. Quæ in re mihi quidem videtur (pace eius dixerim) non fuisse memor illorum verborum, quibus paulo ante asseruerat eiusdem Democriti testimonio, apes nunquam defore, Cytisi pabulo contingente, id quod nos quoque ex Plinio paulò supra retulimus. Ceterum de Trifolio illo odorato, cuius initio huius commentationis, atq; etiam Luchs. libro 3. in Trifolijs mentionem fecimus, neque Dioscorides, neq; Galenus, quod sciam, quicquam memoria prodiderunt. Non desunt, qui Trifolium odoratum quod omnino urbanum lotum representat, velint esse Theophrasto plantam Mel frugum appellatam, quam ipse inter loti genera recenset lib. 7. cap. 14. de plantarum historia, vbi sic inquit: Quædam enim formis pluribus constant, quæquam nomen vnum sortiuntur, ut ita fermè æquiuoca sint, ceu lotus: Illius enim genera plura redundant, folio, caule, flore, fructuq; distret. Inter quæ vel illud redditur, quod Mel frugum appellatur, diuersum tum viribus in usu cibario, tum quòd non eadem loca desideret: hæc Theophrastus. Quæ sententiam illorum sententiam mihi probare non videntur, quòd Trifolium odoratum minime in cubis veniat, & usdem in locis nascatur, in quibus lotorum omne genus vrescere conspicitur. Atqui Plinio lib. 22. cap. vltimo, nil aliud est Mel frugum, Dioclis testimonio, quam Panicum. Cytisi vires Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, reddidit his paucis verbis: Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aqua temperata mistam, sicut & milua folia. Plantæ ut Græcè κύτις, ita etiam Cytisus Latine, & Citiso Italicè dicitur.

Cytisi hist. ex Plinio.

Gesneri lapsus.

Cytisi vires ex Gal. Nonna.

Cytisus à Cythno insula, in qua inuentus, auctore Plinio dicitur: qui hic proponitur quibusdam Cytisus censetur, alij Medicæ speciem faciunt. Dicitur Cytisus, Matth. Lugdu. Cytisus Italicus, Ges. hort. Cytisus Maranthæ & Matthioli, Lob. Cytisus ut existimatur, Dodo. fol. Cytisus in agro Neapolitano, Cæsal. Cytisus tertius cornutus, Taber. Cytisus Galeni, Camer. Verum Cytisi nomine plures ostenduntur plantæ, de quibus in secunda parte nostra: vniuersalis historia, Deo iuuante, dicturi sumus.

ΑΥΤΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ.

LOTUS AEGYPTIA.

CAP. CIX.

Est & in Ægypto lotus, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi occludique, ad ortum autem aperiri: adduntque, caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana, ceu milij, quæ Ægyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; manditur: decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.

Longam satis historiam de Loto Ægyptia posteritatis memoria tradidit Theophrastus libro 4. cap. 10. de plantarum historia, cuius hic verba referam. Qui Lotus, inquit, vocitatur, planis parte maxima prouenit, cum rura inundantur. Huic natura caulis similis fabæ, & fructus eodem modo, verum minores, gracilioresq;. Nascitur fructus in capite, modo quo in faba: flos candidus, lilijs foliorum angustia proximus: multi ac densi promiscui exeunt. Sole occidente se comprimunt, caputq; integunt, ad ortum aperiuntur, & super aquam assurgunt: idq; facit, dum caput perficiatur, floresq; defluant. Capitum magnitudo quanta papaueris maximi, & percingitur incisuris nõ alio modo, quam papauer: nisi quòd in his fructus frequentior habetur, qui milio nõ absimilis est. In Euphrate caput floresq; mergi referunt, atq; descendere vsq; in medias noctes, tantumq; abire in altum, ut ne demissa quide manu capere fit, diluculo deinde redire, & ad diem magis: sole oriète iam extrinsecus emergere, florèq; patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut planè ab aqua absit altè. Ægyptij capita ipsa acerrime putrefaciunt, cumq; tegumeta putruerint, in flumine lauado separant fructu, & siccantes, pinsentesq; panem faciunt, eoque cibo vnum-

Loti Ægyptiæ histo. ex Theophrast.



bo vnum-

bo virtur. Radix loti Corsio appellata, rotunda est, cotonei mali amplitudine, cortice nigro, quali nux castanea tegitur. Cor-
 pus interius candidum: elixum, assumq; in specimen albuminis vertitur, gratū cibis: manditur etiā crudū, sed gratius decoc-
 seu aqua, seu pruna. Hactenus de Loto Aegyptia Theophrastus. Caterum hanc, & supradictas Loti species Serapio sua lingua
 Handachochani indifferenter nominat. E cuius semine oleum exprimitur, Mauritanis ad articulorum dolores experitur.
 Neg, enim sit Handachocha oleum ex vulgari trifolij semine, vt quidam aberrantes existimant, sed ex omnium Lotorum
 semine, & ex eo tantum trifolio, quod asphaltiten Græci vocant. Loti Aegyptie breuiter meminit Galenus inter alia loca
 Nomina. lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Loti Aegyptia semen in panes quidem cogitur. Planta λωτός, αἰγύπτου
 Græcè, Lotus Aegyptia, Latine: Handachocha, Arabicè: & Loto d' Egitto Italicè appellatur.

Μυριοφύλλον. MYRIOPHYLLUM CAP. CX.

a Meū. καύ-
 λισκος. i. cau-
 culus
 b Meū δία-
 πυρρος. i. den-
 fus.
MYriophyllum, siue millefolium, a caulis est tener, singularis, vnica nixus radice: plurimis folijs, lacu-
 bus, fœniculo similibus, vnde nomen accepit. Caulis flauescit, b varius, ac veluti ex industria delima-
 tus: nascitur in palustribus. Vulnere recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum ex aceto
 oblinatur: præcipitatis in potu cum aqua, & sale datur.

I. MYRIOPHYLLON. II. MYRIOPHYL. ALTERVM




Myriophylli
 confid.
Et si nō desint, qui velint Myriophyllum, vt superius in Stratiotis millefolij commentatione diximus, esse vulgare Mil-
 lefolium, quo omnes passim vtuntur in Italia, tamen cum hoc plurimis caulibus à radice profiliat, folijs constet à fœni-
 culo diuersis, nascaturq; in pratis & incultis, non autem in paludibus, hinc satis p' r'spicuum fieri puto, hos qui ita sentiant,
 in errore versari. Equidem legitimum Myriophyllum me inuenisse, & sæpe vidisse credidrim in v' illis Anania palustribus,
 vnico tantum caule, tenero, vnica nixo radice, innumeris foliolis leuibus referto, capilliceis fœniculi modo, odore non in-
 grato, caulis flauescit varius, ac veluti ex industria deliniatus. Huius planta hic picturam damus, aliamq; appinximus ad
 nos Pisis missam ab eruditissimo viro Luca Ghino. Si quis hanc Myriophylli plantam nouerit, is facile Myriophyllum Dio-
 scoridis esse consentiet: & præsertim cum in palustribus nascatur. Myriophylli vires paucis perstrinxit Galenus lib. 7. simpli-
 cium medicamentorum, sic inquit: Myriophyllum vsque aded desiccatoria est facultatis, vt vulnere glutinet. Vulnere re-
 centia ab inflammatione vindicat. si vel viride, vel siccum, ex aceto oblinatur: præcipitatis in potu cum aqua & sale da-
 tur. Quod Græci μυριοφύλλον, Latini item Myriophyllum, & Millefolium aquaticum vocant: Itali, Myriophyllo.

Myriophylli
 vires ex Gal.
 Nomina.

I. Millefolium aquaticum umbellatum, C.B. Myriophyllum, Matth. Lacu. Castor. Myriophyllum aut
 Maratriphyllum palustre, Lobel. Myriophyllum prius, Lugdu. Millefolium, Cord. in Diosc. Lonic. Mille-
 folium aquatile, Dodo. fol. Fœniculum aquaticum primum, Tabernæmontano. II. Millefolium 2
 quaticum, seu Viola aquatica latiore folio, C.B. Myriophyllum alterum, Matth. Lugd. Myriophyllum ali-
 ud, Lacu. Stratiotes fluuiatilis, Ges. hor. Viola aquatilis, Dod. gal. & fol. Fœniculum aquaticum secundum
 Tabernæmontano. Illis addamus duas adhuc species hactenus à nemine depictas. III. Millefolium aqua-
 ticum pennatum spicatum vocamus, quod ex radicibus fibrosis, tenuibus, ramos emittit plures cubitales,
 cauos striatos & ramosos, aqua innatantes: ex quolibet geniculo folia terna vel quaterna, aded tenuiter
 incisa vt pennam & forma & tenuitate æmulentur, colore ex viridi fusco prodeunt. Cauliculorum sum-
 mitates

• III. MILLEFOLIUM AQUATICUM pennatum, spicatum.*

• IV. MILLEFOLIUM AQUATICUM cornutum.*



tates semipalmares, aliquando palmares ex aqua recti extolluntur Junio & Julio mensib. spicâ purpurascē-
tē sustinentes, quæ expanditur in flosculos copiosos ultra viginti simul iunctos, Anethi semen nō magni-
tudine sed forma referētes. pallidè luteos, quib. succedūt capitula quædā nigra & prædura, ac plerūq; qua-
terna aut quina, etiā plura, rotatim cauliculorū fastigia quæ super aquā eminent, ambientia, quibus singu-
40 lise xigua cavitates semē cōtinens inest. Hoc in piscinis prouenit, quod in fossâ arcis Weckethal in Alsatia,
Nobilissimi D. Wolfgangi Waldneri à Freundstein, primū obseruauimus. Hoc videtur Tragus Algæ ter-
tiz vel Algæ Vergilij nomine exprimere voluisse. I V. Millefolium aquaticum cornutum. Hoc ut prius a-
quis innatat caulibus cubitalibus, tenuibus admodum, ramosis, fragilibus, densè geniculatis, quos folia
ambiunt tenuia, capillata, quorū inferiora, cornua ceruina amulantur & exsiccata rigeſcunt, superio-
ra verò tenuiora, tenuiusq; diuisa: ex ipsis geniculis pediculi trium quatuorue vnciarum prodeunt, sin-
guli singulos flores paruos albicantes quadrifolios sustinentes: quibus succedit capitulum paruum, Ra-
nunculi forma, ex quinque senisue granulis virentibus compositum. In riuis circa Hiltelingam non lon-
ge Basilea obseruauimus primū: dein in fossis horti Montembelgardiaci.

Mÿrris.

MYRRHIS.

CAP. CXI.

Myrrhis simillima est cicutæ, caule, folijsque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non in-
suauis. Quæ pota in vino, phalangiorum morſibus auxiliatur: cit menstrua & partus secundos,
purgatque à puerperio fœminas: subuenit & phtusicis cocta in sorbitione. Aunt quoque eandem bis die
terre potam ex vino, in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Meū lō-
x^{ta}. i. que à
partu sequi
debet.

60 Gignitur in quâ plurimis Italia locis planta quadam cicutæ faciem representans, minor tamen, minimeque græco-
lens, Cicutaria nonnullis vocata, quam quidam censent legitimam esse Myrrhim. Sunt deinde, qui pro Myrrhida
Angelicam vulgò appellatam accipiant. Alij verò, vt Manardus, illud oleris genus intelligunt, quod Cheresfolium vocant.
Verū tamen hoc, meo iudicio, nullus notus Myrrhida refert, cum caulis Cicutæ non sit, nec radice vsus sed foliorum, sicuti nec
illa: tamen si huius radix à recentioribus in pestilentia miris laudibus commendetur. Quod autem Angelica non sit Myrrhis,
ex eo euidētissimum esse arbitror, quod ei folia sint satiuæ pastinacæ similia, nō quidem multifida, veluti cicutæ. Ceterum
si Myrrhis in Italia prouenit, nulla sanè mihi hactenus sese obtulit planta, quæ magis illi respondeat, quàm hæc, cuius hic ef-
figiem pictam exhibemus, quæ quidē longè ab Angelica differt. Sed quoniā ANGELICÆ mentio incidit, ne t. im præstan-
tissimā plantā silentio prætereamus, hic fusius de ea nobis differendū est. Hæc itaq; planta cubi. alē excedit altitudinē, caule
genicalato. inani, multis alarum cauis referto: folia profert oblonga, per ambitum serrata, in nigrū vireſcentia: flores albos,
in umbellam coherentes: è quibus semen prodit tenue, lentium modo compressum. Radix ei subest crassa raphanis modo,
quæ im

Myrrhidis cō-
sideratio.

Angelicæ hi-
stor. & vires.

I. MYRRHIS.



Angelica syl-
uestris.

Angelica vi-
res Matth.

qua in plures diuaticatur ramos, gustu acris, & suauiter
rata. Huius plura sunt genera. Namque alia sativa, alia
mestica, alia syluestris, alia in aquosis proueniens. Sativa
sim feritur in Misnia & Saxonia & alijs fortasse Germani-
locis, in campis, coliturque diligenter, quod inde non medi-
crem recipiant prouentum. Eruitur tertio a satu axo. Ra-
ces habet nigras, atque fibratas, odore adeo eximo, ut mer-
Angelica nomen sibi comparauerit. Domestica ita vo-
sponte per se nascitur in montibus, in quibus syluestra
Sed folijs, caule, umbella semine & radice longe grandiora.
Radix illi est succosa, subalbicans, acris, & suauiter odora-
SYLVESTRIS autem pumilior est omnibus suis partibus, in
viribus omnium prestantissima. Radice nititur pollicis cras-
situdine, & saepe maiore, succo flauescente referta, gustu
cerrimo, & qui lachrymas ciet, & odore prestanti. Nascitur
plurima in altissimis montibus, in pratis & pascuis, in
locis. A QUATICA ceteris grandior est, sed viribus magis
imbecillioribus. Excalfacit, pariterque desiccatur ordine secun-
do completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat,
& discutit, penetrat, incidit & flatus pellit. Venenis magis
aduersatur: quare pestilentiam arcerit hausta, & frequenter
commansa. Ipsa per se sumpta pituitosos, lentosque humores
digerit & cruditate concoquit. Idem prestat & radice deco-
ctum, quod etiam celerius ex frigore turbulentibus auxiliatur:
expectorat enim efficaciter crassam lentamque pituitam.
Sanantur eodem ex aqua, aut vino interna viscerum viscum
concretusque sanguis dissoluitur, & roboratur ventriculus.
Radix in puluerem trita animi deliquis, & ceteris cordis af-
fectibus opem vnicè prestat. Valet ad rabiosorum, & venen-
osorum morsus, exterius cum ruta imposita, & intro in corpus
assumpta. Hinc fit, ut recentiores quidam magna opinione

hanc suis inserant antidotis. Datur radice semidrachma vna cum Theriaca drachma e sua ipsius aqua, ijs qui peste labo-
rant, & deinde sudare coguntur, repetiturque eodem modo post septem horas. Aliqui enim hoc tantum antidoto sanati sunt.
Mansa radix, & dentium cauis inposita, eorum dolorem sedat, quinetiam anhelitum adeo commendat, ut presumpti-
lij odorem occultare facile possit. At syluestris cum acerrimi sit gustus, longè valētius, quàm domestica excalfacit, & succo
Quare ad quarti ordinis principium accedit. Omnia prestare potest, quia domestica, sed longè valētius: ceterum non adeo
copiosus ea vti prestabit, quod nimis corpus accendat: mansa enim os, linguam, & fauces maximè vrit, atq; inflamat.

Myrrhidis vi-
res ex Gal.

II. ANGELICA SATIVA. III. ANGELICA SYLVESTRIS.



minant. Radicem habet odoris iucundi, & dulcem, quae menses mouet, & ea quae in thorace, ac pulmone sunt, expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit exalfacientium, adiuncta quadam partium tenuitate. *Moppe* ita Graeci, Myrrhis quoque Nomina Latini dicitur: Italis, Myrrhida. At Angelica, italis, Angelica: Germanis, Angelick: Gallis, Angelique. Sic Angelica syluestris Italis, Angelica saluatica: Germanis, Wilde Angelick: Gallis, Angelique sauvage.

I. Myrrhis maior, C.B. Myrrhis, Matth. Cord. in Diosc. Gesl. hort. Lac. Dod. fol. Lob. Castor. Lugd. Myrrhis vera, Aduerf. Cerefolium Hispanicum, Tab. An. Sefeli Pelopenense, Angul. II. Angelica ab immensa contra venena facultate, satua. Matth. Brunf. Lacu. Gesl. hort. Lob. Castor. Taber. Angelica latua, Trago Fuch. Dod. gal. Lon. Lugd. Catal. Angelica maior, Dod. fol. Angelica odorata, Camer. Lacerpitium, Lacu. Lacerpitium gallicum, Gesl. hort. Smyrnum, Cord. in Dioscoridem. Huius pro Costo in Theriaca confectione vni esse potest, si Angelicae radicis duplum sumatur. Nostra crassior est radice, quare facile, in ea genitis vermibus corrumpitur: at Bohemica radice est minore & nigricante, quare diutius reſeruari potest. III. Angelica syluestris maior, C.B. Angelica syluestris, Matth. Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Lob. Lonic. Lugd. Thal. Taber. Angelica syluestris montana, Camerario. Angelicam in libris Galeno attributis vtrique conuenire posse, cenſet Anguillara.

Μύαγρον

MYAGRVM

CAP. CXII.

Myagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea: folijs rubia, pallidis, tripedanea: semen a Meum oleosum, ſeno graeco simile. Quod contusum igni torret, perunctisque virgis ad lucernarum luminantur. Hoc pingui, scabritias corporis laugari, atque expoliri constat.

* I. MYAGRVM SATIIVM. * II. PSEVDOMYAGRVM.



Scribit Ruellius Myagrum frequentissimum nasci in Gallia, eiusque semine agros bene subactos perinde quasi nappi seri: Myagri conquin & sua spontis inter segetes inueniri. Ex semine autem oleum exprimi ait, quo non ad lumina tantum lucernarum, sed ad ciborum quoque condimenta pauperes vtuntur. Addit id a sua Cameliā, aut Camaminam vocari. Sed ipse non equidem Ruellio ausim subscribere: quandoquidem non pudeat fateri me hactenus Myagrum non vidisse in Italia, quod Dioscoridis delineationi respondeat. Caterum eos haud dubie falli crediderim, qui putant, vulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodam, Drodellam alij, nonnulli vero Dorellam dicunt, legitimum referre Myagrum. Siquidem hoc folijs rubrius non emulatur, sed syluestrem erucam, vt quae laciniata spectentur: nec semen profert ſeno graeco simile, sed paraueris modo exile. Non desunt praeterea, qui plantam, quam Pseudomyagrum appellauimus, legitimum esse contendunt. Caulem edit cubitalem, ramosum: & folia quae in eis sunt, glasti, aut thlaspi quadantenus similia: floribus in summitate albis tenuibusque: semine paruo, dulci. Verum cum & haec rubra folia non gerat, sed glasti potius, & semen illi sit nasturij, non ſanograci, non possum in eorum ire sententiam. Nasitur hac passim in campo inter linum, & segetes, cuius semen audissime auiculis expetitur, est enim dulce, & gustui admodum gratum. Modice exalfacit, atq; hamectat. Accedit omnino ad Sefami vires semen: paratur pariter ex eo oleum, a simili facultatis. Myagri semen, vt restatum reliquit Galeni lib. - simplic. medicamentorum, pingue est. Quare si rundatur, oleosum, quid effundit, quod emplasticam vim obtinet. Herba, quae Graecis Μύαγρον, Latinis pariter Myagrum appellatur: Italis, Miagro. At Pseudomyagrum, Italis, Miagro salso.

Quorundam error. Dorella.

Pseudomyagrum. Myagri vires ex Gal. Nomina.

Cum hoc capite Marthiolus meminerit Dorellae, quae folijs sit Erucae, & Pseudomyagri, quod folijs est Gla-

Zzz

* III. MYAGRUM MONOSPERMON. *



a Meū, & Ca.
μικρά i. παρ-
ua.
b Meū θρη-
ώδ' n. i. mali-
gna.
Onagře con-
sideratio,

latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno a radice candida, longa cum siccata est vinum olente: na-
scitur in montibus. Aqua, in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit: illi quoque
tetra ulcera mulcet.

* ONAGRA. *



Onagræ vires
ex Gal.
Nomina.

Antonij herba maxima, Ges. hort. Lysimachia vulgo altera, Camerario. Hac latiore est folio, flore ceru-
leo, rarius albo: est & angustiore, & quidem vel in arenosis proueniens, vel in alpi-
bus.

est Glaſti, vtramque figuram adponere viſum eſt. I. Myagrum ſatiuum, C. B. Dorella, Marth. in Com-
mentarijs, Cæſal. Myagrum, Dodo. gal. Lob. Lugd. Myagrum Dioſcoridis, Anguil. Myagrum primum,
Taber. Cameline Myagrum Lobel. in icon. Camerario in ſuo Matthiolo. II. Myagrum ſynanthemoides,
Glaſti folio, C. B. Pſeudomyagrum, Marth. Lugd. Seſamum Lacu. Lonic. Seſama Trago. Linaria quinta,
Eidē. Sunt qui ſatu tantum à ſuperiore diſſerre velant: verum cum illud folijs ſit ſinuatis & aliquando laciniatis, hoc verò integris glaſti folijs, diſſerentes facimus His addere lubet III. Myagrum quoddam lactenus à nemine deſcriptum, quod monospermon appellamus. Caule eſt cubitali altiore etiam, recto rotundo, ſtriato, cauo, variè & inæqualiter brachato: folijs vulgari viridioribus, latioribus (quorum prima Cichorij ſatiui modo laciniata) linea alba diſtiſis, minus Myagri hortenſis acuminatis, latiori baſi caulem amplexantibus: floribus luteis quibus accedunt vtriusculi duri, oblongi, peræ ſimiles, ſuperne in duas exuberantias deſinentes, quorum medio apex durus inder: in cuius vtriculi medio cauitas vnica, ſemen vnicum (vnde nomen) ruſſum, oblongum continens. Hoc primum in horto Illuſtris. Principis D. Friderici Ducis Wirtenbergici &c. Domini noſtri Clementiſſimi, quem Iohannes Bauhinus eius Ceſſitudinis Archiater colit, Bricourrues nomine legimus. Ex Eganais etiam accepimus.

ONAGRA. CAP. CXIII.

ONAGRA, ſiue œnothera, aut onuris frutex eſt arboris inſtar, prægrandis, amygdalino folio, ſed

T Ametſi memoria prodiderit Theophaſtus libro 9. cap. 21. de plantarum hiſtoria, Oenothera radicem e vino potam mitiores mores conciliare, nullum tamen, qui eam mihi oſtenderet, haſtenus licuit reperire, quamuis ad mitigandam omnium animalium feritatem, ne dum hominum quorundam, eſſet optimum vtiliſſimumq; remedium. Ceterum ad me ſcripſit clariffimus medicus Lucas Ghinus Forocorudi-enſis, ſepius ex Apenino in viridarium ſuum tranſtulſiſſe plantam homine prociorem: folijs amygdala, maioribus tamen flore rhododendri: ſemine perquam minuto, exilibus terribuſq; ſiliquis contento, molli ac candida lanugine obvoluta radice ſubalbida, longa, ſubter humum repente. Quæ ſæpe mihi ex parte Onagram referre videtur, eſſi ipſe quoque pro certo non auſit aſſerere, hanc legitimum eſſe Onagram, cum haſtenus experientia compertum non habeat, an huius radix ſicca vinum redoleat, mitigetque feras aqua, in qua maduerit, pota, vt Dioſcorides teſtatur. Onagra meminit Galenus libro 8. ſimplicium medicamentorum, vbi ſic inquit. Onagron, aut onothera, aut onothuris, huius radix areſcens vnoſum quiddam redolet: ſed & vini maximo facultate eſt. Quæ ονάγρα Græcè, Onagra item, ſiue Onagra Latine dicitur.

Eſſi huius figuram Matthiolus non exhibuerit, at tamen cum eam ex Ghini ſententia deſcribat, Iconem proponere conſultū duximus, quam ad Lyſimachias referendam cenſemus. Dicitur Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia, C. B. Onagra Ghini, et habet Matthiolus, Lugd. Cæſal. Chamænerion & Epilobium, Gef. ad Cordum, Thal. Antoniana ſiue S.



Cirsium, a caulis est tener, duorum cubitorum, btri- a Meū. καύ
angulo similis: ab imo foliola, rose speciem refe- λιον. i. cauli-
rentia, anguli spinosi, per interualla molles: folia bu- culus.
glosi similia, longiora, subcandida, modicè hirsu- b Meum &
ta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbicu- Ca. τριζωνος
latum, hispidum: in quo capitula in summo purpurea, i. triangularis.
qua solentur in lanugines. Radicem huius loco la-
boranti adalligatam, dolores varicum sedare Andre-
as scripsit.

Redidere recentiores quam plurimi rei herbarie periti, Cirsij consid-
nil aliud esse Cirsium quam vulgare Buglossum. Sed mi-
bi planè hæc sententia, pace eorum dixerim, refellenda potius,
quam probanda videtur: quòd Buglossò caulis triangulus non
est, sed rotundus: quòd ab imo foliola per ambitum aculeata rose
speciem non referant, sed longa, & continua prodeant: quòd
denique Buglossò flores non euanescent in pappos, sed langu-
escentes integri decidunt, relicto in folliculo semine. Plantam,
quam proculdubio Cirsium referre putamus, nuper Pisis ad me
misit, Clarissimus medicus Lucas Gbinus, cuius etiam hic figu-
ram dæmus. Nasçitur, vt ipse scribit, in vliginosis locis. Ea meo
quidem iudicio, Cirsio maxime adstipulari deprehenditur. Cirs-
is nusquam, quod legerim, in simpli. meminerunt censu Gal. & Nomina.
Paulus. Id aq̄e κίρσιον Græca voce, atque Latina Cirsium ap-
pellatur. Italis Cirsio.

Cirsium, Matth. Lobel. Lacu. Ges. hor. Cast. Lug.
Cirsium secundum, Dod. fol. Cirsium agri Pisani, Cæs.
quod Cirsis montani secundi nomine Clusius historia
Pannonica describere videtur.

Aster Atticus a cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum luteumue, per ambitum a Ori. οἱ Ἀσ-
diuisum, anthemidis modo, capitulum, foliolis stella modo radiatis: quæ autem caulem ambiunt fo- βόνιον. i. ali-
lia, oblonga sunt, ac hirsuta. Feruenti stomacho, oca- quibus bubo-
lorum inflammationibus, prociua sedi, ac b inguini- nium.
bus illitu auxiliatur. Tradunt e purpureum florem, si b Meū καὶ
ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malum φιλων. i. in
sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi re- γυνὴ τυνο-
centem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolen- res.
tis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore c τὸ πορφυρ-
liberat. ζον τῆ ἀνδρ.
ita habet Me-
um & Cat. i.
purpureum
in flore.



Aster Atticus, qui e Bubonion, hoc est nostris Inguinalis, a
ducitur, sibi Attici nomen asciuit, quod in Atheniensi a-
gro frequentior, quam alibi proueniat. Bubonion verò, & In-
guinalis dicta est herba, quod Bubonum, siue inguinum preci-
puum sit remedium. Asterus porro appellationem accipit, quo-
nam eius capitula, in quibus flores chamæmali instar emicant
per ambitum diuisa foliolis stella modo radiata spectantur. Ce-
terum non desunt, qui nostram sententiam impugnent, quod
crediderim ego Asterem Atticum eam esse platan. floribus um-
biliotenus melinis, & in ambitu purpureis, quamq̄ etiã Ver-
gilianum Amellum esse censemus. Atqui nos non ita facile a no-
stra discedimus opinione, quod e meum, & Catecuzeni ex-
emplar legant, τὸ πορφυρὸν τῆ ἀνδρ. i. purpureum in flore:
quæ verba manifestò arguunt in Asteris Attici flore duplicem
haberi colorem: quo fit, vt putem in capituli principio, vbi flos
describitur, non ἡ μάλινον, sed καὶ μάλινον. i. ἀνθος πορφυρὸν
καὶ μάλινον, hoc est florem purpureum & melinum. Sed esto et-
iam aliorum iudicium. Verum non ob id tam mordicus meam
tenebo opinonem, quin velim etiam aliam hic plantam osten-
dere, quam quidam rei plantaria studiosi Asterem Atticum fa-
ciunt, sed examinent quoque ipsi antiquam, quam nos addi-
mus, lectionem. Huius plantam misit ad me primum Ioannes
Zzz 2 Crat

Aster Atticus
alter.
Amellus Ver-
gilij.

Folia Amellus

II. ASTER ATTICVS CAeruleus alpinus.

III. ASTER ATTICVS alter.



Serapionis
erratum Aste-
rem cum E-
ryngio con-
fundentis.

Amellus Vir-
gilij.

Chelidon. mi-
nus non esse
Amellum.

Amelli histo-
Matthiolo.


Crato Vratislaniensis, Ferdinandi Caesaris Medicus, & vir quidem singulari doctrina praeclitus, quae quoniam florem stella modo radiantem, licet tantum melinum profert, merito quidem Asteris nomen illi imponendum est. Visitur facies, ex uere sua ipsius planta: nos tamen eam delineandam esse diximus, ut etiam aliorum possit esse iudicium: ceterum nos prior omnino probamus, et praesertim cum in huius flore nihil purpurei habeatur. Hanc Serapio (ut libro tertio in Eryngio mentione prodidimus) cum Eryngio confudisse deprehenditur, florum similitudine falsus, qui in utraque planta stelle figuram praeseferunt. Ceterum non est praetereundum, quod nonnulli Dioscoridis codices reperuntur, in quibus hoc capite praetunguntur, quam supra sint reddita: quae quoniam a doctissimis uiris Dioscoridi accreuisse comperta sunt, ideo nos quoque, utpote adiectitia omisimus. Quod autem adscititia sint, testimonio esse possunt Galenus, Oribasius, Paulus, & Serapio, in quorum libris illa, quae redundant, nusquam leguntur, etsi reliqua, ut solent, bona fide referant. In cuiusdam tamen Apulei liello de plantarum historia & uiribus scripto, nonnulla habentur capite de Astore Attico, quae inde facile, quod fere eadem esse uideantur, huc adiecta sunt: sic enim uerba illa sonant. Stellarum radij noctibus colluunt: quare qui naturam stupiguarant, inane simulacrum se uidere putant. Reperitur a pastoribus pecudum. De Amello autem, quem nos Asterem Atticum appellabamus, & non temere quidem, ob nonnullas notas, quae illi cum Attica Stella communes sunt, cecinit Vergilius libro quarto Georgicorum his luculentissimis carminibus:

Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello
Fecere agricola, facili quarentibus herba:
Namque vno ingentem tollit de cespite syluam.
Aureus ipse, sed in folijs, quae plurima circum
Funduntur, viola subluces purpura nigra.
Sape deum nexis ornata torquibus ara.
Asper in ore sapor: tonsis in vallibus illum
Pastores, & curua legunt prope flumina Mella.

Verum non possum non mirari stupidum cuiusdam blateronis ingenium, qui Vergilij Amellum eam plantam esse cense-
quam omnibus in confesso est esse Chelidonium minus. Ita enim saepe fit, ut qui alios suggillare sat agunt, et praenuidia adeo
cacutiunt, ut non solum in tenebris oberrent, sed excordes quoque fiant. Vergilius enim Amelli florem descripturus inquit:
Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello Fecere agricola: & deinde subiunxit: Aureus ipse, sed in folijs, quae plurima cir-
cum Funduntur, viola subluces purpura nigra. De folijs intelligens ipsius floris, quae ipsum ambiunt, quaeque colore nigra
mitantur violam & recte quidem, subluces inquit Vergilius purpura, quod color ille purpureus, qui in illis spectatur folio-
lis, non ita splendidus sit, ut in ipsa cernitur viola, sed longe dilutior: quo fit ut is omnino cacutiatur, qui de planta ipsius fo-
lijs Vergilium intellexisse censeat. Sed purpureus color in chelidony minoris flore omnino desideratur. Praeterea chelidonium
minus humi perpetuo repit, nec se vnquam in altum extollit: atqui aliter quidem se habet Amellus. Namque is vno ingentem
tollit de cespite syluam. Adde quod Chelidonium illud Verno tantum tempore prouenit, & deperit. Amelli uero flos Ver-
gilio, in fine aestatis, aut sub Autumnii principium apparet: cum dicat: tonsis in vallibus illum Pastores & curua legunt pro-
pe flumina Mella. Id est, legunt Pastores Amelli florem in vallibus & pratis iam falce detonsis. Itaque fit ut iam ex Medice-
siam Vergilij interpretes. Est itaque Amellus herba, quae caules ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore saepe luce cen-
te. E quibus circa cacumen ramuli oriuntur tenues, in quorum summitate flores spectantur in stella modum radiantes, ut
in An-

IV. ASTER LVTEOFLORE.

V. STELLARIA.



in Anthemide, aut Belli, sed in medio lutei, comantibus circumquaque foliis diluta purpura nitentibus. Folia profert oblonga, acuminata oliuae figura, minora tamen, aspera, hirsuta, nigricantia, aspero ac subamaro sapore: qua autem caulem circumuestiunt, longe minora spectantur. Radicem habet multifidam, odore non ingrato, & caryophyllorum quid respiciens. Floret in principio Autumni, aut in aestatis calce, Augusto, & Septembri. Flores tandem flaccescunt, & in pappos dissiliunt: semine paruo, oblongo, Intubo haud longe absimili. Nascitur in asperis, incultis, collibus & conualibus. Asteris Attici recens herba (vt Crateuas tradit) cū axungia semo rufa rabiosi canis moribus vtulster imponitur. Turgentia guttura discutit, & incensa serpentes fugat. Huius meminit Galenus libro 6. simplicium medicamentorum, vbi eius vires retulit his verbis. Aster Atticus, alij bubonium vocant, non ob id tantum quod illitum, sed etiam quod suspensum bubonas sanare creditur. Habet quiddam etiam digerens, habet verò non minimè & refrigerans quiddam, ac reprimens, adeò vt mista sit facultas, vti rosa: verum id non adstringit: hactenus Galenus. Sed quoniam Attica stella mihi in mentem redegit Stellariam recentioribus vulgò vocatam, cum & ipsa viribus non vulgaribus sit praeclara, eam minimè silentio dissimulandam duximus. Est igitur STELLARIA, quam alij Pedem leonis, alij Alchimillam vocant, planta, quae vt plurimum in montibus promeris, praesertim in pratis & pascuis: folijs maluae ferme similibus, durioribus tamen, & crispioribus, angulis octo distinctis, prominentioribus, & per ambitum serratis, adeò vt latius aperta stella formam referant. Caulis ei tenuis, semicubitalis, lanuginosus, à quo plures exeunt ramuli, in quorum summo flores emicant subpallidi, tenues, stellarum effigie. Radice nititur quae crassitudine digitum aequat, & longitudine palmum excedit, sapore adstringenti. Erumpit hac Maio mense, Iunio verò floret. Exiccatur, cohibetur, atq; conglutinat. Efficax est pota sanandis non solum internis viscerum vulneribus, sed & sinuosis vltimis: quinetiam extrinseca vulnera glutinat. Expeditur Germanis chirurgis, mirisq; laudibus celebratur: quippe qui eam felici successu vulnerarijs potionibus admisceant. Arida puluis in sui ipsius decocto, aut cum aqua eius stillatitia sumptus, enterocelis medetur. Datur idem puluis ex vino, aut iure cochlearis mensura, quindecim aut viginti diebus, mulieribus, quibus adempta sit concipiendi facultas à nimia vteri humiditate, quae iniectum semen contineri prohibet & steriles facundas reddit. Stillatitia eius aqua pota, tum etiam in vuluam indita, alba mulierum profluua mirifice sistit: adeò vt eius quoque diutina iniectione, corrupta ab incorruptis vix dignosci possint, restrictis mirum in modum femineis locis: quod tum celerius, tum efficacius praestatur, si in eius decocto insideant. Quin & laxas procidentesque mulierum mammæ contrahit, & duras solidasque efficit, si lintea in eius decocto, aut stillatitia aqua intincta mammis saepius imponantur, diutiusque importentur, praesertim hypocistide, equisetis, stypteria, siccusque rosis admistis. Planta, quae Graecis ἀστὴρ ἄλκυδς: Latina item Aster Atticus siue Bubonium nominatur: Arabibus, Astaraticon: Italis, Aster Attico: Germanis, Sternkraut: Gallis, Aspergoutte mineur. Petite espargoutte, seu petit Augue. Virgilio, Amellus. At Stellaria, siue Pes leonis, siue Alchimilla: Italis, Stellaria: Germanis, Synnaut: Gallis, Pie de Lyon.

Asteris Attici vires ex Gal.

Stellariae historia.

Stellariae vires Matth.

Nomina.

I. Aster caeruleus vulgaris, C.B. Aster Atticus siue Amellus, Matth. Lacu. Castor. Lugd. Aster Atticus, Fuchf. Dodo. gal. Cord. in Diosc. & histo. Gef. hort. Lonic. Lugdu. Aster Atticus purpureus, Fuchf. in icon. Aster Atticus flore caeruleo, Camer. Thal. Aster atticus primus, Dodo. fol. Aster Atticus Fuchfij latifolius, Clus. hist. Pann. Tinctorius flos primus, Traz. Quaedam in montibus, ad Anthyllidem secundam referenda, Caesalpino. II. Asterem hunc Atticum caeruleum alpinum, Cam. in suo Matthiolo habet, qui priore minor est & floribus caeruleis, folijs item non dissimilibus, qui licet radice se propaget, papposa

tamen semina queque gignit, & interdum ad radicem globuli tumentes villosi, foliolis adnascuntur. III. Aster luteus foliolis ad florem rigidis, C.B. Aster Atticus alter, Matth. Lugdun. Aster Atticus verus, Ges. hort. Aster Atticus seu Bubonium, id est, Inguinaria, Lobel. Aster Atticus flore luteo, Clus. histo. Hispan. Aster Atticus luteus latifolius, Camer. Aster atticus Massilioticus, Taber. Aster Atticus, Cæsalpino. Aster luteus alter, Lugd. Oculus Christi, Eidem. I V.

* VI. HEPTAPHYLLON
alpinum sericeum. *



ISOPYRVM.



Nomina.

Aster luteo flore, alijs Conyzae species, Camerano in Matthiolū, cuius hæc est descriptio. Caules proferre mediocres per quædam intervalla radices repentes & se propagantis, ab inferiore parte demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odoratae sunt, sapore aromatico modicè ad cinnamomi saporem accedente. In summis catilibus duos vel tres ramulos conferto insident, qui tandem in pappos abeunt. Folia per caules alterna hirsuta, nullo pediculo duabus quasi alis easdem amplectuntur. Nascitur in salibus. Hactenus Camerarius: Sed de hoc in historia nostra plenius. V. Pes leonis, à foliorum forma, vulgò Alchimilla, quod Alchimistarum præconijs hæc celebrata: (in hac figura sculptor hirsutiæ neglexit.) C.B. Stellaria, Matth. Castor. Lugd. Stella herba luteis quibusdam, Ges. hort. Pes leonis, Brunf. (cui & Leontopodium) Fuch. Lon. Alchimilla, Treg. Lon. Dod. gal. & fol. Lob. Cæf. Tab. Alchimilla vulgaris, Cam. Drosera seu Drosum, Cord. in Dioscotidem. VI. Heptaphyllum alpinum sericeum, quod Stellariæ argenteæ nomine Camerarius suo Matthiolo adsecit. Ex radice dodrantali, crassiuscula, nigricante, ramuli bini aut terni, teretes, firmi, pedales, geniculati exeunt, ex quibus folia, maxime ex radice, longissimis pediculis donata, prodeunt: ut plurimum in septem (interdum quinque & novem) partes ad pediculum diuisa, stellæ modo disposita, supernè viridia, & auersa parte argenteis pilis nitentia, extrema foliorum parte (quod sculptor omisit) crenatae flores ramulorum extremis numerosi, muscarij rita conglomerati, parui, stellati & cædidi, insident: quibus semen minutum, ex luteo viridi vaginulis inclusum succedit. In Heluetiorum (ut monte Fracto) Allobrogum, & Rhætorum alpibus, locis herbidis & pratis prouenit. Astringentis est saporis, Pedi leonis & sapore & viribus simile: quare Alpini huius radicem tritam & potam ad vndecunq; manantem sanguinem commendant, imò de collo suspensam narium hæmorrhagiam cohibere narrant. Sic & siccatam radicem tusam iusculis dysentericorum inspergunt. Dicitur Argentaria, Herba stella, siue Pedis leonis species, Ges. in Fracto. Argentaria petrea. Eidem lib. de hor. Argætea heptaphyllos montana, Camerario Heptaphyllum, Clus. histo. Hisp. Pentaphyllum alpinum petrosum & minimum, Lob. in ico. Quinq; folium alpinum, Tab. Alchimilla alterum genus, Cæf. Tormentilla candida, Lugd. Germanis, Berg Spanaui Stem Synnaui.

Ἰσότρονον. ISOPYRVM. CAP. CXVI

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinē vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule, tenua plena seminis, melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia, semen ex aqua mulla bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vile.

Et si aliàs scripsi haud mihi contigisse antea verum Isopyrum inuenire, postea tamen factum est, ut eius plantam cuius hic imaginem damus, ab amicis optimis sim confectus. Nascitur in campis, & apricis collibus. Ea enim Isopyrum (meo quidem iudicio) per omnia refert. Quod Græci ἰσότρονον, Latini etiam Isopyrum vocant.

Isopyrum quid sit, ambigitur. Fabius etenim Columna Aquilegiam esse statuit: trifolium palustre, centius

cenfuit Dod. hift. Gallica. At quam Matth. hoc loco expreffit, non videtur aliud eſſe quàm Melanthium
 in ueltris nomine ſuperius propoſitum: ab eo tantum foliis inferioribus Anifum referentibus, differens.
 Hunc imitati ſunt, Caſtor, Durantes, herbarij Lugdunenſis authot, & Tabernæ montanus.

Ἰὼν πορφυρῆ.

VIOLA PURPUREA.

CAP. CXVII.

Viola purpurea folium habet hedera minus, te-
 nuus, ac nigrius, nec multò diſſimile: cauliculus
 à radice medius prodit, in quo floſculus ſuauiſſimè
 olens, purpureus: opacis, & alperis naſcitur. Refrige-
 randi naturam habet. Folia per ſe, & ex polenta illi-
 nuntur aperiſſimè ſtomacho æſtuanti, & oculorùm
 inflammationibus, ſedique proidenti.


Sunt in Violarum genere non modò purpurea, ſed etiam
 candida, frigidis & vliſinoſis locis naſcentes. prorsus ta-
 men inodora, de quibus nihil, quod extet, memoria prodidit ratio.

Dioscorides. Hæ numeroſa proueniunt in Ananiensî agro ſu-
 pra Tridentum, vbi menſe Aprilî ad eò copioſè ſtorent, vt ſi
 longè proſpiciantur, oculos fallant, & extenſa lintea videan-
 tur. Sunt & aliæ, quæ aureo ſunt colore, ad eò in colorandis
 floribus occupatur natura. Eſt & genus, Oeniponti primùm
 mihi viſum, cuius purpurei flores numeroſis ſtipantur folioli, multipl.
 odore omnium iucundiſſimo. **ARBORESCENTEM** Violæ arbo-
 rem **VIOLA M** è Baldo monte in agro Veronenſi alla-
 tam, odore perquam iucundo, mihi dono miſit **Franciſcus** tiò.

Calzolarius pharmacopœus Veronenſis, cuius flores illis per-
 ſimiles ſerè habentur, qui in Regali conſolida viſuntur. Cre-
 ſcit hæc duorum cubitorum altitudine, pluribus ab vna ra-
 dice ſublatis caulibus, in quibus folia viola purpurea an-
 ſtiora, per ambitum denticulata, atque paribus interuallis
 diſtincta: flores edit purpureos. Alij præterea flores per æſtatem
 Maio, & Junio menſibus viſuntur tribus reſerti coloribus, ſu-
 perne purpurei, in medio candidi, inferius verò lutei, ſor-
 ma purpureas violas referentes, aſpectu gratiſſimo, cum ta-
 men nullo & ipſi commendentur odore. Prodeunt hi ex

quadam planta, cui primo exortu folia inſunt rotunda, per ambitum ſerrata, qua tamen per incrementum in lon-
 gitudinem deſciſcunt. Conſtat hæc caulibus triangularibus, quadantenus ſtriatis, & intus concauis, quibus paribus inter-

II. VIOLA MARTIA MVLTIPlici flore. III. VIOLA ARBORESCENS.



ZLZ

zallu

IV. IACEA SIVE FLOS TRINIT.

V. IACEA ALTERA



Iacea.

Iacea altera.

Violarum vires ex Mesue.

Syrupus violaceus.

Violarum vires ex Gal.

Nomina.

affirment, hanc esse de qua modo sermo est, eamq; symphyti facultatibus pollere: quemadmodum etiam sunt, qui eandem egre spirantibus, & pulmonum inflammationibus, non obscure opem ferre tradant: quin & scabiem sanare, & cetera vitia delere. Huius duo obseruauimus genera, alterum maius, alterum minus. Atqui [crecit hac minoribus ac brevioribus foliis: in minore flores & minores habentur, & duobus tantum coloribus micantes, nempe caruleo, ac candido, aut lacteo & albicante. Nascitur pariter iisdem in locis, & seritur in hortis. Preferuntur ambe ad puerorum tormina, & praesertim stiblatitia earum aqua pota. Herba tota illita, aut in pabulo data, sanat sues angina laborantes. Violarum purpurearum facultates exquisitè descripsit Mesues inter simplicia soluentia, vnde hac decerpimus. Viola temperatum, conueniensque sunt medicamentum, quo immutantur mala humorum qualitates, & natura eorum soluitur. Preferuntur quae primo re florent, solis ardorem, qui vim resouit, minimè expertæ, nec imbris diluta. Viola refrigerant, & humedant ortos primo, cum tamen sicca minus refrigerent, & minus humedant. Recentibus quadam inest humiditas, quæ obtundit acuitatem, a qua potior est vis. Quapropter siccata humiditate, quæ in superficie continetur, gustu amaritudo deprehenditur, quæ à calido prouenit, qui prius sub humido delitescerat. Quo fit, ut exiccata magis calida, minusq; humida habeantur. Humiditas, quæ superflua recentibus inest, aluum emolliendo ciet: verum arefacta, deiectoria sunt facultatis, non quæ emolliant, sed quod dissoluant. Viola in summa soporifera sunt, refrigerant, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & soluunt. Earum succus, & syrupus ex eo factus ventrem leniunt. Maceratur in aceto, quod valentius ardentissimis conferant febribus. Fit ex violis oleum, is in eo diutius maceratis: ceteris tamen praestat, quod ex immatura oliuis, aut ex dulcibus amygdalis exprimitur. Viola bilem educunt, eiusq; feruorem mitigant. Conferunt capitis dolores, quos caliditas excitauerit: somnum conciliant: pectoris, & asperæ arteriæ scabritiem leniunt, medenturque anginis & aluumella vitii: praecipuo autem auxilio sunt pectoris, & lateris inflammationibus: sitimq; arcunt. At quæ sicca sunt, uicioris obstructions reserant, inflammationes discutunt, & morbo regio laborantibus opitulatur. Hactenus de Violis Mesues. Parant hac ætate è violarum recentium diluto, quo plures viola fuerint macerata, deiectorium Syrupum, quemadmodum & ex rosis rosaceum, quo deicienda alui gratia recentiores medici in pleuritide vtuntur, vncias quaternas, vel quinque exhibentes. Violarum vires tradidit Galenus libro 6. simplic. medicamentorum, sic inquit: Viola folia aquæ & subfrigida substantiam superantem possident: proinde tum per se, tum cum potentia illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi astuanti, & oculis: hac Galenus. Ex quibus abundè palam est non nouisse Galenum, sicuti & ceteros veteres, Violas deiectoria facultate citra noxam praeditas esse. Viola nigra, & Viola purpurea sic Latini dicunt, Græcis ἰὼν μέλαν, & ἰὼν πορφύρεον vocatur: Arabib. Senefigi, Sonofrigis siue Benesefegi: Italis, Viola porporea, & Viola mammola: Ger. Werten Biolen: Hispanis, Violeta: Gallis, Violettes, Violes de Mars, & Carefme. At Viola arborea: Italis, Viola arborea. Sic Iacea seu Herba Trinitatis: Italis, Iacea, seu Minuti penseri: Germanis, Gressamtraut: Gallis, Pensées, aut Menues pensees. At Iacea, siue herba Trinitatis altera: Italis, Iacea, seu Minuti penseri minori.

Viola, quasi vitula, Græcis ἰὼν, ab Io Puella in vaccam à Ioue conuersam, dicta censetur: genera plura sunt, quæ non solum odore florum, sed & forma & florum textura differunt. I. Viola Martia purpurea, odora, simplex, C. B. Viola purpurea, Matth. Fuch. Cast. Lugd. Cef. Viola satiuæ, Brunf. Viola nigra, Dod. gal. & fol. Cor. in Diosc. Viola Martia odorata nigra, Trag. Viola Martia purpurea Tab. Viola, Geln. hort.

hor. Lon. Viola martia præcox purpurea, Label. in icon. II. Viola martia multiplici flore: hæc floribus numerosis foliis constantibus a priori differt, quæ mangonio maiore etiam redditur flore: quare Costeus in Meisem meminit dictæ quæ Byzanti colitur martiæ similis, sed flore infinitis foliis constructo, & Rosam Damascenam æquante, magnitudine & odore etiam nostrates superante. Et nostra colore variat. Viola nigra flore pleno, Dod. gal. Viola datypodion, rectius datyphyllum, Ges. hor. Viola purpurea flore pleno, Cast. Viola flore multiplici, Dod. fol. Viola martia purpurea, flore multiplici, Lob. Tab. Viola cerulea floribus numerosis foliis constantibus, Cast. III. Viola Martia erecta, C. B. Viola arborescens, Matth. Cast. Cam Viola fruticosa, Ges. hor. Mater violati Dalechampi, Lug. Viola martia elatior, Clus. hist. Pann. IV. Viola tricolor hortensis, & Theop. C. B. Iacea trinitatis, Matth. Iacea maior, Cast. Herba Trinitatis, Brunf. Trag. Fuchl. Dod. gal. Lon. Ges. hort. Viola tricolor, Dod. fol. Viola nigra perfoliata, Ges. hor. Viola flammea, eidem. (& Antora quorundam) Cæsal. Lugd. Viola flammea colore, Lob. Viola Trinitatis, Tab. Viola multicolor, Cæ. Viola tricolor seu septicolor, Thal. Flos & magnitudine & colore variat. V. Viola bicolor arvensis, C. B. Iacea altera, Matth. Iacea minor, Cast. Herba Trinitatis sylvestris, Trag. Viola nigra perfoliata arvensis minor, Ges. hor. Viola sylvestris, Lob. in icon. Viola flammea minor, Lugd. Viola trinitatis minor, Tabernæmontano.

Kακαλία.

CACALIA.

CAP. CXVIII.

Cacalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, albæ quibus medius caulis emicat, rectus, albus: florem ferens robori, aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritis arteriæ medetur. Grana, quæ post excussum florem innascuntur, trita & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

* CACALIA. *



Cacalia, Plinio lib. 25. capit. 11. axithore, vocatur semen Cacaliae com-
 mune. in montibus ferè: ita Plinius. Sed non propterea mihi ha-
 cenus contigit Cacalia reperire in Italia, etsi eam du quæ-
 sierim in montibus. Ceterum herbam Cacaliae similem re-
 stituit se plures, videlicet in Apennini Alpibus Lucas Ghinus
 Torcorneisensis medicus, rei herbariæ diligētissimus inquisi-
 tor. folio tu, silaginis. in are tamen, aucta parte candido-
 re, minusq; per ambitum anguloso: caule palmi altitudi-
 ne, recto, subcandido: in cuius cacumine flores exeunt pani-
 cula faciem referentes, muscosi, olina instar. Hanc ipse Caca-
 liam suspicatur. Equidem huius viri iudicio facile ausim sub-
 scribere, quod is in simplicium cognitione diligenter versatus
 sit, atque inter Italos in ea maxime præset. Cacalia can-
 canon vocavit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum, Cacalia vires
ex Gal.
 vi eius vires reddidit his verbis: Cancani radice facultas
 habet mordacitatis expertem. & modice exsicantem: essen-
 tiam crassam. & emplasticam. Quapropter macerata vino,
 sicut tragacantha, & linctæ, arteriæ asperitates sanat: nec
 minus, si quis eam commandat. Succus eius defluens prodest
 arteriæ, similiter vt glycyrrhizæ. Nomina.
Kακαλία ita Græcè, vt es-
iam Cacalia Latine dicitur.

Cacalia duplex est, hirsuta & glabra: hirsuta alia tomentosa, alia solum leuiter hirsuta: huius cum descriptio sit proposita, eius etiam figuram adposuimus, quæ Cacalia Ghini dicitur, & à Matthiolo & à Ioh. du Choul in descriptione Pilati Lugdunensis. Cacalia prima & Cacalia vulgaris incano folio, Clus. hist. Panno. Cacalia, Cæsalpino.

Βύνιον.

BVNIVM.

CAP. CXIX.

Bvnion caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine: in quo ramuli minutis foliis, ac floribus scitent: folia proxime radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Urinam ciēt, excalfacit, secundas euocat: lieni, vesicæ, renibus utile. Tam humidum, quam siccum, expressiq; succi caulibus, foliis, radicibusq; vsus inualuit ex aqua multa.

Πσευδοβύνιον.

PSEVDONVNIVM.

CAP. CXX.

Pseudobunion palmi altitudine fruticat in Creta, folia, ramulosq; napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoq; cum sale, & vino repentes, strumas discutunt.

Bvnion. quod nostri Napum sylvestrem vocant, Plinius videtur posteritatis memoria prodidisse lib. 20. c. 4. vbi de na-
 pu ita scriptum reliquit. Naporum duas differentias & in medicina Græci seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis, Bunii confid
& quod

& quod Bunium vocant, purgationibus foeminarum, & vesicae, & vrinae utile decoctum, potum ex aqua mellea, vel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumque in aqua calida è cyathis quatuor: sed vrinam inbibet, si non lini semen trahatur. Alterum genus Buniada appellant, & raphano, & rapo simile. Seminis praclarum contra venena: ob id & in artuum vestrem rura in Hetruria appellant. Nascitur hac inculto solo, frigido praecipue tractu. Verum Pseudobunium, quod Graeci vocant, nondum mihi in Italia compertum est. Quod nulli mirum videri debet: nam quod planta hac fruticet in Creta, & Dioscorides testatur, videretur potius Cretensem propria, quam aliarum gentium. Bunium, ut Plinius tradit, antidotum simplicium medicamentorum, sic inquit: Bunium, alij arcticon, aded excalfacit, ut & vrinam moueat, & menses prouocet. Sed & Pseudobunium ad similitudinem caliditatis est. Quod Graeci βύνιον, Latini similiter Bunium vocant: Itals, Nemo ne saluatico. Quod verò illi βύνιον, hi Pseudobunium, & Bunio falso.

Bunivires
ex Gal.

Nomina.

Χαμακίσσος.

CHAMÆCISVS.

CAP. CXXI.

Chamæcissos folio est hederæ, tenuiore, longiore, ramulis à radice quinque senisve, dodrantalibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissime ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis, quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Chamæcissi
consideratio.

Credidit Leonardus Fuchsius, in suo de stirpium historia commentario, nihil differre Chamæcissum ab e: vulgarium nominata. Sed cur eius sententiam comprobem, sanè non habeo. Si quidem vulgaris hederæ terrestris folio constat rotundo quadantenus serrato: caulibus, vel potius funiculis vitilium modo longis, humi longo tractu repentibus. Chamæcissus vero Dioscoridi foliis est hederæ, tenuioribus, longioribus: ramulis à radice quinque senisve, dodrantalibus, foliosisque. Adde quod Chamæcissi flores violæ albæ similes facit Dioscorides, ac etiam candidiores. Sed terrestris hederæ florem profert pusillam candido purpurascens. Quibus utique rationibus ducor, ut putem, hanc herbam non esse Chamæcissum, quod nota inter se plurimum pugna deprehenditur. His etiam accedit, quod Chamæcissos (si Plinio credimus lib. 24. cap. 15. speciatim) est tritici modo: & cum floret, existimari potest alba viola. Ruellius hanc in Gallia nasci scribit. Sed eam aliam esse a Chamæcisso hic representato perspicuum est: ea enim, quæ Plinius refert, à Dioscoride dissentiant, quem nullam spicaram mentionem fecisse constat. Equidem, ut ingenuè fatear, nullam hactenus in Italia herbam comperi, quam legitimum esse Chamæcissum ausim affirmare. De viribus Chamæcissi breuiter disseruit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, vbi inquit: Chamæcissi flos, cum sit admodum amarus, iecur obstructione liberat. Sunt & qui ischiadici ipsum exhibent. Haec planta ut Graecis χαμακίσσος, ita etiam Latinis Chamæcissus nuncupatur.

Chamæcissi
vires ex Gal.

Nomina.

Χαμαλευκή.

CHAMÆLEUCE.

CAP. CXXII.

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est: herba virens, incuruis foliis furculisque: flore trifloro.

Chamæleuces
confid.

Sanè quàm paucis Chamæleuces historiam perstrinxit Dioscorides, quare difficillimè quidem decerni potest, quoniam in vniuerso plantarum genere Chamæleucen refert. Caterum hic silentio non dissimulandum puto, quod non desunt codices (ut Marcellus & Ruellius Dioscoridis interpretes aiunt) in quibus non χαμαλευκή, sed χαμαπεύκη legitur. Alteram quidem lectionem nos quoque magis probamus, tum quod in notis Dioscoridis nomenclaturis Chamæleuce nil aliud sit quam tusilago, quemadmodum & apud Plinium lib. 24. ca. 15. vbi eam Farranum siue Farfugium vocari tradidit: tum etiam quod eodem loco Plinius idem ferè scripserit de chamæpeuce, quod de chamæleuce in hoc capite scriptum reperitur. Quod haud dubie ostendit, huius capituli initio mendam subesse. Et certe facilis ac lubricus potuit esse librarium lapsus, ut qui vnius tantum literæ mutatione χαμαλευκή, pro χαμαπεύκη scripserint. Porro Plinius chamæpeucen folijs laticis similem reddidit: mihi tamen ea videtur potius picca folijs assimilanda, si in composito planta nomine volumus rectè posterioris vocis significatum spectare: nam picca πικκή, larix verò λάριξ item Graece dicitur. Chamæleuce, ut auctor est Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, calida est facultatis tertio quodammodo ordine, sicca primo. Ea Graecis χαμαλευκή, Latine item Chamæleuce, & Chamapeuce vocatur.

Chamæleuces
vires ex Gal.

Nomina.

Βύγλωσσος.

BVGLOSSVM, LINGVA BVBVLA.

CAP. CXXIII.

a Cat. τραχύ-
τερον, & άκαν-
θώδες, & μι-
κρότερον. i. a-
sperius, & spi-
nosum, & mi-
nus.

Buglossi con-
sideratio.

Buglossum nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ tres thyrsos emittit, cum semine. & radice tritam potamque, contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. Herbam ablicibus vtilem esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparium, nigrius, aasperum, bubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

Qui diligenter Buglossi historiam expendunt, omnes herbam Borriginem vulgò vocatam, in hortis, aliisque locis nasci: potius legitimum esse Buglossum censent, quam illam, quæ Buglossa vulgò nominatur, cuius in officinis communi- nis est usus. Quorum equidem iudicio non dubitauerim subscribere, si quidem Borrigo dicta folijs est in vniuersum verbasco similibus, nigrioribus tamen, & asperioribus: quibus etiam hac symphytum alterum amulatur, quod folia buglossi proxima ferre superius prodidit Dioscorides. Adde præterea, quod folia Borriginis in terram procumbunt, & bubulas linguas tum forma, tum asperitate imitantur. Contra quæ Buglossi nomen sibi falsò vendicauit, folia habet longa, cubis similia, non vsque adeò lata, ut bubulas referant linguas, minusque humi depressa, quæ potius è toto sermè cespite sursum affi- ciantur.

cliant. nec aliqua ex parte verbasum, aut symphytum alterum representans. Non ob id tamen negare ausim, quin vulgare Buglossum in campestribus nascens, isdem cum Borragine polleat viribus: quandoquidem eadem utriusque asperitas, & sapor gustui manifestum praebeat eiusdem facultatis indicium. Atque facie non multum dissidere ea inuenias, si illud genus spectes. quod hodie in hortu feritur ex Hispania allatum: hoc enim etsi verbasum adeo admodum non representet, quemadmodum Borrage, foliorum tamen effigie bubulae linguas maxime imitatur. Sed quo quomodo haec se habeat, concedam facile Borragine, & vulgarem Buglossum & specie & forma inter se differre: attamen crediderim alterum vix proxime accedere, & si non eadem utriusque, simillimas tamen inesse. Ceterum non desunt, qui his rationibus neglectis asserant vulgare Buglossum Echii omnino genus esse, quod illud omnibus notis referre putent. Alij vero sunt, qui idem Buglossum Cirsium existimant. Verum nos aliud à vulgari Buglossis & Echium & Cirsium esse censemus, ut abunde

Buglos. Hispanicum.

I. BVGLOS. SIVE BORRAGO. II. BVGLOSSVM VVLGARE.



10
20
30
40
suis locis docuimus. Quod in super Borrage facile sit legitimum Buglossum, Auicenna testimonio comprobari potest, qui libro secundo sui canonis ita scribit. Lingua bouis est herba lata, habens folia sicut almara, & ad tactum aspera, & rami eius asperi, sicut pedes locustarum. Oportet autem, ut illa administretur, qua est in Corasceni, crassa habens folia, super quorum faciem sunt puncta, qua sunt radices spinarum, & pilorum exeuntium ab ea. Quibus notum admodum euidenter nostram Borrage expressit Auicenna, ut nemo non intelligat, hanc esse Linguam bubulam. Eam praeter morem descripsit Auicenna, quod suo quoque tempore non deessent, qui veri Buglossi loco aliam quandam substituerent plantam, ut aperte eius verba declarant, dum subdit: Qua autem in hac terra reperitur, & qua utuntur Medici, plurimum eius est genus almara, & non est lingua bouis, & neque confert, ut iuuamentum illius est: haec enim Auicenna. His omnibus illud denique accedit, quod apud Apuleium in eo libello, qui de herbarum medicaminibus inscribitur, inuenio Buglossum Lucani Corraginem nuncupari prioris tantum litera mutatione, quod cordis affectibus quam maxime opituletur. Quae sane omnia, ni fallor, clarissime ostendunt, Borrage esse verum ac legitimum Buglossum. Prouenit itaque Borrage foliis latis, atque oblongis, asperis: eminentibus ubique bullis, tenuissimis armatis aculeis, qui totam plantam hirsutam, ac rigidam reddunt aculeato vndeunque ambitu: caule exit cubitali, & quandoque maiore, pingui, concauo, aculeis ubique scatente, & ramis vultu brachiato: floribus in stella modum radiantibus, caruleo colore, & quandoque candido: nigro è medio prominente apice. Semine nigro, striatoque. Hac planta plurimum per sese in hortis nascitur, adeo ut inde haud facile extirpari possit. Radicem habet albam, teneram, pollicari crassitudine, gustu subdulci ac lento. Ceterum vulgare buglossum folio est Borrage longiore, symphyti maioris modo, hirsuto, aspero, hispidoque, minutissimis aculeis scatente: caule sesquicubitali, rotundo, robustoque, hispidoque, ac pungente, è quo rami exeunt complures sursum spectantes. Flores edit purpureos Borrage minores, è quibus nigrum oritur semine. Radix illi est Borrage per omnia fere similis, crassior & carnosior, letere quodam praeclara, sed crassiori pinguior, libro. Huius tria obseruauimus genera. Hortense latioribus ac longioribus folijs, [quod maius & minus est. Minor folia oblonga profert, sed longè angustiora, breuioraque, hirsuta, sed aculeis vacat, cetera similia sunt. Seruitur passim in hortu,] ac syluestri duplex genus. Cuius alterum folijs altero latioribus, & floribus purpureis spectatur: alterum verò angustioribus, & floribus nigricantibus. Folius crescit breuioribus, incanis, minimè aculeatis, caule crasso, pilosoque, ac subaspero: floribus ceteris generibus similibus, sed nigris. Radice digitali crassitudine, lenta ac dulci. Extat & aliud syluestri genus hortensi minori per omnia simile, sed in omnibus agrestius. Nascitur in campestribus. Viribus isdem polleat, quibus amba hortensium species.

Buglossi descriptio Auic.

Corragio Apuleio.

Borrage descriptio.

Buglossi vulgaris descriptio & genera.

Buglossum sylue.

Borrage

Borag. & Bugloss. vires.

III. BVGLOSSVM ALTERVM
flore nigro.




Buglossi vires ex Gal.

Nomina.

Borragini atq; etiam vulgari Buglossi herba & radice visus ne magna inest, quinetia & floribus ad animi deliquium, & ceteros cordis affectus, & melancholicos morbos: & praesertim earundem decoctum ex vino, ac etiam ex aqua per artem. ~~Tria vulgaris Buglossi radix ex aceto illa etiam dicitur~~ ~~invisibilis in visis.~~ Praestat vtriusque planta succum hantus ad epota venena, & venenosorum animalium morsum. Stillatitia earum aqua delirium, qua cum febre sunt, mirifice auxiliatur, quinetiam oculorum inflammationes multo tam interius, quam exterius imposita. De cuius viribus dicitur Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Buglossum, humida calidaq; temperiei est. Itaque vinum inietum, letitia ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & qui ob faucium asperitatem tussunt, coctum in melicrato conuenit. Herba, quae Graecis Βύλωρον, Latinis item Buglossum siue Borrago & Lingua Bubula nominatur: Arabibus, Lisen althaur, seu Lisan althaur: Italis, Borragine: Germanis, Burret sch: Hispanis, Borraia, & Borraienes: Gallis, Borrage. At Buglossum vulgare, Italis, Buglossa: Germanis, Dörsenjung: Gallis, Buglose. Sic Buglossum alterum sylvestre flore nigro: Italis, Buglossa saluatica del fior negro.

icon. Ges. hor. Lon. Dodo. fol. Lugd. Casalp. Taber. Camerario. II. Buglossum angustifolium maius, C. B. Buglossum vulgare, Matth. Lac. Castor. Lugdun. Buglossum angustifolium, Lobel. Buglossa, Brunf. Casalp. Buglossa Italica, Trago, Lonic. Buglossa latifolia, Cordo in histo. Buglossa vulgaris, Dod. fol. Tab. Buglossus Italica vel Gallica maior, Ges. hor. Echium, Cordo in Diosc. Echium Italicum spinosum, Fuch. in iconibus. Cirsium Italicum, eidem. Anchusa, Turnero. III. Buglossum sylvestre maius nigrum, C. B. Buglossum alterum flore nigro, Matthiol. Buglossum sylvestre maius, Castor. Buglossum sylvestre, Lugd. Buglossa sylvestris nigra, Thalyo.

I. CYNOGLOSSVM.



Cynoglossi consideratio.

Cynogloss vulg.

Κυνόγλωσσον. CYNOGLOSSVM
CAP. CXXIIII

Cynoglossum folia latifoliae plantaginis habet, actiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe vetere, medentur moribus canum, alopecius, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herbae ex vino potum.

Legitimum Cynoglossum, quod, Dioscoride teste, neque caulem, neque flores, neque semen gignit, pluries non modo vidimus, sed etiam legimus Roma post Adriani molem in sabulosis quibusdam locis enatum. Hoc à vulgari Cynoglossa, quo passim officinae vtuntur, perquam longe distat: quippe quoddam radiantis solis morem folia fert, subpinguis, tenui lanugine albicantia, humi strata, & caule perpetuo viduum est. Illa verò planta, quae Cynoglossi vsum omnibus praestat, folia edit lata longaque hortenstis ac maioris Buglossi modo, numerosa ab vna radice procedunt: tactu subaspera ac pilosa, plurimos emittit caules, cubito saepe longiores, teretes, robustos ac pariter subasperos & à mediore-

mosos, adnatis in cacumine ramis: quibus flores insunt purpurei, echio similes, è quibus deinde quadam parua procedunt lappe, aculeo quodam a medio prominente non sine magno natura artificio facta, quae maturascentes contactu vestibus pertinaciter adherent. Nascitur passim, ferè vbique, secus vias, & in agrorum marginibus. Meminit Cynoglossi Plinius lib. 25. cap. 8. his verbis. Iungitur & Cynoglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima.

Aium, quae tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse: quae quatuor, ad quartanas. Est & alia similis ei, quae ferat lappas minutas: haec Plinius. Ex quibus satis perspicuum esse puto, quod neutrum Cynoglossi genus à Plinio traditum, Dioscoridis Cynoglossi responderet. Siquidem primum Plinio caules vel thyrsos edit adeo flexiles ut in topiariis operibus maxime conueniant. Dioscoridi vero planta est sine caule, quae humi sternitur: ut hinc apertissime constet, hanc operi topiario, ut aliquid conestiat vel contexat, prorsus ineptam esse. Adde quod Dioscoridi Cynoglossum medetur canum moribus, alopecis, & ambustu: quoniam et alium emollit. Plinio autem ad tertianas tantum, & quartanas prodest. Id quod de Buglossi intelligitur, ut superiori capite testatur Dioscorides. Hinc itaque palam fieri arbitror, Buglossi historiam & vires, cum Cynoglossi turpiter confudisse Plinium. Cuius certe lapsus non animaduertent recentiorum nonnulli, qui Pliny auctoritate freti contra Dioscoridi grauem sententiam probare contendunt, Cynoglossum caules, flores, & semen proferre. Quod autem secundo loco à Plinio describitur, lappas minutas ferens, nil aliud, meo quidem iudicio, fuerit, quam vulgare Cynoglossum omnibus notum. Quo fit, ut omnino errasse existimem Ruellium, & Fuchsum viros alioqui doctissimos: quippe qui crediderint, vulgarem Cynoglossam esse Lycopsin, ut etiam supra suo loco monuimus: neque enim hos animaduertisse video de hac cum alio Cynoglossi scripsisse Plinium, ac deinde speciatim de Lycopsi lib. 27 cap. 11. Vulgare Cynoglossum manifesto refrigerat, & siccat: folia recentia illa vulnerum inflammationes, ac etiam alias quascumque, mirum in modum sanant, & artent. Cynoglossi in libris de simpl. med. facul. nusquam reperio mentionem Galeni. Id Graeci *κυνόγλωσσος*, Latinis Cynoglossum & Lingua canina vocatur: Italicis Cinoglossa & Lengua di cane: Germanis, Hundszung.

II. CYNOGLO. VVLGARE FLORID.



PHYTEUMA.



conferat, hanc operi topiario, ut aliquid conestiat vel contexat, prorsus ineptam esse. Adde quod Dioscoridi Cynoglossum medetur canum moribus, alopecis, & ambustu: quoniam et alium emollit. Plinio autem ad tertianas tantum, & quartanas prodest. Id quod de Buglossi intelligitur, ut superiori capite testatur Dioscorides. Hinc itaque palam fieri arbitror, Buglossi historiam & vires, cum Cynoglossi turpiter confudisse Plinium. Cuius certe lapsus non animaduertent recentiorum nonnulli, qui Pliny auctoritate freti contra Dioscoridi grauem sententiam probare contendunt, Cynoglossum caules, flores, & semen proferre. Quod autem secundo loco à Plinio describitur, lappas minutas ferens, nil aliud, meo quidem iudicio, fuerit, quam vulgare Cynoglossum omnibus notum. Quo fit, ut omnino errasse existimem Ruellium, & Fuchsum viros alioqui doctissimos: quippe qui crediderint, vulgarem Cynoglossam esse Lycopsin, ut etiam supra suo loco monuimus: neque enim hos animaduertisse video de hac cum alio Cynoglossi scripsisse Plinium, ac deinde speciatim de Lycopsi lib. 27 cap. 11. Vulgare Cynoglossum manifesto refrigerat, & siccat: folia recentia illa vulnerum inflammationes, ac etiam alias quascumque, mirum in modum sanant, & artent. Cynoglossi in libris de simpl. med. facul. nusquam reperio mentionem Galeni. Id Graeci *κυνόγλωσσος*, Latinis Cynoglossum & Lingua canina vocatur: Italicis Cinoglossa & Lengua di cane: Germanis, Hundszung.

Plinii lapsus.

Ruel. & Fuch. error Cynoglossum vulgare, Lycopsin statuendum.

Nomina.

Cynoglossum aliud est semper virens, aliud incanum: aliud medium, quod montanum est, maius & minus: incanum maximum, maius, medium, minus & repens. I. Cynoglossum, Matth. Lugd. Cynoglossa vera, eidem editione Italica: quod ane à sequenti differt? II. Cynoglossum maius syluestre, C. B. Cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Cast. Lugd. Thal. Cynoglossus vulgaris, Ges. hor. Cynoglossum Lon. Dod. fol. Tab. Cynoglossa, Cef. Cynoglossa maior, Brunf. Cordo in Diolc. Lycopsi, Lacunæ.

Φύτευμα. PHYTEUMA. CAP. CXXV.

Phyteuma folia habet Struthij, minora: copiosum semen, perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terræ nitentem. Quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Cum sit vsus Phyteumatis ad amatoria dūtaxat, exemplo Pliny ductus, plura hic de eo referre superuacuum habeo. Mihi quidem hactenus herba hac incomperta est. Quare eam relinquamus in hortis Veneris, quos ipsa ad delicias & amatoria tantum colit, donec quis Dea charissimus hanc herbam edoctus, eam nobis quoque indicare possit. Verum non ob id præmittam commemorare, non deesse rei herbaria studiosos, qui plantam, cuius hic imaginem damus, PHYTEUMA esse censeant, quod perforatum gerat capitulum & folia struthij modo oblonga: sed esto etiam aliorum iudicium. Nascitur in montibus & alijs quoque locis. Huius, tanquam supernacua & inutilis herba, Galenus & Paulus nusquam, quod legerim, inter simplicia meminerunt. Φύτευμα ut Graece, ita etiam Phyteuma Latine dicitur: Italicis, Phiteuma.

Phyteumatis consideratio.

Nomina.

Phyteumatis nomine alij Resedæ speciem, alij Antirrhini: Matthiolus, Campanulam proponit, in cuius figura flores desiderantur, & solum Capitula, quae floribus succedunt, pinguntur. Hæc ergo Phyteuma dicitur Matthiol. Casalpin. hoc nomine, & Lugdunensis pinxit. Campanula cærulea satiuæ,

Dod. gal. Campanula cærulea siue hortensis, Lugd. Campana cærulea, Ges. hor. Campanula media, Dod. fol. Campanula perfici folia nostras, Lob. Campanula angustifolia, Taber. Campanula genus Phytocoma Matthiolo dictum, Clus. hist. Pann. Rapunculus campanulatus Nerij folius, Thalyo.

Λεοντοπόδιον

LEONTOPODIUM.

CAP. CXXVI

Leontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum, quaternumve digitorum hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen vsque ad eum spissa lanugine inuolutum est, vt sæpe fallat: radice parua coherent, quam tradunt appensam ad amatoria prodelle, & tubercula discutere.

I. LEONTOPODIUM VERVM. II. PSEVDOLEONTOPODIUM.

Leontopodii
consideratio.

Non dubito quin plantam, cuius hic imaginem damus, legitimum sit Leontopodium. Siquidem herbula est duum, ternumve digitorum: folijs angustis, trium quoque digitorum mensura, hirsutis, auersa parte canescentibus, & presertim qua circa radicem sunt. Capitulis in summo caule quasi foraminibus distinctis: scrobibus nigris, & semine densa admodum lanugine implicato. Radice parua, tenuique. Hanc è Baldo monte allatam misit ad me Verona Franciscus Calzolarius Pharmacopæus insignis ad auream campanam. Est & alia planta, cuius quoque imaginem expressimus, & passim in Bohemia nascitur, qua tanetsi longiori sit caule, quam deceat, omnes tamen Leontopody notas habet.

Pseudoleon-
topodium.Brunfelsij ex-
ratum.

Nomina.

Ideoq, cam Leontopodium alterum appellare libuit. Caterum hic non est audiendus Brunfelsius, qui Stellariam herbam vulgo vocatam, in suo Onomastico Leontopodium esse scribit. Qua in re non nisi hallucinatus deprehenditur, quam c. alyis compluribus. Vocant ita Λεοντοπόδιον Græci, vt Latini quoque Leontopodium: Itali, Leontopodio.

I. Gnaphalium alpinum magno flore, C. B. Leontopodium verum, Matth. Leontopodium, Cast. Tab. Lugd. Leontopodium Matth. & Pilosella minor, Decd. fol. Gnaphalium alpinum, Clus. hist. Pann. Ab hoc differt Leontopodium à Lob. propositum, vt in Historia docebitur. II. Gnaphalium maximum virgatum, C. B. Pseudoleontopodium, Matth. Lugd. Leontopodium alterum vulgare, Cam. Heliochrysis v. uestris, Trag. Chrysocome Germanica, Lob. Chrysocome lanuginosa, Lugd. Gnaphalium Anglicum folio longiore, Aduer. Lob. in icon. Gnaphalium maus, Tab. Herba Impia in montibus, Casalpino.

ἵππογλωσσόν.

HIPPOGLOSSVM.

CAP. CXXVII


a Meum θάμ-
νισκος. i. par-
uus frutex.

Hippoglosson, a frutex est folia habens rusci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas è folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposta minuit: malagmatis radix, succusque admiscetur.

Hippoglossi
consideratio.

Hippoglossum frutex est folijs rusci maioribus, polygonati similibus, secundum longitudinem frequenter striatis, è quarum medio ligula quadam foliosa assurgunt, sub quibus rubentes exoruntur bacca, vt in rusco. Radicem habet albam, geniculatam, ac duram. Quod in folijs veluti prominètes linguas proferat, Bislinguam vocat Hetruria. alij vero Bonifaciam. Nascitur hac frequentissima in Liguria Alpibus, Urbinate agro, & quibusdam syluosis montibus non longe à

HIPPOGLOSSVM.



Gorticensi comitatu. quæ iter est in Hydriam ad argenti vi-
 us fodinas. Veruntamen nõ est hæc Laurus Alexandrina, aut
 Idea, de qua infra suo loco differemus, vt in suo insigni de
 plant. hist. comitærio existimat Fuchsius. Quandoquidem
 Laurus Alexandrina è foliorum vmbilico nullam aculeatam
 exeret linguam, sed tantum fructum rotundum tiliæ modo
 longiori pediculo appensum profert. Hippoglossum recetiores
 longe pluribus commendant viribus, quam fecerint antiqui
 scriptores: nam, vt illi tradunt, in vteri affectibus magno da-
 tur iuuamento. Quo fit, vt strangulatu vuluæ laborantibus
 mulieribus radicis, aut herbe puluis cochlearis mensura, ex
 vino, vel iure haustus, præsentaneo remedio opem ferat. Est
 & ad puerorum enterocelas præstantissimum medicamentum,
 si diutius diluculo hauriatur puluis idem sesquidrachma pō-
 dere ex maiori symphyti decocto. Verum id sumentibus eue-
 nit, quod primis tantum diebus ad eodæ ramicem pulsare perci-
 piant, vt intestina foras prolabi velie videantur: quare sub-
 cingulu, fasciu, & sibilu reprimentibus, roborantibusq; pri-
 mis diebus vti opus est. Quæ planta Græcis ἵππογλωσσόν, La-
 tinis similiter Hippoglossum appellatur: Italis, Bislingua, &
 Bonifacia: Germanis, Zepfflin Kraut: Hispanis, Lengoa de
 cauallo: Gallis, Lingua pagana, Bislingua.

Hippogloss.
non est Laur.
Alex.

Hippoglossi
vires Matth.

Nomina.

Hippoglossum duplex est, alterum in quo fructus
 pediculo, alterum in quo folio, insidet. Hippoglossum
 fructu pediculo insidente, C.B. Hippogloss. Matth.
 Lac. Dod. gal. & fol. Turn. Gef. hor. Lob. Cast. Cam.
 Hippoglosson, Cor. in Diosc. Vuularia, Brunf. Lon.
 Vuularia mas, Tab. Laurus Alexandrina, Trag. Fuch.
 Gef. hor. Bonifacio, Angul. Laurus taxa Plinii, Lug.
 Billingua, Cluf. hist. Pann. Rusco affinis prima, Cæf.
 Radix Idæa Dioscoridis, Columnæ.

Ἄντιρρινον.

ANTIRRHINVM.

CAP. CXXVIII.

Antirrhinon, alij anarrhinon, vocant herbam caule, & foliis anagallidi similem: florem albæ violæ,
 purpureo, minore tamen, ideoque syluestris a anagallis nominata est: semine vituli narium simili.

ANTIRRHINVM I.

ANTIRRHINVM II.



Aaaa 1

Tradunt

Tradunt perunctos ea cum oleo lilino, venustiores fieri: nec vlllo medicamento laedi posse, si quis ap-
pensum gesserit.

ANTIRRHINVM III.

ANTIRRHINVM IIIII.



Antirrhini
consideratio.

Antirrhini
differ.

Antirrhini
vires ex Gal.
Nomina.

Variat admodum Antirrhini apud veteres histori. Siquidem Dioscorides Antirrhinum herbam foliis, & caule ma-
gallidi similem reddidit. Theophrastus vero eandem aparina similem fecit. Veruntamen nos qui quatuor Antirrhini
genera obseruauimus, nullum hactenus vidimus, quod foliis anagallidis, aut Aparina viresceret, vt ex hic appictu ma-
ginibus apparet. Plinius lib. 27. c. 10. rectius fortasse, Antirrhinum lino simile nasci scribit. Vnde facile suspicor, Dioscori:
& Theoph. exemplaria hoc in loco deprauiata esse, atque in aliqua parte vitium latere. Foliis omnes sunt oblonga, in al-
tero latioribus, in altero vero angustioribus, caulibus ramosis. Caterum vt in plantis variat facies, ita quoque in floribus va-
riat color. Siquidem in vna purpureus, in altera subpurpureus, & in ceteris candidus flos emicat. At qui ex omnibus capita
nascuntur, in quibus semen minutum, nigrumq; continetur, vitulinis admodum similia, qua non nisi magnitudine diffe-
runt. Nascitur in aruis, & in collibus. Illinuntur Antirrhini folia, quinetiam flores, & semen, cum rosaceo, & melle ad-
vteri praefocationes, & mensum difficultates. Herba scorpionis us adeo contraria est, vt illico ea visa torpescant. Eadem for-
ti adalligata, praestat ad dolendas oculorum albugines. Quinetiam principum gratiam sibi conciliari posse putant hec ca-
tum amuleto. Antirrhini meminit Gal. lib. 6. simpl. med. vbi de eius viribus ita scribit: Antirrhinum, aut anarinum senu-
habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem ad similes est cum bubonio facultatis, sed multo minus.
Itaque ex illo de hoc conijcto. Hoc vt Graeci Antirrhinum, ita etiam Latini Antirrhinum vocant: Itali, Antirrhino vocant:
Germani, Drant/ Sterck Kraut, seu Streich Kraut. Hispani, Cabezza de ternera: Galli, Moron violet.

Antirrhinum, quod fructu sit narium vituli simili, quod & Lychnis agria Plinij dicitur: Plures habet
differentias. I. Antirrhinum aruense maius, C.B. Antirrhinum primum, Matth. Antirrhinum, Turn.
Cordo in Diosc. (cui & Cynocephala & Bucranion) Lac. Lon. Antirrhinum syluestre, Phyteuma, Dod.
fol. Antirrhinum minus, Ges. hor. Tab. Antirrhinum minimum, Lob. Antirrhinum paruum, Lugd. (cui
& caput timiae.) Antirrhinum medium, Cam. Antirrhinum rubrum aruense, Thal. Orontium, Dod. gal.
Os leonis alterum, Cæsalpino. Hoc pro Antirrhino quarto Camerarius in suo Matthiolo posuit, & O-
rontium Archigenis quibusdam dici, quasi Aurantium, quod Auriginem morbum siue Icterus leuet.
II. Antirrhinum maius folio longiore, C.B. Antirrhinum secundum, Matth. Lugd. Antirrhinum ma-
gnum, Dod. gal. Lugd. Antirrhinum maius, Cam. Antirrhinum, Gesne. hor. Anguil. Dod. fol. Lob. (cui &
vulgo Caput canis & Caput vituli Apuleij) Taber. Os leonis vulgo, Cæsalpi. Hoc floribus est ex purpura
albicantibus seu incarnatis, rictu luteo leonini oris, caeruleo. III. Antirrhinum aruense minus, C.B.
Antirrhinum tertium, Matth. Lugd. Antirrhinum syluestre, Castor. Antirrhinum alterum minimum re-
pens, Lob. in icon. Antirrhinum minimum, Thal. Cam. Os leonis in vineis, Cæsalpino. Hoc rarissime cu-
bitum aequat, omnibus sui partibus reliquis minus, flosculis albis, pusillis, capitulo minuto: in aruis,
vinetis, & etiam tectis proueniens. IV. Antirrhinum quartum à Matthiolo & Lugdunensi pro-
positum, sunt qui velint illud esse, quod primo loco posuimus: at censem esse Antirrhinum album,
parum à secundo varians.

Κατανάνθη

CATANANCE

CAP. CXXIX

EX eo genere vna, folia coronopi habet, longa: radicem iunci modo pratenuem: capitula sena septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milii exanimati. Altera mali parui magnitudinem explet, radice exigua oliuae magnitudine, foliis quoque oliuae colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen vt cicet, minutum, in virgulis dependet, puniceo coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expecti. Thessalicae mulieres his vti traduntur.

N EUTRUM equidem *Catanances* genus haecenus me competisse fateor, neque aliquem scio in Italia, qui alterum saltem legitime nouerit. Sed nihil certe referre arbitror, quippe quod ea rebus *Veneris* tantum conueniant, & amato- Catanances
consideratio.
rius uocantur. Proinde mulieribus Thessalicis relinquenda sunt, quibus olim fuit usus: praesertim cum hac aetate homines in *Veneris* admodum procliuus sint, atque etiam multi nimis calleant amatoria: tantum abest, vt etiam huiuscemodi herbarum, si cognoscerentur, auxilia us indicari debuissent. Caterum existimat Ruelius, in hoc subscribens Hermolao, se- Ruellii error.
cundi generis *Catanancen* recte eam herbam dici posse, quam herbariorum vulgus *Bistortam* appellat. Sed meo quidem iudicio etiam Ruelius, quod *Bistorta* dicta runcis folia proferat, & radices quandoque humani brachij crassitudine, angustam modo contortas, non autem paruas oliuae magnitudine, velut altera *Catanance*. Nomen eius Graecum *κατανάνθη* Nomina
Latium item *Catanance*.

Τριπόλιον

TRIPOLION

CAP. CXXX

TRIPOLION in marinis nascitur locis, quae allidit vnda, recedensque dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero puniceo conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quae drachmis duabus in vino pota, aquam, urinamque per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quae venena arcent.

* TURPETVM OFFICINARVM.*

TRIPOLIUM Serapioni Turbit appellatur. Quapropter Turpoli con-
sideratio.
credidere nonnulli, Turbit vulgo vocatū *Dioscoridis* esse *Tripolium*, praesertim quod ipsum & album, & deiectiona facultatis esse deprehenderent. Veruntamen rem aliter se habere illud argumento est, quod communis usus *Turpetum* nullo commendatur odore, nec gustui acedineum relinquat, sed tantum salsedine, & asperitate quidpiam. Ex quibus sane notis asserere licet, *Tripolium* in Italia non reperiri, neque aliunde aduehi: quemadmodum nec *Turbit*, de quo disseruit *Auicenna*, quem etiam *Dioscoridus* *Tripolium* intellexisse reor. Caterum ab his longe differre videtur *TURBIT*, quod a Turpeti con-
sideratio.
Mesue describitur, nostrati *Turpeto* omnibus prorsus notis respondens. Ait enim *Turbit* radicem esse herbae folia ferulae minorae ferentis, triplicique notari differentia, nempe alba, subcinerea, & nigra. Quae quidem omnia in nostri usus *Turpeto* diligenter intuentibus facile sese offerunt. Siquidem in *Turpeti* radicibus, quae ex orientali plaga ad nos deferuntur, omnes hi reperiantur colores: non tamen quod putem, eos ita factos esse tantum ex ipsius planta natura, sed quod ob verustatem, & aduentitij aeris humorem radices haec corrumpantur & nigrescant, illosque sibi asiscant colores. Cuius rei in causa etiam esse potest maris, per quod conuehitur, exorta procella, vndae tritantes superantibus, quibus madefactae radices facile situm, vel nigredinem contrahunt. Praeterea cum asserat *Actuarius*, nil aliud esse album *Turpetum*, quam *Alypie* Turpetum
albū, Alypie
radix.
radicem, eorum plane refellitur opinio, qui *Mesuem* errasse existimant, quod album *Turpetum* dixerit planta radicem esse, quae folia ferret ferulaceae: quandoquidem *alypum*, siue *alypia*, vt in sequentibus docebit *Dioscorides*, folijs tenuibus profilit, quemadmodum & *ferula*. Ex his igitur, vt arbitror, abunde liquet, *Turpetum* tam *Mesui*, quam *Actuarii* *alypiae* esse radicem. Est & aliud *Turpetum*, quod potius *pseudoturpetum* dixerim, crassius, & cortice nigrius, quod ex Pseudoturpe-
rum Garga-
nicum.
Gargano



ApuLIA monte conuehitur duplici genere, quoniam vnum est *Thapsiae*, alterum est *Pityusae* radicibus concinnant impostores, a quibus haec omnia didicimus. Non itaque ab re scripsit *Actuarius*, nigrum *Turpetum* radicem esse *Pityusae*. Verum haec (vt mea fert opinio) *Mesui* *Turpetum* haudquaquam fuerit, cum ipsius *Turpetum* nil aliud esse existimem, vt paulo ante diximus, quam *alypiae* radicem. Quanquam putat *Erastronolus*, nulla tamen, quod equidem sciam, ratione vel auctoritate Brafauoli er-
ratum.
nexus, apud *Mesuem* *Turpetum* omnino *Tichymali* *Myrsini* radicem esse. Sed quantum *Myrsi* folia a *ferula* folijs differant, qui nesciunt, rei herbaria peritos consulant. *Fuchsius* porro libro de compositione med. *Turpetum*, de quo *Mesues* egit, Fuch. opinio
relecta.
est *Thapsiae* radicibus exemptum existimat. Sed ipsius quoque sententia mihi plane, vt libere dicam, reprobanda videtur: nam et veteribus nullum haecenus reperi, qui *Thapsiam* lacteo succo turgere scribat: cum tamen *Mesui* *Turpetum* a planta eximatur, quae plurimo lacte madet. Praestat in *Turpeti* genere album ex orientali plaga allatum, resinosum, minime carnosum. Deij. et hoc *Pityusam*, crassos lentosque humores ad articularum compagines defluentes, remotioresque corporis partes. Turpetivires

Ventriculum expurgat, & qua illi penitus inhaerent excrementa: detergit item & pectus à pituita lentore. Datur magno iuuamento aqua intercute laborantibus: item elephantiacus, & Gallia lue affectis: quin & ijs, qui morbis ab exusu venarum moribus prouenientibus sunt obnoxij. Prodest diuturnis febribus, & in vniuersum vbi pituita redundat: verum qui sumunt cauere debent à piscium esu, & australi flatu. Sed iã ad Tripolium nostra redeat oratio. Reperio hac in historia non parum hallucinatum esse Plinium lib. 21. ca. 7. vbi turpiter Tripolium cum polio herba confudit, adeo vt asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripolij floribus tradidere tum Dioscorides, tñ antea quorum reliqui. Tripolij quam breuissimè meminist Galenus lib. 8. simplicium medicamentorum, ita scribens: Tripolis rari gustati actus est, & facultate calida in tertio excessu. Quod Graeci τριπόλιον, Latini quoq; Tripoliū dicunt: Itali, Tripolio

Plinii lapsus.
Tripoli vires
ex Gal.
Nomina.

Αδιαντον.

ADIANTVM.


CAP. CXXXI.

Adianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, a nigro colore nitent, pretenuis, palmum alti: radice supernuacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbae potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffulis, & vinarum difficili: calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est: contra stomachi fluxiones in vino bibitur: secundas ciet, & menstrua: sanguinis reiectiones inhiher. Contra serpentiū morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, & manantia capitis r-cera ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet, cum ladano, & myrrino, & susino, aut hyssopo, vnoque. Decoctum eius cum lixiuio, & vino infusum, idem praestat. Coturnices, & gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Sentur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

a Meum. μι-
λανα, ισχυρά
λεπλά i. nigri
validi, tenues.

I. ADIANTVM.

* II. ADIANTVM SYRIACVM *



a Meum μι-
κρόν λιάν. i.
valde paruum.
b Meū. ἰσο-
μέλανα. i.
subnigra.

Τριχομανίς.

TRICHOMANES.

CAP. CXXXII.

Adianti, &
Trichoma-
nis confid.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus adianton: filici simile, sed a exilius: foliis lenticulari, tenuibus, in ordinem vtrinque digestis, aduersis in se, ramulis tenuibus, acerbis, b fusco colore spectantibus. Eadem quae & adianton praestare posse constat.

Adiantum officinae Capillum Veneris appellant. Duo eius genera Theophrastus assignauit libro 7. capit. 13. de plantarum historia, vbi ita scriptum reliquit: Adianti folium in aqua nunquam madescit, nec quicquam adhaesisse humoris constat: vnde & nomen herba accepit. Genera eius duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad defluuium capillarum utilia, oleo trita. Nascuntur maximè locis humidis: hac Theophrastus. Cui subscribit Plinius: licet confuse sacro libro 22. capit. 21. dum sic inquit: Aliud Adianto miraculum, aestate viret, bruma non marcescit, aquas respuit: persusum marisumue sicco simile est, tanta dissociatio deprehenditur, vnde & nomen à Graecis. Quidam callitrichon vocant, à polytrichon, vtrunque ab effectu. Duo eius genera, candidius, & nigrum, breuiusque. Id quod maius est Polytrichon, aliud Trichomanes vocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, foliis filicis, ex quibus inferiora aspera, ac fusca sunt:

III. TRICHOMANES.



omni autem contrarijs pediculis densa inter se ex aduerso r. & dix nulla. Umbrosas petras, parietibus, asperginibus, ac fontium maxime specus sequitur, & saxa manantia: quod mirentur, cum aqua non sentiat: ita Plinius. In quibus nimirum verbis Plinij lapsus manifeste deprehenditur ipse Plinius Trichomanes, quod & Filiculam appellamus, in secundi Adianti locum retulisse, quippe qui perperam fortasse acceperit Theophrasti sententiam, à quo illa mutuatus est. Nam Theophrastus ubi de retroq. Adianti genere differuisset, eodem loco citato statim de Trichomane hoc verba subiunxit: Trichomanes vel ad distillationes vrinae vnicè facit, ut aliqui existimant. Caulem hac adianto nigro similem gerit, folia admodum parua, densa, aduersa, inter sese condita: radicem minimam. Leca amat opaca: haec Theophrastus. Ex quibus liquido apparet, Theophrasto Trichomanes, quod Filicula à Theodoro vertitur, nullum Adianti generis esse, sed per se sui generis plantam: quod enim Filiculam dixeris cauliculum ferre nigro adianto similem, clarissime ostendat, candidum Adiantum cum Trichomane nullam habere cognationem. Hinc itaq. facile crediderim, Adiantum nigrum, quod caule filiculâ referat, nobis legitimum esse, id sanè intelligens, quod Capillum Veneris passim nominant. Candidum vero eam plantam esse aliquando putauimus, qua vnà cum Trichomane in petris, parietibus, ac fontium asperginibus, specubus, & humentibus locis nascitur: folijs nigricantibus, minutim laciniatis, luteas maculas quam plurimas aduersa parte habentibus: caule viridi, gracili, flexilique: quam nonnulli, eò quod folijs ratam amuletur, & in muris proueniat, Rutam murariam conuocant, alij Saxifragam dicunt. Sed nunc equidem hanc eandem cum Paronychia Dioscoridis esse opinor, ut etiam superius in sua mentione monuimus. Caterum Fuchsius, hanc herbam pro Saxifraga Dioscoridis depinxit in suis de stirpium historia commentarijs. Verùm quod hæc folio constet ruta, illa verò rhymi, cur plane eius sententiam comprobem, non habeo. Adiantum Mem: Galenus lib. 6. sim: l. m. di. sic de eius viribus scribens: Adiantum in caliditate quidem, & frigiditate symmetrum est, verùm desiccatur, & extenuatur, & discutitur. Etenim alopecias capillus vestit, & strumas & abscessus digerit, lapidesq. frangit epotum. Viscosorum, crassorumq. è pectore pulmoneq. excreationibus non mediocriter confert, & ventris profuuium sistit: non tamen vllam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verùm posuerit ipsum quissiam secundum hanc oppositionem, & temperiem in ordine medio. Trichomanis autem meminisse lib. 8. eorundem simpl. medic. ubi subscribens Dioscoridi, hæc tantum retulit: Trichomanes eadem præstat, qua adiantum: haec Galenus. Porro Adiantum, ut Mesues inter sua simplicia refert, aluum subducit, bilem, & pituitam deiecit, crassaq. excrementa, qua diu interioribus inheere. Pectus & pulmonem detergit, sanguinem clarificat, bonum facit halitum, animam dilatat, & iecur & ventriculum purgat, præsertim si obstructione laborent: tametsi ad eorum infarctus potentius sit eius dilutum ex apij, aut endiuia aqua paratum, aut ex cinerum nigrorum iure, aut caprino sero. Sed si addatur saccharum, lateris inflammationes sanat, & vrinam trahit. Eius præterea decoctum frequentius potum calculos frangit, & feminas à partu purgat. Hos autem effectus præbet calida tantum facultate, qua illi inest. At adstringente vi, qua etiamnum pollet, defluxiones inhibet: fluentem sanguinem sistit, ventriculum roborat, & capillorum defluuium vsque adeò emendat, ut non modo eos cohibeat, sed & renasci faciat, præsertim emplastri modo impositum, myrtino oleo, ladano, & austero vino additis. Idem præstat & combusti cinis, quinetiam eius ex vino decoctum, furfures reueratæ lotionibus depellit. Eius cinis hæc omnia potest, & agilopæ curat. Ipsius diluti libra epota commodissime alius subducitur. Herba, qua Græcis ἀδίατον, Latinis pariter Adiantum nominatur. Officinis, Capillus veneris. Arabibus, Bersieguajen seu Bersausan & Chulbare albir: Italis & alijs vulgò, Capel veneris: Germanis, Frauerhaar: Hispanis, Culantrillo de pozo: Gallis, Capil veneris. Qua verò τρυχουανίς Græcè, Latine Trichomanes. Polytrichum & Callitrichum dicitur: Italis & Officinis Polutrico: Germanis, Steinbrech: Hispanis, Politrigo: Gallicis, Polytrichen.

Adiantum, & Trichomanis vires ex Gal.

Adiantum vires ex Mesue.

Nomina.

Adiantum duplex proposuimus, Gallicum, quod Monspelio ubi prouenit, Lugdunum (quare Lugdunense dictum) adfertur, & Orientale. I. Adiantum Matth. Fuch. Turn. Anguil. Lacu. Dodo. gal. & to. Lobel. Castor. Lugdun. Adiantum magnum, Trag. Adiantum candidum, Fuch. in icon. Adiantum nigrum, Cordo in Diosc. & histo. Adiantum nigrum verum, Taber. Capillus veneris vulgo & Mesuzo, Cæsalpino, Callitrichon Apuleij. II. Adiantum Syriacum Tabernæmontano. III. Trichomanes Matth. Trag. Fuch. Turn. Lacu. Dod. gal. & fol. Cordo in histo. & Diosc. (cui & Polytrichon pharmacopœorum) Ges. hort. Anguil. Lob. Lugd. Cam. Trichomanes mas, Tab. Trichomanes nigrum, Thalyo. Adiantum rubrum, Lonc. Polytrichum vulgo, Cæsal. Saxifraga minima, Brunfello.

XANTHIUM, SIVE LAPPA. CAP. CXXXIII.

Xanthium nascitur læto, & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis folia triplicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuae modo, rotundum, & vt Platani pilula, spinosum, qui contactu vestibis adhærescit. Is antè collectus quam perfecte siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua maderat, mox caput, nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

XANTHIVM.

Xanthij cōsideratio.

Xanthij vires ex Gal.

Nomina.



Xanthium, quod vulgus Lappam minorem cognominant, omnibus vulgarissimum est: quandoquidem publicis vique semitis, & exiccatis scrobibus, lacubusq; nascitur. Hinc meo quidem iudicio, omnes conveniunt nota, nulla profecto clamante, qua Xanthio à Dioscoride tribuuntur: nam praecipuam quod caulem gerit angulosum, ac pinguem, folia, quae subalbida sunt, atriplicis effigiem referunt, per amplexum serrata, nasturtium odore imitantia. Prodeunt etiam e caule tumuli, quibus racematim fructus oliuae figura dependet, sicut atus ceu plasani pilula, qui maturescens, cum tangitur, visibus pertinaciter adheret. Paucis admodum huius herbae videscripsit Salenus libro 8. simplicium medicamentorum, se inquit: Xanthium vocatur etiam phasganium. Fructus inscutiendi vim obtinet. Hae planta Graecis Ξανθιον appellatur. Latinis quoque Xanthium. Italis, Lappola minore. Germana, Bettlersteuß / vnd Spießletten: Hispanis, Lappa menor Gallis, Gloteron, & Grappellas.

Xanthium: Matth. Fuch. Turn. Dodo. gal. & sic. Cord. in Diosc. & histo. Lacu. (cui & Bardana minor) Gesl. hort. Lonic. Lob. Cæsal. Castor. Thal. Lugd. Lappa minor, Brunf. Trag. Taber. Dicitur & Struazana vnde Aëtius Cheradolethron & Philanthropon nominari scribit.

Αιγίλωψ. AEGILOPS SIVE FESTV. CA. CAP. CXXXIV.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternae rubra, quibus arista quasi capillacea exeunt. Illita cum farina ponitur. Succus farinae admixtus siccatur, & eorundem granorum


na herba aegilopijs medetur, duritias discutit. Succus farinae admixtus siccatur, & eorundem granorum

Aegilopis confid.

Nascitur frequens Aegilops inter segetes, sed frequentissima inter hordeum, foliis tritici, culmo pratensis, in cuius caumine bina ternae rubra semina dependent, putamine ac etiam figura hordeum referentia, breviora tamen, tum mentio

I. AEGILOPS I.

II. AEGILOPS II.



Arista
Aegilops minor
Arista

GALEGA, SIVE RUTA capraria.

Galega.
Ruellij opin.
explosa.



Glaucis vires
ex Gal.

Nominā.

folijs oblongis, in ordinem utrinque digestis, ceteris modo sub-
ter casijs, supernè viridibus flore purpureo, paruo, filiqua re-
rete, non in aduncum vt fœni graci corniculata. Hac et si Ru-
ellio teste nullum apud Gallos inuenerit nomen, a quibusdam
(vt superius libro tertio commentati sumus, eiusq; hic nunci-
maginem damus, cum ibi sit prætermissa) GALEGA, ab alijs
Ruta capraria. in Hetruria verò vulgò appellatur Lauanese,
sive vt quidam alij Lauamani, quod prope riuos aquarum
nascatur, vbi manus lauantes rustici, hac planta saponu via
sibi sordidum lutum abstergunt. Verùm cum videamus hu-
iusce planta flores, & caules, qui se quandoque ad bicubi-
talem altitudinem attollunt, Glaucis faciem non repre-
sentare, cogimur dicere Ruellium hac in re hallucinatum de-
prehendi: præsertim quòd Glaux, Dioscoride & Plinio auto-
ribus, inuenitur iuxta mare: Galega verò in vltimis locis,
in serobium aggeribus, in montibus, & denique passim fore
prouenit. Huic planta recentiores assignant vires non vulga-
res contra pestilentiam, & venenosorum animalium morsus
in quorum remedium herba per se estur, atque etiam exarum
illinitur. Sunt & qui eam morbo comitiali laborantibus ex-
xiliari prædicent: in quem vsus eius succum exhibent, tra-
chmarum quatuor pondere. Quòd autem hac extinctum lac
reuocet, ad quod Glaux à Dioscoride commendatur, non
quidem ausim asserere, cum nullum inueniam, qui Galegam
his viribus præstare testetur. Glaucis meminit Galenm lib. 1.
simplicium medicamentorum de eius viribus differens in
hunc modum. Glaux herba, & ipsa lactis generandi vim ob-
tinere videtur. Quod si ita sit, calida quodammodo, humida
que fuerit temperamento. Ea aquè Gracis γλαυξ, atque La-
tinis Glaux appellatur.

Galegam supra lib 3. cap. 48. descripsit: quæ di-
citur Galega siue ruta Capraria. Matth. Laci. Castor.
nugræcum syluestre, Onobrychis, Ges. & Fracastorio. Caprago vulgò, Cæsalp.

Πολύγαλον


POLYGALA.

CAP. CXXXVII

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit

I. POLYGALA.

* II. ASTRAGALVS ALPINVS.



1/2. Astragalus alpinus
Palmi

Polyga-

Polygala cuius hic imaginem appinximus, misit ad me Verona Franciscus Calzolarius pharmacopæus insignis. Proue-
 nis in collibus apricis, & in cultis locis. Quæ an legitima sit, pro certo decernere non ausim, quòd tam pauca eius tra-
 duntur nota, tum a Dioscoride, tum etiam a Plinio, ut non facile aliquid certi de ea determinari possit. Vt cum quoniam
 hæc planta palmarem longitudinem non excedit, & folia lenticula habet, & gustu est adstricto, facile adducor ad creden-
 dam, eam legitimam esse polygalam: & præsertim cum ipse Calzolarius scribas, multis sibi experimento constare, hu-
 ius plantæ usum lac in mulieribus copiosum prouenire: mihi plane incomperta est: neque id temere fateri licet, quòd tam pau-
 ca eius traduntur nota tum a Dioscoride, tum etiam a Plinio, ut admodum difficile sit decernere, quæ nos hodie sese offe-
 rat planta, cui Polygala nomen recte competere possit. Hæc Græcè πολυγαλον, Polygalum quoque & Polygala Latine dicitur. Nomina

I. Quam Polygalam censuit Matthiolus, eandem Lugdunensis & Tabernæmontanus sub ipsius no-
 mine potuere, verum Castori Astragalus dicitur, & Lobelo Astragaloides herbariorum, Astragalus fortè
 Matthioli, vel iam demum Polygala eiusdem. II. Astragalus alpinus. D. Cameraius in locum Polygalæ
 Matthioli hanc substituit, quam imitatus Gesnerum, Polygalam vocauit, quæ Astragali Monspeliensium
 nomine a Clui. hist. Hispanica proponi videtur, & in Lugdunensi historia Astragalus purpureus dicitur.

ὄσυρις

OSYRIS.

CAP. CXXXVIII.

Osyris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuque contumaces: & in his folia quaterna
 quina, senaue, ceu lini, nigra initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum iuuat
 arquatos.

Linaria vulgaris
 OSYRIS.



Osyris, quòd folijs, & caule lini faciem representet, officii Osyridis con-
 nu Linaria appellatur. Nascitur ferè vbique in campis, sideratio.
 & agrorum aggeribus. Huius flores, quos tamen omisit Dio-
 scorides, numerosi à medio vsque ad summum visantur, sylue-
 stris cumini secundi generis modo, verum in hoc purpurei sunt,
 in illa sublutei. Sunt tamen qui velint, Osyrim eam esse plan-
 tam, quam vulgò nos appellamus Bel vedere, quòd belle den- Belvedere.
 sissimeq; fructet, viveatq; per æstatem, non solum in hortis, &
 viridarijs satis, sed etiam in scetilibus ornandi fenestras gratia.
 Qui verò ita existimant, eo ducuntur argumento, quòd hæc
 non modo crescat folijs lino similibus, sed quòd etiam nunc se-
 ratur à multis ad scopas ex ea parandas. Quandoquidem id à
 Galeno dictum volunt in simplicium censu, vbi verbum κρο-
 ματα (ita enim legendum est, non autem κρομήματα, ut
 male habent codices) non solum medicamenta quæ faciem ve-
 niunt: verum etiam scopas Græcis significare arbitrantur,
 quemadmodum & Cornarius in Aetio interpretatur. Quo-
 rum equidem sententiam non prorsus improbandam censeo,
 quoniam palam est, hanc plantam folijs lino referre, & ad
 scopas consuetas aptissimam esse: tametsi Dioscoridis placi-
 tis ea non admodum adstipuletur, sicuti nec alia vocata Lina-
 ria, quòd neutrius folia è nigro, quòd viderim, in rubrum mu-
 teretur, quòdq; harum ramuli longè plura habeant folia, quam
 quina, vel sena. Vidi quoque alias plantas, quas, non decant,
 qui legitimam facerent Osyrim: verum cum etiam in his non-
 nulla desiderarentur osyridis nota, non libuit eorum probare
 sententiam. Osyridis historiam tradidit etiam Plinius lib. 27.
 cap. 12. vbi ita scriptum reliquit: Osyris ramulos fert nigros, te-
 nues, lentos: & in his folia nigra, ceu lini: semenque in ramu-
 lis nigrum initio, dein colore mutato rubescens: hæc Plinius. In Plinij lapsus.
 quibus, meo iudicio, lapsus deprehenditur ipse Plinius, quòd ipse

notis depinxerit huius plantæ semen, quæ folijs reddidit Dioscorides, à quo tamen Plinius illa mutuatus est. Tametsi hoc io-
 co Linaria herba vulgò vocata imaginem appinximus vulgum secuti, non ob id tamen ipsam legitimam Osyridem faci-
 mus. De viribus Osyridis Galenus libro 8. simpl. medic. differuit his verbis: Osyridi, inquit, herba ex qua κρομήματα (sive pro-
 pas, siue medicamenta, quæ cutem exterunt, & lauigant, interpreteris) fieri solent, amara inest qualitas, & obstructions ex-
 pedendi facultas: quare & in iccinore consistentes obstructions adiuuat. Herba hæc ὄσυρις Græcu, Latinis item Osyris dicitur: Osyridis virtus ex Gal.
 Germanis Harnkraut: Italis pariter & Hispanis, Linaria: Gallis Linaire.

Linaria vulgaris lutea flore maiore hic proposita, an Osyris, imò an Antirrhinum Plinij sit meritò
 dubitatur: dicitur Osyris, Matth. Fuchf. Turn. Dod. gal. Lacu. Cord. in Diosc. Lob. Lugd. (cui & Vrinaria &
 Vrinaria) Castor. Osyris maior, Taber. Linaria, Brunf. Linaria prima, Lonc. Dado. fol. Linaria vulgo,
 Ges. hort. Cæs. Linaria vulgaris, Cam. Pseudolinum, Brunfelsò.

Σμύλας ἄσπερα


SMILAX ASPERA.

CAP. CXXXIX.

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi modo, aut paluri aculeata: arbo-
 res scandit, ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis, & fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, racemosum.
 gustum- gustum-

ἢ Μεύ κρο-
 νον ἔχει βο-
 τανικόν. ἰ.
 φρούτον ἰ.
 racemosum.

I. SMILAX ASPERA.



a Meū & Cat.
κατά τὰσαν
την σμίλακα
i. per totam
smilacem.
b Meū τρη-
βολον ἀτι-
κόν ἐκατέρω
θεν; τριῦ
ὀβολοῦ Ἀτ-
τικῶν.
Smilacis aspe-
ra histor. ex
Theophr.

gustumque leniter mordent. Nascitur in palustribus
& asperis: radice dura, crassaque. Folia & acini, & an-
tè, & post epoti, venenosorum antidota sunt. Tra-
dunt, Infantibus nuper in lucem editis, quid ex hu-
tritum propinetur, nulla postmodum venena nocu-
tura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea
medicamenta, quibus venena arcentur.

Σμίλαξ λεία. SMILAX LEVIS.
CAP. CXL.

Lævis Smilacis folia hederæ similitudinem ha-
bent, molliora, læuiora, tenuiora: huius læuora
ta supradictæ similia, nullis horrent spinis: conuolu-
tur arboribus, vt prior: fructum parit lupini modo
nigrum, exiguum: floribus in a cacumine perpetuis,
multis, rotundis. Hac Smilace, quadam tepiorum
arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur: fo-
lia per autumnum decidua. Semine cum Dorycano
poto, b ternis singulorum obolis, varia & tumulo-
sa in somnis obseruari traduntur.

Smilax aspera Hetruscis Hedera spinosa, sine rubus ar-
uius nominatur. Hanc diligentissimè persecutus est
Theophrastus libro tertio capite vltimo de plantarum histo-
ria, vbi ita scriptum reliquit: Smilax, id est, hedera Cili-
amplexicaulis ipsa quoque assurgit, frutex aculeatus, &
luc prahorridus: folium hederæ, paruum, sine angulo, iuxta
pediculi retinaculum humectum, peculiare, quod medium
callum, qui instar spina animantium fecat, præteruen-
habet, & interualla staminea, non ex eo petrecta, vt cari-
ca, sed circa eum in orbem circumacta, ab annexu pediculi
ducit, ad caulem verò foliorum internodia consummantem:
iulus ab eisdem pediculis atque folia, tenuis, seque conuol-
uens dependet. Flos candidus, suauiter olens, verno prom-
niens tempore, fructus proximus Solano, atque Meleto,
& maximè vna labrusca vocitata. Racemi peniles vt he-
dera sunt, verum ad labruscam potius accedunt, nam de
eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Colore fructus rui-
lus est: nucleos in vniuersum quidem binos continet, qua-
quam grandior ternos, & paruulus vnum. Nucleus durus
admodum est, & colore forissecus niger. Peculiare racemi,
quod per latera caulium sepiunt, postremoque caulium racemi
omnium maximus propendet, sicut in rhamno, & rabo: v-
de fit vt extremo fructifera, & latere largè fructifera ista spe-
ctetur. Hactenus Theophrasti de Smilace aspera sententia.
Hanc eius radices esse platan affirmant, quam Hispani Zar-
zam parillam vocant. De qua cum superius primo libro vbi
de ligno Guaiaco egimus, latius scriptum sit, hic eadem repe-
tere haud operæ pretium esse censemus, siquidem eo se conse-
re poterunt lectores, qui Zarza parilla historiam, & virela-
gere voluerint. Zarza parilla plantam, cuius imaginem hic
appingi curauimus, misit ad me Cypro dum hæc commenta-
ria prælis subessent, Bartholomeus Rhollæus medicus, & rei
plantaria peritus, atque etiam Constantinus Syluestrius pha-
macopeus Ariminensis: atque eam ob causam legitimam Zar-
zam parillam hanc plantam esse putamus, quod omnibus seu
notis alteram referat, qua ex Hispanijs antea transmissa fu-
erat. Verum tamen si folijs habeatur aspera smilacis, vt tamen
minora, & auersa parte minimè aculeata spectantur: quia
etiã nec viticula spinis rigent. Quo fit, vt iã sateri possim iuxta
Smilacem asperam, & Zarzam parillam nonnullam interce-
dere differentiam. Caterum ob id à mea non dimoueor opinione, nempe vt hæc planta genere, ita & viribus non differant.

II. ZARZAPARILLA.



Zarza parilla.

Smilacis læ-
uis histor.

Qua autem Smilax læuis appellatur, si ea non est, cuius hic iconem expressimus, alia sanè in præsentia ad manus non est, qua
magis læuam smilacem referat quam hæc, in qua nihil desideratur, præterquã seminis facies, qua nullã prorsus cū lupino con-
formitatem

III. SMILAX LAEVIS.



IV. LUPULVS



formitatem habet, non ausim tamen legitimum affirmare. Hac itaque vbi que serè prouenit, sed praesertim in Hetruria, vbi passim frequentissima inuenitur. Incola eam vulgo vocant Villucchio maggiore. Hac folijs aspectum quadantenus imitatur, nec secus ac illa arbores scandit, seq; conuoluit eiu, proxima quaque vinciens: verum sarmentu, siue ramulis constat, non vt altera horridu, aculeatisque, sed lenibus, flexilibus, ac lentis. Flores profert candidos, calathi effigie: è quibus semen prodit atrum. Officina hanc plantam Volubilem nuncupant. Cuius tamen plura Mauritani habentur genera, quorum vnum illud est, quod LVPVLVM appellant. Huius etsi apud medicos atati nostra frequentissimè sit vsus, addaturque ab ijs in quam plurima medicamenta, nihil tamen de eo, quod equidem inuenerim, Galenus, & Dioscorides, aliique veteres tam Graeci, quam Latini authores, posteritatis memoriae pròdiderunt: quoniam non desunt, qui velint, hunc Plinio esse Lupum salictarium, ab eo hoc tantum nomine demonstratum libro 21. ca. 15. atque ibi inter eas herbas connumeratum, quae sponte nascuntur, quibusque pleraque gentium vtuntur in cibo. Lupulus itaque in Germania, Bohemia, Polonia, & in alijs Septentrionalibus regionibus magna sanè cultura in campis alitur, ad cereuisiam conficiendam. Nam absque lupuli folliculis ea parari nequit. Duum est generum, satiuum & spontè proueniens. Hoc in sepibus, & frutetis prouenit, illud in campis feritur, adactis subinde palis, quibus se circūnoluit. At facie inter se nõ differunt, praeterquam magnitudine & exilitate: quandoquidè satiuu omnibus suis partibus adultius est. Planta est arbores scandens & contexendis pergulis aptissima: folijs vitigineis Bryonia modo, modo ternis, modo quinis diuisuris circumstantibus, asperis, vt in cucumere. Sarmenta habet praelonga, aspera, hirsuta & quadantenus aculeata. Flores edit subpallidos, racemososque, & folliculos numerosos, exiles, compactili quadam serie dependentes, in quibus atrum, & amarum concluditur semen. Lupuli flores, folliculi & radices, excalfaciunt, siccant, aperiunt, extenuant, abstergunt & expurgant, sanguinem mundant. Atqui tariones, quibus elixiu vtuntur in acetarijs, cum plura humiditatis habeant, parum quidem, tum excalfaciunt, tum siccant. Sunt tamen sumentibus & cibis, & medicamentum. Namq; sanguinem mundant, ventrem soluant, in cibum sumpti vbi prius probè fuerint elixi, obstructions aperiunt, nec parua cum palato in eunt gratiam. Florum, & folliculorum decoctum datur commode potandum contra hausta venena, scabiem, Gallicam litem, & ceteros quosque affectus, qui extimam cutim inficiunt, nempe lienes, serpigines, impetigines, alphas & huiusce generis alios. Datur & in febribus diuturnis, à iocinoris infarctu prouenientibus. Semen tritum, & posui datum semidrachma pondere, interaneorum animalia necat. Menses prouocat, & vrinam pellit. Flores, & folliculi in defestionibus aditi, praestant ad induratos, & tumidos feminarum locos: & ad eos, qui difficulter vrinam reddunt. Lupuli vocati latins meminit Mesues inter sua deiecloria facultatis medicamenta, vbi hac ad sensum habet. Est & aliud Volubilis genus quod LVPVLVS appellatur, folia habens aspera, cucumeris modo: flores exilibus folliculis squamatim compactos, racematimque dependentes, colore subinereo. Hinc stanam bilem detrahitis, sanguinè ab ea expurgat, & eius inflammationes extinguit. Sero caprino maceratus, & exhibitus, paulò valentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syrupi modo, regio morbo laborantibus medetur. Sed profectò mirum est, quòd eo nostra atati medici tam parè raroque vtantur, cum tamen praestantissimum sit medicamentum quandoquidè: tum herba ipsa per se, tum etiam succus potentè admixtus, capiti dolorem à caliditate contractum tollit. Iocinoris, & ventriculi aestus mitigat. Syrupus ex saccharo, & eius succo paratus, vtilissimè exhibetur in febribus à bile, & sanguine excitatis: hac Mesues de Lupulo. Caterum ad institutum nostrum reuertamur. Smilacis vtriusque vires tradidit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquiens: Milax (sic enim Smilacem vocat Galenus) aspera clauiculis plena est, ita vt varie sursum deorsumque arboribus circumuoluatur. Folia gustata aliquid habent acrimoniae, & alioqui si illa vtantur, calefaciunt. Milax laevis facitatem quodammodo praedita similitudo est. Planta quae Graeci σμῖλα καὶ ῥαρχία, Latini

Villucchio maggiore.
Volubilis offic.
Lupuli mētio

Lupuli virea

Lupuli hist. & vires ex Meli

Smilacis v. triuque vires ex Gal. Noimma.

lib. Iocinoris, & ventriculi aestus mitigat. Syrupus ex saccharo, & eius succo paratus, vtilissimè exhibetur in febribus à bile, & sanguine excitatis: hac Mesues de Lupulo. Caterum ad institutum nostrum reuertamur. Smilacis vtriusque vires tradidit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquiens: Milax (sic enim Smilacem vocat Galenus) aspera clauiculis plena est, ita vt varie sursum deorsumque arboribus circumuoluatur. Folia gustata aliquid habent acrimoniae, & alioqui si illa vtantur, calefaciunt. Milax laevis facitatem quodammodo praedita similitudo est. Planta quae Graeci σμῖλα καὶ ῥαρχία, Latini

nis Smilax aspera, & Hedera Ciliffa vocatur: Italis, Hedera spinosa, & Rouo ceruino: Germanis, Echarpfe Wunden: Gal-
lis, Tan, siue Smilax aspre. Quæ verò $\sigma\mu\iota\lambda\alpha\ \xi\lambda\epsilon\iota\alpha$ Græcè, Smilax læuis siue lenis Latine dicitur: Italicè, Volucchio maggiore
Germanis Wunden oder Zaunglöcklein: Hispanicè, Correguela mayor: Gallicè, Liset maior, seu Campanette. At Lupa-
lus, Italicè, Lupolo, Brusandolo, seu Foranceso: Germanis, Hopffen: Gallis: Houblon.

Smilax, aspera est & læuis, vtriusque & suæ differentia. I. Smilax aspera fructu rubente, C. B. Smi-
lax aspera, Matth. Fuch. Turn. Dod. gal. & fol. Cordo in Diosc. (cui & hedera ciliffa) Ges. hort. Lacu. Lob.
Castor. Cæsa. Tab. Camer. Lugd. cui & Volubilis acuta vel pungens. Smilax aspera vera, Trag. Smilax aspe-
ra fructu rutilo, Clus. histo. Hilpa. Volubilis aspera, Lonicero. II. Smilax aspera Peruuiana seu Salsa pa-
rilla, de qua supra lib. i. cap. iio. III. Conuoluulus maior albus, C. B. Smilax læuis, Matth. Fuch. Ges. hor.
(cui & Conuoluulus Plinij) Lacu. Castor. Smilax læuis alba maior & Coniugulum Caroni, Dod. gal. Smi-
lax læuis maior, Lob. Dod. fol. Volubilis, Brunf. Volubilis maior, Trag. Lonic. Thal. Taber. Helxine ci-
fampelos, Cor. in Dioscorid. Conuoluulus maior, Ges. hor. Cæsal. Malacocissus Damocratis, Angul. Latio-
ne Plinij, Dalechampio in notis in Plinium. IV. Lupulus mas, seu Volubilis folijs asperis Metues, C. B.
Lupulus, Matth. Brunf. Turn. Lome. Dod. fol. Castor. Cæsal. Lugd. Taber. Lupulus salictarius Fuch. Doc-
gal. Ges. hort. Lacu. Ab hoc differt Lupulus femina, folijs, quæ circa radicem non laciniata, sed tantum
in ciliis serrata & rotundiora sunt: flosculis subpallidis, qui sine fructu pereuntes in pollinem luteum ab-
eunt. Vt prior in sepibus nascitur. Sunt qui Lupulum marem appellant, qui steriles habet flores: & femi-
nam, cui absque flore folliculares fructus innascuntur, quod & alijs herbis, vt Spinachia, Cannaba,
tribuunt.

$\mu\upsilon\sigma\pi\omicron\iota\nu\ \alpha\zeta\pi\iota\alpha$

RUSCUS.

CAP. CXLI



Rusci confid.

Pungi topi.

Nomina.

Syluestris myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut myr-
tacantha, Latinis ruscum appellatur: folium fert
myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum: bac-
cæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio
dependentes, ossæo intus nucleo: cubitales rami
ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu con-
tumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & sub-
amara. Folia & baccæ in vino potæ, urinæ cient: men-
ses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio vrinae
medentur, dolores capitis sanant, & regium mor-
bum. In asperis, & præcipitibus locis enalcitur. De-
coctum radice in vino potum, eisdem præbet effe-
ctus. Cauliculi recentes, asparagorum vice in cibo
sumuntur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

Ruscum officina corrupto nomine ex licita addi-
one Bruscum appellant. Nos vero, quod arceudo mo-
ribus is aptissimus sit, si salitis appensis carnibus fructu in-
cumligetur, Pungi topi Hetrusca lingua dicunt. Germanis
hic vere asparagi modo, turionibus tamen breuioribus, cras-
sioribus, hirsutisq; qui elixi manduntur ex oleo, sale, & aceto.
Excalfacit radix, siccat, aperit, abstergit, extenuat Catenam,
quod non obscure amarorem gustui relinquunt, in medua-
mentis potius, quam in cibis expetuntur: sunt enim ciende vr-
rinae, aperiendisque obstructionibus perquam idonei. Græci
quod folijs sit acutis, & myrtum emuletur, oxymyr sine, hoc
est, acuta myrtus appellatur. Ea Græci $\mu\upsilon\sigma\pi\omicron\iota\nu\ \alpha\zeta\pi\iota\alpha$ & $\mu\upsilon\sigma\pi\omicron\iota\nu$
 $\mu\upsilon\sigma\pi\omicron\iota\nu$ vocatur, Latinis, Ruscus, & Myrtus syluestris: Arabi-
bus, qui Cubebas cum rusco confundunt, Cubebe: Itali,
Rusco & Pungi topi: Germanis, Brusco: Hispanis, im barba
& Gil barbera: Gallis, Brusco. Brus.

Ruscus, Matth. Trag. Cord. in Diosc. Ges. hort. Lacu. Lobel. Lugd. Cæsalp. Taber. Camer. Ruscus ve-
rus, Lonic. Ruscum Dodo. gal. & fol. Myrtus syluestris. Turn. Myrtacantha & murina spina, Lob. in icon.
Centromirini Theophrasti, & Oxymyr sine, Anguillare.

$\lambda\alpha\upsilon\upsilon\alpha\ \alpha\lambda\ \xi\lambda\epsilon\iota\alpha$

LAVRVS ALEXANDRINA.

CAP. CXLII

a Meum. &
 $\mu\epsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\tau\epsilon$ i. in
mediis.

Laurus Alexandrina folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: femine a inter folia rubro, ciceris
magnitudine: ramos spargit in terra dodrantaes, interdum longiores: radice syluestri myrto simili,
maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum
pondere in vino dulci, & stillicidio vrinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Lauri Alex-
drinae confid.

Si laurum Alexandrinam, & Hippoglossum vnã & eandem plantam esse sensisset Dioscorides, vt quidem existimant,
nulli quidem dubium est, quin superuacuum erat, de ysdem seorsum, diuersis atque etiam proxime capitibus Diuersi-
dem differere: vel nulla in earum notis, & viribus reperiretur differentia. Sed quoniam eas seorsum tanquam diuersas
tulit, diuersasque vtrisque notas assignauit, idcirco has plantas inter se differre dicatur, necesse est. Nam et si viribus
similes

I. LAURVS ALEXAN-
drina.

II. LAURVS ALEXANDRINA
altera.



folia rusci reddiderit Dioscorides. ramentum Hippoglossum statuit aculeatam gerere comam, & in summo ceu linguas è folijs
exeuntes: commendavit que comam ad dolorem capitis corona modo impositam, & radicem, succumque malagmatis ad-
misceri scripsit. Verum hic in Lauro Alexandrina nec linguarum meminit, nec aculeorum è folijs prodeuntium: tradidit
quidem hanc folia habere rusci similia, sed maiora, molliora, & candidiora: ramos dodrantales, in terram sparsos: radicem
40 rusci similem, maiorem tamen, molliorem, & odoratam. Cui vires tribuit ad difficiles partus, ad vrinae stillitidum, & ad
sanguinem extrahendum. His accedit, quòd (vt Dioscorides testari videtur) Laurus Alexandrina fructum fert rubrum, ci-
ceris magnitudine, inter folia, non autem in medys folijs, vt hippoglossum, & ruscus. Ex his itaque tum notum, tum viribus,
qua in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehenduntur, omnibus abunde constare arbitror, hallucinari eos, qui pu-
tant Laurum hanc, & hippoglossum vnam & eandem esse plantam. Nos equidem hanc, cuius hic figuram datus, veram
ac legitimam Laurum Alexandrinam esse censemus, qua (vt pictura pulchre demonstrat) non parum ab hippoglosso differt.
Huic alteram adiecitimus, qua & ipsa haud dubie, nisi fallor, fuerit Laurus Alexandrina, si huic fructum in medys folijs in-
nata concedamus. Lauri Alexandrina vires memoriae prodidit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum, sic inquit: Lauri herba, quam & Laurum Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul
50 & subamarum est. potuque tum vrinam tum menses prolicit. Planta Graecis δ'αφνιάλαξανδρεια, Latine Laurus Alexandri-
na dicitur. Arabibus, Gar Alexandria: Italis, Lauro Alessandrino. Gallis, Laurier Alexandrin.

Lauri Alexan-
drinae vires
ex Gal.
Nomina.

Polygonatum latifolium ramosum, C. B. Laurus Alexandrina, Matth. Dod. gal. Cam. Hippoglossum,
Lugd. Polygonatum tertium, Clus. hist. Pann. Polygonatum quartum latifolium, Tab. Rusco affinis ter-
tia Cæsalpino. II. Hippoglossum fructu folio insidenti, C. B. Laurus Alexandrina altera Matth. Laurus
Alexandrina, Lac. Tab. Laurus Alexandrina vera, Lugd. Hippoglossum, Loni. Rusco affinis altera, Cæsal.

Δαφνοειδής. DAPHNOIDES. CAP. CXLIII.


60 Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, obsequiosisque, multis, à medio sursum versus
foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contu-
macia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruerit, nigra: radix inu-
tilis: nascitur in montosis. Puitam extrahit folium recens, vel aridum in potu: menses ciet, & vomitum:
caput inanit commanducatum: sternutamenta mouet. Baccæ quindecim potæ aluum resoluunt.

Χαμαειδάφηνη. CHAMAEDAPHNE. CAP. CXLIIII.

Chamaedaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, læues: folia lauri
similitudine, leuiora multò, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis
doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cum vi-
no succus menses, & vrinam ciet: idem facit pello appositus.

I. DAPHNOIDES.

II. CHAMAEDAPHNE



Daphnoidis,
& Chamæda-
phnes confi-
deratio.

Mezereum
non est Da-
phnoides.

Vinca peruin-
ca Chamæ-
daphne.

Piper monta-
num.
Daphnoidis
& Chamæda-
phnes vires.
Nomina.

Daphnoides, quam officina, & herbariorum vulgus Laureolā vōcant, frutex est vulgaris notitia. Prouenit hæc frequen-
in valis Anania montibus, Tridentino agro & vbiq; ferè locorum. Nam & in Germania, & in Bohemia, atq; in
pluriq; in locis copiosa visitur, nullis prorsus reclamantibus notis. Cubitalibus enim assurgit virgibus, flexilibus, obsequensq;
folijs numerosis, sursum spectantibus, lauro similibus, gracilioribus tamen ac mollioribus, acerrimo gustu: quin & rari-
um cortex admodum tenax est. Hinc itaque fit, vt eos errare toto celo deprehendatur, qui putent Mezereum diuinitas
vocatū esse Daphnoidem: quandoquidem Mezereon Chamelæa est, de qua suo loco differemus. Porro Chamædaphne
quam Laureolam marem pleriq; cognominat, folijs ac fructu à Daphnoide non longè differt: verum hæc tantum inter
differentia, quod Chamædaphne singulari rectoq; caule constat, cui folia circum, quaq; prominent, adeo vt in cacumine
bem umbellæ instar diradientur: semine inde prodeunte Daphnoidis modo. Caterum, quod vocauerit Plinius Chamæ-
phnen eam clematidem, quam aliqui Vincam peruinicam appellant, credere quidam hanc Dioscoridi esse Chamædaphne.
Sed profectò ij falluntur: errorq; omnibus euidentior fiet, quam vt pluribus explodi possulet, si modò contemplerentur, & tra-
ferantur nota, quibus Vincam peruinicam descripsit Plin. li. 21. cap. 11. & quibus representat Chamædaphnen li. 24. cap. 11. Ve-
rum Plinio, quod clematidi folia sint lauri, videaturq; humilis laurus, ideo non temerè eam Chamædaphnen dici placet.
Sunt, qui Laureola fructum Piper montanum vocent, quamuis rusticis Ananiensibus nihil aliud sit piper montanum,
quam Dioscoridis granum Gnidium, vt infra suo loco dicemus. Daphnoidis recentia folia contusa illinuntur vniuersi vbi-
aditus tam diu quousque ruborem, aut vesicas excitent. Daphnoidis, & Chamædaphnes vno tantum capite meminit Ga-
enus lib. 6. simplic. medicamentorum, sic inquit: Chamædaphnes germina tenera edi quoq; assolent. Est autem in persia
viribus lauro Alexandrina: sicut sane & quod Daphnoides nuncupant. Planta, qua Græcis Δαφνοειδής, Latinis uero Da-
phnoides, & Laureola nominatur: Arabibus, Daphnides: Italis, Laureola: Gallis, Laureole. Qua verò χαμαιδάφνη Græ-
cè, Chamædaphne pariter Latine dicitur: Arabicè, Chamædaphnes: Italicè, Chamædaphne.

Laureola duplex est, alia folio teneriore & deciduo, alia folio crassiore & semper virente: I. Laure-
ola Germanica folio teneriore, C. B. Daphnoides Matth. Turn. Fuch. Ges. hort. (cui & piper montanum
Italorum) Lacu. Castor. cui & Laureola maior: Daphnoides aliorum Lon. Daphnoides flore purpureo,
Tab. Chamelea seu Mezereon, Trag. Chamelæa Germanica Dod. gal. & fol. Cam. Thal. an Chamelæa al-
tera, Cæsal. Mezereum Germanicum, Lob. Laurus pusilla, Eidem in iconibus. Laureola femina, Lugd.
Chamædaphne, Clus. histo. Panno. Thymelæa, Cord. in Diosc. Piper montanum Anguillaræ. Glycyrrhizæ
zati montanam nominare solemus, vt rei herbariæ ignaros fallamus, quod hæctenus in omnibus fere
herbationibus contigit. II. Chamædaphne, Matthiolo, Lacu. Loni. Castori, cui & Laureola minor.
Daphnoides seu Laureola, Lugdunensi. Hanc figuram Matthiolus in maioribus iconibus exhibet: in mi-
noribus etenim vnico caule expressit, de qua stirpe nonnulli dubitant tanquam de incognita: alij tamen
ad Daphnoidem referunt: suspicantur, Matthiolum Laureolam officinarum exprimere voluisse.

Ελλείθερος λευκός

VERATRUM ALBUM

CAP. CXLV.

Elleborum album Latini veratrum album vocant, fert folia plantaginis, aut betæ syluestris similia,
sed breuiora, & nigriora, rubescencia: caulem canum, quadrantalem, tunicis conuolutum, quod
abdest

abdicat, cum arefcere incipit, radicibus mititur multis, tenuibus, ab oblongo, & exiguo capite cepearum modo exeuntibus: nascitur in montibus, & asperis. Radices mensibus colligenda. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modice extensum, nec a tamen iunci modo mucronatum, quod frangendo pulverem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non admodum feruens, & neque salivam subinde cibus: huiusmodi autem strangulat. Primarium Cyrenaicum tenet. Galaticum autem, & Cappadocicum candidiora, & pulvere quodam oblita, celerius strangulatus movent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutunt: partus impositum necat, menses pel- lit, sternutamenta excitat: mures interficit, cum melle & polenta tubicum: abluunt carnes, si coquantur v-
 20 aut pulve, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita massatur. Preparatio corporum, ac victus ra-
 tio diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime à Philonide Siculo Eunenii, cui nunc assentimur, quippe longum nimis esset in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cre-
 more, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus stran-
 gulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectione nihil periculi mi-
 natur: quod cibo munitis non intemptivè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concit-
 ant subditæ ex eo balani cum aceto.

α δὲ ἀποξυ-
 δὲ καὶ σχε-
 ιωδῆς, ἰ. non
 acutum, &
 iuncum, ita
 Meum & Ca.
 β Meū εἰς
 ἀβρόαις, εἰς-
 λειπέταμο
 τα. ἰ. neque
 cumulatè sa-
 livā attrahēs.

Ἐλαίβορος μέλας.

VERATRUM NIGRUM

CAP. CXLVI.

20 **E**lleborum nigrum appellatur melampodion, quoniam caprarum pastor nomine Melampus furen-
 tem se in Traicidas primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia: minora, folijs spho-
 dylij p- vana. subalpeta nigri ora, pluribus divisis in cæcis: caulis asper, flores in purpura albicantes, race-
 marum con- vientes: semen emei, quo in Anticyra selamoides vocant, quo deiectiones moluntur. Radi-
 cibus conatæ nigris, tenuibus, à capitulo capæ simili confibratis, quarum est usus. In collibus, asperis, &
 a sitientibus locis enascitur. Optimum est, quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum imbi
 probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum, & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, fer-
 uensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium præcellit. Veratrum
 nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasque, datum per se, aut cum scammonia, & tribus obo-
 30 his sine drachma salis: decoquitur vel cum lente, & iusculis, quæ purgationis causâ sumptantur.
 Prodest morbis comitialibus, melancholicis, infantibus, articularijs doloribus, & resolutis. Men-
 ses inditum trahit, partus necat: purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item contra gra-
 titatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum, aut tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat illi-
 tum cum thure, aut cera, & b pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur:
 dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur: hydropicorum ventri
 vtilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma. Confitum proximè radices viu-
 a Meū κα-
 ταξεραις το-
 ποσι. ἰ. siccis
 locis.
 b Meū ὄρνι-
 πτης. ἰ. La-
 chryma pini

I. ELLEBORVM ALBVM. II. ELLEBORVM NIGRVM.



Bbbb

tum, vi-

um, vinum purgandi facultate donat. Huius resparſu domos expurgari arbitrantur: quare inter foſſa dum ſtantes Apollinem, Aesculapiumque precantur, ac virant aquilæ volatus: aduolare enim non tam periculo tradunt: namq; ſi auis effoſſionem ellebori cõſpexerit, moriturũ qui ſuccidit, augurium eſt. Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quapropter ad id arcẽdum, foſſuri alium præſumere, & vinum bibere conſueuerunt: nulli ita noxa opportuni redduntur. Veratri albi modo tradullatur.

III. ELLEBO. NIGRVM alterum.

Ellebori vtri-
uſque conſid.



Ellebori dilu-
tum.

Elleb. purpu-
reo flore.

Elleb. flore
albo.
Pseudoelle-
borum.

Herophili
ſententia dã-
nata.

niola urbem proficiſcuntur, vbi & nos præſantiſſimum ſapius legimus. Prouenit quoque Elleborum flore purpureo conſiſſimum in Austria ſuperiori, non longè à Lintzio, prope urbem quam Steir vocant, vnde quotanni ad me illud mittet let excellens medicus Martinus Stoppius Flandrus. Purpurei radices nigriores, carnoſiores, que ceteris habentur: cum du- rum generum radices vt plurimum ſubalbida ſpectentur. Atqui facies non omnibus eadem eſt. Purpureum enim ſtorem g- renti, numeroſa ſunt folia, robuſta, & ſaturatè virentia: ea ſeptem ſimul ex apice robuſti canaliculatiq; pediculi, qui plu- res in vniuerſa planta habentur, prodeunt, atqui ſex, que vtrinque terna exeunt, in exortu ſimul coniuncta ſpectant. quod verò medium eſt, per ſe ſolum ſine comite conſiſtit. Caulem gerit hæc planta cubito paulò breuiorem, rotundum, gi- bru n, ac ſolidum: flores roſarum figura, in purpura albicantes, è quorum medio inter alba quadam capillamenta eſſe- riantur ſiliquula inuicem coniuncta corniculi figura, in quibus ſemen oblongum concluditur: radicibus nititur numeroſis longis, tenuibus, ſaturatè nigricantibus, tenui intus matrice, & à bulboso capitulo à quo cauſis exit, prodeuntibus: amari- acrique guſtatu, & qui facile ſtomachum moueat, odore inſuauis, ac ingrato, & præſertim vbi exenterata radices ſu- ſcunt. Ceterum genus alterum, quod ſtorem candidum proſert, nihil præſus facie à præſcripto diſſert, niſi ſtorem color. Tertium verò genus quod nos fœminam, aut Pseudoelleborum appellandum cenſemus, folia gerit digiti nouem ad pedu- lum vſque diſſecta, aconiti Cynoctoni ſerè modo: ſed longioribus diuiſuris, nigricantia, circumquaq; ſerrata, & è longo pu- noq; pediculo, caua per medium excurrente linea, ortum ducentia. Caulem edit vegetum, ſubæſperum q;: flores ceteru- les, ſed herbaceo colore ſubuirides, aut quadantenus ſubpalleſcentes quinq; aut plures, emergentibus è medio corniculi ad- minatis & vtrinq; compreſſis, in quibus ſemen continetur. Radicibus coheret numeroſis, tenuibus, palmari longitudine a- etiam longioribus, colore nigricante, & perinde ac in alijs à capaceo capitulo ortum ducentibus: odore pariter graui, & ſe- re amaro, acuto, ac naſeſebundo. Naſcitur in montibus, & conuallibus. Germinat omne genus Ianuario, & Februario. In Martio floret, ſepeq; ſuo germinatu niues perforat. Herophilus antiquiſſimus medicus elleborum fortis. mo duſi aqua- concitatis enim intus omnibus, ipſum inprimis exire dicebat. Ideo errauitſe antiquos parcius id præbendo, cum celerius- rumpere, quod daretur largius. Sed hæc Herophili ſententia non placet noſtra at atus medicis, neq; etiam nobis, vt que po- ribus damnari, & explodi poſſit. Elleborus niger boues, equos, & ſues nocet proinde id in paſcuis cauent, quamuis alibi- noxie depaſcantur. Nigri radices demorſis a ſerpente quadrupedibus mirificè medentur, ſi recentes in vulneris oſculum, ſu- lata a carne cute, immittantur, quod ita ei aculatam reuocent venenum: quum & illud idem prodeſt, ſi gregi peſtilentia- gnerit, in auribus traiecta, vel pectori inſixa radice. Quæ ratione ducti credidere nonnulli, ad etiamnum in hominibus po- ri poſſe, quod ſi in perforatam calcanei catem nigrum elleborum inſeratur, eos omnino à peſtilentia tutos reddat, qui ſi- ſtauerint. Ellebori ſemen, Ariſtotele auctore, coturnicibus gratiſſimum eſt: quam ob cauſam antiqui eas abdicarunt mori- que tamen hodie magnopere expetuntur. Porro non deſunt & recentiores, qui putent nigrum communiſſi vſu Elleborum

Elleborum, quod & Veratrum Latinis dicitur, g- bun, quam nigrum omnibus, ni fallor, notum eſt. Et quæſi- talia. Et quamuis inibi vnum tantum Ellebori albi genu- ueniat, floribus in toto ſerè caule ſpicatis, ſubſiſtens. Et tamen tria nobis comperta ſunt genera. Vnum quoniam- flores proſert purpureos, quales ſuo reddidit Dioſcorides: rum: verò candido: tertium denique herbaceo. Hæc v- diſtinguuntur, ita etiam vtriusque inuicem diſſert: quæ- quidem alterum, & tertium genus ad eò vtriusque imbeci- ſunt, vt ſerè nihil ad alium deiciendam præſent. In quæ- factò peruulo didici, cum primum ellebori genu ſtorem- rens purpureos nobis non eſſet ad manu. Huius radicem- luto ex more noſtro parato, hyeme etiam media, & mag- vrgente frigore (eſi id improbent medici) præparata præ- diutius materia, decoctis ac ſyrupis ad id facientibus, præ- quart: ina febre laborantes ſanauimus. Nunquam enim- quod meminerim, hoc ellebori dilutum dedimus quartu- riyſ noſtris, quin ex vnica aſſumptione, vel ſaltem alia- Deo iuuante, fuerint ad ſanitatè reſtituti. Ceterum alio quæ- que ellebori dilutum exhibuimus quibusdam melancholici- magne, & ſuſceſſu: nulla tamen agrotantium incom- do, nullaq; noxa. Quod non alia ex cauſa eueniſſe putam- rim, quam quod in Tridentino agro, alijsque circumjaci- nis locus, ea fort. aſſe ſit illius cæli temperies, vt non adeo pu- nicioſis facultatibus ſcateat vtrunq; elleborum, quæ- modum illud, quod in calidioribus prouenit regionibus. ta- eſi non dubitauerim etiam vtriusque acerrimam vni- primi, ac corrigi proprijs quibusdam additis medicam- Parandi modum, ac etiam propinandi, deſcripſimus in- tertio noſtrarum Epistoſarum, ad Georgium Hanſfordum Medicum ſcribentes. Viſuntur nigri vniuerſa genera Ma- rio & Aprilis mēſibus, vno & eodem loco florere in empi- ma ſylua, per quam tranſeunt, qui Goritia Labacum Ca-

cui flores herbacei insunt, non elleborum, nec eius speciem esse, sed eam sanè plantam, quam Columella, & Plinius Consili-
 ginem vocant, cuius sententia est clariss. ac doctiss. Fra. castorius, qui etiam eundem Pliny Enneaphyllon eandem facit. quã
 que ad pecorum pulmonariam curandã, pestilentiamq; arcendam summis laudibus effertur, hoc tantum puto argumẽto
 fieri, quod scripserint q; si in morbo si quadrupedi auricula consiliginis radix inseratur, perforat a ferro prius autẽ, omnem
 morbi vim eò confluere. & per illud foramen pestilens virus elui. Si quidem ceteri pastores huius ætatis observauerint, id to-
 tum (vt nos quoq; paulo ante diximus) præstari tantum illius ellebori radicibus existimauerunt hoc veratri nigri genus,
 quod flores rubentes non proferat, vel (vt Diosc. inquit) in purpura albicans, & rubescens, consiliginem esse. Sed h. meã
 quidem sententia, falluntur: quippe Absyrus, & Hierocles idem præstare non veratrum affirmant. Quibus etiam sub-
 scribit Plin. lib. 25. c. 5. his verbis: Nigrũ elleborum pecorum, & tumentorum pituitas sanat. Jurculo per aurem tracto, &
 postea die eadem hora exempto: hæc Plinius. Ex quibus utique perspicuum est, non modo consiliginis, sed etiam nigri veratri
 radicem hæc omnia efficere posse. Vanum profecto esset dicere, explegratias, & manam esse calamintam, vel coira, quod
 utraq; remoratos menses eluant: quasi natura adeò fuerit auara, vt vnicuique morborum generi vnum tantum generet
 medicamentum, cum tamen nullus sit morbus, cui innumeras non creauerit medicina, vno & eodem ordine adhibendas.
 Adde etiam, quod cum nullus extet author, quod ego inuenirẽ, qui Consiliginis historiam describat, neq; vna quidem no-
 ta eius faciem representet, non video, quomodo rectè h. asserere possint, veratrum nostrum vjũ esse Consiliginem. Sciant ita-
 que velim, qui nigrũ herbacei floris Elleborum ideo Consiliginem esse contendunt, quod pestilentibus pecorũ morbis præius
 remedium sit, si eius radix auriculis, & aliis corporis partibus inseratur, id iudicium longe meioris esset, si rubentis floris el-
 lebori idẽ fiat, cuiusq; expurgari virtus illud pestilens, quod hanc virus insunt valentiores. Horũ quidem opinionem vt planè
 sequitur Fuchsius vir doctissimus in libro de comp. med. quem p. primo auctum edidit: ita etiam idem, meo iudicio, in ma-
 nifesto illorum errore versatur. Nec Enneaphyllon esse putamus, si quidem Plinius nusquã meminerit Enneaphyllon consi-
 liginem Latinis vocari, eamq; vrentis facit facultatis, & laborum, & tumoremq; doloribus vtilem. Caterum hic non est si-
 lentio dignum, in epta satis, & vana, meo quide iudicio, de nigro veratro opinio Vgonis Solerij, viri altoqui doctissimi,
 vt eius testantur scholia, quæ nuper in priores Aeth. libros edidit. Is enim in prædictis scholijs cõset, Elleborũ nostrum vjũ esse
 illud, quod flores fert rosarum modo purpureos, quam quod albos, esse lycocloni, vel cynocloni aconiti species: quod verò her-
 bidos habet floris, Pliny & Columella Consiliginem, aliorum iudicium secutus. Quod quibus rationibus comprobet, ex e-
 ius verbis, quæ modò referam, cognosci poterit. Si quis, inquit, commemoratarum iam plantarum radices diligenter expẽ-
 dat, nisi illas cum nigri veratri radicibus quæ, teste Dioscoride, capite modo bulbosa sunt, erumpentibus ab imo earũ bulbo
 multas radices) commune habere multo euidentius comperiet, quam vt pluribus demonstrari nũc debeat. Taceo namq;
 ex his plantis dum velluntur, capitis dolorem oĩ vaporum halitum consistari, vt ipse multo tempore expertus, id quod in nigri
 veratri euulsione testatur Diosc. Ex his igitur constat, nullam harum trium plantarum ad nigri veratrium factis q; te
 post, reduci: quin duas priores aconiti lycocloni postremas species esse, postremam herbam, sui generis: hæc Solerius. Quibus
 verbis cum in me cogit, licet non aperte, meamq; expugnasse sententiam, ex hoc plane conicio, quod nullus, quod sciam,
 ante nos scripserit, tria in Italia, ac priuatim in Carniola reperiri nigri veratri genera. Neque id certè agere sero, quod li-
 center audiam, indies nouas in re herbaria proferri sententias. Velim tamen id liberius, apertius, & firmiter, tum ra-
 tionibus, tũ auctoritatibus fieri. Releo ad olerũ, cuius sane hæc in re argumenta me facile diluere posse spero, vt pote quæ
 (pace eius dixerim) leuia sãta sint, & presus a veritate detrahant. Nam falsum esse, ac nimis fortasse temere dictum arbi-
 tror, quod Ellebori genera illa, quorum superius meminimus, non mittant radices (vt Solerius asserit) tenues, nigras, & ce-
 pæ quodam capitulo p. v. n. ac conhibita, cum omnibus non modo rei herbaria peritis, sed etiam pharm. a. opolis, ne
 dicam lippis & tonforibus, manifestum sit, nigri veratri communis vsus radices non altunde, quam a bulbaco quodam
 tuberculo omni ex parte pen. leu. nigras, & graues: non autem capite modo bulbosas esse, & ab imo bulbo multas erumpe-
 re, vt ille pronuntiauit. Vnde facile adducor, vt credam, si licet ingenuè dicere quod sentimus, Solerius, aut Dioscoridũ le-
 dionem luxasse, aut eam minus rectè percipisse, aut parum adhuc rei herbaria gnarum esse, vt qui sortè in ea re non mul-
 tum laboris insumperit. Quod autẽ (vt idem ait) ex hoc nostro Elleboro, dum effoditur, nullus ob vaporum halitum capitis
 dolor consistetur, & ob hoc illud legitimum esse non possit, nulla hæc est ratio apud me. Neq; enim mirum alicui esse debet,
 cur id non faciat: quoniam Dioscoridus non dicit, quod Elleborum nigrum effodientibus capitis dolorem inferat, sed quod
 balen caput aggrauat. Quam nimirum grauitatem id, cui flos purpurascit, tanquam ceteris acrius, apud nos sæpius ex-
 citat, præsertim si ligone vulnerentur radices, & ventus aduersa parte spiret. Id quod fortasse in Anticyra, Helicone, Par-
 nase, & Aetolia valentius præstat: quandoquidem, Dioscoridũ testimonio, is in locis acre gustu, feruensq; & omnium
 probatissimum gignitur climatũ illius ratione, quod in Gallia fortasse, & in Germania cœli inclementia non euenit. Ca-
 terum quod priora nigri Ellebori genera, quæ flore tum purpureo, tum albo constant, aconiti cynocloni, vel lycocloni sine
 species (vt Solerius sibi perperam, mea quidem sententia, persuasit) mihi planè absurdus videtur, quam vt ab aliquo ap-
 probari possit & debeat. Ea si quidem aconitorum genera iam omnibus clarissimè innotuerunt, suntq; caule filico simili,
 cubito longiore, & radicibus adeò tenuibus, vt squillarum marinarum cirru eas comparauerit Dioscorides. Quæ sanè o-
 mnia in nigro veratro communis vsus nunquam quis inueniat. Huc præterea illud accedit, quod nobis iam millic experimẽto
 comperit, nigrum communis vsus veratrum, quod proprio fungatur munere, atrabiliarios omnes sanare mor-
 bos: fistulas callo induratas tribus diebus impositum emollire, & purgare: in autem demissum auditus grauitatem auferre:
 scabiem, vitiliginem, lepras, & impetigines illitum emendare: & carnem in vlcerebus excrecentem absumere. Quibus ta-
 men viribus non Aconitum cynoclonon, sed Elleborum prædictum esse, in confesso est. Ex his itaque omnibus abundè per-
 spicuum fieri puto, in hoc Solerij opinionem prorsus explodendam esse: etsi idem in alijs quoque non paucis, meo iudicio,
 falli acprehendatur. Sed iam nos quoque de CONSILIGINE nostram proferamus sententiam. Ea quidem nobis
 hætenus incomperta fuit, quod neminem ex scriptoribus tam veteribus, quam recentioribus inuenirẽ (vt supra dixi)
 qui eius notas memoria prodiderit. Atque adeò hinc fit, vt non ausim ego asserere plantam illam, quam hic depingi curauim-
 us, esse veram ac legitimam Consiliginem: neque enim est, cuius authoritate fretus possim eam radicibus, folijs, caulibus,
 floribus aut seminibus comprobare. Vt etiam quoniam huiusce planta radices per auriculam perforatam inserta, pecorum
 pulmonariam atque etiam alios morbos curant, ellebori nigri modo, non parua mihi oritur suspicio, an fortasse Colu-
 mella & Pliny Consiliginem præ se ferat: non tamen velim hoc affirmanter esse dictum, ideoq; pseudoelleborum eam ap-
 pellare libuit. Hanc verò plantam Hieronymus Tragus, cuius sæpe testimonium adfert & probat Gesn. putat esse legitimũ
 Veratrum nigrũ. Sed is vt in hac euidentius errat, quam vt mediocriter etiam in re herbaria versatis osiendi debeat: ita in
 multo alijs placis, quorũ numerũ reserte longum esset, a peritis herbarũ facile cognoscitur vanũ atq; lane iudiciũ habuisse.

Elleb. nigrũ
 non esse Con-
 siliginem.

Vgonis Sole-
 rij opinio er-
 rorosa.

Elleb. nigrũ
 non esse Aco-
 niti speciem.

Consiliginis
 consideratio.

Veratrum ni-
 grum Tragi.
 Tragus ar-
 guitur.

Planta itaque cuius hic imaginem exhibuimus, ad duum palmorum longitudinem assurgit, causticulos emittit tenues ac molles, folia habet longiuscula, tenuia, quadantenus abrotoni amula: flores profert bupthalmi, paulo maiores: ex quibus prodeunt capitula oblonga, ruborum moris similia: radicibus nititur nigris, nigrum veratrum emulantibus, tenuioribus tamen, & aliquantò nigrioribus. Plurima nascitur in Bohemia, praesertim in agro Pragensi. Ea vtuntur omnes illius regni medici, tum pharmacoepoi pro elleboro nigro: priuatim magno successu ad pecorum morbos. Reliquum autem est, vt de vtriusque Ellebori viribus iam aliquid dicamus. Album, vt Mesues in suo de medicamentis deiectionis censu prodidit, maritiferum est, quod facile homines suffocare possit: idcirco omnino reiciendum esse praecipit. Nigri tamen vsum probat, sed in validissimis tantum corporibus. Quod sanè decretum nonnullos adco perterruit, vt non modò suis medicamentis Elleborum admiscere non audeant, sed & nomen abhorreant. Verùm i ridendo potius timore quodam ducuntur, quam quòd iam exhibuisse nullo prorsus incommodo: atque etiam eiusdem diluti faciendi rationem quàm plurimos docuisse medicos, quò factò subinde periculo, effectum consecuti sunt, vnde ingentes mihi gratias retulerunt, quia meritò debentur elleboro. Praestat, quod euulsis statim radicibus, interna repurgatur matrice, siccaturq; in vmbra. Harum puluis diluto longe fortius est, ob id enim non datur nisi robustis, & vbi occalluerit morbus. Proinde de eo ita scriptum reliquit Actuarius in libro de compositione medicamentorum: Veratrum nigrum, atram bilem flauamque è toto trahens corpore deorsum, nec tamen curam ullam difficultatem pellit. Ideo febribus circuitu repetentibus, & diuturnis obijcimus. Datur quoque insanientibus: altera caluaria parte, & subter caput diutinè cruciatis commodissimum: praesertim visceribus, vtero, & vesica deiectionum medicamen postulantiibus. Maxima autem eius vis est peculiariter educere, quicquid sanguini commistum, eum corrumpit. Ideo veterascentibus argutus morbis vtile: & quibus in superficie summatim asperitudines emerferunt, velut lepra, impetiginibus & horum similibus: elephantia quoque laborantibus accommodatum est. Datur scrupulorum ternum pondere, aut paulò plus minusve. It è sicca radicum fibris, aqua paulum maceratis: postea cortice detracto, & in vmbra sicca, proiectaq; tenui, que in ipsa subest medulla. Exhibetur autem ex passo, & aceto mulso: verùm suauitatis gratia, quaedam odoratis seminibus inferenda. Si verò efficaciorē alui deiectionem moliri sit in animo, scammonij pauillum adijcitur: haecenus Actuarius. Caterùm antiqui Medici albi veratri puluerem propinabant comitialibus, melancholicis, vertiginosis, insanientibus, lymphaticis, conuulsis, podagricis, resolutis, hydropicis, & elephantia membrorumq; tremore affectis: sed iam eius exoleuit vsus, quod in puluere non sine periculo dari possit, etsi eius diluto quàm plurimi absq; incommodo videntur. In lixio deoacta albi veratri radices, pediculos, & lendes necat. Decoquitur in lacte ad muscas perimendas. Namque vbi degustauerint, paulò post emoriuntur. Mures quoque necat, & gallinas. Paratur è radicibus albi veratri succo in Hispania arte quadam venenum praesentaneum, quo illinendis sagittis quibusdam in locis vtuntur venatores. Id, vt nos saepe in brutis animalibus, & gallis gallinaceis periculum fecimus, vbi sanguinem contigerit, factò cum sagitta vulnere, paulò post vulneratum animal interficit. Verùm enimvero me in non paruum adduxit admirationem, quòd decuratum, nisi magna fuerit quantitas, nihil ferè incommodi asferre soleat. Ideoq; eo ipso vesci venatores adfirmant Hispani, cum purificationes moliri cupiunt. Ob idq; nihil mirum si ferina carnes hoc veneni genere infecta, nihil prorsus comedentibus obstat: verùm vbi factò à iaculo vulnere sanguini se immiscuerit venenum, nullo alio antidoto seruari animal potest, nisi decoctis cotoneis malis, aut eorundem succo bibito. Id quod à Cesare Ferdinando primo, Domino meo clementissimo, pluries


Ellebori v-
triusq; vires.

Veratri nigri
vires ex Actu-
ario.

Veratri albi
vires Matth.

IV. PSEUDOELLEBORVM.

V. OPHRIS.



post vulneratum animal interficit. Verùm enimvero me in non paruum adduxit admirationem, quòd decuratum, nisi magna fuerit quantitas, nihil ferè incommodi asferre soleat. Ideoq; eo ipso vesci venatores adfirmant Hispani, cum purificationes moliri cupiunt. Ob idq; nihil mirum si ferina carnes hoc veneni genere infecta, nihil prorsus comedentibus obstat: verùm vbi factò à iaculo vulnere sanguini se immiscuerit venenum, nullo alio antidoto seruari animal potest, nisi decoctis cotoneis malis, aut eorundem succo bibito. Id quod à Cesare Ferdinando primo, Domino meo clementissimo, pluries

Ellebori utriusq; vires posteritatis memoria tradidit Galenus lib 6. simpl. med. sic inquit: Elleborus uterque tam albus, tum niger, extergentis simul & excoelantibus est facultatis. Quamobrem ad alphas, impetigines, scabies, leprasque accotomodi iunt. Quinetiam niger, si in fistulam callo induratum demissus fuerit, duobus tribusve diebus callum detrahit. Denique proleci, cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine excoelantium, & deficcantium. Porro niger gustu caudat ej; candidus subamarus. Haclenus de utroque Elleboro Galenus. Caterum quadam planta reperitur a recentioribus OPHRIS appellata, qua folius maximè album veratrum representat. Duo tantum haec folia profert: inter qua caudat erumpit tenuis, capitulum quibusdam oblongis parvisq; in vniuersum referentis balaustrorum effigie: e quibus flores exeunt candidi, exigui linguis similes. Radice nititur gracili, non sine multis appendicibus, alba, odore praestanti. Nasatur in montibus & conuallibus. Manjaradi & glutinosum lentorem reddit, subdulci sapore: quare calida fuerit & humida. Praefertur vniuersa planta ad demigrandos capillos, fracturas sanandas, & vulnera glutinanda. Illa planta qua Graecis ἐλλέβορος λευκός, Latine Elleborus albus, & Veratrum album appellatur: Arabibus, Cherbachem, seu Charbechabaid: Italis, Elleborobianco: Germanis, Weiß Dnestrom: Hispanis, Verde gambre blanco, & yerua de balleste: Gallis, Viraire, Verarum, Veratre, & Ellebore blanc. Illa vero, qua ἐλλέβορος μέλας Graecè, Elleborus niger, & Veratrum nigrum Latine dicitur: Arabicè, Cherbachem, seu Charbech asue. Italicè, Elleboro nero: Germanicè, Christwurz: Hispanicè, Verde gambre negro, & Elleboro: Gallicè, Viraire, & Ellebore noir. At Elleborum alterum, nobis Elleborum femina, seu Pseudoelleborum, Graecis, Ψευδοέλλέβορος: Italicè, Elleboro falso. At Ophris, Italicè, Elleboro bianco falso: Germanis, Zweiblatt.


Ellebori utriusque vires ex Gal.

Ophris descriptio, & vires.

Nomina.

Elleborus, ἑλλέβορον τὴν ἄσπερον, quod esu perimat, si maiori nimirum quàm par sit, dosi sumatur: duplex est, albus & niger: ille flore vel subviridi, vel atrorubente. Niger, alius foetidus: alius flore viridi, alius flore magno roseo, alius Sanicalè folio maior & minor, alius tenuifolius Buphthalmi flore. I. Elleborus albus flore subviridi, C. B. Elleborum album, Matth. Lob. Dod. fol. Cast. Cæsal. Helleborus albus, Brunf. Trag. Fuch. Cordo in hist. Gem. hor. Lon. Ang. Lug. Cam. Helleb. albus femina, Tab. Veratrum album, Turn. Dod. gal. Lac. Cordo in Diosc. II. Helleborus niger flore roseo, C. B. Elleborum nigrum, Matth. Cast. Lugd. Hellebotus niger, Lob. Cam. Elleborus niger verus, Ges. hor. Elleborus niger secundus, Lug. Ellebori nigri alterum genus, Cæf. Veratrum nigrum primum, Dodo. fol. Veratrum nigrum legitimum, Clus. hist. Pann. Veratrum nigrum Styriacum, Tab. Planta Leonis, Dod. edit. gallica. Flore est roseo, est & alba. III. Helleborus niger flore viridi, C. B. Elleborum nigrum alterum, Matth. Elleborus niger adultenus domesticus, Trag. sive hortensis, Fuch. Elleborus niger vulgaris, Ges. hor. Cæf. Helleborus niger, Brunf. Cordo in hist. Elleborus niger tertius, Lugd. cui & Consiligo minor: Helleborastrum, Turn. Lob. Pseudoelleborus niger, Dod. gal. Veratrum nigrum, Cor. in Diosc. Veratrum nigrum secundum, Dod. fol. Tab. Clus. hist. Pann. IV. Helleborus niger tenuifolius buphthalmi flore, C. B. Pseudoelleborum, Matt. Lugd. Elleborus niger verus, Trag. Elleborus niger, Lon. Helleborus niger ferulaceus Theoph. Lobelo: Helleborus Hippocratis, Tab. Elleborastrum nigrum, Ges. hor. (cui & Ellebori nigri species quorundam) Cam. Helleborine tenuifolia, Cordo in hist. Sesamoides minus, Cordo in Diosc. Gel. hor. Buphthalmum, Dod. gal. & fol. Ges. hor. Anguil. Clus. hist. Pann. Lugd. Cam. Etsi huius radicem venenum lethale dixerit, Caltor Durantes, huius tamen radice pro Elleboro nigro frequenter & feliciter vtimur: rectè enim Ges. dixit hanc esse radicibus Ellebori nigri, viribusque.

I. SESAMOIDES PARVVM.



Σεσαμοειδὲς μέγα. SESAMOIDES MAGNUM. CAP. CXLVII.

Sesamoides magnum in Anticyra elleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus miscetur. Simile est Senecioni, aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis, pituitæq; deiectionem, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua multa.

Σεσαμοειδὲς μικρόν. SESAMOIDES PARVVM. CAP. CXLVIII.

Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem, pituitasq; semen ex aqua multa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua tumores, ac tubercula discutit. Nasatur in asperis.

Tametsi in Commentariis nostris antea editis, scripsimus maioris, & minoris Sesamoidis nullam nos habere considerationem.

*II. SESAMOIDES PARVUM
flore magis completo Camerario.*

Nomina.



Elaterium.

foliorum succus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras, & vitiligines absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex acerabuli quarta parte, bilem, pituitamque deiciunt, praesertim in hydrope: deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis selibra, in vini praesertim Lybici herina conteritur, danturque ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur. E fructu huius cucumeris fit medicamentum, quod Elaterium vocatur, ad hunc modum. Decerpti cucumeres, qui casti protinus exiliunt, seruantur nocte vna: post die imposito supra craterem rariore cribro, vtrisque manibus prehensi, sigillarim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur: simulque carnosum, quod haesit cribro, quod facilius excidat, eliditur: quod ita pressum est, residere sinitur, atque in vicinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina dulci aqua perfunduntur, & denuo pressa abiciuntur. Humor in pelui agitatur, & linteo opertus, soli exponitur, dumque steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. Hic vero identidem fieri solet donec existens aqua liquefcat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum lintheum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumque in pila, vt dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionem mulsam aquam respargunt. Elaterium optimum esse constat, laeue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum spectetur, atque erui cinerisque plenum sit, graue & vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cicutinis succo amyllum immisceant, vt candorem ipsum, & lauitatem imitentur. A bimatu ad decemium deiectionibus vtile est. Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chaleri duo, siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem, ac pituitam vtrauis parte extrahit: optima suspiriosis est purgatio: quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus vnus aquae tepidae sorbeat. Ad citandas tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subiectas linguae partes penitissime penna oblitio: quod si quam difficultus enomat, oleo, aut vnguento irino resoluito: somnum inhibeto. Porro his, qui exiunt vacuantur, continue vinum, & oleum dare conuenit: etenim vomendo restituantur. Quod si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quae stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pello subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissime anginis illiatur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

cognitionem, nec inuenisse quenquam, qui vnum ex aliorum genus ostenderet, tractu tamen temporis factum est, vt minus a solertissimis rei plantaria indagatoribus reperiret, notis omnibus perquam belle astipulantibus, vt ex huius imagine quissiam conicere poterit. Hanc ego Iacobo Antonio Cortuso Patritio Patauino refero acceptam: verum an Marius ex Anticyra in Italiam haecenus allatum sit, mihi incertum est. Hoc Graecis Σεσαμοειδὲς μικρὸν, Latine Sesamoides magnum dicitur. Illud vero quod Graecis Σεσαμοειδὲς μικρὸν, Latine Sesamoides paruum.

Hæc ad Sesamoides ab aliis, ab aliis ad Catanance refertur, Chondrillis adnumeramus. I. Sesamoides primum, Matth. Cast. Lugd. Cam. Tab. Sesamoides parua Dioscoridis, Auer. & Lob. in icon. Chondrillæ species tertia, Dod. fol. Catanance quorundam, Lug. II. Sesamoides paruum flore magis completo Camerario, qui suo Matthiolo adposuit: quam ad intubaccum potius referendum censet, cum radix lacte non pauco turgear: flores cichorio figura respondent, quorum alij simplici foliorum textura constant: atq; densius stipantur, colore caeruleo, staminibus in medio luteis: semen subnigrum, angulosum, pusillam squamatis capitulis inclusum, quod sapore est dulci, nihil vel minimum amaritudinis obtinente.

Σεσαμοειδὲς μικρὸν. CUCUMER SYLVESTRIS.
CAP. CXLIX.

Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia, atq; sarmenta sanui refert: radice candida, magna. Nascitur in l. bulbetis, & ruderibus: frutice in totum amaro. Instillatus

CUCUMER SYLVESTRIS.



Sylvestris Cucumis frequens in Hetruria provenit, praesertim agro nostro Senesi in oppidorum plateis, & secus moenia. & semitis, incultis & vliginosis locus. Ex eius fructibus succum exprimunt officinae, atq; Elaterium vocatum parant. Viticulas humi fundit bicubitales, ac aded asperas, ut contrectantes pungere videantur. Folia illi sunt sativo cucumeri similia, sed radiora, hirjutiora asperioraq; & aversa parte subalbicantia, numerosis intercurtantibus venarum lineamentis, longis, crassis asperisq; pediculis nitentia. Flores ex alarum cavitatibus in toto caule prodeunt aurei, stellatarum figura, sativi cucumeris modo, retrò extuberante fructu, qui tandem auctus & longus factus, glandis magnitudinem superat, aut dactylos aequat. Is hispidus est, & quasi aculeis horrescit, qui mense Augusto maturus factus, candicat, & sponte, aut levius impulsus non sine impetu à pediculo disjungitur, & tormenti instar, nigrum, maturumq; semen vna cum succo in legentes ei aculat, quasi iniuria propulsator. Radice nititur dodrantali, & quandoq; longiore, brachiali crassitudine, candida, plena, succosa, & insigniter amara, quemadmodum planta tota & fructus. Nascitur locis incultis, in sabuletis, ac ruderalibus. Officina ex fructuum succo Elaterium parant. Valerius Cordus nuper editus à Gejnero Galenum reprehendit, quòd dixerit in libro de simpl. med. facult. semina agrestis cucumeris omnino esse amara: sed pace mortui Cordi dixerim, falso Galenum impugnari, cum nusquam (quod viderim legerimq;) id scripserit Galenus. Is enim libro quarto de simpl. med. facult. cap. 7. quaedam cucumerum semina amara esse dicit, quemadmodum & amygdala, sed non explicavit, an in agresti cucumere, vel in sylvestri id quandoque reperiat: quanquam coniectura quadam affirmari possit, de sativi cucumeris tantum semine Galenum esse locutum, utpote qui

Cucumeris sylvestris consideratio.

Galen. à Cordi reprehens. defenditur.

legentes admonere voluit, huiusmodi seminum nucleos qui natura dulces sunt, quandoq; etiam amarescere, soli, in quo feruntur, vitio. Caterum de Elaterio differens Theophrastus li. 9. c. 14. de historia plantarum, ita scribit: Sed omnium medicamentorum diuturnissimum Elaterium est, optimumq; quod vetustissimum. Itaq; medicus quidam, vir haud insolens, neque mendax, elaterium ducentorum annorum, virtute mirabili servare apud se retulit, eo a quodam munere donatus. Causa, ob quam tam longo servari tempore possit, humoris copia est: quamobrem vel cum praeciderint, in cinere humidum ponunt, & tamen ne ita quidem ficari potest, sed vsque ad quinquagesimum annum lucernis admotum lumen extinguit. Hac igitur vis peculiaris isti tribuitur: haecenus Theophrastus. A quo maxime dissentire videtur Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit à bimatu ad decennium deiectionibus utile esse. Theophrastus verò, idem ducentis annis mirabili virtute servatum esse ait. Quin & in eo discordare deprehenduntur, quòd alter tradiderit tantum humoris in se continere Elaterium, ut vsq; ad quinquagesimum annum lucernis admotum lumen extinguat: Alter verò probatissimum illud esse Elaterium, quod lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Theophrasto subscribit Plinius lib. 20. cap. 1. ubi sic inquit: Elaterium vsque ad quinquagesimum annum lucernarum lumina extinguit. Hoc enim veri experimentum est, si admotum prius quam extinguat, sunt illare sursum ac deorsum cogat: haec Plinius Theophrastum secutus. Caterum hac in re facile crediderim, Dioscoridis codicem hoc in loco omnino depravatam esse. Quippe praeter Theophrasti, & Plinij sententiam, cum omne humidum, quod pingue non sit, ignis flammam protinus extinguat, nulli profectò dubium est, quin Elaterium, in quo humiditas aquea multum exuperat, potius flammam extinguat, quam flagret: namq; flamma admotum, excitato in humido a calore situ, lumen extinguit: id quod nobis aliquando experimento còpertum est. Elaterij vires de-
 scripsit Mesues inter sua de viis medicamenta, ubi in hunc sensum inquit: Cucumis sylvestris, siue asininus abradit & vasorum oscula aperit: proinde & intestinorum tormina excitat, & alia adfert nocumenta. Sed tolli haec omnia possunt, si addatur aut bdellium, aut tragacantha lacryma, aut aqua mulsa cum salis modico, aut si ex lacte bibatur. Roboratur elaterij vis, addito fossitij salis momento, aut odorato pulvere, quem officina species alephanginas vocat: is enim administrum felicitius quoque operatur. Purgat, ut quidam ferunt, scammony modo. At revera magis pituita deiecit, quam bilis: quamvis & hanc quandoque detrahat, praesertim cum deiectioni parata promptaq; sese offert. Mirifice praeter haec sanguinis serum expurgat, ab iis potissimum partibus ducens, a quibus agrè decumbentes humores detrahi solent: quamobrem articulorum dolore vexatus opem non modicam praestat Radix in aqua elixa, tusa, & oleo subacta cum absinthio, diuturnam hemiplegiam sanat, in capite & loco dolenti illita, si tamen prius eius decocto foveatur locus. Praestat idem & succum ex lacte nigris immixtus, quòd cerebrum purget: idcirco & narium tedia delet, & comitus desolvat. Idem obduratos resolvit abscessus, quemadmodum & strumas, praesertim addito melle, & caprino stercore. Radicis, & cucumis ipsius succus aqua intercute laborantibus praestantissimum est medicamentum, quòd flavam propriè educat aquam. Ad idem valet & radicis decoctum. Prodest praeterea arquat, & iecoris, & lienis obstructionibus. Item ischiadicis, tum clysteribus insusum, tum etiam si decocta radix exterius imponatur. Sciat & radus palus, vulnerum cicatrices, ut tenuit ex melle impositus: & scellit ex usu delet. In dem succus sabacea farina admixtus, ex linimenti modo adhibitus maculas omnes, quae cutis nitorem vitiant, mirifice deiecit. Sed animadvertendum est, ne plus quam par sit hauriatur: quòd referatis vasorum osculis sanguinem eliciat. Cucumeris agrestis vires reddidit Galenus lib. 8. simpl. med. his verbis: Cucumeris agrestis, & fructus ipsius succus, quem vocant Elaterium, & non minimè radicis, ac foliorum, ad medicationes accommodus est. Elaterium itaque quae menses ciet, & foetum interimit appositum, ceu alia omnia amara simul & subtilium partium, maxime si aliqua haerent caliditate, veluti nimirum Elaterium. Summe siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine excalfacientium.

Elaterium omnium medicamentorum diuturnissimum.

Plinius de Elaterio.

Elaterij vires ex Mesue.

Cucumeris sylvestris vires ex Gal.

Nomina.

facientium. Porro tale protinus digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectu, fusum cum lacte in nares. Hoc etiam vsu dolores capitis sanat. Atque Elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, vt & foliorum, licet elaterio similem vim habeat, imbecillitatem tamen Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet: abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro cortex ea potentia desiccatur. Huius planta Græcis σικυός ἀγρία appellatur: Latinis, Cucumis anguinus, syluestris, & erraticus: Officinis, Cucumer asininus: Arabibus, Chese allimar, Kate albenei, seu Chetha alhamar: Italis, Cocomero saluatico: Germ. *Waldes Cucumer* & *Esels Cucumer*: Hispanis, Cogombriños amargos: Gallis, Cocombre sauage. Eius verd succum Græci ἰατρικὸν Latini similiter Elaterium vocant: Itali, Elaterio. † (Quod si in animo sit deiectionem moliri &c.) Duo hic sunt et omnibus Dioscor. interpretibus neglecta, qua facile condonauerim Hermolao, Marcello, & Ruellio: illis quidem, quod medici non fuerint, huic vero quod in philologiam suam potissimum studia collocauerit. At in Cornario, Amatho Lusitano, & Lacuna maiorem intelligentiam requiro, cum medicos phisicos sese professi sint publice, ac de medicina faciendâ, etiam posteris monumenta reliquerint. Vnum est, quod in omnibus serè vetustis exemplaribus manuscriptis legitur non σικυός sed σινήπεος ἔσον χλωσάι, cuius vocis abbreviatiōne, & cognata literarum similitudine decepti sunt omnes Latini interpretes, quod verbum σινήπεος, nihil prorsus ad rem faciat. Nam quid sibiio crudo cum Elaterio conueniat non video, cum nulli medicamento purganti veteres vnquam sibiium adiecerint, neque quicquam tale de eius facultatibus a nostris maioribus proditum sit. Sinapi verò additum puto ad vini elaterij roborandam, & malitiam corrigendam, vt Rhabarb. officina. & alia alijs purgantibus adiuncta sunt, à primis medicina parentibus. Quod autem σινήπεος loco σικυός legendum sit, patet ex ipsius Dioscoridis volumino de medicamentis facile parabilibus, vbi de curandis difficilibus respiratiōibus, & asthmate disseruit. Namque ibi sic habet ἰατρικὸν ἔσον χλωσάι L. α. νίτρον L. α. ὀμοίως, σινήπεος L. α. καταπότια ποικίλα: dicitur sic habet: Mirum in modum efficax est vomitorium ex elaterio, quo ad occultas anginas vtor, Elaterij obolum dimidium, nitri: spuma obolos tres, sinapis drachmam vnam. Hac in aqua dissoluta redigo in octo catapotia, & mane duo, duo, & vespere exhibeo: purgat enim citra molestiam supernè, & paroxysmum magna ex parte soluit, & affectum, si quis remanserit arcet. Postremò huiusce cathartici propè vt ab Aëtio descripti, meminit Galenus in calce lib. 7. de comp. med. secundum locos, inter Andromachi medicamenta. Alterum in quo doctiores desidero interpretes, est quod ἔσον χλωσάι, Latine conuertunt quantum ad colorem inferendum sit satis, cum vox ambigua χλωσάι tum ad colorem, seu tincturam, tum etiam ad compagem, & solidum pilularum corpus referri queat. Idcirco, vt orationis contextus rei medica peritos docere potuisset, & ex Helychio interpretari licuisse, χλωσάι significat etiam ὑποσπαστικόν ἢ ὑδαρτικόν, seu (vt Barbari loquuntur) impropertate.

Cucumis syluestris asininus dictus, C.B. Cucumer syluestris, Matth. Fuch. Lac. Lobel. Cucumis syluestris, Trago, Dod. gal. & fol. Lon. Cæsal. Cam. Cucumis anguinus, Turn. Cord. in hist. Cucumis erraticus, Gef. hor. Cucumer asininus, Tab. Cucumer agrestis, Brunf. Cord. in Diosc. Lugd. Ex fructibus decerptis vna nocte seruatis, postridie cultro supino fissis, succus deorsum labens in subiectum vas, interposito cibo colligitur & ramenta aqua dulci perfunduntur, & in subiectam peluim premuntur. Humor collectus in sole siccatus & in pastillos firmatus, Elaterium dicitur, Agitatorium apud Theophrastum Gaza vertit.

Σταφιδιά αγρία

STAPHIS AGRIA.

CAP. CL.



Staphidis agriz confid.

Staphidis agriz vires ex Galeno.

Delphinium Staphis agria

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosque: fert florem glasti: & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, et nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulla dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mullam continuò potuere: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita phtiriali prodest: item prurigini, & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheumatismum gingivarum sistit: vlcera oris manantia cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur.

Staphis agria, quam officina Græca voce corrupta vltimò Staphisariam vocant, Latinis ab effectu, quod pediculos necet, Herba pedicularis dicitur. Hac in Istria, Dalmatia, Apulia, & Calabria, frequentissima prouenit. Eius semen copiosum apud seplasiarios inuenitur: namque eo sequenter vtuntur medici in apophlegmatismis. Id quod etiam plurimum expetitur mulieribus ad pediculos, & lendes necandos. Sunt qui scribant, eposis Staphidis agriz floribus, & illis eiusdem folijs, sanari eos qui à serpentibus demorsusunt. Staphidis agriz meminit Galenus in Astaphide lib. 6. simplicium medicamentorum sic inquit: Astaphis agria vehementer acrem obtinet facultatem, aded vt ex capite pituitam purget, quod

ἡμοδύμων ἢ ἡμοδύμω Græci dicunt, abstergatq; valenter. Itaque ad psoram accommodata est. Sed & vrendi vim aliquam habet. Es planta Græca ἡμοδύμω, & ἡμοδύμω nominatur: Latine, Staphis agria. Vna syluestris, Herba pedicularis. Nomina. ἡμοδύμω: Arabibus, Albetas, Habeltas, Murbasagi, siue Mubezegi: Italis ac offsinus, Staphisaria: German. Bis-
 monq; Hispanu, Fabra & Paparras: Gallis, Estaphisagrie, & herbe aux poulx.


Staphis agria quæ nunc in Græcia ἡμοδύμω, & ἡμοδύμω, granum pedicularium, ab effectu dicitur. Staphisagria, Matth. Trag. Fuch. Turn. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lon. Catt. Lugd. Caf. Camer. Lob. cui & Vitfolia, in iconibus. Pedicularis siue Phthiroctonon, Cordo in Dioscoridem.

Thapsia CAP. CLI.

Thapsia nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis insula primùm inuenta sit. Totave-
 rò natura ferule similis est: graciliore caule: foliis fœniculi: umbella anethi in cacumine à singulis fur-
 culis erumpente: flore luteo: semen quale ferula: latiusculum, sed aliquatò minus: radix foris nigra, intus
 candida, a lōga, acris, crassiore libro vestita. b Succus extrahēdi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe corti-
 ces inciduntur, aut radix in fornicis speciem in se excavata cooperitur, quò merus succus confluat: oportet
 illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. c Tunditur etiam radix in pila, & suc-
 cus organo per quallum expressus, fictili crasso inso-
 latur. Aliqui folium vnà terunt: sed inualidior huius-
 cemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab
 radice manauit, grauius olet, & humidus permanset:
 è foliis autem extractus exiccatur, atque teredinum
 iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non
 obuertus vento: aut potius cum dies aprictis est, & à
 flatu filet: quoniam ob halitus acrimoniã facies ve-
 hementer intumescit, nudaque corpora inuadunt
 pustula: ob id prius liquido cerato, & adstringente,
 nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tã cor-
 tex radice, quàm succus purgandi vim habent, & la-
 cteus succus in aqua mulsa potus: nam vtrinq; bilem
 extrahūt. Radicis modus, quaterni oboli cum tribus
 feminis anethi drachmis: succi terni oboli: lactis, o-
 bolus vn̄: quod eo amplius assumitur, periculosum
 est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiciosi, & diu-
 turnis laterum doloribus, reiectionibusque: datur in
 cibus, aut obsonio, quibus difficile sit vomere. Tam
 radix, quàm succus omnium maximè, quæ pares cū
 eis vires adepta sunt, vim habent extractoriam ex al-
 to, vbi ex imo aliquod euocandum est, aut meatuum
 laxitas aliò transferenda est: vnde succus illitione, aut
 radix recens affricu alopecias explent. Radix, suc-
 cusque cum æquis ceræ, thurisque portionibus, su-
 gillata, liuoresque tollunt: sed non plus binis horis
 dimittantur: locus deinde aqua maris calida fouea-
 tur. Viria cutis in facie emendat, cum melle illitus
 succus, lepras tollit: tubercula discutit, peructus cum
 sulphure. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum,
 articulorumq; valetudinibus veliter illinitur. Valet
 ad integendam colis glandem iis, qui natura, nō cir-

a Me. & Car. μετ' ἄν. i. ma-
 gna.
 b Meum, ἐπι-
 ζεται. i. suc-
 cus colligi-
 tur.
 c Meū. & Car. χυλίζεται ἢ
 ἡψίζεται. i. expri-
 mitur etiam
 succus è radi-
 ce.

THAPSIA.



cautione curti sunt: tumorem enim excitat, qui pinguium foru emollitus, præputij iacturã resarcit.

DE thapsia viribus locutus est Theophrastus libro 9. cap. 22. de plantarum historia, vbi ita scribit: Thapsia radix vo-
 mitoria est, & si quis continuit, tam superius, quàm inferius purgat. Ad hac liuida tollere potest: suppurationes ta-
 men alias exalidas facit. Succus eius validior est, & quidem tam superius, quàm inferius purgat. Nullus seminis vsus.
 Nasitur tum alibi, tum in terra Attica, in qua pecudes incolæ eam non tangunt: peregrina verò depascunt: & aut alius
 soluitur, aut intercunt: hætenus Theophrastus. Thapsiam ather est Plinius libro 13. capit. 22. à Nerone clarita-
 tem accepisse, eique magno vsui fuisse sui imperij initio, quòd nocturnis grassationibus conuerberatam faciem illinens
 sibi cum thapsia, thure, & cera sequenti die contra famam cutem synceram circumferret: etenim ea murum in modum
 fagillata dicitur. Thapsia plurima nascitur in Apulia, præsertim Gargano monte, inter complures ferulacei generis plan-
 tas. Provenit & in nostris maritimis locis adeò ferula adsmilis, vt non facile, nisi à rei herbaria peritis, vna ab altera di-
 gnoscatur. Vistur etiam hodie in hortis ad spectaculum plantata, qua ratione iam ferme omnibus innotuit in Italia. Ca-
 terum non desunt impostores, qui Thapsia radicum cortices pro Turpeto venditent: quæ quidem à peritis seplasiarjjs in ea
 medicamenta iure optimo addi possunt, quæ Thapsiam exposcunt: sed in Turpeti locum non sunt, meo iudicio, recipienda.
 Quapropter maximè in hoc (vt superius diximus in Tripoli commentatione) à Fuchio dissentimus, qui Turpetum à Me-
 sue descriptum, nil aliud esse censet, quàm Thapsia radices. Thapsia vires memoria prodidit Galenus libro 6. simplicium
 medicamentorum, sic inquit: Thapsia acrem habet, ac vehementer excalfacientem facultatem cum humiditate.
 Quamobrem ex alto violenter extrahit, & ipsum quod extraxit, digerit. Verùm plusculum ad ea efficienda tempus po-
 sculat, vt qua largè excrementitia humiditate impleta est, ob quam celeriter corrumpitur. Et libro primo de compositio-
 ne medicamentorum secundum locos, sic inquit: Qui Thapsia vtitur, sciat opus est, maximam differentiam esse recen-

Thapsiæ con-
 sideratio.

Thapsiæ vi-
 res ex Gal.

Nomina.

tis ad vetustiore[m]. Vis enim huius pharmaci post annum multum exoluitur, atque amplius adhuc post duos annos, que serè dicere eam penitus inutile[m] esse ad triennium progressam. Hac ut Græce θραψία, ita etiam Latine Thapsia nominatur: Mauritanis, Hiantum, & Driz.

† Hoc loco Græci codices habent θραψία, quod verbum Ruellius verterat hic, lac extrahitur: licet alibi, ut in panax Heracleo, idem vertat, succus excipitur. Nos verò, quòd θραψία, à quo verbum illud defluxit, succum, liquorem, & lacrimam significet, malimus reddere, succus extrahitur. Neque certè temere, quòd non solum nobis conueniat cum Marcello interprete: sed quòd etiam arbitremur hanc esse germanam illius verbi significationem, atque melius rem exprimere, de qua sermo est. Huius tamen mutata à nobis versio lectorum admonendum esse duximus.

Thapsia carotæ folio, C.B. Thapsia, Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. Casal. cui & Thurbit album Meisac. Thapsia maior, Cordo in hist. Thapsia vera & Turbit montis Gargani, Ges. hor. Thapsia vulgaris & Turperum griseum, Taber. Thapsia vulgaris Carotæ effigie, Lobelo.

Σάρτιον



SPARTIVM.

CAP. CLII.

Spartion frutex est longas ferens virgas, sine foliis, firmas, fractu contumaces, quibus vites vineuntur. Semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albæ violæ, luteum. Purgant per superna vehementer elcibori vice, citra pediculum flores, & semina quinis obolis in aqua nulla parta. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

I. SPARTIVM.

II. SPARTIVM HISPAN.

Spartii con-
sideratio.

Tanta nimirum inter Spartium, siue Spartum, & Genistam intercedit similitudo tum facie, tum etiam virtutibus, ut eorum affinitate deceptus iam crediderim omnino errasse eos, qui alterum ab altera secernerent: praesertim cum in hac re deprehendissimè Plinium dubitasse lib. 24. c. 9. vbi ita scriptum reliquit. Genista quoque vinculi vsu[m] praestat. Flores apibus gratissimi. Dubito an hac sit, quam Græci authores Spartion appellauerunt, cum ex ea lina piscatoria apud eos saccharari docuerim: & nunquid hanc designauerit Homerus, cum dixit: Nauium sparta dissoluta. Nondum enim fuisse Africam, vel Hispanum Spartum in vsu certum est: & cum sutiles fierent naues, lino tamen, non sparto vngam fuit: hac Plinius. Verum cum accuratius Dioscoridem perlegissem, hac de re prius admonitus à clariss. medico Petro Cannizzaro Hispano, Serenissimi Ferdinandi Romanorum Regis Protophysico, qui in Hispania aridis & siccis locis copiosissimum Spartum, numerosamq[ue] Genistam se vidisse testatus est, comperi planè inter has plantas discrimen esse. Quippe quòd Spartum Dioscoridi frutex sit folys viduus: & floribus constet albæ violæ similibus. Genista verò folia proserat longiuscula, limi serè modo: & flores luteos, ipsi modo lunatos. Hinc itaque factum est, ut nunc in eorum sententia consistam, qui Spartum à Genista differre existimant. Non tamen quòd diuersi prorsus generis has plantas esse putem: nam tanta, ut dixi, vni cum altera cognatio est, ut etsi non eadem sint, tamen congeneres esse videantur. Sparti quidem vsus (ut Plinius est author libro 19. cap. 2.) multa post secula coepit, nec ante Pænorum arma, quæ primùm in Hispania intulerunt. Herba & hac sponte nascens, & qua non queat serri: iuncusq[ue] proprie aridi soli, vni terra dato vitio. Namque id malum teluris est, nec aliud ibi serri, aut nasci potest. In Africa exiguum, & inutile gignitur. Chartaginis Hispania ceteris partibus


Spartum &
Genista dif-
ferunt.Sparti vsus
ex Plinio.

portio nec hac tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum: hinc ignes facesq, hinc
 animalibus noxium, praterquam cacuminum teneritate. Ad reliquos vsus laboriose euel-
 lunt: ceruicibus, manibusq, reclus manibus: conuolutum ossibus, ligneisq, conamentis. Vulsam fascibus in aceruo adu-
 natum: biduo, terro resolutum, spargitur in sole, sicaturq, & rursus in fascibus redit sub tecta. Postea maceratur aqua
 marina optime, sed & dulci, si marina desit, sicaturq, sole iterum rigatur, si repente vrgeat desiderium, persusum cali-
 da in oleo, ac sicatur: stans compendium opere sater: r. Hoc autem tunditur, vt fiat vtilis, praeipue in aquis mariq, inui-
 dium. In siccis praesertim e cannabi funes. At Spartum dicitur etiam demersum, veluti natalium sitim pensans. Est quidem
 eius nomen interpolis: rursusq, quam libeat vetustum nouo miscetur. Verum amen complectetur animo, qui volet mira-
 culum e timore, quanto sit in vsu omnibus terris nauium armamentis, machinis adificatiouum, alijsq, desiderijs vite. Ha-
 10 *Genus de Sparto Plinius. Ceterum GENISTAE in Hetruria adeo sic praesentissima proueniunt, vt Mato, & Iunio mensi-*

Genistae con- sideratio.

III. GENISTA.

IV. GENISTA ANGVLOSA.



huic magnum & iucundum spectaculum praebeant viatoribus, quoniam tam copiose suis speciosis, ac fulgentibus floribus
 ornantur, & vestiantur colles, vt procul aurei videantur. Gaudent earum floribus apes, vt Plinius inquit, proinde aluea-
 rari circumferuntur. Genista nobis ligandis vitibus salicis vicem explet, maceraturq, etiam cannabis modo, fiuntque inde
 funes, & rudia linteamina, qua consuecundis sauis aptissima sunt. Expetitur Genista lignum etiam figulis qui in Italia id
 vasorum scilicet genus consuecunt, quod vulgo de maolica vocant: quippe quod (vt ipsi affirmant) nullo alterius arboris
 ligno fornax succendi possit, quo aureus ille color conseruetur in opere. Genistam recensuit Mesues inter sua simplicia deie-
 30 *ctoria facultatu. vbi hac ad sensum scribit: Genista arbor est montana, e cuius caudice quam plurima funduntur virga,*
recta, flexiles, fractu contumaces, quibus vites, & alia ligantur. Flores edit flauos, lunari figura: e quibus siliqua prodeunt,
erui magnitudine: & semina in eis lenti similia, interuallis distincta. Planta tota perturbat, prouocat, incidit, attenuat.
Obeist cordi, & ventriculo. Sed tollitur noxa (vt Philagrius est author) addito rhodomelle, aut rosa, & mastiche: quin &
anisi, dauci, & faeniculi semine. Epotum semen pituitam vrinque valentissime purgat, & ab articulis quoque humores
trahit. Renum excrementa pellit, vrinam cit efficacissime, & calculos disrumpit, tam in renibus quam in vesica: nec in his
materias si in calculum durefcere sinit. Flores contriti strumas auferunt, si cum melle rosaceo, aut sorbili ouo deuoere-
tur. Fit ex his oxymel, cuius vsu indurati lienes resoluuntur. Profunt ischiadicis, podagricis calculosisq, si postquam illos
sumpserint, subinde frequenter euomant agri. Modus, praesertim floris, a drachmis duabus ad quinque: seminis vero a dra-
 40 *chmis duabus ad quatuor: haec Mesues. Qui tamen Genista semen non recte obseruasse videtur: quandoquidem id erui, vel*
tricia faciem potius referat, quam lentu. Sparti, vt iam ad eius vires redeamus, meminit Galenus lib. 8. simpl. med. his pau-
 50 *is verbus: Sparti, quo & vites apud nos ligant, tum semen, tum virgarum succus non instrenue trahentis est facultatis.*

Genistae de- scriptio, & vi- res ex Mesue.

Sparti vites ex Gal.

Nomina.

Sparti & Genistae figuras duas adposuimus, quarum prima & tertia est Matthioli, altera vero & quarta
 illarum loco a Camerario in suo Matthiolo posita. I. Spartium, Matth. Lac. Lon. Lugdun. Spartium,
 Turn. Fuch. Dod. gal. Spartium Hispanicum, Tab. II. Spartium Hisp. C. B. Spartium primum, Clus. hist.
 Hisp. Spartium Hispan alterum flore luteo, Lob. Lugd. Spartium Hispanicum quartum, Taber. Spartium
 frutes

frutex maius, Dod. in fol. Spartium, Camerario in suo Matthiolo. III. Genista iuncea longifolia, **CL**
 Genista, Matth. Turn. Cast. Genista iuncea, Cordo in histo. Ges. hor. Genista Italica, Dod. fol. Genista al-
 tera iunco rotundo, Cæsalp. Genista transalpina siue Hispanica arborefcens, Camer. Spartium alteram,
 Lacun. Spartium vel Spartum Gesner. hor. Clus. hist. Hispanic. Spartium Diosco. Lob. Anguill. Spartium
 Hispanicum secundum & tertium, Tab. Spartium, Genista peregrina siue Africana, vulgò Italica, Cam.
 IV. Genista angulosa, C. B. Genista, Brunf. Fuch. Trag. Dod. gal. & fol. Cordo in Diosc. Tab. Camer. ad
 Marth. Genista maior seu non aculeata, Lonic. Spartium, Turn. Spartium, Genista Scoparia vulgi, Lobel.
 Genista Scoparia, eadem in icon. Genista quadrato iunco, Cæf. Genista angulosa seu vulgaris, Lugduna.

Σιλυβον.

SILYBVM.

CAP. CLIII.

Silybon lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Hæc recens cum sale oleoque cocta estur. Radix
 succus drachmæ pondere potus vomitiones ciet.

Nomina.

Hætenus non ex nostra tantum, sed neque ex aliorum quoque inquisitione verum ac legitimum Silybum in Italia
 nobis licuit reperire. Et quamuis inter tot alias plantas aculeatas inibi nasci, & esse possit: tamen tam paucis
 notas explicauit Dioscorides, vt difficile admodum illud inuentu iudicem: neque enim ipse, vt ingenue fatear, quod ex illis
 fit, ausim decernere. Vt Græcis σιλυβον, ita pariter Latinis Silybum appellatur.

Βάλανος μυρτινική.

GLANS VNGVENTARIA.

CAP. CLIIII.

Glans vnguentaria fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanae nucis: cuius nucleus a
 mygdalarum amararum more tritus, humorem reddit: quo ad pretiosam vnguenta pro oleo vntur.
 Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam Præfertur plena, recens, candida,
 quæ facillè delibretur. Ea drachmæ pondere pota lienem absumit: cum lolij farina, & aqua mulla poda-
 gricis illinitur. Pforas, leprasque, decocta in aceto: vitiligines, & nigras cicatrices cum nitro emendat: &
 cum lotio lentigines, varos, & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum
 dromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum, quod ab ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex
 magis adstringit: verum tusæ, & expressæ succus abstergentibus in medicamentis adiicitur, quæ aduersus
 pruriginis, & scabritias idonea sunt.

Glandis vn-
guentariæ
consideratio.

I. LILAC.


Andreas Ma-
rius Glansvn-
guent.

Glans Vnguentaria, quam Græci Βάλανος μυρτινική
 dicunt, in quibusdam Hispania locis copiosa (vt auctores
 prouenit. Adfertur hodie copiosa in Italiam ex Æthiopia
 Ægypti. Caterum de foliorum facie auctores inter se differunt.
 Siquidem Dioscoridi folijs est Myrica, Theophrasto Myrica,
 Plinio Heliotropij herba similibus: atqui aut in Theophrasto
 aut Dioscoridis codice mendum subesse vereor. Siquidem aut
 in Theophrasto μυρτινική pro μυρτινική, aut in Dioscoride
 εικνός, pro μυρτινική legitur. Nam in utroque authore
 lubricusq; esse potuit scriptorum lapsus, propter vocabulorum
 propinquitatem. Sed nescio profecto, quorum autoritas im-
 pserit Plinius lib. 12. cap. 21. vnguentaria glandis plantam
 folijs esse Heliotropij, cum tamen in Theophrasti lectione
 que se versatum ostendat. Andreas Marinus, medicus no-
 garis, in suis super Mesuem annotationibus, plantam quædam
 pingit pro vnguentaria glande, à Clarissimo Petro Antonio
 Michaelie patritio Veneto acceptam, quæ à præscriptorum
 bus tota facie differt: sed an legitima sit, cur probem, aut im-
 probem, non habeo. Titulus eius mendax est, siquidem de
 alium inscriptum habet. Itaque vereor ne & ipsa quoque
 magis o tituli sequatur errorem. Hanc autem Plantam, cum
 hic imaginem damus, Constantinopoli secum attulit Claris-
 simus vir Augerius de Busbecke, qui continuis septem annis
 Caesaris Ferdinandi primi, apud Solimanum Turcarum Im-
 peratorem, oratorem egit, sub hoc nomine, LILAC. Eam
 cum inspexissem, & fructus eius agnoscerem pistacorum
 faciem perquam belle referre, illico in suspicionem veni an hæc
 fortasse Glans Vnguentaria dici posset: quapropter, vt ali-
 rum quoque sit iudicium, eam hic excudi volumus. Vnus
 plantam videre non viduit, sed affabre, & diligentissime
 plantam, tamen hoc anno misit ad me Patauii recentissimam
 huiusce plantæ ramulum, floribus copiosissimum refer-
 tam, & alterum deinde cum fructibus, Iacobus Antonius Cortusius materie medicæ peritissimus: quin etiam
 ris mihi significauit hanc se credere esse plantam, quæ Theophrasto libro tertio, capite decimo, de plantarum
 storia OSTRIX appellatur. Hanc ex Aprica, vbi frequentissimè prouenit, sibi missam fuisse scripsit, vbi ut
 naculo idiomate Seringa nuncupatur: quin etiam se plures in suo horto huiusce arboris alere plantas, ob floram suauitate
 tiam. Vnguentariæ ac seplarij Mauritanorum nomina secuti, eam Ben appellat. Forma hæc pistacia maxime refert, al-
 bo cortice, triquetro, fractu facili, nucleo intus conferto, & admodum pingui, ex quo oleum exprimitur, quod de Ben vocant.

Ostrix Theo.

Magis

•II. GLANS VNGVENTARIA.*



Magnificiunt id vnguentarij, quod quamuis diu inueteratum, nunquam rancorem sentiat, vt etiam lib. i. suo loco monuimus. Arabica familia auctores (vt modo dictum est) vnguentariam glandem Ben nominant. Proinde de ea inter sua soluentia simplicia scribens Mesues, in hunc sensum inquit: Ben duorum est generu. Maius est nucus auellana magnitudi-
ne, triangulare. Minus vero ciceri simile. Vtrique inest oleosa medulla, lenis, & alba. Praestat maius, quod noxa vacet: minus siquidem noxiu est. Praefertur in maiori genere, quod putamine sit albo, leui, tenui: nucleo fragili, albo, oleosoq. Verusiu recentis melius. In minori autem praecellit in cinereo albicans, fragilis pariter, & pinguis. Dioscoridi tamen in maiori genere (minoris. n. non meminit, quemadmodum nec Theoph. neq; Plin.) praestitius est reces, etsi contrariu asserat Mesues. Oleu ab vnguentarijs hoc tempore e nucleis tantum exprimitur, vt Dioscorides docuit, non autem, vt quidam existimant, ex putaminibus, quod dixerit Theophrastus, vnguentarios putamine fructus confuso vti solere. Plinius, vt Theophrasti, & Dioscoridis sententiam comprobaret, vnguentarios prodidit e putaminibus, medicos vero e medulla oleum elicere, quod hoc medicamentis, illud odoramentis vsu praebeat. Veruntamen hac atate (vt diximus) ab omnibus tantum e nucleis a putamine repurgatis exprimitur. Nec crediderim vnquam,

Ben.

Oleum Balaninum.

Manardi dubium solutu.

Glandis vnguentariae vires ex Mesue.

Glandis vnguentariae vires ex Gal.

quod ex felis putaminibus oleum effluere possit, quamuis diligentissime comprimatur, & constringantur praeleo etiam granis: quoniam haec putamina arida sunt, & omni prorsus humore carent. Illud quoque fidem non dubiam facere potest, quod hanc parandi olei rationem silentio praetermisit Dioscorides, non modo in hoc loco, sed etiam lib. primo, vbi tamen de oleis, & vnguentis consuecendis latius differuit. Cuius forte doctrinae immemor Manardus Ferrariensis, vir alioqui nostrae etate celebris, dubitat in adnotationibus, quas in Mesuem edidit, an Vnguentariae glandis oleum e nucleo, an e putamine exprimi debeat, asserens quauquam in quibusdam Dioscoridis codicibus legitur, oleum hoc e nucleis exprimi debere, in alijs quibus tamen nec nucleorum nec putaminum vllam fieri mentionem. Verum etsi ambigendi non desuerit occasio, praefertur ex Theophrasti testimonio, qui putaminibus vti vnguentarios tradidit, aderat tamen grauisimus author Galenus, qui rem hanc abunde enucleauit, cum constanter asseueret, Balaninum oleum vnguentarijs ex carne nucleorum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiam facile ex Dioscoride colligi potest, cum dicat consimili modo fieri balaninum & amygdalinum: quod autem hoc ex amygdalarum nucleis fiat, nemo est qui dubitet. Hae sane nobis non leuem faciunt suspensionem, quod aut eo in loco Theophrasti exemplaria sint deprauata, aut minus integri & veraces fuerint auctores, a quibus fortassis vnguentariae glandis historiam accepit. His porro accedit huius olei communis vsus, & eius parandi ratio. Siquidem Balaninum oleum plurimi faciunt vnguentarij, non quod aliqua odoris praestantia commendetur (inodorum etenim est) sed quod nunquam vetustate rancorem contrahat, id scilicet quod e nucleorum medulla, non autem ex putaminibus consuecunt. Nam rancoris expertis cum sit, omnium aptissimum habetur ad odoratissima vnguenta (mixturas vocant) temperanda, quae ex moscho, zibetto, & ambaro, illinendus chirothecis, & alyis, quorum in deliciis, & lasciuia omnis est vsus & gratia, parantur. Quandoquidem si haec alio quouis oleo liquecerent in vnguentum, contracto inde non multo post tempore rancore (atate enim omne oleum praeter Balaninum rancescit) non modo vniuersam odoris suauitatem exuerent, sed etiam putida, foetidaq. euaderent. Quo vtrique experimento apertissime dignoscitur, an oleum illud Balaninum fuerit, quod ex vnguentariae glandis nucleis fieri solet. Caterum de viribus Ben haec subiunxit Mesues. Maioris, inquit, generis fructus incidit, abstergit, attenuat, expurgat, & aperit: sed ventriculum subuertit, & viscera perturbat, ob extremam acrimiam, humiditatem, quam possidet. Minoris autem vis longe vehementior, & magis periculosa: namque adeo perturbat, agit atq. humores, vt sapius animae deliquium faciat, & frigidus sudores concitet. Proinde non in alios vsus is admittendus est, quam in vnguentis, & cataplasmatibus. Maioris noxa demitur, cum igne torrescit: siquidem ignis calore exuperantem deperdit humiditatem, qua vomitionem mouet, sitq. medicamentum tantum deiectionum. Decoquitur etiam cum anisi, & feniculi semine: quoniam hoc modo prior noxa corrigitur. Tam in potu, quam aliter sumptus, lentam crassamq. pituitam vomitu, & deiectione purgat. Ideoq. aptissimum medicamentum est coli cruciatibus non modo haustus, sed etiam clysteribus infusus, praesertim vbi a flatu, & pituita ortum habuerint. Fit etiamnam ex contritis ipsius nucleis, polenta & melle admixtis, cataplasma ad strumas, durosq. tumores admodum vtile, & ad neruorum morbos a frigiditate excitatos, addito tantum melle: quo fit, vt conuulsis, resolutis, & contractis opem ferat non obscuram. Pollet praeterea ad iecinoris, & lienis infarctus duritiesq., si addita lupinorum farina & nardo, emplastri modo imponatur. Nucleorum oleum vulnerum cicatrices attenuat, & delet: item lentiginis, aliasq. cutis feditates emendat. Auribus infusus non modo doloribus leuamentum praestat, sed & surditatem, & tinnitum curat. Glandis vnguentariae vires memoriae prodidit Galenus libro simplicium medicamentorum, his verbis: Balanus myrpesice, hoc est, glans vnguentaria, adfertur ex barbarica regione. Vtuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquia autem, vnde expressus est succus terrestres sicut licet, & dura, vincentem habent qualitatem amaram. Sed & admixta est quadam adstrictio. Proinde extergentem simul, & incidentem, contrahentemq., & stipantem effectum possident. Itaque ad ionthos, lentiginis, ephelin, & prurium, deinde & ad psoram, & lepram conueniunt. Verum enimvero & lienes liquant, iecurq. indurescens. Quod si quis carnem eius drachma pondere cum melicrato bibat, medicamentum experietur vomitorium. Sape etiam per infernam aluam largiter subducit. Itaque cum hoc medicamento vtimur, ad viscerum expurgationem, & maxime iecinoris, lienisq., ex oxycrato ipsum exhibere consueuimus. Gaudet vero vel maxime alioqui aceto ad extrinsecas actiones. Adeo enim efficax efficitur, vt & psoras, & lepras extergeat, & multo etiam magis quae hu sunt minora, lentiginem, vitiligines, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum vlcerosas, & quae crassi sunt succi omnia. Sed & cicatricibus decorem adfert. Porro quod cum illinenda est lieni, praestet admixtam esse farinarum quampiam exiccantium, cuiusmodi est erui, ac lolij farina, id iam potius ad componendorum medicaminum tractationem, haudquaquam ad praesens institutum pertinet: sed & in paratu

facilibus ipsam dicetur. Verum in presens sufficit abstergentem, & incidentem cum adstrictione quapiam propositi medicaminis dixisse facultatem, ac sic ad aliud transgredi. Cortex tamen eius admodum adstringit: itaque eo positum quum ad usum ad quae valida usus est adstrictione: hactenus Galenus. Sed quoniam Balanus myrsica Mauritanorum Myrobala nobis ad memoriam reuocauit, quorum idem quinque faciunt genera, cum ea in medicamenta frequenter, & commode veniant, nec eorum, quod extet, meminerint veteres Graeci, ideo nunc de iis nobis differendum est: neque enim ob eorum sum silentio erant dissimulanda. Sunt itaque, ut diximus, MYROBALANORVM genera quinque: nempe Flauorum genera.

* MYROBALANI CHEBVL.*

* MYROBALANI INDI.*





Chepula, Indica siue nigra, Empelica, Bellerica: qua omnia facie inter se distant, ut etiam viribus. Quamobrem omnino censendum esse putauerim, ea a diuersis produci arboribus: quanquam non desint, qui affirmant, flaua simul, & depulsa ex vna & eadem arbore nasci, existimantes flaua decerpi ab arbore immatura, chepula vero cum ultimam adeptam fuerint maturitatem. Verum cum horum fructuum ortus, & arbores nos prorsus lateant, non est quod illorum sententiam probare, aut refellere ausim. Flauorum, Chepulorum, atque Indicorum arborum imagines excudi curauit Andreas Marinus in suis in Mesuem annotationibus, sed eas non libuit in hocce commentarios nostros transferre, non quod censeremus Marino id fortasse ingratum futurum, cum is non paruum plantarum nostrarum numerum in suum illud opus transplantauerit: sed quoniam ignoramus, an eadem genuina sint, an adulterina, & praesertim, quum Mauritanorum nullus habeatur auctor, qui Myrobalanorum plantas descripserit. Recensentur genera omnia inter ea medicamenta, quae attingunt citra noxam deiciunt: nam etsi purgatoria vi polleant, nulla tamen virium imbecillitate, aut molestia sumentes afficiunt, sed potius sua adstringenti facultate, quam possident, cor, iecur, & ventriculum roborant: quin etiam vniuersum corpus. Id tantum illis noxae adscribunt, quod obstructions, & viscerum infarctus augeant: proinde ne obstructus exhibeantur precipiunt. Infranantur Myrobalani medicamenta omnia, quae deiciendo laborem inferunt: quo fit, ut vtiliter admisceantur scammonio. In flauorum myrobalanorum genere ea ceteris praestant, quae in viridi plene flauescunt, ponderosa, fistulosa, gummosa, crassi corticis, & quibus pumilum osiculum inest. E Chepulis ea probatur, quae ceteris crassiora sunt, colore utroque purpurascente, cortice crasso, & quae in aquam deiecta fundum quam citissime petunt. Inter Indica excellunt, quae maxime nigricant, crassa, ponderosa, nullo intus osse, & quae contracta in vnum compacta cernuntur. In Empelicorum classe laudantur, quae in maiora, crassiora, densiora, ponderosioraque, frustra diuiduntur, & quae minus ossis, quam pulpa habent. Bellericorum vero illa in suo genere praesertuntur, quibus crassities, densitas, grauitasque, non desit, & quibus crassus in vniuersum fit cortex. Flaua, Indica, Chepula, Bellerica refrigerant ordine primo, siccantque secundo. Empelica vero primo tantum refrigerat, tum exsiccant. Vni obstructoria exiunt omnia genera, additis aperientibus, & vrinam cientibus medicis, vel si macerata caprino sero, aut fumarie succo exhibeantur: vel si cum absinthio, aut agarico, aut rhabarbaro hauriantur. Persudantur amygdalino, & sesamino oleo, ut contracta inde pinguedine, ventriculo non inhaerant. Quum & id noxae pariter tollitur, vbi cum castia nigra medulla, aut manna, aut acidis palmulis deuorentur. Vbi deiectione sit opus, eorum tantum delutum praebet: vbi autem adstrictione in puluere conterunt, & subinde propinant. Chepula quae saccharo coduntur, magis roborant, quam deiciant. Contrarium efficiunt, quae cruda siccataque, reponuntur. Myrobala omne genus (ut Mesues est auctor) eorum senectutem remorantur, qui ipsis frequenter vtuntur: colorem faciunt elegantiores, corpori odorem incommundum conciliant, hilaritatem afferunt, & ventriculum, cor, & iecur roborant, conferunt haemorrhoidibus, & bilis feruorem reprimunt.

Myrobala-
norum vires.

* MYROBALANI CILICII *

* MYROBALANI BELLERICI RECENTES & LICCI. *



* MYROBAL. EMBLICI. *



reprimunt: ad quod flava ceteris praestant, ut qua priuatim bilem detrahant: & eos peculiariter iuuent, qui temperamento calidi sunt. Fricantur cote ad oculorum collyria, cum vna acerba, aut rosarum aqua, aut faeniculi succo, quod oculorum inflammationes reprimunt, lachrymas sistant, defluxionesque cohibeant. Sanantur horum puluere vlcera, addita lentiscina resina. Chepula pituitam exhauriunt, intellectum clarificant, & visum, praesertim saccharo asseruata: ventriculorum tumundant, tum confirmant. Dantur vtiliter aqua intercute affectus, & diuturnis febribus laborantibus. Nigra vtrunque bilem trahunt, praesertim exustam. Conferunt membrorum tremoribus, coloris nitorem conciliant, elephantiacos iuuant, maculas auferunt, & quartanam fugant. Embelica pituitam educunt, cor, & cerebrum corroborant, intellectum augent, ventriculorum a pituita, aliisque noxijs unguentis expurgant, ac etiam confirmant, ac sitim extinguunt, vomitiones cohibent & cibi appetentiam inuolunt. Bellerica ea omnia possunt, quae & proximè dicta. Myrobalanorum inter recentiores Graecolantum, quod sciam, Actuarius meminit: qui tamen ea, quae de illis scripta reliquit, a Mauritano (ut ipse quoque fateri videtur) mutuatus est. Sed profectò nescierim, quae ratione ducens inter ea medicamenta, quae vomitum eliciunt, myrobalanareposuerit, cum omnia eorum genera plane vomitiones compefcent. Porro hodie ignorata videtur quae *χρυσόβαλανος* Graeci vocatur, digerens, & roborans Indica nardi modo, ad colicos affectus, ventriculi ardores, & singultus a Galeno Asclepiadae auctoritate commendata lib. 8. & 9. de compositione medicamentorum secundum locos. quanquam non desunt recentioribus, qui sibi persuadeant Chrysobalanum esse nucem myristicam: cum tamen plura sint, quae eorum destruunt sententiam, nempe cinereus color, acutus ori sapor, & quod myristica nucis nusquam meminerint veteres Graeci. Nullam huiusmodi quod legerim, mentionem fecit Galenus in libro simplicium medicamentorum. Id quod argumento esse potest, Galenus ipsum non habuisse compertum, quid esset Chrysobalanus. Sed de his haecenus. Ceterum quandoquidem Balanus myristica, quam ab Arabibus Ben appellari diximus, nobis in mentem redegit radices illas, quas officina Behen album, & rubrum vocant, ad cordis affectus us, ac etiam recentioribus expetitas, hunc locum non praetereundum esse duxi, quoniam de his quoque aliquid differere, praesertim quod in Graecis non inueniatur, qui illa posteritatis memoria prodiderit. Sed illud in primis animaduertendum est, quod communis vsus radices, quas vulgò Behen nuncupant, ea quidem non sunt, de quibus Mauritani scripsere: imò eas prorsus euentur. Siquidem scribit Serapio, Behen radices proferre minoris pastinacae similes, tortas, odoratas, & mansu lentas & in Armenia nasci. Auicenna autem radicem lignosa frustra Behen esse ait, in se contracta, & siccitate exoleta. At nostrates, quae in Italia, non in Armenia effodiuntur, nulla penitus odoris suauitate commendantur, quin & mansa nullum ori lentorem reddunt, nec erraticae pastinacae faciem repraesentant: cum tamen Arabicum Behen radicibus adeo pastinacae referat, ut scripserit Haliabba clarissimus Mauritanorum auctor, Behen & syluestris pastinacae radices nullum inter se discrimen habere. Quo fit, ut nulla sese offerat nobis ratio, qua probare possimus, Behen communis vsus esse Arabum legitimum: quamuis & ipsi inter se hac in historia non parum dissentiant. Nicolaus Myrepsicus itaque, Actuarius Behen hermodactylum vocant, nescio tamen qua ratione, cum alia sit radix apud Paulum, & Arabes hermodactylum. Behen adulterina, tam album, quam rubrum, passim in Italia proueniunt. Hoc enim planta radicem esse scimus, quam superius libro tertio limonium fecimus, illud vero, alterius planta, cuius vires haecenus mihi prorsus incompta sunt. Sed quibus polleant viribus, nondum mihi compertum esse ingenuè fateor. *Βάλανος μύριστη* sic Graeci dicitur, Latina vero Glans vnguentaria: Mauritani, Habben, seu Ben: Italia, Ghianda vnguentaria: Hispanis, Auellana de la In-


Actuarius.

Chrysobalanus.

Behen album, & rubrum.

Behen Hermodactylum.

Nomina.

* BEHEN RVBRVM
Officinarum. *

cinerea: Chebuli seu Aretca, magni sunt, rotundi, oblongi, dum ad perfectam maturitatem pervenire, & angulosi, folijs perfici similibus. Figuris quarum Matthiolus meminit, cum ad manus essent, addere libuit non tam propter arbores, (quæ quam veræ sint aliorum esto iudicium) quam propter fructus tam recentes quam exliccatos rectè expressos, qua de re plenius suo loco. Addita etiam est figura ipsius Behen rubri Officinarum.

L. NARCISSESI.

NARCISSESI.
CAP. CLX.

Orib cœclusa
non legit.
† Ori. add.
ἐν τοῖς ἁγίοις
ἀμμοῖς ἐστὶν ἰ
ἐν τοῖς ἁγίοις
ἐν τοῖς ἁγίοις



Narcissi histo-
ria ex Theo-
phrasto.

Narcissum [sunt qui ut lilium, liriū appellorint.] folia profert porro similia, [tenuia.] multò minora, & [angustiora.] caulis vacuus, & tunc folijs, supra dodrantem attollitur, flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum. Probatissimus nascitur in montibus, suavi odore: cæteri † porrum imitantur, atque herbaceum virus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, vomitoria est: ambustis igni prodest cum exiguo melle trita, præcisos nervos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus trita ex melle, & imposta subuenit. Viria cutis in facie, vitiliginesque cum semine vriticæ, & acetæ emaculat: cum eruo, & melle, vlcera sordida expurgat: abscessus rumpit concoctioni repugnantes: infixæ corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Narcissus, inquit Theophrastus libro 6. de historia plantarum, vel liriū (alij enim hoc, alij illo nomine vocant) folium albuū, terra proximum gerit, sed longè latius, lily modo. Habet caulem sine folio, herbaceum, florem suo ferentem cacumine, in membrana veluti vasa inclusum, largè amplum, coloreq; nigrum, figura oblongum. Hic decidens sponte germinat, cæterum & qui legunt defigere eum solent. Quin & radicem serunt, quæ carnosæ rotundæ, amplæque constat. Serotinus admodum, post ar-


II. NARCISSVS II.

III. NARCONSTANTINO-
politanus III.



IV. NARCISSVS IV.

V. NARCISSVS. V.



Acturum enim, & circa aequinoctium floret. Hæc Theophrasti de Narcisso sententia. Porro Plinius libro 21. capite 19. duo Narcissi genera prodidit, quæ his verbis etiam depinxit: Narcissi duo genera in usu medici recipiunt. Vnum purpureo flore, alterum herbaceum. Hunc stomacho inutilem, & ideo vomitorium, alios quoque solventem, neruis inimicum, caput gravantem, & à narce narcissum dictum, non à fabuloso puero: hæc Plinius. In quibus planè deprehenditur à Dio-


VI. NARCISSVS VI.



VIII. NARCISSVS VIII.



VII. NARCISSVS VII.



IX. NARCISSVS IX.



à Dioscoride dissentire, quòd neutrum Narcissi genus flore albo descripserit. quanquam idem Plinius cap. 5. eiusdem liberin-
ter lily genera Narcissum connumerans, hunc flore candido constare tradidit. Veruntamen nulli ex hoc mirari licet, neque
propterea Plinium damnandum esse censeo, quòd sciamus complures esse Narcissorum species, ut ex imaginibus, quibus
excudi curauimus manifestò apparet. Ha autem cum ad viam expressa sint, haud operaprecium esse iudicauimus, ut ha-
rum de-

...nascitur de cribamus. Narcissi vires retulit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Narcissi ^{Narcissus...}
 ...maxima vulnere conglutinet, vel ad incisiones vsque, qua circa tendo- ^{ex G.}
 ...ant. Habet verò quiddam absterjorium, & astractorium. Plantae quae ^{Narcissus...}
 ...Arabibus, Narces seu Nargies: Italis, Narcisso: Germanis, Weheblumen / Dornungsbiumen / Zentofeu.

Narcissum a Narcisso adolescente nimium seipsum amante, qui in hunc florem mutatus fuit, dictum
 poetæ volant alij a vi stupefaciendi: seu vt Plinius, a narce, quam vim Narcisso inesse testatur libro 21. cap.
 ...quare Plutarchus 3. sympos. dictum censet, quasi neiaos hebetans, & torpidas grauitates efficiens
 Differentias viginti nouem in Phytopinace proposuimus: hic de differentijs à Matthiolo propositis tan-
 tam. I. Narcissus primus, Matth. Narcissus quartus Matthioli, Lugd. Narcissus nonus Matthioli, Taber.
 Narcissus niueus serotinus eidem. Narcissus mediocroceus serotinus polyanthos, Lobel. II. Narcissus
 secundus, Matth. Lugd. Narcissus decimus Matthioli, Taber. Censemus esse Leucoium bulbosum maius,
 quod Leuconarcissolirion pratense verum, Lob. Leucoium bulbosum polyanthemum, Dod. fol. Lugd.
 Came. Leucoium bulbosum multiflorum, Taber. Leucoium bulbosum serotinum maius, Clus. hist. Pan.
 III. Narcissus Constantinopolitanus, Matthiolo in maioribus figuris, Taber. Narcissus octauus. Matthi-
 olo in compendio: Narcissus tertius Constantinopolitanus Matthioli, Lugd. Exprimit scillam minorem,
 quam vocat Narcissium marinum, Dodo. fol. Cæsalp. Hemerocallis, Gesl. hort. Hemerocallis Valentina,
 Clus. histo. Hisp. Lob. Camer. Pancratium verum, Gesl. hor. Pancratium, Cord. in Diosc. Lugd. Pancra-
 tium marinum, Lob. in iconibus. Liliun marinum album & luteum, Taber. IV. Narcissus quartus
 Matth. Lugd. Taber. nil aliud est quam Ornithogalum maximum: quod dicitur Ornithogalum maius,
 Dodo. fol. Ornithogalum Arabicum, Clus. histo. Pann. Ornithogalum maius Italicum, Camer. Liliun nar-
 cissus polyanthos, Lobel. Liliun Alexandrinum, eidem in iconibus, & Camerario. Quædam peregrina
 barbaro nomine Dulipan, Cæsalpino. V. Narcissus quintus, Matth. & Lugd. est Tulipa, cuius varia
 sunt species, maximè colore floris differentes, quæ tamen ad tria prima genera reduci possunt: Præcoci-
 us vnum, serotinum alterum, & tertia dubia, quæ medio tempore floret, ita vt quadraginta septem speci-
 es a Cluio recensentur: vulgatissimi tamen sunt flauii, albi & purpurei. Hactenus Byzantio missæ, præco-
 ces. Caffalale: Serotina Caffalale nomine, à locis vnde primum Byzantium illatæ appellatione indita:
 Lale enim florem significat. Caffa vrbs est in Peninsula Gazaria dicta, quæ inter Propontidem & Euxi-
 num pontem est. Tulipæ verò nomen à Pileo Dalmatico, vel amiculo capitis ab ipsis gestari solito, pro-
 pter floris similitudinem, nomen habere dicitur. Et licet alij ad Anemonem, Limoniam Theophrasti, a-
 lij ad Crinorhodon Plinij: alij ad Satyrium erythraicum referant, videtur tamen ad τριβίωνα Theophrasti
 referenda. Dicitur Tulipa Turcarum, Gesl. ad Cordum, cui & Anemone limonia & Lilij rubentis genus,
 Tulipa, Clus. histo. Hisp. Lonic. Castor. Tulipa præcox rubra, Clus. histo. Panno. Tulipa maior, Lugd. Li-
 lionarcissus purpureus, Lobelo. VI. Leucoium bulbosum minus, C. B. Narcissus sextus, Matth. Lug-
 narcissus octauus alter, Matth. Narcissus tertius alter, Eidem in Compendio: Narcissus secundus, Lacü.
 Narcissus montanus & alter, Cæsal. Leucoium bulbosum triphyllon, Dodo. fol. Camer. Leucoium bulbo-
 sum præcox minus, Clus. histo. Panno. Leucoium bulbosum secundum, Taber. Leuconarcissolirion mi-
 nimum, Lobe. Leuconarcissolirion trifolium Camerario in Matthiolum. Ex radice parua bulbosa, mul-
 tis albis tunicis constante, externa nonnihil nigricante, & sessili parte tenuibus fibris donata, cauliculus
 palmaris, viridis, nudus & concavus, primo vere inter gemina folia oblonga, angusta, æruginoso colore
 exurgit, cuius summo flos vnicus è vaginula prodiens pendulus, infidet, qui inodorus, lacteus, paruus, sex
 foliis constans: quorum tria exteriora candida alarum modo se explicantia, tria verò interna duplo bre-
 uiora & angustiora, cordis formam referentia limbo viridi extremitatem ambiente, inter quæ staminula
 icæ crocea cum stilo exili & candido: quibus succedunt capitula oblonga, semen oblonguiculum & can-
 didum continentia. Nascitur in pratis Italiae, apud nos in hortis colitur, vocatur à Germanis Sännetropf-
 fen, id est, niuea gutta, ab insigni candore. VII. Leucoium bulbosum vulgare, C. B. Narcissus septi-
 mus, Matth. Lugd. Narcissus martius, Brunf. Narcissus, Turn. Narcissus candidus, Cord. in Diosc. Narcis-
 sus aquaticus, Cæsal. Viola alba Theophrasti, Trag. Fuch. Turn. Viola alba bulbosa, Lug. Leucoion Theo-
 phrasti, Dodo. gal. Lonic. Leucoion bulbosum Theophrasti, Getn. hort. Thal. Leucoion bulbosum hexa-
 phyllon, Dodo. fol. Cam. Leucoium bulbosum præcox maius, Clus. histo. Panno. Leucoium bulbosum
 primum, Taber. Leuconarcissolirion paucioribus floribus, Lobel. Leuconarcissolirion vulgare, Camer.
 ad Matthiolum. Germanis Weiß Hornungsbium, Weisgentium. Italis Latte di Gallina. VIII. Narcissus luteus,
 calyce prælongo, C. B. Narcissus octauus, Matth. Narcissus tertius primus, Matth. in Compendio,
 qui inter maiores figuras non habetur. Narcissus, Brunf. Lac. Lug. Narcissus luteus, Trag. Lon. Narcissus
 luteus syl. Dod. fo. Lug. Narcissus totus luteus moranus, Theophrasti, Lob. cui & Bulbus Codiõ Theophr.
 Narcissus calyce prælongo anguloso, Cæsal. Pseudonarcissus, Dod. gal. Clus. histo. Hisp. Pseudonarcissus calyce
 prælongo anguloso, Cæsal. Pseudonarcissus, Dod. gal. Clus. histo. Hisp. Pseudonarcissus luteus, Tab. Codianum
 vel Codianum flore Codij, id est, Campanulæ, Gesl. de hortis Germania: Germanis, Gelbe Hornungsbium
 Gelb Josephstab. Gallis, Coqueturde. Hispanis, Campanella. IX. Narcissus albus flore multiplici
 C. B. Narcissus octauus, Matth. in maioribus iconibus, & Lugd. Narcissus nonus, Matth. in Compendio:
 in penultima editione omissus. Narcissus secundus, Camer. in Matth. Narcissus multiplex Dod. fol. Nar-
 cissus flore multiplici, Clus. histo. Hisp. Lugd. Narcissus albus polyanthos siue Chalcedonicus, Lobe. Nar-
 cissus polyanthos, Taber. Narcissus quartus, Lonic. Habetur flore albo, ex luteo pallente, & medio pur-
 pureo.

Ἰπποφάεις

HIPPOPHAES.

CAP. CLVL

Hippophaes, quo fullones vestes interpolant, in sabulosis, maritimisque nascitur, furculaceo frutice, ^{a Meū αρε}
 vndique denso, & largo: folijs oleæ longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ ^{φλασθαι. vñ}
 emi. ^{dique ampio.}

emicant, sicca, angulosa, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim cohaerent, minusculi tamé, & molles, candidi ex parte rubescetes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustati: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cū erui farina subactus, siccatur & ad viam recoditur. Syncerus pituitas, bilem, aquasque deijcit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mullâ. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tertus datur. Radice, & herba liquamentum depromitur, vt in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Ἰπποφάιστος

HIPPOPHÆSTVM

CAP. CLVII

Hippophæston, id quod aliqui hippophaes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophaes, est spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: in ambus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habes molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus cui voles, tribus obolis in aqua mullâ, aquam pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitijs, & orthopnœæ conuenit huiuscemodi purgatio.

Hippophaeis confid.


Et si quandoque maritima, & sabulosa adierim loca, vt Hippophaem, & Hippophæstum, vtpote plantas inibi nasci inquirerem, neutrum tamen hæcenus mihi licuit inuenire. Caterum retulit nobis Hieronymus Amaltheus Opitergus, medicus ingenio, & eruditione clarus, se olim Venetys plantam accepisse à Ioanne Baptista Zopisso Papiensi, clarissimo medico, que non modo notus omnibus Dioscoridis Hippophaem referebat: sed etiam viribus, vt se experimento comperisset, status est. Quare non prorsus desperandum est, quin & nobis, & alyis quoque aliquando contingat Hippophaem consequi. Non inuenio, quod Galenus hippophaeis, aut hippophæsti meminerit in suo simplicium medicamentorum censu. Hippophaeis tamen mentionem fecit Paulus libro 7. inter simplicia. Hippophæsti verò Plinius libro 27. cap. 10. Illius nomen Græcum ἰπποφάιστος Latinum quoq; Hippophaes. Huius verò nomen Græcum ἰπποφάιστος Latinum item Hippophæstum.

Nomina.

Κικίς ἢ κρότων

RICINVS

CAP. CLVIII



a Meum ῥεῖς κρότων τὸν ἀριθμὸν. i. grana tria numero. b Meū & Cat. καὶ ταῦτα ῥαμειτὰ ὄντες i. tum perle, tum cū aceto atqui aliud exemp legit. ὁ κρότων. i. exp. sic. Ricinus confid.

Cherua maior thic.

Cici, aut Croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parua: ficus altitudine, folio platani, maiore, lauiore, & nigriore: ramis, caudicibusque cauis, in arundinis morem: semine in vis aspers, quod corticibus exutum ricinum animal repræsentat: ex quo oleum nomine cicinum exprimitur, cibis fœdum, lucernis emplastrisque vile. Grana a triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aquamque per aluum extrahunt, vomitionesque mouent: sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio, siquidem stomachum vehemeter subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosque expurgat. Folia cum polenta trita inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt, turgentes mammas cohibent: eadem b ex aceto illita, ignes sacros reddunt.

Ricinum vocauerunt Latini plantam, que Græcis κικίς dicitur, à similitudine, quam eius semen habet cum ricini liuido ac fædo animali, quod canibus, bubus, capris, aliisque quadrupedibus adheret: neq; prius decidit, quam plenum sanguine saginatum rumpatur. In Hetruria planta hæc à quibusdam vulgo vocatur Girasole, aliquibus verò Fagiolo Turibesco. Apud insubres autem pluribus in locis Mirasole: quancū id nominis potius Heliotropio conuenit, de quo in huius libro talce differemus. Semen officina Cheruam maiorem appellant: tamen si ab ipso Mesue, cuius vestigia pharmacopola maxime sequuntur, Regium granum appellari constat: cum matrici o-

Ricini vires ex Mesue.

Ricini vires ex Gal.

tem senserit, impetu quodam facto excidit. Ricinus copiose feritur in hortis & in viridarijs, in Aegypto sponte nascitur: vti ex eius semine plurimum olei exprimitur, cibis quidem fœdum (vt inquit Plinius) sed lucernis vile. Deijcit aluum perinde ac balanus myrsinica, tolliturque eius noxa iisdem medicamentis. Quamobrem de eo sic loquitur Mesues: Regium granum (hoc est ricini semen) pituitam tam per vomitum, quam per aluum extrahit, sed non sine assumentium molestia. Siquidem stomachum vehemeter subuertit: quinetiam bilem, & aquam inter cutem deijcit: & ea sanè omnia excrementa purgat, que ad articulorum compugines desierunt. Tollitur noxa, vbi igne torrefactum sit prius & deinde admisto fœniculi, & anisi semine. Ita enim paratam vomitiones minimè molitur. Consert item coli, & articulorum doloribus, nempe podagricis, & ischiadicis, si ex iure veteris galli decoctum hauriatur. Hydropicis verò decoquitur cum caprino sero, aut emulsa recenter lactis: maceratum oleum quod à semine elicitur, colicos cruciatus lenit infusum: tollit que inunctum cum scabiem, tum capiti vlcera sanat. Auxiliatur quoque inflammationibus sedis, & conuersis, ac præclusis faminarum locis. Inungitur vtiliter malarioris cicatricibus & aurium doloribus. Ricini vires memoria prodidit Galenus lib. 7. simplicium medicamentorum sic inquit: Ricini semen, quemadmodum expurgat, digerit, ac detergit: sic quoque folium, sed vnde quaque debilius. Oleum quod

quod ex semine conficitur, tum calidius, tum tenuiorum partium est, quam oleum commune, ac proinde etiam discutit. *Suffragin* in Dioscoridis exemplari subesse mendam. Grana enim triginta semina non sine periculo vita dari possunt. Quo fit ut cum Orbasio legam tria Grana, non triginta. Planta qua Græci κικί, siue κρότων, Latinus Ricinus appellatur: Arabibus, Nomina Cherna: Italis. Mirasole & Girasole: Germanis, Wunderbaum vnd Kreuzbaum: Hispanis, Fiquen a del inferno: Gallicis, Paulme dien, Palma Christi.

Ricinus, Matth. Fuch. Turn. Dod. gal. (cui & Pentadactylon) & fol. Lacu. Cord. in Diosc. & histo. Anguil. Lon. Cast. Lob. (cui & Cerua maior & Granum regium Mesues) Lugd. Cæsäl. (& Girasole) Taber. Cam. Ricinus vulgo, Trago, cui & Palma Christi, & Phaselus Romanus Thufcis, Marcello Virgilio. Cici, 20 Gefhort. Cataputia maior, Ericio Cordo in suo Botanologico.

Τιθύμαλας

TITHYMALI

CAP. CLIX.

Tithymali genera septē, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtites, qui femina existimatur, eumque myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralius, quem tithymalida appellarunt: alius helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides: septimus platyphyllos dicitur. Characiae caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: a pendet in cacuminibus caulium a Meū & Ca. comaiunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur: nascitur in asperis, 20 & montibus. Succus aluum purgat, trahit pituitam, bilemque binis obolis in posca sumptis, & cum aqua 30 & vase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem multa vomitiones mouet. † Appetente vindemiarum tempore, succus, congestis ramulis mox dissectis, 40 & vase conclusis, excipitur. Alij in aridas ficos ternas quaternasue guttas instillant, vt cum his inarescant, quas ad vsus re- implent. Alij in aridas ficos ternas quaternasue guttas instillant, vt cum his inarescant, quas ad vsus re- condunt. Per se etiam rufus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quod 50 ventus aspiet, stare quenquam, neque manus oculis adgnouere conuenit, sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, b collum scrotumque genitalis, adipe, aut oleo cum vino perungere. Fauces autem ex- alperat: quapropter catapotia cera, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari: binas tamen ter- 60 nasue ficos purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in sole capillos euellit, re- nascentesque flauos, & exiles efficit, denique omnes perimit: dentium cauernis inclusum, leuat dolores: 70 sed cera dentes oblinenda ne suo delapsu fauces, & linguam vñriet. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & qui thymi florem repræsentant: valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas ulcerum, gangrenas, fistulasque. Legitur semen autumnis, & siccarum sole leuiter tunditur, feruifac- que loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen, & folia lactei succi effectum præbent, dimidio 80 acetabulo pota. Sunt qui inveterant, admisto cum lacte lepidio, & caseo contuso. Radix drachmæ pon- dere in hydromelite pota, per inferna trahit: decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Femina, quam myrsinitem, aut caryitem vocant, similis suapte natura daphnoidi: folijs myrti, sed maiori- 90 bus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantales: fructum fert alter- nis annis, c nuci similem, mordaci gustu: nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, confirmilem ante- 40 dicto sortiuntur facultatem †: sed ad citandas vomitiones d inualidior hæc est. Aliud tithymali genus di- citur paralius, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellauerunt. Nascitur in maritimis, ramis subruben- 50 tibus, palmum altis e quinque senisue a radice exeuntibus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato fin quo semen, vt eruum, vario colore emicat: flos albus, nem. Frutex totus cum radice g lacteo succo turget. Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs por- 60 tulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitulis incluso. He- lioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissimum in ru- 70 deribus. Colligitur succus, semenque, vt aliorum. Eadem, quæ superioribus vires, non tamen vsque adeo vahda. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia pini similitudine 80 exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem pinum æmulatur, vnde nomen traxit. Candido succo madet, cui eadem vis, quæ superioribus. In petris nascens dendroides cognominatur: am- pliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, fo- 90 lijs myrti tenuioris, fructu characiae. Eiusdem effectus, cuius superiores, similique modo reconditur. Pla- typhyllos verbasco similis est. Radix, succus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, rufus, & aquæ in parvas. Reliqua tithymalorum genera, quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

Tithymalorum omne genus officina Esulam indifferenter appellant, quanquam plura sunt tithymali genera, quorum 10 historiæ satis confuse Mauritanis tradiderunt: quo fit, vt apud hos non sine magno labore tithymalorum genera re- 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770 7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490 8500 8510 8520 8530 8540 8550 8560 8570 8580 8590 8600 8610 8620 8630 8640 8650 8660 8670 8680 8690 8700 8710 8720 8730 8740 8750 8760 8770 8780 8790 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 8980 8990 9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9180 9190 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9380 9390 9400 9410 9420 9430 9440 9450 9460 9470 9480 9490 9500 9510 9520 9530 9540 9550 9560 9570 9580 9590 9600 9610 9620 9630 9640 9650 9660 9670 9680 9690 9700 9710 9720 9730 9740 9750 9760 9770 9780 9790 9800 9810 9820 9830 9840 9850 9860 9870 9880 9890 9900 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9970 9980 9990 10000 10010 10020 10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 10110 10120 10130 10140 10150 10160 10170 10180 10190 10200 10210 10220 10230 10240 10250 10260 10270 10280 10290 10300 10310 10320 10330 10340 10350 10360 10370 10380 10390 10400 10410 10420 10430 10440 10450 10460 10470 10480 10490 10500 10510 10520 10530 10540 10550 10560 10570 10580 10590 10600 10610 10620 10630 10640 10650 10660 10670 10680 10690 10700 10710 10720 10730 10740 10750 10760 10770 10780 10790 10800 10810 10820 10830 10840 10850 10860 10870 10880 10890 10900 10910 10920 10930 10940 10950 10960 10970 10980 10990 11000 11010 11020 11030 11040 11050 11060 11070 11080 11090 11100 11110 11120 11130 11140 11150 11160 11170 11180 11190 11200 11210 11220 11230 11240 11250 11260 11270 11280 11290 11300 11310 11320 11330 11340 11350 11360 11370 11380 11390 11400 11410 11420 11430 11440 11450 11460 11470 11480 11490 11500 11510 11520 11530 11540 11550 11560 11570 11580 11590 11600 11610 11620 11630 11640 11650 11660 11670 11680 11690 11700 11710 11720 11730 11740 11750 11760 11770 11780 11790 11800 11810 11820 11830 11840 11850 11860 11870 11880 11890 11900 11910 11920 11930 11940 11950 11960 11970 11980 11990 12000 12010 12020 12030 12040 12050 12060 12070 12080 12090 12100 12110 12120 12130 12140 12150 12160 12170 12180 12190 12200 12210 12220 12230 12240 12250 12260 12270 12280 12290 12300 12310 12320 12330 12340 12350 12360 12370 12380 12390 12400 12410 12420 12430 12440 12450 12460 12470 12480 12490 12500 12510 12520 12530 12540 12550 12560 12570 12580 12590 12600 12610 12620 12630 12640 12650 12660 12670 12680 12690 12700 12710 12720 12730 12740 12750 12760 12770 12780 12790 12800 12810 12820 12830 12840 12850 12860 12870 12880 12890 12900 12910 12920 12930 12940 12950 12960 12970 12980 12990 13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13070 13080 13090 13100 13110 13120 13130 13140 13150 13160 13170 13180 13190 13200 13210 13220 13230 13240 13250 13260 13270 13280 13290 13300 13310 13320 13330 13340 13350 13360 13370 13380 13390 13400 13410 13420 13430 13440 13450 13460 13470 13480 13490 13500 13510 13520 13530 13540 13550 13560 13570 13580 13590 13600 13610 13620 13630 13640 13650 13660 13670 13680 13690 13700 13710 13720 13730 13740 13750 13760 13770 13780 13790 13800 13810 13820 13830 13840 13850 13860 13870 13880 13890 13900 13910 13920 13930 13940 13950 13960 13970 13980 13990 14000 14010 14020 14030 14040 14050 14060 14070 14080 14090 14100 14110 14120 14130 14140 14150 14160 14170 14180 14190 14200 14210 14220 14230 14240 14250 14260 14270 14280 14290 14300 14310 14320 14330 14340 14350 14360 14370 14380 14390 14400 14410 14420 14430 14440 14450 14460 14470 14480 14490 14500 14510 14520 14530 14540 14550 14560 14570 14580 14590 14600 14610 14620 14630 14640 14650 14660 14670 14680 14690 14700 14710 14720 14730 14740 14750 14760 14770 14780 14790 14800 14810 14820 14830 14840 14850 14860 14870 14880 14890 14900 14910 14920 14930 14940 14950 14960 14970 14980 14990 15000 15010 15020 15030 15040 15050 15060 15070 15080 15090 15100 15110 15120 15130 15140 15150 15160 15170 15180 15190 15200 15210 15220 15230 15240 15250 15260 15270 15280 15290 15300 15310 15320 15330 15340 15350 15360 15370 15380 15390 15400 15410 15420 15430 15440 15450 15460 15470 15480 15490 15500 15510 15520 15530 15540 15550 15560 15570 15580 15590 15600 15610 15620 15630 15640 15650 15660 15670 15680 15690 15700 15710 15720 15730 15740 15750 15760 15770 15780 15790 15800 15810 15820 15830 15840 15850 15860 15870 15880 15890 15900 15910 15920 15930 15940 15950 15960 15970 15980 15990 16000 16010 16020 16030 16040 16050 16060 16070 16080 16090 16100 16110 16120 16130 16140 16150 16160 16170 16180 16190 16200 16210 16220 16230 16240 16250 16260 16270 16280 16290 16300 16310 16320 16330 16340 16350 16360 16370 16380 16390 16400 16410 16420 16430 16440 16450 16460 16470 16480 16490 16500 16510 16520 16530 16540 16550 16560 16570 16580 16590 16600 16610 16620 16630 16640 16650 16660 16670 16680 16690 16700 16710 16720 16730 16740 16750 16760 16770 16780 16790 16800 16810 16820 16830 16840 16850 16860 16870 16880 16890 16900 16910 16920 16930 16940 16950 16960 16970 16980 16990 17000 17010 17020 17030 17040 17050 17060 17070 17080 17090 17100 17110 17120 17130 17140 17150 17160 17170 17180 17190 17200 17210 17220 17230 17240 17250 17260 17270 17280 17290 17300 17310 17320 17330 17340 17350 17360 17370 17380 17390 17400 17410 17420 17430 17440 17450 17460 17470 17480 17490 17500 17510 17520 17530 17540 17550 17560 17570 17580 17590 17600 17610 17620 17630 17640 17650 17660 17670 17680 17690 17700 17710 17720 17730 17740 17750 17760 17770 17780 17790 17800 17810 17820 17830 17840 17850 17860 17870 17880 17890 17900 17910 17920 17930 17940 17950 17960 17970 17980 17990 18000 18010 18020 18030 18040 18050 18060 18070 18080 18090 18100 18110 18120 18130 18140 18150 18160 18170 18180 18190 18200 18210 18220 18230 18240 18250 18260 18270 18280 18290 18300 18310 18320 18330 18340 18350 18360 18370 18380 18390 18400 18410 18420 18430 18440 18450 18460 18470 18480 18490 18500 18510 18520 18530 18540 18550 18560 18570 18580 18590 18600 18610 18620 18630 18640 18650 18660 18670 18680 18690 18700 18710 18720 18730

I. TITHYMALVS CHARACIAS. II. TITHYM. MYRSINITES



III. TITHYMALVS PARALIVS.

IV. TITHYM. HELIOSCOPIVS.



usquam reperi maioris generis Alsebram folia hedera verbasco similia, nec quod rufum, & aque inspersum pisces interficiat, sed quod rectius (vt inquit Auicenna) eius folia minori Scebram sint similia. Porro si mihi hac in re coniectandum esset, putarem equidem nil aliud Mauritanis esse minoris generis alsebram, siue Scebram, quam plantam illam; qua officinis Esula minor vocitatur, quod (vt inquit Auicenna) in hortis, & vbique proueniat. Hac autem ni fallor, ea est, quam vocat Dio-

V. TITHYMALVS CYPARISIAS.

VI. TITHYMALVS DENDROIDES.



VII. TITHYMALVS LEPTOPHYLLOS.



cat Dioscorides Tithymalum cyparissiam : quippe qua pinum arborem nuper natam folijs prorsus imitetur. Quinetiam Alsebra est censerem Alsebram maius, siue Mebezeheregi eam omnino esse plantam, qua Græci dicitur Pityusa, utpote qua tithymalo cyparissia folijs sit similis, quamuis magnitudine excellat: non enim desunt, qui inter tithymalorum genera etiam pityusam recenseant. Proinde non ab re dicebat Auicenna, Mebezeheregi esse simile Scebram, sed maius, & colore subcineritio. Mesues verò, quòd radicibus esset rotundis, crassis, crassoque cortice obductis, ponderosisque : qua ferè omnia radici Pityusa reddidit Dioscorides. Accedit his Serapionis autoritas, qui de Scebram agens, ea omnia ex Dioscoride illi tribuit, qua pityusa idem Dioscorides assignauit. Ex his itaque perspicuum fieri arbitror, Pityusam Mauritanis Scebram maius appellari: minus verò id, quod Græci Tithymalus cyparissias dicitur. Caterùm Characiam vocatū, postquam multū laboris in eo indagādo frustra impendissem, hoc anno misit ad me Pisis clarissimus medicus Lucas Ghinus Forocorneliensis: qui, meo quidem iudicio, omnibus prorsus notis legitimo respondet. Myrsinitem quoque hoc tantum anno reperimus, folijs circa caulem totum crassis, acutis, myrto similibus. Paralius verò in maritimis tantum nascens, quem vulgari vsus tithymalum putat Brasauolus, in maritimis nostris Senensibus, Argentario promontorio, & in vniuerso illius regionis tractu, item in Aquileiensi agro frequentissimus inuenitur. Huic folio similis visitur quadam alia planta, qua in Hetruria vulgò appellatur Herba mora. Cuius radicibus prius contusis, ac deinde fluminibus demersis, pisces protinus enecantur. Sed careta ac lacteo succo, quapropter eam inter tithymalorum genera iam non esse adnumerandam cognoscimus, etsi alias aliter sensimus, quòd, alijs notis neglectis, lini folia viderentur, & caules subrubentes. Si hac defuerit, Platyphylli radices sumant, quo vniuersa regio scateat. Porro Helioscopius, sic dictus, quòd cum sole comam circumagat, omnibus vulgaris notia planta est. Prouenit enim hac passim prope vrbium, & oppidorum mœnia, in campis, incultis, hortis, collibus, & vbi que tam culto, quam inculto solo. Cyparissias deinde (vt supra diximus) ea est planta, quam Esulam minorem vocant, cuius pro omni Tithymalo inualuit vsus. Mihi profecto mirum videretur, quòd Dioscorides hoc tithymali genus *κυμαριστιαν* ap-

Pityusa.

Tithy. Characiam.

Myrsinites. Paralius.

Herba mora.

Helioscopius

Cyparissias.

- Dendroides.** Pellauerit, cum pinum, non cyparissum referat. Quod nascitur ferè vbiq̃ue circa oppida, & secus vias. Eadem illi vi, qua superioribus. Dendroidem vidimus primùm in regno Neapolitano extra Terracinam urbem inter saxa antiquissimi saxi in itinere Neapolim versus, planta arborescentis effigie. Hunc dum contemplari cœpissim, superuenit peritissimus medicus Hieronymus Drogus Parmensis, & doctissimus Hieronymus Rorarius Portonouensis (tunc omnes vna sequebantur Bernadum Clesium amplissimum Cardinalem Tridentinum ad Casarem pergentem) quibus magno solatio Dendroidem tithymalum ibi à me primùm repertum ostendi: erant enim ambo rei herbaria studiosi, atque etiam gnari. Nascitur idem tithymalus etiam in Tergestino litore non longè à Timauo fonte, in saxosis quibusdā rupibus arborescens. Tithymali leptophylli facies patet ex hic appicta figura: Nascitur incultis locis & asperis. Facultatibus iisdem pollet quibus & reliqua genera.
- Tithymalorum historia ex Theophr.** Theophrasto tria tantum Tithymalorum genera produntur lib. 9. cap. 12. de historia plantarum, vbi ita scriptum reliquit: Lactariarum (sic enim tithymalum vertit Theodorus) quod maritimum granum appellant, folio est rotundo, caule, totaque magnitudine ad palmum, fructu candido. Demetitur, cum vna nigrescere incipit: & siccatus fructus tritus porri datur acetabuli tertia parte. Mascula autem vocitata olea folio cōstat & magnitudine cubitum aequat. Huius lac, cum vndem incipit, exprimunt, & preparato vtuntur: purgat inferius. Myrtaria verò cognominata, candida lactaria est folijs myrti condita, verùm aculeatus parte postrema: sarmentula in terram demittens, longitudine palmi, qua non simul, sed alternatis annis fructificant, alia hoc anno, alia postero, quanquam omnia eadem radice exorta. Loca montuosa desiderat. Fructus nux appellatur: demetitur, cum hordeum turgescit, & exiccatus purgatusq̃, datur elotus cum papaueris nigri duabus partibus, ita vt totum modo acetabuli sit: trahit pituitam per aluum. At verò si nucem ipsam placeat dare, trita dabitur ex vino dulci, aut cum sesama tosta, torrefactaque comedenda: haecenus Theophrastus. Tithymali omnes, Mesue aut bore in simplicibus deiectione facultatis, cordi, iecinori, & ventriculo maxime officium, vasa disrumpunt, intestina abrudent, vniuersum excalfaciunt corpus, adeò vt inde febres facillè concitentur. Tollitur prima Tithymali noxa ijs admistis, qua cor, venter, & ventriculum roborant. Secunda verò, & tertia ijs, qua agglutinatio facultate pollet: cuiusmodi sunt tragacantha lachryma, gummi, bdellium, psyllij seminis spissamentum, & portulaca succus. Tollitur & quarta, admistis frigidis, & humidis: proinde aut sonchi succo, aut intubi, aut portulaca, aut hortensis solani, aut aceto cum cydoniorum seminibus utius rudicula agitato, commiscet. Vulgari vsus Tithymalus pituitam vehementer deiecit, & atrum quem vocant succum, pariterque pituitas ad articulos decurrentes. Aquam inter cutem validissimè extrahit: nihilo secius exicat vniuersum corpus, & genituram extinguit. Vnde rusticorum medicamenti nomen sibi merito asciuit. Tithymali omni generum vires commemorat Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit: Tithymali omnes vincentem habent acrem, calidamque facultatem, inest verò & amaritas. Validissimus itaque est eorum liquor. Secundum locum tenent semen, & folia. Sed & radix dictarum facultatum particeps est, sed non ex aequo: sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maxime qui illis erosus proueniunt. At liquores, vt qui valentior vim habeat, in foramina quidem ipsa dentium induntur: ceterum si aliam corporis partem contigerint, adurunt, vlceraq̃: proinde foris illis cera circumlinitur: quippe iam ex quarto sint excalfacientium ordine, quem esse adurentium posuimus. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porò cum vehementior sit oleo miscetur: & si id saepe fiat, tandem prorsum pilorum radices adusta extirpantur, corpusq̃ depile redditur. Eadem facultate verrucas, quas acrochordonas nominant, & myrmecias, & pterygia, siue oculorum vngues, & thymos auferunt, detergentq̃, lichenas & psoras, quia scilicet & abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Præterea vlcera phagedenica, anthrachode, & gangranode, quia valenter tum excalfaciunt, tum extergunt, si in tempore, & moderate vtare, iuuare aliquando poterunt. Verùm enimvero, & fistularum callos eximunt eadem facultate. Ceterum haec omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia, & fructus prestare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos vt assolent. Celerrimè namq̃, ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aqua superficiem feruntur. Porò cum septem sint eorum genera, valentissimus est quem characiam nominant, quem vtrique etiam quidam vniuersam cognominant, & scemina nūcupata myrsinites, & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui verbascum similis est, & cyparissias: deinde paralius, siue marinus: denique helioscopius. Proportione verò comprehensa illorum facultatis & cinis, & ex ipso lixiuium erit. In vniuersum planta Græcis τῖθυμάλος, Latinis quoque Tithymalus nominatur. Arabibus, Xauser, & Ethuba: Italis, Tithymalo: & Tortomaglio. Germanis, Wolffsmilch: Hispanis, Leche tersa, & Leche tregna: Gallis, Herbe à laict.

Tithymali vocem, Gaza secutus Plinium, Lactariam reddidit, at Columella Lactucam caprinam, Celsus marinam vocauit: Lactaria dicitur ob cōmune omnibus lac, quod ex leuiter secta, foliue abrupto effluit. Genera septem Dioscorides proposuit: at differentias viginti sex in Phytopinace proposuimus, de quibus plenius in historia. I. Tithymalus Characias, id est, vallis peregrinus, C. B. Tithymalus Characias, Matth. Lacu. Lonic. Castor. Lugd. Taber. Tithymalus Characias alter, Dodo. fol. Cæsal. Tithymalus Characias legitimus primus, Cluf. histo. Hisp. Characias Monspeliensis, Lobel. II. Tithymalus myrsinites, Matth. Dodo gal. (cui & Caryites & Myrtaria Gazæ) & fol. Lacu. Anguil. Gef. hort. appen. Lonic. Castor. Camer. Cæsalp. Lugd. Tithymalus myrsinites primus, Taber. Tithymalus myrtifolius, Lobel. III. Tithymalus maritimus, C. B. & Cæsalpino. Tithymalus Paralius, Matth. Lacu. Dodo. gal. & fol. Gef. hort. Anguil. Lonic. (cui & Esula marina) Lobel. Lugd. Taber. Camer. IV. Tithymalus helioscopius, Matth. Fuch. Dod. gal. (cui & Lactaria solsequia) & fol. Turn. Cord. in Dioscorid. Gef. hort. Lacu. Anguil. Loni. Lob. (cui & Solisequius portulacifolius.) Castor. Lugd. Cæsal. Cam. Taber. Elula, Brunf. Esula vulgaris & tertia, Trag. Tithymalus Dendroides Dodonæi, Thalyo in sua Hærcynia. V. Tithymalus Cyparissias maior, C. B. Tithymalus cyparissias, Matth. Trago (cui & Esula vulgaris maior & quinta) Fuch. Lacu. Gef. hort. Anguil. Castor. Lugd. Cam. Tithymalus Pinea, Lob. in icon. Tithymalus cupressinus secundus, Tab. Tithymalus Dendroides, Lonic. Esula maior, Cæsal. Esula minor, Dod. fol. & Lugd. Pityusa minor, Dod. gal. Thal. Pityusa siue Pinea & Turpetum nigrum Actuarij, Lob. in obser. Pityusa siue Esula minor, Lugdunensi. VI. Tithymalus arboreus folio myrti, C. B. Tithymalus Dendroides, Matth. Lacu. Gef. hort. Castor. Lugd. Lobel. Tithymalus arboreus Myrthifolius, Lobel. in iconibus. Tithymalus Characias tertius, Dodo. fol. & Lugdunensi. VII. Tithymalus leptophyllos, Matth. Lugdun. Thal. Cam. Tithymalus minimus, Tab. Esula exigua, Tragi (cui & Peplus Dioscoridis) Lobel. Esula minima, Lugdu. Peplis minor Dalechampij, Eidem. Papauer spumeum, Gef. de hortis Germaniæ.

Πιτυύσα.

PITYUSA.

CAP. CLX.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, etsi tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs a piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine in-
stat lenticulæ lato: radice crassâ, candida, succo referta: quibusdam in locis frutex hic prægrandis inueni-
tur. Detrahit per aluum radix drachmis duabus data in aqua multâ: item seminis drachma: succi cum fari-
na subacti cochlearium in catapotio datur: modus foliorum drachmæ tres.

a Meû, & Cat.
πίτυος. i. πι-
νι.

b σπόρα ἐν
μεγέθει.

valde ma-
gnus.

Pityusæ con-
sideratio quæ
Esula maior
est.

Turpetū al-
bum & ni-
grum.


Alsebra est E-
sula maior.

Esula Cha-
mapitys Ni-
colai.

Fuchsij opinio
reprobata.

Pityusæ ma-
ior ex Gal.

PITYUSA.



Pityusa, vt latius precedenti capite retulimus, ea nimirum fuerit planta, quam officina Esulam maiorem nominant. Huius radices herbarij, qui quotannis è Gargano Apulia monte succos, & alias radices ad nos comportant, magna impostura pro Turpeto venditant, quemadmodum & Thapsia radices pro eodem subijciunt, vt superius in tripolij mentione diximus. Quod cum sua ætate non ignorasset Actuarius, album turpetum Alypia esse radicem prodidit, nigrum verò Pityusa. Nec his obstat, quod dixerit Dioscorides, Pityusa radicem esse candidam: nam is de interiore substantia tantum intellexit, non autem de exteriori corticis membranula, qua viridis rufescit, siccata nigrescit. Porro quod Esula maior sit Mauritani alsebram, vel sebram, satis liquidò ex Serapione colligi potest, vt pote qui integrum de Pityusa caput ex Dioscoride sumpsit, & in suum Scebram reposuit. Quo fit, vt planè falli putem Brasauolum, quippe qui certò sibi persuadeat, Alsebram maius Mauritani esse tithymalum platyphyllon. Nicolaus Myrepsicus quibusdam in antidotis, & catapotijs aluum soluentibus Esulam imponit cognomine chamapityn. Vnde Fuchsius in suis doctissimis adnotationibus, nil aliud esulam Nicolao referre scribit, quàm Chamapityn, non autem tithymali speciem. Qua in re Fuchsij opinio (pace eius dixerim) mihi non planè satisfait. Nam cum plura sint tithymalorum genera, qua in vniuersum Esula nomine appellantur, de ea tantum intellexisse Nicolaum existimo, quam Dioscorides a foliorum forma Pityusam vocat, eo quod pini, vel piceæ arboris folio constet: qua ob id esula chamapitys differentia causa Nicolao appellata est. Paruam enim pinum pityusa representat: quare non ab re esula quoque chamapitys cognominari potuit. Pityusa in Italia passim ferè prouenit, facie minoris esulæ, sed longè in omnibus maior, adeò vt quibusdam in regionibus, vt in Apulia, arbusci speciem referat. Visitur copiosa in

Veronensi agro, e. a immensa planitie, per quam ad Benacum transitur. Sed quod aridissimum ibi fit solum, non admodum adolegit. Hæc vt Mesues est author, agrestium hominum medicamentum est: multa enim sumentibus adfert incommoda proinde eius vsus apud medicos peritos prorsus exoleuit, quemadmodum & turpeti ex huiusce radicibus parati, postquam detecta est impostorum fraus: etsi non desunt improbi pharmacopola, qui Pityusa radices legitimi Turpeti vice suis inserant medicamentis: sint q, etiam circumforanei, qui harum radicum puluere plures iugulent rusticos, quam sanent. Adscribunt quidam Pityusam tithymalorum generibus, quoniam & ipsa similiter lacteo succo madaat, purgetq, eorum modo. Id quod Galenus aperte testatur lib. 8. simplicium medicamentorum, dum sic inquit. Pityusa, & hanc quidam speciem putant esse tithymali, quod succum habeat, vt illi, quodque similiter illi purget, ceteraq, omnia viribus illis est adsimilis. Ea Græcè πίτυσσα Latine item Pityusa vocatur. Arabice, Scebram, & Pthias: Ossuinus, Esula maior: Italis, Pityusa, & Esula magiore. Gallis, Turbit noir.

Pityusa, Matthiolo, Lacu. Castor. Lugd. (cui & Esula maior) Lonicero, cui & Turbith nigrum.

Λαθύρις.

LATHYRIS.

CAP. CLXI.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamque tithymalorum numero adscribunt: caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine alex, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & leuiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aritholochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparim, in quo grana, intercurfantibus membranis, inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus: totus frutex lacteo succo turget, vt tithymalus. b Grana sex, aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo, aut oleibus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

a Meû, & Cat.
ρίζα λαπίν ἀ-
χνησος. i. Ra-
dix tenuis, in-
uulis.

b σπέρματα
ἀσσον ἐπὶ τῆ ἡδ-
κῆ. i. semi-
nis grana se-
ptē aut octo.

Ita habet v-
trumque ex-
emplar.

Lathyris con-
sideratio.

Lathyris vires
ex Actuario.

Lathyrin officina Cataputiam appellant. Planta est vulgaris notitia. Hæc in Hetruria frequentissima nascitur passim in hortis, & secus itinera exoluto solo. Apud Inyabres, quod aluum valèter euacuet, vomitionesq, eliciat, cacapuzza vulgò nomenatur. Isdem pollet facultatibus, quibus & ricinus: usdem quoq, medicamentis insanatur. Huius planta meminit Actuarius in suo lib. de compositione medicamentorum, vbi ita scribit. Lathyris vehementer pituitam purgat. Dantur

Dddd 3 grana

LATHYRIS.

Lathyrus vi-
res ex Gal.

Nomina.



grana eius maiora, quindecim: minora vero viginti. In, est
efficacius purgari cupiunt, mandenda precipito: ut vero ca-
deiectionem non desiderant copiosam, iubendum est, ut
tegra deuoret, praesertim si qui sumit malo fuerit stomachi:
haec Actuarius. Decem, duodecimue seminis grana a putan-
nibus delibrata, tusaque & in ouo sorbili deuorata, vom-
tum potenter citant. Itaque is vtiliter propinantur, qui
philtera deuorarunt, aut alia veneficia, siquidem haec effica-
citer expellunt. Praestat praeterea Lathyrus semen ad eoa-
mnia, ad qua Ricini semen valere superius diximus. Lathyr-
us vires descripsit Galenus libro 7. simplicium medicamen-
torum, sic inquit: Lathyrus, sunt qui dicant & haec e-
richymali speciem, tum quod similiter illis succum habeat:
tum quod eodem illis modo purget, totaq; illis facultate simi-
lis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce: quod se-
etiam maxime purgatoriam vim obtinet. Quae planta a-
bupic Graecis, Lathyrus item Latinis dicitur: Officinis, Chro-
ua minor. Arabibus, Mendana, seu Mahendane: Italis La-
thiri, & Cataputia minore: Germanis, Springstener:
Springstener / vnnnd Treibförner: Hispanis, Tataro
Gallis, Espurge.

Lathyrus maior, C.B. Lathyrus, Matth. Brunf. Tag.
Fuchl. Turn. Cord. in Diosc. Dodo. gal. & fol. Lacu.
Anguil. Ges. hort. Lonic. Castor. Lugd. Cataputia
Brunf. Cæsal. Cataputia minor, Lob. Granum regi-
um minus, Mesuæo.

Πέπλος. PEPLVS. CAP. CLXII

dranta', humi resperfa: semine sub folijs paruo, rotundo, minore quam candidi papaueris: pluribus sca-
ret auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacua, ex qua fruticat: nascitur inter vites, & in hortis. Colligi-
tur messibus, siccatur in vmbra, & continuè versatur. Fructus tufus, & feruefactus reconditur. Bilis, ac pu-
rta detrahitur acerbulo eius in hydromelitis cyatho potu. Obsonijs insperfa conturbat aluum: muria
conditur.

I. PEPLVS.

II. PEPLIS.



Peplus
Peplis

Peplis

Πεπλῖς

PEPLIS.

CAP. CLXIII.

PEplis, quam aliqui sylvestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, late opaco frutice, candidi succi pleno: foliis latius portulacæ, rotundis, internè rubentibus: femine sub foliis rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi, ac dari, uti peplos, & sale conditi solet. Eadem habet vires.

PEplum herbariorum vulgus, quod orbiculata constet coma, Esulam rotundam vocat. Provenit non modò in vinetis, sed etiam in agris cultura dejectis, lacteo succo prægnaus. Peplida vero, que Peplion dicitur, in maritimis nascentem, non prius quam hoc anno enitiam vidimus. Vtriusque vires reddidit Galenus lib. 8. simpl. medic. ubi primum de Peplo ita scribit. Peplos, quidam verò p. pauer spumeum, & hic frutex parvus succum habet similem tithymali, cum in aliis, tum quia purgat, ceu illi. Mox de Peplio idem Galenus hæc verba subiunxit: Peplium, & hic quoque frutex exiguus succum obtinet, sicut tithymalis nascitur, plerumq. ad mare, radicem habens inutilem, ut & plepos: succum verò validum, non tamen admodum utilem. Sed semen vile est, & flatuosum, similiter semini pepi purgans. Quæ planta πεπλος Græcè, Peplus etiam Latine vocatur: Officinis & vulgo, Esula rotunda: Italis, Pepla. Quæ verò πεπλίς, Græcè, Peplis quoque & Peplium Latine dicitur: Italis, Peplo.

Pepli, & peplidis confid.

Vnusque vires ex Gal.

Nomina.

I. Peplus Matthiolo in maioribus figuris & Compendio, Peplis, eidem in minoribus: Peplus, Fuchf. Dod. gal. (cui & Esula rotunda Officinarum.) & fol. (cui & vineale reuelium, Ruellij) Tur. Cor. in Diosc. & hist. Anguil. Lob. Lon. Cæsal. Cast. Cam. Thal. Tab. II. Peplis, Matth. in maioribus figuris & Compendio. Turn. Anguil. Lob. Clus. hist. Hisp. Cast. Lugd. Cam. Tab. cui & Peplus minor, Peplium, Cæsalp. Lug. quia & Hippocrati Peplion dicitur. Meminit Anguillara & alterius, quod locis montosis in Samnitibus collegit, quod nuper ex iisdem montibus accepimus.

Χαμαίσυκε

CHAMÆSYCE.

CAP. CLXIII.

CHamæsyce aliqui sycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, pepulum planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub foliis rotundo, uti in peplo: neque caulem, neque florem promittit: radice firmatur tenui, superuacua. Rami ex vino triti vuluè dolores sedant, in pello appositi: tollunt tumores, ac a verrucis omnium generam illiti. Decoctor. am cibo aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis ictus auxiliatur: aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squalidis, petrosisque nascitur.


a Mc. ἀκροχρυσόειος & μύρμηκας. i. pentiles & formicarias verrucas.

Chamæsyces consideratio.

Chamæsyces vires ex Gal.

Nomina.

CHAMÆSYCE.



Επιβολή χαμαίσυκε
Σκαμμωνία

SCAMMONIA.

CAP. CLXV.

SCammonia ramos ab vna radice emittit a trium b cubitorum, multos, pingues, & qui non nihil c crassitudinis præ se ferant: foliis helixinæ, aut hederaccis, mollioribus tamen, [hirsutis,] & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice d prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavaatur: quo fit, ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij serobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos subiectis iuglandium foliis, profundunt succum, siccatum que extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, niuidum, rarum, & colore quam simillimum taurino glutini, fungosum, renuib. fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum parat, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto sit tithymali lacte) sed longè magis antea narratis: item si non vehementer linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est.

a Ori. addit. τρεῖς ἢ τέσσαρες. i. tres, vel quatuor.

b Orb. ἢ τετραπύχες. i. vel quatuor cubitorum.

c Orb. δ' αὐτῶν τῆτος. i. densitate.

Conclusa nullam exemplar habet, sicuti etiam re ipsa apparet.

d Orb. ἄσμη. i. oblòga.


Pddd

Natione

Natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, grauia, densa, erui farina, & tichymalo victa. Succus drachmæ vnius, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua pura, vel mulla, per inferre satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus veratri nigri, & aloes drachma vna. Fiunt purgatorij sales drachmis viginti succi scamoniæ in senos salis cyarhos adiectis. Horum vna, aut altera purgat cum iis quæ retulimus. Nonnulli decoctum radice ebibunt. Coquitur in aceto, & tubercula discutit cum melle, aut oleo illitus: decocto in aceto perunctæ lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Scammoneæ,
eiusque succi
consideratio.

I. SCAMMONEA.



Diosc. locus
suspectus.

Scammoniij
lesiones, & vi-
res ex Mesue.

Nomina.

in Mesuem annotationibus, hanc ipsam plantam Georgio Liberali pictori, qui nostras pinxit imagines acceptam refert, quod forte ignoreret, à Georgio illo eam è nostris hortis esse sublatam. Sed hac obiter dicta sit, non quod Marino vno primo, aut Georgio succenseamus, sed ne forte Zoili, ac sycophantæ, qui nobis lacerandis inhiant, furti nos accusarent. Sed profecto mirari nobis subit, quod Galenus in libris de simplicium medicamentorum facultatibus, nihil de Scammone viribus meminerit, cum tamen pleraque alia scriptis tradiderit longè etiam minoris momenti, atque aliàs sapius obiter Scammone mentionem fecerit in suis aliis monumentis. Scammonium, auctore Mesue in suis simplicibus deiectionis, quibus corporibus lesiones inferre potest. Prima est, quod flatu quosdam mordaces gignit, vsque adeo ventriculum lacerantes, et summentibus nauseam commoueat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis inassatur, pasta vndique circumlita, præsertim additis aut fœniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galanga. Instamat deinde acridinis exasperantia corporis spiritus: quo fit, vt facile febres excitet, iis præcipuè, qui obstructionibus viscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocuenti aufertur, admistus inter coquendum, quæ refrigerant, & feruorem extinguunt: cuiusmodi est psyllij seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum succus, aut dilutum, aut aqua: quinetiam si ante coctionem maceretur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admisto rhoe, aut factitio spodio. Ad hæc quod magna tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alui fluxiones facit: vasorum enim oscula plusquam par sit aperit. Hæc lesio adimitur admistis rebus adstringentibus, cohibentibusque, nempe mastiche, cydoniis malis, succoq, ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flauis. Abradit præterea acri succo, quo scætet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenasimum excitat. Sed deletur hoc incommodum, additis humidis, pinguibus lentisque medicamentis: cuiusmodi sunt, tragacantha lacryma, bdellium, amygdalinum oleum, et rosaceum: item prunorum pulpa per se, & saccharo asseruata, psyllij spissamentum, mastiche, cydonia mala post sumpta & calida aqua post bibita: vitæ quæ medicamentum ocyus à ventriculo, & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est quod prudentes medici, quod celerius Scammonium à ventriculo, & intestinis deiciant, horum iusculum, cum saccharo superbibendum præbent. Obest postremo Scammonium cordi, iecori, ac ventriculo, substantia sua totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illi tum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, iecori, ventriculoq, opem suam præstant. Deicit Scammoniura v. lentissime bilem, quam & à vasis, & à sanguine exhaurit. Eius deiciendi facultas haud sanè aliis medicamentis absimilis est, quæ purgant cum labore & molestia. Planta Græcis Scammoneia, Latinis item Scammonea vocatur: Arabibus, Scammonea, siue Sachmunia: Italis, Scammonea.

L. Scammo-

•II. SCAMMONEA MONS-
peliaca.*



I. Scammonia Syriaca, C.B. Scammonia, Matth. Dodo.gal. Lon. Cordo in Diosc. Anguil. Cast. Lugd. Catalp. Scammonium, Dod.fol. Lob. Scammonium Syriacum, Antiochenum Scammonæ, Lob.in ico. Scammonia frutex, Ges.hort. Scammonia Antiochena, Cam. II. Scammonia Monspeliaca. Hæc radice est surculosa, fibrosa, digiti minoris crassitie, fusca, intus verò subflava: friabilis cum aliqua dulcedine acris: per cuius medium nervus flavus fertur, qui fractus minimis foraminibus plenus est: caules primo ortu erecti cubitales, postea Volubilis instar sarmen- tosi quatuor etiam cubitorum, repunt, qui concaui, foliis cinereis orbiculatis, in mucronem desinentibus & basi falcatis pediculis reptantibus: floribus stel- latis cædids, quinquefoliis, ex alarum sinu quasi um- bellatim Junio & Julio prodeuntibus: semen angu- losum. Tota planta lacteo succo turget, cuius succo aliqui Scammonio carentes eius loco vtuntur, sed maiore dosi & minori effectu. Calida ultra tertium gradum censetur. Hanc ante annos nouemdecim Monspelij in littore inter Volcarū stagnum & mare legitimus. Dicitur Scammonia Monspeliaca, Ges.hor. Cam.ad Matth. & Periploca repens. Scammonium Monspeliense, Aduer.& Lob. Scammonia Valentina & Monspeliaca, Clus.hist.Hisp. Scammonia mariti- ma Monspeliensis, Lug.Cam. cui & Coriziola Rha- sis. Volubilis marina, Tabernæmontano.

Χαμηλαία. CHAMELÆA.
CAP. CLXVI

& amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam: bilem q; foliis præfer- tum in catapotio deuoratis: namque duæ absinthij partes, adiecta chameleæ vna, a hydromelite excipiun- tur. & in catapotia coguntur: ea autem in ventre non liquefcunt, siquidem quotquot fuere deuorata, re- geruntur. Foliis cum melle tritis, sordida vlcera, & crustosa repurgantur.

Chamelæa surculosa fruticat, ramis dodrantali- bus: folia oleæ similitudinem habent, tenuiora, a Me.ύδατι ή μέλιτι. ή α- qua, aut με- λε.

I. CHAMELÆA.

II. THYMELÆA.



Θυμλαία.

Thymelæa est, ex qua granum Gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apolinum vocant, quoniam sariui lini frutex suapte natura similitudinem referat. Virgas edit pulchras, multas, tenues, binum cubitorum: foliis chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscolis, gummosisque, si mordeantur flore candido: fructu myrti in modum rotundo: qui inter initia virescit, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si viguerit granorum pars interna bibatur: verum fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta, aut in vix aceto detur, aut melle cocto obductum deuorari. Qui agrè defudant, trito semine cum nitro, & acetum guntur. Folia, quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra conditi. Quibus dare libeat, antea tundere, & neruos eximere conuenit. Illitum acetabuli modo cum soluta vini portione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina vix acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta: partus impedi necat. Nascitur in montibus, & asperis. Hallucinantur, qui coccon Gnidium fructum esse chamelææ estimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Chamelææ,
& Thymelææ
consideratio.

Chamelæam, pariter & Thymelæam Arabes confusè satis, ac perplexè Mezereon appellant. Cuius etsi duo faciunt genera, vnum album, alterum nigrum, tamen vs etiam Daphnoïdem admiscunt, & hac omnia adeo confundunt, & implicunt, vt hæc in re nihil certi, nihilq; perpetui ac tuti ex eorum scriptis elici possit. Illarum plantarum vix in excolendo corporis humores, tam vehemens, violenta, ac furiosa existit, vt nisi robustissimis hominibus tunc in medicamentum adhiberi possint: plerunque enim imbecilles confecerunt, abrais visceribus apertisq; vasorum osculis. Quare non temere eas Mauritani & terre leones, & plantas viduificas cognominauerunt. Proueniunt hæc planta numerosè in vallis Anania montibus Tridentino agro: & vtraq; (licet hoc in chamelæa præterierit Dioscorides) fructum ferunt myrti bacis similem, quam Chamelææ quadantenus longior sit, & oliua formam representet. Vtrique fructus initio sui exortus virescit, mox per maturitatem rubescit, denique exiccatus niger conspicitur. Caterum baccam, quæ à Thymelæa decerpitur, quoniam sicca piperis faciem præ se ferat, acrimoniãq; non obscuram gustantibus relinquat, rura Ananiensia, vna etiam cum Laurala semine, Piper montanum indifferenter nominant. Nec sanè mirum, quandoquidem & Theophrastus lib. 9. cap. 22. de plantarum historia, vbi de pipere disseruisset, statim Cnidij grani meminit: vtpote quod maxime piperis imaginem refert, & admodum etiam acre sentiat. Sumunt hoc piper (vt eorum nomine vtar) frequenter incola in suis purgationibus aduersus omnes ferè morbos, ita medicos, & pharmacopolas fallere credentes. Sed sæpe euenit, vt cum futuram noxam præuideant (quæ eorum multorum imperitia est) non solum se ipsos decipiant, sed etiam sibi mortem consciscant. Et hoc testari possum, quod ex montani illius piperis assumptione plures perisissent, nisi antidotis nostris succurrissem, eosq; in vita seruassisem. Ideoq; non possum non admirari Plinium, quippe qui scribat lib. 27. cap. 9. Coccognidium quod Thymelæa est fructus, de quo nunc scribimus, aluum adstringere, cum adeo exoluat, vt in magnum sæpe discrimen sumentes ducat. Et enim (vt ipse inquit Plinius) adeo vrentis gustus, vt vorari non possit nisi in pane. Proinde scite posteritati memoria prædidit Mesues, nemini Mezereon præbendum esse, nisi istis admixtis antidotis, quibus eius deleteria facultas infrenata, quæ omnia corporis principalia membra corrumpit, destruit. Habentur tamen passim in pharmacopolijs cataporis, quæ de Mezereon appellant, quibus aliquando vtuntur medici, ad aquam inter cutem extrahendam. Verum ea non adhibent exhibere (quanquam medicamenta simul receperint, quibus eorū malitia reprimatur) nisi robustis, ac fortioribus hominibus. Sunt qui contendant Theophr. Cneorum, quod duum apud illum est generum, alterum esse Chamelæam, alterum verò Thymelæam, id quod probare nituntur Dioscoridis autoritate, vtpote qui scribat, Thymelææ folia, quæ peculiariter Cneorum appellantur, per messes colligi debent. Verum ab horū vitilitigatorum falsa opinione, longè admodum distat sententia nostra, vt lib. tertio nostrarum Epistolarum ad Ioannem Cratonem Vratislauensem medicum clarissimum scribentes disseruimus. Sed (Deo Opt. max. volente) non hanc contra horum suffronum temeritatem, in secundo eorundem nostrarum Epistolarum tomo, fusius, copiosius, lucidiusq; posteritati memoria commendabimus. CNEORVM de quo meminit Theophrastus lib. 6. cap. 2. de plantarum historia, nullis deficièribus notis, misit ad me Roma vir quidem nobilitate clarus Gerardus Cibo, cuius imaginem hic appropinquauimus, vt qui chamelæam, & Thymelæam Cneorum faciunt ad mentis sanitatem redeant. Chamelæam tantum quod sciam, commemorauit Galenus in simpl. med. censu, de quo cuius viribus lib. 8. eorūdem ita scribit: Chamelæa vincetum habet qualitatem amarã. Quamobrem admodum sordida vlcera, & quæ maximas habent crustas, cum melle purgare potest. Quæ Grecis χαμυλαία, Latinis quoque Chamelæa oleastellum appellatur: Mauritani, Mezereon, seu Alemezerion: Italis, Chamelæa: Germanis, Zilandt: Gallis, Boys gentil. Quæ verò Græcè θυμελαία, Latine pariter Thymelæa vocatur: Italiæ, Timelea.

Pilule de Mezereon.

III. CNEORVM THEOPHRASTI.

Cneorum
Theoph.

Chamelææ
vires ex Gal.

Nomina.



Inter Chamelæam & Thymelæam Dioscorides differentiam fecit, at Serapio vtramque Chamelæam sic Mesues

sic Mefues Thymelææ, & Arabes Mezerei nomine. expressere. I. Chamælea Diosc. Chamælea latifolia vel alba, Serapionis: Thymelæa foliis magnis & tenuibus, Mefues: Chamælea, Matt. Lac. Cordo in Diosc. Dod. gal. & fol. Gesl. hor. Lob. Lon. Cast. Lugd. qui duas habet figuras, Chamælea prima, Clus. hist. Hisp. Chamælea altera, Cæsalp. Chamælea vera, Cam. Chamælea Arabum tricoccus, Tab. Mezereon Arabum Lob. in icon. II. Thymelæa, Dioscoridi: Chamælea tenuifolia & nigra, Serapioni: Thymelæa foliis paruis, Mefues: Thymelæa, Matth. Dod. gal. & fol. Lac. Lob. Lon. Clus. hist. Hisp. Cæsal. Lugd. qui tribus figuris expressit, Cast. Thymelæa vera, Geiner. hort. Thymelæa foliis lini, Cam. Thymelæa grani gnidij Lob. in icon. Thymelæa prima Tab. Chamælea Anguillara. III. Cneorum Theophrasti, Matthioli duplex habet in hæc Commentariis, aliud Capite de Cinamomo, de quo supra: aliud hoc in loco à superiore penitus diuersum. Hoc Cneorum candidum eidem dicitur in Compèdio, cuius figuram assumpsit Lugdunensis, Cneorum aliud Theophrasti, Matthioli nominans. Quod etsi nobis videatur nil aliud esse quam Lychnis vel Ocymoides repens montanum, quod Ocymoides repens Polygonifolia dicitur Lob. & Lugd. cui & Saponaria minor, sic Ocymoidis alterum genus paruum, Cæsalpino, & Ocymoides repens, Camerario, nolimus tamen, Matthioli figuram remouere, meliorem in historia exhibituri, cum in Apennino legerimus.

Acta

SAMBVCVS

CAP. CLXVIII

Sambuci duo genera. Vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, can-
 dicâtes, proceros: folia iuglâdis, [terna, quaternave,] ex interuallis circa ramos exeunt, grauiâ odore,
 & minutim in ambitu lecta: & in ramulorû cacuminibus, cauliculisq; circinata umbellæ, quæ florẽ cãdidũ
 pariunt: mox acinũ terebintho similẽ, in nigredine subpurpureũ, racemosũ, succo madentẽ, vinosũq;
 Alterũ genus chamæactæ vocatur, Romanis ebulum, longẽ humilius est, magisq; herbaceo generi assi-
 gnandum: caule quadrangulo, geniculato, foliis amygdala, ex interuallo longioribus geniculatim expan-
 sis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu ferratis: muscario sambuci flore, & acino eiusdem: radice niri-
 tar longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusq; vis, & vius exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho in-
 uulsi. Folia plerumq; more coquantur, ad pituitã, bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis co-
 cta, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuuat: prodest viperarum morfi-
 bus, eodem pota modo: vuluas emollit in identium, decocto: patefacit earum spiracula: & vitia corrigit.
 Acini in vino poti, eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si prætenera ac mollia ex po-
 tentia illinantur, inflammationẽ mitigant: ambustis, & canum morsibus illitu profunt: vlcera quæ dehi-
 cunt in fistulam, agglutinant. iis, qui podagra tentãtur, cum seuo taurino, aut hircino profunt illita folia.

Conclusa nõ legit Orib. a Meum μικρότερα. i. magis mala. sed Orib. μακρότερα legit. i. longiora. Car. verò μικρότερα. i. minorra, & rectius meo iudicio.

I. SAMBVCVS

II. SAMBVCVS MONTANA.



Sambucus, & Ebulus planta sunt nullis non cognitæ. Prioris etsi vnum tantum genus prodatur à Dioscoride, nobis ta-
 men duo eius obseruata sunt genera: alterum quidem montanum, & syluestre: alterum verò urbanum, plerumque in
 hortorum, & vinearum sepibus proueniens. Hac genera fructu inter se differunt: siquidem montano flores bacca non in
 umbellæ

Sambuci ge- nera.

III. SAMBUCVS AQUATICA.



Sambuci vires Matth.

Ebuli vires Matthiolo.



Vnguentum praetantillimum ad ambusta.

ambustiones hoc pacto: Sumito viridis Sambuci corticis, qui statim sub primo delitescit libro herbacei coloru libram, Cuius pluries loti ex stillatitia florum Sābuci aqua libras duas. Ferueant simul aliquādiu, & deinde percolato, & exprimis & addito cera noua odorata succi surculorū Sambuci, cuiusq; vncias 4. Rursus vt feruescant finito, quousq; succum exangit: tollito tūc ab igne, & rudicula agitato, omniaq; misceto, & ad sinē addito vernicis liquida vncias duas: Thuri albi in m-

umbella coherent perinde ac in urbano, nec mature sunt nigricant, sed in racemū vna modo dependentes. perpetuo befcūt, vniosa ac succi plena, virgū foliisq; vrbano vniosa sed minori longe proceritate adolescit. Nascitur in mēsiis & argentibus locn. Vires vrbano imbecilliores habet. Ibi vrbano discrimen facit, quod vrbano in maiorem proceritate adolescit, & leuiore constat materie. Sunt praeterea quaedam lustrem Sambucum ostendant, nempe arbusculam vrbano & palustri solo enascentem, virgū sambuci domestici amnigeniculatis, alba intus medulla, sed caduca, & fragili materia folio vitigineo: flore albo sambuci modo, odore non proceritate: a quo bacca prodeunt rubentes, oxyantha magnitudine, vinejo ac amaro succo referta, qua deuorata vomitantes cient. Succo vis est abstersoria. Aqua è sambuci florum fronti & synicipiti ilita, capitis dolores mulcet, qui a calido humore prouenerunt. Succus è radice cortice extrahitur, vntum valentissimè commouet, & aquam inter cutem pedis Praestat idem è radicibus ebuli extractus succus. Cuius & tagiam pituitam ad articulos decurrētem extrahit. Ebuli vntum per diutinas aqua lotiones à nigro circumstante succo expurgatum, datur vtiliter drachma pondere ex chamaepitris decocto, podagricis, ischiadicis, & Gallica lae laborantibus: uincet enim deiectoria vi mirifice eorum dolores, cum humores fluentes tum reuocet, tum deiciat. Sunt qui ex ebuli radicibus succum eliciāt, insolentq; subinde, & in pastillos dē, & feruentq; ad vsus. Hic clystere infusus à intestinorum, & coxendicum dolores tollit à frigiditate, & flatu genitum. Superponitur conuenienter faeminarum locū ad euocandū menses, praesertim si lana exceptus intromittatur. Suffūta oculis decocto comode ij, qui diuturna febre vexati ad inuicem accurrunt habitum, si tamen ventriculus, & iecur interea coheratur odoratis adstringentibus, & ad id conferentibus medicamentis. Paratur è Sambuco vnguentū praetantissimū ad vntum

IV. SAMB. AQUAT. POLYANTHOS.

V. EBVLVS.




...nem contra: vna quatuor: quinetiam duorum quorum allum. diu prius cohiberi agitatum. Subinde mi-
 ... & mardo vase asseruato. Eungi qui ad m. m. Sambuci audi. sedem oriuntur, in aqua rosacea
 ... & inflammationes multent. Stomatitiam cum Ebulo, tum sambuci radicem aqua, l. yerepe
 ... laborantes mirifice iuuat, si huius quaternas vncias, illius vero binas, vtriusque simul misti hauriant affecti
 ... continua. Illius ebuli radicem succus proidentem sedent reprimat, & anginam tollit, vbi circa gulam ca-
 ... in linteolis illinatur. Exusta Sambuci folia, & in puluerem trita, emanantem e naribus sanguinem sistunt. Eac-
 ... sambuci succus a recremento repurgatus & cum melle optimo coctus ad l. l. apy spissitudinem, aurium dolores tollit,
 ... imponatur. Sambuci tenerissima folia, que primo statim germinatu produunt, vna cum pari pendere radicem
 ... axurgie veteris contrita, subacta, podagricos dolores presentaneo auxilio mulcent. Meminit Sam-
 ... Galenus libro 6. simplicium medicamentorum. sic inquit: Vtraque Sambucus tum magna illa, & arbo-
 ... tum berbacea quam & chamaedem vocant, desiccandi, conglutinandis, modicisq; digerendi facultatem obtinent.
 ... Galenus. Ceterum facit Sambuci, Ebuliq; facultas, que ad cutem subeuntes aquas pellendas non parua est, vt hic
 ... quoz, arboris, in qua eadem vis non infima reperitur, historiam & facultatem describam. FRANGULA

Ad hydropē.

Sambuci vtri-
 usq; v res ex.
 Galeno.

Frangulæ
 mentio & ei-
 us vires.

VI. FRANGULA.



igitur ita vocata, quod facile frangatur, arbor est mediocri-
 proceritatis, folio fere Corni aut virga sanguinea, cortice Al-
 ni, exterius albus maculis resperso: interius vero aded flaues-
 cente, vt si mandatur, croceo colore inficiat Rhabarbari mo-
 do. Flores edit albos, fructum paruum, Pisi magnitudine, per
 medium diuisum, aded vt duabus simul baccis constare vide-
 atur, quodam natura artificio simul coniunctis. Fructus pri-
 mo exortu vires, deinde rufescit, postremo vero nigricat. Is
 duo inter se concludit ossicula, lupinorum fere figura, sed len-
 tibus paulo grandiora, in quibus nucleus habetur. Ligni ma-
 terius omnino fragilis imbecillaq; est: vnde illi nomen. Nasci-
 tur passim in Bohemia syluis & nemoribus. Cortici vis inest
 non modica. cum exoluens, tum etiam adstringens. Ideoque
 Rhabarbari modo aluum deicit, & viscera roborat. Idem bil-
 lem, & pituitam expurgat, quinetiam hydropicorum aquas
 ducit. Decoquitur cortex cum Eupatorio communi, Pontico
 Absinthio, Agrimonia, Cuscuta, Lupulo, Cinnamomo, Fœni-
 culi, Apij & vtriusq; Intubi radicibus. ad hydropem, ma-
 lum corporis habitum, & Ictericam: daturq; potandus ita
 affectus quinque vnciarum pondere, magno sanè auxilio. At-
 qui operaprecium est, vt prius excrementitij humores, qui in
 ventriculo, & primis locinoris venis decumbunt, expurgati
 fuerint. Soluit enim aluum sine vlllo incommodo, bellè iecur
 expurgans, ac roborans, aded vt quidam, qui scyrroso Iecoris,
 & lienis affectu laborant, hoc medicamento curati sint. Ape-
 rit enim omnium viscerum obstructions, & vasa omnia à
 crassorum excrementorum infarctu expedit. Extimo cortici
 facultas est adstringens: intimo autem exoluens. Vterq; simul
 ab arbore delibrari debet, in ipso statim Veris principio, ac
 dein te in vmbra sicari. Siquidem viridis nullus debet esse v-
 sus. quod vomitiones moueat. Decoctum, quod hinc paratur,

Ad hydropem.

quiescat prius oportet anteaquam propinetur, duobus aut tribus diebus, quousque flauus color in nigrum vertatur, alias
 vomitiones mouere quandoque solet. Idem potum vbi aluum non exoluert, appetitum prouocat, ob eam quam possidet
 adstringendi facultatem. Arbor hac hactenus mihi ignota fuit, nunc vero primum nota, opera ac diligentia clarissimi Do-
 ctoris Iohannis Illebrochi Dantisani, Serenissimi Principis Ferdinandi Archiducis Austria, Medici, qui cum sit rei plan-
 taria studiosus, pretermittere noluit, quin etiam suo auxilio opus hoc nostrum ornaretur. Planta qua ævτν Græcis, Sam-
 bucus Latine appellatur: Arabibus Iasacti: Italis Sambuco: Germanis Holder oder Holler: Hispanis Sambugo & Ca-
 minero: Gallis Suseau & Snyer. Sambucus montana: Græcis ævτν όπευρ: Italis Sambuco montano. At Sambucus aquati-
 ca, Italis Sambuco acquatico: Germanis Schwelcken. Sic Frangula, Italis Frangola. Qua vero χαμουαιατν Græce Ebu-
 lus Latine dicitur: Arabice Kameacti: Italis Ebulo seu Nebbio: Germanicè Aruch vnd Niderholder: Hispanicè Hiez-
 guos & Sabugo pequeimo: Gallicè Hyeble.

Nomina:

Sambucus, quod à Sambuca instrumento musico dictum putant, est domestica, quæ foliis est vel
 non laciniatis, & quidem fructu vel nigro, vel albo: vel laciniatis: altera montana racemosa, tertia aqua-
 tica flore simplici, vel pleno: hocq; colore vel albo, vel purpureo: quarta minor seu humilis, quæ Ebulus.
 I. Sambucus. Matth. Brunf. Fuch. Turn. Dod. gal & fol. Cord. in Diosc. Anguil. Lac. Gef. hor. Lob. Lon.
 Casal. Lug. Taber. Sambucus vulgaris, Trag. Thal. Sambucus domestica, Cast. Sambucus siue Sabucus
 Campestris, Cam. II. Sambucus montana, Matth. du Choul in Pilati Lugd. descriptione, Gef. hor. Cast.
 Cam. Sambucus montana racemosa, Lob. Sabucus syluestris. Trag. Lon. (quamuis & sub Acere posuerit)
 Lug. Sambuci genus aliud minus, Cord. in Diosc. Sambuci alterum genus, Casal. Sambucus tertia, Turn.
 Sambucus quarta, Dod. fol. Sambucus ceruina, Tab. Sambucus montana seu ερυθεσάφυλος aut ποινινοσά-
 φυλος, Thal. III. Sambucus aquatica, Matt. Trag. Aduer. Lob. in icon. Lug. (cui & Traupalus Theophra-
 st; Tab. Thal. Sambucus syluestris & ceruinus. Dod. gal. Sambucus palustris, vel aquatica syluestris, Gef.
 hor. Sambucus palustris, Dod. fol. Lon. Cæs Sambucus palustris fœmina, Cam. Lycostaphylon fœmina,
 Cord. in sua hist. IV. Sambucus aquatica Polianthos: Hæc à præcedenti solùm flore differt, qui cultu &
 crebro situ densissimus fit, ita vt flos albus sphaeræ instar rotundus & glomeratus sit, cuius nomine nostra-
 tes, in quorum hortis frequens, in Galliis & Italiis non visa) pilas niteas vocitant. Dicitur Lycostaphylus

Eeee mascula;

mascula, Cord. in hist. Sambucus palustris, vel aquatica hortensis, Ges. hor. Sambucus aquatica Lugj. Sambucus aquatica polyanthos, Tab. Sábucus palustris secunda, Dod. fol. Sambucus palustris mas, (C. Lob. Lon. (cui & Sambuci alterum genus.) Lug. Cast. Tab. Cæf. VI. Alnus nigra baccifera, C. B. i. r. a. g. Matt. Dod. fol. Lug. Tab. Auornus, Crescentio: Faulbaum Trag. Arbor fatida, Lon. Alnus nigra quibusdam, Dod. gal. Alnus nigra, Lob. Thal. Cam. cui & Siler Plinij. Alnus nigra baccifera, Lug. Jun. 1711.

Πυκνόκομος.

PYCNOCOMVM.

CAP. CLXIX.

† Orib. πρὸς ἐξ. ἰ. πορρι.

Pycnocomon constat eruca foliis, acrioribus, scabris, & crassis: caule quadrangulo: flore ocitru: teri- xosis locis. Semen grauiā iōmnia, & tumultuosa facit, drachmā instar potum: tumores discutit, illuc cum polenta: & spicula, adactosq; corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutunt. Radix eius in aqua mullā duum drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem extrahit.

Pycnocomi consideratio.

Nillum equidem vsquam plantam hactenus sum consecutus, quæ facie Pycnocomo responderet. Quare & hoc mihi. v. ingenuè fatear, referendum est inter alias herbas, quas hodie omnibus incomptas esse arbitror. Ita enim fieri. ut & posteris, quos spero futuros in barbaria diligentiores inquisitores, sius relinquatur scribendi locus. Nec sane quæ, quæ pigere debet, cum ex his, quæ nobis vel incognita, vel incerta sunt, aliquid inuenerit, & compertum habuerit, ad communi vtilitatem, in medium proferre. Eam ut Græci πυκνόκομος, ita Latini Pycnocomum vocant.

Nor. ina.

Ἄπιος.

APIOS.

CAP. CLXX.

Conclusa nō legit Orib. a Cat. addit. ἀπῖος. i. syl. uestis. b Cat. non legit.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spargit, [rubros,] tenues, qui à terra [parum] attolluntur. foliis a ruta, oblongioribus tamē, [& angustioribus,] herbaceis, semine paruo: radice hastula regu formam pyri turbata, rotundiore tamen, succi fœcunda, intus habet corpus candidum, extra cortice nigros. Superior pars eius vomitione bilem, pituitasq; extrahit: inferior per aluum: tota vtrinque purgationes mouet. Succu nō libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernat perna selectum exicatur. Purgat vtræque parte is succus, sesquibolo potus.

I. APIOS.

II. PSEUDOAPIOS.



Apii siue Ischadis consideratio.

Apios, quæ & Ischas appellatur, nascitur in Creta (quamquam non desunt qui velint eam quoq; prouenire in Italia, præsertim in Apulia) folijs exiguis, ruta, vel hyperico proximis, primo statim vere ab radice erumpentibus, nigrioribus tamen, alba quadam linea in longitudinem percurrente, caulibus iunceis succubentibus, lacteo siccis madentibus radice exterius nigra, intèrius candida, pyri effigie, vnde & nomen, ἄπιος enim Græcè nō aliud significat, quàm Latinis pyrum. Theoph. lib. 9. c. 10. de plant. hist. Apron huius notis representauit. Ischas siue Apios folio constat rutaceo, breui, caulibus ternis, aut quaternis, humi prostratis, radice, quæ asphodelus, verum squamosa. Nascitur in montibus. Legitur vere. Datur ad expurgandam corpus, quod altera radice parte superius, altera inferius purget: hæc ex Theophrasto. Apion legitimam, quam primum me vidisse recorder, ad me misit Venetjs Nicolaus a S. Michaeli Noucomensi, medicus singularis ingenij atque eruditionis, & rei herbarie peritissimus. Ceterum scribit Ruellius Apion frequentissimam in Gallia nasci, eiusque radice ruri pauperes per inopiam frugū reu. Sed Ruellij sententia non esse subscribendū iudico: Nam cū Apios per superna, & inferna purgationē molitur, male nomen eius haberet, qui nulla huius facultatis habita ratione, copiose (ut rustici facere solent) eius radices sumerent in cibo. Falsum quoque, in Apio censendo Fuchsius, Tragus & Lonicerus, quippe qui putent plantā, quā nos Pseudoapios vocamus, legitimum esse Apios. Siquidem hæc multiplici crescit caule, cubitali & quandoq; maiori, humi procumbente, vicia fere modo oblongus, & subasperus. Fiorit tunc præsertim mense floribus puniceo colore micantibus. pisi amulis, odoratis, racematis cobarctibus: quibus flaccis et alius siliquula oriuntur, in quibus semē concluditur. Radices habet fici, aut pyri figura terrea aut quaternæ, est armibus & proceris. Rapédula modo nigra exterius cutis & alba intus pulpa: nulla purgatoria vtilitas. Ille passim nascitur fere vbiq; in Lohæan campis, & præsertim in vineis. Sed quātū hæc distet a Dio. sc. pūta apies ap. l. 1.

Ischadis descriptio ex Theoph.

Ruell. lapsus.

Fuchsi Tragi & Loniceri opin. ex plola. Pseudoapii delineatio.

ita videntur, qui de plantaria facultate dicere & ratiocinari possunt. Apij huius nusquam, quod inuenerim, mentio- Nomina,
 nemus in simplicium medicamentorum censu. Hæc planta non secus Latinis & Italis Apios, atque Græcis ἀπιος
 nominatur. At Pseudoapios: Italis Apio falso: Germanis Erdnüss.

I. Tithymalus tuberolâ radice, C. B. Ischias Theophrasti, Caricam Gaza vertit. Apios, Matth. Dod. gal. Lacu. Anguil. Lob. Cast. Lugd. Taber. Apios vera, Lob. in icon. Tithymalus tuberolus, Dod. fol. Lugd. qui & Matthioli & Dodonæi figuram exhibet. II. Pseudoapios, Matth. Apios, Trag. Fuch. Apios Fuchti, Lug. Cam. Chamæbalanus, Dod. gal. Taber. Astragalus, Turn. quo nomine & Matthioli-
 bus alibi in se, in prima editione aliqui autumant, cuius figuram suo loco reposuimus. Astragalus ar-
 gentis Thal. Terræ glandes, Lob. Dod. fol. Glandes terrestres, Clus. hist. Panno. Ornithogalum purpu-
 reum, Cordo in Dioscor. Panis porcinus, Lonicero.

Κολοκύνθης.

COLOCYNTHIS.

CAP. CLXXI.

Colocynthis sarmēta, foliaq; satiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa: fructum in spe-
 ciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in
 pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua
 multâ, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, &
 melle clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitiis, vt quæ bilem, pi-
 tuitam, & strigmenta, interdum etiam crurorem eliciant: fœtus admotæ enecant. Dentium dolorem
 2. totâ si vna repurgetur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluan-
 tur. Si aqua multâ, aut passum in eadem incoquatur, & sub dio refrigescat, potu crassum humorem,
 & strigmenta alui detrahet: stomacho supra modum aduersatur: subdita ex ea balano alui excrementa eii-
 ciuntur. Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

COLOCYNTHIS.

Colocynthis plantæ



Colocynthis planta est tam medicis, quàm seplasiarijs Colocynthi-
 vulgaris notitia. Verùm etsi (vt Mesues est author) pra- dis confid.

stantissimum ex eius fructu paretur medicamentum ad va-
 ria morborum genera, ea tamen cordi, iecinori, & ventricu-
 lo maxime aduersatur: quin & vniuersum perturbat corpus,
 fastidium, & intestinorum tormina excitans. Abradit enim
 intestina & vasorum oscula aperit, aded vt etiam cruenta
 sepe eliciat. Hinc meritò sit, vt eam dari prohibeant, nisi pri-
 us malefica eius vis prorsus aboleatur, ijs additis antidotiis,
 qua ad id prastant: cuiusmodi sunt illa, qua ventriculum,
 iecur, & cor tum roborare tum tueri possunt, & qua lentore
 suo glutinandi vim habent. Colocynthis trahit pituitosa,
 crassa, lentâq; corporis excrementa in remotioribus partibus
 delitescentia: proinde cerebrum, & neruos expurgat, nec
 non etiam musculos, thoracem, & pulmonem. Eam ob cau-
 sam vertiginosis, comitialibus, resolutis, conuulsis, hemicra-
 nia, diurnoq; capitis dolore affectis, asthmaticis, & agere
 spirantibus vtiliter in catapotijs exhibetur. Collachryman-
 tes adiuuat oculos, & diutina tussi laborantes. Est præterea
 vis eius efficax ad omnes frigidos articulorum dolores, præser-
 tim podagricos, & ischiadicos: ad qua non modo in catapo-
 tijs deuoratur, sed etiam clysteribus infunditur: quibus sanè
 nil præstantius est ad coli cruciatu ex flatu & frigiditate præ-
 gnatos. Pellit aquas tam bibita, quàm per sedem infusa. Fit
 è colocynthidis fructu oleum, ad retardandam canitiem, de-
 nigrandos capillos, & eorum defluuium cohibendum, si ex-
 empta è fructu pulpa, cavitatis oleo repleatur, & in cineribus
 decoquatur. Eodem mulcentur aurium dolores, & earum
 incerti sonitus discutuntur: quinetiam oleo ipso & felle bu-
 bulo interaneorū vermes necantur, si simul miscentur, & ca-
 lida vmbilico illinantur. Colocynthidis vires retulit Galenus

Colocynthi-
dis vires.

Colocynthi-
dis vires ex
Gal.

lib. 6. simplicium medicamentorum his verbis: Colocynthis Nomina:
 gustu amara est, sed qua amarissimo medicamento epoto adsunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facul-
 tatem, quam validam in se continet, nimirum cum ijs, qua expurgat, antè & ipsa per aluum excerni præuertens. Viridis
 60 ipsius succus intritus ischiadibus prodest. Κολοκύνθης sic Græcis, Latinis item Colocynthis, & Cucurbita syluestris appellatur
 Arabibus Chandel, Handal seu Handal: Italis & Hispanis Coloquintida: Germanis Coloquint vnd Wilder Kürbß:
 Gallis Coloquinte & Courle sauuage.

Colocynthidis varia habentur genera, alia minor fungosa & leuis, quæ officinarum est: alia maior ob-
 longa, vel flaua, vel candida: alia rotunda varia: alia sessilis nigra maculata, magna instar Cucurbitæ: & alia
 minor: alia denique turbinata, seu pyriformis. Hic pingitur Colocynthis fructu rotundo maior: quæ
 Colocynthis, Matth. Fuch. Cord. in Diosc. (cui & Cucurbita delerti) Lac. Gel. hor. Dod. fol. Lob. (cui &
 Cucurbita amara Cathartica in iconibus) Lon. Lugd. (cui & Arabum plantarum mors) Castor. Cam.
 Colocynthis vera, Trag. Colocynthis prima, Dod. gal. Colocynthis mas, Taber. Coloquintida, Turn.
 Anguil. Cucurbita agrestis, Brunf. Cucurbita syluestris fructu rotundo, Cæsalpino.

Επιθυμόν.

EPITHYMVM.

CAP. CLXXII.

Epithymon flos est è thymo duriore satureiæ simili. Capitula habet tenuia, & leuia: & in eis candidas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemquè atram per inferna. Pnuatum prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura ad quatuor drachmas, cum melle, sale, & accu- guo. Plurimum in Cappadocia, & Pamphylia gignitur.

Epithymi
consideratio.

I. EPITHYMVM.

Epithymum
Græcorum
& Arabum an
diuersum.Multorum
opinio repræ-
bata.

Epithymi vi- rant, cum ita scribunt: Epithymum atram bilem excernit. Datur adultis tusum, & cribro excussum, scrupulorum qua-
res. tuor pondere, cum passo, vel oxymelite, & salis modico. Vitij flatu turgentibus, & præcordiorum noxis opitulatur, &
Epistæbe & quibus iecur aggrauatur, & ijs, qui spirandi vexantur difficultate. Quod verò in stæbe nascitur, aut in satureia profilit,
Epithymbrū. Epistæbe, atque Epithymbrum inde appellatum, thymi modo aluum resoluit: sed vtrunque facultate censetur inferum:
hæc illi ambo. Quæ sanè liquidò ostendunt, quòd non secus Epithymbrum thymbræ, & Epistæbe stæba innascatur, atque
Epithymum in thymo nascitur, vel profilit. Hoc idem præter Aetium, & Actuarium longè antea testatus est grandis
author Paulus, Dioscoridis & Galeni sectator acerrimus ijs verbis: Epithymum inter ea, quæ atram bilem extrahunt, præ-
stantissimum est remedium. Dantur ipsius drachma quinque laugata ex lactis hemina. Epithymbrum verò, quòd thym-
bræ innascitur, epithymo similiter euacuat, sed imbecillius est: hæcenus Paulus. Ex his itaque omnibus non dubitauerim
asserere, vnum tantum esse epithymum, non autem plura. Quandoquidem si Paulus, Aëtius, & Actuarius pro certo non
habuissent, legitimum Epithymum esse illum thymi florem, de quo scribit Dioscorides, putassentq; duo eius genera re-
periri, nulli dubium est, quin & ipsi explicassent duplex in thymo nasci Epithymum. Verùm cum compertum haberent,
vnum & idem esse medicamentum capillamentumq; quòd in thymo, thymbro, & stæbe profilit, ijsq; nullo radice admini-
culo conuoluitur, & implicatur, sibi visum est, quòd suo tempore Epithymum vulgaris notitia medicamentum esset, sed
fore declarasse non modo id in thymo gigni, sed etiam stæbe, thymbræ, & (vt nos sæpe vidimus) in polio, & chama-
dry: vt hinc scirent medici, in epithymi defectu, epithymbrum, vel epistæbem substitui posse: quin etiam vt non igno-
rarent, id capillamentum harum plantarum propriam non esse partem, neque suam habere sedem, sed ascititium
quoddam esse exterius adueniens, & in ijs profiliens, & viuens. His igitur rationibus adducor, vt non temerè existimem,
Dioscoridis codicem, quem Plinius habuit, fuisse (vt diximus) deprauatum, & ob id ipsum Plinium deceptum esse: aut hinc
aliunde accepisse occasionem, vt duo magno errore faceret Epithymi genera. Quòd autem Dioscorides epithymum florem
thymi dixerit, haud ineptè dictū putauerim, nam cum is sciret Epithymum thymo innasci, nulla radice propria, sed thymi
adminiculo fultum, floresque per se albos ferre, qui cum in thymo sunt, huius planta proprii videntur, ideo non absurdum
fore duxit scribere, Epithymum esse florem durioris thymi. Sed quòd Epithymum flores albos ferat, declarasse videretur Di-
oscorides, cum dicit: Capitula habet tenuia, leuia, caudiculas habentia capillorum modo. Siquidem his notis non de-
scripsit Dioscorides thymi florem superius libro tertio (vt Brasauolus asserit) sed capitulis in cacumine, flore purpureo
scente refertis, nulla caudicularum, neque capillorum habita mentione. Præterea conuicere licet Dioscoridem epithymum
thymi florem appellasse, quòd a thymo decerpatur eo duntaxat tempore, quo epithymum ipsum largè flores. Nam
quòd pro epithymo non intellexerit is purpureum thymi florem, hinc perspicud apparet: quoniam de epithymi vi-
ribus libro 3. vbi de thymo & eius floribus egit, nihil in medium protulit, nimirum eam ob causam, quòd epithy-
mum propriam thymi particulam non existimauerit esse, sed (vt supra dictum est) ascititium quoddam, vt in arboribus
inueniuntur.

In hac equidem opinione versantur complures huius etatis
medici rei herbarie periti, quemadmodum Brasauolus Fer-
variensis, vt credant Dioscoridis, aliorumq; Græcorum Ep-
thymum magno discrimine ab eo diuersum esse, de quo scri-
pserunt Mauriani, præsertimq; ab illo, cuius meminit Me-
sues. Quippe qui asserant, nil aliud Arabicum epithymum
esse, quàm capillaris cassuthæ genus quoddam, quòd thymo
circumuoluitur. Græcum verò idem esse volunt cum proprio
flore durioris thymi satureia similis. Suam autem sententiam
hoc argumento comprobare videntur, quòd si vulgaris vsus
epithymum, Arabicum scilicet illud esset, de quo differit Di-
oscorides, is non dixisset, Epithymū florem esse durioris thymi,
sed alterius planta thymo adnascens, eiq; sese conuolucata.
Id quòd etiam Pliny auctoritate confirmant, vt qui eorum
opinionem ex eo maxime adstipulari videatur, quòd duo Epi-
thymi genera prodiderit lib. 26. cap. 8. vbi sic inquit: Epithy-
mum est flos è thymo satureia simili. Differentia, quòd hic
herbaceus est, alterius thymi albus. Quidam aliter epithymum
tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pallioli (radice
fortè pili legendum esset) rubens: hæc Plinius. Ex quibus vi-
que planum sit, duo esse Epithymi genera: quorum alterum il-
li ad Græcos, alterum ad Arabas referunt, & ita sententiam
sententiam. Horum certè iudicio ego quoq; facile subscri-
berem, nisi quadam sese nobis offerrent, quæ aperte redam-
mare videntur, atque etiam ostendere, Plinium ipsum Di-
oscoridis codicem, vnde illa mutuatus est, deprauatum habuisse,
vel alium auctorem in hoc minus grauem secutum fuisse,
vel se ipsum deceptum, vt in alijs compluribus illi enuisse ad-
notauimus. Palam etenim faciunt, quantum equidem reor,
nostri vsus, & Dioscoridis epithymum, vnum & idem esse
medicamentum, quæ de eo Aëtius, & Actuarius, Dioscoridem,
& Galenum secuti, concordem posteritatis memoria probabunt.


... cum, qua tamen legitime arborum partes non sunt, sed viribus & facultate diuersa. His igitur rationibus, ...
 ... de thymo, & eius floribus libro tertio inter odoratas plantas: de epithymo vero, tan-
 ... in hoc libro quarto inter deicloria medicamenta. Similiter de arboribus, quibus vi-
 ... de ipso autem visco libro tertio cum his medicamentis, quae suo lentore glutinant.
 ... quod Latinus modo sub, modo in significat. Vnde nil aliud nobis
 ... quam in thymo, vel sub thymo. Id quod flori thymi quomodo conuenire possit, non video: ut pote qui
 ... sed super thymo, ea eminentiori parte, qua capitula emergunt. His alia accedit
 ... Dioscorides Epithimum plurimum in Cappadocia & Pamphylia gigni, facile colligi potest, i-
 ... Quippe si Epithimum proprii thymi florem esse duxisset, ei sine opus non fuis-
 ... in locis epithimum copiosius proueneret, quam alibi: quoniam scripsisse sat erat, oriri epithy-
 ... hoc argumento, quod thymum vterumque nascatur, aestate suos edat flores. Epithy-
 ... ca simili nos sepius legimus prope Corinthiam, Saluatinio & Gargaro montibus supra Salicanum,
 ... genere copiose vestiuntur, sed cui epithimum insidet eo tantum tractu, qui ad meridiem spectat.
 ... tamen thymo omni ex parte statent, nisi tamen thymi planta mihi licuit inuenire, in quibus Epi-
 ... nisi in amoeniore montis parte, ubi herba enata austro perflantur. Quamobrem nil mirum esse de-
 ... Cappadocia epithimum frequentissimum proueniat. Sed quoniam tot scio me frustra huc ad-
 ... quibus meam firmavi sententiam, nisi etiam Plinii auctoritati, qua nititur Brasauolus, clarius re-
 ... idcirco illi ita responsum volo, quod cum Plinius Dioscoridis mentem, à quo priorem suorum verborum par-
 ... non recte percepit, ideo non affirmatè, sed dubiè duo fecit Epithymi genera, & aliorum potius,
 ... Epithimum est flos thymi Satureia simili. Differentia, quod hic herbaceus
 ... alterius thymi albus. Quidam aliter epithimum tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pili, &c. Porro verò
 ... quod maiori, duriori-que thymo herbaceum florem, minori verò album red-
 ... candidus, modo in candido purpurascens. Hinc itaq; per-
 ... de epithymo, & thymo tractasse Plinium, ut nihil certi in hac re ex eius verbis
 ... mea quidem sententia, in Epithymi historia, etiam Monachi illi reuerendi, qui in
 ... Monachorum exposi-
 ... tione vana.
 ... Certissimè à paucis verus sensus verborum Dio-
 ... epithimum flos est thymi satureia
 ... sed asserit illud dictum
 ... quae etiam & supra thymbram generatur hu-
 ... sicut supra thymum: hac Patres illi. In quibus facile cognoscitur horum inanis quaedam iactan-
 ... quod sensus verborum obscuros, claros reddere profiteantur, atque his subinde, ut mi-
 ... quod non comparat Epithimum, quod florem thymi vocat, flori satureia, ut Monachi illi malè interpretan-
 ... ad thymum tantum refert:
 ... satureia simile fa-
 ... duo habentur genera. Vnum maius sa-
 ... in quo epithimum profilit. Alterum minus, te-
 ... in quo nullum nascitur epithimum.
 ... quare ne quisquam for-
 ... id tantum
 ... prodidit. Sed satis superque de Epithy-
 ... iam medicinae reddenda est ratio, & de
 ... Epithimum
 ... quod valen-
 ... atram bilem excernit, idque facile,
 ... praestat. Efficax est ad morbos cere-
 ... diuturnos capitis do-
 ... agritudines. Confert cordis tremo-
 ... animi deliquis. Præterea cunctis lienis affectibus mi-
 ... item renum vitis, & hypochondriaca melan-
 ... vexatis. Frequens est epithymi vsus: datur enim utilissi-
 ... elephantiasin, & vlcera maligna,
 ... quartana febre detentos liberat. Epithymi
 ... Galenus libro 6. simplicium me-
 ... Epithimum thymi facultatem
 ... excicat, & excalfacit, ordine ter-
 ... Galenus. Verum quia Epithimum ab similitu-
 ... ad memoriam reuocauit CASSUTHAMITA
 ... medicis vocatam, licet officinis, & herbario-
 ... Cuscuta nominetur. At cum à veteribus
 ... de ea memoria proditum sit, hic
 ... ut de ea aliquid disseramus. Cuscuta
 ... ut in frutices, & herbas epithymi
 ... nulla ra-
 ... prodeuntibus cirris, capit-
 ... longissimis. Hac statim ab exorta plantarum ra-
 ... mulis

Epithimum ubi plurimum

Plinii lapsus

Monachorum exposi-
 tione vana.

II. CUSCUTA.



... illud genitium eorum ad thymum tantum refert:
 ... cui Epithimum insidet, satureia simile fa-
 ... Thymi namque duo habentur genera. Vnum maius sa-
 ... in quo epithimum profilit. Alterum minus, te-
 ... in quo nullum nascitur epithimum.
 ... quare ne quisquam for-
 ... id tantum
 ... prodidit. Sed satis superque de Epithy-
 ... iam medicinae reddenda est ratio, & de
 ... Epithimum
 ... quod valen-
 ... atram bilem excernit, idque facile,
 ... praestat. Efficax est ad morbos cere-
 ... diuturnos capitis do-
 ... agritudines. Confert cordis tremo-
 ... animi deliquis. Præterea cunctis lienis affectibus mi-
 ... item renum vitis, & hypochondriaca melan-
 ... vexatis. Frequens est epithymi vsus: datur enim utilissi-
 ... elephantiasin, & vlcera maligna,
 ... quartana febre detentos liberat. Epithymi
 ... Galenus libro 6. simplicium me-
 ... Epithimum thymi facultatem
 ... excicat, & excalfacit, ordine ter-
 ... Galenus. Verum quia Epithimum ab similitu-
 ... ad memoriam reuocauit CASSUTHAMITA
 ... medicis vocatam, licet officinis, & herbario-
 ... Cuscuta nominetur. At cum à veteribus
 ... de ea memoria proditum sit, hic
 ... ut de ea aliquid disseramus. Cuscuta
 ... ut in frutices, & herbas epithymi
 ... nulla ra-
 ... prodeuntibus cirris, capit-
 ... longissimis. Hac statim ab exorta plantarum ra-
 ... mulis

Epithymi vi-
 res ex Mesue,
 & Gal.

Cassutha hi-
 sto. & vires.

Cassyta Plin.

Cuscute vi-
res Matth.

Nomina,

mulis se implicat, & adeo crebris inuolutionibus his se circumuoluit, vt breui plantas ipsas strangulet, atque enecet. Foli-
is nullis vnquam vestita visitur. Flores tamen edit albos quam plurimos, quibusdam in capitulis, a quibus semen terne pro-
dit, sed superuacuum. Cirri rufescunt, vitium capreolis crassitudine, & facie pares. Sunt qui putent, admirabile hoc pinguis
genus Plinio Cassytam appellari, & proinde eam Cassutham nominant. Is vero libro 16. capite vltimo, ita scriptum re-
liquit. Est & in Syria herba, que vocatur Cassytas, non tantum arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluentibus se. Na-
boribus tantum, & spinis se circumuoluat, nostra vero Cuscuta duntaxat herbas, & frutices, non arbores completam
& irretiat, non ausim affirmare vulgarem Cuscutam esse Plinij Cassytam, presertim cum in Syria tantum nascitur. Quo-
ipse Plinius. Credidei e praterca plerique Cuscute eandem inesse facultatem, que & plantis inest, in quibus nascitur. Quo-
rum vtique sententiam potius probandam, quam refellendam censeo, argumento quod Epithymum iisdem, Galeni ratio-
nitate, polleat viribus, quibus & thymum. Excalscit Cuscuta ordine primo, siccaturq; secundo. Abstergit, & quadam com-
adstrictione roborat. Iecoris obstructions aperit, infarcti lienis vitia expedit: venas pituitosis, atque biliosis exonerat humo-
ribus: urinam pellit, & regio morbo subuenit. Puerorum febribus auxiliatur: sed diuturno vsu ventriculum grauat, qua-
tamen noxia tollitur, si Anisi momentum adijciatur. Bilem deiecit, presertim absynthio admista. In quem vsu decoqui-
tur, bibiturq; eius decocti selibra, cum sacchari sesquuncia. Quod Græci ἐπιθύμιον: Latini quoq; Epithymū dicunt: Man-
tani Esitimo seu Esichemo: Itali Epithimo: Hispani Cabellos seu flores del thomilho: Galli Teigne de thyn. At Cuscuta, Ita-
lis Cuscuta: Germanis Flachsfeiden: Gallis couche in icy.

Quemadmodum Thymo circumnascitur capillamentum Cuscute modo, sic & circa Polium ma-
ritimum, Thymbram, Rosmarinum Monspelii obseruauimus: aliquando & in Hyssopo notare est. Hæc
Epithymum dicitur Matthiolo, Lac Cast. Lug. Cæsal. Taber. Epithymum Græcorum & Arabum. Lob.
Lugd. Cassutha minor, Dodonæo historia latina in folio. II. Cuscuta duplex, vel albo vel ruffo colore,
que passim herbis adnascitur, potissimum Vrticæ maiori, lupulo, rubo, vepribus, lino: Sic Cytho, Tri-
folio corniculato: dicitur Cuscuta, Matthiolo, Anguil. Lon. Clus. hist. Panno. Cast. Cæsal. & Oroban-
che Theophrasti: Cassuta, Fuch. Turn. Dod. fol. Lugd. Thal. Cassytha, Dod. gal. (cui & Podagra &
Angina lini, Ges. hort. (& Linodesmon) Tab. Cassytha Plinii, Lobel. Androfases, Trago. Lino. Loph. Ant. vlt. 10
Vid. Saliger in loco cit.

Ἄλυπον.

ALYPVM.

CAP. CLXXIII

Conclusa nō
legit Orb.

Alypon furculosa herba est, subrubra: gracilibus ramulis: tenuibus foliis: flore molli, leui, & copioso:
radice [betæ, tenui,] referta acri succo: [semine epithymi.] Gignitur in maritimis, maxime Libyz,
quam largissima, quanquam alibi quoque plurima prouenit. Semen atram bilem deiecit, si mensura epi-
thymo pari cum sale, & aceto sumatur: verum interanea leuiter exulcerat.

Alypi confi-
deratio.

Alypum eiusq; radix (si Actuarius credimus) nil aliud sanè fuerit, quam officinarum Turpetum, Turbit Arabum &
ctum, quod album vocant. Ipse enim suo de compositione medicamentorum libello, vbi minoris paranda Turpetum
tionem docet (si rectè vertit Ruellius) sic inquit: Si hoc medicamento pituita deiectionem moliri insituis, alypum, atq;
album turpetum addas. Idem post, vbi de simplicibus medi-
camentis vomitibus tractauit, ita scribit: Turpe-
tum, quod radix est pitrysa, & album alypia, glutinosas
destrahit pituitam. Verum quia idem Actuarius, paulo an-
te Alypum describens, prodidit eius semen atram bilem per
alium ducere, putauere quidam Actuarius alypiam ab aly-
po differre, quod huius seminis tantum vires reddiderit. Sed
ijs respondi potest, quod cum probe sciret Actuarius alium vni
inesse semini, aliam verò radicibus, proinde de radicibus
turpeti, de semine sub Alypi nomine differuit. Plantam
habentur, quæ alium folijs, alium semine, alium radicibus
effectum præbent. Medium herba nobis exemplo erit, quæ
Dioscoridis testimonio, menses sistit, cum tamen eius semen
contrarium efficiat. Quamobrem facile crediderim Alypum
& Alypiam nullis inter se notis dissidere: nec modo huius
nibus fretus, sed etiam Pauli autoritate: quippe qui libro
Alypum inter ea, quæ atram bilem depellunt, commemorauit
us verbis: Alypi semen inferius atram purgare bilem pa-
ri epithymo mensura, cum sale & aceto, dictum est: inesti-
na verò, si fidem Dioscoridi accommodamus, leuiter exulce-
rat. Est autem, meo iudicio, quæ nunc Alypias vocatur. hæc
Paulus. Ex quibus palam est, Paulo nullam inter Alypum,
& Alypiam fieri differentiam. Sed hæc dicta sint ad Actua-
rii mentem, non quidem ad præfixam sententiam nostram. So-
nam cum tantum radices solas, eaq; in particulas dissectas,
nec vsquam viuam earum plantam viderim, ex vnguentum
tantum leonem non iudicabo. Ideoque velim, vt aliorum
sit quoque iudicium, & presertim cum parum refert
ad morbos curandos, scire cuius planta Turpetum sit
radix, cum eius facultates optimè à medicis perspe-
ctæ sint. Caterum ad nos solam radicem deferri, nec
vllum hæctenus qui plantam, vel semen ostenderit, me
uactum fuisse, antea prædiderant in commentarij ra-
stru ita-

ALYPVM.

Opinio quo-
rundam refu-
tata,

Plantæ dicitur
forum effe-
ctuum.

Alypi vires ex
Paulo.



Handwritten notes at the bottom of the page, including the name 'Alypum' and some illegible scribbles.

pro ualida lingua conscriptis. Verum hoc tempore Lucas Gbinus vir rei medica eruditissimus, Pisis herbam hanc pro Aly-
pi ad nos misit, cuius hic piceturam datus, qua quidem descriptioni pulchre quadrare deprehenditur. Alypi, quod legerim,
non meminit Galenus in simplicium medicamentorum censu. Hic de Turpeti viribus nobis differendum esset, nisi superius in
Terrely commentatione, eius historiam ac facultates latius prosecuti essemus, quam ut adhuc plura dicenda, vel addenda
superfint. Herba, quae ἀλύπιος Græcè, Alypum quoq; & Alypia Latine dicitur: Italicè Alipo. Nomina.

Alypum, ut Matthiælus expressit, etiam Lacuna & Lugdunensis exhibent, & sub Alypia Lonicerus:
etiam perfectiorem adposuimus figuram. Dicitur Alypum montis Ceti, Aduer. & Lob. Alypum & Her-
be terribilis. Tab. Lugd. Hippoglossum Valentinum, Clus. hist. Hisp. & Tabernæmontano, qui duas pro-
prietate figurat. Empetrum phacoides in Lugdunensi historia, ubi tres diuersæ unius plantæ figuræ exhibentur:
non mirum ergo si magnum sit volumen, quod si semel atq; iterum hoc contigisset, excusandus foret, cum nemo sit tam solide doctus, quem non aliquando cespitare & labi contingat.

Empetrum.

EMPETRYM.

CAP. CLXXIII.

Empetron aliqui Phacoides vocant, nascitur in montibus & maritimis, falso gustu: sed quod propius
terreno fuerit, amariuscule sentitur. Trahit bilem, pituitam & aquam, si bibatur in iure aliquo aut
hydromelice. Empetri cap. deest in meo exemplari.

Empetri herbe faciem nullus prorsus notus depinxit Dioscorides. Vnde solo nomine nobis de hac herba potius diuinan-
dum est, quam quod aliquid certi ac perpetui statui possit. Non desunt tamen qui Oedipum se faciunt, & hac Dio-
scoridu obiecta quasi anigmata audeant soluere. Hi siquidem Empetron eam plantam putant esse, quam hodie Romani
Feniculum marinum appellant, aly vulgari sermone herba di. San. Piero. Sed hanc nos superius lib. secundo legitimum es-
se Crithmum, pluribus probauimus. Porro & ubi nascatur Empetron, & quibus facultatibus sit praditum, Plinius quoq;
trahit lib. 2. cap. 9. ita ut ea plane a Dioscoride mutuatus deprehendatur. Verum in reddendis medicinis, nominis for-
tasse similitudine deceptus, quod Empetron Saxifragam esse existimauerit, vires, quas vtrique seorsum tribuit Dioscorides, i-
pse ut Empetro assignauit, addens huic, quod vrinam cieat, & calculos frangat: quæ medicina saxifraga debentur. Qua in
re Plinium omnino trasse fatendum est. Empetri mentio in Galeno lib. 6. simplicium medicamentorum, ubi de eius viri-
bus hanc modum differit: Empetron ad solas purgationes videtur esse commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu sal-
sum esse: promde ad alia quoq; ut artis licet, ad quæ pollece ostendimus substantiam falfam. Nominatur item prasoides. Hæc
Galenus: qui tamen a Dioscoride in nomenclatura discordat: quandoquidem alter Empetron phacoides à quibusdam vo-
cari prodidit, alter vero prasoides dicitur: Quare non deest suspitio, quin aut horum alter errauerit, aut alterius codex hoc
in loco sit deprauatus. Non enim video, quomodo rectè idem Empetron simile reddi possit, & lenti & porro, ut illa nomina
demonstrant. Quod Græcè ἀμπετρον, Latini similiter Empetrum & Calcifragam nominant: Itali Empetro. Nomina.

Αμπετρον.

VITIS SYLVESTRIS.

CAP. CLXXV.

Vitis syluestris sarmenta vitis a modo prælonga a Orib. addit.
emittit, aspera, lignosa, [rimoso cortice,] foliis
hortensis solani, longioribus ac latioribus, b musco-
fo flore & capillaceo: fructu exiguis vuis simili, post
maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies.
Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus vini a-
qua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideo hy-
dropicis datur. Vux eius vitia cutis in facie & macu-
las omnes expurgant. Enascentes viticulæ, cibi gra-
tia, sale condiuntur. vitis vinifera.
Orib. non le-
git, rimoso
cortice.
b Orib. legit.
i. racemoso.

Vitis syluestris cuius imaginem hic appingi curauimus, i-
ta nobis appellanda fuit, non quod omnino Dioscoridis
ἀμπελον ἀγρεια eam facere velimus: sed quod plures habeat
notas, ac etiam facultates quæ illam representant. Siquidem
sarmenta vitis modo emittit, folia habet hortensis Solani, fru-
ctum exiguis vuis similem, post maturitatem rubentem, cu-
ius acinorum facies rotunda est. Nam hæc omnia vitis sylue-
stris sunt indicia. Repugnat tamen florum figura, quod mu-
scosi non sint, nec capillacei, sed racematim coherentes. Verum
cum in Oribasij codice, qui ex Dioscoride transcribit, lega-
tur βοτρυώδεις non βρωώδεις, hoc loco, deprauatam esse
Dioscoridis lectionem, haud temerè censemus, & præsertim,
quod rationi magis consentanea sit Oribasij lectio, quam quæ
Dioscoridi (ut puto) deprauatè legitur. Siquidem nullam
scio plantam, fructum vix modo proferentem, quæ flores ra-
cemosos non fundat, aded ut omnino stupidus dici possit, qui
aliter contendat. Præterea nec illud nobis ob stare videtur,
quod hæc planta rimoso cortice non sit, cum etiam verbum
illud ῥιμοσφάγῳ in Oribasio non legatur. Adde quoque,
quod hæc planta, omnibus suis facultatibus, agresti viti
bellè correspondeat. Nostra enim mulieres in Hetru-
Eccc 4 ris



Solanum dubitanum

Vitalba non
est vitis agr.
Attagene.

Amara dul-
cis.

Vitis sylue-
stris vires ex
Galeno.

Nomina.

via acinorum succo vtuntur ad faciei nitorem, & ad lentigines maculasq; delendas. Nec desunt, qui scriptis mandauerint, sarmentorum & radicum decocto, ex vino a bo in operculato fictili parato, sanari hydropicos & Regio morbo affectos, quod non solum aluum exoluat, sed vrinam quoq; moueat. Quibus rationibus & autoritatibus fretus (si vel non sit hac planta Dioscoridis ἀμπέλος ἀγρία) non ab re esse nobis visum est, syluestrem vitem hanc stirpem appellari posse, quoniam non appareat Dioscoridis, qui aliam veriore demostret. Nascitur in dumeris, sepibus, syluis & montibus. Sed quam magis hallucinentur, qui Vitibam nobis vulgò vocatam, quam alterius Clematidis genus esse statuimus, agrestem vitē iam, alias longiori commentatione (Deo permittente) differemus. Theophrastus vitem syluestrem Attagenam vocasse videtur, lib. 5. cap. vltimo de plantarum historia, vbi de somnitiis ad ignem concipiendum egit. Antiqua enim etas chalybem for- tasse non experta, ex ligno duriore, & fungoso ignem parabat: ad quod, meo iudicio, syluestris vitis materies admodum e- pta fuit. Fuchsius, Tragus, & alij nonnulli, qui in Germania de Stirpium natura & facultatibus scripserunt, agrestem hanc nostram vitem Amaram dulcem appellauerunt, quòd mansus sarmentorum cortex primo statim occurru amarus, & deinde paulò post dulcis sentiatur, & praesertim si diutius ruminetur. De huius vitis syluestris viribus scripsit Galenus lib. 6. simplicium medicamentorum in his verbis: Vitis agrestis racemi extergendi vim habent, vt ephela & nauos, & idem omni in extrema cute existentia curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina obtinent, qua & condiari assolent. Quae vitis ἀμπέλος ἀγρία Graecis, Vitis syluestris Latinus vocatur: Vite saluatica Italis.

Solanum scandens seu Dulcamara, à corticis sapore, C. B. Vitis syluestris, Matthiolo, Lacu. Castor. Cam. Dulcis amara, Trag. Dulcamara, Dod. gal. & fol. cui & Cyclaminus altera Dioscoridis. Dulcamara & Melothron Theophrasti, Lugd. Amara dulcis, Anguil. Ges. hort. Lonic. Lobel. (cui & Siliquastrum Plinii Guilandini & Solanum lignosum) Taber. Amatum dulce Solano somnifico cognatum, Cordo. 10. Dioscor. Solanum fruticosum, Ges. hort. Solanum γλυκόπιικρον Thal. Salicastrum Plinii, Casalp. Curca Monspehensium, Camerario. Vulgatum flore est caeruleo, reperitur aliquando & albo.

Ἀμπέλος λευκή.

VITIS ALBA.

CAP. CLXXVI

Conclusa nō
legit Orio.
a Dragom.
ἡρίζα λευκή
καὶ παχέα,
ὡς κ' ὑψημ.
Radix candi-
da & crassa,
vt & germen.

Vitem albam aliqui bryoniam vocant. Foliis, viticulis, pampinisq; satiuam vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se naeta sit frutices, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in vna dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, [qui prima germinatione exeunt,] decoctum cibo, aluum & vrinam cient. a Folia, fructus, radix, acrem vium fortiuntur: itaq; vlcera phagedanis, gangranis, chironiis, putrentium tibiaram radio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie varosq;, lentigines & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & fano graeco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, vsq; dum liquecat: fugillata tollit, & redivias committit: inflammationes discutit illita ex vino: suppurationes rumpit: medicamento apte immiscetur, quod carne excis: infraeta ossa extrahit, trita & imposita. Datur comitialibus in potu drachmae pondere, quotidie anno toto: prodest attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra viperarum i-ctus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdum subvertat. Feminarum locis ap-posita, partus secundasq; morantes trahit: cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, vultis, ruptis & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres quoq; infusus decoquitur, siquidem vulvas purgat, sed abortum facit. Succus e radice vere exprimitur, qui trahit pituitam cum aqua mulla potus. Ad psoras, & lepras semen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto forbeat.

VITIS ALBA.



Vitis albæ
confideratio
& vires.

Bryonia fru-
ctu nigro.

Vitis alba officinis, & herbarijs Bryonia nominatur: vulgò mulieribus Cucurbita syluestris dicitur. Nota omnibus fere planta est, quòd passim secus vias, & propter sepes proueniat. Germinat hac primo statim vere plures a radice mittens viticulas, teneras & hirsutas, qua paulatim adolescentes per sepes & fruteta, arbusculas scandunt, & suis clauiculis, quibus referta sunt, sese cum illis vincunt. Folia profert vitigineis proxima, minora tamen, angulosa, aspera, siliabraq; flores racematim coherentes, colore pallido, & in stela modum radiantem. Fructum racemosum vinosumq;, acini hortensis solani magnitudine aequalibus, colore primum viridi, & per maturitatem rubro & quandoq; nigro, quem Dioscorides non vidit. Nos hunc in Vngaria, Germania & Bebe-mia copiosum vidimus: quibus in locis nulla visitur Bryonia cuius fructus rubescat. Semen in acinis delitescit, glutinosi succo immersum, subrotundum ac paulo acuminatum Radice nititur grandi vastaq; perenni, carnosâ, longitudine plerumq; cubitum excedente. Crassitudine humani femoris, ca-pite multo ceu verrucis tuberoso, ima parte diuarcata. colore foris cinereo, & candida & succosa intus pulpâ. amara & subacris sapore, quinetiam fortiter adstringente, succo mader-

Præmo, odore graui. Nascitur plurimum propter sepes, itinera & fruteta. Hanc inter sua deicō. rīa medicament. a repo-
nit Meues. qui de ea hūc ad senjum scribit. Vitis syluestris, quod hausta, quemadmodum & Draunculus, ventriculo, &
et nonnullam miserat danda non est, nisi aromatum puluere permista, aut addito mastiche, cydonys malis, aut alyis ad-
fringentibus roborantibusq; medicamentis. Succus ē contrita radice expressus pituitam ercit, vrinam remorantem tra-
hit, & cerebrum mundat: quinetiam pectus, & neruos a pituitosis putridisq; excrementis: viscerum obstructiones aperit:
renes a. aliis expedit: subuenit item vertiginosis comitialibusq;. Praestat opem mirificē rufiscentibus: & induratos tumo-
res resoluunt: praesertim lienes, si cum vino, & sicubus tusa radix illinatur. Menstrua elicit, & vniuersum purgat vterum, at-
que etiam fetum expellit, si in eius decocto infideant semina. Succus fabarum, aut cicerum farina exceptus, maculas in
carne, & vulnerum cicatrices emendat, linimenti modo adhibitus. Oleum excavatus eius radicibus immixtum cineribusq;
 10 *in oculum, fugidat a delict: haecenus Mesues. Præterea mulieres vuluæ strangulationibus obnoxias mirum in modum iuuat,*
edō vt eas a strangulatu liberet & sanet. Equidem noui mulierem quotidie fere per annos hac morbo vexatam, quæ tan-
quam a quondam vuluæ herbis rīo edocta, et vinum album biberet, in quo vitis alba radix vicia esserbuisset, dormitū itū-
 20 *ra, & in hōdem modo cum hac medicina per annum vīa fuisset, optime ex illo morbo conuuluit. Vitis alba meminit Ga-*
leno lib. 6. simplicium medicamentorum, de eius viribus ita scribens: Vitis alba, quam & Bryoniam, & Psilothrum vo-
cant, quæ quidem germina ab ontibus pro more in vere eduntur, utpote edulium stomacho, eo quod adstringat, gratum.
Habent etiam subamarum, & modicē acrem adstrictionem, quare & vrinam moderatē cient. At radix & abstergentem,
& defluentem & tenuium partium, ac moderatē calidam vim obtinet: quamobrem & lienes induratos liquat, tum epō-
ta tum foris cum sicubis imposita: & psoram & lepram sanat. Porro fructus eius racemi speciem praeserens, is qui coria
 30 *impugnat, rīk est. Planta hæc Græcis ἀμπέλος λευκή καὶ ἑρυνία vocatur: Latinis Vitis alba: Mauritanis Fesire, Alfesire,*
Federa huc Alfe, ieta, Nezargusan seu Nezarchafen: Italis Vite bianca & Zucca saluatica: Germanis Stieckwurz vnd
Zenffelsturbjs: Hispanis Nuexa & Auorca: Galis Colubrine & Couluree, aut Feu ardent.

Bryonia vi-
res ex Melua.

Bryoniae fa-
cultates Mat-
thiolo.

Vitis albæ vi-
res ex Gal.

Nomina:

Bryonia seu Vitis alba triplex est: alia enim vulgatio, cuius bacca maturæ rubræ sunt, radix ex albo
 flouescit: altera cuius bacca nigricant & radix foris subnigra, interius verò eo pallet colore: tertia quam
 maculatam seu Creticam vocamus, quæ vulgari minor, cuius folia & punctis albis & striis notantur:
 fructus est maiore, rubro, aliquando vnico, aliquando plurimis, ex longo pediculo dependentibus, radix
 ampliatæ modo, quæ forinsecus cum vulgari conuenit, verum intrinsecus candida, nec circularibus
 lineis prædita: huius radices Doctor Doldius Noriberga etiam ad me misit. Bryonia baccis rubris, seu Vi-
 tis alba Dioscoridis, C. B. Vitis alba Matthiolo, Fuchl. Turn. Cordo in Diosc. Anguil. Lacu. Ges. hort.
 30 Lob. Castor. Bryonia, Trag. Ges. hort. Lonic. Casalp. (cui & Melothron Theophrasti) Lugd. Camer.
 Taber. Bryonia alba, Dodo. gal. & fol. Cordo in histo. Thal. Viticella, Syluatico. Quæ verò baccis nigris
 eduntur Bryonia nigra seu Vitis nigra Dioscoridis, quam proprie Bryoniam dici Galenus testatur, C. B.
 Vitis alba fructu nigro, Matthiolo, Castor. Vitis nigra, Cordo in Dioscor. Bryonia nigra, Dod. gal. & fol.
 Cordo in histo. Bryonia baccis nigris, Camerario.

Ἀμπέλος μίρα

VITIS NIGRA.

CAP. CLXXVII.

Nigra vitis, quam aliqui nigram Bryoniam vo-
 cant, folia fert hederæ, smilaceis proxima, sed
 maiora: caules etiã cognatos: capreolis suis arbores,
 quasi adminicula, comprehendit: fructus racema-
 tim cohærent, qui inter principia virent, & post ma-
 turitatem nigrescunt: radix foris nigra, intus buxco
 colore nitet. Viticula quæ primo germinum partu
 erumpunt, in olera recipiuntur: menses pellunt, vri-
 nas cient, lienum absument: vertiginosis, comitali-
 bus, neruorum resolutione tentatis profunt. Radix
 eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia
 cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus com-
 modissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Vitis nigra Hetruscis vulgò appellatur Tamaro, corrupto
 à tamno vocabulo. Sunt enim qui hanc Tamnum, siue
 Tamum etiam vocent, vnde Latinis eius vna Taminiæ dicta
 est. Huius viticula, quæ vere primam è terra erumpunt, quod
 asparagi similes sint, eorum more decocta, hac etiam tempe-
 40 50 60 *state manduntur, quamuis non eam, quam asparagi, cum*
palato ineant gratiam. Frequentissima hac in Hetruria pro-
uenit, quin & in Goritiensi comitatu, vbi Martio & Aprilo
mensibus, eius cauliculi in fasciculos digesti in foro veneunt
ad ciborum vsum. Huic tamen, quæ in Italia nascitur, illud
tantum obijci posse putauerim, quod in vuarum colore ab il-
la disidere inueniatur, quã Dioscorides representauit, quod
huic vna post maturitatem nigrescant, nostra verò perpetuò
rubentes spectentur: cetera enim, meo quidem iudicio, inter
se maximè conueniant. Sed illud nihil me mouet, neq; facit,
vt mutare debeat sententiam, & credere hanc aliam esse à
Vite nigra, quod viderim in Vngaria & Bohemia (vt in præ-
cedenti commentatione diximus) Bryoniam vniuersam fru-
 70 *ctam*

Vitis nigra
consideratio.




Tamno

etum ferre omnino nigrum, cum tamen Dioscorides rubri tantum meminerit: quinetiam hoc idem in Sambuco spectatur, ea enim qua in montibus prouenit, rubicundum fructum edit: altera vero ex purpura nigricantem. Videtur quoque etiam num hortense quibusdam in locis vvas ferre modo nigras, modo rubentes, modo croceas: quandoquidem natura partium cum florum, & fructuum colore ludere soleat, vt in vuis, cerasis, moris, ficibus, prunis, malis, & alijs compluribus percipitur. Idcirco nil mirum esse debet, si in Italia Vitis nigra rubentes vvas proferat, alibi vero nigras, vt in Grecia, alijsq; calidioribus, quod huiusmodi discrimina saepenumero caeli ac soli diuersitate contingant. Hac igitur ratione patet, esse veram ac genuinam Vitem nigram, quoniam cetera omnes prorsus nota illi ad stipulari deprehenduntur. Ceterum vidit Leonardus Fuchsius, eam stirpem esse legitimam Vitē nigram, qua nostris in Hetruria vulgò Vit alba dicitur, quae planè reprobanda videtur. Siquidem nostra Vit alba non habet radicem foris nigram, intus buxeo colore: non fert iouas, & maiora, sed potius minora, & per ambitum laciniata: nec semen edit in racemi modum, sed simul com, cum vuis similitudine. Adde, quod eadem sua facultate exulcerat. Vitis vero nigra exulceratis boum, ceruicibus medicatur & luxatis ob adstringentem vim, quam habet, vtilissimè imponitur. Martinus Guidottinus, Tridentinus Myropole plantari studiosus, scripsit ad me superioribus diebus, nuper à quibusdam forte fortunè obseruatum esse, Vitem nigram vim inesse praestantissimam ad conciliandam venerem, si sub cineribus feruentibus decocta deuoretur: immo hoc quod dicit, superare hanc cetera auxilia, quae libidinis flammam accendunt, praeter id quod haud ingratum sit edulium. Quibus nescio sanè an fides sit adhibenda. Vitis nigra vires paucis perstrinxit Galenus lib. 6. simpl. medic. sic inquit: Vitis nigra vocatur autem haec propriè bryonia, viti alba ad omnia similis, nisi quod imbecillior: haecenus Galenus de Vite nigra. Vires autem succo (vt est author Mesues) nihil valentius ad strumas sanandas, si cum vini, & mellis aequali portione vbiatur. Praestat ad idem radix quoque, si tusa & melle excepta illinatur. Sed quoniam Vites tam alba, quam nigra, de quibus haecenus dictum est, mihi in mentem eam herbam redegerunt, qua aliquibus vulgò vocatur BALSAMINA, aut Viticella, alijs Momordica, alijs Caranza, cum veteribus nihil de ea posteritatis memoria proditum sit, sitq; dubium, quam plurimum non obscuris praedita, hunc locum opportunum duximus, in quo huius herbae historia pertractetur. Est itaq; VITICELLA, siue Balsamina, planta, qua pralongis tenuibusq; viticulis, vltro citroq; reptantibus, proximas tum herbae

Fuchsi opin. reprobata.

Vitis nigra vires ex Mel. Viticellae siue Balsaminae historia.

II. BALSAMINA.



III. BALSAMINA ALTERA




tum arbusculas comprehendit: folijs vitis alba, aut viniferae similibus, sed longè minoribus, magisq; per ambitum laciniatis: capreolis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, quibus sese implicat appositis adminiculis. Florem promit cucumeriformem, paruum, colore subluteum: fructum vtrinque, turbinatum, qui oui gallinacei fere faciem repraesentat. cute carnosissima, quibusdam acutis bullis rigente, displici modo. Huic m. turo puniceus color, qui praeterea facile dissilit vltimam maturationem adeptus. Semen includit Anguria vocata simile, minus tamen, contextum cute crassa, pingui, lubrica, & perquam rebenite. Planta haec gracili nititur radice, nec citius fructum perficit ac maturat, quam aduentante autumno, Augusti & Septembris mensibus. Nusquam nisi sata, quod sciam, in Italia prouenit: pluribus autem in locis inibi in hortu & vicinis plantatur & nascitur. Folia vulnera recentia glutinant. Fructus exempto semine insolantur diu in oleo omphaeno, ac macerantur eodem oleo in balneo calentis aquae, aut equino calente simo, sitq; inde oleum praestantissimum ad vulnera.

Viticellae vocatae vires.

I. FILIX MAS.

II. FILIX FOEMINA.



inherens, sed adeo minutum, ut visum ferè fallat. Legitur abscessis prope radicem folijs, & in domo suspensis, substrato la-
teolo, aut papyro, ad finem Iunij, nam circa hoc tempus maturefcit. Atqui vulgus id colligi haud posse credit, nisi nocte fe-
stum diui Ioannis Baptiste precedente, superstitionis quibusdam admurmuratis verbis quibus Cacodamones fugari censet,
qui filicis semen custodire creduntur. Sed hæc & fabulosa sunt & superstitiosa. Inter filicem marem & arundinem non

Filicis hist. & vires ex Theo- phrasto. parua est inimicitia. Vtriusq; filicis meminit Theophrastus lib. 9. cap. 20. de plantarum historia, his verbis: Filix foemina
vtilis contra interaneorum animalia lata, melle subacta: & contra tenuia, in vino dulci cum farina hordeacea data. Si
mulieribus grauidis detur, abortum facere: si cæteris, steriles in totum reddere aiunt. Differt foemina filix à mascula, quæ
folium vnico artu porrectum hæc habeat, radicem verò crassam, longam & nigram. Harum igitur vires sterilitati addi-
xisse natura putatur. Hactenus de filicibus Theophrastus. De ijs etiam scripsit Plinius libr. 27. cap. 9. sic inquit: Filix
duo genera, nec florem habent, nec semen. Pterin Græci vocant, alij blechnon, cuius ex vna radice complures exeunt pines,
bina etiam cubita longitudine excedentes, non graues odore. Hanc marem existimant. Alterum genus thelypteris Græci
vocant, alij nymphæam pterin. Est autem singularis, atq; non fruticosa (fortè rectius non singularis atq; fruticosa breuior,
molliorq; & densior, folijs ad radicem canaliculatis. Vtriusq; radice sues pinguescunt. Folia vtriusq; lateribus pinnata,
vnde nomen Græci imposuere. Radices vtriq; longa, in obliquum, nigra, præcipue cum in aruere: siccari autem eas ali-
portet. Nascuntur vbiq; sed maxime frigido solo. Effodi debent Vergilijs occidentibus. Vfus radices in trimatu tantum, neq;
antè, neq; postea. Pellunt interaneorum animalia: ex his ptæniæ cum melle, cæteras ex vino dulci triduo pote. Vtraque
stomacho inutilissima. Aluum soluit, primò bilem trahens, mox aquam: melius ptæniæ cum scammony pari potate.
Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post vnus diei abstinentiam bibitur, melle prægustato, contra verum
mos. Neutra danda foeminis, quoniam grauidis abortum, cæteris verò sterilitatem facit. Farina earum vlcibus terris-
surgitur iumentorum quoq; coruscibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt. Et libr. 18. cap. 6. idem de Filix
hæc scripta reliquit. Filix biennio moritur, si frondem agere non patiaris. Id efficacissime contingit germinantibus ramis ca-
culo decussis: succus enim ex ipsa destuens necat radices. Aiunt & circa solstitium auulsas non renasci, nec arundine secta-
aut exaratas vomeri arundine imposita. Filicem vtramq; prodidit Galenus libr. 8. simplicium medicamentorum, vti de
earum viribus in hunc modum disserit. Filix mas radicem habet maxime vtilem: Latum enim lumbricum interficit, &
quis eam quatuor drachmarum pondere in aqua mulsa sumpserit. Ad eundem modum factum vitium quidem necare mor-
tuum autem eicere mirum non est: est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quamobrem vlcibus imposita valen-
ter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata. Planta Græca
ἡλεχθὸν, Latine Filix appellatur: Arabibus Sarax seu Sarachs: Italis Felce: Germanis Waldfarne: Hispanis
Helecho yerua: Gallis Osmunda regale seu Fengiere masle. At Filix foemina, Græcis θηλυπτερίς: Italis Felce femina.

Filicis vtrin- que vires ex Galeno.

Nomina.

I. Filix mas dentata, C. B. Filix mas, Matthiolo, Fuchl. Dodo. gal. & fol. Lonie. Lugd. Castor. Lob. Taber. Filix, Brunf. Turn. Filix mascula, Cordo in Dioscor. & histor. Filix mas secunda, Thal. Filix foemina aspera, Gef. hort. appen. Filix foemina, Gef. hort. Casalp. Filix syluestris seu vulgaris, Taceo. Quæ de nomine dicuntur, nec commentitia sunt, nec superstitiosa, in historia explicanda. II. Filix foemina dentata, C. B. Filix foemina, Matthioli, Fuchl. Dodo. gal. & fol. Lacun. Castor. Lugd. Filix foemina secunda, Thal. Filicula petraea foemina dentata, Taber. Pteridion masculum, Cor- do in historia.

Πολυπόδιον.



FILICVLA.

CAP. CLXXX.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis a arborum caudicibus, præsertim quercuum, palmi alti- a Meū & Caī.
radice filiculis, subhirsuta, non tenui perinde diuina. Radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu d'ruā. i.
polyporum, cuiusmodi digiti minimi, coloris intus herbacei, austeri aliquantum, & gustu subdulcis. quercuum.
Purgandi sunt. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida
frangit, & impetia, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas,
quæ inter digitos fiunt.

I. FILICVLA SEV POLY-
podium.

II. POLYPODIUM AL-
terum.



Polypodium Latinis Filicula nuncupatur. Recentiores medici, atq; etiam officina Græcum nomen retinent. Eius duo re- Polypodii
periuntur genera. Alterum [palmari altitudine assurgit, filici similis, subhirsutis, & robustioribus folijs, aduersa parte consideratio.
fuluescentibus maculis resperis: caulem, florem fructumq; nullum profert. Radicibus nititur per summa cespitum vagan-
tibus, polyporum piscium cirris similibus, vnde illi nomen, fibris pilisq; propè innumeris refertis, colore exterius subsulue-
scente, interius vero viridi, sapore dulci, & austero simul] de quo hic Dioscorides differit, omnibus notum est, quod vbiq; lo-
corum frequens proueniat, in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum. Alterum verò non nisi
paucus cognitum esse reor, folio aspleni quadantenus amulo, sed longiore, viridioris: magisq; per ambitum laciniato: radice
proxi simili graciliore tamen paulo: hoc plurimum nascitur in montium syluis. Nos copiosum vidimus, legimusq; quibus-
dam in montibus, per quos iter breue ac compendiosum faciunt, qui Goritia Labacum contendunt. Prætulit Mesues fili-
culam, quæ in quercuum caudicibus gignitur, quod ea, quæ solo, aut muscosis lapidibus innascitur, suo quodam exuberan-
te incoctog, humore maxime ventriculo sit noxia, quodq; ipsum flatibus repleat, ac etiam subuertat. Id quod postea in v-
niuersum de omni Filicula subiunxit, dicens: Polypodium inter ea recensetur medicamenta, quæ vel maxime corpora ex-
icant & extenuant: subuersionem & nauisam facit. In quo tamen Mesui resfragatur doctissimus Manardus Ferrariensis,
asserens, quod Polypodium, cum imbecilliter leuiterq; purget, corpora extenuare non possit: addens se certò scire, quod idem
per se exhibitum, nullam stomacho inferat iniuriam. Proinde Auerroi in hoc magis adstipulandum censet, quam alteri:
quandoquidem Auerroes author est, Polypodium tutum esse medicamentum, & epithymo præstantius. Polypodium (vt te-
statur reliquit Actuarius in libro de compositi. medic.) bilem, & præsertim atram & pituitam extrahit. Dantur purgata
radix sem scrupuli adfusa aqua mulsa. Mediocriter verò aluum ciet, & citra molestiam, tum in gallinaceo iure, tum in
cremore prisa. a coct. a radix. Polypodio facultatem duntaxat assignauit Galenus libr. 8. simplicium medicamentorum, ijs
verbis: Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem qualitatem, vt facultatis sit admodum desiccantis, citra
morsum tamen: hæc Galenus. Ex quibus sanè satis constare posse arbitror, Mesuem rectè dixisse, & in hoc immeritò à
Manardo reprehensum fuisse. Nam quod Polypodium abundè exiccat, Galenus t. su est grauisissimus. Ex quo cur etiam
efficaciter extenuare non possit (vt inquit Mesues) non equidem video. Quare potius adducor, vt in hoc opinio Manardi
aliqui celebris, mihi planè reproband. i videatur. Πολυπόδιον quod Græcis, Latinis similiter Polypodium & Filicula vo-
catur: Mauritanijs Bisberg, Aibeig siue Bessuigi: Italis Polipodio: Germanis Engelhüss / Baumfarn vnd Droppsturz:
Hispanis Filipodio & Polipopio: Gallis Polypode.

Polypodii
consideratio.

Polypodii vi-
res ex Actua-
rio.

Polypodii fa-
cult. ex Gal.

Nomina

F fff

Polypo-

Polypodium et si in ruderibus saxosis ad radices Fagorum, Corylorum, & aliarum proueniat, praefertur tamen quercinum: & quod in antiquis & caeduis salicibus reperitur gustu amariu & syluaticu ceteratur. Filicula, Matthiolo: Polypodium, Brunf. Trag. Fuchf. Turn. Lacu. Dodo. gal Cordo in hist. Ges. hort. Lob. Lonic. Thal. Cast. Camer. Caesalp. & Fidicula Gazæ apud Theophrastum: Polypodium maris, Dod. leii. II. Polypodium alterum, Matthiolo, Lacu. Lugdun. Polypodium primum, Taber. Herba radioli Ap. minus, Dodonæo historia Latina in folio.

Αρυστίεϊς

DRYOPTERIS.

CAP. CLXXXI

Meum
μεῖον ἢ μᾶλλον
σαφὲς ὄντως
i. postquam corpus exudaui.
Dryopteridis
consideratio.

DRyopteris nascitur in veterum quercuum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. ~~Pflorbru est cum rad-~~
~~cibus trita: illinitur enim primum a vfo: dum sudorem euocet, mox sudor abluatur. & recens imponitur~~

DRYOPTERIS.



Dryopteridis
facult. ex Gal.

Nomina

Non aliud Græcis significat Dryopteris, quam filix in quercubus nascens, quod filix hac in annosis muscosq. (vt Dioscorides inquit) quercubus proueniat, folijs filicem ad vnguem referentibus. Nascitur etiam humenti solo, & inter vepres, circa quercuum caudices: eam siquidem ipse in Gortensi agro pluribus in locis inueni extra quercuum caudices enatam, nullis repugnantibus notis. Dryopteris ipsa, qui filix ingentes frequentant, notissima est. ~~Dantur Dryopteridis radices in puluerem contrita. & cum fuscis vultu. adde-
lis & sulphuris momento. equis deuoranda aduersus em-
porum vermes. Namq. potenter illos expellunt & intermunt.~~
Dryopteridis meminit Galenus libr. 6. simplicium medicina-
metorum, eius facultates referens, his verbis: Dryopteris gustu
mistam facultatem praefert, dulcem, acrem, amarum: in ra-
dice vero item acerbam. Facultatem habet septicam, prouide
etiam pilis glabram cutem efficit. ~~Qua d'p'ort. ter. Graec.~~
Dryopteris item & Filix quercus Latine dicitur: Italis Felix
quercina: Germanis Baumfarn: Gallis Fuchre de
chesnes.

Dryopteris Matthiolo in minoribus iconibus, Brunf. Cordo in Diosc. Ges. hort. app. Lob. Lug. Dryopteris candida, Dodo. gal. & fol. Pteridion femina, Cordo in histo. Filicula petrae femina prima, Tab. Filicis genus paruum in montibus, Caesalpino.

I. CNICVS.



Me. παχέα
i. crassis, & re-
ctè quidem,
cum nulla sit
in folijs aspe-
ritas.

Cnici confid.

Cartamū off.

Cnici deli-
neatio Matt.

Κνίκος CNICVS. CAP. CLXXXII

CNicus folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, a asperis, spinosis: caule sesquipedali capitulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsoniis vtuntur. Seminis tui, & expressi succus, cum aqua mulsæ, vel iure gallinæ, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt ossifragæ, quas placentulas vocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante coenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostiarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius vnos, aphronitri drachma vna, cum carnibus triginta cantharum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.


Sunt in Italia, qui Cnicum Crocum Saracenicum appellent, quod eius flore plerumq. croci loco rura vtuntur: tamen si officina Mauritanos secuta Cartamum vocent. Cnicus (vt author est Theophrastus lib. 6. ca. 4. de plantarum historia) duorum est generum, satium vnum, alterum fistulose, vt latius libro tertio in Atractylidis mentione retulimus. Porro in vsu medicina semen tantum venit. Qui nostrum agris & hortis seritur, singularem emittit caulem, sesquipedalem, & quandoq. maiorem, teretem, rectum ex caelo albicantem striatumq. durum atq. lignosum: ramis à medio ca-

...drante longioribus rectisq;. Folia illi sunt oblonga, crassiuscula, robusta, glabra & venosa. in mucronem desinens. & circumquaq; infirmis etiam spinis circumvallata, & sine pediculis è ramis prodeuntia. Spectantur in ramorum terminibus acanacea capitula, in latum turbinem fastigiata, oblongis & aculeatis squamis, conpacta, radiantibus circumquaq; in parte foliolis, aculeis pariter rigentibus, & hyderis faciem representantibus. Flores è medijs capitulis erumpunt, in a canis exortum, capillacei & graciles, ut in ceteris acanaceis, aureo colore ad rubrum inclinante, copiosi, & densè in spaciis staminibus amulti. Semen est illi album, angulosum, leui cortice ac duro, hordeo serè simile, sed paulo maius, alba intus medulla. Radice nititur oblonga, gracili fibratq;, sed nullius in medicina vsus: scribitur in hortis & campo. Semen ut Mesues inquit, pituitam, & aquas extrahit: quo fit, ut coli dolore affectus. & aqua inter cutem laborantibus opem mirifice praestet, non modo haustum, sed & clysteribus infusum. Seminis medulla à putaminibus repurgata, saccharo eleganti modo excepta, pectus & pulmonis attingit, vocem clarificat, prolificumq; semen auget. Hac ille. Radice seminis medulla, extenuat, aperit, digerit & flatu pelit. I. adem lac cogit, coaguli modo. Psitaci, quos vulgo vocantur Papagallo, aut si sine Cnici semine vescuntur, nec tamen eorum alui exoluitur. Cnici vires paucis perstringit Galienus de simplicium medicamentorum, sic inquit. Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur. Tertij est ordinis ex Galieno. Cnici vires ex Mesue. Nomina. Kart. sine Chatham: Italis Zaffarano Saracinesio: Officinis Cartamum: Germanis Wilder Saffran: Hispanis Alacor & Semente de papagaios: Gallis Saffran bastard, & Saffran sauvage.

Cnicus seu Carthamus, δρό τῆ καθάρσει à purgando, flore est croceo, est caeruleo, est & albido: hic de Croco. I. Cnicus flore lateo. C. B. Cnicus Matthiolo: Dodo. gal. & fol. Cordo in Diosc. Lacu. Castor. Cnecus, Turn. Gef. hort. Cnicus satius, Cordo in histo. Cæl. Cnicus satius Theophrasti, Lob. Carthamus, Brunf. Fuch. Lonic. Carthamus, Camerario. II. Helenium Indicum maximum, C. B. Metho-

* II. HELENIVM INDICVM maximum. *

* III. HELENIVM INDICVM ramosum. *



dum Dioscoridis, ratione facultatis & formæ imitantes, in hunc locum, Floris solis maximi figuram reieci-
 cimus, cuius effigiem à Nobiliss. Iacobo Antonio Cortuso patritio Parauino, rei herbariæ studiosissimo,
 & nostri etiam amantissimo, Matthiolo vnâ cum Epistola acceptam editioni Italicæ anno 1568. præfixit:
 verum cum editione postrema 1583. Typographus certis de causis Epistolam Cortusi omiserit, & solum
 huius figuram plantæ maximæ nomine præmiserit, & eam (ijsdem rationibus moti) prætermittere vo-
 lumus: huius tamen descriptio ne utiquam prætermittenda. Stirps est annua, hominis staturam superans,
 ita ut quindecim, octodecim, viginti & aliquando viginti quatuor pedes, vel duodecim & plures cubitos
 atque, ad quam altitudinem sex vel ad summum septem mensibus, ex quo terræ ipsius semen est man-
 datum, extollitur. Caulis brachialis crassitie, rectus, hirsutis asper: folijs vestitur magnis, latis, in mucro-
 nem collectis, crenatis, ex longis pediculis hirsutis pendentibus, carnosis, atrovirentibus, similiter aspe-
 ris: Caulis fastigio capitulum Strobilo simile, sed rotundius & latius insidet, quod in florem explicatur
 prægrandem, ingentis patinæ amplitudine, quo maior non datur, cum medius eius discus pedem, non-
 nunquam sesquipedem latitudine excedat, quem folia oblonga aurei fulgoris, ceu radij solares orbicula-
 nter cingunt, media planitie purpurascente. Succedit semen oblongum planumq;, quod in ipsius disci
 alueolis ceu apum faus, ordine dispositum est, cortice nigro aut candido obductum, medulla dulci, cuius

tanta copia, vt aliquando vltra mille semina in vno disco reperias. Radix summa tellure sparsa, & pro spici-
 tus magnitudine breuis, fibrosa (aliquando tuberosa) idcirco ventorum iniurijs, nisi firmo iungatur ac-
 uent, in Europam illata. Calida in fine secundi & sicca in principio eiusdem gradus, cum tenui substantia,
 censetur. Odore est suauis & sapore grato. Sunt qui teneros foliorum pediculos, cum tenui substantia
 tucula coctos, sale, oleo & aromatibus conditos, palato ipsis Asparagis & Carduis gratiores, ad stimulan-
 dam venerem commendent. Sunt etiam qui caput coctum in cibos assumant. Vniuersa planta vna ac
 inciso extillat, ad renes a calculis expurgandos instar Terebinthinae commendatur: menstrua ducere
 dentium, lateris & coli dolores mitigare, statuunt: ad vulnera etiam glutinanda commendatur. Radix ce-
 collo suspensa Apoplexiam arceat, auctore Durante. Veteribus indicta creditur, sed forte Bellio Plin-
 centeri posset: siquidem Plinio lib. 21. cap. 8. Luteus Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barb-
 lis coronatur. Solem Indianum nonnulli, alij florem Solis, quia non solum effigiem solarem praese-
 fert, sed & cum eo modo in Orientem, modo in Occasum conuertitur, & ad eius ortum quasi praese-
 rentia capite nutans, reclinatur, & cum surrexit consistit solem semper respiciendo ad eius radies se-
 plurimum pandens, donec Sol occidat. Matthiolo & Castori, planta maxima: Chrysanthemum Peruvia-
 num, Dodonaeo editione Latina & Lugdunensi: Solis flos Peruvianus, Lobelo: Sol Indianus Lonicere
 Helianthemum Peruvianum, Camerario in Matthiolo: Helenium Indicum, Caesalpino: Coronaria
 Tabernamontano. Germanis *Groß Sonnen Blum*: Belgis *Sonne Bloemen van Peru*: Italis *Planta*
 maxima, Sole Indiano, Corona regale, Coppa di Gioue, Tromba d'amore: Lusitanis *Gigante*.
 magnitudine: Anglis, *Sunne flouer*. II. Helenium Indicum ramosum, C.B. Chrysanthemum Peruvia-
 num alterum, Dodo. fol. Helianthemum Peruvianum proliferum, Camer. in Matthiolo. Hoc a pro-
 prii florum magnitudine differt: florem enim in limbo expansum, numerosa proles ambit, quod aliquan-
 do a natura luxuriante, interdum mangonio & arte fieri solet.

Διτρίχοσις

MERCVRIALIS.

CAP. CLXXXIII

Linozostis, aliqui Parthenion, alij Hermu botanion appellant, folijs constat ocimi, helixinae cognatis
 sed minoribus: ramulis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cauis multis: fructu foeminae, co-
 piose, quandam racemorum speciem praebente: mari e foliorum sinu dependente, paruo, rotundo: ce-
 binis testiculis vna cohaerentibus: frutice dodrantali, aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aliam
 ciendam: cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamque detrahit. Constat, vt mares gignantur, hunc facere
 vt foeminae, illam, si a purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

I. MERCVRIALIS MAS.

II. MERCVRIALIS FOEMINA.



Mercurialis
 consideratio,
 & historia ex
 Plinio.

Mercurialem, quae Graecis Linozostis appellatur, duorum generum esse constat: vnam mas, alterum foemina. Vtra-
 que non modo medicis, ac septasiarqs vulgaris admodum est notitia, sed etiam mulierculis, & fere omnibus
 quod

quid in clysteribus plerumq; imponatur. Nasitur in hortis, vineis, vrbium plateis, & inter ruder. a. Fœmina, caule, ramis, folijs per omnia alteri similibus prouenit: verum fructu differt, quod in hac racemosum spectetur & semine copioso: in illa vero, ea binis testiculis vna cocentibus. Quare non est, cur de Mercuriali his pluribus disseramus. Subviciam tamen qua de ea memoria prodidit Plinius lib. 25. cap. 5. his verbis: Linozostus, inquit, siue Parthenion, a Mercurio inuenta est, ideo apud Græcos τοξον multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialem. Duo eius genera, masculus & fœmina, qua effuacior: masculus, ut interdum, ramoso in cacumine, ocimo angustioribus folijs, geniculis densis, alarum cauis multis: semine in geniculis depenlente, fœmina copioso, mari iuxta genicula stante, rariore ac breui, contortoq;, fœmina soluto & candido: fœmina maribus nigriora, fœminis candidiora: radix superuacua, pratensis. Nasuntur in campestribus cultis. Mirum est, quod de vtroq; eorum genere proditur: vt mares gignantur huius facere, vt fœmine illam. Hoc contingere, si à conceptu succi proueniat, videtur in passio, edantur ve folia decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo fœtore, ut in tropico, & duabus aut tribus spuis, donec decoquantur. Decoctum dari iubent, & herbam ipsam in cibo, altero die purgationis mulieribus per triduum, quarto die a balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum vsu præcitat. Deinde ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille cas valua cum melle, vel rosaceo, vel irino admodum, ut ad eos mentes secundasq;, hoc idem prestare potest, dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitq; cum vino. Alio folia imposuit, epiphoru, stranguria, & vesica. Decoctum eius dedit cum myrrha & thure. Alio quidam folia, vel in febrili, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ ad dimidias: bibitur sale, & melle aduulso, necnon cum vngula suis, aut galinacea decoctum, salubrius. Purgationis causa putauere aliqui vtramq; dandam, siue cum malua: decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum ladunt. Hæclenus de Mercuriali Plinius. Caterum obseruatum quoq; est, talli verrucas omne genus illius vixitq; folijs, vel eorum succo vtriusq; semen cum absin-
thia, si non herbis amixtum, curat. Malu item que serpunt, succus cum aceto medetur. Eius quoq; vires descripsit Gale-
 nus lib. 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Mercuriali vtuntur omnes ad ventris purgationes duntaxat. Verum
 enimvero si quis eius facere periculum volet in cataplasmate, sane eam digerentis admodum facultatis esse experietur.
 Λινοζοστὸν sic Græcè, Latine verò Linozostu & Mercurialis vocatur: Italice Mercorella: Germanicè Dangeltraut: Hispanice Mercuriale & Vitigua muerta: Gallice Mercuriale. At Mercurialis fœmina, Græcis λινοζοστὸν θήλυς: Italis Mercorella fœmina: Germanis Dangeltraut Weiblein: Gallis Mercuriale femelle.

Hippocrates de Mercuriali.

Mercurialis vires Matth.

Mercurialis vires ex Gale.

Nemina.

Mercurialis (quasi Mercurii inuentum) fatiua est & montana: vtraq; mas seu testiculata, & fœmina seu spicata. I. Mercurialis testiculata, C. B. Mercurialis mas, Matth. Fuchl. Dod. gal. & fol. Ges hor. Lob. Lacu. Lon. Castor. Taber. Camer. Lugd. Mercurialis mascula, Turn. Cordo in Diosc. Mercurialis testiculata vel secunda, Trag. Mercurialis, sexta Parthenii species, Brunf. Mercurialis fructum ferens, Cæs. Phyllon arthenogonon Cord. in Dioscoridem. II. Mercurialis spicata, C. B. Mercurialis fœmina, Matr. Fuchl. Turn. Dod. gal. & fol. Lacu. Ges hort. Lob. Cordo in Diosc. Castor. Taber. Camer. Lugdu. Mercurialis vulgaris & prima, Trag. Mercurialis florens, Cæsalp. Phyllon thelygonon Theophrast. Cord. in Diosc.

Κυνοκράμβη. CYNOCRAMBE. CAP. CLXXXIII.

CYNIA, aut cynocrambe, cauliculum binum dodrantum altitudine emittit, mollem, subalbidum: folia mercuriali, aut hederæ similia, certis interstitiis subalbida: semen folijs adhæret, paruum, rotun-

I. CYNOCRAMBE. * II. CYNOCRA. FOEMINA. *



Ffff 3 dum.

dum. Folia cum caulibus pota, aluum cient, oleribus commendantur. Ius decocti, & pituitam & bilium aquamque detrahit.

Cynocrābes
consideratio.

Ruellii error.

Mercurialis
spuria.

Nomina.

Si planta, cuius hic imaginem damus, Cynocrambe cynia non est, alia præfecta, que magis illi respondeat, ad matrem præsentia non est. Hac enim omnibus sanè notis Dioscoridis descriptioni similis esse videtur, præterquam semen, quod folijs (ut ipse inquit) non adhareat. Quo fit, ut affirmare nequeam, an hæc legitima Cynocrambe dici possit, ac debeat. Vt detur Ruellius existimasse Cynocrambem eandem herbam esse cum Atriplice sylvestri. Quæ in re (si ita esse crediderit) aperte errasse deprehenditur, quod Dioscorides de sylvestri Atriplice libro secundo, hic verò de Cynocrambe ad finem quatuordecimæ quæ de diuersis plantis tractauerit. Hanc autem, quam nos Cynocrambem nunc appellamus, Itali Mercurialem spuriam vocant. Ea vbiq; ferè nascitur, & præsertim in campis, vineis, & in culto solo, & propter vrbium mania. Differt hæc ab Atriplice non modo folijs & facie: sed etiam caulis proceritate. Siquidem Atriplex sylvestris quandoq; ad ducem cubitorum altitudinem asurgit. Cynocrambe verò binum palmorum longitudine contenta est: huius nusquam quod meminerim, meminit Galenus in lib. simp. med. nam ea Cynocrambe, cuius ipse Galenus, & alij rei herbarie scriptores mercurialem faciunt, sub nomine Apocyni, alia est ab hac, de qua hic agitur. Quæ planta Græcis κυνοκράμβη, Latine Cynocrambe & Brassica canina appellatur: Italis Mercorella bastarda: Germanis Wild Bingenkraut: Gallis Mercuriale jannoge.

Cynocrambes nomine Matthiolus Mercurialem sylvestrem & quidem tantum matrem proponit, cum tamen & fœmina detur. I. Mercurialis montana testiculata, C.B. Cynocrambe, Matthiolo. Fuchs. Dodo. gal. & fol. Lacu. Lob. qui vtramq; vna figura proposuit. Cast. Camer. Cynocrambe mas. Fuchs. iconibus, Camer. in Matth. Lugd. Mercurialis sylvestris, Trag. Lonic. Mercurialis mas sylvestris, Thal. Mercurialis mascula sylvestris, Cordo in histo. Mercurialis species, Ges. hort. Mercurialis altera vel montana, Cæsalp. Canina brassica, Cynocrambe, Cordo in Dioscoridem. II. Mercurialis montana spuria, C.B. Mercurialis fœmina sylvestris, Cordo in histo. Thal. Cynocrambe fœmina, Camerario in Matthio-

* III. CYNOCRAMBE DIOSCORIDIS. *



lum. III. Cynocrambe Dioscoridis. Ex radice tenui fibrosa, oblonga, plures viticuli palmares, etiam longiores, rotundi, striati, lenes & succulenti, virentes, aliquando parum rubescens, reclinati procedunt plurimis geniculis distincti, ex quorum lingulis emergunt primum foliola duo parua Alines forma subrotunda, mox alternatim ex vna parte eodemq; loco folium sextuplo maius, oblongo pediculo donatum, oxalidis rotundæ folio oblongius, quadam veluti aspergine obsitum succedit. tandem ad idem geniculum alia decuplo minora, bina, eadem etiam lena notantur: iuxta quæ ab ima radice, ad summam viticulorum internodia, flosculi bini, terni, quaterni, muscosi ex herbaceo albidis, plurimis filamentis donati: quibus succedunt fructus totidem geniculis inter folia hærentes, Mercurialis formæ tenuiores, rotundi, duriusculi, primum virides, postea ex nigro cinerei, medulla alba referti. Gustu est insipido & aqueo ipsa herba. Monspeffuli locis vmbrosis sponte ortum legimus: mox Cynocrambe nomine, & plantam & semen à Nobilitate Jacobo Antonio Cortuso accepimus, quæ copiosè nobis provenit, & fideliter ac ingeniosè, ex viua planta à Doctissimo Ioanne Rudolpho Saltzmanno Botanices studiosissimo, effigiata. Hanc videtur Fabius Columna in suo Phytobasano expressisse nomine Alines facie planta noua, à quo etiam semen accepimus, quod (ut & tota planta) nostro minus est, & satum non creuit, ipsique ex Insula Capreis, vbi frequens sponte oriatur, allatum scribit, Alinemque apud Dioscoridem esse suspicatur. Cynocrambem Dioscoridis statuimus.

Ἡλιοτρόπιον μέγα

HELIOTROPIVM MAIVS.

CAP. CLXXXV.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde Scorpiuro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut saepe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in catumine candidus aut subfuluus, incuruatus ut scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. Decoctum herbe ex aqua, fasciculo manus plena, potu pituitam, biliumq; per aluum extrahit: contra scorpionum ictus in vino potum, & illitum prodest: ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnam ante accessiones, feminis grana quatuor cum vino quartanas finire, tria verò tertianas. Illitum semen formicantes verrucas, pensilesque, & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillatombus, quas Syriais vocant, podagricis, luxatisque vtilissimè illinuntur: mentes cient: partus trita, & imposita pellunt.


HELIO-

I. HELIOTROPIVM MAIVS.

Ἡλιότροπον μέγαν

II. HELIOTROPIVM

alterum.



Ἡλιότροπον μικρόν.

HELIOTROPIVM MINVS.

CAP. CLXXXVI.

Heliotropium paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, foliis antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum verrucarum modo pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota,

III. HELIOTROPIVM

minus.

* IV. HELIOTROPIVM

tricoecon.*



Ἡλιότροπον τρίκοικον

Ffff 4

adiec

adiecto nitro, hysopo, nasturtio, & aqua, latas tineas, teretesq; excutit. Penfiles verrucas, que acetosae dones vocantur, cum sale illita tollit.

Heliotropii
veriusq; con-
sideratio.

Verrucaria.

Herba can-
cri.

Heliotropii
vires Matth.

Caltha con-
sideratio &
virca.

Heliotropium maius, licet in asperis nasci Dioscorides tantum prodiderit, tamen in Hetruria, & in comitatu Ger-
tienti, ubi frequentissimum visitur, passim fere provenit, in campis, secus vias, in oppidorum plateis, & circa ad-
ciorum areas, aridis item, & sabulosis locis. Herba haec apud Hetruscos officinis Verrucaria appellatur, quod verrucas, ver-
mecias, & thymos affricata valenter adimat. Quare mihi, ut Ruellio quoq; doctissimo, plurimum errare videntur, qui
cenent Calendulam officinis dictam, quae & neotericis caltha existimatur, esse Heliotropium maius: namque omnes pro-
fus illius nota huic reclamare deprehenduntur. Neq; eorum opinioni illud quicquam addit, quod huius Calthae jemma
quadantenus scorpionum caudiculas referat, quoniam Dioscoridi Heliotropy slos, non semen Scorpionis cauda effigiem re-
presentat. Porro Ruellius heliotropium hoc vocari ait herbam cancri, quod eius flores in cauda cancri (qui nobis affricam
esse putatur) similitudinem inlectatur. Verum haec nominis ratio a Ruellio assignata, mihi non plane satisfacit, quod
scorpionum & astacorum cauda forma inter se maxime differant. Vnde potius crederem, hoc Heliotropium herba cancri
appellationem traxisse, quod efficacissimum sit aduersus carcinomata, & ulcera gangranosa: ad quae magno admodum
succesu eo vtuntur chirurghi, qui plantam & eius vires compertas habent. Heliotropio herba formica maxime necatur,
obturatus ea carum foraminibus. Si scorpionis cauernula (vt quidam memoria prodiderunt) heliotropy surculo cir-
scribitur, nunquam is foras egredietur: imposita vero herba protinus illum emori aiunt. Folia ex rosaceo illita capiti do-
lorem mulcent. Epotum foliorum decoctum vna cum cumino renum calculos pellit & frangit, & intestinorum animas
necat. Caterum Heliotropium minus vidimus, ac saepe legimus in Tridentino agro, in palustribus quibusdam locis, iaque
compluribus ostendimus, vt quod pictura satis respondere mihi videretur. Quod autem huius Heliotropy, aut alterius men-
tionem fecerit Galenus, non inuenio in simplicium medicamentorum censu. Paulus tamen vtriusq; meminit, sed non
plura de his tradidit, quam quae Dioscoridi accepta referre potest. Heliotropium alterum, sunt qui Heliotropy genus fac-
ant, quod & haec verrucas delet. Sunt e recentioribus (vt supra diximus) qui Calendulam vocatam, Virgily & Pliny
CALTHAM existiment, hoc argumento nixi, quod flores aureos luteosue proferat. Quorum equidem sententia non
ausim omnino subscribere, aut refragari. Folly: ex oblongo
minime acuminatis, Leucoij quadantenus similibus, lateri-
bus tamen ac longioribus: caule edit singularem, subpingu-
sesquidodrantalem, ramosum. Flores in caulium summari-
bus aureos speciososq;, odore cum grauitate haud inuicuat:
e quibus semen prouenit in capitulis apertis: quod si diduca-
tur auicularum vnguibus quadantenus simile spectat. Ra-
dice nititur alba, recta q;. Ea in Hetruria a florum colore vul-
go Fior rancio nominatur, vbi sponte per se nascitur, semina-
nera. Atqui in compluribus Italia locis, & in Germania
hortis ad coronamenta seritur. Hanc ibi passim acetosae ab-
hibent. Excalfacit, attenuat, aperit, digerit, & pruritus
quamuis gustatu adstrictione non vacare deprehendunt. Ce-
terum constat sexcentis feminarum factu periculo, eodem
valere plurimum ad menses ducendos, & praesertim epirit-
us succo, aut herba ipsa recente diutius deuorata. Datur quo-
q; succi vncia, addita lumbricorum terrestrium puluere tra-
chima, vtiliter regio morbo affectis. Sunt qui dicunt, hanc
herba vfu acui indies oculorum acies. Constat tamen filia-
tiam florida planta aquam, oculorum ruborem, & inflam-
mationem arcere, si in oculos instilletur, aut si limbum in tu-
macerata superponantur. Siccata puluis cauis dentium im-
missus, dolorem leuat. Vt Graeci ἡλιότροπον, ita etiam Latini
Heliotropium dicunt: officina & vulgus, Verrucaria
Italica, Heliotropio. At Caltha, Italica Fior rancio, sine Fior
d'ogni mese: Officinis, Calendula: Germania Ringelblum:
Gallia Soufsij.

V. CALTHA.



Nomina.

gal. Herba cancri maius, Lonicero. II. Heliotropium alterum Matthioli quid sit ignoramus, eodem no-
mine & eadem figura in Herbario Lugdunensi exprimitur. III. Heliotropium minus, Matth. Lacu.
Castor. Lugdu. Herba cancri minor, Lonic. Videtur exprimere voluisse Heliotropium tricoccum a
fructu eius triquetro, cuius figuram. IV. loco adposuimus, dicitur Heliotropium minus tricoccum,
Clus. hist. Hispan. Heliotropium tricoccum, Lugdu. Heliotropium minus, Dod. gal & fol. Ges. hort.
(Verrucaria, eadem.) Camer. in Marth. & in horto, vbi & herba Clytia: Heliotropium paruum Diosco-
ridis, Lobelo. Heliotropium tricoccum Plinii, Cæsal. Tabernæmontano. V. Caltha vulgaris, C. B.
Caltha Matthiolo, Trag. (nonnullis Caput Monachi) Fuch. Turn. Lonic. Dalechampio in Pliniam,
qui vult esse Chrysanthemum & Bupthalmum Dioscoridis. Caltha Poetarum, Lugd. Calendula
Brunf. Dod. Gal. & fol. Ges. hort. Camer. Cæsalp. Calendula fatiua, Taber. Chrysanthemum Lobel.
qui Gromphænam Plinii suspicatur: Clymenum Dioscoridis Fabio Columnæ in suo Phytobatano-
Vana

Heliotropium maius & minus, vtrumq; vele-
rectum vel repens. I. Heliotropium maius, Matth.
Lac. Ges. hor. (cui & Scorpioides alterum) Lobel.
Dod. fol. Castor. Lug. Camer. Cæsal. (& Verrucaria
vulgò) Taber. Lugd. Heliotropium magnum, Dod.

Varia est. flore simplici, pleno, minore, maiore: pallido, citrino ruffo: est prolifera: est floribus reflexis: et renouescens, quæ etiam fruticosa euadit: est hortensis & syluestris: hæc quæ maior, minor, & humilis.

Σcorpιοειδής.

SCORPIOIDES.

CAP. CLXXXVII.

Scorpioides herbula est, foliis paucis: semine caudæ scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

SCORPIOIDES.



Scorpioides speciem Calendulam nominatam haud dubiè esse censerem, si folia, sicuti semen, scorpioidi responderent. Verum cum hæc folijs paucis, illa verò multis longisq; profiliat, q; aperte falli deprehenduntur, qui in hac opinione versantur. Equidem veram, vt arbitror, Scorpioidem vidi primum superioribus annis in Foro iulienfi agro in Cinitate Austria, quodam in hortulo clarissimi medici Iuliani à Marostica Teruisiensis. Hac eadem, cuius hic effigiem pictandam, dum hoc tempore diligenter curarem, vt singulis plantarum descriptionibus, quarum cognitionem habemus, pictura accederet, ab amico quodam, rei plantaria perito, ad me transmissa est. Quam sanè suis notis veram Scorpioidem referre putamus: etsi non desunt viri doctissimi, qui aliter sentiunt, volentes, Nicandri scholiæstis autoritate, hanc ipsam Telephium appellari debere. At ego horum sententiam prorsus nihili facio, quod nõ prohibeat nomenclatio illa apud scholiasten quin rectius Dioscoridi scorpioides appelletur. Scorpioidem breuissime perstrinxit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum, sic inquit. Scorpioides extalsfacit quidem ordine tertio, desiccatur verò secundo. Ea non secus Latinis Scorpioides, ac Græcis Σcorpιοειδής appellatur: Italis Scorpioide.

Scorpioidis consideratio.

Scorpioidis facul. ex Gal.

Nomina.

Quam pro Scorpioide Matthiols posuit, Telephium Dioscoridis esse censemus: Scorpioides, ob filiquas ad similitudinem caudæ scorpionis reflexas, dici potest. Scorpioides, Matth. Lac. Lob. Lonic. Casto. Scorpioides Matthioli, Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lugd. Cam. Lunaria burissa, Gef. hor. Telephium, Anguil. Cæsalpino, cui & Herba amoris,

quia puellæ in amore explorando foliis huius vtuntur: si enim folia cum saliuâ applicata, cutim tantum rubefaciant, amoris purant indicium: si pustulas excitat odii. Hunc vsum antiqui poetæ Telephio tradiderunt, vt apud Theocritum videre est, qui ob id philtrum quoque appellarunt.

LIBRI QVARTI FINIS.





PETRI ANDREAE
MATTHIOLI, MEDICI
Senensis Commentarij,

IN LIB. QUINTVM PEDACII DIO-
SCORIDIS ANAZARBEI, DE ME-
dica materia.

Superioribus quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & earundem lacrymis, ac fructibus: item de animalibus, melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus: nec non de omni radicum, herbarum, succorum seminumque ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de vniuersis, & metallicis, à vite nostram commentationem auspicari.

COMMENTARIVS MATTHIOLI.

QUONIAM non difficile tantum, sed quasi etiam impossibile esset, vt cuiuscunque scientie, aut facultatis principijs ac fundamentis vniuersalibus ignoratis, sciri perfecte possint illa, qua deinceps spectatim in ea considerata veniunt: ideo non minus necessarium, quam vtile fore existimaui, si hic in vniuersum fossilium, ac metallorum materia tractaretur. Nam etsi in hoc quinto libro nonnullorum fossilium medicamentorum cum historiam, tum facultates tradiderit Dioscorides, & ipsum secutus Galenus in libro simplicium medicamentorum; cum tamen eorum neuter originem, materiam, causas, ac alia plura in his asserenda, ac cognoscenda explicauerit, illa quidem hoc loco silentio inuoluenda non duximus, vt quantum per nos fieri potest, quod ad absolutam rerum simplicium cognitionem, & communem vsum faciat, à nobis intactum relinquatur. Cum autem que plures tam antiquos, quam recentiores, qui de fossilium, ac metallorum materia scripserunt, diligenter sanperlegimus, eos vtique non modo inter se differentes reperi, sed in aliquibus etiam contrarios. Nam licet eorum quidam in veritatis tramite parum deflectant: videntur tamen non exactè ea omnia explicauisse, qua hac in re maxime necessaria sentur. Fieri enim lapides, Aristoteles author est, igne non liquecentes ex sicca ignescente exhalatione. Ex quibus deduci potest, exhalationem humidam materiam esse lapidum liquecentium, è quibus metalla constantur, quo fit vt ex Aristotelis sententia, lapides igne non liquecentes fiant ex calido, & sicco vapore: liquecentes verò ex humido halitu tantum. Sed opinionem hanc, qui rem altius, diligentiusque inuestigarunt, minimè probandam existimant, cum lapides longe vnus, quam terra ex vapore fieri queant. Siquidem puluis, qui sic gigneretur, vnum aliquod ex pluribus fieri natura non posset, nisi humor illi commisceretur, & omnes pariter lapides non liquecentes absque multa hominum opera, ac tantum labore facile in arenam vel puluerem transirent, si tantum ex his nullo accedente humore effluerentur. Quod profecto haud ita se habet: lapides namque ferè innumeros admodum compactos, solidosque videmus, id quod haud dubie ostendit, ex tantum vapore eos nequaquam genitos esse. Quod si ex eo lapides eiusmodi procrearentur, magis omnino fierent in superiore aeris regione, vt qua facile ignis contactu incendatur, quam intra terram. Quandoquidem omnibus liquidis constata, quam superior illa aeris regio ex velocissima astrorum conuersione, citius accendatur. Ac certè si non alias, saltem quoties gignerentur cometae, faces, flammae, clypeique ardentes, deciderent lapides è caelo, aut terra, quod tamen fieri non videmus. Et quamuis tradiderint prodigiorum scriptores pluisse quandoque lapides, vt Plinius, & alij quidam testantur, non tamen ob hoc opinatus est Aristoteles in aere lapides gigni posse. Nempe is lapidem è caelo delapsum ventorum vi in aere delatum scribit. At si lapides in aere fiunt (quod plane negare non ausim) quid obstat, cur duci non possit, hoc ex eadem materia, ex qua illi sub terra generantur, quam quidem materiam facile produxisse potuerint violentissima tempestates: vt pote qua repente aliquo motu dum oriuntur, ex reliquorum elementorum mutatione terrena illa corpora generentur. Theophrastus vero non lapides solum, sed terras etiam constare scribit ex pura, ac equali materia, qua confixa in terra, siue per colationem sit effecta, aliove modo excreta. Quod etsi iure aliquo probari possit, non tamè his duobus modis tantum talis efficitur. Nec ea quae vnus proxima sit materia terra insignis, omnis etiam est lapis, verum alijs quoque modis si pura & aqua materia, vt ex succi nascuntur. Interdum quoque, necesse est, vt calor materiae his duobus modis genita prius coarctat, vt inde effluat succus, ex quo tandem lapis, qui liquecat ignis calore, fieri possit. Verum in vniuerso multo magis in hoc errore Theophrasti deprehenditur, quod scilicet omnis lapides etiam pretiosos terra abundare crediderit: is enim ita inquit. Ecrata. 12. 1074

Varia de generatione lapidum sententia. Aristotelis opinio.

Theophrasti opinio.

Contra Chymistas.

Causa metallorū efficiēs.

Cur pauci, cur multi lapides fiant.

Et absque vilo impedimento non modo fossores ipsi, sed vehicula, & curruculi per eas discurrent: tractu tamen temporis factum est, quod materia lapidescens in ipsis adeo creuerit, vt fossoribus denuo ingredi volentibus, ob cauitatis angustiam denegaretur aditus. Sed praeterea metalla continuè generari, ferrum indicio est. Id quod in Illue insula metae generari (ea enim à maritimis nostris non longè distat) non modo probatissimi scriptores memoria prodiderunt, sed fossores qui diutius in ipsis versati sunt, verbis referunt: quippe quod ferrea illa fodina multis iam annis destituta, nunc iterum ferrea materia impleantur. Porro Philosophi & chymista aliter sentiunt. Aristoteles lapidum materiam habere tantum existimat. Chymistarum verò nonnulli omnino asserunt, metalla in visceribus terra gigni ex sulphure, & argento viuo, alij ex quadam cinere aqua madefacta. Quorum sententia, cum non solum suspecta, sed etiam plane absurda habeatur, eos nimirum omnes decipit, qui horum lubricis fundamentis nixi philosophantur, vt firmis tum rationibus, tum argumentis probare non vererentur, nisi id praeter nostrum institutum esset, qui hic harum rerum capita tantum percurremus. Verum si quis rem hanc fusius enarratam, atque exactissimè discussam habere cupit, librum legat Georgij Agricola vniuersitatis eruditissimi, à quo nos plura mutuatos esse ingenuè fatemur. Caterum illud omnibus, vt mea quidem fert opinio, persuasum esse debet, quod nil aliud sit metallorum materia, quam substantia elementaria, quae tanto perfectius metallorum materia aquam esse, maximo argumento est, quod ignis calore liquentur, ac fluant: frigore verò tum aqua, tum etiam aqua rursus densentur, ac coeant. Id quod clarè ostendit, ea aqua multum, terra verò parum obtinere. Simplex enim aqua non est eorum materia, sed mista cum terra: atque terra quidem portio tanta in mistione existit, quanta aquae perspicuitatem obscurat, fulgorem verò non auferat. Quin etiam mistura quò purior fuerit, eò pretiosius (vt diximus) metallum constat, idque magis ignis patiens redditur. Sed quota terra portio insit cuique humori, ex quo efficitur metallum, nemo mortalium vnquam mente concipere potest, ne dum verbis explicare. Id tantum nouit Deus optimus maximus, qui creatas, ac definitas quasdam leges natura tribuit, quibus res inter se miscet, ac temperat. Succus igitur est, ex quo formatur metallum, quem pariunt varij motus, quorum proximi sunt aquae defluxus terram molliens, aut secum rapientis: terra cum aqua permistio: & vis caloris agens in misturas, vt id genus succos gignat. Sed cum de metallorum materia dictum sit, iam causam efficientem prosequamur. Ea autem nil aliud nobis esse censetur, quam calor, & frigus, qui in ipsius terra visceribus reconduntur. Calor inquam is est, qui humoris metallici mistionem coquit, ac purificat: frigus vero quo eadem densatur, & dura efficitur. Hoc equidem experientia facile comprobatur, cum neminem lateat igni metalla liquefcere, ac eam tractu temporis post liquationem, ipsius ignis calore contabescere, auro excepto. Quamobrem detestanda videtur eorum opinio, qui tantum calore subterraneo metalla confici crediderunt. Sunt & qui putent, metalla omnino effici siderum errantium influxu. Soli namque auri generationem assignant, Luna argenti, Marti ferri, Mercurio aegyptij viui, Ioui stanni, Veneris aris, Saturno denique plumbi. Adduntque, quod sicut metalla ab errantibus stellis sui ortu percipiunt: ita pretiosi lapides, ac gemmae, à fixis suam effectricem causam suscipiunt. Huic autem sententiae plerumque non acquiescunt, quoniam has causas nimis remotas credunt, & propinquioribus causis inherendum esse arbitrantur. Ego tamen inficias non eundem reor, quin omnia haec inferiora terrena ac finita, regantur, gubernentur, & producantur à superioribus caelestibus, ac sempiternis: quae tandem diuturna orbium circumuolutione, omnium causarum commotatum, quam propinquarum causa existunt. Ita pariter dicendum existimo lapidum gignendorum causam non semper à solo frigore, vel calore, sed modò ab hoc, modò ab illo prouenire. Nam lapides, quos aqua humectando dissoluit, calore exiccando compegisse intelligimus. Contra verò qui calore ignis liquefcunt, vt fluuorum, & torrentium filia, quibus igne liquatis vitrum conficiunt artifices, eos frigore concreuisse certum est. Concretio enim eique opposita defectio, resolutio scilicet, atque liquefactio, oriuntur à causis inter se contrarijs. Etenim calor à materia humorum extrahens, eam efficit duram: at frigus eandem, aère maxima ex parte excluso, vehementer constringit, quae eandem agit, cum aquam in glaciem, vel niuem cogit. Hinc est, quod memoria prodidit Galenus, eam aquam corporum profusa inimicam esse, quae à niue, vel glacie colliquatis fluxit: quoniam omne, quod in ea tenuissimum erat, à gelu expressum fuerit. Duabus his causis tertia quoque accedit, quae est succus ille lapidescens, de quo superius diximus, qui vel sub, vel cum aquis permixtus in stirpium meatus, aut in animantium particulas recipitur. Nam praeterquam quod sit lapidum materia, causa etiam efficientis partes subit: quando scilicet in corpus aliquod per meatus penetrat, idque totum factum in lapidem vertit. Quod si in lapidem concreuerit guttatim cadens, aut in vrceos diffusus, tunc materia tantum, non causa efficiens dici merebitur. Gignitur hic (vt supra dictum est) in locis quibusdam lapidosis, & interdum aqua commixta per venas terra manat, & effluit. Quapropter mirari non licet, si fontes, riuuli, lacus, ac putei reperiri possint, qui serpentes, ossa, & alia multa in lapidem tractu temporis vertant. Verum non est ignorandum, quod succus à lapidum matu aliquo agitat, non facile in lapidem densatur, nisi crassus admodum fuerit, sed simulatque in meatu ligni, aut alterius rei receptus, dispersusque quieuerit, frigore cogitur, & concrefcit, mutatque res illas, quibus continetur, in lapides, vt in quodam Gothiae fonte euenire probatissimi autores testantur. Cuius gutta solo persusa, cum moueri, aut agitari nequeant ab ambiente aère, densantur & lapidescunt. Quod si praeterea verum est, in montibus Pyrenaeis esse loca, in quibus aqua pluuiales lapidescunt, id ideo fieri posse videtur, quod aqua cum terra permixta vel solus calor paulatim concoquat, vel insignis propter calorem siccandi vis, quae terra insit, conspisset: vtraque enim modo ex eis potest effici lapides. Neque necesse est constringere, aut comminisci aliam vim, quae id ipsum agat, quam quatuor qualitatum, aut eam, quae ab ipsis inter se agentibus, & patientibus orta loco tribuitur. Sed hic nobis subit inquirendum, cur vnus tantum quandoque gignatur lapis, cur verò plures vno loco efficiantur. Fit igitur, vt arbitratur, vnus tantum lapis, cum locus, qui conuenit materiam, solidus fuerit, ac meatibus carens. Quippe conclusus calor omnem tunc operam, tum facultatem vniuersam materiam conserens, vnum duntaxat lapidem gignit, & ipsum quidem magnum, aut paruum, secundum materiae quantitatem: quapropter plerumque singulares à frigore efficiuntur, cum purissimi succi, ex quibus constant, vniuersi multi ac magni in locum vnum congregentur. Verum contra plures gignuntur lapides, si locus non fuerit plane solidus, sed meatibus refertus, per quos calor ipse discurrere queat: nam si meatus pauci fuerint, calor materiam diuidens paucos efficit lapides: sin multi, multos. Ad haec plures generantur lapides non modo ex praedictis, sed etiam ex materia diuersitate: quandoquidem calor partem vnus generis secernens ab alterius generis parte, plures efficit lapides. Item plures efficiuntur ex multis vnus loci receptaculis, in quibus infusa materia in plures partes diuiditur: siquidem in ea frigus non minus, quam calor vires suas exercere potest. Qui lapides praeterea pro diuersa materia mole, magni aut exigui redduntur. Isdem modus quoque glarea & silices fiunt: etsi vsapius aquarum impetu, qui saxa frangit, & congregant, efficiantur. Haecenus causas explicauimus, quae lapides, & metalla efficiunt: nunc ad eorum differentias progrediamur.

gradiamur. Colorum itaque discrimina, quae in lapidibus spectantur, materiae, ex qua gignuntur, diversitatem multam: unde unus & idem lapis saepe varios colores consequitur, quod fiat ex diversi coloris materia. Deinde calor, et spirituum lapidum sit opifex, coloribus materiam inficit: nam obscuros ipsius colores illustrare, illustres vero obscuros red-
dere potest. Cuius effectus exemplum clarum habetur in coloribus ys, quibus fictilia vasa pinguntur: namque coloris omnes, qui ad vasa fictilia pingenda, vel inficienda parantur, anteaquam in fornacem conuertantur, ab his plurimum distant, qui in fictilibus ipsis igne torrefactis, postea visuntur. Quandoquidem etsi fictilia aris squama super porphyrite Lapide leuigata, admista aqua, secta rufo colore, aris serè modo appareant, ignem tamen fornacis experta, viridia efficiuntur: sicut & color, qui ex ferri squama paratur, melius efficitur. Lapis etiamnum, quem figuli nostrates vulgò vocant zaffara, porphyrite Lapide leuigatus, colore subnigro cruda adhuc fictilia tingit: sed igne percoctus, in caruleum præstantissimum mutatur, ut nobis aperte declarat caruleus, ac pulcherrimus ille color, quem vulgò pictores vocant Smalto: is enim ex ipso lapide zaffara nominato, cum vitro misto in vitruvius fornacibus efficitur. Verum hanc colorum permutandorum facultatem in frigore non inuenias: quare lapides ab ipso coacti colorem eundem seruant, quo prius eorum materia infecta fuerat. Ex his adduci possumus, ut non temerè credamus, quod plerique fluuiorum, ac torrentium silices coloribus in superficie tinguntur: quoniam modo aquarum inundatione madescant, modo solis calore siccantur. Solum enim calor, a quo silices ipsi estate Sirio ardente adeo incalescunt, ut vix tangi possint, ipsorum quidem colores (ut fictilium fornax) facile immutare potest, licet id magis euenire constet in eorum superficie, quam in centro. Differunt & metalla inter se colore, splendore, sapore, odore, pondere & facultate. Color primum varius in metallis conspicitur, nam vnumquodque suum sortitur colorem. Aurum siquidem inter metalla, ideo fului coloris est, quod calor vel terram in fluiditatem quandam sinceram verterit, anteaquam cum aqua misceretur, vel succum ipsum mox futurum aurum. Aes vero suum colorem habet, & eum quidem subrubrum, eo quod terram nonnihil impuram adusserit calor. Ferrum autem subnigrum est, propter terram valde impuram, & adustam. Argentum porò candidum est, quod terra eius fuerit alba: eadem in ceteris singulis colores inuestigandi ratio. Sequitur deinde eorum splendor, & nitor, qui ab aqua tantum: ut antè diximus) prouenit. Ex quo fit, ut quando humor ipse tenuior, densior, puriorque fuerit, eò metallum nitidius ac splendidius efficiatur: quam ob causam reliquis hac in parte præstat aurum. Atque hinc etiam saporem odoremque sibi metalla ascribunt: dum enim aurum igne comburitur, terra ipsius sinceritate, quae optimè cum aqua commista est, fumum perexiguum, & vix sensibilem emittit, & dulcem, ac suauem magis, quam foetidum. Argentum verò contra, quod terram impuram, licet combustu difficiliorem obtineat, plus fumi eructat, quam aurum, & subfoetidum quoque odorem exhalat. Sed tam ferro, quam aeri multò maior sumi copia effunditur, atque vna odor longè foetidior, quod subiecta adustam contineant terram. Plumbum denique ac stannum, ob aquae redundantiam, hebetes admodum odores promunt. Nec alia de causa tum arca, tum ferrea vasa, qui rem hanc scitè cognouerunt, ab vsu coquinario abdicauerunt, quam quod adustae terrae, quam possident, valde amara qualitate cibi omnes, qui in huiusmodi vasis vel coquantur, vel parantur, vel asportantur, vel reponuntur, facile infici possint. Id quod non modo gustum malè afficit, & exasperat, sed etiam in ventriculo nauseam, & subuersionem commouet. In hoc ergo admonitos seplasiarios volumus, ut ab horum vasorum vsu caueant: nam quandoque compertum est, quod acida medicamenta in cacabo areo (quae fuit pharmacopoeia vel igniua, vel imperitia) decocta, sana ac periculosa intulerunt agris symptomata. Præterea metalla omnia ponderosissima sunt: cuius rei causa est densitas ipsa, quae sequitur bonam terram cum aqua permisionem. Hinc fit, ut grauissima quaeque pondera metallis liquefactis supernatent, modò maior sit metallorum quantitas, quam rerum, quae ipsis demerguntur. At huius rei experimentum quotidie facere licet, si argentum viuum in aliquod vas infundatur, eique metallis pondera superponantur, auro excepto, quod solum inter cetera fundum petit, quoniam plus ceteris ponderet: argento enim vivo ipsa pondera non aliter supernatare deprehendentur, quam aqua ligna. Ceterum aurum in ipso mergitur, non modo quod ponderosius sit, sed etiam quod cognationem quandam, & quasi consensum cum ipso habere videatur. Metalla in super, quae liquefcunt, ys quae attingunt, minimè adherent: nec eadem humectant, neque etiam labuntur, ut ceteri aquei liquores tam sositus, quam à plantis, aut animalibus producti: sed eorum partes inuicem cohaerent, simulque coherent. Idque non alia ratione fieri constat, quam quod tam bona, firmaque mistio rei sicca cum humida facta sit, ut sicca obstet humida, ne adhaerescat, & humectet: humida verò contra impediatur, ne sicca prorsus conquiescat. Quae quidem mistio quoniam in auro perfectissima reperitur, ideo hoc igne nunquam absimitur, nam cum eius purissima terra sit optimè cum aqua permista, humorem stringit, & continet, ne vi ignis expiret: humor verò contra terretur, ac defendit terram, ne accendatur. Idcirco nunquam comburitur aurum, ut cetera faciunt metalla, quae quandoquidem impuriorem sortiantur terram, deterioremq; mistionem, proinde ignis violentia, facile rapiuntur, & conficiuntur: cum enim terra flammis accensa fuerit, humorem celeriter deperdit. At tamen metallum vnum alio magis, & citius comburitur, pro ut hoc illo plus terra, eamque minus probè mistam obtinet. Etenim si libeat experiri, imprimis ferrum deprehenditur igni consumi, propter nimiam, quam habet, terra impura copiam. Mox plumbum, & stannum, quod ys non satis firmum sit cum terra temperamentum, quam ob causam postquam humorem exhauserit ignis, terram consumit. Deinde aes, quod cum terra purioris, ac etiam paucioris particeps sit, quam ferrum, etsi ea non satis exquisitè mista sit cum aqua, diutius igni resistit. Postremò argentum, quod quia puriore terra constat, ac melius aquae commista, non nisi longiori tempore flamma cedit. Verum plumbum, ac stannum non ob id igne tam facile vincuntur, quod multum impurae terra contineant, sed solum ob mistura vitium, quoniam in his imperfectior inuenitur. Sed ad lapides nostra reuertatur oratio, de quorum quoque luciditate, siue perspicuitate, ac nitore, vel horum oppositis obscuritate, ac squalore iam aliquid nobis disserendum est. Ex prædictis itaque omnibus clarum esse arbitror, lapides aquam magis, ac terram participare, quam cetera elementa. Sed quoniam non terra, sed aqua cernitur esse perspicua, ac pellucida, ideo ab ea tantum perspicuitatem, luciditatemque, in ys aduenisse constat. Vnde ex succis claris, & pellucidis constare lapides, qui translucent affirmamus, quemadmodum ex terra eos, qui qualitate perspicuitati opposita reperiuntur: hi enim ex claris succis gigni nequeunt, sed ex impuris, ac turbidis vel luto, vel nigrore infectis. Quod verò alij lapides magis, alij minus pelluceant, non aliunde fieri certum est, quam è succorū diuersitate, cum scilicet alij alijs clariores, ac lucidiores existunt. Ex quo sequitur, quod alba gemma gignatur ex succo, cui aquae color insit, atque adeo ceteris clariores, ac illustriores appareant, ut crystallus, & iris gemma sic ex argumento vocata: nam sub tecto percussa sole, ob angulos quos habet, colores ex opaco reddit, speciesque arcus caelestis in proximis (ut Plinius verbis utitur) ei aculatur parietes. At adamas ex succo minus claro progignitur, ideoque tam iride, quam crystallo obscurior est. Non dissimili varietate notantur aliorum colorum gemmae translucentes, siue ortae fuerint è succis viridibus, ut smaragdi, ac prasij: siue è caeruleis, ut sapphyri, cyanei, & iaspidium quoddam genus: siue è rubris, ut carbunculi.

Lapidum colores vnde

Lapis zaffara.

Metallorum differentia plures.

Admonitio contra Cacabos aereos.

Metallum vnum altero citius cur coburatur.

Lapidum diuersa discrimina.

Cur lapides alij pellucidiores.

Gemmae cur
nitent.

Lapides cur
leues aut
graues.

Lapides cur
duri vel mol-
les.

Lapides cur
ardent.

Lapides ero-
deates.

Lapides cur
pregnantes.

Conchylia in
lapideis.

Pisces lapi-
dibus inscul-
pti.

Pisces fossi-
les.

Terrarū bre-
uis enarratio.

Terra sim-
plex quæ.

Terra com-
posita.

bunculi: siue è purpureis, vt amethysti, & hyacinthi: siue ex aureis, vt chrysolithi, & chrysoptij: siue ex misti coloris se-
cu, vt opali. Hinc igitur colligi facile potest, quòd cetera gemmarum genera, qua perspicuitate carent, è succis concretis
impuris, atris, & obscuris: quando nec aqua quidem limpidissima, cui ater succus infusus sit, clara ac pura perspicua pos-
sit. Nitent tamen gemma non translucens propter insignem leuorem, qui lucis continuitatem & densitatem par-
Quem quidem leuorem, aut sibi natura comparant, aut artificum mangonio consequuntur: isdem de causis maris
quoque radiant. Porro lapides & gemma pellicentes nonnunquam coloris labem, aut vitium aliquod contrahunt:
sape enim aut umbra, aut nubeculis, aut capillamentis, aut sale, aut plumbagine tiantur. Que sane omnia non
alia ex causa proueniunt, quam ex coloris succi diuersitate. Gignitur quidem umbra, cum succi color aliqua parte ob-
scuro fuerit: nubecula verò ob partem albidioris coloris. At capillamentum, quo presertim sapphirus inficitur: sal-
quo opalus: plumbago, quo smaragdus, ex alieno prorsus colore fiunt, non autem proprio gemmarum. Quicquam s-
bi gemma scabritiem induunt, cum ob succi diuersitatem partes inaequaliter coalescunt. His ergo rationibus nitent, non
non audebit dicere atque asserere, lapides omnes, ac saxa, qua neque nitent, neque pellucunt, ex crassissimo succo, & im-
rena materia fieri. Differunt praterea lapides spissitudine & raritate, leuitate & grauitate: itaque ponderosi, ac im-
pactis lapidibus pauci & admodum occultri sunt meatus: raris verò, ac leuibus contra multi, & patentes. Quapropter
dicendum esse reor, quòd raris, ac leues efficiantur lapides vbi eorum humor cum terra non probe fuerit mistus, & se-
dem à calore siccatus, locum in quo consederat, vacuum relinquit, vt in topho & similibus conspicitur. Idem quoque ca-
nit, cum sponte flagrant montes, vt Aetna in Sicilia, & Vesuius in Campania Plinii tempore, ac etiam hac nostra æta-
te: nam cum in magnis incendijs terra cremetur, eadem ratione ex ipsa fiunt meatuū pleni, cauernosi, & lenissimi por-
ces. Contrarium planè fieri constat, si humor vndique in terram penetret, & illi optinè misceatur: in enim hoc modo la-
pides graues, compactos, ac duros generat. Quod autem lapides duri, vel melles fiant, partim materia in causa est, partim
verò ibi, quod materiam fingit, & format. Nam si fuerit materia tenax, & calor tantus, vt ex ipsa humorem exhor-
te queat, vehementer constringitur, & in se cogitur, fitq; ex ea lapis densus, & durus. Si lentior parum admodum, ac
nihil habuerit, & calor fuerit multus, aquam etiam si probe terra permixta sit, abstrahit, & resoluit, terram verò con-
rit: quo fit, vt lapis adeò mollis fiat, & friabilis, vt facile in puluerem redigatur. Quod durefiunt ad hæc lapides frigore,
pote quod succum validissime cogat & constringat. Atque hii lapides, qui ex huiusmodi succis coactis concreuerunt, in fove-
ces ardentes coniecti liquefiunt, fluuntq; ob conclusos humores. Qui verò igni acriter accendantur, & disiliunt, non qui-
dem tantum humoris in se continent, quantum priores, vt eo terrena partes cohiberi possint. Quos autem ex hoc generi
calor, ignis terit in puluerem, propter terrenam siccitatem. Ceterum qui ex succis pinguibus, & bituminosis fiunt,
accensi non secus ac ligna ardent. Cuius generis est gagates lapis, quo Cimbrici, & alij perique Germania inferius popu-
li passim lignorum vice, quorum inopiam habent, ad ignem vtuntur. Verum enimvero non ob id tanta est ignis vis, vt
adamantem vincat: quandoquidem huius humor ignis calore fortior existit. Eandem etiam ob causam adamantis non
modo non comburitur igni, sed ne quidem dissoluitur. Vterque enim etsi siccus, cum tangitur, esse sentiatur, tamen humo-
rem immixtum obtinet, non aliter atq; metalla. Porro lapides, qui corpora erodunt, vt in Lycia inueniuntur, vel ab Asio
vt Asius, in quo corpora defunctorum condita absumi tradunt, vnde illi sarcophagi nomen, ex materia admodum ac-
gignuntur, vt in sodinis quibusdam cadmia quadam inuenitur, qua fossoribus ipsis manus erodit & exulcerat. Post-
mo nonnulli lapides sunt, qui veluti pregnantis lapillum, vel argillam, vel liquorem in vtero gerunt. Cuius rei causa est
& materia diuersitas, & quòd eadem magna ex parte figuram globosam referat, aut quam proximè accedat. Materiam
enim pars interior ab exteriori differens, aut calore cocta mox diuiditur, aut aliquo post temporis spatio separatur, non
secus ac arefacta nucis auellana nucleus à putamine. Quòd si fuerit succus, vel lutum tenax, ipsa etiam pars interior in
lapidem cogitur, vt in Aetite visitur: si verò lutum non tenax, vertitur in terram plerunque argillaceam, vt cernitur in
in Gaode: si succus tenuis, vel aqua, liquor interdum remanet, vt in Enhydro, in quo ad motum fluctuat intus, non
ouis liquor, vt inquit Plinius. Ceterum cochleas in saxis repertas, calor conclusus, ex materia pingui, & lenta efficitur
detur, & ex eadem gignere musculos, & conchylia: sed terra quanto est crassior, quam mare, tanto ea magis impedit
gignit. Nec mirum cuiquam esse debet, quòd eiusmodi conchylia in lapidum medio orta, ibi diutius conclusa, ipsius
lapide, crescant, & viuant. Siquidem ego cerò testari possum, me vidisse non longè à Timauo fonte prope Duinum ca-
strum in Adriatici litore situm, vbi maris alluit vnda, lapides à socijs malleis ferreis frangi, atque in illis plurima reperiri
conchylia, qua Dactylos à forma, & colore vocant: sunt enim palmarum caryoti similia. Hæc eadem me aliquando co-
medisse memini in Castro Goritia in opiparis mensis illustris ac clari comitis Francisci à Turri, nostrorum studiorum (que
eius est singularis humanitas) fautoris, promotorisq; maximi: qua sanè non minorem quam ostrea, in cibis gratiam habere
comperi. In ipso quoque Duini castro isdem vesci mihi contigit apud magnificum Matthiam Hofferum, virum sane ma-
gna bilitate & moribus insignem. Neque me fugit, his nuper elapsis annis virum magnificum atque praclarum Didacum Me-
dozium Hispanum, lapideas quasdam tabellas mihi ostendisse ex Veronensi agro (vt assererat) delatas, qua in longum
scissa varios intus pisces veluti insculptos habebant, cum omnibus suis particulis quamuis minimis, in lapidem versis: in-
tamq; admirabilia sunt opera natura. Huc praterea illud accedat, quòd pisces fossiles reperiuntur ultra pyrenæi montes
vt narrat Polybius libro 24. suarum historiarum. Vsque ad Narbonem amnem, inquit, planities est, per quam flumines
runtur Illiberis & Rhodanus, fluentes propter vrbes eiusdem nominis, qua habitantur à Celtis. In hac igitur planitie
sunt pisces fossiles dicti: in ea enim est terra tenuis, vbi multum nascitur gramen, sub quod altitudine duorum vel trium
cubitum per arenam aqua fluminum delata fluit: & si quando inundauerint, cum aqua pisces terram subeantes (non
mirifice appetunt graminis radices) planitiem efficiunt refertam piscibus subterraneis, quos incolæ effodiunt: hoc Poly-
bius. Quibus adde, quòd etiam pisces fossiles inueniuntur circa Heracleam, atq; in alijs plerisque Ponti locis, vt Theophrastus
stus est auctor: quin & in Germania vltra Albim fluuium quibusdam in locis hac ætate effodiuntur. Verum quandoquid-
dem Dioscorides in hoc quinto libro scripsit tractauitque etiamnum de varijs terrarum generibus, qua in medicum usum
veniunt, non alienum fore iudico, quòd de his quoq; vniuersim aliquid disseramus. Terram itaq; aut simplicem, aut
compositam esse oportet. Simplicem nunc eam intelligo, qua cum nulla re fossili, neque cum aliquo liquido succo fuerit per-
mixta: non autem eam, qua à ceteris elementis sit penitus munda: quippe ob continuam elementorum mixturem vix vi-
tam reperiri posse putauerim, qua nonnihil aqua, aeris, vel ignis non complectatur. Quamobrem eam simplicem dixerim,
qua nullam prorsus aluminis, aut salis, aut nitri, aut chalcanti, aut bituminis, aut cuiusuis alterius rei metallicæ mix-
tionem admiserit. Contra compositam appellauerim, qua vnum, vel plura ex his in se receperit. Simplex autem terra, de qua
nunc sermonem habemus, modo grauis, modo leuis constat, pro maiori, aut minori elementorum mixture, qua ibi mis-
tum

Quoniam dubites, quin ea sit lenior, ac rarior, quae plus aeris, aut ignis participat, quam aqua? Ad haec terra ipsa per se
 ... sed varias fortitur facultates pro varia eorum, quae ei admiscuntur, qualitate. Nam illa, in qua est aqua
 ... que ignem accepit, acris est: quae aerem, glutinosa, & leuis: quae aerem & ignem, lenis & acris. Illa ve-
 ... aut alumen, aut chalcanthum, aut metallum aliquod vel fossilem succum, facile quidem
 ... factu cognosci potest. Nec de his plura diuenda sunt, quod mihi plane persuadeam huiusmodi qualita-
 ... non cognitu facies futuras, gustu duntaxat iudice, qui tamen dulcia ab amaris, acria ab acidis, salsa ab insipi-
 ... discernere solet. Terra artem, quarum in medicina est usus, sua mutuantur nomina partim à

Terrae medi-
 cinales unde
 denominen-
 tur.

10 Cima Eretria, quod ex Eretria Euboea ciuitate: & Pnigite, quod ex Pnigite Libya pago. A colore appellationem tra-
 bunt Rubrica & alia nonnulla. A facultate denique nomen accepit Ampelitus, quod eius sit usus ad illinendas vites sub
 germinationis tempus adiuuans eruciam iniurias. Et ut aliorum quoque fossilium colores percurramus, colore albo constant,
 creta quae saepe amatores videntur, gypsum, alumen, amiantus, Arabicus lapis, Iudaicus, melitites, galactites, alabastrites,
 crystallus, argentum, argentum viuum, s. annum & sincerissimum marmor. Colore cinereo produntur Melia terra, &
 Eritria aerea. Ceruleo vero colore spectantur saphyrus, cyamus, & lapis proprie ceruleus dictus. Virent smaragdus, prassi-
 ... & chalcanthum. Flauo luteoque colore sunt aurum, ochra, chrysopatus, chrysolitus, & auripigmentum.
 Rufo tinguntur rubini, granati, sandaracha, corallium hematites, scissilis lapis, minium, ciunabaris, rubrica, & Lemnia
 terra. Quaedam colore purpureo fulgent, ut hyacinthus, & amethystus. Alia caruleo diluto visuntur quemadmodum ias-
 pu, quem boream dicunt. Nonnulla ceruleo viriscent, ut arugo, & Armenius lapis. Alia albo rufescente, ut aphrodisiace.

Fossilium
 colores varii;

20 Quaedam rufo candicante, ut xanthos. Quaedam nigro rufescente, ut tertia batrachitis species. Aliqua atro purpurascen-
 te, ut alabandus lapis. Alia aureo candicante, ut topatius. Sed plura separatos colores habent, ut nigro, albo, & quouis
 versicolore, ut achates. Apficon vero nigram rubentis vna distinguunt. Contra nasomonites, cum sit sanguinis colore,
 nigris venis decoratur. Venae autem, quae speciem praeseferunt sanguinis intexta, quodammodo sunt heliotropijs, corpore
 portacei coloris. At in caruleo saphyro aurea puncta collucent. Quin etiam quaedam sunt, quae tres separatos habent co-
 lores: nam per album aegyptellae corpus duae vnae permeant, altera nigra, altera rubra. Porro eupetalos, & orca quatu-
 or habent colores: eupetalos enim ceruleum, igneum, ming, mali: orca vero nigrum, fuluum, viridem, candidum. Ver-
 ficolores postremo nonnulla habentur, non aliter ac collum gallinae Numidicae vel pauonis, aut columbae in sole aprican-
 ti, ut crystallus, & pederotum genera: ea enim ad inlinationem colores permutant. Caterum sciendum est, quod ex
 fossilibus, quae in medendi usum recipiuntur, alia quidem corpora sanant, alia vero eadem affligunt, in cibis vel poti-

Fossilium fa-
 cultates.

30 onibus data. At quae remedia corpori sunt, medentur ei partim proprietate totius substantiae, partim qualitate aliqua,
 qua profligantur morbi. Quae autem proprietate valent, earum quaedam resistunt venenis, quaedam morbos sanant.
 Quibus natura dedit vires superandi venena, eorum alia corpora, quae pestilentia sunt affecta, curant, ut smaragdus,
 sigillum Lemnium, gleba Armenia. Alia singulari veneno medentur, sicuti scorpionum ictibus saphyrus potus, sul-
 phur plaga illitum: sicuti stranguilantibus, nitrum potum, ac pariter atramentum sutorium. Alia pluribus aduersan-
 tur venenis, ut sal, morsibus viperae, cerastus, ac crocodili, his enim emplastri modo imponitur: sed potum opio, & fungis
 praesidio est. Quibus vero fossilibus comparatum est, ut morbos proprietate fugent, eorum quaedam sanguinis profluuium
 sistunt, ut hieracites: alia os ventriculi gestatu & appositu roborant, velut iaspis: alia sinistro mulieris brachio adal-
 ligata abortum prohibent, ut aetites: alia item ad femora pregnantis adalligata partum accelerant, ut idem aetites, &
 iaspis. Sunt quae crassa e corporibus deiciunt, ut magnes: alia atram bilem, ut Armenius, & ceruleus lapis: nonnulla

40 vomitum faciunt, ut idem Armenius lapis, chryfocolla, & chalcanthum. Sed inter ea, quae elementaribus qualitatibus
 agunt, calefaciunt alumen, chalcanthum, chalcitis, misy, sory, melantheria: refrigerant, terra Eretria, molybdoides, sti-
 bium, argenti spuma, cerussa. Quae autem secundis qualitatibus operantur, quaedam molliunt quae dura sunt, ut gaga-
 tes: quaedam contra indurant quae mollia sunt, ut lapis plumbarius, & stimmi. Sunt & quae insensibiles ferè poros ape-
 riant, & quae claudant: aperit enim nitrum, spuma nitri claudit terra Samia, & in summa omnis terra glutinosa. Alia
 quae corpori coierunt, nempe glandulas, & nodos discutiant, ut pyrites, molaris, bitumen. Aliqua cicatricem inducunt,
 ut chalcitis misy, alumen, scissum. Nonnulla carnem excrescentem minuunt, ut assij lapidis stas, arugo, chalcanthum,
 chalcitis, misy, calx viua, auripigmentum, sandaracha, chryfocolla. Non desunt etiam, quae diuersis viribus praedita sint,
 ut cimolia, & sal: cimolia enim reprimat, & discutit: sal abstergit, & adstringit. Sunt denique quae vires easdem
 habeant, ita ut deficiente vna, altera eius locum suppleat. Siquidem chryfocolla, & lapis Armenius eundem effectum

Fossilia mor-
 tem inferen-
 tia.

50 praebent: auripigmentum, & sandaracha: hematites, & schistos: atque haec quinque chalcanthum, misy, chalcitis, sory,
 melantheria inter se viribus consentiunt. Veruntamen ex his chryfocolla vim efficaciorē obtinet, quam lapis Armenius:
 auripigmentum, quam sandaracha: hematites, quam schistos: chalcanthum, quam reliqua sibi cognata. Caterum non
 pauca reperiuntur fossilia medicamentum (ut sicut libro sexto dicitur) quae in cibo, aut potu frequentius, aut copiosius
 sumpta, vel maxime sumentes affligunt, vel us mortem inferunt. Idque efficiunt, vel quod viscera erodant, veluti sanda-
 racha & auripigmentum: vel quod spirandi organa occludant, ut gypsum & cerussa. Sed haec de fossilium facultatibus.
 Nam de concretis succis, cuiusmodi est sal, nitrum, alumen, chalcanthum, & cetera, quae cum eo cognationem habent,
 sulphur, sandaracha, auripigmentum, chryfocolla, & alia nonnulla, in huius libri processu suis locis latius tra-
 dabimus.

Αμπελος οίνου


VITIS VINIFERA.

CAP. I.

Folia vitium, & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant & inflammationem stomachi, ardoremque
 cum polenta. Folia etiam per se, ut quae refrigerent, & adstringant, imponi solent. Potus eorum
 succus dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & grauidarum malaciae medetur. Eadem ef-
 ficiunt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lacryma vitium, quae veluti gummi in caudicibus concreuit,
 ex vino pota calculos pellicillita lichenas, & psoras, leprasque, nitro prius perfrictas, sanat: eadem cum
 oleo sapius pilis illitis, pilothri effectum habet: maximeque sanies, quam accensa sarmenta vitium viri-
 dia exudarunt: qua & peruncte verrucarum inforicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum, & vi-
 taceorum, detractis in sede condylomatis, & thymis, illitus ex aceto medetur: prodest luxatis, & vipe-
 rarum

Gggg i

VITIS VINIFERA.



Vitis vinifera, vuaeque confid.

Vites quo pacto ab erucis vindicentur.

Brassica apud vites non letenda.

Vites perpetua fronde virentes.

Vuarum facult. ex Gal.

Nomina.

Vitium omnium genera, quae non modo gratissimas, dulcissimasque vvas ad cibos proferunt, verum etiam ex his vitiis precipuum humanae vitae bonum, suauissimumque potum largiuntur, quot & qualia sint, hic scribere superuacuum esse puto. Quandoquidem earundem dulcedine humanum genus allectum, adeo eas sibi conciliauit, familiarisque reddidit, vt nullus tam clarus quam obscurus, tam nobilis quam ignobilis, tam denique urbanus quam rusticus inueniatur, qui vitium generibus, earumque historia non possit apte, atque etiam distincte loqui. Vt autem & vites ipsae, & vinum a quorundam vermiculorum erodentium vindicentur iniuria, illud omnino silentio iuuoluendum non duximus: quod cum a sarmentis repurgantur, ac putantur, falx hirci sanguine oblinatur, vel ea ipsa prius cotem experta, castorei corio efficitur, nuper emissa gemma (si tanta rei agraria auctoribus fides adhibenda est) ab erucis minime erodi possunt: neque etiam emissa iam folia, ab alijs quibusdam vermiculis conuolui. Praeterea non ignorandum est, quod magna admodum iniuria vitibus infertur, atque vuis maximum detrimentum, si brassica seratur inter vites: siquidem perniciale viti altera odium intercedit. Quod cum animaduertent rei medicae scriptores, precipuum ebrietatis antidotum in viti collocarunt. Ea enim si cruda praesumatur (vt apud plerasque nationes in corna initio capitata brassicam minutim rescisam, lactuca & intubi loco in acetarijs recipi obseruauimus) ebrietatem futuram mirum in modum atret, quemadmodum etiam post sumpta crapulam discutit. Quo fit, vt Germania populi vino admodum addicti, semper suam mensam brassicam interponant, vel recentem, vel muria asseruatam. Ad Elephantinam (vt Theophrastus est auctor) itemque Memphina, vites perpetua fronde virent: tametsi annuas tantum proferant vvas. In Italia vero vites habentur, Plinio sane appellata, quae ter in anno florent, sed primas tantum maturant vvas. Vvas sine vinaceis quidaem prouenire affirmant, si propaginum ima pars, quae terra in scrobe obrui debet, ante plantationem adeo secetur in longum, vt medulla vitium eximat, ac deinde coniunctis partibus, & vlmeo cortice circumuolutis, propagines ipsa suis scrobibus implantentur. Sed vt iam vuis suas reddamus facultates, Vua (vt Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus memoria praedit) quemadmodum inter fructus autumnales principatum obrinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minusque prauis succi habent, praesertim cum exactam maturitatem fuerint adeptae. Porro quod ipse nutriant, maximo argumento sunt, qui vinearum fructum custodiunt: quippe qui tunc temporis vuarum esu admodum pinguescant. Ceterum non omnes vno quidem modo nutriunt, quoniam quae dulces existunt, ceteris succum habent calidorem: et id sunt ferulosa, ac ventriculum inflant, & aluum subducunt. Contrarium efficiunt austera: siquidem, & ventrem cohibent ferulorum nutriunt, egregie concoquuntur. Acerba autem vitari prorsus debent, vt pote quia ventriculo aduersentur. Vuae tamen dabiliores, quod carnosiores fuerint, praesertim cum probe matura a vite decerpuntur. At pensiles, si prius matura fuerint, & dulces, ceteris minus ventriculum inflant, & aluum conuenienter emolliunt: haec tenus Galenus. Vuae recentem praesertim matura praestat auxilio magno ad ambusta, si manibus pressa ad id vt vinum recadat, ambusti partibus illinatur. Nam quae non solum dolorem illico sedat, sed vesicas fieri prohibet. Vitis, quae Graecis ἀμπέλος εἰνοπέρος, Latinis Vitis vinifera appellatur: Arabibus, Harin, seu Harim: Italus Vite vinifera: Germanus Weinreb: Gallis, Vigne. Quae vero ἀμπέλος ἀγρία Graecis Labrusca Latine dicitur: Italus Lambrusca: Germanice Wildweinreb: Gallice Vigne sauuaage. At Vua Latine ac Graecis σταφυλή Graecis vocatur: Arabibus Haineb: Germanus Weinber: Gallis Roisin.

rarum moribus: contra lienis inflammationem dilinitur cum rosaceo, & ruta, & aceto.

Ἀμπέλος ἀγρία LABRUSCA. CAP. II.

Labrusca duorum generum est. Alterius vuae maturefcit, sed floretenus cenanthen nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauiculae, quibus repunt, vim habent cultae viti similem.

σταφυλή. VVA. CAP. III.


Vvae recentes aluum turbant, & stomachum inflant: innocentiores, quae decerpunt diu peccare, ideo quod in eis copia humoris exiccatur, vilesque sunt stomacho, agrisque, atque cibi auaricam excitant. In uinaceis, & ollis seruatae, ori & stomacho gratae sunt, aluum sistunt, sed vesicam, & caperentant: & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque, quae in musto fuere. Sapa, aut passio conditae, stomachum magis infestant. At quae solent prius passae, in aqua caelesti conduntur, minus vinolae sunt, siticulosas, ardentibus, & longis febribus ilubres. Reconditi vinacei inflammatis mammis, cingentibus, ac praeduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fumone vuluae laborantes iuuat infusa: ad defeciones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringenda vim obtinent: stomacho utiles sunt. Inspargitur farina tostorum, polentae modo, dysentericis, & coeliacis, & solutis stomacho.

Vva passa alba adstringentior est. Prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Eit ar in dyenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle admista milii, ac hordei farina. & o no. valet ad purgandum caput: eiusdem gratia cum pipere cominanducatur. Testium inflammatione scie dat. illita cum lomento fabarum, & cumini farina. Fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis pu tredines & gangrenas, sine nucleis trita. & cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter cum pana cis succo illinitur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

* VVA PASSA. *

Vvas passas, quarum vbiq̃ vulgaris & frequens est vsus, Vva passæ omnibus notissimas esse arbitror. Veruntamen non est consideratio.

meo quidem iudicio, credendum, quod cum de Vuis passis mentionem faciunt Galenus & veteres aly, paruulas illas tantum intelligant, quæ hoc tempore ex quibusdam Aegæi insulis ac Peloponneso Venetias conuehantur, & in quibusdam etiam Italia locis insolantur: siquidem Galenus nulla magnitudinis, vel paruitatis habita ratione, omnes in vniuersum vvas solis calore siccatas, passas appellat. Id quod ipse Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus ijs verbis declarat. Porro quemadmodum passarum differentia, quæ à colore sumitur, nihil ad passarum facultatem confert, ita nec magnitudo: sola autem qualitatis, quæ gustu inest, differentia potest omnia. Ex his nimirum Galeni verbis satis colligi potest, ipsum omnis generis vvas, quæ soli feruore staccescunt, nullo prorsus discrimine passas appellasse, nempe Damascanas ceteris grandiores (zibibum officina vocant) ac pariter his Zibibum off. congeneres, quæ à Smyrnis (vt aiunt) Cypro, & Creta comportantur. Præterea loco citato idem Galenus ita scribit: Nonnulli autem, & rectè sanè, è dulcibus, grandibusq̃, quales sunt scybelitides, priusquam mandant, semina eximunt, quæ & ipsa inueterata, curim duram, & rassamq̃, habent, easq̃ prius in aqua coguntur macerare: nam & semen ipsum facilius sic eximitur. Alia quadam sunt his contraria, solida & crassa, quæ nullum prorsus semen haent. Crescunt hæ in Cilicia, colore substano: In Pamphylia autem scybelitica, & colore nigra: quæ, vt dixi, sunt maximæ: hæc ille. Ceterum sciendum est, non omnes Vvas passas eiusdem esse facultatis: alia namque facultas inest dulcibus, alia iusteris, alia vinaceos habentibus, alia non habentibus. Quæ ita aqua vinaceis carent, vel quod ita natura producantur, vel quod y arte fuerint exempti, si dulces sint, adstringente facultate vsque ad eod pri-



maxime conueniunt. Id quod planè confirmat Galenus libro septimo, & octauo de compositione medicamentorum secundum locos, vbi vvas passas sine vinaceis leniendo pectori, ac iecimorosis plurimum commendat. Contra verò facultate omnino adstringente censentur, quæ cum suis vinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret Dioscorides, Vvam passam cum nucleis in dyenteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit, vt maximo in errore versari existimem Medicos alioqui etatis nostra celebres, qui alui deicienda gratia, Vvam passam paruam vulgarem, quæ ex locis supra dictis in Italiam defertur, simul cum vinaceis deuorandam exhibent: quippe cum aluum fluidam facere in animo sit, iam potius cohibent, quam leniant: id q̃, potissimum, vbi vva passa temporis tractu succi partem amiserint. Quæ re perfecta in hanc sententiam deducor, vt ad aluum emolliendam aptiores censeam Damascanas, Cyprias, ac Creticas (quibus tamen prius nuclei exempti sint, vel exsumuntur, quæ sine nucleis nascuntur) quam quæ minuta passim in officini inueniuntur: quandoquidem hæ succi longè minus, quam corticis, & vinaceorum continent, nisi sint omnino recentes & diligenter asseruata. Quapropter si hoc tenui vuarum passarum genere, vti quandoq̃ cogimur ad emolliendam alui, eas eligi præstat, quæ sine vinaceis proueniunt: vel si hæ defint, suppleant illa, quæ a nucleis fuerint expurgata: tamen si Damascanis & Creticis longè bonitate cedunt: de quibus sanè intellexisse Galenum, easq̃ ad pectoris vitia laudasse planè sufficimur. In quorum genere hæc etiam tempestate sunt, quæ semine carent, quemadmodum quæ Galeni etate ex Cilicia conuehebantur. Illud porro animadvertendum est, quod vbi quis aluum bonam facere contendit, non debet passis vtique gustui acerbicatem, vel austeritatem relinquunt: sunt enim tales frigida, ac terrestres, quibus itaque facultatibus cohibent, adstringunt, & roborant, præsertim si cum vinaceis nucleis comedantur. Vnde scitè Galenus libro secundo de alimentorum facultatibus, hæc prodidit: Vva passa cum aly vuis eandem habent rationem, quam carica cum ficibus. Multa enim sunt dulces, acerbæ autem omnino pauca: plurimæ verò ex dulci & austera qualitate sunt mistæ: quanquam dulces non nihil quoque austera qualitatis habent, & austera dulcedinis. Ceterum vt dulces temperamento sunt calidiore, ita austera frigidiore. Ad hoc austera stoma. hum roborant, & ventrem constipant, & his multò magis acerbæ: mediam autem quodammodo inter ipsas constitutionem dulces obtinent, vt quæ nec stomachum dissoluant, nec aluum subducant. Dulcibus tamen, vt vis quadam semper inest contemperandi, ita & mediocriter detergendi: quibus duabus facultatibus exiguas mordicationes, quæ os ventriculi infestant, obtundunt. Et libro 8. cap. 7. de compositione pharmacorum secundum locos, idem Galenus sic inquit: Vva passa contemptilis videri possit, ob familiarem eius vsus. At verò hoc ipsum eam facit vtiliorem: nam cum familiariter nobis sit, in tantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna, sitq̃ ipsa haud facile putredini obnoxia: & vltra hæc secundum totam sub-

Vva passæ in facultatibus differentia.

Medicorum error.

Vva passæ vires ex Gal.

And. Matthioli Comm.

274

stantiam, videri ipsi, hoc est iecinori, familiaris est, & propria. Item libro de attenuante victus ratione sic habet: Tunc passis, si non sint adstringentes, lieni quidem, & epati tumentibus non conducunt, thoracis tamen, & pulmonum officium conducunt. De vuis autem passis vt cibis sunt, locutus est ipse Galenus lib. 2. de alimentorum facultatibus, hu verou. Alimentum ex passis vuis, tali qualitate in corpus distribuitur, qualis ipsarum natura fuerit, dulce ex dulcibus, asperum ex asperis, mistum ex ijs, quæ vtriusq; qualitatis sunt participes. Quantitate verò copiosius ex pinguibus, ac dulcibus partem ex asperis & macris. Quod si passarum pinguium, dulcium, a quibus semina fuerint exempta, parum molem curæ partem rum mole contuleris, passis valentius nutrire deprehendes. Huiusmodi sane, vt minus quam carica subducant, abstragemus, magis tamen quam illæ stomachum iuuant. Hæc vua, quæ Græcis ζαφίς, Vua passa Latinis pariter ac Italis passis Arabibus Zibib: Germanis Weinbeerlen / Merreubel vnd Rosin: Hispanis passas: Gallis Roisins en capiz.

Nomina.

Οινάνθη.

OENANTHE.

CAP. V.

Oenanthæ vocatur vitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectaque substrato linteo, in umbra siccat. Laudatissima in Syria, & Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria, quare pota stomacho, ac ciundæ vrinæ utilis: aluum sistit, ac sanguinis excreationes. Contra fastidium acorem stomachi, sicca & illita efficax est, capitis doloribus tam viridis, quam sicca ex aceto, & rosaceo perfunditur, sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, oris vlcera, & genitulum nomas trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo ab inflammatione vindicat. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores cum polline polentæ, & vino illinitur. Cinis crematæ in testa candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: reduvas, & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

Oenanthæ consideratio.

Oenanthem non illius labruscæ modo florem esse, quæ vuas ad maturitatem non perducit, verum etiam alterius, quæ fructum perficit, asserere non dubitamus. Nam etsi superius scripsit Dioscorides, labruscæ duorum generum esse, & que alterius vuam non maturefcere, sed floretenus Oenanthem nominatâ perducere: nihil tamen propterea prohibet, quam alterius quoque Labruscæ florentis vua Oenanthæ pariter dici queat, cum non aliud veteribus significet Oenanthem, quam vitis flos. Quod in presenti capite ipse Dioscorides manifeste declarat: quippe qui tradat Oenanthem vocari vitis syluestris fructum, cum florat, nullius factæ generis distinctione. Quin & idem in sequentibus confirmat, vbi vini oenanthem meminit, è feracis syluestris vitis floribus fieri scribens. Ex his itaque abundè constare arbitror, non tantum insinuat, sed etiam fructifera Labruscæ florem Oenanthem vocari posse. Adde quod id quoque apertè testatur Gal. lib. 8. cap. 1. de compositione medicamentorum secundum locos, his verbis: At verò quemadmodum omphacium, sic etiam absinthii, incam admisceo, quandoque etiam ambo, & tertium insuper hypocistidis, & quartum oenanthem: sic autem appello vitium syluestrium germen vni cum floribus ex quo succedentibus diebus vua fit. Plinius lib. 12. cap. 28. Oenanthem vuam, non florem esse censet, sic inueniens: Eodem & Oenanthæ pertinet: est autem Vitis labruscæ vua: colligitur cum flore, cum opomè olet: hæc Plinius: in cuius vltimis verbis suspicor mendam subesse, & fortè rectius legendum esse, cum floret, non cum flore. Non enim video, quomodo quis vnquam vuam cum flore colligere possit. Caterum ne aliquis fortasse deceptus, hic non ducimus silentio dissimulandum esse lapsum Marcelli Vergily, alioqui doctissimi interpretis, & commentariorum Dioscoridis: is autem ex eius verbis, quæ nunc subiiciam, magis innotescet. Monemus, inquit, scribere in 6. sua medicina Paulum Aeginetam purimum quidem ex labruscæ Oenanthem usum esse, quoniam egregie adstringit, stomachumq; & aluum maximè firmat. Veruntamen traditis his, idem statim subiicit: Dioscorides autem aliam describit Oenanthem contrarias huic vires habentem, ideoq; secundis, stillicidio vesicæ, & fellis suffusionibus eam mederi ait. Quorum vtrumque capite hoc legitur, nequid in scriptore hoc alibi legisse me memini, & nihilominus non negligenda Aeginetæ auctoritas, & testimonium est, quem credere oportet vera, & quæ aliquando legisset, testari: hæc Marcellus. In quibus sane vultu videntissimè deprehenditur, hallucinatus, vel potius eorum oblitus, quæ de Oenanthæ herba viribus huic contrarij præter memoriam prodidit Dioscorides libro tertio. Neque solum huius, quam tamen Latinam fecerat, non meminisse videtur, sed neque eorum quoq; quæ ibidem in sua commentatione doctè satis scripsit. Sed aliquando etiam bonus (vt aiunt) dormiat Homerus. Illud postremo aduderim, quod etiam domestica vitis flos Oenanthæ dicitur. Verum quia syluestris vitis vni multo magis adstrictoria pollet, is per excellentiam Oenanthæ appellatur. Dicitur igitur Græcis οινάνθη: Latinis Oenanthæ, & Labruscæ flos: Italis Enanthæ: Germanis Wildreben: Gallis Grappe de vigne sauuaage.

Marcelli Vergily lapsus.

Nomina.

Ομφάκιον.

OMPHACIUM.

CAP. VI.

Omphacium succus est acerlæ vuæ nondum maturefcens, è Thasia vite, aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, vique dum cogatur: semperquæ quod ceruicæ vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctu verò à subdialibus locis in tectum referri, quandoquidem nocturni rores ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, vuam, vlcera oris, humida gingiuarum vitia, purulentas aures cum melle, aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto: dysentericis & mulieribus fluxione vultus laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & aqua ore est vtendum, valde siquidem exurit.

Omphacii consideratio.

Omphacium ex omni immaturarum vuarum genere parat Italia, cum Thasijs, & Aminææ careat vuis, è quibus veteres suum Omphacium consiciebant, ad medicina duntaxat usum, id in sole cogentes, vbi videlicet adstrictorium opus erat. Quæ tamen parandi ratio hoc tempore ferè prorsus exoleuit. Sunt qui vt maiorem omphacio adstrictorem vident parent, è syluestrium vitium vuis illud exprimant, non ad medicamenta tantum, sed etiam ad ciborum condimentum. Ferunt

Vinum omne (vt reliqua in commune dicantur) merum ac syncerum, & sua natura austerum, excelsum, facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat: vires alit, acrobata, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosve: contra serpentium morsus, & omnium ictus, quæ refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si ventris interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore ardet, ritur, maximè alba, vetera & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodata, & fluxionibus obnoxia commodè perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campania, & Parætypianum ab Adriatico sinu & Siculum, quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium & Phygelites ex Epheso. Crassa verò, & nigra stomacho negotium exaltant, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, & minus carum largius potant. In media ætate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, & consuetudine & qualitate vini definiatur. Non sitire, & modicè cibos proli, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis & maximè assidua: siquidem obfessos nervos quondam remittit: largiorq; potus acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen vinolentia aliquot diebus, maximè postquam potus, utilis: namq; modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alacritas gratia factæ tenulentiæ remedium adfert frigida.

Vini facultates variae pro modo vsus.

Vinum cui aetate conueniat.

Vinum glacie vel niue refrigeratum malum.

Vini optimi nota.

Generosissima vina in Goritienfi agro.

Vinum Putinum.

Cum profecto Vinum sit liquor omnium suauissimus, præcipuum humanae vitæ bonum ac præstantissimum subbitum, vitalium spirituum regeneratur maximus, ac omnium corporis tum facultatum, tum functionum instrumentum optimus, cor latissime tueaturq; summopere, nulli mirum esse debet, quod plantam, quæ fructum fert, ex quo vinum exprimitur, vitem, quas vitam, appellauerint veteres. Verum non ob id gaudeant iubilantq; ij, qui vino nimis indulgent, quod ipsum tot laudibus extulerim: quippe cum omne extremum (vt in communi proverbio est) sit vitiosum. Si vinum immodice, & plus quàm deceat, bibatur, periculosos atq; horrendos (vt mox dicetur) procreat morbos. Aliàs si in eius vsu temperantia adhibeatur, tum ad idendum, tum etiam ad roborandum corpus omnium efficacissimum habetur, quandoquidem purissimum generat sanguinem, ocysimè in alimentum vertitur, concoctionem in quavis corporis parte adiuuat, animam addit, cerebrum purgat, intellectum excitat, cor exhilarat, spiritus viuificat, vrinam ciet, flatum discutit, innatum calorem auget, conualescentis impinguat, cibi appetentiam inuitat, sanguinem turbidum clarificat, obstructions aperit, alimentum in vniuersum corpus defert, colorem conciliat, & omne in corpore excrementosum deiecit. Sed si modus absit, & sine ratione, ac temperamento sumatur ingurgiteturve (quod facere solent ebrii) ex accidenti totum refrigerat corpus: neque enim secus nimio eius potu (vt Galenus inquit) innatus corporis calor suffocatur, atq; paruus ignis magna lignorum strux extinguitur. Præterea cerebro, spinali medulla, ac nervis inde exorientibus, obest: hinc fit, vt principe hac parte affecta temporis tractu maximi, & perniciosi concitentur morbi, nempe apoplexia, epilepsia, paralysis, tremor, stupor, ephialta, atalepsis, conuulsio, vertigo, articularum contractio, lethargus, phrenitis, destillatio, surditas, cecitas, & oris laborumq; destentio. Quinetiarum vinum immoderate haustum, bonos corrumpit mores: nam quod homines contentiosi, loquaces, & frenesq; fiant, quod furiant, menteq; moueantur, quod denique alea, libidini ac rei venereæ semper ferè indulgent, ac nonnunquam homicidia committant, nulli verius adscribendum est, quàm vino immodicè sumpto. Adde quod memoriam dissipat, sensus omnes perturbat, assiduos morbos parit, & repentinas mortes adfert: ne singula persequar, quæ res sepe longum esset, & audire molestum ijs, qui nimium vino dediti sunt. Caterum Vinum magis senectuti, quàm iuuetuti aetate conuenit: id frigidam senum temperiem, talem annorum multitudine redditam, temperat ac mouet. Verum pueris, ac adolescentibus ad vigesimum annum vsq; minimè concedi debet, si Galeni sententia subscribendum esse putamus, qui libro secundo de tuenda sanitate, nil aliud asserit vinum esse pueris, & adolescentibus exhibitum, quàm ignem igni additum. Cauendum quoq; est, ne in ardoribus æstatis vinum niue, aut glacie, aut gelidissima aqua refrigeratum hauriatur: quod cerebro, nervis, pectori, pulmone, ventriculo, intestinis, spleni, iecinori, renibus, vesicæ, vtero, testibusq; maxime noceat: Quæ admirari non licet, si tempore vinum arte frigesactum bibentes coli, & ventriculi cruditatibus afficit, item conuulsionibus, resolutionibus, apoplexia, spirandi difficultate, vrinae suppressione, calculo, viscerum obstructione, aqua intercute, ac pluribus alijs grauib; & pernicialibus morbis. Proinde scitissimè Galenus libro de cibis boni & mali succi, hac prodidit. Qui non exercentur summa æstate, cum vehementi calore vrgentur, fontis aquam bibant, niuisq; & vini refrigerati sum vitent. Hac enim quamuis protinus nullam iuuenum corporibus sensibilem lesionem inferant, sensim tamen, occulteq; crescente vitio, cum iam ætas progressu temporis inclinauerit, articulos nervosq; & viscera ijs morbis vexat, qui vè difficulter admodum, vel omnino tolli non possunt. Ad hac in tuenda sanitate diligenter procurandum est, vt vinum, quod in potu alimenti gratia quotidie sumitur, sit mundum, purum, clarum, odoratum, & sapore iucundum: namq; corrotum, turbidum, impurum, odore graui, & gustu ingrato, non modo toti corpori noxam infert, sed etiam sanguinem corrumpit. Quapropter felicissime suam tuentur sanitatem, qui regiones incolunt, in quibus optima vina proueniunt: quemadmodum in Goritienfi comitatu, vbi sanè generosissima vina nascuntur, nimirum de Pucinum illud antiquis adeò celebratum, necnon Vipatum illi bonitate proximum. Hac quidem parè modestèque potant ad tuendam sanitatem mirifice conferunt. Id quod ipse experientia in me facta comperi, atque etiam omnibus in quibus testari possum: nam cum multis ante annis diuturnus ventriculi dolor malè me habuisset, quem totius corporis imbecillitas consecuta erat, ex Pucini & Vipati tantum vsu, me pristinam meam sanitatem, & integrum robur adeptum: certo scio. Ob id ergo mirandum non est, si Plinius magnis laudibus predicauit Pucinum libr. 14. cap. 6. vbi ita scriptum reliquit: Livia Augusta octuaginta duos annos vita Pucino retulit acceptos, non alio vsa. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timauo fonte, saxeo colle, maritimo afflatu paucas coquente amphoras: nec aliud aptius medicamentum iudicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes miris laudibus pyctanum appellauerunt ex Adriatico sinu: hoc Plinius. Cuius certè testimonio planè subscribunt rustici Iapidie incolæ: quippe cum ij vinis Pucino cognatis in quatuordecim

non ut antea, rarissime egrotant, & longævam admodum vitam traducunt. adeo ut plurimi reperiantur, qui non age-
 rum annuum attingunt. Est autem vinum hoc tenue, clarum, lucidum, colore aureum, odoratum, gu-
 stum gratissimum. Potum valenter excalfacit, nisi diluatum fuerit, facileq; in vniuersum permeat corpus. Quamobrem
 (vniuerso tunc simplicium medicamentorum scribit Galenus) tale natura vinum, non modo perfrigeratorum omnium,
 sed etiam etiam qui aut ex oris ventriculi, aut cordis dolore animi deliquim patientur, presentaneū fuerit remedium.
 Et quousque colligi potest, felicitissimos esse eos, qui in regionibus, quæ vina optima ferunt, oriuntur, si tamen modeste
 utantur. Ceterum quæ vina in vniuersum quotidiano vsui magis conueniant, hic longiori sermone
 commemorare, præsertim duximus, cum hoc à Dioscoride latius sit proditum, atque etiam de omnium vinorum viri-
 tutibus, ut supra, quæm ut plura a nobis referri debeant. Fit e vino aqua per alembicum, ut vocant) quam ob eius
 10 admittantur vires. Aquam vitæ appellauere sapientes. Nam si ex vino optimo a purito opifice parata sit, merito hoc nomi-
 ne appellari debet. Quomodo enim, quæ in eo macerantur ab omni corruptione præseruat, ita sumentium quoque
 vitam, quæ in omni putredine, custodit, fouet, reparat, tuetur, auget & producit, cum non solum natiuum calorem foue-
 at, & non rigore conuertat, sed vitales quoque spiritus regeneret & viuificet, ventriculum calefaciat, cerebrum & intel-
 lectum auget, & memorem clarificet, & memoriam reparat, & præsertim si ab his sumatur, qui frigidiusculo sunt tempera-
 mento, aut cruditate ventriculi, flatibus, & alijs quibusvis, quæ frigidis affectibus obnoxij sunt. Quare, his, qui ven-
 triculi a flatibus, aut cruditate torquentur, vertiginosis, comitialibus, resolutis, melancholicis, veterosis, hypochon-
 driacis, & totius pulsu, aut tremore, & animi deliquio laborantibus, summum est auxilium, si quotidie sumatur iechica-
 ra composita in eorum. Atqui longe præstantius Antidotum euadit, vbi hoc modo paratur, quo ego mihi parare soleo. Su-
 20 mato annua non vniuersum, gingeris drach. quatuor, santalorum omnium singulorum drach. sex, caryophyllorum, galan-
 gani, drach. tres, cardamomi semunciam, sem. anisi, feniuli dulcis, pastinaca syluestris, ocimi, rad. angelica, caryo-
 phylli, drach. tres, cardamomi odorati, minoris ph. foliorum sclarea, thymi, calamintha, pulegy, mentha, serpylli, amara-
 ricæ, galicæ, drach. tres, rosarum rubearum, storum salua, betonica, roris, marini, stachadis, buglosi, borraginis sing. sesquidra-
 chmam, corticem citri drach. tres: pulueris diambra, aromatici rosati, Diamusi dulcis, Diamargariti, Diarhodonis abba-
 tuncieluany de gemmis sing. drach. tres: Terantur, quæ terenda sunt, & deinde in vitreo vase macerentur, ex libris duode-
 cim aqua vitæ præstantissima, è selectissimo vino parata, oculo suo inde vasis osculo, diebus quindecim continuis. Ac dein-
 de vitreo alembico vasi superposito, per aqua seu uentus balneum a purito artifice distillentur, osculis alembici adeo conclu-
 sione, ut nihil inde exspirare possit. Aqua quæ inde fluxerit, in aliud iubeinde vas recondatur, additis santali odorati tessella-
 tum, conisi duabus drachmis, moschi, ambari, in tenui linteolio colligati, sing. semisrupulo, & iulapij rosati clarissimi li-
 30 bra. Demum concutiantur fortiter, quousque iulapium cum aqua miscetur, claudaturq; deinde vas cera & membrana,
 & ita quiescat diebus quindecim continuis: & ultimo in aliud transferatur vitrum, ibiq; assuetur. Est itaq; hæc aqua
 Antidotum præstantissimum, & presentaneum auxilium ad omnia prædicta. Quippe non solum hausta, sed in faciem ex
 alterius ore proiecta, epilepticos, defectos animo, & sæmias utriusq; angulatu decedentes reuocat, loquelam amissam resti-
 tuit, & iam in moribundos tam diu sustinet, ut quandoq; miraculi speciem afferat. Additur etiam in clysteribus colico-
 rum vnicuique pondere presentaneo auxilio, vbi a flatu aut frigidityate preueniat morbus: & præsertim additis theriaca, aut
 mithridatis Antidoti binis drachmis: & vno verbo omnia serè comprehendam, medicamentum est summum ad frigidos o-
 mnes affectus. Vinum sic Latine, oinos, autem Grace vocatur: Germanice Wein: Italicè pariter & Hispanice Vno. Vires mira-
biles.

Qinos ἐμφάκιτα. VINVM OMPHACITES. CAP. VIII.

Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo siccata sole acri vna, paulò ante maturitatem decer-
 pta, triiduo aut quatruiduo, donec racemi in rugas contrahantur expressumq; vinum cadis insolatur.
 Vinum adstringendi habet, prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium
 malaciæ & crudis: in peccilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post mul-
 tos annos bibi possunt.

Δωλιεία. LORA. CAP. IX.

Lora, quam Deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet adiectis metretis tribus aquæ in vinacea,
 quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint: calcatis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias partes,
 & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextariis, post hyemem transfunditur in
 vasa. Lora intra annum vtendum, etenim celeriter exolefcit. Conuenit ægris, quibus timemus noxam
 vini, coacti sæpe desideris eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum
 quod Adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo. Pares aquæ, & multi menuræ coquuntur mol-
 ligne, donec absumat aqua: quòd, vbi refrixerit, elutriatum picato vase reconditur. Alij marinæ, &
 cælestis aquæ, mellis & multi pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant, quo
 ad annum vtuntur ad omnia eadem.

Lora alia ratione Galeni etate, quam Dioscoridis parabatur. Ille siquidem Loram faciendi modum lib. 2. de alimen-
 torum facultatibus, us vrbis tradidit. Vinaceorum quoque dilutum Græci τρυζα vocitant: quod rursus ab Atticis Loræ paradi-
ratio ex Gal.
 δωλιεία, a nostratibus & μολίτι, id est, Lora appellatur. Coniectis namq; in parua dolsa vinaceis, tantum aquæ su-
 per affundunt, quo ad omnia permadeant. Quod vbi satis factum videtur, in dolsi fundo foramen aperiant, ut dilutum ef-
 fluat, idq; pro vino bibunt. Perspicuum autem est, quòd pro racemorum copia aquam affundunt, experientia docti: quò
 videlicet neq; aquosa admodum, neq; meraca sit Lora. Deinde rursus aliam aquam, parciorem tamen priori, vinaceis
 affundunt, sic vt hoc quoque potioni sit attemperatum: quod quidam Attica proprietatis curiosi proprie δωλιεία dici vo-
 lant, non veluti prius illud. Vtraq; Lora capiti dolorem adfert, nisi dilutior bibatur, sed pro or magis caput ferit. Des vna Loræ facul-
tates.
 huic potioni concessa est, nempe quod ocyus per vrinam reddatur: sed non parca iubeat dicitur, ex varia vuarum specie
 è quibus vinacei sunt relictis. Etenim si dulces fuerint, potus multò erit saluor, citiusq; per vrinam excernetur: sin
 vero

Uoclo. o vulgata exemplaria Graeca habent... In quibus nimirum...

10

Vup

AQVA

CAP. XIII

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, caelum & alia...

Plurimum quidem veritas de potabili in vniuersum aqua differunt Dioscorides, ita tamen vt nullam plane notam pra-

Aquarum dif- ferentiae & facultates. Quae aqua ad potandum lau- datissima. Aqua pluui- alis omnium praestantissima

30... Epileptorum, scribit Galenus in humana vite vsum admitti non debet. Porro aqua cisternarum non tot sane lau-

Aqua cister- nae. Aqua ex niue & glacie, om- nium pesti- ma.

40... aqua potabiles non sunt, neq; in ciborum coquendorum vsum recipien-

Aqua putea- lis. Aqua lacu- tus & palu- stris. Aqua Tiberae Romae. Aquae lapide- scentes.

50... aqua potabiles non sunt, neq; in ciborum coquendorum vsum recipien-

Aquae salae.

60... aqua potabiles non sunt, neq; in ciborum coquendorum vsum recipien-

Aquae nitro- sae. Aquae Alumi- nosae.

vprimit.

- reprimat, & sudorem superfluum cohibet. Nocet tamen tam in potu, quàm balneo, ijs qui viscerum infarctum laborantibus febres facile incidere possunt. Porro aqua, quibus chalcanthum, aut misy, aut sory, aut melantheria immiscetur, omnia eadem facultate constant, aluminosis sanè persimiles sunt: verum amen hæc valentius suum obeunt munus, quod præter adstrictoriam facultatem, succum etiam admodum acrem obtineant, quamobrem serpentibus vitæ, & pidis contractisq; peridoneæ inveniuntur. Eadem compaginum tumores discutunt, & dolores mitigant: nam ubi phagedænicæ coxendicum dolore, aut podagra, vel chiragra vexetur, sulphurosa aqua balneo magnopere iuuatur. Præsertim præterea ad iecinoris, lienis ac vteri dolores, atq; tumores in ijs genitos mirifice resoluunt: ventriculorum tamen laxant, ac excalfaciunt, ac tamen caput replent, sensus hebetudine afficiunt, præsertimq; oculos. Quæ autem Armeny, aut ceruicæ lapidis, aut æruginis, aut chrysoColle aliquid admistum habent, si bibantur, vomitiones conitant: abluitionibus vero phagedænicæ vlcerâ sistunt. Quæ præterea auripigmentum, aut sandaracham continent, pectus dilatant, asthmaticis & phagedænicis profunt, & omnibus frigidis in vniuersum morbis opem ferunt, quibus respirandi facultas impeditur. Aereæ & ferreæ genitalium membrorum vlcerâ sanant: quin & faucium, & oculorum destillationibus auxiliantur. Quæ deniq; ferunt, ventriculi, lienisq; vitis, seminis profluuiio, & mensuris albis vtiliter adhibentur. Et vt rem hanc summam complectamur, aqua omnis, cui quoduis fossile medicamentum admisceatur, eandem facultatem præbet, quam quoduis sciscetur. Quæ nimirum ratione ducor, vt superuacuum putem, reliqua sigillatim prosequi, vt taceam id nimis longum futurum. Aqua Latinis dicta, Græcè ὕδωρ θαλάσσιον appellatur: Italicè Aqua.

ὕδωρ θαλάσσιον.

AQUA MARINA.

CAP. XV.

Aqua maris calida est & acris: stomacho aduerfatur, aluum enim conturbat: pituitam expellit. Si vero calida ad fatus adhibeatur, elicit & discutit, neruorum vitiis, & pernionibus, ante vlcerâ prodebat. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepefaçta infunditur, & ad tormina, calida: pforas, pruritus, impetigines, lendes & mammas rigentes, foueri vtile est: liuores fotu discutit: ad venenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur: maximè scorpionum, phalangiorum alpidumq; etiam, si quis in calidam descendat, auxiliatur: & malo habitu confectis iamdiu corporibus neruisq; balneæ ex ea vtilis: hydropticos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncera & sine potabilis aquæ miscione reposita virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per se aut ex posca, aut cum vino aut melle: verum post deiectionem dant gallinæ, aut piscium iuicula, ad eam mandam morsus acrimoniam.

θαλασσόμελη.

THALASSOMELI.

CAP. XVI.

Quod Thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alii ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiciunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina, & mitius.

ὄξος.

ACETVM.

CAP. XVII.

Acetum refrigerat & adstringit. Stomacho vtile, appetentiam excitat: erumpentem vndeque sanguinem, potu infestive sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulneribus datur: inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum: reprimat procidentia sedis, vuluæque, item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, vlcerâ que terpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est: phagedænas vlcerum, nomasque fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: fugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus sibilosque, feruentis vapor proficit, instillatum quoque aurium vermes necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongia admoueatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commodè fouetur & frigidum ijs, quæ exurens virus ei aculantur. Calidum potum, atque vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam taxumque, cum sale: haustu voratas hirudines, si lotbeatur, eijcit: tussim veterem mitigat, & recentem laceffit. In orthopnæa calidum commodè lotbeatur: gutturis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis, & vuæ procidenti conuenit: contra dentium dolorem, calidum colluitur.

Aceti mistæ facultatis cōsideratio.

Quamuis Dioscorides simpliciter pronunciauerit Acetum esse frigidum, quod fortasse in eo magis frigiditas exuperat, quàm caliditas: tamen Galenus qualitatē medicamentorū omnium indagator maximus, ex contrariis qualitatibus calidis scilicet & frigidis, acetum constare docuit libro primo de simplicium medicamentorum facultatibus, nec esse homomeres similitere, quemadmodum nec lac vniuersum. Id quod ipse Galenus libro 8. de eorundem facultatibus, aperitiuè confirmauit hæc verbis: Acetum primo horum commentariorum mistæ esse substantia, nempe frigida pariter & calida, cuiusq; vtriusque tenuium partium demonstratum est: ceterum calidam frigidam exuperat. Porro magnam desiccantem facultatem obtinet, adeo vt sit tertij ordinis desiccantium iam completi, vtrique cum validum extiterit. Et libro primo de compositione pharmacorum secundum locos, idem sic inquit: Atqui Acetum ex incidentium ordine existens, vtrâ hoc quod discutit, præcipuum quiddam in se habet, quod reprimat, ac quod insuit & repellit: vtpote quod substantia sua parum calidum est, plurimum verò frigidum, & partium tenuium. Idem quoque libro 4. simplicium medicamentorum,

temperata scilicet: At frigiditas, quae ab aceto profusitur, tanto est validior, quanto & tenuior. Inest vero illi & acrimonia, quae tam exacerbat, quae tamen satis non sit ad superandam ab acuitate prouidentem frigiditatem: verum quae tantummodo acuitatem promoueat: nam quanto calidum frigidum facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui tenuissimum corporum meatum transeat, quam acidus. Itaque ille, velut praecedens viam sternit, hic vero haud ita facile in eum potest: quo tempore sensus perficitur mistus, & qui aegre exponi queat, utpote, qui nec plane frigidum esse acutum sentiat, quippe cum in eo ignea quadam percipiatur acrimonia, nec plane calidum. Nam perpetuo, quae ex praecedente sit acrimonia, calefactionem frigus ab insequente acuitate occupans, obscurat prorsus, & extinguit: quo fit, ut maior merito ex frigore percipiatur sensus, quam ex calore. Haec ad litteram Galenus. Ex quibus abunde liquet, quod acetum et iuxta contrarias qualitates constat, minus tamen frigiditatis, quam caliditatis particeps est. Quod cum recte animaduertisset Dio. Corides, acetum simpliciter, ut supra diximus, refrigerare pronunciauit. Veruntamen illud ignorantium non est, quod acetum nimirum eo calidius erit, quo vetustius & acius extiterit. Siquidem ex Galeni sententia, libr. 1. de simplicium medicamentorum capite de adipe, item tertio de compositione pharmacorum secundum locos, vinum, mel, acetum, oleum, adeps, vetustate calidiora sunt. Ex quo facile fieri potest, ut reperiat acetum aduo vetustate acerrimum, et potius habet caliditatis quam frigiditatis. Acetum quod Latini vocant, Graeci οξυς dicitur: Arabibus Chal: Italis Aceto: Germanus Essig: Hispanus Vin agre: Gallus Vin aigre.

Οξυμελι

ACETVM MVLSVM.

CAP. XVIII.

ACetum mulsum, quod Oxymel vocant, hoc modo temperatur. Aceti heminas quinq; salis marini pondos, mellis minas decem, aquae sextarios quinq; pariter coquito, decies efferuescente cortina: atque ubi refraxerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articularum morbo confictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, iamve auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Triplem Oxymelitis componendi rationem posteritatis memoriae tradidit Galenus lib. 4. de sanitate tuenda: qui tamen alii melli commiscuit, ut eius verba loco dicto aperte testantur, quae ita sequuntur. Vni aceti parti, mellis, à quo detracta spuma sit, duplum est miscendum: deinde amittit in leni igni coquenda, donec eorum qualitates in vnum coierint: ita enim nec acetum amplius crudum apparebit. Cum aqua vero statim ita facies oxymeli. Mellis quadruplum optime aquam melleis: dein coques modico igni, quo ad spumare desinat. Ac malum, quidem mel multam egerit spumam, quo etiam diutius coqui debet. Optimum vero, ut leni igni tempore coquitur, ita minimum spuma euomit, unde nec pari ei coctione est opus. Plurimum certe quartam partem eius, quod ab initio est inditum, amittit: post verò dimidio aceti adiedo, rursus coquendum, donec qualitatibus omnino sit vnitas, nec acetum crudum etiam appareat. Conficitur sanè oxymeli etiam tribus statim ab initio mistis, ad hunc modum. Aceti vni parti additur mellis duplum, & aqua quadruplum: atque haec ad tertiam partem coquuntur, vel etiam quartam, spuma interim detracta. Quod si valentius id suere studes, tantundem in partes aceti, quantum mellis: haec tamen Galenus. Quem secutus Mesues, ipse quoque de oxymelite sic scripsit: Oxymeli fit ex aqua, aceto & melle. Aqua vero miscetur, ut longa coctione resoluitur id, quod in oxymelite flatus excitat, ut etiam promptius despumetur, ut denique medicamenti huius facultas, aquae mixture tenuior facta, facilius in corpus distribuatur. Mel vero additur, ad oppugnandum pituitam. Ex melle denique, & aceto mistis, facultas quadam tertia, quae neutri eorum inest, tunc consurgit, ut efficacissima sit, atque certissima ad attenuandum, incidendum, resoluendumque, crassa, lenta, & excrementa, quae in ventriculo & iccore existunt longo tempore genita: quin & ea, quae ad articularum compagines defluerunt, & diuturnas procreant febres: ea namque, & incidit & coquit. Fit ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aquae partibus quatuor. Primum autem mel & aqua simul coquuntur, ubi despumata probe sunt, addito aceto percoquuntur, semper quoque despumando. Datur ab vna vna, ad vnitas tres: haec ille. Nomen eius Graecum οξυμελι: Latini Acetum mulsum: Italianum Aceto melato.

Oxymelitis confectio triplex Gal.

Oxymelitis confectio ex Mesue.

Nomina.

Οξάλμη.

ACIDA MVRIA.

CAP. XIX.

ACida muria, quam Graeci Oxalmen vocant, contra nomas fotu, putrida vlcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur: & prociuum sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hæmudines sorbitione, aut gargarizatu necat: furfures & manantia capitis vlcera extergit.

ACida muria, quae Graecis Oxalme appellatur, vsus ætate nostra prorsus exoleuit. Parabatur autem veteribus illi ex sale & aceto: vel ex muria & aceto. Quae Latinis Acida muria, Graecis οξάλμη vocatur.

Nomina.

Θυμοξάλμη.

THYMOXALME.

CAP. XX.

Thymoxalme veteres vtebantur, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos: item in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosque trahit. Hoc modo factitur. Thymi triti acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegii, polenta, singulorum exiguae portiones in vas conijciuntur, aquae terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescent.

Σκίλλινον οξυς.

SCILLINVM ACETVM.

CAP. XXI.

Scillinum acetum hoc modo fit. Scilla, quae candida fuerit, expurgata conciditur, traiecitque lino segmenta modicis intervallis ne se contingant, siccatur in vmbra quadraginta diebus: mina eorum in acetum boni sextarios duodecim immergitur, & vase diligenter operto septenis diebus in solo madescit: post

H h h h

eura

eum dierum numerum scilla eximitur, & expressa abijcitur: defæcatum acetum transfunditur & reponitur. Aliqui scillæ minam quinq; aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem magnas humore prægnantes collutione stringit firmatq; & motos dentes stabilit: putredines oris & graues halitus tollit: durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, & lympidam canoramq; reddit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialib. vertiginosis, mente captis: in vuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus ischiadicisq;. Imbecillos admodum recitat, corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exaerit: tarditatem quoq; aurius infusione purgat. In summa ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capite dolore, aut ð neruorum vitijs. Datur quotidie ieiunis sorbendum inter initia exiguum, paulatim accurgendo, ad cyathum vsq;. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

† *περί τῆς*
i renū vitis,
ita her Drag.
exemplar.

Scillini aceti
vires mirabi-
les.

Aceti scillini
confectio.

Nomina,

Quanquam satis superq; de Scillino aceto à Dioscoride dictum est, non tamen alienum fore existimo commemorandum acetum Scillinum à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores vsi sunt. Ab ipsius authore fertur, quicunq; horatatur longè vitæ fore, & eius extrema integra, vsq; ad finem permansura. Et ipse quidem Samius senex huiusmodi extitit quantum enim temporis vixerit, haud ignoras: de ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hanc facultatem communicauit: cumq; hoc medicamento vti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & vsq; ad centesimum decimum septimum vitæ produxit integer, & nulla vnquam aduersa valetudine tentatus. Hac sanè medicamenti auctor deservit, quod fortasse vir philosophus erat, mentiri nescius. Nos autem viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam confirmamq; huiusce medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere Scillam montanam libra vnus ponderis. & dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in vitreum vas mittere atq; obruor, ac per triginta dies Canicula caloribus, vt maceretur, permittere: deinde scillam extractam exprimere. Id genus acetum manè sorbeto. Tibi autem hæc euenient, vt ne faucium orisq; partes vnquam remollescant, os ventriculi bene valet, facile spiritum duces, vox rectè habebit, oculi acutissimè cernent, aures in officio manebunt, nullusq; flatuosus vapor ex ventre vnquam excitabitur, nullum viscus suspensum erit, & benè spirans, benè coloratus deges. Ad ciuilia negociare effectus, non acidum, nò falsum ructabis, si aliquid aceti huius assumpseris: & ieiunus vt assumas præcipio septemq; postea die deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui vtitur, in victu quamuis licentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet, & à nullo vnquam offensam patietur, neq; valde implebitur, sed in melius proficere videbitur: nihil superuacuum in corpore residet, non flatu, non bilis, nec stercus, nec vrina, sed omnia facile excernit atq; educit. Aluus lubrica manens est, totiusq; corporis purgatorium medicamentum, etiam si in osibus sordes inhereant. Item phibiscos ab omnibus deploratos hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, vt nisi post longa temporis intervalla, non redierit: incipientem verò ac nouum perfectè discutit, neq; reuerti amplius hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articularum morbos, iecoris lienisq; duritias vehementer facit: & particulares quidem aceti scillini effectus hi sunt. Communes autem quàm plurimi, quibus nos commoti salutare hoc medicamentum, sanitatis integritatisq; causa, tibi tradidimus. Hæc ille, quicunq; fuerit, nam liber is inter nothos, & Galeno adscriptos recensetur. *Acetum Scillinum quod Latini, ὄξος σκιλλινικόν Græci nominant: Itali Aceto scillino.*

Σκιλλινικός οἶνος

SCILLINVM VINVM

CAP. XXII

Scillinum vinum fit hoc modo. Dissectam, vt dictum est scillam, & sole siccata contundito: minime eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam in vicos sextarios musti recentis ac boni demergito, vbi trimestri spatio maduerit, elutriatum vinum, obstructo diligenter vase, recondito. Licet quoq; sic humida scilla vti. In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus in oleo oportet, & valde inueterascere. Alia parandi ratio. Scillæ dissectæ, & repurgatæ tres minas in Italici metretam musti demittito, & senos menses in vase obstructo macerari finito: post id tempus defæcatum, & excolatum vinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item ijs, qui reuocant cibum: & si pituita in ventre aut stomacho coierit. Prodest lienosis, malè habitis corporibus, aquæ inuacutem, regio morbo, difficili vrinæ, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horroribus longis, vertiginosis & vulsis: menses pellit: minimè neruos infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendum in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Scillini vini
vires ex Gal.

Vini scillini
confectio.

Nomina,

Scillini vini meminit Galenus libro tertio de medicamentis paratu facilibus, his verbis: Vinum hoc potui datur omnium sanitatem adfert: hamores enim attenuat, sed maximè pituitam, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis, aut osibus consistere permittit, neq; alium id genus tenacem humorem obstructionis facultatem, sed omnia dissoluit, & ventrem lenit atq; ita subducit, & vrinam mouet, & per ipsam causas attenuat, exterminat. Adeo verò caput purgat, vt nares humiditate vacent. Commodum est podagra, articulari et comitiali morbo: deniq; omnium sanitatus est author. Ex his constat. Scillam albam montanam circiter Canis exortum accipito in libra ponderis per dies decem in vmbra refrigera: deinde scilla laminas refrigeratas in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim superinfunde, & suspensum vas per quadraginta dies habeto: postea scillam exime & abijce, & vino ad sumpta dicta vitia vtere, & eius vim percipies. Subinde ante cibum vini duas vncias exhibe, sin à cibo vnciam mediam. Quod si ipsam potui commodum esse velis, vt magis delectet, mellis sextarios duos, aut tres admisceto. Quod Græci οἶνος σκιλλινικός, Latine Vinum scillinum appellatur: Itali Vino scillino.

Οἶνος θαλάσσιος

VINA MARINA

CAP. XXIII

Vina ex marina aqua, variè faciuntur. Aliqui enim statim cum decerptæ sunt vuar, aquam maris admittunt. Alij in area vvas sole siccant, quibus calcatis marinam adiungunt. Alij passas prius vvas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passii generibus adscribitur. Quæ

Ρόδινος οίνος.

ROSACEVM VINVM.

CAP. XXX.

Rhodites sic fit. Rosarum siccarum, tusarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo multas mergito: & post tres menses defæcatum vinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febri carere & ad stomachi coctiones & dolores, à cibo potum: & contra humiditas aluos & dysenterias. Fit quoque succo rosarum addito melle, quod rhodomeli vocant: quod arteriæ scabritijs conuenit.

Μυρτίτης οίνος.

MYRTITES VINVM.

CAP. XXXI.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem excesserint, tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adijciunt, & vini veteris parem modum: postea exprimunt & seruant. Magnoperè adstringit: stomacho vtile: fluxionibus ventris ac stomachi prodest, & contra intestinas vlcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Μυρσινίτης οίνος.

MYRSINITES VINVM.

CAP. XXXII.

MYrsinities sic temperatur. Rami nigræ myrti cum suis baccis & folijs tuis, decem minarum pondera in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra furfures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas & purulentas aures efficax est: sudores sistit.

Σχίννος καὶ τερεβινθίνος οίνος.
VINVM.LENTISCINVM ET TEREBINTHINVM
CAP. XXXIII.

Lentiscinum similiter vt myrsinities temperatur. Nec secus terebinthinum: namq; bacciferi eorum ramī sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicæ & stomachi, & sanguinis profluuiio. Vlcerata omnia fluxionibus obnoxia, formadiatricem perducunt: fluxiones vuluæ ac sedis infessione cohibent.

Φαιμίτης οίνος.

PALMEVM VINVM.

CAP. XXXIIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydeas in vrceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ congijs infunditur: quòd si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congijs infudisse satis est: post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suaue illud quidem, sed capiti non vtile contra fluxiones propter adstrictoriam vim efficax: stomachicis, cœliacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto sextove faciunt, quod tandem acore vitiatur.

Καρχηδίνος οίνος.

VINVM EX CARICIS FACTVM.

CAP. XXXV.

Catrchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita vt palmeum: sed hoc interest: quoniam pro aqua tantundem humoris adijciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ quæ cædoniæ aut phœnicæ appellantur, præsertim nigræ macerantur, vt diximus: & post decem dies humores excipitur, atque iterum, aut tertio, idem modus aquæ, in qua vinacea maduerint, infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratorum liquor non secus acorem contrahit, & aceti vsu præbet. Id tenue est: status gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamen prodest, vrinam ciet, menses trahit, lactis vbertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adter, vt potio, quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muræ amphoram, quod non facile vitiatur, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum & fœniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è sycomoribus eodem modo vinum, sed in acetum acre degenerat: quoniam non ita præualet vis eorum, vt fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Ρικνίτης οίνος.

RESINATVM VINVM.

CAP. XXXVI.

Resinatvm vinum populatim factitari solet copiosum in Galatia, quoniam vinum illic coalescit, vni non maturescente, ob cœli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphoræ dimidiata hemina permiscetur. Aliqui vbi efferbuit, excolant, separantes resina: alij ce relinquant. Hæc vina vetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & vertigines faciunt: coctionem tamen adiuuant & vrinam ciet: tussientibus ac destillatione vexatis conueniunt: item cœliacis, dysentericis & hydropicis, fœminis fluxione vuluæ laborantibus: altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Στροβιλίτης οίνος.

VINVM STROBILITES.

CAP. XXXVII.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus fractisq;: præbetq; resinati effectus. Si quis madefactas nuces pini musto decoquat, potum affatim conuenit ijs, qui tabitudine consiciuntur.

Κεδρίνου καὶ ἐλάϊνου ἐνδ' ὅρου καὶ καρπῶν αἴνος.

CEDRINVM ET EX ALIQVOT ARBORIBVS AC FRVCTIBVS VINVM. CAP. XXXVIII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum aut abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt, aut soli, aut balneo, aut igni admouere oportet, vti confudent, congioq; vini minam vnam permiscere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, in ioleo. Facturorum vinorum vasa impleri debent: namq; non plenis vas, vina in acetem corumpuntur. Medicata autem vina recte valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, vrinam cient & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. It quoq; ē fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecia tusam baccarum sēlibra: diebus quadraginta intolari debet, & defæcatum in vasa transferri. Fit etiam vinū ebaccis iuniperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussi antiquæ vtile sine febre, pectoris laterisq; doloribus, torminibus, ventris, & interancorum vlceribus, purulentis excreationibus, mulieribus vuluæ causarijs, hydropicisq;: facit aduersus ventris tineas & horrores. Contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Πικρίτης αἴμος.

PICATVM VINVM.

CAP. XXXIX.

Picatam ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primū marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum malbuerit, & sincera maris aqua defluat: mox aqua dulci proluenda: congijs octo musti vna pice vna, aut altera adijcitur: vbi efferbuerit & constiterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vni excalfacit, concoquit, purgat, abitergit: vtile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis, & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

Αΐσινθιτης αἴμος.

VINVM ABSINTHITES.

CAP. XL.

Absinthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, admittam absinthij pontici libram decoquunt ad tertias: & vbi infuderint sex acetis sextarios, & absinthij sēlibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dumq; conquieuerit, defæcant. Alij absinthij minam in amphoram demittunt, tusamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ, floris iunci odorati, calami, elatæ palmarum singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo valis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt: postea defæcatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadum Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, absinthij libram, & sicæ pini resinæ sextantem inmittunt: & post decem dies excolant & recondunt. Vtile est stomacho, vrinam cient, tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitijs auxiliatur: fistulida ducunt: ijs prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionem & inflationes, teretesq; ventris tineas, & remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quam plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Υσσωπίτης αἴμος.

VINVM HYSSOPITES.

CAP. XLI.

Hyssoptes ē Cilicio hyssopo maximè laudatur. Fitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti coniecta: linteo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, vt degrauatis pondusculo fasciculus sidat: vinum post quadraginta dies defæcatum elutriatur. Contra pectoris, laterum & pulmonis vitia, veterem tussim & suspiria prodest: vrinam cit: torminibus & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur, menses mouet.

Οἶνος ἐκ τῶν ποικίλων βλάτων.

FACTA.

VINA EX DIVERSIS PLANTIS

CAP. XLII.

Simili modo chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ intercutem subuenit. Inueterascens melius redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congijs sex stæchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè datur cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetum ē stæchade herba, vt paulò antè diximus, aceto macerata, quod eodem implet effectus. Fit vinum ē betonica, quam cestron psycotrophon appellant. Herbam semine maturo pregnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mentem transfundunt. Ad multa interancorum vitia, vt frut: xipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, facta vna sibi misturarum vires adsciscunt: quare non difficile fuerit ijs, qui illarum naturam norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: veruntamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum ē betonica acetum ad eadem vitia vtile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensē transfusis. Prodest torminibus, vullis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discurlationi, ægris concoctionibus. E napis fit vinum,

H h h h ;

vinum,

vinum, nomine bunites, drachmis duabus tusa napi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses & purgamentum a partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua eodem modo similiter facito. Conuenit hoc vinum pectoris vitijs, & omnibus, quibus marrubium. Thymi tusa & castidia, dysenteriam, nervorum & præcordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è satyria vinum fit, quod eadem, quæ thymites præstat. Sic quoq; origanites ex Heracleotico origano conficitur similiter cum supradicto. Est etiam calamintha, pulegio & abrotono vina fiunt eodem, quo thymites, modo. Prodest stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod urinam moueant. Fit item è conyza vinum contra venenata ante alia efficax.

Αρωματιστὸν οἶνον

VINVM AROMATITES.

CAP. XLIII.

Aromatites ita fit. Palma, aspalathi, calami, nardi Gallici, singulorum quatuor sextarios finito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti coiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde vbi face expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio. Calami vncia, phu drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Syriaci drachmæ sex, cassia vncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinq;, asari drachmæ quatuor. Omnia finiti trita, & linteo colligata in cadum musti demerguntur: & postquam vinum deferbuerit, transfundunt. Facit ad pectoris laterum & pulmonis dolores, difficili urinæ, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt; potum conuenit: pituitæ crassitiem extenuat, colorem alit, somnum conueniat, dolorem finit: renum & vesicæ vitijs auxiliatur.

*Οἶνοι ἐκ τῶν ποικίλων ἀρωματῶν
FACTA.*

VINA EX DIVERSIS ODORAMENTIS
CAP. XLIIII.

Fit & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit. Myrræ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres: omnia pleura tusa, & linteo inuoluta, in sex vini sextarios conijciuntur: vinum post triduum colatur, & in lagenâ conditur. Datur post deambulationem meraculum, cyathi vnus mensura. Fit quoq; nectarites ex helonio herba, radice sicca pondo quinq; drachmarum linteo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: urinam pellit. E Syriaca nardo & Celtica melabathroq; vinum factitatur, hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem: prodest stomachicis, atq; ijs quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextanrem acori & Celticæ nardi quadrantem in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus urinam ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis ilchiadicisq; conuenit. Radicis syluestris nardi recentis, & tritæ, cribratæq; bellem in congium musti conijcito: duos menses quiescere finito. Vrile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

Οἶνοι ἐκ τῶν ποικίλων ἁλῶν.

VINA EX DIVERSIS HERBIS FACTA
CAP. XLV.

Radicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum & vuluæ: menses pellit, ructus ciet, & urinam: prodest tussi, ruptis, vullisq;. Saluiaz vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulla, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congium mittito & transfundito. Prodest ruptis, vullis, contusis, orthopnoæ: lienis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aqua inter cutem & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex acoro & dulci radice conueniunt modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus & latera, & urinam mouent. Seminis apij recentis, maturi, & cribrati vncia nouem in linteo colligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat stomachicis & difficili urinæ auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex feniculo, anetho & petroselino, vina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore salis vinum, multò ad purgandum efficacius quam vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes & stomachum infestat: quare neque in secunda neque aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum, quod phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit, veratro aut scammonia, aut syluestri cucumete, iuxta radices vitium lato: huiusmodi vites sibi illorum vires adsciscunt. Id vinum partus enecat: datur ientnis mulieribus, quæ ante venierunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelææ cum suis folijs, & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congij duo supersint, defecatumq; recondito. Aquosa purgat excrementa: & lienem absomit. Chamelæa dum floret, cum folijs tusa, & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congium additur: post duos menses vinum in vas transferretur. Aquæ inter cutem, hepaticis & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu ægre parturiant. Chamæpityinū simili modo fit, ad eadē conueniens: urinam quoq; ciet. Librâ radicis mandragore

concolito, segmenta lino trancito, quod selibram aequat, in musti cadum demittito, ibique esse finito ad
 heminam vini congio mittam. potu sopore adferre: cyathus vnus cū sextario vini potus enecat. Mediocris
 vis eius doloris sensum auferit: fluxiones incitallat: olfactu, potuq; & cū inditur, idem prestat. In con-
 gium multi aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri triti in luteo mundo mittito: dūniq;
 colato, & vitor. Dato cyathum vnum ex aqua balnei, in potu ad aluum soluendam, iis qui euomuerunt
 aeterna. Alia ratio. Veratri drachmas viginti, iunci odorati vncias duodecim, spica Syriacæ vncias trede-
 cim: cribratas, & linteo colligatas, in septem vini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito,
 postmodum colato: dabis in potu seliqui heminam. Aliter. Decoctæ marinæ aquæ ex alto petiæ sextarios
 duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die quā madefeceris, colato, &
 vitor. Alia ratio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas in senis musti sextariis diebus qui-
 nidenis macerato, mox colato: & semestri exacto, vitor. Id vini genus abortus facit, & partus necat. Aut
 vnas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum
 in vinum mittito pondo drachmarum viginti, & biduo residere finito: conuicito veratri nigri drachmas
 triginta, iunci odorati, calami singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trien-
 tem, myrrhae, & croci singulorum drachmam: inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea
 colato, dabis heminas tres, aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu fœminas: fœtus extrahit: contra
 strangulatus vuluæ efficax. Scammonites sic fit. Radicis scammonia per menses effossâ, trita, & linteo
 colligata drachmas quinque in musti congium mittito ad dies triginta. Aluum purgat: bilem, & pituitam
 extrahit.

Vina facticia parantur: ratio diuersa. quam superius ab initio propè huius libri ad hunc vsque locum pluribus capitibus
 diligenter tradidit Dioscoridis, nobis quidem clarior, & euidentior visa est, quā vt operapctiuū esset
 singulorum capitula necesse commentationibus prosequi, præsertim cum omnium ferè iam vsus apud nos exoluerit: quan-
 quam non eque demum ita uentim, quā erant huiusmodi vina, si eo modo parata in promptu essent iis morbis profutura,
 quibus prodesse produntur. Vnde pluribus adhuc rationibus mixus, primus ego vt arbitror (quod etiam libro 1. in Ebeni men-
 tione diximus) eligno Guaiaco vinum confici, & alijs quoque conficiendum esse scriptis tradidi. Cuius postea vsu innume-
 ros Gallica lue correptos, nos & alij Medici sanitati restituerunt. Videmus enim L. uphrasiatum ad oculorum claritatem
 efficacissimum esse, Myricinum lienis morbos sanare, & quod ex Sena paratur, atrabiliaris morbis, & cutēnis exulceran-
 tibus, nempe scabiei, lepræ, vni liginibus, lichens, & id genus alijs, commodissimum esse medicamentum. Quod cum ani-
 maduertisset magnus philosophus, & Medicus non spernendus Arnaldus de Villa noua, de facticijs vinis, qua medicina vsu
 conueniunt ad varios corporis morbos, copiosissimum edidit libellum. In quo qui vinis medicamentosis delectantur, & hac
 conficiendi modum, & eorum facultates, facie adipsi potuerunt. Nam apud Germanos, & alios illis conterminos, medica-
 menti commista in frequentissimo habentur vsu, quod magis, quā nos odoratis, & concinnatis delectentur po-
 tionibus.

Vinorum fa-
 ctitorum
 consideratio
 Vini è guaiac-
 co Matth. pri-
 mus inuētor:

De Metallicis Lapidibus.

Kadmeia. CADMIA. CAP. XLVI.

Cadmia generibus optima est Cypria, botrytis nomine, densa, modicè grauis, & in leui-
 tatem magis declinans. racemosa facie, colore spodii, quæ fracta cinerulenta est, & ærugi-
 nosa. Proxima habetur foris cærulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, ony-
 chura lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam
 placodes, id est crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod
 eam zonitum appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam
 faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botrytis nomine, &
 onychytis, vtiles: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem
 Cypria prodest. Ex Macedonia verò: Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstrin-
 gere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, † corporis meatus infarcire, excrecentia in carne coer-
 cere, crustas creare, & vlcera quæ cacoethe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex are
 in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus, camerisq; fornacum inhzrente. Prægrandes au-
 tem, ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia connexæ, & concameratæ,
 vt quæ ab are iactantur sursum corpuscula, cohæreant, & inibi detineantur: quæ cū spissius insident,
 in corpus concresecunt, & modò genus vnum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur &
 cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, tremato lapide, cui pyritæ cognomen est: in quo etiam
 monte quædam quasi venæ chalcitis, mysios, foreos, melaneria, cærulei, chrito collæ, atramenti sutorii,
 diphyrgisquè inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi qua-
 dam lapidum cognatione: qualis inuenitur, & apud Cumas lapis, nullam sui vim ostendens. Li eo depre-
 henduntur, quòd sunt cadmia leuiores nullumquè alienum mandentibus saporem exhibent: comman-
 ducatus item lapis dentes offendit: cadmia, vt pote cū cedat, esum non respuit. Alio autem discerni
 possunt argumento. Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit:
 quod in lapide non accidit. Item tritus, & igni appositus lapis profilit, & fumum igni similem eia-
 culatur: cadmia verò quieta manet, fuliginemque luteo colore, aut areo splendentem expuit;
 vano zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus colorem mu-
 tabit, ac leuior multò fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit.

† Cat. èzitei
 i exprimere.

Hhhh 4 Fit &

Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparanda araria. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo balles: mox extinguitur vino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psforarum medicamenta præparatur, acer. Alii hoc modo exustam conterunt in vino, rursusque fictili crudo torrent, donec purissima videatur. iterumque tritam ex vino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabra retinens: hac spodii vice vtuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordium nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Cadmia con-
sideratio.

Lapis cala-
minaris.

Historia ex
Galeno.

Cadmia lapi-
dosa.

Cadmia hist.
ex Plin.

Cadmia in
Germania.

Nomina.

Cadmia duo genera, altera factitia, altera fossilis. Hac duplex est. Vna metalli expers. Altera aut as, aut argentum continens. Factitia in fornacibus concrevit, vbi as conficitur triplici appellata cognomine. Nam botrytem eam appellant, quæ vna speciem refert. Ostracitem autem, quæ testis, & Placitem quæ crustis similis fuerit. Sunt etiam qui in hoc genere calamitem ostendant ab arundinum figura. Decutitur hac à ferreis perticis quibus cum as in fornacibus fusam optari solet: obducuntur enim cadmia, quæ decussa scissi per medium calami faciem refert. Fossilis autem quæ metallum non continet, quamquæ Germani lapidem calaminarem vocant, lapis est non admodum durus, sublucet colore, quæ census luteum fumum edit. Hac vtuntur ararij fabri, qui ex are Orichalcum parant. Siquidem sine ea id parari non potest. Quæ verò metallum continet, Germani Kobelt dicta, nigro colore, affertur in Bohemiam ex ducatu Brunsvicensi à Goselarys fodinis, vbi Chalcitis & Mysi copiosè fodiuntur. Hac erodendi facultate adeò prædita est vt fossorum manuum pedes exulceret. Nec sanè mirum, cum intus hausta animalia quacumq, perimat. Bohemi hanc Ceruisia astate admodum ad necandas muscas: nam vbi primum eam degustarunt, statim emoriuntur. Cadmia vtriusque meminit Galenus libro nono simplicium medicamentorum sic inquit: Cadmia fit, vbi in fornacibus as paratur, nempe tota terra illa, ex qua as generatur, in fornacibus in altum egerente velut fuliginem quampiam, & fauillam, sine vtrumque appellare licet. At si non terram, sed lapidem nuncupare velis, ex quo in fornacibus secernendo partim fit as, partim cadmia, partim phryges, nihil sane retulerit. Sed & in argenteis metallis efficitur simili secretionem, siue generatione, aut quomodocumq, in care voles. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus vsto fit cadmia. Caterum absque fornace in Cypro cadmia inuenitur ac iure quispiam illam lapidem nuncupet. Itaque in Solis, quo tempore ego in insula peregrinabar, paucissimum etiam liquum erat cadmia, quæ in fornacibus fit. Verùm lapidibus, qui in montibus, & riuis reperiebantur, à metallo præceptis, eos in Asiam, Italiamq, portavi ad amicos, à quibus summam inibam gratiam, quòd se vel maximum accepisse dicerent, & quæ alia omni cadmia multò esset præstantior. Et talem certè meritò quis lapidosam vocet. At eius, quæ combusta est, aliam botrytem, aliam placitin medici nuncupant. Botrytem quidem, quæ in aditionibus horum, in quibus fornaces extracta sunt partibus colligitur, Placitim verò, quæ in inferioribus. Ac liquet sanè botrytem tenuiorum partium, crassiorum verò placitin: vtramque autem vi desiccandi, ceu alia metalla omnia, & lapidosam, vnaq, Porro præter desiccandi facultatem, mediocriter item extergit. Attamen, quæ in fornacibus colligitur, ignea facies aliquid habeat necesse est. Meritò itaque lauantes eam, medicamentum efficiunt mediocriter tum desiccans, tum extergens absque mordicatione, vtile ad vlcera impletionem exposcentia, & in oculis, & in toto corpore. Porro vlcera magis humida ac putrescentia, in corporibus impendit mollibus, qualia sunt eunuchorum, puerorum, ac mulierum, in quibus cadmia adiuvat. At in durioribus, & contentioribus, quæ valentius desiccant, requiruntur. Itaque illud semper memoria tenendum, sermonem ad temperatam, & mediam excessuum naturam, in his quæ ita simpliciter effertur, referendum: puta cum dicimus medicamentum aut vlcera carne implere, aut cicatrice claudere, aut aliud quidvis eis præstare: ad quam vtiq, & nos nunc respicientes, leuiter desiccatoriam, absterforamquæ cadmia esse facultatem dicimus. In caliditatis autem, & frigiditatis differentia, temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum in signum efficiens: hæc Galenus. Quibus maximè ad stipulatur Plinius libro 34. capite 10. sic inquit: Metalla æri multum modis inveniunt Medicinam, vtpote cum vlcera omnia ibi ocysimè sanentur. Maximè tamen prodest cadmia. Fit sine dubio & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed nequaquam comparanda araria. Plura autem generantur. Namque ipse lapis, ex quo fit as, cadmia vocatur, fusurus necessarius, medicina inutilis. Sic rursus in fornacibus exusta, aliamquæ nominis sui originem recipit. Fit autem egesta flammis atque statu tenuissima parte materia, & cameraribus fornacium pro quantitate leuitatis applicata. Tenuissima est in ipso fornacium ore, quo flamma eliditur, & appellata capnitis, exusta, & nimia leuitate similis fauilla. Interior optima cameris dependens, & ab eo argumento longè cognominata: ponderosior hæc priore, lenior porro secuturis. Duo eius colores: deterior cinereus: puniceus melior: subtilis, oculorumquæ medicamentis vtilissima. Tertia est in lateribus fornacium, quæ propter grauitatem, ad cameram pertinere non potuit. Hæc dicitur placitis, & ipsa ab argumento, crusta verius, quam pumex, intus varia, ad psoras vtilis, & cicatrices trahedas. Fluunt ex ea duo alia genera. Onychitis extra penè cærulea intus onychis maculis similis. Ostracitis nigra & cæterarum sordidissima: vulneribus maximè vtilis. Omnis autè cadmia in Cypro fornacibus optima: hæc Plinius, qui à Galeno in hoc dissentit, quòd dixerit fossilem cadmiam fusurus tantum necessariam, & medicina inutilem, cum tamen Galenus contrarium scribat. Cadmia omne genus vidimus sæpe nos in pluribus Germanie locis, vbi as, argentum, & aurichalcum conficitur. Sed speciatim botrytem apud Perzenum quinto a Tridento lapide, & apud Sbozium in Trolensi comitatu, vbi in quàm plurimis fornacibus as, ac alia metalla funduntur. Botrytis cadmia frustulum sanè pulcherrimum nouissimè ad me misit Sagabria Dalmatia vrbe, clarissimus Medicus Iosephus Salandius Bergomensis: quæ admodum in racemi modum congesta est, vt planè vna speciem referat. Porro officina omnes Turiam, quæ pompholyx est, Cadmiam perpetam nominant. Quandoquidem tutia illis vocata (nisi mea me fallit opinio) Cadmia est è botrytis aut placitis aut ostracitis genere. Neque enim mirum esse debet, quòd Cadmia proprio amisso nomine, in pompholygu locum successerit, cum etiam Dioscoridis tempore spodij loco vterentur Medici. Metallicum, quod Grecis καδμεία Latini item patiens & Italia Cadmia nominatur: Arabibus Climia seu Chlimia: Germanis Brauer Augsten.

Πομφόλυξ, σποδίου, ἀντι-
SPODIUM.

POMPHOLYX, SPODIUM, ANTI-
CAP. XLVI

Pompholyx specie sola, non genere à spodio distat. Siquidè spodus nigricat, & plerumque ponderosior est, palearum pilorumquæ plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab arariarum officinarum pavementis, & fornacibus euerritur. Pompholyx verò pinguis est, & candida, vsq, adeò leuis, vt in antris

colare possit. Cuius duo fluxerunt genera. Vnum ad aris colorem vergens. subpingue: alterum magno-
 pere candidum. summanq; leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiendo arc fabri
 praeferentem facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insperierint: namque tenuissima fauilla,
 quae effertur in pompholygem coit. Caterum pompholyx non ex aris modò materia, & fabrilis industria
 fabricatur sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam eximie follibus proflata. Cuius faciundae ratio hæc
 est. In domo gemina contignatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra, ad tabula-
 ram a superioribus partibus pateat: domicilii partes fornaci proximas, tenui foramine ad fornacem vsque
 pertinetur, ad excipiendam follis naem: ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabri-
 carum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde
 10 carbonibus in camino succentis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, a locis supra in-
 furniculum extractis: idem negotium obit inferne artificis muniter, simulq; carbones adicit, vsque dum
 indita cadmiae copia profusè ablumatur. Itaque gesta sustitu tenuis pars, & leuis materia in summan dom-
 um euolat, & parietibus, tectis, fornaciq; adhaerescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erum-
 pentibus aquaru bullis simile prodit, postea manus incrementum capeffens, glomusculis vellerum simile
 reddeat. Ponderosius autem in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pavimen-
 to. hinc erit: quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcicia
 in acruatione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antè dictum
 est. Optima creditur Cypria, quae accepto aceto halitum aris præstat, colore aliquantum piceo, sapore
 cum horido: & si fraudem non experta, flagranti carbone inferuclit, arcum colorem contrahit. Ante-
 20 dictis autè notis diligenter attendendum est. Siquidè a nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pul-
 mone aut marino, aut crematis groisis, & quibusdam consimilibus: quod facile cognitu fuerit, quippe
 nihil in his probandis inuenietur eorum, quae antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauare o-
 portet. Ligatam linteo mundo, modiceq; raro, aut siccam, aut aqua resperlam in labellu demittito, quod
 imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculum deferens, immergito: ita enim limosa pars eius, ac vti-
 lis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit: postea relidere sinens aquam cum cinere colis
 incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi ni-
 hilitat: demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alii quantum maximè fieri potest
 siccant, manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imiterur: deinde linteo faucibus exce-
 30 pturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua,
 cinerem conturbant: mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili
 nouo ad vsus recondunt. Quod vero reledit, sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, relicto areno-
 so, quod pessum ierat: rursus lapidosa sidere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc identidem faciunt,
 donec cinis inerus, & arenae expers inueniatur. Alii paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati are-
 nas, lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem, & paleas leuitate sua in sublime attol-
 li. Caterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, vt cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur
 vino chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus: & ita redditur adstringentior, quam aquis elo-
 ta. Vis pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter
 40 medicamenta numeratur, quae leniter crustas obducunt. Quod si spodon torere libet, diligenter tritam,
 & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis leuibus prunis orbiculos continuo versa-
 bis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum ex auro, argento, plumboque fieri spodium, verum
 post Cyprium, plumbeum maxime commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse
 est ostendere, quae simili virtute polleant, vt in spodii locum suffici possint, antispoda vocant: quoq; mo-
 do sumi debeant. Folia itaque myrti cum floribus, & immaturis, in fictile crudum coniecta, indito oper-
 culo continua foramina habente, vruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur: iterum infictile ali-
 ud crudum transtentur, quod vbi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoque fit è ter-
 rite syluestris oliuae, si habeatur: sin iecus, fatiuae cum suis floribus, aut malis cotoneis disiectis, & detra-
 ctis oisibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefa-
 ctis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubi foliis, vel è buxi coma, vel è pseudocypero
 cum flore. Alii ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alii taurinum gluten: alii
 50 succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. Quae omnia in spodii vicem vsurpantur.

Pompholygem officinae Mauritanos secute Tutiam dicunt. Ita enim pompholyx appellatur Serapioni, & Auicenna. Popholygis
 Verum quam Seplasiary Tutiam existimant, legitima non est, sed cadmia potius species. Siquidem cum hac lapidis
 modo crustosa, prae duratq; sit, pompholygem, siue tutiam dictam prorsus mentitur. Pompholyx namque, Dioscoride, & Ga-
 leno auctoribus, ex aris, vel cadmia fauilla in glomusculos vellerum similes coit, & farinae modo contacta dispergitur. Id
 quod recentiorum nullus, quod sciam, animaduertit, fortasse quod omnes rei herbariae indaganda magis insudauerint,
 quam in inuestiganda fossilium materia. Quamobrem Manardum Ferrariensem, medicum aetatis nostrae clarissimum, Manardi et
 hac in re deceptum satis reperio. Quippe qui dum Auicennam redarguit, quod spodium è combustis arundinum radici-
 bus conficiat, sedulo nos admoనేat, vt secuti Galeni sententiam, in spody defectu, Tutia potius vtamur, qua seplasia aban-
 60 dent, quam Auicennae antispodio. Sed in hoc Manardus planè hallucinatum deprehenditur, quod procul dubio crediderit,
 vulgarem officinarum Tutiam legitimam Dioscoridum, & Galeni esse pompholygem, cum tamen legitima Tutiae nullis in
 officinis sit vsus, quod (vt iam diximus) omnes pompholygu loco cadmia tantum vtantur. Porro legitimam tum pom-
 pholygem, tum spodium, quae à Dioscorido & Galeni historia nullis disident notus, ego ab ararys, argentarysq; fornacibus
 pluri: mecum detuli, tam ab his, qua Perzeni, & Lausij in Tridentino agro habentur, quam ab illis, qua Sbozj in Tiro-
 lense comitatu Germania inueniuntur, vbi certe celeberrima sunt metallorum ferè omnium fornaces, ac fodinae: è quibus
 non modo pompholygis, & spody quantum satis fuerat, accipiendi nobis fuit facultas: sed etiam cadmia, pyritu, diphy-
 gi, floru aris, helysina, molybdana, corulei, & Armenij lapidis. Quorum ne minimam quidem particulam apud Italiae
 seplasiarios reperi vnquam, praeter quam apud eos, qui vel a me, vel ab amicis meis admoniti, legitima hac metallica medica-
 menta, adulterinis ex suis officinis abdicatis, in medicu susceperunt vsu. Nunc verò amicos intelligo (quos tamè verius fratres
 amantiss-

amantissimos appellare possem, vt qui & aetate & longa consuetudine, & studiorum communione mihi conuictissimi sint) clarissimos medicos Tridento oriundos, Andream Gallum, & Iulium Alexandrinum, qui iam dudum ob suam doctrinam, tum integritatem a Serenissimo Ferdinando Romanorum, Vngariae, Bohemiae Rege, in sui & sua prole commo-
 dum in medicos honorifice recepti sunt. Hoc itaq; pacto cadmia officinis pompholygis vicem explet: quibus etiam anti-
 Ant Spodium ex quous hinc. spodia quaedam ex arundinum radicibus, & bouum ossibus concrematis facta, spodium falsò referunt. Quod tamen non i-
 mino fuerit reprobandum: nam Dioscoridis testimonio, vbi legitimum desideretur spodium, antispodij rei facienda: nempe quae fieri possint è myrti folijs floribus, bacisq;: ex oliua frondibus, cydonijs malis, quercuum gallis, attritis lili-
 minibus: item moris nondum maturis, terebintho, lentisco, buxo, pseudocypere, fici frondibus, tauri glutino, succo aca-
 pice aut melle perfusa. Quo fit, vt mihi plane immeritò à Manardo reprehensus videatur Auicenna, qui ex combustis arun-
 dinum radicibus sibi spodium confecit, medicinis commiscendum, quae ad cordis robur parantur, & intus in corpore
 muntur. Hic enim longè melius, ac consultius fuerit arundinaceum admiscere spodium, quam eius vice Tutiam pom-
 pholygem imponere: licet hac quoq; sit Brasauoli sententia. Sed equidem hactenus nunquam me legisse recorder. Pom-
 pholygem seu spodium vs medicamentis tutò admisceri posse, quae intus in corpore sumuntur: cum neque Dioscorides, neque Ga-
 lenus, nec qui post ipsos diuersis temporibus claruerunt, tam ex Graecis, quam Mauritanis, vsquam, quod inueniri ne-
 moria prodiderint, ultra vita periculum, hac hauriri posse. Nam fieri non potest, quin tam pompholyx, quam spodium
 Brafauoli er- ventriculo, & ceteris visceribus, mirum in modum noceant, cum ex tenuissima aëris substantia vehementissima igne
 ror, Pompho- conficiantur, & id ob deleterij aliquid habeant. Quod maiori quidem diligentia expendere potuisset Brasauolus, cum
 lygem, Spodio substituentis. interrogatus à suo sene pharmacopola, quid spodij loco in compositis medicamentis imponendum foret, inconsulte
 spodij loco sumendam statuit, in eodem versari errore deprehenditur, in quo Manardum eius ciuem versarum ostendit.
 Quando quidem si rectè nouisset Tutiam communis vsus legitimam non esse pompholygem, omnino (vt semper in
 tam adulteris, quam supposititijs medicamentis facere adsolet) errorem hunc suo seni pharmacopola indicasset. Nec
 stat, quod dixerit Galenus in spody defectu, pompholygem supplendam. Siquidem in ijs tantum medicamentis id
 dum voluit, quae exterius illinuntur. Nam Galeni aetate nullus spodij vel antispodij extitit vsus ad medicamenta, quae
 Fuch, opinio- tus in corpore sumuntur, vt longo post tempore à Mauritanis factum esse reperio. Ceterum Fuchsius, libro de componen-
 dum medicamentorum ratione, Agricolam fortasse secutus, praeter illud Spodium, quod in fornacibus fit, alterum
 recenset subterraneum seu fossile dictum, idq; in quatuor species, cinereum videlicet, nigrum, viride, & luteum
 quod quidem solis Arabibus (Agricola soli Serapioni) notum esse scribit. Veruntamen Serapio vbi de pompholyge
 422. vbi item de Spodio cap. 342. nullam, quod legerim, spodij fossilis mentionem facit: quemadmodum neque
 na, neq; etiam alij Arabicae familiae authores. Porro meminit tum Pompholygis, tum etiam spody Galenus lib. 9. imper-
 Popholygis, & spodij hi- cium medicamentorum, sic inquit. Pompholyx fit in aëris fornace, velut & cadmia: fitq; & dū in fornacibus caui-
 storia & vires ex Gal. ritur, vt in Cypro. Cum enim praefectus ad aëris fornacem instructas res non haberet, praecipit ex ipsa cadmia
 (praesentibus, atque inspectantibus nobis) pompholyga, videlicet minutis cadmia fragmentis in ignem coniectis, quae
 ararium iacebat follem. Cameræ erat incurua, nusquam pertusa, sed integra, quae egestam ab vsta cadmia fuisse
 cipiebat: quam vbi collegissent, habebant pompholyga. At quod reflectens infra in pavementum recidebat, spody
 vocant, quae plurimè vbi aëris fornacibus vritur, colligi assolet. Quidam etiam Spodium neutro genere proximum
 cui videtur similem habere facultatem, quod vocant Antispodium. At ego illo vsus sum nunquam, cum
 hi semper pompholyx suppeteret. Nec enim quisquam, vbi haec adsit, spodio vti velit, nedum antispodio. Est autem
 pompholyx medicamentum, propè omnium, qui citra morsum desiccant, si elota fuerit, praestantissimum, quamobrem
 cera cunctosa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaque inditur collyrijs, quae ad oculorum imponuntur fluxiones,
 bullas, seu pustulas in eis natas curant. Praeterea ad pudendorum, ac sedis vlcera optimum est medicamentum,
 sine morfu desiccans. Sed non est huius negotij in istis diutius immorari. Idem libro 4. de compositione pharmaco-
 cundum locos de pompholyge ita scribit: Pompholyx lota nulli pharmacorum mordacitati expertum inferat
 id ea vtimur ad acres, & tenues fluxiones, capite videlicet prius simulq; vniuerso corpore euacuato. At vero man-
 quod per venae sectionem, ac purgationem totum corpus euacuamus, per apophlegmatismos verò caput à pituita
 camus. Potest enim Pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium, atque amyllum simul, & moderatè humore
 care, simulq; ne per tumulas euacuetur ea, quae in magnis ipsorum venis, superflua humiditas continetur, prohibere.
 si quis prius, quam caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obturantis pharmacis vtatur, vehementer
 lorem ex distentis tunicis efficiet, & ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam, aut corrosionem
 Nomina. Πομφολύξ sic Graecis, vt etiam Pompholyx Latinis, & Bulla dicitur: Arabibus, Thucia: Italis Pompholyge: Germanis
 Weiß Pucht. Σποδίου & σποδός, Graece, Spodium similiter Latine vocatur: Italicè Spodio: Germanicè, Grau Pucht.

Χαλκός κεκαυμένος.

AES VSTVM.

CAP. XLVII.

AES vstum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum verò plusquam
 deceat, exustum est. Fit autem è clavis solutarum nauium, fictili crudo compositis: subsperio
 re cum sale pari, omnibus vicissim inspersis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inu-
 tur, donec figulinū percoquatur. Quidam pro sulphure, & sale alumen inspergunt. Alii sine sulphure
 sale, fictili multos dies vtrant. Alii sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excuriunt. Alii oblitos scissili-
 lumine clauos cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alii in aenea olla aceto resperfos vtrant, & in-
 rum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum
 proximum in Cypro. Adstringit, exsiccat, reprimat, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem per-
 ducit vitia oculorum emendat: excrescentia in carne consumit, vomas cohibet: vomitus ciet cum
 dromelite potum, aut cum melle delinctum, illitumue. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua
 nec nulla prorsus tordes emergat. Aëris recrementum, stercusue quam scoriam vocant, eodem modo
 uatur: & eandem vim, sed imbecilliorē, habet.

Aerium, quod in officinis paucim habetur, pauci sane valoris esse existimaverim, cum nigrum sit, & plusquam oper-
 atur igne exolutum. Verum facile quispiam huiusmodi maledi poterit, si Dio corideri necuerit, ipsum conficiendi la-
 borum subiecti. Quod si aeri clavis nauigis solatis exempti non adsint, et aliud omne vetustate expurgatum, commodè
 auri poterit, et ut meminit Galenus libro 9. simplicium medicamentorum, his verbis: Aes vstum habet & acrimen-
 tum, quod ad huiusmodi est particeps. Proinde si lauetur, pulcherrimum est medicamentum cicatrici vlcibus in-
 ducit: quoniam id ipsum prestare, & antequam lauetur, posuit. potissimum in carne duriore: alioquin in molliore
 curio huius est, quod ablatum est. Quod Aes vstum Latinis χαλκος κεναιμας, Graecis appellatur: Italis Rame ab-
 luto.

Aeris
 conu-
 Vir ex
 Galeno.
 Nomina.

10 ΧΑΛΚΟΣ ΑΙΡΟΣ. FLOS AERIS. CAP. XLVIII.

Flos aëris, quem nonnulli clauorum veterum plëgma, quasi resëgmen aut segmentum, nominarunt,
 optimus est friabilis, in attritu fuluescens, nihil effugit & numero, breuis, ponderosus, modicè splen-
 dens, atque constringens, qui delimatam aëris scobem non recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile de-
 prehenditur, cum dentium illis dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus fustum, in receptacu-
 la delabitur, per cola fistularum ad ea pertinentium: tum huic negotio addicti ministri, sordes expur-
 gantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito: itaque repentino concretu, ac addensâ-
 tione, velut expuitur, & erumpit antedictus flos. Adstringit, & exerescentia coerces: offusâ oculis caligi-
 nem emendat, sed in ignopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extra-
 hit, carnosâ naturam, & sedis vitia absumit: eruptiones papularum cum vino cohibet. Candidius contra
 diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur: vnam, consillasq; reprimit, farina
 eius cum melle admota.

Florem aëris verum ac legitimum in fornacibus, vbi æs ipsum funditur, in Tridentino agro, sapius collegimus, in hunc
 modum. Cum æs fornaci liquatum, in paratum receptaculum extra fornacem diffunderetur, anteaquam omnino co-
 ncret in massam, frigidam super ipsum adhuc ignitum infundebam: statimque vapor magnus excitabatur, sub quo mox
 ferream laminam, & eam quidem amplam, subieci, tandemq; tenebam, donec cessabat vapor. Itaq; demum aëris
 flos, qui super lamina illa ferrea deciderat, mihi se se ostendebat granulis milio proximis, minoribus tamen, sed colore ru-
 bicundo splendentibus. Quandoquidem tenuissima aëris pars, quæ a vapore in sublime fertur, aëris frigiditatem experta,
 facili in eumodi exigua grana concreuit. Is nusquam, quod sciam, in officinis reperitur, quapropter eius vice erugine
 perpetuo vsuntur. Florem aëris paucis perscrinxit Galenus libro 9. simplicium medicamentorum, sic de eius viribus differens. Vires ex Gal.
 Flos aëris tenuiorum partium facultatis est, quam aut æs vstum, aut squama. Merito itaque ex eo factus collyrius, extergunt,
 aueruntque superciliorum magnas asperitates, quas vocant sycoseis. χαλκῦ ἄσθος: ita Graecis, Latinis verò Flos aëris dicitur:
 Mauritani, Zar albas sine Zer albas: Italis Fiore del rame.

Floris aëris
 nomina.
 Vires ex Gal.
 Nomina.

10 ΑΕΤΙΣ ΣΚΥΜΑΤΟΣ. SQVAMA AERIS. CAP. XLIX.

Squamæ aëris excussa ex Cypriis officinarum clavis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est
 clauaris nominatur: sed ex vili promiscuoq; aëre, aut candido, vitiosa intelligitur: quam vt pote tenuè,
 & inualidam, damnamus, maxime approbantes crassam, rufam, præsertim si aceti resperfu æruginem con-
 trahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem: nomas coerces, vlcera ad
 cicatricem perducit: pota ex aqua nulla, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur
 ad oculorum medicamenta: genarum namque scabritiam absumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc
 modo. Sicca aëris squamæ expurgata sel. bra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur,
 quousque pessum ierit: abicitur quod subidit, & effusa aqua, hemina cœlestis imbris adicitur, & di-
 stenta manu, squama, quasi destringenda sit, vehementer contricatur: dumq; lentorem emittere cœpe-
 rit, aqua sensim ad sex heminas vsq; superinfunditur, terendo valide: squama ad latus mortarii colligitur,
 ibique apprimitur: quo facto, expressus humor pyxide ex aëre rubro facta, excipitur: Hoc est enim velut
 flos squamæ, valens viribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile, imbecillumq; quod
 superest, lauatur donec nullam prorsus lentitiam excernat: & linteo opertum biduo conuiescere fini-
 tur, effusaq; extante aqua, vbi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alii vt cadmiam lauant, & reponunt.

10 ΑΕΤΙΣ ΣΤΟΜΟΜΑΤΟΣ. SQVAMA STOMOMATIS. CAP. L.

Squamæ ex acie, aut muctronibus decussæ, quam vocant stomoma eadem vis. Lauatur modo simili, &
 reconditur: sed ad molliendam alui detectionem inefficacior est.

Falsum est si Squamæ stomomatæ eadem
 vis. Reliqua verba interpretari a plinio et
 ipsius add. si sic est huius.

Aeris squamæ malleis ex eo decussa, res sanè vulgaris notitia est: tamen si ea præstantior sit, quæ ab aëre excutitur, quo
 clavi sunt, helitis proprie dicta. Siquidem cum huiusmodi æs rude impurumq; sit, crassiorem, vegetioremq; squa-
 mam reddit, quam id quod pluries ignem expertum, in varia vasorum genera conformatur. Eius præterea abluenda ratio
 adeo Dioscoridi clara distinctaq; traditur, vt nihil addendum supersit. Squama omnis in vniuersum meminit Galenus
 libro 9. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit: Squama alia est aëris, medicamen ad multa vtile: alia fer-
 ri, & stomomatæ. Quidam verò nominant & helitin lepida, siue squamam. Omnes sanè vehementer desiccant. At inter se
 diuersæ sunt, tam quod alia magis, alia minus exiccat: tum quod alia crassiore, alia tenuiore sit essentia: quodq; plus, mi-
 nusue adstrictionis sint participes. Helitis certe principem in desiccando locum obtinet: nam & tenuiorum partium, quam
 alia est, nimirum quæ & æruginis non nihil assumpserit. Maiorem obtinet adstrictionem squama ferri, & hec etiam ma-
 iorem stomomatæ: quoniam ad contumacia vlcera meliores sunt, quam squama aëris. Dicitur & siue est huius.

Squamæ aëris
 & stomomatæ
 vis confid.

Plinii, & recentiorum quorundam error.

Prisauolus arguitur.

Stomomatae chalybis squamam confirmatur auctoritatibus.

Stomomatae conficiendi ratio ex Arist.

Plinii, Marcelli, & Brasauoli error.

Stomomata idem est quod chalybs.

potentius squama aris, & hac etiam valentius belitis. Omnes autem squama non instrenne mordaces sunt. Ex quodam
 rum est, quod essentia ipsarum consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa: siquidem inter qua eadem vim
 obtinent, minus est mordax, quod est tenuius, ut superioribus libris ostendimus: hac Galenus. Ex quibus utique hinc
 constat stomomatae squamam, aris squamam esse nequaquam: etsi contrarium memoriae prodiderit Plinius errore da-
 ctus, atque etiam idem affirmauerint recentiorum quidam, eius fidem magis fortasse secuti, quam quod alius rem hanc
 inuestigauerint. Quandoquidem non desunt, qui stomomatae squamam aris squamam omnium tenuissimam esse con-
 dant, ut Marcellus Dioscoridis interpret. Sunt etiam qui putent eandem modo aris, modo ferri squamam tenuerit de-
 signare, ut Brasauolus: quanquam hac nullis, quod equidem sciam, rationibus, nullisque auctoritatibus probent. Brasauo-
 lus tamen, ut suam tueatur sententiam, Dioscoridem in medium citat. Sed qua ratione ego profecto nescierim, cum mi-
 quam repererim scripsisse Dioscoridem, quod stomomatae squama promiscue aris & ferri squama esse possit. Verum
 quispiam sorte putaret, me hac meo tantum arbitrio proferre, id sane quod sentio, primum non obscuris, ut puto, ratio-
 bus aperiam: mox probatissimorum auctorum testimonio illud apertissime confirmabo, quod scilicet stomomatae squama
 nec aris, nec simplicis ferri, sit materia, sed chalybis tantum. In primis itaque dicimus, quod cum scribat Galenus eru squa-
 mam principem locum in desiccando inter ceteras obtinere, ferri vero maiore adstringendi vi quam hec polleat, & haec a-
 iam maiore stomomatae, manifestum praebet indicium, stomomatae squamam nec ab ere, nec a simplici ferro esse decussam,
 sed a duricre & terrestriore metallo, nempe ab ipso chalybe: quippe cum stomomatae squama longe magis adstringat, quam
 ferri, huius vero plus adstringat quam aris, rationi minime consonum videtur, stomomatae squamam esse, aut eru, aut
 simplicis ferri scobem, sed potius (ut dictum est) purissimi chalybis. Ad hac cum Galenus in capitis fronte scribat, Squama
 alia aris est, alia ferri, alia stomomatae, omnibus sane palam facit, stomomata aliud esse metallum ab ipso ere, & a simplici
 ferro omnino diuersum. Nam si sensisset Galenus, quod stomomata in aris genere, non autem ferri, fuisset reponendum, si-
 xisset haberi squamam aris, stomomatae, ac ferri, neque ita speciem a suo genere disiuuisset. Sed quoniam recte
 uerat stomomata genus esse ferri arte facti, ob id suo illud adscripsit generi, quemadmodum & Paulus ipse
 secutus. Ceterum praeter rationes adductas, stomomatae squamam a chalybe tantum decussam esse, nihilque aliud Graeco
 stomomatae nomine indicari, quam chalybem, confirmatur Aetij & probatissimi, & Graeci auctoris testimonio, quippe in
 libro 9. cap. 48. de iis agens, quae in corpus sumpta dysentericos iuuant, quidnam Graecis esset stomomata, his verbis aperte de-
 clarauit: Deinde vinum purum vetus, quantum satis videbitur, in nouum vasculum infundito, & laminam ignitam ex
 ferro, quod stomomata vocant, non minorem libra in vino extinguito. Item lib. 10. cap. 9. ubi indurati lienis curam agit, sic
 inquit: Sit autem ferrum, quod in ipsis extinguitur, stomomata. Ipsius autem stomomatae ferri squama, quam in fabricis
 officinis ferrum, dum ignitur, & malleo tunditur, abicit. Postea agrestioribus hominibus utiliter exhibetur. Et lib. 4.
 cap. 24. idem ait: Squama ferri praesertim stomomatae, amplioris adstrictionis particeps est: hac Aetius. Ex quibus sane pro-
 spicuum sit, nil aliud Graecis esse stomomata, quam Latinis sit chalybs, qui e puriore ferri substantia, arte fit in forma.
 Quo factum est, ut omnes in vniuersum medici Aetium & reliquos vetustiores sectati, ad dysentericos, aliosque affectum
 expetentes, chalybem igne candentem, magis quam ferrum, modo in aquam, modo in austerum vinum, modo in lac extin-
 guant, quod chalybs maiore adstringendi vi polleat, quam ferrum. Hinc itaque omnino affirmare licebit, nil aliud extin-
 tisse vetustioribus, ac recentioribus Graecis stomomatae squamam, quam quae a chalybe decutitur, eiusque praesertim, qui malleo
 ferrarijs in officinis acuitur, dum gladijs ac telis aciem, vel mucrones coaptant artifices: quin etiam dum alia sunt instru-
 menta materiarijs fabricis, & terra cultoribus expetita. Porro hanc rem quoque Actuarius abunde expressit suo de composi-
 tione medicamentorum libro in Aegyptia Andromachi, dum inquit: Multo reddetur utilior, si squamam acie, aut mucroni-
 bus decussam, quam appellant stomomatae, pari pondere sibi adscisat. Id quod etiam idem paulo inferius repetit. Hoc
 super confirmari potest ex Galeni scriptis libro primo, ac tertio de compositione medicamentorum secundum locum, ubi in
 uersis medicamentis, praesertimque ad alopeciam facientibus, stomomatae ferri squamam immiscet. Sed si forte repererit
 aliquis adeo ceruicosus, & peruitax, ut tot clarissimorum virorum auctoritatibus non acquiesceret, audiat quae
 telem philosophorum omnium principem, qui lib. 4. Meteororum, chalybis siue stomomatae conficiendi rationem
 me docuit ijs verbis: Τίκεται δὲ καὶ τὸ ἐργασμένοσ σίδηρος, ὡς εὐγρὸσ γίνεσθαι, καὶ πάλιν πήγνεσθαι, καὶ τὰ σωματὰ
 οὕτω οὕτω. ὑφίσταται γὰρ, καὶ ἀποκαθαίρεται κατὰ τὴν σκωρία. ὅταν δὲ πολλὰκις πάλιν, καὶ καθαρὸσ γένηται τὸ σωμα-
 τὸν, γίνεσθαι οὐ ποιοῦσθαι δὲ πολλὰκις αὐτὸ, διὰ τὸ ἀπουσίαν, γίνεσθαι πολλὰκις, καὶ τὸν σκωριὸν ἰλάσθαι, ἢ τὰ
 ρομαίον. ἔστι δὲ ἀμείνωσ σίδηρος ὁ ἐλαττωτέρων ἀποκαθαροσ. Qua Latine redduntur in hunc modum. Porro & ferrum
 elaboratum liquefcit, ita ut fluxum reddatur, & rursus concrefcant, atque in hunc modum faciunt stomomata: siquidem
 scoria in fundum subsidet, & defecatur ferrum. Cum vero id saepe factum est, & purum euasit, stomomatae
 Hoc autem non saepe faciunt, eo quod repurgatum multum deperdat, & pondere imminuatur. At qui ferrum illud melius
 est, quod minus excrementi retinet: hactenus Aristoteles. Cuius nimirum doctrinam sequuntur in hunc usque diem
 ferrarijs farnacibus, & officinis e ferro prius elaborato, chalybem conficiunt in Italia, & in alijs vniuersa Europa regni-
 bus. Quapropter eos prorsus hallucinari euidentissimum est, qui aliter sentiunt: nempe inter antiquos Plinium, & inter
 recentiores Marcellum, & Brasauolum. His omnibus accedit Serapionis auctoritas, magni inter Arabes Dioscoridis inter-
 pretis: quippe qui quadragesimo tertio sui operis capite de simplicium medicamentorum historia & viribus, id tenet
 quod a Dioscoride proditum est de squama stomomatae, de ferri squama posteritatis memoria prodidit, ferrum eandem
 genus, chalybis loco accipiens. Nec obstat, quod in Dioscoridis codice scriptum reperiat, stomomatae squama vim eandem
 esse, quae aris squamae, quanquam non adeo valenter aluum deiciat. Siquidem ego plane suspicor, codicem Dioscoridis hoc
 in loco esse deprauatum, ut in alijs quoque pluribus deprehenditur, praesertim cum nec a Galeno, nec ab alijs veteribus recet-
 ribusque Graecis proditum sit. stomomatae squamam aris squamae viribus esse similem: hac namque aluum deicit, illa vero
 traxeam cohibet. Ad hac nusquam memini apud quenquam legisse, alio metallo roborari posse ferrum in aciem vel mucro-
 nem elaboratum, nisi chalybe, qui Graecis stomomata dicitur. Quo fit, ut illorum pertinaciam mirari non desinam, qui
 aliter sentiunt. Ex his itaque haud dubie credendum arbitror, non aliud esse stomomata, quam chalybem, qui cum a pri-
 mordijs semper fuerit expetitus ad ferreorum instrumentorum aciem roborandam, quam aciem Graecis σωματὰ vocant,
 pariter chalybem stomomata vocarunt. Quapropter dicebat Aetius, sit ferrum, quod in ipsis extinguitur, stomomata. Hoc
 vocabulum putauerim ego ortum esse a σωμα, quod Latinis os sonat. Acies enim, itemque mucrones, gladijs, &
 telis, aliisque ferreis instrumentis vsu nullum alium praebent, quam oris: unde Latinis quandoque dici solet, eus quibus
 malefacta caput abscinditur, in ore gladij perusse. Plinius quoque licet ignorauerit, quid Graecis significet stomomata,
 chalybe tamen aciem, quae Graecis σωματὰ dicitur, appellauit lib. 34. cap. 14. sic inquit: Ex omnibus autem ferri generibus
 Scrio

serico palma est. Seres hoc cum vestibus suis, pellibusq; mittunt. Secunda Parthico, neque alia genera ferri ex mera acie temperatur: catervis enim admiscetur: hac Plinius. Ex quibus palam est, id hoc loco Plinio aciem vocari, quod chalybem etiam Latini appellant, quodq; nos corrupto nomine ab acie, vel ab acuendo vulgò vocamus acciaio, quemadmodum & Galili dicit. Hispani aciel suo idiomate dicunt. His igitur tum rationibus, tum auctoritatibus freti, σκουμα potius à σκουμα quam à verbo σκουω ortum habere putamus: quanquam etiam eorum opinio, qui à σκουω σκουμα dictum existimant, non sit omnino improbanda, quòd id verbum roborare, durum facere, aciem & mucronem inducere Græcis designet. Sed neque illos quoque profus aberrare crediderim, qui scobem ab acie, & mucronibus, dum super lapide rotante acuumtur atms. detasam, stomomatu squamam esse censent. veruntamen hac, quòd sit lapidis illius ramentis admista, non perinde ac sincera probanda videtur. Squama, quæ Græcis λεπίς χαλκῆ, Latinis Squama æris appellatur: Italis, Squama del rame: Germanis, Kupferschlag: Hispanis, Esquama de cobre. Quæ verò Græce λεπίς σκουματος: Latine Squama stomomatu dicitur: Arabice, Tubel, Basiture Jabarram, & Cortex asis: Italice, Squama del stomoma: Hispanice, Esquama de azero.

Ἰὸν ἔρυσθῆν

ÆRUGO RASILIS.

CAP. LI.

AErugo rasa fit iis modis. In cadum, aut aliud consimile vas, acetum quàm acerrimum infunditur: superponitur inde inuersum æneum vas, præsertim concameratum, sin minus, planum: sitque obstructum, nullumque habeat spiramentum: exempto, quo doliolum obturaueris, operculo, decimum post diem inidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina vna pluresve vinaceis non recentibus, sed iam accedentibus conduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delinata æris scobe æruginem facere licet: nec non è laminis, quibus bractæ auri conclusæ malleo ducuntur, si quis eas aceto respergat, & ter aut quater verset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cypriis metallis gigni, lapidibus quibusdam non nihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntque per Caniculæ æstus è quodam specu manare: sed illam paucam, & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed vitiosam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant: aliqui pumice admisto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem, aut marmor, † dum pollice sinistrae manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi conitam marmoris autem, pumicisq; partes coeunt non dissipant: demumque tractatione crebra, & humoris complexu dealbescunt: quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, læuis, & sine asperitate. Atramentum verò sutorium igne coarguitur: namque si fictile, aut lamina adulterata æruginem illinatur & feruenti cinere, aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetque id, quod atramentum sutorium acceperit: quòd id vstum suapte natura talem sortitur colorem.

Ἰὸς σκώληξ.

ÆRUGO SCOLECIA.

CAP. LII.

AEruginis, quam vocant scoleciam, duo sunt genera, quædam fossilis est, altera factitia ad hunc modum. In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisque, pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam vnam, cum salis fossilij translucens, aut marini quàm albissimi, solidique, aut certè cum nitri pari pondere teritur in sole æstuosissimis diebus, sub sydu Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat, & concretu strigmentosum fiat: vbi autem se in vermiculorum Rhodiæ similium speciem coegerit, recondito. Efficax, & valde boni coloris redditur, si duas partes vrinæ veteris, cum vna aceti adieceris, & alia, quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant: quod genus, vt vitiosum improbat. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario, & pistillo Cyprij æris, cum vna pueri impubis, qua aurum ferruminant. Antedicta æruginum genera vsto eri omnino respondent, sed magis effectu valent. Sciendum fossilem scoleciam præstantissimam esse: derasam sequi: postremo loco factitiam: mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. Aurificum autem ærugo rasæ respodet. Æruginis omnes adstringunt, extenuant, exalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lacrymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur: vlcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducunt: callos, & sordida vlcera purgant, cum melle cocta: callum fistularum erodunt cum ammoniaco, collyrij modo in eas adactæ: ad gingiuarum autem excrecentias, & extuberationem vtilis. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ, verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est: resina terebinthina exceptæ, cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quamcunque velis minutissime fracta, comminutaque, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad vsum. Sunt qui cruda olla eam vrant, vt dictum est: sed non profus eundem colorem cremata reddit.

AEruginem, quòd colore sit viridi, officina, ac medici in Italia es viride nuncupant, & vulgari sermone verderame. Verum quamuis officina eo in vniuersum abundant, sinceri tamen parum ostendunt. Scolecia æruginis, ac fossilis destituitur: quòd altera, quòd sciam, hoc tempore non patetur, altera verò ab ararijs fodinis, vbi forte plurima reperitur, à fossoribus non deseratur. Proinde cum harum copia non sit, ea tantum vtimur, quæ are in acetariis cadu demisso, aut vna ueni iam acescentibus obruto, conficitur. Hallucinantur, qui credunt æruginem, & æris florem vnam, & eandem rem esse, vt superius de æris flore differentes latius ostendimus. Aeruginum vires reddidit Galenus libro 9. simplicium medicamentorum, sic inquit: Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert, digerens, detrahens, & liquans, non teneram modo, sed & duram carnem. Porro supra dictum est nonnullos eius generis medicamenta epulotica, hoc est, quæ cicatricem inducant, appellare, cum iis in tenuissimum pollinem tritis per specilli cuspidem contigerint, vlcera excrecentia, ac postriede contracta reprimant: tamen si illos haud lateat, si paulò plus impositum foret, sese vlcus non contractum, sed erosum inuenturos.

Nomina.

† Orib addit. ἢ τὰ ὄμματα & similia.

Aeruginum consideratio.

Aeruginum vires ex Gal.

Nomina.

uenturos. Siquidem colliquat, & digerit carnem: cum medicamenta epulotica contrahant, consistunt, constringunt, & calli in morem illam indurent. Quin & gustum mordicat arugo, non tantum ipsa vlcera: quod si pauculum eius ceruo non pauco admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum exterget. Dicitur vero supra est de ratiua medicamentorum natura, tum vt sese quidam fallunt ex talibus compositionibus, aut sarcoticam, aut epuloticam adhibentes, cultatem medicamentis, quibus minime oportet: utpote cum ipsa id prestare nequeant, verum ea, quae ex ipsis composita sunt. Quae arugo ἰὸς σιδήρου Gracis, Aerugo rasilis Latinis dicitur: Italis, Erugine rasilis. Quae vero Gracis ἰὸς σιδήρου, Latine Aerugo scolecia nominatur: Italis, Erugine scolecia. Arabibus, Ziniar, seu Zengiar: Germanis, Spangrum: Hispanis, Cardenillo: Gallis, Verderis & Verdet.

ἰὸς σιδήρου

RUBIGO FERRI

CAP. LIII

Rubigo ferri restringit: sistit foeminarum profluvia admota, potuque praestat ne concipiant. Illius ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, & duuias, & pterygia. Condylomatis prodest, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquave, in qua candens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dylentericis, lienosis, cholera laborantibus & dissolutis stomacho auxiliatur.

Σκωρία σιδήρου

STERCUS FERRI

CAP. LIIII

Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadem potest, quae rubigo, sed inefficacius. Aconito ex aceto solo potum, opitulatur.

Rubiginis, & scoriae ferri consideratio.

Scoriae vires ex Gal.

Oleum è ferro paradi ratio & vires,

Nomina.

Ferrugo, quae est ferri rubigo, vulgaris notitia est. Eius similiter scoria, quae Latinis & stercus, & recrementum ferri nostris vulgò spiuma di ferro appellatur, omnibus notior est, quam vt maiore indigeat declaratione: hac namque prope ferrarias officinas passim in aceruum congesta spectatur ab omnibus. Veruntamen ne aliquis fortasse decipiat, illud modo indictum non abibit, quod ferri, aut eris, aut argenti scoria non est squama, quae malleo decutitur. Siquidem haec ferri fornacibus, quibus ferri metallum funditur, indita liquefit, & iterum in ferrum coit. Scoria vero, quod in melle ferri recrementum, manet, & spongiarum modo spumofum, nunquam ferrum effici potest. Scoria meminit Galenus simplicium medicamentorum, sic inquit: Scoria omnis resicatorium admodum medicamentum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad leuiorem redigens ipsam in aceto quam acerrimo, posteaq; decoquens ad aures, quae longo iam tempore pure fluxerunt, ea vtor, medicamento maxime exicatorio, adeo vt mirentur, qui praeparantem me vident, & interoperculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam proprie helysma appellant. Verum emplastris quibusdam resicatoriae facultatis commiscetur. Paratur è ferro oleum (quidam ferri quintam essentiam vocant) hoc modo. Sumito ferri scobem lima derasam, & ignium vi (vt chymista dicere solent) ad calcis speciem redactam, aut huius vice rubiginis anchora, qua naues sistuntur, quantum libet. Hac in tenuem puluerem trita, in aceto acerrimo distillato, in aqua calentis balnei, non tamen feruentis, aut in equino simo calente, in vase vitreo macerato, donec acutum rubicundum fiat. Praeterea declinato vase acetum in aliud vas effundito, quousque clarum effluerit, & seruatò diligenter, & iterum super idem ferrum aliud acetum imponito, maceratoq; in balneo, eodem modo ad rubedinem vsque, eademque seruatà ratione extrahito, & iterum, atque iterum acetum addito, quousque nihil amplius ruboris concipiat. Deinde acetum rubicundum factum in distillatorium vas vitreum conuicito, & in fornace collocato, cineribusq; obducito, & fructu igne ad destillandum finito, quousque fluxerit acetum, aqua stillatitia modo: & postea vase è fornace exempto, id frangito, & ferream materiam in fundo residentem extrahito, terito, & in aliud vas reponito affusa communi aqua, quae prius distillata fuerit, & simul in balneo praescripto macerari finito, duorum dierum spatio. Eximito deinde, & perstratum (vt chymista dicunt) distillandum parato, & id omne, quod fluxerit, in vase aliquo asseruato, quousque in sal conuertat. Id demum conterito, & in vitreum vas retorti colli, ita à chymistis appellatum, collocato, & valido igne oleum dicitur, quod rubrum emanabit. Hoc seruatò diligenter. Siquidem eximium, rarumq; habebis medicamentum, ad omnes lienis & splenis obstructions, vbi ceteris auxiliis morbus expugnari nequeat, sed sumentes prius medicamentis attenuantibus, & aluuij subducentibus purgatos esse oportet. Datur locinorosis drachma pondere ex aqua Intubi, aut cichorij, aut Agrimonij: lienosis vero ex aqua aspleni, aut adianthi, aut Tamarisci. Ac ad ea omnia mirifice praestat, ad qua Rubiginem & scoriam prestare scribit Dioscorides. Caterum vbi quis per se parare nesciat, Chymistas consulat. Rubigo ferri Latina dicitur, ἰὸς σιδήρου, Gracis appellatur: Arabibus, Seda albadid: Italis, Ruggine del ferro: Germanis, Eisen rost: Gallis, Rouilleure de fer: Quae vero Gracis σκωρία σιδήρου, Latinis, Scoria, Stercus & recrementum ferri dicitur: Arabibus, Chals albadid: Italis, Spiuma di ferro: Germanis, Schlacken: Hispanis, Mozo de herrera, & Mozo de fragua.

Μόλυβδος περιπυρρίμος

PLUMBVM ELOTVM

CAP. LV

Lotura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: lintheo deinde colato, aquam superinfundatur: vbi confederit priori aqua effusa, nouam adiiciens, vt cadmiam lauato, donec nulla extet nigritas postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quae sitam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox vbi id pessum terit, effusa aqua, colligunt in pastillos: nam tritum vehementer, cerussa simile redditur. Alij elimatz scobem modicam plumbaginem adiiciunt, affirmantes ita elotum plumbum praestantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & vlcera ex crescentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vlcera, condylomata, & haemorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quae aegre cicatricem ducunt: & in totum spodij effectus praebet, nisi quod non obducit crustas. Syncerum plumbum affricatu, marini scorpionis, draconisque plagis auxiliatur.

M. L. C.

Μολύβδος καὶ οὐρανός.

PLUMBVM VSTVM

CAP. LVI.

Vritur plumbum sic. Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargi-
gito: additisq; alus rursus laminis, interiecto semper sulphure, vsquedum vas expleueris, succendito:
frigate autem plumbo, ferrea rude veritato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; è plumbo non
vitum hæerit. tum demum obstructis naribus eximito: alioquin halitus plumbi noxius tentitur. Aut eli-
matam plumbi scobem in olla sulphure vrito. Alii laminas in fictili crudo, vt dictum est, imponunt fer-
naci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, vrit. Alij pro sulphure cerussam, aut
10 mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi vitio, & si vehementius vratur, contrahit
spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum lauatur vt cad-
mia, & reconditur. Eisdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multò aciores.

Συγία μολύβδου.

RECREMENTVM PLUMBI.

CAP. LVII.

Recrementum plumbi, quod scoriam vocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam pla-
ne repræsentans, nihil plumbosi habens, quod ad luteum colorem accedit, & vitri splendorem imi-
tatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortariis infusa aqua, &
refusa summa aqua parte, quæ luteum colorem duxit: idq; sapius, dum recrementum absumatur. Dein
10 vbi considerit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

Μολύβδος οὐρανός.

MOLYBDOIDES, SIVE LAPIS PLUMBARIVS.

CAP. LVIII.

Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento vim habet, & eodem
modo lauatur.

Plumbi abluendi, atque etiam comburendi ratio, aded lucide constat à Dioscoride prodita, vt operapretium non sit
30 *plura de ea referre. Veruntamen animaduertendum est, plumbi recrementum, quod Dioscoridi scoriam vocatur, non est* Scoriam plumbi
sepiumbaginem, quæ excrementi instar, vbi plumbum igne liquefit, ab eo secedit. Quippe quod hæc nil aliud sit, quàm consideratio.
purissimum plumbum, quod ignis vstione, cineris speciem induit. Hac enim in Plumbarys officinis in purissimum plumbum
facere redigitur, quemadmodum & argenti spuma. Plumbi itaque scoriam fit tantum in fornacibus, vbi plumbi lapis me-
tallus funditur. Siquidem hoc probe scio, artifices plumbum, quod inde effluxit, in scrobiculam extra fornacem delabi
fiunt. Vbi verò adhuc calens concretuit, aqua frigida perfunditur, quousque scoriam exuat: quæ (vt Dioscorides inquit)
denja admodum est, & fractu contumax, colore in luteum vergente, & vitri splendorem præ se ferens. Huius con:plures vi-
ditum acetuos in Tridentino agro, ac etiam in comitatu Tirolensi, vbi innumera metallorum fornaces, die noctuq; ignibus
eguntur: namque in iis locis metallorum r. crementa, extra officinas abijciunt, monticulos ex his struentes. Quod si accidat
metallicos lapides egre igne in fornace liquefcere, scoriam huiusmodi partem admiscant, quoniam huius adminiculo citius me-
40 *talla ignis cedunt. Reperi ego sapius plumbi, argentiq; scoriam aded versicoloribus lineis intersectam pellucidamq;, vt id*
vitri genus, quod vulgo Venetis appellant Smalto, omni ex parte referret. Quare oportet eos, quibus in animo est, certam
& exquisitam harum rerum cognitionem assequi, metallorum fodinas, & fornaces adire, non autem ea in pharmacopo-
lyis quarere, vbi omnia ferè met. allia medicamenta spuria, & adulteris vitia reperiantur. Caterum qui Lapidem plu-
barium, siue molybdoidem hodie legitime ostendat, habeo profecto neminem, ni forte fossilis quoddam cadmiæ genus de-
Lapidis plum-
barii confid.
monstrent, quod plumbum colore imitetur, qualis illa, quam vulgò vocant Marghestia di stagno: quanquam hanc equi-
dem molybdoidem esse non ausim affirmare, quod nullum latius Molybdoidis historiam scriptis mandasse compererim,
quam ipse fecerit Dioscorides, qui tamen eius historiam tam paucis perstrinxit, vt difficile admodum sit discernere, quinam
Lapis nobis legitime molybdoidem representet. Et si fortasse non aberrarent, qui dicerent, plumbi lapidem ignem in for-
nacibus non expertum, veram esse molybdoidem, quippe quod hic colore, & pondere plumbum maximè referat. De plum-
Plumbi facult-
tates ex Gal.
60 *bo d. iuse sitis dixerunt Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit: Plumbum facult. atis est re-*
frigeratoria. Siquidem non modo multam habet substantiam humidam à frigore congelatam: sed & æream, paucam au-
tem terream. Igitur quod plurimum habet essentia humida à frigore coacta, indicium tibi esto, quod vbi admotum est igni,
celeriter fundatur, fluatq;. Quod verò & ærea sit particeps, hoc habeto signum, omnium, qua nouimus, vnicam plumbum
tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in adibus subterraneis, aerem habentibus turbidum, ita vt quacunque
illuc ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum vincula, quibus earum pedes annectuntur, sepe-
numero creuisse visum est, & quadam adeo intumuisse, vt ex lapidibus dependerent crystalli modo. Atque hæc probabites
quidem sunt humiditatis eius, frigiditatisq; nota, priusquam experimentum fiat: caterum scientifica, & certa per expe-
rientiam cognoscuntur. Preparato igitur mortario, simulq; pistillo, vtrisque ex plumbo, infunde quemlibet liquorem: ita
que terito, vt & pistillus, & plumbeum mortarium succum quandam reddant. Id quod ex vtroque constabit, multò erit
65 *frigidius facultate, quam liquor ipse fuerat. Licet autem & aquam, & vinum tenue aqueum, & oleum iniicere, aut quid-*
us eiusmodi. At si etiam plus effuere succum voles refrigeratorium, oleum omphacinum sit, aut rosaceum, aut melinam
aut myrtinum. Porro si succo, qui proueniet, vti voles, optimum habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum vlcere,
aut rugis & ad eas, quæ in pudendis, testibusq;, & vberibus consistunt: similiter aduersus ceteras omnes fluxiones incipien-
tes, quæ aut in inguina, aut in pedes, aut in alium quemuis articulum decumbunt. Sed & vlcerebus rebellibus vtile est.
Nam & ad canerosa eo viens, virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multum plumbei succi colligere voles, co-
nate in sole torrere, aut quocunque certe modo aere exalfacto. Ad multa autem vtile habebis medicamentum, si adfuso
refrigerantium succorum quopiam teras, ceu semperuiui, coryledonis, in: vbi, lactuca, chondrylla, psyllij, omphacis, parta-
lææ. Porro & qua horum non facile in succum soluantur, velut portulacæ, misceito illis aliorum succorum quempiam, velut
omphacis: quin & ipse per sese prædicto mortario inditus, medicamentum efficit refrigeratorium longè pulcherrimum.

Quin & in laminam diductum plumbum absque alio vlllo, ipsum per sese athletarum sese exercitantium lumbis infirmitur, vbi venereis somnijs vexantur scilicet, nimirum haud obscure eos refrigerans. Sed & bractea ex plumbum tenax, & probè ganglio illigata, planè ipsum dissipat. Illigabit autem probè quisquis ab Hippocrate didicerit, in ipsam partem firmandum, quàm hinc vel inde. Mirum ergo non est, si plumbum crematum, ac rursus ablutum, refrigerantia facultatis, cum ante lotionem mista fuerit. Et hoc ipsum medicamen, nempe plumbum combustum, bonum est ad vitia rebellia. Vbi verò lotum fuerit multò optimum medicamentum est, & ad vlcera impletionem, & ad eadem curandam ducenda. Conuenit & chironicis quæ vocant vlceribus, & cancrofis omnibus, & putredinosis, cum ipsum per sese, cum medicaminum ad cicatricem perducentium quibusdam commixtum, quale est, quod ex cadmia conficitur. Ceterum, cum est principio, si copiosa sit sanies, quotidie, sin minus tertio, aut quarto quoque die. Verum foris spongiam impetu & quæ frigida, quæ si deficcetur, rursus mergatur. Sed hac fusius, quàm pro instituto diximus, plusculum sermone spoliare prouecti. At tempus iam est sequentia deinceps persequi: haftenus Galenus. Plumbum elotum sic Latinis Μολιβδος, & ἰταλῶν Gracè dicitur: Italis, Piombo lauato. Plumbum verò vstum Latinè dictum, Μολιβδος καυτός, Gracè, Piombo brusciato Italicè vocatur. Quæ deinde Σκωεία μολιβδος Gracè, Latinis Plumbi recrementum, & plumbi scoria appellatur: Italis, Spiuma del piombo. Quæ denique Μολιβδος οειδης, Gracè, Molibdoides item, & Lapis plumbarius Latine nuncupatur: Italicè, Pietra piombaria.

Nomina.

Στίβιμ

STIBIVM.

CAP. LIX.

STibium optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedularum emicat, con fractu crustosum, nihil terræ, aut sordidi habens, friabile, quod stibi appellarunt, alij platyophthalmon. Vis eius acitgere, meatus obstruere, refrigerare, excrementa in carne cohibere, vlcera ad cicatricem perducere, lodes, & vlcera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & vt in vltimo sum dicatur, vis vsto plumbum similis est. Priuatim, ambusta igni in pustulas erumpere non patitur, cum dipe recenti illitum, crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera, & exigua cerussa. Tontur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crassa, exemptum que restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis effutum, quoad igni deflagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur vt cadmia, & ex. Sicut qui vt plumbi recrementum eluant.

Stibii confideratio.

Stimmi, siue Stibium, recentioribus medicis, chymistis, ac seplastiis, qui Mauritanorum doctrinam sectantur, in monium dicitur, quod hoc nomine Serapio, & Auicenna Stibium appellauerint. Eius sedina pluribus locis habetur in nostro Senensi agro, sed præstantissimum foditur in maritimis nostris Massano solo, ac Suanenfi: quinetiam in tatus sancta Flora prope Syluam oppidum. Venetias adfertur ex Germania, fornacibus prius fustum. & in massano tatum. Aiunt artifices, qui campanas conlant, has edere senitum magis concinnam, magisq; aurum, & argentum ac præterea, & stibij nonnihil ceteris admisceatur met. illis, dum vna in fornace liquantur. Iis etiam expetitur, quæ vasa è stano viderent item ijs, qui metallica faciunt, & polunt speculantis præterea, qui chalcographus characteres & pos effingunt. Id est differentia esse inter plumbum, & stibium ait Brasauolus Ferrariensis, quod plumbum ignium vi liquecat, stibium vero nunquam, sed facile teratur in puluerem. Sed eius opinionem falsam esse deprehendit experimentum, quando quædam stibium igni admotum, perinde ac plumbum colliquecit, & fluit. Cuius rei nos sapius periculum fecimus, dū oleum nostrum ex stibio conficeremus, quo quidem magno successu vtimur ad contumacia, sinuosaq; vlcera sananda, ad id siquidem stibium pluries fundere oportet, vt syncerius, puriusque reddatur. Ceterum admonitos lectores volumus, oleum hoc nostrum è stibio paratum, non illud esse, quo chymista argentum in aurum mutari fabulantur, sed aliud ab eo longè diuersum: tametsi hoc nostrum ex sese plus auri fundat, quàm illud chymistarum. Sed vt ad institutum nostrum reuertamur, planè vanum videtur asserere stibium igne haudquaquam liquecere. Nam cum quolibet metallo, siue ferrum siue chalybs, in fictili fusorio permixtum, ea celerius eliquandi præbet materiam. Quam ob causam qui ferreos, sphaeræq; bombas bombardis immittendos è fusio ferro conformant, nisi stibium ferro admiscerent, nunquam sanè (vt proceri dicunt) id fluxum facerent. Stibij mentionem fecit Plinius lib. 33. cap. 6. vbi ita scribit: In iisdem argenti metalla nuntur, vt proprie dicamus, spuma lapis candida nitentisque, non tamen translucens, stimmi appellant, alij stibium, alij alabastrum, alij larbason. Duo eius genera, mas, & femina: magis probant feminam. Horridior est mas, scabriorq; & minus ponderosus, minusq; radians. & arenosior. Femina contra nitet, siabulis, fissurisq; non globu debiscens: hanc nus Plinius. Stibij vires retulit Galenus lib. 9. simpliciū medicamentorum, his verbis. Stimmi ad facultatem defecationis adiunctam habet hoc medicamen adstructionem: quamobrem & ocularibus medicinis comiscetur. & illis scilicet, quæ transformantur in collyria quæ vocant, & siccis, quæ vtiq; sicca collyria cognominant: hæc Galenus. Ceterum stibium vim deiectionis sortitur præstantissimā: quanquam antiquorum ac recentiorum nullus præter vnum Theophrastum Paracelsum hoc literis memoriæq; mandauit, attamen inter antiquiores solus Dioscor. vno tantum loco de Stibij deiectionis facultate meminisse videtur, capite de agresti. Cuiusmodi vbi sic habet de Elaterio differens: Elaterium bile ac pituitam vtriusque extrahit, optima suspiriosis est purgatio, quod si in animo sit deiectionem moliri: adiecto salis duplo & Stibij quod colorem sufficiat, ex aqua crui magnitudine catapotia dato, hæc ille. Quare non equidem grauabor in studiosorum gratiam ea commemorare de huius medicamenti viribus, quæ vidi, atque etiam à medicis quibusdam fide dignis accepi. Etenim Andreas Gallus medicus Tridentinus, qui iam admodum honoratissime medicinam fecit Sereniss. Ferdinando Archiduci Austria, Domino meo clementiss. ex multis vigilijs magnisq; laboribus, quos in studia, & seruitium insumperat, incidit in malam valetudinem, nempe in pulmonum, cordis, & ventriculi inflammationē: vnde vehemens admodū sitis consequbatur, quæ nullo quidē potu extinguī poterat. Præterea epiglottidis tumore, & tanta palati siccitate vexabatur, vt vix loqui posset. Quinetiam cordis palpitacionē patiebatur aded magnam, vt nocte repente expergefactus putaret per cubiculum aliquando obambulasse. His deniq; malis accesserat capitis destillatio, à qua sapius suffocari metuerat. Perro metum mortis angere vires, quæ tot morbis quasi hostibus obseſſæ, facile poterant deficere & opprimi, ex eo præsertim quod nullus esset citius, qui appetitum languentem excitaret, atque ita vires instauraret, vel saltem conseruaret. Addit quod os & guttur eius saporem tetrum & carbonibus similem reddebant: quæ sanè omnia dicta inflammationis erant indicium non obscurum. Cum igitur res sua per aliquos dies ita se haberet, atque in maximo versaretur discrimine, neq; vllum perciperet lenimentum

Stimmi Plinij.

Stibij vires ex Gal.

Stibij vis deiectionis.

Historia L.

quædam vnguentum dicitur ex
Stibio & oleo
de Seno.

Brasauoli erratum, Stibium vi ignis non liquari volentis.

Stibium

- factum egritudinum ex multis medicinis factum, ad Stibium, quod Mauritanii Antimonium vocant, me nesciente, confu-
 gunt. quoniam saepe audierat medicamentum hoc sibi minime commendatum fuisse a Georgio Handschio medico haud
 vulgari, qui illius experimentum fecerat in morbo difficilissimo. Hac itaque ratione ductus Stiby in tenuissimum puluerem
 redacti. Et rhodofachari exiguo admisti, tria tantum grana sumpsit: atque paulo post temporis spatio sensit medicamentum
 illud ventriculi subuersionem moliri, ac leuem quandam calorem excitare. Mox erupit vomitus, quo solum quaedam cibi
 particulas reiecit, etsi superiore die non coenasset. Hunc paulo post alius secutus est vomitus similis, cui successit bilis flava
 reiectio ad vnicuarum fere quatuor pondus. Hac autem omnia euenerunt hora tantum dimidia spatio. Ex quibus miri-
 ram illud cepit iuuamenti, quod statim omnis ventriculi labor sedatus est. Ex eo vero quod hora post ter biliosa inferne ex-
 creuit, in quibus crassa quaedam residebant (hæc simul duarum librarum pondus aquare poterant) factum est, ut ab illa
 cordis palpitacione, capitis fluxione, & epiglottidis tumore statim sit liberatus: qui præterea neque sitim molestam habuit,
 neque cibi fastidium perpeffus est. Quamobrem is corporis salutem ipsamque vitam in tot morbis deploratam, Deo primum,
 deinde huius medicamento acceptam retulit. Alium quoque Stiby intus assumpti effectum silentio non dissimulandum mi-
 hi narravit idem Georgius Handschius, cuius superius memini. Is enim cum esset pestilentia correptus, ob idque maxima to-
 tum corporis imbecillitate affectus, cordis tremore, spirandi difficultate, capitis dolore, & sinistri inguinis abscessu, circa no-
 tuum tepidulum Stiby rhodofacharo admisti tria grana sumpsit: atque post hora dimidium vomitionibus reiecit magnam
 pituitam, cum flava tum portacea quantitate, cum prospero admodum successu. Siquidem ex vomitu (sic ille dice-
 bat) statim subleuata est spirandi difficultas, ac cordis tremor cessauit. Vomitus deinde subsequuta est copiosa alui deieccio sine
 vlla ægotanti molestia, postquam reliqua pestis symptomata prorsus euauerunt, atque adeo breuis fuit integra sani-
 tatis habitus. Id quod etiam alijs contigisse scio, qui hoc admirabili medicamento sunt vsi in ea pestilentia quæ anno 62.
 & 63. in tota fere Bohemia grassabatur: siquidem quam plures seruati sunt pestilentia affecti, qui Antimony hyacinthi-
 ni nostri granis tantum quatuor ex antidoti liberantis drachma in morbi principio deuorauerunt. Præterea Stibium opitu-
 latur omnibus in vniuersum morbis, quos atra bilis excitauit, iisque præsertim qui hypochondriacam obtinent inflatio-
 nem. Equidem vidi Præge Bohemorum parochum, qui melancholicus factus planè desipiebat, multaque stultè loquebatur.
 Huiusmodi exhibitum fuit Stibium granorum duodecim pondus: quod paulò post copiosè atram bilem per aluum eduxit, cui
 erant admixta, ut ego qui vidi, vocatus tanquam ad miraculum, testari possum) ramenta veluti carnis, quæ magnos va-
 rices in particulis dissectos præ se ferebant: namque excrementa illa sanguinem nigerrimum representabant potius, quam
 vllum ex alijs humoribus. Hoc utique illi tantam operam tulit, quod postera die visus est bellè pristinam mentis suæ sanita-
 tem recuperare. Et quoniam is erat corpore robusto & animo forti, ideo non est mirum, si facile & sine vllò incommodo tu-
 lerit tantam illius medicamenti quantitatem, quamquam audax nimis fortè habendus est ille, qui eam exhibuit. Datur
 etiam Stibium vtilissimè diuturna febre consumptis, & ijs qui spirandi difficultate laborant, præcipuè asthmaticis. Pro-
 dest item conuulsis, comitialibus, veteriosis, resolutis, & ijs qui coli dolore cruciantur. Extant quoque apud me nonnul-
 lorum Medicorum Itælorum Epistole, quæ (Deo optimo maximo duce) prodibunt in lucem, in quibus de Antimonio admi-
 randa quedam leguntur. Extant & aliorum quoque testimonia, & præsertim Illustrissimi Comitum Octauiani Langos-
 sibi, & viri optimi, nec vniquam satis laudati Luca Contili Senensis. Siquidem, hic sanitatem pluribus simul morbis
 impeditam, & quæ à peritissimis Medicis restitui nunquam potuit, Antimonio acceptam refert. Nam inter cetera mira-
 cula huiusmodi medicamenti scribit ipse quod sumptis a se tantum quatuor granis Stibij nostri, euomuit paulò post 12. tere-
 binthina resina portiones, quas ante dies quindecim vorauerat: quin etiam ille constanter asseuerat, se quam plures sa-
 nasse, qui fere deplorati agebant. Quo fit ut non possim non mirari nonnullorum Medicorum ingenium, qui Stibium ve-
 nenum mortiferum esse contendunt. Siquidem si medicos se esse profitentur, miror quidem eos hactenus non obseruasse,
 quæ admodum, vel fortasse nulla reperiri medicamenta, aluum electiuè exoluentia, tam priscis, quam recentioribus me-
 dicis vsurpata, quæ venenosam vim non sortiantur. Elleborum enim vtrunque, Tithymalorum omne genus, Pityusa, E-
 laterium, Colocynthis, Turpetum, Thapsia, Bryonia, Scammonium, Thymelea, Chamelaa, Cyclaminus, & inter fos-
 silia Armenius atque caruleus lapis, quin etiam aris Squama, quæ passim vsi sunt antiqui ad cutem subeuntes a-
 quas, venenosa vi haud sunt expertia. Atqui quid dicent de Sandaraca atrocissimo veneno? An non eandem propinat
 cam melle, aut in catapoyis Dioscorides asthmaticis, & alius in discrimine laborantibus? Non ne & Auicenna Arsenicum
 quoque propinat? Hoc mihi dixisse sat est ut illorum negligentiam, ne dicam inscitiam palam faciam, qui suis opinionibus
 (profecto ridendus) inhaerentes, non vident dum Stibium vituperant, interim tamen à præscriptis medicamentis non ab-
 stinent, imò ijs quotidie vtuntur, quorum nonnulla longè magis sumentibus nocent quam Stibium: Cuius vsus (vbi rectè
 in morbo conueniat) saepe miraculi speciem affert, & præsertim vbi propinetur ex catapoyis ex Gal. hiera paratis. Quam
 obrè optimè dicunt ac intelligunt, qui in deploratis fere morbis diuturnis, ipsi quoque pituitosis & melancholicis curandis Sti-
 bium Dei manum appellant. Ceterum sunt qui asserunt, Stibium sumptum non secus humana corpora ab omnibus excre-
 mentis expurgare, atque idem reliqua omnia metalla, instrumentaque, metallica, quibus adiicitur, ab omni sorde purificat.
 Atqui in eius exhibitione diligenter animaduertere oportet, ut illud quod exhibetur, sit præparatum. Hanc ob causam nos
 hic eius parandi rationem subiicimus. Eligito Stibium optimum, quod (ut Dioscorides tradit) splendidissimum est, mo-
 doque nitidularum emicat, confectum crustosum, friabile, nihil terra aut sordidi habens. Id primum in puluerem facito: dein-
 de in fictile vas, quod amplum sit, conuicito: tum demum carbonibus succensis ad calcinandum (ut chymistarum verbo vtar)
 sub dio exponito, atque interim cochleari ferreo, spatula ita Myropolis appellata, continue moueto. Hoc vero dum fit, fu-
 mus exhalat tenuis, sulphur & auripigmentum redolens, qui si ore attrahatur, crebras interdum excitat vomitiones: qua-
 propter qui versant, ventis terga opponant. Versare autem assidue expedit, nam si paulisper cesses, vel comburitur Sti-
 bium, vel liquefit. Versato itaque diligenter, quousque in glebas concreuit: quas cum videris, sublato ab igne fictili, quod
 concreuit, iursum in puluerem redigito, atque eidem fictili impositum carbonibus reddito, assidueque versato. Id quod toties
 repetendum est, quoties coalescentes glebula postulauerint. Ita quoque tam diu versare conuenit, quoad corpuscula illa, quæ
 emicant, splendorem suum amiserint, vapor omnis cessauerit, faetor obsoleuerit, & Stibium in calcem conuersum subalbi-
 cantu cineris colorem contraxerit: perfecti autem operis signum erit, si prunis ardentibus inspergatur, nihilque prorsus fu-
 mi emittat. Post hæc sumito huiusmodi calcis, exempli gratia, libram mediam, chrysocolla factitia, semunciam. Deinde chry-
 socollam & Stibium terito in tenuem puluerem, mox omnia simul misceto, atque in fictili fusorio, quo vtuntur aurifices,
 igni vehementi admoueto: vas super laterem aut testaceum aliquod, fictilis olla fundum prius collocatum, & fictili oper-
 culo contextum, carbonibus accensis circumdato: Veruntamen operæpretium est in hoc magnam adhibere diligentiam, ne
 res illa comburantur. Quare tenacula ferrea sublato cooperulo, nonnunquam inspicendum est an colliquescat. Nam vbi

Historia 2.

Historia 3.

Historia 4.

Stibij Hy-
acinthini pa-
randi ratio.

colliquatum fuerit, illico vas ab igne eximito, & super inuersa pelui ex antichalco fabricata, qua tonsores videntur profecto. Quam primum enim ibi concreset in laminas, qua colore, & nitore chrysopatio, quos hyacinthos appellant, atque etiam nonnunquam granatos referunt. Vbi autem lapillos paruos & rotundos parare sit animus, guttazim e sua, atque super eadem pelui solum antimonium effundito. Caterum chrysocholla vicem feliciori successu tibi prestat salis fossile crystalli modo pellucidum, sufficitque in tribus Antimonij vncijs semidrachmam addere. Verum omnes admonitos velim, a quoquam parari posse Hyacinthinum antimonium, etiam peritissimo chymicae artis magistro, nisi prius ab arte vbi eius lamina semel proiecta puluerulenta quadam cuticula obducuntur, qua earum nitorem pelluciditatemque, etiam si fossitij, & iterum igni admouere & fundi permittere atque inde proycere. Cum autem hoc medicamento vti volueris, in puluerem redigito, datoque trium vel quatuor granorum pondere: id tamen pondus in robustioribus nonnihil augeri potest. Stibium ita preparatum commodissime admiscetur rhodosaccharo, cui etiam mastiches modicum adijcitur. Atque hucus de Stibij non vulgari efficacia ac preparatione: qua equidem omnia (vt ingenuè fatear) in primis debeo Andrea Galo viro clarissimo, cuius supra mentionem feci. Stibium quod Latinis, & ἰμύις Graecis vocatur: Arabibus, Aumad, seu Amad: Italis, Stibio, & Antimonio: Germanis, Spieß glas: & Mauro Spieß glas: Hispanis, Piedra de alcohol.

Nomina.

Μολύβδαινα.

MOLYBDÆNA, SEU PLUMBAGO. CAP. LX.

Molybdæna optima est flaua-argenteæ spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitiosa est, quæ aerem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro, & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam, & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens, & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recrementi plumbi similem. Vritur, lauaturque eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Molybdænae consideratio.

Molybdæna, vt Dioscorides testatum reliquit, factitia est, & fossilis. Factitia sit in fornacibus, vbi auri, & argenti metallum funditur: quandoquidem vbi auri, vel argenti vena, siue materia, plumbi tantum sibi admixtum non habet, quantum ad eius liquationem molendam satis esset, qui operi profunt, aut lapidem, à quo plumbum elicitur, aut plumbum ipsum superaddunt: quod tunc ignium vbi parim cum admixtis metallis coit, partim vero argenti spumæ modo fornacis solio coheret, & in molybdænam vertitur. Hoc itaque cum probè nouisset Plinius libro 34. ca. 16. de hac Molybdæna differuit iis verbis: Plumbi nigri origo duplex est: aut enim ex sua prouenit vena, nec quicquam aliud ex se potest aut cum argento nascitur, misistisque venis conlatur. Eius, qui primus fuit in fornacibus liquor, syncerum appellatur plumbum: qui secundus, argentum: qui remansit in fornacibus, galena, qua portio est tertia addita vena. Haec rursus conlatur nigrum plumbum, deductis partibus duabus. Idem præbet argenti spuma, qua Graecis lithargyros dicitur: hanc Plinius. Quamobrem facile asserere ausim, nil aliud esse Molybdænam, quam lithargyri speciem, qua postquam è fornace fuerit extracta, in ipsius fornacis fundo concreta, perustaque, residet. Proinde non ab re dixisse videtur Galenus, quod Molybdæna iisdem polleat viribus, quibus & argenti spuma. Quæ autem in terra visceribus fossilis nascitur, nil aliud sanè ferre, meo iudicio, quam metallicus ille lapis, qui plumbum, & argentum simul continet. Hunc equidem testari possum rursus facie ostendi: quippe quod alius sit colore luteo, alius cinereo, alius ceruleo, alius verò scintillans cernatur, atque nitorem præ se ferens, pro variis, ac diuersis terra vaporibus, quæ in metallicos lapides feruntur. Quod autem eiusmodi sit Molybdæna fossilis, testis est Plinius lib. 34. ca. 18. vbi sic inquit: Est & Molybdæna, quam alibi galenam vocauimus, plumbi & argenti vena communis. Et libro 33. cap. 6. ita scribit. Argenti metallum terra est, alia rufa, alia cinerea. Excoqui non potest, nisi cum plumbo nigro, aut cum vena plumbi, quam galenam vocant, hæc Plinius. Caterum palam est, molybdænam factitiam nihil à lithargyro differre. Hoc non latuisse Galenum, eius verba declarant lib. 9. simplicium medicamentorum, dum ait: Molybdæna similem lithargyro vim possidet, tantum à media temperie ad frigidum paululum quid recedit. Sed nec abstergentis facultatis est particeps. Vtraque autem hæc medicamina liquari possunt: ac non vt lapides, & cadmia, & arena liquationem respuunt, sed celerrimè liquantur, vbi oleo additum nonnihil aceti est: liquantur tamen etiam admixta aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cypro cadmiam, quæ in montibus, & riuus nascitur accipiebam, quæ ipsa lapidosa, vt dixi, species est: ad eundem modum molybdænam multam, cum alijs proiectam lapidibus conspexi in via, quæ ad Ergasteria ducit à Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam, in quo & metalla sunt inter Cyzicum, & Pergamum quadragesima, & quadragesima stadiis distans à Pergamo. Μολύβδαινα sic Græcè, vt etiam Molybdæna Latine dicitur: Italicè, Piombaggine.

Molybdænae vires ex Gal.

Nomina.

Ἀργύρου κρῆμα.

ARGENTI RECREMENTVM

CAP. LXI

Recrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysina, aut encauma, molybdænae vim habet, quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, vt potest cum adstringat, extrahatque.

Argenti scoriam consideratio.

Complures argenti scoriam acerui, quam vulgè Loppa vocant artifices, extra fornacum domos visuntur in agro Triestino prope Perzenum, & Lauisiam, & in comitatu Tirolensi, vbi perpetuò argenti metallum in fornacibus vritur, vt in præcedentibus diximus de plumbi scoriam differentes. Facie hæc vitru, quod Veneti ab inditis quibusdam vulgè Smato dicunt, aded refert, vt perdifficile sit alterum ab altera dignoscere. Variis hæc coloribus conspicitur, pro admixtorum operibus, fossilium varietate: nigricat tamen cum plurimum, & quibusdam exaratur lineis cum ceruleis, tum etiam vitru, nec deest etiam quæ viridi tantum, & quæ solum ceruleo spectetur colore. Huic vires reddidit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, his verbis: Argenti scoriam propriè helcysina appellant. Emplastris quibusdam resicatoria facultate commiscetur. Quod Latinè argenti recrementum, Græcè ἀργύρου κρῆμα vocatur: Italicè, Scoriam dell' argento.

Vires ex Gal.

Nomina.

Ἀδάρρημα

Αργύριον

SPUMA ARGENTI

CAP. LXII.

Spuma argenti quaedam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conflata, donec perfectetur, igni incandescat: altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda Hispaniensis, has sequitur, quae fit Diexarchia: id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim huic locis & fragrantibus laminis plumbeis gignitur. Quae flavo colore splendet, chrysis appellatur, omnium optima, quae in Sicilia argyritis: quae ex argento, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrecentiam in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandum prunae superpositis: ita accensa foliibus, ut conflagret, abstergitur infidens spumantia, & reconditur. Aliqui ter aceto, aut vino restinguentes, rursus vrit, & eadem profecti, reponunt. **Lauatur ut cadmia.** Ut argyritidi nominatae, aut, si delideretur, alteri candor detur, ea in partes magnitudine fabarum confracta, chœnicis Atticae mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimque pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulis vasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum disiliat, deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur: triticum abicitur, spuma argenti vehementer manibus affricando, infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta sathiscat. Excolata aqua, iterum tota die teritur, & vespere infusa eadem aqua sinitur: mane colis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea additis ad singulas minas spumae argenti, quinque salis fossilis drachmis, infusaque calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque in albuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam protius salitatem respiciat: demum ardentissimo sole siccata, eiectione prius humore reconditur. **Similis in omni spumae argyritidis diligenter teritur,** addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conicitur, aqua infunditur, ita ut supereminet: mouetur quotidie mane & vespere, aquaque superinfunditur, pitore nequaquam effusa: hoc fit triginta diebus: namque nisi moueatur, crassescit usque ad duritiam testae. Post haec effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaque in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsuginis indicium praebet: deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in ventre iuillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquescens contabescat, exemptamque cum sale pari terunt, & ut supra dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumae argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. **Alia ratio.** Sumito quantum vis argenti spumam: ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium, repurgatarumque decoquito: cumque fabae disruptae dehiscant, lanaque non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquae, & partem fabarum modum adiciens: eadem teritur, quae supra facito: in summa tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossilij libras, adijcito octogenas spumae argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensque nitri quam albissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundes eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato: tum nouam superadijciens aquam, manibus probe versatam, sinito ut confidat, ac rursus per colum trajcito. Alternis eadem proficere, dum pura aqua, dulcisque effluat, & nullam salitatem praeseferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Caniculae sydus exponito, & siccata vritur. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum foeditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasque, & maculatum plenas.

Fit plerunque Argenti spuma, quam Graeci lithargyrum vocant, ea inquam, cuius hodie apud seplasiarios est vsus, in metallorum fornacibus, ubi repurgatur argentum, e plumbo argenti recrementis admisto. Siquidem cum artifices argenti massam a sua vena defluxam a commistis metallis, nempe plumbo, aereque repurgare volunt, in alueum e cinere suo more paratum plumbi multum conijciunt, adeo ut vi subditi ignis colliquatum, balnei speciem referat. In hoc demum argentum repurgandum immittunt, quod plerunque (ut diximus) aut plumbum, aut aes habet admistum. Dum autem hac perficiuntur, visitur plumbum in liquecentium metallorum superficie, ignium vi solium statu continuè excitata, olei modo supernatans: quod tandem postquam aes, aut plumbum, quod prius argento fuerat admistum, in se contraxit, eorundem solium statu ad cinerei alui oras pedetentim expellitur. Hoc cum vident artifices, alueum in latus secant, labique sinunt in brumum: sitq; hoc modo lithargyrum, coctionis diuturnitate, & metallorum aliorum mistione, ea forma concepta. Huic postquam refrixit, quandoque aureus, quandoque argenteus emicat splendor. Quo factum est, ut hunc argenteum, illum aureum passim seplasiary ac medici dicant, omnino existimantes, alterum ex auro, alterum ex argento constari. Caterum coloru huiusce varietatem lithargyrum haudquaquam ex auri, vel argenti spuma contrahit, sed quod plus minusue vaporis ab argento detracti intra se receperit. Siquidem (ut ego pluries experientia comperi, & ipsi quoque testantur artifices) argentum depurandum si plurimum sului aris contineat, huius & plumbi mistione Lithargyrum aureus redditur. Sin minus, argenteus efficitur. Quare nobis affirmare licebit, nil aliud esse lithargyrum, quam plumbum aris vel argenti vaporibus commistum. Non itaque temere prodidit Dioscorides fieri argenti spumam aut ex arena, quam molybditin vocant, aut ex argento, aut ex plumbo. Cui subscribit Plinius libro trigesimo capite sexto. Meminit argenti spuma Galeni libro nono simplicium medicamentorum. sic de eius viribus scribens: Lithargyrum desiccatur quidem, veit alia omnia metallica. Lapidea, terrenaque medicamenta, verum omnium id efficit moderatissime: & secundum alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio est, neque manifeste excalfaciens, neque refrigerans: modica tamen adstringens, aliter condique; acutus ei inest: quamobrem inferior est: & sarcoticus medicamentis, qua medicriter extergentia ostendimus, & contrahentibus, atque adstringentibus. Caterum ad intertrigines femorum vtilis medicinalis & conueniens est: quandoquidem vtriusque etiam dictae facultatu leuiter est particeps. Iure itaque medij ordinis in metallicis

Spuma argē
ti confid.Lithargyrū
aliud ex argē
to fieri fai-
sum.Lithargyri vi-
res ex Gal.

Chrysocolla, deinde lenatur in conchis siccaturque. Haecenus de chrysocolla finimus. Caeterum seplasiary quem admodum aurifices, Chrysocollam vulgo Borrax vocant. Mauritianos seculi cum tamen pauca ad usum in officinis reperiantur, quae sincerissima manu possit, & qua colore sit viridi. porro, ut Dio. Cor. des inquit, & praeparatissima exposit. Siquidem sui nigricat hinc vel ex parte virebit. Quae saturata colore viret, ut mea sent opinio in aetate tantum metallis foditur: quae nigricat, in pumbeis, quae albiat, in argenteis, & quae pallescit, in aureis. Unde mihi facie persuasum est. Chrysocollam libere virentem vendicare, pro metallorum, in quibus foditur, ratione. Porro sacilita ex alumine rubeo, sale nitro-acetiam a. in quibusdam admixta, copia non desit. Idemco aurifices, qui ea ad aurum ferruminandum frequentiter utuntur, ipsam magna quidem diligentia eligunt, quoniam & ipsi plerumque decipiuntur: tanta in omnibus, si imperitorum asfuit. Praestant autem ferruminando illam, quae lutea est: tamen si in medicamentorum usu, praestantior sit viridis. Vt etiam nam chrysocolla, ut Dioscorides prodidit li. 2. in vrina mentione) ex pectorum vrina in areo mortario, pistillo in areo sub calenti sole tandem du. la, ut vnguenti modo crassefiat. Quod pariter literis memoriae, mandavit Gal. li. 9. simpl. medicamentorum. sic inquit: Chrysocolla, & hoc medicamentum ex ys est, quae carnem liquant, non tamen valenter mordicat, quoniam sit facultate admodum digerente, desiccanteq. Igitur quidam id modo, quod in metallis inuenitur, ita nominant: alij vero id, quod in areo mortario, pistilloq. areo, ex pueri vrina praeparatur: id quod quidam inter aruginum differentias numerant. Satius vero est ipsum praeparare tempore aestiuo, aut certe aere prorsum calido. vrinam in mortario terentes. Praestat autem as, ex quo mortarium pistillumq. conficias, rubrum sit. Nam quo as tenerius fuerit, eo plus circummagendo pistillo deturitur. Hoc medicamentum aptissimum est vlceribus contumacibus, tum per se, tum alysiu, ut in opere de componendu medicamentis referetur. Nunc autem id nouisse sat est, quod quanto plus quam Chrysocolla metallica desit, minusq. mordicat, tanto etiam ipsam excellit tenuitate. Ipsam tamen Chrysocollam illam si vras, multo tenuior rem efficit. Vt Graecis χρυσοκόλλα, ita etiam Latinis Chrysocolla, & Auri glutinum appellatur. Arabibus, Tincar: Italis Chrysocolla: Germanis, Borrax: Hispanis, Atincar, & Borrax.

Chrysocollae vires ex Gal.

Nomina.

Λίθος ἀρμενίος.

LAPIS ARMENIVS.

CAP. LXV.

Armenius lapis praefertur lauis, colore caeruleo, perquam aquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem, quae Chrysocolla praestat, sed inefficacius. Quinetiam vsu habet ad pilos in palpebris a- lendor.

Armenia, ut lib. 35. cap. 6 testatum reliquit Plinius, lapidem mittit, qui eius nomine appellatur. Lapis est hic quoque Chrysocolla modo infectus: optimumque est, quod maxime viride est, communicato colore cum caeruleo. Plinio subscribit Auisenna, sic inquit: In lapide Armenio est aliquantulum azuli coloris, non tamen est in colore azuli, & non est in eius soliditate, sed est in eo arenositas quadam: & quandoque vtuntur eo pictores loco azuli, & est lenis tactus. Ex horum sane verbu perspicuum fit, lapidem Armenium colore esse viridi, ad caeruleum inclinante. Talis autem esse comperitur, qui in argenti fodinis, in compluribus Germania loci foditur: & e quo colorem illum ad pictorium vsu parant, quem vulgo vocant verde azurro, ac si diceret viride caesium, vel viride caeruleum. Namque is colore Chrysocollam refert, sed duritie praecellit. Quamobrem crediderim ego, eos non longè abesse a veritate, qui dicerent, Germanicum hunc lapidem illi congenerem esse, quem Armenia mittit. Siquidem patrium Armenij nomen genus non immutat, neque etiam obstat, quin & in alysiis regionibus lapis hic gigni possit. Quippe Phrygius lapis a Phrygia regione dictus optimus in Cappadocia foditur, ut Dioscorides est author. Id quod facile ostendit, Armenium praeter Armeniam, alias quoque regiones gignere posse. Nec refert, quod scripserit Manardus Ferrariensis libro tertio epistola tertia. Armenium lapidem hodie non facile inueniri posse. Quandoquidem cum certo sitam, multa in officinis ferè omnibus deesse medicamenta, eaque praesertim, quae ex metallorum fodinis expetuntur, quae tamen suo natali solo, vbi proueniunt, copiosa reperuntur, mirum certè non fuerit, si Armenio etiam lapide careant seplasiary. Hac itaque ratione ductus, haudquaquam dubitauerim affirmare, quin & hic in Germania metallis proueniens, in Armenij lapidum genere legitime recenseri queat: quemadmodum in Gagini, Phrygi, Aisyque genere nobis recipiuntur, qui alibi, quam in Gaga fluuio, in Phrygia, & Asso inueniuntur: praesertim cum notis omnibus ac viribus Armenio per omnia similis hic habeatur. Notis quidem, quod summe vireat, & ad caesium colorem proxime accedat. Viribus autem, quod, ut equidem testari possum) atra bile vexatis maxime conferat, vs vomitum, & aluum ciens. Porro seplasia (ut omnibus constat) non modo multis destituuntur fofitrys medicamentis, sed continuae alterum alterius loco supponunt: nempe caamiam pompholygis loco, spodij vice complura antispodia, & pro flore eru, rasilem aruginem subiciunt: cum tamen & pompholyx, & spodium, & flos eris copiosa, legitimaque reperiantur omnibus in fornacibus, vbi argentum, & asfunduntur. Nam ex hoc, quod in officinis non reperiat Armenius lapis, quemadmodum alia complura, haudquaquam colligere licet, quod hac omnia suis in fodinis fornacibusque non habeantur. Praestat mirum in modum Armenius lapis (et si id Galeno, Paulo, alysiis veteribus incognitum existimeretur) ad atram bilem deyuendam, ut testis est Alexander Trallianus clarissimus author, libro primo capite de melancholia, vbi sic inquit: Quod si hiet a data melancholia imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad veratrum album prope crasse, vbi affectum ab atris purgationibus nihil penè imminui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum veratro albo praefero, atque licet videntem ipso experientia cognoscere, quomodo praeterquam efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget, quorum nihil album veratrum habere nouimus. Si igitur res postulat, non modo infra per aluum, sed etiam per vomitum purgationem fieri, lapidem illorum exhibere conuenit. Sit autem modus ipsius scrupuli tres, aut quatuor, aut paulò amplius, minusue, pro virtum simul, & copia humoris noxy ratione. At si ager purgatione per vomitum non admodum indigeri videatur, sed per imum ventrem totum vitiosum humorem exire conducat, tunc lapidem eluere oportet vsque ad duodenas (veteris legit quinquagenas vices) Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem, lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terrestremque humorem vacuabit, ut paucis praeteritis diebus adiuuentum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autem ex eo scrupulos quinque, aut sex, ut plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictu coniectura deprehendens an plus, minusue exhibere debeas. Quod si agrum etiam bis adhuc requirere suspicatus, cum fiducia rursus exhibeto: neque enim calorem habet, aut siccantem admodum, aut aliam quampiam ipsi infidentem, amarum & venenosam qualitatem, ut ager ideo medicamentum bibere detrectes. Sin autem nonnulli humi-

Armenij lapidis confid.

Manardus.

Armenij lapis d s vires ex Alexandro.

do/s.

humidum aliquod medicamentum sumere aduersentur (multi enim in totum non sustinent liquidum medicamentum sumere) in catapotia lapidem redigere oportet. Si vero libet, etiam picra aliquam insignem partem admisceto, aut etiam alijs quibusdam, quae purgationem magis promoueant, & non renitentur. Ne autem is, qui parare velit horum compositionem, inquirendo laboret, visum mihi est ea de causa etiam horum compositionem meminisse. Habet autem in huiusmodi Contusa excipiantur rhodomelo, aut succo citri, aut rhodomelite. Dentur scrupuli duo, plurimum quatuor. Nihil enim verò est, praeterquam quod ventriculum corroborant, simul etiam varios humores, praesertim terrestrem, & melancholicum, citra molestiam purgare posse: haec Alexander. Caterum Armenium lapidem deiectionis facultate pollens, & melancholicis morbis, nouit etiam Aetius: quippe qui li. 2. ca. 47. ex Nichessonis medici auctoritate, sic de eo scriptum reliquit. Armenium, quo pictores vtuntur, duodecima drachma parte melancholicis, & crassum sanguinem habentibus datur. Datur & pueris pectoris morbo infestatis: reuomunt enim, nam vomitorium existit. Datur & morbo sacro obnoxio, & facit hoc modo: Centaurij fasciculos manipulares tres in aqua marina heminis tribus coquito, donec vna supersit, & cum melato decocto, Armuthe lapidis, quem Graeci Armenium vocant, tertiam drachma partem terito, ac confidit exister nihil enim periculi est. Itaque nosse operapretium est, quod Armenium penitus reuomitur, nihil memorabile per se habens, sed & inferne modicum quid paulatim & in pluribus secessibus eijert: haec Aetius. Nouit praeterea, Armenium vires deiectionis inter recentiores Gracos Actuarius, vt videre est in suo de compositione medicamentorum libello. Verum alia in Armenio lapidi vires reddidit Galenus libro 9. simplicium medicamentorum, his verbis: Armeniacum vim habet exurgentem, cum leuicula acrimonia, & leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipse sese quoque ad pollinis leuorem redacto, vt imur sicco ad pilorum in palpebris incrementum: nempe vb. pra. humores acrimonia partim excidunt, partim verò nec crescunt, nec aluntur. Siquidem de passis his acrimonia, in bonum naturae, tum pars reducitur cuius cum alia sint munera, tum etiam producendi, incrementum praebendi, ac roborandi, quae in palpebris sunt pilis: quippe cum prima, & ex professo, quaedam sint medicamentorum opera: quaedam verò mediante natura, quae animantium corpora dispenfat, eduntur, velut quae in his ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim partes moeridas, & mediocriter deficiant, pilos corrumpentem humiditatem absumendo, quae ubi abolita est, tum natura ad proprias vires actiones, nimirum sublatis, quae haecenus ipsi impedimento fuerant. Haec Galenus. Caterum proculdubio aberrant, qui lapidem armenium, quem pulcherrimum fodiunt Germani in Comitatu Tyrolensi propè Sbozinum pagum, Melchioris putant, id quod experientia comprobatur. Siquidem lapis hic (vt ego pluries atque multoties expertus sum) nihil melancholicos morbos curat, vt Trallianus longa satis oratione testatur de Armenio lapide. Atqui huiusmodi vires praebet Melochitem, qui scribat habeo neminem. Albertus enim de eo verba faciens, valere tantum dicit ad nocentes, & non suspendi super infantium cunabula. Lapis, qui Graecis λίθος αρμενιος, Latinis Lapis Armenius cognominatur: Martialis Hager, seu Hagiar Armeni: Italus, Pietra Armenia.

Vires eiusdē
ex Actio.Vires eiusdē
Gal.Me'ochites
lapis.

Nomina.

Κυανός λίθος.

C O E R V L E V S L A P I S .

C A P . L X V I

Coerulei origo ex aetarijs metallis in Cypro: copiosior ex arena litorali secundum quosdam subcertos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis: laetatur vt cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Coerulei lapi
dis confid.

Coeruleum officinae Auicennae doctrinam secuta, Lapidem Azuli, vel Lazuli vocant. Probatissimus, qui similitudinem emittat. Lapis hic (ni fallor) cum Armenio non obscuram habet cognationem, quod non modò vtrique similitudinem proueniunt metallis, promiscueque oriuntur, sed quod etiam vtrique ferè viribus praediti sint ad atram bilem depurandam: quo factum est, vt Mauritanorum quidam alterum cum altero ineptissimè confuderint. Caterum quoniam in Azulo Auicenna, cui subscribit Mesues, coeruleum, siue (vt eorum nomine vtat) Azulum, septica ac putrefaciens esse factum non desunt è recentioribus, qui eum detestentur, quemadmodum & catapotia, quae ad atrabiliarios affectus ex lapide coeruleo passim in pharmacopoijs parantur: è quorum numero est Fuchsi: medicus nostra aetate celebris, in suis paratibus. Verum quamuis confusè satis de Coeruleo, & Armenio scriptitauerint Mauritanii, non tamen obstat, quin vtrique atram pellere queant. id quod priores veteresque Graeci, vel ignorauerunt, vel silentio disimulauerunt. Porro Galenus, etsi non cepit coeruleum atrabiliarios humores ducere, tamen scripsit deicientem habere facultatem. Quod cum fortasse perpendere Arabes, qui multorum medicamentorum, quae Graecis incognita fuisse videntur, diligentissimi fuerit indagatores, uenere tandem factò pluries periculo, coeruleum atram bilem perulianter deicere. Sed si (vt in praecedenti capite ostensum est, vsque ad Alexandri aetatem è veteribus nemo nouerit Armenium in detrahenda, citra noxam, atram bilem facultatem habere albo veratro parem, mirum quidem non fuerit, si etiam longo post tempore, id scripserint Arabes, vel quod ab eis fortasse acceperint, vel quod ex se ipsis id facultatis Armenio inesse adinuenerint. Praeterea cum Armenium, & Coeruleum non modo in vtriusque proueniens metallis (vt in pluribus Germania locis nos ipsi vidimus) sed simul promiscueque oriuntur, adeo vt Coerulei crustum, Armenij non modicum contineat, sicut è conuerso, rectè quidem existimari potest, pari fere facultate, vel non admodum dispari hosce lapides esse praeditos. Hinc itaque fit, vt mihi planè Mauritanii à Fuchsi, & aliorum calumnia vindicandi videantur. Quippe cum cernerent naturam hos lapides promiscue, indistinctèque progignere, quod mirum si ipsam imitati, eorum historiam & facultatem indifferenter tradiderunt? cum pro certo ex his existimandum sit, nil aliud esse Armenium, quam coerulei materiam, nondum à calore in terra visceribus ad summum perfecteque coctam, quemadmodum chalcitis, nisi, forte nil aliud esse creduntur, quam chalcantibi materia. Haec igitur cum accuratè perpendisset clarissimus Manardus Ferrariensis, vbi in simplicia medicamenta à Mesue conscripta diligentissimè adnotauit, eorum sententiam refellit, qui coerulei vsum, sua tantum ducti opinione, tam acriter vituperant, his verbis. Coeruleo Graeci nullam vim deiectionis adscribunt, sed videntur haec vires ab Armenio deriuatae. Arabes enim vtrunque confundunt. Scripsit quidem, & Auerroes sub Lazuli nomine de Armenio tractantes, Auicenna de Azulo scribens, ferè ei omnes vires acrimoniae, quas Graeci vtrique. De Armenio verò ea scribit, quae Graeci: solum addens, quod atram bilem magis purget, quam cyaneum. Quae omnia licet vera sint, non tamen ego his accesserim, qui non secus ac perniciosissimum venenum hunc formidant. Experientia enim certa scio, quod si bene abluatur, multum iuuat, & vel nihil, vel parum laedit: haec ille. In cuius certè sententiam vnusquisque Medicus facile deueniet, qui potius rationalis sit, quam perimax. Dato etiam disceptis Auicenna coeruleum

Mauritanorū
regula contra
Fuchsum.

Azulum Auicennae.

leui excedentis esse facultatis, hoc quidem non impedit, quin haustum atram bilem decere possit absque no-
 fuerit ablutum, quando quidem eius peracta septuag. facultas pluribus lotionibus ab eo facile soluitur. Prae-
 v, non quod aureus macula pellucet: namq, id, quo seplasia abundat. & quo in Germania pictores colore parant
 caritate imbecillius, tum ignobilius habetur. Memini me ad nonnullas tam aru, quam argenti foamas accepisse, in
 & Armenia in aceruos congesti plurimum vidi: attamen nullum mihi in his locis caruleum reperitum est,
 aureus fulgeret, cuius illi, eo quod non proueniat hoc nisi tantum in auri foditis. Idcirco caruleus ille color, qui vulgo
 dicitur Azurum, ab omnibus magno aestimatur pretio. Fit enim is ex caruleo lapide, qui tantum in auri rie-
 randa in orientalibus regionibus foditur omnium praestantissimus. De illo autem, qui ex arena in maris litoribus inuenta
 conficitur, quod plura dicam non habeo, quam scripserint Dioscorides, & Plinius. Carulei vires retulit Galenus lib. 9. sim-
 10 plurimum medicamentorum sic inquit: Cyanos medicamentum acris facultate est, tum detrahendi, quam xadaperi, ut
 vocant, tum digerendi: potentiore quam cinnabari. Inest quoque ei nonnulla adstringo. haec Galeni verba. Quae sane vel non
 legisse, vel non animaduertisse Manardus ex eo deprehenditur, quod caruleo Gracos nullam vim deiectionem trituisse scri-
 ptum reliquerit. Κωρύδιον hoc sic Graecè, Latine verò Caruleus lapis vocatur: Arabice, Liager alezard, Lazuard, seu A-
 20 zabossum, Lapi Lazuli. Italicè, Pietra cerulea: Germanicè, Esurfstein. Hispanicè Azul.

Indici
 Confid.

INDICVM. CAP. LXVII.

Indici duo genera: vnum iua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exi-
 ens. Alterum iniectione dant officinae: & est spuma purpurea innatas cortinis, quam detractam artifices
 siccant. Optimum existimatur, quod carulei speciem praebet. succum suum sorbet, & laue. Inter medica-
 10 menta est, quae leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresque rumpunt: purgat, & reprimit vlcera.

Indicus color, quo hodie pictores vtuntur, tamen si in seplasijs vbique venalis habeatur, fit tamen in insectorijis officinis ex
 glastrecremento. & spuma, cum lana glasto ipso inficiuntur. Quod autem sponte nascitur tanquam spuma germinatio-
 ne arundinibus exiens, quod sciam, ad nos non defertur. Plinius libro 35 c. 6. factitium indicum in purpurarijs officinis fieri
 ait, ex purpura spuma cortinis innatante. Qua in re Dioscoridu verba non recte accepisse videtur Plinius. Siquidem author
 non ex purpurarum spuma fieri Indicum scribit, sed ex purpurea spuma (talis enim est qua ex isatide prouenit) innatante
 cortinis in insectorijis officinis. Nulla namque, quod mihi compertum sit, ex purpurarum sanguine, quo regum vestes olim
 30 tangebantur, spuma proferebatur. Quod Graeci Indicos, Latini quoque Indicum vocant: Itali, Indico.

Indici
 Confid.
 Nomina.

OCHRA. CAP. LXVIII.

Ochram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natio-
 ne Atticam. Vritur haec, & lauatur cadmix modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tu-
 bercula dissipare. Excrecentia in carne reprimit, caua cum cerato explet, & articulorum tofos com-
 minuit.

Ochra fossilis, qua pictores vtuntur, cur legitima non sit, quid obiter non video: quanquam haec (quod sciam) ex Athe-
 nis laudatissima non adferatur, quemadmodum nec Vitruuij tempore, qui Ochra Attica vsum in Italia iam exoleuisse
 40 scribit. Est itaque Ochra terra, qua in plumbi fodinis aureo colore reperitur. Quamobrem qui rerum causas perscrutantur,
 arte etiam ochram ex plumbo ipso conficiunt, qua coloris nitore fossiliam superat. Praestantissimam ochram non longè à
 Tridento effossam, misit ad me hoc anno Martinus Guidottinus Tridentinus, seplasiarius harum rerum diligens inquisi-
 tor, qua nullam haecenus vidimus meliorem. Ochra in libris simplicium medicamentorum non reperio meminisse Gale-
 num: tamen si eius mentionem fecerit commento 2. in Hippocratu prognostica de vomitione agens, cum inquit: Ochra enim
 genus quoddam terra est, cuius potissimum Attica probatissima est. Qua ochra Graecè, Ochra item Latine & Italicè ap-
 60 pellatur.

Ochra
 Confid.
 Nomina.

CINNABARIS. CAP. LXIX.

Hallucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispanis ex lapide
 quodam argenteae arenae permixto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in
 florentissimum, flagrantissimumque colorem permutatur. In metallis verò strangulantiem halitum eru-
 dat: itaque facies incolae vesicis obuelant, vt per illas spectent, nec respirando noxium aerem attrahant.
 Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta vtuntur. Cinnabaris verò ex Africa defertur, & magno
 constat: haecenus inuenitur, vt vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciatur: intento colore, nec diluto
 praeditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris haematitiae lapil-
 lo eandem. Conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem
 cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepta medetur.

Cinnabaris, qua officinae, & pictores vtuntur, longè sanè differt (vt planè constat) à Dioscoridis Cinnabari: quando-
 quidem nostri vsus cinnabaris res factitia est ex sulphure & argento viuo diu arte quadam igne torrefacta. Est & a-
 60 lind cinnabaris genus fossilis, & sponte per se nascens, vt postea dicitur: verum non vt factitium copiosum, nec adeo colore
 praecellens. Quae autem a Dioscoride describitur, ex Africa defertur, eadem facultate pollens, qua hematites lapillus,
 quem non modo praetulit ipse foris appositum ad plures oculorum morbos: sed etiam intus assumptum, ad vrinae angustias,
 muliebrum locorum defluxiones, & cruenta: exspuitiones. Quibus vtrique affectibus vulgaris vsus cinnabaris nullo pacto
 competere potest, quod propria vi erodat, exulceret, & haustum perniciosam adferat, & proinde sit oculi & internis
 vitijs inimica. Caterum quidnam inter ea, quae hac aetate in vsu medicum veniunt, Dioscoridis cinnabaris
 esse possit, non equidem ausim decernere, sed potius quod sentio, adducor, vt coniecturis quibusdam assequar: quippe
 quod

Cinnabaris
 Confid.

Quod Dioscorides Cinnabarin nullis notis describeret, neque tradiderit an factitia res sit, aut fossilis, an ex plantis ma-
 teria proueniat. Sed anteaquam coniecturas eas asseram, quibus constare videtur Dioscoridis cinnabari seplafas reserua-
 non desituri, Plinij sententia cognoscenda est, qui lib. 33. cap. 7. affirmate scribit, nil aliud esse cinnabarin, quam tracon-
 Cinnabaris draconis lani-
 es Plinio. sanem, elisi elephantorum morientium pondere, permisto vtriusque animalis sanguine: quoddam nullus alius sit color, qui
 picturis proprie sanguinem reddat: & quod ea etiam antidotis medicamentis sit vtilissima. Id quod pariter affirmat
 Solinus in var. historiarum lectione. Ad hac scire conuenit, gummi cuiusdam arboris in Aphrica nascentis ad nos
 quod etiam hoc euo sanguinis draconis lacrymam officina vocant, colore sanguinis, pellucidum, leue, & fractu munitum
 Sanguis dra-
 conis duplex. tumax. Hoc nostrates officina vulgo vocant Sanguis di drago in lagrime, alterius differentia, qui pluribus inpositis
 in orbiculos coactus venditur. Priorem itaque non ab re lacrymam appellant, quod scribat Aloisius Mustus patris
 netus in suis in Aphricam nauigationibus, ex arbore quadam hoc gummi collachrymare, colore, & substantia sanguinis
 mili: inciso tamen ab incolis prius arboris cortice, vt fustus inde effluat. Hoc (vt idem subdit) aneis cacabis excipiunt, & in
 resina modo decoquunt, quousque consistat, draconis sanguinem, nescio qua ratione ducti, ipsum appellant: nisi id
 at, quod fortasse sua lingua plantam, a qua defluit, draconem appellant. Ex his itaque nobis iure coniectare licet, quod
 hoc Dioscoridi: facile cinnabarin esse, quod primum non aliunde, quam ex Aphrica deferatur, nec inde copiosum: quod
 pictoribus expetatur, vt intento eius colore, purpureas, rubent esq; concinnent umbras, vbi prius picturas rubro, vel p.
 infecerint: quod demum ob raritatem, etiam hoc tempore, quo frequentius in Aphricam nauigatur, non vili veniat
 quod demum (vt Dioscorides inquit) viribus hamatite lapillo per omnia respondeat. Nam, vt periculum facientibus
 dō p. tebit, adstringendi vi pollet, & maiore quidem quam hamatites: quo fit, vt felicius eo vtantur medici ad mulierum
 & dysentericas fluxiones, ad cruentas excretaiones, ad firmandos commotos dentes, & roborandas gingiuas. Huic
 quod si Dioscoridis atate non decrant, qui Cinnabarin esse draconis sanguinem existimarent, mirum sane non fuerit, si
 plures etates producta haec falsa opinio ad hac vsque tempora inualuit. At ipse, ne simplicium medicamentorum doctrinam
 sectantes hoc tenerentur errare, inanem eorum sententiam silentio inuoluendam non duxit, qui cinnabarin draconis
 sanguinem appellabant, cum inquit. Haecenus inuenitur cinnabaris, vt vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat, in-
 tento colore, nec diluto peditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Ex his igitur cum conuincam
 tum rationibus colligendum esse putauerim, hanc lacrymam, colore sanguinem pra se ferentem, legitimum esse Dioscoridis
 cinnabarin. Caterum videtur hac in re manifeste aberrasse Plinius, quandoquidem etsi asserat is cinnabarin nihil aliud
 quam draconis ferocissima bellua sanguinem, elisa elephantorum morientium pondere, cum tamen dixeris nullam
 reperiri colorem, qui in picturis magis ad viuum sanguinem reddat, quam cinnabaris, facile deprehenditur error. Quae
 necessarium sane fuerit, vt de hac lacryma omnino intellexerit, putaretque, falsus vulgari appellatione, lacrymam
 illum draconis sanguinem esse, ab elephante (vt referunt) collisi. Nam consentaneum minime videtur, vt huiusmodi
 sanguis extra vasa in terram diffusus, puluere & lapillis commixtus, situ & putredine obductus contabefactusque, non
 ac verum sanguinis colorem referre possit: quemadmodum nec ille sincerum sanguinis colorem praebet, quem imperiti
 arbitrio factitant, ex hircino sanguine, rubrica Sinopica, vel fabrili, contusis lateribus & sorbis diutius insolatis, iam
 posse colorem & substantiam imitantes, qui ex collisio simul draconibus, & elephantibus (si tamen vera narrant) emanare
 re solet, quique iam longo tempore ad nos aduehi desijt. Quo postea factum esse opinor, vt in eius defectu factitium
 fuerint impostores, & hanc fraudem excogitauerint: neque solum ea ratione, quam modò diximus, ipsum pati
 sed etiam modis alijs compluribus, resinas, rubra infectoria radices, brasili decoctum, tragacantha lacrymam, ru-
 bricas, & alia permulta immiscentes, quae ne longior sit sermo, quam series ipsa exposcat, silentio duximus inuoluenda.
 Obiectionis
 dilutio. Verum hic fortasse illud quispiam nobis obtrudet, quod cum hoc loco scribat Dioscorides de metallicis tantum, ac fossilis
 coloribus, tum medicamentis, consentaneum minime videatur, vt his inseruerit arborum lacrymas, quarum historiam
 facultates diffusius libro primo pertractauit: & ob id omnino credendum sit, cinnabarin fossile esse medicamentum. Haec
 enti ita responsum volumus, quod cum ea hoc loco recenseat Dioscorides, quae ob colorum nitorem, in pictorium verum
 sum, nempe cerussam, chrysocollam, Armenium, caeruleum, Indicum, ochram, & alia pleraque, non mirum, nec praeter-
 stitutum mihi sane videtur, quod his etiam cinnabarin adiunxerit, quanquam arboris fuerit lacryma. Videmus enim
 inter haec Indicum quoque à Dioscoride connumeratum esse, quod tamen nec fossile, nec metallicum est, sed in India
 instar, ex arundinum quarundam germinatione sponte prouenit: atq; etiam arte quadam fit ex isatide herba in infectoria
 officinis. Ex his itaque omnibus palam fieri arbitror, quod communis vsus cinnabaris, quam Dioscoridis Minium, quod
 fornacibus fiat, & florentissimo, flagrantissimoque colore spectetur, esse mihi semper persuasi, ab ea longè diuersa sit, de qua
 author noster hic mentionem facit. Est enim, vt supra dictum est, nostri vsus cinnabaris fossilis, & factitia: nota haec omni-
 bus, & frequens: illa vero rara, nec multis cognita. Fossilem (vt proxima commentatione latius dicetur) vidimus frequen-
 Cinnabaris
 fossilis. ter nos in argenti viui fodinis, Hydria monte, qui vna tantum die à Goritia distat, circa Carniola fines. Lapis est pur-
 reus ad rubedinem declinans, hamatita lapidi emulus, non admodum durus, impense tamen grauis, tantog, plerumque ar-
 gento viuo praegnant, vt per sese, nulla ignium vi guttatim exiliat. Factitia eodem loco plurimum etiam paratur ex argen-
 Cinnabaris
 factitia. to viuo, & sulphure, fictilibus quibusdam conclusis, & flagrantissimo igni admotis, donec ad saturitatem rubescant. Id
 quod fieri à natura crediderim in ea, quae fossilis fuerit, in terra visceribus. Nullus harum vsus in medicamentis, quae intra
 in corpus sumuntur, quod perniciose sint, & venenosa. Hinc forte factum est, vt existimauerit Fuchsius, in Nicolai Myr-
 Fuch. opinio
 reprobata. fici codice in Damisomy antidoto ab aliquo imperito additam esse cinnabarin. Sed in hoc alia planè à Fuchso opinio
 stra est, quippe quod putem Nicolaum eo in loco non de fossilis, vel factitia cinnabari intellexisse, sed de ea arboris lacry-
 ma, de qua scripsisse Dioscoridem, iam euidentissimum, ni fallor, à nobis factum est. Nam cum cinnabaris haec Dioscoridis
 testimonio, hamatite lapillo pares habeat vires, probaueritq; is hamatitem ad vrinae difficultatem, dubitandum sane non
 est, quin consultò antiquorum cinnabarin ea in antidoto addiderit Nicolaus, quam speciatim ad difficultatem, & stilla-
 dium vrinae commendat. Caterum quamuis communis vsus cinnabaris in medicamentis, quae sumuntur in corpus, omnino
 lethalis, & perimens sit, constat tamen is vtiliter admisceri posse, quae exterius adhibentur, nempe suffimentis, quae sunt ad
 delendam Gallicam luem, vbi caetera non profuerint remedia, vnguentis item nonnullis ad idem facientibus, & ad con-
 macia vlcera, alijsque medicamentis, quorum vires longum esset in praesentia recensere. Porro cum dicat Dioscorides bala-
 M. niam Dio-
 scoridis quid
 nobis. nari eos, qui cinnabarin minio eandem esse existimant, cumq; etiam scribat sequenti capite argentum viuum ex mi-
 nio fieri, quod abusiue cinnabaris dicitur, omnino mihi persuasum volui, nil aliud Dioscoridi esse minium, quam fossile
 hoc, quod diximus cinnabarin fossiliam hodie appellari, à quo argenti viui plurimum eliciunt in Hydriae fodinis. Aux-
 praterea opinionem ipse Dioscorides, quippe qui asserat Minium in metallis strangulantiem halitum eructare, ob idq; fossi-
 ra vef-

re. vbi uisus faciem obvelare, ut per illis spectent, ne, resurgendo noxium vaporem attrahant. Quandoquidem vbi cinnabarum
 in monte foditur, ut ego vidi. Et testantur artifices eam deoquentes, pedibus quibusdam ad id confla-
 re, & conuerso simul ore argilla circumlitus, ut inde argentum viuum eliciant, nates, & os lineis sibi obstruunt, ne noxius
 vapor, & pateat aditus, quod non modo huiusmodi halitus noxia, anhelio insunt, qui hauriunt, sed plerumque dentes vniuer-
 sis amittant, putrescentibus, & nunquam gingiuis, ut quidam apertissime testantur, qui spectro natum, & omni vela-
 mento, ut aetheri viderentur fortiores, edentuli protinus facti sunt continuo timore concupi. Accedit huic Virruuius de
 Minio. Virruuius de Minio.
 tunc, & contentiam nostram maxime tuctur. Ipse enim septimo volumine, in architectura sua de Minio disserit. Ingre-
 ditur rationes explicare. Id autem agrum Ephesium Cilbianis primum memoratur esse inuentum, cuius & res, & ratio sa-
 tis magnas habet admirationes. Foditur in gleba, qua ἀργύριον dicitur antequam tractationibus ad minium perueniat, ve-
 na vti ferro, magis subrufo colore, habens circa se rubrum puluerem. Cum id foditur, ex plagis ferramentorum crebras e-
 mittit, & in argenti viui, quae a se ortu, statim colligitur, haec Virruuius. Nos equidem hoc idem vidimus in Hy-
 dra monte fodimus: vbi plerumque euenit, ut vulnerata ferramentis vena, argentum viuum fonticuli instar, in substratum
 dequat, & inuenitur. Sunt quoque Minij quaedam pulcherrima fodinae plures in locis in Bohemia, vbi copiosum quoque foditur
 atque in Italia, longe admodum pulcherrima. Huius apud me sunt aliquot fuisse, ad ostentationem afferuata. Caterum Plinij gene-
 ra Minio. Minij genera Plinio.
 ra non in Italia, sed in Hispania, ut loco superius citato legitur, vbi iuncta eius genera retulit his verbis: Inueni-
 tur in argentatis, & metallo minium quoque, & nunc inter pigmenta magna auctoritatis. Theophrastus tradit inuentum
 minium a Carya Atheniensium, in quo sperant aurum posse excoqui arena rubente in metallo argenti: hanc fuisse originem
 eius, & peritiam atheniensi tum in Hispania, & in Italia, & arenosum. Item apud Colchos in rupe quadam inaccessa, ex qua
 exuantes deuterent, id est adulterum. Optimum vero supra Ephesium Cilbianis agrum. Arenam cocci colorem habere, hanc
 20 rem, deinde lauari tartarum, & quod subsidat iterum lauari, tuba minium nasci in Carmania tradit. Hermogenes & in Ae-
 thiopea, sed nec uno ex loco inuehitur ad nos, nec fere aliunde, quam ex Hispania. Sed adulteratur multis modis, unde prada
 societati. Namque est alterum genus in omnibus fere argentariis, itemque plumbariis metallis, quod fit ex vso lapide venis
 permixto, non ex illo, cuius vniuersam argentum viuum appellauimus, sed ex alijs simul repertis. Steriles etiam plumbi suo
 colore ne, nisi in fornacibus ruberentibus, exustis, tunduntur in farinam. Et hoc est secundarium minium, perquam paucis
 notum, nunc in naturalibus illis arenas. Sincero cocci color esse debet. Probatum auri modo. Auro candente fucatum
 nigrescit, & nigrum colorem retinet. Inuenio & calce adulterari. Ac simili ratione ferri candentis lamina, si non sit aurum,
 deprehendi illud. Haec de Minio Plinius. Minij igitur palam est antiquus minium & fossile, & factitium extitisse. Nec
 sane ducauerim, quin in factitij genere acciperent ipsi cinnabarum factitiam, qua passim in seplastiariorum officinis inue-
 nitur. Minium hodie appellant pharmacopoeiam, tum etiam pictores, quod veteres Graeci Sandycem vocauerunt, ex plumbo,
 30 aut cinabro in fornacibus perustis paratum, de quo etiam videtur intellexisse Plinius. Κιννάβαρις Graecus, ut Latinis etiam
 Cinnabaris appellatur: Οφιίνου, Sanguis drago in lacrima. Italis, Cinabro: Hispanus, Sangre de drago. Nomina.

Ἄργυρος

ARGENTVM VIVVM.

CAP. LXX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusuè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea con-
 cha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt, siquidem
 deterfa fuligo, quae calici inlidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fo-
 dinarum tectis stillatum concretum. Alij per se in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plum-
 beis, aut stagnis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum
 vniuersalem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & vo-
 mitibus reiectum, aut vinum cum ablinthio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origanum,
 40 aut hyssopum cum vino. Auri limata scobs, id est stramentum quam tenuissimum epotum mirabili est
 auxilio.

Argentum viuum omnibus notissimum, corpus est è fossilibus genere, liquidum, & aqua modo fluidum, colore argen-
 teo, lucente, pellucidum, & substantia vero lentatenui, in qua tam frigiditas, quam humiditas exuperat. Hac igitur Argenti viui confid.
 symmetria, ut chymistarum, qui se philosophos existimant, fert opinio, res est sanè admodum disposita ad metallorum o-
 mnium generationem, quamobrem ipsorum tum originem, tum semen argentum viuum appellauerunt. Quinetiam non ad-
 densari putant, quod ei non insit caliditas, & siccitas tanta, quae ad id muneris obeundum sufficiant. Addunt temporis de-
 fectum id etiam euenire: deo, immaturum, indigestum, imperfectumque reddi. Caterum relicta chymistis disceptandi materia,
 50 autem in metallorum quorumcumque prima fuerit materia, an aliter se res habeat, dicam, philosophorum tantum, qui de eo
 scripserunt, sententiam secutus, facile Argentum viuum esse materiam ad metallorum generationem proximam. Quippe cum facillimè
 omnibus se coniungat metallis, palam nimirum sit, usque gignendis aptissimam esse materiam, usque praesertim, quibus facilius
 contactu inheret: quandoquidem in habentibus symbolum (ut vulgata propositio est) & in consimilibus facilis est tran-
 situs. Hanc itaque ob causam eos non recte sentire putauerim, qui dicunt, quod si argentum viuum in terra visceribus vs-
 gades decoctum e set, ut in aliquod fixum, firmumque verteretur metallum, in plumbum potius aut stannum verti deberet,
 quam in argentum, vel in aurum. Siquidem certum est, quod id facilius plumbo, stannoque contactu inheret, quam cateris
 tametsi non negauerim, quinetiam in argentum & aurum, argentum viuum conuerti possit, cum etiam cum his facile
 commisceatur. Hic autem est chymistarum ludus, qui tempus conterunt, & oleum & operam perdunt, id arte reficere exi-
 stimantes, in quo natura ipsa defuit: quam ut liquido constat, nemo vnquam ita ad vnguem imitari potuit, quin ab eius
 60 mira solertia aberrauerit. Omnia metalla in argentum viuum coniecta, supernatant, ut lignum in aqua, praeter so-
 lum aurum, quod si inyciatur, statim petit fundum, quod hoc magis ponderet, quam cetera. Amplissima argenti viui me-
 talli, ut etiam in superiori capite diximus, visuntur in Hydra monte, qui quadraginta millia passuum a Goritia distat, vbi
 continuo copiosum eluitur e lapide quodam fragili potius, quam duro, colore ex nigro rufescente, & ad purpuram
 quae antenus vergente, ponderoso plumbi instar, & argento viuo scintillante. Hanc venam postquam effoderunt, conterunt
 & in fictilia quadam angustis orificij conijciunt, & recenti arborum musco obturant: deinde fictile alterum huic simile, latioris
 & in fictilia quadam angustis orificij conijciunt, & recenti arborum musco obturant: deinde fictile alterum huic simile, latioris
 tamen oris, in terram sepeliunt, & alterius pleni inuersione orificium, in illud inferunt, & argilla circumquaque muniant
 obturantque oscula, & vasa simul connectunt, & firman, adeo ut vacuum fictile totum sub terra sidat, plenum vero to-
 tum supereminet. Itaque in aperta area quam plurima seriatim collocant fictilia, & deinde ignem in ambitus succen-
 dunt, kkkk

Quorundam error.

dunt, cuius vi calefacta vena, argentum viuum guttatim distillat in substratum fictile. Hinc suo tempore eximunt, & in vitriculos quosdam reponunt, quod vasa ferè cuncta exedat ac dilaceret, præter vitrea, vel fictilia vitro circummissa. Quo fit, vt Dioscoridem mirari subeat, qui argentum viuum in argenteis, aut plumbeis, stagnæisue, aut vitreis tantum vasis seruari posse scribit, quod aliam materiam omnem erodat, nisi codex hic deprauatus sit. Siquidem id falsum deprehenditur: nam argentum viuum exest ac destruit omnia metalla, quibus inhaerit. Ex quo potius, cum hac a Serapione commendanda: id quod etiam varia in hoc loco Oribasij lectio confirmare videtur. Reperiuntur autem in argenti viui fodinis ipsius venam peculiarem quadam lapidis illius rufi zona, quem fossiores fossitiam cinnabarim vocant, de quo etiam in præcedenti capite diximus. Hic aded argento viuo sciatet, vt sæpius absque alio igne inde per sese guttatim destuat. Euenit præterea dan: fossiores mucronatis instrumentis, venam effodiunt, vt purum proficiat argentum viuum, decurratque celeriter veluti è fonticulo quodam. Porro rari admodum sunt fossiores, & huiusce materiae artifices, tametsi robustissimi fuerint temperamenti, qui eo in opere ad quartum vsque annum incolumes perdurare valeant: quippe ob noxium metalli haurientium partium omnium tremore concutiuntur. Ceterum Galenus lib 9. simplicium medicamentorum scribit, contra illud quod experimento comprobatur, Argentum viuum ex sponte nascentibus non esse, sed ex ijs, quæ præparantur, velut cerassa, ergo, psoricum, lith. argyros: fateturque se nullum huiusce medicamenti fecisse periculum, an interimat, si deuoretur, vel vis foris fuerit admotum. Fit ex argento viuo & sale, quod ammoniacum vocant, lethale illud medicamentum, quod officina chymistas secute, Argentum sublimatum appellant, vtrisque simul admistis, & in vas vitreum coniectis, ac inde in fornacem deductis, vt hac ignium vi, in vasis sublimis tollantur, vbi salis modo concreverint, lapidescuntq; sacchari colore sunt: iam qui tantum communi sale, & chalcantio additis, argentum viuum sublimatum conficiant, alij verò salitrum, & lumen, alij Arsenicū album addunt. Atqui quod passim in officinis habetur, ex argento viuo, sale & chalcantio conficitur. Euenit etiam ex argento viuo, & aqua, quam ex chalcantio alumine, & sale nitro conficiunt chymista, arte quædam, & ignium id quod recentiores quidam Præcipitatum vocant. Cui facultas inest sanè admirabilis ad contumacia vlcera sananda, præsertim, quæ à Gallica lue emerferunt. Sunt etiam qui dimidij scrupuli pondere deuorandum propinent, admistis moritis, alijsq; quibusdam, quæ cor tueri non ambigunt, vbi quis Gallicis doloribus circa articulos costatetur. Datur etiam melancholicis, Armenij lapidis modo, vt l. bello, quem de morbo Gallico scripsimus, abundè dictum est: namque eosdem prædictosfectus, vomitionibus expurgans. Sunt præterea qui purum syncerumque Argentum viuum hauriendum præterit modo adultis, sed pueris, & infantibus etate tenellis. Siquidem Brasauolus Ferrariensis, vir sanè hac etate clarissimus, de stirpium examine pro certo scribit, sæpius se dedisse Argentum viuum infantibus deuorandum, vi vermium semperis, qui illico sanati sunt: idq; fecisse vit in vltima desperatione. Sed quomodo, vel qua mensura, vel pondere dandum lentio inuoluit. At Goritienses obstetrices, vbi grauidæ diu in partu laborauerint, statim Argentum viuum scrupuli pondere nullis incommodis potandum exhibent. Quo fit, vt facile mihi persuaserim, Argentum viuum potantes haud necare, nisi pondus, vel mensuram excesserint. Non tamen crediderim, quod solum pondere interimat, vt quidam putant Dioscoridem tantum secuti, vt latius libro sexto discremus. Sed quoniam Argentum viuum nobis in mentem reuocauit AVRVMMnium metallorum pretiosissimum præstantissimumq; cum eius nunquam, quod extet, meminerit Dioscorides, credendum profectò non paucam naturæ rerum iniuriam a me illatam iri, si huius tam pretiosi metalli, cuius inextinguibili splendore, opinati sunt naturæ operum indagatores, admirabiles auro inesse facultates, quibus homines non modo incolumes eri possit, sed & longæuos reddere. Quapropter mirum non est, si ipsum tanti faciat mundus, & ante cetera extollant homines. Auri itaq; materiam niti aliud esse scribunt, quàm substantia elementaria sibi inuicem proportionem respondens: autem simul commista, cum pari sint virtute conformata, aliud sanè gignere nequeunt, quàm amabilem quandam, & optimam misionem, quæ fermentatione, & coctione perscitur: quo fit, vt inde tam indissolubili nexu vniantur, vt permanentes, & ferè indissolubiles fiant, adeo quod, siue id eueniat cælestium corporum influxu, aut temporis vi, aut sagacissimo naturæ opere, aut his omnibus vna concurrentibus, conuertantur eadem substantia in hoc metallicum corpus, quod vocant aurum. Hoc enim (vt diximus) ob sui tum ingentem temperiem, tum vnitatem, tum optimam misionem, aded denique nauadit, quod non modo quandam communem consequitur permansionem, sed incorruptibilem ferè temperiem, & causam quandam, ob quam superflui nihil continere possit. Hinc igitur est, quod, quanquam longioribus seculis aurum in terra, vel in aqua sepultum permeneat, nunquam rubiginem contrahit: sicut in igne diutius permansens, non modo aliqua ex parte non comburitur, sed & depuratus, & splendidus efficitur. Ad hac ob optimam sui vnitatem, nulla phlegmate, nulloq; pingui redindat, ita vt perpetuè fulgeat, splendidissimumq; perduret. Quinetiam tractantium manus nullo colore tingit, nempe croceæ, aut nigro, quemadmodum cetera faciunt metalla: neque etiam aliquo odore, aut sapore constantium, aut olfacientium tum nares, tum palatum inficit. Aurum intus in corpus sumptum, siue ex industria, siue in deuorantibus, nullam penitus infert noxam, vt complura faciunt metalla: sed mirum in modum cor, & vitalem facultatem roborat, quod solum influxui acceptum plerique sapietes retulerunt. Quamobrem iure quidem dici potest, aurum omnium metallorum præstantissimum esse, ductile, colore lucido illiq; persimili, quo cuncta à sole illustrantur. Insuper propria quadam attractrice vi pollet, quæ respicientium animos allicit, & disponit, vt ab ipsis illico desideretur: vnde quidam existimant auro proprias quàm plurimas inesse dotes. In Italia propria synceri auri fodina (quæ sciam) nullibi extant: Atqui in Germania, Pannonia, ac Transyluania ea pluribus in locis habentur. Auri venam ijs omnibus locis crediderim gigni, vbi ceterum id causa elementaris influat ac disponat, de quibus antea differuimus. Huius vena varijs lapidibus impacta visitur in æferimorum montium visceribus. Verùm ea omnium præstantissima auri vena censetur, cui cæruleus lapis subit admiscerantò enim melior hac, quantò ponderosior, & colore vigentior, aded vt illa ceteras præcellat, quæ pluribus auri guttibus scintillet, vel in qua plures auri lineæ intercurfantes conspiciantur. Est etiam auri ferax diuersorum fluminum arena. Siquidem proculdubio constat in Hispania Tagum, in Thracia Ebrum, in India Gangem & Pactolum, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum & Ticinum, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium præstantissimum elicitur, veruntamen non omnibus eorum litoribus aurea eadem sunt arena. Auri vires prodidit Auicenna secundo sui operis volumine, sic inquit: Aurum in omnibus suis partibus æquale est. Insuper propriam quæ atrabiliarijs competunt morbus. Ad hac vbi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum ceteris præstat metalla, quod vlcus inde exortum citius consanescat. In ore contentum, anhelitus graueolentiam tollit. Auri scolis porphyrite lapide lauigata in ea medicamenta additur, quæ ad alopecias, & lichenas parantur, tam intus in corpus sumpta, quam extra medicamentis excepta. Hac item eodem modo diutius lauigata, aded vt tactum ferè effugiat, oculis in-

mittitur ad roborandam eorum aciem. Bibitur autem & ad cordis affectus, & animi maiores. Argentum viuum quod Lat. Nomina.
 ἄργυρος: Graecis nominatur, Mauritanis, Zaibar, seu Zaibach: Italis, Argento viuo: Germanis, Quecksilber: Hi-
 spanis, Azogue. Aurum verò Latinis, χρυσός: Graecè dicitur. Germanicè, Goldt: Italicè & Hispanice Oro.

Μίλτος σινωπική. R V B R I C A S I N O P I C A. C A P. L X X I.

Rubrica Sinopis maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem vergens, calculorum expers, concolor, cum diluitur, impendiò fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataque deferitur in Sinopem urbem, in qua venditur: vnde cognomentum accepit. Vim habet exicatoriam, quam inducendo obstruentem, & adstrictoriam: quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aluum sistit, in ovo sumpta aut clystere infusa: datur iecinoris vitio laborantibus.

Hodie profectò neminem inuenio, qui doceat, & explicet, qua nobis legitima sit Rubrica Sinopica. Sed quantum ego conuicere potui, etsi id pro certo asserere non ausim, nullum e fossilium genere occurrit, quod magis Sinopicam rubricam veris reperiatis, quàm vulgarij. unus bolus Armenius vocatus, is nimirum, qui in quadratas deferitur massas, quibus maxime vulnerarijs medicis expetit ad sanguinis profluuum cohibendum, & fracta ossa ferruminanda. Hac rubrica (vt Celsus Agricola maximus so, illum indagator inquit) etsi iam dudum ex Sinope Cappadociae vrbe, vnde nomen inuenit, tantum importabatur, conuicet tamen alibi etiam reperiri, non modo in proprijs venis, sed in aurarijs, argentarijs, ararijs, & parrarijs, que met. alid. Hian. omnino mihi opinionem illud auxit, quod certo sciam plurimum pseudoboli Armenij ex ferrarijs, & Lythentini iugulae fodinis ad nos quotidie conuehi: quòd deinde colore sit iecinoris, pondere grauis, substantia densus: quòd etiam in aqua coniectus facile dissiliat, quòd denique sua vi exiccet, adstringat, & cogat. Hac enim gleba, cum verus bolus Armenius non sit, nil aliud, meo iudicio, esse poterit, quam rubrica Sinopica, quanquam à Sinope non deferatur. Ceterum non desunt qui, in miser a, serere audeant Armenium bolum, quem vulgò orientalem appellamus. Sinopicam esse rubricam, sed y proculdubio hallucinantur. Plura enim sunt, quae palam faciunt, hos manifestò decipi, & in errore versari. Si quidem ubi primum color expendatur, is sane iecinoris non est, sed longe rubiundior. Praeterea qui scribant Sinopicam rubricam esse pinguem, & in ore detentam butyri instar liquefcere, habeo profectò neminem. Deinde si vires expendamus, ea, quam reperio scripsisse Dioscoridem, aut Galenum, Sinopicam rubricam, viribus esse praeclatam, quibus venenis & animalium venenosorum moribus occurrere possit, quemadmodum Armenius bolus orientalis. Siquidem is omnium probat isidororum medicorum consensu, qui paucim eo vtuntur, non solum venenis aduersatur, sed pestiferis quibuscunque morbis. Adde quòd aqua maceratum haud facile dissoluatur. Sed plura de hu (Deo volente) in secundo epistolarum nostrarum tomo dicemus. Species Sinopidis, vt Plinius est author libro 35. cap. 6. tres, rubra, & minus rubens, & inter has media. Quae sane differentia videntur pariter in vulgari Armenico bolo. Porro Manardus Ferrariensis libro tertio epistola quarta, Sinopica rubrica meminit, quae albo sit colore. Sed in hoc virum alioqui celebrem, mirari subit, quòd non animaduertit non posse aliam quamuis terrae glebam Rubricam appellari. Rubrica quae Graecis μίλτος σινωπική, Latinis pariter ac Italis Rubrica Sinopica vocatur: Arabibus, Mogar, sine Magra: Hispanis, Almagra.

Rubricæ Sinopicae confid.

Armenius bolus non est Sinopica rubrica.

Manardi lapsus albam dicentis rubricam. Nomina.

Μίλτος τεκτονική. R V B R I C A F A B R I L I S. C A P. L X X I I.

Rubrica fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Cignitur etiam in Iberia, quae ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Rubricam hanc ideo fabrilis appellauere veteres, quòd ea plerunque vterentur materiarij fabri ad lineas protrahendas infectis in ea funiculis. Nasu fabrilis rubricam in Lemno memoria prodidit Galenus, cum libro nono simplicium medicamentorum, tum etiam primo de antidotis, sed à Lemnia sphragide plurimum differre. Verum an communis vsus rubrica, quae vulgò Italis proprie dicitur Terra rossa, ea sit fabrilis rubrica, de qua hic meminit Dioscorides, cur pro certo affirmem non habeo. Quae Graecè μίλτος τεκτονική, Rubrica fabrilis Latine dicitur: Arabibus, qui nullam faciunt differentiam inter hanc & Sinopicam, Mogar & Magra: Italis, Rubrica fabrilis: Germanis, Rötestein.

Rubricæ fabrilis confid.

Nomina.

Λημνία γῆ. L E M N I A T E R R A. C A P. L X X I I I.

Lemnia terra cuniculosa in specu nata, è Lemno insula, palustri loco deferitur, inibi electa & caprino sanguini permista, quam incolae cogunt in pastillos, & imagine caprae signant: vnde & sphragida aegios, hoc est, sigillum caprae appellauere. Vim antidoti habet contra perniciola venena singularem: pota cum vino, & praesumpta euomi venena cogit. Contra ictus morsusque animalium, quae exitiale virus eiaculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hanc ad sacrificia vtantur: est & dysenteriae utilis.

Lemniae terrae amplam in Italiam notitiam suo tempore attulit Galenus medicamentorum omnium diligentissimus inquisitor: quippe qui, vt hac sincerissima tandem potiretur, atque vt omnem impostorum fraudem detegeret, qui eam adulteratam vendebant, in Lemnum insulam nauigauit, vt eius verba testantur libro 9. simplicium medicamentorum, ubi ita scriptum reliquit: At alia sunt terrae differentiae ex diuersi generis corporum nata commistione, qua ratione lapidosa, & arenosa habentur: atque admistam talium substantiam segregant largae aquae effusione ac maceratione, dum humidum efficitur. Cum enim id effectum est, id quòd deferitur, atque inest lapidosum, atque arenosum, id omne subsidit, & terra exalta supernat. Tale quiddam & in Lemnia terra visitur, quam cognominant quidam milton Lemniam, id est, rubricam Lemniam, & alij quidam sphragida Lemniam, hoc est, sigillum Lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum Dianae sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodam honore sumens, haud maceratis animalibus, sed tritico, atque hordeo piameneti gratia loco redditis, in urbem comportat, quam deinde aqua maceratam, atque in lutum humidum red-

Lemniae terrae histor. ex Galeno.

kkkk a

Lemniæ ter-
re tres diffe-
rentiæ.

Lemniæ ter-
re vires.

Lemniæ terra
cenferur Bo-
las Armenus.

Etiam, ubi valenter conturbanit, paulumq; inde quiescere fuit, primum aquam, quæ supernat at aufert, & mox quæ sub ea
est lutum tollit, ac reliquum duntaxat, quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet, & arenosum relinquit, ut matæ, &
superuacaneum. Porro lutum illud pingue vsque eò desiccatur, dum mollis cera consistentiam accipiat: huiusq; exigua accepta
particulis, sacrum Diana signum imprimit. Ac postea rursus in umbra siccandum reponit, donec omnem plane humidita-
tem amittat, fiatq; illud medicis omnibus cognitum medicamen Lemniæ sphragidis, siue sigillum. Sic enim quidam rem
gnominant, ut dixi, ob impressam sphragida, hoc est, sigillum, ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniæ multo fæci-
cam appellant: eundem enim, quem rubrica, colorem habet. Verum ab ea differt, quod contactu non contaminet, atque
la: & secundum collem in Lemno, qui totus colore fuluo est, & in quo neque arbor, neque saxum, neque planta nascitur.
tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres eius signantur differentiæ: vna quam posuimus terra sacra, quam alij non
præter vnam sacerdotem contingere fas est: altera verò eius, quæ reuera multo est, siue rubrica, vtuntur autem ea potius
mum fabri: demum tertia eius, quæ extergit, qua vtuntur, qui lintea, & vestes lauant, quibus vtiq; collibitum est. Cæ-
rum cum & apud Dioscoridem, & alios quosdam scriptum legissem, Lemniæ terra hircinum misceri sanguinem, atque ex
luto, quod ea mistione conficiebatur, sacerdotem quas vocant Lemniæ sphragidas tum conformare, tum consignare, cupi-
bam profecto & ipse mistionis modum inspicere, atque symmetriam. Itaque quemadmodum in Cyprium nauigaueram
dendorum, qua in ea sunt, met allorum gratia, & in eam Syriam Palaestina partem profectus fueram, bitumini & ceræ
rum quorundam inspicientium causa, ita nec in Lemnum enauigare piguit, vt quantum sanguinis terra admiscerem
conspicerem. Nam cum iterum ex Asia Romam pedestri veterem itinere, per Thraciam, & Macedoniam, præter Troam
Alexandria in Lemnum id nauigauim, nactus illic nauem, quæ ad Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem
cum nauclero, vt in cursu Lemno appelleret; & sane ille præstitit, sed non ad eam ciuitatem, ad quam oportebat. Antea
nim nescieram duas esse in insula ciuitates, sed credebam, vt Samus, Chius, Cos, Andrus, Tenus, & crines adeo, quæ in
sunt mari, vnam duntaxat ciuitatem habent, toti insule cognominem, ita & Lemnum vnam nominis sui habere ciui-
tatem. Porro vt ex nauis descenderem, intellexi ciuitati nomē esse Myrina, nec in regione ciuitatis illius aut Philoctetis tempore
aut sacræ Neptuni collis, sed in altera, quæ vocatur Hephæstias, nec ciuitatem eam Myrina esse propinquam. Cuius me nauis
expectare non posset, distuli, vt cum Roma in Asia redire, tunc Hephæstias viserem: id & feci, prout speraueram, & præparauim.
Nam ubi ex Italia in Macedonia trauissem, eamq; penè totam pedestri itinere pertransissem, peruenissemq; Philoppos, quo
uitas est finitima Thracia, inde ad mare descendi, quod proximū aberat centum viginti stadiis: primūq; Thason transi-
stantem plus minus ducentis stadiis, atque illinc in Lemnum septingentis, ac rursus ferè septingentis in Alexandria
Troada traieci. Ac proinde sanè ex industria tum de nauigatione, tum de stadiis adscripsi, vt si quem eadem, quæ me cepit
Hephæstias visendi cupiditas, cognito eius situ, sic nauigationem institueret. In tota namque insula Lemno ortum præ-
bet Hephæstias, occidentem verò Myrina. Et quod à poeta dictum de Vulcano est, qui Græcè dicitur Hephæstus, Deo
Lemnum, propter collis naturam occasionem sumpsisse fabula crediderim. Apparet enim combusto similis, tum colore
pso, tum etiam quia in eo nihil nascitur. In hunc itaque collem sacerdos, quo tempore ego ad insulam accesseram, certa
certo quodam tritici, hordeiq; numero in terram coniecto, alijsq; quibusdam pro religione patria perpetratis, plaustrum
tum terra impleuit. Atque ubi in urbem conuenisset, quo dixi modo, illas fama hominum adeo celebratas Lemniæ sphragi-
das præparabat. Visum ergo mihi erat percontari, nunquid vnquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem hircinum
misceri solitum, memoria proditum accepisset. Quo audito, omnes in risum soluti sunt, nec is sanè quibus ex vulgo, solus
oppidò quàm eruditi, cum in alijs, tum præcipue in vniuersa patria historia. Quin & à quodam librò accepi ab incolam
piâ descriptum, qui omnem Lemniæ terræ usum edocebat. Quamobrè nec me quoq; piguit huius medicamenti periculum
cere, acceptis sphragidum viginti millibus. Sed & is, à quo librum dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc vni-
tur medicamine: siquidem ad vulnera tum vetera, tum cicatrici inducenda contumacia: ad hæc ad morsus viperæ, atque
omnes ferarum morsus, necnon aduersus medicamenta lethalia, non antè modò exhibere, sed & post sphragide vti
uerat. Addebat porro sese periculum fecisse medicamenti, quod quia fructum iuniperi accepi, & sic præuidi: ut nauis
tur, cui vtiq; indebatur & terra Lemniæ: vomitumq; ciere aiebat, siquis cum etiamnum in ventre lethale venenum be-
reret, alexiterium siue amuletum ebibisset. Et sanè nos quoque huius fecimus periculum in lepore marino, & cantharidibus,
bus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur: verum hausto, quod Lemniæ sphragida habebat medicamentum
protinus omne euomuerunt, nec postea vllum illis accidit symptoma eorum, quæ leporem, & cantharides comitari
sueuerunt: tamen si conuicta esset perniciosorum medicaminum exhibitio. Caterùm an ad alia mortifera medicamenta
hac inquam, quæ vocant deleteria, eandem vim habeat medicamentum, quod ex fructu iuniperi, & terra Lemniæ confici-
tur, mihi vtiq; ignotum est. At ille ab Hephæstias profecto assererat, adeo vt & rabientis canis morsum eam sanare diceret
in vino diluto epotari: at vlceri ex aceto impense acri impositam. Sed & aliarum ferarum ictus, ex aceto sanate refer-
bat, extrinsecus folijs herbarum insuper impositis, quæ putredini resistere didicimus. In primis verò prædicabat scordium
deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando nos sanè ad vlcera tæcoethe, & putrida terram Lemniæ ab-
hibuimus, magnificè profuit. Vfus autem est, pro prauitatis vlceris magnitudine. Quippe id, quod grauitè olet, impenditq;
laxum, molleque est, ac sordidum, sustinet vt vel per acerrimum acetum Lemniæ terra in lutosam soluatur consistentiam
aliorum more pastillorum, quarum alius alio vtiq; dicitur: dico autem Polyida, & Prasionis, & Andronis, & qui nunc dicitur
quæ Betinū vocant. Si quidem hi omnes valenter desiccantes profunt vlceribus contumacibus, soluti interim quidè in vino diluto
interim sapa, interim anomelitate, nonnunquam etiam alborum vinorum quopiam, aut fuluorum, aut flauorum, prout nimirum
postulat. Nā de talibus alibi definitur: similiter verò quandoq; soluuntur aut ex aceto, aut vino, aut aqua, aut oxymelice,
aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemniæ terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit idoneum tum
centibus glutinandis vulneribus, tum medendis inueteratis, agre ad cicatricem venientibus, & contumacibus. Hactenus de
Lemniæ terra Galenus. Ex cuius quidem verbis facile conijci potest, Lemniæ terram, quam ad nos hoc tempore contumaciter
mercatores Turcici characteribus obsignatam, illegitimam esse, & minimè sinceram. Quandoquidem constat Galen-
stimonio, Lemniæ sphragidem impense rufescere, non autem subrufescere vel potius subalbescere, qualis hæc visitur, quam
passim pro legitima, sinceraque circumferunt impostores. Quamobrè eorum sententiam non omnino improbandam
censemus, qui nil aliud esse Lemniæ terram putant, quam bolum Armenium, qui officinis septasiorum Orientalis cogno-
minatur: præsertim quòd compererim (si vera fatentur negociatores, qui mecum locuti sunt) bolum hunc non adu-
Armenia, ubi legitimum sincerissimumque Armenium lutum nascitur, sed etiam ex insula Lemno. Siquidem Armenium
lutum, quod bolum quidam vocant, præterquam quòd ex Armenia adferri debeat, si Galeno medicorum principum credimus,
colore est pallido ochrea instar, non autem impense rubro. Id quod ipse Galenus libro nono simplicium medicamentorum
in Se-

in Samia terra mentione testatur, his verbis: Caterum durante hac immani, & graui pestilentia, ex Armenia ea, qua Cap-
 padoia dicitur, data nobis est terra, etiam siccantior colore pallido. Lapidem, qui donatur, non terram appellabat:
 promptissime, in leuorem soluitur, seu etiam calx: sic enim videtur, et nuncupo petram combustam. Verum uti nec in illa
 arena um quippiam admixtum est, ita nec in Armenia. Nam postea, quam in mortario pistillo comminuta est, adeo est le-
 uis, nec plus est lapidea, quam aut calx, aut Sanuus aster: tamen non aequè ut aster leuis est. Itaque illo etiam magis con-
 spicienda est, minusq; aëria: quamobrem opinionem, ac phantasiam praebet his, qui negligentius intuentur, quasi lapis esset:
 haec Galenus. Ex quibus sane perspicuum sit, quòd Armenia terra, siue lapis, vel lutum, ab Armenio bolo orientali vulgò vo-
 cato, quam maxime distinet. Caterum ad Lemniam terram redeuntes, quantum ex literis Doctoris Stephani Albaca-
 rii, qui Lemnum Insulam ferè totam circumiuit, a clarissimo viro Angerio de Busbecke Constantinopoli mihi trans-
 missis, intelligere possum, locus, ubi nunc terra Lemnia inuenitur, nihil propriè similitudinis pra se ferre videtur, quod cum
 Galeni historia conueniat. Siquidem Albacarius, ad Angerium, qui cum in Lemnum hac tantum de causa ablegauit, ita
 de terra Lemnia scribit. Qui Insulam hanc incolunt Graeci dicunt nullibi in vniuersa Insula Lemniana reperiri terram, ni-
 si hoc in colle, ubi nunc effoditur, nec vnquam se intulisse aiunt superioribus seculis alibi fuisse reperiendam, neminemque
 habere sua gentis scriptorem, qui aliter de ea posteritati memoria commendauerit. Verum non ob id facile credam, ex hoc
 loco, Galeni auctore, terram hanc effodi solitam. Quippe quod collis descriptio, in quo terra hac habebatur, apud Galenum huic
 minimè correspondeat. Siquidem Galeno collis est combusto similis, fuluus totus, & in quo neque arbor, neque saxum, neq;
 planta nascitur, sed tantam Lemnia terra refertus est. Atqui contrario fere modo collis se habet, in quo eiusmodi terra nunc
 foditur. Nam q; praesertim locus, ubi huiusce terra fodina habentur, lapides adeo magni reperiuntur, ut ex ijs pistinaria
 mole parari soleant. Collis praeterea nusquam combusto similis apparet, nec vllum fului coloris in eo vestigium videtur. Fer-
 tilisq; totus, & arborum, plantarum, & frumentorum ferax. Cum enim ab incolis diligenter colatur, copiosum tritici
 & leguminum, praesertim fascolorum, proventum affert. Idem orientalem plagam respicit, & apud vicum quendam si-
 tum est, quem Repondi vocant. Terra autem Lemnia foditur in montis cacumine, quod in planitiem se extendit. Fodina ibi
 sunt tres, quarum duae, è quibus superioribus temporibus Lemnia terra effossa est, corruerunt, & in totum deleta sunt. Tertia
 autem, pax putei modo in collem descendit ad septentrionem vergit. Ad eiusdem collis radices, tres limpidissimae aquae sca-
 turiant fontes, quorum duo, qui minores sunt, ad Septentrionalem plagam excurrunt. Tertius vero, qui amplior est, ad
 meridiam progrediens, viridarium quoddam irrigat. Hac in parte antiquum paruumque extat sacellum, pluribus in locis
 ditatum, ac vniue detectum (Sotiram hoc vocant) quo Metropolitanus sacerdos vna cum duobus Caloiris (ita praesbyteros
 vocant) accedit eadem die, quo terra effoditur, & ibi Iesu Christi Saluatoris nostri transfigurationem in monte Tabor cele-
 brant, suas canentes psalmodias. Verum id non faciunt aliquam ob superstitionem, qua seruari debet, anteaquam Lem-
 nia terra fodatur, sed quòd ea die transfiguratio Iesu Christi celebretur. Ad hac quae ibi foditur terra, maiori ex parte can-
 dicat, aut paulisper subrubet, etsi quandoque (rarissimè tamen) etiam rubro, aurcoque colore inueniatur, Armenio bolo
 per omnia similia, cum tamen Galeno in vniuersum Lemnia terra adeo saturate rubescat, ut à rubrica nihil colore differat:
 quae quidem rubrica, qua vtuntur fabri ad lineas ducendas, in nonnullis Insulae locis etiam hoc tempore è fodinis eximitur.
 Sed hac Lemnia terra Galeni esse non potest, cum tangentes rubro colore insiciat. Hac itaque me adducunt ad credendum,
 quòd aut ex alio colle Galeni tempore desumpta sit, qui tam longo temporis tractu, aut terra motu, aut pluiiarum inunda-
 tione corruerit, ut in alijs quoque locis factum esse scimus, aut, quòd idem collis, cultorum diligentia, ac laboribus faciem, &
 naturam omnino immutauerit. Nam inter caeteras syluestres plantas Chamaleonis albi plurimum profert. Effoditur
 terra hoc auctore quotannus non absque quadam superstitionis nota, cum sextat. intum Augusti die ad hoc obeundum mu-
 nus accedant, sibi, etò persuadentes, nullo alio tempore reperiri posse, quae viribus praestet. Qui fodiunt, Graeci sunt, sed a-
 siantibus Turci, nempe Insula Praefecto, quem Vaiuodam vocant, & alijs ex primatibus, qui Imperatoria munia obeunt.
 Verum non vsque adeo fossores, qui in puteum descendunt, obseruare possunt, quin h effossa terra aliquid non abscondant.
 Sed mirum est, quam suauem odorem puteus ille spiret. Caterum non omnis, quae in puteo habetur, terra bona est. Quo fit,
 ut eam quae inter fragiles quosdam lapides pinguis, lentaque delitescit, tantum recipiant, eamque praesertim, quae calculo-
 rum sit expertis. Fodiunt a solis exortu sex continuis horis, & deinde eam tantum in imam putei partem occludunt, quam
 diuiniatim fodere solent, nec reserant, nisi ad statutam futuri anni diem. Namque legibus cautum est, capitis poena, ne quis
 illic clam, vel palam fodendi causa accedere audeat. Verum non multum eiusdem terra effodiunt, cum fodina ambitus non
 nisi paucos fossores admittere possit. Id deinde selectissima terra, quod exemerunt, diligenter eluir quidam, huic muneri ob-
 eualo designatus. Ea elota in suspensos aliquot transfertur saccos, ibique tam diu manet, quousque tota effluat aqua. Ex-
 emptam deinde in ambibus miscent, eamque tandem in maiores, minoresque globulos fingentes, imperatorio sigillo obsignant.
 Denum sicari sinunt, & totam Constantinopolim in scrinio, eodem sigillo occluso ad magnum Turcarum Imperatorem
 mittunt. Terra haec in Lemno nusquam venalis reperitur, quòd in nullius arbitrio relinquatur. Nam etsi permittatur, ut
 Insula praefectus, & alij quidam primates nonnihil obsignata terra sibi accipere possint, nemini tamen vendere audent,
 sed tantum amicus donant. Hoc idem facit, qui terram lauat, cui ex lege sacculus donatur, sed hac principis sigillo non in-
 signitur. Hac ille, quae optimis materiae medicae studiosis, considerata relinquo. Sed animaduertendum est, quòd non de-
 sunt impostores, qui terram hanc adulterent, & pro legitima vendant. Ego ex officina Rustani Bassani aliquot sphaeragidum
 globulos acceptos mihi pro thesauro afferuo, quorum aliqui albi sunt, aliqui rubent, & nonnulli humanae carnis colorem
 referunt. Nec ob coloris diuersitatem fraudem aliquam vereor, cum ipse Albacarius fateatur, reperiri terram hanc ijs o-
 mnibus coloribus infectam. Verum quandoquidem in ARMENIAE terra sermonem deuenimus, non alienum fuerit, eius
 etiam vires referre ex Galeno, qui eus loco nuper citato in simplicium medicamentorum censu subdidit, sic inquit: Armeniae ter-
 ra seu boli vi-
 res ex Gal.

Nova Lemniae
 terrae histo. à
 Galeno dis-
 sentiens.

Terra Lem-
 niae lotio.

Armeniae ter-
 ra seu boli vi-
 res ex Gal.

apparuit. Hos ergo, vt dixi, bolus Armenia euidenter adiuuit. Quin & eos qui Roma agunt, qui assidue difficultate mor-
 di discruciantur, magis etiam. Porro in magna hac peste, cuius eadem facies fuit atque eius, que Thuyarum membra
 sabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, succet enim hoc
 quous iuuaretur. Vnde colligitur, quod is duntaxat non fuerit auxilio qui plane erant incurabiles. Caterum bitum ex
 no consistentia tenui, modice diluto, si aut plane febris careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febrat, admodum aquo-
 Non tamen calore vehemētes sunt febres pestilentiales. Porro de vlceribus resicari pestulantibus quid attinet dicere. quā-
 tam vim habeat bolus hac Armeniaca? Liberum est autem vtcunque appellare velu, siue lapidem, vt in qui nini carac-
 sue terram, vt ego, quandoquidem humidis rigari patitur. Haftenus de Armenia bolo Galenus. Sed quoniam Lemnia pro-
 gis, & Armenia terra, quod venenis maximē resistant, mihi in mentem redegerunt lapidem, quem Arabes suo idiomate
 Bezahar vocant, & contra deleteria medicamenta miris admodum laudibus celebrant, hic locus opportunus nobis videri
 in quo de huius lapidis historia, ac viribus aliquid differamus. Lapis itaque BEZAHAR, Mauritanorū testimo-
 dotum est omnium praestantissimū, sua speciali dote, contra omnia in vniuersum venena: vtpote qui nō modo haustum, in
 etiam adalligatus, ita vt nudam sinistri lateris carnem contingat, omnia superet venena. Lapis hic plerumque est generum
 nempe flauus, puluerulentus, qui ex albo virescat. Praestantissimus est flauus, deinde puluerulentus. Verum enunciatō
 ligenter inspicere oportet, ne impostorum fallacys decipiantur, qui hos lapides inquirunt. Sunt enim nonnulli a lapide
 qui hos facie representant, sed viribus nullis praediti. Hunc Rasus experimento ductus, miris extulit praconys, ita de ei-
 bens: Lapis Bezahar est mollis, colore flauo, sapore nullo. Cuius peculiaris vis est, vt venenis omnibus aduersetur, quā-
 quidem ego contra haustum napellum hoc lapide vsus sum felici admodum successu. Erat autem hic colore flauo artu-
 te, leuis & luminis modo splendens. Equidem certō restari possum (hoc enim pluribus experimentis competum
 lapidem hunc longē magis praestare aduersus deleteria venena, quā cetera non modo simplicia huiusce facitatis me-
 camenta, sed etiam theriaca dicta, & alia quaeuis antidota. Subdit praeterea Abdalanarach. Lapidem, quem venenis
 zahar, iam ipsi vidimus apud filios Almirama custodis legis Dei: pro quo lapide is magnificam, ac prope regiam edera-
 duba rependit, initio belli. Lapis hic (vt diximus) ita viribus contra venena omnia pollet, vt non solum haustum dusa-
 granorum pondere, sed vulnere impeditus a mortiferis quibuscunque feris ictos, statim liberet: veneno sudore expul-
 pariter iuuamenti adfert, si ore aliquo tempore sugatur. Verum lapis hic inuentu difficilis fuerit, quod non desit pau-
 notis lapilli, qui tamen nullam vim habent aduersus venena. Sunt etiam, qui memoria prodiderint, in ceterorum nau-
 rum angulis lapidem gigni, viribus Bezahar praedito haud absimilem. Aiunt enim in orientali plaga certe in-
 senio confectos serpentes deuorare, quorum esu (si vera scribunt) reuiuescunt. At veneni superandi causa, in
 deuoratis, in fluuiorum aquis ceruos illos mergi tradunt, capite tantum extra aquas exerto. Iis autem sic permixto
 humorē quendam lentum ab eorum oculis defluere, qui tandem solis ardoribus in lapillos inibi concrefcit, glanda nar-
 nem referentes. Hic itaque lapis ipsis è fluminibus egredientibus, ab eorum oculis (vt aiunt) statim decidit in humum
 ab ijs facile reperitur, qui rem omni diligentia obseruarunt. Sed an hac historia vel fabula dici mereatur, veritas
 raliū studiosis, & peritioribus iudicandum relinquimus. Caterum de admirandis Bezahardi lapidis aduersus
 venena viribus, & speciatim contra Napelli immanitatem, superius in quarto libro de ipso Napelli differentes fu-
 ximus, & quae vidimus retulimus. Terra Graecis λημνία γῆ, seu λημνία μίλτος, & σφραγίς; Latine terra Lemnia, ne-
 rica, & Lemnium sigillum nominatur. Arabibus, Terimachrim seu Thimmachtum: Italis, Terra Lemnia: Hispanis
 terra sellada.

Lapidis Beza-
 har histor. &
 vires.

Lapis in o-
 culis ceruorū
 natus.

Nomina.

Χάλκανθον.

ATRAMENTVM SUTORIVM.

CAP. LXXIV.

Atramentum sutorium genere quidem vnum & idem est, molle, & concretum: sed in specie diffe-
 rentias tres habet. Vnum namque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concretum
 quare ab ijs, qui Cypria metalla conficiunt, stillatitium appellatur. Perecius ipsum pinarton vocat, u-
 lacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos co-
 bes, concrementum capessit, quod pecton, id est, concretitium, proprie nominatur. Tertium dicitur
 etile, & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi haec est. Aqua
 defactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalecit,
 complures formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quae racematim inter se cohaerent. Opti-
 mum esse creditur caeruleum, graue, a concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ad aliq-
 choton nominatum. Proximum concretitium. Coctile verò ad infectus, & denigrationes aptius ceteris
 esse compertum est: sed ad medicinae vsus inualidius esse, experimenta docent. Valet ad-
 gere, calfacere, & crustas inducere: latas ventris tineas necat, drachmae pondere deuoratur,
 aut cum melle linctum: vomitus ciet: aduersus hausta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur: per-
 gat caput aqua dilutum, & in vellere naribus instillatum. Vritur, vt paulò post in mentione chalcantis
 stendemus.

• Ori πικ-
 ρόν, καὶ καθα-
 ρόν. i. densū
 & purum.

Chalcantibi
 genera, & hi-
 storia.

Chalcantibū
 vt fodiat.

Chalacanthum, quod Latini Atramentum sutorium vocant, quoniam vitri modo pelluceat, Itali vitreolum
 nant. Duo eius genera in Hetruria, ac etiam in pluribus Germania locis, vnum fossile, per se in terra visceribus
 cretum, quod vulgo appellant Capparosa colore vario. Siquidem crystallo, sapphiro, smaragdoq, similem Germania
 tium chalcantium vidimus. Alterum factitium, cuius passim est vsus, insectoribus experitum. Praestat be-
 minusue tam pro regionum, locorum, ac caeli dispositione, quā ipsius fossilis materia, a qua arte conficitur. Verum
 compertum est Romanum cognomento (quanquam colore constat diluioie) cetera factitij genera praecellere. Secundum
 locum obtinet Cyprium, tamen si huic apud antiquos palma. Quod autem è Germania adfertur, omnibus in ista
 firmius habetur: sed quod sit colore caeruleo, nonnullos fallit. Caterum chalcantibi materiam, quoniam gustantem
 quam vel licet, aspero, adstringentique sit sapore, putauerunt quidam sulphureis, ferreis, ac aereis constare quibus
 quinetiam aluminis, nitri, salisq, Chalcantibi vena, quae foditur in agro nostro Senensi pluribus sanè locis, praeterea
 timis in syluestribus plerumq, vallibus, terrea potius, quā saxea visitur, colore subcinereo, maculis nonnullis
 quarum alia ferri rubiginem, alia aruginem, colore referunt. Hac dum foditur, fortidum, graueolentemq, haustum
 est.

10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000

in sulphurea fere iustar, quam ob causam in concludis, conamierat, & unculus nusquam foditur, sed aperto vndiq, calo.
 Quippe in subterraneis foditur speluncis, met adorum modo, ob acerrimum, factumq, unumq, vaporem, fossiles noxio
 conam, & hinc facile interuent. Effossam itaque chalcantibi venam in aceruum in longitudinem protractum, quandam
 super arcam exaggerant, vbi aperto celo sex aut minus mensibus, imitibus, rotibus, pruinis, solibusq, die noctuq, maceran-
 tam relinquunt quo tempore statutus quibusdam diebus, lignibus & rastro aceruum dilacerant, subuertuntq, & iterum
 in eandem congerunt acervationem, vt facilius hanc imbribus macretur, coquaturq, solis ardoribus. Post haec rectum acer-
 uis, & proponunt, ne amplius in posterum pluuia diluatur, neque solibus pluiquam par sit, in arefiat: & ita alii sex mensi-
 bus macerant hanc fermentari patiuntur. Eligunt deinde locum, quo facilius e propinquu fluuius, vel fontibus ducantur
 aqua: ibi, sub constructo tecto foditur alueus, qui ligneis assibus, vel lateribus, & calce adeo stipatur, vt imbratintus a-
 qua nullo pacto prolari possit. In hunc igitur alueum purissimam aquam deducunt, cui demum tantum illius chalcantibi
 materiae addunt, quantum huic negotio addidi ministri satis esse censerent: postea miscent ali quo tempore lignis quibusdam
 instrumentis ad id paratis, quousq, aqua in se omne quod inest chalcantibi receperit: deinde excrementa, subsidere sinunt,
 donec aqua chalcantibi praeferat claritatem concipiat. His peractis foramina quadam prope aluci fundum in latere facta,
 recluduntur. & inde exiens aqua in magnum excipitur receptaculum. Hanc itaque sumunt, & in plumbeos alueos conij-
 ciunt. cetera enim metalla ab ea eroduntur fornacibus quibusdam superpositos, & igne subdito seruoere excitant, statutus
 horu. Demum ferri tritulum immittunt, vel arsi si quidem aiunt chalcantibum nunquam concrecere, nisi huiusmodi im-
 ponatur metalla, que iniecta paruo tempore colliquesunt in aquam. Postquam autem debito tempore coxerint, ignem quam
 primum e fornace eximunt, permittuntq, que, cere decoctum, quousque egelidum reddatur, ne plumbeus alueus, eo sublato,
 formam calore colliquesceret. Omnibus itaque tepofactis, decoctam materiam eximunt, & in alueolos quosdam ligneos di-
 gerunt, vbi tandem concreuit, aluminis rupet modo, fitq, chalcantibum. Si vero aliquid supersit decocti, quod concrecere
 nequeat, ad totum iterum reloquunt, eadem seruat a ratione. Sed longe aliter olim fiebat Cyprium chalcantibum, de quo
 Galenus libro 9. simpl. med. in hunc modum scribit: Forte fortuna & chalcantibum in chalcitum transire conspexi. Asportat
 enim ex Cypro & huius medicamenti ingentem copiam. Extimum eius omne post annos plus minus viginti chalcitum
 effatum e, & intima eius parte chalcantibi speciem seruante. Quamobrem & vsque in hunc diem quod sic mutatur, asseruo,
 obseruans dum ad unum vsque vno quoque anno procedat mutatio, ceu chalcitidus in misy, vt est ante positum. Ceterum
 mirari sibi de hoc medicamento, quo pacto vehementissime adstrictioni admista est caliditas non instrenua. Constat ergo
 quod omnium maxime condire, seruareq, carnes humiditas potest, nimirum caliditate humiditatem absumentem, atque ad-
 strictione substantiam contrahens, atq, constipans: hoc enim opere non nihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Costringit
 vero, desiccet, atque contrahit in sese substantiam carnis. Porro quo tempore in Cypro diuersabar, hunc in modum medi-
 camentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna quidem, non tamen alta, ingressus in metallum obiecta. Ad parietem
 autem domus sinistram, qui erat ingredientibus ad manum dextram, effossus erat specus in continentem collem, ea latitu-
 dine, vt tres sese viri in eo contingerent, tanta vero altitudine, vt viro summe procero recto liceret incedere. Specus hic de-
 cliuus quidem erat sed non planus, & multis locis praeuptus. Porro ad finem eius quasi in stadium porrecti, lacus erat aqua
 viridis, & crassa tepentis plenus. At in toto descensu calor similis qualis in primis balnearum adibus percipitur, quas, quod
 in eis corpora prae moliri soleant, promalactera appellare consueuerunt. Aqua vero quotidie guttatim ex pertuso colle de-
 stillans, quatuor & viginti horis diei ac noctis, colligi assolet ad amphoras Romanas quasi octo. Eam aquam vincti quidam
 in urnas quasdam quoad at as scilicet in domo ad ingressum posita sitas, efferbant, in quibus paucis diebus concrecebat fie-
 batq, chalcantibum. Mihi vero vbi ad terminum effossi specus descendissem, vbi videlicet topida hac, viridisq, aqua colligi-
 tur, aeris odor visus est suffocans, & toleratu difficilis, chalcitum, aruginemq, radolens. Hac aqua quoque gustu praefere-
 bat qualitate e, & modo. Ea propter, & nudi, & cum se limitatione amphoras vincti exportabant, nec longiorem illic mo-
 ram perferre poterant, sed celeriter recurrebant. Accensi autem erant mediocribus in specu interuallis lychni, qui nec ipsi
 longo tempore durabant, sed celeriter extinguebantur. Hunc ergo specum pedetentim excauatum multis annis ab iis tunc
 audui. Hac enim, inquebant, aqua viridis, quam vides ex colle in lacum manantem, sensim se ipsa minor effici solet. At
 vbi prope adest vt desinat, rursum vincti, quod continens est ipsius collis, perfodere pergunt: euenitq, aliquando olim, vt su-
 bito quicquid per fossium esset, conuideret, omnesq, ad vnum occideret, ac totam viam corrumpet. Id vbi fit, alio foramine
 fodiendo consueque insistent, quoad rursum aqua illis adsit. Hac habui, qua tibi de chalcantibo exponenda censerem, & sane
 fortasse non necessaria, ceterum qua scire praestaret, quam ignorare. Memineris autem, quod ad sinistram manum ingre-
 dientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, & misyos: vt ex his conuicere liceat, aquam pluiam ta-
 tum collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, & chalcitum: & per fornaces es, cad-
 mia, pompholyx, spodium, & diphryges. Hac de chalcantibi historia Galenus. Ex quibus palam fit, aquam virescentem illa,
 qua e monte in speluncam continuo stillicidio defluebat, nil aliud extitisse, quam aquam, annuis imbribus in montem il-
 lum delapsam. Quandoquidem cum ob sulphureos, met allicosq, vapores, vniuersa montis moles rara effecta, vndiq, innumeris
 meatibus scateret, non sane mirum videtur, si tractu temporis laboretur in unum, secumq, deferret tenuiores chalcitum, mi-
 syos, foreos, cum etiam araria materia partes: ibidemq, calefieret, ac decoqueretur, sulphureis, bituminosis, aliisq, met allicis
 ignibus in terra visceribus concludis: adeo vt tandem in cauernam illam descendens, natura opera id fuerit assecuta, quod
 factitium chalcantibum arte consequitur. Eam igitur ob causam in quadratis vasis extra paratu proiecta ea viridis aqua,
 in chalcantibum corbat nulla adhibita coctionis ratione. Quinetiam opus non erat ferrum, vel as in eam iniucere liquan-
 dum, vt concreceret, quemadmodum in factitio fit chalcantibo: quippe quod dum per arary montis meatus laboretur, aris
 innumera rament a secum deferret, qua chalcitidus, & misyos, vi ab ipsa aqua contracta, in eandem liquecebat, argu-
 mento quod aruginis modo viridis esset colore. Ob id itaque statuendum fuerit, Cyprium chalcantibum concretum esse me-
 dicamentum ex chalcitum, misy, sory, & ere conflatum. Id quod manifeste declarat Galenus, cum ait: Memineris autem,
 quod ad sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim metallum foreos, chalciteos, & misyos, vt ex his con-
 quere liceat, aquam pluiam totius collis terram illam colluere, atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat sory, misy, &
 chalcitum: & per fornaces es, cadmia, pompholyx, spodium, & diphryges. Hoc ego quoque maxime obseruavi in quibusdam
 chalcantibi fodinis in Tridentino agro, vbi chalcitum, misy, soryque non ambigimus reperiri copiosa. Sed cum hac non ani-
 maduertisset Brasauolus, vir aliqui huius araris clarissimus, dum imprudentia Galenum accusare contendit, eius sane
 scriptum magis accusat. Quandoquidem vbi Galenum sibi examinandum proponit, eo scilicet loco, in quo scribit chalcan-
 tibum e Cypro a se aduectum, tractu temporis consensescens, factum esse chalcitum, dicit & factitium vulgare nostrum illud
 idem effecere: verum tamen si in aqua resoluitur, iterum in chalcantibum concrecere: quod manifeste indicat in veram.

Chalcantibi vires, & hist. ex Gal.

Chalcantibi collectio in Cypro.

Chalcantibum Cyprium, conflatum est medicamentum.

Brasauolum male Galenum accusare.

non transisse chalcitē, asserens hoc non expendisse Galenum. Verum in hoc videtur Brasauolus Galeni verba bene percipisse, cum inquit, quod aqua, ex qua Cyprium fiebat chalcanthum, terram vniuersam diluebat, e qua chalcitē, sory, fiebant in terra visceribus. Siquidem nil aliud dixisse voluit Galenus, quam quod chalcanthum efficitur, nec sane non est, si ea quæ tractu temporis sit ex chalcantho, eundem præbeat effectum. Neque his obstat, quod quidam Cyprium chalcanthum non solum ex chalciti fieri, sed ex misy simul, & sory. Quandoquidem (vt in proximo commentario dicemus) tria hæc, chalcitis, misy, sory, ex ipsius Galeni sententia, eiusdem tum generis sunt tum etiam facultati. Chalcanthum sponte, & per se in terra visceribus conflatum, visu sanè pulcherrimum misit nuper ad me Tridento Martini Guidottinus diligens peritusq; pharmacopola, in plures laminas per vniuersam massam dissectum à misyos laminas scintillis fulgentibus, quæ illas vnā ab altera diuidunt. Quod sanè maximum præbet indicium, chalcanthum hoc vel primum extitisse quàm chalcitē, quæ Galeno teste, misy semper superstat. Caterum illud nil miri nobis adfert, quod commentarij uerit Dioscorides chalcanthum potum ac deuoratum ad latas alui tineas, & ad fungorum venena, et si medicamentum erodens, & septica facultatis habeatur. Siquidem ad eosdem, & alios vsus hoc tempore non modò chalcanthum ipsum prædam potui exhibent in pestilentia: sed etiam eius oleum, quod chymistæ vitreis organis magna ignium vi ab ipso chalcantho eliciunt, nullo sanè incommodo, sed magno iuuamento: quin etiam (vt ego expertus sum) datur commixtum semisrupuli ponderē ex aqua agrimonij calculosis, & ad ciendam remoratum urinam: Asthmaticis quoque, & suffocatis perquam bellè conuenit, ex Tusilaginij, aut byssopi decocto: limosos, rubiginososq; dentes purgat, & nitidos recidit: vitæ maligna, & sinus iniectum curat. In summa ad multa utile est medicamentum. Qui illud in peste propinant, quod ruij vocant Copparosa, in aqua rosarum dissoluunt, & iterum cogunt, reiteratis tribus, aut quatuor vicibus: dantiq; alij vomitum concitantes. Quod Græci χαλκάνθη, Latini quoque Chalcanthum, & Atramentum sutorium vocant: Mætanij, Calcantum, Calcant, Calcand, seu Alcalandus: Itali, Vetriolo: Germani, Kupfer wasser: Hispani, Coparosa: Galli, Coperose.

Oleum chalcanti.

Nomina.

Χαλκίτις

CHALCITIS.

CAP. LXXV.

Pforicon.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis venis splendentibusque. Huic absterforia vis inest, exalfaciens, & crustas vlceribus obducens: purgatque oculis, & eorundem angulis hærent. In genere leuiter erodentium est. Ad ignem sacrum, & vlcera que serpunt, efficax est. Sanguinem è vulua, & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Gingiuarum vlcera depaicientia vlcera, tonsillasque eius farina compescit. Vsta, & cum melle trita oculorum medicamentis longè vtilior redditur. Callum genarum, & scabritiam absumit, abstergetque. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentum, quod Pforicon vocant, duabus eius partibus, cum trita cadmiæ additis, & ex aceto tritis: oportet autem in fictili obruere fimo diebus quadraginta, per Caruicæ ardores: sic enim fit acrius: idem quod chalcitis potest. Alij pares vtriusque portiones in vino terunt, & eadem profequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis ut humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit: in reliquis verò, cum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit, tum de mum commendanda est. Insidens autem spurcicia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiam num per flatus carbonibus, vsque dum lateo colore palleascit: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Μίσυ.

MISY.

CAP. LXXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & splendens modo splendet. Vim habet, & vstionem, cum chalcitide eandem, præterquam quod pforicon ex eo non conficitur, excessus, defectusque ratione tantum differens. Ægyptium autem cærens præstat, vt pote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multò supradictò inferius.

Μελαντρία

MELANTERIA.

CAP. LXXVII.

Melanteria geminæ est originis: quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, salis modo crescit. Alia verò in summa facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & aliis quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, leui pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Σόρυ.

SORY.

CAP. LXXVIII.

Sory existimantur aliqui melanteriam esse, aberrantes: siquidem sui generis est sory, ei non abfimile. Verum forei virus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Ægypto, & aliis quibusdam regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Ægyptium, quodque frianti nigrius apparet, & multa foramina dehiscens, subpingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum virus olens, ita vt stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum, censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet: dolori dentium cauernis inditum medetur: eosque labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ vstionem experta non sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini fæcem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt: combusta enim viribus efficaciora redduntur.

T. m. p.

siccare, excreſcentia conſumere, vlcera ſerpentia, & quæ cacoethe vocant ad cicatricem perducere. Sep-
purationes terebinthina, aut cerato exceptum diſcutit.

Diphrygis
conſideratio.

Hic nota &
vires ex Gal.

Nomina.

Diphrygis genus illud, quod perfecti aris quasi ſubſidens fax eſt, poſt frigida aquæ offuſionem, vt Dioſcorides inquit,
pe ac ſæpius vidimus in ararys fornacibus, Tridentino agro, & comitatu Tirolenſi, ac inde etiam nobiſcum
nus. Sed quod è luto in Cyprio illo ſpecu foditur, vriturq; ſarmentis: quod item è pyrite lapide calcis modo exuſto
quod demum ex ſola aris materia ſit, cum in areis aſſatur, & in ſcrobis trãſlata peruritur, hætenus mihi videre nō
nec eorum, quod ſciam, ſpeciatim meminit Galenus, qui libro 9. ſimplicium medicamentorum de Diphryge in hū
diſſeruit. Diphryges miſtam habet tum qualitatem, tum facultatem: habet enim in ſeſe quiddam & mediocriter aſtra
gens, & mediocriter acre: quamobrem vlcerum rebellium optimum medicamentum eſt. Conuexi autem & huius medi-
menti vim ingentem ex Cypri Solis, vbi metallum ab vrbe abeſt, quaſi triginta ſtadus. Proiectū erat enim in medijs
adium, que ante metallum extructæ erant, & vici, qui ei ſubiacer. Caterum præfectus, ac procurator metalli, id quod
cadmiam reperiretur, eſſe dicebat inutile, itaque abici, non ſecus atque vſtorum in foco lignorum cinerem. Verum huius
bi ad multa vtile factum eſt medicamentum, tum ad putreſcentia oris vlcera, ſive per ſe, ſive cum melle, cui detracta
ſpuma, tum ad anginam, videlicet vbi iam per adſtringentium medicaminum auxilium conſtitit, quod inſuſcitat. Pro-
terea columellam vbi præſequiſſem, ipſo ſolo, & ſtatim, & vſque ad cicatricem ſum vſus: ac frequenter exacte occluſione.
ſicit cicatricem tum huius particula, tum omnium adeo exulceratorum: ſic in vlceribus omnibus pudendorum, & que
vſus autem ſimilis eſt in oris vlceribus: ſiquidem ea partes eiſdem ſerè medicamentis gaudent, nimirum calida ſunt,
& humida. Et libro 4. de compoſitione medicamentorum ſecundum genera ſic inquit: Porrò Diphryges appellatur. phe-
macum vlceribus agrè humiditatis vitio ad cicatricem venientibus aptiſſimum eſt: valde namq; ſiccatur, etſi modice moue-
atur. Enumerò id quoque præter acrem tum qualitatem, tum potentiam vim habet adſtrictoriam. Quod Græci diphrygion
tius item Diphryges: Arabibus Diphrygis, Italis Diphryge nominatur.

Αυριπικτόν.

AVRIPIGMENTVM.

CAP. LXXX.

Auripigmentum in eiſdem metallis, quibus ſandaracha, gignitur. Optimum exiſtimatur cruſtoſum,
aureo colore micans, nulli materiæ permixtum, in ſquamas fiſſile: quale in Myſia Hellespontica
tur. Huius duo genera fluxerunt: vnum ſuprà dictum eſt. Alterum glandis effigie, pallidum, coloris ſan-
racham imitans, gleboſum ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam ſecundum locum tenet. Re-
retur in teſta noua, viuis carbonibus ſubiectis, aſſiduoq; verſatur, donec igne flagret, & muret coloris
deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adſtrictoriam, & erodentem. Cruſtas cum vici-
menti vredine, & violento morſu excitat: reprimat quæ excreſcunt, & capillos euellit.

Σανδαράχη.

SANDARACHA.

CAP. LXXXI.

a Me. & Orib.
Σανδαράχη. i. flo-
rida.
b. Drag. ad
μέλιτι κηρί-
melle &

Sandaracha probatur ruſa, & ſaturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, ſulpha-
ris virus redoiens. Dos eadem, & vſtio, quæ auripigmento. Explet alopecias, reſina excepta: & ſcætos
vngues cum pice eximit: contra phtiriāſin ex oleo efficax eſt: tubercula cum adipe diſcutit. Prodeſt ad
narium, oriſq; vlcera. & cæteras papularum eruptiones cum roſaceo: item cōdylomata. Datur ex melle
purulenta extuſſentibus: ſuffitur quoque cum reſina, aduerſus veterem ruſſum, rapto per ſiſtulam melle
re: vocem expedit cum melle delincta: ſuſpirioſis cum reſina in carapotio optimè datur.

Auripigmētū,
& Sandarachæ
conſideratio.

Sandaracha
Arabum eſt
gummi iuni-
peri.

Sandax.

Arsenicum
cristallinum
ei quo fiat.

Auripigmētū
& Sandarachæ
vires ex Gal.

Auripigmentum, & Sandaracha, medicamenta ſunt eiſdem tum generis, tum facultatis, nec inter ſe in alio ſibi
quàm quod alterum magis, alterum verò minus excoctum fuerit in terra viſceribus, vbi gignuntur. Vnde etiam
quitur, quod alterum altero tantum virium tenuit, ite præſtet. Quandoquidem nil aliud eſt ſandaracha, quàm auripig-
mentum, quod maiori naturæ coctione colorem rubeum contraxit, & tenuius effectum eſt. Id quod periculo arte ſano
verum deprehenditur: quippe ſi ſiſtili, vel vitreo vaſe vratur auripigmentum, ſubſtratus candentibus prunis, breui vt
pluries experientia compertum eſt) ſlammeum, & ſummè rubentē contrahit colorem, perinde ac ſandaracha: eoque magis
quod plus caloriſici ignis arte fuerit expertum, quam ipſa ſandaracha natura vi fuerit aſſecuta. Sandaracham ſummè ru-
bentē vidimus primum Venetiis in officinis, vbi auripigmētum, & cæteri vaneunt colores pictoribus experti. Verum
animaduertendum eſt (vt ſuperius libro primo diximus) quod hac illa vulgaris Sandaracha non eſt, quam Venetiam
ptoriam officinæ appellant: ſiquidem nil aliud hac eſt, quam gummi iuniperi. Errorẽ autem ſecere neoterici illi, qui Ma-
ritanorum nomina ſecuti (ius enim gummi iuniperinum ſandarax dicitur) idẽ gummi ſandaracham nominauerunt:
ta nomina turpiter confundentes, vt imperitis ſæpe grauitè in rebus ipſis errandi præbeant occaſionem. Quamobrem vi-
in Arabum monumentis, vel eorum, qui Arabicam ſactionem in omnibus ſequuntur, medicamentum aliquod reperitum
fuerit, quod Sandaracham excepiat, de iuniperi gummi perpetuò intelligendum erit: vbi verò id in Græcis codicibus inuen-
tum fuerit, ea quidem ſine controuerſia erit aſſumenda, de qua hic diſſerit Dioſcorides. Vocauerunt præterea recentiorum
nonnulli Sandaracham quoque Sandicem, quam è combuſta ceruſſa conſciunt, quod forte hæc colore admodum rube-
ſcit. Sed hæc ab illa (vt ſuprà retulimus, cum de ceruſſa ſermonem haberemus) viribus, & qualitatibus plurimum diſſide-
t. Eſt & Sandaracha ceruſſinoſi mellis genus, ſi Plinio credimus, qui libro 11. cap. 7. eius meminit. Caterum illud non eſt ſi-
tuo prætereundum, quod Arſenicum officinis cryſtallinum vocatur, ideo quod cryſtalli modo pelluceat, non ſi per ſe, ne
ſponte naſcitur in auripigmenti ſodinis, vt ſcribit Vannocius cuius meus in ſua pyrotechnia, qui nos aliàs eius ſidem ſan-
tos, in hunc ſuum errorem deduxerat, ſed arte ex auripigmenti ſcobe admiſto ſale: id quod maxime reſtat Georgius A-
gricola acerrimus ſoſtilium indagator, & non ex Realgar, ita Sadaceniſi chimico, appellato. Sumunt enim artiſtes auripig-
menti ſcobem, & cum pari ſalis pondere miſcent, teruntque ſimul, & ſubinde operculatis ſiſtilibus huius operi inferunt
bus, ignium vt tamdiu coquunt, quouſque id omne in ſublime ſeratur, & operculo adhareat, concreſcatq; in lapidem: ubi
toties repetunt, donec adeo purum efficiatur, vt cryſtallum referat. Auripigmenti vires reddidit Galenus lib. 9. ſimplicium
medicamentorum ſic inquit. Arſenicum, ſive arſenicum facultatis eſt cauſſica, ſive vtrius, idq; tam combuſtum, quam
vſtionis expert. Caterum id conſtat vſtione reddi tenuiorum partium. Videntur porrò eo, ſeu aduerſe ad dæmoniacum
plu

plu partem quamuis. Verum si diutius inhaereat, nec cuti etiam ipsi parceret. Idem de sandarachâ eodem libro scribens, inquit sandarachâ vrentis est facultas, seu arsenicum quod vocant. Merito itaque eam digerentibus facultatibus comi-
 scant, atque extergentibus. Metallicum, quod Graeci ἀρσενικόν & ἀρσενικόν, Latini Arsenicum, Arsenicum, & Auripigmen-
 tum vocant. Mauritanii, Harneth, seu Zarnich: Itali, Orpimento: Germani, Auripigment. & Orpiment: Hispani, Oro-
 pimento. Quae vero ἀρσενικόν Graecè, Sandarachâ Latine pariter & Italicè vocatur: Arabicè, non secus atque auripigmen-
 tum, Harnet, & Zarnich.

Nomina.

Στυφεία

ALUMEN.

CAP. LXXXII

Aluminis omne ferè genus in Ægypto: & in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam quasi
 flos glebosi intelligitur. Gignitur & in aliis quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sar-
 dinia, Hierapoli Phrygia, Africa, Armenia, & plerumque aliis regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius
 species: verum ad medendi vsum scissile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præ-
 sertim recens, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulo-
 se aut assulosè compactum, sed sigillatim in capillamenta quadam canescencia deliscens: quale est, quod
 trichures, quasi capillare nominatur, in Ægypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis,
 qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confi-
 cium est: sed ex figura deprehenditur. Allumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo
 propius, atque validius adstringens, præterea non nihil palloris cum quadam pinguitudine præ se ferens,
 sine arenis friabile, natione Ægyptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit limpidum, lacteum, &
 quale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque a quadam coloris igniculum expirans. Vim habent
 excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculorum offundunt: genarum carnem,
 ceterasque excrecentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri, & torrerit chalcitidis mo-
 do debent. Putrescentia vlcera compescunt: sanguinis fluxiones inhibent: gingiuas humore prægnantes
 comprimunt: motus dentium cum aceto, & melle firmant. Profunt cum melle vlceribus oris, eruptioni-
 bus papularum, & fluxionibus aurium cum sanguinalis herbæ succo. Lepris conueniunt cum Brassicæ
 foliis, aut melle coctæ: item pruriti, & vnguium scabritiis, pterygiis, & pernionibus, aspersa cum aqua.
 Valent cum aceti fræce, & galla, pari pondere cicmata, ad phagedænas vlcerum: & cum talis duabus par-
 tibus, ad vitia quæ pascunt: furfures, cum etuo, & pice illita abstergunt: ad lendes, pediculos, ambusta, cum
 aqua illita auxilio sunt. Contra tumores, & graue alarum, inguinumque virus illinuntur. Ex Melo autem
 aduectum, mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori vuluæ inditum: partus quoque extrahit:
 gingiuas, si caro excreuit, vis ac tonsillis accommodantur: ori, auribus, & verendis, cum melle illi-
 nuntur.

a Orib. rupa
 des, non pu-
 pæ ec legit.
 i. casei odo-
 rem spirans.

Tamet si scripserit Dioscorides plurima esse Aluminis genera, non tamen plura, quam tria hoc loco statuit recensenda,
 nempe scissile, rotundum, & liquidum: quod fortassis suo tempore iis tantum vterentur medici. Veruntamen hac et a-
 te officina complura habent genera, quamuis rotundo, & liquido careant: nimirum Rupeum, quod vulgò vocant alume di
 rocca: squamosum, quod vulgò dicunt Alume si agliolo: item è vini fece confectum: necnon illud, Catinum iisdem vocatū:
 quibus accedit, quod plumeum appellant, quod tamen legitimum scissile non est, etsi iam dudum cum ceteris rei metallica

Aluminis
 consideratio.

studiosis crediderim scissile alumen nil aliud esse, quam quod vulgò officinis vocatur Alume di prima. Sed hoc (ut postea di-
 cetur) nil aliud nunc esse censemus, quam lapidem amiantum: quod gustu non sit adstringenti, sed acri, quodq; igne nun-
 quam comburatur, quod est amiantum lapidis proprium. Legitimum alumen scissile Pisis misit ad me hoc anno clarissimus
 medicus Lucas Ghinus, notis omnibus refertum, quas illi reddidit Dioscorides, & gustu admodum adstringens. Quo postea
 factum est, ut diligentius exploratis plumei aluminis tum notis, tum qualitatibus, facile deprehenderim plumeum hoc
 non esse scissile. Ceterum Brasauolus de alumine differens in suo simplicium medicamentorum examine, nil aliud liqui-
 dum esse contendit, quam rupeum. Sed ab eo, licet viro eruditissimo, variat opinio nostra. Nam quod ego in Alumeris Pō-
 tificis maximi in Romano agro prope Tolsam per biennium morâ duxerim, eo nimirum tempore, quod Augustinus Chisius
 opulentissimus mercator civis meus, illas aluminis fodinas à Pontifice emerat, ampla sanè mihi fuit facultas tum videndi,
 tum etiam discendi quo artificio, quave ratione, rupeum constaretur alumen. Quamobrem facile testari possum rupei alu-
 minis materiam liquidam, fluxilemque non reperiri, sed lapideam: quinetiam non exponi aestiuis solibus exiccandam, ut
 putat Brasauolus, quod sic (ut ipse inquit) scripserit Plinius liquidum fieri, & addensari. In eodem Brasauoli errore versa-
 tur etiam Fuchsius medicus alioqui eruditissimus, quippe qui putat libro de compositione medicamentorum Alumen li-
 quidum esse illud, quod officinis rupeum, vel rocca vocatur. Fit itaque rupeum alumen ex durissimo quodam lapide, cuius
 duo obseruauimus genera: alterum durius, & rufescens: alterum verò mitius, & candidans. Quod autem è candido fit la-
 pide, albedinem seruat, & crystalli instar translucens conspicitur. Alterum verò contra rufescit, & maiore acrimonia pol-
 let, visiturq; sordidius. Expetitur candidum sericeorum staminum insectoribus: item iis, qui præstantiora lanarum vellera
 cocineo colore tingunt, quod altero nitidius, minusq; acre habeatur. Foditur aluminis lapis è rupe quadam, aperto vndiq;
 celo, non autem in concamerato cuniculo. Ingens ibi fossorum caterua perpetuò commoratur, qui partim mucronatis li-
 gonibus ex validissimo chalybe temperatis, partim ferreis malleis, ipsiq; ingentibus, partim acutissimis calis cuneisq; hunc
 lapidem frangunt, lacerant, sciunt, conterunt, ac diducunt, ea demum ratione, qua lapicida operantur in ingentibus la-
 pidum, marmorumq; fodinis, qua ad magna effodiuntur adificia. Transferuntur deinde confracti lapides in fornaces cal-
 caris similes, vbi validissimus ignibus, eo sanè modo, quo calx, nocturno præsertim tempore inuruntur duodecim, aut ad
 summū quatuordecim horarum spatium: quippe si diutius vteretur, cuncta aluminis materia inaresceret. Postquam autem
 refluxerint, plaustris in amplissimas areas sub dio, & solibus eos comportant, ibiq; in planos componunt aceruos, hortorum
 toru persimiles, sed longè, lateq; grandiores, latiore fundamēto, quam vertice. Compositis igitur hoc modo in areis aceruis,
 aquam qua vtrinque continue excurrit, in lapidum aceruos mittunt, quibusdam excuatis instrumentis, è ligno cōflatis,
 in perquam similibus, quibus nautæ suis è scaphis aquam eximunt: id tribus, aut quatuor vicibus quotidie repetentes, donec
 diuturna aqua affusione, perusti lapides vsque adeo macerentur, ut in terrâ quandam lentore madida argilla simile pernu-
 tentur: quod tamen nō fit, nisi aqua perluantur, ad trigessimū sextum, aut quadragesimū vsq; diem. Excuant præterea
 ligo: bus

Alumen plu-
 mosum est a-
 miantum.

Brasauoli opi-
 nio reproba-
 ta: item Fuch-
 si error.

Aluminis ru-
 pei faciendi
 ratio.

lignibus terram hanc, & ad fornaces cortinasq; quas caldarias vocant, curribus item conuehunt. Sunt autem caldariae sic dictae cortinae admodum capaces, & super amplissimum aneum fundum patina instar, suppositam fornacem primum exstructam vndique operientem, ex lateribus, & calce fabricata, & crusta quadam pertinaci vndique circumlita. Haec aqua replent, aquae ductibus eò deducta: deinde in subsidentem fornacem, validissimum succendunt ignem, ut demissa ferueat aqua. Hoc cum factum fuerit, comportatam ex areis terram in feruentem aqua alueum coniciunt. Astant vnum bini robustissimi artifices, qui veluti remigantes, magnis quibusdam ligneis instrumentis (pallas vocant) continuis remissam terram aqua commiscunt, quousque aqua omnem aluminis materiam in se conceperit. Subinde terra recementum instrumentis iam dictis trahunt ex aluei fundo, per propinquam ibi fenestram in quendam aqua riuulum proreantem alio deducendum. Quo facto iterum nouam superindunt terram, modo quo diximus commiscentes, & recementum augerent, quod tamdiu prosequuntur, quousque intelligant aquam tantum aluminis materia sibi ascivisse, quantum satis fuerit. Demum parumper quiescere dimittunt, ut si quid recementi sit, in imum descendat. Mox calentem aquam alueum refertam extrahunt, & suis aqueductibus ad id paratis in magnas quasdam capas ex querna materie factas transferunt. Ibi enim octo dierum termino alumen conficitur internis parietibus inherescens adamantinus mucronibus simile, & opistalli instar pellucidum, ad quatuor, aut quinque digitorum crassitiam. Alumine porro ita concreto, lixiuij reliquum sibi enim vocant decoctum) à quo secessit alumen, isdem aqueductibus è capsis illis eximentes, ad caldarias ita eò vocata mittunt, id scilicet, quod clarum defecatumq; sit: nam turbidum, & recementitium, aperto foramine in receptaculi fundo, tanquam inutile per riuulum deferri, & delabi sinunt. Post hac aluminosum recementum, quod minutis partibus granorum tritici instar ad fundum resedit, ad cortinas illas magnas iterum discoquendum comportant. Demum eò fundo scopis omni ex latere mundato, quibusdam ferreis, ligneisq; instrumentis concretum in parietibus alumen discedit diductumq; eximunt, & exemptum in vimineas fiscellas coniciunt, & in quodam aqua alueo lauant, fiscellis in aqua demersis. Eximunt postea, & aqua excolata in aceruum domibus asseruant, salis modo. Ex his itaque omnibus aperiri cognosci potest, rupeum alumen nullam habere cum liquido cognationem. Quandoquidem asserit Plinius libro 35. ubi fieri liquidum ex aqua limoq;, hoc est terra exudantis natura: corruatum hyeme, aestiuus solibus maturari: probari quoque limpidum lacteumq; sit, sine offensis fricantium, cum quodam igniculo caloris. Si verò adulteratum sit, deprehendi succo mali punici: quòd syncerum ea mistura nigrescat. Sed hac non inueniuntur in rupeo, ut quod magis glaciem, crystallumq; referat, quam lac: sicut item ex durissimo lapide, non ex limo: nec affuso punici succo nigrescat, sed longè magis peccat. Hinc igitur fit ut non modo à Brasauolo dissentiam, & à Fuchsio viris alioqui citra controuersiam doctissimi: verum etiam à Cornario, quòd & ipse in còmentariis in Galeni libros de compositione medicamentorum secundum locum, Brasauolum fortasse secutus, scripserit, Rupeum alumen, quòd vulgò vocant Alume di rocca, esse liquidum Gracis vocantur. Verum enim uero liquidum Alumen, quin & scissile, rotundum, placites, & plinthites nuper ad me misit Bartolomeus Maurus ranta Apulus, medicus apprime eruditus, & medicae materiae studiosus, atque diligentissimus inquisitor, qui ex sese Fucolis Campania iam pridem hac omnia aluminum genera comperit, quae sanè nullis, ni me fallit iudicium, notis à legentibus dissident. Huic ergo viro eorum aluminum cognitionem libentissimè acceptam refero, & quas possum ego gratia. Scitamen iis ingentes deberi, qui, ut ipse, sua inuenta cum aliis quoque communicare non grauantur. Liquidum item Alumen ex Ilua Tyrrheni insula aduectum, quòdq; manibus ductum lentescit, antea ad me miserat clarissimus medicus Lucas Genuus, Pliniana descriptioni notis omnibus respondens, adeoq; adstringens, ut nunquàm meminerim medicamentum aliquod degustasse, quod gustui tantum adstrictionis relinqueret. Porro quòd rotundum Gracis vocant, tametsi non desint, qui sibi persuadeant, id esse quòd officina à sacchari effigie saccharinum appellant, ex crudo alumine rupeo, quorum albo, & salutaritia rosarum aqua paratum: cum tamen non inueniatur rupeum veteribus cognitum fuisse, cur eorum iudicio subire non habeo, praesertim quòd legitimum nunc apud me sit. Quòd praeterea Catinum appellant, (hoc quoque sal Alkali quòdam vocant) ex cuiusdam planta cinere, Chali Mauritania vocata, conficitur ad vitra in fornacibus expurgata. Pliniam hanc nos vulgò vocamus Soda. Prouenit hac (ut alibi scripsimus) in litoribus maris, salso admodum sapore. Ceterum quòd ex vini fece paratur, sit conformatis è fece panibus, deinde sole siccatis, & igne tamdiu perustis, quousque candorem ceperint. Postremo Squamosum (sic enim uoco alumen illud, quòd vulgò dicitur Alume scagliola) ex squamoso quibusdam lapide, & vitri modo pellucido, qui nonnullis specularis appellatur, quòd fortasse selenitis modo speculi prebeat effigiem Asini speculum dicimus. Hunc itaque in ignem coniciunt, aut ferri laminis igne candentibus superimponunt. Insuper nimillico claritatem deperdit, dissilitq; in tenuissimas laminas, & gypsi modo albescit, eiusq; induit speciem. Quomodo maxime falluntur, qui sibi persuadent, inter lapidem specularum, & Talcum vocatum nullam intercedere differentiam. Quippe (ut mihi quidem experientia compertum est) non sine magno labore, & flagrantissimo fornacis igne, Talcum in speculum potest. Specularis lapidis puluis nondum ignem experti, miris laudibus quibusdam effertur ad dysentericas, in vino calidius potus: exustum enim non probauerim, quòd gypsi specie inducta, sumentes strangulet. Aluminum vires pauca perscrutari Galenus li. 9. simplicium medicamentorum, sic inquit: Stypteria, huius medicamenti nomen ab adstrictione deductum est: nam adest illi vehemensissima. Ceterum cum sit crassarum partium, tenuior quodammodo est aliis aluminum generibus, quòd vocatur schiste, hoc est fossilis: proxima est strongile, id est rotunda, & astragalote. Admodum autem crassa est tum liquida, tum placites, & plinthites appellata. Et lib. 4. de compositione medicamentorum secundum genera, idem ait. Omnes aluminis differentiae vlcera satis exiccant generosè adstringentes: quare nemo solis ijs ad vlcera utatur: hac Galenus. Sed non desunt, qui Dioscoridem secuti, alumen omne non parum excalescere opinentur: contra verò qui contendunt id omnino esse falsum, potius frigefacere ipsum existimantes, Galeni auctoritate freti: quippe qui lib. 4. simplicium medicamentorum scripserit, omnia quae adstrictoria sunt facultate, esse frigida, ac terrestria. Veruntamen si rectè diligenterque expendantur aluminum quorumcunque effectus, & facultates, quibus in corpus nostrum agunt, nemo quidem inficiari poterit, quin aluminis omne genus non obscure excalescat, quemadmodum chalcantem, chalcitis, & misy: quae cum valenter adstringant, non tamen refrigerant, sed maxime excalescunt, ut idem testatur Galenus libro 1. de simplicium medicamentorum facultatibus, dum inquit: Quin verò & Asclepiades Metrodorus tanquam illum etiam superare contemderet, asserendis de sensu mendacijs, cum alia quadam, tum resinam, & bitumen excalescere nos denegat, atq; adstringentia omnia refrigerare dicit, cum si nihil aliud saltem chalcitis, chalcantem, & misy, quae valenter adstringunt, non tam assecuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si prolixa quadam nugentur seipsoq; nonnulli fallant, cum de manifestò apparētibus verum sateri non audent. Et lib. 4. de compositione medicamentorum per genera capite 1. illud idem affirmavit, his verbis: Porro diphryges appellatum pharmacum, vlceribus agrè humiditatis vana ad cicatricem venientibus aptissimum est: valde namque siccatur, etsi modicè mordeat. Enim uero id quoque praeter actum

Alumē liqui-
dum vt fiat
ex Plinio.

Alumina co-
gnita.

Alumen ro-
tundum.

Alumen Cati-
num, est sal
Alkali.

Alumen squa-
mosū vt fiat.

Talcum.

Aluminum
vires ex Gal.

Alumen o-
mne excales-
cere.

obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisquam in bullientem vrceum micem iniecerit, feruorem statim sedari.

Pumicis consideratio.

Pumicis vires ex Gal.

Nomina.

Pumicem ambustum esse lapidem in montium concavitatibus, omnes serè fatentur nature operum exploratores. Ob id enim pumices sapius eructat mons Aetna in Sicilia, & in Campania Vesuvius, qui hoc tempore, annis nō perclapsum non secus quam Plinij atate, ingentibus flammis exarsit, cum magno Puteolorum, & adiacentium locorum detritum, igne in terra visceribus genito, è sulphureis vaporibus, & bitumine, quo quàm plurimi referti sunt montes, eoq; pumice, quod Graci pissasphaltum dicunt. Pumicis vires duobus locis reddidit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, vnde eo primum ita scribit. Si pumex inter lapides recenseri potest, & ipse eiusdem est facultatis, quod certe ad abstersionem acriter, velut etiam figulina testa, ac multò magis ea, quæ fornacium est. Sed sinitis acrimonia quiddam ostinet: primum causticis, & desiccantibus facultatibus quidam ipsum miscent, eisq; quæ curant gingiuas laxas, ac mollitie fluidas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior eosdem ad vsus smire. Secundo autem loco idem de pumice differit his verbis. Pumicem si inter metallica recenseras, calumniabuntur, quibus animus prurit accusandi lividino: et si inter lapides ponas, lapidem esse negabunt: ac multo minus terram esse concedent, nec marinorum haberi quodpiam. Atqui alicubi tamen de isto dicendum est: quippe qui in sarcotica indatur medicamenta, & ea quæ dentes extergunt, partim vstionem non expertum, partim etiam vstus, quâdo videlicet aliis omnibus combustis similiter substantia efficitur tenuioris. Caterum vstione quiddam acquirat acrimonia, quam rursum lotionem exurit. Videri autem poterit splendorem conciliare, non tantum sinitate, sed etiam asperitate, velut etiam si smirin, aut testam, aut hoc genus quippiam tritum admoueas. Quæ certe & ipsa splendorem asserunt, fortè propter, tum quia detergendi habeant facultatem, tum quia asperitatem. Eundem in modum cornu deusta dentes splendidos efficiunt. Pumex qui Latinis, Gracis κίονες, vocatur: Arabibus, Fanech: Italis, Pomice: Cermis, & Bims. Hispanis, Piedra pomez.

Αλο

SAL.

CAP. LXXXV.

SAL fossilis efficacior est communiter, si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus æquæ compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modò findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamne Cypri, & Megaris, in Sicilia, & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multò validissimus est Phrygius nomine tapeus, aut tritæus, aut gantæus. Salis natura in commune perquam vstione adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimit, extenuat, & crustas inducit: sed hoc interest, quòd aliis alio sit præstantior. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis pforas abstergentibus, & crescentia in oculis reprimit, & pterygia consumit, cæteraq; carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropticorum tumores auxiliatur: dolores in tæcis fotu mitigat: & pruritus sedat, ex oleo & aceto infriectus ad ignem, donec sudent: item lichenas, lepras, pforasque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: tonsillis, vnaq; cum melle tostus. Vlcenibus in ore manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedænis vlcerum, cum polenta crematis illitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini semine: contra serpētium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasten cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur: contra scolopendræ morsus, cum melle, & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasque capitis pustulas, thymos, & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos, cum vna passa, aut saille adipe aut melle discutit: testium tumores, origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus in linteolo, & intinctus aceto, ita vntuculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, & ad sugillationes in facie ex melle: contra haustum opium, & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle: ambustisq; cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium dolens, cum aceto: ignes sacros, & vlcera, quæ serpunt: cum aceto, aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus, ne exiliat, conditusque prunis, vsquedum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vtri. Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur subdito igne, moueturque, donec iam non exiliat.

Αλος αχνη

SALIS SPUMA.

CAP. LXXXVI.

SPUMA salis spumosi maris lanugo, siue ramentum est, in exilibus petris inuentum: cui vis eadem, quæ salis.

Αλμη

MVRIA.

CAP. LXXXVII.

MVRIA effectus salis præbet, abstergitque: dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadicis veteribus. Ad fatus, aquæ marinæ vsum præstat.

Αλος αιθος

FLOS SALIS.

CAP. LXXXVIII.

FLOS salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari: interdum longè magis virus olet, gustuque mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea sincerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad vlcera, quæ cacoethe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aures, efficax est: oculorum hebetudines, caricæ, albuginesque tollit. Emplastris, vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscetur. Sudorem cit, aluum tuivat, in vino aut aqua sumptus: stomachum male habet. Additur acopis, & smegmatis. qua

quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in vniuersum acris est, & feruentis naturæ, vt sal.

Salis quo frequentissime in omnibus ferè cibis vtitur, & sine quo viuere nescimus, quo item ad annos asseruatur carnes, **Salis omnis generis consideratio.**
 plures alia, complura, nulli sanè non cognitus est. Plures tamen in salis genere sunt differentie: quandoquidem præter
 marinum, fluuiatile, lacustre, fossile, reperitur. Marino vtitur vniuersa fere Italia, exceptis Calabria, qui fossilio quam
 pulcherrimo abundat. quo etiam vtitur vniuersa Pannonia. In Germania hauritur è salis quibusdam fontibus, quorum
 aqua dum ignem vt excocta in sale cogitur. Fossitum quod crystalli modo pellucidum est, officinae Arabas secuta salem gem- **Sal gemmæ fossitium.**
 ma vocant. Huius foainas vidimus apud Calabros agentes, loco, qui vulgo dicitur Altomonte, vbi lapidum modo excidi-
 10 tur. At qui non omnis sal fossilis pellucidus est: siquidem qui foditur Halis in comitatu Tyrolensi, lapidis in armorei faciem
 præ se ferre videtur, colore ad rufum inclinante. Calabrus autem in ignem coniectus, præter caterorum naturam nec dis-
 silit, nec crepitat, sed vt ferrum ignescit. Lacustrem hætenus non vidimus, nec fluuiatilem: quanquam Plinius libro 31. ca. **Sal lacustre ex Plinio.**
 tradit plures haberi lacus, ac fluuios, qui salem copiosum reddunt, vt eius verba, quæ subiciam, aperte testantur. Sal om-
 nis, in iure, aut fit, aut gignitur. Vtrumque pluribus modis, sed causa gemina, coactio humore, aut siccato. Siccatur in la-
 cu Tarantino æstiuus solibus, totumq; stagnum in salem abit, modicum alioquin, altitudine genæ non excedens. Item in
 Sicilia in Lacu, qui Cocanicus vocatur, & alio iuxta Gelam. Horum extremitates tantum inarescunt, sicut in Phrygia,
 Cappadocia, Assendi, vbi largius coquitur, & vsque ad medium lacum. Aliud etiam in eo mirabile, quod tantundem no-
 20 tuiubucit, quantum die auferas. Omnis est sal minutus, atque non gleba est. Sunt etiamnum naturales differentia
 tres. Namque in Bactris duo lacus vasti, alter ad Sythias versus, alter ad Arios, sale aestuant, sicut ad Cittiium in Cypro, &
 30 uti a Memphim, extrahunt lacu, deinde sole siccant. Sed & summa fluminum densantur in salem, æne reliquo veluti sub
 gelu fluente, vt apud Cassias portas, quæ salis flumina appellantur. Item circa Mardos, & Armenios. Præterea apud Ba-
 ctros annus Oxus, & Oxus ex appositis montibus deserunt salis ramenta. Sunt & in Aphrica lacus, & quidem turbidi,
 salem ferentes. Ferunt quidem & calidi fontes, sicut Pagasæ. Et hætenus habent se genera ex aquis sponte prouenientia.
 Sunt & montes natui salis, vt Indus Oromenus, in quo lapidarum modo ceditur renascens, maiusq; regum vectigal ex eo
 est, quam ex auro & margaritis. Effoditur & è terra, vt palam est, humore densato, in Cappadocia. Ibi quidem ceditur
 specularum lapidum modo. Pondus magnum glebis quas micæ vulgus appellat. Carrhis Arabiæ oppido, muros domosque
 40 m. us salis fuit, aqua ferruminantes. Inuenit & iuxta Pelusium Ptolomeus rex cum castra faceret. Quo exemplo post
 ea inter Aegyptum, & Arabiam etiam squalentibus locis ceptus est inueniri, detractis arenis: qualiter & per Aphrica si-
 tuentia, vsque ad Ammonis oraculum. Is quidem crescit cum luna noctibus. Nam Cyrenæici tractus nominantur Ammo-
 50 niaco, & ipso, quæ sub arenis inuenitur, appellato. Similis est colore alumini, quod schiston vocant, longis glebis, neque
 per lucidus, ingratus sapore, sed medicina utilis. Hætenus de sale Plinius. Caterum Ammoniacus Sal, qui legitimus sit, ad **Sal Ammo- niacus.**
 nos conueni desit, quippe factitius, adulterumq; est, qui passim in seplasiariorum officinis venditur, nigricatibus exterius
 glebis. Non desunt tamen qui credant consilari hum. ex camelorum vrinis, artificio quodam concretis. Sed cur his ad stipu-
 lari debeam, non video, cum neminem habeant, cuius fide id comprobare possint. Atqui non tamen id omnino negauerim,
 cum Venetias ex orientali plaga asseratur, vbi magnus camelorum est numerus. Seplasiarj, pariterq; chymista Sal Arme-
 niacum appellant, quod fortasse existimè ex Armenia adferri, vbi innumeri sunt camelorum greges. Sed isti, mea quidem
 sententia, hallucinantur. Serapio (Isach Arabici testimonio) scribit Salem Ammoniacum fieri è lapidibus durissimis, &
 translucidis. Sed & is fallitur, meo iudicio: siquidem Ammoniaci nomen nõ altunde sibi comparauit, quam ab arena, quæ
 60 a uuo. Græcis dicitur, sub qua in laminas concretus, inuenitur in Cyrenæica regione. Venit præterea in medicorum vsum
 40 Sal, quem Arabes Alchali cognominant, item Alamen catinum, de quo superius in alumine diximus. Sal autem Indus ap- **Sal Indus est Saccharum.**
 pellatus, vt libro secundo retulimus, nil aliud antiquis extitit, quam saccharum in sacchariferis arundinibus in India
 gummi modo concretum, cuius nunc loco vtitur supposititio, quod seplasiae saccharum candidum vocant. Verumtamen a-
 nimaduertendum est, quod quanquam Paulus, & Auicenna eum fortasse secutus, concretum naturæ saccharum salem
 Indum appellant, non tamen fuerit putandum, quod Indi legitimum salem non habeant. Quandoquidem (vt Plinius est
 auctor) in Oromeno India monte lapidarum modo foditur ingentibus glebis: proinde dicebat Mesues de sale scribens, Na-
 phtbicum, & Indicum ceteros sales præcellere. Quod autem Salnitrum vocant, tormentorum bellicorum pulueribus expe-
 titum, vulgus notitiæ est, de quo tamen latius sequenti capite sermonem faciemus. Caterum salis spumam pluries legi
 quibusdam in scopulis Tyrreni maris. Cum enim procella exoritur, intumescitq; pelagus, spumantes aqua in altum sub- **Salis spuma.**
 lata, scopulorum cavitates replent: quo fit, vt ibi sub dio remanentes solibus, & rore, æstiuis caloribus, in salem album con-
 50 crescant. Muria porro, quæ innumera asseruantur edulia, nota omnibus res est, vt quæ sale tantum, & aqua conficiatur.
 Sed quidnam veteribus flos salis fuerit, decernere nõ ausim, neque plura quod scribam habeo, quam quæ à Dioscoride pro- **Flos salis.**
 duntur. Eius tamen meminisse Plinius loco supra citato, sic inquit. Salinarum sinceritas summam facit suam differen-
 60 tiam. Quædam enim sauilla salis, quæ leuissima ex eo est, & candidissima flos salis appellatur. Et flos quidem salis, in to-
 tum diuersa res, humidiorisq; naturæ, & crocei coloris, aut rufi, veluti rubigo salis. Odore quoque ingrato, ceu gari, dissen-
 tiens à sale, non modo à spuma. In Aegypto inuenitur, videturq; Nilo deferri: & fontibus tamen quibusdam innat. O-
 ptimum ex eo, quod olei quandam pinguitudinem reddit. hæc Plinius. Porro color rufa rubiginis instar pictoribus expeti- **Salis rubigo.**
 tur, e Germania salinis aduectus, qui fortasse flos ipse salis fuerit: nam colore, & sapore illi non obscure respondet, vulgo ap-
 pellant Morello di sale. Verum cur hoc non plane affirmem, illud mihi ob stare video, quod color is non sit liquidus, neque o-
 leosus, sed aridus: quare potius inclinatur animus, vt ipsum credam esse salis rubiginem, de qua ex Plinio paulo ante mentio-
 60 nem fecimus. Fuchsius, in libro de compositione medicamentorum, quem auctum secundo edidit, nihil aliud esse putat flo- **Fuch. opinio improbata**
 rem salis, qui Dioscoridi ἀλόεζον dicitur, quam balenarum semen, quod Germanis medicorum officinis Sperma ceti no- **florem salis Sperma ceti**
 minatur. Quæ in re fortasse secutus est sententiam Georgij Agricola rei metallica acerrimi indagatoris. Sed vtcunque sit, **credentis.**
 non equidem possum horum quamuis eruditorum virorum iudicio omnino subscribere, nam plura sunt, quæ in eo censendo
 mihi repugnant. Primum enim est color, quem in spermate Ceti vocato nusquam croceum, neque rufum, vt salis flori
 ine se restantur omnes, videre mihi licuit. Dein non mihi videtur hoc medicamentum adeo liquidum, vt Galenus, Aetius
 & Plinius, & præsertim cum scribat ipsemet Plinius salis florē in fictilibus cōtineri oportere ne effundatur, quod sanè per-
 inde, ac oleum sit liquidum annuere conspiciuntur. Præterea si gustum consulamus, difficile quis asseuerabit, esse ipso sale
 vto tenuius. Postremo cum Dioscoridi, & Plinio in Nilo flumine, & lacubus quibusdam tantum is inueniatur, nec vs-
 quam in mari, nec in maritimis paludibus reperiri salis florē meminerint, vbi sperma Ceti hoc euo colligitur, nõ ita facile
 adduci

Salis vires ex Gal.

adduci possum ad credendum, illud florem esse salis legitimum. Dicam quoque quod ad maligna vlcera sananda ea sunt prestantissima medicamenta, qua valenter abstergunt, & desiccant, non sanè ea qua humidam, & olei modo pinguioribus substantiam habent, perinde ac sperma ceti vocatum. Tamen ne videar à Fuchio, & à ceteris, qui eius sequuntur, aut contentiosè dissentire, velim vt aliorum quoque sit iudicium. Salis autem meminit idem Galenus tum inter fossilia medicamenta, tum etiam inter ea, qua in mari nascuntur li. 9. & 11. simplicium medicamentorum, sic inquit Salis fossilia dem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: verum hoc differunt, quòd salis è terra effossi substantia magis sit compacta: ac proinde in hoc maior est & partium crassities, & adstringendi potentia. Itaq; marinus affusa ipsi aqua potius liquefit, at fossili hoc non euenit. Porro eiusdem speciei cum marino est, qui in stagnis quibusdam sal sedinem habentibus nascitur, estate videlicet aquis aestu ex iis absumptis, cuiusmodi est Tragastus non procul à Sminthio. Confluit enim ille ante aquas spontaneas, qua admodum sunt calida, copiosa aqua stagnans, non amplo in loco: & ea estate omnes absumitur, à sole videlicet arefacta. Porro quoniam locus ipse sal sedinem natiuam continet, quod reliquum est eius omne, sal est cognominationem à loco pariter & aquis sortitum. Nam spontanea & ipsa illis in locis aqua Tragastia nuncupatur, potentia summè exiccatoria: & sanè, qui in ea regione sunt medici, ad hoc illas accommodant. Porro dictum est & de Sodemoriam nunc opus est, vt exposita gustus qualitate, ipse medicamenti facultatè cognoscat. Igitur cum qualitas salis digeratur simul & contrahat contactam ab ipsa substantiam, vocatum aphrolitron in hoc differt, quòd in ipso vnum modum saporem exuperantem expresse sit videre, quem vocant amarum, vim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, vt sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id totum quodammodo absumit: & quod reliquum est substantia solida adstrictione contrahit: ac proinde etiam conditura sua corpora siccat, & à putredine tuetur. Quippe qua putrescunt, excrementitium continent humorem, substantiamq; tum dissolutam, tum minimè compactam. Quibus ergo corporibus natura prorsus est humiditas superflua, ceu melli optimo, & corpus solidum & compactum est, ceu lapidibus, ea, vt putrescant, est impossibile: ac proinde in his salis non probatur vsus, verum in iis, in quibus suspecta est putredo. Spumosa autem salis efflorescentia multò tenuioris natura est, quam sal ipse, quare & extenuare, & digerere multò plus ipso potest: verum quod substantia est reliquum, contrahere vt sal nequit. Ceterum flos salis medicamentum liquidum est, tenuius etiam quam sal vsus: tum acris qualitatis, & admodum digerentis facultatis: haecenus de sale Galenus. Sal Latinis, ἅλς Graecis appellatur: Arabibus, Melech, seu Melha: Italis, Sale: Germanis, Saltz: Gallis, Sel: Hispanis, Sal.

Nomina.

Nitrum, & spuma nitri.

NITRVM, SPVMA NITRI CAP. LXXXIX.

a Ori. vlt. i. infulis.

PRæfertur Nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum: quiddam, quale ex a Bunis adfertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Lydia defertur: secunda est Ægyptia: quin & in Magnesia Caria gignitur. Vim, & vtionem talis habet, tam nitrum, quam spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, qua inflationes discutere possunt, vt ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, qua extrahunt, & discutiant, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut vino infusum, inflationes, purulentas aures, & sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum morsibus ex balnino adipe, aut suillo medetur: resina terebinthina admistum furunculos aperit: aqua inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si biberitis momorderit, ex aqua: iis verò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: iisque qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonitq; iam remissioribus, & luxatis cum cerato: in lingue resolutione, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

b Me. alycia i. caprino.

Nitri, & spuma nitri conseruatio.

Nitrum vt conseruetur ex vino: & non esse nostrum sal nitrum.

Nitrum, & nitri spuma, quorum antiquis maximus fuit in medicamentis vsus, diu sanè est, quod ad nos conuulsi dereliquerunt. Proinde hallucinantur, mea quidem sententia, qui putant salnitrum vocatum, quo ad tormentorum belluorum pulueres vtuntur, & ad fortissimas aquas conficiendas, quibus argentarij fabri aurum ab argento separant, verum ac legitimum esse nitrum, cuius meminere Theophrastus, Dioscorides, Galenus, Plinius, & antiquorum alij. Siquidem id manifestè demonstrat Plinius lib. 31. cap. 10. vbi de nitro ita scriptum reliquit. Non est differenda & nitri natura, non multum à Theophrasto diligentius tradidisse. Exiguum fit apud Madoc, canescentibus siccitate conuallibus, quod vocat halmithum. Minus etiam in Thracia iuxta Philippas, sordidum terra, quod appellant agrium. Nam quercu cremata, nunquam multum factitatum est, & iam pridem in totum omissum. Aqua verò nitrosa pluribus locis reperiuntur: sed sine virtute deficiunt. Optimum copiosumq; in Clysia Macedonia, quod vocant calastricum, candidum, purumq;, proximum salis. Lacum est nitrosus exiliente è medio dulci fonticulo. Ibi fit nitrum circa Canis ortum nouenis diebus, toridemq; cessat, ac rursus incipit, & deinde cessat. Quo apparet soli naturam esse, qua gignat: quoniam compertum est, nec soles proficere quicquam, cum cesset, nec imbres. Mirum est & illud, scatebra fonticuli semper emicante, lacum nec augeri, nec effluere. Iis autem diebus, quibus gignitur, si fuerit imbres, salius nitrum faciunt, aquilones deterius, quia validius commonent limum. Et hic quidem nascitur. In Ægypto autem conficitur multò abundantius, sed deterius: nam fuscum, lapidosumq; est. Fit per eodem modo, quo sal, nisi quòd salinis mare infundunt, Nilum autem nitrarius. Excedente Nilo siccantur, decolante madent succo nitri quadraginta diebus continuis, non (vt in Macedonia) statis. Si autem imbres adfuerint, minus de flumine addunt, statimq;, vt densari est ceptum, rapitur, ne resoluatur in nitrarium. Sic quoque olei natura interuenit. Ad scabiem animalium vtilis. Ipsum autem conditum in aceruis durat. Mirum in lacu Ascanio, & quibusdam circa Chalcida fontibus, summas aquas dulces esse potarique, inferiores nitrosas. In nitro optimum, quod Magnus & nitro vsus, qui dicitur suo loco. Nitraria egregia Ægyptiis, nam circa Naucratis, & Memphim tantum solent esse. Circa Memphim deteriores: nam & lapides ibi in aceruis, multiq;, sunt tumuli ea de causa facti. Faciunt ex eis vasa. Necnon frequenter liquantur cum sulphure coquentes in carbonibus. Ad ea quoque, qua inueterari volunt, illa nitro vtuntur.

Sunt et nitraria, in quibus & rufum exit a colore terra. Spumam nitri, qua maxime laudatur, antiqui negabant fieri, nisi cum ros caedi set. pragnantibus nitrariis, sed nondum parientibus. Itaque non fieri in aratu, etiam si caderet. Alij operationum fermento gigni existimaverunt. Proxima etas medicorum Aphronitrum tradidit in Asia colligi in speluncis mollibus distillans. Specus eos Calycas vocant: dein sole siccant. Optimum putant Lydium. Probatio, ut sit minime pande-
~~rum, & maxime diabile, colore pene purpureo, hoc in patellis affertur, Aegyptium in vasis pi. utis ne liqueat. Vasa quo-~~
~~que ea solo in areficientia perficiuntur. Nitri probatio, ut sit tenuissimum, & quam maxime spongiosum, sibilosumq;.~~
~~Ad-~~
~~gypto calce. Deprehenditur gustu: sincerum enim facit, oblitur: adulteratum pungit. Calce aspersum,~~
~~reddat humorem vehementem: hac Plinius. Ex quibus liquido constat, non nisi v. Sal nitrum, antiquorum nitrum non es-~~
~~se, et indicat eundem non sit, quin aliquis nitri habeat qualitates. Verum tamen nemini unquam periculum velan, ut~~
~~meo, sicutis, que in v. in corpus sumuntur, nitri lo. & dicitur, ab hunc max. imper. p. f. Et quamvis contrarium~~
~~a. et ut, ut: p. i. j. tradant Monachi illi reuerendi, qui Mejum commentati sunt, non tamen credo, hoc id prius in se: p. s. s.~~
~~experto e. e. Quod nihilominus eos facere debebat, si siaterna charitate ducti sunt, ut alij suaderent salnitrum tuto assu-~~
~~mu po. e. cum prima charitas (quod dictum frequenter usurpant) incipiat a se ipso. Nitri legitimi sicutum, quod a Guiliel-~~
~~mo Quaciveno Flandro Constantinopoli mihi in v. m. est: notis omnibus genuinum refert, ut in epistolarum nostrarum~~
~~libro v. l. i. diximus. Nitri meminit Galenus libro 9. simplicium medicamentorum, sic inquit: Nitrum dictum est supra~~
~~in medio esse aphronitri, & salis v. m. ceterum v. l. m. propius ad aphronitrum accedit, utpote exustione tenuius redditum.~~
~~Deficit itaque, & digerit: & si intro in corpus sumatur, secat, & extenuat crassos lentosq; succos potentius multo quam~~
~~sal. Aphronitrum vero nisi grauis vrgeat neq; sit as, nemo deuorabit, nimirum inimicum si stomacho: quandoquidem plus et-~~
~~iam litro incidit. Sanè ad fungos suffocantes, rusticus quidam eo vti assolet, & semper profuisse probatum est. Ceterum ni-~~
~~tro v. l. o. simul & non v. l. o. & multo etiam magis eius spuma, & nos in talibus vti consueuimus: haec Galenus. Qui ta-~~
~~men videtur h. s. qui codicis mendam non animaduertunt, maximam facere differentiam inter Aphrolitrum & Aphro-~~
~~nitrum: licet haec re diuersa non sint. Nam vbi de Aphrolitro libro citato differit, vulgata exemplaria habent: ἀφρολίτρον~~
~~ἀφρονίτρον: hoc est: Aphrolitrum ab aphronitro differt. Verum in altera dictione latet vitium, ut quae ἀφρονίτρον,~~
~~hoc est, a spuma nitri, duabus vocibus legenda sit. Ita fiet, ut Galeno non aphrolitrum ab aphronitro, sed vtrunque a spu-~~
~~ma nitri apte distinguatur. Id quod & Augustinus Riccius Lucensis, & Leonardus Fuchsius, medici atatis nostra celebres,~~
~~doctissime adnotarunt. Ceterum cum Galeno aphrolitrum, siue aphronitrum spuma nitri non sit, quid aliud sit, ingenue~~
~~facere me ignorare: neq; id alius, quod sciam, haecenus explicauit. Quod Graeci λίτρον & λιτρον, Latini Nitrum nominant:~~
~~Mauritani, Baurach: Itali, Nitro. Quod vero Graeci ἀφρολίτρον vno verbo dicitur: Arabibus, Baurach Afice: Italis, Nitro~~
~~di Africa. Qua deinde Spuma nitri Latine, ἀφρονίτρον Graecè vocatur: Arabicè, Aphronitrum.~~

Monachorū error.

Nitri, & aphronitri vires ex Gal.

Nomina.

Τρὸξ. FAX. CAP. XC.

Fax ligenda maxime à vino vetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fax aceti viribus longe acrior est. Crematur, ut alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo vrant, vsquedum penitus incendatur. Alij viuis carbonibus faxis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ vstionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu vrere videatur. Eadem vrendæ faxis aceti ratio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vlcera ad cicatricem perducit, adstringit, vehementer exest, siccaturque. Sed recenti vtendum est, quoniam celeriter exanimatur: proinde non nisi in reconditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur ut pompholyx. Quæ vstionem experta non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet: ventris stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri profluumum imo ventri, aut genitalibus imposita mitigat: panos discutit nondum exulceratos, & tubercula: rigentes mammas, lūiq; lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cremata verò, vngues scabros cum resina aufert. Addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, ut spodos, adicitur: cicatrices eorum, & caligines eadem abstergit.

Fax vini vulgaris notitia est, quin & ipsius adurenda ratio nota, hys praesertim, qui ex hac alumen, quod vocant faxis, Faxis, & tartari dicti consideratio & vires.
 conficiunt. Torro vini recrementum, quod vinariis cadis agglutinatum, crassa lapidosa instar inuenitur, officinarum vocabulo Tartarum vocatum, aluum non obscure subducit. Proinde non desunt, qui sibi adstrictam aluum citent, hausto tartari puluere ex gallinaceo iure, addito mastiches momento, & saccharo: nihil enim incommodi adfert hac ratione paratum. Additum in deiectoria diluta, quæ ex sena, vel polypodij radicibus, vel epithymo parantur, vim eorum deiectoriam adauget. Sunt qui album Tartarum faciunt, diu ipsum in aqua decoquentes, atque subinde despumantes. Τρὸξ sic Graecè, Latine vero Fax dicitur: Arabicè, Durdi: Italicè, Feccia: Germanicè, Hefen & Weinstein: Hispanicè, Rasura de vino.

Nomina.

Αόλιος. CALX VIVA. CAP. XCI.

Calx viua hoc modo fit. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum vrato, vsquedum vehementer inalbuerint. Dein vbi in aquam frigidam demersæ fuerint, in fictile nouum conicito, & exactè panis operiens, noctem vnā conuiescere finito: manè eam extrahens, vbi perfectò omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusanèo marmore, quæ cæteris praesertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit, & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Calx, cuius passim vsus ad edificiorum muros struendos, nota omnibus est. Præter hanc fit etiam priuatim ad varia medicamenta e purpurarum, buccinorum, cochlearum, ostreorum, ouorumq; testis. Non desunt tamen, qui etiam eam, quæ fit ex calcario lapide, vnguentis, & emplastris admisceant, eam primùm demergentes in aquam, vsquedum prorsus distilat, ac subinde lauantes diebus pluribus, affusa sapius recenti aqua pluuiali, vel fontana. Valet enim sic elota ad
 LIII 2 contumacia

Calcis cōsid.

contumacia vlcera, quod absque morſu valenter ſiccat. Ob id itaque vnguentis eſt petetur, quibus vtuntur ad pndentia vlcera, eaq; praefertim, quae venerea lue contrahuntur. Quinetiam prodeſt ad ambuſta, & alia, quae non facile curantur admittunt. Sunt etiam qui extinctam prius calcem, lauent deinde diutius roſarum ſtillatitia aqua, ita valentius eſt medicamentum exiſtimantes. Calcis vires deſcripſit Galenus lib. 9. ſimplicium medicamentorum, his verbis: Calcis vires ſunt, quae ἀσβεſτος Graece dicitur, vehementer vrit, minusq; inducere cruſtam poteſt. At vero temporis progreſſu proſu nec cruſtam quidem gignit, tamenſi etiamnum calfaciat, carnemq; liquet. Porro ſi lauetur in aqua, ſuam mordacitatem exiit, efficitq; nuncupatam novίαν, hoc eſt lixiuium: at ipſa absque morſu reſiccat. Ac ſi bis, terq; aut amplius abluta, tunc planè mordacitatis expers conſtituitur, ac ſtrenuè absque mordacitate exiccat. Calx viua Latinis dicitur, ἀσβεſτος: Graecis appellatur: Arabibus, Horach, Nura, ſeu Nure: Italis, Calcina viua: Germanis, Ungeleſchter Kalk: Hispanis, Ca.

Calcis vires
ex Gal.

Nomina.

Γύψος.

GYPSUM.

CAP. XCII.

Gypſum vim habet adſtringendi, obſtruendi: ſanguinis eruptiones, ſudoresque cohibet: ſed porum ſtrangulationis modo iugulat.

Gypſi hiſt. **G**ypſum quid ſit, nemo eſt qui neſciat. Abundat gypſo vniuerſa ferè Hetruria, ibiq; commodè frequenterq; expetitur camentarius ad adium fabricas. Fit gypſum è quodam candido lapide, in laminas facile ſciſſili: qui tamen non longa ignium vi torretur, & excoquitur. Quandoquidem in calenti furno coniectus, quatuor, aut ad ſummum quinque horarum ſpatio perurit. Tandem deinde in puluerem, & incerniculis excutitur. Praeſtantiſſimum eſt recens: nam diu aëre uatum, aqua immiſtum aegrè lapideſcit, ac coit. Fit etiam Gypſum e ſpeculari lapide, qui Graecis σελνίτης dicitur. Item et alio quodam lapide niuei candore, e quo in Hetruria torno patitur, & alia vaſorum genera conſciuntur. Huc alabaſtrum

Gypſi vires ex
Gal.

appe'lant, ſed perperam Gypſo vires reddidit Galenus libro 9. ſimplicium medicamentorum, ita diſſerens: Gypſum eſt, quod ad communem omnium terrenorum, lapidoſorumq; corporum facultatem, qua deſiccare dicta ſunt, inſuper hoc adiutum habet, quod eſt facultatis emplaſticae. Vnitur enim ipſum ad ſeſe, & cogitur, lapideſcitq; maceratum. Quamol' tenuis medicamentis, quae ad ſanguinis eruptionem accommodantur, commiſcetur. Nam ipſum per ſeſe lapidoſum ſit, & durum coactum, ac congelatum: proinde rigare, diluereq; illud excoquitur, tenni alboq; qui liquare, quod ad ophthalmia utile eſt, admixto quod in farina triticea eſt puluill' tenuiſſimi, qui in parietibus molendinorum reſidet. Excipere vna quod ſic ſubaëctum eſt tenellis leporis pinis, aut qui perinde ſunt molles, expedit. Gypſum combuſtum non aequè emplaſticum habet: ceterum tenuiorum eſt partium, & valentius deſiccat. Quin & repercuſſorium eſt, maxime ſi maceretur oxoco.

Nomina.

Γύψος κλιματίνη.

SARMENTITIVS CINIS.

CAP. XCIII.

Sarmentorum cinis vrendi vim habet: cum axungia autem, vel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & neruorum nodis prodeſt: cum nitro, & aceto excreſcentias carnis in ſcroto reprimunt. Serpentiū, canumq; morſibus illitus ex aceto medetur: cruſtas obducentibus medicamentis admixtur. Fit ex eo lixiuium contra praecipitationes, & fungorum venena, cum aceto, ſale, & melle.

Cineris omnis
vires ex
Gal.

Cinis omnis quid ſit notius eſt, quam vt pluribus explicari debeat, quare ad eius vires properemus: de quibus in vniuerſum diſſerens Galenus lib. 8. ſimplicium medicamentorum ſic inquit: Cinis combuſtorum lignorum reliquia ſi occupantur, composita ex contrariis tum qualitatibus, tum ſubſtantis. Habet enim in ſe partim terrenum, partim vmbri- lignoſum, quod Graece dicitur athalodes, ſive lygniodes, ſive quomodocunq; quis appellare volet: atque haec ſane partem tenues, & quae maceratis aqua cineribus, & percolatis, vna aſportantur, atque abeunt. Quod vero reliquum eſt, terrenum eſt, infirmum, & morſu carens, calida facultate in lixiuium depoſita. Sed non omnis cinis eadem temperatūra praedita eſt, ſed pro combuſta materia diuerſitate variatur. At neſcio quo pacto Dioſcorides omnes cineres adſtringendi habere vim prodiderit, cum ficulneus eiꝰmodi omnis qualitatibus ſit expers, vt pote cum & ipſa arbor nulla ſui parte acerbam qualitatem praeferat, ceu quercus, ilex, arbutus, ſagus, lentisus, hederæ, & hoc genus alia: verum plena ſucco valido tota ſit, cogit acris & calido. Ergo ex acerbis vtiq; lignis factus cinis, non parum adſtringit: meminiq; me quandoq; cum aliud ad medicandum non eſſet medicamentum, per hunc ſanguinis ſuppreſiſſe eruptionem. Verum nullus vnquam ad tale vti ficulneo audeat: ſiquidem hic acrimonia multum, adurentisq; facultatis obtinet, miſtæ abſterſioni: & vtroque diſfert ab eo, qui ex quocunq; ligno conſicitur, tum quod in eo fuligineum multo eſt acrius, tum quod in illis terrenum quodammodo ſubadſtringens eſt, in hoc abſtergens, velut in cinere titimalorum. Eſt & calx cineris quaedam ſpecies, ceterum tenuioris eſſentia, quam qui ex lignis ſit, nimirum quanto lapides exactius torreti, vt cinis ſint, poſtulant: non tamen multum reliquum in ſe habet, velut natura ignea, quod vocant ἀπύρευμα. Proinde elota medicamen eſt citra morſum deſiccans, magisq; ſi in terra lauetur. Ceterum ſi marina aqua abluta ſit, admodum digerit. Dicitur porro de ea, vbi de metallicis ſermo habebitur.

Nomina.

Τέφρα Graecè dicta, Cinis Latine vocatur: Arabice, Chamad, ſive Ramed: Italicè, Cenere: Germanicè, Aſchen: Hispanicè, Ceniza: Gallicè, Cendre.

Ἀλκυόνιον.

ALCYONIUM.

CAP. XCIIII.

a Onb. addit.
σινδωνίον
i. ſiſtuloſum.

Alcyonij quinque eſſe genera compertum eſt. Vnum enim ſpiſſum, acerbis ſaporis, ſpongioſa facie, tunc terti odoris, ponderoſum, & piſcem olens, quod pluriſimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulae oculorum, aut ſpongiae ſimile, ſiſtuloſum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiformi forma, & colore magis purpureum, a quod Mileſium quidam vocant. Quartum luccidis velleribus non diſſimile, multis manitibus hians, leue. Quintum figura fungi, ſine odore, aſperum, parte integra quodammodo pumicoſum, foris laeue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta inſulam Beſbicon appellatam gignitur, patrio nomine halosachnen vocant. Duo priora in ſeminarum ſmegmata aſſumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquoque corpore. Tertium

Ternem ijs, qui diuina vitina vexantur, aut arenulas in vesica coligunt, idoneum est: item renibus affe-
ctis aqua inter cutem, heni. Vitam autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandi
locis aptum est: in alia smegmata, psilothraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium
exemate velit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, &
cum lignum percoctum fuerit, extrahens ad vltus recondat. Lauatur vt cadmia.

* ALCYONIUM. *

Alcyonium vt Plinius est, author lib. 32. cap. 8. fit in mari
ex nidis, vt aliqui existimant, alcyonum, & calcum: alcy ex
sordibus spumarum crassescens: alcy e limo, vel quadam
maris lanugine. Quatuor eius genera: Cinerum, sstissum, odoris
asperi. Alterum molle, lenius, odore fere algæ. Tertium candidio-
rum vermiculi. Quartum pumiosius, spongia putri simile, penè
purpureum: quod optimum, hoc & Milesium vocatur. Quo au-
tem candidius, hoc minus probabile est: hac Plinius. Qui tamen
quintum fungi figura, cuius meminere Dioscorides, & Galenus,
suentio praterit. Sunt praterea, qui Alcyonium ita appellari
tradant, non quod ex alcyonum nidis fiat, vt Plinius scribit, sed
quod alcyones super illud marinus vndis simul congestum nidifi-
cent: quorum sententiam magis probandam censemus. Alcyoni-
um officina spumam maris vocant: quod sic idem vocent Ara-
bes, Dioscoridem secuti, quippe qui scripserit quintum Alcyoni-
genus in Besbico halos achnen, hoc est, mari spumam vocari.
Ceterum rufum Alcyonium corallij instar, coacturatis in glo-
bum veluti vermiculi, lapidosaq, materie, Venetis primum vi-
dimus. Quartum vero reperimus copiosum in Tergestino litore
velleribus simillimum, album, ac leuissimum. Piscatores hoc co-
chlearum marinarum, qua aculeis rigent, & vulgò appellantur
Garuse, nidum esse affirmant. Primum, & vltimum genus pu-

Alcyonij hi-
sto. & colid.

Spuma maris
offic.



ribus in seplasis inuenitur. Porro in hoc capite in vulgatis Dioscoridis exemplaribus nonnulla vt plane suspicor) verba de-
derantur, cum de vrbibus quarti alcyonij nihil in his scriptum legatur. Auget suspicionem Orbasius, cuius lectio hoc loco
habet: τὸ δὲ τετακτοῦν ἴδιον ἔστι, hoc est, quartum & postremum &c. Idem confirmat Serapio, qui ex Dioscoride trans-
fertens vtriusque speciem meminit. De Alcyonij differunt Galenus lib. 11. simplicium medicamentorum, his verbis Alcyonia
omnia detegunt, ac digerunt, qualitatem habentia acrem, & calidam facultatem: verum aliud alio non parum plus mi-
nusque, & in his ipsis, qua diximus, secundum partium essentia totius tenuitatem. Est autem eorum vnum densum, &
grauis, odore prauo: olet enim pisces putres, spongia in specie simile. Secundum vero aliud figura longiore, leue, & rarum: o-
dorem habens similem phycis. Aliud tertium vermi simile est specie, colore purpureo, consistencia molli, vocant id Milesium.
Post qua quartam secundo quidem iam posito similiter & leue, & rarum, verum lanis succidus simile. Denique & quin-
tum extima superflua lacte, cetera in interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre: & sanè omni-
um alcyoniorum est calidissimum, adeo vt & pilos vrere possit. Itaque cum duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasque ad-
muent, praterea, autem splendorum competentia virium efficiant, idem prestare non potest hoc vltimo loco positum. Nec
enim perinde vt illa, cutem duntaxat summam extergit, sed etsiam excoriat, vsque in profundum cutis penetrans, vt et-
iam vlcera molitur. Porro quod tertio ordine recensuimus, omnium est tenuissimum, itaque vltum alopecias curat illitum
cum vino colore quidem fuluo, tenuis tamen essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud
parum imbecilliores. Quod Graeci ἀλκυονίον, Latini quoque Alcyonium dicunt: Arabes, Zebothalbahar, seu Zebd albahar: Nonnulli
Itali, Alcyonio.

Locus Diosc.
suspectus.

Alcyonij vi-
tes ex Gal.

Nonnulli

A d d p r e s. ADARCES. CAP. XC V.

Fit in Cappadocia, quod adarces appellatur. Est autem tanquam concreta falsilago, humidis & palustri-
bus locis siccitate emergens, & arundinibus, ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, &
omni forma molli alcyonia, & aliquantum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euel-
lendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, similia, accommodatur. Et in summa vis ei acris.
Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Legitimam Adarcem, qua Dioscoridis, & Plinij placitis respondeat, haecenus non vidimus, etsi in Italia nasci tradidit
Plinius lib. 16. cap. 36. Quam postea lib. 32. cap. 12. vocauit calamochnum, sic inquit: Inter aquatilia dici debet & ca-
lamochnum, Latine adarca appellata. Nascitur circa arundines tenues, e spuma aqua dulcis ac marina, vbi se miscent. Vm
habet causticam, ideo acopi additur contra persictionum vitia: haecenus Plinius. Porro vero eos hallucinari crediderim,
qui sibi perjuadent id esse adarcem, quod vulgò Italis dicitur Palla marina. Siquidem hac in mari tantum nascitur, non
in paludibus aqua dulcis: & ibi non arundinibus, neq, herbis inhaerens visitur, sed in sicco reperitur litore, vndis simul
cum alga proiecta, pile omnino similis, qua in lactentium hadorum ventriculis, ex exuctis vna cum lacte pilis, plerunque
reperitur. Adde quod hac, quantum gustauerim, nec acris, nec caustica (vt Plinius inquit) deprehendatur, neque etiam
quod sciam, in paludibus inueniatur. Huius tamen meminisse Galenus libro primo de compositione medicamentorum
secundum locos, referens qua Crito ad conseruandos, augendos, itemque a defluuio praeseruandos capillos scripsit. Vbi cum
interpres Cornarius, vir alto qui doctus, imus, ignorasset quid Critoni & Galeno intelligeretur per σφαίρα βαλάντια, forte
suspectus, locum hunc in Galeno esse deprauatum, spongiam marinam perperam interpretatus est: quandoquidem lectio
illa vera est, & vertendum erat pilam marinam. Id quod etiam Fuchsius doctissime adnotauit in suis de compositio. medic.
libris. Marinam pilam addit Nicolaus Myrepsicus in quodam vnguento ad lumbricos, vbi sic habet: Pila marina, qua
reperi-

Adarces con-
sideratio.

Calamoch-
nus.

Palla marina

Pila in hæde-
rum ventri-
culis.

Cornarij la-
psum.

llll + raperi-

Adarcæ vires
ex Gal.

reperitur in mari rotunda, vt lana congesta. Caterum Adarca vires retulit Galenus lib. 11. de simplicium medicamentorum facultatibus, ita scribens: Adarcion aliqui masculino genere adarcon, alij fœminino adarcen dicunt, essentia quidem sicut velut spuma est aquæ salsa concreta, circa arundines, & farragines concreta. Acerrimum hoc est, simulque calidissimum medicamentum: proinde & per se inutile est, verum commiscetur ijs, quæ vim eius retundunt, itaque fit admodum utile in ijs affectibus, qui ex caliditate postulant, idq; foris impositum: nam intrò in corpus ipsum sumere est impossibile, nam ob virium vehementiam: hanc Galenus. Ex quibus liquido apparet, Adarcium à marina sphaera plurimum fieri, & viribus differre. Id Græcis ἀδάρκων & ἀδάρκων vocatur, quod Latinis item Adarces: Arabibus, Adarachi, seu Adaracha: Italis, Adarce.

Nomina.

Σπόγγου

SPONGIÆ.

CAP. CXVI.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Faminiæ autem, quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ, vt alcyonium. Recentes sine pinguitudine vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscaue conglutinant, veteres sinus ex decocto melle iungunt. Verustæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosq; laxant. Siccæ recentes, & vacuæ, senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cunicularum exedunt, imposito siccant: sanguinis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto aridæ lippitudini auxiliatur: vbi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnia per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæret: insolantur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante, maris aqua † maximum candorem referent.

† Drag. λευκῆ καὶ ἰσχυρῆ ἐκ ὀλίγου. i. candidæ sunt nõ pauca. Spongiarum histo ex Aristotele.

* SPONGIA MARINA. *



Spongiarum genus (inquit Aristoteles lib. 5. cap. 16. de historia animalium) triplex statuitur: nam alia rara, alia spissa, alia quas nominant achilleas. Tenuissimum genus dicitur, spississimum, & validissimum quod galen acrimia inferitur, eoque minus cedere strepitum posse notatum est, genus hoc inuētum perquam rarum est. Quæ autem in genere illo spisso pradura sunt, atque aspera, nomine hirci nuncupantur. Quæ quidem omnes aut ad saxa nascuntur, aut iuxta litus lutog, aluntur. Cuius rei argumentum est, quod capta limosa ferta omnes cernuntur: quod certe indicat ceteris quoque adherentibus cibum per ipsum adnexum hauriri. Imbecilliores propterea sunt spisse, quam rare: quia minus albo radice hauri innituntur. Sensum etiam spongijs esse aiunt: argumentum quod ad euulsoris accessum contrahuntur, ita vt euulsi discedant: quod idem etiam faciunt, quoties status, tempestasque uiget, ne sua de sede pellantur. Sed sunt, qui de hoc dubitant, qui Toronam incolunt. Narrant tamen proculdubio huiusmodi quasdam velut tineas lumbricosas, & eiusmodi aliam esse re intra spongijs, atque ali: quas & euulsis spongijs, sicut saxatiles deuorent, qui vel radices absumunt totas quam herentes saxis remanserint. Si euenerit forte, vt spongia atrapatur, residuo item renascitur, & completur. Magnitudinem amplissima soluta illa, & rara spongia, augentur plurima, quæ circa Lyciam sunt. Sed mollissima quæ spissa: nam achillea torosiores ijs constant. Omnino quæ altis, tranquillis insunt gurgitibus, mollissima sunt: si atus enim, ac tempestas spongijs quoque, vt cetera altis reddunt duriores, & incrementum impediunt. Quamobrem spongia Hellepontis spissa ac dura sunt, & omnino quas mare ultra Maleam promontorium, citraque refert. Differunt inter se mollitie, duritieque, ac calore inmodicum spongia patiuntur: fit enim eo, vt mare pullulantium putrescant. Quocirca optima iuxta oras com-

peruntur spongia, si gurgite alto demersæ sunt: commodè enim temperantur propter altitudinem gurgitis. Color illarum uis que nigricans est. Adherent nec parte, nec toto: intersunt enim fistula quedam inanes, sed pluribus passim particulis habitant, & quasi membrana extensa subesse radicibus earum videtur: supernè autem ceteri meatus concreti propemodum latent: at uero quaterni, aut quini patent, per quos pasci existimantur. Hactenus de spongijs Aristoteles. Cui quidem Plinius suam de spongijs historiam acceptam referre potest, quam libro 9. ca. 65. scriptis tradidit. Spongiarum vires memoria prædidit Galenus libro 11. simplicium medicamentorum his verbis. Spongia vsta acris est, & digerentis potentia. Vtchatur et præceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indigent. In quem vsus semper eam partitam habebat siccam, & exaresactam: cum uero res posceret, bitumine in primis imbuebat, sin eo ceteret, pice. Porro aduuebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardentem, vt & crusta parti induceretur, & ipsum spongia vsta corpus, ceu operculum quoddam acciperet. Caterum spongia ipsa noua per se, non sicut lana, aut linamentum (quod iuxta τριτόν, id est, carpimatum vocant, materia duntaxat est, quæ humores insundendos excipiat, sed etiam manifeste defusca. Id quod sires, si ea sola utaris in vulnere, cum aqua, aut oxycrato, aut vino, pro diuersitate videlicet corporum, vti est ante

Spongiarum vires ex Gal.

¶ Cum Glutinabit siquidem ea similiter atque medicamenta, quae vocantur enama. At si non noua sit, sed vsui accommodata, prout cognoscitur, quantum a noua superetur, siue vulneribus eam imponas, siue a qua proluens, siue oxycrato, siue vino. Neque enim est, cum in spongia noua seruetur etiamnum ea, quam a mari accepit, facultas modice corpora exsiccandi. Atque haec quidem praestare potest, cum etiamnum seruat maris odorem. Nam temporis spatio, etiam si nunquam vsui accommodata sit, tamen & odorem maris amittit, neque aquae desiccare potest. Spongia quae Latine σπόγγος Graecè dicitur: Nomina. Arabice, Asfengi alhairi, seu albar: Italicè, Spongia: Germanice, Badschwamm: Hispanice, Spongia: Gallicè, Esponge.

Κοράλλιον.


CORALLIVM.

CAP. XCVII.

Corallium, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinum esse fruticem constat, qui alto extrahitur, duratur statim atque emergit, tanquam offuso aere protinus concrescat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio, cui Pachyno nomen est. Laudatissimum rubens, colore antherici, aut sandycis saturatae, nec secus terenti facile cedens, aequabili vsque quaque concremento, rursus algæ, aut phuci marini odore, quam ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam eoit, serupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrecentia coarctat: oculorum cicatrices abstergit: vlcera caua, & cicatrices explet. Contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est: vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit. ¶ Quod anthipathes vocant, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro arboris figura, ramosum magis. Vires supradictas habet.

† Dra. ἴστος καὶ φυλακτὴριον ἐστὶ καὶ πάντος κακῆ ἀποτροπῆς. Quinetiā pre seruat à venenis, & omniū malorum depulsor est.

* CORALLIVM ALBUM ET rubrum.*




Corallium, quo vsque adeo abundat Italia, ut ferè nulli ibi reperiantur infantiuli, nullaque puella, quibus non gestentur Corallij monilia aut collo, aut brachij suspensa, quo utimur vtuntur facmina in templis ad suas preces numerandas, ex Tyrieno, & Siculo mari extrahitur, atque inde ad nos desertur. Caterum etsi rubri tantum, & nigri meminere Dioscoridis, reperitur tamen quod niuei sit candoris in hysdem pelagis, non autem vt rubrum compactum, ponderosumque, sed leuius ac rarius, & spongiarum modo inane. Creditur hoc rubro longè magis refrigerare: proinde eo vtuntur medici, vbi opus est maiore refrigeratione. Corallij meminit Plinius libro trigesimo secundo capite secundo, vbi de eo ita scriptum reliquit. Quantum apud nos Indius margaritis pretium est, tantum apud Indos in corallio: namque ista persuasione gentium constant. Gignitur quidem & in rubro mari, sed nigrius. In Persio vocatur lace. Laudatissimum in Gallico situ, circa Stachadas insulas, & in Siculo, circa Heliam, & Drepanum. Nascitur & apud Grauisacas, & ante Neapolin Campania, maximeque rubens, sed molle, & ideo vilissimum Lixibus. Forma est ei fruticis, color viridis. Bacca eius candida sub aqua, & molles, exempta confestim durantur, & rufescunt, quasi corna satiuæ, specie, atque magnitudine. Aiunt tactu protinus lapidescere, si viuat. Itaque occupari, euellique rotibus, aut acris ferramento praeidi: hac de causa corallium vocatum interpretantur. Probatissimum quam maxime rubens, & quam ramosissimum, nec scabrosum, aut lapideum, vel rursus inane, aut concauum. Authoritas baccarum eius non minus Indorum virtus quoque pretiosa est, quam facminis nostris vniones Indici. Aruspices eorum, vatesque in primis religiosum id gestant, amen amoliendis periculis arbitrantur. Itaque & decore, & religione gaudent. Galli gladios, scuta, galeas adornabant eo, nunc tanta penuria est vendibili merce, vt perquam raro cernatur in suo orbe. Sarculi infantie adalligati, tutelum habere creduntur: hac Plinius. Quem tamen mirari Plinij lapsus subit, quod tam facile sibi persuaserit, corallium per se baccas ferre, quasi corna satiuæ specie atque magnitudine, perinde ac cetera arbores suos proferunt fructus. Quandoquidem, vt fatentur ij, qui corallia expiscantur, & q̄s mercaturam exercent, nullas per se baccas edunt. Bacca enim, quæ in coralliorum monilibus, cornis ac cerasis similes videntur, ex ipsorum truncu toruo, & lima prius parantur mox silyridis lapidis puluere, & terra quadam, quæ à Tripoli Africa adfertur, expoliuntur;

Corallij consideratione.

Corallium niueum.

Plinij lapsus.

* CORALLIVM NIGRVM
Dioscoridis.*Corallium
nigrum.Corallii fa-
cultates.

poliuntur, & lucidum leuorem contrahunt, cum ipsa fricantur. Ad hac Corallia è mari circumquaque multa ex-
muntur, nec tunc vlla ex parte rubescunt, verum inde ar-
cibus tradita, deaso cortice rubent, & perpolita utuntur.
Nigrū Coralliū, quod Dioscorides Antipathes vocari ait, pri-
mum vidi ego Neapoli eburnum colore referens. Atqui postea
pulcherrimam eius plantam dono mihi dedit Anzani qu-
dam, qui quotannis mihi plantas è Gardano Apulia monte d-
ferre solet. Ea enim prope radices brachij ferè crassitudinem e-
quat, & à medio trunco in ramos sese diffundit: res quæ
visu digna, & rara. Corallium comitialibus commode adhi-
gatur, hauriendumque prabetur. Corallium, ades (vt au-
a fulminum iniuria tuetur. Idem mensium abundantiam co-
hibet, dentes commotos firmat, desquamatas gingivas emen-
dat, itemq; oris vlcera sanat. Potum dysentericos inuat, fem-
nis profluuium in viris, nocturnasq; pollutiones, & in ma-
ribus albos vteri fluores reprimunt. Recensetur inter ea (An-
na teste) qua cordi hilaritatem adferunt. Auxiliatur prout
(vt Plinius inquit) contra torminum ac vesicae calculi ma-
in puluerem igne redactum, & cum aqua potum. Simili-
do ex vino potum, aut si febris sit, ex aqua somnum concu-
ignibus diu repugnat. Sed eodem medicamine sepius peto-
dunt lienem quoque absunt. Sanguinem reuoluentibus aut
creantibus medetur. Cinis eius miscetur oculorum me-
camentis: spissat enim ac refrigerat, vlcera caua explet, cicat-
cesque extenuat. Corallij meminisse Galenum in libro legi-
mis de simplicium medicamentorum facultatibus, hæc
non reperi: tamen si libro septimo de compositione medica-
torum plura describat medicamenta ad incipientem phthi-
hamopticos, & suppuratos, qua corallium excipiunt. Quod
Græci κοράλλιον, & λιόδερρον, Latini Corallium nigrum,
Mauritani, Bassad, Mergen, Besd, siue Morgian: Itali quo-
etiam Hispani, Corallio: Germani, Corallen: Galli, Cor.

Λίθος φρύγιος

LAPIS PHRYGIUS.

CAP. XCVIII

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia vtuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. O-
ptimus habetur pallidus modicè grauis, nõ solida corporis cõpage, intercedentibus albis segmentis, vt
in cadmia. Vritur autem vino optimo perfusus, viuisque carbonibus obrutus: perficitur assidue follibus,
donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum, & trinis vicibus fa-
ciendum: attendendum tamen ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo, vltimoque
adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadantenus inducit: ambustis cum cerato medetur. *Latine*
vt cadmia.

Phrygij lapi-
dis confid.
Phrygij lapi-
dis vires ex
Galeno.

Qui mihi Phrygium lapidem ostenderit in Italia, hæcenus neminem inueni: quippe cum nec nostratibus Medicis, nec
Lanarum infectoribus, vsui, ex Cappadocia ad nos deferri desijt. Plinius, cum ignorasset, Phrygium lapidem medica-
mentis etiamnum expeti, tingendis tantum vestibus commendauit. De huius lapidis viribus disseruit Galenus libro 9. sim-
plicium medicamentorum, his verbis. Pyritæ facultatem habere existimatur & Phrygius, quem vocant. Sed ea semper vix
combusto quidem ad vlcera putrida, idque aut ipso per se aut ex aceto, aut ænomelite, aut oxycrato: ad oculos vero me-
dicamentum siccum efficiens: quod multi nunc acceptum à me obtinent. Miscentur ei & alia quæpiam. Dicitur etiam de
ipso in opere de componendis pharmacis. Nunc satis est de generali eius facultate explicuisse: valide enim desiccatur, & ab-
quiddam adstrictionis simul & mordicationis. Dicitur verò superius est, ea esse omnia optima medicamina, plurimique
vsus, quæ mistas in sese hæc duas facultates habent, nempe repercutientem, & digerentem. Λίθος φρύγιος Græci, Lapis
Phrygius Latinus appellatur: Itali, Pietra Phrygia.

Nomina.

Λίθος ασίος

LAPIS ASIUS.

CAP. XCIX

Asius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad-
imum actas habens. Eius flos salsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore
in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum vergente: ad motus linguæ aliquantum mordet. Vinum
habet vterque adstrictoriam, & modicè erodentem. Admixtus liquidæ picis, aut terebinthinæ, tabernicæ
discutit. Longè validior flos existimatur. De cetero siccatus flos vetera vlcera, & cicatrici repugnancia facit.
exert

excreſcentia cohibet: terra vlcera, & fungis ſimilia, cum melle expurgat: vlcera caua explet, & expurgat cum melle: depalcentiaque cum cerato ſtat. Fit cataplaſma ex eo podagris, mulo fabæ lomento: & henoſis ex aceto, & viua calce. Prodeſt flos ex melle phthiſicis linctus. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excavato inditis. Fiunt quoque ex eo loculi, qui corpora erodunt: & luxuriantem carnem, & corporum craſſitiam abſumunt, cum vice vitri in balneo ſparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauat.

Tametsi in commentarijs nostris superioribus annis Italica lingua conscriptis, Asium lapidem mihi incognitum esse ir-
 10 genue confessus fuerim: legitimum tamen nuper Tridento ad me misit Martinus Guidottinus seplasiarius diligens
 æque a. peritus: qui quidem lapis, ni fallor, nullus prorsus notus ac vniuersus Dioscoridis descriptioni reclamatur. Foditur in Tri-
 dentino agro quibusdam chalcantibus fodinis, quodam in monte non procul a pago, quem Leuigum nominant. Est enim hic
 pumicus instar leuis, fungosus, friabilis, lutes coloris intercurſantibus venis. Hoc, quod carnes abſumat, utebatur antiquitas
 ad defunctorum sepulchra, vt abſumptis ab eo carnibus, corpora non computreſcerent: ob idque Græci appellauerunt ſarco-
 phagum. Quod manifeste declarat Dioscorides, cum inquit, *καὶ σαρκοφάγος οὐ ζῶοντα* id est, loculi defunctorum car-
 nes abſumentes ex eo ſunt. Hunc locum nullus, quod ſciam, ex interpretibus ita vt nos accepit: ſed omnes ad aliud reſpici-
 entes vocem *σάρκο* puluerem verterunt. In quo mihi plane non videntur mentem Dioscoridis aſſecuti. Quam probe aſſe-
 cutus noſtraque ſententia adſtipulari cognoſcitur Plinius libro 36. cap. 17. vbi de lapide Aſio ſarcophago ita ſcribit. In Aſſo
 Troadu lapis ſarcophagus ſiſſili vena ſcinatur. Corpora defunctorum condita in eo abſumi conſtat intra quadrageſimum
 20 diem, exceptis dentibus: hæc Plinius. Ceterum Aſii lapidis hiſtoriam, & vires deſcripſit Galenus libro 9. ſimplicium medica-
 mentorum, ſic inquit. Est & alius lapis in Aſſo proueniens, quem ob id ipſum Aſion cognominant, non durus vt petra. Si-
 quidem color illi eſt, pariterque conſiſtentia ceu tophi, friabilis, & laxus. innutritur ei quiddam farina tenuiſſima adſimi-
 le, quæ in pſtinetorum parietibus adherere viſitur. Appellatur hoc medicamentum petra Aſia florem. Est verò & ſub-
 tilium partium, vt ſine morſu nimis molles carnes, ac fluidas eliquet. Petra verò, in qua naſcitur, tametsi vim habeat il-
 li ſimilem, actionis tamen vehementia inferior eſt. Hoc enim ea potior eſt flos, non tantum quod magis colliquet, ac
 digerat, & velut ſale condit: ſeruet, ſed & quia hæc præſtet abſque vehementi mordicatione. Habet & ſulſedinem
 quandam in guſtu hic Aſia petrae flos: vt coniectura ſit, illum naſci ex eo quod ros ex mari in petram reſidens, poſtea à ſole
 deſicetur: hæc Galeni verba. Quæ quidem ſi paulo diligentius examinaſſet Fuchſius medicus alioqui noſtra ætatis ce-
 30 lebris, non tam facile fortæ ſuam protuliſſet ſententiam libro de compoſitione medicamentorum: quod ſcilicet Aſia petra
 flos ſit illa mollis, albæ, & tenuiſſima materia, quam farina, quæ parietibus molarum inhaeret, ſimilem exudant veteres
 muni, rupes ſaxaque montium, ex qua ſit quod Salnitrum vocant. Porro quod hæc non verè ſit Aſii lapidis flos, omni-
 bus quæ perſpicuum fiet, quæ rem hanc accuratius expendent. Nam præterquam quod ea diuerſorum lapidum flos eſt,
 nullam habet cognationem cum Aſio lapide, qui ſolus, Dioscoridis & Galeni teſtimonio, florem ſui nominis gignit.
 Lapis, qui *λίθος αἰθίος* & *αἰθίος* Græcè, Lapis Aſius & Aſius Latine vocatur: Arabicè, Hager Aſos: Italicè, Pietra Aſia.
 40

Aſii lapidis
 conſid.
 Aſii lapidis
 hiſto & vires
 ex Gal.
 Fuch. error.
 Nomina.

λίθος πυρίτης. L APIS PYRITES. CAP. C.

PYrites lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris ſimilitudine, facile ſcintillas edens. Vritur
 ſic. Melle irrigatus, molli pruna continuè flatur follibus, donec rufeſcat. Alij in multos carbones igni
 40 candentes, lapidem copioſo melle perſuſum deiiciunt, & vbi ad fuluum colorem vergere cœperit, extra-
 hant: efflatoque cinere, rurfus madefactum cremant, donec æquabiliter aſſiccatus, friabilis reddatur: ſi-
 quidem ſæpe facies ſumma ſolum vritur: ita crematus, ſiccatusque reconditur. Si eloto opus ſit, lauari de-
 bet, vt cadmia. Tam crudi, quam vlti vis eſt excaſfacere, abſtergere, oſuſam oculis caliginem expurgare,
 duritias concoquere, & concoctas diſcutere. Refina exceptus excreſcentia in carne cohibet, ſed calorem
 quendam, & adſtrictionem parit. Ita vſtum nonnulli diphryges appellant.

Lapidem, quem Græci Pyriten dicunt, officina cum Mauritanis Marchesitam vocant. Verum quanquam vniuerſi lapi-
 des, à quibus ignis chalybe excutitur, pyrite appellari poſſunt, cum tamen Marchesita appellata cæteris magis ſcintillet
 50 chalybe aut ferro percuffa, per antonomafiam ipſa ſola vocatur Pyrites, tanquam cæteris præſtantior. Foditur hæc omnium
 metallorum ſerè fodinis, genere, & colore diuerſa, plerumq. tamen (vt Plinius inquit libro trigefimo ſexto cap. decimonono)
 aureus ſcintillis, vel argenteus reſperſa. Gignitur, vt rei metalla periti tradunt, ex impuro metallorum halitu: quo ſit, vt
 ſerè ſemper reperiat in montium cacuminibus, vbi auri, & argenti vena, in profundo deliteſcit. Sterilis hæc magna ex
 parte, quod vt chymiſta exiſtimant, ex impuriſſimo ſulphure, alijsq. inconcoctis partibus metallorum ſit conſtata: quam-
 obrem ſoffores in Germania, extra cauernas Pyriten tanquam inutilem proyiciunt. Veruntamen quandoque Pyriten inue-
 niunt, qui aurum, argentum, vel æs intra ſe continet. Idcirco rectè prodidit Dioscorides, Pyriten lapidis eſſe genus, ex quo æs
 conſtat. Quod cum ignoraret Albertus, oranem Marchesitam inutilem eſſe aſſeruit. Pyrites non ſolum in metallorum
 fodinis reperitur, cum omnibus ſerè lapidibus, & metallis commiſtus: ſed etiam in quibusdam Miſniae fluminibus rotunda
 ſacie, & cæteris durior. Nos pyritem habemus cryſtallo, berillo, Armenio, ceruleo, chalcantio, miſy, chalciti, Minio, auripig-
 60 mento, & alijs lapidibus adnatum, adeo vt cum foſſilibus omnibus lapidem hunc cognationem habere crediderim. Pyrite
 vires reddidit Galenus libro 9. ſimplicium medicamentorum, his verbis. Vnus eorum, qui validam facultatem poſident,
 eſt & pyrites quem vocant: quo vrimur digerenti emplastro admiſto: adicitur ei & ſchiſtos. Ab hoc medicamine, & pus ſe-
 pentumero, & conſiſtentia grumosa in ſpatijs intermedijs muſculorum nata, per halitum digeſta ſunt. Cæterum vbi in vſum
 vocantur lapides omnes admodum vehementer conuſi, atque ad lauorem redacti ſint oportet, ſimiliter atque ea, quæ in
 ophthalmicas facultates admiſcentur. Etenim niſi pollinis inſtar comminuantur, adeo vt in profundum corporum, qui-
 bus applicantur, ſubeant, aſimiles manent iſtis marinis, & fluuiatilibus arenis, quæ & ipſa communem omnium lapi-
 dum vim poſident. Siquidem exiccant tumentem ex hydrope carnem, videlicet laborante in eis excaſſatis decumbente.
 Non tamen ad aliud quippiam eis vtimur, tanquam prædictis, ad ophthalmicas, & ſiſtentes tum ſanguinem, tum multie-
 bre profluuium facultates, præterea ad glutinanda vlcera, cicatrice claudenda, carne implenda. Nam qui ex eis acres
 non ſunt, ad hæc omnes ſunt vtilis, velut & acres, quorum poſtèrius mentionem faciam, ad detergendum, abſtergendumq.
 tum de-

Pyrite vires
 ex Gal.

Nomina.

tum detrahendum, extenuandum, detergendum, valenterq; siccandum, & colliquandum. Qui lapis Græcis λίθος αιματιτης vocatur. Latine lapis Pyrites nominatur: Arabibus, Hager al: siue Alrusenai: Italis & Officinis, Marthesita: Germanis, Sph. 1. Erststoff.

Λίθος αιματιτης.

LAPIS HÆMATITES. CAP. CI

Hæmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus, & suopte ingenio æqualis, nulla forde admista, nulloque zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & excafactoriam aliquantulum, extenuantemq;. Oculorum cicatrices, & scabritiam cum melle purgat: cum lacte autem mulierum lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur contra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab ijs, qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticulæ, & coticulis oculorum vitijs apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adukerant. Densam glebam, rotundamq; schistilapidis, cuiusmodi sunt, quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt: paucaque interiecta moia eximunt, experienturque si trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat: quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confectus, primùm scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hæmatites longè secus leuiter colore habet: namque hic floridum reddit, hæmatites verò saturatiorem, atq; cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnetæ lapide, vehementer ambulto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

Hæmatitæ lapidis confid.

Hæmatites lapis, quo omnes in vniuersum medicæ officinæ abundant, quoq; pictores, & lignarij fabri vtuntur, nunc vocatus Lapis, legitimus non est, de quo meminerunt Dioscorides, & Galenus. Quippe hic alius est lapis mollior, qui proueniens in montibus, apertis locis. At legitimus fossilis est, & sponte natura nascens in metallorum cuniculis: qui hæmatitem sanguinem colore imitatur, vnde & nomen, cum Græcis sanguis αἷμα dicatur. Huic persimilis est, quem Schistum vocant, cuius historiam, & vires statim post hunc scribit Dioscorides ob cognationis vinculum. Foditur hæmatites non modo in Aegypto, sed in pluribus Germania, & Bohemia montibus, præsertim in Hercynia sylua: quin & in Italia Erixensi, sed peregrinis bonitate cedens. Variat tamen huic lapidi color, quoniam & niger, & flauus, & ferruginis instat, quibusdam insit, vt peritissimus aequè ac doctissimus Agricola in suis de fossilium natura libris diligenter adnotauit. Hæmatitis materia

Hæmatites ferri materia.

habet in valle Ioachimica Regni Bohemia Illustris Comes Ioachimus Schlichius, ad eò refertur, vt inde optimum ferrum conficiant: quo fit, vt nil aliud sit Hæmatites lapis, quàm ferri materia. Qui ferrum auro ornant, & contegunt, id sine hæmatite facere nequeunt. Namque ea aureas bractæas ferro prius circumdatas firmant & poliunt, perinde ac pictores, hinc dependente. Hæmatite vires memoria prodidit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, vbi sic inquit. Porro talium quorundam vnus est hæmatites, quem vocant, à coloris similitudine id appellationis sortitus: sicut & galactites, quando & ipse in lacum solutus, lacti similis conspicitur. Habet lapis hæmatites tantum frigiditatis, quantum habet adstringentis. Merito quoque ausi sunt Medici ocularibus facultatibus lapidem miscere hæmatitem. Ac solo eo vti possis palpebris exasperatis: hæmatitem cum phlegmone aspera sint reddita, ex ovo ipsum diluens: ac si magis etiam, per fœni graci decoctum. Sin verò cum phlegmonem, ex aqua. Incipito verò semper à modicè humidis, per specillum infundens. Vbi autem, quod vires eius ferat, impigeris, magis ac magis crassum efficies, ac tandem ad eò crassum facies, vt specilli nucleo inungas, secundum subiectum, aut euerfionem palpebra. Hic idem lapis similiter in cote contritus, sanguinis exspuitioni conuenit, omnibusque vlcibus. Porro siccus, si ad tantum redactus fuerit lauorem, vt puluillum referat, reprimit excrescentia, atq; eo nullus solo ac pinguetatur.

Hæmatitæ vires ex Gal.

Ego verò ad ea quæ dixi, vsus sum facultate eius ex gustu qualitate comperta, cum mox experientia præterire vellem numquid rectè coniecissem. Et ipsa quidem oculorum vlcera, solus per se cicatrice includit (vt patet in comprehensum est) attritus, ceterum aut affusus, aut inunctus: nam & id experientia exploratum habeo: hæmatitem Galenus. Miris item laudibus extulit hæmatitem lapidem Alexander Trallianus, sic inquit. Ego sanè noui frequenter hæmatitem theriaca, alijsque pretiosis antidotis multos curasse, lenibus vsu medicamentis, & præsertim lapide hæmatitæ. Vnde etiam eo sum in his, qui largius sanguinem reiecebant, cum succo punici mali, & granis, vel cum succo polygonij: in quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiam ex aqua sola egelida. At leuigare ipsum curiosè oportet, vt in tenuissimum puluerem redigatur, sitque aereus, & vento persimilis. Dedi ego ex eo scrupula quatuor, & paulo amplius minime. Exhibui etiã ijs, qui pus expuere inceperant, ac mirum est, quomodo vlcus exiccarit sanaueritque, vt non amplius pus generaretur, neque eger tussis infestaretur. Spectaui autem & alium quendam ex his, quibus vas exesum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum quomodo in hoc quoque lapide hæmatitem efficacia iam indicauerit. Nam & hic curatus est nobis non admodum etiã sperantibus. Exhibui autem egro potius medicamentum frequentius, vt commodius distribueretur. Quare cum crebro ipsum bibisset, tandem sumere ipsum sustulit. Excogitavi autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui, & diligenter operam vndiquaque conscriptum, colligatumque in poculo, quod vinum odoratum modicum haberet, suspendere permisit, idque per totam noctem iam inde ab ipso vespere: extraxi autem tenuem, aereamq; eius partem, vt eger solam vini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sanè agendo, bibendoq; continuo, sanis mem-

Hæmatitæ vires ex Alexandro.

mutato, consueti agendo viribus se constare sentiret. Hac de lapide hæmatite a me visa, & vsu comprobata conscripsi. Hæmatitem Alexander lib. 7. cap. 1. Hic lapis Græcè λίθος αιματιτης vocatur: Latine, Lapis hæmatites: Arabicè, Scedenig, Scedenig, seu Alsdanegi: Italicè, Pietra hæmatite: Germanicè, Blutstein.

Nomina.

Λίθος σχιστος.

LAPIS SCHISTVS. CAP. CII

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatum maximè, qui croci colorem æmulatur, friabilis, suoapte natura fissilis, concremento, & alterno coherentium venarum discursu, pectinum modo, Armoniaco salis similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore: quin & caua replet muliebri lacte

tu scorpionum pestis extinguitur. Et in India inuenti contra eadem pollent, & alijs magnis miraculis. Spectasse etiam prodest oculis. Sitim quoque sedant in os additi, Leonina pelli similes, potentiam cateris validiorem habere contra scorpiones additi, refrigerent. Sed ut profint, leoninis iubis alligandos. Abominantur hyena pelli similes, quod domibus discordiales sint. Sed qui vnico tantum colore notatur, inuictos athletas reddit: haecenus Plinius. Lapis, qui Graecis λίθος γαγάτης, Latini Lapis Gagates vocatur: Italia, Pietra Gagate.

Nomina.

Λίθος θρακίας.

LAPIS THRACIVS.

CAP. CIV.

† Ori. λέεια. Lapis Thracias dicitur, nascitur in flumine quodam Scythiae, cui Ponto nomen est. Vis ei Gagatz. Tardius accendi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit.

i. terra.

Thracij lapidis mentio ex Gal.

Qui Thracium lapidem ostenderet in Italia, haecenus profecto neminem inueni: nec qui illum alijs in regionibus se vidisse, aut inuenisse testetur, compertum habeo. Eius mentionem fecit Galenus vna cum gagate lib. 9. de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi ita scribit. Est & alius lapis, cuius meminit Nicander hunc in modum.

Si lapis vratur candenti Thracius igne, &
Post madefiat aqua, flagrabit totus: at idem
Mox oleo affuso, penitus restinguitur: adfert
Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen
Cui Pontus.

Nomina.

Verum nullus eius in medicina vsus: neque Nicander prater graeuelentiam, qua suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit. haec Galenus. Caterum nos Thracij lapidis historiam potius fabulosam, quam veram censemus. Eius nomen Graecum λίθος θρακίας: Latinum, Lapis Thracius: Italicum, Pietra Thracia.

Λίθος μαγνητικός.

LAPIS MAGNES.

CAP. CV.

Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad caeruleum vergente, densus, nec admodum grauis. Datat cum aqua multa trium obolorum pondere, vt crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro haematite vendant.

Magnetis lapidis histo.

Sideritis lapis. Magnetis differentiae & delectus.

Magnes lapis Heraclius, & Sideritis quoque dicitur. Magnes quidem ab inuentore (vt Nicander est author) nomine Magnone, qui primus in Ida monte lapidem hunc adinuenit: aut a Magnesia regione, vt Lucretius suis in poematibus scribit. Heraclius vero, vel ab Heraclia vrbe, vel ab Hercule: vt enim Hercules immanes domuit belluas, viribusque subegit: Magnes ferrum victricem rerum materiam ad se trahens, subigit, & tenet. Quas ob vires Sideritis quoque dicitur: quippe ferrum Graecis σιδηρος appellatur. Nos autem vulgari idiomate appellamus Pietra Calamita. Foditur in Cantabria Hispania, & in varijs Germania, ac Bohemia locis, etsi saepe casu inueniatur in ferri fodinis. Praestat, qui ex Macedonia, & Magnesia illi contermina conuehitur: sed omnium praestantissimus est Indicus, & Aethiopicus. Differunt Magnetes colore, qui aut niger est, aut caeruleus nigricans, aut in nigro rufus, aut contra. Optimus est mas, qui non modo celerrime trahit ferrum, sed etiam vim suam in id adeo transfundit, vt possit alterum inhaerens ferrum ad se trahere: quo fit, vt sapiens cum acum trahat, adeo vt altera alteri subpendeat, nullus appositis adminiculis, ad duodenum vsque numerum. Quod item feris fit anulis, qui alter alteri inhaerentes catena instar dependent, tamen si postremus non tam pertinaciter inhaereat, vt primus & secundus. Ratio autem cur Magneti tantum facultas insit trahendi ferrum, nulli sane, quod sciam, adhuc comperta est, nec vlla eam philosophorum inuestigatio vnquam assequi potuit. Proinde necessarium fuerit dicere, illi vim huiusmodi tribuisse caelum, & rerum omnium parentem naturam, vt Rhabarbaro vim detrahendi bilem, & Torpedini maiora stupidam reddendi manum, qua ipsam viuentem tetigerit. Nec sane aliud quicquam inueniri putauerim, quod vim Magnetem magis amuletur, quam Torpedo piscis. Quandoquidem vt Magnetis admiranda facultas ex vna pendente ac in aliam transit acum, & ex annulo in annulum, idem similiter efficit Torpedinis virtus. Quippe hamo capta, ob stuporem eius facultas adeo confestim per setas virgamque excurrit, vt statim piscatoris manum miro sane stupore corripit. Idemque efficit retibus comprehensa, vt per funem aura instar excurrente. Caterum Dinocrates Alexandrinus (Plinius author est libro 34. cap. 14.) Arsinoes de Magnete lapide templum concamerare inchoauerat, vt in eo simulacrum eius e ferro pendere in aere videretur. Cuius forsitan rationem secuti Arabes, Turcarumque sacerdotes (si tamen vera referunt, qui talia scribunt) Mahumeti sacellum e praestantissimo Magnete concamerari iusserunt, vt imposita in eo Mahumetis arca e purissimo ferro conflata, tanquam diuino quodam miraculo in aere penderet, ita deceptis popularis. Trahit itaque Magnes propria vi ferrum, excepto eo, quod rubiginem contraxerit, vel vbi lapis is allio fuerit confricatus, aut vbi adamas prope adferat. Magneti vim sane contrariam habet Theamedes lapis in Aethiopia montibus nascens, non procul a monte magnetis: quippe quod appositum sibi ferrum confestim abigat respuatque. Quo fit, vt qui calceis ferreus per magnetis montem pergat, pedes submouere nequeant: per alium vero ambulantes, nunquam pedibus consistant, & veluti tripudiantes fiant. Atque ne fortassis quispiam censeret id esse fabulosum, ego quidem fateri possum, me Magnetis frustum habere, quod altera parte ferrum trahit, altera respuit. Magnes flauo cum are fusus, illud argenteo nitore colorat, quemadmodum calmia aureo, vt superius diximus. Magnetis breuiter meminit Gal. lib. 9. simplic. medic. sic inquit: Ex lapidibus vnus est & magnetis, & heraclea, qua vocant, ad similem haematite vim obtinens. Lapis, qui Graecis λίθος μαγνητικός & ἡρακλεός, Latini Lapis Magnes, Magnetes, & Heracleus appellatur: Arabibus Hager almagritos, seu Magnathis: Italia, Pietra magnete, & Calamita.

Theamedes lapis.

Magnetis vires ex Gal. Nomina.

Λίθος ἀραβικός.

LAPIS ARABICVS.

CAP. CVI.

Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitus haemorrhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

Nomina.

Nillum haecenus vidi, nec reperi lapidem, qui eburneam mihi ostenderit faciem: quapropter non crediderim Arabicum lapidem hoc tempore conuehi in Italiam. Eius tamen nomen Graecum est λίθος ἀραβικός, Latini Lapis Arabicus: Italicum, Pietra Arabica.

Λίθος

Λίθος γαλακτίτης. LAPIS GALACTITES. CAP. CVII.

Galactites appellatur, quod lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, & gustu dulcis. Ad o-
culorum fluxiones, & vlcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea
recondere, propter vim glutini, quod ei obhæret.

Λίθος μελιτίτης. LAPIS MELITITES. CAP. CVIII.

Melitites omnia galactitæ similis, hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem vt
galactites effectus.

Galactiten, item Melititen, etsi antea me non vidisse scripseram, dum tamen in Bohemia sum, vtrunque ex Misnia ab
amicis accepit. Alter tamen (vt Galenus inquit lib. 9. simplicium medicamentorum) Galactites vocatur, quod in suc-
cum solutus lactis speciem reddat: quem admodum alter melitites, quod siccæ dulcedine mel gustu representet. Galactitæ me-
minit Plinius lib. 3. cap. 10. sic inquit: Galactites ex vno colore lactis est. Eandem dicunt leucam, & leucographiam appel-
lant, & synnophitæ: tritæ lactis succo, & sapore notabilem. In educatione nutricibus lactis fecunditatem: infantium quo-
que ad aligata collo, saluam facere diuitur. in ore autem liquefcere. Eandem memoriam adimere dicunt. Mittit eam & A-
chelous amnis: hæc Plinius. Cæterum, vt testatur Agricola, non solum reperitur Galactites in quibusdam Saxonie monti-
bus, in Germania, sed etiã in quorundam fluminum alueis, pariterque Melitites. Lapis ille Græcè λίθος γαλακτίτης, Latine
Lapis Galactites: Italicè, Pietra Galactite vocatur. Hic verò Græcis λίθος μελιτίτης, Latinis Lapis melitites: Italis, Pietra
Melitite nominatur.

Galactitæ, &
melititæ hist.

Nomina.

Λίθος μορόχθους. LAPIS MOROCHTHVS. CAP. CIX.

Morochthus lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt, in Ægypto nascitur: quo, vt-
pote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis vestibus vtuntur. Spiracula corporis obstrue-
re videtur: conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, cæliacis, & vesicæ doloribus, cum aqua potus: itidem
fluxionibus vuluæ, & impositus velleri. Molliibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atq; de-
lachrymationes listit. Idem cerato exceptus, vlcera, quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem
perducit.

Morochthum lapidem nonnulli galaxiam vocant, nascitur (vt inquit Georgius Agricola, accertimus fossilium inda-
gator) in Saxonia Germania. Huius frustum non paruum ex Misnia misit ad me Georgius Fabritius, vir quidem
doctrina, & virtute clarus, nullis deficientibus notis ac viribus. Veruntamen cum nec inde, nec ex Ægypto, quod sciam, in
Italiam deferatur, cur plura de eo dicam, non habeo. Porro facit Morochthi lapidis adstringens facultas, qua cruentæ reie-
ctiones sistit, & corporis spiracula obstruit, vt alterius quoque lapidis hic mentionem faciam, admirabilis sanè facultatis
ad ossium fracturas. Siquidem tametsi perfracta ossa a Chirurgis non ante quadragesimum diem sanari solent, conper-
tum tamen est à compluribus in Germania, ea proculdubio sanari triduo, aut quatrinduo huiusce lapidis potu, seu quadrach-
ma pondere, ex rubro metaco cum mane, tum vesperi hausto. Sed interim os fractum restaurare, æquare, ac afferculis cir-
cumquaq; munire operæ pretium est, & affectum locum illinire vngueto ex Geraniy radicibus cœrulcum florem gerentis, &
lactentis ius axungia, siccatis prius radicibus, & in puluerem tritis, & deinde ex axungia præscripta in mortarium exce-
ptis. Extenditur enim super linteolo cera odorata imbuto, & fracto loco adalligatur. Est itaq; lapis is lógus perinde ac huma-
nus digitus, teres, crassitudine ferè annularis, & sape tenuiore, albicans, friabilis, tephacea intus substantia. Hunc primo ad
me misit excellens ac doctus Medicus Georgius Vvrt, qui olim in Aula Cesaris Caroli Quinti honorifice medicinam fecit.
Nascitur in eo Rhæni tractu, quem Germani die Bergstraf vocant circa Darmstat oppidum, duobus à Rheno miliaribus,
& reperitur in arena. Tale est enim illius loci solum. Sunt qui hos lapides, è planta cuiusdam bechio similis, radicibus, ibi
nascentis gigni existiment. Sed an hoc verum sit, mihi certo non constat. Germani hunc lapidem ab effectu appellant Bein-
bruch. Morochthi meminit Galenus vna cum scissili lapide li. 9. de simplicium medicamentorum facultatibus, sic inquit:
Sunt & alij lapides in succum solubiles, vt qui in Ægypto nascitur, quo vtuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est
autem omnium dictorum minimè qualitatis particeps, nec adstrictionem, nec morsum, nec abstersionem præseferens: quo
circa hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod defuisset videlicet: proinde cerato eum miscentes ad cicatricem vlceribus in-
ducendam in mollibus corporibus vsurpant. Sed & ocularibus miscetur facultatibus, perinde vt modo dicti. At quantum est
maiore emolliendi vi, quam prædicti, quod nullam videlicet effectricem qualitatem habeat, tantò etiam moderatior est,
maguq; dolorem leuat. Hunc lapidem quidam moroxum, nonnulli leucographida nuncupant: hætenus Galenus. Sed certè
nescio qua ratione, aut authoritate ductus sibi persuaserit Plinius libro 27. cap. 11. hunc non esse lapidem, sed herbam, vbi vna
cum leuca de leucographide disseruit: nisi fortasse fuerit vocabulorum similitudine deceptus. Lapis Græcis λίθος μορόχθους, Latinis Lapis morochthus appellatur: Italis, Pietra Morochtho.

Lapis ad offi-
um fracturas.

Morochthi
lapis vires
ex Gal.

Nomina.

Λίθος αλαβαστρίτης. LAPIS ALABASTRITES. CAP. CX.

Alabastrites vocatus onyx, crematus, resina aut pice exceptus, duritias discutit, stomachi dolores cum
cerato leuat: gingiuas comprimit.

Alabastrites notissimus lapis est is qui Romana inuiserunt adificia. Hallucinantur tamen, qui credunt lapidem illum
Alabastriten esse, quo hac tempestate torno varia finguntur vasa, quibusdam subnigricantibus venis discurrentibus,
pellucido leuore, materia verò adèd imbecilli, vt parum collisa facile frangantur. Quandoquidem lapis hic Alabastrita spe-
cies non est, sed potius gypsi materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad vasa vnguentaria cauabant, quò diutius vnguen-
ta à rancore vendicarent, nascitur (vt Plinius inquit lib. 36 cap. 8.) circa Thebas Ægyptias, & Damascus Syria. Hic cateris
M m m m z candidi-

Alabastritæ
confid.

Alabastris
vires ex Gal.

Nomina.

candidior. Probatisimus verò in Carmania, mox in India, iam pridem & Syria, Asiaque. Viliſſimus autem, & sine vlla uirtute in Cappadocia. Probantur quàm maximè mellei coloris in vertice maculosi: hac Plinius. Huius facultates meminit prodidit Galenus li. 9. simplicium medicamentorum, sic inquit: Et alabastrites vocatus vnguis in medicina, & in ingretur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis. Is Græcè λίθος ἀλαβαστρίτης, Latine, Lapis alabastrites dicitur. Italicè, Alabaſtro.

Λίθος θυίτης

LAPIS THYITES.

CAP. CXL

Lapis nomine Thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit. Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis obuersione, expurgat.

Fuchsio male
Turcicus lapis
Thyites
creditur.

Thyiten lapidem neque ipse haecenus inueni, neque ab alio compertum scio. Qui fortasse ex Aethiopia tantum petendus est, ubi eum gigni prodidit Dioscorides. Veruntamen Fuchsius medicus singularis doctrina, libro illo de compositione medicamentorum, quem collocupletatum secundo edidit, lapidem Dioscoridi Thyiten dictum, nihil aliud esse censet, quàm lapidem illum caeruleum, qui Italis vulgò Turchina, alijs verò Turcicus lapis appellatur, ut eius verba, quæ subijcitur, aperte declarant. Iaspis, inquit, Galeno duplex est. Vna subuiridis, quæ Dioscoridi Thyites, ut alibi diffusè monstratum dicitur. Thyites autem non est nisi e. i. Iaspidis species, quæ quòd aeri & cælo matutino autumnali similis sit, hoc est, carulea lacteque suffusa ἀπὸ πρὸς ἄνω Græcis, Iunioribus Turcica, Germanis Tūrckes nominatur. Quam certè appellationem verisimile est ex Thyitis deprauata voce promanasse, originemque suam duxisse. Altera viridis, quæ sic dicta est quia vires. Eius generis sunt genera, quæ alibi à nobis sunt ordine explicata. Quintum autem genus est Turcica vocata Iaspis, de qua iam dicemus. Haecenus de Thyite lapide Fuchsij sententia. Quæ sanè mihi nonnullis rationibus refellenda videtur. Primum enim non inuenio, quòd Galeno Iaspis in duo genera digeratur, in viridem scilicet, & subuiridem, ut illi Fuchsius adscribit. Sed ipsum viridis tantum meminisse constat lib. 9. simplicium medicamentorum, ubi de eius facultatibus disseruit. Nescit, quòd Galenus eodem libro in commemoratione Thyitis lapidis ex Dioscoride, hunc coloris esse scribat subuiridum quodammodo, ut Iaspis: siquidem Galenus eo in loco Dioscoridis verba refert, ut ex capituli illius titulo quisque certior fieri potest: id enim ita inscriptum legitur, Περὶ τοῦ Διοσκορίδου θυίτου. De Dioscoridis Thyite. Præterea equidem nescio, quò pacto Iaspis ille Turcicus possit esse Thyites, quoniam hic tum Dioscoridi, tum Galeno coloris est subuiridis, non autem saturati caerulei, ut ille. Ad hæc si lapis, qui ἀπὸ πρὸς ἄνω Græcis vocatur, & qui verè Turcicus est, Iaspidis generibus assignatur (quod ipse quoque Fuchsius asserit) non video, quo modo fieri possit, ut idem sit Dioscoridi Thyites: qui à nemine, quod sciam, inter Iaspidis genera recensetur. Postremò mihi quidem non videtur verisimile, quòd Turcicus lapis à Thyitis deprauata voce nomen acceperit: quam enim, quæso, illæ voces habent inter se similitudinem: certè nullam. Quare potius adducor, ut credam eam appellationem fluxisse ab Italica nostra lingua: nam quemadmodum in Italia caeruleus color, quem proprie cæli colorem esse volunt, vulgò turchino vocatur: ita etiam inibi lapis is, de quo sermo est à colore, quem caeruleum habet, Turchina nominatur. Ex qua nomenclatura postea factum esse arbitror, ut eundem lapidem iuniores Turcicum appellauerint: atque adeò simili imitatione fortasse ducti Germani ipsum Tūrckes dixerunt. Lapis, qui Græcis λίθος θυίτης, Latine item Lapis Thyites appellatur.

Nomina.

Λίθος ἰουδαϊκός

LAPIS IUDAICVS.

CAP. CXII.

Iudæicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis regulariter inter se distantibus, quasi industria detornatis. Solutus nullam qualitatem manifestam gustu præsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos in vesica comminuere.

Lapidis Iudæi
vires ex Galeno.

Nomina.

Lapis è Iudæa allatus, vnde & illi nomen, passim in officinis habetur. Utuntur eo medici non modò ad vesicæ calculos, sed etiam ad eos, qui in renibus fiunt, Galenum secuti, qui libro 9. de simplicium medicamentorum facultatibus, eum faciem ac vires descripsit, his verbis. Est & alius lapis viribus valentioribus in Palestina Syria proueniens, colore candido, specie concinna, lineas habens ceu torno ductas. Appellatur eum a loco, in quo nasci consuevit, Iudæicum, utunturque ad vesicæ lapides in cote soluentes, & ex aquæ calidæ tribus cyathis potui præbentes. Sanè in quibus nos experti sumus, proficit nihil, quòd ad lapides vesicæ pertinet: verum ad eos, qui in renibus hærent, effuax est. Λίθος ἰουδαϊκός: ita Græcis, Latine verò, Lapis nuncupatur: Arabibus, Hager alyendi, seu Agiar alihend: Italis, Pietra Giudaica: Germanis, Jüdenstein.

Λίθος ἀμιάντος

LAPIS AMIANTVS.

CAP. CXIII.

Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis: quo, utpote flexili, telas, & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora excurrunt.

Amianti lapidis
confid.

Vestes ex Amianto.

Plinij error.

Lapis Amiantus ita appellari cepit, quòd in ignem coniectus non modò non comburatur, nihilque splendore amittat, sed si sordidus fuerit, nihil deperdens, nitidus, & splendescens extrahatur. Idem vocatur Asbestos, quòd in lucernis pro elychnio impositus, non solum extinguatur dum aliquid olei supererit, sed nunquam comburatur. Idem lauitur, pedicatur, netur, texitur. Quare (ut Hierocles literis commendauit) Brahmænes Indorum Philosophi, ex eo sibi vestes parabant, ut diuinitatis specimen posteritati de se relinquerent. Ex eodem quondam etiam funebres Regum tunica fiebant, quibus induti in rogam imponerantur, ut corporum cinis, a lignorum cinere secretus scilicet usque, sepulchro conditi possent. Hinc Plinius, vel author quisque ille fuerit, à quo transcripsit, manifestò deceptus est, quòd putaret ex lino quodam Indiarum parari telas. Nam in libro decimonono, capite primo, de eo ita scriptum reliquit. Inuentum est etiam limum, quòd ignibus non absumeretur. Vinum id vocant, ardentesque in focis conuulsi ex eo vidimus mappas, sordidas exarsissimas splendentes igni magis, quàm possent aquis. Regum inde funebres tunica corporum suauillam ab reliquo separant. Nascitur in deserto, aduſtuque Sole India, ubi non cadunt umbres, inter diras serpentes, affueſcitque viuere ardendo.

R. 111

Rarum inuentu, difficile textu propter breuitatem. Rufus de cetero colos splendescit igni. Cum inuentum est, aequat pretia
 excellentium margaritarum: vocatur autem a Graecis Asbestinum, ex argumento natura. Anaxilaus author est, ex eo cir-
 cū datam arborem, surdis ictibus, & qui non exaudiuntur, cadi. Ergo huius lino principatus in toto orbe: Hec ille. Quae tamen
 partim fabulosa, partim vera apud me sunt. Obtusi nimirum ingenij opinantur, adde linum aliquod igni impositum non arde-
 re, ad transeant haec vna cum Salamādra fabulosa historia. Ego autem id erroris euenisse censeo ab Amiantis lapidis effectū. Linum viuū.
 Cum enim vidi, sent antiqui ex eo flamina duci, & telas, & mappas inde parari, linum viuū lapidem hunc ab opere eos
 appellasse credendum est: officina autem medici Alumen plumbeum vocant, id est existimantes, quod Graecis scispile dicitur. Sed
 meo quidem iudicio, falluntur, cum plumbeum alumen q̄, vocatum nulla adstringenti vi polleat, sed acri, nec in ignem con-
 iectum comburatur, quod Amiantis est proprium. In hac vulgari opinione ego quoque vna cum plerisque rei metallica stu-
 10 **diōsi** iam pridem versatus sum, donec clarissimus medicus Lucas Ghinus legitimum alumen scispile Pisis ad me misit, facie
 adeo Amianto simile, vt nisi a districtiora vis, qua pollet ipsum ab Amianto plurimum differre gustui indicasset, alterum sa-
 ne ab altero discernere nesciuissem. Nihilominus & ex eo discrimen cognoscitur, quod hoc in ignem proiectum statim exuri-
 tur, ille vero nequaquam. Hinc itaque fit, vt baud dubie credendum sit Alumen plumbeum vocatum legitimum esse Amian-
 tum. Ceterum non desunt impostores (vt auctor est Brasauolus Ferrariensis) qui lapidem amiantum simplicibus muliercu-
 lu ostendant, vendantque se penumero pro ligno Crucis seruatoris nostri. Id quod facile credunt, cum igne non comburatur,
 quodque ligni modo plurimum constet lineis intercurrentibus. Meminit Amiantis Plinius libro 36. cap. 19. vbi sic inquit: A-
 miantus alumini simili nihil igni deperdit. Huic veneficus resistit omnibus, priuatim magorum. Eius nomen Graecum λιθος
 ἀμιαντος: Latiniū Lapis Amiantus. Italicum, Pietra Amianto.

Alumen plu-
meum.

Alumen scis-
pile & Amian-
tum differūt.

Fraus impo-
storum.

Nomina.

20

Λιθος σάπφειρος

LAPIS SAPPHIRVS.

CAP. CXIV.

Sapphirus lapis percussis a scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bi-
 bitur. Exerescencia in oculis vvasque, & pultulas inhabet, & ruptas membranas cogit.

Sapphirus gemma colore constat cyaneo, perquam translucido. Lapis est omnibus notus, quod annulis, & torquibus, qua
 collo gestantur, frequenter inseratur. Plinius Sapphirus aureus punctis collucere scribit libro 37. cap. 9. Veruntamen hac
 arate nullum haecenus vidi Sapphirum, qui aureus colluceret scintillis, sed colore tantum cyaneo, adamantis modo translucido.
 Quo fit, vt putandum sit aut nostri vsus sapphirus esse cyaneos gemmas sapphiri amulas: aut hac in re errasse Plinium
 fatendum, quod fortasse caeruleum lapidem peculiariter vocatum, quem Mauritanii azulum vel lazulum dicunt, pro Sap-
 30 **phiro** acceperit. Nam nullus praeter hunc inter gemmas aureus emicat scintillis. Sapphiri vires perquam breuiter perstrinxit
 Galenus, cum tantum ad scorpionum ictus haustum prodesse scripserit. Ceterum adduntur hoc tempore in medicamenta
 ad cor facientia, & in antidota, quae aduersus venena, & pestiferos affectus parantur, non modo sapphiri, sed smaragdi,
 carbunculi, granati, sardonij, hyacinthique: tamen praeter medicorum spem, potantes plerunque fallant: quod rara admo-
 dum sint seplasia, quae huiusmodi gemmas agnoscant, & legitimas habeant. Caueant itaque medici, ne decipiantur. Ide-
 40 **um** fiet, si vbi vs opus fuerit, peritissimos probataq̄, fidei consuluerint gemmarios: quippe gemmarum ramenta, quae in se-
 plasis habentur, adulterij, & imposturi non vacant. Adde, quod plerunque alterum alterius vice supponunt. Putant enim
 chrysopatos aureo colore nitentes hyacinthos esse, qui tamen amethystum colore referunt. Praeterea obseruandum est, vt
 gemmarum ramenta, si qua legitima, praclaraque inueniuntur, quin & margarita, & coralli super lapide porphyrite tam-
 diu atterantur, vsquedum redigantur in puluerem tenuissimi pollinis instar. Et sane aduertant medici, quibus cura est, vt
 plus honoris, quam auri lucentur, ne corallia in aeneis mortarijs conterantur. Nam si id inconsulte fiat, derasis delimitis-
 que aeneis mortarijs, ferreisque pistillis, ariū & ferri scobs corallijs admista, noxium & venenosum reddet medicamentum,
 magna egrotantium iactura. Quandoquidem vidi ego sapius multerculas, quae corallia & margaritas in aeneis mortarijs
 contriuerunt, & subinde suis egrotantibus propinatunt, qui vs degustatus in maximum deducti sunt discrimen. Qui lapis
 λιθος σάπφειρος Graeci, Lapis sapphirus item Latinus dicitur: Italicus, Sapphiro.

Sapphiri con-
sideratio.

Sap. vires.

Gemmarum
ramenta in
offic. adulte-
rata.

Corallia vt
conterenda.

Nomina.

Λιθος μεμφίτης

LAPIS MEMPHITES.

CAP. CXV.

Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur calculorum magnitudine, pinguis, versicolor. Tra-
 dunt trito, & illito, quae vrenda, aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant
 50 **cruciatum.**

Λιθος σελήνιτης

LAPIS SELENITES.

CAP. CXVI.

Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inuenitur lunae imaginem red-
 dere, quae cum ea quidem augetur, & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, leuis. Huius
 ramenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores adal-
 ligato eodem frugiferae redduntur.

Memphites lapis hodie, quod sciam, ad nos ex Aegypto non adfertur, tamen si vulnerarijs medicis sapissime desideretur, Memphite &
 60 **ubi** integra partium sectione sit opus. Seleniten vero etsi antea non videram, emi tamen hoc anno a peregrino quo-
 dam, qui e Galitia Hispania, vbi diui Iacobi templum inuiserat, in patriam reuertebatur. Hic lapis vitri modo translucet,
 & facile in tenues finditur laminas: quo fit, vt vs in locu, vbi frequentissimus habetur, vitri vices expleat, ad concludendas
 adificiorum fenestras. Quidam quod speculi imaginem reddat, Specularem lapidem vocant. Ceterum quoniam hic trans-
 lucidus lapis Crystallum nobis in mentem redigit, cum expetatur id sapius in medicum vsus, silentio inuoluendum nō du-
 ximus. CRISTALLVM itaq̄, vt Plinius inquit lib. 37. ca. 2. gelu vehementiore concrescit, nec alibi certe reperitur, quam
 vbi maxime hyberna niues rigent, glaciemq̄, esse certum est, vnde & nomen Graeci dedere. Hec Plinij de crystallo sententia. Plinij senten-
 Nos vero contra rationibus non obscuris innixi (quod etiam peritissimus Agricola sentit) Crystallū censemus nec glacie, nec
 niue fieri vnquam: sed eo ipso humore, quo in terra visceribus gignitur beryllus, adamant, & alij id genus lapides. Gigni au-
 tem i- tem cy-

Memphite &
Selenite con-
sideratio.

Crystalli hist.

Plinij senten-
tia explorata.

tem crystallum ex humore omnium purissimo sanè constat, quòd omnium gemmarum clarissimū, translucidissimūq; fr. Probatur sic gigni, non autem (vt Plinius inquit) ex glacie, vel niue: quoniam vnaquaque glacies quantumvis longo tempore concreta in algidissimis montibus, à quibus nec hyeme, nec aestate nix vnquam recedit, etiamsi e profundis partibus eruat, liquefcit tamen in calidis locis reposita, non modò ignis, sed solis etiam calore. Namque id ipsum Crystallo enetra, igni vel solibus admoto, si è niue aut glacie concreveret: reperireturq; tantum in montibus perpetuo niuosis. Verum cetero cum reperiat, etiam in marmorum, aliorumq; lapidum, & metallorum fodinis in Hispania, Germania, Scythia, Cipro, Carmania, & in Nerone, & Chiti rubri maris insulis, quin & in agris, vbi seges feritur, vbi aratro sepius magna crystalli glebas fodere bubalci, liquido sanè cõstabit, ex alia materia gigni crystallum, quàm glacie. Siquidem id, quòd in præruptis montium scopulis inuenitur, superficiei tenus coherens, ex purissimo lapidescente humore in visceribus terræ concrefcere non dubitauerim: quo tamen tractu tēporis pluuiarum impetu, quæ in præruptis montium vniuersam detradunt terram denudari crediderim. Quapropter non temere dixit Plinius, liquido se affirmare posse in cauitibus alpium nasci ad eò inuis, vt plerunque fune pendentes id extrahant homines. Huic alia accedit ratio, quòd glacies per aquas munit, crystallum verò illico subsidat. Porro Pliniana sententia, præter hæc res agatur apertissime Iulius Solinus cap. 20. Polihistor. his verbis. Ille & crystallus, quam licet pars maior Eroupa, & particula Asia subministrat, preciosissimum tamen Scythiaedit. Destinatur ad pocula: nam fert calorem præcipuè quamlibet nihil aliud quàm frigidum pati possit, sexangulus inuenitur. Qui eligunt purissimum captant, ne quid rufum neue nubilum, vel spumis oblitum arceat perspicuitatem. Tunc ne irritia iusto propensior obnoxium fragilitati magis faciat. Putant glaciem coire, & in crystallum corporari, sed frustra. Nam si ita foret nec Alabanda Asia, nec Cyprus Insula, hanc materiam procrearet. Quibus regionibus incit arissimus calor est. Liuis Augusti ad magnitudinem centum quinquaginta librarum inter capitolina donaria crystallum dedicauit. Præcipuum illud existimant, quòd album & aqua clarissima modo pellucidum visitur. Vis crystallo adstrictoria: proinde dicitur in puluerem tenuissimum tritum vtiliter dysentericis ex vino austero. Alba vteri profluvia sistit, lac verò nutritiuus æque, quòd à Tridentinis mulieribus didicimus. Fiebat quondam antiquis è Crystallo pila, qua aduersus solis radys exposita medici corpora vrebant, igne inde concitato. Sed vs tantum id cauterij genus admouebant, qui candente ferro perterriti vni reformidabant. Sed & nos huiusce cauterij periculum fecimus, non sine agrotantium, & astantium admiratione. Latini qui Græcis λίθος μαμαίτης, Latinus lapis Memphites, Italis Pietra Memphite vocatur. Qui verò λίθος σελήνης, Græcis λίθος σελήνης, Latine, Pietra selenite, Italicè appellatur.

Crystal. histo.
ex Solino.

Crystalli vi-
res ex Gal.
Cauterium
ex Crystallo

Nomina.

λίθος ιασπίς.

LAPIS IASPIS.

CAP. CXVII.

IAspidum quædam sinogradum imitatur: alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis ære. Ob id vocatur ærizusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento vocatur: quædam lineis abo resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata: alia terebinthinæ similis, quæ terebinthizusa dicitur: alia colore callaida gemmam æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensa.

Iaspidum ge-
nera.

Iaspidum na-
tura.

Iaspidis vires
ex Gal.

Nomina.

IAspidum genera longè plura recensentur, quàm quæ à Dioscoride describuntur. Quandoquidem quædam visitur in copioso, aut glauco pingui similis, id est, viridis lacte suffusa. Alia purpurea, qualis nascitur in Phrygia. Alia reseda, & quæ si floribus tincta, qualis in Ida monte profundissimis specubus foditur. Alia ex purpura cœrulea, qualis inuenitur in Cappadocia. Alia ex rubro nigra. Alia iecoris imitatur colorem, quæ si saturatiore colore reperiat, lineis eiusdem coloris inanis, & nigri tingi solet. Quædam niuem imitata rutilis punctis respergitur. Quædam onyche pungitur, aut ex altera parte iaspis est, ex altera onyx, proinde iasponyx vocata. Alia cuius altera parte sit purpurea, altera viridis, nec vniq; præcipuum, sed qua parte vireat. In summa varia est Iaspidum natura. Suspensas ad plura valere aiunt, nempe ad omnem sanguinis fluxum, ad protegendum conceptum, & partum iuuandum, veneremq; inhibendam, & febrem, & hydropem sugnam. Nec desunt superstitiosi, qui dicant Iaspidas homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdam magicis verbis amantur, priusquam suspendantur. Ex tot Iaspidis generibus viridis tantummodo meminit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, vbi de facultatibus eius ita differuit. Proprietatem nonnulli lapidibus quibusdam testimonio suo describunt talem, qualem re vera habet Iaspidis viridis, nempe stomachum, ventriq; os iuuans appensa. Ac nonnulli quoque ipsam annulis inserunt, scalpuntq; in ea draconem radios habentem, velut rex Nechepsos scripsit in quartodecimo libro. Sane huius ego quoque lapidis abunde periculum feci. Torquem enim ex huiusmodi lapillis confectum a collo suspendi, ita in lapides os ventris contingerent. Apperebant autem nihilominus prodesse, etiam si sculpturam non haberent, quam descripsit Nechepsos: hæctenus Galenus. Qui lapis Latinis Iaspis, Græcis λίθος ιασπίς, dicitur: Italis, Diaspro.

λίθος αἰτίτης.

LAPIS ÆTITES.

CAP. CXVIII.

Ætites lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in vtero sonante. Gravidis continet partus, cum lubrica sunt vuluæ, & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, vt sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus furem coarguit: quippe decoctum cum eo deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excafciente, comitialis magnifice iuuat.

Ætites lapi-
dis hist. & vi-
res.

Ætiten Græci, Latini Aquila lapidem dicunt, quòd aliquando in earum reperiat, etiam in nidis. Variat lapis huiusmodi colore, & magnitudine, & vulgaris est notitia. Meminit huius Plinius libro 36. cap. 21. his verbis. Ætites lapides ex ægæto nomen magnam famam habent. Reperiuntur in nidis aquilarum, sicuti in decimo volumine diximus. Sunt in nos inueniri, marem, & feminam: nec sine vs parere, quas diximus aquilas, & ideo binos tantum. Genera eorum quatuor. In Aphrica nascentem, pusillum & mollem, intra se, ac velut in aluo habentem argillam suauem, candidam, & in aluo habentem durum lapidem: tertius in Cypro inuenitur, colore illis in Aphrica nascentibus similis, amplior tamen, & durior, & in aluo tatus, ceteris enim globosa facies. Habet in aluo arenam iucundam, & lapillos: ipse tamen nullis, vt etiam digitis iugiet. Quatuor generis Taphiusius appellatur, nascens iuxta Leucadè in Taphiusa, qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucadè.

inuenitur in summis candidus & rotundus. Hinc est in alio lapis, qui vocatur callimus, nec quicquam tenerus. Haec Nomina. Plinius. Arabice: حجر ابيض; Graecus dicitur, lapis Actites Latinus vocatur: Arabibus, Hager achta-mach: Italis, pietra d' Aquila.

Λίθος οφίτης.

LAPIS OPHITES.

CAP. CXIX.

Ophites genera multa quidam ponderosus, & niger alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdam candidis intermixtus est. Omnes alligati contra capitis dolores & serpentium ictus profunt. Feruntur, qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari.

Ophites lapidis meminit Plinius libr. 36. ca. - sic inueniens. Ex ophite columna, sed parua admodum inueniuntur. Duo eius genera, molle candidum nigricans durum. Dicuntur ambo capitis dolores sedare adalligati, & serpentium ictus. Quoniam pumicis, ac lethargus adalligati uident candidantem. Contra serpentes autem a quibusdam laudatur, precipue ex his, quem sephitiam appellant a colore cineris. haec Plinius. Verum Ophites marmor, quod vulgo vocamus Serpenteo, porphyrite sive lapidis inftar durissimus est, colore minime nigricante, nec candido, nec cinereo, ut in suo requirunt Dioscorides & Plinius, sed viridi saturato, dilutus candidi coloris maculis repperso. Ex quo sane constat antiquorum Ophiten a nostrate maxime fuisse diuersum. Ophite lapidis vires tradidit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, ubi sic inquit. Ophites quem vocant lapis vsus extergendi contingendiq; vim potidet, ceu etiam vitrum. Admodum enim ipsum ex vino a. 300 tenui epotum lapides resica comminuit. Verum ipsum in lapidibus quispian forte non numeret. Et infra in lapidibus viridis mentione de Ophite ita scribit. Porro lapidem ophiten deprauati sunt Graeci codices, qui habent οφειτης vir sive dignus se veniuntare morjus a vipera suspensum retulit. Sed eiusmodi facultates extra vsus sunt methodo constantem: velut etiam Hieracius, & Indus, cum profluentem ex haemorrhoidibus sistunt sanguinem. Lapis Graecis λίθος οφίτης, Latinis, Lapis ophites: Italis, pietra Serpentina vocatur.

Ophite lapidis hult.

Ophites marmor.

Ophitis vires ex Gal.

Nomina.

Λίθοι εν τοις σπόγγις.

LAPIDES IN SPONGIIS.

CAP. CXX.

LAPIDES in spongiis inueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vino poti.

Lapides in spongiis reperti, omnibus noxissimi sunt: quippe quod rarissime sint spongiae, quae hisce lapidibus vacent. Horum vires retulit Galenus lib. 9. simplicium medicinis verbis. Lapidis, qui repertiuntur in spongiis, frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapidem in vesica comminuant, vnde qui id scriptum reliquerunt, mentiri sunt: verum qui in renibus consistunt rumpunt, velut qui ex Cappadocia conuehantur, quos in Argeo nasci aiunt. Soluuntur autem in succum colore lacteum: ex quo liquet, quod extenuandi vim obtinent, absq; ut insigniter excalsfaciant. Arabice, Hagiur alsfengr: Italicè, Pietre delle spugne.

Lapidum spongiarum vires ex Gal.

Nomina.

Λιθοκόλλα.

LITHOCOLLA.

CAP. CXXI.

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur: conflatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, in comodos oculis pilos replicare.

Λίθος οστράκινος.

LAPIS OSTRACITES.

CAP. CXXII.

Ostracites testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtuntur. Menses drachmæ pondere potus ex vino sistit. Si quatuor diebus a purgatione bibatur siclici pondere, scemnis praestat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Ostraciten lapidem, quo pumicis vice vsa est antiquitas, haecenus mihi videre non licuit: quanquam reperiri hunc in Hildesheimio circa antrum a nans appellatum, colore subrugeo, & ostracorum testis similem, libro quinto de natura fossilium scribit Agricola. Eius vires tradidit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum, sic inquit: Porro ostraciten vocatum lapidem predicare quosdam sudio, quasi desiccandi valenter facultatem obtineat, temperatam ex adstrictione, & acrimonia, velut & Geoden nomine, pupillas expurgare, & vberum testiumq; phlegmonas sanare, ex aqua videlicet inunctum. Lapis Latinis ostracites Graecis λίθος οστράκινος dicitur: Italis, Pietra ostracite.

Ostracite lapidis confid. & vires.

Nomina.

Σμύρις λίθος.

SMYRIS LAPIS.

CAP. CXXIII.

Smyris lapis est quo annularij sculptores lapides expurgant, ad erodendum, & vrendum utilis: gingiuis, quas humor vexat, prodest: dentificio commendatur.

Άμμος αιγιαλίτις.

ARENA LITORALIS.

CAP. CXXIII.

Arena è litoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenuis in ea obruantur. Torrerit solet ad aridos fetus, pro milio aut sale.

Smyris vulgò nobis Smeriglio, notissimus est lapis, praesertim quod eius puluere expoliantur gemmae, & armorum omne genus. Vitrum quoque Smyride lapide finditur, quemadmodum & adamante, tanta inest ei durities. Huius vires Galieno lib. 9. simplicium medicamentorum, his verbis describuntur. Sed & Smyris vocata, quod multum abstergentem habeat facultatem, clarum est vel ex eo quod dactyloglyphi, hoc est, qui anulos exculpunt, eum in vsu nullo vtantur. Quin etiam quod dentes puros efficiat, experis sumus. Lapis, qui Graecis λίθος σμύρις. Latinis lapis Smyris appellatur: Italis, Smeriglio. Quae verò Latinis Arena litoralis, Graecis άμμος αιγιαλίτις: Italis, Arena marina dicitur.

Smyridis consideratio, & vires ex Gal.

Nomina.

Αμμος & Αιγιαλίτις.

Ακόνη ναξία

LAPIS NAXIVS.

CAP. CXXV.

ECote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit: virginum mammae cohibet, nec incrementum patitur. Potum ex aceto lienem absumit, & comitialibus prodest.

Αίδος γεώδες

LAPIS GEODES.

CAP. CXXVI.

Geodes lapis adstringit, ficit, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium mamma- rumque inflammationes sedat.

Naxos est Co-
te appellatū.Naxij vires
ex Gal.

Nomina.

Naxium lapidem nullis prorsus notis descripsit Dioscorides, sed illum legitimum esse censeo, quo passim utimur ad ca-
tellos acuendos, & fanarias falces, nobis vulgò Cote appellatum. Geodem autem, cum ita à terra denominatum esse
putem, me saepius vidisse crediderim, cum in Bohemia, Misnia & Saxonia lapis quidam subrotundus, colore ferrugineo re-
periatur, qui suam terram non modicam intra se concludit. Naxius autem, Galeni testimonio, non solum virginum
mammarum incrementum prohibet: sed & pueris testes crescere non patitur, tanquam videlicet particeps facultatis re-
frigeratoriae. Lapis, qui ἀκόνη ναξία, Graeco, Latinis lapis Naxius, ut etiam Italis pietra Naxia nominatur. Qui vero αίδος
γεώδες Graeco, Lapis Geodes Latine, pietra Geode Italicè dicitur.

Γῆ ὅλη

TERRA OMNIS.

CAP. CXXVII.

Omnis terra, ad medendi usum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatusque ob-
ducendi, occludendi que: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis.

Γῆ ἐρετρια

TERRA ERETRIA.

CAP. CXXVIII.

Eretriades duæ sunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem
vergens, perquam mollis: quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur, ut
cerussa, aut hunc in modum. Teritur leotum, cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur: sic
cata solibus, iterum teritur interdium, adiecta aqua, ut vespere confidat: antelucanis colo excernitur, & de-
mum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine acci-
ris in fictile perforatum coniciuntur, oreque vasis diligenter obturato, supra carbones candentes con-
nenter solibus perflantur: ubi verò cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem contraxit, exempto
reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & langu-
nolenta conglutinat.

Γῆ Σαμία

TERRA SAMIA.

CAP. CXXIX.

Samia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis
cuiusmodi est, quam aliqui collyrion vocant. Duæ enim species eius: vnam antè diximus: altera vix
appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur, ac lauatur, ut eretria, vimque consimilem habet. Scia-
guinis reiectiones sistit: fœminis fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris puniceæ datur. Testium,
& mammarum inflammationes, illita ex rosaceo, & aqua, refrigerat: sudores arceat: contra serpentium
morsus, & venena pota ex aqua auxiliatur.

Αίδος Σαμίου

LAPIS SAMIUS.

CAP. CXXX.

Samius lapis in Samia terra inuenitur, quo aurifices vtuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur
candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans: prodest stomachicis potus: sensus hebetat verum
ad fluxiones oculorum, & vlcera, cum lacte efficax est. Partus, ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus
fœminarum custodit.

Terræ Samiæ
consideratio.

Aster.

Talcum non
esse Samium.

Petra S. Pauli.

Terra, quam Samiam vocant, an ex Samo deferatur in Italiam, non equidem affirmarem, nisi legitimam viderem.
Hanc primum mihi misit eruditissimus medicus, & simplicium indagator non postremus Alphonsus Pantium Ferrar-
iensis. Hac enim cum frangitur radiantes quasi stellas ostendit, vnde illi Asteris nomen. Præstitit Samia terra maximam
in medicina usum Galeni tempore, qui ea, quæ aster appellatur, tanquam præstantiore semper usus est: huic tamen Dio-
scoridi præferitur illa, quam aliqui collyrion vocant. Sunt qui putent Samium astra illum esse lapidem, quem sepulchra Tal-
cum nominant. Sed y, meo quidem iudicio, hallucinantur: quandoquidem Talcus linguæ contactu nunquam glutinis
modo adhæret, attritu contumax est, nec cotis instar prædurus visitur. Adde quod Talcus non sit crustosus, sed squamosus,
translucidus, ut vitrum, ac leuis: & quod non nisi magno labore, & diutino igne comburi possit: nec id quidem per se fieri
potest, nisi quibusdam admixtis, quod tamen Samio astra non euenit, ut pote qui facile teste Dioscoride, Eretria terra mo-
do comburatur. Ad hæc scians Medici Talcum ebibitum strangulare, non secus ac gypsum: cum tamen Samius aster per-
inde atque Lemnia terra, contra venena, & venenosorum serpentium ictus maxime auxiliatur, & ut illa labijs & lingua
inhæreat. Id quod aliquando animum traxit ad credendum, eam terram vel Samiam, vel Samia similem esse, quam ma-
gnifaciant circulatores, qui serpentes circumferunt, à Melita insula allatam: quamq; vulgò vocant Pietra di San Pauli.
Siquidem hæc colore candida spectatur, linguæ tangenti pertinaciter adhærescit, mollis est, & succosa, facileq; friabilis: &
aduersus venena, & serpentium ictus Lemnia vicem explet. Caterum neque illud ausim asserere, quod lapidem Samium
vocatam ad nos conuehant mercatores, quo aurifices aurum, & argentum antiquitus poliebant: etsi hunc quoque in Ger-
mania reperiri scribat Agricola. Terra Samia sive Latine, atque Italis, ut γῆ Σαμία Graeco appellatur. Lapis vero αίδος
Σαμίου Graeco, Lapis Samius Latine, & Pietra Samia Italicè nominatur.

Γῆ χία

TERRA CHIA.

CAP. CXXXI.

CHia eligi debet candida, vergens ad cinereum, Samiæ similis. Est autem crustosa, † albaque, sed ficti- † Orib. & λε-
tus formis differens. Vis eadem, quæ & Samiæ: extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: πῆ. i. tenuis-
colorem in facie, & corpore toto commendat: in balneis pro nitro deterget. que.

Terram Chiam notis omnibus legitimam, misit ad me superiori anno Alphonfus Pantius medicus Ferrariensis.

10

Γῆ σελινυσία.

TERRA SELINVSIA.

CAP. CXXXII.

Eadem præstat Selinusia: maximè laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima.

Hanc à me antea non visam, albam, splendentem, atque friabilem, misit ad me idem Alphonfus Pantius.

Γῆ κίμωλια.

TERRA CIMOLIA.

CAP. CXXXIII.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, vtraque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur.

Γῆ πνιγίτις.

TERRA PNIGITIS.

CAP. CXXXIIII.

Quæ pnigitis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis ad- moueat, refrigerabit: tactu linguæ vsque ad glutinosa, vt pensilis hæreat. Cui effectus idem, qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade vendunt.

30

Ὀστρακα τῆς ἰτνῶν.

TESTÆ FORNACEÆ.

CAP. CXXXV.

Fornacæ testæ vehementer tostæ, crustas vlcerebus obducunt: quare prurigini, & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt: strumas discutunt, cerato exemptæ.

Γῆ ἐκ τῆς κερμένω.

TERRA FORNACVM.

CAP. CXXXVI.

Fornacum terra, quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testa effectus.

Γῆ μελία.

TERRA MELIA.

CAP. CXXXVII.

40

Melia colore cineream eritream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitar. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam liccat: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiligines, & lepras abstergit. Pictoribus vsum præbet, vt colores diutius perennent. Emplastris viridibus, quæ chlora dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni melia terra, & omni alia in vniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, faciliè resoluatur.

Quamuis terra Erethria, Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, & Melia antiquis notissima fuerint, & in vsu medico frequentissima, vt author est Galenus, non tamen ab his, qui nos præcesserunt, adeò neglectas fuisse constat, vt pauci admodum sint hac ætate, qui eas agnoscant. Ego autem & Pnigitem, & Erethriam sum consecutus, Alphonfi Pantij medici Ferrariensis, liberalitate. Verum cum terras has non habeant in Myropoliis, operapretium non duxi, vt in singulis motam traheremus, ac de earum historia & viribus latius differeremus. Qua terra γῆ χία, σελινυσία, κίμωλια, πνιγίτις, με- Nomina.
λία Græci, Latinis, terra Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigitis, Melia: Italis, terra Chia, Selinusia, Cimolia, Pnigite, Melia vocantur: Arabibus verò terra Cimolia, Teri chimolea, seu Thun chimulia: Pnigitu, Terri hanem.

Γῆ ἀμπελίτις.

TERRA AMPELITIS.

CAP. CXXXVIII.

EX ampelicide terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos carbones referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquefcit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi, & refrigerandi habet: ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas vites, sub germinationis tempus, vt pote cum innascentes vermiculos enecet.

Ampelitis, vt author est Galenus libro nono simplicium medicamentorum, hoc sibi nomen iure vendicauit, quòd anti- Ampelididis
quæ in frequenti haberetur vsu, ad præseruandas ab erucis vitium gemmas prima earum germinatione, quemadmo- terra confi-
dam nos visco circumlito nostras tuemur in Hetruria. Pharmacitis verò dicitur, quòd medicamentosa maximè sit. Siqui- detatio.
dem non modo vermiculos ad vites ascendere inhibet, sed etiam eos interficit. Hac vsque adeo bitumine referta est, vt Pli-
nius, & Posidonius, bitumini similem ipsam fecerint. Cuius experimentum est, si facile in oleo imposta, liquefcit.
Quamobrem credere nonnulli Ampelitim terram crustosum illum fuisse lapidem, quem scribit Galenus se inuenisse
in Lycia

Ampelitis à
Gagate parū
differt.
Nomina.

in Lycia litoribus, & in caele Syria, qui in ignem coniectus leuiusculam edebat flammam. Hoc argumento nisi, quod idem scripserit se reperisse lapidem illum in quodam colle omni ferè ex parte circumdato ab Asphaltite lacu, quem Sodomem vocant, ex quo bitumen in ipsum labitur lacum. Quapropter non desunt, qui dicant, Galenum haudquaquam non esse, cui lapides nil aliud esse, quàm terram ampelitidem: quæ cum piccum referat carbonem, vt Dioscorides ipse testatur, non modum, si potius lapidis, quàm terræ speciem præ se ferat. Non ab re itaque credendum fuerit, Ampelitim terram non admodum à Gagate lapide differre, quippe quòd vtræq; ex terra & bitumine suam traxerint originem. Ampelitis nuper in Carniola, vbi foditur, ad me allata est, nullis reclamantibus notis. Hac, quæ γῆ ἀμπελίτις Græci, Latini Terra Ampelitis appellatur: Arabibus, Thin Alcharin: Italis, Terra Ampelite.

Ἀσβόλη ζωγραφικὴ.

FVLIGO PICTORIA.

CAP. CXXXIX.

FVligo, qua pictores vtuntur, ex vitrariis officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. Vis ad adstringendum, & erodendum efficax: fracta, cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Μέλαν γραφικόν.

ATRAMENTVM LIBRARIVM.

CAP. CXL.


Atramentum quò scribimus, fuligine è redis coacta colligitur. In singulas libras gummi, ternæ fuliginis vnciæ adiiciuntur. Fit etiam è resinarum, & pictoria fuligine, de qua paulò antè diximus. Admittitur autem fuliginis mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sesuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamētis: ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè soluatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis siquidem vlceribus, sua sponte decidit. Caterùm habet amicissime Arce, ferè quæ tradenda duximus pro operis modo, quem destinaueramus, & materiarum, aliorumque medicinalium copia.

Nomina.

DE fuligine pictoria, atque etiam de Atramento librario latius & apertius à Dioscoride scriptum est, quàm vt de his plura nobis supersint dicenda, vel declaranda. Quare iam vnà cum authore nostro, huic quinto libro finem imponamus, atque insuper DEO, cui omnia, quæ à nobis fiunt, aut dicuntur, accepta ferre par est, immensas agamus gratias. Ea fuligo, quæ ἀσβόλη ζωγραφικὴ Græcè, Latine Fuligo pictoria dicitur, quemadmodum Italis Fuligine de pittori. Quæ τὸ μέλαν γραφικόν Græci, Latini Atramentum librarium, Italis Atramento librario, aut Inchiostro nominant.

LIBRI QVINTI FINIS.





10 P E T R I A N D R E A E
M A T T H I O L I , M E D I C I
Senensis Commentarij,

20 I N L I B . S E X T V M P E D A C I I D I O -
S C O R I D I S A N A Z A R B E I , D E L E T H A L I -
bus venenis, eorumq; præcautione & curatione.

Præfatio Dioscoridis.

30 **S**UPERIORIBVS, amicissime Aree, libris tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & earundem fructibus, lacrymisque: item animalibus, melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radicibus, liquamentis, vinis, metallisque. In hoc verò totius operis vltimo, facultates medicamentorum recensēbimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur. Huiusmodi autem tractatus cum bifariam distributus sit, in partem venena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes, aut si quando per imprudentiam dentur, ut tum quoq; innoxia fiant, irritaque: & in ratione iis succurrendi, qui iam noxam sentiunt: primum differam de præcauendi modo, quem esse difficillimum pleriq; maiorum arbitrantur, quòd dantes clam venena ita insidias temperāt, ut peritissimum quēq; decipiant. Siquidem venena sua amaritudine, permixtis dulcibus, spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorum eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ tuendæ sanitatis gratia dari putātur, & præsertim in valetudine, ut absinthium, tragoriganum, saturciam, aut hyssopum, quinetiam thymum, irim, organum, abrotonum, castorium, aut si quid medicamenti purgatoris cognatam habere qualitatem videatur. Aut potionibus inserunt, ut vitis asperis, iuribus, passio, mulsa aquæ, musto: succis, ut in cremore lentis, polentis: aut medicaminibus, aut aliis, quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Quare qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salorum, aut acidorum abstinere: nec sitibundi assatim bibere, aut elurentes voraciter comesse, semperque ad saporem horum diligenter attendere, præsertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates egerrime postea concoquantur. In ægris quidem facile cauemus potiones auxiliij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi beneficiorum artifices: itaque ob id laborantes morbo non perinde audentium iniuriis patent. Et hæc quidem ne facile incauti seductiq; homines capiantur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, ut suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires heberent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi caricæ sunt cum iuglandibus nucibus manducatæ, & quæ cedromela vocant, id est citria, seminisq; napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum vino: aut rutæ folia, & nucis iuglandis nucleum: aut caricæ duas, & salis callum ieiuni sumant, & nullo veneni genere lædentur. Antidota ex vino sumpta, eundem effectum præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithridarium, & quod sanico, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculiare quidam corporum affectus certo quodam modo constitutorum, cum quadam cibi, potusque qualitate, tum vini copia ita temperatorum, ut cum venenis dissentiant: siquidem ingesti veneni vires frangunt, atque iam priore alimento fractis, præclusisque meatibus, obstant, ne membratim per digestionem insinuetur. Verum enimvero, quoniam fortunæ necessitas interdum similia discrimina peregrè agentibus adfert, absque vllis insidiis hominum, non nihil dislerendum mihi de hac re necessarium duco. Iam primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibosque & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commodè nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi, apponendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda: frequenter enim à superioribus contabulamentis animalia decidunt exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, ut phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Porro vinarum vasa diligenter intueri oportet: namque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum verò delapsa immersaque expirarunt, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hætenus dicta sint, ne cauti, & prouidi insidiis pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidiis sumpserunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit: siquidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paulisper negiectum, medicamenti ægrè cedit. Quare si qui pro comperto se virus sumpsisse intelligunt, & fateantur, aut eo-

rum, qui aderant, testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari, ratione
 constitutioni restituemus. Neque enim iis assentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhi-
 beri contendunt. Quo enim modo morbi, quorum causa cæca, latentisque corporibus insident, me-
 dicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medendi rationem aspernantur? Equè verb
 omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proque antecedentibus affectionibus quibus-
 tibusque, quibus sit opportunum corpus, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod
 si qui forsitan obmutescunt, aut temulenti, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nullam nobis con-
 cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad ea, quæ communiter e potis quibuscumque vene-
 nis opitulari consueverunt. Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, quam ut proximo
 loco virus foras exhauriatur, priusquam inualecat. Quare sine mora calidum oleum ex aqua, aut iecoris,
 ut vomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut ma-
 ua, aut lini semine, aut trago, vrtica, fæno græco, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non
 modo vomitionibus exigent vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducunt, &
 corporum inanitione ita aduersabuntur, ut acrimonias venenorum hebetent. Id quod euidenter humi-
 cemodum argumento deprehendere licet. Esto, ut quisquam viua calce, vel fæce, aut cantharidibus, aut a-
 lio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet.
 Atqui neque vehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam
 vomitus non ob id modum, quod vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamentum adfert: sed quod
 assumptum virus nonnumquam odore, coagulatis grumis, aut colore prodatur: quippe cum odore, &
 amaritudine, meconium: colore, cerussam, gypsumve: grumis, lac aut sanguinem animalis recens
 gulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehendit: non
 nonnulla ab iis remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo etiam ma-
 decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps ascerinus, aut pinguium carniū iura, aut luxiuum
 gnorum cinere factum. Vbi verò vomitus diligenter citatus fuerit, nequid in ventre coierit, quæ hæc
 intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & vina re-
 tera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesque, & quæ adipe aut
 recenti butyro parantur. Aluum namque subducunt, vti diximus, & stomachum resoluentia, profusionem
 ipsum ad vomitum reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem vi-
 rum penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ communi dote profunt, ut Len-
 nia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum Gal-
 cum, castorium, ferulæ virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser, aut laserpitium, sa-
 gapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix, quam magudariam appellarunt, aristolochia longa,
 syluestris rutæ semen, & betonica, quam cestron nominant, folia: singula cum vino drachmæ pondus
 sumi debent. Effectum præbet polij decoctum, & seseli, & liquidæ pix linctæ. Magnificè ferunt open
 antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio præstandi auxiliij ita se habet. Cæ-
 rùm ab iis, quæ consueverunt euenire, communia remedia sumptari possunt. Ferè enim vires vene-
 norum quàm plurimorum in affectus consimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerique
 communia conducunt auxilia: varia etenim sunt venenorum genera, communes tamen, nec multi-
 dem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes concurrentesque casus, quæ symptomata vocantur,
 vnum venenum sequantur, alioquin superuacanea fuisset venenorum singulorum traditio, cum summo
 mediis ab authoribus descripta. Neque verò in vno eodemque promptum est inuenire, ut quis stom-
 chi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesicæ dolore vehementer crucietur, ut singuliat, erodatur, ob-
 tremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, veterno pre-
 matur, vertigo obuerfetur, caligent sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre confictetur, er-
 lotium reddat, torminibus vexetur, crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore sugilletur, pube-
 scat, deliriat, stertat, viribus deficiat, & pleraque alia faciat, patiaturque: singula enim in generales af-
 fectus deducta, pauca numero, & communia ea demonstrant, quæ euenire consueverunt. Quare in sin-
 gulis, quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio, sto-
 machi, ventris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vritæ difficultas, & interdum cruoris cum eo ex-
 itus, lacinatio, & in pluribus partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modo potis repe-
 riuntur: sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modo eos, qui meconium
 hausert, veterno, aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto cor-
 pore pruritu sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam, qui mandragoram, aut cicutam deuorauerunt.
 Delirium non hysteryamus tantum infert, verum etiam quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel-
 quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte
 aconito, cerussa, gypse conspicitur. In summa, difficile vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod
 haustum, gustatumque; virus prodere possit: maximè, quod hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in corpo-
 re exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his, quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan in-
 dicare possis, si ad ea respexeris, quæ sumus dicturi. Sed in iis, quæ ad longas ægritudines spectant, nihil ad
 medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim, atque
 presentaneam vim illam perdididerunt, transmutata in longos affectus, communia reliquorum vitiorum
 remedia, compositionesque flagitent, cum venefica proprietas non amplius insit. Si verò longa sit affe-
 ctio, in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, à quibus facile fuerit medendi rationem asse-
 mere. Sed de iis, quæ generaliter auxiliantur, hæcenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scri-
 ptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem, aut maleficam
 vim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur: quod
 nonnulla eorū, quibus vtuntur, venenis sint commissa. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe con-
 nuo vsu eorū, homo in pernitiæ agitatur. Proinde animalia, quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: catharides,
 buprestis, salamandra, pinorū crucis, lepus marinus, rubetæ, & rana palustris muta, deuorantur hirudines.
 Semina

Semina sunt, hyoscyamus, coriandrum, acuta, gith, pillion. Liquamenta, meconium, opocarpasou, campar succus, claterium, mandragoras. Radices, quas mittit chamaleo, aconitum, thapsia, veratum, rna, agaticum nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum vocant, quod in Colchide nascitur. Arbores, herbae, oleraq; simlax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxum: solanum manicum, quod & doryenium dicitur: sardonia herba, quae ranunculi genus est: corniculatum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fungi. Ab animalibus, taurinus sanguis recens, lac intus coagulatum, mel Heraclae in Ponto genitum. Metalla, gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, duo sandaracha genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis, vinum abunde potit balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

COMMENTARIUS MATTHIOLI.



AGNUM sanè, & immensum beneficiũ acceptum referre debent sapientissimo Dioscoridi, non solum Me-

Beneficiũ a Diosc. in posteros colatum.

dia ortus vniuersi, sed etiam vniuersa simul humana natura: quippe quod is artem medicam illustrauerit quinq; superioribus libris, in quibus infinitorum simp. medicament. historiam, ac facultates miro ordine tradidit: sine quibus nullo quidem pacto aegritudines propelli possent, nulliq; earũ noxa deleri, quibus vita nostra constaretur, ac tollitur. Sed longe plura adhuc beneficia eidem accepta referri debent, quod de-

id. eps in hoc sexto volumine, exactissima scientia mirabiliq; doctrina ac ratione explicauerit, & quomodo quisque lethali omnia venena praecauere possit, & qua etiam ratione succurrat, ne eadem perniciem, vel aliquam inferant noxam, qua prius per imprudentiam, aut malitiam, aut dolum intus in corpus assumpta suere. Nam etsi medicamenta tam ad vniuersales, quam ad particulares morbos, qui quotidie inuadunt, affliguntq; humanum corpus, necessaria plurimum semper extiterunt, appropinquatq; vtilia: innumeri tamen habentur morbi, qui seruata tantum victus ratione, natura duntaxat ope pelluntur. Secus autem euenit his, quibus venenum exhibitum sit: quando quidem nisi prius haustus praestantibus admodum antidotis veneno praecauerint, vel post ipsum assumptum remedia non admisserint, rarissime vel nunquam natura vitibus seruantur. Quin potius eos plerumq; vita deficit, qui venenum hauerunt, nisi quam primũ succurratur remedijs: de quibus ita abunde, accurateq; scripsit Dioscorides, vt Galenus & grauisissimus author, & medicorum facile prin. eps, nec non tota posteriorum Graecorum, & Mauritanorum schola, ipsum in hoc adeo diligenter sint imitati, vt ab eo omnem huiusce facultatis doctrinam didicerint. Cuius rei amplissimus testis est Galenus libro primo de antidotis.

Quamobrem omnibus perspicuum esse potest, Dioscoridem in hac venenorum, aequè ac in illa medicamentorum facultate, omnium facile principem, & magistrum extitisse. Itaque cum in alios eius quinque superiores libros, commentarios

Ratio commentariorũ in librum sextum.

(vt puto, non inutiles conscripserim, me equidem operae pretium facturum putavi, si libro quoque sexto commentarios adderem praesertim cum nouerim quam vtile sit ac necessarium, homines in vniuersum assequi tum modum, tum rationem tam praecauendi, quam curandi venena. non solum ea, quae intus in corpus sumuntur, sed etiam quae venenosorum animalium morfu, vel ictu etiaculantur, & relinquuntur: Siquidem malefica venenorum vis, adeo grauis & potens humane naturae semper extitit inimica huic enim magis, quam ceteris aduersatur) tantiq; velocitate suum exequitur munus, & saepenumero eundem praestet effectum in corporibus nostris, quem praestat voracissimus ignis, si quando ad aridissimas petuenerit paleas. Fit enim, vt plerumque venena, dum iubent qui sumpserunt, vel icti languent, medicos accersiri, eosq; corporis humores insuuant, atque etiam principes partes, vt subinde nihil, vel parum possint remedia, & quam praestanti-

ssima antidota. Quapropter recte Galenus lib. 3. de simplicium medicamentorum facultatibus cap. 23. scriptum reliquit, quod quando venenum putredine, & erosione enecans, grauem corpori intulerit noxam, fieri quidem non potest, vt amplius vincatur, supereturq; vel victus ratione, vel generosorum medicaminum ope. Ex hoc itaque accepi, clareque cognoui, quod si in hunc quoque librum sextum commentarios non scripsissem, praestantiorem, magisque vita humanae necessariam medicamentorum partem, intactam silentio praterissem. Quae quidem pars, cum praeterea à nobis ex Dioscoride pluribus ante annis in Italicam linguam versa habeatur, ac etiam his nostris commentarijs enarrata, causa nimirum erit, quae potissimum innumeri homines, non modo à mortiferis se tueantur venenis, sed à morte quoq; liberentur. Nam qui unquam in hos nostros incidit commentarios, qui Italicis, aut Latini sermonis non fuerit prorsus ignarus, quanquam non fuerit Medicus, non tantum sibi ipsi, verum etiã alijs adiumento esse poterit. Nempe quod vsus medicamenti tum simplicibus, tum compositis ad venenorum noxam facientibus, quorum inferius praestantiora, valentioraq; referam: quin etiam conuenientibus vsus cautionibus, facile aliquando veneno prorsus medebitur, aliquando autem tamdiu agros viuos traducet, quamdiu diligentissimis Medicis accersitis, qui non semper praesto sunt, sed magna ex parte vel longè distant, vel abijunt, integrum medendi locum relinquet. Sed anteaquam modum, ac rationem praecauendi venena in medium afferam, non alienum duxi, ad ampliorem huiusce rei doctrinam, nonnulla in vniuersum praemittere scitu, vt arbitror, necessaria, vt sine quibus tractatio hac diminuta, & imperfecta videri posset. Primũ itaque dixerim (vt etiam Conci-

Venenĩ operatio qualis.

liator inquit, in libro, quem de venenis edidit) venenum omne intra corpus nostrum assumptum omnibus suis facultatibus prorsus opponi cibo, quo nutrimur. Nam quemadmodum cibus in nostri corporis sanguinem vertitur, fitq; in omni sui parte membris, quae praecipue nutrit, similis, locum illius, quod continuò in nobis exoluitur, subintrans: ita venenum contrario modo se habens, corpus ac membra, quibus primò adhaeret (vt infra latius dicetur) in sibi peculiarem venenatam naturam transfert. Unde quemadmodum animalia omnia, omnesq; fructus, quae terra parens gignit, quaeque in nutrimentum verti possunt, si a nobis edantur, in nostrum transeunt alimentum: sic per oppositum inodum, venenata intro in corpus sumpta, vniuersa corporis nostri membra venenata reddunt. Quippe cum omne agens suo passo sit fortius, venenum vi sua agendi valida, nostram vincit substantiam, vertitq; in suam venenatam naturam, ea sanè ratione, quae ignis sua vi agendi potentissima paleas celerrimè in se ipsum conuertit, & conficit. Ob id itaque dixere antiqui rerum naturalium exploratores, quod venenum homines interficit corrupta corporis temperie, & compositione. Id quod maximè comprobatur Galenus lib. 3. de simplicium medicamentorum facultatibus, vbi in hoc inquit, differt alimentum à medicamento, quod hoc nostrum corpus alterat suis qualitatibus, illud vero conuertitur, fitq; substantia corporis simile. Porro

Venenorum genera tria.

sunt conuenit (vt Auicenna, & Auerroes posteritatis memoria prodiderunt) venena in vniuersum trium esse generum: vt enim aut à plantis, aut ab animalibus, aut a metallicis exitiosam vim habent, ita inde discrimina sortiuntur. In plantis igitur ea omnes inter venenata recensentur, quae ciborum natura omnino repugnant, & aduersantur: quae natura non

eiusmodi sunt, ut esitata in alimentum conuerti possint: quin immo contrariam obtinent facultatem, ita ut membra
 iam nutrita, in se ipsas conuertant. Cuiusmodi est elleborus, aconitum, cicuta, napellus, Sardonis herba, nerium, & alia
 quam plurima plantarum genera, de quibus in processu pluribus seorsum agemus. In animalibus ea omnia venena infor-
 unt, cuius natura humana prorsus aduersatur. Patet id in viperis, aspidibus, basiliscis, lepore marino, rabia, scorpione,
 phalangio, salamandra, rabidis quadrupedibus: item in morticinis carnibus aut a fulmine occisis, aut a venenosis, &
 rabidis animalibus. Caterum hac in re, licet nonnulli dicant venenum cum vita animalis confumi, eo ducti exemplo, quod
 terui, lupi, apri, & reliqua fera, qua venenatis sagittis conficiuntur, innocue comedantur, scire tamen oportet, hanc
 regulam deficere in his, qua pestus, aut rabies, aut fulminis ictus, aut venenosorum morsus enecat. Quandoquidem cum
 plures vidi mortuos esse, qui tantum boues peste confectos excorauerant, haud aliter toto corpore tumentes, ac si in hy-
 dropem incurrissent. In metallicis denique illa omnia produntur venenata, qua malefica, ac lethali constant facultate.
 Quales sunt argentum viuum, auripigmentum, sandaracha, magnes, & similia. Ad hac sciendum est venena non solum
 interficere per os sumpta, sed interdum etiam extrinsecus applicata, varijs ac diuersis rationibus. Porro qua per os sumpta
 venena vitam adimunt, sub ciborum, aut medicinarum specie plerumque propinantur. Quae vero exterius tantum adma-
 inferant, ut plurimum a venenatis, & mortiferis animalibus desumuntur. Siquidem hac homines non morfu modo, sed
 inficiunt, ut plurimum a venenatis, & mortiferis animalibus desumuntur. Siquidem hac homines non morfu modo, sed
 ictu necant, sed visu quoque, sibilo, & tactu (ut quidam scribunt) interimunt. Quin etiam non desunt venena, qua per
 statum, olfactuq; tantum statim hominem in perniciem agant nulla temporis mora, qua quidem inter caetera malitia &
 atrocitatis principem locum obtinent: quippe quod secum deferant praesentaneum interitum, ex quo nullum subinde sa-
 reliquum in felicibus moribundis succurrendi tempus. Caterum morsu, ictuq; interficiunt vipera, aspides, scorpiones, phe-
 langia, pastinaca pisces, rabidi canes, & alia id genus plura. Visu autem & sibilo (ut auctor est Galenus libro de theriacis
 ad Pisonem, si tamen Galeni legitimus est liber) statim inficit Basiliscus. Tactu alius serpens enecat, de quo agens An-
 na lib. 4. sen 6. narrat, quod is a milite quodam hasta infixus virulentam vim per hastam transmisit ad manum, qua
 primum infecit, & deinde totum corpus corruptit. Ad huiusce rei comprobationem illud sane compertum habeo, quod
 agro Tridentino euenisse scio. Nempe cum rusticus quidam esset suis in vinetis, paruum quendam collem sapius asom-
 bat, ut ibi vuarum custodiam ageret. Hinc quadam die ad collis pedem magnum & horrendum vidit serpentem
 capiti supernè hastam satis longam infixit: at dum fixam feram se hinc inde fortiter contorquentem, & hasta corrum-
 lutam, pro viribus teneret, magno statim tremore correptus est, quo maxime deterritus vociferans, viatores, & circum-
 stantes colonos ad se ire rogabat. Quam vociferationem audientes, qui non longè aberant rustici, eò cursu velocius
 tenderunt, & ipsum ferè semimortuum inuenerunt. Cognita tamen ex occiso serpente, sui infortunij causa, ad theoriacum
 & alia antidota confugerunt, quibus eum ad vitam reuocarunt. Veruntamen duobus annis postea is vniuersi serpens
 stupore in lecto semper decumbens agrotauit, & eo praesertim brachio, quo perniciosum animal hasta occiderat. Ex
 modum mirari rem hanc nobis licet, cum videamus (ut etiam literis mandauit Galenus lib. 6. de locis affectis) torpedinem
 marinam de repente piscatoris manum obstupescere, ac torpidam reddere, vbi primum is tridente eam tetigerit. Id quod
 similiter efficit, transmissa per funem retis qualitate, dum trahitur in litus. Proinde id experientia docti piscatores, si
 retia trahunt, manus torpescere, tremereq; praesentiant, certò torpedinem captam sciunt, etsi longo admodum fune
 hatur. Vnde illud perspicuum est, quod si huiusce piscis qualitates per tridentis hastam, & retis quam longissimum funem
 transmissa ad manum, inficiunt & corrumpunt homines, eò magis id ipsum fieri poterit, si animalia ipsa, aut vna ma-
 nu, aut alia corporis parte tangantur. Idcirco manifestè constat nullum esse brachium tam validum & robustum, quod
 torpedinem adhuc viuentem diutius sustinere possit. Quare admirandum sane non erit (ut lib. testatur Galenus in apo-
 tato) quod sputum canis rabidi, si humanum corpus contigerit, perinde ipsum rabie afficiat, ac si ab ipso cane esset deu-
 sum: nam & huiusce effectus hac nostra aetate plura afferri possent exempla. Neque etiam alicui mirum esse debet, quod
 sputum aspidis cognomento Ptyas, omnes veneno inficiat, quos contigerit. Hoc idem similiter efficiunt quaedam
 venena arte conflata, tanta permeandi & penetrandi vi praedita, quod illitis (ut ferunt) sellarum pediferis, & alijs
 ocreas penetrant, donec ad nudas pedis plantas peruentas, & inde per cutis spiracula in corpus ingressa, vniuersa mem-
 bra corrumpunt, & absument. Horum vsus (ut audio) frequens apud Turcas, & alias ferinas gentes. Ex hac
 re nullam quis capiat admirationem oportet: siquidem arteriae corporis nostri (teste Galeno libro tertio de simplicium
 medicamentorum facultatibus, ac alijs in locis) ad se intus trahunt quodcumque proximè circumdat eas, dum contractae
 dilatantur. Id quod quotidie liquet ex inunctionibus, ac suffitibus ad morbum Gallicum paratis, quippe eadem ab ar-
 terijs attracta, vbi argenti viui, cinnabaris, vel sublimati officinis vocati plurimum admiserint, sensissima saepe patitur
 symptomata. Sunt & alia venena, qua olfactu tantum (ut quorundam fungorum meminit Rasis) praesentaneam
 runt mortem ijs, qui e naribus admouerint. Huius summa malitia sedem illud sanè tenere debebat, quo storem recentem
 bus vetonicum vocatum, Senis quidam circumforaneus infecerat ex his qui innocue venenum deuorare profuerant, quia
 cum olfaciendum exhibuisset suo concurrenti in publico Senensi foro, is ex solo olfactu derrepente concidit mortuus. Prae-
 rea venena quaedam sunt, qua solo gustatu, quanquam non deglutiuntur, perimunt: idq; praestat aspidis sputum
 Quo memini quosdam imprudenter infectos esse. Inter quos vidi ego rusticum in valle Anania, qui dum feram solum
 in pratis, feram falce per medium secuit, & cum postea capitis truncum manu cepisset, ut socijs assistantibus ostenderet, u-
 pote qui iam feram demortuam fortasse censebat, suspensus manu truncus caput retorsit, & rustici manum senis mor-
 mordit. At ille credens suctu vulneri succurrere, os statim morsui admouit. Quo facto derrepente in terram cecidit, vbi
 ro matius factus deperijt. Insuper sciendum est, quod venena non vno eodemq; modo, neque ab vna eademque causa
 pariunt effectus. Siquidem (ut sapientes quidam memoria prodiderunt) quaedam agunt excessu qualitatum elementorum
 quarum mistione constant. Quaedam vero propria tantum qualitate aut forma, quam occultam proprietatem medici-
 xorum splendore proueniunt, pro materia mistorum proportione seu constitutione. Alia denique vtroque
 agunt, nempe & qualitate elementari, & propria quam formam specificam nominant. Porro venena, qua excessu
 suarum qualitatum operantur, suas variant actiones, pro varietate ipsarum qualitatum: quippe quod vnum sit cal-
 dum, aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Quae igitur caliditate excedunt, duobus modis perimunt. Vno quod
 intus in corpus sumpta excalfaciant, vrant, corrodantque vsque ad cor: alio quod extrinsecus apposta corrodant &
 exedant carnes vsque ad ossa: id quod lepori marino adscribitur. Vel quod summè calfacientia tam intrinsecus, quam extrinsecus
 corpus adurant, quemadmodum euphorbium, & elleborus donec inflamato tandem corde interimant. Frigida tandem
 bifaria necesse adferunt. Vno modo quod exuberante frigiditate sua, vsq; ad eò corpus gelidum, stupidumq; reddant, quod sicut
 etiam cor congelascit, ut ijs euenire sapius compertum est, qui opium deuorauerunt. Altera, quod obstructis
 frigida

Venena quot
modis mortē
adferant.

Historia no-
tabilis.

Sputum ca-
nis rabidi ra-
bie afficit.

Venena olfa-
ctu necaria.

Venena solo
gustu necan-
tia.

Venenorum
effectus a di-
uersis causis.

Aqualitati-
bus exceden-
tibus.

60 *... hinc meatibus, anhelitum intercipiunt. & proinde suffocant. & strangulant. id quod praestant exustum plumbum,*
... venena. Duplicem & triplum venenum habet operandi modum: quare quidam vel humidum sanguinem cor-
... ut calx viua: vel separent ac diuidant partes ab invicem, quousque omnia membra ad cor usque in mini-
... partes quem effectum praebet risagalium vocatum. Humidum postremo, et si aliqui tradant non inueniri,
... sit humidum reperire. quod ad quartum humiditatis excessum peruenierit, oppositum tamen declara-
... quodammodo, qui nocte dum dormiret, a serpente quodam demoratus, (vt Gilbertus Anglicus narrat) mortem obyt:
... propter brachium traheret, sic enim arbitrabatur dominum a somno excitare) caro iam vniuersa putre-
... tracto illo concidit, ossibus remanentibus carne prorsus exuta. Quod non certe alia de causa contigit potuit,
... quam ab excedente veneni humiditate. qua summa sane inerat terra illius dentibus. Fundem effectum praestat etiam sala-
 20 *... mandra, si in puluerem redacta bibatur, vt in processu suo loco de elidit Dioscorides. Nunc scus illi acciat, quem cenchrus*
serpen mordent. Quocirca recte proditum est a Galeno ex auctoritate Hippocratis libro primo de temperamento, quod
annu consuetudo pluuialis. humida, & austerius suscit. ea potissimum humiditas facit, vt succedente aestate car-
... quibus ob corruptam venenatamq; humiditatem eouque in aliquibus brachia putruerunt, quod de-
... que tota hac ipsa putredine correpta, a cubitis diuisa deciderunt. In alijs vero tantam coxarum, crurium, & pedum
... caro putredinem sensit, quod plane ossa carne destituta remanserunt. In alijs denique non caro solum computruit, sed si-
... mul etiam nerui, ossa, cerum compagines, nexuq; contabuerunt. Ex hoc itaq; aperte ostenditur reperiri venena, tanta hu-
... miditate exuberantia, vt homines interimere possint, vt pote qua membra putrida efficiunt: sicut argentum viuum,
 20 *... quod in humiditate modum excedente, insitum cordi natura humana sepe corrumpit, vt quotidie videmus in ijs, qui co-*
... regentis excepit. e mungunt ad luem Gallicam delendam: in quibus praeterquam quod semper gingiuas, dentes, palatum,
 20 *... aliaq; vicinas partes putredine afficit, saepe etiam vbi vberius quam par sit, inunctum fuerit, eos in perniciem ducit: quippe*
quod vniuerso sanguini putredinem inferat. Idq; extrinsecus dentaxat adhibitum, quanquam & id ipsum intus astrum-
... ptum occidit, si modum quendam excesserit, vt libro superiore tradidimus. Siquidem pra nimia sui frigiditate vitales spiritus
cordisq; instantiam congelat, quod cuidam seplasiario, qui illud imprudenter biberat, euenisse narrat Conciliator Petrus
Aponensis hoc iugiter modo. alij, praedictus suos venena praestant effectus, qua suis modum excedentibus qualitatibus mor-
... tem hominibus adiungunt. Ceterum venena, qua propria sui facultate, vel (vt dicunt) propria forma enecant, id non effi-
 30 *... ciunt, quod caliditatis, frigiditatis, humiditatis, aut siccitatis modum excedant, sed quod id peculiare a natura habue-*
... rint ex influxibus a radys, (vt supra diximus) quorundam siderum fixorum prouenientibus, qua ea humana natura pror-
 30 *... sum aduersa genuerunt. Haec propterea etsi tam pauca quantitate sumantur, vt vix sentiantur, tanta tamen est eorum ma-*
... lefica, atroxq; vis, vt breui tempore tantum atqueantur, in se ipsa corporis humiditatem conuertendo, quod postea quasi
 30 *... hora momento dissoluunt, & ad mortem trahunt homines, a quibus hausta fuerint, quemadmodum aconitum, napellus,*
& toxicum facere contineuerunt. Id quod optime nouit Galenus libro primo de simine, vbi rem explicauit his verbis: Qua-
ratione etiam minima particula humoris lethalium venenorum, qua deleteria appellant, vbi in animalis corpus ingressa
... fuerit, totum id momento temporis immutat, sibiq; simili afectione alterat. Nec leuis sit curatio, qua per venenorum re-
... media, & antidota adhibentur, quae a exipiamata nuncupant, qua contraria lethalibus alteratione totum etiam ipsa
... corpus immutant, non sane quod in substantia ipsorum per totum penetret corpus (neque enim potest tam paucus succus tam
... breui tempore corporis interdum maximam molem replere, sed qualitate diffusionem, qualis & extra nos a Solis fulgore in
 40 *... ambientem aerem, & in nobis, tum a corde in arterias, tum a cerebro in neruos fieri conspicitur. Et lib. 5. cap. 19. de sim-*
... plicium medic. facult. idem inquit: At medicamenta sunt qua tota essentia nobis contraria sunt: proinde si vel minimu co-
 40 *... ram a sumptum fuerit, omnino laedit necesse est, haec Galenus. Ex quibus facile constat, ipsum velle, quod antidota non se-*
 40 *... cus atque venena agunt in corpora non solum Galenus tertio simplicium medicamentorum censu cap. 22. in praedictorum*
testimonium ita scriptum reliquit. Medicamenta erodentia, & putrescentia etiam si quantitate minima sumantur,
omnino tamen corrumpunt, quia videlicet, qua putredini obnoxia sunt, calore, humiditateq; putrescere solent. At qui cali-
... dus, cum idus sanguis est. Itaque putrescere non potest, nisi caliditate usare possunt. Proinde longo etiam post tempore, a quo sum-
... pta sunt, nonnulla intermunt, potissimum qua caliditate, terrenaq; essentia sunt: haecenus Galenus. Sed ad antidota redea-
 50 *... mus. videndum est, quod ex his ea tantum operantur, qua praeciue gratia antea assumuntur, quam qua post: nam vt*
venenum quanquam efficacius, nihil aut parum nocet ijs, qui prius se antidotum muniuerunt (vt contigit Mithridati) ita pari-
... ratione nullum, aut paucum adferunt auxilium, quae postea exhibentur, nisi saepius, maiorq; quantitate sumantur, vt in
corporibus maius eorum vis capiat incrementum. His adhaerens Galenus libro primo de antidotis a principio sic inqui-
 50 *... ens: Mithridatica antidotus, itemq; theriaca non eam vim habent post venenum accepta, quam antea sumpta habuissent:*
 50 *nam portio antidoti qua prius, & semel hausta tutum a morte quempiam praestitisset, ea venenum subsecuta nisi ob qua-*
... druplum, quintuplumque aucta, non iuuabit: neque id semel tantum, sed bis singulis quibusq; diebus hausta, faciet: haec-
 50 *... nus Galenus de his dicens. Ceterum venena, qua & manifestis, & occultis simul qualitatibus agunt, id praestant*
vtroque modo, quo praedicta duo: cuiusmodum agit euphorbium, quod licet venefica vi, quam ab excessu caliditatis
... obtinet, inficit: inficit tamen & vt alia, qua a propria sua forma, & latente qualitate procedit. Cuius rei illud indicium
 60 *... est, quod exhibita theriaca, cuius proprium est, ea omnia superare venena, qua propria forma, & tota specie operantur, ef-*
ficacissime valet aduersus euphorbium haustum. Quod si sola excedente caliditate euphorbium noxam inferret, tantum
... abest, vt theriaca, qua non parum caliditatis obtinet, auxilio futura sit, vt etiam illius noxam foueat, & augeat, quod
... tamen non facit. Sane etiam conuenit non omnia venena cor primum petere, & illi noxam inferre. Siquidem repe-
 60 *... riantur, quibus ita natura comparatum est (vt enim claret experientia) vt intus assumpta separatim noceant vno tan-*
 60 *... tum corporis membro alia vero alteri quemadmodum etiam sunt medicinae, quarum alia praecipue cordi opitulantur, vt*
crocus, haec enim bus. ita cerebrum, & caput inuadit, vt smaragdus, stoecha, betonica: alia ventriculo praecipue opem fe-
... runt, sicut corallium, cinnamomum, ginziber: alia denique alijs corporis membris auxiliantur. Idcirco Galenus libro de
theriaca ad Plonem: Sunt inquit, plura medicamenta, qua quibusdam corporis partibus eximie curandis sunt idonea
... Patienti igitur ieiuniori saepe eupatoria herba auxiliata est: Glans vnguentaria (myrobalanon vocant) lienem adiuuat:
... saxifrago, & betonica renibus pulchre faciunt: similiter alia aliarum (vt experientia obseruauimus) propria sunt me-
... dicamina. Tales igitur proprietates in venenis quoque reperiri affirmauerim: quandoquidem plane constat cantharidas
... praecipue noxam inferre vesicae, cicutam cerebro, leporum marinum pulmone, & alia item alijs corporis membris particu-
... laribus, ut in hoc libro melius, Latius q; ostendimus, vbi de singulis seorsum agemus. Id quoque non latuit Galenum, vt loco
... citato eius verba aperte testantur, dum ait: Sunt nonnulla venena, qua partes etiam quasdam corporis priuatim viti-

Venenam
 sicentia. qd
 citet agt.
 Humida ve-
 nena dari.

Argentum vi-
 uum vt ne-
 cct.

A forma pro-
 pria.

Antidoto-
 rum actio.

Venena ma-
 nifestis & oc-
 cultis quali-
 tatibus simul
 agentia.

Venena di-
 uersa mem-
 bra petunt &
 non primum
 cor.

aut. Nam leptus marinus pulmonem exulcerat, cantharis vesicam peculiariter afficit. Porro non ignorandum, quod et
 venena haec (vt adnotat Gentilius) natura insitam habeant, vt seorsum vnumquodque membrum determinatum
 non tamen propterea sit, quin noxam etiā cordi communicent: nam si secus esset, neminem sane interimirent. Quam
 nam in displicet eorum sententia, qui ideo volunt omnia venena perniciosa esse, quod cordis facultatem opprimant.
 quidem parum refert, an illud efficiant, quod primo cor ipsum opprimant, aut aliquo alio mediante. Huius rei
 frangit eam facit Galenus libro 5. cap. 1. de locis affectis, vbi sic habet: Quoniam ipsi cordi proprie vel primario affe-
 veniant accidentia: quoniam verò ipso ceteris partibus consentiente, id ex his intelligi potest, quae prius in alijs
 strauimus, vbi iam declaratum est innati caloris cor velut fontem esse, neque animal magis omnino posse
 ciatur: haec Galenus. Caterum illud etiam in disputatione venit, nunquid fieri possit, vt venena in diem exhibita
 certis occidere temporibus, hoc est, quod certo & praefixo tempore mortem adferant: exempli gratia in vno
 pluribus, vel ad annum vsque, non celerius, neque tardius determinato tempore praefixo. Quam in re prin-
 dicit Theophrastus, gratissimus & antiquissimus auctor, qui libro 9. cap. 16. de historia plantarum de aceto
 rens, ita scriptum reliquit: Componi autem ita ferunt, vt certis occidere temporibus possit, videlicet bimestri
 semestri, anno completo, nonnullum etiam biennio. Pessimè illos de vita discedere volunt, qui plurimum tem-
 re possint: paulatim enim tabescit corpus, & languore pereat diuturno esse necesse. Facillime illos, qui con-
 hac Theophrasti sententia. Veruntamen omnes ferè rei medica studiosos in hanc conclusionem conuenire reperio,
 quamuis in venenorum numero inueniantur (vt Theophrastus inquit) quae celerius, & quae tardius interficiunt
 propterea tamen praescribi potest terminus certus, & dies, quo mortem inferre debent, vt quidam existimant. Nam
 venena citius, aut serius occidant, non tantum ex innata & propria eorum vi prouenire censent, sed etiam quae
 vel minus resistat eius natura, quae venenam assumpsit. Id autem planè docet experientia: si quidem con-
 num eodem pondere, vel eadem quantitate diuersis natura exhibitum, alios in hora tantum perire, alios in quatuor
 horis, alios in die, & nonnullis nisi paruum asserere noxam. Id quod etiam quotidie experiri in medicina
 efficiendam alium exhibentur: quandoquidem idem medicamentum eodem pondere, vel quantitate à diuersis
 acceptum, in aliquibus iuuat celeriter proficit effectum, in alijs tarde, in aliquibus parum efficit, in alijs plurimū
 lys nihil, in aliquibus citra omnem noxam desistit, in alijs vero magno cum labore. Neque tamen id alia de causa
 cidere manifestum est, quam ex vario distanti agrotantium temperamento: quod non ita ad vnguem deprecatum
 vt certo fieri possit, quamdiu innatus calor veneno resistere valeat. At quamuis concedi possit, quod quis ad
 veneficus reperitur, vt ex longa experientia, ac pariter scientia tam exacte naturam, & robur vitales facultates
 in vnoquoque homine, vt conquirere possit, quaeque perdurare valeat, vbi venenum illi sua arte praeparatum
 non tamen propter hoc is determinate scire poterit aem, neque horam mortis illius, qui venenum assumpsit,
 fieri potest, nisi diuino iudicio, aut assatu, vt aliquis medicus, vel philosophus adamusim expendere possit
 quantum humidis substantiis quantumque caloris innati in quocunque sit corpore, praesertim quod non semper in
 statu persistant principes facultates: quo fit, vt quispian modò viuens, non omo minus fortis appareat: tum etiam
 corporis temperamentum plurimum immutent causa extrinseca, quae Graeci νεκραταρατα vocant. Adde etiam
 quod antidota, quae à medijs huiusmodi venenatis continè propinantur, etsi veneni vim ob sui contumaciam
 nequeant, impediunt tamen, ne id tam breui tempore perimat. Vnum igitur crediderim esse, quod internae
 facultates, ac iuncturae possint (vt quidam videntur, iudicio cunctat ita exquisitè expendi, vt lance experiri
 Atqui scire etiam oportet, quod etsi hoc magna ex parte euenire possit natura ipsius robore in hoc magis, in illo
 istante: eo etiam tamen prouenit, quod aliqui constent arterijs, quibus venenum in cor fertur, admodum angustae
 contra admodum amplius. Namque venenum vbi vias latas expedit, inuenit, non solum celeriter pericit, sed
 ge etiam facilius vna cum acre prouehitur, qui cordis refrigerio continè ingreditur. Id quod his minime contingit
 propterea, quod cor minus calidum obtineant, arterijs potuntur longè angustioribus, quin & spirituum
 cultatem valde imbecilliores habent. Quocirca Galenus tum tertio simplicium medicamentorum censu
 secundo de alimentorum facultatibus, tradidit cicutam hominibus in cibo lethalem esse, sturnis autem nutritiam.
 Quandoquidem hi arterijs adeo angustis praclusisq; constant, vt nullo pacto per eas ad cor lethalis cicutae
 sit: quanquam hoc de frigidis potius, quam de calidis venenis intelligi debeat. Huc illud scitu dignum accedit, quod
 sua suu difficiendum est, venena, quae ab impijs veneficus in diem exhibentur, alterius generis esse ab his, quae
 tum qualitatum excessu perimunt. Nam quae propria forma ac vi necant, in minima etiam quantitate exhibita
 nus inquit, difficile cohibentur, quin breuissimo tempore lethale munus obeant suum. Non desunt tamen, qui
 affirmant, quaeunque venena adco temperari posse, vt illa celerius, hac tardius interficiant: quibus equidam
 non iussum, cum sciverim admiranda admodum esse secreta natura. Quari praeterea solet, num fieri possit, vt quocumque
 veneno assuescat, minimum quid de eo quotidie assumens, vt eo tandem innocuè moriatur, quemadmodum Rufus
 no scribit Auicenna, olim puellam nutritam esse veneno, ea tantum ratione, vt reges quosdam, & principes (quod fieri
 esset, qui suum rem haberent, inficeret. Quam in re dixerim ego, quod etsi non desint, qui hoc fieri posse
 quam tamen ipse adduci potero, vt credam humanum corpus nutriri posse veneno, & praesertim napello, quo plerumque
 exponentes, eam puellam nutritam esse interpretantur. Siquidem ea historia Arabicis potius fabulas imitatur, quam
 aliquam, quae omnibus naturalis philosophiae rationibus comprobari possit. Quamobrem consistit Gentilem Fulgentium
 hoc Auicenna loco adnexam quidem fuisse, vt hanc opinionem seruaret integram, quod nimis fidelis casusque
 sitoris esse debet. Nam postquam eam sententiam validis, verisque rationibus primùm improbalet, deinde
 Auctoris, Dnique auctoritate innixus, Auicenna, & Rufi opinionem probare non dubitauit quibusdam
 quamuis nudus, & infirmus. Quorum illud videtur fortius esse, vbi auctoribus magis, quam rationibus adducuntur.
 Aequum non esse, quod auctores tam graues, tamque sapientes, mendaces vocentur, vaniq; habeantur, nuppe quod
 to crediderit ipse Gentilius Rufum, itaq; Auicennam in veram historiam hanc rem recepisse, non autem in fabulam
 quoniam superuacaneum ducio in hoc contere tempus, longa contradicendi oratione, praesertim quod venenam medi-
 lae: nullam aut paruum afferat utilitatem: ideo relicti alij, in Galeni sententiam facile deuenio, qui tertio
 medicamentorum censu cap. 18. tradit venenam calidam, & sicca qualem esse Napellum, quo puellam illam nutritam
 lunt non parvigo, nullo modo posse in nutrimentum redigi, etiā quod in quantitate minima sumantur: tamen si frigidat
 na quando in nutrimentum vertuntur. Quandoquidem haec vt idem auctor est exemplo cicutae, populi, hyoscyami, & ma-
 gora, non sui natura interficiunt, sed qualitate duntaxat frigida. Quibus adicit ipse Galenus historiam annis
 Alder.

Num vene-
 na in statum
 diem interi-
 mere possint.

Cicutae cur
 nutrimentum
 Sturnis.

Verum quis
 afflicti per
 fit, vt venena
 innocue lu-
 mat.

Viperæ vino
venata.

Araneus ni-
ger in ollam
delapsus cæ-
nobium in-
ficat.

Quæ res ve-
nena pro-
dant, quæq;
suspensæ ei-
dem aduer-
sentur.

Lapides ve-
nenis resisten-
tes.

Præcautio ex
medicamentis

Ratio curan-
di venena.

uenerunt, ut præceperint in liquatum igne aurum, vel argentum, ex quo vasa confici debent, ibi venena, ut Mithridatis
antidotum, & alia adiungi debere, ut ascita inde antidoti facultate, venenis repugnent. Sed quam absurda, videlicet, fo-
horum opinio, & dyudicent (ea enim est, qua non indigeat clariore reprobatione) qui mediocrem et rerum naturam, et
metallorum præcipue peritiã sunt assecuti: ceterum suppellectiliũ non negligenda cura, ut scilicet vasa, quibus ciborum condi-
menta reponuntur, clausa, & cooperta seruentur, ut neq; aranei, neque scorpiones, nec aliquod virulentũ reptile, vel infe-
ctum ingredi possint. Admonet Dioscorides, ut et vasa vinaria diligenter clausa custodiantur: namq; vipera summo vni-
more alliciuntur, qua si vasa aperta offenderint, eo facillè contendunt. Quo fit, ut interdum bibendo exitiosum vitum or-
ctent, interdum verò in vino immersa expirent. Quamobrem Aristoteles libro. 8. capite. 4. de historia animalium quæ-
dam viperas vino in scutulis ad sepes disposito venari, & ebrias capere, memoria prodidit. Gal. item lib. 1. simp. med. am-
narrat historiã, quam nos lib. 2. in viperarum mentione retulimus, nempe de illis viperis, qua sponte se vino immerferunt,
vnde et sibi mortẽ consciuerunt. Quo vino duos homines elephanto affectos sanitati restitutos esse, idem est author. Quis
ex verbis palam est Galeni testimonio, vinũ in quo sint extincta vipera, noxiũ non esse, quin potius adeo salutaris, ut effu-
cissimè elephantiasin curet. Quod tamen Diosc. sententia refragari videtur, nisi dicamus vipereũ venenum elephanto labo-
rantibus præstans esse auxiliũ, ceteris aut. exitiũ. Qui item in veneni suspitione versantur, cibos vitare debet, qui candidi,
vel oleraceo colere fuerint: nec non ab his et abstinere, qui ex animalium sanguine parantur. Siquidẽ albedine, venena quo-
dam metallis facile occultantur: cibus in herbaceo colore, varia lethales planta commodè admiscuntur: sanguini et an-
imaliũ, quibus vescimur, commodissimè venenatorũ sanguis inseritur. Illud etiam apprimè vtile atq; necessariũ esse, ut
ut coqui, & reliqui culinae inseruientes, non modo fideles sint, & incorrupti, sed et mundi, cauti, ac preuidi, ne vltimũ ven-
ficorum insidijs relinquatur locus: tum et ut sciant rectè diligenterq; custodire cibaria, vel aliud vnumquodq; quod in cu-
rum vsu reponitur. Sed præcipue diligenter animaduertant, ne in culinaria vasa, qua super, vel circa focũ edulij: res
resident, venenatũ aliquod animal a tecto per saminũ decidat, ut quidam exigui aspides, qui sub rectorum tegula, & cu-
tabulamentis se recipiunt. phalangia, stelliones, scorpiones, & similia. Namq; Florentia (ut Nicolaus est author) cænobium
monachorum veneno infectum est, quod araneus niger admodũ in ollã decidisset, dum coquerentur in scula. Ad hac Præ-
pes maximè curent oportet, ut perquam fideles habeant cubicularios. Nam (ut superius dictũ est) quodã veneni generis
lia, interula, cateraq; vestimenta infici possunt. Quare nonnulli facere solent, ut diu, priusquam vestes induant, eas ma-
bus pertractent serui. Quin & pueros similiter iubent, ut sapius equis insideant, ijs super sellis, quibus ipsi vti consueverunt.
Tum et stabuli præfectis mandant, ut tam cautè sellas, habenasq; recondant, ut ignotis, & his quibus fidendũ non est, non
intueri, ne dum tangere liceat. Insuper illud scire conuenit, qd quodã res simplices sunt (ut pleriq; inculpate fidei medici-
tentur) qua sua peculiari natura dote præsens venenũ signis manifestant. Inter quas cornu, seu lingua, qua serpenti lingua
vocat, refertur, qua (ut Conciliator Petrus Aponensis tradit) præsentem napello, aut vipera, aut pardi felle exudat: quæ
non prodit, ceteris venenis præsentibus. Sunt alij, qui pro certo tradunt, præsiũ lapidem, quẽ Plasma vulgus appella-
splendore amittere, vbi in præsentia veneni cuiusq; fuerit. Addunt præterea, quod si lapis tana terrestris anulo auro infu-
tur, ita ut is digiti carnem contingat, quam primum præsenferit adesse venenũ (si credimus his, qui hoc scriptũ reliquerunt)
tanta digiti afficit caliditate, ut carbonẽ accensum, ipsumq; digiti vrentẽ præseferat. Quibus sanè etsi parua, mea quibus
sententia, sit adhibenda fides, ea tamen, quò omnibus satisfiat quantũ potest, non duxi silentio dissimulanda. Non desunt
et, qui contra lethalia venena pollere contendant sigilla quadã, siue characteres, siue imagines, quomodocumq; eas appo-
libeat, præcipue si collo suspensa gestentur, vel digitorum anulis inserantur. Quocirca prodidit Albertus libro in agri-
dicato, qd si Serpentarij imago cum suis stellis cuius lapidi præioso insculpatur, eam vtilissimè gestari aduersus omnia ve-
nena, eaq; præsertim, qua venenosorum animalium ictu vel morsu relinquuntur. Proinde Petrus Aponensis scriptũ inueni-
tradidit in quodã libro, quem reges Persarũ olim habuisse refert, quod si in hematite lapide sculpatur homo genibus suis
serpente cinctus, cuius caput dextra teneat, caudã verò sinistra, & lapis ille anulo ex auro purissimo confecto inserat, qd
statu hominem a quocumq; veneno tuetur. Qua imago si modo aliquẽ præberet effectũ (non enim hac in re certi quicquam
proferre ausim) mea fert opinio, quod tempore, quo sculpatur, necessaria sit quarundã stellarũ obseruatio, a quibus uenti-
fluat in sculptã imaginẽ. Porro tradidere sapientũ veterũ nonnulli, reperiri præiosos lapides, quibus solis a natura largitus
est, ut venenorum malitiã efficacissimè dissoluant, & destruant. Ob id itaq; scriptũ reliquit Albertus cognomento Magnus,
Adamantẽ orientale gestatũ brachio sinistro inter humerũ, & cubitũ adnexũ, omnium venenorum vim demoliri. Id qd et
tribuit achata, hyacinthe, & sapphiro orientali. Alij eandẽ facultatẽ assignant smaragdo, alij lapidi, quẽ in capiti de auro
inueniri tradunt, vnde draconitis nomen accepit. Ceterum (ut ingenue fatear qd sentio) parũ fidendũ esse crediderim his
suspensionibus: quippe qd nunquã viderim huiusce rei experimentũ tam clarũ, ut sincera fides adhiberi possit: quamuis il-
lud facilius persuaderi possim, quod smaragdus, hyacinthus, achates, sapphirus lapides in tenuissimũ puluerẽ redacti, postea
per os sumpti veneno infectos saepe liberare: ut pote qui eã fortiantur naturã, ut cordis viribus subueniant. Sed quod gestari
lapides veneni assumpti vim, atq; actionem inhibere valeant, non ita facillè adduci potero, ut credã, sicut credunt aliqui,
& ita imaginantur esse, nisi prius notabile ex his experimentũ viderim. Nemo præterea non poterit (ut in hac præfatione
scriptum reliquit Diosc.) innoxia irritaq; venena reddere, si medicamenta tam simplicia, quam composita præsumpsit:
qua viribus præstantissimis polleant, quibus post assumpta venena facillè valeant superare. Simplicia autem medicamen-
ta Dioscoridi comprobata, sunt carica cum iuglandibus nucibus esitata, citria mala cruda manducata, napiq; semen ex vi-
naporũ. Item calamintã folia, & Lemnia sphragis, quam summis laudibus extulit Galenus: sed qua pro singula vna
drachma pondus non excedant. Idem similiter summis laudibus commendauit ruta folia, cum nucis iuglandis nucleo ac-
cepta: quin & duas caricas, salisq; momentũ. Ex compositis aut non immeritò ceteris antidotis Mithridatium antecellen-
scribit: quandoquidẽ ex frequenti eius vsu (ut ex antiquorũ monumentis accepimus, atq; et a Galeno lib. 1. & 2. de anti-
dotis memoria proditum est) vsq; adeo se innoxium præbuit veneno Mithridates Ponti rex, ut cum vellet sibi necẽ veneno con-
sciscere, ne se Ramanis dederet, nullum ex assumpto veneno percepit incommodum. Qua in re postea Galenus theriacam
præstantiorem esse tradidit, asserens fieri non posse, ut ijs venenum vllum noceat, qui eam quotidie saba Aegyptie pondus su-
mere consueverunt, quomodo suo tempore Aurelius Antoninus Imperator facere solebat. Ceteri posteriores, qui Dioscoridẽ
& Galenum secuti sunt, præsertim Arabes, & ipsi ad idem castaneas plurimum valere tradiderunt: quin & mespila, p-
stacia, allium, raphanum, & nucas Ponticas addiderunt, omnibus his tamen optimam theriacam præferentes. Et hoc ho-
cenus dictũ sufficit: de modo præcauendi venena. Reliquum est, ut curandi ordinem, ac rationem ineamus, qua ijs succu-
rere possimus, qui cibo aut potu venenum sumpsert. Primum igitur (ut paucis etiam superius dictum est) scire conuenit,
quod ingestum intus venenũ, non statim ut quidam volunt, ad cor ipsum contendit, quoniam prius alias interius partes pa-
curat.

curat & ledat, & sanguinem inficiat. Sed quia maxima pollet agendi vi ob propriam sui formam, vel temperamentum, quam si sine atrocissimam, quamcumque corporis humani partem contigerit, in suam virulentam conuertit naturam, & ut a conu. procedit multiplicando, inficiendo, atq; sanguinem cum reliquis humoribus in venenum vertendo. quousq; accessit forma quantitate adactum, cor ipsum attingat, quod tandem breui tempore in venenatam speciem transmutat. Hinc descendit, ut spiritus vitæ fouentes, loco proprio ac naturali expulsi, suam sedem cedant veneno, atq; ita subinde corpus spiritibus, & vitæ simul desitueratur. Illud præterea non ignorandum, quod arteria vna cum cordis ventriculis (quibus natura datur est motus dilatationis & constrictionis, ut ex illo quidem attrahatur aer circūdans, quo indiget cor ad refrigerandum summum spirituum vitæ calorem ex hoc autē pars aeris fuliginosa expellitur, pro cordis item refrigerio) quemcumq; statim extra ostenderint, intus attrahunt, ita ut arterie, quamuis minutissime, quæ per totū corpus disperguntur etiam sub cute per meatus quos habent, aërem nos circūdantem attrahant, ipsumq; prouehant ad cor, q̄ quidem postea per easdem vias calorem summumq; superfluum reuertit. Quo fit, ut si nos circūdans aer fuerit infectus, venenatus & perniciosus, ea ratione dicitur cor ipsum inficit atq; corrumpit. Idq; non euenit propterea quod arterijs atq; cordi natura insitum sit, ut venenum attrahat, sed quod aërem continuo inspirent, quo mediante natura est repugnante sua, venenum quoq; trahunt. Hinc itaq; est, quod quidam, dum (ut contingit) somnum caperent sub arboribus venenatis, ceu taxo ac nerio: vel humi cubaret super plantis venenatis, velut napellio & aconito: vel propter virulentorum serpentium specus quiescerent, imprudenter venenū contraxerunt, non alia de causa, quam ex aere loca illa ambiente, plantis illis venenatis infecto, & specuum virulento spiritu. Ceterum non tempe iudicium est ad generalē eorum curationem accedere, qui veneno infecti sunt, eorumq; præcipue, in quibus non a se manifeste signa conspiciuntur, ut quodnam sit assumpti veneni genus, dignosci possit. Nullus itaq; Medicus ingenio præteritus est, qui non protinus videat & intelligat ex seuis accidentium incommodis, quæ sequuntur, cum quis venenū sumpserit. Siquidem hæc quæ propria forma agunt (quam etiam proprietatem occultam appellare liceat) statim semper succedit virium & roboris totius corporis prostratio: agri ex magna cordis molestia frequenter animo deficiunt: fauces lincescunt: quæ & lingua, & labia nigricant: ite extrema corporis, præsertim ungues, plumbeo colore liuescunt. Ad hæc qui hauserint, vertiginosi fiunt, voiem edunt cum murmure & oculos toruē mouent. Huius frigidus accedit sudor circa frontē & tempora erumpens. Quæ omnia assumpti veneni manifestissimum præbent indicium, maxime autem si statim sequantur post assumptum vitium, hæc contingant qui sibi rectam quotidianam victus rationem adhibeant. Quandoquidē tam male esse possit: in aliquo victus ratio, q̄ humores inde geniti, tractu temporis vsque adeo corrumpentur, ut contracta veneni natura, vim naturæ infertent, & eadem iam dicta ceterent symptomata. Id quod maxime testatur Galenus lib. 6. de locis affectu, tum etiam libro de cibis boni ac mali nutrimenti. Quapropter Medicos cautos, ac prudentes esse oportet, quod in huiusmodi accidentibus diligenter singula perquirant. Sua similiter accidentia inferunt, quorū etiam manifesta præbent indicia, venena illa, quæ suis manifestis qualitatibus agunt. Nam quæ caliditate excedunt, omnia membra interna celeriter inflammant, sitim ingentissimam excitant, oculos inflammatione male habent, inquietudinem continuam inducunt, & continuū sudorem eient. Si verò præterquam q̄ calido excessu polleant, excellent etiam vi tum erodendi, tum putrefaciendi, ut arsenicum, sublimatum, auripigmentum, sandalaba, & id genus alia, punctione atq; dolore intolerabili, ventriculū & intestina afficiunt, in quibus etiam frequenter murmura sentiuntur. Hæc autē accidentia sæpe sequuntur vomitus, fastidia, sudores modo calidi, modo frigidi, vicia deniq; coloris mutationes. Quæ verò nimia frigiditate excellent, plerunque somnum infertunt adeo profundum, ut sæpe non sine magno labore excitari possint affecti. Nonnunquam verò cerebrū obstupesciunt, ita ut affecti cogantur quam plurimos incompositos edere motus, tum corpore toto, tum etiam oculis, ore, manibus, reliquisq; corporis partibus, non secus ac si stulti facti essent, vel remulenti. Huc illa præterea accedunt, frigiditas scilicet totum corpus occupans, frigidi sudores, & color in facie luidus admodum & terrificus. Ad summum totum corpus torpidum efficitur. Ex sicca autem venenis lingua arefcit, guttur sitimextinguibili afficitur: alius adstricta redditur, agrè redditur vna: omnia deniq; membra fiunt arida, & vigilie instant longissima. Postremò humida inexpugnabilem somnū adferunt, alui fluxiones, articularum neruorumq; luxationes. Ita quod quandoq; oculorum nerui, ac nexus in tantum laxantur, ut sponte sua è cavitatibus exeant capitq; propendeant. Plerunq; etiam extrema corporis partes putrescunt, ut in præcedentibus dictam est. Porro & illud adnotandum est, quod venena, quæ & manifesta, & occulta qualitate agunt, si fuerit hæc viribus alicui imbecillior, in fine suæ actionis eadem pariunt accidentia, quæ proueniunt ab his, quæ occulta duntaxat proprietate munus suum obeunt. Vis etenim qualitatū elementarium, quæ illis inest, vim illam propriam occultamq; quam hæc pariter sortiuntur, antecellit. Proinde printū qualitatis elementaris excedentis effectus præbent, eosq; subinde, qui propria eorum forma attribuuntur. Sed huius rei clariorem notitiam trademus, vbi speciatim singulorū meminimus. Hæc igitur sunt omnium venenorum indicia vniuersalia, ceteris quæ explicari possint, certiora ac manifestiora, quibus peritissimi Medici turò diiudicare possunt. Nam cum constet accidentia prædicta non solum perdurare, sed etiam augeri ac continue in deteriora labi, nulloq; modo auxilijs cedere, neq; natura repugnanti obsequiū præstare, clarum profecto mortis indiciū est. Contra salutis, si quando remitti accidentia, & agri melius habere videntur. Ceterum eorum, qui venenum sumpserint, vitæ esse debet (vbi tamen remedia, quæ postea dicentur adhibita fuerint) ex his rebus, quæ non solum habent nutriendi corpus, sed quæ etiam venenorum noxa resistere valent. Quo in genere lac asininū summopere laudatur: item caprinum, ouillum, lubulum, atq; etiam humanum, præsertim si recentem emunctum bibatur: quanquam lac omne efficacius exhibetur contra venena calida & erodentia, quam ad reliqua veneni genera. Ad hoc & butyrum facit. Faciunt & iuscula tum carniū pinguiū, tum piscium, quibus addi possunt, ut pinguiora reddantur, butyrum crudum & pinguedo animalium, quorum est vsus. Siquidem pinguia hæc idē conueniunt, quod vias obstruant, ex quo veneni transitus inhibetur. Quinctiam vbi venena excalfaciunt & erodunt, pinguia hæc acrimoniā eorum hebetant. Idcirco hoc in casu animalium cerebrum, atq; osium medulla aptissima pariter censentur. His similiter herba quæ plurimæ opem ferre possunt cibis admixta: e quarū numero probatur calaminta, organū, serpyllum, fisymbrium, ruta, buglossum, echium, filipendula, fenchus, pimpinella, aliæq; quæ plurimæ: quarū vim venenis, superioribus libris, aduersari retulimus, quarū et catalogum paulo infra recensimus. Locus deinde, in quo residere debent, qui venenū sumpserint, lucidus sit oportet: vbi aer quoq; sit nulla mala qualitate affectus. Paretur autē eorum cubiculū odoramentorū suffitu, quib. vis inest, ppulsandi venena. Idemim præstāt sunt alii omne myrrha, styrax, aloë, laserpitij lacryma, agallochū, scordium, castia odorata, citrei mali cortex, iuniperi bacca eiusq; lignū succum, & id genus plura. Insuper affecti veneno (Galeno auctore lib. 2. de antidotis) nihil aut parum dormire sinuntur. Somnus namq; venenum retinet in internis partibus, & facilius ad cor deducit. Contra verò vigilie, quippe quæ id à centro ad corporis superficiem, nempe ad externas partes, retrahunt. His ita institutis in primis omnia intra venena, castra ac diligentia curandum est, ut deuoratum venenum foras exhaeriat. Quæ in re nullum sanè valentius auxilium

Indicia in commune veneni sumpti.

Victus ratio eorum qui venena sumpserunt.

Remedia contra venena.

perhibetur, quàm vt sine vlla mora acri vomitum ciere cogantur: si tamen venenum adhuc in ventriculo resideat. Quod si iam in intestina descenderit, illud quàm primum clysteribus infusis extrahatur. Atqui in hoc omni diligentia ordinem ac modum inire debemus, què in huiusce voluminis præfatione nobis reddidit Dioscorides. Siquidem is de hac re ita exquisitè ediderim, q̄ si fortè is, qui venenū sumpsisset, ex omnibus vomitum cientibus auxilijs vomere nequiret, tunc (vt Rasis dicitur) medicamentis soluentibus, itemq̄ clysteribus erit procedendum. Medicamenta aut̄, quæ deiectoria potiuntur facultate, ad hoc idonea sunt agaricū & rhabarbarum. Quandoquidem vtrunq̄, præterquã quòd deiectoria vi præditum est, facultatem et venenis maxime repugnantem fortitur. Id q̄ etiam quidam minori centauro attribuunt. Neq̄, prorsus ab re esset ad idem Aegyptiæ siliquæ atrâ medullam aloemq̄, vsurpare: hac namq̄, præter deiectoriã facultatem, seorsum plurimum potestatem, ut dicitur, ad purgandam, quæ semper, vel plerunq̄, ingesta sequitur venena: illa verò q̄ aluum mirificè emollit, venenâ, cui tunicis adherens abluat & abstergit: quin & erodentium acrimoniã obtundit, & ea deniq̄, per acriã fecundè educit. His aut̄ peractis, ea certè clysmata cõpetere videntur (vt Diosc. placet) quæ acria sunt & trahendi vi prædita. Quod si ea succoesserint, quæ è iuribus pinguibus, adipe aut pinguedine, aut butyro aut lacte parantur, ne ulterius venena penetrat in intestina, fieri solet, nequaquã ea inutilia fore putauerim, præsertim vbi compertū haberetur, venenū intestina exulcerasse. Quamobrè lac copiosius epotum post vomitiones, & clysteria vtilissimū esse prodidit Auicenna: nempe q̄ venenâ noxiã strangat & sanet. Quinetiã summopere profunt, præmissis tamen vomitionib. & clysteribus, fortes ac valide diureses: utpote quæ nõ modo prohibeant ne venenū petat cor, sed et ipsum trahant à membris nobilib. internis, ad ignobilia externa. Ob idq̄, plurimū prodesse crediderim cucurbitulas, si ex igne natibus, & crurium pulpæ applicentur. Ferunt fœdèter opem frictions ex asperis linteaminibus, quin & fibula strictim facta ita vt dolorẽ excitent, manuum pedumq̄, digitorum item brachijs & cruribus. Mirificè et venenū auertitur à partib. intrinsecis, si patientes in balneo aqua calida ex medicamentis accommodatis confecto, vel in laconico sicco sudorem ciente imponantur. Quandoquidem huiusmodi calor extrinsecus efficacissimè venenū ad cutim trahit. Balnei ac laconici vicem illud sanè supplere poterit, si dissecto viui muli, aut equi ab exercitis statim intestinis, ager in animalis cadauer intromittatur, & cum refrigerit cadauer, idẽ et de alio fiat, quousq̄ fuerit. Ad hoc autem muli, mulaq̄, (vt vulgi fert opinio, fortasse q̄ hac animalia plurimū caloris habeant) ceteris præcipue animalibus. Hoc. n. auxilio à veneno liberatum narrant Valentinum Alexandri sexti summi pontificis filium. is enim, n. ferunt) cum in quadã cœna aliquot Cardinalib. venenū exhibere vellet, sibi ipsi, ac patri id imprudenter exhibuit. Cõueniẽt scire et conuenit, quòd quamuis prædicta remedia omnia communiter venenis opulentur, non propterea est dominè quin continuè infectis propinètur omnia probata antidota, tam simplicia quàm composita, quæ cuiuscunq̄ venenâ auferre possunt. Simplicia quidem medicamenta quæ ad hoc idonea Dioscoridi, reliquisq̄, Græcis posterioribus celebrata sunt vinum vetus copiosius epotum, Lemnia sphragis, agaricum, abrotonum, irio, eryngij radix, napi & pastinaca semina, calamintha, nardum Celticum, castoriū, ferula virentis medulla, slos rhododendri (quanquã is Galeno, alijsq̄, ipsum sicutis in antidotū minimè recipiatur, sed potius inter venena annumeretur) succus marrubij, laferpitij & panacis, (q̄ quæ aristolochia longa, semen ruta syluestris, betonica, pix liquida delincta, polij & seselis decoctū, phu, cinnamomū, castorei niperi bacca, citria mala, & quæ limonia, & aurantia vocant, & eorum semen. Item glandes, præsertim quærna ex hano lacte epota, quinquefolij radicis succus, leporis coagulū, mustella caro sale inueterata, & in vmbra siccata, cum vino pota, lac canis ex primo foetu acceptū, capparis, chameleonis albi radix, apij decoctum, polemonia radix, tribuli terrestris succus, smilacis aspera acini, scordium, thlaspi, & Cretense dictamnū. His Arabes & recentiorū nonnulli castaneas addunt: item ponticas nuces, mespila, pistacia, Zedoaria, lauri baccas, gentiana radicem, quin & dictamni albi, tormentilla, in Illyrica, hastula regie, helenij & millefolij: rhabarbarū, hederæ corymbos, bolū Armenium, hypericū, sabinam, masticam, pimpinellam, Imperatoriam, centaorium maius, angelicã, verbenacæ succum: mures, qui napelli radices depascunt, & muscas grandiores, quæ eius folijs victitant: filipendulã, carpobalsamum, muscum odoratum, ambarū, os in corde compertum, & ceruinū cornu, quin & monocerotis, vrsi testes, & arietis, origanum, simaragdum, lapidem bez abar, & quosdam quem sanctum vel benedictū appellant. Et hac de censu omnium simp. med. quæ contra venena pollent, quæ nobis tunc videntur recentiores scripta reliquerunt, dixisse sufficiant. De compositis aut̄ medicamentis illud proferre non dubitauerim, si Theriaca legitime parata reperiretur, non essent aliunde petenda auxilia contra venena. Sed quoniã mihi plane displicimū esse videtur, vt ea reperiat, quæ quæadmodum eius exigit apparatus, confecta sit, cum nobis desint cinnamomum, balsamū, petroselinum Macedonicū, myrrha, folium, chalcitis (quam tamen iam nobis cõpertam putamus) amomum, spalathus & calamus odoratus, quæ omnia perquã maximi sunt momenti, idcirco nunquã adducar, vt credam venenâ Theriacã posse sibi locum & vsu illius antiqua legitime vindicare: præsertim cum cõstet tempore vsq̄ Galeni, quo Romani summo imperio potiebantur, Theriacã omnibus numeris absolutã confici nõ potuiss. vt ipse Gal. testatur lib. 1. de antidot. nisi ab Imperatoribus: quanquã non deessent tẽpore Antonini Caesaris diuites primates, qui eam consecerent, et quod multa eis desiderarentur. Quare illud dixi, q̄ si vlla Theriaca ex ijs, quæ nostra atate conficiuntur, in vsu admitti debet, dent operam Medici diligentissimi, vt illa saltem vtantur, quæ omni studio ac diligentia parata sit, clarissimorū & prætiosissimorum virorum testimonio: quæq̄, eo modo experientia cõprobata sit, quo docet Galenus libro quẽ ad Pisonem scripsit quin & alio, quem Pamphiliano dicauit. Hoc itẽ faciant de Mithridatio, q̄ nihil minus quàm Theriaca præstat aduersus venena, quodq̄, & facilius parari põt. Quæ in re caueant homines ab adulteratis Theriacis, quas in publicis foris vendunt circulatores, et si plerunq̄, ab his, quos eorum adulteria fraudesq̄, latent ceteris meliores atq̄, efficaciores habentur: quippe q̄ nihil vltra videant astantes, quàm quòd ij siustum integrum arsenici, vel risagalli officinis vocati, deuorant: quodq̄, subinde deuorata Theriaca, quam postea circumstantibus vendunt, nullum veneni incommodum sentiant. Quòd cum Galenus optimè nouisset, libro Pisoni dicato, ita scriptum reliquit: Multa à subdolis improbisq̄, in hoc quoq̄, fraudes sunt, ac vltimus solus antidoti opinione deceptum, ab ijs quibus ars est mercenaria, plurima pecunia medicamentum, vel præuic confectum red. mit. Ceterum vt quisq̄, flagitiosorum impostorum fallacias & dolosas merces euitare possit, & debeat, nunc mihi in animo est ad cõmune rei publicæ beneficium eorum ingens, ac scelestum facinus posteritati prodere. Nam cum isti suggesta ascendunt coram populo, quem dolus capere intendunt, ostensuri quòd venenū aquè ac panem innoxie sumant, multis canillationibus atq̄, insidijs vtuntur. Inter quas has duas habent fraudes, quas modò omnibus aperiam, quæq̄, retinent illi in suos chariores (vt ita dicam) lenones. Primus itaq̄, dolus, quo nituntur huiusmodi fraudulentissimi impostores, est q̄ cum sciunt venena non posse nisi parum nocere, vbi ventriculus fuerit cibus valdè repletus (vt in præfatione huius libri tradidit Dioscorides, & libro quarto sen sexta retulit Auicenna) priusquam suggestum ascendant, ad saturitatem vsque, præsertim estate, lactucas crudas deuorant sale, aceto & oleo conditas: verum olei tantum imponunt, vt ferè in eo innatent lactuca

si nota
quæ in
cada.

Cucurbitule.

Balneum.

Simplicia
medicameta
quæ pollent
aduersus ve
nena.

Composita
medicameta.

Theriacæ ve
terum & re
centiorum
comparatio.

Fraudes qui
bus vtuntur
circuforanei
qui venena
innoxie sume
re proficiunt.

gelica, millefolij, filipendula, zedoaria, gingiberis, singulorum drachmas duas: agarici drachmas tres: libenocida mar-
gentiana, morsus diaboli sic herbarijs dicti, cuiusq; drachmas duas & semis. Ad hac seminu citrei mali, vitruu, cocca, tui-
Etory, fraxini, oxalidis, pastinaca sylvestris, napi, nigella, peonia, ocimi, irionis, thlaspi, feniculi, ammi, singulorum tra-
chmas duas: prater ea baccarum lauri, iuniperi, hedera, aspera smilacis, cubeba, singulorum sesquidrachmam. Foliorum iun-
dij, chamedryos, chamapityos, centaurij minoris, stachadis, nardi Celtici, calamintha, ruta, mentha, betonica, veronica,
scabiosa, cardui benedicti, melissophylli, singulorum sesquidrachmam: dictamni Cretensis drachmas tres: sampuch, hyperi-
iunci odorati, marrubij, galega, sabina, pimpinella, cuiusq; drachmas duas. Caricarum, nucum iuglandium, pistacorum,
singulorum vncias tres: myrobalanorum empelicorum drachmas quatuor. Florum vtriusq; buglossi, rosarum, leucadum,
salviae, rorismarini coronarij, cuiusq; scrupulos quatuor: croci drachmas tres. Cassia odorata, quam hodie cinnamomum
vocat, drachmas decem. Caryophyllorum, nucis myristicae, macis, singulorum drachmas duas & semis. Piperis nigri
longi, sartalorum omnium, agallochi, singulorum sesquidrachmam. Cornu cerui crudi drachmas quatuor: vnicoru dra-
chm an vnam: osis cordis ceruini, ramentorum eboris, virga ceruinae, castorij, singuloru scrupulos quatuor: terra Lemna
drachmas tres: opij sesquidrachmam: margaritarum orientalium, ramentorum smaragdi, hyacinthi, coralli rubri, singu-
lorum sesquidrachmam: caphura drachmas duas: mastiches, thuris, styracis, myrrha, gummi Arabici, resina terebinthina,
sagapeni, opopanax, luserpiti, singuloru drachmas duas & semis: moschi odorati, ambari cuiusq; drachmam: olea e chel-
cantho confecti vncia unam mediam. Pulueris cordialis temperati, diamargariti, diamoschi, diambari, electuarij e gemma, pa-
stilloru caphurae, scilla singuloru drachmas duas et semis: pastilloru viperae vncias duas. Succu oxalidis, funchi, scorpij, con-
buglossi, melissophylli, singulorum selibram: hypocistidis drachmas duas. Theriaca electa, Mithridati optimi, cuiusq; v-
cias sex. Vini veteris albi odorati libras tres: sacchari e Medera insula, vel optimi mellis libras octo & vncias sex. Ex
bus his summa diligentia & ratione inquisitis atq; selectis, fiat electuarium, eo modo quo theriaca, aut Mithridatu anti-
tum conficiuntur. Sumendi quantitas est a drachma vna vsq; ad tres pro etate & constitutione patientis. Atq; ita om-
bus persuadere poteris, antidotum hoc non solum praestantissimum esse (vt ante diximus) contra omnia venena, quae
os sumuntur, itemq; aduersus ea, quae morsu vel ictu relinquuntur: verum etiam in pestilentia, cui mirifice opitulatur
solum quotidie assumptum nucis Pontica quantitate ad praeseruandos sanos, sed etiam ad sanandos iam pestilentia affec-
tibus in morbi principio propinetur ex cardui benedicti succo, aut stillatitia aqua, vel galega seu ruta captaria vocata, au-
rum drachmarum pondere, affectis deinde in lecto ad sudandum collocatis, bisq; aut ter repetita portione, nonnulla tamen
interpositis horis. Sanatos enim scio esse quamplurimos hoc tantum singulari auxilio. At si cui in animo fuerit, ut po-
sentaneum adferat auxilium, hac faciat oportet. Antidoti praescripti libram accipiat, libram item syrupi e citri nati-
tice parati, & libras quinque aquae vitae vocatae, ex optimo odoratoq; vino confecta, totiesq; vitreus organus reponatur.
quinta essentia speciem praeseruat. Deinde omnia haec in vas vitreum inijciat duple a rebus inditis capacitatis: postea
sis ore ita obturato, vt nullus spirandi meatus relinquatur, magna cum dexteritate aquam in vase cum electuario
agitet, donec totum dissoluatur: atq; tum vas ore cera, vel pice obducto in mensum integrum reponat, quod tamen
hebdomada agitari conuenit eo modo, quo antea dictum est: fit enim, vt electuarium facile residat in fundo, si dimittatur.
Exacto denique mense claram aquam aureoq; colore nitentem, electuario supernatare inueniet, & qua iam omnem
illius vim in se contraxerit. Tum itaque vas ipsum aperiat, & in vas aliud item vitreum lympidam aquam per
effundat, cuius os cum cera, & membrana accuratissime obturet: nam si illud diei spatio apertum sineret, omnis concinnis
aqua in auram euanesceret. Tanta haec aqua virtute pollet (quod millies expertus sum) vt quatuor drachmarum portio
pota vel per se, vel cum pari odorati vini quantitate, vel stillatitia cuiusvis aqua ad cordis robur facientis, vbi quicquam
demorsus a quocunq; venenato animali, in tanto mortis discrimine versaretur, vt vocem, visum, ac reliquos sensus
misset, agrum ingenti adstantium admiratione a longo veluti somno excitat. Quin & vomitione plerumq; purissimum
fectorum humorum copiam exhaurit. Cuius rei exemplo (praeter alia innumera) nuper mihi fuit praescripti oppia
vixor, quam a vipera in dextra manu demorsam, & iam iam de nauo rationem cum Charonte in turram, hac aqua
tam a morte reuocauit. Id quod etiam paulo post contigit cuidam miserae Sclauae ab alia non dissimili vipera in manu
morsa. Hac idem similiter praestat contra venena, quae per os sumuntur: siquidem ea adeo tenuis essentia, efficae & p-
netrans est, vt momento vi sua in omnes corporis venas permeet. Quin & eosdem praebet effectus in aliis quam plurimis
morbo, quos breuitati studens praetero: quandoquidem prudentes, & periti medici, habita huiusce virium exacta rati-
one, eam adhibere poterunt, vbi legitime conuenire censebunt. Porro antidotum alterum generosum pariter & singulari-
oleum illud est, cuius superius libro secundo capite de scorpionibus, item quarto capite de aconito a nobis facta sunt mentio.
Id pulsibus extrinsecus patientibus illitum, nempe temporum, manuum ac pedum, quinetiam extrema cordis parte ad sin-
stram mamillam, repetita alternis tribus horis illinitione, efficacissime succurrit omnibus venenis per os sumptis, quae
men ex erodentium genere non fuerint. Similiter viperarum, aspidum, & cuiuscunq; deniq; venenati animalis morsu
singulari auxilio est, vt in processu latius explicabimus. Praestat praeterea ysdem locis semel quotidie inunctum non quidem
calidum, sed frigidum, ad praeseruandum a pestilentia homines, qui eo se inungunt, quin etiam ad sanandum iam pestilen-
tia affectos: necat quoq; vermes, naribus & pulsantibus arterijs inunctum, & praesertim vbi caetera auxilia non valent.
Vt autem omnes intelligant quam maximum sit in me iuuanda posteritatis studium, modum, quo illud conficitur, scribo
scribere non grauabor. Sumantur itaq; ineunte mense Maio, quo tempore confici debet, olei communis centum cantharis,
sin minus sui temporis vetustissimi libra tres: foliorum hyperici virentis manipuli tres. Oleum in vas vitreum duple a con-
tento capacitatis imponatur, inde hypericum aliquantulum antea contusum infundatur: deinde vas cera, & membrana
obturetur, & medium in tenuissimam arenam condatur, loco vbi tota die insolari possit, atq; inibi sinatur ad decimum
vel duodecimum diem vsq;. Quo exacto tempore mergatur vas in calentis aquae balneo ad viginti quatuor horas: mox e
ab herba exprimatur. Hoc factum sumatur hyperici, chamedryos, calaminthae, cardui benedicti, singulorum manipuli: quae
omnia prius diligenter contusa oleo admisceantur, ac subinde vas in praedictum mergatur balneum tribus continuis diebus
extrahatur deinde, & ab incoctis herbis exprimatur. Post hac accipiantur florum hyperici manipuli tres, qui a vniuersis
probe repurgati, & contusi in praedictum oleum infundantur, ac in idem balneum per triduum reponantur. Post id tempus
excimantur, & vt prius exprimantur. Idem fiat ter aut quater, vsquedum oleum sanguineum colorem referat. His per-
actis sumatur hypericum, quod iam destoruerit, & ab eius cacumine grana illa viridia excerpantur, quae herbae in g-
nis similia deprehenduntur, in quibus semen continetur. Ex his itaq; tres confertim manipuli decerpantur: quae postea
si, & vino meraco albo aliquantulum persusi in oleum praedictum infundantur, & cum eodem vitro, in arena spulsa
cto diebus continuis insolentur. Quo tempore transacto tridui spatio in balneum immittantur, post colentur, & non
praedicta

Antidoti
Matthioli
vius.

Potio ex pra-
dicto anti-
doto.

Aqua Matth.
vius.

Alterius anti-
dotti descri-
ptio & vires.

Ol. scorpio-
ni confectio.

praefato exprimantur: tertio aut quarto similiter dictum semen in oleo macerari debet, donec id ebulli sanguinis colorem
 receperit: Ad haec sumantur scordij recentis, calamintibus, centaury minoris, cardui benedicti, verbenae, dictamni Cre-
 tici singulorum medius manipulus: tundantur omnia, mergantur in oleum praedictum, & vas in balneum iterum im-
 ponatur per biduum continuum, deinde colentur & exprimantur, ut supra. Postea sumantur zedoaria, radicem dictamni
 albi, gentianae, tormentillae, anisi, alochiae rotunda, singulorum drach. tres, scordij manipulus. Tundantur item omnia, in-
 fundantur & immittantur in balneum, ubi permancant tribus diebus continuis: colentur deinde & exprimantur. In-
 fundantur ut denno styracis calamita, laseris, cuiusq. drach. sex, baccarum iuniperi drach. quatuor, melinthi drach. dua, cas-
 sia odorata, cinnamomi officina vocant drach. novem: iunci odorati, cyperi, singulorum sesquidrachma: santalorum
 alborum semuncia. Tundantur omnia (ut plures de alijs dictum est) & in idem oleum infundantur, & per triduum con-
 tinuum in balneo macerentur, demum colentur & exprimantur, modo quo ante dictum est. Postremo adfins oportet
 trecenti scorpiones vni diebus canicularibus collecti. In vase vitreo conclusi, cineribus calidis superponantur, & cum eos
 praecalore sudate, atq. trasei constet, omne iam dictum oleum calidum superimiciatur. Sed advertendum est, ne id adeo fer-
 uens sit, ut vas disrumpat, obturato statim vasis ore in balneo tribus continuis diebus contineatur: deinde coletur & ex-
 primatur. Proiectis interea scorpionibus, rursus in oleum infundantur rhabarbari laudatissimi, myrrha communis vsus,
 aloes hepatica, singulorum drachma tres: nardi Indici drachma dua, croci drachma vna: theriaca electa, electiq. Mithrida-
 ty, cuiusq. semuncia. Quae ex his tundenda sunt, terantur, mox ultimo infundantur in oleum, quod per triduum continu-
 um contineatur in balneo. Quo facto oleum non amplius percoletur, sed deinceps recondatur, perinde ac opobalsamum, quippe
 per quod mirandum sit remedium ad iam dicta venena, & praecipue contra napellum, quo infecti fuerit, ut experimentum
 facit. Cuiuslibet duo vitarum obiectores, quorum historiam supra retulimus libro quarto in aconiti mentione: ad cuius lectio-
 nem, ne idem sit repetamus eos retulimus, qui eius desiderio capiuntur. Caterum ut omnia mea in Reipublica commodum
 erant, in materia quoq. Antidotum addam, quo nihil sane valentius ad venenorum vim coercendam: nempe pulverem
 idem, auterrimum: cum quo (ut superius libro quarto de aconiti discretis retulimus) huius sanati sunt, qui Arsenicum
 & Napellum hauserunt. Datur robustus drachmarum duarum pondere, cum ceteris drachma sufficiat, ex vino Cretico, vel
 alio pariter generoso, reperiturq. potio per intervalla, ubi vna tantum non sufficiat: verum tunc obolus satis est. Qui qui-
 dem pulvis, si meti mirum in modum deleteria venena omnia superat, vincit ac destruit, non tamen si praesumatur ab his-
 dem praeruat. Parandi ratio haec est. Sumas radicem minoris phu drachmas quatuor. Vincetostici, vrtica vulgaris, cu-
 urq. vna, vna: Angelica domestica, Althaea cuiusq. vncias duas: Angelica sylvestris vncias quatuor: Polypodij fescun-
 diam, Corticum radium chamacha, siue (ut Aphri dicunt) mezereonis, drachmas decem. Colliguntur haec radices ad calcem
 Augusti, siue in eunte Septembri, tessellatimq. secantur, & siccantur in umbra. Deinde feruescunt in aceto albo acerrimo olla
 cooperculo diligenter oclusa argillaceoq. luto agglutinato, per dimidia hora spatium. Amouentur postea ab igne, & cum
 relaxerint eximuntur, iterumq. siccantur in umbra. Demum teruntur in pulverem, additis herba Paris baccis duodecim,
 & folijs sex & triginta. Praeter autem Mithridatum, antidota alia duo generosa Dioscoridi probantur in presenti praeser-
 tione, vnum scilicet quod est scinco, alterum quod de sanguine nuncupant: sed quod ut eorum conficiendorum rationem tradi-
 derit, nusquam haecenus reperit. Quamobrem illa duo in multorum gratiam hic adscribere, non alienum fore duximus, eo
 tamen modo, quo lib. 2. de antidotis a Galeno seriatim describuntur, ubi haec scripta reliquit. Antidotus δὲ τῶν αἱμάτων
 id est, ex sanguinibus, ad venena, venenatorumq. omnium morsus idonea, sic habet. Piperis longi, piperis albi, acori, croci,
 phu, mei, dictamni Cretici, ammoniaci, agarici singulorum drachmas duas: amomi, opobalsami: seminis ruta sylvestris,
 cymini Aethiopi, anisi, sanguinis anatis maris, & taminis sicci, sanguinis hadini, sanguinis anserini, seminis napi sylves-
 tris, singulorum drachmas tres: gentianae, trifolij, florum iunci odorati, thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmas
 quatuor: & rosolini drachm. quinque: poly Cretici tantundem, cinnamomi drachmas sex, florum scordij drachmas
 octo: myrrha, nardi singulorum drachmas decem, croci drachmas duodecim, cassia drachmas octo. Omnia
 haec diligenter contusa, ac per excussorium cribrum traiecta melle Attico despumato, commiscebis, commistaque in
 argentea pyxide repones, atq. hac ut maximo medicamento vteris. Caterum quae scinco temperatur antidotus, a Galeno
 hunc in modum redditur. Antidotus Mithridatus Eupatoris δὲ οὐδὲν ἕτερον ὀνομασμένη, faciens ad venena, omnemq. vene-
 natorum materiam mortem inferentem, omniumq. venenosorum animalium ictus, conficitur hac ratione. Scinci, sagape-
 ni, acori, phu, hyperici acaciae, vidus, mei, gummi, singulorum drachmae dua: rosarum siccarum, gentianae, cardamomi,
 singulorum drachmae quatuor, opij, oboli duo: styracis, drachma octo: polij, cassia nigra, seselis, bdelly, balsami, piperis albi,
 singulorum drachmae quinq. & oboli duo: succi hypocistidis, popanacis, myrrha, thuris masculi, castorij, piperis longi, cy-
 plicae, foliorum malabathri, singulorum drachmae sex: scordij, costi, florum iunci odorati, galbani, resina terebinthinae,
 singulorum drachmae sex & oboli duo: nardi Syriacae, opobalsami, thlaspis, dauci Cretici, singulorum drachmae sex & o-
 boli tres: croci, cinnamomi, zingiberis, singulorum drachmae sex & oboli duo: succi glycyrrhizae, agarici, singulorum dra-
 chmae septem & oboli tres. Construitur autem hoc modo. Cyphi, hypocistidis, sagapenum, gummi, opium, styrax, popanax,
 vino Chio macerantur die noctuq., quoad peritus dissoluta sint. Reliqua vero interim contusa tenui cribro excutiuntur,
 illiq. iam maceratis ac dissolutis commiscetur, commistaq. Attico melle ad crassitiem vsq. despumato excipiuntur, opo-
 balsamog. superimisso: demum in vas argenteum transferuntur, atq. ad multos vsus reponuntur. Datur autem ex hac
 antidoto quantum eger tolerat. Haec de duabus antidotis, quas non immerito quidem probavit Dioscorides, quasq. ut ef-
 ficacissimas in aliarum censum retulit Galenus atq. descripsit. Sed quoniam (ut supra in Theriaca mentione dictum fuit)
 multa nobis de sunt simplicia medicamenta, quae in eis expetuntur: idcirco non video quomodo possint legitime confici, nisi
 utriusque velimus, quae eorum vicem supplent, ita ut vnum simplex medicamentum in alterius locum succedat, id quod medi-
 corum ac seplasiariorum plerisq. fieri adsolet. Quorum sententia etsi cuiquam videretur Galenus ad stipulari, quippe quod
 scriptis tradiderit in cinnamoni defectu duplum cassiae subijci posse, non tamen propterea inde colligi potest, quod idem fie-
 ri possit de quocumq. alio simplici medicamento, quod desideretur, ut quidam existimant, non recte, meo quidem iudicio,
 Galeni mentem assecuti. Siquidem is secus de hac re disserit lib. 1. de antidotis, ubi sic inquit: Quod ad cassiam vero attinet
 ea me commemorare nunc opus est, quae in multis de medicina libris scripta sunt, duplum cassiae si quis cinnamomo egeat,
 iniiciendum. Hoc dictum irridens Satyrus magister meus, vnam ex Quinti facetys ipsum esse dicebat, asseuerans eos, qui
 duplum cassiae imponere iubent, si cinnamomo careamus, similia illi facere, qui nos censent, si quando Phalerno carueri-
 mus, illius quod in cauponis venditur, duplicata mensura bibere: siq. panis filiginis desit, surfuracei duplum comedere.
 Mihi vero haec Quinti facetia, si de re vna quapiam, quae per se sola utriusque velimus, asseratur, vera irreprehensibilisq. videtur:
 si de re, quae in societatem multorum veniat, non est eodem pacto vera. Nam cuiuscumque, quod solum corpori admo-
 ueri

Pulvis contra venena.

Antidoti e sanguinibus descriptio.

Antidoti e scinco descriptio.

Succedanea quando admittenda.

ueri debet, ut puta rhus, absinthium, iris, gentiana, vel id genus alia aliqua medicina, si quis minus boni duplum loco promiscendum fuerit, quod se aucturum aliorum vires respondeat, si praestantissimum desit, peius nihil erit uti duplicatum, qui proprietates eiusdem generis habeat, etiamsi deterius hoc illo videatur. Cassia quidem cinnamomo genere proxima, que adeo est, ut ex ipsa quandoq; cinnamomum oriatur, spectenturq; nonnunquam cassiae arbores integrae, in quibus aitate functionibus in extruenda domo, in fabricanda navi, in tollendis & transponendis oneribus, in omnibus deniq; operationibus, in quibus quod peragendum erat ab vno homine robusto, si absit, a duobus imbecillioribus perficitur: hac Galen. Ex quibus verbis omnibus palam est, Galenum non assentire, ut in compositis medicamentis vna simplex pro alio proponatur, nisi ex ijs sint, quae eandem naturam sortiuntur, ut cassia & cinnamomum. Quare illud inde colligendum esse patuerim, quod perperam faciunt y, qui rem hanc aliter intelligunt. Porro & illam antidotum, qua iuniperi baccas, terramq; Lemniam recipit, summopere laudauit Gal. eamq; lib. 2. de antidotis memoriae prodidit, hisce verbis: Antidotum, qua exhibitam accipientem tutum a venenis reddit, sic habet. Baccarum iuniperi drachmas duas, terra Lemnia drachmas duas & o-bolos duos. Hac vbi in puluerem redegeris, oleo aut melle commiscebis & repones: atq; cum opus fuerit, ex aqua mulsa & athis duobus quantum est auellana dabis. Hac antidoto Nicomedes rex utebatur, si quando suspectos habuisset, qui se ro-carant. Nam si venenum non subsit, quietam manet: sin adsit, nauseam concitat, & euomere cogit, ita ut venenum quoq; cum antidoto reijciatur. Sed haec haecenus dicta sufficiant, quantum ad venenorum omnium in vniuersum rationem, quandoquidem de ijs priuatim, eorumq; auxilijs, & antidotis in singulorum mentione diffusius agemus.

Antidotus ex
terra Lénia.

Karbaeides.

CANTHARIDES.

CAP. I.

Quibus datae sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsq; cuncta en-di sentiuntur: picem aut simile quiddam cedriae resipiunt: dextra praecordia inflammantur: vrinam aegre reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo referuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; vertigine concidunt: postremo mente abalienantur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur: mox vbi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryzae, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluae, aut feminis lini, aut foeni graeci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adhuc, eluendo excernantur ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor: ipsam virus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen interiecto tempore, molestissimas inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant & leniant. Tum vbi corpus calfacente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeat. Gallinaceis carnibus & hædinis, aut fuillis catulis, maxime pinguibus, & teneris, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem aluum cient, atq; venenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quatuor singulorum drachmæ cum passo sumantur: item pulegium ex aqua tritum: irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto: recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota aumantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Cantharidum
malefica &
noxia vis.

Symptoma-
tum causa.

Canthari-
dum veneni
curatio.

Cantharidum tum historiam, tum etiam facultates superius libro secundo, vbi & earum picturam exhibuimus, ac diffuse lateq; tradidimus, ut superuacuum ducerem hoc in loco plura de eis rememorare, nisi nunc de earum malefica & noxia vi nobis differendum esset. Cum igitur Cantharides excalfaciant recessu quarto, & exiccant secundo, mirum fuerit, si erodant, vlcèrent, & deniq; sumentes interimant. Nocent priuatim vesicae, omnibusq; vrinæ inferentibus membris, non modo hausta, sed quandoq; etiam exterius illita, vbi exulcerare sit opus: praesertim cum amplius adu- scentur cataplasmatibus, locisq; illinuntur vesicae propinquieribus: nempe coxendicum articulis dolore diutius tentatis, vel pubi vel renibus, vel testibus. Quo fit, ut qui has hauserint, exulcerata inde vesica, magnis in vrina reddenda excreta- tur doloribus: quanquam praeter id omnia in vniuersum ladant viscera, quod suapte natura erodant, & postremo necem inferant: namq; sua venesica, & perniciose vi deradunt internos meatus omnes, quibus obuiant. Proinde nec mirum si cum lotio sanguinem extrahunt, erosio ab eis vas: neq; si quando (ut recentiorum quidam dixerunt) penis ipse, testis, pa- bes, & vesicae ceruix intolerabili inflammatione vexentur. Hinc enim plerumq; euenit, ut qui hauserint, vrinæ sicuti afficiantur non sine intolerabili ardore angustiaq;. Caterum picis & cedriae odor, quem a cantharidibus male affectis g- stu & olfactu percipiunt, aliunde, meo quidem iudicio, non prouenit, quam a vaporosis humoribus in ventriculo & uen- nore adustis, intensa huiusce veneni caliditate. Ab ea siquidem dum exuruntur humores, quadam inuicem sit com- qua propriam tum gustum, tum odoratum inscisciendi facultatem adipiscitur. Inflammantur praeterea dexteri lateris pra- cordia, quippe cum veneni vis in iecur facilius, quam in lienem excurrat, mirum utiq; non est, si concitatus ibi inflam- tionibus, potius dextrum, quam sinistrum agrotet latus. Nec alia ratione fit inde fluxio dysenterica similis, secundum de- intestinorum ramenta, quam quod Cantharides ipsa ad intestina descendentes, acerrima sua vi ea exulcerent & abra- dant. Defectus vero animi, ingens anxietas, cordisq; angustia partim eueniunt, doloris, ardoris intolerabilisq; inflamma- tionis exuperantia: partim vero deleteria vi pharmaci, quæ vsque adeo resoluit vitales spiritus, & imbecillos redat, ut de affecto corde, haec tam seua oriuntur symptomata. Quin & ob id vertiginosi fiunt, delirio amentiaq; capiuntur, qui ea sumpserint, quod venenosa exhalationes, quæ a colliquo humoribus in inferioribus membris sursum in cerebrum i- runt, adeo ipsum insciant, ut facile animales facultates corrumpantur, ratioq; ipsa pereat. Sed ut his omnibus succur- tur incommodis, primum sane necessarium fuit, ut etiam Dioscorides inquit) cantharidas ipsas extra corpus ducte re- brues-

in excoriatis vomitionibus, ut nimirum medicamentis quorum in huius libri prefatione meminit Dioscoridus, quorum mentionem fecimus in nostra in eam longa commentatione. Quinetiam acris dygnatis opus est, ut per se ad uentrem que ad intestina descenderunt. Est enim ut exhaustus è corpore cantharidibus, non magno postea negotio, acris uentris incommodis, praesidia adhibeantur. Quandoquidem exulcerata vesica, cui suapte natura plus nocent cantharidibus, quam ceteris interioribus visceribus, succurritur, et frigida, lentis et pinguis simul misis medicamentis, frigida uisum, et amones extinguunt, mulcent, et carum dolores, pinguis ueniens acrimoniam obtundunt: lentia uero acris, et non inter partibus pertinaciter inhaerant, non modo dea medicamenta in excoriatis retinent locus, sed etiam sanam partem mutant, ne ueniens vim admittant. Idcirco ad hoc officium praestat lac humanum ab ipsis uerbis exuendum, et crudum reuocatum, et elegantis modo linctum: pistacia, et ceterorum malorum, et maluae seminis spissamentum: item serapium ex nymphae floribus et papaueris uiole, quoniam et quod ex papaueris conficitur, nec non lactuca, et portulaca, et cucumeris, et cucurbita succus: praeterea cremor, lactis speciem referens, qui ex papaueris, melopeponum, cucurbita, cucumeris, arguriae et lactuca semine exprimitur solet, affusa violarum aqua, aut radice albaea, aut solani, quod vesicarium et halicacabi vocantur, nunc etiam rubentes bacca decem, vel duodecim numero fracta, et ex aqua portulaca, vel ptisanam hordeacea pota, hoc in negotio praesentaneo remedio profunt. Fuit ad hoc et amygdalinum oleum, quod scilicet ex dulcibus elicitur nucibus, unguentum sex pondere haustum. Huius autem praesertim, quod è recentibus pinis nucibus exprimitur. Sed omnium praesertim, unum est, quod è semine albi papaueris exprimitur: quandoquidem hoc praeter id quod tanquam pinguis plurimum conuenit, potest suapte natura inflammationes extinguere, ueniens acrimoniam retundere, et dolores quantum uis uehementes sedare. Sunt etiam qui praesertim aquam, qua feruentis balnei calore uitreis instrumentis elicitur è malua solis, et radicibus et recentibus cucurbita ramentis: quod propria uis uine ardoribus opem ferat, et intestinum inflammationem repellat. Porro succurritur exulceratis intestinis eodem sanis medicamentis, quibus ad dysenteriam utitur, nempe papaueris, et carum uentris dyltere infusis, addito hirci, cerui, et adipe: et omphacino rosaceo, plantagine, et portulaca aqua pota elota. Prohibentur balneis cerulorum potens, dissoluntur in sumptis antidotis, que ueniens resistunt, et humores proretere non sinunt: quinetiam cataplasmatibus ex frigidis, repellentibusque succis, sincipiti et coronali sutura illitis. In summa frangitur atque demolitur ueniens uis, Dioscoridis testimonio, ualentibus antidotis, ueluti Theriaca aut Nitridatio, ut scribit Galenus lib. 9. simplicium medicamentorum capite de terra Lemnia) eo antidoto, de quo et nos superius locuti sumus, quod fit ex ipsa Lemnia sphragule et iuniperi bacca. Profunt insuper epithemata corroborantia, inter haec unguenta, que ex odoramentis constant ualentioribus: praesertim oleum nostrum de scorpionibus superius descriptum aduersus uenena. Refert Galenus libro secundo de antidotis Asclepiadis auctoritate, cantharidas proprio ueneno remedium et antidotum esse, si earum pedes, et ala trita cum melle elegantis modo paulatim assumantur. Id quod etiam asseruit libro 11. simplicium medicamentorum, ut superius libro secundo in earum quoque mentione retulimus. Hoc idem scribit Aetius a Galeno fortasse mutuatus lib. 13. cap. 49. sic inquit: At uero contraria affectionis ratione, quantum nihil aliud his auxiliatur cantharidum ala, et pedes cum passopota: hac Aetius. Veruntamen cum huiusmodi remedium suffragio non uacet (non propterea Galeni testimonium reuocandum putauerim) cumque a multis improbetur, atque ipse nihil aliud, cuius periculum fecerim, ideo nec ipsum damnare, nec probare ausim. Arabes namque pro certo habent, omne uenerunt, quod cantharidibus insit, earum tantum ala, pedibus et capitibus inesse. Quare cum cantharidas suum in se ueniens medicamentum, tam intus sumendum, quam extra adhibendum, iubent contra Graecorum sententiam, ut capitula, ala et pedes abscondantur: quanquam credendum arbitror Arabas Hippocratem perperam intellexisse, ut ultimo commentario de ratione uictus in morbis acutis scribit Galenus. Sed quoquomodo res se habeat, amborum partium placita in medium attulimus, ut unusquisque suam in hac re sequatur sententiam. Nos tamen suspecta medicamenta semper dimitte-
 40 tendi iudicauimus, atque huic utendum, de quibus inter probatos auctores, et doctos viros conuenit. Sunt è uulgaribus, qui ad epotas Cantharida acetum commendent. Sed id equidem probare non ausim, quod antiquorum recentiorumque, repperim neminem, qui scriptis tradiderit acetum contra cantharidas auxiliari. Quinetiam medentur uirina ardoribus et pudendorum inflammationibus, non tantum ea medicamenta, que per os sumuntur, sed ea quoque, que exterius illinuntur. Praesertim igitur ad hoc rosaceum, omphacinum oleum, violaceum, et quod fit ex nymphae floribus: item quod ex papaueris semine conficitur, quodque ex his paratur fructibus, quorum plantam appellant aliqui Balsaminam, alij uero Caranzam, cuius historiam ac facultates superius libro quarto descripsimus, cum de uite nigra differeremus. In quem usum hac non modo exterius illinuntur pubi, peni et testibus: sed etiam in pudendi meatum dyltere injiciuntur, praesertim addito oui albo diutius rudicula agitato, aut sedi succo, aut hyoscyami, aut portulaca aut lactuca. Maxime etiam prodesse compertum est, si ad umbilicum usque, duabus aut tribus horis sederint patientes in aqua tepentis balneo, cui ibisci radices, maluae folia et semina, violarum flores, psyllij, cydoniorum malorum, saxigraci, et lini semen, hordeum et hyoscyamum, et id genus alia fuerint incocta. Postremo ad omnes huius ueniens reliquias, que corpori haesissent, eradicandas, lasaque membra roboranda, et ad pristinum temperamentum restituenda, probatissimum erit medicamentum bis in die mane et uespere, electuarium mox describendum, uncia pondere ex humano vel caprillo, vel asinino lacte potum. Fit autem hoc modo. Accipe nucleorum pineorum, uncias tres: nucis Indicae recentis, uncias duas: pistaciorum sesquunciam: seminum melopeponum, cucurbita, cucumeris, papaueris albi, maluae, singulorum uncia dimidium: corticis arboris thuris, drachmas tres: margaritarum, coralliorum amborum, santalorum alborum, singulorum sesquidrachmam: succi glycyrrhizae, drachmas duas: baccarum iuniperi, drachmam unam: gummi Arabici, sesquunciam: terra Lemnia, drachmas sex: succi baccarum halicacabi, portulaca, singulorum uncias sex: diluti violarum, uncias octo: spissamenti è seminibus malorum cotoneorum, aqua violarum maceratis, uncias sex: serapij violacei, uncias quatuor: de floribus nymphae, de papaueris, cuiusque, uncias decem. Quae terenda sunt, conterito, deinde commistis omnibus secundum seplasiariorum regulam, electuarium facto: quo uisitor, ut ante diximus.

Cōtrouersia inter Graecos & Arabas.

Electuarii descriptio.

ΠΙΝΟΡΩΝ ΕΡΥΧΑΙ. PINORVM ERVCAE. CAP. II.

Is qui erucas pinorum hauserint, illico dolor in ore & a palato exoritur: uehemens alui, linguae ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire uideantur: corpus totum exaeruat: fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs, quae deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

a Meū ερω. i. uirina.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt: stomachi ventrisq; vehementis dolor iniequitur: tam venter quam stomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutem, diffusus, inturgescit: vniuersa corporis facies contenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post vomitus & vacuationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in m. ulso, aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac manu bibere, conuenit.

De buprestibus & pinorum erucis superius libro secundo satis differuimus, quantum ad earum historiam attinet: harum vim veneficam prosequimur. Hac igitur animalia etsi pota, aut aliàs in ventriculum ingesta, quadam symptomata, & incommoda pariant, ab his planè diuersa, quæ ab epotis cantharidibus inferuntur, tamen & ipsa eandem expetunt curationem, eademq; postulant medicamenta, quibus in epotis cantharidibus vtimur. Verum aduersus hec quoque nonnulla propria, peculiariaq; habentur antidota, quorum cum latins meminerit Dioscorides, non est in nos de ijs plura dicamus.

Si salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur: mens & sermo præpeditur: tremor cum torpore aut horrore quodam, ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumqueque sugillantur: sæpeq; diutius immorante veneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta quæ potis cantharidibus. Peculiaria verò remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum, & alyx decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: vrticæ quoq; folia, cum lilijs & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestris cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

Salamandræ
venefica natura.

Salamandræ
veneni curatio.

Stellionum
consideratio.

Lacertæ
maiores.

Non solum veneno inficit, & necem adfert Salamandra sicca, & in puluerem pota, vel clam cibo admista, sed etiam morsu, viperarum modo, cæterorumq; serpentium venenum ei aculantium. Quin & fructus, & herbas insua salua quadam, tum mucosa specie, quæ è toto eius corpore sudat, magno degustantium discrimine: siquidem plerique, qui hoc tantum veneno periere. Proinde mirum non esse videtur, si recentiorum quidam tradiderunt, inter quos quandoq; interisse familias, quod aquas bibissent, in quorum puteos fortè Salamandra ceciderat: vel quod panem tantum comedissent furno incoctum, qui lignis ea infectis concaluerat. Quibus tamen non vsquequaque credendum existimo, cum ignium vi venena omnia absumantur. Sed potius ad stipulandum fuerit Plinio, qui libr. 29. cap. 4. non ex panis furnis incocto, in quibus ligna salamandræ veneno infecta, accensa fuissent, quosdam iam fuisse necatos prodidit, sed ex panis crusta lignis inassata pede tantum salamandra contactis, vt eius verba testantur, cum inquit: Inter omnia venena salamandræ scelus maximum est. Cætera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt, vt omittam, quod per conscientia dicuntur homine percusso, neq; amplius admitti ad terras. Salamandra populos necare improvidos potest: non si arbori irrepserit, omnia poma inficit veneno, & eos qui ederint, necat frigida vi, nihil aconito distans. Quinimo si contigit ab ea ligno vel pede, quo crusta panis incoquatur, idem veneficium est, vel si in puteum cadat. Quippe cum salua eius quæcunq; parte corporis, vel in pede imo respersa, omnis in toto corpore defluat pilus: hætenus Plinius. His igitur, qui hæserint (vt Aëtius est author libr. 13.) præter ea quæ à Dioscoride scribuntur, macula in totum corpus exoriuntur: hæc, deinde rubra, postremò nigra, quæ tandem putrescentes, vniuersum deglabrant corpus. Sic venenatis succurritur (vt Dioscorides ait) ijsdem remedijs, quæ ad cantharidas præstant, quod tamen aliquibus minimè videtur rationi consonum: quandoquidem cum salamandræ venenum maximè frigidum humidumq; sit, cantharidum contra calidissimū, & exiccans, nullo quidem pacto consentaneū censent, qd ijsdem vtriusq; succurratur medicamentis. Verum huiusmodi rectè, mea quidem sententia, responderi potest, qd vbi Dioscorides salamandræ cantharidum cõmendat medicamentis, de generalibus, quæ in vniuersum fiunt, duntaxat intelligit, nempe vt quàm citò fieri possit, venenum è ventriculo & intestinis extrahatur crebris vomitionibus, & clysmatis acrioribus: in cordisq; præsidium dentur Theriaca, Mithridatiū, alijsq; generosa antidota, quæ pota cor ipsum à venenatis omnib. tuentur. Siquidem in cantharidum capite, quod omnium primum habeatur, generalis methodus Dioscoridi tradenda fuit, ne eadem per singula capita sæpe frustra & ineptè repetatur. Quare scite cum ad cantharidum remedia legentes reijcit, de generalibus tantum intelligit. Auicenna eandem salamandræ adhibet curationem, quæ opio, qd tam hoc, quam illa frigidissimo sint temperamento, præfertq; cæteris Theriacam, Mithridatiū antidotum, resinā terebinthinam, styracem, vrticæ semen, & cupressi frondes. Cæterum quoniã salamandræ corporis forma STELLIONES mortiferi etiam morsu animalia mihi in mentem reuocauit, cum eorum peculiare venenationem non fecerit Dioscorides, non alienum fore duximus, eorum primum historiam describere deinde venenati morsu remedia in medium adducere. Sed an lacertarum generi legitimè stelliones adscribi possint, profectò non ausim deseruere: quanquam non desunt, qui asserant, maiores lacertos, quos vulgò appellamus Ramarri, alij Liguri, alij verò Lacerti, veros esse stelliones. Quorum tamen sententia non possum subscribere: quandoquidem Plinius lib. 10. cap. 25. & 26. Stellionem inquit esse lacertarum figuram, & chameleonum quodammodo naturam habere, vt qui rore tantum viuant, præterquam è rore. Ex quibus fateri licebit, stelliones non esse nostrates lacertos, namq; hi cochleas, cicadas, locustas & papiliones deuorant, & id genus animalcula. Ad hæc copiosum in venis continent sanguinem, & amplo referti sunt iecinore, hominibusq; haudquaquam inimicantur, quin potius eos amant. Contra verò ijs aduersantur stelliones, Plinio auctore lib. 30. cap. 12. vbi nullum animal fraudulentiùs inuidere homini tradidit. Præterea (vt idem eodem loco scribit) stelliones hyemant in domibus, in locis ostiorum & fenestrarum, aut cameris, sepulchrisve: quapropter venatores obseruant cubile eorum astutibus. Ibi vere incipiente sifis harundinibus textas opponunt casas decipularum modo, quarum angustijs etiam gaudent. Venantur autem eos, vt eorum senectam, qua vt serpentes quot annis exuuntur, facile consequantur, quod nihil ei remediò in comitialibus morbis præferatur: ex more enim exutam senectam illico deuorant. Hinc igitur sanè perspicuum fuerit, Stelliones à maioribus Italicis Lacertis differre: hi siquidem in campestribus, in fructibus, sepibus & maceris degunt: illi

terò in sepulchris & domibus nostris oberrant. Proinde iubet Dioscorides, ut qui in venenorum timore versantur, & culi-
 nam, non in domo apparere nequeunt, sub tecto apparent. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda, quòd frequen-
 ter in domibus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed qua non modicam perniciem noliuntur, ut
 Phalangia stelliones, & alia quadam reptilia. Quòd autem stelliones in Italia proueniant, testis est Aristoteles lib. 8. cap.
 27. de historia animalium, asserens in quibusdam Italiae locis stelliones morfu homines perimere. Sed qui sint, nullam
 huiusmodi clariorem. Quanquam his coniecturis iamdiu existimaui ea lacertarum genera esse stelliones, quae in
 Italiae montibus morantur domibus, praesertim quibusdam prope terram foraminibus, a nobis vulgò Terrantola appel-
 lata, de quibus superius libro secundo latius diximus, de lacerta Calidula differentes. Quandoquidem hoc animal lacertis
 perimere videtur, & araneos maxime venatur, ut Plinius inquit, item Aristoteles lib. 9. cap. 1. de historia animalium. Dor-
 10 jo praeterea maculis quibusdam nitet stellarum modo radiantibus, unde & fortasse nomen. Quinetiam, quòd venenum
 morfu relinquunt, cum e caernis exeunt, statim in Hetruria necantur. His (ut audio) abundat Syria in caninis potius,
 quam aliubi commorantibus. Varia sanè sunt huiusmodi animalium genera, de lacertis, chameleonibus, scincis, croco-
 dilis, stellionibus & salamandris loquentes: quippe quoniam in vnoquoque horum genere habentur differentia tum formae,
 tum coloris, tum magnitudinis. Obseruaui ego Salamandras in quibusdam Germania syluis vniuerso dorso nigerrimas,
 pectore vero, & ventre admodum rubentes. Sunt & in Vtinenibus aquis degentes, cauda anguillarum modo lata, & ro-
 tundo rostro, aluo admodum rubente, nigricante dorso, nullis maculis respergo. Quod etiam Scincis euenit: nam & hi in
 Italia habentur Vtentino agro parui & nigricantes, ut utiq; adsimiles, qui ab Alexandria Aegypti Venetias comportan-
 tur. Sicuti & in Arabia lacerta sunt bicubitales. In Nisa India monte 24. pedum longitudine reperiuntur. Et in ea for-
 20 mo, eorum moribus succurrendum est Theriaca, Mithridatis antidoto, & alyis, quae in vniuersum venenosorum anima-
 lium moribus opitulantur. Imponuntur priuatim maximo praesidio, de morfis iam locus contriti scorpiones. Proinde oleum
 nostrum de scorpionibus, de quo abunde in prima huius commentatione diximus, ut praecipuum fuerit antidotum. Si ve-
 ro quis venenum hoc in potu cibo sumpserit, primum tum vomitione, tum clysteribus extrahendum erit: mox valentio-
 ribus antidoti cordi succurrendum. Illud postremò non ignorandum est, quod (ut Plinius inquit) ex Stellionibus fit ma-
 lum medicamentum: nam cum Stellio immortuus est vino, faciem eorum, qui biberint, lentigine obducit: ob id in vngu-
 do necant eum insidiantes pellicum forma. Remedium est oui luteum, & mel ac nitrum.

Stellionum
 morfus re-
 media.

Ε' φήμαρον.

EPHEMERVM.

CAP. V.

30 Sumpso Ephemero, quod aliqui Colchicon aut syluestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpo-
 re excitatur, non secus atq; ijs, qui vrtica aut scilla laceffuntur: interna rosionem sentiunt: stomachus
 cum ingenti grauitate exaestuatur: caterum inualefcnte morbo, cruor strigmentis admistus, per aluum
 exigitur. Quibus, ut ijs qui salamandram hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari conueniet: sed
 antea quam venenum inualefcatur, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malico-
 rij: lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum: item succum sanguinalis herbae, aut ramorum vi-
 tis, aut rubi, aut medullae recentis ferulae, aut myrti cum vino. Baccæ autem myrti tusa tritaq; & aqua
 macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media castanearum tuniula, similem effectum præ-
 bet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumptitetur: origanum quoq; cum lixiuio epotum: eximie
 40 iuuantur afinini lactis, aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius
 adfit, non aliud desideretur.

C Olchici Ephemerum historiam picturamq; reddidimus libro quarto, ubi ea attulimus, quae in ipso consideranda nobis oc-
 currebant. Eius autem veneno medendi rationem hoc loco adeò diffuse tradidit Dioscorides, ut plura ab alijs, qui post
 ipsum clauerunt, consequi mihi non licuerit. Danda igitur opera est, ut primum (quod in alijs quoq; saepenumero dictum
 est) crebra vomitiones, & clysteres suum praestent auxilium: deinde propria antidota exhibenda sunt, praesertim huma-
 num lac, asininum bubulumq;. Nec tamen omittenda, quae in vniuersum omnibus venenis resistunt, de quibus iam sapius
 diximus. Sed quoniam inter venenata recensentur Anacardia sic Mauritania vocata, forma ephemero quadantenus pro-
 xima, quamuis colore dissimilia: itemq; Staphis agria, quae & perniciofa habetur, & eiusdem ferè cum anacardys tempe-
 50 ramentum: cum haec Dioscoridi praetermissa videantur, sintq; medicamenta, quibus quotidie ad varios humani corporis mor-
 bos vtuntur medici, ab instituto nostro defecisse putarem, nisi horum quoq; natura venefica propria assignassem remedia.
 Praesertim cum saepe contingat, quòd haec medicamenta (quae crassa quorundam circumforaneorum ignorantia est, qui non
 modo non mederi, sed vix etiam legere sciunt) propinentur, nullis seruatis ponderibus, nec mensuris, nullisq; additis medi-
 camentis, quae illorum vim maleficam si angant: vnde nonnunquam miseri egrotantes in tam magna incidunt discrimi-
 na, & tam seua sequuntur symptomata, ut nisi postea à peritis medicis remedia & antidota adhiberentur, facile deperi-
 rent, id quod plurimis euenisse scimus. ANACARDIA igitur tam in potionibus hausta, quam aliàs ingesta praeter
 60 quam quòd fauces, guttur, & ventriculum inurunt, & vsque adeò vniuersum excalfaciunt corpus, ut inde febres orian-
 tur, excitant & paralyfim in quibusdam corporis membris, & ratiocinatricem facultatem corrumpunt, quòd sua calorifi-
 ca vi atrum succum exurant: quibus est succurrendum, factis antea vomitionibus ac clysterijs, oleo amygdalino dulci,
 aut è pincis nucleis, aut è nucibus Indicis, aut è papaueris semine, aut recenti butyro & bubulo lacte. Dantur haec affatim
 in potu, magno sanè iuamento. Quin & alia pinguis medicamenta conueniunt: nempe pinguium carniuum iura, suil-
 lum & anserinus adeps liquefactus, quadrupedum & volatilium cerebrum, & osium medulla: quandoquidem his am-
 plissima inest facultas (ut pluries diximus) quae venenorum calidorum omnium feruor extinguitur, retunditurq; acrimo-
 nia. Praeterea ut auxiliantur omnia, quae suapte natura refrigerant, vel quae arte fuerint refrigerata. Proinde Auicenna
 Anacardiorum feruori extinguendo ceteris praetulit bubulum lac acefcens, violaceum oleum, & hordeaceam ptisanam,
 prius tamen glacie, vel niue frigefactam. Veruntamen proprium Anacardiorum antidotum sunt Iuglandes, & pinorum
 nuclei aliquantisper torrefacti. Caterum STAPHIS AGRIA, anacardys (ut paulò superius diximus) temperamen-
 70 to respondet, quòd admodum calida sit ac vtens. Quare eadem sanè adfert incommoda, quae anacardia & cantharides. Adu-
 rit enim fauces & palatum, vomitiones commouet, ventriculi erosiones facit, & dysentericos fluxus ciet, postremò stran-
 gulat,

Ephemerum
 veneni curatio.

Anacardiorum
 veneni signa,
 & curatio.

Staphidis a-
 griæ roxa, &
 curatio.

gulat, nisi statim succurratur. Sed cum hac sua sponte & propria facultate vomitiones molitur, non aliter est provocandus vomitus. Verum animadvertendum est, an ipsa rejiciatur: quod ubi non euenierit, dulce amygdalinum oleum in potu fuerit dandum, admisto hydromelitis plurimo: atq; interim cogantur agri, vt continuo inambulent, namq; hoc tam medicamento valentissime per vomitum exigitur. Nec tamen ob id negligantur clysteres, quorum pluries meminit, vt si ramentum ipsius aliquod ad intestina descenderit, his extrahi possit. Reliquum vero curationis sumatur e cathartico curatione, non omisis vniuersalibus antidotis.

Δορυχνιον

DORYCNIUM.

CAP. VI.

a Mc. ποβή.
i. pota.

Dorycnion, quod aliqui manicon solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentibus singultus eiet, humor linguam vexat, sanguis confertim rejicitur: mucosa quædam penne quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq; antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, vomitus clyster & quæcunq; potum venenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsæ, a lac capulium aut afininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ, gallinacea pedota decocta: quinetiam conchyliæ omnia, tam cruda quàm tosta esse, salutare est: conueniunt & locustæ marinæ, & gammari, & pota eorundem iuscula.

Dorycnii veneni confid.

DE Dorycnio satis disseruimus libro quarto, quantum qua nostra esset de eo sententia, ingennè dicendum erat. Hoc tamen loco non tacebo, quòd idem esse non arbitror Dorycnium, & manicum solanum: quandoquidem duobus capitibus lib. 4. de his tanquam de diuersis disseruit Dioscorides. Verum enimvero etsi hoc in loco dixeris is reperiri quosdam, qui Dorycnium manicum solanum appellant, non tamen id esse verum asserit, sed aliorum tantum refert opinionem, quam nec probandam censet. Caterum Solano manico veneficam vim inesse constat, vt pote quod eos, qui ipsum hauserint, maximis afficiat incommodis, vt ipse Dioscorides testatur loco citato, cum inquit: Solani manici radix drachma inuis pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non iniucundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres vsq; dies mens alienationem adfert: quadruplicatus vero interimit. Remedio est aqua mulsæ copiosius pota, & vomitione reueta. Hæ perniciosas facultates, earumq; remedia loco dicto reddidit Dioscorides Solano manico: cuius tamen hic inter venenias plantas postea non meminit. Ibidem libro quarto non aliam vim maleficam Dorycnio assignauit Dioscorides, quam quod copiosius haustum mortem adferat. Hinc itaq; conijcere ausim, quòd eadem vtriusq; medicamenta facile competant.

Solani manici veneni noxa, & curatio.

Vua vulpina.

Bella donna lethiferum.

Dorycnium Auicenna vnam vulpinam vocat, nec tamen plura de eo retulit, quam scripserint Dioscorides & Paulus. Idcirco hoc in negotio à Dioscoride minimè discendum erit, nec ab ijs præterea medicamentis, qua nobis inferius in curatione describentur. Caterum non minus lethiferum est Solanum maris, quod vulgo Italis appellatur herba bella donna, cum non solum eius bacca deuorata, sed ipsa quoq; radix quandoque ioci causa parasitus exhibita, qui ad læta mensas, etiam inuitis Dominis, accedere solent, oblectamenti non parum conuiuantibus asferre solet. Siquidem si catibis derafa scrupuli pondere in vini fescuncia maceretur horis ad summum duabus, & deinde percolato diluto, ac digitis presso, id vini recentis addatur, quod poculum repleat, totumq; potandum propinetur, sit paulò post, vt qui biberint nihil prorsus edere possint, magno spectantium oblectamento: verum qui hoc fucò vtuntur, priusquam mensa asideant, parasitos ad ientaculum inuitant, vt fucatum vinum propinent. Discutitur fucus à visu, aceto potui dato. Idem præstantaneum antidotum est. Hanc huiusce radice facultatem fortè fortuna primus adinuenit Franciscus Calzolarius pharmacopœus Veronensis, rei plantaria studiosissimus, qui mihi id reuelauit. Sed animadvertendum est, ne modus excedat, nam si propinetur copiosius, strangulando interficit. Succurritur noxa iisdem medicamentis, quibus Dorycnii & manici Solani noxa superatur.

Ακόνιτον

ACONITUM.

CAP. VII.

a Cat. i. i. Com.
mu. i. eruca.b Meū. d. Zer.
i. aceto.

Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conantur, vertigines offundit: lacrymas ciet: grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio vel absinthij decocto, cur vino absinthiate, vel a semperuino, vel abrotono, chamelzæ aut aiuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte cum castorio, pipere & ruta, æquis ponderibus ex vino: coagulum hædi, leporis, aut hini cum aceto: ferri quoq; stercus, item vinum in quo aurum, ferrum, argentumve candens restinguatur, potum: lixiuiæq; cum gallina & vino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum bino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

Aconiti veneni confid.

Aconiti complura haberi genera, quisquis facile nosse poterit, qui superius libro quarto eorum Icones examinanti, siquidem genera duodecim ibi reperies, qua omnia deleteria sunt facultate. In quibus indagandis sedulam uiam operam Franciscus Calzolarius Veronensis, rei plantaria studiosissimus. Namq; is sex Aconitorum genera aduocata monte quem Baldum vocant, qua quarto lib. postremo loco appingi curauimus. Et ad me tandem ea transmissa sunt a clarissimis Medicis Dominico Montisauro, & Hieronymo Donzellino, qui omnia Calzolario ipsi accepta referunt. Itaq; tametsi permulta habeantur Aconiti genera, nempe tria, qua cynoctona, lycoctonaq; appellantur, & quartum paralyticum vocatum, qua omnia veneficam vim sortiuntur, vnam tamen, & eandem exposcunt curationem. Refert Aetius præter Dioscoridem, eos qui hauserint, post dulcedinem & adstrictionem amaritudinem percipere: adstringuntur deinde maxilla, subsequuntur morsus & erosiones stomachi. Quibus nisi illico succurratur, caligant oculi, & subruenti visuntur. Obortuntur tremores, corpus vniuersum intumescit, fiuntq; agri hydropicis similes. Medendi ratio à Dioscoride perculat quippe qui vsque ad præstantia descripsit medicamenta, vt Aetio & Auicenna plura non reliquerit addenda. Antiquior Conciliator Aponensis, qui inter recentiores de venenis luculenter scripsit, aconitum bibentibus sphaigidem Lemnæ commendauit, drachmarum duarum pondere ex calida potam: dein vomitum excitari iubet: à vomitu theriacâ eodem potu dicit exhiberi, ex vino in quo incocta fuerit gentiana: atq; adeò putat Aconiti præcipuum esse antidotum longè a præ-

tochia radicem. Caterum dum hac scriberem, mihi in mentem venit nonnunquam inter venenatas plantas haberi scil-
lam, flammulam, vrticæ & dracunculi semen, qua cum his silentio prætermissa fuerint a Dioscorido, optimam institutum
de singulorum veneno, eiusq; remedijs nonnulla commemorare. Sunt igitur in SCILLARVM genere, Scillæ vene-
natæ a venenosa procedunt: sunt etiam contra quæ nullo imbutæ veneno in medium veniunt vtiunt. Haec pote-
nter age, se, non tam parant noxam, nisi earum plus, quam par sit, assumatur. Illæ vero sua mascula vi, et quæ par-
terentur, o tamen hominem torquent, quem admodum fungi. Venenosa autem scilla vt Mesius, ac ceteri Auci-
ta o tamen trahere sola nec alteri annexa prouenit, locuq; ol oritur saxis ac graueolentibus, vt apud thomas. Discant i-
guntur: genti, simi septuaginta vs vs scilla, qua simul conuiscuntur sapore amaro, acris simul & dulci, splendentes vndiq;
laminis. Quandoquidem nulla his facultas inest qua corpus laedi possit, nisi fortasse, vt dictum est, plus earum assumere-
 10 *nt, quam ferre possit natura. Quæ uero de his differens Auicenna inter venenatas plantas seu septima quarti volu-*
nt, sic inquit: Scillæ male aut probate longior usus, quam par sit, ventriculum exulcerat, & intestina, ipsaq; mesara-
ia, uentris, aliosq; meatus, qui e ventriculo in iecur permeant. Quo fit, vt in visceribus orientur punctiones, acutiq; cru-
ciat u, & inde dysinteria. Quibus incommodis succurrit tur lactis potu, in quo ferrum, quod Græci stomoma, nos uero cha-
biton appellamus, plures restimam fuerit, deuoratisq; quorum vitellus in aceto decoctus. Quinetiam is fixa cibaria con-
ferunt, pinguis carniū iura, recens crudumq; butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum membra, aliq; per multa,
de quibus latius egimus, cum de cantharidibus sermo haberetur. Nec minor: facit incommoda FLAMMULA vocata, Flammulæ
curat, horiam scripsimus libro quarto in alterius clematidis mentione. Ipsa enim præter venenosam quam possidet facul-
tatem, uero, aut ordine quarto, adeo vt ualentissime corpus exulceret, ubi fuerit inposita. Ingesta uero fauces, guttur, uen-
triculum & intestina in ignis afficit ardoribus. Quin & intolerabilem excitat sitim, & aridam reddit linguam: intesti-
 20 *na deradit, & ardentem pelit urinam: nam quandoq; tam alte excoriat, vt erosio uasorum tunicis, mictu sanguinis redda-*
tur intolerabili sane dolore. Ad hoc sunt auxiliaturq; excitatis prius vomitibus & clysteribus infusis, lic bubulum suo
cum butyro potum, aut alio recenti admistum, item amygdalinum oleum, aut e pinis nucleis, aut Indicis nucibus, aut pa-
paueris semine expressum. Quippe (vt iam se penumero diximus) huiuscemodi acutorum curatio, non est aliunde peten-
da, quam a pinguis & seminum quorundam crassamentis. Præstat hoc in negotio & iecur souere, lactucæ, portulicæ, &
intuoi hortensis succo: item santalis aqua rosacea mazeratis: quin & halierecabi baccas deuorare prodest. Quod si cruenta
uulsiore reddantur, illinantur statim renes, testes, & ipsa demum uulsiore, rosarum, polygonij, plant. agnus, cynog. of-
fi, papaueris, lactucæ & hyoscyami succo. Opitulatur etiam clysteres e bubulo aut caprino lacte, aut e pinguis carniū
uulsiore infusa, addito rosaceo, & uino e myrtinis baccis confecto, vt diffusus in cantharidum curatione retulimus. Sequi-
 30 *tur VRTICÆ SEMEN, id præsertim, quod lini semen refert, quo excitanda ueneris gratia quidam utuntur. Sed, ut*
& ipsum in medium ueniat usum, ac etiam quorundam cibus admisceatur, animaduertendum est, ne largius ingeratur,
præsertim solium, sed usq; quatur cibus vel medicamentis, qua eius acrimoniam exedentemq; feruorem obundare & ex-
tinguere queunt: cuiusmodi sunt pistacia, nuclei pinici, dulces amygdala, nuce Pontica, & priuatim deglubitum sesami se-
men. Nam cum vrticæ semen affatum deuoratur, non solum (vt Auicenna est author) omnes scillæ malos præbet effectus,
sed priuatim etiam continentem excitat tussim. Curatio eadem qua scillæ: uerum ad finiendam tussim, qua priuatim ex
vrticæ semine prouenit, ea non sunt omittenda, qua suapte natura pacioris asperitates mulcent: qualia sunt amygdali-
num oleum, scriptum violaceum, & ex zephyris, saccharum quod candidum uocant, diatragacanthum frigidum, hor-
deacea pti, ana saccharo irpersa, & id genus alia. Præstant præ ceteris (vt scribit Conciliator) ad epotum vrticæ semen,
malorum cydoniorum semina contusa, & ex calida aqua pota. Cuiusmodi porro acerrimæq; facultatis est etiamnum
 40 *DRACUNCULI semen, utpote quod potu, aut in cibus sumptum, guttur asperitate afficiat, adurat ac pungat linguam:*
uitem gingiuas & dentes vexat: quin & corpori uniuerso ingentem calorem inducit. His noxis auxiliatur recens butyrum
baustum. Priuatim tamen præcipuum remedium adfert hordeacea farina in pulsem conformata, additis penidij, aut sac-
charo, amygdalino oleo, vel recenti butyro.

Scillæ vene-
nata, &
curatio.

Scillæ inter
venenatas A-
uicenna me-
minit.

Flammulæ
ueneris noxa,
& curatio.

Vrticæ semi-
nis noxa, &
curatio.

Dracunculi
seminis noxa
& remedia.

Μέλι τῆς Ἡρακλείας.

MEL HERACLIAE.

CAP. VIII.

Mel in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt, bibuntve, non secus afficiuntur, quam qui aconitum ebiberunt. Ijs eadem, qua potu aconito conueniunt. Adiuuantur in primis continuo uini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

10 Mellis Heraclæotici historiam & vires fusius libro secundo retulimus. Quo in loco tradidit Dioscorides (et si id postea hic silentio inuoluerit) eos mente ab alienari, ac sudore diffuere, qui illud comederint: remedio autem esse rutam effratam, & balsamentum, aut epotum mulsam. Sed cum iamdiu in Italiam non adferatur, ideo nec cura eius insistendum est, præsertim quod eandem cum aconito venenatam sortiatur facultatem & curationem.

Κόριαν.

CORIANDRVM.

CAP. IX.

60 Coriandrum ob odorem latere non potest: epotum autem uocem exasperat: insaniam adfert, à remulentijs non abhorrentem, qui sumplerunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo concitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex ablinthio potum auxiliatur: item oleum: nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina & anseris: passum quoq; cum lixiuia sumptum.

DE coriandro libr. tertio abunde disputauimus. Et quia non solum de facultatibus coriandri, qua humano corpori prodesse possunt, controuersia est inter authores medicina, sed etiam de us, qua eidem officere possunt, idcirco loco antedicti quid de prima difficultate sentirem, & cui potissimum adhererem, dixi. Ceterum de secunda difficultate nunc equidem secus sentio atq; olim. Alias enim multorum sententiam secutus, coriandrum ab usu prorsus abdicandum esse scripsi, quod omnem eius usum nocuum esse existimarem. Nunc uero eius usum tantum immoderatum (quod ita mentem commoueat, & mortis periculum adferat) euitandum censeo: idq; non lenibus, ut puto, rationibus. Quas quoniam libro superius

Coriandri
uenerica na-
tura.

Coriandrive-
neni reme-
dia.

rius citato retulimus, ideo ab eis hic supersedebimus, & ad remedia accedemus. Iis igitur, qui Coriandrum largimur sumptu-
runt, præter illa quæ à Dioscoride produntur, opitulatur theriaca ipsa ex mero pota: quin & herba vincetoxicum vulgo vo-
cata, de qua libro tertio scripsimus in Asclepiadis mentione: namq; hæc proprium coriandri antidotum est. Subueniens
præterea raucedini, vociq; exasperata gargarizationes ad id experta: item ea, quæ pectori conueniunt. Ad cerebri vero mo-
xam præstat diamoschum & diambaram, & id genus alia, quæ cordi & cerebro auxiliantur.

Ψύλλιον

PSYLLIVM.

CAP. X.

a Meum
κόνιον. i. ci-
cuta.

PSyllion epotum, corpori toti frigus, & torporem cum exolutione & mœrore quodam adfert, ita vt
animum despondeant. Cui omnia, quæ ex hausto a coriandro auxiliantur.

Psylli vene-
ni noxa & cu-
ratio.

PSyllium & eius semen, cuius in pharmacopolijs frequens est vsus (vt superius libro quarto diximus) notum omnibus est.
Hoc in potionibus hausto præter ea, quæ à Dioscoride illi assignantur indicia, consequitur anhelitus difficultas, alui tu-
mor, & tanta deniq; cordis anxietas, vt plerumq; oborto sudore frigido commoriantur ægri. Curantur qui hauserint, pri-
mum vomitionibus & clysmatis. Post hæc antidota illa exhibenda sunt, quæ in vniuersum omnibus venenis aduersantur.
Sed & ea omnia q; maxime subueniunt (vt Dioscorides est author) quæ & ijs, qui coriandrum exhauserint.

Κύκτου

CICUTA.

CAP. XI.

Cicuta pota vertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita vt ne minimum cetnatur, singultus ci-
et, mentem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulantur.
Quare inter initia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutimus: postmodum deiectionem moliemur, vt
quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionem, quæ maximo est ami-
lio, deueniemus: repetendum per interualla, in quibus proderit, lac asininum, aut bubulum potui da-
tum, aut absinthiū cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut sty-
racis vncia, aut piperis, cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo, & passum
per sese largius potum proficit.

Cicutæ vene-
fica vis.

Historia Ci-
cutæ pro pa-
stinaca, & pro
petroselino
comestæ.

Cicutæ sum-
ptæ curatio.

Cicuta historiam & facultates, quibusq; in locis magis exitialis proueniat, ita copiose retulimus libro quarto, vt o-
pus non sit, ea hoc loco repetere, nec plura nobis restent addenda. Sed iam ad vires eius veneficas transeundum est. Po-
ta hæc, vel in cibis sumpta (vt Dioscorides inquit) vertigines excitat, visum adimit, oculus caligine offusa, & mentem of-
que adeo perturbat, vt in furorem agi videantur, qui hauserint. Quæ omnia experimento nobis comperta sunt. Quippe
rusticus quidam magnifici Ioannis à Turri vinitor non longè à Goritia arce suas coleret vineas, ligone forte fortunæ crum-
cicutæ radicibus, secumq; domum delatis, pastinacæ radicis loco decoxit, comeditq; in cæna vnâ cum vxore: max. stam
(quæ rusticorum consuetudo est) ambo iuere cubitum. Media autem nocte à somno expergesciti, omni penitus amissa ra-
tione, huc atq; illuc per domum in tenebris vagabantur, amentia & furore ducti: vnde adeo caput, faciem & oculos in pa-
rietes percusserunt, vt mane accurrentibus vicinis, partim percussionibus tumidi, partimq; effuso sub cute sanguine luces-
tes, tumentibus admodum oculorum palpebris, horrendam ac monstrosam ostenderent faciem. Vocor ego statim ab ea
tam, percontatiq; domesticis, quibus edulys in cæna victit assent, reperi hos cicuta esitasse radices, quas pastinacæ esse
diderant. Quandoquidem mihi in propinquam vineam adeunti, ostenderunt alij locum, vbi rusticus ille radices esitasset,
ibiq; inueni alias cicuta radices, quæ iam folia emittere incipiebant. Qua re perspecta celeriter ad agros redij, quos quidem
non multo post tempore, Deo adiuuante, in pristinam mentem & sanitatem restitui, tametsi percussionum curatio
to longior fuerit, quàm veneni. Decepta quoq; hisce radicibus est superioribus annis quadam nobilis matrona à Celso
Vtinensis, quæ cicuta radices proprio in horto effossas toti familia decoxit, præbuitq; esitandas carotarum loco. Quædam
monachum Franciscanum curauimus, qui pluribus mensibus modo amentia, modo furore agebatur, quod cicuta subabu-
tensis petroselini vice piscium quorundam iusculis imposita comedisset. Caueant igitur omnes, ne in hac veneni disci-
mina. Exhibet Aëtius, præter Dioscoridis antidota, cicutam haurientibus apij semen, ex vino potandum, aut iridis rabi-
cem, aut seseli Massiliense: item nitrum ex aqua copiosiore potum. Totum præterea corpus calefacere conducit, & præse-
tim præcordia: quamobrem ad vehementiorem motum ac cursum (vt ipse inquit) cogendi sunt agrotantes. Conciliat
tamen Theriacam maximopere commendat, duarum drachmarum pondere, ex dictæ anni decocto potam: aut gentiana ra-
dicem ex vino. Namq; hoc cicuta verum esse antidotum putat.

Σμίλαξ.

TAXUS.

CAP. XII.

SMilax, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus vniuerso corpori, strangulans, &
celerem interitum infert. Cui eadem, quæ cicutæ conueniunt.

Taxi venefi-
catura.

Taxus arbor, cuius historiam superius libro quarto retulimus, vbi & eius planta picturam adiecimus, non solum
perdit homines, qui folia & fructus esitauerint, vel biberint foliorum succum: sed etiam (vt aiunt quidam) quæ
pedum omne genus, quod præsumptum pabulum non ruminat: cuiusmodi sunt equi, asini, muli, & id genus alia: quæ
quam scribit Plutarchus, tertio symposiorum commentario, Taxum eo tantum tempore noxiam, quo iam florere incepe-
rit, quod succo sit maxime prægnans. Dioscorides libro quarto de taxo agens, inquit: Narbonæ tam præsentis est veneni,
vt si qui dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant, ledantur, & sæpenumero moriantur. Id quod Sestius (autore
Plinio libr. 16. cap. 10.) in Arcadia quoq; euenire scribit. Vasa etiam viatoria ex ea vinis in Gallia factis mortifera sunt
compertum est: & in Hispania lethales esse baccas. Prouenit arbor hæc frequens in Tridentinis montibus, præsertim à
narta vallis, & Flenarum, vbi ea inter ingentes abietum, picearum, pinorum & laricum sylvas, numerosa consistit.
Iu in locis nobis compertam est, quod non modo iumenta, quæ non ruminant, deuorata taxo, moriantur: sed etiam qua-
runt.

cum in arboribus quandoquidem boues complures vidimus à rusticis deploratos, qui taxum depasti fuerant. Quapropter cum in
 mentibus, illisq; pascuis boues morbofi sunt, conclamant rustici, animaduertendum esse, ne Naxum degustauerint, Baccarum
noxia.
 ut eorum taxum eorum apto vocabulo nominant. Nihil minus eius baccas eisdem in locis noxia ac perniciose deprehendantur:
 quippe quodcum auctum ego pastores, aliosq; in syluis ligna cadentes, qui saporis dulcedine allekti, baccas ipsius comederant,
 ex purum est non modo in ardentibus febribus incidant, sed & in alui profluuium, adeo ut in maximo versarentur diseri- Taxus ut
calida, vel
frigida.
 mine. Ceterum non parum dubitandum videtur, an inter plantas calidas, vel inter frigidas taxus sit reponenda. Di-
 cendum quidem, & eius sequaces omnes existimant taxum esse frigidi temperamenti, argumento quod asseruerint, is-
 dem comedunt taxum venenatum iuperari, quibus & cicutae: quorum tamen sententia, omnium pace dixerim, mihi plene non
 probanda videtur. Namque amaror qui cortici, & frondibus inest: coma perpetuo virens, pinorum, abietum, & picea-
 rum modo, quibus fronde similis spectatur: baccarum tum dulcedo, tum acrimonia quadam: & quod auicula eas de pa-
 sia nigrescant: manifeste indicant insignem temperamenti caliditatem. Atque hinc est, quod & febribus, & alui proflu-
 uiis, utantur, qui baccas esitauerunt, inflammatus eo cibo spiritibus, & sanguine. Verum quamuis aliquis respondere pos-
 sit, accendi in his febres, gigniq; alui profluuium, ex humorum putredine, quemadmodum in aestate eueniunt hac ex sit-
 gorum iudicium quicquam vero colorem in auiculis contrahi posse, non minus à frigido, quam à calido: ex eo tamen
 adhuc suspecta & improbanda relinquatur eorum sententia, quod frondium, & corticis amaror, baccarum dulcedo, &
 acrimonia, perpetuo, virens coma, nulla prorsus repugnantia contrarium praeserant, nempe quod & febres, & alui
 profluuiis obstruantur: tunc caloris primum exuberantia (ut accidit denotatus anacardys, quam humorum putredine,
 Neperitae ea potest: ut quae à frigido pabulo in auicularum pennis sulcorum: nam si frigiditate nigrescerent, illico peri-
 rent. Quando pumonia ex edens sigus haudquaquam nigredinem inducit, nisi membrum simul confectis ac deperditis.
 At non ita sit ea nigredo, quae per uisus humoribus gignitur, quemadmodum accidit Aethiopicis. Haec sanè dixisse volumus,
 ut non quicquam tam celebratorum virorum auctoritati detraherem, neque etiam quod ausim temere eorum sententijs
 refragari, sed ut meam in meliorem proferrem sententiam, atq; ut haec à nobis proponerentur alijs discutienda, & studiosis
 diligentius estimanda. Ceterum quoniam taxus NERIVM, quod Graeci rhododendrum, & rhododaphnen vocant, Nerij malefi-
canatura.
 Mauritani verò oleandrum, mihi in mentem redegit, cum sciam scripsisse Galenum, & ipsum secutos, non modo brutis,
 sed etiam hominibus esse venenatum. cumq; eam quam plurimum in locis referta sit Italia, praetereundum non duxi, quin hic de
 Nerio aliquid dicerem. Et quamuis non absque ratione fortasse scripserit Dioscorides libro quarto, itemq; in huius pra-
 satione, quod Nerij folia & portis, si deuorentur, hominibus contra mortiferos serpentium morsus praesidia sunt, atque in
 ba, re ideo possit et fides adhiberi, quod etiam cantarides dentur potanda à cane rabido demorsis, & euphorbium ictis à
 scorpione, cum tamen nec Galenus, nec qui cum sequuntur, nec Auicenna, ceteriq; posteri id probent, aut admittant, Ne-
 rium potius dimittendum putarem, quam cuiquam exhibendum, praesertim quod alia non desint antidota, quae à serpen-
 tibus demorsis magnopere opitulantur. Nerium igitur, Galeni & Auicenna testimonio, tam potum, quam in cibus sum-
 ptum, quamuis non largius ingeratur, homines & quadrupes interficit. Primum enim intollerabiles excitat angustias,
 tumescit inde aluus, & subsequitur vniuersi corporis inflammatio: quod temperamento calidum sit, & siccum, desic-
 cans & exulcerans. Ob id enim non tantum noxam corporis infert, intra corpus sumptum, sed etiam eos afficit, qui in ei-
 us umbra subsederint, taxu, ut ante diximus) modo. Quinetiam aquae fluuiorum, & lacuum, in quorum ripis Nerium Nerij veneni
curatio.
 crescit, umbra, frondibus, frondibusq; deciduis infectis, nonnunquam in magnum discrimen bibentes ducunt. Succurritur
 noxae epoto sani graeci decocto, aut deuoratis palmulis, aut viticis semine, aut frondibus, aut hausto horum decocto. Con-
 ferant & carica ex melle, aut saccharo aut nilapio sumpta. Praeterea defrutum, & pingua, & quae crassum dant alimen-
 tum auxiliantur, non omnes tamen dysenteribus, & vomitionibus, ut in alijs omnibus saepenumero dictum est. Conuenit
 & diacastoreum (ut Continuator est auctor) potum duarum drachmarum pondere. Profunt item iuniperi bacca eodem
 pondere. Porro illa quoq; lethifera est arbor, quam perperam quidam SYCOMORVM appellant, quae fructus profert
 loti arboris instar, quorum osculus funiculo traiectis, suas praesides Deipara virgini numerant infima gentis mulieres, quae Azadaracht
arboris vene-
num, & reme-
dia.
 illos à monacho saepe dono accipiunt, quod in eorum monasterijs arbor ea frequens reperiatur. Hanc Auicenna vocat AZA-
 DARACHT fen 6. quarti voluminis, sic inquitens, Folia Azadaracht, quemadmodum & lignum, animalia necant. Tolli-
 tur noxiae medicamentis, quae in vniuersum omnibus succurrunt venenis: priuatim verò ijs, quibus & nerij vis exiti-
 alis aufertur. Cauent itaq; omnes, qui hanc arborem suis in viridarijs alunt, ne forte imprudenter se ipsos, & domesticos
 omnes in perniciem agant. Sed si aliquis fortasse dubitaret hanc arborem non esse Azadaracht Auicenna, fidem illi mani-
 festam faciet Andreas Belluensis, qui in Arabicorum nominum interpretatione, ita esse aperte declarat.

50 Καρπάσιου ὀπίου. CARPASI SVCCVS. CAP. XIII.

EPotus carpasi succus soporem citamque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt,
 epotae cicuta remedijs.

Quodnam hodie planta genus nobis Carpasum dici possit, omnino fateor me ignorare: nec quenquam reperiri Taxi veneni
canatura.
 crediderim in Italia, qui plura quam nos de Carpaso referre possit. Quandoquidem etsi hic inter venenatas plantas
 illud descripserit Dioscorides, nusquam tamen in praecedentibus libris quicquam de Carpaso retulit, quemadmodum nec
 posteri tam Graeci, quam Arabes, ex quo coniectari possit, quidnam antiquus fuerit Carpasum. Hoc Paulus Dioscoridem
 secutus libro 5. carpesiam vocat. Quamobrem credidere nonnulli carpasum, carpesiam & carpesum, de quo primo li- Carpasum &
Carpasium
male quibus-
dam idem.
 bro latius diximus, vnam, & eandem esse plantam. Sed vanam prorsus horum sententiam esse arbitror. Siquidem à ne-
 mine pestiferitatis memoria proditum inuenitur, deleteriam vim vllam carpesio inesse, verum eandem (ut Galenus &
 Paulus constantur) quae ipsi ph: quinimmo ita aduersus venena commendari compertum est, quod Quintus Carpesium
 cinnamonum loco in Theriacam addere non dubitauerit, quod tantum id praestare existimauerit, quantum potest laudatissima
 castra Verum si quis fortasse assereret opocalpasum, de quo scribit Galenus, dum probatissima myrrha notas expendit, lib. 1.
 de antidotis, & opocalpasum hoc loco à Dioscoride descriptum, vnum & idem esse medicamentum, is meo quidem iu-
 dicio rem, ut aiunt, acutetigisset, q opocalpasum Galeno mortiferum omnino sit & lethale. Licet idem Galenus non opo-
 calpasi, sed de 722: 227 hoc est: succi carpasi mentionem faciat, tum lib. 1. de compositione medicamentorum localium, ubi
 ex Archigene recenset medicamenta, quae capillos crispas reddunt: tum et lib. 5. de compositione eorumdem in quodam

molari emplastro. Ceterum cum huius usus, & notitia apud omnes penitus exoleuerit, non est cur alia à nobis frustra de-
fit instituenda curatio.

Σαρδωνία ἕρβα

SARDONIA HERBA.

CAP. XIII.

Sardonia ranunculi herbae generi assignatur, quae vescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem praebent: à qua quidem affectione, de Sardonia risu adagium in vulgus infausto omine manauit. Post vomitum peculiariter conuenit aqua multa & lac liberalius epota, irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfaciens: in calidam aquam, oleumq; descendant, sed tum multum perfricare, & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quae conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Sardoniae herbae venenum, eiusq; curatio.

Apium risus.

Quod inter Ranunculi genera ea annumeretur planta, quae à Sardinia, vbi plurima nascitur, nonnullis vocatur herba Sardonia. abundè docuit Dioscorides libro secundo. Meminit huiusce plantae Iulius Solinus cap. 8. Polybius. huic incommode accidit & herba Sardonia, quae in defluuijs fontanis prouenit largior iusto: ea si edulio fuerit, vescentibus neruos contrahit, rictu ora diducit, ut qui mortem appetunt, velut ridentiū facie intereant. Tradidit huiusce conuulsionis genus priuatim curari debeat. Quippe cum diuersa sint conuulsionum genera, diuersa etiam exposcunt remedia. Praefert tamen castoreum in puluerem contritum aut per se, aut è dulci vino potum. Ceterum ut Conciliator est, ad hoc large epoto, ut inde ebrij facti diutius dormiant: item melissophylli succo ex aceto sumpto: is enim, ut idem ait, Sardoniae herba verum ac singulare est antidotum. Sed quoniam (ut Dioscorides prodidit) in hac cura, balnea, & laconica admodum prosunt, ea utiq; paranda sunt medicamentorum decoctis, quibus vis insit excalfaciens, tum etiam deficcans, & quae propria facultate neruos tum roborent, tum iuuent. Cuiusmodi sunt, stoechas, hyssopum, salua, ruta, betonica, chamapitys, amaracus, origanum, calamintha, pulegium, dictamnium, anthemis, satureia, acorum, Syriaca & Celtica nardus, asarum, phu, cyperus, rosamarinus, & id genus alia. Ad haec praestat inungere occipitium, ceruicem, & vniuersam spinalem medullam, fusino oleo, aut è castoreo, aut è terrestribus lumbricis, aut è costo, aut ex hyperico, aut vulpis, aut vnguento aragone, aut agrippino, aut denique alijs his similibus.

Υοσκιάμος

HYOSCYAMVS.

CAP. XV.

Hyoscyamum potum, aut comesum, similem ebris abalienationem mouet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua multa copiose data, lacq; praesertim asininum: si id desideratur, capillum, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & vinum falsum, cum adipe suilla recenti, passoq; itidem vrticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, capra, & allium, & haec singula cum vino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant.

Hyoscyami venenosa vis.

Disturbio dicitur hyoscyamus.

Auicennae erratum. Hyoscyami vtriusque curatio.

Succurritur facile Hyoscyami noxa, cuius historiam cum Dioscoride tradidimus libro quarto, vbi eius quoque effigiem dedimus, si antea, quam venenosa vis inualescat, superetq; corporis vires, conferentia propinentur medicamenta. Sed propter indicia, quae epoto, vel comeso hyoscyamo à Dioscoride assignantur, alia plura eidem reddidit Aëtius lib. 17. nempe quod insequatur iactatio corporis cum distortionem: quibus succedit exolutio, animi deliquio similis, oculorum rubor, pruritus, deinde tremor: praeterea omnino delirant agri, & putant se flagris corpore cadi. Proinde merito Ananien (et hyoscyamum vulgò vocant Disturbio, utpote quod mentem, & omnes corporis sensus disturbat. Meminit vtriusq; hyoscyami vter deleteria pharmaca etiam Auicenna, sic inquit: Epoto hyoscyamo albo, osium compagine luxantur, lingua in abscissus transit, spumat os, caligant & rufescunt oculi, spiritus difficulter redditur. Hinc sunt vertigines, surditas, gingivarum, & totius corporis pruritus: ebrietas, amentia, furor, comitialis morbus, vocisq; diuersitas: nam quandoque videntur affecti asinorum mulorumq; more, & equorum modo hinnunt. A nigro autem corporis extrema confrigescunt, obtebrantur oculi, oboritur delirium, atque aded constringitur pectus, ut impedita prorsus respiratio, suffocentur, conuelanturq; agrotantes. Verum hac omnia cicutam facere tradiderunt Dioscorides, & Paulus. Quo fit, ut suspicari liceat, in hoc cicutiuisse errasseq; Auicennam, quemadmodum & in alijs quam plurimis simplicibus medicamentis, quorum nomina ab eo saepenumero confunduntur. Ceterum in albi hyoscyami curatione idem Auicenna praesert ceteris medicamentis Theriacam, & Mithridatis antidotum. Sed ijs, qui nigrum hauserint, post vomitum & clysteres meracum praebet potandum: quin & bubulum lac, absinthium, castoreum, rutam, laseris lacrymam, baccas & folia lauri, defrutum, vrticæ semen, magudatim, cardamomum, & styracem: sed quae singula ex vino sumantur. His praeterea addit mori radicis decoctum, & opobalsamum ex lacte potum. Ad haec insuper farinam triticeam vino subactam, emplastri modo ventriculo vtiliter imponi promittit. Sunt porro ex recentioribus nomine praclaris, qui longum piper in hoc magnopere commendant, atq; etiam pistacia largius manducata, ceteris praesertunt antidotum.

Μανδραγόρα

MANDRAGORA.

CAP. XVI.

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus, nihil temerè distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua multa proderit: postea nitrum, & absinthium, ex vino dulci, aut passo sumantur: caput rosaceo, & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ, tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione, & extinctu. Quod si ægrè ii reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs vti conuenit.

Qua-

Quandoquidem Mandragora inferiori latius profecti sumus libro quarto, ubi virumq; eius genus depinximus: ideo Mandragorae 7
 autem tantum deinde primium, & accidentia referam, quae ab epotis vel deuoratis eius tum iuuice, tum siue uenifica-
 ante, deinde horum uariationes aegrediar: quoniam si diutius malefica res serpere, augeriq; negligentia dimittat-
 tur, nihil amentibus remanet, sed tales, qui hauserint, amori potuerunt. Quamobrem dixerim, Actium scilicet cum vix iulere
 lucentem, aut comedere, non posse, quod odore sit admodum graui, ac nauseabundo, amaro intucundoque gustu. Cetera uti-
 dem copia. Mentis ad aduendum requiritur. De cetero vero molestias quidem facit, sed serius interimit. Huius potu
 pascunt, & resantes, ut Dioscoridis inquit, in veterno, um soporem delabuntur: quin & seges, & languidi, & tristes, &
 exantant, uti dicitur, ac torpionibus excitati, repente rursus tanquam amentes recidunt. Remoueri noxam
 possunt, praeter ea quae Dioscoridi produntur, cori, mani semine, aut pulegio ex calida aqua, aut alui deiectione cum deie-
 20 **T**ercio medicamento quo adueternos utimur. Quod si a vomitu, qui mali habent, non excitentur a somno, origanum
 potandum ex frigida, tanquam expertissimum medicamentum offerri volunt. Profectum item acria clysmata, frictiones
 a frigore amittibus in omni corpore extensa: cucurbitula ignis flamma apposita tum occipitio, tum scapulis, tum etiam
 nationibus: siue extremi corporis membra torquentes: quin & sternutamenta, quae veratri albi puluere naribus indito
 cunctis sunt. & septem medicamenta vesicas excitantia, ut cantharides, & ranunculus, occipiti & post aures emplastri
 modo imposita, matremopore auxiliantur: namq; haec omnia valentissimè reuocant, quae cerebro officiant. Porro animad-
 30 **A**cto de haudquaquam conuenire, quod magis refrigerare valeant, castorium, chamæpityn, pulegium, calamintum
 sepium, thymbram, & thymum huius medicamento addiderint, ne eo solo admoto, morbum fouerent, atq; demum agris
 mortem adferrent. Verum enunucro putandum est, Galenum rosaceum ex aceto tantum imponere, ubi frigidus humor,
 quo veternis excitatur, bili (ut plerumque accidit) fuerit admixtus, quae tamen bilis maxima ex parte in ipso duntaxat
 morbi principio vexare solet: nam cum tenuis sit, facile resoluitur, & superatur a frigido. Hinc itaque quisque expendere
 & cognoscere potest, an is, qui a deuorata mandragora veternosii sunt, purum illud medicamentum ex rosaceo & aceto
 adiuuere liceat, nullis aditis excalescentibus, cum (ni fallor) ab assumpta mandragora caput nullo afficiatur ca-
 lore. Ad haec, tamen si mandragora poma matura comedantur a nonnullis detracto semine, citra ullam prorsus molestiam,
 immittuntur tamen, & cum semine deuorata, mortifera sanè inferunt symptomata. Siquidem exoritur intolerabilis ar-
 dor, qui vniuersam corporis superficiem adurit: lingua & os arescunt, quam ob causam ore perpetuo hiante cernuntur af-
 30 **S**edi frigidum trahentes acrem. Quibus nisi iuoco succurratur, conuulsi percunt: contra vero facile liberantur, si statim hau-
 serint, quae opem ferre possunt. Id autem commodè, & efficaciter praestat Andromachi theriaca, ex aqua pota: quippe hac
 sola momento omnem auferit molestiam. Curantur (ut Conciliator inquit), qui huiusce radicem, vel pomum, vel succum
 sumpserint, vnius tantum diei medici, si tamen subinde praestantissimum meracum vinum largius bibant acri, & acetum
 olfat, ut. cui admixtum sit castoreum. Sed horum omnium peculiare scribit esse antidotum domestica radix triduo cum
 pane & sale deuorata. Ceterum cum mandragore poma METELLAS NVCES quas vocant, mihi in memoriam
 reuocauerint, quam historiâ superius libro primo descripsi, si uerimq; non modo, si edantur, suapte natura canes neca-
 re, sed etiam homines, cum nihil de his, quod extet, posteritatis memoriae prodiderit Dioscorides, nec antiquorum ceteri,
 non alienum duxi hoc loco earum inditâ referre, atq; etiam medicamentâ commemorare, quae harum veneno opitulantur.
 Ea naces igitur cum intus in corpore sumuntur, vertigines, & faciei ruborem inducunt: quin & oculorum caligines, te-
 40 **M**ulcentiam, inexpugnabilemq; somnum: postremo oboritur frigidus sudor, vicina mortis praesagium. Auxiliatur noxa ex-
 citatus pluries vomitus aqua calida, & oleo post vomitum datur conuenientissimè butyrum, & vinum meracum copio-
 sum, additis pipere, pyrethro, Lauri bacis, cinnamomo, & castoreo. Prodest, & egrotantium extremas corporis partes,
 nempe manus & pedes, calida aqua fouere, ac inde frictionibus rudi linteamine factis calorem in vniuersum corpus exci-
 tare: cum eo tamen, ut subinde balanino, aut castino oleo perungantur affecti. Praestat item exercitatio, proinde ad celerem
 gressum cogendi sunt, ut vniuersum corpus incalescat: & pinguibus postea cibus, dulcisq; vino refocillandi. In summa &
 haec ea maxime conuenit curatio, quam epotum requirit opium, de quo proxima commentatione differemus.

Mandragorae
noxae reme-
dia.

Rosaceum v-
trum hic con-
ueniat.

Metellarium
nucum vene-
ficium, & re-
media.

Μηκόνιον. **MECONIVM.** **CAP. XVII.**

E Potu papaueris succo, quem meconion vocant, consequitur veternis cum perfrictione, & pruritu
 vehementi, ita ut saepe inualecente veneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet: corpus id
 medicamentum olet. Post citatam oleo vomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum
 sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum
 per sese acetum: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiuia aut passo: & rutæ syluestris semen cum pipere,
 vino, & panace: piperq; cum castoreo, & aceto mulso, vel cum satireiz aut origani decocto cum vino.
 Hi olfactilibus excitandi: & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum
 prodest iurium pinguium visus, cum vino, aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Μηκόν κερκίτις. **PAPAVÉR CORNICVLATVM.** **CAP. XVIII.**

Quod corniculatum papauer appellant, & potu, & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaueris succo
 cus: nec aliis expugnatur auxiliis.

Ingratus opij odor, perinde atq; mandragora, facile obstat, ne in cibus, aut medicamentis inferi possit, quin veneficium
 pateat gustantibus, praesertim cum necem non inferat, nisi certa quadam sumatur quantitate. Quamobrem raro contin-
 git, ut homines venefici opio utantur, ubi quenquam veneno tollere volunt, nimirum veriti ne fraus odoris grauitate depre-
 hendatur. Tamen si quandoq; accidat, aut sorte Medicorum imperitia, aut pharmacopolarum negligentia, ut ebibitis medica-
 mentis

Opium venefi-
ca natura.

mentis; quibus opium admistum sit largius quàm par sit, sumentes in ea incurant discrimina, quorum meminit Dioscorides. Atque illa quoque sequantur, quae in suis alexipharmacis Nicander ijs verbis representauit. Animaduerte, inquit, è sumpto papaueris in capite suo semina gredientis liquore dormientes: nam illi in summa corporis cute frigent: nec oculi aperiantur, sed enim palpebra earum immobiliter colligantur, eque labore eo, odoratus sudor distillat vna colicam. ad eam ipsam corpus pallefcit, ac labia ardent, eque genis nexus demittunt, id est flaccida maxilla sunt. Languidus item & in gutture anhelitus expirat: saepe & liuidus vnguis, vel obtortus nasus mortem non procul abesse nunciant, ipsiq; oculorum qui in caua recesserunt, rary. Nicandro subscribit Aëtius lib. 13. vbi sic inquit: Quando voluntarie meconium aliqui biberint, siue id manifestare noluerint, siue volentes non possint, his cognoscantur indicij. Sequitur enim eos, qui opium acceperunt, in somnum grauem collapsio cum frigiditate & pruritu intenso, vt aliquando ob usum excitentur: odorq; opij per totum corpus effertur, & exhalat: inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singulus, distorquetur nasus: palpebra adest, liuor vnguium, praecordiorum diuulsio, respiratio parua & frigida, oculorum offuscata, & ad postremum mortifera conuulsio. Hac de notis, quae opium sumptum consequuntur. Quibus valentissimè illa remedia auxiliantur, quorum meminit Dioscorides, neque enim plura apud posteriores Gracos reperi. Auicenna autem praefert laserpitij lacrymam, & castoreum. Sed praestantissimum dicit esse medicamentum, Theriacam sagazeneam, & Mithridatæ antidotum ex vino potum. Excitandi etiam sunt egrotantes sternutamentis, fibulis, frictionibus, odoramentis, nempe moscho, castoreo, lasefere, ambaro, naribus inditis, quin & sulphuris fumo. Succurritur conuulsioni, si vniuersum corpus perungatur sustinaculo, ac etiam costino, alijsq; remedys, quorum in praecedenti capite meminimus. Verùm longè omnium potentissime proficit antidotus nostri vsus, scilicet quinta essentia theriacalis, de qua superius in praefationis commentatione diximus, quae praesentaneo remedio non modo his omnibus opituletur, sed etiam omnibus in vniuersum venenis, quae frigiditate nimia terimunt. Nec aliter curantur, qui corniculatum papauer deuorauerint.

Opii veneni curatio.

Φαρικόν.

PHARICVM.

CAP. XIX.

Quod Pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem neruorum potam adferre cum conuulsione & delirio. Oportet autem post vacuationes vinum absinthitum potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui vocauerunt: aut spicae nardi duas drachmas, & myrrhae totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: dera sumq; caput illinire cordicea farina cum aceto, & trita ruta.

Pharici veneni confid.

Non equidem haecenus apud quenquam scriptorem consequi potui, quid Pharicum antiquis fuerit, an simplex, an compositum medicamentum. Quin neq; etiam certè inuenire licuit, vnde id nomen traxerit, cum varia sit de nomine eius apud authores sententia. Porro is, qui in Nicandri alexipharmacæ scholia scripsit, hac protulit. Phragos memoria prodidit pharicum lethale medicamentum sic vocatum à Pharico venefico quodam Cretensi, qui hoc reperit. Sunt qui primum Pharis Arcadiae repertum velint: appellant autem etiam Medicum. Nec desunt qui in Thessalia in Pharis, alij Lacedaemone, quod ibi fortasse proueniat: hac ille. Ceterum cum iam id meritò deperditum sit, neque hoc tempore à nemine, quod sciam, cognoscatur, superfluum sanè esset plura de eo scribere nam institutum nostrum non est, in re tanta diutius immorari.

Τοξικόν.

TOXICVM.

CAP. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quòd barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquentur. Incoercitus furor varias iis imagines obuerset: quare vix medicina locus est, raroq; qui hauserunt, evadent. Vinculis ergo cohibendi, aut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim iis conuenit quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte entus: malaquæ cotonea trita esse, aut cum pulegio, & aqua bibere conueniet: amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & vbi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus degunt.

Toxici confid.

Quid antiquis fuerit Toxicum, quo Barbari sagittas inficiebant, vt ijs vulneratos inimicos haud dubie perderent, nec à Dioscoride, nec ab alio aut Græca, aut Arabica familia authore memoriae proditum esse, mihi haecenus competere non est. Ideoque difficile admodum fuerit discernere an Toxicum hodie sit, vel cognoscatur in Europa, cum proprie hi Barbari antiquis dicantur, qui Troglodyticam Aethiopiae regionem incolunt, apud quos fortasse tantum nascitur. Verum enimvero putarunt quidam, vt Manardus Ferrariensis vir nostra ætatis celebris, id antiquis fuisse Toxicum, quod Arabes Napellum vocant. Quæ quidem sententia non omnino ijs videtur refellenda, qui plura de Toxico non inuestigarunt: quandoquidem (vt Auicenna est author) non defuere, qui sagittas Napello inficerent: constat quæ napellum haurientibus lingua & labiorum inflammationem excitari, & raros admodum esse sumentes, qui euadant: id quod omnes Græci toxica describunt. Ad hac cum asserat Auicenna, quòd si qua cura cum Toxico adhiberi possit, ea fiat vomitionibus, hausto mellea rapi semine, & sumptus subinde glandium putaminibus, hoc omnino illorum opinionem auget. Siquidem Dioscorides quoque ijs, qui Toxicum hauserunt, rapi semen ad ciendum vomitum ex vino potandum prebet, ac deinde quoque fagi, aut ilicis corticem, arborum nimirum, quæ omnes glandes proferunt. Quæ sanè omnia facile ad credendum trahunt Græcorum toxicum, & Arabum napellum vnum & idem esse venenum. Sed diligenter rem expendentibus contraria profectò sese offerunt rationes: etsi enim ex notis prædictis Toxicum, & Napellum vnum & idem esse videantur, tot tamen alia habentur nota, quæ alterum ab altero discriminant, & contrarium arguunt, vt aliter existimandum non sit, quàm quòd deleteria hæc medicamenta plurimum inter se dissideant. Nam nusquam, quod legerim, tradidere Mauritani, eos qui Napellum hauserint, in tantum furorem agi, vt recalcitris sint coercendi, quemadmodum eos, qui Toxicum deuorauerint. Equidem illud pro certo testari possum, quòd Corsi illi latrones, sicarijque nequissimi, quorum historiam libro quarto prodidimus, cum de aconito siserent.

Toxicum Græcorum & Arabum Napellum non esse idem.

serentur. quanquam ab alypio Napello ea omnia dederint iudicia, que ab Auicenna napello assignantur: in nullum tamen inuorem adducit iure. neq; vllum etiam sensere delirium Praterca Auicenna, nostrorū testimonio, qui experimen- tum vidimus, epoto Napello, oculi exterius prominent, obortuntur vertigines, animi defectus, & ingens crurum imbecil- litas: quorum tamen symptomatum nihil de Toxicis agens meminit Dioscorides. Quinetiam, vt ipse perhibet Auicenna) qui Napelli pericula euadunt, plerumque aut ad hecticam febrem, aut ad tabem, aut ad comitalem morbum decedunt, ad quod Toxicum sumensibus non euenit: horum siquidem qui superuixerint, stupidi tantum relinquunt vite tempus diuini. Ex his itaque omnibus liquido apparet, quod hac inter se maxime differunt. Longi enim saniora sunt Toxicis in- comoda, quam Napelli, vt abunde constat ex Nicandro in alexipharmacis, vbi Toxicum descripsit hys notis. Protinus etiam lethali Toxicis dolorem & malum auigere dicitur, quando ius cruciaticus hominem comprehenderit. **Lingua** eius, qui Toxicum hauserit, inferne crasior redditur. sed labia intumescunt, os plane pondere suo degrauiant, ac aridum prorsus sputum regerit, inferiori que parte gingiue distunduntur, & e ius stationibus mouentur. Sape etiam cordi suporem iniecit, omnisq; sensus consternatus est, pontuo isto malo perturbatus. Ac laborans eo, & balat, & mugit, innumeris nugis fabulasq; pra insania edens: ac sine intermissione dolens, vehementer vociferatur, instar hominis, cui ca- pus totum corpus compingens, ense amputandum sit. Vel quomadmodum iraterisera sacras res tractans ipsa Rheia sacer- dos, non a mensis publico appropinquans itineri, longum ore iuro rumorem, & clamorem edit, quem horrendum in monta- nulatratum audientes sibi metuunt. Sic ille rabie, mente sua turbatus errans eiulat, ac lupi instar fugitiuè ululat, obli- quusq; pupillis aurino more inspicens, album dentem acuit, dei tibusq; ius desumat: haecenus Nicander. Caterum diffe- runt Toxicum, & Napellus in curandi quoq; ratione, Toxicum namq; Dioscoridi curatur rosacco ex passo potu, quinque- folij radice, caprillo, & hircino sanguine, cotoneis malis, amomo, & balsami fructu. Auicenna vero Napello succurrit cum vino potu, butyro, mocho, capparum radice, & eo deniq; mure, qui napelli ipsius radices depascitur: qua vtiq; medica- menta omnia ab hys admodum discrepant, qua in Toxicis curatione commemorauit Dioscorides: quem tamen penè ad ver- bum reddidit Auicenna in ceteris venenorum auxilijs. Haec igitur apertissime ostendunt, conuincuntque Napellum & Toxicum esse diuersa venena. Nec illa obstant sententia nostra, qua superius in Manardi fauorem adduximus: quando qui- dem vt facile colligi potest ex vniuersa huiusce libri materia) alia etiam habentur venena, qua quod eadem excitent ac- cidentia, & paribus curentur antidotis, videntur vnam, & eandem rem esse, cum tamen longè diuersa cernantur: cuius- modi sunt mandragora, opium, hyoscyamus, corniculatum papauer, & id genus alia. Sed vt iam de Toxicis meam in medi- cam proferam sententiam, cum huiusmodi salu crediderim, qui dixerit, id esse Auicenna Toxicum, quod idem Tusom appellat. Nemp: quod a serate epoto labra, & linguam inflammati, sequi delirium, & incoercitum furorem, qua propria Toxicis sunt iudicia. At tamen hoc videtur illi omnino fuisse incognitum, quod nec minus fortasse Dioscoridem latuit. Nam si Toxicum uouisset Dioscorides, eius certe historiam libro quarto silentio non dissimulasset, vbi de ceteris mortife- ris affert medicamentis. Illud pro iudicium quodammodo facit Mauritanorum Tusom esse Dioscoridis Toxicum, quod nomen idus licet corruptè ab his Arabes traxisse videantur, quasi toxicon tusom nominauerint. Verum cum Toxicum de NAPELLO loquendi nobis occasio dederit, non alienum fuerit, vt nostrum sequamur institutum, hoc loco eius tum venenum, tum remedia describere, praesertim cum nascatur in Italia. Napellus itaq; vt Mauritanorum testantur monu- menta, & nostra ad stipulat experimenta, si potu vel cibo in corpus ingeratur, seu a statim adfert discrimina: nempe illico labia inflamantur, & aded intumescit lingua, vt exeri extra dentes, & oris amplitudine capi non possit: oculi itè pariter intumescunt, ita vt prominent, vertigines, & animi deliquia frequentissime inuadunt, & crura imbecillitate affecta immo- bilitate redduntur: subinde vniuersè inuescit corpus, intumescitq; & confestim malo occupatur habitu. Quo fit, vt breui tem- pore patiens, qui iumpserint, imitabiliter intereat. Sed id mirum non est: quippe quoniam tanta est huiusce lethiferi veneni vis, ut si statim proprijs antidotis succurratur, nullus subinde expugnetur medicamentis. Immo quamuis etiam in ipso principio valentiora dentur remedia, pauci tamen superuiuant, qui aut hectica febre (vt diximus) aut tabe, aut comi- tiali morbo tandem non consistantur. Succurrendum igitur illico fuerit, excitatus prius vomitibus (vt Auicenna inquit) epoto rapti, aut napi semine. Prodest demde butyrum bubulum coctum, & sepe ac large cum vino sumptum: item glandi- um putaminum decoctum ex vino potum. Auxiliatur diambari & diamoschi puluis: quin potius ambarum & moschus pra ceteris per se, & cum Lemnia terra, ex vino pota. Quod si hac non proficiant, nihil sanè praeterea sperandum relinqui- tur, quod parum, vel nihil possint in huiusce veneni noxa Theriaca, & Mithridatis antidotus. Proinde dicebat Auicenna, Theriacam Napello non prodesse, nisi certo tempore, & termino. Faciunt ad hoc & Capparum radices, quod dixerint quidam antiquorum, has verum Napelli esse antidotum. Conciliator Smaragdi puluerem duarum drachmarum pondere magno remedio ex vino potandum pollicetur. Sed hoc dari tantum potest Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, alijsque opulentis principibus, quandoquidem parua, vel nulla est adhibenda fides pretiosorum lapidum fragmentis, quibus hac arte seplasia vtuntur. Ad hac recentiores ferè omnes, qui venenorum materiam pertractant, Auicennam secuti, verum securumq; Napelli antidotum putant murem quendam, qui Napelli radices depascitur. Hunc vidimus nos, cepimusq; in quibusdam altioribus vallibus Anania montibus. Sed non omnibus datur ipsum inueniendi, venandiq; modus: ad hoc tamque multa patientia, & vigilantia opus est. Quamobrè mihi mirum non est, quod scripserit quidam recentiorum cla- rissimus, Magnificum quendam virum ac principem, philosophum tamen, & medicum, cum diu hos mures quassuisset, neque eos inuenire potuisset, vt denum suum conficeret antidotum, horum vice magnas quasdam cepisse muscas, quas fo- lys, & floribus Napelli vicitare obseruauerat. Eo autem antidoto, quod constabat ex praedictis muscis numero viginti quatuor, rucis duabus Lemnia sphragidis, & pari pondere baccarum lauri, atque Mithridatis antidoto, omnibus oleo & melle sufficienti exceptus, admirandos fecit effectus, non solum aduersus Napelli venenum, quod vt periculum faceret, di- uersis dederat animalibus, & ipsemet experiendi antidoti gratia sumpserat, sed etiam in omni alio veneno. Sed quid di- cam si tamen licet sine vitio sua quenque laudibus efferre) de admiranda vi olei nostri de scorpionibus, cuius componendi rationem tradidimus in praefationis huius libri commentatione, cum à tam sauo exitialiq; veneno, qui biberint, breui ad- modum tempore liberentur, eo tantum exterius inuncti? nihil certè aliud, nisi quod aduersus hoc venenum, & cete- ra qua viscera non erodant, sicut & venenosorum omnium morsus & ictus, inter omnia remedia (pace aliorum dixerim) id primum sibi locum vendicat. Vbi enim vehementissima, ferociaque fuerint venena, singulis horis in- ungi postulat: vbi vero minus vehementia, minusque seua fuerint, interposito trium horarum spatio, pluribus continuis diebus. Inungi autem debet non modo cordi ad sinistram mamillam, sed temporum quoque, manuum, & pedum artcrijs.

Toxici notæ ex Nicandro.

Toxici & Na- pelli diuersa cura.

Toxicum & Tusom idè.

Napelli vene- num. eiusq; remedia.

Mus Napelli antidotus.

Oleum Scor- pionum con- tra Napellū.

IXia, quæ vlophonon appellatur, inter potandum aliquid ocimo simile gustu & odore redolet: vehementem linguæ inflammationem excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus supprime: strepitum cum animi deliquio ciet: iisque intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post vomitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex vino largiore, aut aceto melleo pota: rutaque sive hestris semen, aut laseris radix: item tragorigani decoctum, cum aliquo supra dictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt: quin & nuces iuglandes ex vino, cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita vt singula drachmæ ponderis æquent. Iridem chamelææ, aut thapsiæ, aut absinthii succi sicilicus cum aqua mulla, & acetum calidum potum.

Ixiæ ver-efica
natura.

Ixiæ non ef-
se diuersam à
chamæleone.

Ixiæ veneni
curatio.

Chamæleo-
nis nigri ve-
nenum & re-
media.

Etsi Ixiæ nomenclatio vtriq; chamæleoni sit communis, quod ambo gummi visco simile proferant, Ixiæ tamen dicitur præcul nil aliud designat hoc loco quam nigrum Chamæleonem. Siquidem id apertissime declarant plantarum vanae appellationes, quæ Dioscoridi adscribuntur, vbi sic legitur. Chamæleo niger, quem quidam vlophonum, alij Ixiæ, vnde li Cynoxylon vocant. Quæ verba adeo rem claram faciunt, vt ab hac sententia discedere nequeam. At si sycophantia quæspiam adeo fuerit impudens, vt nomenclationes illas tanquam Dioscoridi adulterinas rejiciat, addam non ob id esse falsas. Quod si adhuc recalcitrabit, Plinium illi in oculos obijciam. Quippe qui libro 22. cap. 18. ita de nigro Chamæleone scriptum reliquit. Ex nigris Chamæleonibus aliqui marem dixere, cui flos purpureus esset, & femina cui violaceus. In nascuntur caule, cubitali, crassitudine digitali. Radicibus eorum lichenes curantur, cum sulphure, & bitumine decoctis, commanducatis verò dentes mobiles, aut cum aceto decoctis. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant, & canum necant: Iuencas quoq; angina modo: Quare quibusdam vlophonum vocatur, & Cynozolon propter odoris vitæ uitatem. Ferunt & hac viscum vlcerebus vtilissimum. Omnium autem generum eorum radices scorpionibus aduersantur hæcenus ille. His itaq; me satis comprobasse arbitror Ixiæ chamæleonem esse nigrum. Quare apertissime hallucinatio impudentissimus ille, qui Ixiæ contendit plantam esse ab vtroque chamæleone differentem, nempe eam ipsam, quæ Theophrastus libro sexto, cap. 4. de plantarum historia, Ἰξίον appellat. Deprehenditur error & impostura non ex modo qua diximus, sed etiam ex ipsius Theophrasti historia. Siquidem Ἰξίον nihil aliud Theophrasto designat, quam chamæleonem. Namque hæc notis omnibus illum omnino refert. Ita enim de ea scribit Theophrastus: Ἰξίον ἄνθη δὲ ἐκ τοῦ Ἰξίου προεῖναι δύναται. Est ab radice foligera, qua de media seminalis acanus veluti malum extuberat, folijs nimis tatus. Hic lacrymam iucundi saporis parte profert postrema, quam spinalem mastichem vocant: Hæc ille. Quæ si perpendit, & inter Ἰξίον, & album chamæleonem nullam esse notarum differentiam non agnouerit, is merito appellari poterit, & præsertim cum Ἰξίον nusquam dixerit Theophrastus esse venenosam, & vlophonum appellari eius vsquam extet mentio apud Dioscoridem, Galenum & Plinium. Impostura hæc sunt, & sophismata, quibus inueniuntur saepe decipi solet. IXIA itaq; (vt Nicander, quem Dioscorides est secutus, in alexipharmacis inquit) Ἰξίον ἄνθη δὲ ἐκ τοῦ Ἰξίου προεῖναι δύναται similem saporem præbet: hausta extremum lingua tractum exasperat, interiora adurens, quinetiam corde suo turbat, insaniam vsque qui sumpserit, ac linguam penitus dentibus lacerat. Porro mente attonitus redditur, aluumq; tenuis, & vtrinque meatus & liquidorum, & esculentorum obdurans, qua & intrinsecus spiritum suffocans, sub vltimo modico tractu volutatur. Qui item hoc malo angitur, egrè magnaq; difficultate respirat, adeoq; venenata illa Ixiæ proterius excrementa eijcit ouorum similitudine: hæcenus Nicander. Caterum Mauritanii Ixiæ aldabac vocant, & proprie viscum significat. Ideoq; etsi scripsim ego antea Ixiæ viscum esse Chamæleonis, non ob id mihi vitio vertendum est, & præsertim, cum non minus venenosum esse sciam huiusce plantæ gummi, quam sit ipsa radix. Cuius nimis incommodis in primis succurrunt, Auicenna teste, excitata vomitiones, & infusi clysteres, qui ijs maximopere auxiliantur, sed mitiores lenioresq; esse oportet. Præstant deinde auxilium Theriaca, & Mithridatis antidotus, ex absinthij Romani & santonici decocto pota. Profunt item epithemata, qua cordis imbecillitati dicantur: quin & vtriusq; buglosi flores saccharo asseruati, additis margaritis, corallis, pretiosorum lapidum fragmentis, moscho, ambaro, & alijs qua cordis operam ferunt. Conuenit insuper rosaceum aceto admistum, & sincipiti vbi futura intersecat, linteis illitum. Quæ sanè remedia non modo remorantur, franguntq; veneni vim, sed omnibus etiam incommodis ab eo excitatis mirifice subueniunt. Verum est qd radix albi chamæleonis, qui in Italia prouenit, nullam hæcenus Ixiæ reperi: attamen superiori anno à Jacobo Cortuso viro sanè insigni, & plantarum indagatore maximo, & à Francisco Calzolario Veronensi rei herbarie studio studio, plures Chamæleonis plantæ integra ad me Pragæ missæ sunt, qua gummi illo visci modo lento referta sunt. Antea verò quidam Cretensis rei herbarie studiosus mihi pro certo affirmavit, e Carlinæ vulgò vocatæ radice in Creta Ixiæ ab ijs colligi, qui sagittas conficiunt, vt pennas sagittis conglutinent. Nec modò eā reperiri mihi retulit in Creta, sed na genere caule viduo, sed etiam quandoque in altero. Caterum hic referre non præteribo qua de Chamæleone nigro veneno, & eius remedijs memoria prodiderunt Paulus & Aëtius: ita enim scribunt. A Chamæleonis nigri potu morsus veneni & linguæ tumor, cum rugitibus intestinorum sequitur: facies distorquetur, & vomitus spumofus, tremores conuulsiones & totius corporis conuulsiones, ac vocis interceptio concomitantur. Caterum curantur ex his, qua ad sanguis sunt relaxant. Datur eis & thlaspis, & beta succus, & triticea ptisana cremor ex passo, absinthij dilutum & nitrum cum aceto melleo. Vbi verò euouerint, lac recens multum sape exhibeto, & aluum cum lubricis infusis eluito, velut est sanigræci & alba decoctum. Præcordijs etiam somenta, ac calfactoria adhibeto.

Præcordijs.

CERVSSA.

CAP. XXII

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiuarum, lingua & commissura dentium candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat iis extrema frigiditas mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mullam, aut ficuum, aut malua decoctum, aut lac calidum, aut sciamam ex vino tritam, vel lixiuum ex sarmentis factum, amaracium eleusium, aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis: aut gummi, quod vltimus plorauit: aut humor, quem vltima folia reddiderunt, cum tepida aqua sed tum quoque vomant. Conuenit etiam thapsiæ succus, aut scammonia, cum aqua mulla potus.

Cerussa facienda rationem tradidimus superiore libro. Hæc tamen sunt videri medicamenta, quæ exterius illinuntur, Cerussa le-
 gatur plerumque sit medicamentum, si tamen sumatur intus in corpore interficit, quemadmodum cetera deleteria thalis natura
 pharma, de quibus iam supra retulimus. Epota cerussa incommoda pluribus notis, quam fecerit Dioscorides, eleganter
 armatus retulit in alexipharmacis Nicander, quorum carminum hæc erit paraphrasis. Cerussa per omnia stumanti
 adest, cum vitio tempore, pingue & recens in mulctram emulsum fuerit, colore similis est. Perro cerussa stuma su-
 po... adstringente vi standit, quæ spumosi medicamenti frigore arefcunt, & contrahuntur in rugas. In lingua, & fau-
 ce hæc... languent. Vexantur ob id, qui hæc erint, arida tussis, oculisq; nutantes grauitate, dum crebros ructus egerunt,
 nec illi esactione succoplentur. Hinc fit, vt capite non parū turbentur: quinetiam animo suo nauseabundi præ tristi la-
 bore penant. At septime in ip'a luce vanum phantasma, quod resp' a nulum sit, cernunt: aliis son: nolenti toto corpore
 10 digunt, neque vt antea membra, potissimum manus, & pedes, suum officium faciunt, adeo vt ni eis succurratur, eo tan-
 dem dolore hæc editi, succumbant pereantq; hæcenus Nicander. Ceterum Auicenna testimonio, cerussam haurientibus alia
 adueniunt incommoda, nempe animi deliquium, faucium asperitas, ventriculi, & alui compunctiones, præcordiorum
 rethio a thalitus difficultas, piæfocatio spirituum, & albedo totius corporis: quin & vrina modò nigra, modò cruenta
 redditur. His auxiliu præstant vt ipse, & Actius tradiderit ammonium ex mulsu potum, aliq; medicamenta, quæ Cerussa mali
 suapte natura vimam valenter pellunt. Post hæc clysteribus vi conueniet, ac sul inde prouidere, ne dormiant affecti, sed
 vigilantes, vt corpus euomant potò prius hydromelite, susino, & narcisino olco admixtis. Præferunt quidam vomitiones ab
 atridatis, & capivomine conatatas: item clysteres ex trapica decocto cum oleo, absque sale: insuper Theriacam ex vino, &
 Mitridatu antidotum, & album meracum vinum largius potum.

Μυκήτις FVNGI CAP. XXIII.

Fungorum alii genere, alii copia lædunt: omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Qui-
 bus confestim succurrendum: communiter ex oleo vomere cogendi, mirifice iuuat lixiua ex sarmentis
 tis aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca & nitro. Fructus, aut folia pyrastris cum fungis decocta,
 strangulantes illam vim auferunt, eistataq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallinacea oua cum
 posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma: item absinthium cum vino melleque sumptum, & ex a-
 qua potum: apialium ex nitro: panacis radix, & semen in vino: sax vini cremata, cum aqua: atramentum
 a sutorium ex aceto: radix, vel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Non modò nocent in vniuersum Fungi, quòd in eorum genere aliqui habeantur lethales, & suapte natura veneno
 imbuti, sed etiam quòd ex his, qui perniciosi non sunt, plus quam ventriculi robur ferre possit, quandoq; ingeratur,
 ita vt tunc non malefica vi, sed copia lædant. Quippe cum natura humidi admodum, & frigidi sint, & lentore non modi-
 co scateant, superato sua quantitate corporis calori, suffocant, strangulant, & deniq; interimunt, nisi citius remedys suc-
 curratur. Cognitionem qui mortifera sunt vt superius libro quarto tradidimus, si strangantur, quod illico varios mutant
 colores, statimq; computrescant. Proinde dicebat Auicenna, in fungorum genere eos esse lethales, qui virides & casy depre-
 benduntur. Sed certe magnopere admirari licet, quòd tanta in hominibus inualuerit gula libido, vt etsi sciant fungos esse
 plerumque necis hospitium, tamen sui ipsius oblit, magno sane apparatu eos in cibis avidissime deuorent. Verum post-
 quam tantam cum palato fungi mure gratiam, vt ab his abstinere homines non possint, saltem discant velim, vt se ipsos
 a morte vindicent, fungos nunquam esse sumendos, nisi prius cum sylvestribus pyris decocti fuerint. Quòd si sylvestria pyra
 desiderantur, ex domesticis ea supplere poterunt, quæ ceteris austeriora habentur: in quem usum adhiberi possunt tam re-
 centia, quam sole siccata. Præstant idem arboris tam folia, quam cortex, præsertimq; sylvestris: siquidem fungorum anti-
 dotum pyra sunt. Dioscorides libro quarto præter medicamenta hic ad fungos assignata, prætulit origani, & satureia deco-
 ctam, gallinaceorum simum, ex aceto aut melle potum: quod tamen (vt Philagrius explicat) album esse oportet. Sed pri-
 mum medicamentis sapius enarratis eliciendus est vomitus, & subinde acria infundenda clysmata, vt extra corpus traha-
 tur virus. Ceterum ignorandum non est, eos incommoda asserre longè maiora, qui propria natura venenati nascuntur,
 quandoquidem non modò suffocant, strangulantq; comedentes, sed etiam intestina exulcerant, ventriculum inflant, sin-
 gultum & punctiones excitant, corpori vniuerso pallorem inducunt, & vrinam remorantur. Præter hæc alia verenda, &
 lethifera oriuntur symptomata, nempe frigus, tremor, interceptio arteriarum, animi deliquium, perfrigidus sudor, & mors ad po-
 30 stemum immatura. His primum auxiliantur vomitiones omni celeritate excitata: quibus etiam conuenit epotus dome-
 stici raphani succus, aut deuorata rana folia, aut origanum, aut mel. Prodest deinde mirum in modum Theriaca, & Mi-
 thridatis antidotus ex acerrimo aceto pota, aut ex oxymelite, aut ex aqua vite vocata. Quamobrem quinta essentia no-
 40 stra Theriacalis, in his fungorum malis mirificam fert opem. Prætulit ad hæc Auicenna calida quacumq; aromata: cuius-
 modi sunt diapireos, diaminum, digalanga, diamoschum. Conciliator potandum exhibet magno iuuamento vinum
 optimum, in quo serbuerit piper, offertq; subinde allium crudum deuorandum. Id quod facit vniuersa ferè rusticorum tur-
 50 ba, qui (vt Galenus inquit) allio theriaca vice plerumque vtuntur.

Γύψος GYPSVM CAP. XXIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat. Quare eadem proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxi-
 lia: & ad hæc malua decoctum, quod etiam olei vicem pensat: vt pote cum pingue sit, euomendo lu-
 bricas vias, & faciles reddit, deradique corpora non sinit: quod vbi duratur in lapidem, gypsum efficit.
 Quinetiam prodest oleum ex aqua mulia, aut ficorum decocto: & lixiua è ficulneo cinere, aut sar-
 mentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum, aut thymum cum lixiua, aut aceto, aut passo: hiq;
 decocto malua proluendi.

Gypsum omnibus notum, si bibatur, aut comedatur, strangulat (vt Dioscorides inquit) quod respirationis meatus va-
 lenter adstringat, & obstruat. Meminit huius inter venenata medicamenta Auicenna, sic inquiens. Eadem sunt gypsi
 iudicia, quæ & cerussa, præterquam quòd illud citius, & atrocius strangulat: quamobrem ys, qui hauserint, ea conueni-
 60 unt me-
 P P P P

unt medicamenta, qua cerusse, & fungis opitulagi diximus. Postea lubrica danda sunt, cuiusmodi est malua, althea, frum graci, & lini seminis decoctum. Conciliator egelidam aquam cum butyro primum potandam iubet, & deinde vomitum excitandum, à vomitu calidam item cum melle præbet, ut iterum vomant: postremò Mithridatis antidotum viuo meraco multum, drachmarum duarum pondere. Quod si alius ad hoc adstricta fuerit, citetur oleo, & anatis adipe clystere infusus, & illinatur venter ricino oleo. Quin & murium stercus (ut ipse ait) ex vino potum, proprium est gypsi antidotum. Auicenna autem vltimò purgari iubet scammonio, & alijs pharmacis, qua aluum deiciendo ad rem faciunt.

Αἷμα ταύρου

SANGVIS TAURINVS.

CAP. XXV.

TAuri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem, strangulatumquè concitat: faucium, tonfillarumq; meatus cum neruorum distentione præcludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quædam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gulæ inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiant, & aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex polca, & nitrum per sese, auxiliantur, nec secus coagulum omne cum aceto, & laserpitii radice, aut laser: itidem & bratsicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto: alius resoluenda. His qui seruantur, stercorosa, & fluida per sedem egeri consueuerunt. Stomachum, aluumq; hordæacea farina ex aqua mulla perungere oportet.

a Metum
απέμμα. i.
icmen.

Sanguinis
tauri venena-
ta natura.

Nemo tauri sanguinem clam potandum exhibere potest: nam vnusquisq; sana mentis sanguinem cognoscet, quare mea quidem sententia, fieri non potest, ut venefici eo quenquam decipiant: quippe nisi largius bibatur, & adhuc calens ab ipsis defluens venis, antea quam concreseat, noxam non infert, aut leuem. Quo fit, ut eos tantum taurino sanguine interire crediderim, qui aut atra bile tentati, aut cacodæmonibus irritati, vel ut aliquot sauum mortis genus ab legibus pro suorum facinorum pœna luenda institutum effugiant, vel ut immedicabiles & grauissimos morborum cruciatus simant vitam pertæsi (quod Plinius lib. 20. cap. 18. fecisse ait epoto opio Liciny Cecinna patrem ciuem Romanum) mortem sibi voluntariam conciscunt. Proinde scitè Nicander in alexipharmacis ita scriptum reliquit. Si ex insipientia quispiam atrum tauri sanguinem hauserit, mœrore adeò ingemit, ut nimio cruciatu tandem conficiatur, quando cordi appropinquans sanguis ille condensatur, ac in medio alui receptaculo in grumos coagulatur: hinc & meatus spirituum obturantur, & halitus suffocatur impleto gutture. Atqui tractibus, & singultibus iste afflictus, crebrò humi spuma coinquinatus palpitat: hac ille. Caterùm si sorte fortuna euenerit, ut quis tauri sanguinem potauerit, & ad eum domestici, quibus factum constat, Medicos aduocent, tunc Medici ijs vti poterunt remedys, quorum hic abundè meminit Dioscorida. Sed quoniam taurinus sanguis menstruum sanguinem mihi in mentem redegit, atq; etiam hic nobis occurrit fel pardi, vipera, & canis piscis: item cerebrum felis, quem Graci alurum vocant, cerui extrema cauda, quorundam quadrupedum sudor, & malum deniq; improbatumq; castoreum, qua omnia inter lethalia medicamenta annumerantur, cum hæc à Dioscoride in hoc venenorum censu prætermissa deprehendantur, & nobis propositum sit, singulorum vires maleficas, earumq; auxilia describere, hic locus opportunus visus est, in quo de ijs differeremus, & nostrum institutū, quantum pessimum

Sanguinis
menstrui ve-
nenam eiusq;
curatione.

exequeremur. Sanguis itaque MENS TRVVS mulierum, præsertimq; biliosarum, & facile rixantium potus, adeò bibentes effascinat & inficit, ut lunaticos & amentes efficiat. Idem detestabilis facinoris quandoque perpetrant malefica veneficæq; mulieres cacodæmonibus ductæ, ipsum exhibendo proprijs maritis, vel alijs, quos odio prosequuntur. Huius tamen noxæ succurritur contritis margaritis drachma pōdere ex mellissophylli aqua potis: auxiliatur & tepida balneū. Confert ad hæc (ut Conciliator inquit, si tamen id absq; diuina legis iniuria fieri possit) ut affecti hilariter frequentiq; mulierum consortio latentur, cum eisq; coeant, præcipuè cum iuuenibus, qua raro nuptias celebrent. Prodest & Theriaca drachma pondere ex sumaria aqua quotidie pota. Profunt & viperei pastilli scrupuli pondere, additis tum margaritis, tum Theriaca eodem pondere. Epoto autem PARDI felle excitatur vomitus, ceu aloes amaroreos & nares inficiens: post vomitum vniuersum corpus flauescit, ictericorum modo: postremò ea omnia consequuntur incommoda, qua ab assumpto napello, & à viperarum morsibus eueniunt, cum tam sauum lethiferumq; sit, ut tribus tantum horis potantes perimat: quod si hoc temporis spatium non interficit, prorsus desperandum non fuerit. Expugnatur primum vomitionibus illico excitatis, subinde ijs vtique antidotis, qua napello, vel vipera morsu infectis opitulantur. Auicenna huic veneno peculiarem conficit Theriacam ex Lemnia terra, & lauri baccarum, singulorum drachma vna: capreoli coaguli drachmis quatuor, myrrha & ruta seminis, cuiusque semidrachma, qua omnia melle excipit. Hanc iuglandis quantitate exhibet, excitatis deinde vomitionibus, ductisque demum laborantibus in calida aqua balneum, cui inferbuerint odorata medicamenta. Sed

Viperæ fellis
venefica vis
& auxilia.

VIPERAE fel adeò perniciosum existit, ut statim animi deliquium adferat: quare rarissimè antidotis succurri potest, quod nullum detur ea preparandi spatium. Veruntamen si quid est, quod tam breui temporis momento quicquam opis ferat, id erit quam celerrimè excitatus vomitus, epoto prius cocto butyro, igne colliquato: quo vomitiones iterum, atque iterum mouere oportet. Post vomitus nihil salubrius, quam theriaca, & mithridatis antidotum, moschus, ambarum, & eorum composita medicamenta, qua diamoschum, & diambarum appellantur. Vbi autem animi deliquia perseuerant, & corporis vniuersi angustia, vinum quidem offerendum est, aut caporum, & gallinarum carniū succus ex aqua feruentis balneo in vase vitreo destillatus. Huic equidem noxæ crediderim magnificè aduersari oleum nostrum de scorpionibus, cuius componendi rationem tradidimus in huius libri præfationis commentatione: itidem & quintam essentiam nostram, quod ictu oculi suis perquam tenuissimis partibus in totum deferatur corpus. Porro fel, quod à CANE piscis eximitur, lethiferum est: quippe quod potum, vel esitatum lentis tantum quantitate, septenis diebus interficiat. Curantur tamen qui hauserint, epoto bubulo butyro cum gentiana radice, cinnamomo & leporis coagulo. Prodest & corpus vniuersam odoratis oleis illinere, & victu tenuissimo vti. Caterùm qui FELIS CEREBRVM in cibū cederint, crebris afficiuntur vertiginibus, fiuntq; subinde stolidi & amentes. Quibus etsi subueniri possit, id tamen non nisi temporis tractu, & admodum difficulter fieri potest. His danda est Lemnia sphaeragis, & vomitiones inde sunt excitanda: seriū id oportet, ter, aut quater in mense. Præstat item auxilium, si quotidie mane sumant agri diamoschi confectioem, tribus vel quatuor horis ante cibum, quinimò moschus per se se sufficienter auxiliatur: namq; ut quidam tradiderunt, moschus tantum huiusce cerebri proprium est antidotum, si dimidijs scrupuli pondere ex vino bibatur. Sed illud non est igno-

Canis piscis
fellis venenū
& cura.
Felis cerebri
maleficum
& remedia.

mandum, quod non modo Feles deuorato eorum cerebro homines inficere possunt, sed pilis quoque, respiratione, & oculorum intuitu. Nam etsi pili omnes imprudenter in cibis sumpti, praefocare possunt, anhelitus meatus obstruentes, tamen jactantur priuatim exitiales censentur. Eorum praeterea spiritus tabifico quodam veneno infectus deprehenditur. Lentum non ergo quosdam, qui cum felibus adeo delectarentur, ut nunquam sine ipsis dormitum peterent, attracto inde diutius acris vitulo eorum spiritu, in tabem, & marasimum incidere, quibus postremo confecti diem suum obierunt. Nec diu est, quod quosdam monachorum caenobio vniuersa perijt familia, magno felium numero & contubernio. I adunt item suo (ut diximus) oculorum intuitu, adeo ut quidam reperiantur, qui his visis, aut auditis, pauore quodam illico capiuntur, tunc autem, maxime, quod non modo ex eorum veneno prouenire existimauerim, sed etiam propria eorum natura, qui eos uidentur, vel audiunt: quandoquidem y sua natura talem a caelo qualitatem influxam habent, qua nunquam ad propriam mouetur actionem, nisi obijciatur id, quod natura sibi contrarium fuerit. Horum plures in Germania duntaxat vidimus, & quosdam ex ea natione Goritia commorantes. Quod autem verum sit id aliunde euenire non posse, quam a congenita qualitate, qua paucis admodum inest, aperte sane ostenderunt eorum aliqui. Quippe cum huius gentis quidam hyemis tempore in hypocaustum nobiscum canaturus intrasset, quod plurimum amicorum sodalitas conuenerat, mulier quaedam huius viri natura conscia, ne is, viso felis catulo, quem educauerant, iratus discederet, illum in arcula quadam eodem in caenaculo concluderat. Sed quamis nec vidisset ille nec audisset catulum, cum pauco post tempore acrem felis habitum infectum inspirasset, irritata statim ea temperamenti qualitate felium inimica, emissio sudore, pallida admodum facie, omnibus sane admirantibus, tremebundus conclamare coepit, hic aliquo in angulo latet felis. Hus autem eadem opem ferre putauerim, qua cerebrum comedentibus remedio esse diximus. Inuenitur etiamnum in CAUDA CERUI extremis partibus porraceus quidam humor felis bili admodum similis, qui si forte deuoretur, praesentaneum est venenum.

Adfert enim illico intollerabiles angustias, animi deliquia, & omnia tandem symptomata, qua epotum napellum consequuntur. Succurritur his, ut ceteris primum vomitionibus, epoto butyro excitatus. Postea dandus smaragdi puluis ex vino dimidij scrupuli pondere. Quin & pistacia profunt, & pontica nuces in cibis largius sumpta. Ad haec vniuersum corpus inungi praestat, oleo e citrei semine expresso. Item theriaca proficit ex vino pota duarum drachmarum pondere. Magna quoque infert incommoda quadrupedum quorundam SVDOR, praesertim equi, asini & muli, quamuis etiam ceterorum sit malus. Is igitur potius viridem tumidamque reddit faciem: sudorem fetidum in vniuersum excitat corpus, praesertim sub alis. Perturbat praeterea tum ventriculum, tum aluum vniuersam, genitus excitatusque flatibus in intestinis. Quod si bibatur ex vino, delirium facit. Hus tepidam largius praebendam scribunt, ut concitato inde vomitu puluerulentus sudor reijciatur. Post vomitum confert vinum cum rosacco potum: item rhubarbarum semidrachma pondere sumptum, addito fositu salis momento: tametsi propria huiusce sudoris antidotus ea sit Theriaca (ut Auicenna est author) qua ex Lemnia

spyragide & Lauri bacca conficitur, cuius componenda rationem paulo superius retulimus, de Pardi felle differentes. Venenosum aequale lethiferum aiunt esse etiam CASTOREVM, quod iam putredine nigredinem contraxit, vel illud potius, quod e Pondo fuerit allatum. Hoc enim (ut Strabo inquit) venenosum est propria sui natura. Animaduertant igitur tum seplasiary, tum Medici, cum plurimum vsus sit medicamentum, ne malum exhibentes castoreum, aliquem interimant, quandoquidem non modo furore aguntur, qui hoc medicamentum hauserint, sed etiam intumescantem linguam exerunt, atque tam saeva febre corripuntur, ut vno tantum ferè die intereant. Aduersus hoc venenum mirum in modum iuuant vomitiones, quas toties butyro, & hydromelite epotis citare conuenit, quod nullum ea, qua reijciuntur, castorei odorem referant. Post vomitiones conducit diamoron potum, aut limonum, aut citrei mali succus saccharo admixtus. Verum peculiariter huiusce castorei antidotum est coriandri semen tostum, drachmarum duarum pondere sumptum.

Felium con-
tractio no-

Felles quida
ferre no pot-
sunt.

Caudæ cerui
venenum &
cuius curatio.

Sudoris ani-
malis virus
& remedia,

Castorei viru-
lenta vis &
curatio.

40

Γάλα ἐμπυτιαστὴν.

LAC INTVS COAGVLATVM. CAP. XXVI.

EOS, qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere saepius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum: aut laserpitii radicem, aut laser cum posca: thymumque; ex vino, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla saltilago obijciatur: quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neque illos vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gulæ angustias insinuans, strangulat.

Redidere quidam Dioscoridis interpretes, authorem hoc in loco de eo coagulata lacte differere, quo frequenter in ci-
bis utimur. E quorum numero fuere Ruellius, & Manardus Ferrariensis ea epistola, in qua vniuersam Marcelli in-
terpretationem corrigit. Sed ij alioqui viri eruditissimi, in hoc haud dubie falluntur, meo iudicio. Siquidem lac ea ratione
coagulatum nutrit, non autem strangulat, ut omnes in vniuersum homines testari possunt, sed praesertim ij qui in monti-
bus degunt, cum Maio & Iunio mensibus huiusmodi lactis plurimum deuorent. Ideo nil aliud nobis asserendum esse pu-
tauerim, quam quod de eo tantum lacte intellexerit Dioscorides, quod cum admixto coagulo bibitur, anteaquam coalescat
ita ut intus, non extra coagulatum sit. Quo factum est, ut in hoc a Ruellij interpretatione in aliam descuerimus & hic,
& in huius libri praefatione prope calcem. Magis enim Dioscoridis sententiam exprimi censemus, si lac intus coagulatum,
vel (ut Marcellus) lac cui coagulum admixtum sit, vertantur verba illa Γάλα ἐμπυτιαστὴν. Nam quod iam coagulatum
estur, non magno labore coquitur, ac digeritur, transitque in nutrimentum. Illud verò, quod vbi coagulum et admixtum
fit, subinde hauritur, priusquam coalescat, cum aliquantisper in ventriculo resederit, vi admixti coaguli illico inibi con-
crescit, fitque concoctrici facultati adeo contumax, ut superato caloris robore strangulet, non secus ac taurinus sanguis. Pro-
inde asserit Dioscorides, tauri sanguinem minimè suffocare, nisi recens calidusque iugulati tauri venis defluxus bibatur,
antequam concreseat: quandoquidem is non enecat aliqua propria veneni facultate, sed concretionem tantum, quam in
ventriculo consequuntur. Id quod euidentissimum est in epoto lacte, cui admixtum sit coagulum: aut in eo quoque, quod
sine coagulo bibitur, & per se alijs de causis in ventriculo coalescit. Euenit enim quandoque hoc, cum lac bibitum crassius
fuerit, & ventriculi, & iecoris temperatura calida, & sicca nimis. Nam ingens horum viscerum cum caliditas, tum sic-
citas, consumpta breui lactis humiditate, reliquum, quod crassum est, facile cogit, & conspissat. Quinetiam illud
idem ingenti fit frigiditate: nimirum expresso ab ea, quod tenuium est partium, reliquum, crassioris substantia facile
congelat.

Lactis coagu-
lata considera-
tio.

Quorundam
interpretum
error.

Lactis in ven-
triculo coa-
gulati cura-
tio.
Diosc. lectio
castigata.

Lixiua
pilorum.

congelascit, haud secus quam de glacie, & niue fieri libro quarto meteororum tradidit Aristoteles. Quamobrem est Gale-
ni consilium libro tertio de alimentorum facultatibus, vt nemo lac potaturus ipsum bibat, nisi mellis, aut salis tantillum
prius admisceat, ne in ventriculo concresecat. Sed non propterea mirari licet, quod Dioscorides scripserit, lac concretum in
ventriculo habentibus nihil salis salisue esse offerendum. Quippe quemadmodum coagulo primo lac coagulat, contrarium-
q; deinde efficit, si iam concreto lacti superaspergatur: ita sal prius lacti commistum, id concresecere prohibet, mox contra-
rium effectum prabet, si iam concreto aspergatur: recens enim caseus sale respersus, illico duritiem contrahit. Sed iam ad
curationem accedamus. Eadem autem erit lactis in ventriculo coagulati curandi ratio, qua sanguinis tauri, quando
is tantum sit vtendum medicamentis, qua suapte natura concreta liquant & discutunt. Qua in re auxilium prestant
ipsa coagula, acetum, praesertimq; scillinum, lixiuium, & ea omnia, qua incidunt & disgregant. Porro illud non pra-
tereundum esse arbitror, quod vbi in hoc capite legitur, & τὴν πηλοποιτικὴν κοιλίαν, id est, & siglinam lixiuiam, non vt
vertit Ruellius, & cum luto suo lixiuiam, Gesnerus in primo suo de animalibus tomo, de tauro agens, legendum rectius pu-
tat & τὴν πηλοποιτικὴν κοιλίαν, hoc est, & pilorum lixiuiam: reprehenditq; in hoc Cornarium, quod putauerit sig-
los ad lutum lauandum sibi lixiuiam conficere. Sed mihi, vt ingenuè dicam, magis placet Gesneri, quam Cornarij opi-
nio, siquidem cum siglinum lutum nunquam lixiuia lauari aut parari audiuerim, viderim aut legerim, veritati conse-
num non videtur, vt de siglina lixiuia intellexcrit Dioscorides: sed de ea potius, qua ad lanam expurgandam, vt in seculo
magis idonea reddatur, vtuntur pilopæi, hi sunt, qui pileos conficiunt. Eorum namque lixiuia, quod è combusta vini sa-
te plerunq; fiat, ea qua ad caput capillosq; abluendos communiter paratur, acrior, fortiorq; efficitur: vt proinde ad lac
dissoluendum in ventriculo coagulatum, est longè valentior. Error praeterea facili esse potuit librariorum, ex vnius dun-
taxat litera variatione, n pro i scribentium. πηλός enim per n scriptum, lutum significat, vnde πηλοποιτικὸν & πηλοποι-
aliqui sigulum interpretantur, πηλοποιός autem per i, artifex est, qui pileos ex lana conficit. Hac itaque ratione putan-
dum fuerit πηλοποιτικὸν, non autem πηλοποιτικὴν in Dioscoride hoc loco esse legendum. Caterum Fuchsius in suis doctis-
simis annotationibus in Nicolaum Myrepsicum, ea sectione, in qua de vnguentis tractat, capite 28. nil aliud hanc lixiui-
am esse putat, quam aquam qua lutum lauerit, vel per lutum transferit, non autem cum cinere & calce factam. Sed cum
siglinum lutum potius adstringat, contrahatq; quam laxet, ac digerat, nesciuerim profecto, qua ratione is eam lixiuiam
è tali luto confectam, is potandam daret, quibus lac in ventriculo concreuisset.

Αἰθέρης ὑπό.

ARGENTI SPUMA.

CAP. XXVII

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & 30
nonnunquam pondere suo intestina vulnerat, vrinamq; supprimit: corpus intumet, plumbeamque
deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum vomitionem, potum syluestris hormini semen,
myrrha drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apii semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum
palumbis fimum, cum nardo & vino.

Spumæ argen-
ti mala.

Pota argenti spuma, cuius historiam libro quinto tradidimus, lethifera (vt Dioscorides inquit) adfert incommode
Sed praeter hac Aëtio, & Auicenna authoribus, alia etiam eueniunt mala, nempe compaginum, & articularum in-
cendium, seu ardor: alui suppressio, quamuis quandoque ex accidenti alui ipsa deiciatur: sermo item praepeditur, &
sedis intestinum prominere: postremò inualecente malo agri suffocati moriuntur. Nicandro verò in alexipharmacu au-
thore, is qui argenti spumam sumpserint, alui molestia accedit: quin & flatus sese reuoluentes per medium ventrem, & 40
iuxta vmbilicū murmurant, instar torminum curatu difficiliorū, qua hominem affligant duris eum cruciatibus impeten-
tes. Nec iam vrina eijcienda patet exitus: membra totius passim corporis ardent, planeq; iam plumbeum, seu liuidum co-
lorem induerunt: hac ille. Caterum illud animaduertendum est, quod vbi in hoc capite legitur, dandam esse myrrham
octo drachmarum pondere, non deest suspicio, quin ea lectio sit deprauata, quod hac myrrha nimia videatur esse quanti-
tas. Auget suspicionem Nicander, qui duos tantum myrrha obolos exhibet, Aëtius tres, Auicenna verò tres drachmas non
excedit. Curatio in vniuersum sit citatū primū vomitibus, & infusis deinde clysmatibus (vt Conciliator tradit) ex by-
dromelite, gallinarum & anatum adipe. Post hac prodest amygdalinum oleum potum è dulcibus nucibus expressum. Con-
ferunt item carica in cibus sumpta: praeterea ventriculum apy succo, & aluum butyro illinire vtile est. Proprium verò hu-
iusce veneni antidotum (vt idem ait) est lathyris semen duarum drachmarum pondere potum. Veruntamen cum hoc fa-
cultatis admodum deiectoria sit medicamentum, drachmam ego non excederem. Eadem quoque infert mala PLUMBI 50

Spumæ argē-
ti curatio.

Plumbi sco-
bis noxa, &
curatio.
Ferri scobis,
squamae, &
recrementi
noxa & cura.

SCOBS tenuissimè contrita, & isdem pariter curatur medicamentū. Siquidem argenti spuma nil aliud est, quam plum-
bum argenti aut aris recremento commistum. Nec deleteria vi vacant (vt author est Auicenna) FERRI tum scobis, tum
squamas tum recrementum: tamen si omnia hac prius diutius aceto macerata nulla prorsus molestia in medicum veniant
vsus, denturque potanda dysentericis, mulieribus vteri defluxione tentatis, & in eclegmate ad lienis infarctus, item-
que ad enterocelas. Sed de his vel non insenatis, vel plusquam par sit sumptū, fortasse intelligit Auicenna. Itaque exitum
ab his intestinorum cruciatibus, oris & lingua scabrities, estuatio vniuersi corporis, capitis dolor, marasmus, & membra-
rum omnium arefactio. Succurritur noxa potu lactis recenter mulsi, ac subinde datis aluum valenter soluentibus medi-
camentis, secundum qua butyrum tamdiu potandū dare oportet, donec intestinorum dolores amoueantur. Hac dum sunt
persundatur eorum caput oleo rosaceo, violaceo, & è nymphæa floribus parato. Tollitur deinde adueniens marasmi in-
temperies, & corporis vniuersi arefactio, demersis in balneo laborantibus, in quo testudines, rana, malua folia inserbu-
erint: quinetiam clysteribus ex pedum hadorum iure, aut althæa radicum decocto: item butyro largius in cibus sumpto, &
epotis pinguium carniū iuribus. Sed (vt idem Auicenna scribit) proprium huiusce ferrei pharmaci antidotum, est lapis
magnes drachmæ pondere potus, ex mercurialis, vel beta succo. Veruntamen hoc haudquaquam fieri posse videtur absque
manifesto sumentium discrimine, quandoquidem etsi magnes suapte natura ferrum trahat: non tamen affirmauerim,
quod hanc ob causam eius quoque destruat facultates, & impediatur noxam, sed potius quod eam auget crediderim. Qui-
pe cum is ferrum ad se traxerit, id sanè diutius in ventriculo retinebit, ex quo noxa fouebitur. Adde praeterea, quod cum
& ipse MAGNES deleteria sit facultatis, adeo vt eos, qui hauserint, lunaticos & melancholicos efficiat, cum hanc
quaquam ore sumendum esse duxerim. His itaque qui Magnetem sumpserint, commendant quidam auri tenuissimam
scobem ex vino potam, & suatagorum tamenta eodem pondere. Laudant etiam clysteres ex lacte, & alium amygdala-
rum

Magnetis ve-
nena vis &
auxilia.

Larum oleo infusos. Sed ceteris preferunt smaragdum ter nouem diebus potum, tribus semper intermissis diebus. I et hisera & non parum formidanda est etiam AERIS SQUAMAE vis. Ea siquidem pota, intolerabiles alui defluxiones mouet, aut noxiis vomitiones concitat, obortis inde molestissimis alui & ventriculi punctiombus. His auxiliantur citata primam vomitiones: deinde agri in balneum mittendi sunt, in quo hircorum conserbuerint capita, aut ingens cochlearum ramus. Prodest & mentha succus potui datus: insuper aluum, & ventriculum calido rosacco perungere expedit. Verum ad hoc praeceteris pollent acori radices trium drachmarum pondere pota, aut earum succi tantundem. Sed necis acori succum dare perdifficile fuerit, cum legitimum in nostris non proueniat regionibus, nec nisi succum afferatur. Lituani tamen & Tartari eo abundant, vt superius libro primo prodidimus.

Squamæ æris
lebetera vis,
& remedia.

10

Τὸ δὲ πρῶτον ὑποσ

ARGENTVM VIVVM.

CAP. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ spuma argenti infert, eisdemquæ vtendum auxiliis. Lac copiosè potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

Verum omnino & exquisitam argenti viui cognitionem non habuisse Dioscoridem & Galenum, illud maximo indicio esse videtur, quod hic paucis, ille vero perplexè eius historiam, & facultates tractauerit. Hoc, vt in præfatione huiusce voluminis commentario tradidimus, intermisit, si largius bibatur, excessu summi frigido & humido. Putrefacit enim hoc suo exuperante temperamento innatum cordis humorem, ac subinde congelat sanguinem, vitales spiritus, & ipsam denique cordis substantiam, quandoquidem id Medicis experientia non pertum est, vt Conciliator testatum reliquit. Nam cum septisarius quidam ardentissima febre correptus, siti intolerabili vexaretur, & delirio oberrans in pharmacopolium descendisset, vt aliquid ad potandum inueniret, fortè fortuna in argenti viui vas incidit, multumq; ex eo potauit, aque fortasse vice: postea statim in suum cubiculum se recepit, vbi paucis post horis congelatus interijt. At cum eius domestici sub cadauere magnam argenti viui quantitatem inuenissent, iam per sedem egressi, aduocarunt Medicos, vt eius rei, quam miraculum existimabant, diligenter causam inuestigarent. Ii statim ex pharmacopolio argenti viui vas adferri iusserunt, quod vbi ferè vacuum reperissent, rem vti se habuerat deprehenderunt: auxitq; fidem, quod euiserato homine, adhuc argenti viui libram in eius ventriculo inuenerunt: quin & sanguinem circa cor concretum. Quo argumento palam fit, magno admodum recessu frigidum esse argentum viuum. Verum enimvero in eius curatione illud inquirendum est, an purum sit quod potum fuerit, an aliuu alioue liquore extinctum, aut acerrima aqua, qua chymista vtuntur, aut per se tantum præcipitatum, aut vna cum arsenico, vel chalcantho sublimatum: cum enim aliud alio perniciosius habeatur, proprium quodlibet exigit remedium. Pernicialius est sublimatum, secundum hoc præcipitatum: proximè sequitur, quod saluum, aut aliquo liquore fuerit extinctum: minus verò ceteris nocet, quod purum, viuumque fuerit: vt potè cum fluidum admodum sit, & ponderosum, non difficulter clysteribus extrahitur. Id quod ceteris generibus non euenit, quæ cum ventriculo inhereant, illum facillè erodunt & exulcerant. Argento viuo puro, aut extincto, aut præcipitato epotis, eadem consequuntur symptomata, quæ argenti spuma pota infert, sed cum magno anhelitus fœtore, quem & respiciunt, qui Gallica lue affecti eo illinuntur. Quod maximum præbet indicium, quod sua exuperante humiditate, omnes humores, qui ventriculo alijsq; circumstantibus partibus hæserint, computrescere faciat. Ceterum epoto sublimato, illico lingua & fauces non aliter exasperantur, quam si quis immaturorum sorborum succum hausisset. Quod sanè incommodum nullo lenientium gargarizatu, nisi difficile, & longo tempore tolli potest. Id enim quàm primum in ventriculum descendit, ei pertinaciter inhaeret: quare statim erodit & exulcerat: tum inextinguibilem sitim excitat & inexplicabilem angustiam inducit. Hu succedit lingua tumor, animi deliquium, vrina suppressio, anhelitus difficultas, & ventriculi & intestinorum tormina, tum vehemèti erosione, vt nisi confestim succurratur, pereant affecti, erosio, perforatisq; ventriculo & intestinis. Purum curatur (vt Dioscorides, Aërius & Paulus memoria prodiderunt) auxilijs, quibus argenti spuma: nam si copiosius ebibatur, non interficit, quod ob sui tum pondus, tum fluxilem substantiam facile per inferna secedat, nulla in ventriculo, & intestinis protracta mora. Ex quo nil mirum, quod scripserit Auicenna, non deesse qui bibant argentum viuum, & nullam inde sentiant noxam, quod facillè labatur è corpore, dummodo qui hauserint, continuè huc atq; illuc deambulent. Goritienses mulieres agrè parturientibus vltimo remedio, argentum viuum potandum præbent, scrupuli pondere. Nec desunt, qui ad interimendas alui tineas, pueri etiam propinent, ad duorum granorū milij quantitatem, citra vllam molestiam. In aliorum autem curatione alia requiruntur remedia, nempe clysteres, vomitiones, pingua in potu sumpta: & vt in vniuersum dicam, his opem ferunt omnia medicamenta, quæ venenis erodentibus conueniunt, quorum latius superius meminimus in cantharidum curatione, ad quam breuitatis studio lectorem rejicimus: namque his efficaciora non plura hæctenus nobis comperta sunt. Nec alijs vtendum est remedijs, vbi quis cinnabarin sumpisset.

Argenti viui
perniciosa
natura.

Historia sum
per argenti
viui.

Sublimati è
poti signa.

Argenti viui
sumpti cura
tio.

Argentum
viuum partū
promouet.

Cinnabarin
remedia.

Τίταρος, σάνδαράχη, αὐριπίγ-
MENTVM.

CALX, SANDARACHA, AVRIPIG-
CAP. XXIX.

Calx, sandaracha, & auripigmentum pota, aluum, & intestina cum vehemèti erosione excruciant. Præbenda cuncta, quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac soluunt, & facillè lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi ibisci, & maluæ succus est: natura enim vtrique perlubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragi herbæ, vel oryza, lacquæ cum aqua multa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Non modò Calx, Sandaracha & Auripigmentum, quorum historiæ superiore libro tradidimus, hausta vehementissimos ventriculi & intestinorū cruciatu, & erosiones excitant, vt Dioscorides inquit, sed etiam sitim inexplebilem, faucium & gula asperitatem, tussim, spirandi difficultatem, vrinae suppressionem, & dysenteriam. Ceterum hac omnia adiuuantur (vt scite docet Dioscorides) pinguibus acrimoniam obtundentibus, & potionibus lenientibus, aluumq; lubricam reddentibus, tum etiam cremoribus, atque seminum quorundam: sticticentis, vt in cantharidum curatione latius diffusiusq; prodidimus: quandoquidem medicamentorum omnium erodentium curatione à cantharidum curatione non differunt: neque his sane valentiora nobis sese offerunt remedia. Quare ex eo loco medicamenta petenda erunt his, quibus vsu fu-

Calcis, sanda
rachæ, & auri
pigmenti ve-
nifica vis, &
curatio.

Arfenici sublimati, & aliorum quorundam venenum. tura sunt. Eosdem quoque effectus malos & noxios prebent ARSENICVM sublimatum, Aerugo, & quod officina Risagallum appellant: quin & Saponis lixiuium: quod vulgò vocant Itali la maestra, & Aqua ea omnium acerrima, qua aurifices, ac chymista aurum ab argento separant. Sed aqua huius & lixiuij difficilis est cura, quòd illico in totum diffundantur corpus. Vniuersalis tamen curandi ratio eadem erit, quæ calcis & auripigmenti: tamen si altero sit vehementius, & erodentius. Qui autem priuatim Arsenicum sublimatum hauserunt, eos sequefter vomere oportet, potò semper prius butyro, aut per se tantum, aut addito rapi seminis decocto. Profunt his & clysteres ex pingui iure, aut ptisana alicuæ cremore, aut spissamentis ex psylli, malua & cydoniorum semine factis. Auxiliatur amygdalinum oleum, & ius pinguium galbanarum in cibis sumptum. In præstantissimum verò antidotum censetur fossile crystallum, in tenuissimum puluerem contritum drachma pondere, ex dulci amygdalino oleo potum. Sed antidotum omnium præstantissimum: contra mortiferam Arsenici vim, est puluis Serenissimi Principis mei Ferdinandi Archiducis Austriae, quo Prage seruatus est quidam, u-10 spendio damnatus, cui pulueris huius experiendi gratia, Arsenicum datum est in potione drachmarum duarum pondere. Siquidem cum is post quartam ab epoto veneno horam, liuidus totus ad eò viribus destitutus decumberet, vt iam moribundus strangularetur, oblatu est illi puluis ex albo meraco. Quo factu est, vt etsi in conflictu nulla fere recuperanda vitæ spes haberetur, vicit tamen natura hoc antidoto validior ac viuacior reddita, & veneni immanitatem superauit, ac eò vt u-11 sequenti die liber euaserit, & latus coram omnibus apparuerit. Eodem quoque puluere alij à me seruati sunt, quinetiam ab alijs, qui antidotum à me receperunt. Franciscus Calzolarius myropola Veronensis amicus intimus meus, hoc anno eodè antidoto à me accepto duos homines Veronæ in carcere detentos, qui venenū in pisce quodam dono missum vorauerant, post octauam diem à veneno accepto liberauit, præter Medicorum sententiam, qui symptomatum immanitatem cernentes, illos omnino morituros censebant. Nec quidem ab re, cum alij duo, qui illis comensales in carceribus erant, eodem die mortui sint, quòd neminem habuerint, qui sui curationem suscepisset. Huiusce historiae etiam assertores habeo Magnificos viros, patritios Venetos, Nicolaum Quirinum, & Hieronymum Marcellum, quorum hic Capitaneum (vt dicunt, ille Prætozem Verona gerebant, vt ex publicis eorundem scriptis, quæ apud me sunt, quisquis certior fieri potest. His accessit clarissimi Medici Antonii Capriani Mantuani testimonium, qui Tridentini Concily aliquot annis Physicum egit magna cum laude. Nam cum is, tum temporis, quo hæc euenerunt, Verona se reperiret, accersitus a Reuerendissimo Cardinali Nauagerio, admirandas huiusce pulueris aduersus venena vires, ad Excellentissimum Philippum filium suum, Reuerendissimi Archiepiscopi Pragensis Medicum, & historiam omnem descripsit, & vt me rogaret addidit vt eundè puluerem illi transmitterem. Sed & id mirum admodum videri debet, quòd hic puluis non solum haustus, sed etiam illitus, demorsos ictosq; à venenosis animalibus seruat & sanat, eo è rosarū aqua epithematis modo sub sinistro vberè, & super afflato loco illito. Iacobus Antonius Cortusius Patritius Patauinus, hoc puluere a me accepto, quendam ciuem & vicinum suum à Scorpione magno ictum, iam animi deliquio detentum, breui admodum tempore reuocauit ad vitam. Quinetiam eadem serua- 30 ta ratione proprium suum seruauit aurigam à serpente venenoso demorsum. Porro AERUGO, præter alia eius mala ante dicta, ad eò spirandi meatus occludit, vt magno impetu suffocet affectos. Succurritur noxa crebris cum butyro, & calida excitatis vomitibus, vt in Arsenico, & infusis subinde clysteribus ex asinino lacte, & dulci amygdalino oleo. Prodest & Lemnia sphaeragis drachma pondere ex vino albo pota. Præstat item in olei balneum laborantes ad ventriculum vsque demittere. Sed proprium huiusce pharmaci antidotum (vt ait Conciliator) est, vt qui hauserint, bibant ex vino corallia rubra in tenuem puluerem contrita senorum scrupulorum pondere. Caterum RISAGALLO vulgò dicto, quod quidam Realgal appellant, cum maximè extremeq; siccat, & nervos contrahat, non alia conuenit curatio, quàm qua Argento viuo, & arsenico sublimatis, & arugini adhibetur: quanquã priuatim non obscure iuuat vniuersum corpus dulci amygdalino illinire, & violaceo iulapio, & ptisana hordeacea sitim extinguere. Proficit & pinorum nucleorum oleum, aut e mag- 40 nis nucibus, quæ ex India aduehuntur, expressum, semilibra pondere potum. In summa ea omnia efficaciter adhibentur, quæ cantharidibus conferre diximus.

Aeruginis remedia,

Risagalli curatio.

Δαζώος Θαλάσσιος.

LEPVS MARINVS.

CAP. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium virus olent: procedente tempore alius dolore afficitur, & vrina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum colorem refert: omne piscis genus auerfantur, & odio habent: fœtido, ac graui sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asinum, vel passum continuè, aut radicis maluae foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonii succi drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis. Cedria contrita cum vino efficax est: anserinus sanguis, vt repebit potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernenturq; , solis fluuiatilibus cancris vesci possunt, bibuntq; eos admisso vino, adiutiq; ab his percoquant, cumque appetere & comesse, pisces ceperint, suæ salutis indicium habent.

Leporis marini veneni signa.


Diximus de Lepore marino libro secundo, de quo ita scribit Nicander in alexipharmacis. Sin marini leporis male perdentis potionem deprehenderit, perniciem afferentem, odorem eius senties, qualis est squamarum & piscium purgamenti. Porro gustus, & sapor eius piscosus est, qualis putrefactorum piscium esse solet: vel cum nondum ablutorum squama polluant corpus Sequitur huiusce potionem viridis fellis suffusio, cum obtenebratione visus: & caro paulatim in homine contabescit. Accedit his ciborum omnium abominatio, malus habitus, & talorum ardor: oculi in concauum occul- 60 tantur, & gena ac maxilla florido colore rubent. Vrina ægerrimè redditur: quæ tametsi reddatur, purpurea apparet, & plus æquo sanguinea. Adhæc si pisces agris offerantur, eos illico nauseabundi execrantur: hæc ille. Cui subscribit Aetius & Auicenna, qui præter relata induta, alia adhuc lepori marino epoto assignant, his verbis: Marinus lepus adeo icterum inducit, vt totius corporis habitus croceo admodum colore inficiatur. Postea facies liuens intumescit, pedum planta intendentur, adest spirandi difficultas, pectoris & pulmonis angustia, rufescuntq; oculi. Dehinc tuus emergit succus, sicutum truentum, renum dolor, veritumq; inflammatio, adeo vt perpauis euadant, qui non labantur in tabem. Quare Galenus libro de theriaca ad Pisonem, proprium marini leporis esse ait, vt pulmonem exulceret & erodat. Succurritur noxa, vt Di- 40 escorides inquit, asinino lacte ex passio potu, & malua decocto. Neque id aliam ob causam, vt Aetius declarat, quæ ad elu-

ad eliciendum vomitum, & veneni acuitatem retundendam, quemadmodum elleborum, cyclaminum & scammonium exhibet. partim ad citandas vomitiones. partim ad aluum deiciendam. Cetera vero, ut incommodus subueniatur. qua interitus infert particulis. Praefertur quibusdam aduersus hoc malum humanus sanguis calens e venis potus: humanum item lac, ab ipsis vberibus exuctum, & vulpis caro in assata: quin & theriaca diatesseron tribus diebus pota.

Φρύνος καὶ βάτραχος ἑλετος.

RVBETA ET PALVSTRIS RANA.

Rubeta. aut rana palustris assumpta tumores ciet: pallor corpus vehementer decolorat, ut planè buxeum spectetur: spirandi difficultas torquet: & grauis halitus oris, singultusq; inuita interdum genitura profusio consequitur. Adiuuantur secundum vomitionem multo meri potu, & arundinis radicis bini arachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt, ut vehementi ambulatiōi & cursui se credant, ob torporem, quo corripuntur: quinetiam quotidie lauandi sunt.



Rubeta Rana, quam quidam busonem vocant, diue: saepe reperuntur genera. Terrestris tamen, quae Graecis phrynos dicitur, Latinis vero rubeta, quod in frutetis & sepibus inter rubos degat, nocentior magisq; lethifera est, quam quae in paludibus & aquosis scrobibus viuit (ad quod non recte, meo iudicio, intellexit Aloysius Mundella Brixianus, octaua sui voluminis epistola) tantog, magis noxia, lethiferaq; fuerit terrestris, quanto in opacioribus frigidioribusq; locis vitam duxerit. Quamobrem in hoc genere ea omnium pessima creduntur, quae in vmbrosis conuallium syluis, & in arundinetis morantur. Adulta crassa tenaciq; conteguntur cuti, adeo ut acutissimo palo quandoque difficile à rusticis, qui ita eas interficere solent, perfodiantur. Haec cum circumnascens herbas, siue aliquod depascens animal, veneno inspicere volunt, contrahunt sese in tumorem, ut venenum per urinam longius ei aculentur in plantas, & circumstantes quadrupedes. Quare admirari non licet, si nonnunquam repente intereant homines, qui siaga, fungos aliasque plantas harum veneno infectas inscru deorauerint. Quippe quod non modo veneni nucleu hac omnia inscruunt: sed etiam salua ea saepius conspuunt: quae sanè non minus mortifera est, quam napellus: quinetiam earum sanguis vipereo scatet veneno. Proinde mirum non est, si in puluerem pota mortifera inserunt incommoda, quemadmodum & morsu. Nam et fidentibus careant, tamen compressa scabris gingiuis particula, & subinde ingressa per cutis spiracula salua, demorsos venenant, ut in praefationis huiusce libri commentario tradidimus. Sicca & in puluerem pota, ut Auicenna refert, praeter mala quae à Dioscoride redduntur, faucium & gutturis tum inflammationem, tum siccitatem excitant: item oculorum caliginem, vertigines, conuulsiones, dysenteriam: fastidium, vomitus, animi deliquium, delirium, amentiam & plerumq; edentulos faciunt homines, quamuis euadant, qui hauserint. Nec minora etiam pericula adferunt fructus, & herba earum veneno infecta, & epotus earundem sanguis. Curantur his malis affecti Theriaca, vel Mithridatis antidoto tribus continuis diebus ex vino potis. Idem praestat testudinis marinae sanguis, additis cumino, leporis coagulo & vino. Datur potanda praesentaneo remedio quinta essentia nostra Theriacalis. Quin & oleum nostrum de scorpionibus exterius commode inungitur. Praesert Conciliator smaragdi puluerem ex vino potum scrupuli pondere, cum eo tamen ut subinde intret ager nudus in mulum recenter exenteratum, inbique conclusus moretur, donec deservescat cadauer, totiesque sic exenteratum mulum aut equum, si mulus non adsit, permutet, donec effuso diutius sudore cedat noxa. Aetius mulia & equis parcens, in clibano, quantum tolerari possit, calidissimo affectos, vel alio in loco arte calefacto detinendos ad sudandum iubet, quemadmodum curantur aqua inter cutem laborantes. Quorum medicamenta curatioque, ut Auicenna est author, hoc in negotio non parum conueniunt. Proinde prodest his maxime rhabarbarum, diacurcuma & dsalacca confectio: tamen si Conciliator lapidem his omnibus praeferas, qui in eorum capite reperiri solet.

Rubetae palustrisq; ranae venenum.
Ranae maleficae signa & curatio.

Βδελλα.

HIRUDO.

CAP. XXXII.

Deuorata cum aqua hirudines, si ori ventriculi adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem praebent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenaeicus succus, aut laserpitij folia aut betra, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca: nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus haereant, in aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient.

Hirudinum
deuoratarū
noxa.

Hirudinum
curatio.

Hirudines raro in alijs aquis inueniuntur, quàm in palustribus, lacustribus & stagnantibus: quandoquidem in pro-
batissimis fontibus, & arenosis & saxosis fluuijs non nisi rarissime viuunt, cum suapte natura cæno ac limo delecten-
tur. Quamobrem caueant, qui palustres vel stagnantes aquas bibunt, ne hirudines simul ingerant, quemadmodum in ex-
pertis viatoribus nonnunquam euenit: namq; æstatis tempore calore & siti defatigati, dum aquam, cuiuscumq; in itinere ob-
uiuerint, aut de potant, sepe imprudenter hirudines hauriunt. Quo fit, vt subinde non modo sibi sanguinem exugi senti-
ant (vt tradidit Dioscorides) sed etiam (vt Auicenna inquit) cruenta expuant, ac præ timore melancholici fiunt. Verum
antequam aliquod offeratur medicamentum, inuestigandum est, an animal ori ventriculi, an gula adhaerit, an ipsis
faucibus. Id quod facile intelligi potest ex eorum, qui hirudines hauerint, relatione: quoniam vbi suctionem sentiunt, ni-
mirum ibi hirudinem fixam esse significatur. Quod si ori ventriculi affixa fuerit, auxilium præstat muriæ leniter epota,
factida item l'aserpitijs lachryma, quin & lixiuium cum sale & aceto, aut raphani domestici succus cum aceto, aut oleum
crudum haustum, quod per se tantum hæc interficit animalia: conferunt insuper ea omnia, quæ alui tineas, & lumbricos
necant. Si verò guttur medium ab hirudine obsideatur, proderit acre lixiuium gargarizare, aut aquam, in qua alumen cum
aceto inferbuerint, vel chalcanthum, aut muriam cum lixiuium, aceto & sinapi simul commistis. Sed si ea faucium ambitui
hæreat, opem mirificam feret (vt Dioscorides docet) calidæ balneum, aqua frigida in ore contenta. Siquidem hirudo ab a-
quæ calore propulsata, ad frigidam in ore contentam decurrens, facile vnâ cum ipsa aqua expuetur. Interdum contingit,
quod statim sub linguæ radicibus, vel in primis faucium partibus adhaerescit, ita vt depressa lingua videri possit: tunc ro-
stratis forcipibus facile extrahi poterit, vel quouis alio instrumento, quod cuiq; in promptu fuerit.

Ἐλλέβορος λευκός, θάψια, ἐλατήριον, ἀγαρικόν μέλαν.

VERATRUM ALBUM, THAP-
PSIA, ELATERIVM, AGARICVM NIGRVM.
CAP. XXXIII.

Prouidendum etiam ijs, quæ etsi ferendi auxiliij gratia tradantur, non minora tamen cæteris venenis
pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, elaterium, agaricū nigrum: siquidem
ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur, quæ in fungorum
mentionem & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis, quæ excremen-
ta supprimunt, coercemus. Neq; negligenda quæ parum quidem nocere videntur, interim verò vitam
in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pappi recentes: flores autem
sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Diuisio capi-
tis castigata.

Exant quàm plurimi Dioscoridis codices, in quibus caput hoc de Veratro albo, Thapsia, Elaterio & Agarico nigro, à
precedenti capite seiunctum non legitur. Verum cum antiquissimus manuscriptus codex, hæc proprio & peculiari ca-
piti dicauerit, videaturq; absurdum de his differuisse Dioscoridem vnâ cum hirudinibus, cum quibus nullam habent cogna-
tionem, neq; iisdem curantur remedijs, non temerè facturos duximus, si illa à nobis seorsum proprio capite ab hirudinibus
distincto, tractarentur. Sciendum itaq; est, quod cum hæcenus scripsisset Dioscorides omnium venenorum indicia, quæ po-
ta, vel deuorata, homines necant, vel saltem egros efficiunt: quin & vniuersalia & particularia antidota tradidisset, qui-
bus illorum vis frangi ac destrui possit: cum præterea sciret aliqua in medicum vsum haberi medicamenta aluum ducentia,
quæ simpliciter pota, & nullis antidotis infrenata, vel maiori mensura, vel pondere, quàm par sit sumpta, non minus ho-
mines interimunt, quàm quæ propriè venena vocantur, Medicos illud hoc loco admonere voluit, qd in propinadis hisce medi-
camentis minimè cacutiant, sed in hoc omne suum studium, omnemq; diligentiam impendant. Verum quamuis, inter
ea omnia, quæ in medicum vsum veniunt, paucorum tantum meminerit, nempe thapsia, albi veratri, elaterij & agari-
ci, non tamen ob id fuerit insimulandus, quod nesciuerit præter hæc, alia plura esse medicamenta, quæ noxam inferre pos-
sunt, aut maiorem quàm illa, aut æqualem. Quippe quod illi satis visum sit, si tantum horum exemplo imperitos Medi-
cos, discrimen noxamq; docuisset, quæ omnia in vniuersum medicamenta aluum cum labore ducentia plerumq; sumentibus
adferunt, cum (vt modo diximus) vel largius quàm deceat, vel suis antidotis exuta sumuntur. Sed vt hæc rerum
studiosis in omnibus, quantum possumus, satisfaciamus, præter ea quæ à Dioscoride tradita sunt, nos alia quoq; plura ad-
dere decreuimus, quibus quotidie passim vtuntur Medici. Cuiusmodi sunt cyclaminus, veratrum nigrum, euphorbium,
turpetum, tithymali omne genus, scammonium, colocynthis, bryonia, lathyris, ricinus, thymelæa & chamelæa. Quan-
doquidem cum hæc omnia Medicis in frequentissimo sint vsu, ad corporis excrementa exigenda, & ad vomitum quandoq;
ciendum, in quàm plurimis hominum affectibus, mihi sanè negligentia adscribi posset, si hæc prorsus silentio inuoluissim,
præsertim cum sæpius eueniat quorundam circumforaneorum imperitia, ac temeritate (pharmacopolas præterea,
quod eorum errata sæpe ac sæpius improbauerim) vt vulgaribus ac rusticis, necnon & quandoque nobilibus, innumera
propinentur pharmaca aluum ducentia, quæ plerumq; sumentes in magnum discrimen ducunt, quoniam nec medicamenta
ponderant, nec infrenata exhibent, nec ad agrotantium temperaturam, atatem, sexum consuetudinemq; respiciunt. Quo
fit, vt agrotantes, qui in eorum manus incidunt, præcipuè q; qui natura sunt imbecilles, magnis nonnunquam afficiantur
incommodis, quibus nisi periti proprijs succurrerent remedijs, facile interirent. Albi itaq; Veratri potionem, aut
Thapsia, aut Elaterij aut Agarici nigri, aut Cyclamini sequuntur vomitus, ingentia alui profuuita, intestinorum ter-
mina, strangulationes & respirationis angustia: quibus dehinc tanta succedit principum facultatum imbecillitas, vt
paruo temporis momento acri animi deliquio corripiantur, grauius spirent, & frigido sudore madescant. Postremò, ni-
si citius succurratur, oborto singultu, illico vel suffocati, vel conuulsi intereunt. His primùm auxiliantur vomitiones
(vt multoties diximus) crebro concitata, & infusa clysmata, quorum sæpissime superius meminimus. Post hæc reme-
dio sunt antidota, quæ in vniuersum omnibus aduersantur venenis, præsertimq; Theriaca, cui (vt Galenus pluribus in
locis testatur) vis peculiaris inest, modò adulterio vacet, vt sumpta post medicamenta deiectoria, aded eorum superet
vires, vt nihil per aluum exigant. Cæterum priuatim Albo veratro confert aqua multa largius sumpta, & nymphæa flo-
res duarum drachmarum pondere poti vel deuorati, traduntq; hæc propria albi veratri esse antidota. Cyclamino deinde
conducunt lauri bacca, duarum drachmarum pondere, sed propria facultate nigrum piper in puluerem contritum, &
eodem pondere potum. Elaterio præterea opem fert Andromachi theriaca ex baccarum Lauri decocto, aut melle pota se-
num scrupulorum pondere: verum proprium eius remedium est mentha succus. Thapsia denique & nigri agarici no-
xat.

Albi veratri,
aliorumque
noxa & au-
xilia.

Cyclamini
auxilia.

Elaterij au-
xilia.

x. tollitur ijs medicamentis, quibus albo veratro subuenimus, cum eadem sint huius, quae illorum incommoda. Fiunt quoque
 NIGRO veratro (vt scribit Auicenna) interdum horrenda symptomata, nempe intolerabiles alui fluxiones, suffocatio-
 nes, conuulsiones, animi deliquia, palpitatio cordis, linguae arfactio, dentium constrictio, frequentissimi ruelus, & vniuer-
 sicorporis inflammatio: & nisi illico succurratur, tremor consequitur, vniuersum occupans corpus, cum quo postremo com-
 moriuntur agri. His auxilium praestat absinthium ex vino potum: quin & cumini & anisi semen, nardus, cistoreumq;
 aequis ponderibus in puluerem contrita & ex vino pota appositis, vbi intumuerit venter, linteolis igne calefactis, itemq;
 facculus flatus discutientibus. Cibandi autem sunt agri recenti caseo, melle, butyro tam crudo quam cocto, pingutum car-
 num iuribus, ac etiam passo. Sed non propterea parcendum fuerit antidotis in vniuersum iuuantibus, nec etiam nymphae
 floribus, vt pote qui non modo albo veratri vires demoliantur, sed etiam nigri. Porro EUPHORBIVM fauces, & guttur
 vehementi admodum incendio vexat. Corpus vniuersum inflamat, ventriculum & intestina magno dolore erodit,
 singultum excitat, & continuas alui fluxiones. Quae itidem omnia mala inducant TURPETVM, Scammonium,
 Colocynthidis, Bryonia, Tithymali omnes, Lathyrus & Ricinus. Quamquam non tam acriter nocent, veluti euphorbium.
 A THYMELAEA autē, & Chamelaea pituitosa spumantesq; excitantur vomitiones, alui profluvia, intolerabiles inte-
 stinorum, & ventriculi erosiones, angustiae, inflammationes, & vniuersi corporum cruciatus: quin & sitis implacabilis, sin-
 gultus, conuulsio, praepedita locutio, & alia saeva accidentia, quae quandoq; ea excedunt, quae ab epoto euphorbio proueni-
 unt. His omnibus in vniuersum primum opitulatur vomitiones & clysmata, seruat a vniuersali methodo, ac etiam com-
 munitis vsus antidota. Priuatim vero prouent oleosa ac pingua: item quae valenter sunt frigida, vt haec ingentem feruorem
 extinguunt, illa vero vt exuperantem acrimoniam obtundant. Proinde praetulit Auicenna acidum lac, capburum ex ro-
 sacca aqua potum, puniceorum auferorum vinum, anguria, cucumeris, cucurbitae, & acidorum malorum succum: item
 hordei ptisanam niue, vel glacie refrigeratam. Sed proprium (vt aiunt) euphorby antidotum est citri semen ex vino, in
 quo helony radix inferbuerit potum. Scammonij vero lac, a quo deceptum fuerit butyrum, malorum cotoneorum, rhois
 rithij, succus. Colocynthidis deinde antidotum fuerit sanē bubulum lac, & butyrum recens, Lemnia sphragis & smara-
 gda puluis, pluries pota. Turpei praeterea & Tithymalorum omnium, Andromachi theriaca ex vino pota, in quo Creten-
 se dictamum incoctum fuerit: item munitia sepulchrorum in puluerem ex vino meraco pota drachmae ponere. Bryonia
 porro, theriaca ex vino hausta, in quo helonium conferbuerit, itemq; nigrum piper contritum. Lathyrus ad haec, & Ricini
 proprium antidotum est hyperici succus, aut herba ipsa in puluerem pota. Thymelaea deniq; & Chamelaea rosaceum sera-
 pium, ex hordei ptisana potum, & subinde origanum Cretense igni tostum. Sed haec omnia praestant tantum ad supradic-
 torum medicamentorum vim deleteriam superandam. Ceterum cum plerumq; eueniat, vt haec, quae modum excedunt
 medicamentis, varia ac diuersa adserant incommoda, quae etiam ob sui repentinam vehementiam praesentanea exposcunt
 remedia, nempe continentes vomitus, perpetua alui profluvia tam ceterorum humorum, quam puri sanguinis, cum va-
 sorum oscula veneni vi referantur, conuulsiones, praefocationes, animi deliquium, & vitium omnium imbecillitatem, id-
 circo non modo attendendum fuerit, vt medicamenti vis antidotis superetur, sed etiam vt ipsis grauius symptomatis o-
 mni diligentia succurratur. Quandoquidem haec saepius tanti sunt ponderis, vt maiorem celeremq; expetant coniu-
 rationem, quam cetera. Inhibentur itaq; vomitus modum excedentes (si tamen medicamentum cum humoribus reiectum
 sit) adstringentibus medicamentis, quae ventriculum roborant, exterius praesertim illitis, quin & vinculis ac fibulis, ex-
 tremis membris obtortis. Faciunt ad hoc in corpus sumpta flaua myrobalana, tam sicca, quam saccharo asseruata: item
 nuces cum putaminibus saccharo similiter condita, diacytonites, saccharum rosaceum diutius inueteratum, addita Lem-
 nia sphragide: praeterea cydoniorum & puniceorum malorum vinum, syluestrium prunorum succus, myrti bacca, rhus, ro-
 sa sicca, syluestrium rosarum semen, cornu ceruinum combustum, santala, corallia, omphacium, acetum, & id genus alia.
 Sed eorum quae exterius illita prouent, haec sese offerunt, Indica videlicet & Celtica nardus, mentha, glandes, lentisina re-
 sina, rhus, flaua myrobalana, myrti folia, rhus, malinum, nardum, lentisinum & myrtinum oleum. Nec tantum pol-
 lent haec ad vomitiones compefcendas, sed etiam pari facultate valent ad sistendas alui fluxiones, quae modum excedant:
 verum ijs vniuersa alius est illuenda, ab ipso ventriculi ore ad pubem vsq;. Praestat brachia ab scapulis ad manus, &
 crura à coxendicis articulo ad pedes vsq; fascijs constringere, offusis subinde austeris plantarum succis. Confert item sudoris
 excitatio, aut detentis agris in calido cubili, aut laconicis arto calefactis, in quibus egros caput emittere oportet, aut bra-
 chijs & cruribus, in calida balneo demersis. Ab his dare conuenit, quae adstringunt & roborant. Principes in vniuersum
 facultates roborant odorata medicamentis, cuiusmodi sunt rosa sicca, caphura, garyophylla, agallochum, styrax, laferpici
 lacryma, iuniperi bacca, santala omnia, & id genus plura. Praetulit in huiusmodi alui fluxionibus Auicenna nastur-
 tij semen tostum, trium drachmarum pondere, ac subinde in lacte decoctum, quousque lac concreuerit, & postremo po-
 tum. Si vero haec non profuerint, soporiferus vii licebit, nimirum Phislonis medicamento, athanasa, requie, & alijs qui-
 buscunque quae opium aut meconium exceperint. Nam etsi haec quoq; noxa haud vacent, tantum tamen adserunt iu-
 uamenti (si tamen recta ratione exhibeantur) vt ijs tuto in tam magno discrimine Medici vri possint. In summa si opti-
 mam haberemus Theriacam, quae ex adulterinis & suppositiis non esset confecta medicamentis, omnibus praepone-
 re: vt
 antidotis in superanda vi medicamentorum aluum ducentium. Siquidem testatur Galenus (vt paulo superius diximus) Theriac
 pluribus in locis, suis in libris de Theriaca ad Pisonem & Pamphilianum, illud optima Theriaca indicium esse, vt a pra-
 sumpto deiectionis pharmaco pota humorum deiectionem impediatur, citra vllam agrotantium noxam. Id quod nobis expe-
 rientia compertum est praestari ab antidoto nostro, cuius descriptionem tradidimus in praefationis huius libri commenta-
 rio. Prodest non parum praeter haec vomitionibus, & fluxionibus praedictis etiam victus regimen ex adstringentibus & au-
 steris institutum, quae deinde niue vel glacie refrigerari conuenit, aut in altum aqua puteum sune suspendi. Adiuuantur
 conuulsiones, quae ab ingentibus laboriosisq; alui profluuijs eueniunt, ijs duntaxat cibis, quibus ad refocillanda exinanita
 corpora viresq; roborandas vtuntur Medici. Quo in negotio praesertim humanum lac ab ipsis exuctum vberibus: quin &
 dulcium amygdalarum cremor, & earum pariter oleum, ciborum condimentis admissum. Prouent & nuclei pinci, pistia-
 cia, Indica nuces, & melopeponum semen, omnia in mortario contusa, & caporum iure colliquata, addito candidiori sac-
 charo. Opem similiter fert caporum, & phasianorum exenteratorum carnum eliquatus saccus, carnis ipsis tenuiter
 incisis, vitreo vase conclusis, & in aqua balneum eodem in vase decoctis, quousque vniuersus ab his exudauerit succus: u-
 namque frequenter potus coctlearis mensura (vt libello de viribus cordis prodidit Auicenna) magis succurrit in becilli-
 tati cordis, quam alius quouis cibis. Conducunt praeterea recensium ouorum vitelli carnum iuribus admixti, & saccharo
 respersi: insuper caporum, phasianorum, perdicum & attagenarum pulpa in mortario contusa & iure & saccharo tem-
 perata. Praefocationibus porro subuenimus ijs factum tum auxilijs, tam medicamentis, quorum superius mentionem
 fecimus

Nigri veratelli
noxa & cura.

Euphorbii,
Turpeti &
Thymelae
venenata po-
tio.

Euphorbii &
alorum o-
mnium curatio

Remedia ad
varia sympto-
mata.

Theriac
pura & indi-
cium.

Remedia ad
conuulsiones
ex alui pro-
fluuijs.

fecimus cum de mortiferis fungis differeremus. Caterum meminit hoc capite Dioscorides præter prædicta, melanthij, sive feris rata, & earum plantarum lanuginis, quæ in aculeatarum genere quibusdam cacti vocantur. Quorum omnium historias & facultates superius proprijs locis tradidimus, quæ tamen non semper nocent. At si noceant, curantur excitatis vomitionibus, ebibito prius maluæ decocto, aut lacte, aut recenti crudo butyro. Post quæ proficiunt pinguia iura, & cætera, quæ aluum emolliunt. Dent igitur operam, diligenterq; animaduertant seplasiarj probi ac fideles, ne in ponderandis hisce medicamentis, aut manu aut oculis imprudenter decipiantur. Quinetiam eos admonitos velim, vt imperitos ac temerarios circumforaneos à pharmacopolijs suis excludant, reprehendant, & missos faciant: ac si opus fuerit, protomedicis & rectoribus ciuitatum eos denuncient, ne miselli agrotantes, sub publica omnium fide ab hoc improbo ac pessimo hominum genere perdantur, atq; in perniciem agantur.

Ὁ νεῖα ἡμῶν.

DOMESTICA NOBIS.

CAP. XXXIIII.

Aqua frigida abunde pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus, & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus & vacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sunt. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus vtimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione superfedemus.

Rerum domesticarum noxa.

Carnium noxa.

Oua barbi piscis.

Piscium & carnum noxa remedia.

Non modò aqua frigida, & vinum meracum, aut passum, inter ea, quæ nobis domestica sunt, & quotidiano vsu alimentum præbent in humana vitæ subsidium, eo modo pota, quo Dioscorides scribit, maxima adferunt discrimina, sed etiam carnes & pisces. Etenim hæc vtraq; cocta, & adhuc feruentia humidus locis diutius asseruata, subindeq; frigida deuorata, eosdem malos pariunt effectus, quos à maleficis fungis creari tradidimus: tametsi quandoque non nisi duobus, aut tribus post diebus appareat noxa. Tostæ præterea carnes, venenatorum subeunt naturam, si calida inter duas suffocentur patinas, obuoluanturq; linteis, ne exhalare possint. Eadem etiamnum mala inferunt morticina carnes estata, quemadmodum & ea, quarum animalia aut à venenatis serpentibus, aut à rabidis brutis demorsa, aut fulmine icta interiere. Quandoquidem sæpius harum esu colicæ inflammatio, mæror, alui profluuium, furor, obliuio, veteris morbus, & ad postremum mors insequitur. Quæ mobrem hæc sanè negligenda non sunt, quin potius summa cura vitanda: quippe aliquos noui, qui his deuoratis nullo medicamento adiuti, intumescere inde toto corpore, tandem vitam miserè finiuerunt. Nec minus euitare oportet oua barbi piscis, nam ad eò venenata sunt, vt si largius sumantur, eos qui hauserint, in magnum periculum adducant. Piscium curatio eadem est, quæ fungorum: quanquam non existimat Conciliator, vt piscibus sicut mortiferis fungis conueniant syluestria pyra. Carnium verò suffocatarum malis succurritur excitatis prius vomitionibus, & infusis clysteribus: mox vini optimi & odorati potu, admisto cydoniorum malorum succo. Præstat à vomitu Lemniam sþragidem bibere, vnà cum agallocho, & mastiche: quamuis eadem sit harum cura, quæ colicæ affectibus adhibetur.

De venenatis animalibus.

Το βλάζα

VENENATA.

CAP. XXXV.

DEBESTIIS, quæ virus eiaculantur, & exitalibus venenis, ideo scribere aggredimur, vt tota curationis remediorumq; ratio ad vmbilicum perducatur. Siquidem pars hæc non minus quàm cæteræ aliæ, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, vt pote cum admiculo eorum, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris, virus inspicientibus sermo disserit, theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs, alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ non nihil auxilijs ferunt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere artificem oportet, propter vrgentem sæpenumero necessitatem. Siquidem pauca è venenis & virulentis animalibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita vt dilationem admittant: pleraq; verò præsentaneam perniciem afferunt. Hominum autem partim malè alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita temperant, vt spatium curanti liberum non relinquunt: partim sceleris admissi conscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hauisto sponte veneno, mortem sibi consciscere conantur: qui postea deprehensi aut resipientes, & vitæ cupidi, præsentaneam opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes, certam & inuitabilem aduersarijs perniciem moliantur. In quibus ipsis etsi maleficium non subito, sed aliquantò post grassari natura sua comparatum est, tamen nisi primo quoq; tempore coerceatur, & remedijs subinde excipiatur, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitali vi veneni. Proinde non vulgari industria diligentiaq; in ea re vtendum est, vt quod in alijs incommodis ars consueuit, in his quoq; salutem mortalibus præbeat. Quin & apud priscos genus hoc vnum existimabatur esse eius partis, quæ medicamētis pugnat: sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes præcautionem, & modum præcauentem, salubris sanantisq; medium statuantes, parua & leui supra modum persuasione decepti. Siquidem tres in humanis corporibus constitutiones esse contendunt: vnã, quam sani degimus: alteram, qua sinistra valetudine corpora laborant: tertiam, quæ medium inter vtrasque locum sibi vendicat. In qua positi, sanitatem specie mentuntur, facileq; in morbos & pericula concidunt, ob vim corruptricem, quæ corporibus nostris incumbit: quemadmodum in ijs videre licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent

horrent: in ijs quoq; qui cantharidas hauserunt, sed nondum vrinae tormento cruciantur. Tripartitò igitur artem digeri, tripliciq; corporis constitutioni meritò respondere tradunt. Salubrem partem esse volunt, quæ sanitatem tuetur: præcauentem, eandemq; prohibentem, quæ obstat, quò minus in morbos incidant: & sanantem, qua vitia discutiuntur. Quibus ita responderi potest, quòd primùm ex ista ratiocinatione non tres corporis tantùm, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset: quippe ut aliqui sint, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maxime ob impendentē causam sũnt obnoxij: ita sũnt quoniam priore morbo defuncti, nondum tamen secundæ valetudini restituti sũnt: id quòd in ijs qui à morbo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui virium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est.

10 Ad arcendas enim valetudines vehementibus vtimur auxilijs, altiore scarificatu, vltionibus, amputatione derodontibus epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisq; alijs. Verùm enim uerò sunt vsq; eò rudes nonnulli, vt ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliarem remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cæli statu morbo nondum correpti sũnt, pesti tamen, propter obuersantem aëris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, vt inoffensa valetudine degant, nec morbis conflantur. Neque id silentio prætereundum, quòd maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, vt suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à virulentis animalibus venenisq; contrahuntur, vocari cæcos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causa: quapropter quaestionibus obseruatione artis, & eius qua ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; prorsus verum deprehenditur, affectus huiusmodi cæcos esse: nam quòd semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs vsum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cæcos eos affectus concedimus, qui ab exitalibus venenis & animantibus, quæ virulento morfu læuiunt, contrahuntur. Nam quòd ad opus nonnullum vsum præbet, datq; medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nullivæ causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis

20 impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sũnt, quàm vt sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plistarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad verbum ita scribens. Nolle quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, vt quamuis exiguo sint corpore, vixq; conspectui subijciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem, vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim moles corporis est, quæ à scorpis ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morfu conficiunt attingitur? quorum aliqua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneam pernicipem moliantur. Aut quantulum est quòd à phalangij morfu ingeritur, & vniuersum corpus excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole consistent. Ergo quòd hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verùm quòd exactè deprehensum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus, molestiarum, quæ exoriantur, nobis causa sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur vsque ad contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quam à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat, quòd inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quæ nam res opus hoc efficiat, vt nihil prorsus nos lædat, incomprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo, quem de canis scripsit, commentario aptissimè prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, vt in venenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus trita medendi ratione contentos esse: neq; satis facturam sibi obseruationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est: primùm enim genere comprehendere facile possunt. Quòd autem sit lethifera vis, corporaq; permutans, ita vt perimatur, ex ijs quæ per genus, non per speciem vagantur, curatione indicat, qua hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiungit. Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis, & ante obseruationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem, ad demorsæ partis suctum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, vtentia medicamenta, aut ea quæ vim eandem adipiscuntur, admouit, postremò partem amputauit: sed cum reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre, & applicari solita, immissa ad intima pernicipi repugnarent. Hæc itaq; quæ dixerunt Erasistratus, veritati consentanea sũnt, nec arti resagantur.

30 Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus illapsam, negociorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur: verum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis *θηροποιός*, id est mortifera, nominatur: *θηροποιός* autem nullius officij alius esse potest, quàm causæ. Aiunt hæc nomina, *μάστιπτος*, & *ἀνακαλύπειν*, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nuda enunciatione comprehenduntur. Enimvero quemadmodum in his vocibus *μάστιπτος*, & *ἀνακαλύπειν*, partes neq; certos, neq; principes retinent significatus: sic in hoc verbo *θηροποιός*, partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transcunt, affirmantq; causarum aliquas euidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem creant, separantur: cuiusmodi sũnt frigus, labor, ætus, & similia, quædam continentes, quæ permanent, postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus præsentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, affectus augentur: decre-

scunt.

scientibus, minuuntur: & cum desinunt, iisdem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniã morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adlit: quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt demorfi. Quod si neq; evidens causa, neq; continens fuerit, neq; per se, neq; alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neq; causam esse fateamur. Quod autem asserunt, vocabula quaedam in se non habere partes rerum significatrices, sed nuda & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed per pauca talem nunciandi conditionem existimandum est: neq; enim *καίεν* in hoc nomine *φθοροπœον*, perinde atq; assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim *φθορὰς*, id est corruptio- nis nomen, mutationem in peius significat: sic hoc verbum *καίεν* sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem *φθορὰς* secum habeat, declaret: neq; prorsus id significat, quod omnes palam audiunt, & huic simile redditur, *καίεν* *καίεν* *καίεν*. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utiq; vim in huiusmodi verbo *καίεν* subesse: siquidem aliquid est, quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subijciuntur, idq; tam in lethalibus venenis quam in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verum non nihil subiacere causarum differentijs produunt. Quintetiam aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui verò se dogmaticos profitentur, causam esse partim preparantem, partim continentem asserunt, ut inguinum vlcus, & inguinariam febrem, & quæ effectui tum assistat, tum etiam separetur, ut à fractis præcipitatio. In summa quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur, vitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropœon causa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quæ contingunt, apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quam ex animante vim, & illapsum in corpora virus? Neq; enim frigus, neq; æstu, neq; sectionem corporis, neq; cruditatem, neq; aliud quicquam simile causari possunt. Verum quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroq; istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem verò quod morbis præsentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hætenus. Statuendum itaq; mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, varijs modis est certandum, de nec vis tota corporibus excutiat. Modò enim reuocari debet ea parte, qua pestis intrauerit: modò alia qua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coerceatur, quam altius irrepens viscera tangat: aut eius pernicies eluatur retundaturq; cum iam membratim peruagatura est. Itaq; venena si hausta sint, crebris vomitionibus: si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptio, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. Retinentur verò infusione, & imposito medicamentorum acrium cohibentur: hæc simul utiq; arcere virus & eluere possunt. Restinguuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Pestremò deiectio alui, euocatus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim uero non lethiferam modò materiam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet: etenim ab ijs remedia quam plurimum discriminè capessunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minantur: alia putredines altas, aut exterioribus excitant: alia vehementissimos dolores, aut cæcos cient: alia vix medicamentis cedunt, & magis minusve molestias excitant. Oportet autem ea quæ pericula ferunt, perucacioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus verò, vehementium auxiliorum iniuria corpus laceßere. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula, & præsentibus molestias adducit: illud verò sensim, & dilatans in diem longam, aut breuiorem producit. Itaq; in acutis quidem confestim multa simul auxilia repræsentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quadam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.

Ratio tractatus de virulentis animalibus. **C**um hætenus tradiderit Dioscorides de his priuatim venenis, quæ epota aut in cibis sumpta, corpora nostra permittant, corrumpunt, destruunt, & deniq; in perniciem agunt, ut hac in re nihil amplius desiderari posset, statuit deinceps de his etiam sibi esse differendum, quæ virulenta animalia ictu, vel morsu relinquunt. Quod utiq; probè sciret, hæc non minora, quam illa repræsentare discrimina, immo etiam maiora: quandoquidem eueniant hæc ex tempore, & præter opinionem, plerumq; in campestribus & montibus, vbi nullum auxilium, nullaq; vel rara remedia. Quamobrem de his non minus diligenter differuit, quam de alijs quæ corporibus ingeruntur, argumento satis manifesto, quod vniuersalia horum remedia non vna tantum præfatione, sed pluribus scriptitauerit. Quod cum animaduertent recentiorum quidam, hæc dubie existimarunt hoc sextum volumen in quatuor libros esse diuidendum, nempe in sextum, septimum, octauum & nonum. Veruntamen q; mihi non rectè (pace semper eruditorum dixerim) ea expendisse videntur, quæ in huiusmodi libri præfationis initio a Dioscoride scribuntur: is enim apertissimè hunc sextum librum totius operis vltimum declarauit. Quapropter ipse Dioscoridem si cutis relictis aliorum opinionibus, asserere non dubitauerim, hunc vniuersum de venenis & venenatis animalibus tractatum, vnum tantum, non plures esse libros: tametsi pro cuiusq; arbitrio in plures sectiones diuidi possit. Quarum prima ijs dari poterit, quæ ore sumuntur in corpus: secunda canis rabidi morsibus: tertia indicijs ac symptomatibus, quæ à venenatis morsibus oriuntur: postrema verò eorum curationi. Verum enim uero cum hæc diuinitus exanauerim, ut Dioscoridis doctrina ad maius omnium commodum in vnum congeratur, & ne tot huius libri fiant sectiones, venenosorum animalium tum indicia, tum accidentia, quæ proprijs capitibus tradidit Dioscorides, ijs coniungimus, quibus ipse egit de eorundem curatione & remedijs, ut vnusquisq; iunctim nulla temporis iactura, vno tantum capite indicia, & curationem consequantur. Quod & ipse fecit Dioscorides, vbi superius de venenis differuit, quæ in corpus sumuntur. Ibi enim indicia à curationibus non disiunxit. Nam si in vno tractatu indicia, in altero verò curationes quarantur, maius temporis dispendium fiet, maiorq; menti molestia inferetur, quam si hæc omnia in vnum redacta legentibus

gentibus sese offerant. Neque hoc nobis vitio adscribendum esse putamus, quando res eò magis placere soleant, quò commodius fieri possunt, cum præterea illud (ut aiunt) frustra fiat per plura, quod fieri potest per pauciora. Neque etiam ob id quis calumniari poterit, quòd Dioscoridis codicem aliqua ex parte deprauauerim, quod nusquam à me deprauatum, sed tantum in meliorem formam, & ad priorem authoris doctrinam ipsum redactum, & restitutum putem. Porro non aliud super hac præfatione nobis dicendum videtur (quæ multis intellectu difficilior extitit, ut Marcellus ipse fatetur, quòd fortasse Dialecticam ignorauerit) nisi quòd aliud sanè hac præfatio non sit, quam Dioscoridæ Aristotelem secuti disceptatio, aduersus eos omnes, qui superfuerunt in medica facultate, super nuda ac simplici vocabulorum interpretati-
 10 nis vocabulorum distractio, potius ad Sophistas, & nugatores attinet, quam ad expertos, & probatos Medicos, ut facile
 videre est in pluribus irreprehensibilibus vocabulorum exemplis, ex pluribus vocabulis compositorum, quæ in libro τῆς ἐπιεικείας ab Aristotele assignantur. Quippe quoniam nouerat ipse Dioscorides, quòd tam methodicorum, quam dogmaticorum quidam in ipsis compositis vocabulis declarandis expertorum, exercitatorumq; Medicorum sententiam, proprijs vocabulis denominatam, haudquaquam secuti fuerant. Ceterum & eos non parum reprehendit, qui absque aliquo Dialectica fundamento, diuisiones in causis facere audent: nam cum in diuisionibus errorem committant, in q; quoque quæ sequuntur, errent necesse est. Proinde qui hac latus vberiusq; noscere cupiunt, Aristotelem consulant libro secundo physicorum: illis siquidem inibi amplissime satisfiet. Potuissemus quidem & nos rem hanc pluribus prosequi, sed cum nostrum institutum non sit, nunc in aliam materiam digredi, hac silentio prætereunda duximus.

Dioscorides Aristotelem secutus.

Σημεία κυνός λυσσώντος καὶ τῶν ὑπ' αὐτῷ διδωμένων. **SIGNA RABIOSI CANIS,**
 ET DEMORSORVM AB EO. **CAP. XXXVI.**

DE rabiosi canis morfu sermonem alijs præposuimus, quòd id animal domesticum ac frequens esse confuevit, & in rabiem sæpius agitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile, inde periculum ineuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantissimis æstibus in rabiem effertur, interdum quoties frigora incesserunt. Rabiosus autem potum & escam auersatur: largam ipumantemquæ pituitam naribus, & ore proicit: toræ & solito tristius intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, & æquè feras hominesque, tam familiares, quam ignotos mordet: nec protinus infestum quicquam infligit, nisi, ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus Graia est voce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum distentione neruorum, totiusque corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore, & languore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiunt: alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam qui canum more latratus edant, & obuiani factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili vitio labefactant. Proinde ex ijs qui hoc vitium senserint, neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex historia vnum aut alterum euasisse audiamus: siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos anteaquam ipsum experirentur, vindicauimus, & complures ab alijs medicis
 30 seruatos nouimus.

CANIS RABIOSVS.



Nullum in vniuersum animal homini tam domesticum familiareq; reperitur, nullumq; quod tam multiplici, varioq; genere constet, quam canis. Hinc est, quòd viti, mulieres, ac pueri q; magis delectantur, quam cæteris animalibus, quæ in domibus nostris aluntur, tanta quidem intercedit canibus cum homine societas. Qui tamen in rabi-
 60 acti, quos momorderint, in maximum discrimen plerunq; deducunt. Cum itaq; canes à continuo hominum consortio nunquam absint, qui propterea illorum morfib; magis subiacent, quam cæterorum, quæ morfu pariter, vel idu venenum eiaculantur, ideo merito quidem de his prius, quam de reliquis bestijs venenatis tradidit Dioscorides. Ceterum
 quamquam ipse causas non scribit, cur magis æstate Canicula ardoribus, itidem hyeme frigidibus vehementissimis in rabiem aguntur, quam reliquis anni temporibus, cum tamen palam sit, canum rabiem non aliunde prouenire quam ab atrabiliarijs excrementis, facile cognosci potest, id æstate euenire perusto à caleribus eorum sanguine, hyeme vero
 65 frigidibus concreto. Rabids canis indicia describit Galenus libro de Theriaca ad Pisonem (si tamen liber is Galeni legitimus est) his verbis. Si audieris canem, qui aliquem momorderit, gracilem corpore & sicum, oculis

Canis rabiosi venetica natura.

Canum rabi- es vnde.

oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, praeterea lingua foras porrecta, & tanquam bile colorata obuiam
 quenquam insiliisse, citraque rationem cucurrisse, deinde rursus subito consistentem cum ira quadam magis furenti non ipsi
 praeuisos momordisse, hac inquam si in eo sic habere audieris, statim rabiosum canem fuisse intelligas: hac ille. Incedit pre-
 terea (vt quidam asserunt) lento gradu, demissis auribus, abscessa voce, stupido capite, & obuios non modo homines nullo
 delectu, sed & bestias demordent. Nec mirum si proprium mordeant dominum, aliosque domesticos omnes, nullius habito
 discrimine, vel ratione: siquidem cum proprium atra bilis sit sensus omnes inficere, omnium, & sui ipsius obliti, domesticos
 ipsos cognoscere nequeunt. Id quod etiam pluribus hominibus accidit, qui melancholici affecti, non modo patrem, matrem
 uxorem, & proprios filios, sed etiam se ipsos quandoque occiderunt. Verum enimvero non tantum aestiuis caloribus, & hye-
 mis frigore canes in rabiem aguntur, sed etiam morticinorum, putridarum, vermibusque scatentium carni-
 marcescentis earum sanguinis. Quod si fuerint haec carnes eorum animalium, qua pestilentia, aut ictu fulminis, aut vene-
 nosorum morsibus interierint, ed facilius maiori-
 que afficiuntur rabie. Quae etiam excitari solet computrescentibus aquis se-
 quentius obibitis, quod haec omnia atrabiliaris succos augeant, & putredine corrumpant. Eo-
 que magis his de causis in rabiem
 aguntur, quanto alter altero super natura magis atrabili obnoxius fuerit. Aduertant praeterea nobiles mulieres, ne suis
 catellis, quos in deliciis habent, & quibus maxime oblectantur, cibum vel iusculum edendum praebeant, quibus aromata,
 praesertim j. piper & ginger, fuerint admista. Quippe cum haec caliditatis siccitatisque modum excedant, eadem ratione,
 qua ingens aestatis feruor, canes rabidos efficiunt. Caueant ideo, eas libenter moneo, ne ipsis forte fortuna id mali accidat,
 quod Tridenti euenisse scimus clarissimo Baldo vtriusque legis doctore. Is siquidem inter ludendum cum quodam suo catello
 iam rabie affecto, leuiter in inferiori labio demorsus fuit. Sed ipse huius rei ignarus quarto post mense rabidus factus, &
 tandem hydrophobicus miserabiliter mortem obiit, nullo adiutus medicamento. Ad haec sciendum est, quod non canes tan-
 tum (quanquam ij magis, quam cetera animalia in rabiem aguntur) rabidi fiunt, sed etiam alia pleraque animalia, nempe
 vulpes, mustela, viuerra, martes, simia, & id genus alia. Quapropter nesciuerim, quo argumento dixerit Galenus libro 6.
 de locis affectis, solum canem inter cetera animalia corripit rabie: nisi voluerit dicere (vt equidem reor) canes ceteris ani-
 malibus rabie magis esse obnoxios. Refert Aristoteles libro 8. de historia animalium, camelos etiam, & equos in rabiem
 agi. Id quod ego quoque asserere possum: etenim memini, cum ruri degerem, me vidisse equum rabie furentem, qui fracto
 capistro obuiam quandam vetulam per capitis & crinium vittam morsu comprehensam, decem pluresque passus a terra sus-
 pensam pertulit, nullo tamen vulnere illato, sed magno sane terrore. Hoc affectu capiuntur (vt Auicenna est auctor) etiam
 muli, qui suis aliquando morsibus dominos, & stabularios rabidos, & veluti arreptitios reddiderunt. Verum huiusmodi a-
 nimalia non nisi raro, vel nunquam per se rabie tentantur, quandoquidem ferè semper id illis eueniat, cum à canibus, seu
 lupis, aut vulpibus rabidis mordetur. Ceterum (vt ipse Dioscorid. inquit) rabiosorum canum morsus infestum quicquam pro-
 tinus non infligit, nisi, vt vulnus, dolorem. Sed neglecta curatione, demorsi aliquo post tempore rabidi fiunt, & aquam ex-
 p. uescunt: quod etiam fatetur Galenus libro de theriaca ad Pisonem, aliosque in locis. Idcirco diligenter aduertant, quia ca-
 nibus mordentur, si aliqua sese offerant indicia, quibus conici possit, canem, qui momorderit, rabie laborasse. Siquidem
 neglectis remediis (vt modo diximus) in id discriminis demorsi adducuntur, vt nullus subinde relinquatur salutis locus.
 Tradidere Oribasius, Paulus, Aetius, Auicenna, aliosque probatissimi auctores, quod illius per integram noctem contritus in-
 glandibus canum morsibus, & postmodum gallis, aut gallinis in escam exhibitis, gallinaceos ipsos sequenti die interire, si à
 rabido cane illatum fuerit vulnus. Sunt etiam qui asserant, si panis emanante è vulnere sanguine inficiatur, & cuiuscumque
 cani quantumuis famelico offeratur, canem non modo illum non mandere, sed nec olfacere quidem. Attamen huic tantum
 experimentis (meo consilio) non planè fidendum fuerit: quanquam ea à probatissimis prodantur auctoribus, quapropter
 alia indicia iam dicta diligenter fuerint perquirenda. Cum autem rabidorum canum morsus negliguntur, post aliquod
 temporis spatium demorsi praeter morem cogitabundi fiunt, eaque mente reuoluunt, quae illis insuetas sunt, quod iam veneni
 vis in cerebrum repens imaginatricem occupet facultatem. Si verò adhuc in longum protrahuntur nullis remediis adiuti,
 ijs frequentius nocte interruptitur somnus, sapiusque pauore expergiscuntur: exinde hominum, & domesticorum consortia
 vitant, & cum serino quodam aspectu secum submurmurant: solitudinem deligunt, lucem & candida omnia odere maxi-
 mè, rubent quandoque facie, usque extremarum partium nerui conuelluntur: postremo eò deducuntur, vt aquam expan-
 scant. Quod certissimum mortis, & inexpugnabilis veneni praeber indicium. Proinde dicebat Dioscorides ex iis, qui hoc vi-
 tium senserint, neminem seruari posse. Allata itaque in eorum conspectu aqua, cuius potu facile sanarentur, si tamen bi-
 bere possent, ingentissimis clamoribus, & canum latratu astantes terrent. Quod si diutius ante eos aqua ipsa dimittatur,
 tremunt, sudant, deficiunt animo, delirant, pauoreque concutiuntur, ac si in ignem illico se proiciendos cernerent. Id verò
 accidit, quod melancholici effecti, corruptis insensibusque inde animalibus facultatibus, recusant miselli, metuuntque aquam,
 qua sola sanari possunt. Nec alia de causa id euenire censent medici, quam huiusce inexpugnabilis veneni prauitate. Nam
 cum humorum omnium, & totius corporis principalium facultatum, functionumque imperium venenum ipsum suscep-
 rit, cumque iam omnes corporis dispositiones sibi similes reddiderit, mouentur vniuersi corporis vites, irruuntque contra id,
 quod sibi contrarium existimant, hoc est, contra ipsam aquam, si ea in mediū afferatur. Quocirca Galenus libro de theria-
 ca ad Pisonem, ita scribit: Non enim corpus duntaxat ipsis inarescit, & conuellitur interdum, febrique acri intus vri-
 tur, sed animus etiam delirat, & grauissimum ipsis affert symptoma. Quippe aquam timent, ac propter multam siccit-
 atem humidi tenentur desiderio, & à potu abstinere, quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non confide-
 rant. Fugientes enim aquam pauentesque, miserrimo mortis genere intereunt: haec Galenus. Haec itaque rationabi-
 les sunt cause, quibus in aqua timorem deueniunt. Veruntamen quidam testantur, vt Aetius, Possidonius, & Rufus, id
 etiam accidere posse, quod rabidi canis imaginem videre in aquis imaginentur, cuius speciem recolentes, protinus ingenti
 terrore corripuntur, quod quidem nimiam ob siccitatem perpetiuntur. Nam philosophus quidam (vt Aetius refert) mor-
 sus à cane rabido, & egregia animi virtute affectioni resistens, dum phantastici canis imago sibi obuersaretur in balneo
 (ea enim ipsi quoque quemadmodum & reliquis eodem morbo affectis apparebat) diu intra se meditatus, ecquid tandem
 inquit commune est cani cum balneo? quod effatus balneum intravit, & imperterritus bibit, atque ita morbum supera-
 uit, & incolumis euasit. Vnde postea in proverbium manauit, quid cani cum balneo. Refert Auicenna quod si quis à cane
 rabido demorsus, aquam timentis in speculo respiciens, se ipsum cognouerit, huic salutis spem non deesse. Quod vtrique arguit
 hydrophobicos quoque sanari posse, cum veneni vis non adeò vniuersum occupauerit corpus, & cerebri facultatem
 vt omnino ratiocinatrix facultas ablata sit. Quamobrem mirum non est, si Philosophus ille, cuius historiam refert
 Aetius, curatus euaserit, cum manifestò appareat eius ratiocinatricem facultatem parum fuisse affectam. Ad haec scri-
 bit Auicenna euenire interdum, vt à cane rabido demorsi quidam frustra carnis ingenti cum dolore mungant, qua forma
 propri

Canes quibus
caulis rabie
exagitantur.

Baldus à ca-
ne morsus
interiit.

Animalia a-
lia rabie ten-
tantur.

Canis solus
rabie corripit-
tur Galeno.
Equi.

Muli.

Gallinacci.

Neglecti mor-
sus discrimi-
na, & cause.

Salutis indi-
cium.

A cane de-
morsus frustra
cardis min-
guunt.

prope canes paruulos referant: quod etiam ab aliis recentioribus accepimus, quin & ab iis, qui huiusmodi catulos se miu-
xisse fatentur. Caterum cum hoc potius fabulosum, quam rationi consentaneum videatur, atque ab ipsa natura penitus
alienum, si qui id verum esse rationibus & auctoritatibus comprobatum videre cupiunt, Gentilem Fulginatam consulant
Auicenna interpretem: item Conciliatorem differentia 179. Quandoquidem ex iis nimirum intelliget, quo pacto hac pra-
ter natura institutum quandoque eueniant. Postremo asserit in hoc capite Dioscorides, fateri aliquos Themisonem, cum a-
mico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia similem contraxisse affe-
ctum: Sed id potius ego euenisse crediderim, quod Themison medicus amicum laborantem excitandi causa ad aquam &
cibum, secum mādūcasset, aut bibisset, ex eodem sane poculo, eius fortasse salua infecto, aut alio quouis modo oris spumam
contigisse. Nam si, vt Galenus tradit libro 6. de locis affectus, rabidorum canum salua, nuda corporis membra contingens,
non aliter homines rabidos efficit, quam si demorderentur, quid mirum, si rabidi hominis salua id ipsum effecerit. Proinde
eos admonet Auicenna, qui rabidorum curam agunt, ne eorundem ciborum reliquias comedant. Nec paruipendat aliquis
spumae contactu infici posse homines: quippe quod duos viderim ego, qui spuma tantum persusi, nullo quidem ex morfu ac-
cepto vulnere, rabiem contraxerunt. Legitur in Aristotele lib. 8. cap. 22. de histor. animalium, quod omnia animalia, a ca-
ne rabido demorsa rabiunt, excepto homine. Quae tamen sententia aperte falsa deprehenditur, vt millies experimento com-
pertum est. Quamobrem potius adducor, vt credam Aristotelis codicem eo in loco deprauatum esse, quam vt in re clara, &
omnibus cognita ipsum Aristotelem ignorantia accusare velim.

Canum rabi-
dorum salua
inficit.

Hominem a
cane rabido
nō affici Arist.

Θεραπεία τῆς δόξης λυσσῶντος κυνὸς θυμάτω.

REMEDIA DEMORSORVM

A CANE RABIOSO.

CAP. XXXVII.

Ratio medendi duplex: vna communis, qua vtendum in omnes morfus, quos virulentæ animantes
impresferunt: alia peculiaris priuataque, eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint: quæ nō
nullis quidem summā opem ferre consuevit: alijs verò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum
acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus, deinde cursim perstringemus, quæ ad com-
munem medendi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmētis albæ vitis cremare oportet,
& cinerem eorum, quàm minutissimè tritum habere recōditum: itidem gentianæ radicem tusam, cribra-
tamque reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bi-
na cineris cancrorum cochlearia, vnumque gentianæ coniiciantur: hæc in polentæ dilutioris modum sub-
acta, quatruido bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morfu bini
ternive dies fluxerint, curationem auspiciabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus.
Optimum hoc aduersus rabiosorū morsus auxilium, quod & plerisque vnum satisfacit, eoque cum fiducia
vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilijs cōtra ineuirabile periculum muniamur, nihil cæteris vti prohibet.
Satius autem multò fuerit, etiam si in vanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus,
quàm per inertiam, ac desidiā in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulne-
ra vereri oportet, vti minora, & vlcusculi cutis similia: quippe maiori vulnere confertim copiosus sanguis
emanans, potest non nihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus
abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella
carnem amputare oportet. In vtrisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior
sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma aggluti-
nata idiua menti præstant, vt veneni vis extrahatur.

Tam accuratè exquisiteque, tradidit hoc capite Dioscorides rabidi canis curationem, nihil planè silentio præteriens, vt
mihi superuacuum esse videatur quicquam addere. Verum vt nostrum sequamur institutum, vtque etiamnum lectori-
bus fiat satis, qui nouis semper rebus inhiant, non alienum fuerit hic nonnulla commemorare, quæ multos fortasse delecta-
bunt, quod ea in hac re non inutilia, neque scitū iniucunda putem. In primis itaque illud animaduertendum est, quod alia
vtique ratione cancrorum fluuiatiliū cinerem præparabat Galenus, quàm Dioscorides, vt constat aperte ex verbis ipsius
Galeni lib. 11. simplicium medicamentorum, vbi ita scriptum reliquit. At fluuiatiliū cancrorum cinis, quanquam simili-
ter prædictis exiccatorius est, substantia tamen totius proprietate, mirifice contra rabiosorum morsus efficax est, isque
tū solus, tū cum gentiana & thure multò præstantior. Thuris sanè partem esse vnam oportet, quinque autem gentia-
nae, potè cancrorum decem: & raro equidem aliter illis vstis nos sumus vsi. Caterum ad eum modum plerumque, quo vte-
batur Aeschriō empiricus, medicamentorum peritissimus senex, concinuis ac præceptor meus. Patella erat eris rubri, in quam
impositos cancos viuentes, hæcenus vtebat, donec in cinerem redigerentur, vt faciliè ad leuorē redigi possent. Hic Aeschriō
sic paratum promptum semper in adibus habebat medicamen, tempore aestiuo vtens cancos ipsos post ortum canis, quando
Sol in Leonem transfisset, luna decima octaua. Potè bibendum hoc medicamen ijs, qui à cane rabido fuissent morfi, præbe-
bat quotidie vsque ad diem quadragesimum mensura cochlearij satis magni, aqua inspersum. At si non protinus ab initio,
verum aliquot post dies à morfu curam cœpisset demorsus, tūc quotidie duo cochlearia aqua inspergebat. Ad ipsum verò vul-
nus emplasticum applicabat medicamentum, quod ex pice brutia, & opopanace, acetoque conficitur, habens picis libram
vnam, vnum aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanacis verò vncias tres: hæc Galenus. Caterum sciendum est, eos ma-
ximè, meo iudicio, hallucinari (vt latius libro secundo prodidimus) qui gammaros Latinis vocatos, cancrorum fluuiati-
lium loco, à cane rabido demorsis potui exhibent. Namque aliud Græcis animal esse censemus κακίνορ, aliud verò ἀσάρορ
& καμμάριον. Scripsit & Democrates carminibus huiusce cancrorum antidoti componendi rationem (vt libro secundo
de Antidotis refert Galenus) eo sanè modo, quo ipsum fortasse secutus eam reddidit Dioscorides. Astamen antiquorum qui-
dam resinam terebinthinam imposuerunt thuris vice, quod Aeschriō Galeni præceptor huic semper inseruit medicamen-
to. In summa huius antidoti vires miris laudibus ab auctoribus celebrantur, adeò vt scripserit Galenus, neminem vnquam
mortuum esse, qui hoc antidoto rectè fuerit vsus. His non dissimiles vires veteres assignans Alysson, si siccum quadragesima
diebus continuis detur ex hydromelite potandum: sed à prima statim die incipiendum erit. Huius experimenti meminist
Galenus libro secundo de Antidotis, vbi alia quoque valentiora remedia ad rabidorum morsus ex Asclepiade retulit. Ve-
rū nobis difficile admodum fuerit discernere, quænam hodie planta sit, quæ veterum Alysson representet, ita vt potius de
hoc diuinandum esset, quàm aliquid certi statuendum, vt latius superius libro tertio disseruimus. Commendauit Actius
secundo.

Curatio de-
morforum à
cane rabioso.

Cineris can-
crorū fluua-
tili præpar.

Multorum
error.

Alysson con-
tra rabiem.

Curatio es-
secundo.

secundo, & sexto volumine, ad morsus rabidorum canum bitumen Iudaicum, siue Asphaltitis lacus, asserens si drachma pondere ex aqua bibatur, non id modo aqua pauorem arcere, sed & eos sanare, quos iam primum timor inuasit. Memorauit etiam marinos hippocampas ex aceto nigro & melle subactos, tam potu haustos, quam vulnere illitos. Confert praeterea his maxime acutus rumex: quare idem scripsit se nouisse senem quendam, qui demorsos à cane rabido hoc solo rumice curabat. Primum enim vlcus eius decocto fouebat: deinde herbam ipsam illinebat, eandemq; potandam exhibebat: quod quidem medicamentum tanquam efficacissimum summopere commendabat. Plurima autem, & turbulenta qui illa assumpserunt, mingere solent: id quod maxime hac in curatione confert. Quo fortasse argumeto extulit Auicenna propria quadam medicamenta, quae cantharidas admistas habent, vt valentissimè non modo vrinam excernerent demorsi, sed etiam sanguinem ipsum, asserens paulò post securum esse salutis indicium, cum post medicamenta sanguinem mingunt affecti. Porro Galenus libro de theriaca ad Pisonem, Theriacam praefert tam intus in corpus sumptam, quam exterius supra morsus illi- tam. Sed cum hac, quae nostro tempore conficitur, non adeò praestet, quemadmodum ea, quam ipse conficiebat Galenus, illi sanè fidere non possumus, nisi factò prius de ea periculo in gallis à vipera demorsis, vt ipse docet Galenus. Prodest item potamogetum cum sale exterius illitum: itidem caprifici cortex contusus, & ex aqua potus, quin & absinthium, & allium, minus centaorium, aristolochia, artemisia, scordium, chamaedrys, bryonia, pulegium, & laser, tam exterius illita, quam interius sumpta. Sunt qui credant securissimum esse remedium ipsius rabidi canis, qui momorderit, iecur tostum, & à demorsis in cibis deuoratum, quod etiam scribit Dioscorides: quamuis id non affirmauerit, vt libro secundo capite de diuersorum animalium iecinoribus legitur. Proinde scribit Gal. lib. 11. simpl. med. iecur canis rabientis alijs valentioribus antidotis admistum quam plurimos sanasse, sed eos tamen interiisse, qui solum nullis alijs adiectis medicamentis illud estarunt. Sunt etiamnum qui credant, vt loco antè citato tradit Dioscorides, arceri aqua pauores dente eo, qui caninus dicitur, si is à cane, qui momorderit, exemptus, & folliculo inditus, pro amuleto brachio adnectatur. Sed nemini his fidendum esse persuaserim vt in nostra huius sexti libri praefatione de pretiosorum lapillorum suspensione diximus: satius enim esse semper existimaui certis ac tutis vti medicamentis. Caterum curationis summa manuum maxime operam exposcit. Quandoquidem vulnus diducere oportet, laniatamq; per ambitum carnem rescindere: ita enim latior fit veneni exterius euocandi aditus, demittitur quod tabefactum est, & ex sanguinis fluore ab excidentibus cultus excitato, repens affectio non parum reuellit. Quod etiam facere expedit scalpello circumquaque profundius adacto, & subinde oppositis scalpello loco cucurbitulis sanguinem fortiter extrahentibus, aut hirudinibus. Medicamenta autem quae aluum citant, & humores deiciunt, in principio omnino vitanda sunt, sicuti etiam sanguinis missio: quippe cum hac à circumferentijs ad centrum trahendi facultatem habeat, facile egros in mortis traherent discrimen. Tamen si in curationis processu, & vbi praesertim medicorum negligentia citius quam expetatur ratio, conclusum fuerit vulnus, irreperitq; venenum (vt postea dicitur) medicamenta aluum ducentia, pariterq; sanguinis missio in sanguineis temperaturis admodum quandoque proficiant. Verum enimvero perpauci nostrae aetate habentur à rabioso cane demorsi, qui Medicos consulant. Nam tanta est religionis vis, vt omnes, quos canes rabiosi momorderint, partim ad diui Donini templum confugiant, partim verò ad ciui Bellini sacellum, vbi quibusdam exorcismis, & panibus characteribus obsignatis, à sacerdotibus perquam facile curantur, vt plurimorum testimonio equidem sciri possum. Sed cogitanti mihi quonam pacto hoc tam facile eueniat, nonnullae sese obtulerunt rationes, quas liberè dicere non dubie in primis diuina auxiliatur gratia: quippe cum non parum molestia maliq; morsu canis rabiosi affectus inferre possint cacodemonas, vt qui in atrabiliarijs humoribus suam habeant sedem, y quidem exorcismis cedentes abeunt, & afflictorum corpora munda relinquunt, sublato secum veneno. Illud praeterea addiderim, quod fortasse sacerdotes ipsi aliquod nobis occultum habent antidotum, quod panibus illis admiscentes, agris deuorandum praebent: vel id aliquo in potu bibendum exhibent. His denique accedit magna laborantium fides, quam suscipit Deus opt. max. cuius solius munere omnia nostra delentur incommoda, atque omnes auferuntur aegritudines.

Καὐσις τῆς ἀπὸ λυσσωτός κυνὸς δαγμάτων.

A CANE RABIOSO.

VSTIO DEMORSORVM
CAP. XXXVIII.

Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, vtpote cum ignis caetera viribus praestet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patitur: simul quod pars ignem experta, postea non vulgare fundamentum curationi futuræ praebet, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore, cum crustae decident, ne vlceris orae coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest, ad multum, idque praestitutum tempus, vlcerationes, & sordidas adhuc & inflammationem minantes prorogari conuenit. Quod inditum iis lalfamentum optinè praestabit, & syluestre allium detritum, item caepe, luccufve, praesertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quam non mansa imponantur: siquidem subacta pistave à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est: caeterum tempestius eorum vsus minimè est contemnendus. Si verò, quod per saepe accidit, ante dies praefinitos cicatrices coirent, committerenturque, manum postulabunt: namque eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere expedit. Vbi verò propositum tempus praeteriit, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multò post sinapismo vtendum.

Vstionis, siue cauterij vtilitas.

Argentum sublimatum exulcerans est.

Cauterium, quod ferro igne candenti, aut auro, aut argento fit, non modo salutiferum est ad rabidi canis morsum, sed etiam aliorum quorumcunq; animalium virus eiaculantium, quin & ad alios insanabiles ferè morbos. Proinde mirum non est, quod hoc loco dixerit Dioscorides vstionem, siue cauterium, contra virulentos ictus aut morsus expeditissimum esse auxilium. Fiat itaque cauterium intrepidè, tantaeq; amplitudinis, vt vlceris cicatrices breui committi non possint. Quod si timidus quispiam vstionem ignis terrore recuset, septicijs & exulcerantibus medicamentis vtendum erit. Quae in re cauterij praestat, quod vocant argentum sublimatum: admiscetur id vnguentis refrigerantibus, vt minus dolor inferat. Probatum hoc, quod non modo valentissimè inurat, sed quod etiam exusta ab eo caro, obductaq; crusta duobus tantum diebus post decidat, si tamen recenti butyro assidue illinatur, id quod in aliorum exustione non euenit, nisi longiore temporis tractu. Quod si igne, aut adurenti medicamento (vt multus de causis quandoque accidit) id effici nequeat, diligenter prouidendum est, ne vulnus coeat, sed diutius maneat diductum & apertum, superimpositis emplastris valide attrahentibus.

stahentibus, cuiusmodi sunt quæ è brutia pice, resinis, vario gummi genere, & id genus alius parantur. Si verò cauteria fiant, diligenter procurandum, vt relicta quam primùm excidat crusta, quo veneno pateat exitus, quippe ea diu in vulnere retenta, omnes obducit meatus magno agrorum detrimento. Porro non magno quidem negotio decidet apposita continuè liquida vernice, oui vitello, & recenti butyro permixta, quæ & butyro solo igni inquato, & madefactis in eo spariis superimposito: præstat enim hoc cæteris. Vbi vero è vulnere crusta decidit, salutarerum quidem fuerit remedium piaga quotidie puluerem præcipitati (sic enim vocant chymistæ argentum viuum in puluerem rubicundam conflatum) inspergere: siquidem id eximium præstantissimumq; medicamentum, præter id quod vulnus oculi prohibet, diu patens seruat, attrahit etiamnum ex alto ad superficiem potenter venenum: quæ in cætera huiusce facultatis præciliè medicamenta. Commodè etiam, nec minus efficaciter idem puluis atria Toris emplastris, siue vnguentis admisceri, & subinde vulnere admoeri potest: etenim iam dudum certior sum, in vniuersa medica facultatis materia, nullum haberi medicamentum, quod valentius ab alto reuocet extrahatq; virus, quam præcipitatum dictum. Ad hæc tamen si (vt omnibus fore placet, in quibusdam ægrorum diem apertum vulnus dimittere sit satis, non tamen errauerit, qui diutius prærogauerit, vt qui, quid malè residuum fuerit, exhauriatur.

Præcipitati vocati vis.

Vulnus in 40. diem pateat.

Διάταξις τῆς ἐπιπέτου κυνὸς λυσίωντος δυνάμει τῆς οὐ.

RABIOSI CANIS.

RATIO VICTVS IN MORSV

CAP. XXXIX.

Quæ ad partem ictam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterùm victus rationem ex iis, quæ veneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul vt veneni vires heberet restinguatq; simul vt arceat, quò minus ad intima perniciès illabatur. Etenim assumpta perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorum vtrumque præstare potest vini meracioris, passii, & lactis fetus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, non nihil veneno obiciunt, quod omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo alliorum, porrorum, cæparumq; cibis: quòd ea difficulter cõficiantur, vixq; aboleantur. Nã multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrariis illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vltus accommodatur, & Theriaces, Mithridatij, & eius quod eupatorio temperatur, denique omnium quæ magnam aromatum partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantiis ægrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nolle conuenit, pauorem aquæ non statò definitoq; tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimum vsque diem neglectis differri consuevit: post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis vitu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorum à cane rabioso curandi ratio talis est. Verùm enim uerò si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalp pro carnè circinare, nec vitionem experiri operæpretium est: nõ enim quod pertranfit, satis euocare possent. Nulla vtiq; istius rei occasio aut vtilitas, sed in cassum corpora doloribus sternentur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectione magnum præbet iuuamentum, vtpote cum mouendo corporis habitum transmutet: & quæ colocyinthidem recipit hiera: item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit, cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Cæterùm sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacissimi sinapismi q; alternatim per corpus totum aduciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur: quo cum fiducia nõ semel atq; iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus vti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, vt quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumptò helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati: nam & iam vitio têtatos nemo vnquam seruare potest. Itaq; primùm curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus: iam ad alia, quæ venenatis moribus sæuire consueuerunt, transeundũ. Notas vno contextu, deinde communem medendi locũ, qui omnibus cõuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Postremò subnectentur etiã venenata, quæ nullis cedunt remediis.

Instituenda demorsis à cane rabioso diligenter est ratio victus, nec ea tantum regula, cuius hic meminist Dioscorides, sed etiam vt ea sit ciborum quantitas, quæ iis rectè conueniat. Siquidem huiusce curationis regimen tenuem vltum nõ ex-
 50 petit, sicuti nec plenior, vt Aetius est author libro 6. vbi sic inquit. In victu indigentia, & satietas euitanda, magis tamen indigentia: hæc enim succorum prauitatem adauget, quod nequaquam expedit malefico vlceri. Ergo alimentum moderari oportet, vt & rectè conficiatur, & optimum succum corpori præbeat. Nec minus egestioni, & vrimarum prouocationi studendum: quod quidem tum ea, quæ prædiximus, tum scæniculum, & scandax comesta efficiunt. Plus verò simul & aluum, & vrinam ducit: ac cichorium agreste crudum oblatum stomacho confert, quem nonnulli serim, nonnulli ab amaritudine picrim appellant. Profunt & brassica cima, & palustris asparagus, & hortensis, & agrestis rumex: & e piscibus qui carnem teneram habent, & camari, cancri, & erinacei recentes cum vino mulso: & carniū extremitates, auiculaq; o-
 60 mnes montane, quæ facillè coquuntur, boniq; sunt succi. Vinum album tenue, neque valde antiquum: hæc ille. Ex quibus conijci potest, hæc in curatione ea plurimum conferre, quæ vrinam valenter mouent. Idcirco Auicenna (vt proxima cõmentatione diximus) quadam profert medicamenta, quæ cantharidas excipiunt, vt vnâ cum lotio sanguis etiam reddatur. Proinde mirum non est, si quandoque praualens natura, per instrumentum vrina, magno cum dolore parua veluti li-
 quida carnis frustra catulorum forma, venenum propellat. His itaque ea victus ratione vti licebit, quæ vrinam ægrè excernentibus à Medicis institui solet. Verum si fluuiatiles cancri, quibus vniuersa abundat Hetruria, haberi poterunt, hæc tam in prandio, quam in cœna vescantur demorsis: quòd hæc mira insit facultas, aduersus rabidorum canum venenum. Præbet Auicenna præter dulce vinum etiam aquam, in qua candens ferrum, vel chalybs restincta fuerint. Cæterum nosse conuenit
 Aquæ pauor ad quod vlt, tempus exoritur & cur.

Aquæ pauor
quando, &
quib. curetur.

Catuli coagu-
lum præstan-
tiss. in Hydro-
phobia.

ris meatus angustissimos habent, alij verò contra: quidam sincerissimis referti sunt humoribus, nonnulli verò succi ichori-
bus scatentibus, ac facile putredini obnoxii. Ex quo fit, vt in his citius, in illis verò serius hæc appareant symptomata. In He-
truria abstinent demorsi per integrum annum à quorundam lignorum contactu, præsertim corni arboris, & sanguinea
virga vocata. Siquidem (vt testantur ij, qui rem experimento compertam habent) si harum arborum virga tandem in ma-
nibus teneantur, quousque concalescant, illico demorsi rabie exagitantur. Quod cuiquam minime fabulosum videri de-
bet: etenim memini me vidisse in ciuitate nostra Illicinensi amicum quendam meum rabie correptum, quod corni arboris
virgis (dabat enim lanificio operam) lanam diu excussisset, qui eorum oblitus, quibus sibi à Medicis interdictum erat, ra-
bidus interiit. Postremò sciendum est, aquæ pauorem haudquaquam curari posse, cum veneni vis omnes corporis occupau-
erit facultates: quamuis in ipso pauoris initio, aut anteaquam venenum illapsum fuerit in vniuersum corpus, aliqui curati
euaserint, vt Philosophus ille, cuius historiam superius enarrauimus, præsertim cum pro viribus in morbum nituntur male
affecti, & qui eorum curationem agunt. His ad stipulari videtur Dioscorides: quippe qui quosdam asserit, qui iam aquæ
metum sentiebant, sumpto cum fiducia helleborismo non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem
vel post, fuisse seruatos. Proinde scribit Auicenna eos, qui aquam expauescunt, deploratos non esse, quousque in speculo in-
tuentes se ipsos cognoscunt, argumento quod non adhuc venenum vniuersum infecerit cerebri facultates. Hoc igitur tempe-
re medicamentis vtendum est deiectoris, & si nihil obstet, sanguinis missio non aspernanda. Ex medicamentis autem in
hoc ceteris præstat album vel nigrum veratrum, iis adiectis, quæ eorum infrenant feruorem. Conuenit etiam epithimum,
sena, fumaria, myrobalana, elaterium, agaricum, rhabarbarum, centaurium minus, geniste semen, thapsia, confectio ha-
mech, & hiera colocynthitis, & Armenius lapis: siquidem hæc in atra bile deijcienda principem tenent locum. Proderit i-
tem Syriacum bitumen frequentius ex aqua potum: quin & Mithridatis antidotum, & ipsa Theriaca, & cancrorum
fluuiatiliū combustorum puluis, Galeni modo paratus. Confert præterea hus leporis, vulpis, & capreoli coagulum. Sed
semper in primis omni studio curandum, vt aquam male affecti bibant. Verum ne ipsam intuentes pauor inuadat, lon-
gissimis tenuibusq; metallicis fistulis è longinquo ducenda erit, aut ex superioribus contabulamentis: namque ipsa sola ser-
uari poterunt. Refert Aetius, quod si catuli coagulum ex aceto semel tantum ederint hydrophobici, statim eos capit potus
aque cupiditas, & bibunt: ob idq; medicamentum hoc miris laudibus extulit. Sunt qui nigrum cicer aqua incoquendum
esse velint: sic enim aqua claritatem amittit, nigraq; efficitur: & præter id quod haurientibus pauorem non adfert,
quemadmodum quæ sincera, pellucidaq; spectatur, vrinam valenter ducit. Nec desunt qui suadeant vrentia cataplas-
mata occipiti esse apponenda, pariterq; post aures. Quæ etsi ad rem facere non videantur, quod valentissimè exicent, vbi
tamen deplorati sunt agri, valentissimis etiam medicamentis vti licebit.

Κοινὴ τῶν ἰσοβόλων διαπραξία.

COMMVNIS CVRATIO IN OMNES

ICTVS VIRVLENTOS.

CAP. XL.

ADuersus quidem omnem animalis ictum, quod venenum vibrat, oris sectio conuenit. Sugentem
verò oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguum olei in o-
re continens plagam exugat. Locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlcuscula altius imprimere
expedit, quod virosa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione
longè potentius opitulantur: namq; ab iis duo peculiaria præsidia fiunt: vnum, quod virus è loco tollitur:
alterum, quod eius veneni pars, quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoque sanguine excernitur.
Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitæ cum largiori flamma adfigendæ sunt. Sed etiam de
sectione supra in rabiosorum morsu disseruimus. Si verò icta pars, vt pote extrema, eam sectionem com-
dè non respuat, præsertim in omnibus serpentium ictibus vt aspidis, cerastæ, similiūque, procul dubio
amputanda est. Conuenientiora supra dictis auxilia sunt, quæ epithemata vocant. Imponantur sarmentis
tius cinis, aut ficulneus, cum lixiuio stillatio subactus, garo, & acri balsamento: porri, cæpe, & allia modò
minutissimè contrita illinuntur, modò cremata vulneribus iniiciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum
pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec desunt qui huic tanquam discordia quadam
naturali pugnantibus vtantur: verum huius rationem inire facillimum fuerit. Gallinæ enim calida natura
præditæ sunt, argumento, quod deuoratum insigne virus conficiunt, & aridissima quæq; semina consumi-
unt: item nonnunquam arenas lapillosq; ingluuie sua deuoratos, dissolunt. Itaque animantis ad moti
calore adiutus spiritus, ab icta parte impetum capessens exiliensq; secum venenum exigit. Nec me fugit,
quid in Ægypto fieri soleat. Cum spicas Ægyptij metunt, ollam picis paratam habent, & appensam fasciam:
tunc enim maximè serpentium iniurias expauescunt, tum propter spicilegij tempus, tum quod opacis si-
mul abdite speluncis & cauernis, densoque aruorum cespite delitescunt. Molestissima enim animalia, &
virus eructantia, Ægyptus in campis ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, morsum
intulerunt, qui adsunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, & semel aut iterum brachium aut crus paulum
suprà vulnus obligant, & arctissimè duo è præsentibus dstringunt, locumq; secantes qua circumactus est
laqueus, picem instillant: cumque satis vulnus excepisse videtur, laqueum resoluunt, & capis aliisque su-
prà memoratis illinunt. Præterea pix liquida cum sale trito & feruente illita, præsentaneo est auxilio, si
iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & fimum caprarum ex vino decoctum. Locum aceto calido, cala-
mintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt empla-
stra vehementissima, & calidissima, quæ venenum elicere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi
sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye componuntur, de quibus consequenter erit tractandum.
Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incessit, qui incognitas ad hunc vsum facultates
conscripserunt, vt elephanti fel, crocodilive sanguinem, ouæque testudinis, & consimilia. Nam
cum iuuantia quædam literis tradidisse videntur, planè in hæc sola incidentibus imposuerunt. Quare
talibus deuitanda sunt, cum difficilè, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quod nostra fides
iis obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad com-
munem omnium vsum pertinent, quæque facillè suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxi-
lium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque, erica, & astragalus, cum aceto pota, con-
tra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virentes platani pilulæ in vino diluto coctæ,
& paliu

& paliuri decoctum: radix aristolochia, & eryngij: decoctæ etiam lauri bacæ, & deuorata, piperque largius elitatum, ruta, anethum, & cyclaminus: coma porrorum priuatim ex pane, aut allum, aut cepe: tallamenta que quàm acerrima: origani decoctum cum vino potum, fœniculi, pulegij, calamintha, porrorumque succus cum melle desorptus: hæc quidem à plantis conquiruntur. Ab animantibus verò quædam vtiliter peti solent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum vino: iudem castorei textans: testes marinæ testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxiliana medicamenta est. Commendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent, hæcenus. Percussis à serpente prodest alui deiectio, diffluens sudor, vrina, copiosè reddita. Sunt & cõpositæ quædam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, vt & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Ægyptiæ fabæ dantur cum vino. Iridem syluestris rutæ seminis, gith, cumini Æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones trita, & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent: dantur ex ijs terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

Venenosorum animalium ictus, morsusq; doctrinam, curandique rationem, duabus sectionibus tradidit Dioscorides. In quarum altera cuiuscunque ictus induita exposuit: in altera verò curationes diligentissimè conscripsit. Caterum præfationem hanc illi sectioni præposuit, quæ curandæ rationem docet: in qua præfatione omnium virulentorum ictuum curationem in vniuersum profecutus est. Verùm quoniam (vt superius diximus in commentatione, quam in caput 35. huius libri conscripsimus) rati sumus illud non paruum legenti negocium facessere, quòd ex diuersis locis indicia, & curationes conquirantur, vt id molestia quisque effugeret, vt que citius commodiusque nulla temporis iactura omnia in vnum redacta haberentur, vbi prius illa in duobus locis legebantur, nos omnia in vnum locum congesimus, atque ex duobus capitibus vnum tantum fecimus, singulis virulentorum ictuum sua peculiaria remedia subiicientes. Hanc verò Dioscoridis præfationem præfiximus, in qua tamen adeò exactè docteq; tradiderit is vniuersalem virulentorum omnium animalium ictibus medendi methodum, vt nihil planè addi possit: tamen ne ab instituto nostro defecisse videamur, in eorum gratiam, qui semper plura profecti expectant, nonnulla modo differam, quæ, vt arborivror, non inutilia, neq; scitu iniucunda erunt. Dicam itaq; primum animalium, ferarumq; virus, non in omnibus esse idem, sed in hoc vehementissimum, & omnium perniciosissimum, adeò vt vna tantum hora hominem conficiat, vt in aspide, ceraste, & basilisco: in alio verò minus vehemens, minusq; lethale, vno vel duobus diebus interimens, vt in vipera: in alio deniq; hu longe imbecillius, vt in scorpione, & phalangio, longiore tempore necans. Verùm quinquam id plerunq; euenit, quòd animalia quæ mordent, vel ictunt, diuersorum sint generum, & proinde diuersa etiam eorum venena, accidit tamen, vt ab aspide, vel vipera demorsi quandoq; tribus tantum horis, interdum vno duntaxat die, nonnunquam pluribus diebus superuiuant. Quod à diuersis causis prouenit: siquidem in aspidum, & viperarum genere longè pernicialiores sunt femina quàm mares, iuuenes quàm senes (quamuis nõ desint, qui contrarium putent) adulta quàm adolescentes. Quinetiam fera omnes, & insecta in montibus, & aridis locis inter vepres, & saxa degentes, is citius hominem perdunt, quam quæ palustres vliginososque tractus incolunt. Citius præterea necant, quæ orientalem, & meridionalem inhabitant plagam, quàm quæ septentrionalem. Ad hæc famelicæ depastis nocentiores sunt, & irritata venenosiores sunt, quàm dimissæ: quamuis omnium in vniuersum ictus perniciosiores sint aestate, quàm hyeme. Hæc itaque causa esse possunt, cur citius, vel serius demorsi intereant. Id tamen etiam plerunq; fit ex fortiori, vel imbecilliori demorsorum temperamento, aut vasorum latitudine, vel angustia: quandoquidem (vt superius pluribus in locis diximus) veneno non tam facilis patebit aditus, vbi vasa suapte natura angusta fuerint, quàm vbi latiora. Caterum errât, Auicenna testimonio, qui serpentium venenũ frigidum esse statuunt, quòd ab is demorsi illico frigidifant, quodque serpentes ipsi, vt frigoris impatientes, appetente hyeme in subterraneis cauernis latitent, vel sub lapidibus, sub quibus priuatim se condunt vipera, vbi nonnunquam adeò frigore correpta reperiuntur, vt stupida & immobiles reddita, tanquam congelata persistant. Frigiditas enim toti corpori ex ictu vel morsu adueniens, non vtique euenit ex veneni frigiditate, sed quòd innatus calor ab extremis, & vltimis corporis partibus ad cor se conserat, quodque etiam veneno superetur, & extinguatur. Nec eo argumento frigidi temperamento, serpentes sunt iudicandi, quòd scilicet hyeme immobiles, & serè exanimis suis in cauernis reperiuntur: quippe nulla alia de causa id illis accidit, quam quòd eorum natura, quæ calidissima est, id maximè refugiat, quòd sibi contrarium sentit. Visitur hoc pariter in pisibus, qui cum frigidi natura sint, quàm primum ex aqua extrahuntur, aeris calore necantur: quin & vespa, quæ temperamento calida sunt, & sicca, eadem ratione hyeme conficiuntur, nisi calidissimus reconduantur locus. Sed iam ictuum, vel morsuum virulentorum curationem aggrediamur. In qua Dioscoridem, Paulum, Aetium, & alios aterni nominis scriptores imitati, dicimus efficacissimum esse remedium, morsu vel ictu illatum vulnus continuè ore sugere (sugentem tamen prius præparatum esse oportet) subinde venenum, vel venenatum sanguinem expuere. Veruntamen id opus, meo quidem iudicio, per se non potest, absque magno sugentis discrimine. Nam si in aliqua oris parte, aut gingivarum, lingua, palati que vlcusculum aliquod fuerit, quanquam adeò insensibile, vt cutim tantum occupet, vbi venenum in os suctione vocatum vlceris locum contigerit, & sanguini se admiscuerit, qui forti suctione facile è gingiuis per dentium connexus maneat, dubitandum non est, quin illico sugenti perniciem inferat: itaque fiat, vt qui alteri mederi velit, sibi ipsi rem pareat. Quin nec minus pericula immineret, si venenata salua tantillum in stomachum descenderet. Neque temerè hæc dicimus: etenim iam nos vidimus (vt superius in nostra in primam, & vniuersalem huius libri præfationem commentatione retulimus) rusticum, qui cum fœnum quodam in prato secaret, fortè fortuna falce mediam secuit viperam: & cum à trunco, quem manu imprudens sustulerat, in digito morsus esset, os vulnere statim admouit, & venenatum exiit sanguinem, quo factò repente mortuus condidit. Proinde scitè admonet Aetius, vt caueant, qui sugunt, ne os habeant ulceratum. Porro ad hæc vitanda discrimina, recentiores galli vel gallina sedem plumis exuunt, & vulnere consultissimè applicant, & demortuo primo, alterum substituunt, idque tamdiu prosequuntur, quousque vniuersa veneni vis extrahatur. Cuius rei certum indicium habent, cum gallus postremò appositus non moritur. Aetius Dioscoridem secutus, non modò gallinaceos, gallinasque viuentes dissectas, & adhuc palpitantes his morsibus commode applicari tradidit, sed etiam quodlibet volatilium genus, item iuuenum, tenellorumque quadrupedum. Dehinc idem iubet, extrahat calidæ aquæ potu vomitionibus, valentiora dari antidota, nempe Theriacã, & Mithridaticã antidotum. Mirificam vim in hac curatione habent, quantum equidem experientia comperi, quinta nostra essentia, pariterq; oleum de scorpionibus, quo-

Ordinis Dioscoridis immutata ratio.

Venenorum diuersi gradus, & effectus.

Serpentium venenũ nõ esse frigidũ.

Virulentorum ictuum, vel morsuum curatione. Suctio sugenti periculosa.

Gallus sede deplumata applicandus.

Cris è lauri-
nis ligais.

Serpentinae
puluis singul.

Theriaca lau-
dibus à Gale-
no celebrata.

Calceolarij
theriaca cō-
mendatur.

bus, quorum parandi rationem in praefationis huius libri commentario tradidimus: siquid in his tantum antidotis, imò nonnunquam solo oleo, nonnullos à viperis demorsos sanauimus, paucis admodum horis, qui cum nullum vita signum praebirent, tanquam deplorati iacebant. Nam tanta est horum partium tenuitas, ut momento vniuersum corpus percurrant, & subinde omne superent venenum. Protulit Aetius sarmentorum, & ficulnea cineris vice, eam qua è laurino conficitur lignus. Cuius sententiam magis probandam censemus, quod hac arbor suapte natura polleat aduersus venena. Vbi vero veneni vis contumax reperiatur, & non nisi longo tempore euinci possit, est diligenter animaduertendum, ne icti vnquam die ac noctu dormire sinantur, donec veneni vis euannerit, quippe quod somnus (ut alijs in locis superius dictum est) venenum maximè ad cor, & cerebrum ducat, & secum trahat. Multa praeter hac habentur remedia vulnere illinenda, ut calx viua, oleo & melle subacta: hac enim (ut Aetius est author) omnibus venenatis morsibus opem fert, praeterquam ab aspidè illatis. Sunt & qui nigri veratri recentem radicem in vulnus figendam consulant: quod hac (ut equidem me experientia cognouisse fateri possum) virus valentissimè extrahat. Quamobrem Tridentina rura cum iumentum aliquod à serpente ictur, statim perforato ibidem cortio, praestantissimo remedio ellebori nigri radices in vulnus inserunt. Profunt etiam iumentum magno iuuamento cepa, allium, porrum, asphodeli, & dracunculi radix elixa, contusa, & subinde Theriaca, aut Mithridatio, & oleo de scorpionibus subacta, & illita. Non secus auxiliantur, iris, ari, phu, vtriusque chameleoni, lili, hemerocallis, heleny, sennuli, smyrny, gladioli, scilla, spargani, cyclamini, bryonia, vtriusque raphani, & bulbaceorum omnium radices, concisa, ac decocta, & morsibus illita: qua omnia saepe à nobis experta sunt. Conferunt praeterea bdellium, Syriacum bitumen, pix liquida, castoreum, montanarum caprarum simum, euphorbium, sulphur vrinae admixtum sal, nitrum, taurinum fel, oleracea cruce, vtrunque laser, galbanum, sagapenum, panacis lachryma, erica, hyssopum, origani omne genus, dictamnium Cretense, & Italicum, calamintha, conyza omnis, verbenaca, halicacabum, satua & agrestis ruta, sonchus tam aspera quam lauis, silybrium, sinapi, nasturtium, lepidium, iberis, thlaspi, aut in emplastro, aut in fomentis exterius adhibita. Quae verò pota, vel deuorata valentissima censentur, ea omnia erunt, qua in nostro in huius libri praefationem commentario longiori catalogo recensuimus: tametsi priuatim ad venenatos ictus praesentantur Medica mala, & eorum semen: quin & echy, & viticus, & ligustici, & paonia, & hyacinthi: praeterea virides platani pensiles pilulae, iuniperi bacca, conyza, chymedrys, scordium, chamapitys, echini terrestris caro, gallinaceorum & gallinarum cerebella leporis, & equi coagulum ex vino potum, marina testudinis sanguis cum cymino, porri succus ex melle, nasturtium, maioris centaurij, gentiana, albi dictamni, & superior gladioli radix, thlaspi, pulegium, Cretense dictamnium, elchrysi coma, rana oleo incocta, & sale conspersa, earundem ius, oleo & sale adiectis, & cerui genitale siccum, & in puluerem potum. Mirificum ac singulare remedium praestat illius herbae radix, quam Goritienses, ex eo quod serpentium morsibus celeriter, & efficaciter medeatur, Serpentinam vocant, cuius historiam descripsimus libro secundo in coronopi mentione: hac siquidem in puluerem ex vino hausta cochlearis mensura, à venenoso quouis serpente demorsos breuis tempore sanat: neq; ea solum valet aduersus virulentos ictus, sed etiam contra epota venena. Iis serè viribus pollent (ut quidam recentiores fatentur) syluestres roseo colore micantes, quos nonnulli syluestres garyophyllos vocant. Porro Galenus libro de theriaca ad Pisonem, ceteris antidotis tam simplicibus, quam compositis ad virulentorum morsus Andromachi Theriacam praetulit his verbis. Theriaca est proculdubio apud vniuersos homines celebratissimum antidotum, tum quod pollicito neceminem frastretur, tum ob ipsius actionis efficaciam. Siquidem nullum vnquam à feris, qua hominem solent interimere, commorjunt, hac statim epota perijisse memoria est proditum. Nullus eadem praesumpta, haud multo post morfu impetitu, bellua veneno ceu illam superante interijt. Quod subinde nonnulli pratores etiam, penes quos vita & necis potestas est, experiantur: atq; medicamentum probare volentes, an quod promittat praestare quoque possit, in omnibus iam ob praua quadam, & illegitima facinora ad mortem iudicatis, de ipsa faciunt experimentum. Nos autem cum in hominibus id non possumus, in alijs quibusdam animantibus idem facientes, veram medicamenti probationem inuenire conemur. Namq; galu, qui donu non enutriti, neque nobis sunt contubernales, sed potius agrestibus, & sicciore pradis temperamento, capti, feras obijcimus, & qui inter illos non biberint ex medicamento, protinus intereunt: qui verò biberint, conualescunt, & à morfu vitam retinent. Interdum verò medicamentum num adulteratum sit, hoc quoq; modo probare conuenit. Si epota Theriaca, non purgetur, qui purgans sumpsit medicamentum, hoc ipso iudicamus antidotum esse praestantissimum, quoniam purgationem, ei qui medicamento vsus sit purgante, impedierit, ut tali experimento à veri medicaminis inuentione nunquam aberrauerimus. haecenus Galenus. Cuius nimirum atate qui pratorium in facinorosos exercebant iudicium, facile probare poterant num Theriaca probata esset facultatis, an adulterina. Namque pluribus in locis qui ob sua facinora mortis supplicio damnabantur, non semper capite, aut quouis alio poena genere necabantur, prout leges statuebant: sed sapientius in theatrum ducti, ut mitiori supplicio e medio tollerentur, aspidibus, & viperis offerebantur demordendi. Huius rei testis est Galenus eodem libro ad Pisonem, vbi post enarratum Cleopatrae interitum, sic inquit: Pluries in magna Alexandria sum contemptus, quam celeriter aspides homines perimant. Cum enim aliquem hac poena lege damnatum, humaniter, citoq; volunt occidere, adyctes ipsius pectori feram, iubentesq; paululum ambulare, ita sine mora hominem tollunt è medio. Probanda igitur fuerit Theriaca, praesertim qua fit hoc tempore, antequam ematur, vel alicui propinetur, in gallis agrestibus à feris sapius enarratis demorsis, ut docet Galenus, aut in alio quouis animali: etenim in simijs (ut opinor) sagittis & certius id experiri possent, quod simiae magis ceteris hominem referant. Ceterum si qua in Italia Theriaca nunc reperitur, qua mihi probanda sit, ea sane fuerit (seruata omnium pace) qua Verona ad Campana aurea insigne, à Francisco Calzolari, pharmacopoeo quam perijssimo simpliciumq; medicamentorum indagatori acerrimo, parari solet. Cum ea haud minora praestare videatur, quam qua olim Galeno imperatoribus parabat. Siquidem praeter mirificos quosdam successus, quos (ut ego mihi testis esse possum) in varijs ac diuersis iam serè deploratis vidimus morbis, non desunt quoq; nonnullorum aliorum haud infima doctrina Medicorum testimonia, qui hac theriaca vsi sunt, ac quotidie vtuntur, admiranda admodum successibus. Verum enimvero cum ingenui, beneficiq; viri sit munus, huiusmodi auxilia tam humano generi saluberrima, in omnium conspectum palam facere, ac per vniuersi orbis oras scriptis extollere, ne defraudentur homines, si iudicio inuoluantur ea, quibus mortalium vita tueri possit, ac praesens quandoq; mors euinci & superari, ego quidem, qui iudicanda cum Reipublice, tum posteritati continuo operam nauare non desino, huiusce sanè admirande antidoti vires reticere non possum, tametsi non desuturos sciam inuidos, ac maleferiatos, qui hac detrectare conabuntur. At qui horum recordiam confringent nonnullorum clarissimorum Medicorum testimonia, qua nunc in medium afferant. Testatur enim vir summa experientia clarus Antonius Caprianus Mantuanus, qui suam obraram doctrinam, & in morbis medendis solertiam ab omnibus Sacrosancti Concilij Tridentini Patribus in medium ascitus est, se quidem in quibusdam, qui venenum hauiserant, in pestilenti febre affectis, in melancholicis, ac quartana febre laborantibus, Calceolarij theriaca felicissime admodum esse

dum esse vsu, non solum semel tantum, sed saepius atq; pluries. Siquidem is (vt lucidiori testimonio hac comprobata habeantur) historiam quoq; narrat cuiusdam puella, annorum duodecim, quae Martua, in domo nobilissima matronae Anna Bonattae pestilenti febre laborabat. Siquidem cum iam (vt ipse scribit, omni arteriarum pulsus, ac voce esset destituta, ad vitam breui admodum tempore reuocata est, vna tantum huiusce Theriacae drachma vino Cretico dissoluta, violentiq; propinata. Scribit praeterea vir non postrema eruditionis Ioannes Baptista Oliuus Vitellianensis, Illustrissimi D. Vespasiani Gonzage Medicus, se hoc singulari antidoto proprium filium à morte liberaffe, qui argentum sublimatum saccharum esse existimans, domesticorum incuria vorauerat. Est & Prosper Borgarucius Urbinas Serenij. Galliarum Reginae Meduus, qui quoq; fatetur se sanasse Patruij feminam quandam, (praeter ceteros à se curatos) quae pariter argentum sublimatum sumpserat, propinata tantum Calceolarij theriaca. Est quoq; praeter hos, vir summa doctrina insignis Dominicus Montescurus Medicus Veronensis, quippe qui scribat plures à se sanatos celeberrimo hoc antidoto, quorum nonnulli à virulentis animalibus demorsi fuerant, quidam verò venenum vorauerat. Atqui longè maiora fatetur Hieronymus Iulianus medicus haud vulgus. Quandoquidem scribat is à se Verone huiusce antidoti auxilio ad vitam fuisse restitutum militem quendam à Totetorum familia, qui ex potu succi radicis sambuci, sanguinis plurimum per sedem emiserat: quinetiam feminam quandam, quae non solum deorsum, sed etiam sursum, magnam sanguinis vim effuderat, ob potum colocynthidis dulcissimum ex Cretico vino paratum. Atq; his addit vir iste fide dignus, huiusce Theriaca potu sanitati fuisse restitutam mulierem alteram, è Discipulorum gente, diuturna admodum Cachexia adeò affectam, vt tanquam deplorata iam negligeret à Medicis, vermibus plus mille (quod omnibus mirum: videri debet) per sedem pulsus. Tacebo interim admiranda quadam, quae de huiusce antidoti mirificis successibus meminisse solet Ioannes Baptista Susus Mantuanus, Medicus non imperitus. Quinetiã alias nonnullas historias haud minus admiratione dignas silentio inuoluam, tum ne lectoribus molestus esse videar, tum etiam

20 quod intentio nostra suum potius habeat scopum ad medicamentorum cum simplicium tum compositorum, describendas facultates, quam ad historias recitandas. Quamobrem iam aliò sermonem meum conuertam, dicamq; ingenuè me nihil penitus mirari quòd Theriaca, quae Verone à Francisco Calceolario paratur, haec omnia praestare queat, cum haud me latere sciam eandem minori succedaneorū numero esse paratam, quam vnquamquãq; aliam, quae nostra hac aetate in Italia habeatur. Namq; nullam scio ante hac paratam esse Theriacam, in qua legitimum venerit amomum, atq; legitimus costus Arabicus. Quae quidem rara admodum medicamenta, cum mihi examinanda missa sint ab ipso Calceolario, cumq; in his omnes obseruauerim notas, quae Dioscoridi hīs tribuuntur, ea quidem mihi seruanda proposui hīs tantum demonstranda, qui fortasse nostris hīsce commentarijs minus fidei quam par sit, adhibendum esse putabunt. Quin autem costus hic legitimus sit Arabicus, praeter ceteros Dioscoridi cōmendatus, mihi sanè est qd verear: quippe quòd leuis, plenus, densus, aridus, coloratus, acris, intus candidus, & (vt Galenus inquit) subamarus habeatur. Quamquã enim legitimus Indicus (neca quidem sententia) est

30 costus quem nuper ex orientali India ad nos detulit Cecchinus Martinius Rauennas Pharmacopaeus Venetus ad Angelū insigne (vt superius libro primo de Costo agentes asseruimus) cum tamē Dioscoridi testimonio Arabicus ceteros antecellat, non possum non affirmare Costum à Calceolario sua in Theriaca additum, omnium esse praestantissimum. Ceterum si quisquam forte asse reperiretur adeò contumax, atque incredulus (vt inuidi ac zolis esse solent) qui tantorum Medicorum in testimonijs astipulari nollet, atque nequiret, faciat (objecto) ipsemet huiusce antidoti periculum: nam postea cognoscat nos fabulas non venditare rei medica studiosis. Hac itaq; tantum dixisse libuit tum in vniuersa Reipublica commodum, ac deinde vt nostra huius aetatis Medici Calceolario viro optimo, ac nunquam satis laudato, ingens hoc beneficium acceptum referant: cui non parum etiam debere scio nostra hac commentaria, quòd splendoris non modicum hīs accesserit Calceolarij ipsius diligentia, quippe qui raras nonnullas ad nos miserit plantas. Hinc itaque conijcere poterunt, qui hac candide legerint, falsò à quibusdam malè sanis hominibus, Calceolarij theriacam impugnari. Narrant quidam antiquitus fuisse gentes in pluribus orbis partibus, quae suapte natura cum serpentibus degebant, tractabantque manibus, nullo vnquam ab his morsu accepto. Cuius rei testis est Plinius libro 7. capite 2. vbi ita scriptum reliquit. Crates Pergamenus in Helioponto circa Parium genus hominum fuisse tradit, quos Ophiogenes vocat, serpentum ictus contactu leuare solitos, & manu imposita venena extrahere corpori. Varro etiam nunc esse paucos ibi, quorum salua contra ictus serpentum medeantur. Similis & in Africa genus Psyllorum fuit, vt Agatharchides scribit, à Psyllo rege dicta. Horum corpori ingenitum fuit virus exitiale serpentibus, ex cuius odore sopirent eas. Mos verò liberos genitos protinus obijcendi sauisimis earum, eoque genere pudicitiam coniugum experiendi, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Hec gens ipsa quidem propè interemptione sublatæ est à Nassomonibus, qui nunc eas tenent sedes. Genus tamen hominum ex his, qui profugerant, aut cum pugnatum est, abfuerant, hodieque remanet in paucis. Simile & in Italia Marsorum gente durat, quos à Circes filio ortos ferunt, & ideo inesse hīs vim naturalem eam: hac Plinius. Veruntamen, vt author est Galenus libro de theriaca ad Pisonem, Marfi qui suo tempore extabant, contra serpentium venena nullam vtiq; propriam habebant facultatem, sed fraude quadam vniuersam decipiebant plebeculam. Ipse enim loco citato ita scribit. Circulatores hi nunquam congruo tempore viperas venantur, sed multò post vernationem, cum non amplius vigent. Captas autem ipsas crebro sibi ipsis assuefaciunt, & cibis non solitis enutriunt, imò carnes ipsis permittentes, & continuè mordere cogentes, vt virus ex earum ore vacuetur efficiunt: quinetiam mazas quasdam obijcunt, quae dentium foramina obstruant. Atque hac ratione morsus sunt imbecilles, vt videntibus magnum sit miraculum, talis ipsorum ad fraudem parandam artificij imperitū: hac Galenus. Ceterum id fraudis dolivae genus, nostro etiam tempore locum habet, in his praesertim circulatoribus, & circumforaneis, qui ex diuisi Pauli stirpe (quod tamen planè mentiuntur) se prognatos pradicant. Quippe quòd serè omnes Apuli sint ex Leccia tribu oriundi, aut ex circumstantibus locis: quamquam facile possunt originem duxisse à Marsis eorum vicinis, qui sexcentibus annis, aut fortasse millenis annis ante diuum Paulum extiterunt. Cauendum igitur fuerit, ab eorum nugis, nam quicquid leniuntur pollicenturque, id omne fraudulentè, & dolose agunt. Capunt enim viperas abeunte iam hyeme, & vt magis ab earum morsibus se tutentur, manus sibi perquam diligenter inungunt quodam vnguento hac in venatione ab ipsis experto. Vnguentum illud conficitur ex oleo syluestris raphani semine expresso, dracunculi radice, & asphodeli succo, leporis cerebro, sabinae folijs, lauri baccis, & alijs quibusdam additis. Affirmant eo vnguento perunctos à serpentibus icti non posse. Quod ego facile crediderim, cum etiam apud Nicandrum in Theriacis vnguentum repererim, quo qui fuerit perunctus a feris non possit. Nicandri verba subiiciam, quae soluta oratione ita redduntur. Quòd si in triuis missa reptilia iam recens generantia sese, & rem secum habentia, in ollam mittas, repones aduersum perniciosas noxas remedium. Inq̄tes autem in ollam illam cerebri, seu medullae cerui recens casi drachmas triginta: cotylas quatuor rosacei, cuius primam, mediam, & tertiam expressionem vnguentarij precipuas, & solas numerant. Olei splendentis crudi totidem cotylas infunde, & cotylam cera vnã, atque hac in rotundo vase celeriter calefacito, donec liquefacta serpentium squama mol-

Historia.

Costus Arabicus.

Gentes turq; à serpentibus, eorumq; rebus medicantes.

Frans circulatorum, qui in Pauli stirpe mentiuntur.

Vnguentum Nicandri.

ma mollescant: postea arte paratam molam recipies, & hæc omnia in vnum mista turbabis, teresque cum serpentibus. Longè autem spinas separa: quandoquidem maleficum illis venenum adhereat. Omnia porro membra ex hoc unguento inunge, tumque vel in quamvis viam, vel grabatum etiam te tutò conferes, vel cum arentis æstatis tempore ad arca opera cinctus, tridentibus profundum manipulorum aceruum disquisueris: hæc ille. Capiunt igitur qui Masos se faciunt viperas, aliudque quoduis serpentium genus hoc modo: captisque statim caput saliva perfundunt, cuius contactu non parum vilescunt, & veneni feritatem deponunt, quòd hominis saliva facultate sit illis prorsus contraria. Cùm autem in foro, miraculosum de se spectaculum prabeant, ab his nullo veneni incommodo demorderi se facere volunt, oblato prius illis dura carnis frusto id dentibus dilaniare cogunt, vt virus, quod propè dentes quosdam vesiculis continetur, in mansam effundatur carnem. Non desunt tamen qui etiam vesiculas illas forcipibus abscindant, ne amplius veneno repleantur: itaque hac fraude vniuersam gentem decipiunt. Verùm pulcherrimè horum fraus quandoque detegitur, cùm simul in eodem foro plures eiusdem prauis generis homines contendunt, vt alter alteri primum locum praripiat, & summam apud populum authoritatem consequatur. Nam ij, vt quisque se legitime ex diui Pauli familia ortum ostendat, viperis, quibus venenum exemptum non sit, se inuicem dilacerant, præsumptis tamen suis fallacibus antidotis: quibus tandè frustrati, à veneno victi relictis vexillis, tanquam moribundi, suis è pulpitis in terram cadunt. Et certè nisi statim periti Medici illis operam ferrent, mortem sæpe immaturam oppeterent: licet etiam interdum occumbant, & animam cacodemonibus, corpora vero suis serpentibus deuoranda relinquāt. Equidem memini, cùm essem Perusij, me duos huiusce generis circumforæos vidisse in foro, qui in tribus corporis partibus à viperis demorsi erant: & ij sanè ambo periissent, nisi Carauitus ille Bononiensis chirurgus, & præceptor meus, oleo nostro de scorpiionibus eos inunxisset: nec suus illis profuisset lapis, quem vendunt, & omnibus præferunt, aduersus omnia venena. Quemadmodum idem non profuit ijs, qui Tridenti inuicem in foro demorsi, & veluti mortui in hospitium delati, prædicto oleo sanitati restituti fuere, magno quidem amborum discrimine, ac dedecore. Sunt qui dicant eum lapidem, vel potius terram obsegnatam, à Melite insula allatam, quam omnibus præponunt antidotis, vim omnino aduersus serpentium venena efficacem habere, quemadmodum & ea, quæ à Lemno insula, Lemnia vocatur. Veruntamè vbi ab aspide, vel vipera quis fuerit demorsus, parum vel nihil proficit: quamobrè credendum minimè fuerit, panem vel vinum, quibus suas ij admurmurāt cantilenas, eos qui sumpserint, tutos à serpentibus, & alijs id genus venenum eiaculantibus, ad integrum vsque annum seruare posse. Quandoquidem nouimus nos, qui hoc pane deuorato se tutos à serpentibus existimantes, serpentium venationi se dedere, sed ab ijs tandem demorsi huius admurmurati panis opinione falsi interiere. Non tamen eam inficias, quin aliqui reperiuntur, quibus quadam ea à cælo facultas tributa est, vt à serpentibus non mordeantur. Siquidem noui ego plures, qui simpliciter, nulloque artificio aut verbis, aspides & viperas quotidie capiebant, nec vnquam ab ijs icti fuere: quamuis serpentes ab ijs modo pedibus calcati, modò manibus compressi fuerint, ac diutius in nudo eorum sinu gestati. Neque præterea negauerim, serpentes non posse carminibus, & incantationibus compelli, quòd plurimis id constet experimentis. Caterùm, vt nihil quod ad curatorem ictuum virulentorum facere possit, à nobis prætermittatur, qui omnia quæ scimus, ingenuè docemus, non verebor proletere memoria (etsi id sciam ad Medicos non spectare, neque ab ipsis recipi) quoniam pacto in Romano agro senex quidam eremita amicus meus, à feris ictus sanabat, ipsis absentibus agris. Cùm enim quis è circumstantibus populis à serpente demordebatur, id per nuncium eremita significabant: tum is interrogabat nuncium, an medicamentum icti loco ebibere vellet: quòd si id se facturum respondebat, iubebat ille, vt dextrum pedem calceo denudatum solo sisteret, & cultello totius pedis vestigio lineam circumducebat: deinde iubebat pedem auferri, & intra spatium linea signata cultelli cuspide hæc verba inscribebat: CARO CARVZE, SANVM REDVCE, REPVTA SANVM, EMANVEL PARACLETVS: mox terram eodem gladio abradebit, ita vt omnes abolerentur characteres: abrasum puluerem fictili quodam paruo aqua pleno excipiebat, ibique tantisper dimittebat, donec terra subsideret: demum nuncij interula aquam percolabat, & cruce signatam illi bibendam præbebat. Sed certe mirum est, quòd eadem hora ictus sanabatur, qua nuncius potionem illam sumpserat, vt mihi planè compertum est, & omnibus illius regionis incolis. Hæc est curatio in virulentos ictus, qua utebatur ille eremita: qui mihi sapius dixit, hoc esse maius secretum, efficaciusq; remedium, quàm habeant ij, qui suam originem in diui Pauli familiam falso referant.

Σφήκες, ἢ μέλισσαι.

VESPÆ, ET APES.

CAP. XLI.

Inter ferientium venenatorum notas, nihil de vespis, & apibus articulatim digessimus, quòd conspicuum omnibus sint, & nihil excellens, aut notatu dignum in his obseruetur: inter remedia tamen earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus vtrarumq; ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulnus instillatum, & muricæ, aut aquæ marinæ fots.

Vesparum, & apum ictus, & remedia.

Etsi vesparum, & apum ictus nemini vnquam attulerit necem, cum tamen dolores molestissimi inde quandoque oriuntur, non alienum, neque inutile fuerit ea nosse medicamenta, quibus facile idem mulceri possint. Quamobrè iam dictis à Dioscoride remedijs ea addenda duximus, quæ priuatim scribit Aetius libro 13. sic inquit: Si quis ab apibus, & vespis illasus permanere velit, eum malua folia cum oleo illita, & eruca, siue bruchus cum oleo illitus asseruabunt. Quandoquidem verò quidam ab his clanculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantq; se à maligno aliquo animante petitos esse, necessarium existimo prius ostendere quæ signa horum ictus comitentur. Hos itaque, qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperitur. Eadem etiam hos, quos vespa pupugit, concomitantur, sed intensiora: verùm stimulum vespa in percusso loco non relinquit. Auxilium autem vtrique ferunt luto, aut stercore bubulo eis illito cum posca: aut malua folijs impositis cum posca: aut cimolia cum malua & posca. Naturaliter autem opitulatur veneranda, & viuifica strombi conchylij imago in sigilla ferreo exculpta, & loco ictus appressa: non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu præterea ipsi foliorum lauri tenerorum drachmas duas cum vino austero præbet: hæc Aetius. Caterùm compertum est, dolorem statim sedari illitis muscis prius contritis. Id quod similiter præstant thymbra, melissophyllum, & sisymbrium.

Signa ictus apum & vesparum.

Φαλάγγια.

PHALANGIA.

CAP. XLII.

Demorsis à phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit: vbi verò contrariorum occursum refrixit, consequitur corpore

corpore toto tremor, distentiones poplitum & inguinum, conuulsionibus non dissimiles, in lumbis collectio exoritur, & perpetua vrinæ libido lacepsit. multaue reddendis excrementis colluctatio: vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusisque nebulis caligant. Horum ictibus ficulneum cinerem adiecto sale trito, & vino imponere oportet: aut radicem syluestris punice quam tenuissimè tritam: aut aristolochiam cum hordei farina, & aceto subactam. Ulcera aqua maris proluenda, aut apialtri decocto, foliaque eiusdem illinenda. Lauacris perpetim vtendum, & propinandum abrotoni semen: anisum, aristolochiâ, cicer syluestre, cuminû Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticè, & trifoliz herbæ semen: priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina conuenit: item myrica fructus, & chamæpityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum cum lacte, assumpto apij semine, confectum molestijs liberare prodant.

Phalangiorum genera quanquam plura à veteribus describuntur: tamen Actius libro 13. cap. 18. sex tantum numeratur, his verbis. In phalangiorum genere primum quidem rhagium, alterum lupum, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalum, sextum scoleciū appellant. Ac primum quidem Rhagium, id est, acmum, figura rotundum est, colore verò nigrum, acini vna nigra similitudine, vnde etiam appellationem accepit: & os quidem iuxta medium ventrem habet, pedes verò ex vtraque parte quam breuissimos. Alterum verò Lupus appellatum, muscas perdit, eiusque pascitur, ac corpus quidem habet latum & volubile, partes verò circa collum ipsis incisæ sunt: simplicius autem & os eius eminentias tres habet. Tertium autem Myrmecium, hoc est, formicarium dictum, formica maxima assimilatur, colore fuliginoso: corpus verò eius velut astris quibusdam insignitum est, maxime circa dorsum. Quartum deinde Cranocolaptes, sublongum est, & viride, stimulumque iuxta collum habet, atque si in quem irruat, locos circa caput perit. Quintum Sclerocephalum dictum, caput habet saxeum, & obduratum: lineamenta verò per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas. Sextum autem Scoleciū siue vermiculum appellatum, sublongum est, & submaculosum, maxime circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumerantur: hæcenus Actius. Qui tamen cuiuscunque phalangij notas, & indicia seorsum non descripsit (genus enim diuersum diuersa quoque parit symptomata) sed omnia in commune simul collegit. Quamobrem si particulatim cuiusque phalangij indicia per se scire cupimus, Nicandrum consulamus. Is siquidem in theriacis præter id quod plura, quam fecerit Actius, phalangiorum genera reddidit, singulorum etiam primarum indicia describit suis versibus, qui ita paraphrastice in Latine vertuntur. Opera iam nunc noxy considera phalangij, signaque eius morsus. Primus itaque splendidus Rhox appellatur, niger plane, accumulatu pedibus protrepens, medium ventrem ore, & dentibus septem habens. Cui ab hoc inflitum fuerit vulnus, perinde corpore apparet atque si nihil quicquam sauciatus foret: oculi verò inferiori parte rubescunt, frigus iuxta in corpore adhaeret, infigitur, statimque color, & membra hominis a supernis ad ima vergere videntur: neque penus semine vuidus demittitur, sed lumbos occupans ita frigus genuum nexus dissoluit. Asterion iam secundum obserua, in cuius dorso pinguis quadam relucens, ac lucida in corpore virgule. Percussus ab hoc inexpectatus horror cum flamme quodam odoritur, caput verò somnus grauat, genuum & membrorum nexus, & imbecillitas fit. Cyaneum aliud sublime, crinitum, & asperum equaliter est. Difficilem corpori inserit illud puncturam, quodcunque labefactauerit, corque graui languore succumbit. Nox & caligo tempora circumstant, vomitumque edit è collo lubricum, ab arancis telis non multum distantem, adeoque tandem interitum subministrat. Ab hoc alius est Agrostes, qui specie sua lupo similis est, muscarum interemptori, qui apum obseruator est, culicum qui psenes dicuntur, & astrorum, & omnium qua ad telam ipsius peruenerint. Hic imbellem plagam, & vanum vulnus homini infligit. Quod autem Dyderi, siue sphaecum appellant, rutilum satis, vespa crudus vescenti persimile. Hic si quempiam vulnerarit, ingens è vulnere tumor erigitur: morbi etiam quidam ad genua, alius etiam neruorum cordis, & venarum languentium trepidatio alias virium destitutio, vt percussus sapius domet, atque interimat. Extremi malefici animal, somnum adferens, qui hominem quiescere ab huius seculi laboribus faciat. Est præterea Formicariū dictum, quod formicæ plane simile sit, collo quidem rutilum, reliquum corpus nigredini ex putredine factæ, par est, vndique latum, stellatum dorsum, punctisque distinctum gerens, cui subcinericium tempus ad modicam ceruicem attollitur. Atque ex hoc phalangio dolores priorum similes venenatorum veniunt. Sunt & alia parua phalangia scarabeis similia, qua in agris inter legumina sua carpunt pascua. Horum circa cruciantem morsum tubercula, & pustula exurgunt, cor oberrans furit, lingua incondite obmurmurat, oculi etiam subuertuntur. Educatur in Aegypto in perseæ folijs, quem Cranocolapten dicunt, phalange similis, quæ circum lucernas cum impetu volitat nocte. Eius horribile semper caput incessanter nutat, vterius autem granatur. Illic vbi cuiuspiam stylum infixerit, quem ceruicetenus gerit, facile sanè contra omnem laborem ad interitum ducit: hæc Nicander. A quo tamen in hoc dissentit Actius, quod sclerocephalum ijs simile fecerit bestiolis, quæ noctu lucernas circumuolitant, Nicander verò huic cranocolapten comparauerit. Sed iam ea prosequamur, quæ de phalangiorum ictibus tradidit Actius, qui loco superius citato sic habet. Quæ percussos à phalangijs cõcomitantur, cõmunia sunt iuxta magnitudinē, & paruitatem discreta. Morsus porro tenuis est, vt vix conspici possit: tumor autem liuidus, quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua, lumbos, & scapulas, nonnūquam verò totū corpus aggrauatur: amplius & dolor asiduus adest, tremor, pallor, vigilia. Quibusdam verò pudendi tentigo, & circa caput pruritus, aliquando etiam circa suras: oculi humecti, & lachrymantes, ac caui, & venter inaequaliter eleuatur. Intumescit autem vniuersum corpus, faciesque, & maxime circa linguam partes, aded vt impedito sermone balbutiant demorfi. Quibusdam verò vrinæ emittenda difficultas adest, cum pudendi tentigine, & dolore. Si verò minxerint, aquosa ipsorum sunt vrinæ, quadam arancorum telis similia in se habentes, & vomitus quoque similis: aliquando verò & per vomitum, & per ventrem talia excernuntur. Ceterum in calidam aquam demissi, dolore leuati sibi videntur: post verò è balneo egredientibus intentum dolet pudendum. Senioribus verò pudendum plurimum laxatur, ac minime incenditur. Atque hæc quidem communiter ad omnium ictus sequuntur. Si verò cranocolaptes aliquem percusserit, caput magis dolet, & vertigines consequuntur, frigus continens, delirium, corporis iactatio, & ventriculi punctiones. Omnes autem à phalangijs percussi inuuantur asiduo balneo: ictus etiam locus ex trifolij bituminosi decocto, cum oleo proluatur, totū verò corpus ex cerato liquidissimo pinguescat. Inuuantur etiam fomento spongiarū in calido aceto tu Larum, & plaga continnè adhibitarum. Cataplasmata autem eū conueniunt: bulbi, sanguinaria, porrum, sursures aceto incocti, hordeacea farina incoctū cum ea in vino aut melle lauri folijs, ruta, grossi, caprinū steruus cum vino, amarus cum aceto, syluestris ruta cum aceto & cyperus: hæcenus Actius. Ceterum Dioscorides varijs in locis huius totius operis de medica materia plura alia medicamenta intus in corpus sumenda aduersus phalangiorum morsus commemorauit, præter ea quæ hoc capite speciatim retulit. Ea autem sunt, si summatim colligantur, myrris baccarum succum ex vino petunt, frigus

Phalangiorū genera ex Actio.

Phalang. genera, & morfus nota ex Nicandro. Rhox.

Asterion.

Agrostes.

Dyderi.

Formicariū.

Scarabeis similia.

Cranocola-

Phalangiorū ictuum signa & curatio ex Actio.

Tarantulae
venenum &
remedia vide
libro 11.

item foliorum mori cyathi mensura, lixiuium è fici vel caprifici cinere paratum, asparagi radicem decoctum, agrestis lactuca, coris semen, hederæ succus ex aceto potus, ruta ex vino hausta, hieracium, dauci semen, melanthium drachma pondere ex aqua potum, aparine, melissophyllum, & phalangium herba ex vino pota, pentaphyllum, & hyacinthi radix, sedum minus. Qua verò ad idem exterius illinenda commendauit, hæc sunt, nullus piscis dissectus, malua decoctum, aqua marina, & marinorum iuncorum tenella folia. Nec desunt composita medicamenta ab authoribus tradita, qua si quis videre & habere cupit, Galenū consulat libro secundo de antidotis, vbi valentissima describuntur antidota ad phalangiorum ictus, è pluribus veterum clarissimorum medicorum monumentis excerpta. In summa tamen legitima Theriaca, & Mithridatum contra phalangiorum venenum ceteris præstantiora censentur. Sunt etiamnum in phalangiorum genere recensenda, qua nobis in Hetruria TARANTVLAE vocantur: quarum historiam, & admiranda symptomata superius libro secundo abinde retulimus, cum de phalangijs differeremus. Quinetiam inibi docuimus, quo modo ab his ictu curentur musicis instrumentis, ductisq; quàm longissimis tripudijs, quare eo se conferre poterunt, qui hæc scire desiderant.

Σκολοπενδρα

SCOLOPENDRA.

CAP. XLIII.

SI Scolopendra, aut dicta ophioctene, morsum intulit, locus per ambitum liuore sugillatur, & computrescit: interdumque, licet raro, fæculentus, atque ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, vlcusque id negocium exhibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore prurigo sentitur. Hæc vbi morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus, ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

Scolopendrar
venenosa
consideratio.

Terrestres Scolopendras Hetrusci centipedas vocant. Sunt enim in Hetruria omnibus vulgaris notitia vermes, innumeris vtrinque pedibus referta, colore subrufo: diuerso quoque genere constant. Ceterum ea tantum ictu venenum relinquunt, qua quòd morsu serpentes interficiant, ophioctone appellantur, quarum tantum existimamus hoc loco meminisse Dioscoridem. Veruntamen qua in vniuerso genere ea sint, hætenus compertum non habeo. Quibusdam in regionibus tanta copia increuere scolopendra, vt fugati ab eis populi, proprios deseruerint lares, quod Arerietus contigisse scribit Theophrastus. Progreditur Scolopendra tam in anteriorem, quam in posteriorem partem. Idcirco scribit Aristoteles lib. 4. cap. 7. de historia animalium, quòd dissecta Scolopendra altera parte in caput, altera in caudam, mouetur & serpit. Vnde videtur existimasse Nicander, hanc biuipitem esse, vt eius verba in theriacis innuunt, cum inquit. Modicaque pemphredon, biceps-

Scolopendrar
morsus reme-
dia.

que scolopendra, cuius euntis ala, vt remi nauis, festinant. Non inepta quidem Nicandri comparatio: nam Scolopendrarum multitudinem velocique motu triremem representant. Harum morsibus (vt Dioscorides ait) auxiliantur aphodii semen, & flores ex vino poti. Quinetiam (vt scribit Aetius) ea omnia Scolopendra ictibus medentur, qua priuatim muræ aranei morsibus conueniunt, de quorum curatione paulò inferius dicemus. Præferunt antiquorum nonnulli cinerem acetosubactum, & vulnere illitum, item scillam: præterea pulegium, rutam, & mentham ex vino potam. De marinis Scolopendris tradidimus superius libro secundo. Nec tamen mihi compertum est, aliam noxam ab his inferri, quàm ingentem pruritum his tantum partibus, quibus inhaerint (vt scribit Aristoteles, & Dioscorides) earum erucarum more, qua pilis horrent, & que præsertim in pinu vitam agunt.

Scolopendra
marina.

Σcorpιός

SCORPIO.

CAP. XLIV.

Scorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurefcit, ac intentus rubet, vicissimque dolore premitur: modò siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horrois sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigerant, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor tanquam ex pungente acu, per vniuersam cutem sentitur. Percussis præsentis est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpius ipse, qui ictum vibrauit, tritus, & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cæcæ quandam naturarum (vt constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. Præterea tritus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpius conuenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplatri modo adiectum, auxiliatur. Iridem galbanum ad splendij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifolij herbæ trinum, & vulnere iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gentiana, & pulegium decoctum, & bacca lauri pauco numero trita, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino, & ruta, nec secus ficulneum lac: laferpitiu si adsit: sin desideretur, peucedani succo vtendum: efficax est potum trifolij, & ocimi semen. Horum autem omnium vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor, & dilutæ vini potiones.

Scorpionum
genera octo
ex Nicandro.

Plura, ac varia antiquis numerantur Scorpionum genera, vt latius libro secundo diximus, quorum alij multum, alij parum suo ictu officiant, alij verò pro diuersitate locorum nihil penitus ledunt. Id quod testatur etiam Aristoteles lib. 8. cap. 29. de Historia animalium his verbis. Morsus etiam beluarum ex locorum diuersitate plurimum differunt. Nam in Pharo, locisq; alijs non ledunt. Alijs verò & præcipue in Scythia multi, magni, & nocui sunt, adeo ut si vel hominem vel quamvis bestiam percusserint, interimunt: nec sues euadere possunt, quamuis ceteros virulentos ictus minime sentiant. Potè Nicander in Theriacis scribit eorum octo reperiri genera, his verbis: Agedum aculeo dolorifico armatum scorpionem canam, eiusq; tetricum genus. Quorum primus albicans, neque sorticus neq; letalis est. Sed cui rursus genam micant, calorem flagrantemque mortalibus furorem incussit, quo malo homines horrore concutuntur, & frigore, perinde ac qui febre diuexantur, & acri siti incenduntur. Qui liuidus est, malam trepidationem, & motionem tribus hominibus, quos percusserit, qui ceu attoniti, & vani, & stulti: dent. Alius viridante colore, qui simulac corpus hominis concusserit, tremores, & frigora illico admittit, acrisque grando talibus videtur circumstare, etiam si Sol ardentissimè radios suis flagret. Talis tantaque eius stimuli afflictio, cuius vertebra nouem (lego septem, cum non plures scorpionum

pionum caudis inesse comperiantur) iuncturis connexa apice suo nocent. Alius liuido colore, ingentem aluum gestat. Latumque herba enim vesceus, semper insaturabilis manet, corpus etiam hominis excedens, inguini insolubili ictu nocens: tam vehementis eius genus & ori morsus insitus infixusque est. Deprehendens utidem similem scorpionem litorali seu marino cancro, qui albescentes algas fluctumq; maris decerpit pascendo. Alij rursus incurtus aequales plane paguri videntur, corpore grandes, chelis, & forcipibus aque solidi atque paguri, qui in saxosis cauernis demorantes sibi timeant: quin etiam e paguris tales scorpiones, genus & ortum suum ducunt. Nam cum rupes tenues, que multum strepentis maris reliquerint algas, eos ex mari inescantes piscatores extrahunt. At paguri se peti ea venatione sentientes, murium rimas, & nido: subeunt, ubi prolem perditricem habent, ibique e mortuis tandem paguris scorpj nocentes per foramina ista generantur. Postremo melichlorus tibi animaduertendus, cuius summum verticillum prænigrum est, inextinctamque noxam infligit, hominibus certe insensibilis ille, obliquo gressu corpus flamma simile commouens: pueris vero, & natu minoribus celestem interitum adduxit: quibus & circum terga densa ala expanduntur locuste fruges rodenti non dissimiles: hætenus Nicander. Caterum scorpionum ictuum indicia, & curationem conscripsit diligentissimè Actius lib. 13. cap. 19. sic inquit: A Scorpio percussos vehementissimus plaga dolor consequitur, frigiditasque ac tensio, & stupor: circaque plagam, & totum corpus frigidus sudor: & his, qui iuxta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur, ac intumescunt: qui vero circa supernas, locum sub alis. Et hac quidem leuiter percussus adsunt. Validius autem ictus ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambustus, & verrucarum instar formicarum eruptio circa labra, & totum corpus, ut grandine se impeti putent. Facies distorquetur, sordes circa oculos adsunt glutinosa, & lachryma viscosa: durities articulorum, anis que procidit, cum egerendi cupiditate: spuma circa os est, & vomitus largus, singultus, conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur serpyllum, althææ radicem, & elaphoboscum bibendum præbeto. Præter opinionem autem facit elaphoboscus, tum viridis comesta, tum sicca pota. Cochleam item hortulanam maximè accipito, eamque vnâ cum operimento tritam, plagæ imponito, & confestim sedibus dolorem. Idem etiam vermes terreni facere dicuntur. Prodest præterea fluuiatilis cancer tritus, addito lasere, in vino potus. Confert verbenaca recta, aut viridis cataplasmatibus modo imposita, aut sicca in puluerem pota. Conducit etiamnum puluis ex aequalibus partibus cumini, melanthij, & viticis seminis confectus, & drachma: pendere ex vino potus. Datur & pastinaca semen, quin & pontica nuce: quippe hæ non modo in cibum sumpta, sed in cingulo quoque gestata, gestantem ab omni scorpionum ictu tutum reddunt: hæc ex Actio. Commune & vulgare remedium est plagam perungere ipsorum scorpionum oleo. Proinde oleum nostrum de scorpionibus, cuius antea sæpenumero mentionem fecimus, hæc in curatione maximopere conueniet. Scorpionum ictibus Dioscorides præter ea medicamenta, quorum hoc capite meminit, hæc quoq; sparsim in superioribus libris mederi tradidit: nempe amomū melle subactum, fluuiatiles cochleas, nullum piscem recentem, smaridem muria asseruatum, diuulsas lacertas, domesticos mures concisos, tritici farinam vino aut aceto subactam, sonchi & intubi succum, ocimum polentæ admistum, amaracum ex sale & aceto, hieracium, la serpity lachrymam, melissophyllum, chamapityn: verbasci illius folia, quod tantum aureum florem gerit, leucocyj aurei semen: & polemonia radicem, cui tantam vim contra scorpiones inesse quidam tradunt, ut ij ab his non feriantur, qui eam gestauerint: quos, si forte percussi fuerint, nihil tamen molesti passuros affirmant. Et hæc omnia prosunt tantum vulnere illusa. Quæ vero pota vel deuorata auxilium præstant, eiusdem testimonio, hæc erunt: fluuiatiles canceri triti, & cum asinino lacte poti: asinorum & equorum, qui in pascuis degunt, finum liquatum in vino, & posum: oxylapathi, & oxalidis semen ex vino aut ex aqua potum, agrestis lactuca: abrotoni hortensis, pastinacæ, hyacinthi, & vrticæ semen: quin & olusatrum, & heliotropium, & cardamomum, & myrrha, & myrti baccarum vinum. E quibus omnibus cum plura possint confici antidota, pro varia Medicorum intentione, non operæ pretium puto, nos hæc in re longiorem moram ducere, ut quæ potius perisistimæ cuiusque iudicio sit relinquenda.

Scorpionum ictus, & curatione ex Actio.

Remedium commune.

Remedia alia ex Diosc.

40 Τρυγών θαλάσσιον, σκορπίος καὶ δράκων θαλάσσιος. PASTINACA MARINA, SCORPIO ET DRACO MARINI. CAP. XLV.

SI Marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidua conuulsiones, lassitudo & imbecillitas, mēs percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentem non sentiat: hunc si quis premat, atra sanies, crassa, & male olens excernitur. Ei qui marina pastinaca ictus, omnia, quæ de viperarum morfu paulò post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, noxas excitant. Quibus absinthij, saluiæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Ipsi etiam dissecti, vulneribusque impositi, sui cuiusque ictus remedio sunt.

60 Qui à marina Pastinaca percussi sunt (ut testatum reliquit Actius) his vulneris locus manifestè apparet. Sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor. Acutum enim, & firmum habet aculeum, quo vehementissima vim altum impulso, nerui sauciantur: quapropter in aliquibus mors derepentè totum conuellens corpus comitatur. Narrant quidam, quòd si quis caudam pastinacæ, quæ ictum intulit, auferat, & in arborem maximè quercum, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arefcere, agrum autem sanari, atque id iuxta contraria affectionis, & remedij rationem: contingere. Id quod etiam asserit Nicander in theriacis, his planè verbis: Trygonem, hoc est, pastinacam, itidem maleficum, mareque vastantem draconem arcere noui. Dolor autem sic hominem afficit trygon, cum oblongis sageris defatigatum piscatorem a culco suo ceciderit: vel etiam ramis arboribus infixus fuerit, nam tum arbor ea sit obscurior ignobiliorque. Siquidem ab huius morfu, ceu salu est, eius & radices perdit & vna cum folijs flaccida redduntur, & arefcunt: homini vero caro putredine imminuitur: hæc Nicander. Caterum auxilium sentiunt percussi, ut Actius inquit, ubi stupor, & refrigeratio totius corporis consequatur, ex calidis illitionibus, & consimilibus cataplasmatibus. Proprie autem surfures aceto incocti, & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur, & ipsum adeò acetum pro sotu assusum maximè prodest. Magis autem conueniunt eu attractoria, & quæ tenuium partium sunt, ac calida, quo nimirum per attractoriam facultatem venenū ex profundo attractatur, & per calorem frigiditas mitigetur, & quæ tenuium sunt partium, in altum proreptent. Ad hæc igitur rem in promptu habebis apta, sulphur viuum vrina veteri subactum, marrubium, Lauri folia, echium, radicem panacis, saluiam, & similia. At verò si hæc desiderentur, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imponito: mirabiliter enim auxiliatur: Dato item lauri decoctum, aut succum Cyrenaicum cum myrrha magnitudine fabæ, ac medico pipere trito, ac dato

Pastinacæ marinae ictus signa.

Pastinacæ ictus remedia ex Actio & Nicander.

cum vino: aut silphium, aut laser ex vino: aut succi fici guttas quinq;, cum tribus serpylli granis bibendas præbe. Hac Aetius aduersus pastinaca marina ictus auxilia reddidit. Ad quos præterea commendatur saluia decoctum continuè pluribus diebus potum: quin & scordium in puluerem tritum, & ex sui ipsius decocto potum, itemque verbenaca. Non tamen ob id prætermittenda est Theriaca, aut Mithridatis antidotus, aut quinta nostra essentia, cuius iã saepe meminimus. Porro Nicander quoq; nonnulla remedia protulit, quæ hæc sunt. Anchusæ folia, quinq;folium, rubi flores, arctium, oxalis, lycopsis, tordilium, chamapitys, fagi cortex, agrestis pastinaca semen, terebinthi fructus, phycus marinus, adiantum, smyrnium, eryngium, libanotis, cachry, & vtrunq; papauer.

Μυγάλη

MVS ARANEVS.

CAP. XLVI.

AMure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens, exurit: proximæ partes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non ei dissimile, quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas vrinæ, & frigida asperginis offusio consequuntur. Huius morsibus auxiliatur ex galbano splenium, per se vulnere exterius impositum, vt medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quoque acinif dulcis punici decocti, & illiti: item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fofus: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si in vino detur: præterea serpyllum, & galbanum, & eruca vino madefacta: recentes cupressi pillulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino, & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneum contra suos ictus commodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ adnotaretur. Alij asseuerant, demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt.

Muris aranei morsus notæ.

Quamquam Mus araneus, qui, quod colore mustela sit similis, Græcis μυγάλη dicitur, ab omnibus inter venenata numeratur, attamen in agro Tridentino is nullam morsu infert noxam, quemadmodum nec scorpio. Historiam eius superius libro secundo retulimus, quare iam ad eius morsus notæ, & remedia progrediamur. Demorsis itaque ab eo (vt Aetius inquit) vulnera manifesta fiunt: quadrifido enim ordine illata vulnera conspiciuntur: & sanguis quidem primùm purus promanat, paulò post verò saniosus: animal enim ipsum putrefactione occidit. Consuerunt etiam bullæ insurgere, quæ si quis disrumpat, carnem subiacentem feculentam offendet, & fissuris disparatam. Inflatio autem sequitur demorsos. Ceterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosq; verberare impetere, non hominis modo, sed cuiusque etiam bruti animalis. Auxilium autem ferunt cum ob putrefactionem periclitantur demorsi, post prædicta communia remedia, lauritenella folia, vnius aut duarum drachmarum pondere, trita & ex vino pota. Conueniunt etiam ipsis omnia communia venenorum remedia è vino dulci in potu sumpta. In pecoribus verò & iumentis illa ipsa cum aqua trita, naribus infunde: est enim ipsis præsens remedium. Vnde etiam hominibus similiter in potu exhibeto. Morsus porro cumino, & allio, putamine extrinsecò non abiecto, contegatur. Eadem etiã cum oleo trita assiduè ac diligenter locis circumfisis illinantur. Si verò ruptæ fuerint bullæ, & vlcera oborta, acida muriæ proluatur locus, aspergaturque subinde vsti hordei puluere. Verum non rumpentur, nisi prægnans fuerit mus araneus, qui morsum inflixit. Quod si exulcerentur, malû punici dulcis putamen coctum tritum erit imponendum, & vlcera ex eodem decocto aut magis myrti decocto proluenda, fouendaq;. Strato verò inquit, in muris aranei morsu primùm scalpello, circumquaque vulnerandum esse locum, & murem subinde araneum vstum cum aceto imponendum, aut sinapi tritum, & aceto exceptum. In potu verò opem ferunt panax, eruca, capparis cortex, gentiana radix, & recta verbenaca, omnia ex vino pota, aut in cataplasmata conformata, & morsibus illita. Profunt & malua folia imposita, & magna antidota potui data.

Curatio.

Εχίδρα.

VIPERA.

CAP. XLVII.

SI vipera momordit, corpus intumet, vehementer arefcit, subalbūque colorem concipit. Sanies à vulnere profunditur, primùm subpinguis, mox cruenta: pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit. Gingiuarum cruore suffunduntur: inflamatio circa iecur erumpit: tormina, & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & vrinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Vbi verò vipera morsum impressit, primùm caprinum cum vino studiosè impositum opitulatur: item laurus & abrotonum, & galbanum splenij loco superiectum, & origanum viride inditum: pulli gallinarum discerpti, & confestim admoti: erui farina vino subacta: radicis cortex vique eò tulus, vt in puluerem solutus abeat, & scilla tostæ detritum chamæmelum, hordeaceæ farinae cataplasma in aceto mulso præparatum, sed locus ante eò calido foueatur: hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in vino terni oboli bibuntur, & portacei succi hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia mandenda, & capæ, & porri recentes, falsamenta acerrima, & opipara: simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclare auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorij, floris portulacæ feminisque, dimidio acetabulo constat: hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Estristratus in eo libro, qui ἐξὶ θυνάμεων, id est de viribus, inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudantur. Gallinacea cerebella cum vino pota, semélatiux brasiæ tritū, & acetabuli mensura cū vino potum. Quinetiam bonum est digitū in liquidam picem intingere, deinde vinū, quo digitus fuerit elurus bibere. Hæc sunt quæ contra viperæ ictus auxiliantur.

Viperarum morsus indicia ex Actio.

Viperarum historiam exactius, vt puto, latiusq; libro secundo tradidimus, quam vt operapretium sit hic eandem repetere, vel plura nobis supersint addenda. Quare tantum reliquū est, vt iam de earum morsu indicijs, & remedijs differamus. Reperiuntur itaq; in eis, vt Aetius memoria prodidit, quos vipera in se momordit, vulnera in loco lina: in his vero quæ a femina demorsi sunt, quaterna. Primū autē ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta, & oleosa. Adesi tumor bilio-

- biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus, denigratus, & proserpens. Siccitas vehemens inest ori, ardor, exolutio, & frigidi horroris insultus, aliquando & bilis vomitus, tormina, capiti grauitas, vertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plumbeus, & frigidus sudor. Mors in horu septem, aut vt longissime absit, tertia die, in his qui non feruantur, & maximè his, qui à vipera summa sunt icti: hac ille. Quæ omnia Nicandro accepta referri possunt: siquidem u
- in theriacis ita ad Latinum sensum scribit. Hinc luctum a vipera manantem viatores diuulgant: duos enim instar nerui a-
 cutos masculi dentes in ore suo virus eructantes, ostentant: vipera vero femina semper plures exeret, pernicioso suo ore in-
 sultans. Atqui in carne icti facile latos dentes perpendas. Porro è vipera inslicta plaga sanies aliàs pinguedini similis, aliàs
 cruenta, interdum sine vlllo colore cõspicitur. Sed quæ vlcus ipsum caro circumdat, germinans grauis offert sese tumore: inter-
 dum rubens, tumq; palam liuida cernitur: quandoque etiam aquosum onus concipit. Frequentes præterea bulla, ceu vacui
 10 per ignem tumores, perinde ac corpus igni sit ambustum, in cute supernè ebulliunt: illic subinde putredines circumcirca ac-
 currunt, alià quidem seorsum à vulnere, alià circa plagam veneno non diu, inuicem mortem edentes. Aspera itaque noxa,
 vehementerque ignescens totum corpus exedit: hic per guttur, atque collum coeunt sonitus, agminatim strepunt: quinet-
 iam oculorum vertigine mœret. Illicoque membris grauans imbecillitas, & lumbis anxietas venit: at in capite caliginosum
 onus consistit. Atqui laborans ille aliàs siti aridum guttur suum exiccat, saepeque ex vnguibus eum frigus tenet. Hyberna
 autem niue exuberans grando, omnia membra grauatur. Crebrò etiam biliosos ventris sui humores expuit, toto corpore pal-
 lens, ac buiens circa membra sudor niuis iactu frigidiori circumfunditur. Colorem interdum liuidi plumbi gerit, aliàs ob-
 scurum, mox floribus similis est eris: hæcenus Nicander. Præstat igitur (vt Aetius auctor est) priusquam cruenta prodeat
 vrina, alij plurimum deuorare, & vinum meracum copiosum bibere, excitatus subinde vomitibus. Efficacissimum enim
 20 eis remedium est allij esus, ac meracior vini potio, inquit Archigenes, adè vt si quis multum eius sustineat vsus, itenique me-
 ri potum, nullo alio auxilio opus habeat. Conuenit item maximè Theriaca ex viperis sine dilatione pota, & vulnere illico
 superposita. Quin & ipsa vipera excoriata, capite & cauda abscisis, interaneis omnibus reiectis, anguillarum modo co-
 cta, & à demorsis deuorata, maximum ictus præfidium affert. Caput autem à viua amputatum, diligenter per volsellam
 prehensum, morsuique impositum, ea parte adhuc calente, quæ ceruicem contingit, venenum id mirificè extrahit. Condu-
 cit & dissectam gallinam adhuc internè calentem morsui imponere, idque alijs pariter dissectis, frequenter & assidue repe-
 tere. Oportet etiam scalpello per ambitum demorsum locum circumcidere, & cucurbitulas subinde admoouere. A cucurbi-
 tulus foliorum fraxini succus in potu exhibendus est, & expressa à succo folia vulnere illinenda, est enim valde efficax ad vi-
 perarum morsus fraxinus arbor. Melissophylli item folia, & succus tum ex vino potus, tum vulnere exterius illitus, euident
 auxilium confert, etiam si iam moriatur eger. Aiunt præterea, si quis melanthi drachmas quatuor edat, non moriturum.
- 30 Similiter etiam metaphroditos herba efficax est, & cancri fluuiales cum lacte triti, & poti, & vulnere adhibiti. Magnificè
 etiam profunt rana cocta, & in cibum sumpta & iusculum earum subinde bibitum. Præstat & nasturtium plurimum e-
 dere, vel tritum ex vino bibere. Facit autem ad id mirificè testudinis sanguis exiccat & cum syluestri cumino potus. V-
 tendum etiam omnibus communibus remedijs, supra sapius relatis: quippe superuacaneum fuerit eadem tam saepe repetere.
 Maximè verò vtendum est anchusa radice, & heliotropio cum vino: dandus & hamatites lapis. Auxiliantur & raphani
 in cibo accepti, & deinde vomitu reiecti, exhibitæ statim à vomitu Andromachi Theriaca. Post scarificationem, & galli-
 narum impositionem, vulnus ex trifolij bituminosi decocto calido, diu proluendū ac fouendum est, nam si pauco id tempore
 fiat, demorsi peius afficiuntur. Deinde porrum & panem cum sale illini conuenit, aut allium cum aceto, aut ipsius exusti,
 aut fraxini cinerem, aut alium quemuis cum aceto, aut hastula regia, aut sycomorî folia cum pane: aut lauri tenellis folijs,
 coctis & cum oleo tritis integatur locus aut caprino stercore, priusquam claudatur. Caterum vt libro de theriaca ad Pisonem
 40 auctor est Galenus, nò modo è viperarum morsibus retrahitur venenū, appposito tantum vt Aetius inquit, vipera capite, sed
 ipsa quoque vipera tota contusa, & vulnere imposita. Contra viperarum morsus mirificè medetur echij epotus succus, herba-
 que ipsa vulnere imposita, vt superius libro quarto prodidimus, illius Alcibi historiam referentes, à quo echium Alcibiadi
 cognomentum accepit: quandoquidem planta hæc (vt ipse Dioscorides testatur) facultatibus adè præstantibus insignitur,
 vt epota eius radix ex vino, non percussis modò à serpentibus opitulatur, sed eos quoque qui antea biberint, ferri non pasia-
 tur. Commendauit etiamnum aduersus viperarum morsus Dioscorides sparsim in suis de medica materia libris, præter ea
 quæ hoc capite retulit, alià præstantissima simplicia medicamenta, partim exterius applicanda, partim bibenda, vel com-
 edenda, quorum nonnulla hic subiiciam. Vulnere igitur exterius illita conferunt, iuniperi, & fraxini folia: tritici surfures
 ex ruta decocto incocta: erui farina vino macerata, scilla ex aceto seruesceta: personata, ebuli, & sambuci radices in vino e-
 lixata: sarmentitius cinis aceto subactus, aliæque complura, quæ breuitati studentes nunc silentio inuoluimus. Potæ verò
 50 profunt castia odorata, costum, myrica semen, pistacia, cerui genitale exiccatum, tritum & potum, ebondrylla, anagallidis
 succus, ferula medulla, aparine, rubia radice, & terrestris tribuli succus: auxiliatur etiam bryonia radix. Admiran-
 dos insuper præbet effectus radix illa, quam Goritienses ab auxiliari eius vi Serpentinam vocant, cuius historiam, pariterq;
 vsus rationem superius libro secundo tradidimus. Verum præter hæc præstantaneo remedio sanat nostra quinta essentia,
 cochlearis mensura pluries eodem die pota: item oleum nostrum de scorpionibus, de quo etiam sapius dictum est, ea ratione
 inunctum, quæ superius ipsius consiciendi modum describentes retulimus. In viperarum quoque genere ea nimirum im-
 manis fera recenseri potest, quam AMMODITEN vocant, cuius etsi nusquam, quod extet, meminert Dioscorides, minimè
 tamen silentio prætereundum est, quin hæc eiusque veneni remedia describantur. Siquidem Ammodite, meo iudicio, in plu-
 ribus Italia & Illyria locis reperiuntur, præsertim in Goritiensi comitatu, & Iapidia montibus. Est enim fera hæc vipera
 omnino similis, præterquam quod capite sit ampliore, & maxillis latoribus, quodque vltimo rostro superiori parte emi-
 60 nentiam quandam habeat, acutæ verrucæ similem. Vnde circumforanei, qui serpentes eorumque veneni remedia proffi-
 tentur, hanc feram vulgò appellant Aspido del corno, hoc est Aspidem cornutum. Neque sane inceptum illi nomen inuide-
 runt, namque non minori cum velocitate interficit, quam aspis. Scimus enim quosdam ab hu inopinate demorsos, tribus
 tantum horis morte occubuisse. Proinde scite libro 13. cap. 25. de cocta scriptum reliquit Aetius. Ammodites magnitudine
 quidem cubitalis est (maior enim non pingitur, neque scribitur) colore verò arcuosus, per corpus autem maculis nigris infi-
 gnitus, caudam habet præduram, supernè descissam. A quibusdam verò Cenchiis, hoc est militari, ob caudam instar mili dū-
 ritiam, appellatus est. Latiores autem maxillas, quæ vipera habet, cumque in multis aliàs ei similis sit, colore magis di-
 scerni potest: vipera enim sublaua est. Caterum ab Ammodite percussos festina vt plurimum mors sequitur: qui vero tam
 breui non pereunt, his sanguis è vulnere manat, & vulnus intumescit: sed paulo post sanies effertur, sequitur capitis graui-
 tas, & animi deliquium. Qui verò optime dispositi sunt, & robusti, in triduo intereunt: quanquam reperti sunt, qui in
 septimum vsque diem durarint. Celerius verò mors aduenit his, qui à femina sauciantur. Auxilium porro & y ferunt, pri-
 mum

Ex Nicandro
indicia.Viperarum
morsus reme-
dia.Simplicia me-
dicamenta ex
Diosc.Ammodite
historia, & ve-
nena vis.Ammodite
morsus signa,
& curatio.

Sepis feræ cō
sideratio.

mum quidem à communibus remedijs, vt pote ab adfixis cucurbitulis, circunciso prius per ambitum vulneris loco, & superioribus partibus arctissimis vinculis constrictis: quin absissa, dilatataq; statim scalpello plaga. Proprie autem ei auxiliatur mentha ex aqua mulsa pota, castorium, castia, & artemisia succus cum aqua. Danda etiam in potu Theriace, nec non vulneri eadem illinenda. Vtendium & emplastris attractorijs, & subinde cataplasmata, qua ad nomas siue vlcera serpentina conducunt, imponenda. Vipera praterea similis, vt quidam tradunt, ea etiam fera fuerit, quam SEPA nominant, cuius historiam superius libro secundo retulimus, quanquam inibi Dioscorides Sepem lacerta generi assignauit, vnde & eam lacertam Chalcidicam à quibusdam vocari tradidit. Itaque cum varia sit apud authores Sepis historia, facile adducor, vt credam, Sepa reperiri non modo in lacertarum sed etiam in mortiferarum serpentium, & viperarum genere. Quod sanè videtur asserere Nicander in theriacis suis. Siquidem cum inquit primo: Praterea niualis, & asper admodum mons Othrys rubentes bestias profert, cauaque vallis; & jalebrosa rupes, ucmorosumq; promontorium, vbi sitibundus ingreditur 10 Seps, colore nunquam vno visus, & c. haud dubie offendit serpentem, immanemque feram se representare, non autem lacertam. Cum verò secundo ait: Sepem item corpore demisso, exiguis haud dissimilem lacertis, declinabis, nulli dubium est, quin eam descripserit, quam Chalcidicam lacertam vocant. Nicandro subscribit Dioscorides, quippe qui etsi libro secundo ea ratione Sepa statim post lacertas reddiderit, quòd lacertis corpore, & forma sit similis, attamen libro quinto, Sepa viperarum generi adscripsit, vbi de aceti mulsi viribus differens inquit. Acetum mulsum contra morsum eius vipera, quam Sepa vocant, haustum meconium, ixiame auxilio est. Actius tamen eius Sepis tantum meminit, qua inter mortiferos serpentes, vel vipera genera recensetur, his verbis: Serpens, qui Seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum reperitur: ex crasso autem in tenuem abit: recta verò ac tarde proserpit. Caput habet latum, os acutum: vniuersum autem corpus multo 20 albis notis respersum. Sed aliter de Sepis forma, magnitudine, & gressu tradidit Pausanias, vt superius libro secundo suo la-

Sepis morfus
figna, & reme
dia.

co adnotatum reliquimus. Caterum ab ea percussus (vt tradit Actius) sanguis è vulnere manifestus excernitur, & paulò post sanies graueolens, tumor, & dolor segnis est, sed affecta partes putrefacta dealbatur, & totum corpus vitiligini, qua alphas appellatur, simili colore inficitur. Pili, capillique e toto corpore desluunt, atque intra tres aut quatuor dies icli pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex ystè rebus, qua in vipera, & cerasia, & ammodite morfu relata sunt. Exhibenda est praterea portulaca plurima in cibo, & vinum bibendum myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutam, morfui imponere, & ex butyro cum melle locum illinire, aut milium cum melle, aut paleas vnà cum terra, qua eis adheret, exusta imponere, Hæc Actius. Ex quib. facile conijci potest, cū amba hæ fera è viperarum sint genere, ijs tunc antidotis earum venenum superari posse, quibus vipereum frangitur, & euincitur. Sed quoniam hæc humana vitæ tam inimica animalia ali-

Acontia hi-
stor. morfus
notæ, & cura.

am admodum perniciosam feram mihi in mentem reuocarunt, qua Græcis ideo ACONTIA appellatur, quod iaculi, vel sagitta modo in hominem profiliat, cum nihil de ea à Dioscoride memoria proditum sit, sciuerimq; & hanc in Italia reperiri: 30 non alienum duxi de eius historia ac veneni curatione ea hoc loco commemorare, qua ex probatis authoribus excerpti. Hanc itaque describens Galenus libro de theriaca ad Pisonem, inquit. Acontias serpens, vbi se multum extenderit, seu iaculum quoddam corporibus insiliens, sic perimit. Hæc vt Actius scriptis tradidit, serpens est duorum cubitorum magnitudine, figura autem crassa in tenuem abeunte, colore viridi, praesertim iuxta ventrem, vt milium colore referat, vnde & cenchrias, hoc est miliaris, appellatur. Aiunt hanc fortiolem fieri, cum milium floret. Porro vbi se ad ladendum parat, extendit se ipsam, ac veluti iaculum vibratum corporibus inuolat, atque hoc modo verberat. Ab huius morfu omnia, qua de vipera dicta sunt, sequuntur accidentia, atque etiam grauiora, adeò vt etiam putrefactiones, & carniū defluxus consequantur, ac grauior item mors succedat. Caterum remedia similiter eadem, qua ad vipera morsum his conducunt. Est qui referat inter recentiores non obscurus author, quòd cum pastor quidam misellus, sub cuiusdam arboris vmbra estate media quietem somnumq; caperet, cuius socij non procul oues pascebant, ab Acontia, qua in arborem ascenderat, ita percussus fuit in sinistram mamillam, vt illico perierit: at socij audito percussione sonitu, viso serpente, quem nouerant, super defuncti pectus, relicto grege in propinquum rus, pauore territi, aufugerunt. Confirmat hoc Iulius Solinus cap. 30. Polyhist. his verbis: Iaculi arbores subeunt, è quibus vi maxima turbinati penetrant animal, quodcunque obuium fortuna fecerit. Reperitur hoc seuissimi serpentis genus, vt quidam mihi retulerunt, in quibusdam Calabria, & Sicilia locis, vbi ipsum incolæ à sagitta Saettone, vernaculo nomine appellant.

Σεντάλη, καὶ ἀμφισβᾶνα. CÆCILIA, ET AMPHISBÆNA. CAP. XLVIII

CONFIMILIA supra dictis in vipera eueniunt ijs, qui à cæcilia nomine, & amphisbæna demorfi sunt, eademque ferè auxiliantur: quare hoc venenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque visum est dignum, quod alio genere cōprehendatur. De ijs autem mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad vipersas scriptis, percussi ab eis adiuuari soleant.

Amphisbæ-
ne, & Cæciliæ
confid.

NON desunt, qui scripserint, Amphisbanam prater natura institutum duobus cum capitibus gigni, qua vtranque serpentis extremitatem occupent: fierique ob id putent, vt fera in vtranque partem repat. Quod tamen fabulosum censemus: nam & hydræ poeta septem capitibus constare fabulantur: id quod nihilominus falsum est. Verantamen non negauerim ego id monstrosè, & prater natura intentionem euenire non posse, in omni serpentium ouiparorum genere, quemadmodum & volatiliū. Siquidem pluries compertum est, ex vno tantum ouo duobus vitellis referto, nasci pullum modò habentem quatuor alas, modò totidem crura, totidemque pedes: atque etiam lacerta visa sunt aliquando bicipites. Sed hæc non vtique statuunt, haberi aliquod serpentium genus natura biceps. Hoc scitissimè, & apertissimè confirmat Aristoteles libro, & capite tertio de generatione animalium, sic inquit: Monstra rarè admodum fiunt in ijs, qua singulos pariunt, sed crebrius in ijs quorum partus est numerosus, & præcipue in auium genere, potissimumque in gallinis. Iis enim partibus numerosus, non modo, quòd sape pariunt, vt columba: verum etiam quòd multos simul conceptus intra se continent, & temporibus omnibus cocant. Hinc gemina etiam pariunt plura: coherent enim conceptus, quoniam in propinquo alteri est, quomodo interdum fructus arborum complures. Quod si vitella distinguuntur membrana, gemini pulli discreti sine vlla superuacua parte generantur. Sed si vitella continuantur, nec vlla interiecta membrana disterminantur, pulli ex ijs monstrifici prodeunt, corpore, & capite vno, cruribus quaternis, alis totidem: quoniam superiora ex albumine generantur, & prius: (vitellum enim cibo ys est) pars autem inferior postea instituitur, quanquam cibo idem, indistinctusque suppeditatur. Iam serpens etiam biceps visus est, videlicet eadem de causa: nam id quoque genus ouo parit, & mul-

Monstra in a-
uium genere

& multa numero: hac Aristoteles. Quae sanè mihi facile persuadent, ut credam, omnino falsum esse, quòd Amphibiana ex sui generis natura biceps perpetuò nascatur. Verùm quandoquidem hoc serpentis genus terrestrium: lumbricorum in modo vtriusq; extremitatibus, capite scilicet, & cauda, acuminatis gignitur, adeò ut difficillime possit caput à cauda discerni. existimare quidam hanc feram duobus constare capitibus. Proinde Aetius lib. 13. cap. 28. scribit, Scytalam (hanc alij Ceciliam interpretantur) & Amphibianam animalia esse inter se similia. Non enim, inquit, ex crasus in caudam tenuem abeunt, sed equalis crassitudinis in vniuersum existunt, ut neque cognoscant videntes ea, iuxta vtram partem caput aut cauda sint sita. Quod equidem tum in terrenis & alui tineis, tum in erucis quibusdam, tum etiam in hirudinibus conficitur. Differt autem, ut idem tradit, amphibiana à scytala, quòd illa ex vtraque parte progrediatur, vnde à Græcis illi nomen inditum est. Galenus porro libro de theriaca ad Pisonem, Amphibianam bicipitem esse existimat: si tamen liber u adscriptitius non est) ut hac verba, qua in eo leguntur, aperte ostendunt. Amphibiana, est autem animal biceps, quemadmodum (ane & nauigia vtrinque proram habentia, cui natura ex superfluo substantia bina capita est largita) hoc inquam animal, aut, si mulier grauida supergressa fuerit, malè abortum facit: hac ille. Caterùm, ut ipse Aetius scriptum reliquit, ab vtraque demorsis contingit morsum obscurum esse, ac vix apparere, veluti sunt muscarum ictus: quapropter etiam si mordant, non enecant tamen, sed inflammationem excitant, ut apum & vesparum stimulus. Quare transferantur ad hos quoque, quae de illis sunt relata, verùm facultate intensiore. Ex his etiam Aetij verbis conyici potest, cum horum animalium ictus admodum tenuis, & obscurus sit, Amphibiana caput inesse terrenis vermibus, vel alui tineis persimile, ac proinde adeò etiam cauda amulum, ut alterum ab altera non nisi difficillè discerni possit. Ceciliam autem Hetrusci vulgo appellant Lucignola. Amphibiana corium, authore Nicandro, olea stri baculo circumuestitum, si manibus frigore torpentibus tractetur, calorem statim adfert, articulorumq; nexus dissoluit.

Ampl. biceps na biceps nō est

Vtrinque, morsus signa, & curatio.

Δρύινος

DRYINVS.

CAP. XLIX.

ADryino morsus pustulae, molestique dolores incidunt, praesertim qua diluta saniei emissarium subest: quin etiam erofio, torminaeque consequuntur. Ab eo ictus conuenit aristolochia cum vino pota, trifolium herba, radix hastulae regiae similiter assumpta, & fructus ex omni glandiferarum arborum genere & tulae ilicis radices, & illitae parti ictae auxiliantur.

DRyinus, ut in theriacis testatam reliquit Nicander, in quercibus latebras parat, aut alicubi in concauis fugis, in montibus versatur. Appellant enim alio nomine etiam hydram, sed & alij chelydram, qui relictis bryis, palude, suaeque natura idoneo lacu venatu intercipit in pratis molurides, & ranas. Hic si à myope musca illa quauis animantia prouocante, petatur, insuetum illum impetum suscipiens, cum concaua quercus robur celeri saltu subit, structo sibi in imo cespite cubili. Candet tergo, caput illi aequale, adeoque hydro simile: grauis autem fector à corpore eius euaporat. Quemadmodum quando incurua, nec non abrasa cori praesegmina sub teretibus ferramentis circa humentes equorum exuuias, & pelles hument. Si quempiam is vel in talum, vel pedus plantam percusserit, à corpore icti hominis difficilis odor sparsus fertur, atque circa ictum niger in acutum surgit tumor, mentemque moerentis angor, & tristitia, quibus detinetur, obscurant. Species nimio dolore confluescit, & perit: cutis cum corpore admodum male olet, adeò ipsum atrum venenum semper depascens consumit, quin & caligo lumina eius obfuscans, occultansque malè affectum perdit. Alij à dryino icti caprarum instar seu ouium balant, ac omnino difficiles redduntur, impendioque cruciantur. Vrina eis decutitur, & pallescit: Ipsi verò dormitantes stertunt, frequentibus singultibus correpti, alias per collum vomitum fellis similem, alias cruentum eructantes, ipsi quoque malum acrem sitim generat: postremò laborantibus membris tremorem effundit: hac Nicander. Caterùm Dryini nomen huic ferae mortifera inditum est, quòd in quercuum cauernis, quae propè radices sunt, stabuletur. Græcis enim quercus & pōc dicitur. Proinde Galenus lib. de theriaca ad Pisonem, de Dryino ita scribit. Dryinus serpens sic nominatus, quòd in radicibus quercuum viuat, tam malignus ad perdendum proditur, ut eius, qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excoriatur, tota crura admodum intumescant, & quod magis mirificum est, manus quoque ipsa curantium eodem modo periclitentur. Si autem quis aggrediatur eum perimere, olfactu adeò mulctari aiunt, ut quenilibet gratum odorem prauum esse existimet, nec alterius praeter eaei queat sentire: haec Galenus. Dryino, ut Aetius inquit, abundat Hellestus. Is latibula in quercuum radicibus habet, atque adeò foetidus est, ut etiam si quis eum non videat, fectore loci cognoscatur. Est autem cubitorum duorum longitudine, obesus, ac asperissimis squamis circ. vniuersum corpus manitus. Porro qui ab eo percussuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor vehemens, nomia, delirium, corporis siccitas, singultus, biliosus vomitus aut omnino simplex, vrina suppressio, tremor, interceptio vocis, stupor, scissura, & mortificatio percussorum locorum: plurimi etiam intereunt. Porro & hi quoque, ex ijs, quae in vipera morsus dicta sunt, opem sentiunt: itemq; ex communibus remedijs iuxta consequentium accessionum proportionem adhibitu.

Dryini historia, & eius ictus nota ex Nicandro.

Ex Galeno.

Dryini descriptio, & morsus curatio.

Ἄιμορροῦς, ἐξήντητος

HÆMORRHOVS, ET DIPSAS.

CAP. L.

AB hæmorrhoo ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angusta, contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus sudor effluit, & quacunq; parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eiiciuntur, profluensque sanguis in globo coit. A pulmone languinem extulsiunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriantur. Quos verò dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque vsque ad pertinax, ut satiari non possit, ac sine vlla interapedine excruciet: & si potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint: quare propter continuam sitim, & praeter, & causon, aut dipsas appellatur. Hæmorrhoi, dipsadisque mortuus velut immedicabiles, à plerisque maiorum deplorati relinquebantur, quare si peculiaribus contra dipsadem remedijs egeamus, communia experiri operereperitium erit. Protinus autem scarificatione vti, vstionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit: consequenter quàm acerrima cataplasmata admo- uere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à salamentis, vtilis esse. Me-

ca potiones, & lauacra profunt, quæ subinde interiecto breui spatio assumenda sunt, priusquam morbi genus emerferit, quo semel erumpente opem ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmorrhoidis eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantur, vt Icarificationes, vstiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc indipsade definiuimus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle trita.

Hæmorrhoi
perniciolus
ictus, & histo.

Hæmorrhous, & Hæmorrhoidis, authore Galeno in libro de theriaca ad Pisonem, suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem inferunt: quippe percussis sanguine per os, & nares, totoque corpore effuso, intereunt. Hic (vt in Theriacis cecinit Nicander) petrosas rimas assiduo incolit, asperum, supinum, & modice pendentem lectum illic sumens, vbi tractum suum habeat, deinde pabulo satur fiat. Longitudo eius pedis vestigio equalis: ceterum quod ad latitudinem attinet, à capite adusque caudam totus & subtilis, & minutus est. Aliàs colore igneo, aliàs rursus candens. Collo satis constricto est, gracilis cauda necessario in arctum contracta, extensa est angustè, & tenuiter. Supra eius frigidus, & niuales oculos, duo cornua fronti sunt infusa: albore luminum suorum, locustis vel sylvestribus apibus par. Insuper horribile, & asperum ei caput horret, oblique modico corpore suo instar cerasta claudicans. Ex medio etiam dorso paruus nauigium semper appellit, ad terram ventrem suum atterens: squamis verò & itinere parum substrepit, perinde ac arundinis copiam transeat. Post ictum statim decolor species accurrit, nigræ: nimirum, corq; ipsum dolore circumangitur: venter aqua refertus effluit. Quin & prima nocte: sanguis cum ex naribus, tum collo, & auribus salit, recens bilioso veneno coinquinatus: lotium item rubens accurrit, quæq; in corpore sunt vulnera, & plaga, hæmorrhoidis rumpuntur aperianturq;: cutes enim fuligine contrahuntur. Caueas itaq; in primis, ne in te scemina hæmorrhoidis virus suum iaculetur. Nam si cui morsum illa inflixerit, eisingiua simul ignescunt, penitusq; & vnguibus sanguis cum impetu procurrit. Dentes etiam ex ea cade graeolentes, sentientes molunt: hæc ex Nicandro. Cui subscribit Aetius, sic inquiens. Animalia hæc (hæmorrhoidum, & hæmorrhoida intellige) colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem caudam angusta figura paulatim defluunt. Sunt autem igneo oculorum fulgore, rectaq; & tarde proreptant. Per corpus verò multis notis albis, & nigris variegata sunt, & asperioribus squamis obstita: quapropter dum serpunt, sonus auditur. Et scemina quidem ventri incumbens, per terram reptat, & gressum inferne circa caudam firmat: mas verò circa ventrem ingressu nititur, & collum serpendo extendit. Consequitur horum morsum color icti loci cruentus, coloris terri, & nigricans: ex quo nihil in initio effluit, præter quam paucum quidpiã aquosum. Ventriculus dolore tentatur, adestq; spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex ipsius morsus foraminibus: & si qua in corpus obducta iamdiu sit cicatrix, ea rumpitur, & sanguinem profundit, atq; hæc quidem in maris Hæmorrhoidis morsu contingunt. A scemina verò Hæmorrhoidis morsu ad hæc & anguli oculorum, dentium gingiue, & vnguium radices sanguine manant, & vt simpliciter dicam, per omne corpus sanguinem efferi contingit. Dentes præterea exidunt, & gingiua putrescunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo ijs medicamentis, quæ aptè sanguinem sistere possunt, deinde cataplasmata plaga imponendo ex folijs vitis coctis tritis cum melle, & portulacæ folijs cum polenta. Antea verò quam cruenta prodeat vrina, alijs multum deuorent, multumq; vini diluti bibant, & ad vomitum cogantur, deinde confestim Theriace exhibeatur, & postea pisces multos, alijs tritis cum oleo tinctos edant. Sumant item in cibo panem, & vuam passam dulcem, & deinde vino diluto largè hausto vomant. Plaga verò aqua frigida proluatur: vesica autem spongij calidis foueatur. Sed iam de DIPSADE differamus, quæ sic à Græcis dicta est, quod continuam, & inextinguibilem sitim excitet. Huius mentionem fecit Galenus lib. 11. simp. medic. vbi eiusmodi feras in Lybia, non in Italia reperiri scribit: quod hæc regio humida sit, illa verò sicissima. Hoc autem à Marsis, qui Romæ viperas venabantur, accepisse ait, quibus tamen non in omnibus fidem adhibendam esse existimant. Quare longè minus nos ijs circūseraneis fidem præstare debemus, qui Marsos hosce imitati, diuisi Pauli generi se adscribunt, seq; inde ortū duxisse prædicant. Nam si Galeni etate hi mēdacissimi nebulones vniuerso orbi imponebant, veri quidem similimū est, eos qui hodie per Italiã vagantur, longè magis decipere posse, quã fecerint Marsi illi antiqui, quippe nō dubitandum, quin eorū astus à Galeni seculo in hūc vsq; diē protractus, maximū susceperit incrementū, q; constet mortaliū ingenia tam in bonū, quã in malū procliuia, etate magis acui. Meminit etiã Dipsadis Gal. li. de theriaca ad Pisonē, sic scribens. A Dipsade comorfi causo febris male conficiuntur: nam & multa sitis, & astu vehemēti vexati, interdū & disrupti diem obeunt. His Galeni verbis subscribit Aetius lib. 13. vbi sic inquit: Dipsas, quæ à quibusdam Causus appellatur, vipera est species, quæ magis in maritimis locis reperitur, quã alibi, magnitudine cubit ali, ex crassa in tenuē desinē: notas autē habet per omne corpus fuluas, & nigras: caput verò angustius. Sequitur autē ab ea demorsos, præter ea quæ de vipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planē, atq; vt etiam si multus potus eis adhibeatur, sitis non sedetur: & tamen neq; per vrinas, neq; per vomitum, neque per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereunt modis, aut ob multam sitim exusti, si potum non sumant: aut ob multam potus repletionem distentus rumpitur venter, vel infernè circa inguina, vel circa imum ventrem, vt in aqua inter cutem sapius euenit. Ceterum & his, ceu à vipera demorsis, auxiliamur: propriè autem in his potiones magis vrinam cientes exhibeantur. Alius item per infusum etuatur, & oleo cum decoctis exhibito, ad vomitum cogendi sunt male affecti. Ad plaga verò locum, post exustionem, circumcisionem circumquaque scalpello factam, cucurbitularum affixionem & dissecta. gallinas admotas, calx viua cum oleo imponitur, & emplastra attractoria, & theriaca illinuntur. Porro Dipsadu prius iam meminit Aelianus li. 9. de hist. animal. sic inquiens: Dipsas cuius vim, & naturam eius nomen nobis declarat, inferior quidem est magnitudine, quã vipera, sed tamen in occidendo quã celerrimè superior. Cuius morsu confixi, et si assiduam potionem hauriant, ad sitim tamen continuo exardescunt, & ad bibendum eatenus inflammantur, quã ad celerrimè rumpantur. Eam Sostratus cum albam esse ait, tum duas in cauda lineas nigras habere. Et sicut audio, vario, multipliciq; nomine nuncupatur quidam præsterem vocant, alijs causonem, alijs anombaten, a quibusdam melanurus appellari fertur. Cum in Aphrica, tum magis in Arabia nascitur: hæc Aelianus. Ex quibus verbis manifestè deprehenditur error Leonicensi viri alioquin eruditissimi, qui Dipsadem putauit corporis forma nullis notis à vipera diuersam esse. Nec equidem scio, quæ ratione, vel auctoritate nixus, in hanc opinionem venerit, in eaq; perstiterit.

Hæmorrhoi
morsus notè,
& curatio.

Dipsadis hi-
storia, morsus
signa, & cura.

Leonicensi
error.

T. d. p. c.

NATRIX.

CAP. LI.

AB Natrice demorsis vlcus dilatatur, & liuidum, ac ingens euadit. Sanies ex eo multa, & atra, & male olens, non secus atque ijs quæ serpunt vlcerebus, expuitur. Si ergo morsum natrix adegit, prodest origanum tritum, & aqua subactum: dixiua cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix mi-
nuit

nutim contrita, & hordei farina cum aqua, & melle colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ dra-
chmæ in portione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel decoctum alterius cum vino: fa-
uus recens datur in aceto.

Hydrius anguis in aquis plerunque degit, à quibus nomen sibi vindicauit. Sunt & qui Natricem, quoddam aquis innatet, Hydri hinc
Natricis hinc:
voent. Hic si relictus aquis, terras in habitet, longè nocentior euadit, vocaturq; tunc Chersydrus. Differt tamè à dryi-
no, qui vt superius diximus, Nicandro hydrius etiam appellatur. Si quidem ipse de Hydro, cuius nunc historiam, morsus di-
scrimina, & remedia prosequimur, differuit sub Chersydri nomine in theriacis, sic carmine in prosam verso scribens. Age i-
taque Chersydri, qui aspidi conformis est, figuram aequalem recitat. Sed plagam eius malefica, & pessima sanè signa sequun-
tur. Chersydri na-
tura, morsus
& curatio.
10 Tot a cutis circa carnem arida, & abominabilis expassa ab internis partibus, humentem ictum satum certo indicat, pu-
tridine fatihis. Quinetiam dolores immensi ignescentes, hominem tandem interimunt: mox etiam per membra pustula
funguntur, alia ex alta parte inuicem turbantes agrum. At qui chersydrus iam antea in viciis, seu parum aque habenti lacu,
irrecociabilem canis iram adfert. Enimvero vbi sole aqua exiccata fuerit, adeoq; ariditas in fundo extiterit lacus, tum
hic serpens in terra sese continet, & squalidus, & deformis in sole tetrum corpus suum refocillans: in semitis autem, lingua
sua afflando sitibundus sulcos exedit: hac ille. Chersydri quoq; meminit Aetius lib. 13. cap. 35. his verbis: Serpens hic chersydri
appellationem inde habet, quod in principio quidem in aquosis degit locus, & hydrius appellatur ab ipsis aquis, hoc est natricis
postea verò siccos incolit locos, & ex compositione locorum, chersydri, id est natricis terrestis, nomen inuenit. In humectis qui-
dem locus, ex humido victu exsatiatus, non purum venenum habet: cum autem terrestris sit, nocentius id acquirit. Cate-
rum forma, paruam terrestrem aspidem refert, præterquam quod ceruicem non ita latam habet: hoc enim in signe so-
lum aspidem præ his habent. Qui igitur ab hoc morfu sunt, eis communiter eadem accidunt, qua in aliorum serpentium mor-
20 fu, veluti est tumor, continuus dolor ardens, liuidus locus, & faculentus, vertigo oculorum, exolutio, vomitus biliosus, ac sæ-
tidus. Proprie autem motus torius corporis inordinatus, vt & per ventrem quadam inordinate ferantur: mors autem intra
tres dies. Porro ex communibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis antidotis. Priuatim verò coni cupressi drach-
mam vnam, & myrti baccarum itidem vnam, terito, & cum melle rosaceo, aut vino mulso in potu exhibeto. Iuxta verò
affectum locum calcem viuam, & similia, cum oleo imposito.

Κένχρος.

CENCHRVS.

CAP. LII.

Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur: carnes antea, vt in aqua inter
cutem, prætumidæ defluunt: lethargo corripiuntur, & veterno pressi somnos captant. Erasistratus e-
os iecinore, intestino ieiuno, coloq; conflictari author est: quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes cor-
ruptæ reperiuntur. Morfus à cenchro auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia trita, &
sylvæstris ruta, & serpyllum, cum duabus hastulæ regiæ drachmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ
radix, item cardamomum, & gentiana.

Quamuis Aetius appellauit Cenchrum ammoditen, & Acontiam cenchriten, non tamen propterea censendum est Cenchri con-
sideratio.
Cenchrum, de quo hic differit Dioscorides, ammoditen, aut acontiam esse: quod hic nullam cum illis habeat cognatio-
nem, nec similitudinem. Ea autem de causa Cenchrus dictus est, quod maculis per quam minimis (vt Lucanus est author)
40 nully magnitudine, & colore, vniuersum eius corpus respersum appareat. Auicenna cenchrum famosum appellat.

Κεράστis.

CERASTES.

CAP. LIII.

ACeraste percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus, è plaga sanies profluit, modò atra, modò
pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur, mens labat, & oculorum cali-
go exoritur: denique rigore neruorum distenti commoriuntur. Si cerastes percusserit, cita partis amputa-
tio suffragatur: quare sine mora ictam partem amputare, aut scalpro confestim circumcidere, & ijs si-
50 milia prosequi oportet. Yrentia insuper reliquijs admouenda: siquidem virus hoc veneno basilisci simi-
le est.

Cerasta, quorundam probatissimorum authorum testimonio, in Africa duobus in capite cornibus cochlearum instat Cerastæ mor-
sus exitialis,
& auxiliis.
oriuntur, à quibus cerasta, hoc est cornuti, nomen inuenerunt. Horum morsus lethalis ferè semper fuerit, nisi (vt Dio-
scorides inquit) demorsum membrum statim à reliquo corpore abscindatur, amputeturque, aut saltem illico omnis caro,
qua demorsum ambit locum, circumcidatur. Immanis hæc fera (vt refert Aetius) cubitalis est longitudinis, longissima duo-
rum est cubitorum, corpore verò arenosa, & iuxta caudam desquamata. Eminentias habet in capite duas, cornuum simi-
litudine: partes verò circa ventrem ex ordine squamis obsitæ sunt, quapropter in serpendo somnum sibilo similem edis, per
60 obliquum autem, non rectè proreptat. Iulius Solinus Cerastam (inquit) quadrigemina cornicula, non quidem gemina
gerere scribit cap. 30. Polyhistor. quarum ostentatione velut esca illic sollicitatas aues perimunt. Nam reliqua corporis de-
industria arenis tegunt, nec vllum indicium sui præbent. Caterum percussis ab ea, eleuatio ac tumor plaga capiti clauis
similitudine insurgit, & sanies profluit vini colore, aut nigricans, & maxime per ambitum, velut in cruentatu ac sugillatis
aliàs fieri consuevit. Reliqua item, qua in vipera morfu dicta sunt, etiam hu succedunt, cum intensione vehementiori. Vt
plurimum verò vsque ad nonum diem supersunt. Remedia autem eadem, qua morsus à vipera conferunt: hæc Aetius.

Κεράστis.

CERASTES.

AB Aspide ictus vulnus exiguum profus, quasi ab adaeta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino leuis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit. At vir perit absque labore virès, atque discolor: mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellit: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent: hos mors tollit, ad diei trientem non dilata: Caterùm ijs, qui ab aspide feriuntur, quæ de cerasse scripta sunt, auxilia dari debent. Nam venenum hoc, quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus, celerrimè in arterijs sanguinem cogit.

Aspidis perniciosis ictus, & genera tria

Aspidum histos. ictus notæ, & cura.

REperio apud eos authores, qui animalium historias tradunt, tria Aspidum genera constitui, & vnumquodque vbi hominem morsu comprehenderit, celerrimè mortem inferre: quippe tanta est earum veneni vis in hominum necem, vt rarissimè seruentur, qui ab eis perussi fuerint. De his scribens Galenus libro de theriaca ad Pisonem, sic inquit: Inter aspides nominata ptyas collum exporrigenis, & spatij metita longitudinem, perinde ac si tunc rationalis fera facta esset, venenum solerter corporibus inspuit. Harum itaque ferarum vna (siquidem tria sunt Aspidum genera, ptyas dicta, chersæa, & chelidonia) reginam ferunt Cleopatram, cum vellet custodes latere, statim, & citra suspicionem mortem sibi concuisse. Hac ille, qui subinde pluribus historiam enarrauit tam inuicti animi huiusce moribunde regina. Caterùm chelidoniã vocatam, id nominis sibi comparasse volunt, quod hirundinum modo dorso nigricet, & candicet aluo: quemadmodum & ptyas altera dicitur, quod in hominem expuat, chersæa verò ita dicta est, quod in mediterraneis semper degat. Harum omnium meminit Aetius lib. 13. cap. 20. sic inquit: Aspidum apud ferarum scriptores tres species reperiuntur: quadam enim ex eis terrestres appellantur: quadam verò chelidonia, qua circa fluuiorum ripas, praesertim Nili, latibula habent, alia verò ptyades nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt, & quandoque vsque ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maxime verò ptyades, cinereo sunt colore, viridique & ad auri colorem inclinante. Terrestres verò vt plurimum & ipsa cinerei sunt coloris, quanquam & subuirides reperiuntur. Caterùm accessiones, & signa communia sunt in his, quos aspides momorderunt: vulnera enim in demorso loco, veluti ab acu puncta inueniuntur: bina quidem ex maris morsu, ex femella verò quatuor citra magnum dolorem, à quibus nihil effluit, nisi violentum animal sit, quod morsum inflixit. Consequitur autem stupor, pallor, frontis refrigeratio, asidui hiatus, palpebrarum nictationes, colli inclinatio, capitis grauitas, segnitias, & collapsio in somnum profundum, ad finem verò conuulsio. Mors autem in tribus ad summum horis ex terrestri morsu sequitur: in chelidonia verò ictu presentissima adest. Porro his, qui à ptyade conspuuntur, caligo oculorum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio: tardius autem mors consequitur. Auxilium autem ab aspide morsu ferunt, & praesertim quos ptyas momordit, ex acerrimi aceti potu: dandum autem est, quousque aceti qualitatem circa dextram praecordiorum partem perceptent: hepat enim in morsu ab aspide primum aiunt sensu priuari. Caterùm ad pranotionem, an victurus sit percussus, centaurium cum vino tritum bibendum praebet: siquidem enim euomet pharmacum, morietur: si non, viuet. Quò verò veneni in corpus distributi vis probe euomatur, allia trita cum zytho exhibenda sunt, donec nauseabundus reddatur malè affectus: aut opopanax cum vino diluto detur, & confestim euocet. Numius autem inquit: Origanum viridem, aut aridam pro egri viribus cum vino dato. Post vomitum antidotis theriacis vtendum, & communibus remedijs predictis. Vtiliter autem ad plagam imponuntur post cucurbitarum adhibitionem, & scarificationem, centaurium cum myrrha & modico opio. Rumex autem si cataplasmatibus modo imponatur, nihil laeditur. Praeter opinionem verò auxiliatur Theriace tum plaga imposita, tum pota. Profunt autem & asidua excitationes cum euulsionibus, & plagis, & vniuersi corporis motus, & aqua marina calida pro fomento aspersa: haecenus de aspidibus Aetius. Efficacissimum porro, & omnium, quantum equidem expertus sum, praestantissimum antidotum contra venenosum ictum aspidum, quas surdas dicunt, quae in Italia pluribus in locis reperiuntur, est nostra quinta essentia, ex aqua vita, & antidoto nostro confecta. Quippe cum tenuium admodum sit partium, ictu oculi in vniuersum corpus diffunditur, venas, & arterias confestim permeans. Vnde prohibet, ne sanguis & spiritus in vasis refrigerati cogantur: atque aucto calore innato, veneni vim arceat potentissimè, idque superat citissimè.

ERasistratus in libro, quem de medicaminibus, & venenis condidit, de vocato basilisco scitè ita refert. Cùm basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se habent. Ad basilisci morsum, vt idem Erasistratus author est, auxiliatur castorei drachma in vino pota: item papaueris succus. Ictuum remedia ita se habent.

Basilisci varia historia.

Multiplex variag, est apud ferarum scriptores Basilisci historia, quem Latini Regulam vocant. Sunt enim qui scribant tantè perniciosi animal esse Basiliscum, vt solo oculorū intuitu, alij sibilo tantū, alij halitu, alij verò morsu, homines statim interimat. Nec desunt qui vulgi opinionem secuti, ex antiqui galli ouo hanc fauissimam feram nasci putant. Ex hac itaque historiae varietate ac inconstantia, facile adducor, vt credam, plerosque historiam Basilisci, vt fabularem descripsisse. Id quod etiam probe Dioscorides sensisse, atque adeo nostro iudicio ad stipulari videtur. Siquidem in ne cum alijs accusaretur, Erasistratum citauit, authoremque historiae huius fecit. Basilisci meminit Galenus libro de theriaca ad Pisonem (si tamen liber ille inter legitimos censetur) vbi sic inquit: Basiliscus bellua subflaua, & triplici frontis apice munita, tantummodo conspectus, & quando sibilat auditus, videntes se, & audientes necat: atque si quod aliud animal illum etiam mortuum attingit, statim moritur. Hinc aiunt omne aliud reptilium genus cauere, ne Basilisco vicinum habitet. Libro verò 10. cap. 1. de simp. medic. facultatibus, idem contra Xenocratem scribens, non omnino Basilisci historiam comprobare videtur, sic inquit. Nam bestiam seu feram regiam, quam vocant βασιλισκὸν θηρίον, ne videre quidem mihi vnquam contigit: & si vera sunt, qua de illa referunt, periculosum etiam est vel prope accedere ad hoc animal. Aelianus praeterea Basiliscum tanta veneni acuitate, & immanitate pollere ait, vt quamuis magnitudine dodrantalem non excedat mensuram, serpentes tamen omnes etiam ingentes, suo duntaxat halitu extinguat, adeo vt virga quoque è longinquo contactus, illico tangentem conficiat. Scribit Iulius Solinus, vires ne defuncto quidem Basilisco deesse, eaq, propter eius emptas esse reliquias a Pergamenis amplo festerio, vt ad eum Apollinis manu insignè, nec aranea intexerèt, nec alites inuolatèt, cadauere eius reticulo aureo suspensio.

sumpso, & ibidem collocato. Huius item horrendissima fera historiam tradidit Plin. lib. 8. cap. 21. ubi ita scriptum reliquit. Apud Hesperios Aethiops fons est Niger, ut plerique existimauerunt, Nil caput, ut argumenta, qua diximus, persuadent. Iuxta hunc fera appellatur Catoblepas, modica alioquin, ceteri, q. membris iners, caput tantum praegrave agre ferens: id deiectum semper in terram. Alias interfectio humani generis, omnium, qui oculos eius videre, conserit expirantibus. Eadem & Basilisci serpentis est vis. Cyrenaica hunc generat provincia, duodecim non amplius digitorum magnitudine. candida in capite macula, ut quodam diademate insigni. Sibilu omnes fugat, serpentes: nec flexu multiplici, nec ut reliqua, corpus impellit, sed celsus & erectus in medio incedens. Necat frutes non contactos modo, verum & asflatos. cauris herbas, rumpit saxa. Talis vis malo est. Creditum quondam ex equo occiso habita. & per eam subeunte vi non equitem modo, sed equum quoque absumptum. Huic tali monstro saepe enim credum concipere reges videre, mustelarum virus exitio est: adeo natura nihil placuit esse sine pari. Inveniunt eas cavernis. facile cognitis sola tabe. Necant illa simul odore, moriunturque, & natura pugnam conficiunt. Hac de basilisco Plinius. Quem tamen plura cum aliis fabulosa narrasse putamus. Nam si tantum oculorum intuitu, sibilu aut halitu hominem interficit, non equidem video, quomodo factum sit, ut q. qui ipsum viderunt. cuiusque faciem adnotarunt, ex quorum postea relatione huius ferè historiam pleriq. desuperunt, in volumines euaserint: praesertim cum ta paruum sit animal, ut nisi in propinquo loco conspici possit. Atq; adeo hinc mihi impossibile videtur, quum ipse aspicientes non viderit. cum ut Plinius refert non multiplici flexu incedat, ut reliqua fera, sed celsus, & erectus: vel quod ex infecto circumstante aere, qui viderunt non perierint. Ceterum cum Erasistratus his fabulis nullam forte fidei adhiberet, certog, sciret Basiliscum morsu tantum, ut alia fera, homines interimere, eius duntaxat morsus curationem instituit. Verum quandoquidem huiusce veneni vis adeo vehemens, & immanis existit, ut expugnari non possit, non est cur plura hic referam, quam ex Erasistrato memoria prodidit Dioscorides. Quem ducenti & authorem secuti, ut ipse suu de medica materia libris hoc sexto finem imposuit, ita nos nostris in eos commentariis, quos ad nostram communemq. rei medicae studioforum vtilitatem conscripsimus, iam extremam manum imponemus. Non oblitum immensas gratias agere DEO optimo maximo, cui & omnia accepta referimus, & honorem ac gloriam tribuimus sempiternam.

Catoblepas.

Plura fabulosa in Basilisci historia.

LIBRI SEXTI ET VLTIMI FINIS.



DE RATIONE
DISTILLANDI AQVAS
EX OMNIBVS
PLANTIS:

Et quomodo genuini odores in ipsis
aquis conseruari possint.






DE RATIONE DISTIL- LANDI AQVAS EX OMNIBVS PLANTIS, ET QVOMODO GENVINI odores in ipsis aquis conseruari possint.

RISCORVM medicorum nemo fuit, qui quicquam ad posteritatem transmisisset de arte eliciendi aquas stillatitias ex plantis, vel aliis quibusvis vegetabilibus. Parabant illi potiones suas ex dilutis, vel decoctis, ad curandos corporum nostrorum affectus, aquarum stillatitiarum nulla habita mentione. Inuentum hoc nouum est, referuntq; quidam ad Chymicæ artis professores: alij ad Medicum quendam, qui (vt narrant) rerum experimenta admodum diligenter inuestigans, dum fortè fortuna Betam decoctâ, & adhuc calentem, in stanneam patinam effunderet, alteram similem patinam superponeret, ne statim refrigereret olus: id vbi sub edendi tempus rursus detegeret, videretq; superiorem patinam aqueo liquore, ipsoque copioso adeo resudantem, vt vndiquaque plurimæ excurrerent guttæ, quæ oleris iam cocti tum odorem, tum saporem respiciebant, illico artem à natura edoctus, instrumentum excogitauit plumbeum, campanæ rostratæ simile, ad contegendum æneum vas, plantarum plenum, super fornace constitutum, vt hinc claras limpidasque consequeretur aquas: id quod illi felicissimè cessit. Elegit autem ille plumbeas hæc campanas, quòd certò sciret, plumbum ob suam, quam possidet, frigiditatem, ascendentem è plantis ab igne calefactis vaporem, perquam facillè in aquam vertere posse. Et rectè quidem, cum è nullo alterius metalli, aut materiæ alembico, tã copiosa educatur aqua, vt è plumbeo. Id cum deinde contemplarentur alij, nouum modum excogitarunt, quo vno tantum igne, & vna tantum fornace, plura cõcalerent vasa, singula singulis plumbeis Alembicis contacta, vt minore sumptu ac labore copiosas adipiscerentur aquas. Quamobrem fornacem, cuius imaginem primo loco dabimus, sibi fabricarunt. Cæterum cum non desint, qui semper meliora inuentis addere satagunt, præsertim Chymicæ facultatis Magistri, ij cum viderent eiusmodi aquas plumbeis Alembicis paratas, suarum plantarum odores, saporesq; haudquaquam respicere, sed potius fumum oleris, & adustionis nidorem, & quæ ex amaris, acutisq; plantis fierent, nec amaroris aliquid, nec acridinis, sed dulcedinis non parum gustantibus reddere, aliud ad destillandas è plantis aquas inuenerunt instrumentum, quod Vesicam appellauerunt, quo passim vtuntur ij, qui è vini, aut cereuisiæ fæcibus Aquam vitæ distillant, herbis vnà cum communis aquæ non mediocri quantitate, in vas æneum coniectis, vt ex fornacis ipsius imagine quispiam videre poterit. Sed concinnioremodum postremi reppererunt, qui eiusmodi aquas in feruentis aquæ Balneo (quod Mariæ vocant) aut super vaporibus extrahunt, siquidem constat eas aquas esse multò præstantiores, quòd suarum plantarum tum odorem, tum saporem egregiè retineant. Euenit sanè hoc, quoniam balneum calentis aquæ, sua ipsius humiditate, partes tenuiores retinet, cõseruat, ac custodit, quo fit, vt eæ non resoluantur suis in plantis; quemadmodum in iis, quæ lignorum, aut carbonum violento igne exuruntur. Quapropter inter aquas, quæ balnei calentis vbi destillantur, & quæ plumbeis instrumentis extrahuntur, tanta deprehenditur differentia, quanta inter vinum & aquam. Quippe quæ fiunt in balneo aquæ bulliētis, aut super ipsius vapore, vitreis rostratis organis ad id muneris paratis, vt postea ostendemus, eæ ab herbis & floribus, à quibus manant nec sapore (vt paulò antè diximus) nec odore discrepant. Quin non solum proprias plantarum qualitates secum trahunt, sed & tam limpida & sinceræ proueniunt, vt ne tantillum quidè fumi, vel adustionis nidorem respiciant. Contra verò nunquam vel rarissimè gustaueris aquas è plumbeis Alembicis resultantes, quin tibi fumidum quoddam in ore relinquant. Quæ res non modò gustantibus, bibentibusve præsertim agris, qui cæteris morosiores semper esse solent, nauseam mouent, & molestiam afferunt, sed plurimum noxæ pectori, ventriculo, iecini, notis, visceribusq; omnibus ingerunt, quòd à metallicis vasculis, è quibus deriuantur, malam qualitatem eliciant, & in se ipsas contrahant. Patet hoc manifestissimè in Absinthij aqua, ex Alembico plumbeo profecta, nam eam dulcem esse constat, non amaram. Id quod à plumbeis instrumentis, quibus conficitur (vt diuturna docet experientia) euenire certum est. Et non solum in Absinthij aqua, sed etiam alterius cuiusvis plantæ temperamento calido, & sapore acri præditæ. Siquidem cum plumbeus Alembicus huiusmodi herbarum vaporibus tum actu, tum potètia excalescentibus superficietenus afficiatur, corrumpatur, fit quidem, vt superficies ipsa ita affecta in cerussam tenuissimam vertatur, quæ deinde aquis sese commiscens, illis dulcedinem addit. Atque id videre est in albo talium aquarum sedimine, præsertim vbi aquæ per plumbeum Alembicum recès paratum meauerint. Nam vas, quod diu in hoc opere vsurpatum est, obducta circumquaque quadam veluti gypsea crusta, non ita facillè à vaporibus deraditur, & in cerussam vertitur. Nulli autem mirum esse debet, si ab acri plantarum vapore plumbi superficies in cerussam mutetur, cum cerussa ipsa (vt Diosc. est author) paretur laminis plumbeis, super aceti vaporibus suspensa, & super craticula ex arundinibus parata extensa. Quod quidem iis non accidit, quæ duplici vase, vitreis organis, calentis aquæ balneo conficiuntur, nam eæ sufficienter amarescere, aut fauces linguamve mordicare, si fiant ex amaris, aut acerrimis plantis, apertissimè sentiuntur. Præterea carèt dulcedine, quòd à vitreis Alembicis, vnde guttatim fluunt, nullam adscititiam qualitatem recipiant. Porro, quæ parantur instrumento, quod Vesicam appellant, stanno circumlito, longè meliores habentur, quam quæ è plumbeis rostratis campanis euocantur. Quòd ignis fornacis herbas in aqua feruescentes, nec vsulare, nec fumido nidore inficere queat. Attamen nec hæc integras herbarum vires retinent, ob aquæ communis admixtionem

distillandi aquas.

missionem, quæ illas suffocat & hebetat. Quamobrem aquis illis palma danda, quæ in Balneo Mariae aut super eius vapore parantur, & præsertim quæ fiunt ex herbis facultate calidis. Et hæc de modis distillandarum aquarum à plantis, & plantarum floribus, in vniuersum dixisse sufficiat. Peculiaris enim inferius describentur, vbi fornacum, & instrumentorum imagines appictas dabimus. Quod autem ad aquarum stillatitiarum vires spectat, sciendum est, iisdem eas pollere viribus, quibus & herbarum, floretive, à quibus eliciuntur, præditæ sunt, verum non adeò præstantibus, quippe quod in distillando non modicum substantiæ deperdatur, & in auram euolet, quo fit, vt non desint Medici, qui decoctis potius vtantur. Siquidem ex gustu olfactuque apertissimè constat longe plus virtutum in his contineri, quam in aquis stillatis. Verum quia decocta ægris non æquè placere solent, vt aquæ ipsæ distillatæ, ideo hæc potius, quam illæ eligenda, vbi ægrotis nostris gratiora pocula offerre volumus. Ad quam rem etiam Myropolarum diligentia requiritur, vt eas aquas probè & cum industria conficiant, si & ægrotantium & Medicorum gratiam tibi conciliare volunt. Sunt itaque diligenter distillatæ aquæ vtilis admodum, adeò vt decoctis, quibusdam in medicamentis, non parum anteferri debeant. Nam vbi in ardētibus febribus, & æstatis feruoribus potus aliquis parandus fuerit, qui & sitim valenter restinguere, & gustum potantis oblectare queat, felicius, commodiusque id proculdubio fiet cum aquis distillatis, admistis aut vno Punicorum malorum, aut Iulapio è rosarum, aut violarum aqua parato, aut ex citrei, aut limonij mali succo, quam cum quouis decocto, quantumcunque optimè confecto. Idem etiam euenit, vbi aut ad oculorum morbos collyria, aut in capitis dolore oxyrhodina, aut in iocinoris, & cordis affectibus epithemata paranda erunt. Prætereo, quantum conducatur aquarum distillandarum artificium ad odoramenta paranda, cum in Medicum potissimum vsu, tum ad vniuersi corporis delicias: quales sunt, quæ parantur è floribus rosarum, pomorum aurantiorum, Myrti, & aliarum plantarum, quorum flores suauissimè spirant. Quinetiam ad mulierum ornatum, quæ subinde suis vtuntur aquis distillatis ad conciliandum faciei nitorem. Ad hanc rem sunt efficacissimæ, quæ è radicibus Polygonati, Bryoniæ, Cucumeris agrestis, Ari, & Fabarum floribus ac Tiliæ parantur. Verum cæteras superat, quæ è Limonum succo, in quo minuta cochlearum quarundam marinarum candidissima putamina, magnitudine pisi granum parumper aut nihil excedentia, pluribus diebus fuerint macerata, & deinde in balneo feruētis aquæ vna cum succo ipso distillata. Siquidem hæc non solum cutim attenuat & erugat, sed nitorem elegatissimum addit. Id quod neutiquam silentio mihi prætereundum duxi, vt non solum viris satisfecisse videat, sed etiam nobilibus matronis, & cæteris quibuscunque mulieribus, quarum gratia mihi non parui facienda est. Quo fit vt admodum necessarius sit aquarum distillatarum vsus apud omnes nationes, & præsertim apud eos Medicos, qui politicè, & cum omnium laude Medicinam exercere desiderant.

PRIMA FORNAX.




I.

Hæc fornax in testudinis acutæ formam parata, quàm plures potest fouere & sustinere plúbeas rostratas campanas, quæ vnico tantum igne calefieri possunt. Artamen hisce plumbeis alembicis vtuntur pharmacopæi, qui hæctenus præstantiores aquas facere neglexerunt.


SECVN-

De ratione


SECUNDA FORNAX.



TERTIA FORNAX.



QUARTA FORNAX.



II.

VESICAM æneam, æneo pariter alembico coopertam continet, cuius rostrum, ligneum cadū aqua frigida plenum perforat, ne spiritus in auram euaporent, sed condensentur, atque in aquam vertantur. Hoc itaque alembico (vt diximus) paratur aqua vitæ. Verūm omnes ferè Germaniæ Myropolæ eo nunc vtuntur ad distillandas aquas ex omnibus plantis, sanè non reprobandas.

III.

BALNEVM est Mariæ, simpliciter paratum cum vno tantum alembico. Inferius vas quod stanneum est, matule magnę, oblongę ad simile habetur, tum æneo caldarij cooperculo ita plumbarum feruminatumque, vt alterum sine altero extrahi non possit. Simul imponuntur, simul quoq; auferuntur. Atqui alembicum vitreum esse oportet. Vbi autem aqua in caldario ex longo feruore defecerit, aperto foramine, quod cuneo conclusum in caldarij operculo spectatur, alia etiam feruens infunditur, donec ahenum repleatur.

IV.

BALNEVM hoc quatuor continet alembicos vitreos, quorum vasa in balneum collocanda, & vitrea & stannea esse possunt. Quod autem in summo eminent, vapore tantum aquæ inferioris balnei, per æneam fistulam sursum ascendente calefactum, quam à contētis herbis aut floribus reddit omnium optimam. Cōcluditur autem vrinale eius stanneum in cacabo maioris circumferentiæ, super fistula fabricato, rimis vbiq; stanneo glutino adeò occlusis, vt nihil vaporis ascendentis expirare valeat. Est itaq; superius hoc instrumentum adeò simul compactum confabrefactumque, vt vnum tantum corpus videri possit. Solutus vitreus alembicus separari potest, & vicissim reponi, vbi aquas distillare opus est.



bricato, rimis vbiq; stanneo glutino adeò occlusis, vt nihil vaporis ascendentis expirare valeat. Est itaq; superius hoc instrumentum adeò simul compactum confabrefactumque, vt vnum tantum corpus videri possit. Solutus vitreus alembicus separari potest, & vicissim reponi, vbi aquas distillare opus est.

QUINTA

distillandi aquas.

QVINTA FORNAX.

SEXTA FORNAX.



V.

BALNEVM hoc est elegantissimum, in quo vas stanneum, trium spithamarum longitudine fabricatum, tumidoque inferius ventre, relidet, cuius superior pars, in qua situm est orificium, per rotundum foramen, in medio balnei cooperculo excisum, extra caldarium ad spithamæ altitudinē porrigitur. Huic inferitur stanneus alembicus, quem vas aliud, eodem metallo conflatum, amplioris latitudinis, excipit, ad frigidam recipiendam aquam, quæ ex superiori oblongo vase, in summa columnæ parte constituto, per æream defluit fistulam, frigidæ aquæ destinatam, ut stanneum alembicum in medio stantem circumdet ac refrigeret. Si quidem eo continuè refrigerato fit quidem, ut vapores ascendentes longe melius cōcrescant, & in aquam vertantur. Id quod in causa est, ut copiosorem aquam recipiant artifices. Vbi autem ipsa aqua frigida paulo post à calore Alembici calefiat, illico fistula in inferiori vasis Alembicum recipientis parte euacuari potest, aperto epistomio, & alia iterum frigida denuo vas ipsum repleri. Verum ne tantum laboris in effundenda & refundenda hæc aqua suscipiant ministri, potest superioris vasis fistula, quod frigidam continet, epistomio ita subinde regi & moderari, ut tantum aquæ continuò in vas alembicum circumdans distillet, quantum huiusce recipientis fistula, suo epistomio moderata, cōtinuè vacuari queat. Ut autem Balnei ipsius caldarium eadem semper aquæ quantitate refertum sit, & ne aqua, quæ ignium vi continuò consumitur, vacuum remaneat, arte quidem factum est, ut vas aliud columnæ inferiori parte affixum, calidissimam continuò, per inferiorem fistulam epistomio mensuratum, in balnei caldarium effundat aquam, quæ quidem suo in vase calefit eodem igne, quo ipsum calefit balneum, si quidem vacua est parietis columna, vsque ad ipsius inferioris vasis fundum.

VI.

VLTIMA hac fornace vtuntur Veneti ac Neapolitani, qui vitreis alembicis abūdant. In qua vna tantum die & nocte, sicco ignis calore, eliciunt aquæ ultra centum libras. Fornax rotunda est, ut ex imagine hic appicta apparet, fornacibus, quæ in Germanorum visuntur vaporariis, omnino similis. Continet hæc circumcirca, ut videre est, numerosa fictilia, intrinsecus vitro incrustata, vrinæ formā referentia, & diligenti sanè artificio argillaceo luto agglutinata, quibus singulis per totum fornacis ambitum singuli adduntur vitrei Alembici, e quorum vertice ex globulo ad hoc parato, Recipientia crassiusculo funiculo adalligata, pendent. Calefit hæc fornax eodem modo, quo Germanicorum vaporariorū fornaces. Atqui dum ignis vehemens est, vacua relinquunt vasa, donec parumper remittatur, ne violento calore plantæ aut flores exurantur. Tunc itaque plures ministri, qui hoc tantum artificio aluntur, obstructo vniuersæ fornacis ostio, ne conclusus expiret calor, herbas fictilibus inuiciunt, & simul vitreos applicant Alembicos. Atque in hunc modum copiosas eliciunt aquas, quæ longe meliores habentur, quam quæ plumbeis conficiuntur instrumentis, quòd nullam metallorum contrahant infectionem.

INDEX



INDEX ACCURATUS OMNIUM

NON SIMPLICIUM TANTUM, SED

ALIARUM ETIAM QUARVMCVMQVE RE-

rum, tam in Dioscoridis textu, quam Matthioli commentariis

contentarum: duplici numero signatus, quorum prior

paginam, alter eiusdem lineam docet.

A.

	<i>Biogna liquida Dioscoridi & Plinio ignota</i>	109.31	<i>Achillea vires</i>	714.9	<i>Adianti vires</i>	632.33
	<i>Abies</i>	104.51	<i>Acida punica quomodo mitescant</i>	194.9	<i>Adiantum album Theoph. non est</i>	632.33
	<i>Abies</i>	102.4	<i>Acida muria</i>	911.46	734.42	
	<i>Abietis lachryma an Picea</i>	102.63	<i>Acinus</i>	537.40	<i>Adonis</i>	650.1
	<i>liquida Galeni</i>	102.63	<i>Acinus Columna</i>	ibid.	<i>Adonidis mentio</i>	649.22
	<i>Abiegnalachr. vt adulteretur</i>	103.9	<i>Aconitum</i>	761.36	<i>Adrachne Plinij</i>	205.7
	<i>Abrotonum mas</i>	512.40	<i>Aconiti genera & consideratio</i>	761.55	<i>Aegilops prima</i>	834.36
	<i>Abrotonum femina</i>	513.33	<i>Aconitum Pardalianches Diosc.</i>	762.1	<i>Aegilops secunda</i>	ibid.
	<i>Abrotoni vires</i>	514.34	<i>Aconitum Pardalianches Plinij</i>	ibid.26	<i>Aegilops ex hordeo generatio</i>	835.18
	<i>Abrotoni fem. vires</i>	ibid.53	<i>Aconitum Pardalianches Theophr.</i>	762.26	<i>Aegilops vires ex Gal.</i>	835.26
	<i>Abrotoninum oleum</i>	82.1	<i>Aconitum Pardalianches minus, quod falsd</i>	763.10	<i>Aegineta Rhabarbarum agnouit</i>	476.48
	<i>Abinthium</i>	508.37	<i>Doronicum vocant</i>	763.10	<i>Aegyptia siliqua historia</i>	501.4
	<i>Abinthium Ponticum montanum</i>	ibi.	<i>Aconitum secundum</i>	ibid.	<i>Aegyptiis vipera cibus</i>	261.1
	<i>Abinthium Ponticum</i>	509.24	<i>Aconitum tertium</i>	764.1	<i>Aeris vsti consideratio & vires</i>	921.1
	<i>Abinthium marinum</i>	ibid.	<i>Aconitum vni folium</i>	ibid.	<i>Aerugo rasilis</i>	923.25
	<i>Abinthium maritimum foliis laciniatis</i>	510.1	<i>Aconitum quartum</i>	764.35	<i>Aerugo Scolecia</i>	923.57
	<i>Abinthium Seriphium</i>	ibid.37	<i>Aconitum quintum</i>	765.1	<i>Aeruginum consideratio</i>	923.60
	<i>Abinthium Seriphium Gallicum</i>	511.37	<i>Aconitum sextum</i>	ibid.	<i>Aeruginum vires ex Gal.</i>	ibid.
	<i>Abinthium Seriphium latifolium</i>	ibid.	<i>Aconitum septimum</i>	765.34	<i>Aeruginis remedia</i>	1000.
	<i>Abinthij vires</i>	511.32	<i>Aconitum octauum</i>	766.1	<i>Aes vstum</i>	920.56
	<i>Abutylon Auicennae</i>	662.	<i>Aconitum nonum</i>	ibid.	<i>Aethiopsis</i>	804.1
	<i>Acacelus</i>	142.53	<i>Aconiti vires ex Gal.</i>	770.7	<i>Aethiopidis vires ex Paulo</i>	803.66
	<i>Acacia</i>	170.40	<i>Aconitum</i>	986.46	<i>Aetites lapis</i>	964.
	<i>Acacia Officinarum</i>	171.44	<i>Aconiti veneni consideratio</i>	986.56	<i>Agallochum</i>	67.18
	<i>Acacia succedaneum</i>	171. ibid.	<i>Acontia historia, morsus & cura</i>	1022.	<i>Agallochi fabulosa opinio</i>	ibid.30
	<i>Acacia Aegyptiaca</i>	ibid.1	<i>Acori consideratio</i>	20.61	<i>Agallochi historia ex Serapione</i>	ibid.33
	<i>Acacia alterum genus</i>	172.31	<i>Acori radix condita</i>	23.5	<i>Agallochum crudum quid</i>	68.23
	<i>Acacia vires ex Galeno</i>	ibid.44	<i>Acori radix amara</i>	22.18	<i>Agallochi facultas</i>	68.29
	<i>Acanthium</i>	499.1	<i>Acori & Galanga differentia</i>	ibid.22	<i>Agaricum Larici innascens</i>	101.45
	<i>Acanthus</i>	499.32	<i>Acorum legitimum esse Calamum odoratum</i>	ibid.22	<i>Agaricum</i>	475.1
	<i>Acanthus syluestris spinosus</i>	500.5	<i>ibid.29</i>	22.66	<i>Agarici vires ex Gal.</i>	474.62
	<i>Acanthi duo genera Plinio</i>	ibid.	<i>Acori vires</i>	621.25	<i>Agarici vires ex Mesue</i>	475.10
	<i>Acanthi facultas ex Gal.</i>	ibid.37	<i>Acus muscata</i>	622.43	<i>Ageratum Diosc.</i>	739.34
	<i>Acarna Theophr.</i>	593.33	<i>Acus pastoris</i>	148.21	<i>Ageratum alterum</i>	740.1
	<i>Acetosa</i>	353.33	<i>Acuta spina</i>	148.21	<i>Agerati vires</i>	741.14
	<i>Acetosa minor</i>	354.1	<i>Acuta spina non est officinarum Berberis siue</i>	ibid.32	<i>Agrimonia est Eupatorium</i>	717.65
	<i>Acetosa Cretica</i>	355.40	<i>Cresspinus</i>	207.32	<i>Agri folium</i>	146.15
	<i>Acetum Scillinum</i>	911.65	<i>Adami pomorum historia</i>	953.48	<i>Agrostes</i>	1017.
	<i>Aceti scillini vires mirabiles</i>	912.13	<i>Adarces Diosc.</i>	953.48	<i>Aiuga</i>	669.
	<i>Aceti scillini confectio</i>	912.21	<i>Adarca vires ex Gal.</i>	954.1	<i>Aiuga consideratio</i>	669.
	<i>Acetum Diosc.</i>	910.40	<i>Adeps anserinus</i>	306.40	<i>Alabastrites lapis</i>	961.60
	<i>Aceti mista facultatis consideratio</i>	910.60	<i>Adeps gallinarum</i>	ibid.	<i>Alaudarum historia</i>	285.42
	<i>Acetum mulsum</i>	911.19	<i>Adeps viperarum</i>	307.14	<i>Alberti & Plinij lapsus</i>	285.44
	<i>Achatu lapidis historia</i>	959.60	<i>Adeps vsorum</i>	ibid.	<i>Alcea</i>	ibid.
	<i>Achatu vires</i>	959.68	<i>Adeps piscium</i>	ibid.20	<i>Alcea historia ex Plinio</i>	61.
	<i>Achillea</i>	213.33	<i>Adipis in cibis facultas</i>	ibid.40	<i>Alcea vires ex Paulo</i>	952.10
			<i>Adeps</i>	304.55	<i>Alcyonium</i>	ib.
			<i>Adiantum</i>	832.12	<i>Alcyonij vires ex Gal.</i>	70.
			<i>Adiantum Syriacum ibid.</i>	ibid.24	<i>Alga Veneta</i>	Albaj

Libros Dioscoridis.

Albaster quid ex Serapione	314.35	Amygdala 221.1. earum vires ibid.	27	Apium risu 990. Diosc. 561. 54. hortense 562.	
Aludatararon Auicenna	84.43	Amygdala amara quo pacto fiant dulces ibid.		13. crispū ib. palustre 563. 5. hortense maxi-	
Alisma Diosc. 666. duplex Pliny	ibid.	51		mū 563. 1. Calamella 563. 3. vires 564. 36	
Alismatis vires ex Gal.	ibid.				
Alisaria	613.34	Amylum 332. 35. eius vires ibid.	50	Apium	876.20
Alum 421. 40. anguinum 422. 1. Vrsinum		Anacardium	227.31.229.1	Apocynum 774. 40. repens ibid. duplex 775.7	
ibid. 35.		Anacardiorū veneni signa & curatio 985. 56		eius vires ex Gal.	775.23
Ally facultates	423.19.	Anagallis 463. 49. mas 464. 1. femina ibid. a-		Apum consideratio	315.56
Alni historia ex Theophrasto 131. 64. vires 132		quatica 465. 15. aquatica folio rotundo ib.		Apes quibus gauderent 316. 5. earum reparatio	
40		15. eius vires	463.64	ex vitulo ibid. 42. mira industria ibid. 14	
Alnus bifurca	133.41	Anagyris 664. altera ibid. minor 665. vires ex		ictus & remedia	1016
Aloe 507. 1. mucronato folio	ibid.	Gal.	ibid.	Aqua Absinthij cur dulcis	310. 66
Aloes vires ex Gal. ibi. 34. vires ex Mesue ib. 66		Anchusa prima 703. 35. secunda ibi. tertia 704		Aqua aurea ex Lil. conual.	631.50
Algebra 863. 62. est Pityusa 865. 35. est esula		8. earum vires ex Gal.	ibid.6	Aqua Betule vires	132.56
maior	867.20	Andacoca quid	609.67	Aqua cochlearum	248. 61
Alfine 782. 33. altissima	ibid.	Andernacum notatur	185.22	Aqua Cinnamomi vulgaris vires	49.67
Alfines vires	783	Andrea Lacuna litera	538. 48	Aqua foliorum quercus & eius vires	179.45
Althæa 662. altera, ibid. eius vires	662	Androsaces Diosc. 644. 50. eius figura 643. 1.		Aqua Fraxini	128.65
Alumen 945. 30. plumosum est Amiantum		altera ibi. vires ex Gal.	644.62	Aqua ad faciei ruborem	106.39
945. 40. liquidum ut fiat 946. 22. rotun-		Androsimum Diosc. 667. & 668. fatidum ib.		Aqua florum Aurantiorum mira facultas 206	
dum 946. 37. squamosum ut fiat 946. 43		Anemone prima 460. 35. secunda ibid. tertia		Aqua Gentiana facultas Matthiolo	481.33
omne ex calcere 946. 59. Catinum est sal		461. 1. quarta ibid. quinta ibid. 35. eius flo-		Aqua mulsa 908. 36. eius facienda ratio va-	
Alcali 946. 40. rubeum 946. 54. eius vires		res varij	462.1	ria	908.49
946. 51. plumeum 963. 7. scissile & Amia-		Anethinum oleum	82.6	Aqua 909. 30. pluuialis omnium prestantissi-	
tum differunt	963.10	Anethum 554. 20. eius vires ibid.	33	ma 909. 25. cisterna 909. 30. ex nive & gla-	
Alypum 880. 28. eius vires ex Paulo	ibi.50	Angelica Costus quibusdam	54.60	cie omnium pessima 909. 36. putealis 909.	
Alyssum 591. 6. Pliny est Rubia minor 591. 7.		Angelica farina 814. 40. sylvestris	ibid.	40. palustris ibid. fluxuatis ibid. Tiberis	
Acyū est Sideritis ibid. 37. Galeni ibid. 43.		Anguillara arguitur 161. 11. notatur de Aspa-		Roma	909.47
Ruellij est Cannabis sylu. ib. 50. eius vires ex		latho 63. 4. eius opinio 172. 42. lapsus. 99.		Aqua salsa 909. 53. nitrosa 909. 61. aluminosa	
Gal.	591.56	60. lapsus in Theoph. versione 212. 44. sen-		909. 63. sulphurosa 910. 5. bituminosa. 910.	
Alyssum contra rabiem	1009	tentia de Cneoro refutata 45. 54. opinio		10. atea 910. 13. ferrea	910.14
Amaracinum oleum	84.1	reprobata in Saluica & Hirculo 34. 1. ar-		Aqua marina	910.30
Amarax dulcis	882.11	guitur 182. 1. notatur circa Thuiam 124. 17		Aqua pauor ad quod vsq. tempus exoritur.	
Amarax simplicia que	11.16	reprehenditur	56.69	& cur 1011. quando & quibus curetur 1012	
Amaraci historia 531. 8. vires	535.11	Anguria mentio & historia 396. 62. & 397. 1		Aq. Polygonati	678.60
Amaracus tenuifolia	535.18	Animalia que rabie tentantur	1008	Aqua rosarum prestantior	167.13
Amaracum & Sampsuchum num idem sint	81.34	Anisum 553. 7. eius vires	ibid.37	Aqua & Oleum ex humano stercore	310.15
Amaracum & Parthenium num idem. 81. 44		Anonis 500. 56. eius historia ex Theophr.	501	Aqua stillatitia ad calculosos	203.64
Amaracus 534. 36. tenuifolia	534.36	Anonis non spinosa purpurea 501. non spinosa		Aqua stillatitia è Limoniorum succo & eius	
Amaranthus 737. 14. pannicula incurua 737		lutea 502. eius vires	501	vires	207.15
14		Anserinus adeps	306.40	Aqua vita ex Ceruisia parata	522.57
Amaranthi purp. vires	737.54	Anteuphorbium	585.26	Aqua vita & eius vires	907.9
Amati opinio Cinnamomum notissimum ef-		Anthemis Diosc. 648. 62. eius consideratio 649		Aq. vita Matthioli parandi ratio. 907. 18. vires	
se, refutatur	49.36	10. vires ex Gal.	650.8	907.32	
Ambari historia 66. 48. genera & vires ibi. 57		Anthera quid	167.10	Aquifolium 147. 18. eius varietas ibid. vires i-	
Ambrosia 619. 22. altera ibid. Pliny ib. 69. eius		Anthericum	450.68	bid. 54.	
vires ex Gal.	620.4	Anthropomorphon Pythagora	760.4	Aquilina 467. 22. flore pleno ibid. eius vires	
Ambubeia	388.45	Anthyllis 648. 33. eius vires ex Gal.	ibi.	ibid. 53	
Amellus Virgilij	818.46	Antidota prestantissima Matth. contra vene-		Arabum lapsus dum vitumz. Centaurij con-	
Amelli historia Matthiolo	818.68	na	979.62	fundunt	487.48
Amiantus lapis	962.56	Antidoti primi Matth. descriptio 979. 68. vsm		Aracum niger 328. 1. eius historia	337.60
Ammi Diosc. 557. 38. & 558. 1. paruum folijs		980. 21. alterius descriptio & vires 980. 47		Aracum niger in ollam delapsus canobium in-	
faniculi. ib. eius vires	557.64	è sanguinibus 981. 35. è scinco 981. 44. ex		ficis	976.23
Anomoda historia & venefica vis 1021. mor-		terra Lemnia	981.10	Aracis maris consideratio	297.60
sus curatio	ibid.	Antidotus ad rabidorum canem moyses 250.		Aracum	293.27
Anomi consideratio	51.68	60		Arancorum & phalangiorum genera	293.50
Anomum spurium 52. 10. eius vires ex Gal. 53		Antidotorum actio	973. 40	Arbor vita	123.10
22		Antirrhinum primum 829. 35. secundum ibi.		Arbor Iude	171.31
Ammoniacum 587. 10. eius vires ibid.	35	tertium 830. 4. quartum ibid. eius vires ibi.		Arboribus que incrementum	9.5
Ampelitis à Gagare parum differt	968. 4	45		Arbores aliarum arborum fructuum feraces	
Ampeloptasum 418. 40. proliferum ibid. eius		Antispodium 918. 63. ex quibus fiat	920.6	14.21	
vires	419.5	Antora 769. 28. eius radices varia	ibid.	Arborea que sint	7.58
Amphisbana consideratio	1022	Aparine 590. 35. eius vires	ibid.50	Arbutus 220. 18. eius vsm & vires Matth. ibid.	
Amphisbana biceps nō est 1023. eius morsus fi-		Aphaca instubi sylvestris species	388.38	45	
gna & curatio	ibid.	Aphaca 416. 20. Iutybi genus	417.8	Arctium 804. 15. eius vires ex Gal.	804.34
Amurca olei	176.60. & 178.13	Aphacam cum Vicia quidam male confundunt	417.3	Arena littoralis	965.60
Amygdalinam oleum	76.34	416. 28. eius vires	417.3	Argemone 463. 27. eius vires ex Gal. ibid. 43.	
Amygdalini el. parandi ratio & vires	ibi. 50.	Aphronitrum 950. 30. eius vires	951.15	eius vice Eupatoriū veteres perperam sum-	
		Apiastrum 602. 15. eius consideratio 602. 59.	603.5	perunt	463.43
		vires ex Arabibus		Argentum vivum ut necet	973.17
				S sss	Argen-

Ararica fol. 713

Index in Sex

Argentum vivum 935.34. & 999. exhibetur 936.25	Asteris Attici vires ex Gal. 819.40	Myrrha differt 92.18. eius differentia scribitur ibid.20
Argenti sublimati confectio 936.15	Asterion 1017	Behen rubrum offic. 696.36. album & rubrum 857.53. est Hermodactylus 857.63. rubrum officinarum 851.1
Argenti viui pernicialis natura 999 sumpti curatio ibid. partum promouet ibid.	Astragalus alpinus 836.40	Bella donna lethiferum est 986.32
Argenti recrementum 928.54. eius vires 928 66	Astragalus 743. 6. eius vires ibid.	Bellis maior 653.1. Alpina ibid. media 653.35 minor 654.1. minima ibi. lutea maior 39 3. lutea minor ibid.
Argenti spuma 998. eius mala 998. eorundem curatio ibid.	Astura 244.4	Bellidus vires 653.48
Argentum sublimatum exulcerat 1010	Athera 325.27. eius consideratio ibid.	Bellonij Sapius est Picea 103.20. opinio im- probata 151.46. opinio explosa 97.55. de opinio explosa 99.36. opinio falsa circa Ca- driam 123.50. opinio de Mumia explosa 113 39. opinio absurda circa Sabinam 120.52
Arida loca qua planta ament 8.49	Atragene 882.6	Beluedere 837.30
Arisarum 450.1. alterum ibid. eius vires 449. 68	Attractylis 593.10. Theophr. 593.34. Plinij 593.58	Belzoinum non esse Myrrham 513.29
Aristolochia longa 482.36. vera ibid. & 483. 83. pistolochia ibid.	Atramentum librarium 968.18. scriptorij con- ficiendi ratio 185.24	Ben album Fuchsi. Polemonij statuit 682.79
Aristolochia triplex Gal. 484.18. tenuis est Cle- matitis ibid. eius vires ibid. 64.	Atramentum sutorium 940.40	Beta alba 370.24. nigra ib. rubra 371.20. Cre- tica ibid. sylvestris Plinio 371.5. amfacul- tates 370.67
Aristotelis vana opiniones 292.52	Attriplex domestica 361.25. sylvestris prima 362.1. sylu. secunda ibid. 32. sylu. tertia ib. angusto Centinodia folio 363.1. marina i- bid. sylvestris lappulas habens 365.14. eius vires 363. eius semen ex Serap. aluum mo- net 364.40	Betel historia 43
Aristoteles & Plinij lapsus, in Aphrica ceruus esse negantium 290.2	Auellana Indica 227	Betonica Dioscoridis 671.34. eius vires ex Ga- tonio Musa 671.54. flore albo ibi. eius vires ex Gal. 673.8
Armenia terra seu boli vires ex Galeno, 939. 58	Auellanarum consideratio 229 25. facultates ibid. 28	Betula 132.1. & 134.3. eius bitumen 114.23
Armeniacorum consideratio 204.44. & 208. 10	Auena 326.4. eius facultates ex Galeno ibid. 21	Bistorta 674.1. minor ib. eius vires 673.64
Arnabo historia 439.42	Auerrhois contra Gal. vana calumnia 476.39	Bitumen duplex 114.9. & 111.33. ex Anacardis ibid. 14. fossile ib. eius consideratio 111.62. vires ex Gal. 113.63
Atomata que 15.50	Auicenna lapsus 94.32. defensio à Fuchsi ca- lumnia 768.63. defensio contra Fuch. 219.1	Blattaria 802. eius vires ibid.
Arsenicum crystallinum ex quo fiat 944.60	Auicenna de Karabe 131.39. eius lapsus 353.50 notatur 206.8	Blatta 277.56
Arsenici sublimati venenum 999. eius curatio ibid.	Auis lingua 128.68	Blattium bizantium ab Onyche Fuchsi dif- fert 247.6
Artemisia 617.25. eius duo genera Plin 617. 32. tenuifolia Dioscoridi adulterina 618. 40. eius historia 618.50. altera ibid. eius vi- res 618.56	Aurantia mala 206.59. Gal. ignota 201.59	Blitum maius 357.5. rubeum ibid. album ibi. 38. polyspermon 358.14
Arum Aegyptium 339.4. Colocasia vult An- guil. ibid.	Auricula muris 470.40	Bolus Armenius non est Sinopica rubra 937 25. eius vires 939.18
Arum 448.15. minus ibid. eius vires ibi. 65. & 449.29	Auri historia & prestantia 936.33. vires ex Auicenna 936.63	Bombycis historia 231.13
Arundo Indica latifolia 701.5	Auripigmentum 944.25. eius venefica vis & curatio 999. eius vires ex Gal. 944.68	Bombycini velleris vsus ib.23
Arundo 137.22. sativa descriptio 138.1. & si- licis odium: cum asparago amicta 138.18.	Auxilium religiosum in canis rabidi morstu 1010	Bonus Henricus 449.1. eius vires ib.18
vires ibid. 25. scriptoria 138.40. Indica 139 30. vallatoria 138.8	Azadaracht 233.10. arboris venenum & re- media 989	Borrugo 825.10. eius vires 826.1
Afarina consideratio 37.1	Azulum Auicenna 932.64	Bothomarien 443.59
Afari vires ex Gal. ib.16	Azaroli descriptio 209.50	Botrys 620.20. eius vires Matth. ib. 46. vires ex Paulo 620.60
Afarum & Bacchar differunt 36.21. eius vires ex Mesue ib.53	B.	Branca vrsina an legitimus sit Acanthus 499 60
Afalonia 421.15	B Aaras admirabilis facultatis planta 760. 14	Brauaoli error 379.16. error de Calamo 22. 63. error Calamum odoratum Acorum Of- fic. credentis 57.67. error in Coriandro 559 65. error Acorum Galangam statuentis 21 60. opinio improbat. dum Mumiam bitu- mini substituit 112.57. opinio de Origano reiecta 520.6. opinio improbat. volens Myrrham Offic. esse Bdellium. 88.5. calum- nia contra Mesuem depulsa 495.40. im- quercubus Agaricum vidit 101.53. argu- tur 617.50. reprehenditur 395.47. male Galenum accusat 942.66. eius op. non re- probata 109.12. lapsus Ocl. rui Eruius cententu 343.50. error 528.56. error Nar- di radicem nullius vsus existimantis 37 52
Afalepis Dioscor. 591.68. nigro flore 592.18	Baccharis Dioscor. 538.30. consideratio 538.40 eius meminere antiquissimi 539. & herba & vnguentum ap. Athenaeum ibid.	Brauaoli error negantis pedem columbinum esse Geranium 622.66
Afayrum 667. & 668	Balaustia 193.27	Brauaoli lapsus de Manza 94.65
Afay lapidis historia & vires ex Gal. 957.18	Balaninum oleum 77.4. eius facultates ibid. 14	Brauaoli arguitur, de Nardo mōt. ana 35.51 Brauaoli opinio de Succino reprobata 131.24 Brauaoli
Afialathus 62.15. non est santalum rubrum 62.54.	Baldus à cane morsus interijt 1008	
Afialathum verum è Cypro allatum 63.10. e- ius vires ex Gal. ib.20	Ballote 601.38. eius vires ex Paulo 602.2	
Afparagus 373.24. sylvestris ibid. eorum fa- cultates ibid. 67. sylvestris aculeatus 374.1	Balneum ad Podagricos 119.112	
Afphodelus 451.1. luteus ibid. eius vires ibid. 45	Balsami vires ex Galeno 61.5. succedaneum i- bid. 9. Indicum nouum ibid. 22.60. factij conficiendi ratio ib.27. vires ibid.35	
Afphalti nomina 114.7	Balsamum 59.12. eius historia ex Iustino ibid. 47. ex Strabone & Pausania ibid. in Aegy- pto 59.64. Iudaicum 61.45. Americanum 61.67. ex Hispaniola 62.2. Tolutanum i- bid.8	
Afpu cornutus 1021	Balsamina 884.22. altera ibid.	
Afpidu genera tria 1025. eorum iclus nota & cura 1026	Barbula hirci 409.44	
Afplenum Diosc. 645. & scolopendr. quibusd. diuersa 645.68. vires 645.62	Barbari & Ruellij lapsus 238.55	
Aftracis 250.21	Basilisci varia historia 1026	
Afster Atticus sine Amellus 817.40. ceruleus Al- pinus 818.1. alter ibid. luteo flore 819.1	Bdellium 90.62. eius historia ex Plinio 91.25. vulgatus genera ib.20. vires ex Gal. ibid.25 alterum Serapioni, palmae genus 91.37. à Beccabunga 465.	
Afsterem cum Eryngio confundit Serapio 818. 37		

Libros Dioscoridis.

<p><i>Braſauoli lapſus</i> 461.65 <i>eiuſdem: lapſus</i> 987.20 <i>Br.ſica apud vires non ſerenda</i> 902.44. <i>lauis</i> <i>366. criſpa ibi. capitata</i> 367. <i>Gongilodes i-</i> <i>bid. cauliflora</i> 367.35. <i>marina</i> 368.15. <i>ma-</i> <i>ritima maior ibid. ſpinofa</i> 369.33. <i>eiuſ ſyl-</i> <i>ueſtris conſideratio</i> 366. 68. <i>vires</i> 367.40. <i>mira viſ ad remulentos</i> 14.6 <i>Breſilium duplex</i> 64.31 <i>Britanica Dioſcor.</i> 673.36. <i>Plinio contra ſto-</i> <i>macacen</i> 673.45. <i>eiuſ vires ex Gal.</i> 674. <i>56</i> <i>Bromos Dioſcor.</i> 835.43 <i>Brunſelſius taxatur</i> 383.58. <i>eiuſ & Cornarij</i> <i>error</i> 324.34 <i>Bruta Plinij</i> 120.62 <i>Bruta etiam condita</i> 114.63 <i>Bryonia fructu nigro</i> 883.60. <i>eiuſ vires ex Me-</i> <i>ſue</i> 883.1 <i>Bubuli ſtercoris vires</i> 310.20 <i>Buccina Dioſcor.</i> 242.45. <i>eiuſ hiſtoria</i> 243. <i>18</i> <i>Bufo</i> 271.24 <i>Bugloſſum ſiue Borrage</i> 825.11. <i>vulgare</i> 825.11 <i>alterum flore nigro</i> 826.1 <i>Hiſpanicum</i> 825 <i>4. ſylueſtre ibid.</i> 65. <i>eiuſ vires</i> 826.10 <i>Bulbus eſculentus</i> 451.64. <i>vomitarius</i> 452.14 <i>eorum vires</i> <i>ibid.</i> 44 <i>Bunium</i> 823.54. <i>eiuſ vires</i> 824.8 <i>Bupthalmum</i> 652.4. <i>alterum ibid.</i> <i>eiuſ vires</i> <i>652.53</i> <i>Bupreſtu</i> 984.1. & 291.41. & 92.3 <i>Burſa paſtoris</i> 429.1. <i>eiuſ vires ibid.</i> 24 <i>Butyrum Dioſcor.</i> 300.68. <i>eiuſ vires</i> 302.1 <i>Buan lues</i> 164.59 <i>Buxus</i> 169.20. <i>eam quidam Guaiacum cen-</i> <i>ſent.</i> <i>ibid.</i> 35</p>	<p><i>Calciſ venefica viſ & curatio</i> 999 <i>Callorum equi vires</i> 280.68 <i>Caltha</i> 894.26. <i>paluſtris flore pleno</i> 616.1 <i>Calx viua</i> 951.56 <i>Campeſtribus qua herba creſcant</i> 8.63 <i>Canabel Serapionis mentio</i> 510.33 <i>Cannabis</i> 663. <i>mas & ſamina</i> 663. <i>eiuſ vires</i> <i>664</i> <i>Cancamum</i> 69.6. <i>eiuſ conſideratio ibid.</i> 14. <i>& Lacca quod idem ſint probatur</i> 69.50 <i>Cancer ſtumatilis</i> 249.40. & 251.50. <i>marin-</i> <i>us</i> 250.1. <i>eorum vires ex Gal.</i> 250.60. <i>ſu-</i> <i>uiatiliuſ vires</i> 251.54 <i>Candido flore qua herba ſint donata</i> 12.23 <i>Canis rabidi iecur</i> 279.47. <i>venefica natura</i> <i>1008</i> <i>Canes quibus cauſis rabie exagitantur ibid.</i> <i>iſ</i> <i>ſolus rabie corripitur Galeno ibid.</i> <i>eorum</i> <i>ſaliua inſicit</i> 1009 <i>Canis piſcis felluſ venenum & cura</i> 996 <i>Cannella Italorum</i> 50.49 <i>Canini ſtercoris vires</i> 310.43 <i>Cantharides</i> 982.20. <i>earum malefica viſ</i> 982. <i>47. veneni curatio</i> 982.67. <i>conſideratio</i> <i>291.38. integras uſurpandas</i> 291.62. <i>ea-</i> <i>rum vires</i> 291.66 <i>Caphura hiſtoria & genera</i> 105.60. <i>ea vt ad-</i> <i>ulteretur ibid.</i> <i>temperamentum & vires</i> <i>106.22. legitima qua & quomodo affer-</i> <i>uanda</i> 106.40. <i>vt alba reddatur</i> <i>ibid.</i> <i>Carcioffi genera</i> 497.24 <i>Cancellorum hiſtoria</i> 253.24. <i>ij ingrediuntur</i> <i>conchulaſ</i> 253.38 <i>Caryophylli aromatici</i> 435.38 <i>Caryophyllorum hiſtoria ibi.</i> 13. <i>vires ibid.</i> 36. <i>domeſtici</i> 436.20. <i>ſylueſtres</i> <i>ibid.</i> <i>Carbones foſſiles non eſſe lapidem</i> 959.35 <i>Cardiaca</i> 790.1. <i>eiuſ vires</i> <i>ibid.</i> 50 <i>Cardus lacteus</i> 503. <i>eiuſ vires ibid.</i> 10. <i>ſtella-</i> <i>rus</i> 504.36 <i>Cardamomum veterum</i> 28.25. <i>Græcorum &</i> <i>Arabum diuerſum</i> 28.36 <i>Cardamomum</i> 27.50 <i>Carduus D. Maria</i> 495.20. <i>benedictuſ</i> 594. <i>18. benedicti vires</i> <i>ibid.</i> 30 <i>Carduus aculeatuſ</i> 496.38. <i>nō aculeatuſ</i> 497 <i>32. vulgaris ibid.</i> <i>eorum conſideratio</i> <i>ibid.</i> 1 <i>Cardus Carcioffi</i> <i>ibid.</i> 17 <i>Cardui vires</i> 497.67 <i>Cardamomi genera quatuor ex Plinio</i> 28.63. <i>vires ex Galeno</i> 29.1 <i>Cardoni</i> 497.5 <i>Caryophyllata</i> 697.35. <i>montana</i> 697.35. 4 <i>quatica</i> 698.10. <i>vires</i> 697.68 <i>Carum</i> 553.37. <i>eiuſ vires</i> 554.9 <i>Carnium noxa</i> 1004 <i>Cariei lignorum conſideratio</i> 136.68. <i>vires</i> <i>137.12</i> <i>Caricarum uſuſ</i> 235.49. <i>vires Matthioli</i> 236 <i>6</i> <i>Carabe</i> 200.24 <i>Carpinus</i> 135.1. <i>Plinij & Theophrasti</i> 136. <i>7</i> <i>Carpheſum</i> 38.60. <i>eiuſ ex Galeno conſideratio</i> <i>39.4. Cnbebaſ ſtatuentium opinio repro-</i> <i>batur</i> 39.30 <i>Carpobalaſtum Officinaruſ</i> 60.43. <i>non le-</i> <i>gitimam</i> <i>ibi.</i> 60 <i>Carpafi ſuccuſ</i> 989 <i>Carophylli lapidei</i> 469</p>	<p><i>Carpafum & Carpeſum male quibuſdam</i> <i>idem</i> 989 <i>Carramum officinarum</i> 388.62 <i>Carota</i> 549. <i>purpurea</i> <i>Beben rubrum quibuſ-</i> <i>dam</i> 549 <i>Capparis</i> 455. <i>acuminato folio ibid.</i> <i>eorum ſa-</i> <i>tio ibid.</i> 48. <i>vires ibid.</i> 51. <i>leguminofa</i> 456. <i>13</i> <i>Caprini ſtercoris vires</i> 310.26 <i>Capriola Coronopus Leoniceo</i> 383.59 <i>Caprinuſ adeps</i> 306.34 <i>Capriſolium</i> 691.55 <i>Caput lactis</i> 302.11 <i>Caput monachi</i> 388.44 <i>Cafeuſ Dioſcor.</i> 300.58. <i>Hetruſcuſ optimuſ</i> 302 <i>34. bubuli antiqui vires.</i> <i>ibid.</i> <i>Cafia Columella</i> 45.41. <i>Monſpeliaca</i> 51.17 <i>Cafia</i> 44.10. <i>eiuſ odorata & coronaria diſcri-</i> <i>men</i> 45.18. <i>legitima eſt Cinnamomuſ vul-</i> <i>gō dictum</i> 45.49. <i>tranſmutatur in Cinna-</i> <i>momum</i> 47.1. <i>ſiſtuita Andromachi ibid.</i> 4. <i>eiuſ hiſtoria ex Plinio ibid.</i> 15. <i>hiſtoria ex</i> <i>Theophrasto ibid.</i> 25. <i>vires ex Gal.</i> 49.53. <i>ſolutiua conſideratio</i> 50.7. <i>ſolutiua qua</i> <i>preſtantior ibid.</i> 28. <i>eiuſ vires</i> <i>ibid.</i> 32 <i>Caffuta vires & hiſtoria</i> 879.62 <i>Caffuta Plinij</i> 880.4 <i>Caſtanearum conſideratio</i> 183.60. <i>Orientaliſ</i> <i>ſiue Equina</i> 184.3. <i>earum vires, ibidem.</i> <i>15</i> <i>Caſtoreum non prouenire ex reſſib.</i> 268.30. <i>e-</i> <i>iuſ adulteratio</i> 268.51. <i>quodnam efficaciſ-</i> <i>ſimum</i> 268.56. <i>eiuſ ſuffituſ ibid.</i> 32. <i>virtu-</i> <i>lentia & curatio</i> 997. <i>vires ex Gal.</i> 268. <i>64. ex Plin.</i> 269.38 <i>Catapota ex Thure</i> 93.63 <i>Catanance</i> 831.1 <i>Catoblepaſ</i> 1026 <i>Catuli coagulum preſtantiſſimum in hydro-</i> <i>phobia</i> 1012 <i>Caucaliſ</i> 404.40. <i>nodoſo echinato ſemine ibi.</i> <i>eiuſ vires</i> <i>ibid.</i> 31 <i>Cauda cerui venenum & eiuſ curatio</i> 997 <i>Caulium in plantis diſſerentia</i> 11.26 <i>Cautery uilitas in canuſ morſu</i> 1010 <i>Cauterium e Cryſtallo</i> 964.22 <i>Cedruſ</i> 121.40. <i>Phenicia</i> 122.65 <i>Cedri duo genera Theophr.</i> & <i>Plinio</i> 122.35. <i>duplex reſina ibid.</i> 48. <i>minoruſ genera, ibid.</i> <i>63. Lycia</i> 123.8. <i>Atlantica & Thuaia idem</i> <i>124.16.</i> <i>Cedria</i> 123.46. <i>eiuſ vires</i> 124.36 <i>Cedrides ſimiliſ Cedri</i> <i>ibid.</i> 58 <i>Cefaglionuſ conſideratio</i> 91.42 <i>Cenebruſ conſideratio</i> 1025 <i>Centauium magnum</i> 487. <i>vtuſq; male A-</i> <i>rabeſ confundunt</i> 487.47. <i>magnum male</i> <i>quidam Lyſimachiam ſtatunt</i> 487.58. <i>e-</i> <i>iuſ vires ibid.</i> 57. <i>Rhaponticum eſt Offici-</i> <i>narum</i> 487.20. <i>eiuſ radice pro Rhapontico</i> <i>male quidam vtuntur.</i> 475.60. <i>minuſ</i> 488 <i>30. ſpicatum ibid.</i> <i>luteum perfoliatum</i> 489 <i>38. non perfoliatum ib.</i> <i>eiuſ vires</i> 489.3 <i>Cepaa</i> 666. <i>eiuſ vires ex Paulo</i> <i>ibid.</i> <i>Cera</i> 315.10. <i>eiuſ vires ex Gal.</i> <i>ibid.</i> 28 <i>Ceraſta morſuſ exituſ & auxilia</i> 1025 <i>Ceraſia</i> 197.40. <i>ſine oſiſ</i> 199.22. <i>eorum ge-</i> <i>nera</i> 198.11. <i>arboruſ cum ſimo inſimicruſ</i> <i>199.20. eorum vires</i> <i>ibid.</i> 25 <i>Corid</i> <i>Corid</i> 152.22. <i>Cepaa</i> 465. <i>Cetonia</i> 173 <i>Cerata</i> 173 <i>Ceris</i> 173.</p>
---	---	--

C.

C *Acabi arei damnantur* 899.32
Cacalia 823.18. *eiuſ vires ex Gal.* *ibid.*
36
Cacatreppola 504.56. *eam Ruell. tribulum*
facit 692.60
Cachrys quid 576.67
Cactos Theophrasti 497.8
Cadauera condicendi modus triplex 114.40. *ij*
varia incluſa 115.1. *eoruſ uſuſ* 115.15. *vt nūc*
condiantur *ibid.* 44
Cadmia 917.40. *lapidoſa* 918.28. *in Germa-*
nia 918.55. *eiuſ hiſtoria ex Plinio* 918.
40
Cecilia conſideratio & curatio morſuſ 1023
Cepa non acris 352.27. *capitata* 419.38. *ſecti-*
lis 420.40. *Aſcalonica ibid.* *earum varia*
ſpecies 421.1. *vires* *ibid.* 20
Ceruleum ſtorem qua herba edant 12.52
Ceruleuſ lapis 932.33. *eiuſ vires* 933.9
Calamintha Dioſcoridis 528.27. & 528.40.
magno flore 529.1. *montana ibid.* *aquati-*
ca 529.32
Calamintha vires 530.6
Calamochnuſ 953.56
Calamus odoratuſ 58.1. *Libani, ibidem, eiuſ*
hiſtoria ex Theophrasto & Plinio 57.55.
non eſt radix 58.46. *eiuſ vires ex Galeno i-*
bid. 53.
Calamo odorato deſtituimur *ibid.* 60
Calcha plinij 470.

Index in Sex

<i>Coria veteramentaria</i>	381.8	<i>Cicinum oleum</i>	76.4	<i>Cochlearia folio sabrotando</i>	380.4
<i>Cerofolium</i>	402.1	<i>Ciclamini auxilia</i>	1002	<i>Coccam insectorium</i> 727.12. & <i>Cherimefina</i>	727.67
<i>Ceruifia</i>	322.47	<i>Cicer domesticum</i> 335.24. <i>sylueftre</i> <i>ibid.</i> eius	336.5	<i>differt</i>	727.67
<i>Ceruffa</i> 930.8. & 994.62. <i>vires</i> 930.30. <i>lethalis natura</i> 995. eius <i>malis auxilia</i> <i>ibid.</i>		<i>vires</i>	336.5	<i>Coccum in quercu</i> 727.55. <i>infectory</i> <i>vires</i> <i>ibid.</i>	52
<i>Cerui vsus in medicina</i> 290.14. <i>castratis cornua non nascuntur</i> 289.57. <i>eorum historia</i> 288.58. <i>vira</i> 289.62		<i>Ciconia stercus</i>	310.63	<i>Colchicum Diosc.</i> 777.54. <i>orientale</i> 778.1. & <i>Hermodactylum</i> <i>idem faciunt</i> <i>Montachi</i>	780.66
<i>Ceterach</i> 645.46. <i>non est Asplenium</i> <i>quibusdam</i> 645.54		<i>Cicutra</i> 772.33. eius <i>vires</i> 773.11. <i>venefica</i> <i>vt</i> 988. <i>pro pastinaca comesta</i> 988. eius <i>sumpta</i> <i>cultatio</i> <i>ibid.</i>		<i>Colocasia ex Plinio</i>	
<i>Chalcanthum Misy</i> <i>statuit Brasauolus</i> 943.7. eius <i>genera</i> & <i>historia</i> 940.59. <i>vt fodiat</i> <i>vt</i> 940.69. eius <i>collectio in Cypro</i> 941. <i>Cyprium constat</i> <i>est medicamentum</i> 941.60. eius <i>vires ex Gal.</i> 941.22		<i>Cimices lectularij</i> 276.55. <i>sylueftres</i> <i>ib.</i> 67. <i>earum vires</i> 276.64		<i>Colocynthis</i> 877.12. eius <i>vires</i> 877.34	339.36
<i>Chalcidicarum descriptio</i> 295.28		<i>Cineris cancrorum flauiatilium preparatio</i> , 1009		<i>Colophoniam</i> <i>Diosc.</i> & <i>nostra</i> <i>differt</i> 110.13. <i>eius consideratio</i> 109.20	10.65
<i>Chalcitis</i> 942.25		<i>Cinis e laurinis lignis</i> 1014. <i>sarmentitius</i> <i>Dioscoridis</i> 952.33. <i>vires ex Galeno</i> , 952.40		<i>Colorum varietas in plantis</i>	10.65
<i>Chama</i> 245.32		<i>Cinnabaris</i> 933.30. <i>Draconis sanies</i> <i>Plinio</i> 934.4. <i>fossilis</i> <i>ibid.</i> 50. <i>factitia</i> 934.53. <i>collectio</i> 935.1. <i>remedia</i> 999		<i>Columella lapsus</i>	337.35
<i>Chamaciffus</i> 824.15. eius <i>vires ex Gal.</i> <i>ibi.</i> 39		<i>Cinnamomi consideratio</i> 47.65. & 44. <i>historia ex Galeno</i> 48.2. <i>cognita facillimum. ibidem</i> 4. & <i>barbarorum terra Romam allatum</i> 48.12. <i>optimi nota</i> <i>ibid.</i> 20. <i>penuria vnde fit.</i> <i>ibid.</i> 37. <i>in India</i> <i>Straboni.</i> <i>ibid.</i> 46. <i>auis est</i> <i>Aristot.</i> <i>ibid.</i> 48. <i>sex genera Galeno</i> 49.10. <i>differentia ex Theophrast.</i> <i>ibid.</i> 14		<i>Colutea</i> 572.12. <i>siliquosa</i> 573.30	593.65
<i>Chamadaphne</i> 842.1. eius <i>vires</i> <i>ibid.</i> 50		<i>Cinnamomi quid sit.</i> <i>ibid.</i> 52		<i>Colytea</i> <i>Theophr.</i> & <i>Colutea</i> <i>differt</i> 572.34	572.34
<i>Chamacerasus</i> 198.30		<i>Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia vt. conficienda</i> 49.57		<i>Combreti Pliniani mentio</i>	540
<i>Chamacyparissus</i> 513.21		<i>Cinnamomum officinarum</i> 46.36. eius <i>oleum</i> 85.26		<i>Composita medicamenta aduersus venena</i> 978.44	
<i>Chamedrys</i> 597.35. <i>altera</i> <i>ibid.</i>		<i>Circaea</i> 626.60. <i>Plinij</i> 627.3. eius <i>vires ex Gal.</i> <i>ibid.</i> 18		<i>Confectio e Moscho</i>	66.16
<i>Chamedrys spinosa</i> 598.30. <i>quadruplex Fuchsio</i> 598.8. eius <i>vires ex Gal.</i> 598.22		<i>Circumforaneorum frans</i> 1015. & 978.62		<i>Conferua mentis & vires ex Plin.</i>	799
<i>Chamaescus</i> 234.1		<i>Cirsium</i> 817.1		<i>Conchula Indica qualitas</i>	247.21
<i>Chamaeiris</i> 17.35		<i>Cistus</i> 157.62. <i>mas & femina</i> 158.1. <i>hirci barbula</i> 158.54. eius & <i>hypocistidis vires</i> 159.2. <i>genera</i> <i>ibid.</i> 23		<i>Conchyliia in lapidibus</i>	900.42
<i>Chamela</i> 871.42. eius <i>vires</i> 872.59		<i>Cistum cum Cisso</i> <i>confundit Plinius</i> 158.69		<i>Conorum Cupressi vsus</i>	117.12
<i>Chamaleon albus</i> 490.40. <i>niger</i> <i>ibid.</i> eius <i>historia</i> 296.68. <i>vires</i> 297.28. <i>niger alter</i> 491. <i>eorum historia ex Theophrasto</i> 491. <i>magri venenum & remedia</i> 994.45		<i>Citra mala</i> 208.15. <i>eorum diuersitas</i> 205.21		<i>Conserua e floribus Punicorum & eius vira</i> 194.31	
<i>Chamaleuce</i> 824.40. eius <i>vires</i> <i>ib.</i> <i>Farfugium</i> <i>Plin.</i> 615		<i>Citra facultas aduersus venena</i> <i>ibid.</i> 43. <i>vires</i> 205.54		<i>Consiliginis consideratio</i>	245.60
<i>Chamamelum</i> 649.1. <i>mobile flore multiplici</i> 649.38. <i>foetidum</i> <i>ibid.</i>		<i>Cynoglossum</i> 826.46. <i>vulgare floridum</i> 827.6. <i>vulg.</i> <i>Fuchs.</i> & <i>Ruell.</i> <i>Lycopsin statuunt</i> 827.16. <i>vires</i> <i>ibi.</i> 21		<i>Consolida regalis non est Delphinium</i> 571.45	
<i>Chamapitys</i> 669. <i>altera</i> <i>ibid.</i> eius <i>vires</i> 670. <i>Monspeliaca folijs serratis</i> 670		<i>Cynosbaton & Cynorrhodon</i> <i>idem credunt</i> <i>Monachi & Marcellus</i> 152.61		<i>maior</i> 683.6. <i>media</i> <i>ibid.</i> 37. <i>media cerulea alpina</i> 683.37. <i>minor</i> 684.40. <i>regalis</i> 555. <i>regalis peregrina.</i> <i>paruo flore</i> 557.1	
<i>Chamaeripis consideratio</i> 189.67. <i>ex Theoph.</i> 190.50		<i>Clematis prima</i> 679.40. <i>Daphnoides flore pleno</i> 679.40. <i>altera</i> 680.1. <i>tertia</i> <i>ibid.</i> 40. eius <i>vires</i> <i>Matth.</i> 680.19. <i>ex Gal.</i> 681. 17		<i>Conuulsioni ex plenitudine prodest Castreum</i> 269.10	
<i>Chamaelyce</i> 869.25. eius <i>vires ex Gal.</i> 869.40		<i>Clinopodium vulgare</i> 595.10. <i>consideratio ibidem</i> 42. eius <i>vires ex Galeno</i> , <i>ibidem</i> 56		<i>Conyza maior</i> 629.28. <i>minor</i> <i>ibid.</i> <i>media</i> 630.1. eius <i>vires ex Gal.</i> 630.19	
<i>Cheiri</i> 632.52		<i>Clymenum</i> 690.35		<i>Copey</i>	239.36
<i>Chelidonia</i> 286.54		<i>Clysmata qualia injicienda ijs qui venena sumpserunt</i> 978.12		<i>Corallina</i>	794
<i>Chelidonium maius</i> 468.32. <i>maius alterum</i> <i>ibid.</i> <i>minus</i> 468.26. <i>maioris vires</i> 467.60. <i>minoris vires</i> 469.1. <i>minus nostrum an sit Veterum</i> 468.47. <i>minus non esse Amellum</i> 818.57		<i>Cneorum album Rosmarinum non est</i> 45.55		<i>Corallium Diosc.</i> 955.8. eius <i>consideratio</i> 955.22. <i>niueum</i> 955. <i>nigrum</i> 956. <i>eorum facultates</i> 956. <i>vt conterendum</i> 963.40	
<i>Chermeffinum quid sit</i> 70.5		<i>nigrum Lauendula no est</i> <i>ibid.</i> eius <i>descriptio</i> 45.48. <i>Theophrasti</i> 872.38. <i>Chamaelea non est</i> 46.8		<i>Coram taxatur</i> 52.59. eius <i>Fuchsi & Brunfelsij error</i> 439.44	
<i>Cherephylli Pliniani mentio</i> 402.16		<i>Cneorum Matthioli</i> <i>ibid.</i>		<i>Coriandrum</i> 559.1. eius <i>facultas ex Gal.</i> 558.64. <i>ex Auicenna</i> 559.46. <i>venefica natura</i> 987. eius <i>remedia</i> 667. & 668	
<i>Cherfydri natura, morsus & curatio</i> 1025		<i>Cnicus</i> <i>Theophr.</i> 593.22. & 888.40. <i>Plinij</i> <i>ibi.</i> 50. eius <i>sylu.</i> <i>altera species</i> <i>ib.</i> 68		<i>Coris Dioscor.</i> 667. & 668	
<i>Cherua maior officin.</i> 862.55		<i>Cnici vires</i> 889.8		<i>Cornarius notatur in Iride</i> 19.37. eius <i>opinio de omphacitide galla reprobata</i> 185.1. <i>opinio de Persicis reprobata</i> 203.68. <i>Item</i> 201.58. <i>lapsus circa Smilacem</i> 180.67	
<i>China radice consideratio</i> 163.20. <i>descriptio</i> 164.60. <i>est duplex</i> <i>ibid.</i> 65. eius <i>vsus</i> <i>ibi.</i> 67		<i>Cnicinum oleum</i> 77.52		<i>Cornus</i> 213.23. <i>eorum vsus in cibo</i> 213.40	
<i>Chondrilla</i> 392.1. <i>altera</i> <i>ibid.</i>		<i>Coagulum</i> 304.17. eius <i>facultates</i> <i>ibid.</i> 35		<i>Coronopus</i> 383.12. <i>syluestris</i> 384.23. eius <i>vires</i> <i>ibid.</i> 30	
<i>Chrysanthemum</i> 738.20. eius <i>caput restitutum</i> 738.50		<i>Cocblea</i> 247.50. <i>ponaria</i> 248.26. <i>earum vires</i> 248.32. <i>marina</i> 249.17. <i>sine testa</i> 249.20		<i>Corpora ista fulmine non putrescunt</i> 14.39	
<i>Chrysobalanus</i> 857.49				<i>Corruda</i>	373.64
<i>Chrysocolla</i> 930.50. eius <i>vires ex Gal.</i> 931.12. <i>factitia</i> 311.49				<i>Cortex Thuris</i> 92.60. <i>Balsami vt incidam.</i> 60.55	
<i>Chrysome</i> 735.1. eius <i>vires</i> <i>ibid.</i> 12				<i>Cortices quomodo siccandi & reponendi</i> 7.1	693.10
<i>Chymistarum opinio de metallorum generatione</i> 898.6				<i>Cortusa</i>	16.42
<i>Cicada Dioscoridis</i> 283.44. <i>sunt sine ore</i> 284.11. <i>earum vires</i> 284.20				<i>Cortuse vires</i>	807.65
<i>Cicade in cibo</i> 137.8				<i>Corydalis descriptio</i>	229.50
<i>Cichorium domesticum</i> 387.38. <i>syluestre</i> 388.1				<i>Coryli historia</i>	1015
<i>Constantinopolit.</i> <i>ibi.</i> 35. <i>verrucarium</i> 389.1. <i>spinosum</i> 391.12. eius <i>vires</i> 390.28				<i>Costus Arabicus</i>	54.6
				<i>Costus Officinarum amarus</i>	161.23
				<i>Costus Officinarum dulcis</i>	55.10
				<i>Costus Arabicus</i>	161.23
				<i>Costus Indicus</i>	32
				<i>Costi vires ex Galeno</i>	Cor

Libros Dioscoridis.

<p>Cacina 187.22. eius historia & vires ibid. 20 Conoclea radix 202.1. Pyrus ibid. Corula fatida 649.33. eius vires ibid. non fer- rida non est buphtalmium 652.43 Crascolapta 1017 Crataegum Anguillar. forbum censet 215.48 Crataegonon 633.27. Theop. 147.62 Crescione 379.53 Crespini forma & vires 150.15 Crespini cum Pyrastris & acuta spina collatio 148.54 Crinum 323.68. eius consideratio 324.1 Cribrum primum 381.30. secundum ibid. tertium 382. quartum ibid. eius vires 382. 55 Crocinum oleum 82.61 Crocodili historia 296.28. genera & vires ibi. 56 Crocodilium 492. eius vires ex Gal. 492 Crocum floreus 71.38. non floreus ibid. quod o- primum 72.12. eius vires ex Gal. ibid. 18 Crocomagma 71.30 Cruciatu consideratio 481.36 Cruciatu vires ibid. 45 Crystalli consideratio 963.65 Crystalli historia ex Solino 964.13 Crystalli vires ex Gal. 964.20 Cubebarum vulgarium consideratio 39.54 Cubeba Arabum ab Officinarum differunt 39.39. pro Carpobalsamo 61.13 Cuciphora planta & eius fructus considera- tio 191.49 Cucumer sylvestris Diosc. 848.32. eius vires 849.66 Cucumeres aquam diligunt, oleum refugiunt 14.18 Cucurbita oblonga 392.40. lagenaria 393.1. maior sessilis ibid. Indica ibid. 35. eius vires 394.5 Cuminum sativum Diosc. 554.62. sylvestre Diosc. 555.1. sylvestre primum 556.1 Cuminum sylvestre secundum, ibid. eius vires 556.38 Cucumis sativus 394.60. longus 395.1. eius vires ibid. 63. & 397.26. eos Angurias ma- le credit Fuchsius 396.20 Cultus locis qua herba crescunt 8.54 Cupressus 116.30. eius natalia ibid. 64.10. pu- silla 117.18. eius vires ex Gal. ibid. 23 Curatio venenorum 976.67. demorsorum a cane rabido 1009 Curatio icturnum virulentorum secundum ere- mitam quandam 1016 Curcuma Cypri genus 26.47 Curmi 322.38 Cuscuta 879.37. eius vires 880.11 Cyanus maior 389.1. minor flore multiplici 390.1. vtriusq. vires ex Gal. ibid. 18 Cyclaminus 443.25. & 444.1. eius genera ex Mesue 443.61. vires ibid. 64. & 444. 30. radice oblonga 444.43 Cydoniorum genera 202.32. vires Matthiol. ibid. 49 Cymbalaria 788.12 Cynocrambe 891.36. femina ibid. Dioscor. 892.25 Cypri historia 25.49 Cypri descriptio Matth. 25.62 Cypri vires ex Gal. 27.6</p>	<p>Cyphi 70.30 Cyprinum oleum 23.9 Cyprum & ligustrum diuersa censet herba- rum quidam 153.66 Cyrenaicus succum Plinij 382.60 Cytinus & Balaustrum 194.21 Cytisus 810.8. frutex est, non herba 810.40. ar- bor Straboni 810.53. eius historia ex Plinio 811.23. vires ex Gal. 811.40</p> <p style="text-align: center;">D.</p> <p>Dactyli ex Trapezonda 212.58. eorum dif- ferentia ex Theoph. 189.33 Daphnoides Diosc. 841.58. eius vires 842.49 Daucus primus 569.40. secundus Diosc. ibid. secundus 570.5. & Pastinaca agrestis non idem esse ostenditur 570.19. eius tria genera ibid. 35. vires ex Gal. ibid. Delphinium 370.67 Dens caninus 388.44 Dens canis primus 779.36 Dens Leonis 388.1 Dentaria maior 685.16. minor 684.40 Deracia Pauli 203.20 Diacydonium 202.43 Dialacca compositio hodie plerumq. vitiosa 70.13 Diapensia 720.36. eius vsus ibid. 68 Dictamnium Cretense 522.38. Diosc. 522.14. alterum Diosc. ibid. 34. eius consideratio & historia ex Theoph. 523.1. fert flores 523.22. album ibid. 29. vulgare & eius hi- storia Matthiolo 523.42. eius vires ibid. 52. albi consideratio 129.2 Dioscorides a Galeno maxime commendatus 4.52. in simplicium medicamentorum ma- teria primas tenet ibid. 60. eius locus susse- ctus 632.57. beneficium in posteros colla- tum 971.14. defenditur a calumnia 7.28. locus enucleatus 209.63. locus restitutus 143.60. eum legi vult Galenus 3.33 Diphryges 943.58. eius historia & vires ex Gal. 944.8 Dipfacus 493.6. eius vires 494.16 Dipfadis historia, morsus signa & cura 1024 Disturbio dicitur Hyoscyamus 990 Dodonaeus arguitur 151.46 Dolichos Galeni 414.48 Dorella 815.60 Doronicum vulgare est de genere aconitorum 763.47 Dorycnium 758.54. & 986.10. vires ibid. Dorycni veneni consideratio 986.20 Draba lutea 430.38. adulterina 430.28. Se- rapioni ibid. 35 Draco marinus 255.40. eius historia ex Arist. 256.22 Dracunculus maior 445.33. minor ibid. a- quaticus 446.1. eius species ex Plinio ibid. 26. vires Matth. Gal. & Mes. 446.42. ter- tius Plinij ibid. 55. hortensis ibid. 66. semi- nis noxa & remedia 987 Draconcellus 447.1 Dryini historia & eius iclus nota 1023. mor- sus curatio 1023 Dryopteris 888.11 Dryopteridis facult. ibid. 26 Dalcu radix 885.41</p>	<p>Dysacti 1017</p> <p style="text-align: center;">E.</p> <p>Ebenum 160.46. quando primum Roma 161.4. fossilis Agricola ibid. 16. eius vi- res ex Plinio & Gal. ibid. 23. species 164 31 Ebulus 874.40 Ebuli vires Matthiolo 874.18 Ebur 288.68. eius vires 288.17 Echinas terrestris 240.20 Echini terrestris facultates ibi. 52 Echinus marinus 239.34 Echimometra ibid. 64 Echinosorum vires ex Gal. 240.14 Echium 705.14. flore albo ibid. Echij vires 705.67 Echium Scorpionides palustris 471 Eghelo 664 Eleagnus Theophrasto 173.60 Eleagnus alba ibid. 67 Eleagni Bohemica historia 173.64 Eleomeli 75.56 Elaphobosium Diosc. 567.52. & 568.1 Elaphobosii facultates ex Gal. ibid. 18 Elaphoscorodon 422.1 Elate & eius historia 188.55. duo genera Ga- leno 192.4 Elaterium Diosc. 848.42. eius vires ex Me- sue 849.50. auxilia 1002 Elatine 716.12. vires 716.59 Elatinum oleum 80.43 Eleoselinii consideratio 562.67 Elleborum album 843.40. nigrum ibid. Elleborum nigrum alterum 844.5. purpureo flore 844.41. flore albo ibid. 52. nigrum non esse Confiliginem 845.1. nigrum non esse Aconiti speciem 845.50. vtriusque vi- res 846.5 Elleborinis 806.23 Electrum 133.19 Electuarium contra cantharidas 983.54. ex Iride ad hydropicos 17.12 Elephantorum historia 287.21. partus ibid. 63. mira sagacitas 288.3 Empetron quidam herbam S. Petri male cen- sent 381.67. Diosc. 881.14. eius vires ex Gal. 881.28 Enceli opinio de Lyncari generatione falsa 311.64 Enula campana officin. 73.53 Epimedium 700.6. eius vires 700.24 Epimelis Galeni 210.22 Ephemerum Diosc. 777.66. & 780.18 Ephemerum 985.30. eius veneni curatio ibid. 43 Epipactis 806.23 Epistabe 878.42 Epithymum 878.1. Graecorum & Arabum di- versum 878.10. vbi plurimum 879.12. eius vires 878.40. & 879.46 Epithymbrium 878.43 Equisetum rabiem aguntur 1008 Equiseti marini consideratio 241.66 Equisetum olidum 798 Equisetum primum 725.1 Equisetum secundum ibid. Tertium 725.32 Quarta ibid. eius vires 726.14</p>
--	---	--

Index in Sex

<p><i>Erica</i> 141.20. altera <i>ibid.</i> 57. <i>baccifera</i> <i>ibid.</i> 62 <i>eius facultates</i> 142.32 <i>Erinus</i> 707.1. <i>Plinij</i> 707.12. <i>eius vires ex Gal.</i> <i>ibid.</i> 22 <i>Error quorundam qui Cassia fistula loco Cas-</i> <i>siam solutiuiam sumunt</i> 47.45. <i>de Mu-</i> <i>mia</i> 115.42. <i>eorum qui abiegnam lachry-</i> <i>mam Larignam censent</i> 103.4. <i>vulgaris de</i> <i>Sycomoro</i> 232.63. <i>qui Hiericoteam ro-</i> <i>sam Anomum censent</i> 52.54. <i>Cassiam &</i> <i>Cinnamomum eiusdem arboris existi-</i> <i>mantium</i> 49.1. <i>interpretis Auicenna</i> 613. 66 <i>Eruca sativa</i> 405.30. <i>sylvestris</i> <i>ibid.</i> <i>cerulea</i> 406.20. <i>earum historia</i> 290.35. <i>generatio</i> <i>ibid.</i> 52 <i>Eruum duplex</i> 343.48. <i>eius farina</i> <i>ibid.</i> 63. <i>vires ex Gal.</i> <i>ibid.</i> 66 <i>Eryngium</i> 504.37. <i>montanum</i> 505.1. <i>mari-</i> <i>num</i> <i>ibid.</i> <i>Eryngium planum</i> 505.33. <i>eius vires</i> 506.4 <i>Erysimi consideratio</i> 431.63. <i>Theophr. aliud à</i> <i>Dioscor.</i> <i>ibid.</i> <i>Erysimi similis hirsuta planta</i> 432.24 <i>Esula Chamapitys Nicolai</i> 867.24. <i>maior of-</i> <i>fic.</i> 867.10 <i>Euonymus</i> 170.1. <i>eius consideratio</i> 169.60. <i>differentie</i> 170.31 <i>Eupatorium</i> 717.15. <i>vulgare</i> <i>ibi.</i> <i>Mesues</i> 717. 67. <i>eius vires</i> 718.22. <i>vires ex Gal.</i> 718. 34 <i>Euphorbium</i> 585.10. <i>eius tenella planta</i> <i>ibid.</i> 26. <i>inuentio & nomen</i> 585.65. <i>vires</i> 586. 1. <i>eo quando utendum</i> 586.19. <i>venenata</i> <i>potio</i> 1003 <i>Euphrasia</i> 721.32. <i>eius vires</i> 722.2 <i>Exhortatio ad Lusitanos Medicos</i> 49.26</p>	<p><i>Ferula</i> 578.4. <i>asinos pascit, equos interficit</i> 14.14. <i>eius hist. ex Theoph.</i> <i>ibid.</i> 14. <i>mira</i> <i>natura</i> 578.56 <i>Ferulago</i> 578.22 <i>Ferula vires</i> <i>ibi.</i> 40 <i>Fiber Dioscor.</i> 267.47. <i>eius historia</i> 268.14 <i>Ficibus & vitibus folia nunquam decidunt</i> 8.20 <i>Ficus</i> 234.1. <i>Indica</i> <i>ibid.</i> <i>earum genera</i> 234. 64. <i>facultates</i> 235.33. <i>præcoces quo man-</i> <i>gonio fieri possint</i> 236.8. <i>pamila quomodo</i> <i>habeantur</i> <i>ibid.</i> <i>maritima</i> 236.30 <i>Filipendula</i> 627.5. <i>eius vires</i> 628.63 <i>Filix mas Diosc.</i> 885.44. <i>femina</i> <i>ibid.</i> 55. <i>eius</i> <i>historia & vires ex Theoph.</i> 886.37 <i>Filiacula Diosc.</i> 887.1 <i>Fimum</i> 309.25 <i>Flammula</i> 680.40 <i>Flammula historia & vires</i> 681.12 <i>Flammula veneni noxa & curatio</i> 987.14 <i>Flores quo tempore sint decerpendi, siccandi</i> <i>ac recondendi</i> 6.35 <i>Florum Nardi vires</i> 31.59 <i>Florum in plantis varietas</i> 12.20 <i>Flos aris</i> 921.12 <i>Flos S. Iacobi</i> 793 <i>Flos solis</i> 545 <i>Flos salis</i> 948.63. & 949. <i>Fuchsi est sperma</i> <i>ceti</i> 949.57 <i>Fluida Theodoro</i> 186.63 <i>Folium Officinarum</i> 44.1. <i>eius mentio apud</i> <i>Iureconsultos</i> 42.5 <i>Foliorum in plantis comparatio & similitu-</i> <i>do inter se</i> 10.10 <i>Fomes ignis ex Tusilagine</i> 615.12 <i>Formica & culices in Succino</i> 131.20 <i>Formicarium</i> 1017 <i>Fontium riguis qua herba increfcant</i> 8.46 <i>Fossilium colores varij</i> 901.12. <i>facultates</i> <i>ibid.</i> 30 <i>Fossilia mortem inferentia</i> 901.52 <i>Fragaria</i> 721.1. <i>fructu albo</i> <i>ibid.</i> <i>eius & frago-</i> <i>rum vires</i> 721.50 <i>Frangula</i> 875.14 <i>Fraus impostorum circumforaneorum</i> 979. 14 <i>Fraxinus</i> 128.20. <i>humilior</i> 128.58. <i>eius vires</i> <i>ibid.</i> 60 <i>Fructus quando decerpendi & quomodo con-</i> <i>seruandi</i> 6.56 <i>Fruentum Indicum</i> 319.1 <i>Fruentum Saraticum</i> 320.1 <i>Frutices qui dicantur</i> 7.60 <i>Fuchsi & quorundam error circa Pissasphal-</i> <i>tum</i> 112.33 <i>Fuchsi opinio de Sebesten reprobata</i> 218.34 <i>Fuchsi circa Colutea vires error</i> 572.12 <i>Fuchsi lapsus</i> 462.33 <i>Fuchsi lapsus circa spinam albam</i> 495.16 <i>Fuchsi opinio Ambarum nostrum esse facti-</i> <i>tium</i> 66.61 <i>Fuchsi opinio Styracem calamitem liquidum</i> <i>fuisse, reprobata</i> 90.12 <i>Fuchsi opinio reprobata qui Botrym theriaca</i> <i>miscet</i> 52.63 <i>Fuchsi opinio reiecta in Pistolochia</i> 484.50 <i>Fuchsi opinio Caphuram bituminis genus</i> <i>statuentis</i> 106.10 <i>Fuchsi opinio Malabathro Attractylim sub-</i> <i>feria.</i> 469 <i>Flor Indij pag 469.</i></p>	<p><i>stituentis, explosa</i> 45.27 <i>Fuchsi opinio reprobata Mannam explodere</i> <i>conantis</i> 95.63 <i>Fuchsi opinio improbata de succedaneo Car-</i> <i>pobalsami</i> 61.17. <i>opinio de Manna</i> 94.53 <i>opinio reprobata, volentis & Cassia &</i> <i>Cinnamomi genera inueniri</i> 49.33. <i>opi-</i> <i>nio reprobata de Attractyl.</i> 594.11. <i>opinio</i> <i>improbata de Calamo</i> 58.49. <i>opinio de</i> <i>Cedria</i> 124.8. <i>opinio improbata Chermes</i> <i>Laccam existimantis</i> 70.9. <i>arguitur</i> 468. 64. <i>error</i> 153.59. <i>error</i> 513.19. <i>error</i> 332.10. <i>error</i> 592.9. <i>error circa Armoraciam</i> 350. 29. <i>error circa Terebinthinam resinam</i> 101.64. <i>error circa Chrysanth.</i> 738.67 <i>error Galangam crassierem Accrum cer-</i> <i>sentis</i> 22.12. <i>de Ebore opinio falsa</i> 233.6 <i>error Pseudomelanthium Lelium satuca-</i> <i>tus</i> 581.8. <i>error dum hypocistum fungum pu-</i> <i>tat</i> 158.62. <i>lapsus</i> 56.68. <i>lapsus</i> 474.56. <i>a-</i> <i>pinio damnata dum Rhous tertium fecit</i> <i>genus</i> 186.50 <i>Fuchsius sibi contrarius</i> 49.42 <i>Fucus marinus, Diosc.</i> 795 <i>Fuci marini historia ex Plin.</i> <i>ibid.</i> <i>Fuci marini vires ex Gal.</i> 796 <i>Fucus ex Myrrha ad rugas</i> 88.61 <i>Fucus ad mulierum ornatum</i> 341.66 <i>Fucus ad decorandas feminas</i> 396.53 <i>Fuligo butyri</i> 300.63 <i>Fuligo liquida picis</i> 110.39. <i>earum vires</i> 111. 20. <i>picioria</i> 968.10. <i>Thuris</i> 93.5. & 96.56. <i>Fulmina qua auertunt</i> 14.24 <i>Fulminum admirabilis facultas</i> 14.31 <i>Fumaria</i> 807.10. <i>altera Plinij</i> 484.58. <i>altera</i> 807.14 <i>Fumaria corydalis</i> 808.1. <i>eius genera ex Plin.</i> 807.50 <i>Fumaria vires</i> 808.33 <i>Fungi</i> 995. <i>ad Populum albam</i> 133.4 <i>Fungorum venefica natura</i> 995. <i>preparatio</i> <i>ibid.</i> <i>Fungorum veneni remedia</i> <i>ibid.</i> <i>Fungi</i> 776.20. <i>malefici vt dignoscendi</i> 776. 43. <i>arte vt fiant</i> 777.5 <i>Fungorum genera</i> 776.63. <i>vires</i> 777.31 <i>Fungi igniarij</i> 101.56</p>
F.		
<p>F <i>Faba</i> <i>Fabarum vires</i> 337.10. <i>sylvestris</i> <i>Aegyptia</i> <i>Fabaria</i> 472.35 <i>Feniculum marinum</i> 381.64 <i>Femina in viros mutata ex Hip. & Plin.</i> 331.60 <i>Feniculum</i> 568.30. <i>erraticum</i> <i>ibid.</i> 50 <i>Feniculum sylvestre</i> 569.9 <i>Feniculi vires ex Gal.</i> <i>ibid.</i> 13 <i>Fenum gracum</i> 332.64. <i>eius vires</i> 333.10 <i>Fax</i> 951.30 <i>Fagi consideratio</i> 179.60. & 180.1 <i>Fallopium notatur</i> 161.40 <i>Farfara officin.</i> 614.60 <i>Farsugium Plinij seu Chamaleuce</i> 615.66 <i>Farrus & halica differentia</i> 327.50 <i>Febrifuga</i> 488.68 <i>Febris tertiana & quartana cura rusticorum</i> 36.63 <i>Felis cerebri veneficium & remedia</i> 996 <i>Felium conuersatio noxia</i> 997 <i>Feles aliqui ferre non possunt</i> 997 <i>Fel terra</i> 488.65 <i>Fel</i> 308.10 <i>Fellis vires</i> <i>ibid.</i> 35 <i>Fellus bubuli lapis & eius vires</i> <i>ibid.</i> 45 <i>Fernelius reprehenditur</i> 905.8 <i>Ferri scobis squama, noxa & curatio</i> 998</p>	<p><i>Ferula</i> 578.4. <i>asinos pascit, equos interficit</i> 14.14. <i>eius hist. ex Theoph.</i> <i>ibid.</i> 14. <i>mira</i> <i>natura</i> 578.56 <i>Ferulago</i> 578.22 <i>Ferula vires</i> <i>ibi.</i> 40 <i>Fiber Dioscor.</i> 267.47. <i>eius historia</i> 268.14 <i>Ficibus & vitibus folia nunquam decidunt</i> 8.20 <i>Ficus</i> 234.1. <i>Indica</i> <i>ibid.</i> <i>earum genera</i> 234. 64. <i>facultates</i> 235.33. <i>præcoces quo man-</i> <i>gonio fieri possint</i> 236.8. <i>pamila quomodo</i> <i>habeantur</i> <i>ibid.</i> <i>maritima</i> 236.30 <i>Filipendula</i> 627.5. <i>eius vires</i> 628.63 <i>Filix mas Diosc.</i> 885.44. <i>femina</i> <i>ibid.</i> 55. <i>eius</i> <i>historia & vires ex Theoph.</i> 886.37 <i>Filiacula Diosc.</i> 887.1 <i>Fimum</i> 309.25 <i>Flammula</i> 680.40 <i>Flammula historia & vires</i> 681.12 <i>Flammula veneni noxa & curatio</i> 987.14 <i>Flores quo tempore sint decerpendi, siccandi</i> <i>ac recondendi</i> 6.35 <i>Florum Nardi vires</i> 31.59 <i>Florum in plantis varietas</i> 12.20 <i>Flos aris</i> 921.12 <i>Flos S. Iacobi</i> 793 <i>Flos solis</i> 545 <i>Flos salis</i> 948.63. & 949. <i>Fuchsi est sperma</i> <i>ceti</i> 949.57 <i>Fluida Theodoro</i> 186.63 <i>Folium Officinarum</i> 44.1. <i>eius mentio apud</i> <i>Iureconsultos</i> 42.5 <i>Foliorum in plantis comparatio & similitu-</i> <i>do inter se</i> 10.10 <i>Fomes ignis ex Tusilagine</i> 615.12 <i>Formica & culices in Succino</i> 131.20 <i>Formicarium</i> 1017 <i>Fontium riguis qua herba increfcant</i> 8.46 <i>Fossilium colores varij</i> 901.12. <i>facultates</i> <i>ibid.</i> 30 <i>Fossilia mortem inferentia</i> 901.52 <i>Fragaria</i> 721.1. <i>fructu albo</i> <i>ibid.</i> <i>eius & frago-</i> <i>rum vires</i> 721.50 <i>Frangula</i> 875.14 <i>Fraus impostorum circumforaneorum</i> 979. 14 <i>Fraxinus</i> 128.20. <i>humilior</i> 128.58. <i>eius vires</i> <i>ibid.</i> 60 <i>Fructus quando decerpendi & quomodo con-</i> <i>seruandi</i> 6.56 <i>Fruentum Indicum</i> 319.1 <i>Fruentum Saraticum</i> 320.1 <i>Frutices qui dicantur</i> 7.60 <i>Fuchsi & quorundam error circa Pissasphal-</i> <i>tum</i> 112.33 <i>Fuchsi opinio de Sebesten reprobata</i> 218.34 <i>Fuchsi circa Colutea vires error</i> 572.12 <i>Fuchsi lapsus</i> 462.33 <i>Fuchsi lapsus circa spinam albam</i> 495.16 <i>Fuchsi opinio Ambarum nostrum esse facti-</i> <i>tium</i> 66.61 <i>Fuchsi opinio Styracem calamitem liquidum</i> <i>fuisse, reprobata</i> 90.12 <i>Fuchsi opinio reprobata qui Botrym theriaca</i> <i>miscet</i> 52.63 <i>Fuchsi opinio reiecta in Pistolochia</i> 484.50 <i>Fuchsi opinio Caphuram bituminis genus</i> <i>statuentis</i> 106.10 <i>Fuchsi opinio Malabathro Attractylim sub-</i> <i>feria.</i> 469 <i>Flor Indij pag 469.</i></p>	<p>G. G <i>Agates Diosc.</i> 959.14. & 114.16. <i>historia</i> <i>& vires ex Gal.</i> 959.4 <i>Galactites lapis</i> 961.1 <i>Galange consideratio & historia</i> 23.34. <i>vires</i> <i>ibid.</i> 46. <i>cum Cypero comparatio</i> 22.5 <i>Galbanum</i> 586.45. <i>eius vires</i> <i>ibid.</i> 64 <i>Galega siue Ruta capraria</i> 836.1 <i>Galenus à calumnia defenditur</i> 371.10 <i>Galenus loci restitutus</i> 94.10. <i>liber ad Pijo-</i> <i>nem spurius</i> 610.62. <i>nauigationes, vt legi-</i> <i>tima cognosceret simplicia</i> 2.25. <i>peregrina-</i> <i>nationes</i> 285.57 <i>Galerita</i> 793 <i>Galion Diosc.</i> <i>ibid.</i> <i>Galiij vires ex Gal.</i> <i>Galiopsis</i> 791. <i>eam quidam scrophulariam</i> <i>putant</i> 791 <i>Galla</i> 184.43. <i>earum praesagium</i> 185.27. <i>vires</i> <i>ibid.</i> <i>Gallularia alba in tra.</i> 152. 23 <i>Gallidrago Plinij.</i> 494.</p>

Libros Dioscoridis.

<p>Galli & gallinae Diosc. 281.26. eorum vires ex Gal. 281.57. rabidi sunt 1008. eorum tutela contra mustelas 514.44 Gallus sede deplumata vulneri venenato ap- plicandus 1013 Gammari nomen graecum Aristoteles ignora- uit 250.48. eorum lapilli 251.42 Garum 276.34 Garyophyllus Indicus maior 469.6. minor i- bid. 38. minor flore simplici ibid. Gattaria mentio 528.61. historia 529.55. vi- res 529.63 Gaza reprehenditur 147.11 Gelsiminum 86.13 Gemma cur niteant 900.4. earum ramenta in officinis adulterata 963.34 Gentiana maior 480.32 Gentiana maior purpurea ibid. Gentiana minor 481.1 Gentiana minima ibid. Gentiana vires ex Gal. 480.68 Genista 853.12. angulosa ibid. Genista vires ex Mesue 853.50 Genitale cervi 279.64 Genes peculiare a serpentibus tuta 1015 Genes lapis 966.7 Geranium primum 621.3. tuberosum maius ibid. 38. secundum ibid. Pliny seu acus mu- scata 621.28. tertium 622.1. cicutae folio i- bi. cicutae folio supinum 622.35. quartum 623.34. quintum ibi. sextum 624.1. Myr- rhim censet Hermolai 622.60 Gerani vires 623.68 Gesnerus arguitur 665. deceptus reprehendi- tur 761.66. notatur 264.68 Gesneri calumnia retunditur 770.23 Gethyum 420.32 Githago 580.69 Gitto non est Melanthium sylu. 580.45 Gitto non est legitimum Melanthium 62 Gith seu Melanthium 579.55 Gingiber 438.23 Gingiberis vires ibid. 63 Gingiberis radices rubrica inficiuntur 37 Gingidium 401.27. eius vires 402.33 Gladiolus 701.5 Gladioli vires ex Gal. 701.48 Glandiferarum arborum vires 182.7 Glanides 272.35 Glans vnguentaria 854.22. Andrea Marini ibid. 45 Glandis vnguentaria vires ex Mesue 855.43 Glans 178.36 Glandiferarum arborum consideratio 178.52 Glastum 472.16 Glaucium 588.16. ex chelidonia ibid. eius vi- res ex Gal. 588.30 Glaux Dioscor. 835.62. eius vires 836.23 Gleucinum oleum 83.50 Glirum consideratio 298.63 Glutinum 588.38 piscium 588.44. librariorū 588.53 Glycyrrhiza 486.1. altera Glycyrrhiza vires 486.36 Gnaphalium 625.14. latifolium peregrinum 626.1. vulgare Gnaphaly vires ex Gal. 625.55</p>	<p>Gnidinum oleum 77.50 Gobius primus 274.1. secundus 274.20. ter- tius & quartus 274.50. quintus & sextus 275.5. fluminalis ib.30 Gossipium 334.46 Gramen Diosc. 707.40. manna 708.1. alterum ibid. Parnasi 709.1. aculeatum 709.34. e- ius vires ex Plinio 708.35. ex Gal. 709.50 Grana Paradyfi 28.16 Granata 195.69 Grani tinctorij vires 728.3 Gratia Dei Elaphoboscum Ruell. 568.8 Gratiola 516.47. minor 517.19. eius vires ibi. Guaiaci planta 162.16. facultates ibi. 19. con- sideratio 161.29. tria genera Manardo 161.34 Guaiacum lignum quod sit praestantius ib. 46 quid sit 164.34. eius tria genera 164.42 primus vsus ibid. Guaiabara 139.53 Guilandinus arguitur 147.58 Gummi Graecum quid 172.8. Arabicum 171.67 Gummi lachryma, resina vt colligenda & re- ponenda 7.18. Iuniperi seu Vernix & eius vsus 118.50. Elemi 178.5. Vlni 136.48. cerasorum 199.32 Gypsum 995. & 952.12. eius veneficium & remedia 995. vires ex Gal. 952.22</p>	<p>Hemionium & Asplenium Plinio idem 646.6 69 Hepatica quorundam 609.62 Heptaphyllon alpinum sericeum 820.6 Herba lula 740.68 Herba Gattaria 530.1 Herba Lupa 409.23 Herba Paru 767.1 Herba Iudaea Anticenna 912.33 Herba mora 865.60 Herba Tora 409.33 Herba paralytis 800 Herba paralytis vires ibid. S. Iohannis 618.48 Herba cancri 894.10 Herba stella 383.52 Herba qua dicantur 7.64. certis temporibus colligenda 5.58 Herba venerea Theophrasti mentio 638.52 Herbaria rei studiosis quid faciendum 4.27 Herbarum forma descripta parum conferant 3.30 Hermolai & Ruellij error de Nardo 31.18 Hermolai error 409.55 Hermolai, Ruellij & Manardi lapsus 324.35 Hermolai lapsus, Elzeomeli Mannam censentis 75.66. & Marcelli opinio de Iasmino im- probata 85.65 Hermodactylus verus 778.34 eius coniectura 779.11 Hermodactyli officinarum radices 780.15 Herniola 677.12 Hieracium Diosc. 560.25 Hieracium maius ibid. 33 Hieracium minus filiqua falcata 561.26 Hieracium pro Endiua male sumunt sepla- starij 388.63 Hippocampus 240.68 Hippocampi consideratio & opiniones 241 20 Hippocampus locustae genus ibid. 32 Hippocampi vires 242.20 Hippocratis praecipuum Crataei in colligendu herbus datum 6.1 Hippoglossum 828.63 non est Laurus Alexand. 829.2. eius vires ibid. 8 Hippolapathum 354.1. sylu. stre ibid. 33 Hippophaes Diosc. 861.66 Hippophastrum Diosc. 862.10 Hippopotamus 260.34 Hippopotamus Ballony & Gesneri 267.3 Hippopotamus vbi alatur 267.20 Hippopotami vires 267.29 Hippofelinum 563.54 Hirculus 34.10 Hirundo 286.24 Hirundinum historia 286.50 Hirundinum vires 286.60 Hirundinum demoratarum noxa 1002 Hirundinum curatio ibid. Historia 763.48. 767.64. altera & tertia 768.9. alia 1015. alia notabilis 972.23 fraudis circumforanei 9.40. sumpei ar- guti vias 999 prima de slibio 926.60. se- cunda 927.12. tertia ibid. quarta ibid. Ga- lens de Peronia 655.58 Holostium 627.1. Hirsutum allicans maius ibid. 26 Hordeum 321.6 Hordei facultates ibid. 52 Hormi-</p>
---	---	---

H.

H

Adrospbarum Malabathrum 42.63
Hamorrhoi perniciosus iclus & histor. 1024

Hamorrhoi morsus nota & curatio 1024

Hematites ferri materia 958.32. eius consi-
deratio 958.24. vires 958.36

Halici 327.19. eius paraderatio ex Plin.
ib. 26. vires ibi. 39

Halimus vulgaris 145.35. latifolius erectus ib.
vulgaris descriptio 146.9. vires 146.14

Harmala historia 542. loco cicutae semen ma-
le accipitur 542

Hastula regia 451.1

Hedera arborea 466.12. helix ibid. terrest. is
467.22. terrestris montana ibid. eius vires
ibid. non est Asclepias 592.4

Hedychroum 84.30

Hedysarum 641.20

Hedysari vires ex Gal. 642.10

Helenium Indicum maximum 889.22. r. a.
mosum ibid.

Helenium 72.50

Heleny vires ex Gal. 73.38

Heleny succum venenatum esse. fabulosum i-
bid. 44. Aegyptij consideratio 73.26

Heliotropium maius Diosc. 892.60. alterum
893.1. minus 893.40. tricocon ibid. eius vi-
res 894.15

Helichrysum 735.26. Italicum ibid. 36. Creti-
cum 736.1. Orientale 736.33

Helix 466.54

Helius plura genera ibid.

Helixine 781.50. & 715.43

Helixines vires 712.4

Hemerocallus 630.44

Hemerocallis altera 631.1

Hemerocallis vires 631.57

Hemionium 646.39. eius vires 647.69

Hemionium 647.69

Hormi-

Index in Sex

Horminum Dioscor. 639.44. domesticum 640.1. sylvestre ibid. Syriacum 641.10. Plinij 640.40. frugis genus 640.46	Isatis domestica 471.38. sylvestris ibid. vtriusque vires 472.13	ardeant 900.28. cur duri aut molles ibid. erodentes ibid. 32. pragnantes 900.37. accenduntur 101.30. venenis resistentes 976.44. in spongis 965.25. eorum vires 965.28.
Humida loca qua planta ament 830	Ischas 876.48. eius descriptio ex Theophrast. 876.56	Lappa maior 804.40. maior altera 805.19 minor 834.1
Hyacinthus 743.32. vacinium est 153.42. Orientalis 743. Orientalis alter 744.1. Tripolitanus 744.36. eius vires 744.22	Isopyrum 820.55	Lapsus Hermolai, Manardi, & Ruellij 456.64.
Hydri siue Natricis historia 1025	Iudaea Balsami destituitur plantis 59.59	Lapathum 352.56. sanguineum 353.1. eius vires 354.51
Hydropiper 717.63. siue Persicaria 440.8. male Ruellius Pseudoeupatorium statuit 440.45. eius vires 441.4	Iudaicus lapis 962.40	Larga 102.35
Hyoscyamus 750.5. & 990. albus ibid. tertius 750.40. cur altercum dicatur 751.5. Creticus luteus 751.36. eius vires 751.12	Iuglandis descriptio 223.42. vires condita 224.14	Larix 104.34
Hyoscyaminū oleum 77.28. venenosa vis 990. vtriusque curatio 990	Iuiuba 219.63	Laurinum oleum 78.32. eius vires ibid. 46
Hypocoum 749.12. eius vires ibid. 37	Iuncus 731.35. floridus ibid. eius consideratio & vires 732.7. odoratus 56.1. eius descriptio ibid. 42. vires ex Galeno 57.26	Laricis historia 101.7
Hypericum Diosc. 667. & 668. eius vires ex Gal. 669. eis album florem tribuit Brasauol. 668	Iuniperus 117.44. duplex 118.41. Dioscor. Cedrus Theophr. non est 118.37. eius lignum ad centenarios annos perdurat ibid. vires 119.20.	Lathyrus Diosc. 867.54. eius vires 868.10
Hypericum Diosc. 667. & 668. eius vires ex Gal. 669. eis album florem tribuit Brasauol. 668	Iureconsultorum locus in Digestis emendatus 42.20	Laurus 125. latifolia ibid. Apollini & Ioniscra 126.13. è caelo missa 126.23. vires ibid. 40. lapidea ibid. 50. sylvestris seu Timus 127.1
Hypocistis 158.43. eius succedanea ibid. 67	Ius piscium 276.40	Lauendula seu Lauanda 31.48
Hyssopum 515.28. ceruleū folio dissecto ibid. albo & rubro flore ibid. vulgatum esse legitimum 516.1. montanum 516.29. eius vires 516.33	Ixia 994.1. eius venefica natura 994.12. non est diuersa à Chamaleone 994.24. eius veneni curatio 994.42	Laurus Alexandrina 841.1. altera ibid. vires 842.6
Hystricis mentio 240.59		Lasertium Dioscor. 582.18. seu Lasermesse Belzoinum 582.50. hist. ex Theophr. 583.30. vires ex Gal. 583.63. Gallicum 584.7
I.	K.	Leccio Serapionis deprauata 26
Iacea siue flos trinitatis 822.1. altera ibid. incana laciniata 690.1	Kali 364.1. maius cochleato semine ibid. Anthyllis altera quibusdam 363.67. Anthyllidem censet Fuchsius 648.43	Ledum 159.41
Iacobi Syluij opinio reprobata 172.20	Karabe 133.19. Succinum esse negat Brasauolus 131.34	Lens 340.36
Iasminum oleum 85.55		Leoniceus à Fuch. calū. defenditur 39.48. opin. de coronopo reprobata 383.62. eius & Fuch. opinio improbata, qui voluerūt Celticā nardum à Saliunca non differre 33.50
Iasminum Hispanicum grandiflorum 87.1	L.	Leontopetalum 596.5. eius vires ex Gal. ibid. 23
Iassidum genera 964.36. natura 964.40 vires ex Gal. ibid. 44	L Abram veneris 493.5. alterum ibid. 39.	Lepidium 238.59. & 456. Plinij ibi. 62. Pauli ibid. 69. Piperitis 457.1
Ibicus stercoris mir. facultas 310.69	Labrusca 902.3	Lepus marinus & terrestris Diosc. 261.50. marinus venenum 262.50. marinus alter 262.26. terrestris 262.59. marini veneni signa 1000
Iberis 237.67. & 457.1 & Lepidium idem 238.14. altera Paulo ibid. 49	Laburni mentio 664	Leusticum vulgare 564.1. Smyrnum censet Fuchsius 564.28
Ibiscus 662	Lac Dioscor. 300.20. intus coagulatum 997. eius veneni curatio 998. eius probatio ibid. 45. facultates ibid. & 302.64. bibendi ratio 301.58	Leontopodium verum 828.14
Ichthyocola 588.45	Lacca 69.16. Arabum de ea opinio varia ibid. 28. eius vires & lotio ibid. 38. tinctorum & Arabum differens à Cancamo 69.44. facultia genera ibid. 68	Lemnia terra censetur bolus Armenus 938.65 noua historia à Gal. dissentiens 939.8. lotio 939.50. tres differentia 938.9. vires 938.40
Idea radix 724. eius vires ibi.	Lacerta 294.46. earum consideratio 295.24 maiores 984.58	Lens palustris 783.22. altera ibid. tertia 784.14
Idola in cadaueribus conditis reperta 115.10	Lactuca 398.33. crispa 399.1. non capitata ib. florescens ibi. 33. foliis Endiuia ibi. Romana 398.63. sylvestris 400.10. eius vires 400.3. & 30. sylvestris Plin. 472.10	Lepores aquè gignere vana est opinio 262.68. bina iecora habent 263.37
Iecinora 279.1	Lacunosis locus, qua herba crescant 8.37	Lentiscinum oleum 78.50. eius vires ibid. 60
Iesemin vnde dictum 86.12. eius vires ex Serapione ibi.	Ladani consideratio 159.58. vsus ibid. 67. vires ex Gal. 160.11	Lentium vires ex Gal. 340.29
Ilex 180.1. latifolia spinosa ibid. 34. duplex ibid. 42. coccifera 727.12	Lagopus 697.22. pes leporis 699.1. eius vires ex Gal. 698.66	Lentiscus 105. Roboris magnitudine 105.23. eius vires ibid. 50
Imperatoria 567.1. eius vires 566.66. Alpina 567.33	Lamium Plinij 792	Leucacantha 502. eius vires ex Gal. 503.20
Impia herba Plinij 625.3	Lampsana 356.15. Plinij ibid. 52. eius vires ib.	Leucas 598.60. duplex 599.1
Impostores quandoque etiam peritos decipiunt 3.42. eorum fraus cauenda 162.43	Lana 303.24	Leucoium album & purpureum 632.16. aureum ibid. eius vires 632.66
Incantationibus vti dum planta effodiuntur, vanum est 4.35	Lapis Arabicus 960.64. Afius 956. Armenius 931.22. Armenij vires ex Alexandro 931.54. Bezabar 940.10. calaminaris 918.13. plumbarius 925.23. Phrygius 956. in oculis ceruorum natus 940.27. Pyrites 957.38. Ostracites 965.40. Schistus 958.67. Lincis vulgaris 311.58. Zaffara 899.9. eorū generatio 896.45. colores varij vnde 899.1. diuersa discrimina 899.58. cur pellucidi 899.63. cur graues aut leues 900.13. cur	Libanotis seu Rosmarinum 575.25. fructifera Theophr. 564.6
Indicia veneni sumpti 977.20		Libri qui explodendi 5.4
Indicum 933.16		Libysticum idem est cum Ligustico 547. eius vires 548
Interpretum Dioscoridis lapsus 154.63		Lichen. 732.33. eius genera ex Plinio 732.47 vires ex Gal. 733.46
Intubus maior 386.36. minor ibid. crispa 387.38. eius vires 390.22		Lichenes equorum 280.44
Inula 73.5		Lignorum marcor 126.62
Ioan. de Vigo lapsus 86.29		Lignum Aloe 67.20
Iouij error 239.66		Ligusticum 547. alterum Ligustrum
Irium oleum 83.34. ad quos vsus praestet 19.28		
Iris 431.30. altera ibid. eius genera duo 432.11		
Iris & eius species 18.24. candida ibid. 65. lutea ibid. eius vires 19.8. mentio ex Gal. ibi. 40. cognomento Astragalitis 19.34		

Libros Dioscoridis.

<i>Linum catharticum</i> 263.				
<i>Ligustrum</i> 153.15. conuoluuli species Seruio Gram. ib. 60. Aegyptiacum 154.24. eius vires ibid. 10. oleum & eius vires 154.6. a qua	ca viis & auxilia	998	res	ib. 60
<i>Lilac</i>	<i>Mahaleb à Phillyrea discrimen</i> 156.58. vires ibid. 68		<i>Medulla vires</i> 307.58. in cibis facultas	308.5
<i>Lilium conualium</i> 631.1. eius vires	<i>Maiorana</i>	535.23	<i>Megalinum oleum</i>	84.20
<i>ephemerum</i> vocat Fuchsius	<i>Mala aurea</i>	760.69	<i>Mehenberbene</i>	228.69
<i>Lilium</i> Diosc. 599.60. eorum consideratio 600.38. historia ex Plinio 600.45 facultates 601.5. vt totum annum vivat	<i>Maia</i>	251.68	<i>Mel consideratio & historia</i> 24.56. vires 25.5	
<i>Limonium</i> Diosc. 695.66. alterum ibid. vires 697.10	<i>Mala</i> 200.63. eorum vires 201.33. Punica 193.8. eorum vires ex Gal. 194.44. dulcia ad pleuritidem 201.65. Cotoneorum consideratio 201.66. Melengena 760.28. insana 760.46. horum vires	ibid. 62	<i>Mel</i> 312.23. heracleoticum 313.10. eius genera non rosida ibid. 13. heraclia 987. cruceum	141.42
<i>Linonia mala</i>	<i>Malabathrum</i> 41.62. eius historia ex Arrianus	42.50	<i>Melanteria</i>	942.50
<i>Lingua serpentina</i> 447.37. aut	<i>Malabathrinū oleum</i> 85.50. vnguentum 42.6		<i>Melanthium sativum</i> 580.1. syluestre	ibid.
<i>Linum</i> 333.40. syluestre 334.1. angustifolium	<i>Malicorium</i> 194.25. eius vires	ibid. 37	<i>syluestre secundum</i> 580.33. eius vires	581
<i>ibid. eius vires</i>	<i>Malua</i> 359.1. maior ibi. Rosea flore pleno	ibid. 360.8	<i>23. oleum</i>	77.56
<i>Linum viuum</i>	<i>33 arbor</i> Plinio ibid. maior altera	360.8	<i>Melegeta femina Cardamomi quibusdam</i>	28.13
<i>Liquidambar quid</i>	<i>quarta</i> ibid. eius vires	360.42	<i>Melites lapis</i>	961.8
<i>Lithospermon</i> 656.50. maior 657.1. minus ib. barundinaceum 657.32. eius historia ex Plin. 657.34. vires 657.50. frutescens angustifolium 658.8. aruense radice rubra	<i>Manardus arguitur</i> 166.40. eius opinio de Pisaniana 322.4. opinio non accepta 538.8. error officinar. Nardum nec Indicum nec Syriacū esse 30.22. Dolichos eruiliam esse volentis 414.53. lectio non probata 90.17. & Fuch. opinio reprobata 313.23. dubium iolutum	855.26	<i>Melica consideratio</i>	329.49
<i>Lithacolla</i>	<i>Mandragora</i> 990. eius venefica natura 991.1 noxa remedia 991.8. mas & femina 759.38. humana forma. sacilitia 759.50. Morio vocata 760.25. eius vires	761.2	<i>Melilotus sine Serrula campana</i>	535.39
<i>Litora & scopulos que planta ament</i>	<i>Manna thuris</i> 92.67. & 96.50. & 94. celestis	94.40. Arabum 94.58. eius historia ex Gal. 95.3. ex Plinio ib. 12. in comitatu Goritienfi & foro Iulij 95.20. in agro Tridentino ibid. 25. secto arborum cortice manis	<i>Melilotus Italica folliculus rotundus</i>	ibi.
<i>Lixiua pilosorum</i>	95.43. eius temperamentum & vires ibi.	57	<i>Meliloti historia</i>	536.14
<i>Locusta</i> 284.26. in cibis 284.69. debellantur 284.5. earum agmina in Italia	<i>Marcelli error</i> 423.52. error Pinum Tedam interpretantis 100.62. & Symphoriani error Persicam & Perseam idem censentium	203.68. ignoratio 264.31. lapsus 324.15. Is reprehenditur 153.56. eius error	<i>Meliloti vires ex Gal.</i> 536.18. descriptio ex Serapione 536.22. Germanorum	309.51
284.65	<i>Margaritarum historia</i> 243.44. ea proueniūt in Bohemia	244.2	<i>Melinum oleum</i>	80.50
<i>Loligo sine Calamato</i>	<i>Marrubium</i> 604.23. eius duo genera Theoph. ibid. 36. vires Matthiolo	604.43	<i>Melissa</i> 602.35. Constantinopolitana 602.25	
<i>Lolium</i> 331.40. eius vires	<i>Marsi vi viperas capiunt</i>	1016	<i>Molucana</i>	603.15.
<i>Lonchitis</i> Diosc. 660. altera Diosc. 660. aspera maior 661. aspera minor ibid. Plinij ibid. eius vires ex Gal.	<i>Marum</i> Diosc. 536.45. & 537.1. eius mentio ex Galeno 536.51. Italia peregrinum	537.5	<i>Moldauica</i>	ibid.
<i>Laniceri & Tragi error circa Ocimum</i> 408. lapsus circa locum natalem cupressi 117.1. error 157.6. lapsus	<i>Mastiche duplex</i> 106.56. eius consideratio 105.33. cura & vires ibid. 51. oleum	79.7	<i>Melissophylli duo genera</i> 603. Constantinopolitanum 603.50. alterum ibi.	58
<i>Lera</i> 907.50. eius paranda ratio ex Gal. 907.60. facultates	<i>Marragon</i>	600.4	<i>Melochites lapis</i>	932.25
<i>Lotus syluestris</i> 608.2. urbana 809.1. syluestris ibid. vtriusq. vires ex Gal. 809.54. arbor 211.10. Plinij ibid. 34. Africana 212.4. & 64. Italica ibi. 16. Athenas non 212.3. phus 213.1. Aegyptia	<i>Matricaria</i> 651.1. non est Artemisia eam Artemisiam statuunt Monachi & Fuchsius	618.24	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lunaria minor</i> 647.20. ramosa ibid. alia	<i>Matthioli testimonium aduersus Gesnerum</i>	770.47. aduersarij notantur	<i>Melocites lapis</i>	932.25
647.62	<i>Meconium</i>	991.50	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Luparia</i>	<i>Medica Dioscoridis</i>	415.40	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lupini stercoris vires</i> 310.48. iecoris vires 279.34	<i>Medica malus</i>	204.62	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lupinus</i> 344.32. sylv. luteus ibi. caruleo flore angustifolius 345.1. eorum facultates ib. 10	<i>Medicina scopi duo</i>	15.45	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lupulus</i> 839.10. eius historia & vires 839.54	<i>Medicamenta peregrina cur adulterentur</i>	85.10. adulterabantur etiam Galeni tempore	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lycobis</i> 599.8. sylv. ibid. 30. sive. alba multiflora 706.20. vires ex Gal.	<i>Medicorum quorundam opinio explosa</i> 2.46		<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lycium</i> 168.5. Italicum ibid. 30. adulterinum ibid. 64. eius vires	<i>munus neglectum</i>	3.26	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lycopis</i>	<i>Medicorum & Sephasiariorum error in Casfia succedaneo</i>	46.30	<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lyncurium</i>	<i>Medium sine viola Mariana</i> 699.40. eius vi-		<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lysimachia</i> 675.14. altera ibid. eius vires ex Gal.			<i>Melocites lapis</i>	932.25
676.4			<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Lythargyrium aliud ex auro, aliud ex argento fieri falsum</i> 929.56. eius vires ex Gal. 929.63			<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>929.63</i>			<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>929.63</i>			<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>M.</i>			<i>Melocites lapis</i>	932.25
M acer 134.10. & Macis differunt 134.14 & 50. eius facult. ex Gal. ibi.			<i>Melocites lapis</i>	932.25
26			<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Mena</i>			<i>Melocites lapis</i>	932.25
273.35			<i>Melocites lapis</i>	932.25
<i>Magnetis lsp. hist.</i> 960.26. differentia & delectus 960.36. vires ex Gal. 960.59. venesi-			<i>Melocites lapis</i>	932.25

Index in Sex

<p>Horminum Dioscor. 639.44. domesticum 640.1. sylvestre ibid. Syriacum 641.10. Plinij 640.40. frugis genus 640.46</p> <p>Humida loca quae plantae ament 830</p> <p>Hyacinthus 743.32. vacinium est 153.42. Orientalis 743. Orientalis alter 744.1. Tripolitanus 744.36. eius vires 744.22</p> <p>Hydri siue Natricis historia 1025</p> <p>Hydropiper 717.63. siue Persicaria 440.8. male Ruellius Pseudoeupatorium statuit 440.45. eius vires 441.4</p> <p>Hyoscyamus 750.5. & 990. albus ibid. tertius 750.40. cur altercum dicatur 751.5. Creticus luteus 751.36. eius vires 751.12</p> <p>Hyoscyaminū oleum 77.28. venenosa vis 990. vtriusque curatio 990</p> <p>Hypocoum 749.12. eius vires ibid.37</p> <p>Hypericum Diosc. 667. & 668. eius vires ex Gal. 669. eis album florem tribuit Brasauol. 668</p> <p>Hypocistis 158.43. eius succedanea ibid.67</p> <p>Hyssopum 515.28. caeruleū folio dissecto ibid. albo & rubro flore ibid. vulgatum esse legitimum 516.1. montanum 516.29. eius vires 516.33</p> <p>Hystricis mentio 240.59</p>	<p>Ifatis domestica 471.38. sylvestris ibid. vtriusque vires 472.13</p> <p>Ischas 876.48. eius descriptio ex Theophrast. 876.56</p> <p>Isopyrum 820.55</p> <p>Iudaea Balsami destituitur plantis 59.59</p> <p>Iudaicus lapis 962.40</p> <p>Iuglandis descriptio 223.42. vires ibid.62</p> <p>condita 224.14</p> <p>Iuiaba 219.63</p> <p>Iuncus 731.35. floridus ibid. eius consideratio & vires 732.7. odoratus 56.1. eius descriptio ibid.42. vires ex Galeno 57.26</p> <p>Iuniperus 117.44. duplex 118.41. Dioscor. Cedrus Theophr. non est 118.37. eius lignum ad centenarios annos perdurat ibid. vires 119.20.</p> <p>Iureconsultorum locus in Digestis emendatus 42.20</p> <p>Ius piscium 276.40</p> <p>Ixia 994.1. eius venefica natura 994.12. non est diuersa à Chamaleone 994.24. eius veneni curatio 994.42</p>	<p>ardeant 900.28. cur duri aut molles ibid.</p> <p>erodentes ibid.32. pragnantes 900.37. accenduntur 101.30. venenis resistentes 97.6. 44. in spongiis 965.25. eorum vires 965.28.</p> <p>Lappa maior 804.40. maior altera 805.19</p> <p>minor 834.1</p> <p>Lapsus Hermolai, Manardi, & Ruellij 456.64.</p> <p>Lapathum 352.56. sanguineum 353.1. eius vires 354.51</p> <p>Larga 102.35</p> <p>Larix 104.34</p> <p>Laurinum oleum 78.32. eius vires ibid.46</p> <p>Laricis historia 101.7</p> <p>Lathyrus Diosc. 867.54. eius vires 868.10</p> <p>Laurus 125. latifolia ibid. Apollini & Ionis sacra 126.13. è caelo missa 126.23. vires ibid.40. lapidea ibid.50. sylvestris seu Timus 127.1</p> <p>Lauendula seu Lauanda 31.38</p> <p>Laurus Alexandrina 841.1. altera ibid. vires 842.0</p> <p>Lasertium Dioscor. 582.18. seu Lasernense Belzoinum 582.50. hist. ex Theophr. 583.30. vires ex Gal. 583.63. Gallicum 584.7</p> <p>lectio Serapionis deprauata 26</p> <p>Ledum 159.41</p> <p>Lens 340.36</p> <p>Leonicenus à Fuch. calū. defenditur 39.48. opin. de coronopo reprobata 383.62. eius & Fuch. opinio improbata, qui voluerūt Celticā nardum à Saliunca non differre 33.50</p> <p>Leontopetalum 596.5. eius vires ex Gal. ib.23</p> <p>Lepidium 238.59. & 456. Plinij ibi.62. Pauli ibid.69. Piperitis 457.1</p> <p>Lepus marinus & terrestris Diosc. 261.50. marinus venenum 262.50. marinus alter 262.26. terrestris 262.59. marini veneni signa 1000</p> <p>Leuisticum vulgare 564.1. Smyrniū censet Fuchsius 564.28</p> <p>Leontopodium verum 828.14</p> <p>Lemnia terra censetur bolus Armenus 938.65 noua historia à Gal. dissentiens 939.8. lotio 939.50. tres differentia 938.9. vires 938.40</p> <p>Lens palustris 783.22. altera ibid. tertia 784.14</p> <p>Lepores aequè gignere vana est opinio 262.68. bina iecora habent 263.37</p> <p>Lentiscinum oleum 78.50. eius vires ibid.60</p> <p>Lentium vires ex Gal. 340.29</p> <p>Lentiscus 105. Roboris magnitudine 105.23. eius vires ibid.50</p> <p>Leucacantha 502. eius vires ex Gal. 503.21</p> <p>Leucas 598.60. duplex 599.1</p> <p>Leucoium album & purpureum 632.16. aureum ibid. eius vires 632.66</p> <p>Libanotis seu Rosmarinum 575.25. fructifera Theophr. 564.6</p> <p>Libri qui explodendi 5.4</p> <p>Libypticum idem est cum Ligustico 547. eius vires 548</p> <p>Lichen. 732.33. eius genera ex Plinio 732.47</p> <p>vires ex Gal. 733.46</p> <p>Lichenes equorum 280.44</p> <p>Lignorum marcor 136.62</p> <p>Lignum Aloes 67.26</p> <p>Ligusticum 547. alterum Ligustrum</p>
I.		
<p>Iacea siue flos trinitatis 822.1. altera ibid. incana laciniata 690.1</p> <p>Iacobi Syluij opinio reprobata 172.20</p> <p>Iasminum oleum 85.55</p> <p>Iasminum Hispanicum grandiflorum 87.1</p> <p>Iaspidium genera 964.36. natura 964.40 vires ex Gal. ibid. 44</p> <p>Ibicus stercoris mirafacultas 310.69</p> <p>Iberis 237.67. & 457.1 & Lepidium idem 238.14. altera Paulo ibid.49</p> <p>Ibiscus 662</p> <p>Ichthyocolla 588.45</p> <p>Idea radix 724. eius vires ibi.</p> <p>Idola in cadaueribus conditis reperta 115.10</p> <p>Iecinora 279.1</p> <p>Iesemin vnde dictum 86.12. eius vires ex Serapione ibi.</p> <p>Ilex 180.1. latifolia spinosa ibid.34. duplex ibid.42. coccifera 727.12</p> <p>Imperatoria 567.1. eius vires 566.66. Alpina 567.33</p> <p>Impia herba Plinij 625.3</p> <p>Impostores quandoque etiam peritos decipiūt 3.42. eorum fraus cauenda 162.43</p> <p>Incantationibus vti dum plantae effodiuntur, vanum est 435</p> <p>Indicia veneni sumpti 977.20</p> <p>Indicum 933.16</p> <p>Interpretum Dioscoridis lapsus 154.63</p> <p>Intubus maior 386.36. minor ibid. crispus 387.38. eius vires 390.22</p> <p>Inula 73.5</p> <p>Ioan. de Vigo lapsus 86.29</p> <p>Iouij error 239.66</p> <p>Irinum oleum 83.34. ad quos vsus praestet 19.28</p> <p>Iris 431.30. altera ibid. eius genera duo 432.11</p> <p>Iris & eius species 18.24. candida ibid.65. lutea ibid. eius vires 19.8. mentio ex Gal. ibi.40. cognomento astragalitis 19.34</p>	<p>K</p> <p>Ali 364.1. maius cochleato semine ibid. Anthyllis altera quibusdam 363.67. Anthyllidem censet Fuchsius 648.43</p> <p>Karabe 133.19. Succinum esse negat Brasauolus 131.34</p>	<p style="text-align: center;">K.</p> <p>L</p> <p>Abrum veneris 493.5. alterum ibid.39.</p> <p>Labrusca 902.3</p> <p>Laburni mentio 664</p> <p>Lac Dioscor. 300.20. intus coagulatum 997. eius veneni curatio 998. eius probatio ibid.45. facultates ibid. & 302.64. bibendi ratio 301.58</p> <p>Lacca 69.16. Arabum de ea opinio varia ibid.28. eius vires & lotio ibid.38. tinctorum & Arabum differens à Cancamo 69.44. factitia genera ibid.68</p> <p>Lacerta 294.46. earum consideratio 295.24 maiores 984.58</p> <p>Lactuca 398.33. crispus 399.1. non capitata ib. florescens ibi.33. foliis Endiuia ibi. Romana 398.63. sylvestris 400.10. eius vires 400.3. & 30. sylvestris Plin. 472.10</p> <p>Lacunosis locis, quae herbae increscant 8.37</p> <p>Ladani consideratio 159.58. vsus ibid.67. vires ex Gal. 160.11</p> <p>Lagopus 697.22. pes leporis 699.1. eius vires ex Gal. 698.66</p> <p>Lamium Plinij 792</p> <p>Lampfana 356.15. Plinij ibid.52. eius vires ib.303.24</p> <p>Lana 303.24</p> <p>Lapis Arabicus 960.64. Asiū 956. Armenius 931.22. Armenij vires ex Alexandro 931.54. Bezabar 940.10. calaminaris 918.13. plumbarius 925.23. Phrygius 956. in oculis ceruorum natus 940.27. Pyrites 957.38. Ostracites 965.40. Schistus 958.67. Lincius vulgari 311.58. Zaffara 899.9. eorū generatio 896.45. colores varij vnde 899.1. diuersa discrimina 899.58. cur pellucidi 899.63. cur graues aut leues 900.13. cur</p>
L.		

Libros Dioscoridis.

<p><i>Ligustrum</i> 153.15. conuoluuli species <i>Servio</i> Gram. ib. 60. Aegyptiacum 154.24. eius vi- res ibid. 10. oleum & eius vires 154.6. a- qua ibid.</p> <p><i>Lilac</i> 854.32</p> <p><i>Lilium conuallium</i> 631.1. eius vires ibid. 42 ephemerum vocat <i>Fuchsius</i> 780.52</p> <p><i>Lilium</i> <i>Diosc.</i> 599.60. eorum consideratio 600 33. historia ex <i>Plinio</i> 600.45 facultates 601.5. vt totum annum virescunt 600.61</p> <p><i>Limonium</i> <i>Diosc.</i> 695.66. alterum ibid. vires 697.10</p> <p><i>Limonia mala</i> 206.14. & 208.23</p> <p><i>Lingua serpentina</i> 447.37. aum 128.68</p> <p><i>Linum</i> 333.40. syluestre 334.1. angustifolium ibid. eius vires ibid. 68</p> <p><i>Linum viuum</i> 963.6</p> <p><i>Liquidambar quid</i> 903.7</p> <p><i>Lithospermon</i> 656.50. maius 657.1. minus ib. harundinaceum 657.32. eius historia ex <i>Plin.</i> 657.34. vires 657.50. frutescens angu- stifolium 658.8. aruense radice rubra ibid.</p> <p><i>Lithacolla</i> 965.37</p> <p><i>Litora & scopulos quae planta ament</i> 8.41</p> <p><i>Lixiua piloporum</i> 998</p> <p><i>Locusta</i> 284.26. in cibis 284.69. debellantur 284.5. earum agmina in Italia 284 65</p> <p><i>Loligo sine Calamario</i> 265.25</p> <p><i>Lolium</i> 331.40. eius vires 332.6</p> <p><i>Lonchitis</i> <i>Diosc.</i> 660. altera <i>Diosc.</i> 660. aspera maior 661. aspera minor ibid. <i>Plinij</i> ibid. eius vires ex <i>Gal.</i> 662</p> <p><i>Loniceri & Tragi error circa Ocimum</i> 408. lapsus circa locum natalem cupressi 117.1. error 157.6. lapsus 192.12</p> <p><i>Lora</i> 907.50. eius paranda ratio ex <i>Gal.</i> 907. 60. facultates 907.66</p> <p><i>Lotus syluestris</i> 608.2. urbana 809.1. syluestris ibid. vtriusq. vires ex <i>Gal.</i> 809.54. arbor 211.10. <i>Plinij</i> ibid. 34. Africana 212.4. & 64. Italica ibi. 16. Athenai non 212.3. plus 213.1. Aegyptia 811.53</p> <p><i>Lunaria minor</i> 647.20. ramosa ibid. alia 647.62</p> <p><i>Luparia</i> 762.5</p> <p><i>Lupini stercoris vires</i> 310.48. iecoris vires 279 34</p> <p><i>Lupinus</i> 344.32. sylv. luteus ibi. caruleo flore angustifolius 345.1. eorum facultates ib. 10</p> <p><i>Lupulus</i> 839.10. eius historia & vires 839.54</p> <p><i>Lycónis</i> 599.8. sylv. ibid. 30. sylv. alba multi- flora 706.20. vires ex <i>Gal.</i> ibid. 49</p> <p><i>Lycium</i> 168.5. Italicum ibid. 30. adulterinum ibid. 64. eius vires 169.10</p> <p><i>Lycopsis</i> 704.50</p> <p><i>Lyncurium</i> 311.55</p> <p><i>Lysimachia</i> 675.14. altera ibid. eius vires ex <i>Gal.</i> 676.4</p> <p><i>Lythargyrium aliud ex auro, aliud ex argen- to fieri falsum</i> 929.56. eius vires ex <i>Gal.</i> 929.63</p>	<p>ca vi & auxilia 998</p> <p><i>Mahaleb à Philyrea discrimen</i> 156.58. vires ibid. 68</p> <p><i>Maiorana</i> 535.23</p> <p><i>Mala aurea</i> 760.69</p> <p><i>Maia</i> 251.68</p> <p><i>Mala</i> 200.63. eorum vires 201.33. <i>Punica</i> 193. 8. eorum vires ex <i>Gal.</i> 194.44. dulcia ad pleuritidem 201.65. <i>Cotoncorum</i> conside- ratio 201.66. <i>Melengena</i> 760.28. insana 760.46. horum vires ibid. 62</p> <p><i>Malabathrum</i> 41.62. eius historia ex <i>Arria- no</i> 42.50</p> <p><i>Malabathrinum oleum</i> 85.50. vnguentum 42.6</p> <p><i>Malicorium</i> 194.25. eius vires ibid. 37</p> <p><i>Malua</i> 359.1. maior ibi. <i>Rosea</i> flore pleno ibid. 33 arbor <i>Plinio</i> ibid. maior altera 360.8 quarta ibid. eius vires 360.42</p> <p><i>Manardus arguitur</i> 166.40. eius opinio de <i>Pti- fana</i> 322.4. opinio non accepta 328.8. error officin. <i>Nardum</i> nec <i>Indicum</i> nec <i>Syriacum</i> esse 30.22. <i>Dolichos erniliam</i> esse volentis 414.53. lectio non probata 90.17. & <i>Fuch- sio</i> opinio reprobata 313.23. dubium <i>Jolotum</i> 855.26</p> <p><i>Mandragora</i> 900. eius venefica natura 991.1 noxa remedia 991.8. mas & femina 759. 38. humana forma. factitia 759.50. <i>Mori- um</i> vocata 760.25. eius vires 761.2</p> <p><i>Manna thuris</i> 92.67. & 96.50. & 94. caelestis 94.40. <i>Arabum</i> 94.58. eius historia ex <i>Gal.</i> 95.3. ex <i>Plinio</i> ib. 12. in comitatu <i>Go- ritiensi</i> & foro <i>Iulij</i> 95.20. in agro <i>Triden- tino</i> ibid. 25. secto arborum cortice manus 95.43. eius temperamentum & vires ibi. 57</p> <p><i>Marcelli error</i> 423.52. error <i>Pinum Tedam</i> interpretantis 100.62. & <i>Symphoriani</i> er- ror <i>Perficam</i> & <i>Perficam</i> idem consentium 203.68. ignoratio 264.31. lapsus 324.15. Is reprehenditur 153.56. eius error 341.39</p> <p><i>Margaritarum historia</i> 243.44. ea proueniunt in <i>Bohemia</i> 244.2</p> <p><i>Marrubium</i> 604.23. eius duo genera <i>Theoph.</i> ibid. 36. vires <i>Matthiolo</i> 604.43</p> <p><i>Marsi vt viperas captant</i> 1016</p> <p><i>Marum</i> <i>Diosc.</i> 536.45. & 537.1. eius men- tio ex <i>Galeno</i> 536.51. Italia peregrinum 537.5</p> <p><i>Mastiche duplex</i> 106.56. eius consideratio 105 33. cura & vires ibid. 51. oleum 79.7</p> <p><i>Martagon</i> 600.4</p> <p><i>Matricaria</i> 651.1. non est <i>Artemisia</i> 650.66 eam <i>Artemisiam</i> statuunt <i>Monachi</i> & <i>Fuchsio</i> 618.24</p> <p><i>Matthioli testimonium aduersus Gesnerum</i> 770.47. aduersarij notantur 531.52</p> <p><i>Meconium</i> 991.50</p> <p><i>Medica Dioscoridis</i> 415.40</p> <p><i>Medica malus</i> 204.62</p> <p><i>Medicina scopi duo</i> 15.45</p> <p><i>Medicamenta peregrina cur adulectentur</i> 85.10. adulterabantur etiam <i>Galeni</i> tem- pore 2.34</p> <p><i>Medicorum quorundam opinio explosa</i> 2.46</p> <p><i>munus neglectum</i> 3.26</p> <p><i>Medicorum & Sepalsiariorum error in Cas- sia succedanea</i> 46.30</p> <p><i>Medium siue viola Mariana</i> 699.40. eius vi-</p>	<p>res 998</p> <p><i>Medula vires</i> 307.58. in cibis facultas 308.5 ib. 60</p> <p><i>Megalinum oleum</i> 84.20</p> <p><i>Mehenbethene</i> 228.69</p> <p><i>Meli consideratio & historia</i> 24.56. vires 25.5</p> <p><i>Mel</i> 312.23. heracleoticum 313.10. eius genera non rosida ibid. 13. heractia 987. cruceum 141.42</p> <p><i>Melanteria</i> 942.50</p> <p><i>Melanthium sativum</i> 580.1. syluestre ibid. syluestre secundum 580.33. eius vires 581 23. oleum 77.56</p> <p><i>Melegeta semina Cardamomi quibusdam</i> 28.13</p> <p><i>Melites lapis</i> 961.8</p> <p><i>Melica consideratio</i> 329.49</p> <p><i>Melilotus siue Sertula campana</i> 535.39</p> <p><i>Melilotus Italica folliculus rotundus</i> ibi.</p> <p><i>Meliloti historia</i> 536.14</p> <p><i>Meliloti vires ex Gal.</i> 536.18. descriptio ex <i>Sc- rapione</i> 536.22. <i>Germanorum</i> 809.51</p> <p><i>Meinum oleum</i> 80.50</p> <p><i>Melissa</i> 602.35. <i>Constantinopolitana</i> 602.25 <i>Molucana</i> 603.15. <i>Melissa Moldauica</i> ibid.</p> <p><i>Melissophylli duo genera</i> 603. <i>Constantino- politana</i> 603.50. alterum ibi. 58</p> <p><i>Melochites lapis</i> 932.25</p> <p><i>Melongena</i> 760.28</p> <p><i>Melopepones Gal. an nostri Melones</i> 396.5. eo- rum facultates ex <i>Gal.</i> 397.50</p> <p><i>Memithe</i> 588.24</p> <p><i>Memphites lapis</i> 963.46</p> <p><i>Mendesium</i> 84.60</p> <p><i>Mentha</i> <i>Diosc.</i> 525.62. prima 526.5. altera ibid. crispa verticillata ibi. 38. eius vires <i>Matthiolo</i> ibid. ex <i>Gal.</i> 526.65. <i>Graca</i> 527 24. syluestris <i>Galeni</i> quid ibid. 6. <i>Graca</i> hi- storia ibid. 19. & vires ibid. 64</p> <p><i>Menthastrium</i> ib. 24. eius eius vires ibid.</p> <p><i>Mercurialis spuria</i> 892.9. mas 890.36</p> <p><i>Mercurialis femina</i> ibid. eius vires 891.12</p> <p><i>Mergi iecur & venter</i> 279.49</p> <p><i>Mesospherum Malabathrum</i> 42.63</p> <p><i>Mesius & Brasauoli lapsus</i> 572.45</p> <p><i>Mespilus</i> 209.30. <i>Theoph.</i> 209.66. altera 210 12. <i>Aronia</i> ibid.</p> <p><i>Mespilorum vsus</i> ibid. 34. duo genera 149.52</p> <p><i>Metellarum nucum veneficium & remedia</i> 991</p> <p><i>Metopium</i> 84.46</p> <p><i>Metallorum ortus</i> 897.60. efficiens causa 898. 24. differentia plures 899.16. vnum cur ci- rius altero comburatur 899.50</p> <p><i>Methodus qua vsus Dioscorides in suo opere</i> 15.30</p> <p><i>Meum Athamanticum praeslantius</i> 25.1</p> <p><i>Mezereum non est Daphnoides</i> 842.38</p> <p><i>Microsphaerum Malabathrum</i> 42.63</p> <p><i>Milium</i> 328.1. eius vires ibid. 30. <i>Indicum</i> 329. 58. eius aliud genus ibi. 61</p> <p><i>Millesfolium aquaticum pennatum. spicatum</i> 813.1. aquaticum cornutum ib. aquaticum 797. masus 798. minus 798</p> <p><i>Millegrana</i> 677.11</p> <p><i>Milicpeda</i> 277.20. earum vsus ibid. 49</p> <p><i>Mimum Dioscoridis quid nobis sit</i> 954. eius genera <i>Plinio</i> 957.14</p> <p><i>Myropolarum igneum & lapideum</i> 76.56</p>
--	---	---

Index in Sex

Osor candidum Theop. 152.

Miram admodum auxilium 202.47
Misy 942.42
Mituli 244.40
Molochia Mauritanis quid 146.14
Molucha 603.53
Molybdana seu *Plumbago* 978.18. *lythargyrū* species est 928.36. eius vires ex Gal. ib.45
Molybdoides 925.23
Moly historia ex Theoph. & Plinio 543. vires ex Gal. 544
Momordica 884.23. & 623.3. genus *Geraniū* 885.10
Monachi reprehenduntur de *Cardamomo* 2844. eorum lapsus 238.44. iactantia circa *Ocimum* 406.68. error 495.12. error sanguinem draconis cancamo substituentium 70.25. opinio explosa, dum *Iuncum odoratum* officin. spurium censent 56.50. erratū in *Tragacantha* 504.68. error 144.62. opin. explosa 95.35. error in *Ammi* 557.63 & Plinij error 186. *Carui* semen *Carotarū* statuentium 554.7. hallucinatio 669. opinio de *Galanga* falsa 23.50. error *Melanthium flauum* *cuminum* sylv. statuentium 555.60. lapsus 529.53. error 581.15. opinio falsa de *Macere* 134.39
Monophyllon 709.1
Morochthus lapis 961.24. eius vires 961.48
Morsus diaboli 464.69
Morsus gallinae ibid.60
Morus 230.18. alba ibid. eius vires ibid.66
Moschi odorati historia ex *Ruellio* 65.54. vires 66.13. probatio ibid.21
Muli rabie tentantur 1008
Mullus piscis 265.56. eius facultas ex Gal. 26564
Mumia 112.63. eius vires 113.48. duplex 11427
Muria 948.58
Muris aranei morsus nota & curatio 1020
Muris consideratio 298. alia genera 299.48 montanorum consideratio ibi.11
Mus araneus 297.60
Mus montanus 299.12
Mus napelli antidotus 993.50
Musa 189.47. & 192.60. quid apud veteres ibid.60
Muscus marinus 794. Plinij ib. eius vires ex Plin. 795
Muscus arboreus 65.1. malè *Calamo* substituitur 58.63. terrestris ibid. eius nomina 64.50. vires ex Gal. & Arabib. ibid.60. *Lariceus* nobilior 64.55. terrestris consideratio 65.32. eius vires ibid.38. terrestris clauatus 120.13
Mustela 269.48. eius natura & vis 270.42
Myagrū 815.20. *monospermon* 816.1. vires ex Gal. 815.63
Myrica 139.64. eius consideratio & vires 14040. & 62. medicina ibid. 54
Myriophyllum 812.12. alterum ibid. eius vires ex Gal. 812.58
Myrobalani *Chebuli* 856. 10. Indi. ibid. *Citrini* 857.1. *Bellerici* ibid. eorum vires 856.63
Myristicarum vires 225.23
Myrsidanum 196.38
Myrti vsus 197.3. vires *Galeno* & *Marthiolo* 197.10
 197.12. eius hist. ex Theoph. 18.30. hist.

ex *Plinio* ibid.15. vires in febre 88.53
 vires ex Gal. ib.66. *succedanea* 89.5. *Bœotica* ibi.11
Myrrhis *Diosc.* 813.52. eius vires 814.38
Myrreum condimentum 197.9. oleum 77.61 eius parandi ratio 78.20
Myrtus Romana 195.19. *Tarentina* ibi. exotica 196.1. maxima ibid.
Myxa & *Myxaria* 219.60

N.

N *Apellus* 768.1. *Moysis* 769.14. & *Toxicum* differunt 769.22. eius vires 76760. venenum & remedia 993.33
Narcissus primus 858.40. secundus 859.1. Constantinopolitanus ibid. quartus 859.32 quintus ibid. sextus 860.1. septimus ibid. octauus ib.33. nonus ibid. eius vires ex Gal. 861
Narcissinum oleum 82.46
Nardus Italica 31.36. eius vires ib.50. montana consideratio 34.60. vires ex Gal. 35.42
Indica 29.41. *Indica* vires ex Gal. 32.8
Celtica consideratio 33.5. *Celtica* vbi nascatur ibid.11. *Celtica* cum *Lauanda* comparatio ibid.24
Nardinum oleum 85.40
Naphtha 111.50. eius nomina 115.66. duplex 116.6
Napus 348.48. seminis vires ibid.
Nastos 138.6
Nasturtium 425.33. crispum latifolium ibid.38. crisp. angustifolium 426.7. latifolium ibid.40. eius vires ibid.17. aquaticum minimum 380.38
Naxius lapis 966.1
Nerium siue *Rhododendrum* 775.40. vires 775.69. malefica natura 989. venenicuratio ibi.
Nesirit *Setapioni* quid 167.62
Nicolaus Mireps. damnatur 247.31
Nicotiana maior latifolia 751.38
Nigella Cretica 581.40
Nipotella 528.48
Nitrum 950.30. vt conficiatur ex *Plinio* ib.50 eius vires ex Gal. 951.15
Nomina varia simplicium *Dioscoridi* adulterina sunt 7.45
Nucis Indica consideratio 224.28. myristica consideratio 225.10. vomica & metella 226.3
Nuciperfica 302.63
Nuclei pini vires 223.5. & 103.37
Nugatorū cuiusdam opinio explosa 468.67
Nummularia 716.60
Narcaphthum 68.50
Nux auellana 229.14. *inglans* 223.34. *Indica* 224.40. & 227.58. *Myristica* ibid.66. *Metel* 225.36. & 228.3. vomica ibid.
Nymphaea *Diosc.* 642.55. alba 643.5. lutea ibid. parua 644.1. alias *Græcorum* alias *Arabum* *perperam* statuit *Fuchsius* 643.40. eius vires ex Gal. ibid.23

O.

O *Chra* 933.32
Ocimastrum 706.20. eius vires ibid.59
Ocimum maius 407.1. medium ibid. sylv. 53810. latifolium crispum 408.35. *Gariophyl-*

latum 407.35. citratum 406.61. eius generatio in *serpillum* 407.64. vires ib.67
Ocimum oleum 81.60
Ocimum ab *ocymo* differt 408.6. antiquorum quid ibid. 11. non est planta ibid.29
Odoratarum herbarum catalogus 11.19
Oeleomeli quibusdam *styrax* 90.48
Oenanthe 904.10. prima 627.38. secunda ibi. tertia 628.38. quarta ib. eius tria genera *Cortuso* ibid.11
Oenanthinum oleum 80.64
Oesyphus 303.24
Officinarum lapsus 2.54. ignorantia & lapsus 3.1. lapsus in herbis siccis reponendis 25. error 708.6
Olea sylvestris 176.22. & 117.7. domestica ibi. *Aethiopica* *lachryma* 176.52. & 178.4. & *quercus odium* 177.67
Olei consideratio 74.46. vsus apud veteres ib. 50. facultates ex Gal. 74.68. *styrax* 7514. *facilitium* duplex ibid.38. *compusum* ibid.42. veterum 79.58. *lini* 333.64. *Omphacinum* 73.66. *sylvestris* oleum 74.11 *ficyonium* ibid.27. *scorpionum* *Matth.* 41056. *Cicinum* 76.4. *Ricinimum* ibi.18. *semine Ebuli* ibid.23. *Amygdalinum* ibi.34 *spica* 32.1. *chalcanti* 942.53. ex *corruis* luteis 283.23. *balaninum* 85.12. *terrestris* *hedera* 468.64. & *Urtica* 318.68. de *Resina larigna* 102.44. de nucib. *inglandib.* 77.23. de *styrace* 90.28. de *Liquidambar* 9054. *Fraxini* 128.65. de ferro parandis ratio & vires 924.34. de *lasmino* 86.47. *Asini* 36.60. nucleorum *Armeniacerū* 204.56 ex nucibus *Indicis* 225.3. ex *Ladano* quomodo paratur 160.5. *Iuniperi* 119.4. ex *virga sanguinea* *baccis* 214.15. ex *serpentinibus* vires 254.31. *Myrris* 88.58. *sericorum* *vermium* 297.40
Oleaster Rhodius 62.63
Oliua Bohemica siue *Elaagnos* 174. eius generatio decē 177.48. eas condiendi ratio ibid.60. vires 178.20. *sylvestris* oleum 74.11
Olyra 324.8. eius & *Secala* differentia ibi.28
Omnimorbia 360.51
Omphacium *Diosc.* 904.52. eius vires ex Gal. 905.3
Omphacinum oleum 73.66
Onagra 816.31. eius vires ibid.53
Oua barbi *piscis* nocua 1004
Onobrychis 667. eius vires ex Gal. ibid.40
Onosma 642.26. eius vires 851
Opaca loca quae herba ament 422.1
Ophioscorodon 422.1
Ophites lapis 965.6. *marmor* ibid.13. eius vires ex Gal. ibid.17
Ophioglosson 447. eius vires ibid.42
Ophrus 846.32. eius descriptio & vires 247.6
Opij venefica natura 991.66. eius curatio 992.12. facultas 746.57. vt administrandum 747.20
Opinio quorundam de *Acino* explosa 538. improbata circa *Palsurum* 144.34
Opopalsamum 60.40
Opuntia 235.14. *Oppida* quae herba ament 8.60. *Oreoselinum* consideratio 563.20
Origanū 518.32. *Heracloticū* 519.4. *Omnifolio* *subrotundo* ibid.37. vulgare ibid.26
Oretica 520.20. eius vires *Ornitho-*

Libros Dioscoridis.

Ornithogalum primum 412. secundum ibid.	651. num idem cum Amarako 81.44	Picem Plinius Cedriam vocat 123.58
maius spicatum 413.15	Pastinaca marina 263.60. eius vides	Pila in helorum ventriculo 953.60
Oriza 326.55	264.34	Pilojella 687.40. maior repens, minus bifida
Ononiu 500.56	Pastinaca marina ictus signa 1019. remedia	ibid. eius vides 686.60
Ornus siue Orneoglossum 128.58	1019	Pilula de Mezereu 872. pro tabido 525.42
Orobancha 409.1. Theophrasti alia ibid. 20. e-	Pastinaca domestica 548. sylvestris ibid. erra-	e chamapityde 670
ius facultates ibid. 35	rica 549. eius vides 549. maior sylvest. 401	Pimpinella Italica 12.58. saxifraga 729.1
Orobis 343.12. Creticus ibid. 66		minor ibid. siue Sanguisorba maior 729
Opsiagus 285.14	Pauonum oua pessima 282.52	37. non est Tragium 728.68. eius vides 729
Ostracites lapis 965.40	Pausanias de Platano 127.62	47 siue Sanguisorba minor 730
Ostryx Theophr. 854.66	Pecten veneru 403.1	Pines nuclei purgantes 104.6. facultates 103
Oxyru 837.18. eius vides ibid. 34	Peplus 868.38	34
Oribonna 469.20	Peplu 869.1	Pinguedo Tassi 307.22
Onum 282.13. eorum partes 283. coctura di-	Peponum consideratio 396.1. & 27. eius vides	Pinguetinis differentia & vides 306.20
nerfa 282.55. vides 282.66	397.42	Pinna siue Astura 244.4
Oxalus siue acetosa 353.33. duplex ibid. 9	Perdicum & Phasianorum oua 282.50	Pinorum eruca 983.64. & 291.42.
Oxyacantha legitima 149.5. Paliurum qui-	Peregrinus medicamentu est vtendum 96.8	Pinus & Picea 96.63. sylvestris montana 97.
da male statuunt 147.3. eius vides ex Gal.	Perfoliata 805.14. eius vides 805.51	14. Domestica ibid. species & consideratio
151.52	Perforata 667	98.31. sylvestris Mugo 98.40. sylvestris Cē-
Oxylapathum 353.1. Plin. ibid. 54. eius vides	Periclimenum 691.5. Germanicum ibid. eius	bro ibid. Tarentina 99.18
ex Aetio 354.66	vires 691.60	Piperella 533.3
Oxymel ex Acoro 23.2	Persea 236.50	Piper 433.13. Indicum 28.50. montanum 842
Oxymelitis confectio triplex 911.25	Persea mentio ex Gal. 237.30	48. & 872.27. duo genera Theophrasto ib.
Oxys Plinij 609.43	Persica 207.66. eorum consideratio & genera	59. planta in Italia 434.5. Aethiopicum
	202.54. amygdala 202.64. vides ex Gal.	ibid. 6. corniculati mentio 434.32. Indi-
	ibid. 49	cum ibid. 38. Indici varietas ibid. vides 435
	Persicaria 440.8. altera ibid. eius vides ibi. 69	7. descriptio 437.18. longum ibid. 25
P.		Piperitu 457.1
Paconera 192.66	Personata 804.47. siue Lappa maior altera	Pisces lapidibus insculpti 900.52. fossiles ibid.
Pederos Pausania 500.30. & 402	805.15. eius vides ex Gal. 805.53	Piscium & carnum noxa remedia 100.4
Paeonia mas 655.20. foemina ibid. eius vides	Pes gallinaceus quorundam 383.55	Pissasphaltum 111.42
ex Gal. 655.62. foemina flore pleno 656.1	Pes ceruinus ibid.	Pissasphaltis consideratio 112.29. nomina 114
Paliurus 146.35. eam quidam Rhamnum	Pes columbinus 622.35	20
constringunt 144.34. Theoph. varia histo-	Petasites 806.8. flore candido 615.20. eius vides	Pistlochis 484.3
ria 146.50. eius descriptio ex Plutarcho	ibid.	Pistacia 222.8. eorum consideratio & histo-
ibid. 68	Petri criniti error ros Syriacum Mannam pu-	ria ibid. 46
Palla marina 953.60	tantis 186.60	Pisum maius 343.10. minus ibid. cicer arietini
Palma 188.20. eius consideratio & historia	Petri Criniti error 95.52	num perperam putatur ibid. 49. eorum
188.48. in Cypro 189.42. eius genus in In-	Petroleum triplex 116.6. eius historia & vi-	vires ibi. 54
dia 190.57.66. Elate quid sit 192.2. earum	admirabilis 112.45	Pityusa 867.1. eius vides ex Gal. 867.47
vires 192.13. vinifera ibid. 54. eius cere-	Petrofelinum Macedonicum 563.36	Pix ex Cedro 123.60. liquida 110.18. arida ib.
brum quid 497.20	Pettimborsa 481.50	48. eius facultates 111.12. oleum 110.32
Palmula optima 188.48. Thebaica 190.66	Peucedanum 579.1. Officinarum adulteri-	Plateary error volentis Capburum ex succo
Palma Christi maior 637.32. minor 638.1	num ib. 30. vides ex Gal. 579.36	herba 106.20
Paludapium Ruellij 563.13	Πέννη Pinum esse probatur 103.68	Planta quae florentes colligenda 6.16. melio-
Paludosa loca qua herba ament 8.33	Pharix 723	rescunt celi clementia & loci amicitia
Pamphili tractatus de herbis fabulosus & su-	Phalangium Diosc. 606.58. & 607.1. eius vi-	8.19. diuersorum effectuum 880.46
perstitiosus 4.39	res ex Gal. 607.38	Plantago aquatica 666. maior 375. rosea ibi.
Panaces Heracleum Diosc. 544. Asclepium	Phalangiorum genera ex Aetio 1017. ex Plinio	medis ibid. 32. longa 376.20. aquatica ibi.
545. Chironium Diosc. 545. Chironium	293.59. ictuum signa & curatio 1017	eius facultates Matth. 375.43. vides Gale-
minus 546. eius vides ex Mesue 546	Phalaris 658.55. eius vides ex Gal. ibid.	no 376.1
Pancreatium 453.16	Pharicum 992.24. eius veneni consideratio	Plantarum degeneratio 8.2
Panicum 328.64. domesticum ibid. sylvestre	992.30	Plantarum situs qui naturales 8.23
ibid. eius vides ibid. 43	Pharmacopolatum error in Dialacca 70.13	Platanus 127.41. eius mira amplitudo 127.53
Panis quis optimus 318.60. hordeaceus 322.7	Phasioli 341.16	vires 128.2
Pannum in larice nascens & eius vsus 102.58	Phasiolorum coctura 414.65. vides	Plinius de Elephanto 287.28
Papauer corniculatum Diosc. 747.50. spu-	Phellodrys & eius historia 181.66	Plinij lapsus glycyrrhizam aculeatam dicentis
meum Diosc. 747.60. spinosum 748.41	Phillyrea 154.50. media 155.1. angustifolia ib.	485.60
corniculatum rubrum 748.6. corniculati	33	Plinij lapsus 433.53. lapsus 577.59. lapsus de
vires ex Gal. 748.37. erraticum Dioscor.	Photel 192.67	Tilia 156.50. error 510.7. plures lapsus cir-
744.66. satinum Diosc. 745.10. polyan-	Phrygi lapidis consideratio & vides	ca Populum 130.36. lapsus 605.57. lapsus
thos 746.12. satini tria genera Plinio 746	Phu maius & eius historia 37.56	de Pino 100.37. error qui Tedam propriam
44. succi siue Opj facultates 746.57	Phu minus 39	arborem esse censet ibid. 56. error tedam
Papyrus Nilotica 138.40	Phu minimum 38.45	Laricu morbum volentis ib. 69. lapsus vo-
Papyri conficiendi ratio 139.14. quoddam ge-	Phu vides Matthiolo 38.45	lentis Laricem esse sterilem 101.14. halluci-
nus 139.21. vides ex Gal. ibid. 33	Phyllitis 606.1. eius vides	natio 31.9
Pardifellis venenum eiusq; remedia 996	Phyllon 633.42. Theophrasti 633.54. Ruellij	Plinius in Nardi historia deceptus 42.45
Parenychia 734.1. altera ibid. eius vides 734	ibi. 63. seficulatum	Plinius notatur 523.33
48	Phyteuma 827.40	Plinij lapsus 525.22. lapsus 192.7
Parthenium Diosc. 650.57. seu Matricaria	Picea 102.4. & 104.40. eius historia	102.53
Phyllis siue Plinij 470		T E X T 2 Plinij

Index in Sex

<p>Plinij tutela aduersus Brasanolum 36.30. lapsus Fraxini folia mortifera esse 128.40 lapsus 617.40. lapsus 203.51. lapsus Ladanium ex Cisso colligentis 159.64. lapsus in ol. gleucino 83.64</p> <p>Plumbum elotum 924.56. vstum 925.1. recrementum 925.14. scobis noxa & curatio 998. facultates 925.50</p> <p>Podagricorum restitutio 119.12</p> <p>Poetarum fabula circa Succinum 130.54</p> <p>Polemonia Diosc. 681.63. eius vires 682.13</p> <p>Polenta consideratio 322.11</p> <p>Polium 612.24. alterum ibid. Plinij ibid. eius vires ex Gal. 613.5</p> <p>Polycnemon 594.56. eius vires ex Gal. ibid.</p> <p>Polygala Diosc. 836.38</p> <p>Polygonatum 678.35. eius vires 679.11</p> <p>Polygonum mas 676.40. faemina ibid. minus 677. maritimum latifolium ibid. 40. Polonicum cocciferum ibid. eius vires 677.23</p> <p>Polypi mira magnitudo 264.61</p> <p>Polypodium 887.10</p> <p>Polypodium alterum ibid.</p> <p>Polypodij vires ibid.60</p> <p>Poma praecipua 201.48</p> <p>Poma Adami 207.1. & 208.40</p> <p>Pomorum Adami vires ibid.41</p> <p>Pomata paranda ratio 307.25</p> <p>Pompholyx 918.63. eius vires 920.33</p> <p>Populus alba & nigra 129.40. Lybica 130.1 vires 132.60</p> <p>Porrum sectile 417.38. commune ibid. capitatum 418.5. sectium vt faciendum ex Columella ibid. eius facultates ibid.19</p> <p>Portulaca domestica 372. syluestris ibid. eius vires ibid.51</p> <p>Potamogeton Diosc. 796. eius vires 797</p> <p>Potentilla 718.33. eius vires ibid.52</p> <p>Poterium 498.1. eius vires ibid.41</p> <p>Pracauendi venena modus 975.48</p> <p>Pracautio vulgaris Principum contra venena explosa 975.50. venenorum ex medicamentis 976.55</p> <p>Pracipitati vocati vis 1011</p> <p>Pratis qua planta latentur 8.57</p> <p>Primulaveris 801. altera 802</p> <p>Propolis 315.38. eius vires ibid.</p> <p>Proserpinaca Apuleio 677.5</p> <p>Prunella 684.11</p> <p>Prunus Sebestena 218. vsus & facultas 217</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p>Prunus 216.22. & 219.26. Cerea ibid. Aegyptia 217.22. syluestris ibid.34. Poterium Cornario 498.37</p> <p>Pseudoaconitum Pardalianches 766.35</p> <p>Pseudoacorum 21</p> <p>Pseudoapios 876.26. descriptio ibid.64</p> <p>Pseudobunium Dioscor. 823.63</p> <p>Pseudocassia 46.41</p> <p>Pseudoclinopodium 595.10</p> <p>Pseudocostus 54.10. a Costo discrimen 54.47 quale melius & quibus polleat viribus ibi. 50</p> <p>Pseudodictamnium 522.26. & 523.34</p> <p>Pseudoelleborum 844.53. & 846.34</p> <p>Pseudoleontopodium 828.14</p> <p>Pseudolonchitis aspera 661</p> <p>Pseudolotus 211.38. & 212.60</p> <p>Pseudomelanthium 581.8. eius descriptio. 580.52</p> <p><i>Pseudomelanthium. 968.</i></p>	<p>Pseudomyagrurn 815.20</p> <p>Pseudorhabbarbarum 479.59</p> <p>Pseudohermodactylus 779.38</p> <p>Pseudostachys 605.18</p> <p>Pseudostruthium 442.22</p> <p>Pseudoturpetum Garganicum 831.60</p> <p>Psyllium 753.1. alterum ibid. eius vires ex Mesue 752.61. vires ex Gal. 753.40. veneni noxa & curatio 988</p> <p>Psarmica 441.28. altera ibi. eius vires 442.2</p> <p>Ptisana consideratio 322.1</p> <p>Pagurus 252.50. Maiam statuit Rondeletius 252.47</p> <p>Pulegium 521.22. angustifolium ibid. eius duo genera Plinio ibid. 58. vires ibid.67</p> <p>Pulmo marinus 278.6</p> <p>Pulmones variorum animalium 278.60</p> <p>Pulmonaria 733.1</p> <p>Pulmonaria altera ibid.</p> <p>Pulmonaria vires 732.66</p> <p>Pulsatilla 462.1. rubra & lutea ibid. vires ibi. 52</p> <p>Puluis contra venena 981.20</p> <p>Pumex 947.64. eius vires 948.8</p> <p>Pungitopi 840.41</p> <p>Punici mali consideratio 193.62. cultura 194. 10. vires ibid.27. arboris facultates ibid.39</p> <p>Purpurarum consideratio & historia 243.8 Dioscor. 242.45</p> <p>Purpureis floribus qua herba sint 12.36</p> <p>Pycnocomum 876.8</p> <p>Pyra 208.45. cotonea 202.34. facultas & vires 209.10</p> <p>Pyrethrum Dioscor. 573.65. verum 574.4. alterum ibi. in pratis ibid.43. eius vires ibid. 49</p> <p>Pyrite vires ex Gal. 957.60</p> <p>Pyrola 696.64</p> <p>Pyrola vires 697.1</p>	<p>Remedia ad varia symptomata 1009</p> <p>Remedia contra venena 977.67. contra erucum 290.57. ad scorpionum icus 1019</p> <p>Resina lentisci 106.52. duplex est 110.11. ligna officinis Terebinthina dicitur 101.51 terebinthina 109.5. earum vires ex Gal. ib. 42. ligna vires 102.49</p> <p>Resta bouis 500.69</p> <p>Rha Dioscoridis 476.1</p> <p>Rhabbarbarum 478.20. eius radix ibi. hist. ibi. 62. ex Froglodytica regione deserti probatur ibid.1. eius nomenclatura 477.60. ad idem cum Rhapontico 475.65. eius vires vt augenda 479.43. falso quidam violentum vocant ibid.23. adulteratum vt noscitur ibid.33</p> <p>Rhamnus primus 143.1. secundus ibid. Germanicus ibid.32. tertius 144.1. cum venenib. ibid.64</p> <p>Rhaponticum 475.42. folio helenij m. 476.1. eius sub Rhabbarbaro meminit Serapio & Auicenna ibid. 44. vires ex Gal. 477.26</p> <p>Rhei tria genera Mesue ibi. 38. Turcicum clatio ibid. Indici nominatio ibi. barbaris nomenclatura ibid.61</p> <p>Rhodacena sunt Persica 203.35</p> <p>Rhodia radix 724.10. eius vires ibid.48</p> <p>Rhodius oleaster 62.63</p> <p>Rhododendrum 775.40</p> <p>Rhois plura nomina apud Gal. 186.37</p> <p>Rhocx 1017</p> <p>Rhus 106.1</p> <p>Rhus duplex Theophrasto ibid.56</p> <p>Ribes officinarum 151.12</p> <p>Ribes offic. vsus ibid.28</p> <p>Ricinus animalculum 76.19</p> <p>Ricinus 662.30</p> <p>Ricini vires ibid. 60. oleum 76.18</p> <p>Risagalli curatio 100</p> <p>Roberti Constantini hallucinatio 128.53</p> <p>Rondeletij erratum 272.62. notatur 240</p> <p style="text-align: center;">39</p> <p>Rosa 165.30. graca Plinij 599.48. Rosa Hircuncea viridis 52.23. arida ibi. earum succus & dilutum 165.67. duplex 167.55. lactea 166.50. earum genera ex Plinio ibid.51 facultates 167.52. partes & vires 166.63</p> <p>Rosacei olei consideratio 80.28. omphacicum ibid. eius vires ibid.35</p> <p>Rosmarinum Dioscor. 574.64. coronarium Diosc. 575.19. eorum consideratio ibid.58 historia ex Theoph. ibid. 64. syluestre 176.23. syluestre minus ibid. non esse Cuminum ibid.9. vires Matth. 388.45</p> <p>Rostrum porcinum 622.58</p> <p>Ruberta 1001</p> <p>Rubeta 270.62. eius venenum 924.10</p> <p>Rubigo ferri 600</p> <p>Rubia Diosc. 659.1. Plinij ibid. fatina ibid. syluestris ibid. eius vires ex Gal. 12.37</p> <p>Ruber flores quibus herbu emicent ibid.40</p> <p>Rubrica sinopica 937.5. fabrilis 153.9</p> <p>Rubus Diosc. 714.20. Idem ibid. 40. eius vires ex Gal. 352.37</p> <p>Rubus canis ibid.45</p> <p>Rubus canis non est rosa syluestris 153.9</p> <p>Rubi canis vires 153.9</p> <p>Rubij error Agrifolium Lotum censentur 212.38</p>
--	---	---

Index in Sex

<i>Sicula</i> q <i>ui</i> <i>Sicula</i> <i>bita nigra</i> 771.			
<i>Seseli Creticum maius</i> <i>ibid.</i> 40. <i>Creticum minus</i> <i>ibid.</i> eius vires ex Gal. 552.12	<i>Spatulam Sparganium</i> credit Ruellius 702.8	<i>bituminis genus</i> Agricola 131. 24. <i>rubrum</i> <i>ib.</i> 29. <i>pterygophoron</i> <i>ib.</i> 48	
<i>Sferra cauallo</i> 647.18	<i>Spelta</i> 322.68	<i>Succisa</i> 464.34. eius vires <i>ib.</i> 48	
<i>Sideritis</i> Diosc. 710.32. <i>heraclea</i> 711.1. <i>secunda</i> <i>ibid.</i> <i>vulgaris hirsuta</i> 711. 33. <i>tertia</i> <i>ibid.</i> <i>quarta</i> 712.1. <i>Fuchsi</i> 710. 69. eius vires ex Gal. 712.64.	<i>Speronella</i> 590.43	<i>Sudoris animalium vires & remedia</i> 997	
<i>Sideritis lapis</i> 960.34	<i>Sphacelus</i> 525.34	<i>Suffrutices qui sint</i> 762	
<i>Sigillum Salomonis</i> 678.63. <i>S. Maria</i> 443.56	<i>Spondylium</i> 577.23. eius vires <i>ibid.</i> 50. <i>Acanthum</i> Germ. <i>Fuchs.</i> vocat 577.43	<i>Suillus adeps</i> 306.46	
<i>Siligo antiquorum</i> 324.36	<i>Spica Celtica</i> 34. 24. <i>Nardi est Nardi radix</i> 30.37	<i>Sulphur</i> 947.10. <i>fossitium</i> 947.25. eius <i>fandi ratio</i> 947.37. eius vires ex Galeno 947.48	
<i>Silique</i> 199.40. <i>mel fundentes</i> 200. 7. earum vires <i>ibid.</i> 14	<i>Spina insectoria</i> 144.1. eius succus & eius vires <i>ibid.</i> 53. <i>alba</i> 494.39. <i>alba altera</i> <i>ib.</i> <i>alba legitima</i> 495.22. <i>alba vires</i> <i>ibi.</i> 55. <i>Arabica</i> 496.5. <i>Arabica non est Acacia</i> <i>ibid.</i> 9. <i>Arabica vires</i> <i>ib.</i> 45	<i>Sumach</i> 181.1	
<i>Silurus</i> 271.58. eius <i>consideratio</i> 272.32	<i>Spinacia</i> 361.25. <i>femine non spinoso</i> 362. 1. eius facultates 363.39	<i>Susinum oleum</i> 82.15	
<i>Silybum</i> 854.12	<i>Splenion</i> 596.62	<i>Sicyonium oleum</i> 74.27	
<i>Similitudo quarundam partium in plantis</i> 10 12	<i>Splis</i> 807.66	<i>Sycomoros</i> 231.53. <i>mentio ex Gal.</i> 232.57. <i>lethifera arbor</i> 949	
<i>Simplicia medicamenta qua pollent aduersus venena</i> 978.29	<i>Spodium</i> 918.63	<i>Sycophanta cuiusdam calumnia depulsa</i> 43.	
<i>Simplicium peritiam nemo potest adipisci ex librorum lectione</i> 3. 25. <i>peritia a preceptoribus non ex libris comparatur</i> 3.35. <i>cognitio perficit medendi rationem</i> 2.45	<i>Spongia</i> 954.13. earum <i>historia ex Arist.</i> 954. 25. vires ex Gal. <i>ibi.</i> 60	<i>Syluatici hallucinatio</i> 494.13. <i>error</i> 362.57	
<i>Sinapi primum</i> 424.10. <i>secundum</i> <i>ibi.</i> 40. <i>tertium</i> <i>ibid.</i> eius vires 425.6	<i>Spuma maris offic.</i> 953.20. <i>argenti</i> Diosc. 929.1	<i>Syluij error</i> 39.52	
<i>Sinapismus</i> <i>ibid.</i> 11	<i>Sputum canis rabidi rabie afficit</i> 972.40	<i>Sympathia & Antipathia quarundam rerum in simplicium materia</i> 16.4	
<i>Sinapinum oleum</i> 77.56	<i>Squala</i> 835.26	<i>Symphytum petraeum</i> 682.35. <i>maius</i> 613.5. <i>maius tuberosa radice</i> 683.5. vires 685.12	
<i>Siser primum</i> 351.20. <i>secundum</i> <i>ibid.</i> apud <i>Plin.</i> 352.8. <i>Tiberio Cas.</i> <i>gratissimum</i> <i>ibid.</i> 20. <i>syluestre</i> <i>ibid.</i> 31	<i>Squama aris</i> 921.38. <i>huius lethifera vis & remedia</i> 998. <i>stomomatis</i> 921.36	<i>Syrupus violaceus</i> 822.55. <i>rosarum solutium</i> 166.35	
<i>Sison</i> 552.40. <i>femen incognitum</i> 553.4	<i>Squillarum consideratio</i> 251.64		
<i>Sisymbrium hortense</i> 378.18. <i>syluestre</i> <i>ibid.</i> <i>aquaticum</i> 379.20. <i>aquaticum alterum</i> <i>ibi.</i> eius in <i>mentham mutatio</i> 378.66. vires 379.58	<i>Squinanthum Officinarum</i> 56.20		
<i>Sium verum</i> 377.18. <i>vulgare</i> <i>ibid.</i> eius vires 378.1	<i>Stachys</i> 605.10. <i>huius vires</i> <i>ibi.</i> 59		
<i>Smarides</i> 273.1	<i>Stacte</i> 84.68		
<i>Smilacis consideratio</i> 180.58	<i>Staphis agria</i> 850.40. <i>huius vires ex Gal.</i> 850. 65. <i>noxa & curatio</i> 985.68		
<i>Smilax hortensis</i> 415.1. <i>aspera duplex</i> 165.13. <i>aspera</i> 838.1. eius <i>radix</i> 164. 63. <i>leuis</i> 839.1	<i>Staphylo dendron</i> 222.12. <i>Plinij</i> 223.2		
<i>vtriusq.</i> vires 839.66	<i>Stellaria</i> 819.1. eius vires <i>ibid.</i> 50		
<i>Smyris lapis</i> 365.56	<i>Stellionum morsus remedia</i> 985.20. <i>consideratio</i> 984.55		
<i>Smyrniun</i> Diosc. 565.36. & 666.10. <i>Creticum</i> <i>ibid.</i> <i>Plinij</i> 565. 60. eius vires ex Gal. 566.50	<i>Stercoris vires</i> 309.60. <i>humani experimentum</i> <i>ibi.</i> 65		
<i>Sodomus lacus</i> 112.22	<i>Stercus ferri</i> 924.20		
<i>Solani manici veneni noxa & curatio</i> 986. 24. <i>pomiferum fructu rotundo, molli</i> 761. 1. <i>fertidum spinosum</i> 228. <i>maius, siue herba bella donna</i> 756.38 <i>maius non esse Man dragoram</i> <i>Theophr.</i> 756.50. <i>eorum vires ex Gal.</i> 757.10. <i>tuberosum esculentum</i> 758.1. <i>tuberosi radix & fructus</i> 758.1. <i>hortense</i> 754.1. <i>halicacabum</i> <i>ibi.</i> <i>furiosum</i> 754.50.	<i>Steriles mali quomodo fecunda fiant</i> 201.60		
<i>Somniferum</i> 755.1	<i>Stimmi</i> <i>Plinij</i> 926.36		
<i>Solbastrella</i> 729.60	<i>Stirpes folia immutates dum adolefcunt</i> 3. 62		
<i>Soldanella alpina</i> 369.32	<i>earum mutatio</i> 8. 12. <i>imagines parum aut nihil profunt ad simplicia dignoscenda</i> 4.7		
<i>Solidago</i> 684.11. <i>regalis</i> 685.5. <i>regalis vires</i> <i>ibid.</i> 8	<i>Stoebe</i> 688.20. eius <i>consideratio</i> <i>ibid.</i> 53. vires 689.28		
<i>Solisfuga historia</i> 244.36	<i>Stoechas</i> 518.1. eius vires 517.64. <i>citrina</i> 736.1		
<i>Sonchus aspera</i> 384.35. <i>leuis</i> 385.1. <i>leuis altera</i> <i>ibid.</i> <i>leuis caruleus</i> <i>ibi.</i> 35. eius vires <i>ibi.</i> 40	<i>huius vires</i> 737.2		
<i>Sorbus domestica</i> 215.1. <i>syluestris</i> <i>ibid.</i> <i>terminalis</i> 215.34. <i>eorum vires</i> <i>ibi.</i> 60	<i>Stomoma esse chalybis squamam</i> 922.23. <i>conficiendi ratio ex Arist.</i> 922.44. <i>idem est quod chalybs</i> 922.64		
<i>Sory</i> 942.58	<i>Strabo de Silphio</i> 582.57		
<i>Sparganium</i> 702.8. eius facultates 702.34	<i>Stramonium</i> 228.11		
<i>Spartium</i> 852.14. <i>Hispanicum</i> 852.22	<i>Stratiotes</i> Diosc. 797. <i>millesfolium</i> 798. eius vires ex Gal. 799		
<i>Spartum & Genista differunt</i> 852.62. eius vires ex <i>Plinio</i> <i>ibi.</i> 66	<i>Strigmentum</i> 74.48		
	<i>Struthij consideratio</i> 442.54 <i>Plinij</i> <i>ibid.</i> 62		
	<i>Fuchs.</i> <i>Saponariam perperam statuit</i> 443. 8. eius vires <i>ibid.</i>		
	<i>Styrax</i> 89.28. <i>liquidus</i> 85.10. <i>adulteratio</i> 90. 27. vires ex Gal. 90.32		
	<i>Sublimati epti signa</i> 999		
	<i>Suber primum</i> 181.1. <i>secundus</i> <i>ibi.</i> eius <i>consideratio & historia</i> <i>ibid.</i> 38. <i>corticis vsus</i> 181.50. <i>Plinij</i> <i>ibi.</i> 53. vires <i>Matth.</i> 182.4		
	<i>Succedanea quando admittenda</i> 981.60		
	<i>Succi quomodo exprimendi & conseruandi</i> 7.4		
	<i>Succinum album</i> 133. 9. eius <i>varia historia</i> 130. 69. <i>lachryma arboris Pinorum</i> 131. 17		
	<i>Strumen</i> <i>Plinij</i> 469		
		<i>Talcharta vsum prabet Indiciis</i> 139.60	
		<i>Talus suillus</i> 288.24	
		<i>Tamarix Narbonensis</i> 140. 8. eius <i>genera</i> 141.6	
		<i>Tamarindorum consideratio</i> 190.67. <i>vires</i> 42	
		<i>Tanacetum</i> 651.1. <i>Artemisiam</i> <i>statuit Ruellius</i> 618.12. eius vires 619.43	
		<i>Tarantula venenum & remedia</i> 1018. <i>consideratio</i> 294.17. <i>remedium Muscia</i> 294.28	
		<i>Taraxacon offic.</i> 390.55	
		<i>Tartarum</i> 951.48	
		<i>Tassi pinguedo</i> 307.28	
		<i>Taurinus adeps</i> 346.50	
		<i>Taxus</i> 773.30. eius <i>venefica natura</i> 988. <i>basica noxia</i> 989. <i>glandifera</i> <i>ibid.</i> <i>historia</i> <i>ibid.</i> 16	
		<i>Theophrast.</i> 774. vires ex Gal. 100.40	
		<i>Teda consideratio</i> 472.35. eius vires ex Gal. 473.5	
		<i>Telinum oleum</i> 81.4	
		<i>Tellina</i> 244.60	
		<i>Tembul seu Betel</i> 429	
		<i>Tempus quo stirpium partes legende sunt</i> 544	
		<i>Terebintibus Indica</i> <i>Theophr.</i> 222.52. eius <i>descriptio</i> 108.30. <i>Indica pistacearum planta</i> <i>ibid.</i> 65. <i>consideratio & vires</i> 96.60	
		<i>Terentiabin</i> 96.60	
		<i>Terra omnis</i> Diosc. 966.20. <i>Eretris</i> <i>ibi.</i> 25. <i>Salmia</i> <i>ibid.</i> 36. <i>Chia</i> 967.1. <i>Selinus</i> 967.10. <i>Cimolia</i> 967.18. <i>pnigiti</i> <i>ibid.</i> 24. <i>strnacum</i> 967.36. <i>Melia</i> <i>ibid.</i> 40. <i>ampelitis</i> <i>ibid.</i> 58. <i>obsignata</i> <i>S. Pauli</i> 1016. <i>simplex</i> 900. <i>composita</i> <i>ibid.</i> <i>medicinales</i> 295.39	
		<i>Terrantola</i> 697.30	
		<i>Testa fornacea</i> 538.57	
		<i>Testiculus</i> Diosc. 634. 60. <i>primum</i> 635.1. <i>secundus</i> <i>ibid.</i> <i>tertius</i> 635.33. <i>quartus</i> <i>ibidem</i> <i>quartus alter</i> 636.1. <i>quintus</i> <i>ibi.</i> 1. <i>canis vires</i> ex Gal. <i>Ten-</i>	

Libros Dioscoridis.

Tentorium 596.36. duplex Plinio ibi. 57. alterum 597.1. eius vires ex Gal. 597	609.1. pratense alterum ibid. pratense luteum 610.1. peltatum Creticum 611.38. spinosum Creticum ibid. acutum Scribonij 608.11. pratensis tria genera 609.45. acetosi vires 609.38	Vestis ex Amianto 962.83
Thapsia 851.10. eius vires ibi. 64	Trinitas 610.1. non est Epimedium 700.13	Veteramentorum vires ex Gal. 281.10
Thalassomeli Diosc. 910.34	Tripoliton Diosc. 831.20. eius vires ex Galeno 832.5	Vetonicorum storam descriptio 436.53. vires ibid. 66
Thalictrum 794. vires ibid.	Triffago Theophr. 598.9. palustris 614.4. seu Chamadrys 597.34	Viburnum 186.1. eius historia ibid. 68. vires 187.12
Thelyphonum Theophrasti 763.7. eius historia 762.10. ex Theophr. 764.58	Triticum 317.1. amylum 325.38. in lolium & lolium in triticum mutatur 331.52. eius genera ibi. 54. Italicum 318.6. multiplici spica ibid. 23. vires 319.33. Indicum ibid. 40	Vicia 416.38
Theamodes lapis 960	Tubera 413.50. eorum historia ex Plinio ibid. 60. vires ex Gal. 414.12	Victuratio demorsis à cene rabido institumenda 1011. eorum qui venena sumpserunt 977.53
Theodori Gazæ error 272.32	Tubulus Plinij 104.18	Vinetis qua herbe latentur 8.59
Theophrasti error de Vlmo 135.60. locus suspectus 213.50	Tune 235.13	Vinca pervinca 680.6. Chamadaphne 842.42. perperam Chamadaphne statuitur 680.25
Theriaca laudibus à Galeno celebrata 1014. depravatio 84.44. optima indicium 1003. Veterum & recentiorum comparatio 978.49. bona nota 4010	Turcicus lapis Fuchsis malè Thyites creditur 962.14	Vincetoxicum 592.18. eius vires ibi. 54
Thlaspi primum 427.5. vulgatum serrato folio ibid. secundum ibi. 40. tertium ibi. saxatile minori folio. 428.15. quartum ibi. villosum 430.1. vires 248.63	Turpetum album & nigrum 867.14. eius venenata potio 1003. ossumatum 831.28. album Ahyria radix ibid. 50. vires 831.68	Vini natura 905.30. facultates varie pro modo vsus 906.24. id cui etati conveniat 906.45. nunc refrigeratum malum 906.48. optimi nota 906.57. Pucinum generosum ibid. 60. ex palmulo Plin. 188.66. helenites 73.24. ex pyrro 913.33. Oenanthinum 913.40. ex Punicis 913.44. rosaceum 914.1. myrtites 914.10. myrsinites ibid. 16. lentiscinum & terebinthinum ibid. 24. palmeum ibid. 30. ex caricis factum ibid. 43. resinatum ibid. 56. strobilites ibid. 66. Cedrinum & alia 915.1. picatum ibid. 20. absinthites ibid. 30. hyssopites ibid. 46. ex diversis plantis ibid. 53. ex diversis odoramentis 916.25. ex diversis herbis facta ibi. 46. è Guaiaco Matthiolus primus invenit 917.26. Euphragiatum 722.5. oxylapathi 355.8. scillinum 912.40. scillini confectio ibid. 59. scillini vires ex Gal. 912.54. marinum 912.68. Cydonites 913.10. Omphacites 907.40. è Labrusca 908.6. melitites 908.15. è Punicis conficiendi ratio 194.17. Guaiaci conficiendi & exhibendi ratio 162.51 Berberis & eius vsus 150.57
Thunia siue Thya 124.15. & 125.19	Tusilago 614.40. maior 615.20. siue Farsugium 616.1. eam sine flore scribit Plinius 614.66 duplex Plinio 615.3. tertia & eius historia 615.59. eius vires 616.40	Viola purpurea 821.5. Martia multiplici flore 821.38. arborescens ibi. earum vires 822.40
Thora minor 767.1	V. V Accinia 153.57	Vipera 258.47. ex homine fugata. 281.17. earum partus 259.21. facies & sexus discrimen 259.34. venatio & earum pastilli 260.24. vires adversus tabem 260.58. vino delectantur 260.9. vino venata 976.5. fellis venifica vsus & auxilia 996. adeps 307.15. morsus indicia 1020. morsus remedia 1021
Thracij lapidis mentio 960.10	Valeriana rubra dicta 40.34. peregrina purpurea ibi.	Virga sanguinea 214.1. Plinij ibid. 21
Thunius 275.52. eorum captura 275.65. in viti facultas 276.24	Venenata animalia Diosc. 100.4	Virga pastoris 493.39. duplex 494.4
Thus 92.32. & 93.30. historia ex Theophrasto & Plinio 93.18. vires ibid. 51. facultates ex Galeno 94.1. arbor 96.40. differentia ibid. 43	Venenata animalia Diosc. 100.4	Virga aurea latifolia 712.32. vires ibi.
Thyites lapis 962.10	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vijnaga 401.33
Thymbra 532.54. eius vires 533.5	Venenata animalia Diosc. 100.4	Virulentorum ictuum curatio 1013
Thymelæa 872.1. eius venenata potio 1003	Venenata animalia Diosc. 100.4	Viscum 589.1. Polycoccon Camerarij 589.1. eius confectio & utilitas ibid. arbor non est 589.54. Damascenum 590.5. ex radice ut ibid. 6. vires ex Gal. 590.17. è sebestenis paratur 218.26
Thymoxalme 911.60	Venenata animalia Diosc. 100.4	Visalba 681.4. non est vitis agrestis 882.6
Thymum 531.12. vulgare tenuiore folio ibi. ex Creta 531.50. eius vires ex Galeno & Aetio 531.59	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitex 173.54. latifolia serrata ibidem 24
Tigname 68.61	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis nigra 883.34
Tilia mas 155.33. 157.42. eius vires ibi.	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis nigra vires 884.18
Typha 626.18. Theophr. ibid. eius vsus ibi. 33	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis sylvestris 881.38. eius vires ex Galen. 882.12
Tithymali Dioscor. 863.15. Characias 864.1. Myrsinites ibid. Paralios 864.34. Helioscopius ibi. Cyparissias 865.1. Dendroides ibid. leptophyllos 865.34. eorum histo. ex Theophr. 866.10. vires ex Gal. 866.28	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis vinifera Dioscor. 901.60. quo pacto ab eorum conservetur 902.39. perperam fronde viventes 902.56
Tormentilla 674.34. eius vires 673.64	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis alba 882.26
Torpedo 257.46. eius mira facultas 258.30. vires ex Gal. 258.20	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis alba vires 883.12
Toxicum 992.42. eius nota ex Nicandro 993.6. & Napelli diversa cura ibi. 18. & Tusom idem ibid. 26. Græcorum & Arabum Napellum non esse idem 992.65	Venenata animalia Diosc. 100.4	Vitis
Tragacantha 503.40. eius vires Matt. & Gal. 504.18	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragacantha officin. 172.17	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragema quid 664	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragium Diosc. 129.10. & 728.24. alterum 728.33. eius vires 730.18	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragopogon 410.1. alterum ibid. laciniatum 411.27. purpurei mentio 409	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragoriganum 518.50. & 520.1. Plinius cum Origano malè confundit 519.1	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragos 325.56	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragi error 320.20	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tragum Diosc. 730.60	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Trasi 412.35. eorum vires ibi. 67	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tribulus terrestris 692.22. aquatica ibid. eius vires 693.5	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Trichomanes 832.59. eius vires 833.30	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Trifolium 607.52. Asphaltite 608.1. acetosum ibid. 38. acetosum luteum ibid. pratense	Venenata animalia Diosc. 100.4	
609.1. pratense alterum ibid. pratense luteum 610.1. peltatum Creticum 611.38. spinosum Creticum ibid. acutum Scribonij 608.11. pratensis tria genera 609.45. acetosi vires 609.38	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Trinitas 610.1. non est Epimedium 700.13	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tripoliton Diosc. 831.20. eius vires ex Galeno 832.5	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Triffago Theophr. 598.9. palustris 614.4. seu Chamadrys 597.34	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Triticum 317.1. amylum 325.38. in lolium & lolium in triticum mutatur 331.52. eius genera ibi. 54. Italicum 318.6. multiplici spica ibid. 23. vires 319.33. Indicum ibid. 40	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tubera 413.50. eorum historia ex Plinio ibid. 60. vires ex Gal. 414.12	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tubulus Plinij 104.18	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tune 235.13	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Turcicus lapis Fuchsis malè Thyites creditur 962.14	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Turpetum album & nigrum 867.14. eius venenata potio 1003. ossumatum 831.28. album Ahyria radix ibid. 50. vires 831.68	Venenata animalia Diosc. 100.4	
Tusilago 614.40. maior 615.20. siue Farsugium 616.1. eam sine flore scribit Plinius 614.66 duplex Plinio 615.3. tertia & eius historia 615.59. eius vires 616.40	Venenata animalia Diosc. 100.4	

vires prona plij

Index in Sex Libros Dioscoridis.

<i>Viticella</i> historia 884.22. vires	ibid.68	<i>Volubilis officinarum</i>	839.10	<i>Xyloaloe</i>	
<i>Vitruuius de Minio</i> 935.6. eius de Latice quod non flagret, opinio vana	101.18	<i>Vrinarum facultates</i> 311.35. medicinas contempfit Gal.	ibid.43	<i>Xylobalsamum Officinarum</i>	61.33 60.8
<i>Virulinus adeps</i>	306.53	<i>Vrsarum partus</i> 278.62. adeps	307.15	<i>Xylon siue Gossipium</i>	334.34
<i>Viucerra</i>	270.31	<i>Vrtica lactea</i>	791	<i>Xyris</i> 702.50. vires ex Gal.	703.6
<i>Viurna Gallorum</i>	187.8	<i>Vrtica prima</i> 789.25. secunda ibid. tertia 790		Z.	
<i>Vlmus</i> 134.57. eius quatuor genera Plinio 135		1. vires 789. 68. feminis noxa & curatio	987	Z <i>Acintha</i>	
51. facultates ex Plinio 136. 20. ex Galen.	ibid. 36	<i>Vsnea</i>	64.65	<i>Zarza parilla</i> 838.35. eius consideratio	319.1
<i>Vlua</i>	796	<i>Vua marina minor</i>	726.40	163.28. vires 164.12. decoctio	ibi
<i>Vmbelliferarum numerus</i>	12.63	<i>Vua quercina</i>	182.50	<i>Zea</i> 322.65. eius historia & facultates	323
<i>Vmbilicus veneris</i> 787.35. alter ibid. tertius		<i>Vua vrsi</i>	151.40	46. dicoccos	ibid.1
788.11. vires	788.59	<i>Vua spina duplex</i> 151.2. vsus	ib.7	<i>Zedoaria Costus</i> quibusdam 54.66. & <i>Napellus Moysis</i> apud Auicennam idem	770.1
<i>Vnguentum praestantissimū ad ambusta</i> 874		<i>Vua passa</i> Diosc. 903.1. earum in facultatibus		longa & rotunda 439.9. eius historia & vires	ib.10. Auicenna qua
34. Nicandri 1015. eorum consideratio 80.		differentia 903.33. vires ex Gal.	ib.60	<i>Zibetti</i> historia 66. 25. vires	ibid.30
20. compositio 79.16. genera tria ibid. 36.		<i>Vua lupina</i>	986.30	<i>Zibibum officinarum</i>	903.23
vsitata ex quibus conficiantur 79.49. venenatum ex helleboro	73.40	<i>Vua</i> Diosc. 902.12. earum facult.	902.53	<i>Zingiber & eius filique</i>	431.33
<i>Vnguis odoratus</i> 246.3. eius consideratio 246		<i>Vulneraria potio</i>	697.6	<i>Zizypha</i> 219.1. & 220.7. eorum consideratio	219.39
24		<i>Vulparia</i>	762.6	218.55. Plinij	270.27
<i>Vngula caballina</i>	614.63	X.		<i>Zobella</i> historia	110.58
<i>Vngula asini & capra</i> 280. 10. earum vires	280.35	X <i>Anthium</i> 834.1. eius vires	ibid.12	<i>Zopissa</i>	438.44
<i>Vnionum vires</i>	244.26	<i>Xiphia piscis</i>	275.60	<i>Zurumbeth</i> historia	322.30
		<i>Xyli histor. & vires</i> 625.11. vires Matt. 625.51		<i>Zythum</i>	

F I N I S.



PETRI ANDREÆ
MATTHIOLI
SENESENSIS,

SERENISSIMI PRINCI-
pis Ferdinandi Archiducis Au-
striæ, &c. Medici,

APOLOGIA

ADVERSUS AMATHVM
LVSITANVM, CVM CENSURA
in eiusdem enarrationes.

ET:

Epistolarum Medicinalium Libri V.

ITEM:

Dialogus de Morbo Gallico.



Cum Gratia & Priuilegio Cæs. Maiest. speciali ad decennium.

FRANCOFVRTI,


Ex officina Typographica Nicolai Bassæi.

MD. XCVIII.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΤ.
ΘΙΟΛΟΓ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ

Μαΐθατος Καλλιπες ΒοήμηΘ.

Ἐργα Διοσκορίδα Βοτανῶν πέρι, καὶ περὶ δένδρων.
Σὺν πολλαῖς μελέταις ἔξεσε Μαΐθιολος.
Οὐ πόνον εὐκλέεες τὲ καὶ εὐφρονέοντες ἰητροὶ
Φανὶκλάς ἔμεναι ἀξίον ἀθροάτα.
Εἰς τίς ἀνὴρ ἀχάριστον ἔχον ὄνομα ἔσθ' ἄγ' Ἄματις.
Ἄλλ' ἀμαθής, τὰτα χρήσιμα ἔργα ψέγει.
Τῶν ὑπερηφανίας τοῖς χάριν ἀντιβολήσας.
Τῆδε Βίβλου τὸ γέρας δῶκεν ὁ Μαΐθιολος.



FRANCISCUS
PARTHINVS RO-
BRETANVS

Serenissimi Maximiliani Regis Bo-
hemiae Medicus

PETRO ANDREAE MATTHIOLO
praclarissimo Medico S. P. D.



EMINI hoc vnquam mortalium haecenus cōcessum fuis-
se video (praestantissime Matthiole) quantumcunque in
quavis praecelleret facultate, vt in tanta passim iudiciorum,
sententiarumq; varietate, omnium desideria, & omnium
animos aequaliter expleret. Atque in hac communi mor-
taliū quidem infelicitate nescio quomodo placatiores,
& longè plus semper moderatos se exhibent boni viri, in
quibus & virtutis, ac singularis probitatis, simul & eximia
eruditionis lux enitescit, quàm prauis, & peruersis, qui quò
maiori implicati sunt inscitia, tantò & difficiliore, & in om-

mnibus se morosiores praebent. Vt quod ignauia, vel mentis hebetudine, siue suo quo-
dam infortunio non valuerint adipisci, id suae imperitiae tenebris in aliis obruere con-
tendant. Quorum quum molesta, & inhumana sit ingratitude, tum non ferenda est
haec in eis arrogans, & effrenata libido, qua non modò ipsi, quibus nihil bonum & eli-
matum placere potest, in optimis fastidiunt, sed & eò prorumpunt, vt etiam ceteris om-
ne tollant emolumentum, & omni doctrinae fructu, & utilitate spolient. Ac quamuis
ea sit in te constantia, ea morum grauitas, vt parum, aut nihil curandam, & omninò ne-
gligendam tibi arbitreris Amathi cuiusdam Lusitani hominis ingratisissimi, & ab omni
humanitate alienissimi, imperitissimam in tuis scriptis temeritatem: tamè postmodum
nō nihil vereri mecum coepi, ne haec animi tui magnitudo longius quàm par sit, euadat.
Nam quum iam frequenter ad me delatum foret, te Apologiam, quam contra hunc in-
eptum hominem institueras, pariter & censuras in eius grauisissima errata penè ad finem
perduxisse, non minus tua, quàm omnium reliquorum causa, capiebam animo nō me-
diocrem voluptatē, quòd has defensionis partes per neminem commodius subiri, nec
per vllum facilius, & clarius huius insanam vecordiam, quàm per te ipsum retegere posse
existimarem. Nunc autem quo consilio, quave mentis altitudine te aut tædeat, aut pu-
deat publicè facessere aliquid negotij cum isto nugatore, nescio laudem, an (quod mihi
certè potius videtur) tuum hac in re non nihil vituperem propositum. Quòd si tibi per-
suades, vt non tanti aestimes Lusitanum, quem nemo aditu, nemo congressu, nemo con-
spectu aliquo doctorum virorum meritò dignatur, vt indignum plane tibi iudices, vt
istam dissolutam, & praecipitem loquacitatem irretitam retundas, magis tuam erudi-
tionem, quam summam esse nullus dubitat, quàm reliquorum consulis iudicium. An
quo singulari doctrinae lumine facilè tu huius falsitatem animaduertis, idem quoque de
omnibus censes? Erras profectò mi eruditissime Matthiole. Quot erunt, qui casu in
hunc hominem incident, quos istius falsitas à veritatis studio impediatur? Quot ille non-
dum satis instructos, & in hac facultate roboratos suis calumniis à tuis pulcherrimis o-
peribus auertet? Qui quò infirmiores adhuc circa huius scientiae tyrocinia adhaerecunt,

aut nec diu in tua doctissima scripta expenderint, tantò periculosius ab hoc veteratore inducentur. Qui adeò perfricta frontis est homo in aliena reprehendendo, in suas fabulas intrudendo, adeò perfidiosus in alienis scriptis violandis & (qui imperitorum mos esse solet) adeò proclius est in sua constituenda sententia, vt vel mediocriter doctos non nihil fortè commoueat. Huius impudentiæ tu non occurre? Eam quum tu sine omni tua molestia comprimere valeas, cum omnium reliquorum detrimento libidinosè grassari patieris? Dicam id, quod sentio, Matthiole, non tam vt cæteris in hac nostra medica disciplina præstantissimis viris aliquid derogem, qui pro sua humanitate summa, omnia tibi tribuunt, quàm ne tui oblitus esse videaris. Quis hac nostra ætate doctius in hac medica facultate elaborauit? Quis vtilius, & luculentius hanc nobis maiori diligentia, & eruditione illustrauit? Vt excellentissimi vbique viri, quos maria, terræ, itinerum immensitas diuidunt à tuo cõspectu, hi animo, sermonibus, scriptis, literarum missione (vt tu optimè nosti) certatim velut ingentes, & immortales tibi gratias agant. Ego quidem (vt de me priuatum ingenuè fatear) his tuis amplissimis cõmunibus beneficiis sic me tibi deuinctum, & adstrictum cognosco, vt nihil tui causa detrectare nec debeam, nec velim. Quis ita sit inhumanus, quæ in quoquam tanta sit immanitas, vt tuis pulcherrimis, & fructuosissimis elucubrationibus adiutus, his fruens, his quotidie se oblectans, non dico ingritudinis, vel minimum indicium ostendat, sed hos tuos præclarissimos sudores immortalitatis, si possit (id quod fore non ambigo) gloria non compenset? non omnibus monumentis decorandos eos putet? licet nulla gloriæ cupiditas ad hoc te stimularit, quæ maior est tuus animus, nec ea te huc impulit, sed solus communis, & publicæ vtilitatis amor, quo incredibiliter flagras, te inflammauit, vt omnes grauissimos susciperes labores. Tantane fuit in Lusitano ingratitude, eane inhumanitas, vt nihil istorum recorderetur? Non quòd vili tantum largiar homini, vt tantam ei vindicem excellentiam, quasi nil omninò in eo deprehendi valeat, quod non leuiter aliquem offendat, quod non teneam aliquem apud alios mereatur reprehensionem. Nec tantum tu tibi asseris, vt (si quidem fecisse) emendatum te à Lusitano dolere queas. Vsq; adeòne hominem esse immoderatum? Ita in aliorum labores impudentem? Sic vbique in alienis repellendis imperitum? Et quod ad te attinet, minus equidem sum sollicitus de ea modestia, pietate, gratitudine, quam ille imperitissimus homo tuæ præstare debuerat humanitati. Non tanti est id incòmodum, vt corrigi, & resarciri posse à quamplurimis doctissimis, & grauissimis viris dubitem. Nam vt innumeros hoc nostro prætermittam tempore, eruditissimos, & plenos leporis, venustatis, humanitatisq; viros, qui quo sunt ingenij cultu, quo flagrantissimo literarum amore, in perpetuum obligatos se tibi profitentur, tum vel vnus Cronemburgius Coloniensis, summus & præstantissimus medicus tuo cordi hac in parte abundè satisfaciatur. Cuius etsi doctissima, ac clarissima scripta à te versata non ignorem, audi obsecro qua gratitudine, autoritate, quàm doctè, quàm luculenter in suo de compositione medicamentorum libro breuiter suum in te intimum affectum declaret, & Lusitani illius nequitiam, & indoctam improbitatè redarguat, ac perstringat. **MATTHVS, IN QVIT, LVSITANVS** frequenter odiosa confidentia, virus inuidentiæ suæ in clarissimum, modestissimùmq; virum Matthiolum Senensem eructat, dum passim nimis intempestiuè huius doctrinam super cõmentariis in Dioscoridem editis coarguit, ac insectatur: quibus probatæ fidei hominibus nil aliud, quàm malignum animum, & perniciosam inuidiam ostentat, ipse interim infinitis modis dignus, qui ob magnâ stirpium imperitiam, atque improbam in se translata operam alienam (quod crimen est longè omnium turpissimum) velut è sublimi doctis veniat deridendus. Ecquid etiam enarrationibus suis inseruit, quod non iustissimo titulo vni Matthiolo acceptum referre debeat? A quo dum æmulandi studio dissentit, in graues, manifestosq; errores imprudens homo prolabitur. Cuiusmodi exemplum tum in hac plãta, tum in Acanthio, tum Coronopo, tum Elichryso, ac in plerisque aliis visitur. Multò fatius fuerat, quò doctiorem se æstimaret, eò quoque modestiorem se præstare, quod ingenuum Philosophum decet. Hactenus. Quid syncerius? Quid magnificentius huiuscemodi viri grauissimo testimonio? Vt recreare potius te debeant talium, & tot clarissimorum virorum contrariæ, quàm vt te moueat vnicum inter homines esse portentum, quod omnem comitatem, gratitudinem, beneuolentiam, & ipsam humanitatis naturam exuerit. Si monstrum hoc sit simile, talem in lucem esse editum, & in commune humanum consortium fuisse productum huiuscemodi hominem, qui ea rodatur, laceretur, cõuellatur, in ea insaniat, & debacchetur, de quibus humaniter pares agere gratias nunquam poterat, minime tamen reformido, quin parum multi sint futuri, qui sua modestia istius intemperantiam conuincant, qui sua gratitudine, & candore, illius insolentem malignitatem, & insaniam superent.

Matthioli laus.

Apologia aduersus Amathum.


5

superent. Quorum sinceritas, honestas, probitas, non te plus reuocent, ac consoletur, quam istius barbaries te deiciat. Absit, ut non multò plus eruditissimorum virorum iudicia valeant, quam importunitas vnius Lusitani. Hoc porrò magis me affligit, quòd quam tu ipse per te commodè, & opportunissimè confutare possis hanc audaciam, id per te fieri nolis. An aliorum patrocina expectas? Quum alios non animus, sed ingenuus pudor ab hac dehortetur molestia cum isto subeunda homine. Alij suis impediti negotiis, alienæ difficulter se subiiciant falci. Cæteris aut nò innotuit Amathus, aut quod mihi est verissimum) tibi hanc reseruant provinciam. Indignum se arbitrantur de eius disceptare mente, & iudicio cum aliena temeritate, eo incolumi, & adhuc superstite, cuius labores sint attentati, cui sua eruditio optimè sit cognita, & explorata, qui optimè se ipsum intelligat. Non decere id onus in cæteros reici, quòd ab eo sit acceritum, qui & id facillè ferat, & maiora portarit. Neminem aliena censent tutius, diligentius, fideius, protecturum, quam sua ipsius, in quibus suus honor, sua laus, sua gloria versatur. Cur defendam Matthiolum? Viuit ipse, ipse est superstes. Quæ studiosissimè est commentatus, ea nobis seruet integra, hæc custodiat nobis salua, contra peruersorum calumnias hæc nobis tueatur. Quare tuæ sit prudentiæ excellentissimè Matthiole, ut quid hic te facere conueniat, sedulò prospicias. Et quid opus est magna hic, & longa consultatione? Quasi sit obscurum, quasi te ipsum id lateat, magis te in isto negotio tuæ obtemperare mentis generositati, quam nostri omnium expectationi. Vide μή πλείων ἀγκυροῖα σεαυτὸν κατακείνη. Suspecta tibi sit ea securitas, ex qua & tuæ autoritati, & cæterorum studio non leuis fortasse imminet iactura. Ne nimis securè permittas obrepere in gremium tuorum librorum τὴν ἀμαθίαν τῆ ἀπειροσύνη Lusitani. Excute istum scarabeum è tuis floribus, ne cæsinas, ut suis molestissimis susurris, & fæetore ista contaminet, ex quibus optima, & roscidamella reliqui se confecturos sperant. Hic labor (& quis labor?) nisi ad cætera tua præstantissima monumenta, velut cumulus accedat, ea nos à te accepisse cognoscemus beneficia, quæ fuerint inchoata, non absoluta, splendidè adumbrata, non expressa. Quid? Vereor Matthiole, ne qui sint futuri, qui istuc tuum silentium molestè, ac adeò ferant acerbè, qui & priorum amplissimorum beneficiorum pœnituisse te dicant, cum tanti ea non dicas, ut ea nobis ab hac contagione liberet. Propulsa nobis hanc molestiam, declina, obtunde omnem improbitatem, ut tutò nos in tuis luculentissimis operibus sciamus posse versari. Si te mortuo (quod Deus Opt. Max. auertat) Lusitanus ita nequiter tua inuasisset opera, implorandus, & excitandus (credo) nobis eras, ut omni ignominia, macula, omni vel tenuissima aspersa labecula, tua nitidissima nobis restitueres opera. Nunc quid viuis cessas? Quod tunc à mortuo nos obtinere non posse penè iniquum putaremus, quanto id erit deploratius, quanto iniquius à viuo non impetrasse? Quid illud? Nihil ne te hoc mouebit, quòd victus, & tuo iudicio, quod grauissimum est, superatus, manum conserere te cum isto imbelli transfuga abnuere censeberis? & ea iam tacitè cõdemnare, ob quæ cæteri suæ felicitati cum primis gratulantur? Scimus iam hanc operam à te inceptam, plus increbuit hic rumor, quòd latius, & libetius hunc calcographus dissiparit. Ut hac quoque opera suas bibliothecas doctissimi complures locupletandas expectent. Hanc spem comprehensam, & mentibus nostris infixam, si tua præstantia defraudet, quid cogitabimus, cur ab incepto destiteris? Cur non id perfeceris, quod tu ipse inchoaris? An cedere te posse quisquam credat Lusitani ineptiis? aut iure te reprehensum ab isto imperitissimo calumniatore fateberis? Nulla vel tenuissima irrepit huiuscemodi suspicio. Da quod à te magnifice expectamus. Exhibe quod lectu, & visu iucundissimum erit omnibus. Emitte quod iam penes te habes paratum. Quid abdis, quod non in lucem dare tuæ derogat existimationi, Lusitani inanem auget confidentiam? Quid dicet calumniator profligatissimus? Scripsi contra Matthiolum, rapui, suffuratus, deprædatus sum, quæ volui. Viuit Matthiolus, nil contradicit. Adeò non nunquam plus iuuat perfricatio frontem, quam omnia tribuere doctrinæ. Vici nil repugnantem. Cedit Matthiolus Amatho. Hæc ne pro sua impudentia, si non effutiet, secum uolutabit? Noli tantum locum dare huius amentia. Nobis nihil erit iucundius tua existimatione, nil dignius, nil contra huius furorem vehementius, quam quod ex tuæ eruditionis armario deprometur. Effecit id iam antè tua præstans eruditio Matthiole, ut nihil vulgare, nihil mediocre, nihil non præclarum, & eximium omnes à te sperent. Noli te (rogo) in eam præcipitare opinionem, ut aliquid in tuis bibliothecæ scriniis delitescat, quòd nobis subtrahas, quod nobis inuideas. Non patitur nostræ consuetudinis, & familiaritatis amor, ut hæc parum sollicitè, non satis anxie tecum pertractem. Tametsi de medica sis materia ita benè, & præclare meritis, ut nemo tibi deesse, nemo non omnibus beneficis te cumulatisimè prosequi valeat, timeo tamen subindè, ne homines ingrati, inuidi, malitiosi tua abutan-

tur humanitate, & summo reipublicæ amore. Qui tunc demum veram se venari putant gloriam, si (id, quod nunquam, vt confido, adipiscuntur) suis maleficiis tuos nitantur præclarissimos obliterare labores: Vt quod liberali doctrina non potuerunt consequi, id imperitia, impudentia, furore nanciscantur. His, quæso, per nostram amicitiam, per communem omnium literarum amorem, quibus animum semper habuisti deditissimum, declara, quam mala cæcitate ruant. Aperi horum vanitatem, concute, dispelle istorum inuidentiæ virus. Indica eis quam longè fuerat tutius sana in eis mente vti, quam in illis suum furorem patefacere, ex quibus haurire poterant cum sapientissimis summam vtilitatem. Infringe nobis hunc Amathum, qui antequam sapere didicerit, omnium se agitatore præbet. Quod quum tua postulet sapientia, eruditio, existimatio, tum nihil prius, nihil potius nos à te expectamus, quàm vt ea, quæ antea doctissime nobis elucubrasti, ea nunc aduersus hunc prædonem, calumniatorem, tura, salua, illæsa, & intacta posteritatis memoriæ tradas, simul & ipsum sua imperitia, & erroribus infinitis ornes. Vale mi eruditissime Matthiole, & quàm celerrimè nostræ satisfacias omniū expectationi. Viennæ Austriae, Quarto nonas Septembris. 1557.

MAGNI-





MAGNIFICO AC CLARISSIMO DOMINO

PETRO CANNIZERO,

Serenissimi Regis Romanorum, &c.

Archiatro,

PETRVS ANDREAS MAT-

thiolus Senensis Medicus S. P. D.



ESCI O quo pacto id ferè semper usu venire animaduertamus (clarissime vir) summos & praestantissimos viros, quo magis excellent, quantoq; ceteris bonis, ac eruditis viris magis satisfaciunt, tanto importunius improborum nequitia, & calumnus impeti, ac laceffi. Quo minus mihi dolendum censeo, si ego quoque (quamuis in me quidem, & in hoc meo amore satis acri publica utilitatis, non id praestantia culmen videam, quod eos summoperè offendat) post tot consumptos labores, horum improbitatem, inuidiam, & irritos morsus euadere non potuerim. Quod quidem neuisquam in huiusce aui improbitatem (ut quidam fortasse putant) sed in impiorum hominum impudentiam reiciendum arbitror. Quod tamen si minus sit nouum, minus inusitatum, ut ab honestissimo quoenquam impediatur instituto, tamen miserum est, & certè deplorandum, quum vnà cum ipsa virtute nata sit inuidia, liuor cum primordiis emerferit, & hac omni tempore suam exercuerint improbitatem. Inuidia verò virus improbitatis sua nunquam in obscuros, ignaros, abiectosque exercere solet, sed in eos plurimum, qui ceteris vel doctrina, vel sapientia, vel aliis quibuscunque animi, vel fortuna dotibus praclarioribus, eminentioribusque euaserunt. Vt potè quacum eò loci euehi non possit, quò praclari viri propria virtute peruenierunt, fraudibus tantum & technis se extollere nititur. Nec idcirco mirum videri debet, si quò magis quis inclarescat, eò vehementius in illum hac se sauculetur vipera, & sauiat tigris. Adhuc autem quum quandoque animaduertissem, & labores, conatusque nostros ab inuidis dilacerari comperissem, gaudebam sanè, & mea propè cuiusdam felicitatis esse ducebam (licet nunquam mihi tantum tribuerim) à clarissimorum hominum communi fortuna me non segregari. Ob idq; decreueram potius inuidorum rabiem silentio extinguere, quam scriptis respondendo palàm facere eorum latratus mihi negotium facessere: praesertim cum in omni vita praecipuos comites mearum actionum, consiliorum, voluntatum, pudorem, modestiam, humanitatem esse voluerim. Verum quum vidissem, legissemque vanissimas quasdam calumnias in nostros in Dioscoridem Commentarios editas ab Amatho Lusitano homine sanè non solum, ut eius fert nomenclatio, apprimè indocto, sed etiam, quantum ex eius scriptis colligi potest, omnium arrogantissimo: quumque praeter id comperissem hunc quamplurima ex commentariis nostris furtim in suas transfuisse enarrationes, & in illis innumeros commisisse errores, qui rei herbaria studiosis magno fuissent detrimento (hoc enim praeceteris me maxime angebat) nisi à nobis palàm resellerentur, pietate potius, quam cupiditate aliqua contendendi, à qua maxime sum alienus, excitatus, pati sanè non potui (etsi aliter mecum prius statueram) quin scriptis in publicum editis eius calumnias contunderem, errata reprehenderem, imposturas concuterem, furtiva patefacerem. Quod quum tandem fecissem, dubius subindè distrahebatur animus, an quam confeceram Apologiam, vnà cum Censuris in eius deliramenta in lucem proferrem, an verò diutius domi nostra premerem. Siquidem tamen si non verebar hunc aliquam me reponaturam victoriam, non tamen ducebam eam mihi fore gloriosam, eò quòd cum homine nullius ferè frugis, & pauca admodum existimantis in certamen descenderem. Ob idque

8 Pet. And. Matth. Apolog. adu. Amath.

consultius videbatur scripta illa iam adornata in aliquem tenebrosam angulum abdere, quam in lucem evulgare. Ad hoc accedebat, quod audirem, & iam etiam viderem quamplurimos doctissimos & honestissimos viros (quos nunquam novimus) non tam nostra, quam veritatis causa patrocinium suscepisse, ac iam tandem pro me tulisse sententiam, Amathum verò causa cecidisse. Verum deversum suadebat genius meus, subindè velut insusurrans indignum fore si meos partus tanta iniuria affectos hac tantum ratione destituissem. Idq; eò magis mihi faciendum suadebat, quod iam in promptu essent, qui suis scriptis ad hoc munus exequendum me plurimum compellerent. Dum itaque anceps in his versor opinionibus, & in altera mihi animus repugnat, in altera verò cōscientia, & ipsius hominis damnosa imperitia me admonet, & ubi potius negotium hoc honestè subterfugere cupiebam, quam exequi, tot accesserunt doctorum virorum suasiones, tot amicorum litera, tot calcographi nostri preces, tot quorundam allata rationes, ut tandem (quanquam ferè inuitus) decreuerim eorum potius sequi sententiam, quam meam. At qui inter tot suosores, amicos & studiosos nullus mihi sese obtulit, qui animum magis vinceret meum, quam Franciscus Parthinus Serenissimi Maximiliani Regis Bohemia medicus apprime eruditus, & in omni studiorum genere optimè versatus, cuius litera omnium postrema adeò me à priori instituto reuocarunt, ut eius opinioni & consilio, quod semper plurimi feci, assentiri decreuerim. Caterum quum iam diu noverim (vir clarissime) quantum doctrina, eruditione, ac sinceritate praestes, quin etiam quantum iudicio summo, ingenio, aequitate, & auctoritate valeas, quumque te habeam precipuum inter eos, quos mihi eximie obseruandos proposui, hos ultimos labores nostros non tantum tibi legendos, videndosque mittere decreui, sed etiam nuncupare volui. Nec (mihi crede) eo animo, ut hac re tua in me collata beneficia rependere velim ac putem, sed quod eximia virtus tua id meritò à me exposcat. Doctrina enim tua, ac singulari eruditione imperitissimi huiusce hominis nequissimas in me calumnias, & errata quamplurima facile noscere poteris, animi sinceritate discurrere, iudicio & ingenio ponderare, aequitate iudicare, & postremò auctoritate currere. Hoc si (ut spero) eo feceris animo, quo in omnium amicorum, bonorumq; virorum negotiis semper esse soles, verendum mihi non est, quin tuis etiam praconiis nostra augeantur praesidia. Nam ubi videris hac omnia partim in me falsò esse collata, partim in rei medica nostra, & studiosorum, tyrannulorumq; discrimen esse deprompta, tu, qui omni pietate duceris, ne utiquam te continere poteris, quin omnibus modis labores nostros tuearis. Vale. Praga, Quarto Calend. Septembris.

P R A E F A T I O.



Ut utaque nō sine magno labore, magnaq; industria Commentarios in Dioscoridem cādidissem, quemadmodum doctus quamplurimus praeclarusq; materiae medicae studio. His hōs laboribus nostris non ingratos fore sperabam: sic neminem tam peruersam, inuidiam, improbumq; fore indicavi, qui non potius optimi consuleret (ut ingenue fatear) candidos nostros, & synceros conatus, quam iniquum quidpiam de his existimaret. Et enim quum semper me admodum delectaretur medica materia, & temporis & studij illi tantum impenderem, ut aliquid quoque nostrum in hac facultate valere indicium crediderim, ingenii honestiq; viri munus esse putavi sua industria, & labore paria, ne

Commentarij in Dioscoride magno labore sunt editi

1. ob causam hoc mihi ingenium, honestumq; videbatur, ut id quod unusquisque in quolibet scientia genere, vel ingenio, vel doctrina, vel longa diuturnaq; lucubratione, observantiaq; sibi privatim, & nō quasi privatim & sibi pro prium fuerit assequutus, contineat, sed in commune totius republicae emolumentum pro viribus libenter effundat. Hoc enim iam pridem a me esse factum, non sine fructu fortasse, nec (ut audio) absque magna multorum praeclarissimorum virorum laude, quibus meae elucubrationes placuerunt, tamen: nec me noverint nec viderint unquam, non leviter sum excitatus, ut libentius, & alacrius novum suscipere laborem, ut es auferentur, plantarum imaginibus decorarentur. & Latino sermone cuderentur. At dum acriori, intentioniq; quam hactenus, in hac verborum opinione, & iam operis praeclarissimi Evamianis subiectis, frequentibus amicorum literis ad aures meas pervenit incredibilis Amathi cuiusdam Lusitani intemperantia. Id quod nō parum fortassis ab hoc meo me divertisset instituto, nisi ab hoc uno contemni, & arrodi audivisset qua tot praestantissimorum auctorum iudicia comprobarent. Veruntamen nō adeo hominum iudicio stare volui, quin & ille Lusitanus, quem in modestissime in meos inuehi commentarios audieram, non mihi me commoveret. Non enim arbitrabar hominem illum tanta posse duci temeritate, ut ea, quae passim ab omnibus penè probarentur, sine magna ratione, & consilio conuelleret, & lacerare auderet. Quamobrem curavi sedulo, ut eius libri ad me deferrentur, non alio profecto animo, quam quod philosophi munus, & mea modestia semper duxi, non ea pernicacia propriis affigi, ut eorum improbaretur opinio, qui melius & sanius aliquid sentirent. Equidem putabam quod cum Lusitanus ille omnium ultimus Dioscoridis codicem expendisset, adeo omnia cribrasset, & excussisset, ut nullus reliquus fuerit ambigendi locus. Momebat quoque istius Centurionis nomen, quem centurias quasdam digessisse aiebant. Sed ubi primum eius enarrationes intueri coeperam, longè aliter quam putarant, euenisse cognoui. Quandoquidem praeter calumniam mihi falso ascriptam, nihil aliud quam invidiosissimum animum ac loquacem, & ineptum hominem observare potui. Nescio profecto magne me offenderit hominis imperitia, qui nullo iudicio, nulla ratione aliena praeceptis & inanisissime damnet, an improbitas, & insignis nequitia, quod tam impudenter ex his ipsis, quae in alios calumniatur, suas agit predae, & tamquam sua quasi vindicat. Verum ut suam agnoscat inscitiam, nec suis calumniis quicquam nostra detrahat auctoritati, aut publica utilitati, quin & ne in posterum fortè honestissimum nostrum, vel aliorum impediatur cursum, cogor sanè eius ineptias aperire, ne videar id mali ad posterum relegare, si praesentibus culpis ignoscerem. Licebit itaque nobis nostra pro virili defendere, & ex omni parte tueri, ne si hac silentio dissimularem, aliquis tandem modestiam nostram in conscientiam duceret. Et primò ne aliqua iniuria, aut fraude hic, qui tam improbè nos lacecessit, secum agi putet, ac etiam ut candidus lector facilius deprehendat & equissime discernat utriusque controuersiam, antea eius verba ob oculos ponam ad quae singulatim mihi respondendum meminero. At videte obsecro, quam grauius, ac vehementer me priuim adoratur Lusitanus, non quasi de herba sibi sit certa.
2. men. s. d. quasi in eundem regione considerat, quā homo inconstans, iā pridem turpissime ac impudentissime deseruit. Nec enim (inquit) veritas ipsa occultanda est hac de causa, quia Plinius scribitum reliquerit. (suo tempore M. in Italia non nisi a paucissimis medicis fieri, quem sequutus postea Marcellus Virgilius vir alioqui doctissimus, rei tamen herbariae non admodum peritus, dixit: Nunc, quod sciam, nullum Italiae Meum est. Ob qua verba Matthiolus Senensis in Italia quaeque Meum non reperiri clamat, imò contra Patres, Meum interpretatores, acriter agit, qui in Calabria, & Nursia montibus Meum nasci affirmant. Quod ita esse crediderim, cum apud Bononiam quaeque nascatur, ut testes sunt Nicolaus Nicolucci pharmacopola Ferrariensis, & Cassar de Gabrielis nobilis Patavinus harum rerum maximus indagator. Accusandus igitur Matthiolus est potius, cum magis negligens in inquirenda hac herba fuerit, quam diligentissimi Patres, qui desudantes Nursia montes, ut eam inde eradicarent, ascenderunt. Sed frustra metantia acerbitate persequitur Lusitanus.
3. Attendat ipse, quanta usum sim modestia in huiusce rei assertionem. Non enim clamo Meum in Italia non reperiri, sed plura sanè esse scribo, quae me ancipitem reddiderunt, an Meum quod nunc pro genuino sumitur, legitimum fuerit. A Lusitano iam pridem non didici in Italia quoddam circumferri Meum, cum ante ipsum hoc scierim. In hanc tamen inclinari me dixi opinionem, illud a genuino ac vero Meo mihi videri longè dissimile. Hoc etsi simpliciter a me esset dictum, ut meam hac in parte solum exponerem sententiam: nescio tamen cur accusandus magis illi videar, quam leniter admonendus. At quod in hanc venerim opinionem, illud in causa fuit, quod plures huius rei mihi constarent rationes. Etenim est, in primis quod viderim nostratis Meiradices longè crassiores, vegetioresque quam genuini expechistoria: quippe longas & tenues radices Meo reddidit Dioscorides. Est deinde quod eadem grauius possis, quam suauster oleant. quum tamen Dioscoridi Meo radices requirantur odoratae non graueolentes. Est praeterea, quod mansa parum omnino acrimonia respiciant. At quum Galeno auctore Meum tertio excessu excalfaciat cur non illud genuinum acriori ut pollere existimauerim, quam quod nuperrime in usum medicum concessit? Est etiā, quod extent manu scriptis Dioscoridis codices, qui Meū non Auehi, sed Anisi foliis conferant. Quod & idē refert Plinius, quē licet reuocet Amathus, non tamē sine ratione est adductus, ut scriberet nō nasci in Italia Meū. Nam cum nō nisi a medicis, usq; admodum paucis usum feratur, magnum & euidentem est argumentū non ibidem sua sponte procreari. Quomodo zelus peregrinū a medicis excolebatur si ubiq; in Italia nunc illud excrescere videremus? His itaq; palam est, ut nō ab re in censendo Meo mihi plurimum fuerit ambigendū. Etenim mihi perpetuò decretum volui, non ita facile de rebus dubiis affirmare, ne id arrogantius potius, temeritatig; quam doctrinae, & diligentia nobis ascriberetur. Veruntamen nolui ob id praetermittere, quin huiusce Mei imaginē appingerē non tamē, ut hoc tamē argumentū fieri videret illū genuinū referre Meū, sed ut illud nobis antea nō ignoratū (ut opinari videtur Lusitanus) ostenderē.

Ingenii viri manus.

Qua est causa...
Dioscoridi...
sint editi, &
tatu imaginibus
illustrati.

Cur edita haec sit Apologia.

Calumnia L. de Meo.

Calumnia refellitur.

Mei consideratio.

Meum, quod circumfertur a genuino pluribus differet notis.

Quam

Quam ob causam non modo illos mihi semper detestandos proposui, qui tam facile de incertis sententiã ferunt, sed & eos longe magis, qui, ubi fatear, hanc illam me non vidisse, nec nouisse stirpem, mox clamitant, & errorum me arguunt. Equidem semper optimi viri munus esse credidi, ignota, vel dubia, potius silentio inuolueri, & nihil de illis determinare, quam in posteritatis discrimen, falsa pro veris describere, & dubia pro certis asserere.

Vulpina Lusitani religio.

Quod quandoque fecisse monachos illos, quos, vulpina quadam religione, patres Lusitanus appellat, non ambigimus. Sed sane mirum videtur, quum nostram, & suam religionem omni flagitio polluerit, dedecore maculauerit, scelere obligauerit, & eam tantum ob causam à sua exulauerit Lusitania, quod hic tam acriter pro Monachis illis depugnet, qui Iudaeorum omne genus maximè persequuntur. Sed & illud etiam mirandum nobis sese offert, quod hic me tantoperè lacefferit, quod in eos hæc scripserim, quum tamen ipse pluries Monachos illos aliàs damnet. Id quod etiam cum Plinio fecisse constat. At iam hominis videre inconstantem seueritatem, qui & si paulò antè (puto enim me aliter inuadere nõ potuisse) Plinium ipsum, & alios grauissimos auctores explodere, ac damnare nõ est verius, me tamen quasi rigidus patruus seuerè increpat, quod a Plinio nihil in Iridis mentione discesserim, ea ratione adductus, quod is præter Dioscoridis sententiam, candidam Iridem rufa prætulerit his verbis: Illyrica quoque duorum generum est. Raphanitis à similitudine, qua & melior: Rhizotomos subrufa. Nouam hic quandam excogitat Lusitanus artem, qua me adoriri posse putat. Nam quum idem Plinius alibi scripserit Iridis radicem cateris præstare, qua rufa fuerit colore, ne vlla in tanto viro obseruari possit dissensio, eam inuenit defensionem fidus patronus, qua haud scio an defendi se velit ipse Plinius.

Calumniã secunda.

Atqui Lusitanus priorem clausulam dissoluens, ita legit: Illyrica quoque duorum generum est, Raphanus à similitudine: reliqua qua sequuntur in unum coërcet cum relativo, Qua & melior Rhizotomos subrufa. O insignem Palemonem. Non equidem rogabo Amathe, ut dicas, in quo codice tales videris interpunctiones, cum certo sciam in nullo inueniri. At afferatur iam in medium Frobeniana editio, quam tibi patrocinari putas. Afferatur (inquam) ut statim confusus sis. At non te pudet editicnem hanc vocare in iudicium, ut illic palam sit, Grammaticorum omnium iudicio, ET particulam, pro ET I A M ibi sumi? Quæ ista connexio? Quæ etiam melior Rhizotomos subrufa. Nimis sanè multa nobis affers de verbo, cuius sensus cuilibet legenti Sole lucidius apparet. Istis grammatica confusis legibus nolit (me hercule) defendi Plinius. Multis communi obliuionis quodam errore (quod & doctissimis & summis viris inter multa quandoque contingit negotia) lapsus videri, quam huic grammatico sua subiici opera. Id ne nouum tibi est in Plinio, ut aliquoties sibi non satis constet? Mihi quidem & studiosis lectoribus nequaquam. Etenim de Castore scribens Plinius libro octavo, capite 30. Castores affi mat dentibus sibi testos abscindere, quum venatu vrgentur, ob hoc se peti gnaros, id quod postea libro 33. capite 3. apertissimè negauit, & tanquam fabulosum explosit. De Populo autem agens libro 16. capite 23. nullum hanc florem, nullumq; fructum edere ait, quorum oblitus lib. 33. capite 8. eandem Populum dixit, & vnas, & semen gignere, hoc comitialibus, illas ad unguenta præferens. Quid igitur mirum, quod scelus iderit, si & in iride, & sibi, & Dioscoridi Plinius repugnasse dicetur? Equidem id flagitium non dico in Plinio summo utique autore, si in tanto opere, & tam varia lectione aliquando memoria fragilitate sit prolapsus, præsertim cum is potius alienam recitet historiam, quam propriam. Te potius miror Amathe, qui quod tibi lubet, idem cateris, quum tamen iusta id ratio suadet, non licere censeas. Nos veritatem ubique sequimur, eam nulla hominum auctoritate, quoad possumus, patimur obfuscari. Non tanti (mihi crede) est estimandum in Plinio aliquis memoria lapsus, quanti eam, quam de laboribus nostris agis, rapinã estimandam censemus.

Plinium quandoque non satis sibi constare.

Quid enim turpius, impudentius, detestabilisq; quam furtiuam frugem ex aliena messe in suam transferre horreum? Quid deinde inhumanius, quam quem expoliameris, gladio & conuictis adoriri? Optimorum hæc sunt hominum? Grassatorum, prædonumque potius mihi videtur, quos tu maximè sequutus videris. Quo fit ut mirum non sit, si primùm è Lusitania pulsus, ac deinde è Germania in Italiam reiectus, iam inde etiam profugus aberras, adeo ut solum ferè non inuenias, ubi iam tutus esse possis. Porrò hæc mihi de Lusitano illo dixisse liceat, non ut videar cum homine pugnare, quem non est ut timeam, neque etiam ut odio prosequar aliquo præsertim cum nihil sui possideat, ubi possim postea refici, adepta victoria: sed tantum medica materia vindicanda, & honoris nostri sustinendi causa. Potuissem quidem Amathum hunc acriori, vehementioriq; sermone reprehendere, primum quod tam temerè labores nostros depradatus sit, deinde quod falsissimas, frivolasq; calumnias in me excogitauerit. Postremò quod ubi aliquid suo Marte cudit, in grauissimos frequentisq; labatur errores. Atqui quum probi, ac candidi hominis non sit munus, conuictis ac maledictis, sed propria virtute pugnare, ea utar in dicendo modestia, quam animi nostri sinceritas, & eius insolentia exposcere videbuntur.

Animaduersio in Lusitanum.

Quod si quandoque pietate summa adductus, vel calumniarum iniquitate sauciatus pauca quadã acerbiora fortasse in hunc deprompsero, rogo atque etiam obsecro, ne quis id mihi vitio vertat. Scio quidem in respondendo me magnam non habere expectationem, quod nemo iam sit, qui eius legerit libros, quin prius nouerit non modo hominis imperitiam, sed etiã temeritatem. A meo Lusitanus de Amomo hæc in me confert. At Matthiolus Senensis cum nos vero carere Amomo sciret, ut illum tamen habeamus, in Lusitaniam nos remittit ubi ex India nunc delatum contendit: mea tamen sententia fallitur, cum hucusque Amomum verum incomperitum sit. Hæc ille. Sed planè falsò, cum plura me dixisse scribat, quam rei veritas exposcat. Quandoquidem cum nunquam meis scriptis affirmarim Amomum ex India in Lusitaniam conuechi, nunquam eoque quemquam remiserim, ut ille somniasse videtur, dum meas metitur lucubraciones, & eas (qua illius est liberalitas) suis verbis amplificat. Scripsi quidem me à quibusdam non spernenda fidei medicis accepisse iam primùm ex India in Lusitaniam afferri Amomum, nec sanè plura, quam hæc. Caterum cum eorum sententiam nec probauerim, nec damnauerim, cur hæc in re me adeo vellicet conuictum quidem non possum, nisi quis fortasse in eius malucolum animum hæc reiciat. Quod autem ille perperam meam acceperit mentem, id argumento ostenditur.

Calumniã III. de Amomo.

Calumniã de pulio.

Calumniã III. de calamo odorato.

se potest quod in commentariis nostris Latino sermone editis, nihil huiusce fabula meminerim. Ad calamum odoratum veniamus. ubi ille grauioribus sicut ipse putat, in me admonet machinas, quas idcirco non magno sane negotio a nobis amoliamur, quod non aliquo consilio, non aliqua prudentia, aut ratione, sed suo more (propè dixerim moria) id in nos moliri contendat. Arguit me, quod nixus Theophrasti, & Plinii testimonio certo affirmauerim radicem, qua passim odorati calami vice utuntur Sephasia, legitimum, genuinumq; esse Acordum, quin & quod scripserim Calamum odoratum harundinem esse, non radicem, quibus refragatur his verbis: At

meo

- mea sententia decipitur Matthiolus, cum, licet Theophrastus & Plinius, in Calamo odorato calamum, & non radicem laudare videantur, alibi tamen Calami odorati radicem desiderant, & eam ceteris calami partibus anteferunt, ut apud Plinium est legere libr. 24. cap. 2. in quo cum Calami odorati inuenta enumerat, sic inquit: Efficacissima autem in omni harundine, que proxima radici efficacissima & genicula. Per qua verba manifeste percipitur, quod in omni calamo, siue harundine, radix efficacior est pars. Qua de causa Calami odorati radix potius, quam calamus in opus trahenda est, ut merito haecenus pharmacopola hac praeiosa & exotica radice, pro vero, ac genuino Calamo odorato usi sunt. Quantum vero ad Dioscoridem attinet, si quis introspectans eum accuratius expendit, inueniet illum de radice potius loqui quam de calamo, cum radix geniculata dicitur, calamus vero potius nodis cinctus. His ne tam stolidè me putat concludi Lusitanus? Sed audi-
- 10 at ipse non quam Matthiolus, qui accuratius prius quam scripserit, pensitavit sed quam turpiter ipse potius decipiat: quippe qui temerè Plinij, & Dioscoridis grauisimorum authorum abutitur testimonio. In primis enim ut eius argumenta dissoluam, & tanquam inania & irrita monstrem, non vereor, ne Plinius, aut Theophrastus Calami odorati radices adeo desiderarint, ut nunquam earum fecerint mentionem. Nam quod Plinius ait, efficacissimam in omni harundine eam, esse partem, qua radici proxima, quis fuerit Pliniane lectionis, Latine sermonis adeo imperitus, ut non videat de harundine non de radicibus intellexisse Plinium? Namque examinaturus, quam partes in uniuerso calamo ceteris prestent, ne non radices, ut Lusitanus sua quadam malitia, vel fortasse imperitia in me distorquet, sed partes radicibus proximis ceteris prestare inquit: quod facile prudens animaduertet. Nec enim aliam ob causam, putat Plinius maiori vi pollere calami partes, qua prope radices habentur, quam eadem ibi crassiores, vegetiores, robustioresque
 - 20 in omni harundinum genere reperiantur, quam in ceteris earundem loci: quo fit, ut etiam calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius, quippe & genicula robustiora sunt, & crassiora. Quam ob causam Calamum illum praetulit Dioscorides, qui dense fuerit geniculatus. Sed iam ipsum queso intueamur: locum, quem ille quasi violentum quoddam telum in me vibrat. At si vlla in eo sit prudentia simile & consideratius verba Dioscoridis mecum perpenderit, non solum deponet hanc iracundiam, sed fortasse etiam noscet, quam magno ducatur errore. Nam quod Calamum, non radices describat Dioscorides, aperte quidem constat, cum ait: Calamus odoratus in India nascitur, melior est fuluus dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula. Hac ille. Quae tamen perperam Lusitanus intelligit: quippe calamus in primis harundinem designat, non radicem. Praeterea proprium harundinis est pluribus constare geniculis, & assulose frangi. Deinde fistula, in qua quoddam araneae tele simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quae solida, dura, lignosa, & ubiq; occlusa spectat: & in omni harundinum genere. Ad haec fuluus color calamo sane debetur, non radici: quippe quod radix in harundine perpetuo albescit. Ad id autem quod proprium sit radicis (ut ille contendit) ut ipsa geniculata dicatur, calamus vero potius nodis cinctus, Dioscorides ipse respondet. Quandoquidem is non modo quarundam pl. in. r. radices geniculatas facit, sed etiam canles, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, ut facile quis certior fieri poterit, qui eius codicem legerit in Hydropipere, in altera Cyclamino, in Gentiana, in Panace Aesclepio, in Ligustico, in Elaphobosco, in Crateogono, in Gramine, in Equisetis, in Cicuta, in Pityusa, in Ebulis, aliisque nonnullis. Sed relinquamus haec (inquam) quae legere non vacauit Lusitano, & alios consulamus auctores. Plinius tritici culmi genicula quaterna farris sena, hordei octona tribuit. Hinc libro de senectute, Culmo geniculato, inquit Cicero. Hac si animaduertisset Amathus, aut si non tam negligenter & oscitanter Dioscoridis codicem legisset, tam non fuis-
 - 40 set insulsus. Illud tamen maxime in hoc homine ridiculum videri debet, quod quum tam excellentem se haberi velit medicum, reiq; herbaria peritissimum, eius sententia, quam damnat, nullam soluat rationem, & omnia relinquat intacta argumenta. Porro ego in illum tam vecors non ero, ut hominem potius, quam opinionem parum validam, nulla veritatis imagine saltam, videar persequi. Solus seuerus hic iudex in nos ex alto tribunali fert sententiam, damnat nostram. Tantum sibi temporis superesse non putat, ut vel aliquid probabilius afferat, vel rationes nostras dissoluat, ut non veritatem, cui a quouis prolata semper sui additissimus: sed solam suam sequi malevolentiam se monstret. Nos (quod praecipuum sane nobis est studium) ne calumniatores potius, quam veritatis putemur indagatores, multa habemus, cur Amathi huic nobis displiceat opinio. Primum quod nusquam visa sit radix inter valde admodum innumeras, quas ille falso genuini Calami esse censet, quae secum vel minimum harundinis trunculam cacumini adpexum deferat: sicut quam plurima visantur, quae ab ipso
 - 50 cacumine folia emittunt Iridis, ut quisq; facile certior fieri poterit, qui diligenter hasce radices explorauerit. Constat praeterea hasce radices ex Litvania, & Tartaria finibus, quoniam etiam ex Ponto, ubi passim ferè proueniunt, ad nos conueni. Quod maximo cuiq; argumento esse potest, eos prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quod nullus extet autor (quod viderim) qui scripserit odoratum calamum alibi prouenire, quam in India & Syria. Quin & illud in nostram concedere sententiam Lusitanum fortasse mouebit, quod a Galeno dictum est, quippe qui scripserit calami odorati partium essentiam esse in caliditatis frigiditatisq; coniugatione temperatam, & minimum habere acrimoniam, cum tamen gustantibus palam sit, radicem hanc non obscure esse acrem pariter & amaram, id quod odorato Calamo minime tribuit Galenus. Hisce itaq; satis iam comprobatum censemus sua in sententia hic hallucinari Lusitanum, nec pluribus est hac nostra defendenda causa: in sequentibus tamen & rationibus, & auctoritatibus, ostendemus radices has legitime esse
 - 60 Acori. Nec minus fallitur, quae de Aspalatho contra nos affert. Est vero Aspalathus (ut Ruellius testatur, & recentiores Graci confirmant) lignum, quod a Rhodiorum Insula affertur, & illud lignum, Aloes Rhodiorum officinae appellant, ex quo corona ad fundendas preculas Deo parantur. Nec enim Matthiolus, qui hoc itaquam falsum euertere contendit, audiendus est, quum reuera lignum hoc, ex quo corona parantur, ex arbuscula humili, crebris spinis aculeata, in insulis Rhodiorum, & alijs Graeciae locis caditur, non vero ex oliuae speciem referente arbore. Vidimus enim nos apud Thomam Lucensem insignem apud Ferrarienses pharmacopolam, huiusce ligni frustum brachialis crassitudinis, solidum, graue, multum interceptum nodis, quod a Graecis hominibus sub nomine Aspalathi acceperat. Erat enim lignum coloris sabruhi, cui simile in Hispania apud Tarconenses & Valentinos magna in copia reperitur. Haecenus ille. Ofallicem discipulum, qui ubiq; magistris ha-

Calamus Oloratus communis vltus, vnde afferatur.

Calamnis vltus de Aspalatho.

Calamnis vltus de Calamnis vltus.

venit mihi in mentem, ne quoque iniuriam his faciam, quibus preceptoribus se toties usum iactat. Verum si ab his hoc sit edocuius, seu ipse ingenio hoc excogitauerit (malo enim non a me hac agitari testimonia, quam ad hanc inue[n]tione[m] et tanquam si ipsi laboris) ego profecto Rhodium illud lignum multum distare ab Aspalatho certo scio: quod primum a munda cortice tenui utens non sit, sed a potius albicans. Aspalathus enim Dioscoridis detracto cortice adeo rubet, ut purpuram pene referat. Quo argumento credidit quidam Santalum rubrum legitimum esse Aspalathum, quamquam et illi aberrauerint. Sed et id clarissime demonstrat, Rhodium lignum nullam cum Aspalatho habere cognationem, quod scribat Galenus, qui legitimum in Grecia fortasse plures degustasse, hunc gustu esse auri, et simul adstringenti vi praeditum. Id quod minime in hoc Rhodio ligno reperitur, quemadmodum nec praeualens amaritudo, quam illi reddidit Dioscorides. Quod autem huiusce ligni planta sit Oleastri species, id maxime fatentur Rhodij, qui eius historiam ex Melita Insula ad me scripserunt his verbis: Lignum ex quo torno globuli fiunt ad fundendas preces, truncus est arboris, longitudine hominis metam non excedens. Nascitur arido et saxoso tractu, fronde perpetua Oleastri amula, floribus albicantibus, baccis nigricantibus parvis, candice brevi contracto, brachij instar crasso, a quorundam prodeunt rari, spinis ferè nullis, aut a. Inicidum paucis, albicante cortice. Ligni materies cortice tenui candida, medullitus vero nigricat. Radicibus nititur firmis albicantibus. Quibus palam esse arbitror Rhodium hoc lignum ab Aspalatho admodum esse diuersum, et Lusitanum una cum Ruelli in eodem versari errore. Quippe (ut praemisimus) Aspalathus tantum cortice tenui, non ut ille existimasse videtur, in tota ligni substantia, adeo saturate rufescit, ut purpureus appareat. Quinetiam cum Aspalathus in Rhodo proveniens frutex sit surculosus (ut testis est Dioscorides) non arbor procerà, rationi consonum non est, ut ad brachialem crassitudinem adolescat. Ceterum quod de re incerta non modo contendat, sed tam facile audeat affirmare, detestandum mihi videtur. Quippe nihil tam temerarium, tamque indignum sapientis gravitate credidit, quam aut falsum sentire, aut quod non satis exploratè perceptum sit et cognitum, sine ulla dubitatione defendere.

Rhodium Oleastri non est Aspalathum.

Rhodium Oleastri huiusmodi

Calicutia VI. de Helenio.

Hinc ad Helenium venio, in quo quum Lusitanus existimet, me pluribus modis hallucinatum, adeo utilis possim me defendere rationibus acriori morsu in nos inuehitur his verbis: Confirmat Marcellus Vergilius sic in antiquissimo Dioscoridis codice legisse: Caulem ex se mittit Helenium, crassum, hirsutum, cubitalem, et aliquanto maiorem, angulosumque, flores luteos, et in ijs semen Verbasco simile, tactu pruritem faciens. Vnde facile credere est, ut hoc peruersa, et immutata fuere, ita quoque pars hoc ad amaritudinem attinens: quamquam eam quoque a Plinio pretermisum animaduerto. Unde Matthiolus Senensis hic falso admodum Plinium adducit lib. 19. cap. 5. qui vltra quod in eo capite nullam penitus de Helenio mentionem faciat, lib. 10. cap. 10. ubi Helenij meminit, non de hac loquitur, sed potius de Aegyptia, cui Dioscorides in hoc capite ex mente Crataea herbarij, ramulos serpylli modo humi sparsos tribuit folijs vero Lentisimilia: cui quoque eodem loco nullam tribuit amaritudinem. Imò in describenda hac herba Plinius a Dioscoride variat, cum Dioscorides folia Lentis, et ramulos Serpylli per terram sparsos Aegyptiam Inulam habere tradat. Ille vero non Lentis folijs, sed Serpylli potius possidere dicit. Accedunt ad hoc, quod cap. 21. eiusdem libri, ubi medicamenta Helenij pertractat, dulcem esse asserit, non amarum: ut liquido constet Plinium de illa tantum dulci Aegyptia Inula memoriam fecisse non vero de hac a nobis amarum tractata. Proinde Matthiolus si Plinij autoritatem in hac parte subiecit, prudentius dubio procul fecisset, ac non ita duplici errore hallucinaretur. Primum cum credat, Plinium de hac Inula prima mentionem fecisse, quum (ut diximus) potius de secunda Aegyptia agat. Secundo cum dicat Plinium illi amaritudinem tribuere, cum revera illi dulcedinem condonet, et non amaritudinem, ut cuique legenti notum erit.

Calicutia retulit.

Hac itaque sunt, quae in me spicula mittit Lusitanus. Sciat igitur velim, culpam, qua me accusat, non in me, sed in Typographum esse reuocandam, quippe qui imprudens et meam peruerterit sententiam oblitus quibusdam lineis in quibus Plinij verba adnotaueram qua de Helenio primi generis ab eo scribuntur (praeter Lusitanam opinionem, quod hunc Plinij locum semidormiens pertransierat) lib. 23. cap. 5. et quibusdam alijs lineis priorum loco acceptis ex decimo vigesimo primi libri capite, quae postea in medium adduxeram de altero Helenij genere quod in Aegypto provenit. Facile enim ac lubricus fui lapsus, quippe quum prope essent duae illae Plinianae autoritates, Typographus, qui e codice nostro manuscripto hac in sum transferebat typum, oculi imprudentia deceptus primum Plinij locum tanquam dormiens praeteriit, et secundum in eius locum reposuit, quod ad alterum spectauerat, Helenium. Cuius erroris illud semper omnibus fuerit argumentum (ne fortasse quis puset me id totum subdole in Typographum reuocare) quod non modo in commentariis nostris Latinis factis pluribus antea annis in lucem editis, id erroris fuerit expurgatum, sed quod ea quoque Plinij verba per Typographum cotranslata lib. 19. cap. 5. ubi ascripta non legantur sed lib. 21. ca. 10. ubi de Aegypto Helenio is est. Quin et illud de innocentia nostra maxime testari poterit quod illa per Typographum transposita authorum, nihil penitus ad rem nostram faciat neque concludat ut priores Italicae editiones nostra unum quemque certiorum reddent. Non enim putet velim Lusitanus, quod adeo sim excors, ut tam indecenter, tamque fatue Pliniana illa verba, quae nihil pro sententia nostra concludunt, in praedictorum fulcimentum attulerim. Quandoquidem si a quo animo in accuratius perpendere, quae Plinius de Helenio verba fecerit libro decimo nono, capite quinto a me eo loco citata nec assuetanter Plinium relegerit, me omni culpa vacare compulsus veritate fatebitur. Ipse enim Plinius ibi sic habet: Siferis factus mensibus Februario Martio, Aprili, Augusto, Septembri, Octobri, breuior est sed torosior amariorque. Inula per se stomacho inimicissima eadem dulcibus mista saluberrima: pluribus modis austeritate iuncta gratiam inuenit: haec tenus ille. Hac itaque sunt a Typographo Lusitano quae ad probanda ea quae diximus afferebamus ex quinto capite decimi noni libri. Ceterum, ut suam Lusitano detegam negligentiam vel fortasse imprudenciam, dicat sane cur tam aperta fronte negauerit, Plinium lib. 10. cap. 10. Helenij Inulae de qua primo scribit Dioscorides nihil penitus meminisse, cum tamen ea omnia, ac etiam perperam inuenitur qua hic his per paucis lineis in medium attulimus. Quibus etiam videre poterit quae ratione non minus reperiri apud Plinium Inulam esse amarum. Hisce igitur de causis iam primum Lusitanus conperere poterit, id quod in me reprehendit, tantum quidem a veritate distare, ut potius sibi ipsi quam mihi iniuriam inferre videatur. At insignem et arrogancem hominis teneat, item ausum sese offerunt

Lusitani imprudencia.

Calicutia 7. in

quum in hoc libro per se in verbis maxime ambiguis, hoc manifestius suam prodit incertiam. Sed iam sese offerunt non minus auctoritate quam in euguento simplici aduersione me scribit, tametsi longe magis ipsam accensent: qui

ea, que nullis argumentis probari possunt, falso probare contendit, & que pluribus sanè modis probata sunt nullis in contrarium allatis rationibus, inani quadam arrogantia, improbare nitatur sic inquit. E. si apud Theophrastum, vel Plinium, nonnullosq; alios celebres viros Sampfuchus eadem cum Amaraco, siue Maiorana herba sit, apud Dioscoridem tamen, & Galenum, ac Paulum Aeginetam multum inter se differunt, cum Sampfuchus Maiorana herba hodie in fœtilibus & vasculis reposita ad fœneji, ac pro delicias habitata sit: Amaracus verò Parthenium est, quæ an Matricaria officinarum sit certis dicemus libro. Hanc vero an: aduer-

10 tentes inter utranque differentiam Galenus, & Paulus, diuersa capita tanquam de rebus diuersis fecerunt, videlicet de Sampfuchis, & Amaraco quam prius no: cens Dioscorides vigilantissimus, oleum Sampfuchinum ab oleo Amaracino, tanquam rem diuersam distinxit. Nam Amaracus Galeni & Pauli, proculdubio apud

20 Dioscoridem, Parthenium est, ut tertio libro facile quis comprehendere poterit, cum ibi Parthenium Amaracum esse dicat. Qui verò Amaracum Galeni & Pauli, Mirum Dioscoridis esse opinantur, miro modo ce- curunt, nam etsi verum sit, quòd Galenus, & Paulus in libris de facultatibus medicamentorum simplicium de Maro nullam faciant mentionem, non proinde Amaracum illorum, Dioscoridis Marum, ob nominis vici- nitatem esse, dicere debent: & eò magis quia Galenus in libris de Antidotis, & Amaraci & Maro, tanquam rerum diuersarum, meminit. Quare Mattho:us Senensis si hæc animaduertisset, non sic facile cepisset, nec hæc sic confusa reliquisset. Hæc enim ille. Sed cur hæc Amathe? Tuid mihi turpe ducis homo præcep, quòd in

Calumniz con- futatio.

30 rebus dubis meam suspenderim sententiam? an velis tu potius, ut præcipis quadam arrogantia in istam tuam incurram vecordiam? nisi incredibilis arderes libid ne nostros oppugnandi labores, tu tam essis inter hos scopu- los præcep? ad. ò temere de his deserneres? Nos sanè longe aliter sentimus. Etenim malo ceteris veritatis in da- gaudere apertam relinquere viam quam non ut temeritate eos hinc auertere, præsertim cum non desint clarissi- mi viri, qui hæc Galenile: tione plurimum habitarunt. Siquidem non desunt rationes, quæ ostendant Amara- cum Galeno & Paulo tam Parthenium, quam Marum posse designare. Quam ob rem nec hinc, nec illam opi- nionem probare, vel improbare libuit. At si aliquid in re difficili & suspensa asserere liceat, quòd noui quam in tanta antiquitate nouum esse debet, igitur in hoc inclinor, ut librariorum negligentia hunc Galeni locum cor- ruptum putem ac hoc errore Ma: i tuulum in Amaracum esse translatum. In qua re tamen si auctorum certa desint testimonia, n: n:ta n:en huius rei absunt indicia, quæ Amaracum Galeno, & Paulo Marum designare præferant. Siquidem cum sit Galeni proprium institutum simplicium medicamentorum vires ex Dioscoride describere, id, præsertim seruire in his, quæ viribus non uariabilibus præstant, noui quam crediderim si Ama- racum Galeno Parthenium designaret, quin scripsisset ex Dioscoride id Epithymi modo bilem atram, & pi- tuitam detrahere, suspiriosos & melancholicos curare, calculos expedire, anbelosis liberam spirandi faculta- tem reddere, quin & eius decocto insidentibus fœminis uteri duritias emollire, & inflammationes arcere, illi- tu uero ignem sacrum extinguere, collectione q; consumere. Quandoquidem tam raras uicue que facultates haudquaquam putarem insoluisse Galeno, si de Parthenio eocum te egisset. Verum cum Maro nil aliud uirum tribuerit Dioscorides, quam quòd illi uis serpentina ulcera sistat, & quòd in unguento ad datur, mirum sanè non est si de Maro tractaturus Galenus libro sexto de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi sortasse deprauata lectione de Amaraco legitur, de eius uiribus sobrie admodum tractauerit, paucisq; per- strinxerit, nec plura dixerit, quam quòd ius ut excalfaceret, & siccaret. Id quòd etiam egit fort. off. libers, quòd datus de eo scribere statuerit libr. 1. de antidotis in Medicis compositione. Hæc nobis dicta uelim, non

40 aff: an: tantum huius opinionis causa sed tua refellenda temeritas, ac impudentia. Quam ob rem eos mihi impugnare non licuit quorum tu opinionem sequeris. Nimirum quòd in obscuris incertisq; nusquam so- leam in aliquem uerba facere, nec quicquam agere, cuius nequiter uis causam probabilem red:ere, eòq; præ- sertim, quòd si uerum esse etiam rationes, quibus se ueri possint, nempe Serapioni testimonium, qui id tan- tum, quòd Galenus de Amaraco scripsit, Matricaria tribuit. Sed hæc etiam posset destrui autoritas. Hæc itaq; si recte, sincere q; perpendisses, non modo te ipsum non isset, sed & fortasse pudisset ita te in:arie in me conspiras- se. Rel: quum nunc est, ut iam tibi tua detegam errata, ne alios in posterum ducas in errores. Inquit tu Lusita- ne, apud Dioscoridem, Galenũ & Paulum, Sampfuchum & Amaracum admodum in:er se differre. Id quòd

Sampfuchum & Amaracũ idem esse.

50 esse falsum & à ueritate alienum, illicò probari potest ex ipso Dioscoride quippe qui libro tertio de Sampfuchis agens, scriptum reliquerit: Sampfuchum à Sicilia, & Cyzicenis, apud quos laudatissimum prouenit, Amara- cum vocari. Hoc idem facile uidetur probare etiam Galenus, ipse enim libro primo de antidotis, Amaraci plu- rimum in Cyzico nasci scribit, & Amaracinum unguentum in Cyzico parari ait libro secundo capite primo de compositione medicamentorum secundũ locos. Id quòd omnibus pariam facis, ut alius Galeno designare Ama- racum, quam Sampfuchum. Etenim cum Cyzicenis Sampfuchum, Amaracum appellent, quisnum fuerit ille tam amens excors, obtusq; ingenij homo, qui non noxerit Amaracinum unguentum in Cyzico paratum è Sa- mpfuchis fieri? Hu: subscribit etiam Plinius libro uigesimo primo capite undecimo sic inquit: Amaracum Dio- cletis medicus, & Sicul: gens appellauere, quòd Aegyptus, & Syria Sampfuchum. Et capite uigesimo secundo eisdem libri: Sampfuchum (inquit) siue Amaracum in Cyzico laudatissimum, & odoratissimum. Fit ex eo oleum, quòd Sampfuchinum uocant siue Amaracinũ ad excalfaciendos emolliendosq; neruos, & uulnas. Qui- bus palam est, quam impudenter hæc asserat Lusitanus. Nec obstat quòd in quibusdam Dioscoridi codicibus legatur Parthenium etiam aliquibus Amaracum vocari. Siquidem hoc non uetatur huius uniuersalem ne-

60 gitione. Adde quòd illa uerba Dioscoridis spuria a quã plurimus rei plantaria studiosis, non ab re iudicantur. Nisi iam extant Græci codices antiquissimi manu scripti, in quibus non legitur in Parthenij capite particula illa οὐδὲν ἀπὸ τῆς γῆς quemadmodum nec apud Serapionem, qui Parthenium ex Dioscoride transcribit. Hu: ac- cedit a: sua solidum Lusitani erratum, quòd facile quis intueri poterit, quum asserat is Amaracinum unguen- tum odore uicundissimo, edolens parasse antiquos non è Sampfuchis quòd Cyzicenis, qui illud olim præstantis- simum parabant, Amaracum dicitur, sed ex Parthenio, quòd etiam falso eam esse plantam existimat, quam eò odoris uirus Septasia merito Cotulam fœtidã uocant. Sed quantum in Amaracino unguento, quòd odoris

Cotula fœtida.

fragrantia plurimum præstitisse scribit antiquitas hæc fœtens planta conueniat, e. certò indicare poterant, qui- bus longè magis, quam illi res medicæ cordi fuerit. Et quidem fatetur Galenus libro primo de Antidotis, ac alibi etiam locis in Cyzico, quemadmodum in uniuersa minori Asia, Maro & Amaraci orti uicini sunt, parum

veritas aliis regionibus, praesertimque in Italia. Id quod Lusitanum hic maxime hallucinatum palam facit. Quandoquidem nullo magis herbarum genere ubiq; abundat Italia, quam Cotula fetida dicitur. Ea enim ubiq; scatent campi, horti, area, platea, semita, ac colles, adeo ut nullus in Italia sit locus, ubi hac herba non proveniat. Adde quod cum dicat Galenus in Ozco Amaraci nasci plurimum, ubi Amaracinum unguentum omnium odoratissimum parabatur, & nobis iam comprobatum sit Sampsuchum a Cylicenis Amaraci nomine appellari, satis etiam comprobatum esse putamus, Lusitanum medica materiae igna, & tam Dioscoridi, quam Galeno idem esse Sampsuchum, quod Amaracum. Demum an Dioscoridis Parthenim Cotula fetida sit in vulgo vocata (ut Lusitanus certo sibi persuadet) is postea audiet. De Iasmeno unguento multum quoque mecum contendit. & ex eius floribus vult parari Iasmenum, quos Itali vulgo appellant Geisimini, cum tamen id nullis rationibus comprobet, sed tantum suis nitatur verbis, non est cur multis cum illo agam. Satis enim mihi esse existimo, cum scribat Dioscorides parari Iasmenum (id est violaceum unguentum) e floribus alba viola, nullo pacto fieri posse, ut ex aliis patet floribus, & ex his praesertim, quos non apud Dioscoridem, & antiquos nulla praesens habetur historia Quinetiam superuacaneam, hic omnem verbositatem esse censeo, eo quod in commentario nostro satis superq; comprobatum sit, eos proculdubio decipi, quos Lusitanus sibi imitandos proposuit. Praeterea cum is rationibus argumentisq; nostris, nullus prorsus obset verbis, nec ulla dicendi facultate (si philosophum medicumque ut audio se putat) non vereor, quin facile scire possit, me ad suas non teneri obiectiones, nisi primum ad nostra responderet argumenta. Quibus nulla alia de causa illum nihil in contrariam adduxisse putamus, quam quod is longe magis descendit ad peritiam, quam veritati fuerit addictus. In primo autem ut Theophrastum defendere videatur sic mecum agit Lusitanus. Longum profecto, nec minus difficile esset, omnes Pini species percurrere: illius tamen (Theophrasto auctore libro tertio de historia plantarum. 10.) duae sunt speciei, altera urbana, altera vero sylvestris. Sylvestrem vero in Ideam, & Maritimam partitur. Nam Ideam id est, montana, rectior, celsior, materiaeque crassior est, sed maritima folio ornatur tenuiori, imbecilliori & curvace laeviori, ad coria vili, in qua nux conspicitur rotunda, brevisque debescens. In Ideam vero tanquam nux sylvestris oblongior est, viridis minusque hirsuta. Hac ad Theophrasti mentem, qua vera esse nullus hucusque in dubium traxit, praeter unum Matthiolum Senensem, qui omnino hac suo tantum iudicio fulens evertere conatur, dicens se in sylvestri Maritima Pino observasse nuces non quidem rotundas, sed oblongas, potius solidas, & difficiliter debescens: in montana vero non oblongas, sed breves, & ad aperiendum faciles. At nos revera Theophrastum verum univrsaliter dixisse observavimus, ac Matthiolum aut non recte apprehendisse, aut potius, et non aliquid aliud dixisse videretur, in medium hac asserre voluisse. Hac illius sunt verba. Ceterum an vera, vel falsa, sincera, vel subdole prolata, candidissimus quisque lector, qui nostros legere commentarios, facile conijcere poterit. Explodenda enim detestandaq; sunt Lusitani fragmenta, qua hic aduersum me habet. Signidem ego recitata Theophrasti historia, nec cum hallucinatum nec delusum asserui, sed id tantum Theophrasto repugnare dixi, quod utriusque Pinastris strobilus in nostro climate testatur. Quod autem vera non sita, nec fabulosa scripserim (ut ex se ipso fortasse me indicat Lusitanus) is proculdubio iateripuerit, qui in agro Tridentino Ideam, in Senensi, ac Pisano Maritimam observauerit Pinastrum. Quippe in maritimis hisce locis duo habentur Pinastris genera, quorum alterum strobilos profert striatam longiores: alterum vero breviores paulo, compacti duritie conclusos, nec per se facile debescens. In Tridentinis vero montibus, quemadmodum & in B. hemia, qua Pini ubicunque sylvescit, Pinastris nuces in univrsam visuntur longe maritimis breviores infirmioresq;, qua cum primum inaruerint, illico debescunt & ab arbore decidunt. At si quis ad vias, virentesq; huiusce Pinorum plantas se conferre nequiverit, novae Pinorum imagines postremae commentariorum nostrorum editioni appetas intueri poterit. Quod si sincero animi affectu fecerit, non veremur, quin facile coniciat, nostram in plantarum historia fidem falso a Lusitano improbatam, ac cognoscat subinde etiam magnam illius imperitiam, & apertam in nos invidentiam. Ego quidem nunquam putavi hac in Theophrastum reicere, sed nostro climate causam assignavi. Quare obrem non possum non admirari Lusitanum quippe qui non sit verum tam evidentes in me asserre calumnias. Equidem nunquam negaverim Pinastris, qua in Ida monte proveniunt, quin & eas, qua in Graecia maritimis crescunt, in nucibus edendis contrario modo fortitan se habere eae soli, illius immutata natura. Venio ad Hippocampum, cuius historiam nemine de scriptam haecenus reperi. Quo sit, ut difficile admodum sit absque ulla dubitatione affirmare, quod nobis sit piscium genus, quod Hippocampum appellaveris antiquitas. Nec displiceret Lusitani opinio, qua longe antea audieram a Luca Gorno medico clarissimo, quod Graecis recte idem sonet Hippocampus, quod Latine flexuosus equus si que probari possit, esset ad manus. Verum tamen cum nulla extet Hippocampi historia, cuius opinionem accipiam sane non habeo: quin nec etiam cur resellam. Plinius lib. 26. cap. 5. dum Praxitelis admiranda percenit marmora, vnde scribit in maxima dignatione, Gn. Domitij delubro in circo Flamini Neptunum, Thetim atq; Achillem, Nereidasq; supra Delphinos & Hippocampos. Qua quoniam demonstrat Hippocampos equorum effigiem praese ferre, non tamen hac Plinij auctoritate quis unquam recte affirmare poterit, Hippocampos, quorum ille meminit, esse pisciculos equi vel draconum formam habentes, quos quidem veros esse Hippocampos non ambigunt. Quandoquidem Plinij verba luce clarum demonstrant Hippocampos parvas non esse pisces, sed ingentes fortasse beluas, corporis mole Delphinis minime inferiores: nisi hac potius fabulosa censamus, qua vera. Nos ante cum iam diu non ignoraverimus non deesse rei medica studiosos qui equiculus illos, vel marinos dracunculos veros esse Hippocampos putarent, non absre esse duximus horum equicularum imagines commentariis nostris adiungere, non ea tantum causa, ut horum placitis subscriberem sed ut unumquemque praesertimq; Zoilos admonerem me hac prius non ignorasse. Verum non ob id absurda vocari expedit (ut Lusitanus putat) qua de Hippocampo ante scripsimus, doctissimos Dioscoridis interpretes & Graeci sermonis peritissimos scitis, quarum non desunt qui asserant in Locustarum genere haberi Hippocampum. Quibus subscribere videtur Plinius lib. 22. cap. 11. At cum in Locustis nulla spectetur, qua magis flexuoso dorso erucat, qua Graeci vocant, ut referat quae ea, qua illi carver pietate spectari potest, nefas sane fuerit iam petulantia ore affirmare, & aliorum opinionem tanquam absurdam esse spernendi cum tamen rationibus, & auctoritatis comprobata veritas, facile cernat. Multa etiam circa nos de sativo Cucumere effundit Lusitanus procaecius magis, quam veritas, sic inquit Cucumer non ubiq; sativus reperitur, qua de causa multi non sine ingenii errore Cetrulium quod

Calumnia VIII. de Iasmeno.

Depulsio calumniam.

Calumnia IX. de Pino.

Lusitani signemta expioduntur.

Calumnia X. in Hippocampo.

Lusitani opinio nec resellitur, nec probatur.

Calumnia XI. de sativo Cucumere.

10

20

30

40

50

60

Pepone

- Peponem esse certo scimus, Cucumerem appellant, vulgariū forsitan voce seducti, qui in Italia fere vniuersa & Flandria ac Germania Cucumerem vocant sed, ut dixi, non sine magno, ne dicam pudendo, errore, inter quos nouissimū extat Matthiolus Senensis in suo Dioscoride Hetrusca lingua confecto. Est igitur Græcorum Cucumer, siue Cucumis, dictus sic (ut Varroni placet) quia facile curuatur baculi crassitudine, colore viridi, longitudine cubitali, & maiori, præsertim si in flore existens in fistulam mittatur. Tunc enim (ut tradit Plinius libr. 19. cap. 5. mira longitudine, & ad fistula complementum crescit, & hac de causa Columella Anguinum Cucumerem eum appellat, quia oblongus, crassus, atq; instar anguis flexuosus sit. Nascitur enim in simili planta qua Cucumis syluestris oritur. Raro in Lusitania Cucumer videtur. secus autem in altera parte Hispanie, præcipue apud Salmaicensis, ubi in magna cernitur copia, hirsutus, colore omnino viridi, longitudine cubitali, & curua. At Pepo est, quem Officina ob colorem Citri in maturitate acquisitum, Citrulu appellat. Græci vero illum πένταλον, id est maturum Græsa voce dixerunt. Quam vocem Hispani vel hodie seruantes nulla mutata litera, sive syllaba illum quoque Pepanum vocant: & eius supremam partem concisam frontis æstus hora, in qua illum plerumq; comedimus, tanquam refrigerantem, admoemus. Quod olim quoq; a Græcis fieri Dioscorides innuere videtur. Vescimur enim Pepone Hispani, dum viuet, nam postquam maturuit, & colorem luteum Citri mitturi contraxit, tanquam cibo inutilem reiecit. Si quid tamen illius comedendum sit, eius suprema, & cartilaginea pars tantum pro victu, reiecta eius medullari parte, accipienda est, ut apud inferiores Germanos plerumq; fit, qui Peponibus iis non nisi maturis, contra Hispanorum consuetudinem, in vitium utuntur: quorum medullarem, & interiorem partem, in qua semen continetur, tanquam improbam & malam reieciunt. suprema & cartilaginea illa, crebris verrucis ornata parte contenti. Qui mos apud Græcos quoque fuit, ut ex Galeno deprehenditur lib. 2. de Alimentorum facultatibus, ubi inquit: Huc accedit quod in Peponibus homines a carn: intima, in quo semen habetur, abstinent. Sed hac ignorans Matthiolus, nil in hoc capite facit, quam vellicare alios. Sed audias Amathe. Solus ne inter tot eruditissimos viros quibus eadem placuit opinio, à te reprehendor: Solum inter innumeros alios Matthiolum in seclari? Quapropter? non alia opinor causa, nisi ut tuam malitiosam inuidenciam in eius tantum videaris monumenta effudisse, ex quibus tu opima spolia congeffisti. Egregiam certe hominis in furando prudentiam, ut tacite ius secum gaudeat: qua publice criminari putetur. Idcirco, homo vaserrime, tot hac contra me construuntur hic verba? Sed audiat ipse Lusitanus quam his toto aberrauerit celo. Etenim sententia nostra haudquaquam obstare sed plurimum astipulari censemus, quod dixerit Varro Cucumerem a curuore esse dictum. Quippe quod Cucumeres qui passim in Italia proueniunt, & quos falso Lusitanus Pepones esse contendit, plerumq; incuruis spectantur, ut æstate tota videre quis potest in clarissimarū urbū plateis, ubi innumeri venduntur. Porro si hac ignorat Lusitanus, medicos non consulat, sed olitores. Nam in istensis incuruorum cucuminū millenarius, facile crassam hanc caliginē ab ipsius oculo detergent. Præterea vulgarem Cucumerem, quo passim utimur, verum & genuinum esse manifesto comprobatur Plinius libr. 19. cap. 5. his verbis: Particulatim Cucumis flores, sibi ipsi super florescens, candida lanugine obdus, magisq; cum crescit. Hec ille. Quibus palam est Cucumeris nostri vsus legitimos esse: quippe si Lusitanus ut (prædiximus) oliores adibat, & ad eorum hortos sæpe se contulerit, vniuersos videbit cucumeres. illos scilicet, qui nuper emerferunt, & iam primum ad inglandium quantitatem intumuerunt, sibi ipsis in cacumine super florescere, & alia quadam contegi lanugine. Ad hac sententiam nostram, ac quam plurimorum clarissimorum scriptorum à Lusitano falso improbatam illud sane luce clarius ostendit, quod satiuus, ac vulgari Cucumis fructu tantum ab erratico differat. Vtriq; enim eadem sunt folia, eadem flores, eadem viticula, & eadem in vniuersum deniq; facies, ut lib. 4. testatur Dioscorides, & lib. 7. cap. 6. de historia plantarum posteritatis memoria perdidit Theophrastus. Tanta enim inter hæc plantarum intercedit similitudo cognatioq; ut si simul serantur, vel altera alteri conferatur, nulli fere differentia dignoscantur. Nec propterea negauerim, quod Cucumis ille, qui sua longitudine serpentis speciem refert, & quæ Hetrusca falso Melonem vocat, inter Cucuminum genera non fuerit recipiendus, cum & ipse olitorum mangonio, è vulgaribus nostris in eam formam fuerit redactus: id quod Hippocrati primum, dein Plinio, & Palladio referunt acceptum, quippe qui scripserint flore in fistula, vel haurundine demisso. Cucumerem inde mira longitudine crescere, & omni alia, qua coguntur, forma: id quod & de Cucurbitis tradidit Columella. Hinc itaq; suam traxit originem illud Cucuminum genus, quod ita prælongū se diffundit, & anguiam modo contorquetur. Quippe satis subinde semine, quod exemptum sit ex hisce prælongis mangonio illo paratis, in posterum per sese eadem forma proueniunt, ut & nos experimento comprobatum scimus, non solum in Cucumeribus, sed etiam in Cucurbitis, præsertimq; in iis, quas Indicas vocant: id quod etiam Plinius affirmat loco prius citato. Nam cum maxime compertum haberet in Campania oriri Cucumeres mali Cotoneæ effigie (ij autem ut Lusitani fert opinio) prælongi non erant, & huiusce forma causam reddere vellet: forte (inquit) primo natum ita audio unum, mox semine ex illo genus factū. His itaq; palam sit (ut Lusitanus iktius verbis utar) in quam magno, ac pudendo is versetur errore. Quippe si (ut idem falso contendit Lusitanus) vniuersum Cucuminum genus sponte sua ita prælonga proueniret, stolidum sane esset id arte vel mangonio moliri. Sed Cucumeris sui natura non esse adeo in longitudinem protensos, manifesto demonstrat Plinius, quippe qui scribat Cucumeres in Italia esse quam minimos, in Prouinciis quam maximos. Nam si sponte sua ea essent forma (ut Lusitanus somniasse videtur) scripsisset quidem nasci Cucumeres in Italia quam breuissimos, in Prouinciis quam longissimos. Adde quod etiā experimento constat (ut ego mihi testis esse possum) quod Cucumeres sic Italia vocati in suppositam aquam descendere nitantur appensi, & contra refugiant, & vnicui modo recurrentur, ubi vas oleo plenum supponatur apertum. Id quod proprium esse Cucumeris, affirmat præclarissimi rei rusticae plantariæq; scriptores, præter id, si gustum consulat, nulla penitus saporis vel odoris differentia inter prælongos Cucumeres illos, & vulgares nostros cognosci potest. Ad hæc cum tria Theophrasto, & Plinio sint Cucumerum genera, Laconicum, Scythicum, Bæoticumq; hoc maxime etiā Lusitano aduersatur quod vnum tantum Cucumerum genus statuerit præsertim cū etiā Auicenna lib. 3. de tussis curatione scribens tria statuat Cucumerū genera, sic inquit: Et medulla Cucumeris longi arcuati, & Cucumeris rotundi, & Cucumeris communis. Ad id autē, quod Columella testimonio asserit Lusitanus satiuū Cucumerem anguinū vocari, Anguinus cucumeris quæ quod forma anguinæ referat speciem, nil aliud nobis respondendū sese offert, præter quā quod falso id Columella acceptū referat. Constat enim anguinū Cucumerem nil aliud fuisse Latini, quā Cucumerem syluestrem, quem ad-

Amathus suas e-
narrationes in
Diosco. ex Mat-
thiolo transcri-
psit.
Calumnia refelo-
litur.

Cucumis vulga-
ria.

Cucumis sati-
uus ab erratico
ut differat.

Cucurbitæ, &
Cucumeres oli-
torum mango-
nio varias indu-
unt formas.

Cucumerū tria
genera.

Anguinus cucu-
meris quæ

modam sylvestre *Allium* Dioscoridi *Anguinum* vocatur, non quod forma referat angues sed quod in sylve-
 stribus nascatur locis, ubi facile stabulantur angues. Ceterum quod anguinum Cucumis sylvestris sit non solum,
 testatur in primis Lucius Apuleius suo de simplicium medicamentorum libro capite proprio de sylvestri Cu-
 cumere, quin & quidam Dioscoridis codices, ut Hermolani & Marcellus legunt quibus etiam subscribitur Plin-
 ius lib. 20. cap. 11. Sed cur hoc nitar tantorum virorum testimoniis comprobare cum Lusitanus ipse capite de A-
 gressi Cucumere, sui ipsius oblitus, id aperte fateatur, & suo ipse se ingulet gladio? Sed quod falso Columella te-
 stimonio fuerit usus, prater id quod nosquam ab ipso hoc scriptum esse scimus, testem habeo Hermolanum virum
 sane preclarissimum, qui in suo Circolo Lusitanum mendacio redarguit his verbis: Cucumeres in fistula apud
 Hippocrate demisso flore mira longitudine quasi anguina specie proueniunt, quanquam Anguinus cucumis
 dexti videtur esse, qui Sylvestris, multo in sua magnitudine satius, Erraticus & Anguem Cotumella appellatur
 a saturo penitus differens: haec enim Hermolani.

Lusitanus suo i-
 pias laqueo ea
 pias.
 Lusitanus men-
 dax

Cucumis vulga-
 ris non est Pe-
 ponum

Lusitani signum
 cum explosum.

Calumnias XII.
 de Carpesio.
 Carpesium sunt
 Cabaeba.

Lusitanus impu-
 dentia & me-
 lancia notatur.

Calumnias XIII.
 in Artemisia.

Amarum in
 se ipsum larrare.
 Calumnias dicitur.

Matricaria nul-
 lam eil-Artemi-
 siae locum aperte
 probatur.

At si ita demum huius bono vero a sua forma longioris illos Cucumeres ab aliquibus Anguinos vocari: at non
 inteligit quam non coherentia, qua in se ipsum repugnantia dicat? nunquid non vides domo miser, quod non-
 alia ob causam haec differentia plaris addi solent, qua quod a reliquis earundem generibus distinguantur? Nonne
 statim ob hoc sequitur esse etiam alia cucumerum genera? Respiat miser, & sua iam recognoscat errata respiciat,
 inquam, cum signis omni luce clarioribus vincatur a testibus, & propria confessione urgeatur. Coprobati enim men-
 cumerem nostratam non esse Peponem, cum in primis sapor tum deinde facultas. Sapor quidem quod cum Lusitanus
 Simeon Sethi Graecus auctor, Pepones sapore esse dulces nulla sane ratione fieri potest ut Cucumeres nostri viderentur
 fuerint Pepones quippe qui eo magis amarescunt, quo maturiores euadunt. v. Theophrastus scribit in 6. cap. 4.
 de plantarum causis. Praterea si Peponum facultas expendatur, constat sane ex Galeni sententia, quod de 20
 uorauit, os excuant morbis quin & vomitiones. Et id quidem (ut Simeon ille asserit) sua dulcedine effici-
 unt, praesertim cum in biliosum inciderint ventriculum. Ad haec cum fricata Peponum caro (ut Galenus ait) vitia
 cum in facie nempe alphas letigines ephelidasque abstergit dulci, quo imbuitur succo. Id quod ex nostrato Cu-
 cumere affricatu nunquam consequeris. Nec obstat quod Hispani Cucumerem nostrum (ut Lusitanus inquit)
 Peponum vocent: quippe cum Italiae Latinis originem ducant, omnino credendum videtur Latinam rem no-
 menclaturam rectius asseruisse eos quam ceteras nationes. Demum fabulosum esse scimus, & Lusitanus signum,
 quod Flandrae vulgares Cucumeres edant cum penitus consenserint: sunt enim de mari nostre Flandrae, quibus
 seruimus. & qui Flandriam & Germaniam sepe totam peragrarunt, id penitus detestamur. Nec obstat scripsisse
 Galenum a Peponum carne intima, qua semen continet abstinere homines, quum id fiat potum in Cucumeribus,
 quorum seminis una cum carne vescimur. Huic itaque poterit Lusitanus fortasse noscitur quam non censenda Cu-
 cumeris historia fuerit hallucinatus & subinde palinodiam meditari. Nam si seculum fecerit quis in scribit Plin-
 ius Cucumeres in Italia quam minimos, in prouinciis vero quam maximos prouenire, quum Lusitanorum
 regio, qua se oriundum facit, ad ultimas Europae oras habeatur, & ob id ceteris fortasse magis ab Italia distet,
 verendum sane est, ne rei medicae studiosi qui hac perlegent, Cucumerem Lusitano maiorem nusquam se vidisse
 affirmant. Sed nimis fortasse prolixo Cucumeris causam egi. Equidem haec nimis esse facere in re minime ob-
 scura: veruntamen ut huius calumnia & maledicta aliquando cessent, omnis eius est obtinenda verborum im-
 portunitas, ne si forte breuior sum, uere sibi cedi putet minusque sibi a nobis satisfactum clamet, & qua est inani
 arrogantia, non silentio, vel dissimulatione uane se uittozem gloriatur. Iam de Carpesio pauca et respondeo, de
 quo agens Lusitanus capite de Piperis, postquam ibi de Caryophyllis egit nostrum ibi ordinem & doctrinam quem
 admodum in ceteris sequutus, ita aduersus nos scribens comminiscitur, Caryophyllus Caryesium proximum esse,
 quod Cabaeba Officinis dicitur, ut lib. 1. meminimus, & Actuarius confirmat. Non enim Caryesium Zedoaria,
 siue Zurumbet Arabum est, ut Matthiolus augurat, quum potius, ut dicimus, Caryesium Cabaeba sit. Haec fab-
 so Lusitanus. Falso, inquam, quod a nobis nunquam scriptum sit Zedoariam siue Zurumbet esse Caryesium.
 Qui ergo non miretur hominis impudentiam infidelitatem mendacemque locutionem? Quis non detestetur
 huiusmodi hominum genus, qui tam evidentibus calumniis, ac imposturis candidissimisque lacerant? Huic
 adhibenda fides? huic credendum? huic assensendum? Nequaquam. In confesso enim est omnibus hominibus hu-
 iusce scripta sui ipsius esse signa, mendacia, vanitates, adeo ut iam omnibus ston iachum imponerint. Sed qua-
 tum hallucinetur miser, dum sibi persuadet Zedoariam, & Zurumbetum Mauritaniis nihil inter se differre,
 postea audiet, cum in numeris illius errores promulgauero. Sequitur, ut quid de Artemisia dicat, videamus.
 Artemisia duplex est, altera latifolia hortensis, odore acuto, sapore vero amaro: altera uero Matricaria dicta
 tenuifolia a Graecis Leptophyllos appellata. Nec enim in eam immo sententiam, quod Matricaria haec Parthe-
 nium sit ut Matthiolus contra omnes grauissimos medicos contendit, quum reuera tenuifolia Artemisia vul-
 garis Matricaria sit. Nam Parthenium, Brusaculum, Herba foetida Chamomilla similis est, ut suo dicemus
 loco. Haec illius ad unguem sunt uerba inania tamen nihilque ponderis referentia. Quum enim Lusitanus argu-
 mentis, rationibus, & auctorum testimoniis, quibus satis superque nobis comprobatum est, Matricariam vulgo
 uocatam, alteram non esse Artemisiam nihil responderit nec subinde ullis in dicitis ac rationibus contra senten-
 tiam nostram scripserit, sed sua tantum falsa opinione ductus, non est sane cur cum illo pluribus agamus: sed illum
 in se ipsum larrantem relinquamus. Verum ut huiusce hominis imperitiam pluribus detegamus, & procacitatem
 compescam libebit sane nobis nonnulla in contrarium asserre. Scribit itaque Lusitanus Artemisiam duorum esse
 generum, alteram latifoliam hortensemque alteram Matricariam tenuifoliam dictam, quibus illico depre-
 henditur quam oscitantem Dioscoridem legent. Qui etsi scripserit alteram Artemisiae genus folie esse tenui,
 non tamen ob id eam proprie appellauit, ut quidem quam eorum proprie dicitur, quam quidam Dio-
 scoridi adulterinam putant, cuius capitis titulus sic habet, *Artemisia tenuifolia*. A hac non reperio uisquam
 scripsisse Dioscoridem quin nec etiam Plinium primigeni artemisiam hortensem esse plantam, sed quod in
 maritima Hispanie Esperse proueniat ut ille, ut sibi aliquid arrogare fateatur. Ad haec duo sunt argumenta quibus
 refragari nemo potest quae maxime obstant Matricariam non esse secundae generis Artemisiae. Alterum quod hoc
 flore sit paruo tenui, in uniuersum candido: id quod sane in Matricaria non uisitur, quum sit illius in Artemi-
 sia matricariae decuplo maior formam uerum in uniuersum candido, sed in bilio tenui aureo, cum bilio fo-
 liolis citris septem, ut in Antemide. Alterum quod plura sit ad manum parua, ac tenuior, quae adeo maiore Ar-
 temisia

temisia

remissam emulatur, adeoq; illi congener est (ut fateretur etiam Brasavolus) ut ambigendum non sit, quin ipsa sit altera Artemisia. Adde quod, cum Matricaria foliis, caule, floribus, sapore, odoreq; plurimum a prima Artemisia differat, non est sane censendum, quin eius differentias, ac notas silentio inuoluisset Dioscorides sed cum inierit primam & alteram Artemisia genus nulla intercedat differentia, praterquam magnitudinis crassitudinisq; ut ipsemet aperitissime fateretur Dioscorides, non fuit illi opus alterius Artemisia notas pluribus explicare. Demum & illud unicuique contra Lusitani sententiam verum potest esse argumentum, quod antiquorum nullus scriptum reliquerit, Artemisiam alteram nec etiam primam esse amaram, quemadmodum reperitur vulgaris Matricaria, que amaro admodum gustu sentitur, adeo ut parum ab Absinthio differat. Quod etiam argumentum prabet in caliditate & siccitate hanc longe magis excedere, quam ipsa, Galeni testimonio, excedat Artemisia. Hec itaq; si quis recte per-

- 10 penderit, nobis quidem minime verendum fuerit, quin Lusitani insciam, & iudicij vanitate facile deprehenderit. Quod autem Matricaria non sit, quam vulgari appellatione Cotulam foetidam dicunt, nos penitus detestamur, quippe si Cotula foetida Dioscoridis Parthenium esset, quibus hac omni ex parte Anthemidem adeo referat, ut tantum fere odoris diversitate altera ab altera dignoscatur, quisnam dubitauerit, quin Dioscorides Parthenio Anthemidis folia reddidisset, non Coriandri? Coriandri folia Cotula foetida profecto non habet, sed Anil emidid: Matricaria vero contra. At si obiecerit Lusitanus cum ad summum usque Coriandrum adoleuerit, & suum in ediderit semen, qua in summitatibus sunt folia, adeo parua tenuiaq; spectari, ut Anthemidis folia quadam tenues referant, quibus dicat Dioscorides, Parthenium foliis esse Coriandri tenuibus, is ad minora tantum folia respexit, non ad maiora. Vnde quod hoc ego argumentum propulso facile. Siquidem cum neq; Orisbanus ex Dioscoride a quo verbum ex verbo transcribitur, Serapion, qui eandem seruat regulam, legat particulam illam, arbitrarium sane est, particulam illam a Dioscoridi impertinenter accessisse scriptorum incuria, vel potius temeritate praesertim cum plantarum comparationes rectius, exactiusq; fieri debeant, cum planta ipse adolescunt, vel constant, quoniam hoc tempore foliorum, ac caulium nota aperitissime conspici possunt: non ante cum primae oriuntur, vel cum consueverint, quo tempore genuina foliorum forma videri non potest. Quin & illud contra Lusitanum maxime pugnat, quod cum Cotula foetida longe acrior sit, quam amara, adeo ut easdem abstergentibus ardore non obusum inferat, ob idq; vulgo Ferrariensibus (ut Brasavolus inquit) dicatur Bru'ciaculo, Parthenium esse non potest. Quandoquidem
- 20 Dioscoridi Parthenium nulla saporis acredine commendatur, sed tantum amariudine, que in Matricaria manifeste percipitur sine acredine tantulo. Postremo cum sexcentis iam expertum sit, Matricariam ea omnia praesertim, que Parthenio ascribuntur, palam sane est, maxime delictos, qui contra sententiam nostram fruolus quibusdam argumentis, ac captiuiculis, machinantur sed utinam tam facile vera inueniri possent quam falsa conuinci. Caterum qui antea
- 30 scripserim in meis commentariis Italico sermone primum in luce edita, Symphytum Petraeum me habentem non visum, quasi me negligentia inertiq; accusare velut Lusitanus, hac suo more aduersum me scribit. Ex herbis, quas Ioannes Falconerius Anglus secum assebat, Symphytum Petraeum erat, quod Consolidam nonnulli appellant, que (ut testatur Ruellius) familiaris Gallis admodum est, & ea lingua Anglica vocant. In Italia quoque nasci cum Paulo Castilione medico affirmamus, quamquam Matthisolus eam nunquam se vidisse tradat. His Lusitanus non tantum in me inuehitur, ut putarum, nostrae accusanda gratia negligentiae, sed etiam sua extollenda gloria, quippe qui se nobis rei medica peritior ostendere ambierit. Verum si (ut solertes decet scriptores) Italica eadem commentaria secundo edita, anno a Christo nato M. D. L. perlegisset conperisset quidem Symphytum Petraeum me per memet adinuenisse. Id quod is nunquam per sese, vel per alios fortasse fecisset, nisi Falconerius ille (si tamen vera refert) id illi ostendisset. Non enim una die uniuersae leges in horreum congregari potest. Quo fit, ut accusari iure non possim, ubi quandoq;
- 40 passus fuerim, me hanc vel illam non nouisse stirpem. Praestabat quidem tunc mihi Symphytum Petraeum nunquam me vidisse fateri, quam mentiri, ut doctior, diligentiorq; viderer: quo nihil detestabilius, execrabiliusq; dici potest. Ad Sparganium veniamus in quo ita me traxit. Sparganium siue Xiphodion Officinarium Spatulam foetidam est, cum inter se maxime conveniant. Vnde Matthiolus Scenensem hic errare certum est, qui Sparganium non esse Spatulam foetidam contendit, & eo magis, quia in Spatula foetida pilulas non conperiri, in quibus semen claudatur, dicat: quod falsissimum esse, qui Spatula foetida mediocre habent noticiam, norunt. Proinde Sparganium Spatulam foetidam esse certum est. Hactenus ille. Demiror sane tam perfrictam hominis frontem, qui quasi omnium rerum naturam, plantarum omnium intimam noticiam perdidicerit, ac imberit, adeo audacter hos graues mihi imponit errores, confestim me errore accusat. Cognoscitis ut opinor, hominis eruditionem, & sua consuetudinem. Porro non modo omnibus rei herbariae studiosis (unum tantum Ruellium excipio) sed & ceteris omnibus, quibus aliqua sit stirpium
- 50 cognitio, in confesso est nihil aliud esse Spatulam foetidam vulgo appellatam quam Xyridem. Xyris enim praeter id, quod omnibus notis, Spatulam foetidam referat, foliorum odore facite indicat nomenclationis occasionem, quippe quonia si digitis confricentur, foetidum admodum odorem fundunt, unde illi nomen, adeo ut Tiresia, vel talpa caecior sit, qui non viderit, Spatulam foetidam vocatam omnibus sane notis Xyridem referre. Hanc a nemine descriptam reperio, praeterquam a Mattheo Syluatico Pandectarum auctore, qui eam Iridis similem reddidit, id quod Lusitanus petulantiam palam facit. Siquidem nulla extat planta, que magis Iridem referat quam Xyris, adeo ut scripserit Orisbanus appellari aliquibus Syluestre Iridem, a quo quantum distet Sparganium, eos iudices velim, qui in materia medica indaganda plus operis, ac laboris, quam Lusitanus impenderunt. Nec pluribus verbis ea refellam, que de Siderite obiciis, in qua magis ac magis tua detegis rei plantariae insciam, cum ita memoras. Conspectus Sideritis hoc in nonnullis vallibus, folio aspero, Salviae magnitudine, tanquam Marrubij albicantem, & per circuitum tanquam
- 60 quercus dentato, quod frictum ex se odorem, quale ex Cydonis optime maturis oriri videmus, emittit, quem Dioscorides subintelligit, cum dicit gustus non inuicundo, cum adstrictione aliqua. Hanc vero Fuchsius in suo herbario nouisse videtur, quamquam Matthiolus oppositum contendit. Sed re vera Matthiolus eam nunquam vidit, quia si eam cognouisset, illius odorem sensuissimum nunquam pretermisisset. Hac eius sunt verba sed quae omni succo inania, ipse videat. Quod enim de Siderite prima, quam se in doctissimi viri Fuchsi herbario narrat inuenisse, suas profert commentarias nugae, hic facile demonstrat, quod eius folia non modo non spectantur quercus instar sinuata, sed nec per ambitum ulla parte laciniata: tamen si Lusitanus, ut potius sua tueretur opinione, quam veritate id non sit veritus affirmare. Ipsa enim Fuchsi pictura de Lusitani fide maxime testatur, in primis enim flores ostendit, & ceteros in caulium summitatibus erumpentes, non autem in ipsis caulibus orbiculatae vertebrae instar, ut in Marrubio, per interstitia dispositos. Praeterea folia nulla ex parte correspondent, nec peritiorum Cydoniorum odor, que folium Lu-

Cotula foetida non est Parthenium.

Bru'ciaculo.

Calceolus de Symplicibus

Cofolida pugna

Confutatio.

Calumnias XV de Sparganio.

Columnia contuditur.

Spatula foetida est Xyris, non Sparganium.

Iridis simile Xyris.

Itus syluestre dicitur Xyris.

Calumnias XV de Siderite.

Sui ipsius nomen confuditur Lusitanus.

S. de ius Fuchsi.

scianus illi tribuit. Dioscorides enim nec Cydoniorū odore, nec quouis alio Sideritē hanc cōmendauit, sed gustū non iniucundo, multa enim habentur, quæ odore maxime placeant, & sapore displiceant. Sed mihi satis uerendum est, an Lusitanus Cydoniorum odorem huic planta tribuerit, ut uera fateretur, an fortasse sua sustinenda opinionis causa. Quippe Fuchsius huiusce odoris non meminit, nec nobis periculum facientibus percipi potuit. Non enim hanc stirpē ignoramus, ut sua potius temeritate, quā scientia existimat Lusitanus. Sed nō fortasse à scopo aberraret, qui diceret Lusitanum Fuchsi Sideritem nusquam uidisse, nisi appictam, quod falso scribat, Sideritem hanc in uallibus nasci, ubi plerumq; solum ulginosam esse solet, Fuchsius uero perinde, ac Dioscorides in asperis, petrosis, ac incultis locis. Minus acerbe aliquanto patior, cum de Trago nostram studet emendare opinionem, ubi Lusitanus ita suam exorditur calumniam. Non pratermittendus quoq; est Ruellius, qui proculdubio in dignoscenda herba ista multum hallucinatus est, qui Tragum Iunci speciem esse crediderit, cui quoque Matricobus Senensis subscribit nulla fultus ratione, cum è directo Tragus herba sit, ex qua vitrum conficitur. Atqui inter omnia, quæ hactenus nobis obiecta sunt à Lusitano, & satis dilucide, ut arbitror, refutata, nihil instius, nihil equius fateor, unquam in nobis est calumniatus quam qua de Trago hic recitat: hoc modo si cauere potuisset, dum nimis se sollicitum exhibet circa exiguam in nobis labeculam, non ipse pluribus se maculis contaminaret. Equidem fateor, olim in Tragi historia ancipitem me habuisse opinionem, quanquam inclinaret quandoque animus ad credendum, nil aliud Tragum esse quam quoddam humilis Iunci genus in maritimis proueniens cui semen acinosum in cacumine nascitur rubrum, astringenti sapore. Erant enim fretus hoc argumento, quod scilicet scripsisset Dioscorides, nasci Tragum sine foliis, pusillis circumramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, quæ omnia potius ad iuncos spectare quam aliam quamuis plantam uidebantur. Opinionis indicia subinde augebat, quod sequenti statim capite idem Dioscorides de Iunci vulgaribus egerit. Verum quod & summis & præclarissimis contingit ingenis, ut temporis processu plura que inuenerint, & diligentius examinauerint, id mihi accidisse fateor. Renanque in posterum exactim agitata, ac perpensa melioribus adiuuentis, minime puduit priorem deponere opinionem. Etenim cum animaduertentem apud Theophrastum, & Plinium, quorum etiam iudicium in nostris Latinis commentariis secutus sumus, Tragum utrisque Scorpionem appellatum, quemadmodum & Dioscoridi aculeatam in uniuersum esse plantam priorem, quæ in animo uersabatur, opinionem diutius sequi non libuit. De hac enim planta scribens Theophrastus lib. 6. cap. 1. de Plantarum historia, Aculeatarum, inquit, alia ex toto aculei sunt, ut Corru-da & Scorpius: hæc enim nullum præter aculeum, folium generant. Id quod postea repetit tertio eiusdem libri capite, his uerbis. Inter ea uero distincta genera plurimum quæ aculeato folio cōstant, nimirum dixerim, quod ex toto spinosum inspiciatur exiguo est numero quemadmodum diximus, & difficile quicquam ferme inueni-
es, præter Corrudam, & Scorpium, quæ post Aequinoctium Autumni florescunt. Scorpius enim florem in carne extuberante sub extremo aculei profert, initio candidum postea leuiter accedentem ad purpuram & singulari radice, eademque breui adheret. Hæc ille: cui subscribit Plinius lib. 21. cap. 15 sic inquit. Spinosarum multa species: in totam spina est Asparagus, Scorpio: nullum enim folium habet. Quibus palam est Tragum, quem Dioscorides etiam Scorpionem uocat, nullis prouenire foliis, sed scaterere tantum aculeis. Id quod etiam uidetur fateri Dioscorides, quod dixerit, Tragum, quem alij Scorpionem uocant, sine foliis oriri, acutis tantum circumramos adnatis granis. Quamobrem libenter hæc in re postea meam correxi sententiam, quam Lusitano displicuisse summopere gauderem, si quid hæc mea dubitatione melius, ac certius aliquid deprehendisset, sed quod usu uenire nimia temeritati plerumque solet, dum nimis in me excandescens maius aliquid asseuerare nititur, longe turpissime labitur, quod eam uelit plantam legitimam esse Tragum, quæ Mauritanus Kali, & alkali appellatur, nobis uero Hetruscis Soda, cuiusque imaginem ultima huic editioni addidimus lib. 2. inter Atriplices ad uinum expressam. Quandoquidem planta hæc, ex qua alumen conficiunt, quo vitrari utuntur, Catinum appellatum, quin & sal, quod a planta Alkali uocant, foliis non uacat, quum admodum sit foliosa, nec ullis penitus riget aculeis. Ipsa enim cum primum emergit, foliis profilit minori sedo amulis, quæ tractu temporu dardant alifere longitudine augentur geniculatimq; protrahuntur. Cum uero iam adoleuerint, prodeunt è geniculis folia pingua, crassa, incurua, ex lata origine in acutum desinentia. Vbi uero ad summum constitierint, in caulium cacuminibus longe minora, exilioraque spectantur rufo colore, à quorum exortu parua, rotundaq; prodeunt pilula, in quibus minutum semen concluditur, ut uidere est extra Tergesti mœnia, in præferim locis, quibus salinarum mea circundantur. Quæ Tragi notis prorsus repugnant. Adde quod Kali sapore sit admodum salso, Tragus uero non salso, sed astringente. Quæ omnia citra controuersiam attestantur, quod legitimum Tragum nusquam uiderit, nec nouerit Lusitanus, qui tam excors, obliuiosusq; deprehenditur, ut eandem herbam legitimam Tragum esse affirmet, quam prius asseruit esse Anthyllidem, ut postea differam. Caterum eam constat plantam genuinum esse Tragum, quem nos suo loco appinxiimus. Quippe ea sola, Corru-da excepta, toto spinosa uisitur, nullis circundatur foliis, & in maritimis tantum nascitur, fruticosa, humilis, humi accumbens, innumeris triangulis, quæ à triangulis uel tritici magnitudine ubiq; scatens, in quorum medio (ut Theophrastus inquit) post Autumni Aequinoctium slos emicat albus, qui paruo temporis tractu purpureus euadit, astringenti sapore, perinde ac tota planta, adeo ut nihil repugnet, quin hæc genuinum Tragum dici queat. Hanc inueni ego primum in Tergestino solo: in Hadriatici litoris, ubi frequentissima, copiosa que oritur. Nec immerito Scorpium eam appellauere antiqui, quippe quod auelli non possit, nisi èctis ab ea manibus, ut ego mihi testis esse possum. Tantum igitur abest, ut celari uelim mea sicubi sunt, errata, ut ea etiam ipse non uerear emendare, gaudeoque hæc à ceteris aperiri, modo ista semper adhibeatur moderatio, ut potius ueritas exquiri uideatur, quam improba calumnie, quæ in optima quæque inuehuntur, instrui sentiantur. Etenim id longe honestius arbitramur, ubi quis se lapsum nouerit (quum proprium sit hominum labi) se hallucinatum aliquando agnoscere, quam quod extrema est pertinacia, ac uecordia, quod semel arripueris mordicus adeo tenere, ut illuc a-melli non consentias. Ac sanè in iis commentariis, quæ antea Italico euulgauis sermone, nonnulla postmodum deprehendi, quæ minus quam decreueram a nobis enucleate, exacteque essent scripta, quorū & eo ipso tempore non eram nescius. Verebar quidem sepe ne tanti operis festinatio inter tot alia, quibus in dies distinebar, iudicij ferre extremam maturitatem in aliquibus prauertere. Quod sane peccatum leue (ut credo) & in paucissimis re-
pertum, quæ uis uel quorum uis uis uis, sum facile cōpensari, sum recte obscurari posse censerem, scilicet tamet
præter,

Calumnia XVII.
de Trago.

Tragus, Iunci
species.

Kali & Alkali A-
rabum.
Kali historia:
Alkali.

Lusitani incon-
stantia.

Tragus genui-
nus.

Autor Tragum
primum inuenit.

pranos, ac maleuolos homines minime defuturos, qui etiam rectissime a nobis dicta acerare & caninis dentibus arrodere non cessarent, & qui citius reliquorum omnium fructu se expoliari mullent, quam ut lenissimum alicui condonarent erratum. Sed quid? Tot amicorum erant interpellationes, qui hoc opus a me quotidie flagitarent, & prope suo iure postularent, ne hoc meorum studiorum partu eos diuini desidiaudarem, & suspensioenerem, ut improborum, inuidorumq; iniquis moribus me intempestiuus obui malnerim, quam horum resistere voluntati. Emisit tandem opus non tam inaequum, quam amicorum precibus, & obsecrationibus efflagitatum, quorum desideris satisfactum a nobis plurimum gaudeo. Si qua vero erant nimis accerata, ea sane longe accuratius in Latinis nostris commentariis agitata sunt, & discussa, id quod tunc me maxime solabat: quae si ante me ita deprehendisset Lusitanus, ut nullam in me ostentasset acerbitatem, nullas in optime munita, firmataq; suas ingessisset calumnias, & non sua infidelitate in alienas possessiones irrumperet, gratias ei profecto agerem, quod suo studio, & sinceritate hisce nos sublenasset laboribus. Is vero optima quaeq; facti, sine lecessit, conuellit, diripit, & in quibus aliquam ueniam mereri poterat eum calumnia, hac maiori offensa, car falsitate. Dixit paulo ante in Trago, quam sua reprehensione turpiter aberrauerit, nunc quoq; in Amarantho nithio canit: & peritus se gerit. Scio in Italica editione Aetium de Amaranthi uiribus discretem me citasse in uulgari Amarantho, quum Aetio nihil sit aliud Amaranthum, quam Dioscoridi Helichrysum. Nec tamen a Lusitano admonitus facile, & non inuitus quaedam renocare, & omnia prorsus trutinare decreueram in Latinis positus comminetari: quod & iam pridem est factum. At ne Lusitanus uane contra nos exultet, ac nulli incogitantie indulgendam uociferetur, uideat ipse quam falso sibi persuadeat uulgari usu Amaranthum esse Chrysochrome. Nam si (ut audis) Graeci sermonis peritum se ipsum facit, maximo illi uitio adscribendum fuerit, quod Graecorum uerborum uires tam negligenter expendit. Quod enim Graeci aurum Latinis designat, non uerosema. Adeo ut id sit: Graeci χρυσόχρον, quod Latinis aurea coma: quo manifeste deprehenditur Lusitanus in uulgari. Quandoquidem cum uulgari Amarantho spicatus flos insit, non aureus, sed in purpura ardens, quo pallidus fieri possit ut recte is χρυσόχρον Graecis dicatur, si diuiduunt, qui Graeci sermonis peritiores habetur interpretes, quiq; hac diligentius explorauerunt. Quod autem Chrysochrome flore sit aureo, ut is fert nomenclatio, testis est Plin. lib. 21. cap. 8. ubi sic inquit: Chrysochrome, siue Chrysis non habet Latinam appellationem, palmi altitudine est, comantibus fulgore auri corymbis. Quamobrem non solum constabit, quam lubrico lapsu sit Lusitanus, sed quam falso, ac inique accusauerit Ruellium, & Euchsium. Quippe cum Chrysochrome, & Amaranthum longe inter se differant, ut clarissimi illi uiri recte norunt, non ab re illud dictum est, Amarantho purpureo uim esse Chrysochromam siquidem mansa coma, folia, ac etiam radix adstringentem facultatem non obscuram praeseferunt. Huius accedunt, quae in minori Sedo Lusitanus enumerat, ita exordiens. At minus Sedum (ut ego opinor) faba crassa, siue faba inuersa herba dicta est, natura frigida, non autem Vermicularis, ut Matthiolus, & alij putant, quia Vermicularis herba sapore acris est, natura uero calida, quae duo minime Sedo minori conueniunt, cum, ut dixi, Sedum minus, sicut & maius, natura frigidum est. Caterum & planta ipsa descriptioni in toto respondet, ut iure concludendum sit, ut Fabam inuersam siue crassam dictam minus hoc Semperuivum sit. Hec illius sunt deliramenta. Sed sane uereor, ne haec tam crassa, tamq; frigida herba cerebrum ei totum perfrigeraret, inuenterit, infatuaueritq; ac Amathum nostrum penitus amentem fecerit. Inquit Dioscorides: Semperuivum minus in petris parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis nascitur, cauleculis ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis, caule a medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidosq; flores, & tenues gerente. Dioscoridi subscribit Plin. lib. 25. cap. 13. his uerbis: Minus Semperuivum in muris, parietinisq; nascitur & tegulis, fruticosum a radice, sursumq; & ad cacumen, folijs angustis, mucronatis, succolis palmo alto caule, radix inutilis, quibus maxime omni ex parte refragatur omnes fabariae illius nota. Quandoquidem Fabam inuersam uocata cauleculi non infunt tenues, sed crassi, ac pingues, bicubitales, & quodq; maiores, nec folia quidem exilia rotundaq; sed magna, lata ac praelonga, flores in umbella non herbidi, sed plerumq; melini, uel in purpuram candicantes. Radice quoq; non est inutilis, nec superuacua, sed bulbosa, pluribus adnatis tuberculis Aphodeti fere modo, colore cinereo, cortice leui, & succo plena ad multa expetita. Quae in uniuersum nota, si cum minoris Sedi historia comparentur, clarissime demonstrabunt tantum ab illo differre Fabariam, quantum a Lusitania coruus. Non enim aliam ob causam Semperuivum tam maius, quam minus id sibi nimirum asciuit, quam quod perpetuo anno toto uirescat, ac uiuat. Id quod testatur Theophrastus lib. 7. cap. 14. de historia Plantarum, quin & Plinius loco nuper citato. Idem praeterea affirmat planta ipsius uocabulo clatio Graeca. Αειζωον enim Graeci sempiternum designat. Sed hoc natura donum Fabaria minime largitum uideatur, quum autumno percat tota, & in uniuersum arefeat, nec inde celerim repulset, quam Vere medio. Quod autem Vermicularis dicta quae Semperuivum minus nulla reclamante nota representat, sapore sit acris, detestatur uniuersi materia medica studiosi, cum nullo alio sit sapore, quam acido. Sed cum fortasse Lusitanus sincero careret gustu, perinde ac iudicio, mirandum sane non est si inter acidum, & acrem nullam fecerit differentiam. De Cirsio hac habet. Adeo Cirsion nostra uulgata Buglossa respondet, ut omnino fatendum sit, eandem esse herbam, cui sententia Ruellius quoq; patrociniatur, & merito, quia uideamus Buglossam aliquando triquetram habere caulem spinosum ex cuius floribus nescio quid, ut animaduertenti notum euadet, euanesceat. nam in ceteris ita inter se respondent, ut spectanti nulla dubitandi maneat occasio. Proinde Matthiolus in hac re minus bene dixisse crediderim, cum Cirsium alteram herbam a Buglossa esse contendat. Sic Lusitanus ille. Caterum cum uulgari Buglossa caulis sterotundus, non triangulus, ut fortasse per somnium tradit Lusitanus, nec foliola oblonga cernantur, quae uillam rose speciem praeseferant, sed foliola longiora, quum & quod cauli: cacumen in bulbosum non sit nec ibi capitula purpurea quae in pappos euanescant, uideantur, uulgari usu Buglossam Cirsium esse non potest cui caulem reddidit Dioscorides perpetuo triquetrum non aliquando tantum. & angulos ipsos folijs aculeatos uoluit & per interuallum molles, quibus profecto notis uulgare Buglossam prorsus destituitur. Caule enim est, ut diximus tereti, qui ubiq; tenuissimis aculeis rigeat. Ad haec Cirsio capitula requiruntur purpurea ut etiam praeter Dioscoridē fatetur Plin. lib. 2. cap. 7. quae in lanuginem dehiscant. At cum uulgare Buglossam uillam unquam capitula proferat, quae eandem lanuginem contrahant, sed flores tantum purpureos, nullam praeseferentis capituli formam nec unquam lanuginem contrahentem, non uideo cur ita stolidē crediderim uulgare Buglossam legitimum esse Cirsium in quo censendo decepti sunt Ruellius, & enim sequenti Lusitanus, qui cum scripserit de uulgari Buglossa, nescio quid euanescente, suam ipsius uanitatem declarat. Cirsij.

Lusitani obsecra-
tionem Amathum

Turpiter uolens
Lusitanus erro-
rot.

Chrysochrome.

Chrysis.

Ruellius & Euchsianus
in calumnia uino
dicantur.

Calumnia VIII.
de minoris Sedi,
esse fabam crassa-

fatam.
Vermicularis acris est.
Lusitanus reprehenditur.

Calumnia refellunt & Amathum
bulbosum esse ostendunt
Fabam inuersam.

Vermicularis

Calumnia XIX.
de Cirsio esse Buglossam.

Calumnia diloluit.
Buglossam non esse Cirsium.

Calumnia XX.
de Elleboro.

Exploditur Lu-
sitani calumnia.

Lusitani inuidē-
tia detegitur.
Animaduersione
in Amathi deli-
ramenta in sciti-
amque.

Lusitanus Semi-
Iudæus.
Hispani tales
Maranos vocant
quos maxime
detestantur.
Cur Amathus
tanta labore
cæcitate.
Cur author hæc
confecerit Apo-
logiam.

(ut opinamur) genuini imaginem quis videre poterit in commentariis nostris, quæ vinum legitimum referat, Baglossum enim quod passim concessit in usum, vel Echsi, species est, vel potius fortassis ipsa Lycopsis, ut alias latius explicabimus. Reliquum est, ut ad ea respondeam, quibus me falso in Elleboro accusat Lusitanus his verbis. Ex iunioribus quoque Matthiolus Senensis nigrum Elleborum albo periculosiorem facit, quia ita experientia deprehendit, quum tamen hodie boni practici nigro correcto tanquam Diagredo utantur: hac in nos ille. Sed an in re, vel iniuria, eos iudices velim, qui accuratius, quam ille ea perlegerunt, quæ in commentariis nostris de utriusque Ellebori viribus scripsimus, quibusque in animo semper est non mentiri. Siquidem in, ubi nusquam a me scriptum repererint, nigrum Veratrum albo esse validius, perniciosiusque (ut Lusitanus somniasse videtur) minime mihi verendum est, quin illum temeritate, ac mendacio accusaturi sint. Scripsi quidem, (scriptis commendasse Plin. lib. 25. cap. 5. Nigrum boues, equos, suesque necare, cum tamen albo nullo incommodo depascantur. Quo fit, ut iniuriam in me reiecerit Lusitanus, quæ non nostra, sed Pliniana sunt lectionis: at quum is ad nostros perdendos labores inuidencia ac liuore se totum accinxerit, eo cecitatis, insolentiaque processit, ut etiam aliorum errata in nos remiserit, utpote, qui mentiri nunquam erubuerit, non alia opinor causa, quam quod voluerit monumentum sceleris, atque audacia sua esse in conspectu omnium. Hactenus Amathe tuis ineptissimis calumniis satis superque puto a nobis esse responsum. atque ita clare, tantaque luce eas me diluisse nunc arbitror, ut si vlla in te fuerit ratio, si qua probitas, si quod etiam scientia vestigium, facile seu in me, seu in alios istam sis posthac depositurus temeritatem. Est quidem, ut discas, quid docti sentiant, priusquam tam arroganter, tam temere in eorum labores insoleras. Quinetiam quo pacto eorum sudoribus potius candidè et gratanter fruaris, quam ut eos imperite laceras, et tuis calumniis obruas. Etenim non incirco has vigilias libentissimo animo suscepimus, ut tu eas obscuræ tuæ inuidencia, ac etiã imperitia: etenim si nostras has lucubrationes tibi vsui esse nolis, cur talè clandestinum furem te exhibes, ut solum tua furta commendata aliis esse velis, cetera vero, quæ tua libido sibi non videri, ea malitiosa studeas opprimere inuidencia? Patefaciam in aliis tuum infidelem in meis scriniis animum. Nunc satis mihi est, si tuas contuderim calumnias, quibus si tuo quoque iudicio a me est satisfactum, vehementer tua causa gaudeo, si in eis maneat, ac perseueres qualem te esse predicant, certe non omnium iudicium, candor, ac æquabilitas ex una tua indocta et præcipiti pendebit malevolentia. Narrat vetusta gentilitas eos, qui se intulissent magna Dea sacrificiis, confestim excacari, quam quidem cecitatem illi non tam ad oculos, quam ad mentem credebant. At ego Amathe non te ideo cacum dico ductus hac gentiliū superstitione quod Cybeles alienigenis te inferueris sacris, sed ea tantum ratione, ac sententia (ut tu ipse iam pridem in te experiris) quod a Deo immortalis perfidissime desiscas. Etenim cum (ut audia) nunc nostra religionis te ipsum facias, nunc Iudæicis legibus, superstitionibusque te totum addicas, et ita non solum in homines, sed in ipsum Deum Optimum Maximum insoleras, minime id est mirum, si a te ipso quoque desicias. Somni statu mentis dimouearis. Ut non modo in te nulla vigeat pietas, nulla religio, verum et in ipsa medica facultate, quam immerito profiteris plurimum cæcitas. Hinc ego fieri arbitror, ut non solum tibi, et ceteris omnibus molestissimum, ac infestissimum te exhibeas, et tumultuosissimis mentis furiis impulsus modo huc modo illuc agiteris: quum etiam ut tu, qui tam diu tua impietate in diuina cæcitate veritate, nunc nec alios, nec te ipsum in ipsa medica facultate intelligas. Quare nulla mouebor admiratione, si tuam obstinatam detrectes exuere vesaniam. Non id iam animo mecum proponebam, non incirco tuam reprimere sum conatus insanabilem (ut timeo) libidinem, ut te tua aliquando in tanta veritatis luce pœniteat insania, sed id magis elaboravi, ne tyrones et huiusce medica materia studiosos, tuæ sorte impeditent calumnia. Nihil tuam Amathe moror censuram. Iudicabunt syncerius docti, ac præclari homines, utrum tu iniustus me inuaseras, an ego maiori vi te in me temere irruentem declinauerim, penitusque profugauerim. Quapropter aut cessa Amathe posthac calumniari, aut tam queso non sis inutilis, et inanis, ut quum reliquorum labores et scripta explodas, tu nihil melius afferas: aut quod vltimum est, caue, ne apud eruditos, et æquissimos lectores, ac iudices, qui nunquam deerunt, tua inuidia et calumnia nostrum augeant et amplificent honorem.

PETRI ANDRÆ MATTHIOLI IN
Amathi Lusitani enarrationes
Censura.

Præfatio in Censuras.

Am minus vereri debeo, ne quis potius glorie captanda cupiditate me putet adductum, ut homini impudenter et rerum omnium imperito, suos patefaciam errores, quam ad id vera, rectaque duci ratione. Quod si libentius in hominem petulantem adeo importune laceffit inueherer, quis probus non id mihi iure concedat? In Amathum, inquam qui suis iniquissimis calumniis, non modo honestissimos labores nostros opprimere nititur, sed et quantum in ipso est, sua imperitia et impudentissima confidentia rem medicam obscurare conatur vniuersam. Nec sane aliud sibi quis de eo persuadere potest, qui aliorum scripta a quam plurimis comprobata, satisque communita, sua temeritate incessit, et violare molitur. Hoc si impune, et tacite sit improbus permissendum, ut suo tantum iudicio audacter reprehendant ac cõtaminent omnia, quoniam omnium præstantissimarum facultatum cultus deueniet? Quis posthac istorum se obiectet ingratitude? Verum ut et ipsum si qua adhuc in eo vigeat ratio, pœniteat istius calumniandi insanissima licentia, et non solum ex aliis verum ex se ipso suam cognoscat omnium rerum inscitiam, infringenda est hac nimis arrogans, et effrenis audacia. Non arbitrabar quenquam tam præfrictæ frontis esse posse, qui ibi tam seuera in alios consortia utatur virga, ubi ipse tot ubique scateat erratis. Molestum friuolumque pene credidissimè grauioribus impeditus negotiis, ut cum huiusce hominis disceptarem, ineptis, nisi ipsum in me tam petulanter insultare a pluribus audissem. Nunc autem eadem molestia, qua istius impetum, et vanam incurSIONEM a me prohibui, ne qui vestitus seueri censoris impellatur iudicio, ut statim approbet, quæ ab isto viderit proferri: audiat bonus et egregius vir, quanto tutius fortasse fuerat honeste tacere, quam eo pacto contra ceteros insane oblatrare. At qui hac in re ea nequaquam utar vanitate, quæ illi contra nos, et ne hominem potius persequi, quam veritatis studiosi videamur, nihil nobis erit negotij cum Amatho. Etenim eius errata sic in lucem producimus, ut si vel ipsemet aliquid habeat, quo is, quæ a nobis afferuntur, contradicere valeat, doctorum iudicio longe libentius acquiescam, quam ut aliqua pertinacia reliquorum studia retardem. Idem qui hoc promitto, hoc quod est æquissimum, si non ab Amatho, quæ rediturum vix ad mentem spero, saltem ab erudito lectore peto, ac postulo, ne qua

Apologia aduersus Amathum.

ne qua mora, ne quod impedimentum teram & medicina fiat candidatis, ut tum deum de utroque nostrum suam ferat sententiam, ubi nostras rationes diligenter expendere ac penitent. Amathus non nisi quae a praecipue dementia nostras inuasit labores conuulsit, distraxit nullam huiusmodi differens rationem, nisi quae, in auctoritate hoc est stultissima libidine, tantum putauerit ubique concessum. Ego sane quae in istis reprehendo, nisi apertissimis, & ipsa luce clarioribus argumentis inductus videar, cupio me eisdem argui temere ac stultitiae, ignorantia quam de se prodidit me. Atque sic candidus lector, qui hac in manu sumptis facile delectet, ut a fore arbitror, ut mirum me extra penitentiam esse lectione, ubi non tantum istius terribilissimum, sed & non sine nostro labore rerum plurimarum cernit, explanatas naturas. Ideo, hac quo maiori cum facilitate, & emolumento distinctius ab omnibus legerentur, in certa digestimus capita, ac iam tanquam alio in numero silentio inuoluitis a dea, quae sunt praecipua, in quibus ille turpissime offendit, veniamus.

ACORVM.

DE Acoro summi ipsius, quod olim tenuit, reprehendis iudicium, sed quanto praestiterat a priori non discedere sententia, ipse videat, qui vegetiorem Galangam nihil ab Acoro discrepare putat, cuius error multum patet rationibus, & iudiciis. Nimirum quod neutrum Galange genui solia proferat Iridis (ut quae dicuntur testantur) sed Cypri quos (Lusi non etiam ita testante) ut non desint qui Galangam ipsam Cyprium Babylonicum vocent. Tem quod vegetioris Galangae radix cum Iride nihil habeat cognationis, nec illius faciem vlla ex parte referat: id de quod radix haec rufescat potius, quam subalbescat. Praeterea Galanga nusquam reperita est, quae gustu fuerit ubamuro, ut de Acoro fateatur Galenus, sed tantum acris. Quocirca non in merito de rapione, qui inter Archus in enarranda simplicium medicamentorum historia prima tenet, aliud est Galanga, aliud vero Acorum. Ob eandem quoque causam inter Gracos, Aelianus & Nicolaus Myrepsius in partibus Aurea Alexandri inudoto, & Acorum & Galangam impediunt, tanquam medicamenta inter se diuisa. Quibus luce clarior quis intueri poterit, Galangam & Acorum pluribus sane notis differre. Acoro enim solia non debentur Cypri, sed Iridis quae & Iridis proxima, genicula intercepta, subalbescant, non sicut rufescent, & (ut Pinus inquit: cui & Lusitanus subscribit) rupta faciles, non ut in Galanga, utraq; si adhaerent contumaces, quibus eripicuum satiq; comprobantur censemus, neutrum Galanga genu esse Acorum. Nec profecto intellexerim inquam (ut alius meminimus) quo pacto, quae metamorphosis factum sit, ut Galanga illa, quae ab alio genere nec viribus, sed tantum magnitudine differt, quam primis ad uos Syriae et in semphraducta est, in Acorum se commutauerit nisi quis fortasse dixerit, exenisse hoc magico praestigio, quae quam ineretur opinionem. Acorum a nostris apertis obmutescat argumentis, quibus in hac de iura uti illud iudicari libet: hac potius retractasse Lusitanus, ut Brasanolus a nobis reprehensum (illi enim ubiq; plurimum videtur adhaerere) in immemor de ferre quae ut veritatem quam prius futebantur sustineret. A. Fuchsius vir profecto clarissimus, & qui potius philosophum se existimat quam ut pertinax sit auctor, nisi iam pridem in Brasanolus concesserit sententiam visis, ut in commentariis nostris, ac per iter argumentis, quibus eorum distantur opiniones qui existimant, maiorem Galangam esse Acorum, honesta quadam dicendo serie quae suam tuerit existimationem, postremo quem edidit, de compositione medicamentorum libro, a priori opinione non parum videtur abesse: quod fortasse & Brasanolus, si immutatus a morte fuisset, perueniret. Porro Acorum non mea tantum sed plurimorum sententia, qui in re medica multum praestiterunt, ea sane eius radix, quam perperam Cuminum aromaticum appellant. Ipsa enim si primis recto oculorum intuitu expendatur, ac deinde sincero inuenerit gustu, nulli dubium esse opinamur, quin adeo singularis Acori nota sit praesentantur, ut is merito staphidius appellari debeat, qui aliter senserit. Quos, ut videndum videatur Lusitanus argumentum, quo ducitur, ut credat Galangam eam ob facultatem, quae ad venerea praestare solentur Mauritaniam, genuinum esse Acorum: quoniam Apuleius Acorum Veneream herbam quibusdam vocari scribat. Quandoquidem cum nullam explicauerit illam rationem, quae illi venerea herba nomen a cesserit, non tanti nobis fuerit Apuleii auctoritas: praesertim cum plurima alia praeter Galangam habeantur radices, quae hac polleant facultate. Cum enim antiquorum nullus scriptus commemorauerit Acorum ad Venerea praestare facile quis opinari poterit Latinis (ut audio) Veneream herbam uocari, quod fortasse ob plantae pulchritudinem, amoenitatem, & odoris fragrantiam Venere illam dicauerit antiquus, quem admodum & Myrrum. Plures enim habentur planta quae Venerea appellantur nomenclatione, nempe Venereum alium, Venereum pellen, Venereum capillus, Venereum umbilicus: quin etiam Thyrsus, & Syrax, quod susauer harent, Venerea dicuntur planta.

30 Adhuc in Acori historia parum quidem Aculi adstipulandum videtur, quippe qui non satis constantiter de Acoro scripserit. Primum enim nomen Acorum scribit in libro de cultis horti ac prunis, contra omnium penitus sententiam, deinde perositoco a ferit idem inuenta rarum nomen inueni, nec scire posse, nisi cum fuscubum emiserit. Quae omnia si cum iis conferantur quae a graecissimis scriptoribus de Acoro scripta sunt, facile subtilia deprehendi poterunt. Nec minus si ipse dum videtur aliud Lusitanus argumentum, quod eam ob causam veli Galangam esse Acorum, quoniam a Plinio dicitur in libro 25 cap. 13. Acorum nigra habere radices, quando quidem crassioris Galanga radices nigrae, quam reuera sunt, sed subrufescentes. Atque illi venia danda est: quippe quod (ut aiunt) de coloribus caci non iudicant. Ceterum extant apud nos Pliniani codices meritis ultimo loco expurgati ac restituti qui non nigrae sed subnigrae gant Acoro esse radices. Quae quidem lectionem magis probamus, quod scripserit in paulo infra, Creticae Acori radices esse Ponticis candidiores: quinetiam quod haec lectio Dio Coridis adstipuletur qui Acoro radices tribuit, non albicantes. Subalbus enim coloris (mea sententia) fuerit, qui ex nigro albicat, subniger vero qui ex albo nigricat, adeo ut subalbus & subniger color parum inter se differant. Talis autem visitur color in radicebus, quibus passim utimur Cylami odorati vice.

CARDAMOMVM.

Nec sane minus in Cardamomo caecit Lusitanus, utpote qui putauerit Cardamomum, quo vis sunt antiqui, lignum fuisse, non semen. Patet non leuis error, quod esse plenum, in nigeris contumax, in oculum, fardumque, potius feruus se proprium, quam lignum. Sed Cardamomum, antiquis fuisse semen non lignum, testatur ipse, si me graui, si mens auctor Galenus libro primo de antidotis capitulo primo ubi scribit: Fructus autem, qui una cum vis quibus foliis calicibus ac floribus in Thracia nutuntur, si sunt Scordij, Nepita, Marrubii, Stechadis, Diastamni, Polii, Chamedryes, Chamopyris, Hyperici, Cedaurii, Radice

De Acoro Confessio
Galangae & Acori
in eodem Amathum
Galanga Cypri
tota

Lusitanus de Galanga
laudat

Acorum Calamus
est aromaticus.

Ridiculum argumentum
Venerea herba
& planta quae

Apuleio in Acoro
non disputandum

De Cardamomo
Confessio

*Radices autē ha Zinziberis, Iridis, Rhei, Quinquesolii, Costi, Nardi Indica, Nardi Celtica, Gēriana, Mei-
Asbamāsci, Phu, Aristolochia tenuis. Semina vero hac: Napi, Petroselini, Thlaspi, Amos, Anethi, Feni-
culi, Dauci, Cardamomi. Hac ille. Recensuit etiam inter semina Cardamomum senior ille Andromachus, ubi
carmine de Theriaca scripsit his versibus.*

Καὶ μακάριον ἀίψμα, καὶ ἰδιὸν καρδάμουμον.

Καὶ ψαράρον σπόρις παρδόμενος σίταλι.

Hac Andromachus & Galenus, aduei sive Lusitanum ante tot secula scripta reliquerunt.

NIGELLA CITRINA.

Censura III. de
Nigella Citrina
non esse Corda-
momum.

Erat Lusitanus, quod recentiores quosdam forte sequutus, sibi persuaserit Nigellam Citrinam (licet mihi
nunc pharmacopœorum uti vocabulis) maius Mauritanorum esse Cardamomum: minus vero id, quod
Meleghetam vocant. Quandoquidem Serapioni maius Cardamomū semen est, quod oī longis quibusdam cō-
cluditur capitibus, ut fere similibus, qua ē Rosis prodeunt, granis subnigris, rotundis, in quibus minuta conti-
nentur semina angulosa, sarcta, & odorata. Id quod manifesto arguit Nigellam hanc, qua Melanthii est spe-
cies (ut nobis alias satis superq; ostensum arbitramur) Maius Mauritanorum Cardamomum esse nequaquā.
Adde quod Nigella calix nullum intra se habeat granum, quod ipsum semen excipiat, sed parua seminata, ut
intercurfantibus mēbranis papaueris modo. Præter id, cū sui Cardamomi colorē subnigrū fecerint Arabes, non
video cur Nigella Citrina vocata, qua colore spectatur Citrei mali, a quo illi nomen, maius illorum Cardamo-
mum appellari possit.

Censura IIII.
de Meleghetis,
non esse Carda-
momū minus.

Quod præterea Melegheta, minus Mauritanorum Cardamomū non sit, quis facile corticere poterit, quippe
cum hoc semen calice quodam, Melanthii instar, concludatur: Cardamomum vero minus ut Serapion-
quit) suum ferat semen nullis occlusum capitibus, colore maiori amulo. Qui tamen color subniger Meleghetis
minime est assimilis, eo quod ha colore sint subrufo Indici Milii instar, quod Thusi Sagnā vocant, in subru-
vero Melegam, unde fortasse accessit his seminibus Melegheta nomen. Adhæc cum Melegheta semen longe
maius habeatur, quam Nigella Citrina, non video sane cur consentaneū fuerit id minus vocari Cardamomū.

MELEGHETA.

CVBEBA, CARPESIVM.

Censura V. de
Cubebis & Car-
pesio non effi-
dem.

In Cubebis, & Carpesio censendis quantum aberrat? quod Cubebas velit, quibus passim utuntur Officina,
cum veras Arabum esse Cubebas, tum etiam legitimum Galeni Carpesium. Verum, ut ipud Arabum nullus
habetur, qui scripserit usquam Cubebas esse baccas, vel semen: ita nec apud Græcos ullus exat author, qui Car-
pesium fateatur esse semen. Galeno enim Carpesium tenuis sunt festuce, siue sarmenta parua, Cinnamomi: ut-
gultis similia. Quare quum Mauritanis idem sit Cubeba, quod Græcis Carpesium, nullo pacto fieri posse puta-
mus, ut vulgaris Cubeba, qua baccarum generibus ascribenda est, inter festucas, & tenuis virgulta, (Carpesi-
um esse possit, ac debeat: quin etiam nec genuina Mauritanorum Cubeba, ut pluribus remaneat in commenta-
riis nostris explicatam habemus.

SALIUNCA.

Censura VI. de
Saliunca, nō esse
Pseudonardum.

Pseudonardus.

Multo vero apertius suam declarat inscitiam in Saliunca, quam eandem arbitratur esse plantam, quam
Italī Spico, recentiores quidam Pseudonardum appellant. ad quod quoq; genus refertur, qua passim vul-
go vocatur Lanendula: in quo certe miror maximam hominis nescio imperitiam, an sturorē dixerō. Etenim
quid alienius? quum manifeste Plinius Saliuncam foliosam asserat esse plantam, adeo breuem, ut nec li non pos-
sit: quin & herba verius quam flos, densa, veluti manu pressa, radice numerosa coherens. Quantum ab hoc dif-
fert Pseudonardus? quum planta sit fruticosa lignosaq;, Roris marini Coronarii instar, non brevis, sed bicubi-
talis, & flos verius quam herba, & qua in corollis facile neci possit. Florum enim longioro pediculi ianceo fere
lentore præstant. Præterea Pseudonardus numerosis radicibus non coheret, nec adeo dense fruticat, ut foliatam
pertinaciter sibi ipsis inhereant, ut tanquam manu pressa cernantur. Adde quod in Panninia, & in Noricorū
Alpium apricis locis, nusquam Pseudonardus proveniat, ubi Plinio ipso teste, numerosa provenit Saliunca. Hu-
milis autem & brevis Saliunca herbula est, non bicubitata & Pseudonardi modo fruticosa: ac lignosa, quam
obrem in Bucolicis pēta cecinit:

Puniceis humilis cedit Saliunca rosetis.

Tantum discrimen inter Saliuncā & Pseudonardū non cernit Lusitanus, ut humillimā herbam a bicubitāli
nō distinguat frutice. Timendū, nisi hęc oculorū curret caliginē, ne culicē p cane, vel fortasse etiā equo, accipiat.

CINNAMOMVM.

Censura VI. de
Cinnamomo,
non effectantum
corticem.

Cinnamomum
est virgultū pu-
milla arboris.

Redibo in gratiā aliquando cum hoc homine, qui alienis (utinam vere) nos locupletet diuitiis, & optimo
Cinnamomo capsis (ut ille inquit) cannellaresertis, qua ab India deferuntur Antuerpiā, nos abundare
iactat, & contra omnium præclarissimorum authorū sententiā sibi persuadet, Cinnamomū esse corticē tantū sua ar-
boris non lignū. Noxiatu avidus nouū credo aliquid afferre, studuit: fidem idcirco sua authoritati adhibēdā
minus dubitavit, quod iā fama increbuerit apud omnes Lusitanos, per agratis Africa & India regionibus, Aro-
matū multa genera esse aduecta. Miror cur nō se in his quoq; partibus fuisse fingat, ut maiore huius comēti fa-
ciat fidē. Sed cū nec ipse id asserat, nec Lusitani, qui nauigius istas terras petierunt, ullā huius rei afferat histo-
riā, nos Lusitano in istis comētiis inuentis astipulemur? Præsertim cū nō desint pbatissimorum scriptorum testi-
monia, qui repellentes has nugas apertissime fateantur Cinnamomū virgultū esse pumila arboris non corticē au-
tum. Id enim in primis testatur Dioscorides, sic inquit: In Cinnamomi Mosylitici vocati genere præstat recēs.
nigrū, ex viroso in cinerē vergens, laue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, per quā incunde olē,
Quibus palam sit Cinnamomum virgultum esse tenue nodis pluribus constans. Huic subscribit Galenus lib. 2.
de Antidotis his verbis: Quauis autem Cinnamomi species ab una radice, cum frutex quidam paruum consur-
git, emittitq; hac sex, illa septem virgulta, vel paulo plura pauciorave, nō equali tamē omnia longitudine sunt.
Verū quod maximum est, pedis Romani dimidiū nō excedit? Hac ille. Adest adhæc liber de simplicib. medica-
mentis ad Paternianū Galeno adscriptus, qui etiā de Cinnamomo sic habet: Cinnamomū sunt rami fere, ac vir-
gulta, qua ab una radice plura excreſcunt, recta & minuta, breuiq;, colore subrufo, & cortice extenso nō rugoso,
qui

Quod autem ex Indica nucce Elaomel manare non crediderim, id sanè mihi licere persuaserim, quod huius historia neminem habeam autorem præter Lusitanum.

MACER.

Censura X de
Macer, non idè
eùdè cum Maci.

Lusitani insolè-
tia.

Macis & Macer
quid.

Contendit maxime Lusitanus, utpotè qui semper falsa tueri nititur, Macim, quo Myristica nuce prætextus instar conteguntur, & Græcorum Macerem nihil inter se differre. Cui nisi quis astipuletur, illum seuerus iudex contumacem declarat: tantam sibi arrogat auctoritatem, ut ceriò putet unumquemque suis debere astipulari deliramentis. Verum quum id nulla asserat ratione, vel auctoritate, ipse merito nò modo contumax fuerit declarandus, sed insolens, vecors, ac delirus. Quippe qui potius errori patrocinari voluerit, nihil perpendens, & aliorum subscribere ineptis, quam veritatem amplecti ac tueri. Atqui quum nobis in commentariis nostris in Dioscoridem editis, ab eùdè comprobatum sit cum Græcorum, tum etiam Mauritanorum testimonio, horum Macim Myristica nuce esse tegumentum, ut ipso oculorum intuitu unusquisque videre potest, illorum verò Macerem corticem esse radicis magna (ut apertissimè lib. 12. cap. 8. testatur Plinius) non est ut hic pluribus istius Centurionis insolentiam & inscitiam redarguam. Eò itaq; se conferre poterunt, qui hæc differentias hæctenus non considerarunt.

ERICA.

Censura XI. de
Erica.

Erica bis in an-
no floret.

Nec minus in Erica hunc deceptum reperio, quippe qui neget contra omnium doctissimorum virorum sententiam, eam plantam, è qua uniuersa ferè Hetruria ad mundandas ades scopas sibi parat, vilo pacto esse Ericam, hoc tantum inani argumento fretus, quòd hæc semel tantum in anno floreat, quum tamen Erica, Theophrasti testimonio, bis in anno florere debeat. At quam decipitur? cum non nobis tantum, sed aliis quam plurimis obseruatum sit plantam, quam Ericam vocamus, bis in anno, nempe verno & autumnali tempore, sine ulla controuersia florescere. At cum lib. 111. scribat Dioscorides Corim herbam Erica foliis provenire, constatq; id Ericam nostram per omnia referre, palam sit omnibus, hanc legitimam esse Ericam.

ACACALIS.

Censura XII. de
Acacali.

Myricæ generâ.

Acacalim nasci scribit apud sua gentis Olyssiponam Lusitanici regni metropolim, fructu albo, pusillis margaritis simili, ex planta quadam inter Myricam & Ericam media. Sed quòd ad fabulas redeat, palam facit Dioscorides, qui scripsit Acacalim semen habere Aegyptij fruticis Myrica semine simili, nò autem Acacalim fruticem esse Myricæ similem. Caterum cum duo sint Myrica genera, alterum fructum gerens, quasi florem compage musco sum, alterum vero Galle similem, videant obsecro, qui rem medicam proficiunt, quam negligenter Dioscoridem legerit Lusitanus: quin & qua auctoritate vel ratione ductus affirmare ausus sit, Acacalis semen pusillis margaritis non esse absimile, quum antiquorum quispiam (quod sciam) nusquam id scriptis commendauerit.

PALIURVS.

Censura XIII de
Paliuro non esse
Agrifolium.

In Paliuro confundens historiam pede prolabitur: siquidem putat Dioscoridis Paliurum & eam, de qua lib. 3. cap. 17 de historia Plantarum tradidit Theophrastus, & Galenus octauo de simplicium medicamentorum facultatibus illam esse arborem quam Agrifolium vulgò vocamus, folio Lauri, per ambitum aculeata, crasso, perpetuoque fructu Rusci modo rubente. At tam Dioscoridi, quam Theophrasto citato loco, Paliurus frutex est, non arbor, & semen in siliquis profert, fuliginosum, mansu lentorem relinquens seminis lini modo. Id quod in Agrifolio nusquam spectari potest, cum baccifera sit arbor. Nec propterea negauerim Agrifolium aliud esse Paliuri genus, quod, ut ipse Theophrastus inquit lib. 5. cap. 4. de historia plantarum in Aphrica nascitur, quum notis omnibus illam referat. Verum non ob id affirmauerim Agrifoliū alterum illud esse genus, quod siliquis profert. Sed cum Lusitanus fortè audierit Agrifolium inter Paliuri genera haberi, nec unquam legerit Paliuri differentias apud Theophrastum, nulla adhibita distinctione, pro omni Paliuro Agrifolium adducit.

Censura XIII
in eodem Paliu-
ro.

Quin & in hoc decipitur, quòd ceriò crediderit Paliurum à Plinio descriptum lib. 13. cap. 19. & à Theophrasto lib. 5. cap. 4. esse Dioscoridis Paliurum. Error sanè per se patet, quòd Dioscoridi Paliurus semen in siliquis ferat: Theophrasto verò & Plinio citatis locis, fructum ferat rubrum siliquis nullis insertum. Nam tametsi siliquarum non meminerit Dioscorides, sed tantum seminis, quum tamen rara in arboribus sint semina, qua siliquis, vel vasculis quibuslibet non asseruentur, non temerè censeri potest siliquis prætermisisse Dioscoridem. Nam si de Africana Paliuro scripsisset is, fructus meminisset non seminis. Adhuc quum Theophrastus Paliuro siliquis ferenti easdem tribuerit tum vires, tum qualitates, quas suo reddidit Dioscorides, ambigendum sanè non est, quin Dioscoridis Paliurus semen in siliquis ferat.

RIBES.

Censura XV. in
Ribem.

Ribes legitimæ
historia.

Mauritanorum Ribem vulgi opinionem sequutus, eam arbusculam censet hortis & viridariis familiarem, qua folio exst virgineo, paruo, alba Populo emulo, ramulis lentis, obsequiosisq; topiariis aptissimis, è quibus fructus racematis dependent, acinis magnitudine piperis, rubentibus, sapore subacido. Sed manifeste refellit eum Serapio, (Ribes enim Arabica planta est) Ribem asserens esse arborem capreolos proferentem, colore viridi rubescente, foliis latis, magnis, rotundisq; que quidem nota in nostra Ribe omnes desiderantur. Vulgaris enim Ribes nec fert capreolos, nec lata, nec magna, nec rotunda folia, sed parua, viridæ, & diuisuris per ambitum laciniata.

ROSÆ DAMASCENÆ.

Censura XVI.
de Rosæ Dama-
scenis.

Quo in altum magis in hoc turbulento mari vela facio, ea flagrantius ad portum aliquem me receptum velim. Tædè profecto cum istis ineptis me diuinus ad naseam usque consuetari. Sed quid agam? In portu erat respiciendum, nunc danda vela, quacunque se offerat molestia: maxime cum ita diluantur ipsi nauis, ut hinc ad serua reuocemur. Audite quæso lepida huius peritiam. De rosæ enim scribens, quæ Damascenus appellat, quæq; vulgus Moschettas vocat, quod odoris fortasse fragrantia Moscum respiciant, non solum has non minori us delectatoria pollere existimet, quam Scammonia: sed existiosissimum esse medicamentum pariter contendit. Hoc ut confirmet, anitè prorsus huic subtexti fabulam, quod Venetus viderit (liceat mihi nunc suo teste testimonio) nobilissimam quandam sua gentis mulierem Beatricè a Luna vocatam, qua cum semel tan-

rum faccharum ex hisce Rosis paratum à medico quodam Veneto tanquam medicamentum quod nullo incom-
 mo ad alium ueret, degustasset. statim faucium & lingua desquamationem, quin & ventriculi erosionem cen-
 suerit. Nihil ad me attinet illa, quam adducit muliercula. Primum (ut ego mihi testis esse possum) id con-
 tra Lusitanianam sententiã maxime pugnat, quum sepius ipsemet id sumpserim medicamentum, alisque frequenter
 dederim sine ullo prorsus incommodo adeo ut quandoq; pueris felicissime propinauerim. Præterea non magno
 negotio deprehendi potest Lusitanianum iudicium esse falsum, quod mansa hæc rosa nullam penitus gustu relinquat
 acridinem sed tantum se ostendit tum adstringentem, tum etiam subamaram. Id quod manifeste indicat, ut
 nulla faucium, aut lingua erosio, inflammatione hinc degustatibus accedere possit. Mihi enim hæc rosa sepe mæn-
 dens, ut quandoq; adstrictam excitarem aluum, nihil erosionis, inflammationis uel accessit. Quo fit, ut quis re-
 cte opinari possit, suo inconstanti iudicio delusum esse Lusitanum, utpote qui huiusce medicamenti facultatis
 penitus ignarus, symptomatis illius causam in illud perperam reiecit. Cum potius credendum sit id ab acrimia,
 salisq; succorum defluxu prouenisse, qui forte fortuna eo tempore, quo rosaceum illud faccharum mulier illa
 sumpsit, a capite in eas partes labi cepit. Nec putauerim unquam medicum illum Venetum, quem tamen nomina-
 re non audeo Lusitanus, adeo excordem, imprudenter negligentemq; fuisse, ut tam nobili ac diuiti mulieri me-
 dicamentum præbuerit, cuius ignorauerit uires. præsertim cum ad huiusmodi durissimos egrotantes implerunq;
 accedant medici, qui primas in ciuitatibus tenent. At qui magis sane demiror hominis imperitiã, quod tam
 acriter damnauerit has Damascenas Rosas, odore perquam suauis fragrantibus, è quibus clementissimum illud pa-
 ratum medicamentum, nullo penitus incommodo aluum ducens. Contra uero tam magnis laudibus prætulit
 ad eandem excluendam Persici arboris flores: quum & syrupum ex eorundem diluto paratum Quandoquidem
 ut iam sexcenties obseruauimus) Persici arboris flores ad ducendam aluum deuorati, incommodis quam plu-
 rimis sumentes afficiunt, nempe crebris vomitionibus, uentriculi & intestinorum torminibus, animi deliquio,
 & crebris alui deiectionibus, quæ omnia plerunq; sequitur frigidus sudor, astuatio, uirium amissio, & corporis
 uniuersa imbecillitas. Præter id, quoniam Amathum hunc merito Amathum, non appellauerit, cum eo ignorantia
 peruenisse constet, ut certo sibi persuaserit Ielensabin è Persici paratum, de quo pluries in febrium curatione &
 uentriculi dolore meminit Auicenna, ex Persici arboris floribus parari debere? Sed quam falsa, ac ridenda te-
 neatur opinione, luce clarius ostendit ipsa medicamenti nomenclatio, quippe Ielensabin Mauritanus omnium
 præclarissimorum medicorum consensu nil aliud designat, quam Mel Rosaceum. Sed quoniam pacto Rosaceum
 Mel è floribus Persici arboris parari possit (ah ah ah. prauis scribere fere nequimus) qui sciunt, doceant, quum
 id hætenus nec uiderim, nec legerim usquam. Constat enim per Rosas Persicas nil aliud uoluisse Auicennam,
 quam Puniceas. Siquidem lib. v. ubi de compositione medicamentorum omnium egit, de quibus in uniuerso
 meminit uolumine Ielensabin ad febres & uentriculi dolores parari iubet è Rubris Rosis, non autem (ut Lusit-
 anianam uana fert opinio) ex Persici arboris floribus. Id quod manifeste indicat, nil aliud Persicas Rosas Auicen-
 na designare, quam Puniceas, Persicas illi fortasse uocatas, quod a Persis in suas uenerint regiones. Nam & nos
 Damascenas uocamus eas, de quibus diximus, quod è Damasco Syria primo ad nos peruenierint.

Lusitani iudicium falsum.

Lusitani in re medica uident imperitiã.

Lusitani in Ielensabin iudicia.

Rosa Persica quæ apud Auicennam.

PALMÆ INVOLUCRUM.

Fallitur præter id Lusitanus in ea examinanda palma, quam Græci ἐλάτην uocant. Is enim nil aliud Palmæ
 Inuolucrum ἐλάτην Græcis uocatum primum esse existimat, quam Nucis Indica villosum tegumentum, de Palmæ inuo-
 hoc tamẽ argumeto fretus q; Nux Indica uocata ab arbore pferatur (ut referunt qui in Indiã peregrinatur) lucto.
 Palma simili. Deinde uero sua fortasse inconstantia ductus, in eiusdẽ capitis processu, remota prior sententia
 (qui talium puerorum est mos) nil aliud tandem affirmat apud Dioscoridẽ esse Elaten, quam Palma germen, quod
 Græcis Encephalos dicitur, ea ratione innixus quod scripserit Galenus libro octauo de simplicium medicamentis
 rum facultatibus, id recte Elaten uocari. Sed gemino hic se implicat errore. Quandoquidem Dioscoridi Palma
 Elate nihil aliud est, quã fructus palmarum adhuc florescentium inuolucrum calixq;, nõ uocis alicuius tegumentum,
 nec germen Indica enim Nucis nusquam meminit Dioscoridẽ, nec (quod sciuerim, legerimne) antiquorum ali-
 quis. Quo fit, ut censendum sit huiusmodi Nucis inuolucrum nunquam antiquis innotuisse. Porro Palma arbor, Palma Elates hi-
 que dactylos profert (id quod penitus ignorare Lusitanum non ambigimus) primo inuolucrum magnum edit, stria
 folliculi cuiusdam instar in quo quam plurimi flores includuntur, qui longopediculo serie quadam pendenter
 racematim coherent. Id tractu temporis dehiscit emerguntq; flores. Carpiur deinde inuolucrum ad plura utile,
 idq; est, quod Dioscoridi Elate appellatur: quæ si non ignorasset Lusitanus, non ita fortasse facile, dum duabus
 uult insidere sellis, duobus hinc parietibus caput impigisset. Nec nobis sane obstat Galeni auctoritas, qua uiti-
 tur Lusitanus. Siquidẽ Galenus loco superius citato duo facit Elates genera, unum quod germen est ipsam Pal-
 ma, aliud uero tegumentum, de quo tantum scribit Dioscoridẽ: cui etiam Elates duo produuntur genera, quo-
 rum unum illud est, de quo diximus, aliud uero id totum, quod inuolucro illo concluditur, quorum nullum Nu-
 cis Indica tegumentum, nec Galeni Encephalon esse potest. Ceterum ut fortasse probet Elaten plura apud anti-
 quos designare, Plinius in medium affert, quippe qui scripserit libro duodecimo, capite ultimo, arborẽ quãdã
 esse Abietem uocantem, uinguentis expetitã, quam alii Elaten uocant, alii Palmam, alii Spathen. Idq; ma-
 xime palmam facit, quam imprudenter uelut Lusitanus aliorum errorum inscitia suam inueni opinionem. Siqui-
 dem Plinius non satis apte locutus deprehenditur uocabulorum similitudine deceptus. Ipsenim cum legisset a-
 pud Græcos ἐλάτην Abietem arborem designare, quin & ἐλάτην quibusdam uocari Palmam Elaten siue Spa-
 then, & hanc in unguentis addi, magno ac pudendo errore putauit, idem esse Abietem arborem, & florescentium
 dactylorum inuolucrum, quod ad unguenta subtilissima expetebat antiquitas.

Censura XVII de Palmæ inuolucro.

Palma Elate Dioscoridi quid.

Galeno Elates duo genera. Quoniam etiam Dioscoridi.

Plinii error, quæ maxime sequitur Amathus.

PERSEA ARBOR.

Reprehendit etiam aliorum opinionem, ut uanam qui Perseam arborem existimãt è Persico uostrate dis-
 ferre. Sed quam ille totus sit uanius, & quam magno ducatur errore facile quis animaduertet ex proba-
 tissimarum auctorum testimoniis. Nam (ut Theophrastum memoria perdidit libro quarto, capite secundo, de Pla-
 tarum historia) Persea arbor est ægypti aspectu magna formosaq; folia flore, ramo, totaq; p; uera patissima
 Pyro proxima, nisi quod altera folio perperuo altera deciuo est. Fructum abunde parit omnibus temporibus perfi-
 eu: nouis anniculum semper occipit, matris ita annuicis fructum afflati conficiunt, reliqua in crasso am-

Censura XVIII de Persea.

Persea arboris huiusmodi Theophrastus.

Perficid. Scri-
ptus.

ferunt, atq; recondunt. Fructus est magnitudine Pyri, figura oblongus, Amygdala modo, colore herbidus, nō
cens intus habet, ut Prunum, verum longe minorem, mollioremq;. Caro eius suavis, ac prae dulcis manditur,
concoctusq; facilis, & innocua etiā largiore cibo sumpta. Radice arbor exsuperat tum longitudine, tum etiam
crassitudine, multitudineq;. Materie constat robusta, aura visq; decora, veluti Lotus, quapropter ex ea, &
simulachra, & lectulos, & mensus, & reliqua similia fabricant: hactenus Theophrastus. Caterum si Persea
Aegyptia nota cum Persico nostrate conferantur: qua uniuersus scaturit orbis. I: quid constabit has plantas nubi-
lominus inter se distare, quam a quercu salicem: Persicus enim arbor, qua nostris in hortis, viridarius, ac vine-
tis passim frequentissima visitur, pro: era, magna, formosaq; nusquā visitur, nihilq; cum Pyro cognationis ha-
bet. sed potius per omnia Amygdalum refert. Quin nec fronde perpetuo viuet, nec fructum omni tēpore persi-
cit, nec oblongus is est Amygdala instar, sed orbiculatum in sphaera modum, colore minime herbido, sed cum
maturuerit, aut subpallido, aut subcaudicante, aut rubente, aut flauo. Huic officulum prater id Prunominus
non visitur sed quandoq; duplo triploq; maior, nec illi figura simile, quin nec fractu facilis, sed longe cotinua-
tius. Ad haec nostratus Persici fructus gustu prae dulci non percipitur, sed potius subaustero, aut vinoso. Adde q;
vulgaris Persici fructus maxime damnauerit Galenus libro secundo de Alimentorum facultatibus, ut prauis
sua alimentum, & qui facile corrumpatur, & noxam ventriculo inferat: contra vero qui ex Aegyptia Per-
sea proveniunt. Postremo Persicus nostras radice nititur breui non longa, tenui non crassa, rara non multiplici,
& proinde rarissime annosa reperitur. Contabescit peritq; facile quod inbecillibus admodū sustentetur radi-
cibus. Ob idq; ligni materies illi rara, frangosaq; cernitur, nec nisi ad ignem apta, quum tamen Aegyptia Per-
sea solida compacta, pulcherrimaq; spectetur, ut pote qui in multiplices veniat usus. Quo fit, ut omnino Ama-
tior amentior. & Lusitano lusciusior fuerit, qui non nouerit Perseam Aegypti arborem a vulgari Persico plari-
mum atq; plurimum differre. Id quod etiam comprobatur Plinius testimonio, qui libro decimo quinto, capite
decimo tertio sic scriptura reliquit: Nam Persica arbores sero, & cum difficultate transiere ut qua in Rhodo
nihil ferant, quod primum ab Aegypto eorum fuerat hospitium. Falsum est venenata cum cruciata in Persis
gigni, & penarum causa a Regibus translata in Aegyptum, & terra mitigata. Id enim de Persea diligentiores
tradunt, quae in totum alia est, nec extra orientem nasci volunt. Eam quoq; negauerunt eruditiores ex Persida
propter supplicia translata, sed a Persis in Amphisatam, & ob id Alexandriam illa coronari victores ibi in-
stituta, se in honorem atati sui. Semper autem folia habet, & poma, subnascens aliis: haec Plinius. Verum
non modo hic & pariter Theophrastus destruit Lusitanis euanidam sententiam, sed etiam grauisissimus auctor
Galenus, qui libro 11. de compositione medicamentorum secundum locos manifeste testatur, in nulla alia Roma-
ni subditagine vidisse Perseam arborem, praeterquam in Alexandria Aegypti. Sed vbi rerum testimonia
sunt, quid opus est verbis? Hoc tamen tantum addam, quod cum per longas ante Galenum atata Persicus,
vulgus nota arbor, uniuersum occupauerit Graeciam, Italiam, ac alias passim regiones, si Persicus nostras ab
Aegyptia non differret Persea, nullo pacto credendum est, eo dementia peruenisse Galenum, ut posteritatis me-
moriam commendauerit, nusquam gentium vidisse Perseam, nisi tantum in sola Alexandria.

FLUVIATILES CANCRI

Censura XIX. de
Fluuiatilibus can-
cris.

Ridenda Lusita-
ni amentia.

Quum Lusitanum de Fluiatilibus Cancris differentem legerem, tenere me non potui, quin in vehemen-
tem soluerer cachinnum. Si quid, in illum eo inscitia peruenisse offendi in hisce censendis, ut aquatilis Te-
studines Cancrorum affirmauerit esse genus, eo grauisissimo argumento impulsus, quod heclicis, & lenta febre
laborantibus maxime commendentur. O lepidum caput, sine helicebaro tibi cerebrum demulceam? Seruone hac
dicuntur ab Amatho? an risum mouere sua recordia studet? Nimium aaducor, ut credam (si id serio fatear,
quod sentio) aliquo amentio genere illum quandoq; vexari, & proinde tunc temporis non nisi huiusmodi deli-
ramenta describere. Nam & Rana, & Cochlear in Cancrario genere erunt, quod heclicis maxime conferant, si
potius Lusitani delirio addicuntur, quam veritati.

MARINVS SCORPIO.

Censura XX. de
Marino Scorpio-
ne.

Marinum Scorpionem paruulum quoddam putat esse animalculum, quod ex Cancrario genere existima-
uerim (vidimus enim illud saepe in Hadriatici littore tanquam inutile a piscatoribus reiectum) longis
ac tenibus cruribus, corporis forma terrestri scorpionis simili, chelis pariter tenuissimis, cauda nulla, & omni
penitus pu pa carens. Gulielmus Rondolietus libro 18. capite 22. de Marinis piscibus animalculum hoc Can-
crum Aegypti vocat. Verum Aristoteli, Hicetio Galeno, Athenaeo, Plinio, & Elianoq;, Scorpius pelagicus est
piscis, & inter mulcos, a fellos lacertos cernuus, & quotquot sunt, alios dura carnis recensetur, non autem in Ca-
ncrario genere. Quum autem eius historiam in Commentariis nostris in Dioscoridem plaribus describerem, &
vera Scorpionis imaginē appinxerim, eo se conferre poterit Lusitanus si caecitatis sua remediū non neglexerit.

RANÆ.

Censura XXI. de
Ranis quas ve-
nenosas censet.

Lusitani Reli-
gio.

Vbi Ranarum viros expendit Lusitanus proculdubio aberrat, quod omnes in uniuersum Ranas veneno-
sas censet, adeo ut in Aetium inuehat, quod is libro 3. cap. 55. palustres ranas inter venenata recenset:
at: & tamen libro secundo earum ius tanquam alexipharmacum pratulerit ad venenatorum reptilium istum.
Error nimis est manifestus, quod quotannis insinuat ranarum numerus Italas in cibum veniat ex his, quae in
paludibus, & scrobibus morantur, & nullo tamen incommodo comedentes afficiunt. Nam si (ut Lusitanus in-
quit, Rana omnes venenosa essent, nullum dubium est, quin quam plurimi earum esu interirent: quum non de-
sint homines innumeri, qui us tantū sapius satentur, nulla ibi accedente noxa. Nec sane sententia nostra ob-
stat, quod Galenus lib. de C. b. boni & mali succi scriptū reliquerit, a Ranis esse abstinendum, quippe is Rana
non detestatur, q; veneno aliquo sint infecta, sed quod malum in corpore uicū procreent, perinde ac pisces in sta-
gnis & paludibus degentes. Quippe si Galenus perisset veneno, esse Ranas, nunquā eas inter cibos retinisset.
Sed magis fortasse Lusitanus, credo Igeperatus Mosaica, quae in ueritate sustinenda desiderio in Aetium inue-
llus est, quae p. ue eius dixerim non intellexerit. Ipse enim lib. 2. de Viribus animalium quae in esum medicum
veniunt ubi deuenit ad palustres Ranas quae passim ab omnibus euntur: Ranepalustres (inquit) in aqua elixre,
salq; & modico oleo condita venenosorum reptilium, ut dicitur, frus earum bibantur, magnam praesidium afferunt:
id quod

id quod ex Dioscoride deprompsit, qui pariter de his egit iisdem verbis. Quibus manifeste suffragatur Plinius libro 32 cap quinto, ubi non modo Ranarum sive pratulis contra serpentium ictus, sed etiam ad Marini Leporis venenum, hausta venena deuorata Rubetam, Salamandramque, ut laudibus pratulit. Nec ob id velim fortasse putet Lusitanus Actum sibi ipsi repugnasse: quippe qui dixerit libro 13, quod deuorata palustris Rana tanquam venenosa, variis ac multis vexet incommodis. Quoad quidem ibi de palustribus Ranis non egit, quatenus cibum veniunt, sed de venenosis, quae Bufonum sunt genere, & in paludibus, praesertim fetidis, morantur. Ipse enim cum proximo capite de Rubetis Ranis egisset, quas Bufones alii appellant, voluit de aquaticis etiam Bufonibus, quos Graeci sub Rana palustris nomine comprehenderunt, verba facere, quoniam sciebat Bufones & terrestres, & aquatiles reperiri, ut unumquemque, compertum habere non ambigimus, qui diligentius, accuratiusque rei medica operam nauarit, quam fecerit Lusitanus. Id quod manifeste declarat libri illius titulus, qui de noxiorum animalium morsu, & de bestiis viribus etiaculantibus inscribitur. Nam & idem legitur apud Dioscoridem, quippe qui libro secundo de Ranis, quae in cibum veniunt, egit. sexto vero, ubi peculiariter de Venenis, & Venenatis animalibus tractauit, de Rubeta, & palustris Rana curatione caput proprium edidit. Adeo ut iam nobis fateri liceat, nentiquam in re medica Lusitano esse astipulandum.

Bufones duplices.

Lusitano in re medica nouesse astipulandum.

GALLINÆ.

At qui nulla mihi amplius est contentio cum Medico, optime lector, verum cum solertissimo degustatore, vel coquo potius, quo plurimum recreatur officio regalium epularum. Gallinas inferioris Germania praenimia algoris inclementia carnes habere scribit hircinis, vel caprinis deteriores. & proinde malum, vitiosumue praeberere alimentum: quin & raro ibidem homines idcirco vesci galinis. O indagatorem omnium educatorum: Patere id me te percontari: quis amabo te ibidem Princeps sua praefecit culina, ut istis eum spoliare delicias? Id quum ego mecum admiratus Flandris quibusdam exponerem fabulam esse aiebant. Quippe quod non minus in eorum regionibus carniū probitatis, saporisque, incunditate praesent gallina, quam alibi. Adhuc pariter fabulosum esse sententur, quod raro gallinis ibidem vescantur incole, ea ratione innixi, quod earum cibum reprobum generet alimentum sed quod multi fortasse a gallinis abstineant sumptui parcentes. Quod autem praeter rationem ij medici agant (ut ait Lusitanus) qui post exactam purgationem ad ventriculum abstergerent ab inherente medicamento simplex gallinarum ius exhibent, sane non improbamus, sed qui sint illi prorsus ignoramus, quum in communi omnium medicorum usu perpetuo esse scierim, tunc illud hoc in negotio nunquam exhiberi, nisi saccharum admisceant rubeum. Nec id temere factum putauerim, cum non ambigam ius ita paratum non modo abstergere, sed etiam posse roborare: id quod a purgatione plurimum praestat.

Censura XXII. de Gallinis malum alimentum praebentibus.

LAC SCISSILE.

Lac Scissile nil aliud esse censet, quam lac ipsum simplex per se acescens. Conuincitur ipsius Dioscoridis testimonio, qui huiusce parandi lactis rationem scribit his verbis. Ex omni lacte fit, quod Scissile appellant, hoc modo. Lac fictili nouo feruet, ramoque ficulneo recenti moneatur, inspersis, postquam bis vel ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt lactis hemina. Ita enim ferescens liquidum ab eo dividitur, quod in caseum concreuit, sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictili labrum detergere, sextariumque argenteum frigida aqua plenum demittere: haec ille. Dioscoridi subscribit Galenus libro decimo de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi de Canino stercore egit: quin & Paulus lib. 1. cap 88. Non possum satis cogitare, qua fuerit in homine tanta imprudentia, ut somnolentia, quod cum tam splendidis enarrationibus explanandum Dioscoridem susceperit, adeo graui labascet negligentia.

Censura XXIII. de Scissili Lacte. Lactis Scissilis parandi ratio.

OLYRA.

In frumentaceo genere eam, magno errore Olyram censet Lusitanus, quam nos Secalam, & Plinius Secalem, & Farraginem appellat, e qua rustici panem conficiunt nigrum triticeo longe deteriorem. Sed cadit Lusitaniani opinio, quod Galeno primo de alimentorum facultatibus Olyra colore sit albo, adeo ut dixerit Plinius libro decimo octauo, cap. octauo, esse, qui ob Olyra candorem, illam Olyram esse putarent. Praeterea scribit idem Plinius ex Olyra dulcem confici panem, id quod ex pane ex Secale confecto minime percipitur, cum potius quodammodo amarorem respiciat. Adhuc Secala ita vulgo vocata, cum in area flagellis decussatur, illico omnem exiit tunicam, & tritici modo nuda colligitur: sed aliter Olyra euenire fatetur Galenus loco superius citato, dum Olyram expendit partes, sic inquit: Habet autem Typha semen extrinsecus corticem veluti Olyra & Hordeum, verum decorticatum in panes congeritur: & paulo inferius ait: Ex nobilissima Olyra, cum, ut decet, fuerit decorticata, nominatum Tragum conficiunt, quo plerique utuntur. Quibus plane constat, Olyram decorticari in area non posse flagellis, quemadmodum nec Hordeum, nec Zeam nec Auenam, dum in area concussatur, sed opus esse, ut in pilis pincentur, ut etiam hoc auo moris est apud omnes.

Censura XXIII. de Olyra, quam Secalem censet.

CHONDROS.

Ex ea fruge parari Chondrum existimat, quam quidam in Italia, ut in Tridentino agro, Scandellam vocant, quod merito redarguit omnium agricolarum consensus, qui dicunt hanc esse Hordei genus non Zeam. Hordei enim plura habentur genera, ut quis ex Theophrasto nosse potest libro octauo, capite quarto, de plantarum historia. Quae si recte expendantur, nil aliud Scandella erit quam Hordeum minus, quae binis tantum versibus spicam gerit, rotundiore etiam grano. Nam praeter id, quod per omnia, nempe facie & viribus, Hordeum referat, constat non esse Zeam, quam Dicoccon appellant, quod nunquam Scandella reperta sit, quae Zea illius modo in geminis putaminibus coniunctum semen habeat: quo fit, ut nullo pacto Scandella inter Zeas recenseri possit. Zea autem Dicocco abundat Goruensis ager, & Foro iulienis arua, ibique vulgo Pirra Farra dicitur, quod Zea sibi ab incolis in uniuersum Pirra vocetur. Caterum quia ex hoc Zea genere Halicam, siue Chondrum sibi parant, quam ipsi Far appellant, licet falso (differt enim ab Halica Far) ideo eadem Pirra Farra nominatur a rusticis. Huic alius eius affinis est error, quod scripserit putaueritque, Far ab Halica nihil differre, idque ex Scandella parari, quam Zeam Dicoccon censet. At Plinii testimonio, Far nihil aliud est quam frumenti vel tritici genus, Adoreum vocatum. Ille enim libro 18. cap. 8. uerba scriptum reliquit. Frum-

Censura XXV. de Chondro.

Censura XXVI. de Farre & Halica quae idem facit.

menti genera non eadem ubique, neque ubi eadem, sunt iisdem nominibus. Vulgarissimum Far, quod Ado-
reum veteres appellaverunt. Item eodem capite, ut palam faceret aliud esse Zeam, e qua fit Halica, aliud ve-
ro Far, Qui Zea utuntur, inquit, non habent Far. Item cap. 7. eiusdem libri Populum Romanum, aut Far-
re tantum e frumento trecentis annis usum Verrius scribit. Quo tempore Romanus nullus fuit Halica usus, ut
ipsemet testatur Plinius libro 22. cap. 25. cum inquit: Halica res Romana est, & non pridem excogitata, neque
arbitror Pompeii magni etate in usu fuisse. His accedit Asclepiadis & Galeni auctoritas libro septimo de
comp. medic. secundum locos in quodam ecligmate ad cruenta sputa, ubi sic habet: Ferris Clusini appellati
sextarii dimidium, decocti Marrubii viridis sextarium unum. Hac in vas vitreum coniecta per diem &
noctem macerari sinito, sequenti die pharmacum molito, quemadmodum Halicam maceramus: hac Galenus.
Quibus palam est a Farre differre Halicam. Galeno subscribit Aetius lib. 9. cap. 45. his verbis: Quod vero
Latine in regionibus Roma vicinis Far appellant, hoc modo paratur. Frumentum modico tempore aqua
madefacito, indeque extractum, ac in pilam coniectum, veluti Ptilianam a cortice repurgato, ubi vero cor-
ticem exuerit, tollit, atque in sole siccato: deinde manibus tritum, donec penitus a cortice fuerit mundatum,
crassissime molito, ita ut granum unum in quatuor aut quinque partes redigatur, & siccum asseruato. Usus
autem tempore Halica modo coquitur, & a sanis in cibum sumitur. Hac ille. ad qua certe pertingere debuerat
ille magnarum centuriarum constructor.

PHASEOLVS.

Censura XXVII.
de Phaseolo qua
Eruiam statuit.

Phaseolum, siue Phasiolum, non paruum illam & vulgarem, quam Galenus Ochron appellat, sed magna
esse Eruiam falso contendit. Quandoquidem Eruia illa maior Latinis Pisum dicitur, non autem Pha-
solum. Differre autem Phaseolum ab omni Eruia & Piseo, testis est Plinius lib. 18. cap. 7. sic inquit: Erui-
a nientis felura harundinaceum, Fabae rotandum, & magna leguminum parti. Longiora Eruia, & Piseo
Phaseolis venosa. Quibus palam est, nec Eruia genus, nec Pisum esse Phaseolum. Constat praeterea Erui-
a cuiusque generis, vel Pisi siliquas elixas in cibis a nemine mandari, quod adeo dura sint cartilagine, ut nullo
manu dentium confici queant. Contra vero vulgaribus, genuinisque Phaseolis accidit. Id quod idem fatetur
Plinius cap. 12. eiusdem libri, ubi sic habet. Siliqua rotunda Ciceri, ceteris leguminum longa, Piseo cylindrica,
& Phaseolorum cum ipsis manduntur granis: id quod nostris Phaseolis vulgaribus accidit. Nam tenellae
maturitatem astate comeditur: quod tamen nulli alii leguminum generi a natura datum esse comperimus. Hu-
ic itaque palam est, Phaseolum Dioscoridi nullam esse Eruiam, sed vulgaris usus Phaseolum, qui passim in ca-
pis feritur. Quippe non tantum folia illi insunt (ut Plinius inquit) venosa, sed (ut Dioscorides ait) deoratum
inflatur spiritus eius, & egre concoquitur. Quin etiam viridis cum siliqua sumptus, aluum emollit. Annon in-
idem cadit erratum, quum Eruiam, quam confundebat: cum Phaseolo, Dolichum a Theophrasto credit ap-
pellari? quum Dolichum ille testetur aperte ad alto longo palo consurgere. Id quod maxime denotat, Dolichum
nil aliud esse, quam varium Phaseolum illum, qui Dioscoridi hortensis Smilax dicitur. Quippe in primis hic
longissimos ascendit palos, qui Lupi Saliarii modo se circum voluit, nec alibi, quam in horis feritur: quin et-
iam eius siliqua simul cum granis, perinde ac aliorum Phaseolorum, manduntur in cibis. Id quod in praefatio-
ne secundi libri de Alimentorum facultatibus testatur Galenus, & Paulus Aegineta libro primo. Atque si
pluribus inanem suam velit sententiam confirmari, commentarios nostros in Dioscoridem consulat. Plura enim
ibi reperiet, quae hic silentio praetermittenda duximus, ne plantarum potius historiam scribere, quod in aliis v-
berius exequenti sumus, quam istis temerariis hominis imperitiam ac negligentiam videamur aperire, quod
iam nostrum est institutum, sed id breuiter: ne si omnino tacuerimus, ille sua temeritate in ceteris nostra abu-
tatur modestia, sin copiosius, ne iustum excedamus modum.

Censura XXVIII.
in Dolicho.

LAPATHVM SIVE RUMEX.

Censura XXIX.
de Rumice.

Aciam propemodum vereor, ne quis cruditus tandem fastidiat in audiendis innumeris & turpissimis istius
hominis erratis: quae si nuda in medio ponerem, cui non ista stomachum moneant? Nunc ita uniuersumque
occurrere studeo prudentia, ut non parum hoc quemque consolari debeat, quod in huius refrenanda audacia
plura interim a nobis afferuntur non infrugifera, & (nisi me spes fallit) non indigna eruditus auribus. Id unum
siquidem hic ubique laboro, ut & Lusitanus, qui tam infide ac improbe aliorum versat scripta, patefiat audax
inscitia, & veritas simul in his tenebris non sine lectoris emolumento elucescat. Verum sic a nobis utrumque est
peragendum, ut plura, & absolutius nos alias de his acturos meminerimus, utque contra Lusitani insulsum, ac
imperitiam, non parum hinc quoque roboris & lucis accedat. Quare (quod in ceteris sum facturus) iam acce-
dam ad ea, quae de Spinachio, seu Rumice ille profert. Nam quod hortense olus, Spinachium nobis passim vo-
catum, fatuum Lapathum esse asserat, meo certe iudicio longissime aberrat, quod Spinachium cum Rumice
vel Lapathum nihil habeat cognationis: siquidem nec folio, nec caule, nec flore, nec semine, nec radice Spinachium
Lapathum simile cernitur: quemadmodum nec gustu, nec viribus. Constat item Galenum (etsi contrarium for-
tasse somniauerit Lusitanus) Spinachium, quin nec Hortensis Lapathi meminisse inter olera, sed tantum sylue-
stris Lapathi, cum inquit: Licet cuius (ut ante diximus) Lapathum appellare Betam agrestem, ut quod non
gustu modo, sed viribus etiam Beta hortensi est adsimile. Verum cum Beta Lapathum sit suauior, ideo nemo
est, qui non ipsa libentius vescatur: haec tamen Galenus. Quibus palam est Spinachium, Lapathum esse non posse:
nam praeter id, quod Spinachium nihil cum Lapathum habeat similitudinis, sylvestre olus non est, sed hortense.
Quo fit, ut sylvestris Beta etiam appellari nequeat. Adde quod Spinachium suauius, & cibo gratius olus sit,
quam Beta. Vane idem sibi persuadet Lapathum communis vsus nunquam in ciborum usum concessisse, cum
Galenus locotam citato ubi sylvestre Rapum inter olera, quae comeduntur, recensuit, eam sylvestrem appella-
rit Betam. Quin etiam & Tridentina, & Goritensis rura, totiusque fere Italia agrestes homines id maxime co-
probant, cum vere sylvestris Lapathi plurimum manducant, quod eo tempore tenella habent folia.

Spinachium.

Spinachium non
esse nec Lapa-
thi genera rec-
tendum.
Vana Lusitani
persuasio.

CHONDRYLLA.

Censura XXX.
de Chondrylla.

Chondrylla Dioscoridi caulem, flores, & folia habet Cichorio similia, adeo ut inter Cichorii species
venias numeranda: tenuior tamen, tota Cichorio est. At Lusitanus, qui in Dioscoridis lectione
maximo

maxime versatum se ubiq; censet, Chondryllam folio esse hortensi Inybo minus recte scribit. Id quod proculdubio ostendit Chondrylla stirpem aliquam nunquam uidisse Lusitanum.

GINGIDIUM.

Nec errore vacant, que de Gingidio censet, quippe qui velut recentiores quosdam sequutus, nil aliud Graecis esse Gingidium, quam vulgare illud Oly quod Cherophyllum, vel Cherofolium vocant. Atque Cherophylli folia, pariter ac radices nihil amaroris ad triditionisq; mandentibus relinquunt, sed potius dulcedinis & acutissimum respiciunt, quum tamen Dioscoridis & Galeni testimonio Gingidium herba sit adstrictivus & amaritudinis non obscura, adeo ut sit etiam sylvestris Pastinaca amarior, & ob id (ut Galenus inquit libro secundo de Alimentorum facultatibus) potius fuerit hac herba medicamentum, quam alimentum. Adde quod Galeno libro de Cibis bonis & mali succi cap. octavo, & Attenuante virtus ratione capite tertio, Gingidium herba sit sylvestris: contra vero Cherophyllum, quod passim in hortis seruitur, ad obscurum.

Censura XXXI
de Gingidio
quod Chero-
phyllum facta

SCANDIX.

Nec minus improbari debet, quod senserit legitimam Scandicem eam esse herbam, que in segetibus nascitur, plerumq; in agrorum extremis atq; Cherophyllo similis, Gerani amulis, in quibus conditur semen: quandoquidem hac herba nec amara est, nec subacti gustu deprehenditur. Id quod in Scandice Galeni testimonio non obscure percipitur, adeo ut hanc ille retulerit inter ea medicamenta que secundo ordine intendo, vel tertio incipiente excofaciunt. Præterea quum Scandicis historiam (quod viderim, legerimq;) nemo scripserit antiquorum, arduum sane videtur, vel potius temerarium decernere, & pro certo affirmare hanc vel illam plantam esse Scandicem. Quippe hac quam, alios sequutus, Scandicem appellat Lusitanus (ut rei herbaria periti existimant) eam maxime refert plantam, que Plinio Veneris Peeten appellatur, ut latius in commentariis nostris scriptum reliquimus.

Censura XXX L
de Scandice.

HIRCI BARBULA.

Quamvis in censenda Hirci Barbula fallatur Lusitanus, si facile noscent, qui in re herbaria eius legerint enarrationes. Ille enim, ut non aliquid afferre videatur, si vera desint, fabulosa afferre non ambigit. Scribit is duas Tragopogonis esse species, alteram flore purpureo, alteram luteo, sed utriusque radicem esse parvam bulbosam, aliquantulum oblongam, Anellane nucis magnitudine, dulcem, & esui aptam, quam pueri in Hispania in campis eradicantes a similitudine paruarum nucum Nucellus appellant, & illarum esu maxime delectantur. Sed aberrasse deprehenditur, quod non solum Dioscorides, sed & Theophrastus, & Plinius scriptum reliquerint, Tragopogon radicem esse longam ac dulcem. Id quod Sole clarius visitur in genuina Hirci Barbula, non autem bulbosam Nucis Pontica magnitudine. Quibus palam est, quam diligenter quamque accurate diligens enucleator legerit Dioscoridem (ut Theophrastum & Plinium præteream) quem enarrandum suscepit. Is enim (quantum video) eam plantam Tragopogonem putat, quam Fuchius in Commentariis de Stirpium natura Apios admentur. Planta hac in Bohemia frequens, non in agris tantum sed etiam in vineis: Germani Terra Nucem appellant. Sed quam habeas cum Tragopogone, cognationem, ego sane nullam video.

Censura XXXIII.
de Hirci barbula.

SMILAX HORTENSIS.

Non parum profecto etiam errore notatur Lusitanus, ut Dioscoridem de Hortensi Smilace differentem de Phaeolorum genere sub Smilacis illius nomine scripsisse arbitretur, cum vulgares Phaeoli, quibus passim in cibus vescimur, dum futi in campis virent, non repant, nec adeo frutices conscendunt, ut Smilacis modo topiarias scenas in umbræ queant. Præterea quum vulgaris Phaeolus passim in campis seratur, colorum leguminum more, quo pacto, quaeneratione hortensis Smilax vocari possit, profecto nescio. Sed quoniam hac longe pluribus nobis comprobata sunt in Commentariis nostris in Dioscoridem, eo Lusitanum remittimus.

Cens. XXXIII.
de hortensi Smilace.

THLASPI.

Nec minus decipitur Lusitanus in expendendo Thlaspi, quod dixerit in eo latum percepisse semen, & folia in cacumine diuisa. Ac si ex verbis eius coniecturam facere liceat (quod tamen pace eius dixerim) nunquam vidit Thlaspi. Non enim Thlaspi semen latum est, ut Galenus testatur, sed rotundum, simile milio, & aliquanto longiusculum, & proinde recte scripsit Dioscorides, Thlaspi semen esse Nasturtio simile. Latum quidem folliculus est, qui semen ipsum includit, sed qui folliculum dicant esse semen, neminem habeo præter unum Lusitanum. Ceterum Thlaspi folia (ut insuentibus facile patebit) nusquam in cacumine diuisa spectantur, sed folliculi, qui semen concludunt, ut in commentariis nostris que legere poteris, ubi hanc Dioscoridis locum restituiimus.

Cens. XXXV.
de Thlaspi.

ZEDOARIA.

Quod Zedoaria & Zurrumbetum Mauritanis idem non sint, aduersus Lusitanum reclamant Serapio, qui de his diuersis capitibus diuersam scribit historiam. Deinde quod Zedoaria radix sit herba, Zurrumbetum vero arbor procera, infrugiferaque, curem odorem spirans, folio Salicis colore ex viridi in luteum languescente, ut idem Serapio scriptum reliquit. Zurrumbetum Paulo Arnabo appellatur. Actus tamen utriusque meminit, Zedoaria, scilicet, & Arnabonis variis in locis, tanquam de medicamentis inter se differentibus. Sed Lusitano perinde ac alii quibusdam errandi ansam dedit Serapionis interpreti, qui capite centesimo septuagesimo secundo, Zedoariam falso Zurrumbetum appellat. Pater interpretis error Serapionis interius ipsius testimonio, quippe qui capite ducentesimo septuagesimo primo, de Zurrumbeto egerit, & longe aliam præcipit lapsum. Zedoaria fecerit.

Censura XXXVI.
de Zedoaria.

STRUTHIVM.

Cens. XXXVII.
de Struthio.Cens. XXXVIII.
in Lusitani fabu-
lam.

Struthium, siue Radiculam, siue Lanariã herbã magno sane errore nihil à vulgaribus Saponariis differre putat Lusitanus. Quippe quod harũ nulla spinoso proneniat folio, quã tamen Theophr. ac Plin. Struthium, aculeata sit planta, & caulẽ proferat fœnilaceũ, qui talis iis Saponarius, de quibus meministi, non visitur. Adde quod neutrum Saponaria genus sternutamenta ciere valeat. Ad fabulam autẽ maxime ridendã, & potius longo Cachinno explodendã, quam verbis refellendã, quam narrat Lusitanus de herba illa in eius castelli montis nascente, a quo se oriundum facit que flore sit Passerculi effigie, eo q̃ ibi passeris quam plurimi nidificent, & semine in coitu euaculato herba radices respargant nil aliud dicendũ censemus, nisi quod hic suis deliramentis colophonẽ addiderit Lusitanus. Ceterum si prope nidificantes passerculos, nascentes planta ob id flores passerulorum illorũ formã proferat q̃ earum radices eorum spermate madescãt, cur fiat igitur q̃ plurimorũ animantium formas, qui in campestribus, & syluis morantur, in quam plurimis non reperiantur herbis, quotidie eorũ semine perfusis. Lusit. id se dicat, qui sua singulari amentia, nouam hanc philosophiã excogitauit, in qua si fortasse perseuerandum statuerit, discat etiam a circulatoribus scribere Madragoras ex humani seminis profusione oriri: quin & Antirrhinum ex bubulo, quod eius semen vasculis includatur, qua vitulina referunt capua

CYCLAMINVS ALTERA.

Censura XXXIX.
de altera Cyclami-
no.
Lusitanus inani-
ter Matthiolum
citat.

Graue, & permolestum mihi est, q̃ in Cyclamino sui erroris me faciat authorem, cum dicat Matthiolum Senensem alteram Cyclaminum a se conspectam affirmare, radice parua Auellana persimili, tamen si habens ille nunquam viderit. Quibus conicere quis recte poterit, quã ille oscitanter commentariis nostros legerit, & inaniter me citauerit: quandoquidem nobis nusquam dictum est Cyclaminum alteram, cui supernacuum radicem assignat Dioscorides radice constare parua, Nucis Ponticã magnitudine, quum ibi recte affirmarem Cyclaminum hanc me nusquam vidisse in Italia.

BVLBVS ESCULENTVS.

Censura XL. de
Bulbo Esculeo.

Ceparũ genera.

Nillum discrimen cernit diligens & solertissimus rerum inspector inter Esculentum Bulbum, & Aiscalonicum Cape, quod nos vulgo vocamus Scalongna. At quantum distant? Aiscalonicum enim Cape inter Caparum genera antiquis recensetur, non autem inter Bulbos. Lusitano refragatur maxime Theophrastus, quippe qui lib. 7. cap. 4. de Plantarum historia, Aiscalonicum Cape, ac alterum eiusdem generis Fissile appellatum inter Cenarum genera recensuit, non inter Bulbos, de quibus speciatim egit cap. 13. eiusdem libri, cui subscribit Plinius lib. 19. cap. 6. sic inquit: Allium, Cepa q̃ inter Deos iure iurando habet Ægyptus. Genera apud Græcos plura, Sardia, Samothracia, Alsidena, Setama, Schista, Aiscalonia ab oppido Iudæa nominata. Demũ Galenus lib. 6. de simplicium medicamentorum facultatibus, Esculentos Bulbos amaros, ac pariter adstringentes facit. Id quod rursus repetit lib. 2. de Alimentorum facultatibus. Quæ tamen qualitates in Aiscalonia Cepa non reperiantur. Ipsa enim acris est valde, perinde ac cetera Caparum genera, nec quicquam ei inest amarosi saporis. Equidem putabam hac non ignorasse Lusitanum, quum illum compertum habeam oriundũ a locis quibusdam non procul ab Aiscalone Iudæa.

ARGEMONNE ALTERA.

Censura XLI. de al-
tera Argemone
quam a genti-
nata facit.

Alteram Argemonem Dioscoridi adulterinam esse non ambigimus, ut in Commentariis nostris diffusim diximus, sed hoc fortasse nesciens Lusitanus, ne huius planta videretur ignarus, Argemonem eam plantã esse censet, qua recentioribus quibusdam Argentina dicitur, non alia (ut opinor) ratione, quam quod Argentina folia gerat vulgari Agrimonio similia, qua quantumcum Syluestri Papauere habeant cognationis, similitudinisue (talia enim Argemone alteri requiruntur folia) in indices erunt, qui plantarum hystorias diligentissime explorauerunt, & Lusitani imperitiã norunt. Qui cum fortassis fieri persuaserit, eam ob causam Empatorio Argemonii nomen accessisse, quod folius & facie Argemonem hanc referret, nomenclationibus magis innixus, quam plantarum ipsarum notis, hic etiam miser se deridendum dedit.

TELEPHIVM.

Censura XLII.
de Telephio,
quod Semperui-
um textũ facit.

Quam in Censura Telephii hallucinetur, qui vult Telephium Dioscoridi nil aliud esse, quam tertium Semperuium, illud sane statim ostendit, quod Dioscorides de Telephio lib. 2. & de Semperuiuo illo lib. 4. scripserit, & quod nec nobis scriptum reliquerit Dioscorides tertium Semperuium quibusdam Telephii vocari. Siquidem Dioscorides has nomenclaturas non recipit, sed tantum adducit: quamobrem nõ est propterea dicendam tertium Semperuium esse Telephium: quemadmodum (exempli gratia) nec Helsing, quam Parthenium quosdam appellasse Dioscorides scribit, Parthenium est, nec Asarum Baccar est, nec Asplenium Hemionium, nec Gingedin Lapidium: tamen si hæc omnia aliarum plantarum nomine quibusdam appellantur. Nam si Dioscoridi idem esset Telephium, & tertium hoc Semperuii genus, non fuisset illi opus de altero per se 2. lib. scribere, de altero vero lib. 3. inter Semperuii genera, ut etiam compertum habemus fecisse Pliniũ, qui lib. 27. cap. 13. de Telephio egit, libro vero 25. de tertio Semperuiuo. postquam de aliis duobus generibus differuit. Adhuc si Telephii facultates apud Dioscoridem & Plinium expendantur, Telephium videmus vitiliginis sanare, quinetiam vulnera, & sinus: hoc vero Semperuium strumas tantum discutere.

AGARICVM.

Censura XLIII.
de Agrico.

Longe ab omni scopo eos medicos aberrare scribit Lusitanus, qui Agarico in pastillis conformato passim vultur, nona sua quadam opinione ductus, quod Agaricũ contritũ nullo pacto diu suas vires seruare possit. At nos illum errore sane longe maiori procul dubio duci censemus, eoq̃ præsertim, quod nullam afferat rationem, nec probatissimorum scriptorum auctoritatem, qua suam fulciat sententiam. Porro Mæsus clarissimus inter Arabes, & qui in componendis medicamentis primas tenet, Agaricũ in pastillos redigi suadet, ut una cum iis, quibus excipitur medicamentis tractu temporis debũt acquirat mixtionem: id quod expedit omnibus cõpositis medicamentis. Nõc videtur tam facile quicquid tenuium partium in eo extiterit (ut fraxolis admodũ verbis contendit Lusitanus) eu miscere possit. Sequiam cum Mæsi pastilli de Agarico Salems fossilem, Gingiber, & Ox. meica cõplant: non sane constat, cur tam facile tenuior Agarici pars in anã resolui possit, cum nielles proprium

primum fit in suo vigore admixta diuina afferuare, Salis vero & Gingers: hanc medicamentis facultate augere. Frustra quidem tot cataplasmae massae, quae Agaricum excipiunt, Septisacrosedat afferuare, quin & Elethuarium alium ducentia, si Agaricum in puluerem us additum quatuordecim deperderet vires. Frustraque illud in Theriaca addidisset Andromachus. Quamobrem omnino expugnanda erit Lusitanus sententia qui praeter omnium clarissimorum virorum placita, solus iubeat Agaricum ea ipsa labora esse contumendum, ac alius addendum medicamentis, qua expedit illo uti.

RHABBARARVM.

Ceterum de Rhabbarbaro scribens Lusitanus, medicos illos magno teneri errore contēdit, qui tostum, vel **10** acridinem abradant. Quare suadet, ut à Rhabbarbaro in dysentericis omnino abstinere medici. Atqui si Rhabbarbarum dari liceat, nonustum, neque, assum esse propinandum, sed crudum, hac tamen conditione ut prius anferantur ab eo tenuiores partes. Id quod facile (ut ipse ait) efficere potest, si ex aqua Plantaginis vel Rosarum maceretur. Verum Lusitano maxime refragatur Mesues, ubi Rhabbarbarum vult, expendit his verbis. Rhabbarbarum tostum dysentericis probe confert. Et paulo superius ait, Quod si post huiusmodi functiones videra adstrictione roborante egerint, ipsum quidem Rhabbarbarum in puluerem contritum exhibendum fuerit, ad illud quod igne torrescit, vehementer operatur, ac etiam vehementius id quod coëburitur. Hac Mesues. Seca iudicat etiam Galenus, qui lib. 9. de Compositione medicamentorum secundum locos, combusta torrescit, et medicamenta dysentericis dare suadet, nempe Cochleam, Cornu Ceruinum, Opium, Gallas, Malicorium, Sini corticem, Hyoscyamum, Acatiam, & **20** alia plura vino nigro excepta Praterea XI. de Simpl. cum medicamentorum facultatibus, exustis etiam Cochleam cum Galla & Piperi dysentericis commendat. Quibus sane patet non modo hoc in medicamento spernere Galenum Cochlearum, & Gallarum combustarum acridinem, sed etiam addere Piper acerrimum medicamentum huiusmodi medicamentis nulla dubitatione reuertitur etiam posteriores Graeci, Paulus (inquā) Orbasius, Aetius, Alexander. Adde quod ubi intestina v. e. v. fuerint affecta, Auripigmentum, Sandarachum, Alummen, Calcem, Aeris squamam, & alia plura ex acridia medicamenta clysteribus infundunt. His itaque, palam est, combusta, tostaque, medicamenta non modo nullo prorsus incommodo dysentericis dari posse, sed magno sane inuamento, quod crudis longe magis exiccet, ac etiam adstringant: At si vsta, & in cineres versa dysentericis tunc exhibere suadent tot grauissimi auctores, cur illius vstam Rhabbarbarum interdicit Lusitanus, cōscere nequeo. Nam si Medicorum omnium consensu, dysenteria affecti alii debent assatis volatilium carnibus, oiorū vitellis ignitis tegulis tostis, & aliis quā plurimis alimentis fixis, torrefactisque, cur igitur a Rhabbarbaro illo fuerit **30** abstinendum, nulla penitus (ni fallor) sese offert ratio. Porro ad aliud Lusitanus pigmentum quo fretus ait plures vidisse Lusitanos sui generis homines dysenteria affectos vsti Rhabbarbari potu interisse, nil aliud respondendum in praesentia succurrit, quam quod nobis minime sit approbandum, cum sexcentos homines ad vitam reuocatos se iam vsti Rhabbarbari potu. Equidem non possum non mirari Lusitanum, quod sua tantum gentis Lusitanos Rhabbarbari vsti potu interemptos in exemplum adducat ac stultitantum fuerit letale medicamentum, cum antea usque et ipse testantur scripta, toto fere aetate sua decursu apud inferiores Germanos primū, & deinde apud Italos suam exeruerit medicinā Demirorū, quod ita temere quasi diuinitus edoctus affirmare non sit veritas potius ex Rhabbarbari vsti potu interisse eos, quam ex morbi natura, quā hac sciri non possint. Prater id, **40** mihi nunquā persuasum velim, longe magis dysentericis Rhabbarbarum illud profuturum, quod aqua Plantaginis vel Rosarum fuerit maceratum, quam tostum, vel vstum. Quandoquidem, Galeni testimonio, assatis vsti, quod plurimum sitentis ad vstionem, medicamentis confert. contra vero euenit ut quae aqua maceratur. Sed hac fortasse in medium adducit Lusitanus Aucenna testimonio confusus quod dysentericis Rhabbarbarum nullū vstionem assationemque, expertū ex plantaginis aqua bibendum suadet, quod fortasse nescierit Rhabbarbarum nil aliud Aucenna designare interpretis lapsu, quam Graecorum Rhabbarbarum. Quo locum nulla d'edictoria vi polleat, citra vstionem, assationemque, propinat Aucenna ex Plantaginis aqua, nec id macerat, ut sibi fingit Lusitanus.

Censura XLIII. de Rhabbarbaro.

Rhabbarbarum totum dysentericis maxime conuenit.

Lusitani insectū in censendo Aucenna Rhabbarbaro.

CHAMÆLEO ALBUS ET NIGER.

Ac cum illi Chamæleonem album censeat esse stirpem spinis undiq, horrentem folio grandi, lactis quasi maculis interitis quam quidam Carduum Maria, quidam a maculis Carduum Lactarium vocant, quidam **50** Suarum, quod eosnes pascantur, qui eius opinionem improbe? cum Chamæleo albo nullam producat caulem Dioscoridi, sed e medio spinas echinatus Cinare modo. Carduus autem Lactarius caulem profert bicubitalem & quandoque maiorem adnatis pluribus referunt longis pedunculis, Radici nulla est odoris praesentia, nec Chamæleoni facultas. Siquidem dextera Dioscoridi testimonio, canes, sues, muresque necat. Contra vero nec suos non modo alit, sed etiam saginat. Vnde et nomen. Postremo albo Chamæleoni, Theophrasti testimonio, capax requiritur magnum Acano simile, non autem paruum qualem Lactario Carduo spectatur. Sed qualem in albo, talem & in nigro se declarat Chamæleone, existit: mans hunc inter illud Cardui genus, quod a Carduo Lactario nulla alia dignoscitur differentia, quam quod huic folia non sint lacteis illis maculis respersa, sed potius nigricantibus. Cuiusmodi comprobabitur: Spinae huius caulem non rubrum, nec dodrantalem, sed bicubitalem, ac colore viridem effert. Deinde huic flores non sunt versicolores, sed purpurei. Praterea Carduus hic radice nititur alba, integrasque, non Chamæleoni nigri modo exterius nigra, interius vero flava & pluribus **60** in locis excisa non acris, sed potius subamara. Adde quod Dioscoridi Nigri Chamæleoni folia requiruntur rubro colore distincta, non maculis infecta nigricantibus. Quibus certum facit omnibus, quanta iudicis maturitate in plantarum censura ducatur Lusitanus.

Censura XLV. de Chamæleonibus.

CROCODILIVM.

At quam nec sui se praestat dissimilem in Crocodilio? Eam hanc opinatur esse stirpem, quā vulgus herbariarum Carlinā appellat, ea tantum ductus ratione, quod hac non solum in siccis, sed etiam in arenosis, ut **Cens. XLVI. de** **Crocodylio,** **quod** **Carlinam** **faciunt.** **quod** **si** **sentibus** **nascatur** **locis.** **Sed** **cautus** **non** **leuiter,** **quod** **Carlinā,** **quae** **caulem** **profert,** **adeo** **omni-** **bus** **in** **uniuersis** **notis** **nigrum** **Chamæleonem** **representat,** **ut** **nensis** **quā** **qui** **persuaderi** **possit** **eam** **esse** **Cro-** **dilium.** **praese** **ntium** **facto** **periculo,** **is** **sane** **viribus** **non** **praestet,** **quibus** **praestare** **Crocodylium.** **Dioscorides,**

Crocodili mira
vis.

Galenus, Plinius, ac alii plerique posteritatis memoria prodiderunt. Crocodili enim decoctum (hominum omnium testimonio) potui datum sanguinem copiosum per nares pellit. Quod si praestaret Carlina radix, magno admodum pretio aestimaretur à Medicis. Adde quod Crocodilio radix sit longa, lenis, aliquantulum lata, odore, ut Nasturtio, acuto: Carlina vero crassa, rotunda, aspera, inaequalis, exesaque, nullo Nasturtii odore praedita. Adhuc Crocodili semen, Galeni testimonio, acre, odoratumque percipitur: qua facultates in Carlina proculdubio desiderantur.

POTERIVM.

Censura XLVII.
de Poterio, quod
Prunū syl. facit.
Cornacius re-
prehenditur.

Poterium eam vult esse arbusculam, quam Germani Schleben, nos vero sylvestrem Prunum nominamus, quod idem existimavit Cornarius vir alioqui insignis, cuius opinionem magis hic sequitur Lusitanus, quam genuini Poteris historiam. Ego vero nihil hic contra Cornarium dicam, quem vir Clarissimus Fuchsius pluribus argumentis copiosissime refellit. Quocirca his iam super sedemus, solum, ut nostri memores instituti, dicimus utrumque deceptum, & plurimum aberrasse Lusitanum, quod sylvestris Prunus potius inter fruticosas arbores recenseri debeat, quam inter herbas: item, quod nulla penitus conuestiatur lanugine, quod item ramulis non habeatur longis ac tenuibus Tragacantha modo, sed breuibus, solidis, duris, contortisque: quin nec fructu est acuto nec odorato, sed inodoro, austero, adstringenti admodum succo: adeo ut qui dixerit sylvestrem Prunum esse Poterium (Cornarii, & illius pace dixerim) Tiresia cecior dici possit, vel mente captus. Quo fit, ut mirari non debeant medici, si clarissimus ille Fuchsius plura in Cornarium uberrime conscripserit.

Fuchsi laus.

LEVCACANTHA.

Cens. XLVIII. de
Leucacantha.

Nec à seipso dissentit, quod etiam Leucacantham herbam eam esse arbusculam contendat, qua in seipso, & frutetis provenit, folio Pyri, fructu in maturitate nigro, ligustrinis baccis non ab simili, è quibus elegantissimum colorem viridem parant pictores. Quandoquidem Dioscorides hoc loco de aculeatis herbis egit, non autem de arboribus. Adhuc arbuscula haec, quam nos vocamus Spino Merlo, quidam vero Spino Zerbino, Cyperi radices non habet, sed arboreas, lignosas, longas, pradurasque, austero sapore, nulla admista amaritudine, adeo ut nihil succi inde exprimi possit, etiam si arctissimo prelo stringeretur, quum tamen è Leucacantha radicibus succum exprimat Dioscorides, adrupta & conuulsa sananda.

CRETENSE DICTAMNUM ALTERVM.

Censura XLIX.
de altero Cretense
Dictamno.

Ceterum & de altero Cretensi dictamno cecutisse Lusitanum non ambigimus, quippe qui scripsit videri hoc non modo in hortis sed etiam in siccilibus ad fenestras frequenter reponi folio (ut illius verbis utar) Crefonis, flore pulchro, purpureo, qui fructus odorem ex se refert, qualem ex flore Naratii oriri videmus. Sed quam sibi ipsi imponit primum quod hoc Dictamnium Theophrasti testimonio in Creta tantum proveniat. Id quod videtur etiam fateri Dioscorides, cum dicat, & hoc ex Creta ad nos aduehi. Praeterea quod non scripserit Dioscorides, quin etiam nec Theophrastus, nec Plinius Dictamnium hoc folio esse Sisymbrium Aquaticum, quod Lusitanus, vulgus sequutus, Crefonem appellat sed Sisymbrium absolute, quod indicat, hos praclarissimos auctores de primo Sisymbrium genere intellexisse. Sisymbrium enim primi generis, folio est Mentha, rotundiore tamen, non autem Eruca, qualia sunt Crefonis folia, qua an magis Dictamni foliis sint comparanda, quam primi generis Sisymbrio, si diiudicent, qui rem herbariam doctissime proficiunt. His accedit, quod Dioscoridibus se Dictamni folia odorem ex se mittunt medium inter Sisymbrium & Salniam, a quo omnino eum diuersum putamus, quem Arantiorum flores suavissime fundunt.

CALAMINTHA.

Censura L. de Ca-
lamintha.

Censura LI. de
tertio Calamin-
tha genere.

Et quod Ferrarienses, & Longobardi Gattariam herbam Neuedam (quasi Nepetam) vocent, magno errore sibi persuasit Lusitanus, Gattariam hanc esse secundum Calamintha genus: sed aberrasse videtur, quippe Dioscoridi Calamintha secundo loco posita, folio est Pulegii, ut & sapore, non autem Apiastris, vel Pruticis, quibus Gattaria vocata maxime visitur amula. Nec minus item decipitur in censenda tertii generis Calamintha, quae crediderit hanc eam esse, qua passim in Italia utitur Seplasia. Patet error, quod haec folia habeat Pulegio grandiora, rotundioraque, non autem praelonga Mentastri modo, cui tertiam Calamintha simile secum Dioscorides.

SAMPSYCHVS.

Censura LII. de
Sampsucho.

Lusitani leuitas.

Quanta sit Lusitani inconstantia, quanta in nos inuehendi fraus, quantaque is suscipi capiat obliuione, si facile intueri poterit, qui legerit eius enarrationes lib. 1. in Olei Sampsuchini confectioe, & lib. 3. capitulo proprio de Sampsucho. Quandoquidem lib. 1. apertissime contendit aduersus nos scribens, Dioscoridi Sampsuchum nulla ratione esse Amaracum & ob id plura ibi in nos machinatur, ut in Apologia superius premisimus. Libro vero tertio euidenter fatetur magno sua leuitatis dedecore nil aliud esse Sampsuchum, quam Amaracum, vel Maioranam. Quare non modo seipsum euidenter confutat, & grauissime vulnerat, sed etiam palam declarat, non aliam ob causam nostram impugnasse sententiam, quam ut nobis aduersaretur, & quocumque modo suum virum in nos euomeret. Tanta in nos inflammatus rapitur cupiditate, qua mentem ei excacet, memoria tollat, & insano quodam modo seipsum destruat, ac pene subuertat.

RUTA SYLVESTRIS.

Censura LIII. de
Ruta syl. quam
Caryoph Indica
facit.

Sylvestrem Rutam, quam Cappadocibus Moly, Syris Besafa, quibusdam vero aliis Harmolam vocari Dioscorides inquit, eam esse plantam existimat Lusitanus, quam Caryophyllos ultramarinos, vel Indicos vulgus appellat, sed manifeste decipitur. Quandoquidem haec verba praeter id, quod folia Ruta non proferat, flores anteos gerit magnos, ad luteum vergentes, non, ut Ruta sylvestris, candidos. Quin etiam capita non prodeunt, alterius Ruta modo sed longa pluribus eminentibus costis striata. Praeterea, nec semen ille visitur trianguli speciem referens, neque subrufum, sed longum, nigrumque, nulla amaritudine praeditum. Adde etiam quod Galeni testimonio sylvestris haec Ruta radicem proferat nigram, id quod in hisce Caryophyllorum Indorum plantis maxime desideratur.

CVMINVM SYLVESTRĒ.

Sylvestre Cuminum quū non viderit, nec nouerit Lusitanus, illud Officinis rusticum Cuminum vocari ait. Cens. L. III. de Syluest. Cuminum
 Sperinde ac si adeo vulgaris notitia fuerit, ut nullo sit opus examine, quum tamen pauci (ne dicam nulli) re-
 priantur Pharmacopœi, qui vnum vel alterum syluestre Cumini genus legitime cognoscant. Nam prater sa-
 tuum, nullam aliud nouere Seplasia. At Amathus, ne videatur id ignorare, syluestre Cuminum adeo vulgare
 facit, ut quis illud apud Myropolas intueri possit. Quo fit, ut recte intuentibus palam sit, non Amathum sylue-
 stris Cumini historiam confundere, sed quid sit syluestre Cuminum penitus nescire, & ignorata, tanquā cogni-
 ta & vulgaris, sateri. Duo enim Dioscoridi, quem nunquam accurate legit Lusitanus, sunt Cumini genera in-
 ter se pluribus repugnantia: sed hac negligens Amathus rem omnem confudit. Siquidem nulla generum habua
 1^o differentia absolute protulit syluestre Cuminum, Officinis Cuminum rusticum vocari, quum tamen non desint Cens. LV. de co-
dem.
 rei herbarie peritissimi, qui haecenus de syluestris Cumini generibus nihil affirmant:

CORIANDRVM.

In censendo Coriandro quam non hallucinatur, nō decipitur, sed pene delirat: quod vulgaris usus Coriandri Cens. LVI. de Co-
riandro quod
dicitur summa
veterum.
 scribat, non esse antiquorum Coriandrum, sed illis Coriandrum fuisse aliam plantam Cicutariam dictam,
 folio nostratis Coriandri simili. Id quod tueri nititur hoc tantum argumento, quod Coriandri plantam Hispani
 nullo incommodo oleraceis cibis admisceant. Quin & quod eius semen odoratiū sit, & eius pariter herba optimi
 sit odoris vel saporis. Caterum hac quum legissem, mirari sane desii, quod alia etiam innumera deliramenta in
 medium adduxerit. Quis autem (Dij boni) Lusitanum hunc negantem, imo & amentem ignoret, quum dicat
 2^o Coriandri vulgaris herbam odoris quidem fatidissimi lellulariorum camicum, instar optimi esse odoris Lusitani in
gait
amentia
 ac saporis? Equidem censebam utero tantum gerentes mulieres citra picam, corripiri posse. Sed (ut video) Ama-
 thus etiam eo morbo laborabat, quod fortasse ob multam praestitam in re medica operam, & ob magnas illas
 Centurias adeo innumuerit, ut pregnantis similis euaserit: Vel q̄ fortasse Coriandri tantum inter olera esitauerit
 in Hispania eius saporis, odorisq̄, praestantia allectus, ut inde facile amentiam contraxerit quam facere Coriā-
 drum scribit Dioscorides, ubi largius assumatur in cibum. Quo postea factum est, ut inde Amathi nomen fue-
 rit consequutus. Prater ea cur suam probare possit Amathus stultitiam, quod Coriandrum communis usus, ve-
 terum Coriandrum non sit quod in cibo acceptum nihil mali inferat, nihil sane rationis adduci potest. Quan-
 doquidem etiam Galeni tempore Coriandrum in obsoniorum venerat usum, ut ipse testatur Galenus libr. 2. de
 Alimentorum facult. & libro de Attenuante victus ratione. Quin & Dioscorides non nisi a largiore Corian-
 3^o dri esu abstinere prohibet. Proinde mirum non est, si cum aliis oleribus pro obsonio deuoratum nihil incommo-
 di afferat, perinde ac Papaner.

PETROSELINVM.

Genuinum Græcorum Petroselinum idem quod Seplasia, & Herbariorum vulgus passim Apium vocant, Censura LVII.
de Petroselino
est apium.
 magno sine lapsu esse credit Amathus, quod hoc Paludapium sit in hortis translatum, & vigenoso
 solo gaudens. Contra vero Petroselinum, quod Dioscoridis & Galeni testimonio, in praruptis & saxosis monti-
 am locis, ut ipsamet indicat nomenclatio, tantum proveniat, semine Ammi odoratiore, sapore acri aroma olen-
 te. Id quod in communi Officinarum Apio nusquam percipitur.

ELAPHOBOSCVM.

Er rare in Elaphobosco non modo Amathum censemus, sed pro more etiam falsa narrare scimus. Nam ut Cens. LVIII. de
Elaphobosco
 seipsum praeclarum ostendat, ait in quarendo Elaphobosco sibi adiunxisse duos doctissimos viros, quos etiam
 nominat. At quum horum altera, cuius in commentariis nostri, pluries meminimus ob praestantissimam eius do-
 elrinam, integritatemque, mihi pluries affirmauerit illum nec nouisse, nec fortasse vidisse unquam, quod illi Amathus in fido-
litatis arguitur
 credam, non habeo.

COLLUTEA.

Colluteam quibusdam rei agrariae authoribus Alburnum vocari affirmat, si alio vero vulgo Aorno. Verū Cens. LIX. de
Collutea.
 quantum ego legi, cum Alburnum planta non sit, sed pars tantum arboris, idem qui semper fuit deprehe-
 ditur Amathus, Plini primum testimonio, qui lib. 16. c. 18. de Alburno haec scriptis mandauit. Humor & cor-
 1^o tici arborum est, qui sanguis earū intelligi debet: pro cute cortex est. Proximi pleriq̄, adipos. Is vocantur a colo-
 re Alburnum, mollis ac pessima pars ligni, etiam in robore facile putrescens, teredine obnoxia: quare semper am-
 putabitur: hoc ille. Quibus facile Amathi conuincitur ignorantia. At si fortasse, ut nostram effugiat censuram,
 dixerit, non dixisse Colluteam vocari Alburnum, sed Laburnum, & id erroris in Typographum reieceris,
 facile responderi poterit & hoc esse falsum. Quandoquidem Laburnum, teste Plinio, Alpina tantum est
 arbor dura, & candida materie, cuius florem cubiti longitudine apes non attingunt. Id quod in Collutea sa-
 ne desideratur, quum hac Alpina non sit sed ubique fere proveniat, materie non alba, sed exterioris buxæ, int-
 dallius nigra flore non cubiti longitudine, sed breui, Genista modo.

SENA.

Ceterum magno etiam errore scribit Senā herbam aluim exoluetem eam esse plantam (ut ipse opinatur) Cens. LX. de
Sena quam Col-
lyream statui.
 que Theophrasto Collyrea appellatur. Nam cū apud Theophrastum duplex sit Collyrea, nec de qua intel-
 ligat explicet, non solum hallucinatus deprehenditur, sed & confusus, adeo ut quid sibi velit nesciat. Prater-
 ea cum Collyrea utraque Theophrasto lib. 3. cap. 14. & 17. de historia plantarum arbor sit non herba, & utrius-
 que meminerit inter arbores, minus constare sibi vana Lusitanus potest opinari.

GLAUCIUM.

Nisi alium prater se testem adduxerit Lusitanus, qui Glaucium herbam apud Louanienses viderit, quæ cū Cens. LXI. de
Glaucio.
 Dioscoridis historia concordet, ego illic credam? Nam cum illum tam sepe hallucinatum offenderim, ac Glaucio
 fabulosum, vitio mihi dandum non censeo, si nisi dato pignore illi non crediderim.

ALYSSVM.

Censura LXII. de
Alyssis, dū Diosc.
& Plinio idem
esse vale.

Nullam constituit differentiam inter Dioscoridis Alysson, & Plinianum. Sed quoniam penitus neutrum intellexit? Siquidem Dioscoridi Alyssum exiguum est frutex unicus, subasper, rotundis foliis, fructu duplicium scutorum effigie, quad antenus latum, in montibus & asperis locis emicas: qua sane omnia in sylvestri Rubia, qua Plinio Alyssum est, desiderantur. Siquidem hac non adeo exigua est planta, sed plerumq; bicubitalis, non uno tantum caule crescens, sed pluribus foliis minime rotundis, sed stella modo decussatis, semine rotundo non lato, nec duplex, nec simplex scutum referente. His accedit, quod Dioscorides de utraq; Rubia, maiori nempe & minori tradidit, uno & eodem capite. Id quod illum fecisse putandum non est, si Sylvestrem Rubiam ab Alyssodiversam non indicasset, de quo prius dixerat eodem libro.

ATTRACTYLIS.

Censura LXIII. de
Attractylide
quam Cnicum
Syl. alterum cēset.

Redit austerus & immitis censor? virgam, vel fustem potius profert. Eiicit omnes ex medicorum, id est, ex suo senatu, & gravissime hallucinari eos contendit, qui negant Attractylida alterum Sylvestris Cnici esse genus, eo argumento innixus, quod scribat Plinius, primam sylvestris Cnici speciem Attractylida quibusdam vocari, sed, quantum videre aut conicere possum, Amathus ipse potius hallucinatur. Nam quamvis scribat Plinius primi generis sylvestre Cnicum quibusdam Attractylida nuncupari, non tamen affirmat, Cnicum illud esse Attractylida, nec eorum recipit sententiam, qui putant genuinum sylvestre Cnicum nihil ab Attractylide differre, quemadmodum superius diximus de Telephio differetes, Telephium non propterea esse Sempernium minus, quod hic etiam Telephium (ut Dioscorides scribit) quibusdam dicatur, nec Helxinen Parthenium, nec Asplenium Hemtonium: quoniam iis etiam nominibus a nonnullis appellantur. Quamobrem Plinius ipse eodem libro speciatim de Attractylide egit his verbis: Acarna colore tantum rufo a Scolymo distinguitur, & pinguiore succo. Idem erat Attractylis quoque, nisi candidior esset, & nisi sanguineum succum funderet, qua decansa Phonos vocatur a quibusdam, odore etiam gravis. Quibus palam est, Plinio Attractylida nullum sylvestris Cnici esse genus. Id quod maxime attestatur Theophrastus lib. 6. cap. 4. de plantarum historia. Is enim postquam de omni Cnici genere differuit, de Acarna, & Attractylide speciatim egit. Adde quod experimento etiam, liquet, neutrum sylvestris Cnici genus sanguineum succum fundere. Unde Amathi minus probari potest sententia.

TEUCRIVM.

Censura LXIII. de Teu-
crio quod San-
guisorbam dicit.

Amathi opinio
explora.

Sanguisorbam quam Itali Pimpinella proprie appellant, quamq; frequentissime in acetariis addunt, Amathus Teucrium esse indicat. At in pristina sua versatur cecitate, quippe cum scribat Dioscorides Teucrium herbam virga effigiem referre Trisaginis similitudine, facile palam fit inter Teucrium & Sanguisorbam maximam intercedere differentiam. Siquiae hac nobis Pimpinella vocata in unceis constat cauliculis foliis utringq; pinnatis, nullam virga effigiem, nec Trisaginis formam referentibus. Quod vero Pimpinella hoc nomine sit appellata, eo quod odore sit Citruli, quem Hispani Pipinam vocant, nobis probare non libet, quum compertum habeamus, vocatam fuisse primum Pimpinellam a bipinnatis cauliculis, unde postea corrupta appellatione Pimpinella est appellata. Nam cum nullo Citruli odore vel sapore sit praedita, cur Amathi sententiam probem non video.

LYCHNIS.

Censura LXV. de
Lychnide.

Quod Lychnidis viridibus foliis scribit Amathus, quod scilicet ea oleo illita igne flagrent, & inde nomen traxisse stirpem fabulosa omnino videntur, cum re vera Lychnidis folia, non viridia, sed sicca ad lucernarum usum pro elychnio usurpauerit antiquitas, unde sibi nomen inuenit, non quod viridia flagrent, ut Amathus putat. Quippe λυχνιον Gracis lucerna dicitur, & λυχνιον funiculus, qui est gossipio lucernis indicitur ad ignem excipiendum. Sunt enim Lychnidis folia admodum villosa, tomentosaq; & proinde arefacta ignem facile concipiunt, perinde ac illius Verbasci folia, quod Lychnide ab eodem effectu pariter appellatur.

MARTAGVM.

Censura LXVI. de
Martago.

Martagum flores edere Lilio albo similes, sed croceos assenerat, & proinde Martagum Plinio eam plantam esse existimat quam ipse ab Hercule Petilium vocatam scribit lib. 21. cap. 8. At demiror, ubi Lusitanum, qui tanto usu, tanta omnium rerum peritia est praeditus, Martagum viderit croceos emittens flores. A sibi enim ante hunc diem, id est inauditum, cum flores proferat purpureos, rubentibus quibusdam punctis respersos. Id quod manifeste arguit, Hemerocalem pro Martago accepisse Lusitanum. Namq; is flore constat aureo Liliatum facie, tum etiam magnitudine. Ceterum an Martagum, vel Hemerocallis Petilium sit a Plinio descriptum, fateri sane non ausim, quum Petilium, Plinii ipsius testimonio, autumnali tempore floreant inter vepres colore rose sylvestris, illa vero cum aliis Liliis media floreant estate.

TRIFOLIUM.

Censura LXVII. de Trifolio, ubi
pratense cum
bituminis idem
facit.

Quod Bituminosum Trifolium nunquam viderit noueritq; Lusitanus, hoc argumento facile conici potest, quod asserat pratense Trifolium omnibus vulgo notum primo Rutam olere, ubi vero adoleverit, Bituminis odorem reddere. Atqui hoc falsum esse unicuique constabit, qui pratensis Trifolii odorem olfactu explorauerit. Siquidem id nec Ruta, nec Bituminis quicquam ullo tempore respiciat. Etenim aliud genus est a communi Trifolio, quod Graci Asphaltite, ab odore nos Bituminosum vocamus. Iccirco recte scripsit Plinius lib. 21. cap. 9. Trifolii tria esse genera: Asphaltite aliud, aliud acutum, Minutum item aliud, quo prata fere omnia scatent. Hinc itaque apertissime constabit, pratense Trifolium longe ab Asphaltite diversum haberi, & Lusitanum non paruo in errore versari.

AMBROSIA.

Censura LXVIII. de
Ambrosia que
illi Tanacetum.

Ambrosiam ait ille esse herbam quam vulgo Tanacetum vocant Seplassis. Verum patet eum non mediocriter lapsu. Siquidem Ambrosia, Dioscoridis testimonio, pusillus est frutex, adeo ut trium palmorum longitudinem non excedat, foliis exiguis circa ipsum caulem, Rutam referentibus, cauliculis perinde quasi racemulibus.

lis grauidis, qui nunquam florent, odore vinoso suauis, radice tenui, se quipedali, que omnia in Tanacetis maxime desiderantur. Nam, Tanacetis bicubitalis gerit caulos, ac etiam quandoq, longiores folia non Rusa, sed Tanacetis maioris. Altillefolii amaro sapore, flores aureos globuli modo colore (quod maxime refert) grani, ac ingrato. Nullos fert hęc plantaracemos cauliculis appensos, nulli ubi vinosus odor, nec altas suauis. Illud etiam addi potest, quod Tanaceto nusquam visa sit radix sesquipedalis, sed breuis, & superuacua.

GNAPHALIVM.

A Deo breuiter, perplexeque Gnaphali historiam scribit Dioscorides, qui etiam Plinius illum sequutus, non decernas, quamam planta ex his, qua in ipso natura viridario colitur genuinum Gnaphalum representet. At Lusitanus qui hac, quemadmodum & cetera, leuiter admodum expendit, quandam herbam Gnaphalum esse asserit, qua Anconitanis Zigi appellatur, ea tantum ratione ductus, quod hac planta tenuibus foliis, mollibus, albicantibusq, quibus tamen plura habeantur herbaram generis, qua his nouis insigniantur, perinde ac herba illa, qua vulgaribus herbariis Gnaphali nomen meretur. Etenim adeo Plinius impiam representat, ut posthac ambigendum non sit, quin Impia nobis sit desideranda.

Cens. LXXIX. de Guaphal u.

OENANTHE HERBA.

Recentiores quosdam sequutus Oenanthem eam vult esse plantam, quam Filipendulam vocant, cum patris Oenanthē. Dioscoridis testimonio caulem crassum palmi longitudine gerat, semen quale in Atriplice spectatur radicem magnam in multa rotunda capitula exuberantem, nascaturque in petris. At longe aliter prouenit Filipendula. Etenim non in petris, sed in pratis, & lato solo nascitur, radice nusquam magna, qua rotunda capitula exuberet, sed sili modo tenuis pluribus appensis globulis non rotundis, sed potius glandiam figuris, ut in peonia, sed longe minoribus, unde illi nomen. Semen praterea Atriplicis illi non inest sed globuli in sili quadruplici apice mucronati, ut in Buxo: quia nec caulis illi visitur crassus, sed tenuis non palmari longitudine sed bicubitali. Quibus palam esse non ambigimus, Oenanthem a Filipendula quam maxime abesse.

Cens. LXXIX. de Oenanthē herba, eius Filipend. det. pau.

PHYLLVM.

Dum in Phyllo Ruellii sententiā improbat Lusitanus, se ipsum ignorantiā manifeste accusat his verbis: Illuc Raellius alterā Persicariā esse credit quo vero iudicio alii iudicent. Est vero hodie herbulis quadā, vni cotantum ornata folio, & inde Vnifolium dicta, Semen racemosum serpentis similitudinem ferens. His herbis illam describere videtur Lusitanus, quam quidam Ophioglossum, id est, serpentinam linguam vocauerunt. Sed plurimum is a veritatis scopo, & a veris ipsius herba delineamenti digreditur. Etenim preter id quod semen racemosum non proferat id nullā serpentis imaginem ostendit, sed serpentis potius linguam imitatur. Id quod certo arguit Lusitanum, hanc plantam negligenter admodum examinasse. His accedit alius illius lapsus, quem affirmauerunt Dioscoridis Phyllum esse Ophioglossum, cum nullis prorsus notis conueniant.

Cens. LXXI. de Phyllo, quod Ophioglossum facit.

Cens. LXXII.

HORMINVM.

Aliorum quorundam insistentis vestigiis pro certo assenerat Horminum eam esse, quam quidam Sclaream, alii Matrisalviam, nonnulli herbam S. Iohannis vocant. Sed sum Horminum Dioscoridi plāta sit Marvubio similis, caule semicubitali, circa quem eminentia siliquarum forma prodeant ad radicem spectantes, in quibus semen includitur oblongum nigrumq, neuiquam crediderim, Sclareā ipsam, qua miro odore fragrat, esse Horminum. Quandoquidem hac folio est Verbasco, non Marrubii, caule bicubitali, non semicubitali. Praterea Sclareā caulis nullus vestitur siliquis, sed rami, qui ex caule ipso produnt multi. Adhac siliquula in quibus semen concluditur, rotundum, non oblongum ad radicem non spectat sed ad verticem. Adde etiam, quod nulla odoris praesentia Horminum commendauit Dioscorides. Etenim illius odoris fragrantiam nunquam silentio inuoluisset Dioscorides. Quo fit, ut cum hac non perpenderit Lusitanus, aliorum tantum opinione imprudens abtutus errauerit una cum illis, quorum sequitur error.

Censura IXX. de III. de Horm. no. quod Sclareā statua.

ONOSMA.

Onosma inter vulgares Rapunculos, quibus passim videntur in acetariis, nasci Lusitanus scribit, qui & illis adeo Onosmam simile facit, ut difficile ab ipsis dignoscatur. At quā Onosma folio sit Anchusa, Dioscoridis testimonio, que non minus distat a Rapunculo, quam equus a lepore, siliico frivolum, & stolidum nimis, ut ceteras omnes, opinionem induit Lusitanus. His accedit quod Onosma non nisi in asperis nascitur, radice sanguineum succum fundente: id quod maxime desiderari potest in Pseudorapunculo illo, quod in radice sit alba, tenuis, ac superuacua, nullo unquam tempore cruenta.

Cens. LXXXIII. de Onosma, quod Rapunculum fecit.

ANTYLLIS.

Quia & in Antyllide censenda plurimum decipitur, cum vult, quinimo & affirmauerit, eam legitimam, genuinamque esse Antyllidem, qua Mauritani Kali, sine Alkali appellatur, cuius cinere videntur ad conflanda vitra. Error non magno negotio deprehenditur. Etenim cum Dioscoridi dua sint Antyllidis species, altera qua Lenti sit similis, foliis mollibus, ramulis rectis, palmi altitudine, altera vero foliis Anthe hirsutioribus, non video cur credam Alkali Antyllidas utrasque referre, quam nullis conueniat, notis: quippe Alkali, cum primum e terra emerferit, folio est teretis, pinguis, minori Sedo non ab simili, quod postea in dodrantalem, fere longitudinem, adolescit, geniculatimque protrahitur Equiseti modo. Quam uero iam adoleuerit (ut de Trago differenter in Apologia superius diximus) prodeunt, e geniculis, sili pinguis, crassaque, incurua, ex lata origine in acutum desinentia. Ubi vero ad summum plantae excreuerit, in caulium cacuminitibus longe minora exilioraque spectantur rufo colore, a quorum exitu parua rotundeq, pilula prodeunt, in quibus semen minutum concluditur. At quoniam huiusmodi planta tam varias mutationes non animaduertit Lusitanus proinde factum est, ut ipse crederet Alkali diuersae, & generis quorum unum alteram Antyllidem, aliud secundam esse contendit. Sed cum Alkali nullam cum Anthe habeat similitudinem, cui alteram Antyllidem similem fecit Dioscorides, nec foliis unquam hirsutis sit visa nec vlla ex parte

Cens. LXXXV. de Antyllide quam Kali censuit.

Alkali deserti

parte Lentis figuram referat, cui prior Antyllis est amula, fateatur ex veteri suarum opinionum promptuario constanter hac se protulisse Lusitanus. Adhuc cum ipse de Trago agens asserat Alkali esse Tragum, deducor in eam opinionem, ut credam Lusitanum Circa veneficis incantationibus imbutum, unam & eandem plantam in varias transmutare formas. Quod in Alkali factum videmus, quam nunc Tragum nunc Antyllidem facit.

LITHOSPERMUM.

Censura LXXVI.
de Lithospermo
quod lacrymam
statuit.

Lacrymæ de-
scrip.

Genuinum Dioscoridis Lithospermum eam memorat esse plantam, quæ globulos illos (lacrymas vocant) mittit, quibus utuntur funiculo traiectis ad numerandas preces. In quo manifeste peccat, quoniam Dioscoridi Lithospermum planta est foliis Olea longioribus, latioribusq; ac mollioribus, humi accubantibus ramulis, rectis, tenuibus firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibeant foliis longis, interq; paruum semen, rotundum, Erui parvi (ut Orbasius & Serapio ex ipso Dioscoride transcribunt) magnitudine, nascaturq; in asperis. Quæ omnia in planta lacrymas illas ferente desiderantur. Siquidem hac folia profert Harundinacea, quemadmodum & culmos per intervalla geniculatos, in quibus semen Orobo duplo grandius visitur, quæ quantum cum Lithospermi notis habeant similitudinis, ipse videat. Adde etiam quod Lithospermum in editis & asperis locis per se sponte nascatur: lacryma vero vocata non nisi sata proveniat, erectis omnino calamis, non humi repentibus, ut scribit Plinius.

ALISMA.

Censura
LXXVII. de
Alisma, quæ illi
Plantago aquat.
Plantago aquat.
descrip.

Ceterum Alismam herbam credit Lusitanus Ruellium & Cordum sequutus, eam esse plantam, quam quidam Plantaginem Aquaticam, alii Barbam Sylvianam vocant. sed falsum non obscure liquet. Etenim Alisma folia fert Plantagini similia, sed angustiora, in terram reflexa, laciniataq; caule simpliciter tereti, cubito altiore, capitibus Thyrsi flore candido, pallescente. At plantagini Aquatica folia insunt Plantagine latera, acuto cacumine sursum spectantia, neutiquam laciniosa, caule plurimo adnatis multis referto, nulla Thyrsi effigie, radice inodora, nec etiam acri. Quæ omnia palam faciunt maxime deludi eos, qui una cum Lusitano in hoc versantur errore.

BRITANNICA.

Censura
LXXVIII. de
Britannica quæ
sili Bistorta.

Aliorum iterum adhaerens errori credit nil aliud esse Britannicam, quam eam herbam, quæ passim Septembris, ac vulgaribus herbaribus Bistorta dicitur, eo tantum fortasse argumento ductus, quod hac planta Rumicis sit folio. Verum mea sententia fallitur. Etenim quamvis Bistorta folio sit Lapathi, aut Rumicis nigriore, pilosiore tamen non visitur, sed glabriore, leuioreq; rubeis intercurrentibus fibris, & à terra quadantenus casto, quæ omnia in Britannica maxime desiderantur. Adhuc Britannicæ radix requiritur tenuis, ac brevis: contra vero alteri. Namq; Bistorta radix quandoque nobis visa est brachialis fere crassitudine, bipollicari autè septicime, colore in nigrum rufescente, non (ut in Britannica scribit Plinius) nigro. Præter id Britannicæ radicibus æquam brevis ac tenuibus, nihil virium attribuit Dioscorides, sed tantum foliorum succum ad medicamentum prætulit. At Bistorta contrario modo se habet, cum tantum radicibus præset, & nullus sit eius foliorum usus.

ALTERA CLEMATIS.

Censura LXXIX.
de altera Clema-
tide, quod Flammulam
vult.

Nec minus in altera decipitur Clematide, quippe qui censeat Flammulam vulgo appellatam, genuinam esse Dioscoridis Clematidem alteram. Clematis enim hæc Dioscoridi per arbores reptit, id quod in flammula nusquam mihi videre licuit, cum planta sit recti caulis. Legitimam Clematidem nos eam esse non ambigimus, cuius imaginem dedimus in commentariis nostris, quanquam ob id haudquaquam negabo, Flammulam hanc Clematidis non esse genus: sed non propterea affirmaverim unquam Clematidem alteram esse Dioscoridis.

POLEMONIA.

Censura LXXX.
de Polemonia,
quæ illi Galega.

Arrogantia
Amathi.

Aloysius Mun-
della a calunia
viudicatur.

Nimium additus Brasauoli, viri alioqui eruditissimi, non tam ut veritatem videatur indagare, quam ut pro sua fide, & antiqua consuetudine huius patrocinetur sententiæ, Polemoniam esse herbam contendit, quam quidam Rutam Caprariam, alii Galegam appellant. Multa porro sunt (ut in Commentariis nostris ostendimus) quæ utriusq; sententiæ confutet. Primum si natale solū expendamus, id profecto facile indicabit Galegam non esse Polemontiam, quod hæc in montibus & asperis proveniat, illa in cæpstribus lato & vliginoso solo, adeo ut prope aquas, & in scrobium aquarum marginibus plurimum oriri videatur. Præterea nihil in summis caulibus habet, quod corymbaceam effigiem referat, sed corniculos Fœni Græci amulos, in quibus semen occluditur rufescente colore, quod in Polemonia nigrum requiritur. Hæc itaq; si diligentius explorasset Lusitanus, non ita fortasse facile in Brasauoli sententiæ concessisset. Nec sane video cur sibi tantum arrogantia asseruerit, ut tantum Brasauoli tueri causa, Aloysium Mundellam medicum huiusce tempestatis eruditissimum, & medicæ materiæ studiosissimum, sua tantum garrulitate fretus, adeo temere maledictis conitissiq; lacefferit, præsertim quum pro more illius argumentis quemadmodum & nostris, nihil responderit. Obsecro dicas Amathe, quos furore agitaris: quæ temeritate duceris: ut ausus sis ubi de Sorbis egisti, Mundellam ipsam, virum citra omnem controuersiam clarissimum, Sycophantam appellare? Tu, mihi crede, potius Sycomoros appelladus fueris, cum tantum ad amentias, & fatuitates te procreauerit natura, illum vero ad totius reipublicæ commodum. Depone istum mentem desine impudentissimo isto modo doctissimos viros laceffere. Omnes qui istam in te audient ingratiæ contumaciæ, quamvis de facie te nunquam viderint, quum tamen talem te audierint, nonne stolidum, vecordem, insanum, & omni mentis statu dimotum te indicabunt? Aliter iam pridem nullus prudens de te existimat, hoc unum tibi patet refugium si istius insane dementiæ infames velis delere maculas, ut aliquando te ad mentem renoces, & præstantissimos viros optime de literis meritis o tuo more sycophantas, sed modestius nominare assuescas.

LAGOPVS.

Censura LXXXI.
de Lagopo dum
Trinitatem au-
tumat.

Lagopum magno errore eam plantam existimat Lusitanus, quæ à triplici foliorum apice Trinitas appellatur. Quandoquidem cum Dioscorides, Plinius, & si qui sunt alii, quæ Plantarum historiam scribunt, nullis penitus nominis Lagopum descripserint, non video cur solus Lusitanus divinare velit, quæ oraculo quodam doctus, quænam plin-

is antiquis fuerit Lagopus. Verum quod Trinitas Lagopus non sit, id argumento esse potest, quod ille Plinius & Dioscoridis testimonio inter segetes nascatur in campis, illa vero in frutetis iuxta sepes, & in opacis proximitat.

XYPHIUM.

10 **Q**uod Plinius libro 25. capit. 11. per Xyphium intelligat Pseudoacorum, quod in Paludibus prouenit, flore iureo, Iridis amulo, et Lusitanus perperam intelligit, minime probamus, non solum e ratione, quod Xyphu histori in Plinius accurate, probeque describat, non Pseudoacori sed quod etiam genuinas eius facultates, quas Dioscoridis acceptas facile referre potest, recenscat. Praterea Pseudoacori radicem esse Iridis grandioremem nemo ambigit. At Plinius ibidem recte Xyphio dixit esse radicem Nucis Auellanae figura. Nec obstat quod scripserit is nasci Xyphion in aquosis, Dioscorides vero in aruis, quum & in aruis, & in palustribus locis magis quoque proueniat, et, perinde ac nos, res herbaria studiosos obseruasse non dubitamus. At Plinius qui longe melius Xyphii natale solum explorauerat quam Lusitanus, non aliam ob causam in humidis nasci dixit, quam ut eorum reselleret opinionem, qui Lonchitum a seminis figura Xyphium esse censebat. Hinc itaque is argumentum sumens, probat Lonchitum Xyphium non esse, quod illa in siccis tantum proueniat locis. His alius accedit Lusitanus lapsus, quo facile adducor et credam ipsum nusquam uidisse Xyphium, nimirum quod scribat illi esse radices Caninis testiculis similes, quum nusquam Xyphium reperitum sit, quod Cynorchis modo radices gereret. Xyphii enim radices rotunde sunt & compressa verticilli modo, vel Ibisici seminis instar, cui plurimum asperguntur, in uolucris simul conclusae, is similibus, quibus Croci bulbis contegitur. Quae tamen de his scripturus animaduertisse debuerat Lusitanus.

Censura XXXII de Xypho quod Pseudoacorum fecit.

GRAMEN HARVNDINACEVM.

20 **L**usitani opinionem de Harundinaceo Gramine ea ratione improbamus, quod scribat plantam esse vltimam ad Eridani ripas nascentem, quum & iumentis gratissimum esse pabulum. Nam cum (Dioscoride teste) hoc graminis genus iuxta vias oriatur, non iuxta flumina, non magno mihi negotio credendum fuerit, Aquaticos Calamos, qui prope flumina aquas nasci solent, pro Harundinaceo Gramine accepisse Lusitanum.

Censura XXXIII de Harundinaceo Gramine.

RVBVS IDÆVS.

30 **T**ametsi Idaum Rubum in Idae monte plurimum nasci scribat Dioscorides, & sapius Idaeum pro montano accipiatur: Lusitanus tamen ad Padis fluminis ripas oriri hunc Rubum affirmat. Sed minime vereor, quin pro more caecitatis, quum quae montana sunt, flumina ista fecerit.

Censura XXXIII de Idaeo Rubo.

CHRYSANTHEMVM.

40 **Q**uam nusquam verum Chrysanthemum viderit Lusitanus, quod tamen abundat Italia, passimque omnibus sit notum, quumque oscuranter eius historiam examinasse: apud Dioscoridem, eam herbam Chrysanthemum esse putat, quam herbariorum vulgus, quod unoquoque mense floreat, Calendulam vocat. A parte conuincitur error, quod Chrysanthemum Dioscoridis folia gerat plurimis incisuris densa, id quod in Calendula vocata prorsus desideratur, quum illi minoris Anchusa modo longa spectentur, nullis prorsus incisuris laciniata. Sed id fortasse illum in hanc opinionem adduxit, quod habeantur aliqua Dioscoridis exemplaria, quae habeant Chrysanthemum, quae alii Caltham vocant, &c. Nam quum non desineret herbaria perire, qui Calendulam hanc non sine ratione Caltham esse existiment, ille nominis tantum argumento fretus, neglecta penitus Chrysanthemum historia, Calendulam ipsam Chrysanthemum esse putauit. At si in simplicium facultate ac historia, ut illum sane decebat, se exercuisset, & varia Dioscoridis exemplaria habuisset ad manus, eoque presertim, quae a doctissimis viris magno labore sunt restituta, vidisset quidem in Chrysanthemo non ita densa sed

Censura XXXV de Chrysanthemum quod Caltham voluit.

ASTRAGALVS.

50 **A**stragalum oriri radice rotunda, Raphani modo magna, scribit Dioscorides. Quibus quis facile conuincere potest, Astragalo radicem non esse rotundam in pila modum, sed teretiformis, quum talis sit Raphani radix. Quamobrem in Astragali censura inaniter Lusitanum hallucinari deprehendimus, quod scribat inferioris Germania incolae Astragali radicibus vesci sub cineribus Castanearum modo assatis, easque Inglandum nucum figura, magnitudinisque esse asserit, albo intus colore, & nigro exterius cortice. Hinc itaque suspicor ego Lusitanum pro Astragalo eam plantam accepisse, quae Fuchsio, & quibusdam ex recentioribus, Dioscoridis esse Apios existimatur, quaeque Germanis Erdnussen, id est, Nux terra vocatur. Sed quam magna inter has plantas intersit differentia, Turesia cecior fuerit, qui non viderit.

Censura XXXVI de Astragalo.

ACONITVM.

60 **D**um in censendo primi generis Aconito Fuchsium virum apprimè doctum accusat Lusitanus, ille tamen longe grauius aberrat: quippe qui tanquam caecus indicet de coloribus, & nulla ratione scribat Aconitum Pardalianchen in multis reperiri locis, radicibus nigris ad rubedinem declinantibus. Quibus facile patet lam est, quam fuerit ille negligens in explorandis, legendisque plantarum historiis. Etenim Dioscorides primi generis Aconiti radicem facit Scorpionis caudam emulantem, & Alabastrum modo splendens. Perum an Alabastrum colore sit nigrorufescens, statuarii indicent, & lapicida, & qui Roma columnas ex Alabastrum viderint ad Constantini lauerum prope sacrum Lateranense, & ad D. Agnetis ad extra Timinalem portam.

Censura XXXVII de Aconito.

COLCHICVM.

Quando hic homo semel errandi faciet finem? quousque tot vitis hic omnium caterorum nos obtundet in dex? nusquam ne dubit brexe aliquod spatium in omnibus paginis respirandi? Ibi quoque (ut vere fatear) ad nauseam usque omnia passim Amathi sapient offensa. Tadei omnia huc conuertere, quibus ille summi volumen expoliuit. Transcurro innumera, & ad finem scriptum per omnia propero. Quae tamen boni de Colchico sentit? cum hoc nihil refert diffidere ad Hiermodia, de quo scripsere Paulus, & Serapio. Verum non

Censura XXXVIII de Colchico.

est, quo minus Lusitano merito reluctemur, cum Paulus diversis capitibus eodem libro de Colchico & Hermodactylo tractauerit, hunc per se, vel ex decocto posum, arthriticis commendans, illud vero quod lethale sit, ab usu medico abigens. At Lusitanus, ut suam tueatur sententiam, mirandum non esse dicit, quod Paulus scriptum de Hermodactylo, tanquam a Colchico differente sermonem habeat, alibi vero caput de Colchico praefigat: quum id consulto fecerit, videns utique Colchicum non adeo venenosum esse, praecipue ubi Hermodactylus dicebatur, sed rei medica potius conducibile. Qua de causa de eo, ut venenoso, cum ceteris Graecis caput constituit: alibi vero, tanquam de re sibi nouiter comperta, & non admodum venenosa, sub Hermodactyli nomine differit. Verum haec Lusitani fragmenta, cur sane probem, non video. Siquidem si Paulus hac fuisset ductus opinione, credendum quidem non est, quasi ille eo insania, furorisque peruenisset, ut Colchici nomen in Hermodactylum peruertisset: quin etiam nec quod in medicum afferret usum mortiferum medicamentum, de quo paulo post egi sex tantum interiectis capitibus, propria occultatio nomine, quum recte scuerit Paulus, vires & facultates in plantis haberi, non in earum nomenclaturis. Nec pariter obstat alia Lusitani ratio, nimirum, quod in uno loco de ea tanquam veneno sub Colchici nomine scripserit Paulus, in altero tanquam medicamento sub Hermodactyli appellatione. Quandoquidem cum Paulus libro quinto, inter ceteras venenosas stirpes Colchici latius meminerit, non fuerat illi opus iterum de eo scribere libro septimo, ubi de medicamentis salubribus, non de venenis egit, nec tam horrendam facere metamorphosim, ut medicos deciperet. Nec item obstat Serapionis autoritas, quod is Colchicum Dioscoridis Hermodactylum appellet. Quippe hac in loco, sicut in aliis nonnullis Colchicum, quod Hermodactylum vocat, cum genuino Hermodactylo, de quo speciatim egi Paulus, confundit. Etenim scate mendis Hermodactyli caput in Serapione quis facile nouerit, quum, ea, quae Dioscoridi accepta referre debeat, Paulo ascribat, & quae Pauli sunt in Hermodactylo, Galeno accepto referat. Quod autem (ut Lusitanus putat) in sola Colchide Colchicum nasci venenosum ac lethale, alibi vero minime, non facile probamus, cum nulla huiuscere rei sit nobis veterum autoritas. At quum Dioscoridi lib. 4. ubi de Colchico scripsit, non Colchicos tantum admoneat, ne huiuscere planta radicem deuorent eius dulcissime allesti, sed omnes in uniuersum homines, maximo est argumento, hanc plantam non tantum apud Colchos, sed ubique nasci venenosam.

Setapio lapsus.

EPHEMERVM.

Cens. I XXXIX. de Ephemero, quod illi Liliū conuallium.

Lusitanus recentiores quosdam sequutus Liliū, quod conuallium vocant, magno errore Ephemerum esse putat. Nam huic Lilio, folia non insunt Lili: quin nec radix longa, quae digiti sit crassitudine, sed tenuium in capillamenta desinens. Praeterea nec caulis illi videtur Lilio similis, sed gracilis, flexilisq, tenuissimū in st. Adhuc nec credi par est, Dioscoridem silentio inuoluisse, quin etiam nec Galenum, qui eius quoque historiam narrat, suauissimi odoris praestantiam, quo Liliū Conuallium fragrat, si hoc illis Ephemerum esset. Quo fit, ut una cum Lusitano cecutiant, qui hac ducuntur opinione.

VMBILICVS VENERIS.

Censura XC. de Veneris Umbilico.

Vbi de Veneris Umbilico scribit Lusitanus, tam primum quam alterum parietibus habere asserit, & humectis nasci in locis, folio crasso rotundo, concauo, coxendicis figura, quibus palam sit, quantum in re barbaria praestet valeatque Lusitanus, quippe qui hallucinatus existimauerit inter Veneris Umbilicos nullam intercedere differentiam foliorum, radicum, ac etiam locorum, in quibus proueniunt: quum tamen Dioscoridi Cotyledonis primum genus folia ferat Acetabuli figura, & radicem Oliva modo rotundam: alterum veromaius referat Sedum, & maiori nitatur radice. Adde etiam quod neutrum in humectis nascatur locis, quum primum in tectorum tegulis, & collapsis adificiorum parietibus, proueniat, maritimis praesertim locis, ut Plinius inquit: Alterum vero inter ingentissima saxa in montibus nascatur.

THALICTRVM.

Cens. XCI. de Thalictro.

Ruellius vir profecto clarissimus, & in stirpium historia non postremus author, Thalictrum in Galliana scribit, ubique appellari Argentinam, eo quod eius Coriandrina folia argenteo splendore micent. Nos autem quod hanc herbam nusquam viderimus, Ruellii sententiam nec probare, nec improbare possumus. At Lusitanus, qui nulla ratione omnes impugnare solet, statim id falso sensisse Ruellium scribit, tamen si eius Argentinam nec viderit, nec nouerit unquam. Nec valet Lusitani argumentum, quod Argentinam herbam sic alius vocatam a Thalictro maxime distinguat. Siquidem de hac Lusitani Argentinam haudquaquam intelligit Ruellius. Hec enim solus non est Coriandri, sed unico tantum folio assurgit, nullis laciniis interfecto. Quo fit, ut ille merito veniat accusandus, quum iniuria alios accuset.

POTAMOGETVM.

Censura XCII. de Potamogeto, quod Pulmonariam dicit.

Potamogetum sic dicta est Graecis, quod fluminibus sit vicina, aut in ipsis fluminibus nascatur. Id quod clarissime demonstrat Dioscorides, quum inquit Potamogetum folium Beta simile gerit hirsutum, paulo supereminens extra aquam. Id quod facile comprobatur etiam in hac planta hallucinari Lusitanum. Quippe qui Potamogetum eam herbam esse contendat, quam Seplassia Pulmonariam vocant. Siquidem haec primum in fluminibus non nascitur, nec prope eorum alueos, sed secus vias propter sepes & fruteta, praesertimq, opaculis, folia non Beta sed Buglossi, cuius saporem etiam adeo imitatur, ut eo sicut & facte Buglossum referat. Adde quod huic macula quadam in foliis cernantur albo colore, de quibus nihil inuenio scripsisse eos, qui Potamogetum historiam narrant.

LOTVS VRBANA.

Censura XCIII. de Urbana Loto, quum in uacu. colam stacuit.

Quam vehementer decipitur Lusitanus in censenda Urbana Loto. Constat id, quod nulla ratione horum testimonium temere affirmauerit eam esse Lotum Urbanam, quam quidam Trifolium Aca. alii Panem Cuculum nonnulli Alleluia vocant. Etenim non memini me legere apud antiquorum aliquid

liquē Lotus hanc sapore esse acetoso. Præterea Plinio quis non viderit aliud esse Sativam Lotus, aliud Trifolium acetosum, quod ipse spectatim Oxyn a sapore merito vocat, quod nomine & viribus differant? Siquidem de Oxyn ad enterocelis, & dissolutum stomachum præstare ait, id quod facile quis quæsi deprehendere potest. Lotus vero, ut iam ad discutendus oculorum cicatrices, argema, & nubeculas ex Dioscoride proposuit, tanquam excussorium detorsoriumque medicamentum. Id quod nunquam Oxys præstare poterit.

ANTIRRHINVM.

1. In exi, limando Antirrhino immerito sane Lusitanus Plinium criminatur, quod Antirrhini plantam lino
 2. simul, si ferretur etiam quod Lychnis Agriam appellauerit. Nec alia ratione Plinium impugnat, quam quod
 non liceat (sicut se putat) Antirrhinum appellare Lychnin quod, florem habeat illi similem, & magna sit inter
 hæc plantarum differentia. Quam in re sane quid arguat in Plinio nescit: cuius insecta id in causa esse putauerim,
 quod Lusitanus Plinianæ lectionis, perinde ac aliorum authorum, imparis & rudis fuerit. Nam quanquam
 Plinius libro 25. capit. 10. Antirrhinum Lychnis Agriam vocari scribit: non tamen ob hoc affirmat, quod
 Antirrhinum & Lychnis Agria una & eadem sint planta, sed tantum admonet, a quibusdam ita vocari An-
 tirrhinum. Id quod etiam inuenitur in quibusdam Dioscoridis codicibus, qui ita habent ἀντιρρῖνον ἢ λυχνίαν
 ἢ ἀντιρρῖνον, ἢ λυχνίαν ἀγρίαν. Nec tamen ob id accusandus est etiam Dioscorides, qui non ob hoc præ-
 termisit, quin Lychnidis Agria meminerit, ubi libro tertio de domestica scripsit. Aliis enim nobis superius di-
 ctum est præsertimque de Telephio differentiis, non deesse plantas, quæ aliarum etiam plantarum nomenclatu-
 ra appellentur, quum tamen nihil cum illis habeant cognationis. Præterea cum plures hodie habeantur Antir-
 rhini, ut hæc res quarum alia, quæ maior est, folia gerit mul. s. fida, alia Lino similis alia parua, et Anagallis, quæ
 sine prægenera nunquam vidit Lusitanus, hic Plinium defendere non verebor, quem tamen miror accusare
 Lusitanum quum is de Iride differens, acriter me accusauerit, quod ibi quedam in Plinium deprompserim.

Cens. XCIII. de
 Antirrhino, ma-
 ie appellari Ly-
 chnin agriam

Antirrhini spe-
 cies.

POLYGALA.

3. Polygalam scribit Dioscorides ad palmi altitudinem adolefcere foliis Lenticula. gustu astringenti, cui ita
 sub, cribit Plinius libro 27. cap. 12. Polygala palmi altitudinem petit, in caule summo foliis Lenticula. gu-
 stu adstricto. Quibus tamen notis dissimile admodum videtur, et qui herbam asserre possit quæ legitimam Poly-
 galam referat, quum horum nec in caulibus, nec in floribus, nec in aliis que soli huiusce plantæ meminerit. At
 Lusitanus, qui (quantum video) longe potius Oedipum quam medicum proficetur, quandam plantam Poly-
 galam esse putat, quæ virgas Gemita inuenit, in quarum summitate flores emittant aures, præstanti odore, ex qua
 (ut ipse ait) magna pars Italici scopas parat. Quin & hanc quoque plantam scribit sapore esse amarissimo. Ve-
 runtamen cum a nemine memoria proditum sit, Polygalam hæc notis haberi, coniecturas, quæ se dicunt habere
 Lusitanus, præsertim quum eas scribere non sit ausus, frivolas ac inanes putamus. Adde quod Dioscorides, Ga-
 lenus, Plinius, Orbasius, & quot quot sunt alii gravissimi authores, nusquam Polygalam scripserunt esse ama-
 ram, sed adstringenti sapore. Præterea Polygala planta tota, omnibus consentientibus, lac promocat, non flores
 tantum, quorum nemo meminit. Sed hoc ignorans Lusitanus, putat hanc facultatem floribus tantum debere,
 quod suavis præstent odore, ac si odorata omnia lacti promocando sint idonea.

Cens. XCV. de
 Polygala.

Lusitani coniec-
 tura inuites.

OCHRA.

4. P. V. Lusitanus Rubricam, quæ utuntur Pigmentariis ac Sarcinatoris, quæque usi sunt hactenus Myropola,
 4. Lipidis Hematitibus vice, genuinam esse Ochram. Sed magno tenetur errore. Ochra enim (ut Dioscorides
 scribit) luteo est colore, non rubro, et propria indicat nomenclatio. Quæ enim Græcis, pallor Latinus inter-
 pretatur. Id quod etiam, fatur Galenus Comm. 11. in lib. Prognosticorum Hippocratis. Quæ si legisset Lusita-
 nus, non ita fortasse temere de rebus sibi ignotis tam ridiculum protulisset iudicium.

Cens. XCVI. de
 Ochra.

MELANTERIA.

5. Melanteriam nasci in faucibus cuniculorum, in quibus as foditur, falsis modo concretam, quin & in sum-
 5. ma facie eorundem locorum, testis est Dioscorides: quo sit ut artis potius aliquid hanc continere credi-
 derim quam argenti, ut sibi falso persuasit Lusitanus. Ipsa enim in argenti metallis non reperitur, sed in aris cu-
 niculis, cuius facultates possidet perinde ac Chalcanthum, Sory, Chalcitis, ac Misy: & proinde esse vim can-
 sticam obtinere Melanteriam, scribit Dioscorides, quem admodum & Lisy. Argento enim nulla vis canstica
 inest, sed ari quam plurima.

Cens. XCVII. de
 Melanteria.

SORY.

6. In censendo Sory non minori ducitur errore, quod pro certo crediderit, Chalcanthum falsitium, quod Phar-
 6. Imacopæ Vtriolum Romanum vocant, genuinum esse Sory. Patet error, quod Sory res sit effossa, non arte pa-
 rata, tum etiam quod Chalcanthum siue fossium siue sit arte paratum à Sory, omnium consensu, plurimum
 differat.

Cens. XCVIII. de
 Sory.

AVRIPIGMENTVM.

6. Eodem fere tenetur errore etiam in Auripigmento, quod pro more, temere asserat id coctum esse. Error fa-
 6. cile palam sit, quod scribat Dioscorides Auripigmentum per se gigni in metallis, in quibus gignitur
 Sandaracha, non autem excoqui & arte parari. Crudum itaque est Auripigmentum, non coctum. Quippe si co-
 quatur & igne torreatur, magnopere rufescit, adeo ut Carbunculi speciem induat, & pellucidum fiat.

Censura XCIX.
 de Auripigmento.

GAGATES.

7. Quid de Gagate tandem eius opinionem referam? quem nigrum illud Succini genus esse arbitratur, quo i-
 7. magines parantur eorum galatis affigenda, qui peregre proficiscuntur, vel ad D. Iacobi ades, vel ad alias
 quasunque. Nihil Lusitanum, quæ eorum quantum illa inter se dissonant: Quum Succinum hoc, lapis non sit,
 sed potius, et quidam putant, Bitumen: aut præter alii genus, Gagates porro lapis est bitum. no. & non autem
 Bitumen ipsam squalidum, & crassum, ut verum illud, quum nullam lapidis speciem præ se ferat, nihil que,

Censura C. de
 Gagate lapide.

Gagates deitup.

Animaduersione
in Amathum.

*squalore, crustisue sit vitiatum. Genuino ac vero Gagatis utuntur Septentrionales quamplurima regione, qua lignis non admodum abundant, ad fouendum ignem. Plurimum Gagatis foditur in Leodiensi agro apud Fladros, Brabantosque, qui plurimum differt ab illo succini genere. Sed praedam tandem quaso alia, quere-
stant innumera, ne videamur pios quosque carpere, qui veritatis candorem impediunt, & ne minutias quas-
que canillari nos arbitretur Lusitanus. Mihi quidem (ut ingenue fatear) non leue fuit incommodum cum
huius friuolis ineptius colluctari. Veruntamen tum istius proteruitate laceffitus, tum multorum (ut praedixi-
mus) honestissimorum virorum precibus excitatus, id diligentius facere sum coactus, quam vel mea occupatio-
nes, vel istius leuissima & imperitissima temeritas à me exigebant: Simul & commonebat non mediocriter il-
lius sanctissima auctoritas, quam in omnes tam temere tamque vane sibi vendicat, cui tantum ceteros existima-
uit adhibituos fidei, ut ea quoque, qua nulla confirmaret ratione, eodem mentis stupore excepturos alios pu-
tarit. Hoc si vel temeritate, vel fortasse simplicitate, aut inscitia potius, quibus plurimum valet, fecerit, agno-
scat iam denique quam ei periculosum fuerit aliorum carpere & immodestissime damnare labores, prius-
quam sua valeat intelligere foedissima errata, quibus omnia eius volumina, & praeclara illa Centuria ubique
scatent. Nunc cum & tela repulerim, qua tam insipienter ille in me iecerat, & pariter hominem ex suis praes-
diis, citra omne negotium, dimouerim, non tyronibus modo, sed etiam doctis non ingrati me in hoc collocasse
operam arbitror. Nec vero tanti mihi erit, si Lusitanus, quo est furore, iniuste se argui clamitet. Quin & hoc
singulare sua demerentia dabit indicium, quo manifestius argumentis, nulla ratione, nulla veritate satisfieri
posse conueratur. Equidem quantum potui, hoc vnice sum conatus, ut non solum se reprehendi doleat,
sed & sua confidentissima imperitia ipsum iure poeniteat. Quinetiam ut sciat ac noscat se er-
rorum Centuriam fecisse, quemadmodum & agritudinum. In quo quantum
profecerim, Lectoris candidi, & eruditissimorum virorum
erit indicium.*

F I N I S.

PETRI





PETRI ANDREÆ

MATTHIOLISE

NENSIS MEDICI

EPISTOLARVM MEDICINALIVM

Libri Quinque.

SERENISSIMO PRINCIPI

FERDINANDO, ARCHIDVCI

Austriæ, Duci Burgundiæ &c. Comiti

Tyrolis, &c.

Domino suo Clementissimo.



QUOD paucos adhuc factitasse video, SERENISSIME PRINCEPS, eam ab ineunte ætate vitæ degendę rationem, id consilium sequutus sum, vt turpe otium ac desidiam, quantum in me esset, fugerem temper, operis vero, & laboribus meis publicę vtilitati omni tempore, & loco perquam fideliter inseruirem: nec eadem de causa dubitavi defraudate sæpe genium meum voluptatibus omnibus, & honorib. & opibus posthabitis, ipsaq; valetudine mea neglecta. Itaq; in vigiliis, & perpetuo veritatis indagandę studio (liceat hæc nunc mihi citra iactantiam de me ipso prætari) ætatem hanc festam iam continuatione laborum, iamque annis ingrauescētem tenex adhuc traho: estque animus in posterum etiam, quicquid reliquum est virium, id totum publicis dicare commodis, laborareque in medium, donec spiritum hūc meum debitum sibi natura, morsque vltima linea rerum repetierit. Aceo maiore sane animo maioreque spe hæc omnia aggrediar, quod cum eo me esse PRINCIPE intelligo, cuius sub authoritate, clementia, prudentia, ac potentia, in otio, & pace, ab hostium incurSIONIBUS, ab iniuriis omnibus, ab egestate, quinetiam ab insidiis, & maleuolorū calumniis, tanquam in portum hospitalem appulsus, tutus, & securus tractare studia publice profutura, meæque vitæ extremam partem feliciter claudere queam. Cur autem ab impedimentis hisce omnibus, quę sæpenumero, vel optimis conatibus obstant, quominus optatos fortiatur euentus, te Domino immunem me, & liberum omnino fore sperem, dicerem in præsentia pluribus, si aut ea facundia essem, quæ rei tantæ sufficeret, aut non verecundia impediret, ne fortasse fortunæ tuæ, & vniuersę Austriacę familiæ assentari potius, quam meritas vobis laudes tribuere viderer. Dicam tamen ingenuè quantum res, de qua sermo haberi cœpit, postulat. Nam consideranti mihi nostro sæculo genus, ingenium, mores, & eorum omnium institutum, qui cum Imperio, & potestate humanis rebus administrandis præsunt, non multos quidem inter eos reperiri posse censeo, qui hisce naturæ & diuinę prouidentię dotibus vobis AVSTRIACIS PRINCIPIBVS comparari possint. Si enim vniuersam familiam intueamur, si patrem non tam amplissimo illo imperio, quam virtute, & sapientia Augustum & verendum, si Avos, Proavos, Patruos & Patruales, quorum gestis ad cælum vsque plena sunt elementa, si fratrem tuum Boemię Regem, cuius splendore, magnanimitate, pietateque iam t̄lget vbiq; omnia, si Carolum te natu minorem, cui regna & imperia grauis quædã promittit morū maiestas, si te ipsum, de cuius virtute, & cæteris admirandis animi dotibus silere potius debeo, quam breuiter scribere, spectemus, quam mundus vniuersus patet, ad extremas vs-

que Indias, quarum etiam habetis imperium, dignitas, fama, & gloria vestra incredibili fulgore, & lumine resplendet. Quid enim? An non hoc, qui vitam, spiritumque mortales, aliquo saltem iudicio præditi ducimus, libentissime confitemur omnes, diuino quodam fato miserante res nostras factum esse, ut difficilimis, & grauissimis temporibus familiaræ Austriacæ fastigium, ad Cælum usque immensis facultatibus, innumeraque regnorum accessione, sublatum extolleretur, ut imperia omnia senescente iam mundo ruinâ minantia, vestris opibus, & potentia sustentarentur, aut collapsis iam illis sua dignitas, pristinusque splendor, & gloria restituerentur? Quod quidem magnifice ubique terrarum fieri videmus. Omnes in vos Reges & Principes, omnes ciuitates, omnes denique populi coniectos defixosque oculos habent, a vobis iura petunt, à vobis opem, consilium, salutem tanquam à Diis quibusdam immortalibus expetunt. Idem vestram Amplitudinem, & Maiestatem tremunt: clementiam & pietatem amant: & illud admirantur, in vna tam potenti familia admirabilem connexum omnium, quæ natura in homines conferre potuit, bonorum, sapientiæ, fortunarum, potentia, authoritatis, gratia, & quod magis est animorum vestrorum admirabile consensus. Hinc fit, ut certatim vos omnes gentes, & nationes, non laudibus tantum summis efferant, sed tacita etiâ admiratione & veneratione animis prosequantur, ac colant. Verum ut nunc de te ipso tantum dicam, etsi pacis consilia, quæ ad administrationem, moderationemque Regni, ad iustitiam, tranquillitatem, dignitatemque Imperii conseruandam pertinent, sequutus esse videaris, nulla profecto militaris disciplina pars est, quam non diligenter obieris, nullatio, aut munus bellicum, quod non vtiliter, magnique cum laude, & gloria exercueris. Taceo pueritiam tuam, cum iussu & consilio sapientissimi Patris, sub præceptoribus rei militaris peritissimis exercitatus, magna cum omnium admiratione, admirabile adolescentis virtutis specimen ederes. Taceo, & spectatum sæpe robur, animique præstantiâ, quando in pompis & theatricis spectaculis cataphractis equitibus concurristi, atque etiam pedester hasta, ensæ, claua, omnique armorum genere victor plerumque intrepide depugnasti, quæ viderunt sæpe Proceres, Principes, Reges & Imperatores. Quinetiam in magnis expeditionibus emicuit virtus tua, & primo quidem quando ante annos plus minus quatuordecim adolescens, bellicis exercitiis, & laboribus assuescere cepisti, cum Germania magno bello, magnis seditionibus implicata, res nouas, ac tot dissensiones moliretur vna cum CAROLO Quinto inuictissimo Cæsare, & Serenissimo Patre tuo Romanorum Rege exercitum ductitantibus, in Saxoniam concessisti: vbi primum expertus es, quam dulces sint victoriae fructus. Postea vero cum ductandis te copiis exercitibusque suis in Vngaria FERDINANDVS Rex Pater tuus anno ab hinc quarto præficeret (memini enim, qui ipse etiam periculis illis aliqua ex parte interfui) eo tempore ducis optimi officio ad eo functus es, ut non solum Seghetum à Turcis antea obsessum, inuitis hostibus, militibus, comitatibus, bombardis, & armamentorum omnium genere, munieris, ut ab initio tibi proposueras. Sed Babotiam munitissimam, Corodnam, & alias arces expugnaueris, occisis Turcis quampluribus, & incolumi seruato semper exercitu hac tantum de causa congregato. Iam vero in pace degens, quam in conferenda politica disciplina, iisque administrandis, quæ ad iustitiam, & tranquillitatem spectant, & ad promouenda studiosorum bonarum artium præmia, promptus ac sedulus, publice testantur omnes. Ut enim de me vno dicam, ad illius sumptuosi operis editionem quod de omni stirpium genere à me nunc instituitur, grandioribus, & elegantioribus imaginibus ad vinum expressis, quantum tu mihi subsidii recens contulisti? Verum non contentus eo, etiam alia ratione bene mereri de sapientiæ studiis statuisti. Pergendum vero tibi, PRINCEPS, eodem animo est, eodemque tenore recte factorum series continuanda. Ita enim tui nominis splendorem & gloriam, nulla vnquam ætas antiquare, nulla obliuio obliterare poterit. Sed ut redeam vnde digressus sum, lætor quidem celeste numen mihi tam fuisse propitium, ut senili hac ætate, tu mihi ea authoritate, iis facultatibus, ea liberalitate, insuper tam prompta in bonas literas, propensaque voluntate omnibusque ornamentis maximis, quæ optare quisque in suo Principe, vel Domino, vel velit, vel possit, præditus patronus contigeris. Sub quo quidem cum voluptate, securitateque ludores, & lucubrationes meas sedulus persequi queam. Id, quod vnum ego præ rebus omnibus cæteris opto. Est autem & pars aliqua diligentia, ac studii mei: hisce in EPISTOLIS. Quas quidem, & si in meis in Dioscoridem editis commentariis ad ampliore rei plantariæ indagandæ doctrinam describere pollicitus essem, non tamen hoc tempore eas typis committere publice legendas decreuissem, nisi amicorum quorundam frequentiores fuissent adhortationes. Namque hæc adeo me conuicerunt, ut non potuerim illis non morem gerere. Continent vero materias varias scitu fortasse non indignas.

Editio cum g. 2.
duob. figuris.

De epistolis his.


dignis, quibus explanandis me nonnullam gratiam apud candidos & veritatis studio-
 sissimum non diffido. Nouarum plantarum in his frequens, crebraque fit mentio,
 pluraque in plantaria facultate habentur, de quibus nihil prius in commentariis nostris
 in Dioscoridem à nobis dictum est, adeo ut nouum iam in his habeam viridariolum,
 quo plurimos se delectaturos non ambigo: præsertim quum præter id nonnulla de ani-
 malibus quibusdã ac etiam fossilibus iis explicentur, quorum antea fortasse, vel saltem
 hoc nostro æuo meminit nemo. Continent etiam deinde defensiones nostras, aduer-
 sus maleuolorum blateronumq; quorundam calumnias, quibus scripta, & monumen-
 ta nostra defenduntur: quinetiam & censuras contra eorum ignorantiam, & apertissi-
 mam inuidiam. Plurima præterea soluunt dubia, & authorum loca deprauata resti-
 tuunt, non solum ad ipsam materiam medicam spectantia, sed ad vniuersam medicinæ
 facultatem. Multa etiam postremo asserunt, quæ ad antidotos recte parandas perti-
 nent, quarum passim in Myropoliis est vsus, vbi plura expenduntur, declaranturque
 simplicia medicamenta, quæ hæctenus à nemine sunt recte explicata, quibus Pharma-
 copœi non parum sese oblectabunt. Cætera, quæ etiam non modica sunt, lectoribus
 explicanda relinquo. Atqui haud necesse est hac præfatione opus hoc nostrum com-
 mendare, ipsum enim per se (vt spero) & lectores, & emptores eosque doctos reperiet,
 vbi primum in manus saltem, aspectumque bonorum virorum, & iudicio aliquo prædi-
 torum illi peruenire contigerit. Id vero tibi benignissime, & Sereniss. PRINCEPS,
 dedicare & consecrare placuit. In tua enim aula, & tanquam domi tuæ, sub tuo patro-
 cinio ac fauore, magna eius pars conscripta est. Et si enim fortasse argumentum scri-
 pti non putabunt aliqui dignum esse tanto PRINCIPE, quem scientia armorum po-
 tius, & prudentiæ consiliis, quam huiusmodi quæstionibus ad Philosophiam & artem
 Medicam pertinentibus instructum esse oporteat: negari tamen hoc plane non potest,
 bonas & vtilis Reipublicæ scientias, & artes, eorumque cultores omnibus seculis curæ
 summis Regibus fuisse. Laudi vero sibi duxisse optimos & potentissimos quosq; sem-
 per de literarum cultu non male mereri. Itaque hæc celeberrimo nomini tuo inscri-
 psi ac dicaui, non vt ea legeres, qui rebus grauioribus ad Regni amplissimi procuratio-
 nem pertinentibus occupatissimus es, sed vt testater publice, id quod res est, cum te esse
 PRINCEPEM, qui intellecta dignitate, & utilitate disciplinarum, quibus nec priuata
 vita, nec publica carere vilo pacto potest. sumptu eas & fauore tuo, quantũ possis, pro-
 moueas, & tuearis contra eorum barbariem, qui in turpibus voluptatibus honorumq;
 & opulentix splendore consistere summum bonum arbitrantur. Quinetiam contra
 inuidos & obtrectatores omnes defendas & tuearis: Tum vero etiam apud multos te-
 stimonium gratitudinis, obseruantix, & fidelis seruitutis in te meæ extare volui, qui tot
 tantisque beneficiis abs te affectus eorum memoriã, non solum vsq; ad extremum vi-
 tæ meæ defixam tenere animo, sed etiam scriptis & monumentis ad posteritatem pro-
 pagare vehementer cupiam. Vale PRINCEPS BENIGNISSIME, & Matthiolum
 indignum Medicum tuum commendatum habe.

Sereniss. Celsitud. Tuæ

Fidelis Seruitor

Petrus Andreas

Matthiolus.



PETRVS ANDREAS MAT-
THIOLVS MEDICVS, IVLIO ALEXAN-
drino Protophysico Cæsareo,
S. P. D.

Agitur de quibusdam Galeni contradictionibus.



De Aloe prima
contradictio.

De Trifolio A-
sphalite secun-
da contradictio.

Lib. 1. cap. 106.

Venenum vlc-
rato ore exuctis
necem affert.

*Vm Valgrisius Calcographus Venetus Dioscoridem meum Italico sermone exaratum recu-
dere statisset, scinissetq; locis quam plurimis iam pridem esse auctum, postulavit a me, ut no-
uos hosce laboris illi excludendos traderem. Ego vero, tametsi cum ob ipsius Valgrisi in me ob-
seruantiam, tum in cudendo libros nostros diligentiam, sedulitatemq;, id illi denegare non au-
derem: volui tamen, priusquam ea scripta pralis subicerem, omnia ea Galeni loca relegere, ubi
prater institutum simplicium medicamentorum memini, ut viderem, an hinc florum aliquid decerpere pos-
sem. Hoc itaq; instituto cum de Aloe in diuersis ipsius libris legerem, videbatur Galenus ipse quibusdam in lo-
cis sibi maxime contradicere. Quandoquidem libro octauo de compositione medicamentorum secundum locos,
vbi de hiera agit, qua ex Aloe paratur, manifeste asserit Aloen vim habere purgatoriam non admodum valen-
tem, & proinde non nisi ea purgare, qua circa ventriculum & aluum continentur. Etenim, ut ipse inquit, etsi
quandocumq; ampliori pondere exhibita, usq; ad locos circa iecur se diffundat: non tamen totius corporis purgato-
ria Aloe existit. Atqui contrario modo scripsisse videtur Lib. de Theriaca ad Pisonem, vbi apertissime scribit
Aloen uniuersum purgare corpus, his verbis: Aloe atq; cum aris squama supercrescentes in ulceribus carna
cohibent, & fluxiones qua illis adueniunt subinde exucant: assumpta vero per os, uniuersum corpus purgant:
hac ille. Qua quidem his maxime repugnare videntur, qua de Aloe loco superius citato idem scripsit Galenus.
Adhac cum ea diligenter examinarem atq; perpenderem, qua de Trifolio asphalite siue hyacinthino in eodem
differit libro, videtur idem Galenus non solum plurimum a Dioscoridis sententia ac historia aberrasse, sed etiam
a ratione ipsa ac veritate, longe sane abesse. Quamobrem non potui non admodum mirari Galenum philosophu
summum haudquaquam agnouisse a ratione crani esse alienum, Trifolium illud, contrariis illis, de quib; ipse
scribit constare facultatibus, cum nulla in eo vis deleteria conspici possit. Veruntamen is ita de eo scriptum reli-
quit: Trifolium herba, qua hyacintho similis est, cum Vere parturit, & semen agresti Cnico persimile obtinet,
decocta admodum, deinde moribus Aranei vel Vipera quoq; ex aqua foetu adhibita ipsis medetur, & doloris
statim sedat. Sin autem in alio non commorso sanum locum eodem foetu circumdederis, similem sensum, simileq;
doloris iis, quos morsus inuehit omnes efficit, ut re vera miraculo dignum opus esse videatur, videlicet, herbam
& morsum sanare, & ferarum modo sanam partem prae afficere: Haec tamen ibi Galenus. Qui tamen (pase-
tanti philosophi ac medici dixerim) negligenter satis Dioscoridem legisse videtur. Namq; si Dioscoridis verba
recte expendantur, id nullo prorsus natura miraculo fieri facile constabit, sed potius rationabili, ac legitima
natura lege. Quandoquidem (ut recte scribit Dioscorides) simplex huiusce Trifolii decoctum haudquaquam
id efficere potest: sed tantum illud, cuius foetu quispiam a ferarum moribus liber euaserit, si eodem alterius lo-
cus ulcere affectus non sanus (ut Galenus inquit) perfundatur. Id quod aperte Dioscoridis verba declarant,
cum inquit: Tradunt aliqui totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctum, foetu dolores eorum finire, quos serpe-
tes percusserunt. Qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde
ac ille afficitur, qui fuerit a serpente demorsus. Hinc itaq;, mi doctissime Iuli, clarum fieri arbitror, non so-
lum nihil in se rem hanc admirationis habere: sed etiam Trifolium ipsum, vel eius decoctum, omni prorsus de-
leteria destitit facultate. Nam cum Trifolium ipsius decoctum, quo demorsus, vel vlcus quispiam foueatur, ser-
pentis venenum a vulnere extrahat, eique permisceatur, haud dubie id venenosum redditur. Quamobrem
nil mirum id videri debet, si idem decoctum, quo quispiam non demorsus foueatur, ubi perfuse partes aliquo
ulcere laborauerunt, veneno per meatus vlcus ingrediente, ac sanguini se commiscente, ea omnia exucet
mala, quibus demorsus vexantur. Idem enim venenum cum sit, eosdem quoque praebeat effectus necesse est.
Vnde liquido colligi potest, quod virus a Trifolii decocto euocatum, non autem Trifolium sit, quod similem
sensum, simileq; dolores faciat. Quod autem venenum a ferarum moribus exuctum, aut quocumque alio
modo euocatum, vlcus partis contactum, necem afferre possit, complures tam Graeci quam Arabes
autores manifeste fatentur. Quandoquidem scribentes a serpente demorsos ore sugere praestantissimum esse
remedium, sermo nos admonent, ne id ore vlcus affecto fiat, quoniam si venenum illud vlcus continge-
ret surientem proculdubio in mortis discrimen duceret. Hac itaque sunt, qua me maxime mouent, ut cre-
dam Galenam hac in re non solum Dioscoridis mentem non percepisse, sed etiam, si liceat dicere, plurimum
secussisse. Nam quemadmodum eodem de Theriaca libro ad Pisonem idem Galenus hallucinans videtur,
quod*

quod scribat, Nicandrum sequutus, Viperam partu necari corrosis à filis intestinis (quod falsum esse iam omnibus notum est) ita facile adducar, ut credam in Trifolio hanc esse eundem fuisse delirium, vel à Septo de Poea, vel à Simo Medico, qui ante illum fabulam hanc scriptam reliquerunt, ut apud Plinium legere quis facile poterit libro 3 cap. 21. Sed & illud mihi magis mirum videtur, quod observari in Galenorum, cum in Philologia, tum in Medicina parem crediderim inueniri posse neminem, adeo Poeta additum, ut eorum fabellas historia loco: tam facile acceperit. Cum autem quomodo in his partibus aberraverit, partim vero sibi ipsi contradixerit, nesciam profecto cogitare, ne dum decernere: ad te, mihi doctissime Iuli, mihi confugiendum fore putavi, ut hac in re tuam mihi declares opinionem. quoniam pacto hisce in rebus falsus fuerit Galenus. Etenim cum videam ex tuo doctissimorum Enantiomatum libello, quantum laboris injumas, ut vobis que Galenum tuearis a calumniatorum insidiis, quantumque laudis in Encomio illo tuo illi tribueris, non aliter sane mihi persuadere possim, quam a te huiusmodi explicationem me accepturum, qua & Galenum ipsum ab omni crimine servatum videam, & mihi plurimum satisfaciunt esse putem. Scio equidem non fore mihi opus, ut aliis te literis sollicitem, quo ad hanc me cito respondeas, cum haud me lateat, quod tanto (qua tua est humanitas) mihi satisfaciendi desiderio, tantoque animi fervore continuo accensus in Galeno defendendo, ut non oporteat me a quo (ut aiunt) sponte currenti calcaria adhibere. Caterum hac omnia in eam te partem accepturum esse confido, quam & summa tua humanitas, & iam plane confirmata amicitia nostra postulat. Vale. Goritia.

Viperam partu necari: fabulosa

Liber de Theriaca ad Pisonem falso Galeno adscriptus.

De Macere in Galeni animadversio.

De Hordeo contra Galenitentis.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Iulio Alexandrino Casareo Archiatro,
S. P. D.

Agitur item de nonnullis in Galenum animadversionibus, de Macere, & Hordeo.

30 On parum admirationis attulerunt mihi litera tua. Vbi enim ex illis abs te aliquid noni pulchriq; afferri sperabam, quibus Galenum tuum ab erroribus illis defenderes, in quibus versari animadverteram, Lib. de Theriaca ad Pisonem, nil aliud in eo defendendo te attulisse video, quam aperte affirmas lib. illum haudquaquam a Galeno fuisse editum, & ob id non esse opus aliquo defensionis genere. Ac eo magis pene sum stupore affectus, quod semper antea mihi persuaseram librum illum legitimum esse, quem admodum & ceteri arbitrantur, qui in re Medica primas tenent, & in Galenica lectione se perpetuo exercent, qualis est in primis Iacobus Sylvius apud Gallos insignis, praclarusq; nominis Medicus, qui in Galeno ita versatus est, ut astiment quidam Galeni Genium in ipsum transmigrasse, ut quivis facile intelligere possit, cum ex ceteris eius scriptis, tum ex eo volumine, quod de componendis medicamentis insituit, mihi prorsus eum dubitare, quin de Theriaca liber sit Galeni legitimus. Quinimo de Aloe & Asphaltite trifolio scribens, eadem omnia ex Galeno deprompsit, qua de eodem libro de Theriaca ad Pisonem leguntur. Quin etiam non Sylvium solum hac duci opinione video, sed quotquot sunt in Italia nostra praclarissimi medici, & praesertim illi, qui in publicis Academicis medicam facultatem profitentur (ut sane audio) eadem proculdubio affirmant. Idcirco cum id erroris abs te tantum fuerit observatum, hocq; non paucis comprobationibus, nempe quod stylus & oratio ipsa a Galeni ordine ac gravitate plurimum distent, & nonnulla habeantur ibi vocabula, quibus nunquam uti soleat Galenus, non possum te ipsum, tuumq; ingenium acumen non magno opere admirari, & (ceterorum, qui secus tenent, pace dixerim) sententiam tuam alius omnibus praeferre. Mihi quidem tuae rationes adeo firmis fulcra videntur argumentis, ut nihil sit quod impediat, quin ego totus in tuam concedam sententiam. Proinde rectius posthac (ut arbitror) fiet, si Chalcographi ac Medici, qui Galeni opera recudere cogitabunt, librum illum de Theriaca ad Pisonem a legitimis se iunxerint, & inter spurios, ascriptitiosq; te autore reconderint. Cui hac merito accepta referre debent, non si solum, sed etiam ceteri quotquot habentur rei medicae studiosi. Atqui mihi reliquum hi perquam gratissimum erit abs te doceri, quibus argumentis in hoc, quod nunc proponam Galenus servari possit, cum certo sciam libros, in quibus, qua mihi animadversa sunt, nulla dubitatione esse legitimos. De Macere itaque prima erit animadversio, in quo Galenus sibi ipse dissidere videtur. Siquidem libro septimo de simpl. Medicament. facultatibus. Macer, inquit, in tertio siccantium est, in caloris vero, & frigoris differentia neutrum insigniter efficit. Verum huic forte fortasse censera oblitus, longe aliter sensisse videtur libro sexto de medicament. compositione secundum locos, ubi de parando è Punicis pharmaco egit, sic inquit: Nominatur autem Macer cortex quidam aromaticus, qui ex India affertur, multum calidus & adstringens. Qua in re unicuique palam est sibi parum constare Galenum, ac etiam manifeste contradicere, cum hic Macerem calidissimum esse scribat, illic vero nec excalfacere, nec frige facere censeat. Praeter id eodem sane modo videtur in hordeo idem aberrasse, siquidem libro de Pisana, Hordeum, inquit, generaliter acceptum, refrigerat, atque exiccatur. Et primo de Alimentorum facultatibus: Hordeum, ait, in frequenti usu apud homines est, quod non eandem cum ipso tico habeat facultatem: siquidem hoc palam calefacit, illud vero non modo non calefacit (quomodo nonnulla qua in medio sunt calfacientium & refrigerantium, ut amyllum & panis lotus) sed quoquo modo utare, siue panes ex ipso feceris siue piscinam coxeris, siue potentiam paraveris, nunquam corpus calefacit. Quae verba cum ita generaliter sunt prolata, hac efficere praestareque hordeum, tam interius assumptum, quam exterius appositum, sensisse Galenum non ambigo. Ad hac libro septimo de simpl. medicament. facult. eundem Galenum scripsisse constat, hordeum refrigerare & siccare ordine primo: sed longe aliter sensisse videtur, non sine ipsius doctrina repugnantia libro quarto de medendi methodo capite quinto, ubi sic habet: Porro omnia quae putrescunt ex calido & humido afficiuntur. Ideoque etiam ea cataplasmata qua ex hordeifarina componuntur, cum qua calfaciant, humectentq; omnibus ut afficiuntur, quibus moveri prae expediat, admoventur: haec ille. Quibus

his palam est, quod tamen si pluribus aliis in locis semper affirmavit, hordeum, quoquo modo in medicum usum venerit, corpus ipsum refrigerare ac siccare: hinc imen manifeste docet contrarium, cum idem hordeum calidum & humidum putet. Proinde hac in re te consulendum decrevi, utpote Galeni defensorem, & qui ingenii acuitate & doctrina praestantia hosce nodos dissolvere facile valeas, quin etiam Galenū ipsum in istis argumentis tueri, & mihi id maxime expetenti satisfacere. Quod si non ita cito, ut velim, expeas, alius fortasse maiorem in Galenum animadversionibus te quam primum praecipuerim. Has quidem praedictis attexissem, nisi aliquantulum subuerer, ne tibi plus molestiae afferre quam par sit, si longioribus literis ad te scriberem. Hoc tantum addam, nimirum me summopere optare, ut me fraterno eo amore prosequaris, quo semper antehac erga me affectum te fuisse cognovi. Vale. Goritia.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Medicus, Iulio Alexandrino Cæsareo Archiatro, S. P. D.

Traclatur an fracta pulmonis vomica pus quandoque (ut Galenus inquit) per urinae meatus excerni possit.

Quum tabellariorum, qui isthuc irent defectu priores litera mea hisce secundis adnexa ad te mitti nequiverint, manserintque apud me ab Idibus Decembris in hunc usque diem: committere non potui, quin iterum ad te scriberem narraremque quanta sim affectus admiratione, & pene attonitus factus, dum hisce diebus elapsis Galeni libros de locis affectus legerem. Siquidem in lib. 6. cap. 5. ubi diffusus de vesicae morbis egit, ac etiam de eius corporis excrementis, quae per urinae meatus excerni solent, rem intellectui maxime arduam afferre videtur, his verbis: Praeter has alio quidem sunt purgationes, sed raro, ut cum thorax, & pulmo per alium purgatur, quae sub septo transverso positae sunt partes per urinas: quorum causam cum nonnulli ignorent, neque id unquam accidisse viderint, quod a multis visum est, negant fieri posse, ut abscessus in pulmone orto, pus per renes excernatur. Pulmonis vomicae per urinam, thoracis autem per intestina & alium, esse purgari vidimus. Quanquam re vera de latione ex pulmone in renes nulla omnino sit dubitatio. Etenim ut a caava vena, ita quoque ex magna arteria, rami descendunt ad renes. Hac quaestio tamen Erasistrati sectatores non parum urget, quippe qui putant solum spiritum in arteriis contineri. Nobis vero nihil difficultatis affert, utpote intelligentibus, quod tenuis arteria pulmonis, quantum pus ex rupta vomica suscipit, id in sinistram cordis sinum deferre potest, quod inde in magnam ipsius arteriam incidens, per renes transit ad vesicam. Haec tamen ibi Galenus. Hoc idem pariter scriptum reliquit Avicenna utpote qui magis Galeni testimonio acquieverit, quam rationi. Quo fit, ut pene obstupescam, quo pacto velit ibi Galenus, quod pus ipsum, quod nil aliud est quam putridus, foetens & corruptus sanguis, non solum labatur per arterias, in quibus vitales recluduntur spiritus, qui ubi paulisper a sua distrahantur functione & in discursu remorentur, praesertimque, ab his impedimentis, quibus leduntur, verèda emergunt symptomata: sed quod ingredatur in sinistram cordis sinum, ubi nil profecto aliud manere potest (ut Gal. idem ait) quam tenuissimus ac purissimus sanguis, tenuissimis spiritibus refertus: nimirum, nescio ego quomodo fieri possit, quod in sinistro cordis sinu, ubi hominis vita, & sanguis ille purissimus una cum vitali spiritu continetur, possit quoque contineri eo tempore pus illud foetens, erodens, labefactansque, vel illac transire, quin sanguinem illum seletis, inficiatque, misceatur, & per consequens quin mortem illico afferat. Siquidem cum Medicus omnibus comprobata sit sententia, quod sanum omne quod a putrido tangitur, putridum fiat, non video sane, quo pacto fieri possit, quin spiritus, et sanguis ille purus, pure foetido labefactatus, aliquid in se foetoris putredinisque, excipiant, & verèda admodum subsequantur symptomata, & ipsum fortasse totius corporis exitum. An non videmus quotidie, qui morbos curamus saepe numero, cor ipsum versus malignos ferri vapores, à vitiatas succis exortos, qui quamprimum cor ipsum invaserint, egros inducunt cum in animi deliquium, tum in cordis tremore? Quae symptomata statim sequuntur, frigidus sudor, totius corporis pallor, virium defectio, arteriarum interceptio, & alia huiusmodi accidentia, quae hominis interitum denunciare solent. At si certum est ab infecto aere infici spiritus, & humores, & pestilentis subinde (ut Gal. pluribus in locis scriptum reliquit) oriri febres, quarum putredine innumeri moriuntur, quomodo fieri potest, ut non solum spiritus, sed etiam sanguis ob tam foetidi puris per eorum vasa, imo per ipsius vitae fontem, decursum, non admodum afficiantur, sed ex consequenti corpus uniuersum, affecta facultate vitali? Fiat autem id tam velociter quam a natura fieri possit, haud unquam mihi aliter persuaserim, quam quod impossibile sit, quin contactus affectusque spiritibus id fieri queat. Nam quemadmodum videmus, si quis veloci quantūvis cursu feratur, ubi in putridum incidit cadaver, quod nullo sane pacto fieri possit, quin foetor illi illico nares feriat, & spiritus ibi contentos inficiat, ita sane longe magis infici posse spiritus vitales crediderim, qui a foetidis illis pure fuerint contacti. Equidem mihi de hac re diligenter cogitati nulla succurrit ratio, cuius auxilio cognoscere posse, cur id tam facile factu affirmaverit Gal. His accedit Galeni ipsius autoritas, quippe qui lib. 1. Aphorismorum, Medicos quoscunque admonet, ne humores trahant vacuamque per principes partes his verbis: Motus vero humoris noxii ad loca non accommodata sunt, quando vel aliquem habuerit suapte natura principatum, & maius ex ipsis damnum est subsequatur, quam morbus, qui indicatur, exposulet, vel nullam habeant effluxionem. Exempli gratia, ubi Epur humores infestat, quos oportet evacuari, dua sunt accommodatae motiones. Prima per ventrem, et huiusmodi, quae per aliam inferiorem: altera per vomitum melior existit. Secunda quae per renes atque vesicam. At motus qui ad pulmonem, thoracem & cor inclinatur, bonus non est. Oportet itaque medicum naturam motum animadvertere, & siquidem idoneus fuerit, subministrare & adiuuare: sin autem contrarius ac noxius, prohibere, transferre, atque dinertere oportet. Haec ille. Quae omnino affirmare videtur, nullo pacto expurgari posse vomicae pulmonis pus per arterias illas, et sinistram cordis sinum absque manifesto mortis discrimine. Hoc autem cum fortasse animadvertisset Paul. & Aetius, viderentque id non esse rationi consentaneum nihil peculiare de venis, vel arteriis discernere ausi sunt, sed tantum scriptis posteritatis memoria reliquerunt, huiusmodi abscessus sursum erumpere, non nunquam infra, atque ea quae inferius tendunt, partim in ventre & in thorace transmitti, partim in vesicam per vasa quaedam administrata. Quo fit ut facile existime, hac in re (sic tamen hoc liceat affirmare) aberrasse Gal. Quamobrem non desunt etiam docti viri, qui putent, quod

Argumenta contra Galeni sententiam.

nam si huiusce puris ad vesicam transmissio, transmitti id ad venam sine pari, Gracii. 2. pr. vel alia forte cir-
 ca pulmones vel thoracē, & inde in venam caua, renas & vesicā. Nam non nunquam in sanguine venarū in
 ceteri affectionib. ubi obstructa ea vasa fuerint, quib. sanguis ille expurgari debet, sicut in ferri videmus per ve-
 nam caua & deinde non per arterias, neq. sinistrum cordis sinum (sed, ut putamus) per venam sine pari, vel a-
 lias quacūq. a quibus facile in pectus thoracemq. diffunditur, fieriq. inde, ut ita affecta mulieres cruentum
 emittant spuum: Ita videtur facile euenire posse ut eodem ductu purissimum deorsum feratur. Proinde non ita
 facile adducar ad credendum, posse pur per arterias illas & per cor ipsum transire, ut ipse apertissime censet Ga-
 lenus. nisi tu, mi. doctissime Iuli, qui Galeni genio pro tua voluntate uteris, doctissimum tuum argumentum ab hac
 medimoneris sententia. Vale. Gortia.

Vomica p. l. d. 6.
 nis ex p. l. d. 6.
 ne in ad v. l. d. 6.
 n. h. l. d. 6. v. l. d. 6.
 sine pari.

IULIUS ALEXANDRINUS, PETRO
 Andrea Matthiolo Medico.

Respondetur obiectionibus & animadversionibus nonnullis in Galenum factis,
 in Epistolis precedentibus.

Quoniam ita tibi videri video, Vir celeberrime, abstinere in posterum a nimis illis, ac verbosis, quae
 tua antea inchoata, ac nunc diuina absolutam, minime omnium decere videantur amicis. n. nostram,
 p. l. d. 6. in ed. scil. futuro semper tempore intenti unum et quousque v. l. d. 6. venere, aliquaq. sese aliquo tam-
 dem pacto inuandiprabuerit occasio, uno tantum verbo quid sit, quod fieri ac peragi a nobis velimus, in-
 ter nos significemus. Dioscoridem Gallici auctoris illum, quē ad nos miseris, postridie Hieronymo a Sprincen-
 stam Baroni, nomen tuum amatiss. legendū dedi: ipse tamen prius quā Proximum illum auctoris totū, ac capita pra-
 terea quadam delecta a me ad rem hanc antea percurrem. In quib. honorificentiss. semper mentio tui fit, &
 usq. ex, et ingenue passim fateatur auctor libri accepta se omni prope tibi libenter referre omnia, quacūq. tandē
 dici, aut excogitari ab eo potuerint, ad rem hanc apte & concinne. Hoc non opinor ignoras, si paulo magis glorio-
 se, nescio cuius essimus cupidi, quantū non solū tibi Auctori operis tantū celsū laudis esset, sed etiam tibi, cuius
 tu nomen inscribendū curasti in parte clypei quem Dioscoridi de tro, tanquam Minerva olim sua opinor Phi-
 dias ille, affixeras. Cuius iam operis non solum Italiā peruenisse, famā. h. l. d. 6. verum etiam Germaniā ipsam omnē
 peragravit Gallias & Hispanias occupavit, atq. haud scio an minime in huiusmodi locis subsistens ulterius et-
 iam sese propagauerit, & ad Indos usq. peruenerit noua, q. memora nostra inuenti orbis penetrare in regiones.
 Terum natura quadā, & instituto philosopho homini, cuiusmodi tu esse in primis videris, nō tam de hoc glorio-
 andum esse censeo (quanquam & hoc quidē non prorsus dedecet, si quis bene apud bonos omnes audiat, quod
 nominis tui apud gentes omnes & nationes fama vigeat, quam de colit. andū magnopere, quod propagatum in v-
 niuersos ita, ex rerum tuarum animadversione hac, usus fructuosiss. omnib. futurus sit, ut iam tibi homini, ut
 dixi a natura ad philosophiam factō satis hoc futurum superq. si sit etiam benefacti huiusce rei quod mox atq.
 olim in vniuersum genus humanum redundaturum sit omnia, consolare. Atq. hac ita se habent.

Quod autem in dos m. h. l. d. 6. offerre explicandos quosdam in Gal. libris, quamuis sciam hoc idē prestari a te ipso
 melius posse, non subterfugiam, antea h. l. d. 6. quicquid id est amice inuictum a te mihi laboris, et si sententia de
 se hac vobis forte conueniant, certior quaedam opinioni inde nostra acquiratur fides: sin minus at ansa tamen
 ex hac suboritur veritatis appareat aliqua quam tenere possimus. Ac primum de Macere, video a Gal. libris de
 simpl. medic. facult. Corticē idē si, sicut ex India allatum, in quo exiccandi, & adstringēdi vis in fit insignis, ac
 p. l. d. 6. p. l. d. 6. ere. caliditas quadā & tenuitas acrimoniaq. exigua qua aromata referat, notetur, breuiterq. in
 quo nihil effusa dignum reperitur, quod ad calorem vel frigus attineat. At qui in lib. de comp. Med. per locos
 sexto, dissonant Auctoris eiusdē dicta de hoc, quo loco Macer, idē, verbis minime obscuris egregie excalfacere &
 adstringere dicitur. Non confugiam eo nunc, ut dicam, quod affirmare tamen possim, huius de comp. per locali-
 bras, inter omnes a se p. l. d. 6. factos reponi a Gal. sicut de simp. medic. facult. praesertim vtro operis partem eam,
 qua tractatum de lapidib. precedat, multo ante tempore ab Auctore eodem prodisse, qua temporis intercapedi-
 ne haud sane exigua verisimilimum sit potuisse diligentiore quadam, et in rerum saepe harum examinatione
 euenit, obseruatione, alia quadam reperiri: cortex is facultate praeditus a Gal. qui in visu ei antea fuisse: imo
 non alia, diuersa nimirum ac contraria: sed quod tam multo antea modice se acre ac calidum gustari obtulis-
 set idē postea maiori insignitum caliditate representaretur. Quod cum frequenter in aliis contingere omnib.
 possit, quaecūq. obuia eundem si p. l. d. 6. gustum experimur, cum vero longe minus futurum mirum sit, si in
 re exoticā eodem contingat, ut ab euanda, iam marcescente aliter atq. aliter a vigente adhuc, vires suas in-
 terius obtinente effusi gustus queat. At quod tunc paulo ante dicebam, non diuersimode prorsus, sed cum utro-
 b. q. calfacie diuina quadam notare potuimus hic tamen, quam ibi efficacem eam interdum esse magis depre-
 hendamus, postioraq. ita Galeni verbi non destruentis prorsus priorem sententiam sint, sed addentis potius,
 eamque ipsam tanquam in melius promouentis: a qua ego sententia non sane recederem, si qua modo postero-
 re in loco facti a prioris fuisse mentio a Galeno. Eadem hac de causa dicendum nobis non fuerit diuersi, ac va-
 rii, diuersi his in locis meminisse Maceris auctorem eundem. Neque enim facile silentio prateritum hoc a
 Galeno fuisse, praeter id quod in idem prope utitur utrobique locorum, quibus nobis rem ipsam notis prorsus
 suis implicet verbis, ut eundem omnino esse appareat. An vero antiquorum, ac nostris temporis Macer eadem,
 aut diuersa habenda res sit, quarendū. Non diuersam esse omnino videri non immerito possit quod in nostris,
 non sicut atque in veterum illo, caliditas adstringēdiq. & exiccandi vis, & aromaticum praeterea haud ob-
 scure quiddam me. omnino apparet, corticē autē idem speciem refert, imo praesertim cortex ipse est quadam-
 Eo quibus in re acuenio, et considerem affectum de quo sexto de comp. per locos libr. a Galeno mentio fit.
 Polegmonem esse in siccum tam a sententiam quam non nisi frigidi, crassiq. humores quadam procreare sol-
 ti sunt. Video quare a Galeno h. l. d. 6. Sicut a medic. facult. Maceris rem tribui v. l. d. 6. in primis exiccandi,
 quod si praestare potest, et frigidos id genus humores secundo dissipet, idem non immerito videatur dici posse
 excalfacere: si non primo ac per se, at secundario, & ex accidenti, nimirum exiccandi vis sua, dum frigiditatem
 humo-

Responū ad
 tra h. l. d. 6. G.
 leni de Macere

humorum eam omnem aufert. Sic quidem, ut quod prius Galenus in lib. de Simp. medica facultat. dixerat, *ἰκανῶς ξηραίνει καὶ σίφει, reuulerit in lib. de comp. medicament. per loca, ἰκανῶς θερμαίνων καὶ σίφει.* Ac quomam loco ξηραίνει θερμαίνων reponit, idem voluisse ac effectum omnino eundem notasse videatur, diuersa quāuis id ratione fieret, prope ut illud θερμαίνων pro ξηραίνων accipiendum sit. Reliqua enim omnia eadē de re verba sunt, hoc uno dempto, ut si reuicere dissensionis causam in librarios velimus, facere id haud vlla omnino absq. causa non prorsus immerito possimus, contendere, hoc pacto eorum culpa in sedē prioris ξηραίνων irrepisse posterius θερμαίνων. Quid est enim quamobrem usdem prope utrobq. ad rem hanc verbis uteretur, in hoc autem uno dissideret? alioqui longe quoq. verisimilius cum sit, cum insigni adstringendi vi, insignem illam exiccandi potius quam calefaciendi consistere facultatem posse. Quod si θερμαίνων scriptum omnino sit, hoc scimus, nempe egregie calidū, exiccare egregie quoq. solere. quemadmodū exiccans, sicuti prius dicebam, calefacere ex acci- 10 denti, & quidē non tenuiter, siquidē humores quos siccando dissoluit, frigidi valde fuerint. Neq. tamen interea pro magna habenda controuersia illa sit ac dissensio, in qua res eadem calida semper esse pronuntiatur, plus licet aliquando, minusq. aperta, & ex professo dictorum repugnantia esset, si quod prius statuisset frigidum, calidū postea vehementer esse assereret. Nunc cum calidum primo, sed non magnopere, secundo vero magnopere calidum posuerit, idq. interiecto annorum plus viginti spacio, videri cuiuspiam posterius diuersum potius quam aduersans aut repugnans priori, dictum non iniuria possit.

Responsio ad factas de hordeo obiectiones.

Iam de hordeo facilius est explicatio: ut enim frigidum id alibi semper statuerit Galenus, quarto autem Therap. Meth. libro, Cataplasma ex hordeo inter calefacientia & humectantia numerarit, in eam partem accipiendum dictum hoc fuerit uti Cataplasma ex hordei farina, idem, quod reliqua pus mouentia cuncta faciunt, prestare existimemus. Quae cum emplastica esse conueniat, sic meatuum cutaneorum obiteratione calorem 20 natuum detinent, ut hac de causa, quoniam quidem calorem hunc, rem calidam humidamq. adaugent, calefacere, & humectum reddere dicantur. Plus prope in eo inesse controuersia videri cuiuspiam non immerito queat, quod quum ex quarto Meth. ex suppurantibus hordeum fecisset: idem deinceps quinto de simp. Med. facult. libro, ex horum ipsorum numero delet addita etiam ratione, quod abstergentis inesse illi plus facultati appareat, quam suppurantibus conueniat. Veram hoc de simplici, ac per se. De composito illud intelligendum, ut, licet non sane multum a suppurantium temperamento recedat, haberi tamen huiusmodi non nisi addito hydreleo possit. Neq. tamen inuenta: quarto Meth. ea quidem in parte libri priuatum nominatimq. factam fuisse a Galeno hordei mentionem vllam: In hunc quidem modum scribit, καὶ τοίνυν καὶ τὰ δὲ τῆς ἀμύλου καὶ κριθῶν μαζα- 30 ματα. Quod interpretes vertit: Ideoq. ea Cataplasmata. quae ex hordei farina componuntur: quā recte, haud auctim affirmare. Nec ignoro alibi a Galeno acceptum fuisse ἀμύλου pro farina hordei, ut 14. Meth. quum ἀμύ- 30

ἀμύλου varia significata.

λύσις prius meminisset, subdit postea ὁνομαζόμενον τὸ καλεῖται ἢ λέγεται ita uoco hordei farinam. Idemq. prope 3. de compo. medicamentorum κατὰ τὸν προτάλιτ, quod nō sic tamen perpetuum habendum fuerit, ut nō accommodari alterius alicuius generis farina uox eadem ab autore eodem soleat, ut ex secundo colligi potest de corp. med. per loca lib. cap. de Cephal. Κριθῶν ἀμύλου, hordeacea inquit ἀμύλου, quasi alia quoq. quam hordeacea reperiat: & quarto eiusdem operis lib. quo loco medicamentorum Archigenis meminit utidem ἢ ἀμύλου κριθῶν ἢ πνεύνη, id est, hordeacea vel triticea. atq. uidem sexto inter Archigenis eiusdem medicamenta ad Gargareonai. Καὶ ὅμνη λύσις ἐπιπέτον τὴν δὲ κριθῶν ἀμύλου ἢ δὲ λινοσπέρμου ἢ τῆς λείας, id est, imponendumq. ὅμνη λύσις quae ex hordei, vel lini seminis, vel fenogreci farina componitur. Quod si igitur non unicum idemq. ubiq. ὅμνης λύσις significatum esse manifesto apparet, viderit interpretes, qui ὅμνη λύσις hordei statim farinam interpretati sunt, quam recte factum ab eo hoc fuerit: uti iam siquidem vera sunt, quae diximus, ac quarto Metho- 40 di, ubi nulla hordei mentio, ac suppurantia tractantur, pro ὅμνη λύσις triticeam, ut quae dubio procul suppurans sit & habeatur, accipere conuenientius, quam hordeaceam farinam liceat, nulla omnino futura in Galeno ita dictis controuersia sit, & ut cataplasma inibi tamen ex hordei farina intelligatur, calidum id, humidumq. illo quo antea diximus modo, caloris videlicet innati adauktione, intelligatur, non unius quidem hordei ratione, sed hydrelei, quod uel in primis nominandum ὅμνη λύσις sit. Sic enim ait Autor li. qui introductorius siue Medicus inscribitur, τῶν δὲ μαζασμάτων τὰ μὲν δὲ μόνον μέλιτος καὶ ἐλάει καὶ γασκιδάξεται καὶ καλεῖται μαλακτικὰ, τὰ δὲ δὲ ἰσχυρὰ, ἀπερὸν ὀνομαζομένην ὅμνην λύσις, id est, Cataplasmatū alia ex solo melle & oleo preparantur, nominanturq. μαλακτικά, alia uero ex hydreleo, aqua nimirum & oleo, quam ὅμνην λύσις uocant. Apparet iam hinc ὅμνης λύσις compositionem hydrelei potius esse quam farina adiuuenti, quae sicuti dictum fuit, ut hordeacea quoq. interdum sit, olei in primis & aqua additione nancisci temperamētum id queat esse, ut ex pus mouentibus medicamentum unum quoddam possit. Atq. hac credere omnia magis possimus, si dictorum a Gale- 50 no de hordeo meminerimus, quibus immutari eius aliquando temperamentum, & ex sicco humidum reddi aperte pronunciet. Idq. intro etiam pro cibo assumpti. Ita namq. ait, lib. de alimentis primo capite de hordeo. οὐδέποτε μὲν ἐν θερμαίνοντι τὸ σῆμα κατ' ὄνομα τρέπον σκληρίας, ἵζηραίνουσι ἢ καὶ ξηραίνουσι διαφορῶς σκευασθέντα. τὸ μὲν γὰρ ἀψίλον ἐκ τῆς φρυγείσης κριθῆς γινόμενον ἐπαρχῶς φαίνεται ξηραίνον, ἢ πικρὰν ἢ ὑγραίνον ὅταν γ' οἷς περιέχεται σκευασθῆ ἢ φ' est: Nullatenus ergo quocunq. modo paratur hordeū calefacit, humectat autē & exiccatur p. modum diuersitate, quibus preparatus. Etenim farina, quae ex tosto hordeo fit, manifesto exiccare videtur. At si sana, si p. eo ac conuenit preparatur, humectat, quae de hordeo, ut in alimentū tantummodo cedit, dicta accipi cuncta debent: Eiusmodi namque nunquam quidem excalefecerit. At extrinsecus admotum cum hydreleo, quomodo dici calidum, atque humidum possit, natuum ipsum calorem conseruando, superius ostendimus. Concesso 60 etiam quod dicta quarto Method. ὅμνη λύσις illa pro hordei farina habeatur. Id quod tamen non usque adeo firmum, certumq. esse dictis antea de causis apparet. Obiit illud dicendum hoc loco occurrit, sententiam nostram, quam olim de vini temperamento sicco, humidoque memini me protulisse, Galenicis scriptis, de hordeo hisce ueluti asserari certius etiamnum posse. Etenim si hordeum, quod siccū per se habeatur, commode preparatum, hoc est, plurimum inter elixandum cum intumuerit, deinde lentiore igne ad cremorem quandam longum, uale de dictum sic humectans reddi ualeat, quid est quamobrem existimare non possimus vini quoq. siccitatem, quae raris u. illi sic adliuata aqua attemperari, deduciq. ad humiditatem posse, ut sicuti siccano prius fuerat, nunc idem humectatio sit, praesertim cū tam facilis ac p. mpta rerū inter se harū mistura sit, ut non magno negotio aliterius, diuini, u. alteri natura, atq. adeo uincta p. uio liber. alio alterius additione possit. Non

- Non autem facile memini incidisse me in loca Galeni unquam ulla, in quibus vinum humidum statua, non autem indidem semper certissima quedam dicitur coniectura queat, de potu, ac mentioque vini intelligentia deserta esse: ideoque pro diluto, semper tunc accipienda sunt. Quoniam certum, probatum, nec frequentissimum usitatisimumque diluendi bene vini veteribus semper morem fuisse. Quasi vera esse conueniendum, ac siccatas solius, ac per se perpetuo intelligenda est, humiditas autem aqua aucta, dicitur, auctori de hoc aptissime semper tanquam applicari sensus quaque suo possunt, nulla hac quaerit in re a sensu, di cordia nulla fuerit, sicut nec in hordeo, quod varia quadam ratione, merito modo succum, modo humidum dicatur, frustra que hoc patet tot actante, a tot actantibus suscipere de rebus huius altercationes fuerint, quas diluere unica hac ex re veritateque, ipsa (ut mihi quidem videtur) annotatione liceat. Venio autem, in quo non tam Galeni culpam vis-
- 10 deatur, quod minime coherentia sibi protulerit, quam damnari, quo impossibilia, quaque fieri queant, rationi omni, et videri unicuique possit reclamant, scripserit. Ea sunt dicta sexto de locis affectibus quo loco thorace et pulmonibus contenta, quamquam raro, ac interdum tamen per alium sicuti quales ab tranverso septo sunt per urinas purgari solere dicitur a que ita pulmonis aliquando abscessum per urinam, thoracis vero per intestina. Et alium purgatum visum a ceteris ipse non dicitur. Quid non usque adeo videri mirum debeat quum haud difficulter, ut ipse ait, lauis pulmonis arteria quod pura in seipsum recipit ex abrupto abscissa, id in sinistram cordis arteriam deferre possit, unde in magnam arteriam incidens per renes in vesicam transiens deferatur. Quod quemadmodum ex vena cava, sic ex magna quoque arteria ramosa quedam protagines in renes tendunt. Cuius igitur non videatur admiratione maxima dignum (autem) purulentam in genere materiam ac corruptam prae naturalemque sanam naturam, a insensibus, non solum arteriis, quibus spiritus continentur vitales, omnium maxime rerum sibi aduersantibus noxam presentem, se letam sinistram illam cordis ventriculum occupare posse, quo loco sanguis solummodo spiritusque quidam consistere soleat ut si peruenire eo delatum per concedamus, necessarium sit cum spiritus eo in primis infici in quibus vita, tum vero horrenda inde quadam symptomata sequi, cum tantum non quotidie in curationibus ipsis videmus impetentes cor ipsam famidos quosdam vapores ac malignos, cordis tremorem, syncopem, frigidosque sudores ac horrenda queque, in se re symptomata laui: si ex aeris corruptione infecti spiritibus febres oriantur pestilentes, unde multa sepe hominum multi pereunt, quid censemus futuram decumbente eo putrida aliqua ac infecta materia, non infectum statim in spiritus ac sanguinem? cordisque vires, corpusque una totum corruptum affici credemus? His adductis rationibus inconsiderata cuiusdam ostentante prope damnas Galenium, nec in re rationem ullam te posse, ac quomodo venire in mentem Galeno potueris ut ista scriberet: maxime autem quod repugnantia huius ipsi spiritus videri possit non immerito, ut sectione Aphorismorum 1. Aphor. 21. Quae parte cauendum nobis est admonet, ne per principales corporis partes evacuatione unquam decantentur humores. Eadem culpa notat Avicenna, quod idem sensus est visus sit. Paulam, et Aetium eximius quod diuersa: Ad extremum reiecta Galeni, ipse tuam de tuo affers super re hac sententiam, et facta tamen ratio, quod fieri interdum videamus, sequetur, ac quoque videri tibi transmissioem puris hanc per venam potius sine pari fieri per quam in venam cauam delatum peruenire tandem, ad vesicam possit, non secus ac in menstruum suppressione videmus aliquando, deditibus eiusdem sursum alium sanguinem: non tandem reuerti. Atque hac fere argumenta sunt in favor, tua, quibus Galenicum de re hac dicitur praem vehementer sane abrogas. Verum si diligenter nobiscum pendentes reputauerimus, animaduertere licebit longe aliud esse, quam quid naturaliter, atque quam prae naturaliter sit, cum a facultate quadam, atque quum ab affectu, cum pars valet, atque
- 20 cum imbecillus est, cum expellitur noxa atque cum recipitur. Contrarium enim inter se rerum harum diuersam quoque ac contrariam esse rationem oportet. Nihil igitur eorum que ante attulimus ad deiciendam Galeni sententiam fuerit, in quo non affectum, imbecille ac veluti vultum esse cor ipsum necessarium sit. In syncope enim, ac tremore cordis, et huiusmodi quibus non imbecillitatem cordis videat? Non enim contingere aliter ista possunt. Eodem modo in inspiratione attractus aer pestilens, si cor, vicinaeque cordis partes male affectas, ac putredini expositas offenderet, noxam intulerit, aliter vero nequaquam: non iniuria, succumbit enim his casibus impetenti nocimento cor, viribusque suis defectum afficitur. Contra vero quoties expultrice facultate sua validum trisur, longe a se venientem semper noxam expellit, atque ut aliunde aliquando transmissam admittat, non ut retineat, admittit, sed ut propellat, quasque per transennam, et in transitu actam euiciat. Quod tunc fiat, quoque, cum pulmonis abscessus disruptus, eam sibi forte inuenit viam, ut per leuem arteriam ab expultrice
- 30 ce vi actus, tanquam fugiens sinistram quoque cordis ventriculum perstringat. Quo tempore verissime est, robore suo constans cor, spiritibusque una praeditum validis, cum alius una surgere ad res noxia celerrimam, quandam expulsionem, uti iam robusta quidem pars ea non sane admodum adfici debeat, dum integra facultatem suam obtinet, quam materiam quantumvis fuerit dam ac corruptam, de sedibus suis exturbatam pellit. Solere autem expultricem vim ex minima quaque occasione per qua, unque corporis partes humores quoscunque a se propellere, autorem habemus Hippocratem ipsum. Hippocratisque una subscribentem Galenum, Πάνδεκα παρὰ τὸ ἐλαττωμένον, καὶ πάλιν μεταδιδόναι τὰς μίαν παρὰ τὸν ἐλαττωμένον καὶ ἀμύητον καὶ ἀπὸ τῶν τῶν δὲ δαυματιάτους ἰπποκράτους ἐστίν. Id est, Videtur enim unum quodque, ex uno quoque trahere, atque ad unum quodque, transmittere, unamque, habere omnium conspirationem et consuetudinem, sicuti hoc quoque ipsum admirabilis maxime Hippocrates dixit. Hac ratione videmus ex ambitu totius corporis per singulas corporis partes de-
- 40 los trahi humores malos, atque etiam malignos saepe ad ventriculum, et intestina, rursum ex praecordis sepe ipsis in extimam cutis superficiem expulsos verti, quosque morbum faciens materia saepe numero omnium pessima, cuiusmodi quidem pestilentium februm fuerit, expultrice facultate protrusa, particulas tunc omnes permeans in ambritum diffunditur. Hippocrates igitur est, qui primus partium omnium inter se consuetudinem ac conspirationem quandam inuenit quam videri possit sequutus Galenus, dum puris transmissionem per loca cordis fieri posse asseruit. Quae si, videmus robuste partes ea sint, viresque ac facultates obtinent, suas propellendis noxiis validas, verisimilimum est, transcurrunt eas fieri posse materia tantula temporis mora per eas abacta, precipue non usque eaque tamen, ut pleraque alia male. Quamquam quidem puris ipsum cum rem esse remissam quandam, cum quo non prorsus natura vires effugerit, atque ideo qua minus esse eisdem aduersa queat. Quod si tunc temporis imbecillum cor sit, viribusque defectum suis, nec celeriter propterea depellere a se noxam

Responso ad
questionem de
expurgatione vo-
micæ pulmonis

eam valeat, non negauerim ea casu, quibus abscessus ad cordis sedes eas tetenderit, hosce Syncopen, multaque
 praeterea incurrere symptomata alia posse, atq; adeo mortem quoq; ipsam fortasse quandoq; obire. Tanta enim
 esse potest redundantis eo saniei vis ac copia, inde ut veluti suffocatus perire eger queat. Nam alias nisi copia ea
 exuberet, non crediderim facile moriturum, cuius robur tam potens fuerit, ut immutanda in melius materia
 noxia, conficiendoq; inde puri satis esse potuerit. Neq; Galeno tamen aduersantur ista, qui eo loci, sexto nimirum
 de locis affectis, nil aliud quam delationem puris per loca ea contingere posse affirmavit: subsequantur autem nec
 ne symptomata, nihil quicquam pronunciarit. In quo igitur quaeso reprehendere Galenam possumus, qui rem,
 qua fieri possit narravit, rem vero ipsam aliquando insequentia non attulit: Neq; enim necessarium semper hoc
 facere est, ut qui pus per sinistrum cordis ventriculum transire, atq; ita in vesicam deferri aliquando posse di-
 xerit, idem is, nisi tunc solere hoc ipsum grauius quandoque insequi mala addat, damnandus propterea non sit.
 Non enim rem attingit hoc, qua explicata satis esse videri potest, si delatio ea puris notetur tantum ea quidem in
 parte, in qua nihil quam hoc ostensum aliud volebat Galenus. Concesserim igitur rem hanc, symptomata ea se-
 qui interdum: non ideo culpabimus Galenū, quod id quod fiat scripserit, accidētia autē aliquādo nō scripserit: aut
 nū affectus quidā cordis, quū de his scilicet institutus solū sermo est, nō recte numerabuntur: quos nihilominus
 sequi plerūq; syncope cōsueuerit, etiā si nullā syncopes mentionē faciamus. Scimus obstructionē arteriarū vicin-
 arū cordis, syncopen facere: saepe de arteriarū earū obstructionib; loquimur aut scribimus: quoties hoc ipsum
 videlicet tantum agimus, de syncope verbum nullum: an ideo falsa nos dixisse caullabitur aliquis? Sic Gala-
 no quum derivatio tantum puris illa significāda eo in loco esset, nihil praeterea, non fuerant necessario adnecē-
 da symptomata, qua insequi interdum derivationem illam consueuerint. Quid itaque fuerit quod queramus
 de Galeno? Nunquid falsa ipsum dixisse dicemus quod per cordis loca abire in vesicam pus existimantur a
 Hippocrati hoc, & Hippocraticam illā admittere docuimus, exemploq; firmauimus maxime saepe
 liquorum humorum utro citroq; per corporis particulas omnes permeantiam, & modo se foras ex praecordiū ad
 extimas corporis partes protrudentium, modo eisdem prorsus viis, sed discessu in contrarium facto, interitua-
 lorum, idq; in omnes prorsus partes πᾶν, ut inquit, ἐκ παντός, & rursus ἐκ παντός εἰς πᾶν φέρεται, tertio de
 nat. facult. lib. nulla ut inde eximi prorsus pars videatur: Sedenim dices, non addidit malorum quorundam
 symptomatum sequelam. Primum non erat necessum hoc facere aliud agenti, remq; solū ipsam ut contigit nar-
 ranti: Deinde non semper successerint symptomata eiusmodi, sed quo casu tantum inualidum imbecillumque
 fuerit cor, spiritusq; vitales exiles, quemadmodum non quoscunq; corripit animi defectu videmus, etiam ut in
 corpore causa subit, qua facere hoc valeat. Fortis namq; virtus, quod dici solet, multo maximis nocentis
 resistit. Ne miremur igitur Galenū ista dixisse, qua, quomodo contingere possint, ratio extet. Nec valere ex-
 istimemus, transmissionem eam ad loca ea puris sequuntur aliquando symptomata quaedam: ergo transmissio
 ea non fit. Fieri autem non difficulter interdum sane posse absque quod vel pareat, vel grauius quibusdam
 symptomatis corripatur eger, aperte, nisi fallor, docuimus, ac proinde minime contraria sibi attulisse credamus
 21. Aphor. lib. 1. Quorum si recta examinetur ratio, confirmanda potius Galenica huiusmodi sententia can-
 sa adduci debeant, tantū abest ut destruant. Nihil enim aliud persuadere nobis nititur ibi, quā ut loca qua-
 ramus per qua commodius semper, ac tutius duci euacuandus humor queat: inspiciatq; semper artifex, motus
 impetum ita humorum a natura factum, ut conuenienter promoueamus, contrarium vero cohibeamus, aut
 auertamus, atq; haec sunt aphoris. libri dicta. At in de loc. affectis: solere inquit, interdum fieri, quanquam
 rarenter, ut materia ex pulmone in cor feratur. Οὐ μὲν εἴη τὸ συμβαίνειν ὡς τὸ πολὺ φθαρσις τῆς πύλης
 ψεῦδος ἢ τὰς τραχείας ἀσπείρας γίνεσθαι. Atqui ait, plurimum non ita contingere consuevit; facta primum in aspe-
 ras arterias transmissione, ut cum hanc minus natura vsitatam esse dicat, proinde minus esse quoq; intelliga-
 mus, commodam nisi tamen affatim confertimq; transmissio illa ad tracheam fiat, in quo periculum suffocatio-
 nis insit. Idem prorsus, quod in Aphor. dixerat consueuisse naturam, modo conuenienter, modo contrarie hoc fa-
 cere. Neq; vsquam reperietur Galenus eo quidem in loco euacuationem hanc aliis pratulisse, sed solere, raro li-
 tet, a natura fieri, dixisse: videlicet, ut quum potiore non inuenit, hanc tamen ipsam tanquam secundo loco
 ad exonerandum se querat. In Aphor. autem nihil aliud, quam medicum admonet, caueat diligenter, ne per
 loca inconuenientia ducat, quod nos quoq; praeciptum sequenti, quoties euacuandum nobis contentum pulmone
 pus esset, si quam moliri nobis aliam commodam magis liceret, non utiq; ad loca deduceremus paulo nobiliora,
 quod idem a natura quoq; fiat, ut non, nisi quum aliter aliqua tandem de causa non potest, puris eo ab ea ma-
 teria transmittatur. Nihil igitur controuersa in his, repugnantia nihil. Nec dissentire mihi quidem videntur
 ab his Paulus & Aetius (nam de Auicenna ne tu quidem ambigis) illud enim quod utriq; verbis prope vsq;
 quibus Galenus ad hac vsi per vasa quaedam id fieri dixerint, quid aliud, quam monstrata a Galeno via illa
 (nisi vero aliquid nobis fingamus) esse possit, fateor me non videre. Adde ad extremū quum Galenicam su-
 per hoc sententiam refutasse tibi viderere acute in primis excogitatam de tuo communiq; tibi cum quibusdam
 aliis credisq;: siquidem transmissio tandē hac fieri a pulmonibus ad vesicam debeat, per venā id solam fieri posse
 ἢ ὑπὸ quam vocant, id est sine pari. Vnde per venam cauam in vesicam tandem derinetur, non dissimuliter
 atq;, quannus motu in contrarium facto, sanguinem menstruum videmus, cum impeditas naturaliter delegata
 sibi vias inuenit, retrocessione per venam cauam ad venam sine pari deferri, pectusq; ipsum ingredi, atque ita
 sanguinis sputum efficere. Mihi autem (siquidem ingenue quod sentio dicendum est) longe difficilior hac esse,
 quam Galenica illa ratio modusq; videtur. Quū enim de pulmonis abscessu disputetur, nemini dubiū esse po-
 test, multo magis facitē habendū esse materiae illius transitū in asperas, leuesue arterias, quam q; pectoris primū
 cavitatē de pulmone emissa empyemaq; potius ita faciens, occupet, aliter enim non potest: Deinde vena sine pari
 exiguis magis osculo sese insinuet. Tum quod de sanguine menstruo dicitur, suspectū mihi valde est, ut fieri re-
 lle queat. Non enim video quomodo egressus (quod ipse dicit) venam sine pari sanguis, in cavitatemq; pectoris
 ingressus nō sanissima quaedam inferre symptomata debeat. Nō enim ignoras, quacūq; in corporis parte, praeter
 vero sithoracis cavitatem ea esset, extra vasa cōtineatur sanguis, quātopere verendos affectus faciat: quod nihilo-
 minus euenire his casib; nō experimur: praeter id q; ut sputo cānceretur conē: ut ita illa in parte sanguis, neces-
 sario prius intra pulmone: cum assumi opus esset, ut per sputū deinde ita p̄dieret. Quanto igitur minore negotio
 existimādū nobis est menstruum sanguinem per venā cauā apertis, cōtineatq; quibusdā viis in tracheā delatū sputo
 tādō cūci? Atq; haec sunt vtr̄ doctissime, qua si p̄baris, mihi quoq; p̄babuntur siu minus sequamur alia. Et qua-

Liber de Theriaca ad Pisonem ostenditur notum.

niam superest forte nunc satis adhuc mihi ad scribendum temporis, significasq; doctissimum quēq; Patavinorum me-
 duorum, quos ego. preceptorum meorum semper loco habeo, non ambicare ac Thieriaci ad Pisonem libro, Galeni,
 esse et ita dicam: ipsissimum, quamobrem ego contrarium sentiens, ad te scripsi, et rogo, legere ne gravare, licet
 paucula quadam de re hac scripta alibi a me sint. Primum disco libri dictionem illius, legisti, me semper mihi dis-
 stare visam ab ea, qua Galenus in operibus suis utitur. Huiusce ego rei fidem facere certius non possum, quā
 si per se eruditi, quos ego longe me ipso melius hoc ipsum animaduersuros sperare, collatis inter se lectionibus diuer-
 sis, exacte imprimis in hac inquirerent, insignem quandam deprehensuram vocū ac figurarū diuersitatem, maxi-
 meq; diuersas elocutionis formulas, periodos varias, fluxumq; nimis, ac solutum discēdi genus. Vox certū du-
 bitandi primum mihi ansam dedit, qua Aristoteles & Dioscorid. utuntur: Galenus (quod sciam, nunquā, nisi cū
 10 aliena forte recitat. *Αἰς δ' ἑὸς μὲν οὐλοῖς ἐστὶν δὲ τοῖς ἑμμοσάν.* i.e. Confestim amatoris inspicisti oculis. Perio-
 dus profecto nimis pro Galeno mollis. Mito enim illud ἑμμοσάν pro ἑθαλαμῶς uerbum Poeticū prosum, & prope
 dixerim, ampullatū, quibus nō temere usum Galenum reperias. Dum Pisonis filii historiā narrat, quam se pro
 adulate gerit autor ille? quod Galenus semper cauit. Diuinum sapissime appellat Platonem, Galenus sapien-
 tissimum quo loco appellari, nō succurrit, quod autor is facit. Idem Imperator ē Marcū diuinum nominat, non
 temere inuenias Galenum Marcū, aut Traianum, aut Adrianum, aut Commodū, aut Neronem, aut Seuerū,
 aut Antoninum diuinus uocasse, ut qui Casares, quoties illorum mentio incidit nominibus: ut suis appellet sic
 simpliciter. Deinde quod persuadere omnium maxime possit, temporum ratio non quadrat. Scriptum namque
 fuisse apparet ad Pisonem librum Roma duobus imperantibus Cesaribus atq; ibidem rursus Imperatoris Mar-
 ci, qui cum Vero aliquandiu imperauit, ut demortui iam mentio sit. Constat autem quandiu Roma uixit Ga-
 20 lenus, nullos duos simul regnasse Imperatores, praeter Marcum & Verum, a quibus ad Maximianorum usq; &
 Gordianorum tempora soli imperarunt. Commodus, Pertinax, Iulianus, Seuerus, Caracalla, Macrinus, He-
 liogabalus, Alexander: quanquam Macrinum regnasse sciunt cum filio annū, aut eo paulo plus. Quis si uera
 sunt, certisq; argumentis colligi potest post Seuerum Roma non uixisse Galenum, post quem demum Macrinus,
 Maximinus, & Gordianus non soli imperarunt liber autem (ut diximus) plurimum simul Imperatorum me-
 minit: necessario conuincitur, Galenum ipsam libri autorem haberi neutiquā posse, qui sub Imperatoribus duo-
 bus Marco & Vero Roma tantum fuerit, quos ipse ad Pisonem liber mortuos iam faciat. Fuisse autem Seueri
 temporibus Roma Galenū, uel illud argumento esse potest unū, quod Seueri iussu in Theriaca compositum, co-
 actus fuerit Cinnamomum ex Adriani apotheca sumere, idq; Roma priusquam secundo peregrinaretur. Post
 quod deinde tempus, cum in patriam reuersus alterā iam peregrinationem peregisset, tertio non rediit, non enim
 30 tertio peregrinatus est. Composuit autem librum de Antidotiis in patria, uiuente etiam nū Seuerō, uixitq; postea
 domi semper sua, ut nullo tandē pacto composuisse librum ad Pisonem potuerit, qui Roma post Seueri omnino tē-
 pora factus composuitq; fuerit. Idem porro manifestius adhuc facies lectio pergens. Videbit praeterita pro aori-
 stis, modo minime quidem Galeno uisitato τὰ δαιμάνα τὴν ἰατρικὴν animaduerteret adulationis genus a Galeno
 summo opere abhorrens: historiā fabula similitimā de serpentiū in Romanorum exercituum profectione, de Cleo-
 patra, de huius ipsius ancillarum nominibus, de Augusto, de Polixena, de Mithridate, de Pompeio in auster re-
 lata quadam. ὄμην εἰδότες, φημάτων σκερδιστὴν φητοῖμοις λόγοις, περιελάττοτα ἐν πλειπλοῖς φαντασίαις, οὐ γὰρ
 eis, pro ἑἴς, τὰ τὰ πρὸς ἑἴς, uocabula sunt, qua omnium minime Galeni moneta percussa uideri possint. Quoties
 quidem de suo ea profert, non alienis utitur. Illud uero quomodo credamus Galenum admissurum fuisse, ut
 puello illi Theriaca ad perniciem daretur? Hoc atq; huiusmodi praeterea quadam praecipue uero genus dicendi,
 40 longe a Galenico diuersum, fidem cuius facere possunt, a Galeni officina remouendum esse librum hunc. Ac
 uide quo progrediar: ego ne ad Pamphilianum quidem libellum, Galeni esse credo opus, eandem ob causam, ne-
 que tamen iam me Aristarchum de rebus his facio, ut ad uersuum a uorum inspectionem, sicuti in sandalarso
 ille olim, profitear Galeni me posse hanc illam uel esse aut non esse dictionem affirmare. Verum, quod in isto dixi,
 sperarem ego eruditos idem, quam me certius animaduersuros, modo animū intenderent, ut quod ego primus
 fortasse hoc deprehenderim, non id perspicacia, aut eruditionis tribuendum alicui sit, sed animaduersioni potius
 cuiusdam tantūmodo, uerborumq; inspectioni paulo magis diligenti. In qua diuini herere docti haud ita liben-
 ter soleant, studio maiora semper quadā spretis inter ea, qua illis ita uideantur, minutis his, consuetandi. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS ME-
 dicus, Iosepho Salandio. Medico, S. D.

Scribitur de Metallis quibusdam medicamentis, de Hyacintho flore, de Alica,
 Farre, Tragorigano & Paluro.



AD decimum calend. Septembris reddita mihi sunt literae tuae, quibus prioribus meis respon-
 deras. Sum autem us maximopere delectatus, cum a viro Medice facultatis studiosissimo
 emanarint, cuius percommodē nunc si uor amicitia, quin etiā cum a viro, quem & plurimi
 laudat, & cui mea scripta non parum probari intelligam. Nā et si nos desint alii docti uiri, qui
 quotidie ad me scribentes illud idem faciunt: habeo tamen tibi gratiam, quod eorum senten-
 60 tiam tot laudibus mihi probes. Cum autem ad me scribas de metallis & metallorum fornacibus, in quibus
 hisce diebus nuper elapsis fuisse ais, una cum Baptista Balisto myropola qui apud Croatas agit, uelim quidem
 meam concessisse fortunam, ut & iam me comite hoc idem euenisset. Quandoquidem ut Galenus inquit li-
 bro septimo & octauo de compositione medicamentorum secundum locos, nemo in simplicium cognitione se pe-
 ritum euadere confidere potest assidua tantum librorum lectione, et si eos quidem gratissimi conscripserunt
 authores: nisi sapius ad uisenda stirpium & metallorū genera se contulerit, & a preceptore aut in materia me-
 dica exercitatio, digiti demonstratōne prius fuerit edoctus ac scuerum, en, u, gustatuque omnia diligenter o-
 70 mus ex parte expendere. Quod cum ipse etiam aliter consequi nequirit, in Cyprium, Syriam, Lemnum, alia-
 que loca nauigauit, ut oculis propriis fossilia quae, & qua in fornacibus perferuntur, medicamentis aspiceret.
 Haec autem nolim a me esse dicta putare, quod mihi persuadam me adeo in metallis materiae peritum, qua-

Simplicium peritiam nemo potest adipisci ex librorū lectione.

Pompholyx legi-
tur
Spodium ubi
in fornacibus me-
tallis.

si tibi non nihil huiusce facultatis te docere potuissem, nec quod credam ea ipsa metalla mihi longe magis quam tibi esse cognita, sed quod videam Balistum illum, quem tecum duxeras in us censendis metallicis mecum amen- tis, qua a fornacibus in quibus as conflat, se accepisse scribit, non parum a scopo aberrasse. Quandoquidem quævis ea omnia a Dioscoride describantur, ac etiam a Galeno, non tamen illa mihi esse videntur, quæ ipse Balistus pu- rat. Scribit, n. quod mittat ad me Cadmiam, Spodium atq; Pompholygem, cum tamen repererim ex ipsius inscri- ptionibus, pro Cadmia Diphrygem missam esse, pro Spodio Cadmiam botritem subnigram, & pro Pompho- lyge Cadmia aliud genus, quod ex cinere orufescit. Legitima Pompholyx est mihi ad manus, candida farinae similis, & admodum levis, quam ipsemet ab arariis de feras fornacibus, quæ iis in locis concrevit candidissi- ma lana similis, ubi aris metallum igne flagrans vaporem extra fornacem impellit. Est etiam ad manus Spo- dium, quod circa imas huiusce loci reperitur partes, utpote ipsius Pompholygis pars gravior, & impurius. Quamobrem si una vobiscum fuisset, præter id, quod tua consuetudine ac doctrina fuisset maxime dele- ctatus. Balistus ipse non nihil fortasse doctior inde recessisset. Etenim non solum metallica hac propriis nomi- bus appellarem, sed aliâ fortasse nonnulla digito (ut aiunt) ostendissem, nempe, aris florem scoriâq; quinet- iam Cadmiam tum planciam, tum fossitiam, quæ omnia iis in locis reperiri facile crediderim. Atqui valde sum admiratus qui factum sit, ut is qui in us conquirendis te præceptorem asciuerit, ita rem omnem peruerterit. Ad hæc habeo tibi gratiâ, quod (ut fidum amicū decet) ita libere ad me scribas, tibi me aberrasse videri in Hyacin- thi historia cum adolescentem Hyacinthum, non Aiace, ut ipse scribo, in Hyacinthi florem permutatum p- tes. Quæ etiam quod de Zea dicocco agens, illam non declarauerim esse Far, quo nostrates in cibis utuntur. Cui autem certo sciam, non aliâ ob causam hæc abs te mihi scribi, quâ ut meo honori, meisq; laboribus bene consulimus velis, cupiasq; mea scripta omni prorsus erroris nota carere, nihil mihi verendū est, quin gausurus sis, cum in- traq; obiectio, te ipsum, non me quidem hallucinatum cõperies. Proinde quemadmodū ego fraternas tuas ob- iectiones cãdide ac sincere a te emanare video, ac etiam lato gratiq; animo suscipio, velim, ut eadẽ ratione me- as inmittas defensiones. Quæ tamen cum factas tam placide esse nequeant, quin te obliuiosum ostendant, ego ne egre feras, si quomodo aberrare videri, nunc tibi aperiam. Etenim id tantum efficiam, non ut te arguere velim, sed ut cognoscas me in altero non aberrasse, in altero nõ defecisse. Ut autem ad priorem tuâ obiectioem respondeam, in qua me aberrasse putas, quod non recte scripserim Aiace in florem Hyacinthum fuisse conuersum, quod ego de Aiace cruore tradiderim, Ouidius de Hyacinthi adolescentis sanguine ab Apro interfecti posteritatis memoria cõmendauerit scias velim, iam mihi sane manifeste constare, philosophiæ & medicinae studia, utpote nobiliora & fructuosiora adeo tuam occupasse mentem, ut huiusce fabule prorsus fueris oblitus: quemadmodū & mihi sæpenumero cõtigisse scio. Siquidem Ouid. lib. 10. & 11. Metamorph. scribit, Aiace sanguinem in eun- dem creuisse florem in quem Hyacinthus se permutauit. Quo factum est, ut Apollo cuius disco necatum est Hy- acinthus, Ouid. ipsius testimonio morientem solaretur his verbis:

Semper eris mecum, memoriq; barebis in ore.

Te lyra pulsa manu, te carmina nostra sonabunt.

Flosque nouus scripto geminus imitabere nostros.

Tempus & illud erit, quo se fortissimus heros

Addat in hunc florem folioque legatur eodens.

Hic enim de Aiace intelligit Ouidius, quem fortissimum vocat heroem, de cuius interitu scribens lib. 7. eiusdem operis sic carmine habet:

Nec quisquam Aiace possit superare nisi Ajax

Dixit, & in pectus tum demum vulnera passum,

Qua patuit ferro lethalem condidit enses.

Nec valere manus infixam educere telum,

Expulsi ipse cruor, rubefactaque sanguine tellus

Purpureum viridi genuit de cespite florem,

Qui prius Oebalis fuerat de vulnere natus.

Hæc Poeta ille lepidissimus. Quibus subscribit Plinius lib. 21. c. 11. sic inquit: Hyacinthum comitatur fa- buli duplex, luitum præferens eius quem Apollo dilexerat, aut ex Aiace cruore aditi, ita discurruntibus ve- nis, et Græcarum uel literarum figura a legatur inscripta. Hæc ille. Proinde videas obsecro quam late longiq; a scopo aberraueris. Verum tu videri quoniam pacto, quibusve argumentis te ipsum ab errore excusaueris, quod credas Hyacinthum ab Apro interemptum. Siquidem Adonis, quem Venus adamauerat, non Hyacinthum ab Apro illo Ouid. ipsius testimonio, occisus est, & in florem sui nominis a Venere ipsa conuersus. Sed de fa- bulis satis. Quod autem ubi in Dioscoridem sum commentatus non declarauerim Zeam, quæ Græcis Σίροκος dicitur, aliud esse semen quo far conflat, cum contra tuam sententiam certo sciam, aliud semē esse adorem, è quo far paratur, aliud vero Zeam, ex qua Alicam faciunt: operæ pretium mihi non fuit male sentire cum illis, quorum videris tu legi opinionem. Et autem non putes me fortasse hæc temere affirmare, scias velim, quod quemadmodum Pissana paratur ex hordeo a putaminibus repurgato, confractis crassiuscule granis, eodem pa- riter modo ex Zea fit Halica, & extruiceo quodam semine Adoreo vocato fit ipsum quoque far: adeo ut Pissana, & Alica & Far, non nisi arte parata è variis, ut diximus, seminibus habeantur. Caterum quod Pissana ar- te fiat, id facile comprobatur Galeni testimonio quippe qui libro de Pissana ita scriptum reliquit. Quandoqui- dem composita quedam res est, tum Pissana, tum eius tremor, ex hordenim probe contuso & aqua. & certa quadam cõctioe conficitur. Atqui non solum hæc sibi genus ita parati Pissana dicitur, sed etiam hordenim ipsam crudum ubi delibatum in particulas fuerit confractam. Idem idem Galenus ostendit libro 1. de ali- ment. facultatibus, sic inquit: Crudam Pissanam aliquandiu in aqua præaceratam, deinde in mor- tarium coniectam manibus terere oportet con- dunt præpositus & qui in superficie est cortex, sit abiectus. Is enim quod dicitur centenas tactica non totus inter pinsendum abicitur. Quapropter & præaceratur, & in morta- riorum dicitur. Caterum quod Alica paratur ex Zea, eaq; præsertim, quam dicocco vocant, testatur sane Diosco- rides quippe qui lib. 2. Alicam ex Zea ita parari scribit. Cui subscribit Plinius lib. 18. capit. 1. his verbis: Alica fit ex Zea, quam semen appellamus. Truditur granum eius in pilâ lignea, nam lapidis duritia conteritur.

Zea & Far non i-
dem sunt semen.

Pissana quæ di-
catur.

- Plinius item scribit Cōstan: in: Imperator, qui lib. 3. sua agric. Ad alicam (inquit) parandam Zea decor-
 uatur, & in ferventem aquam inicitur. Optima est, qua primū excussū est: secundum locum habet qua sic
 cedit, deterior autem tertia, id quod a Plinio transcriptum videtur loco superius citato. Quibus facile palam
 est, non solum parari Alicam ex Zea sed adeo eam frangi mola, ut postea incerniculis trita eiusdem excueren-
 tur genera nempe crassius, medium, & tenuius. Nec obstat quod scripserit Galenus libro primo de aliment. fa-
 cult. ut Chondrum ex genere esse tritici. Quippe quod (ut postea dicam) eorum loco chondrum profarre, quod
 extriticeo semine paratur, accipiat Galen. Quod autem far fieret ex quodā tritici genere, Adoreo antiquus ap-
 pellato ob eius in sacris spon: salsiorum usum, facile tibi satisfactū iri putaverim, ubi hac qua sequuntur legeris.
 Plin. lib. 18. c. 8. Frumenti genera, inquit, nō eadem ubiq, neq, ubiq, eadem sunt isdē nominibus. *Vulgatissimū*
 10 far q̄ veteres adorem appellaverunt. Et eodē ipso cap. Qui Zea utitur, inquit, non habent far. Item 7. eiusdē lib.
 cap. Populum Roman. ait farris antiū e frumento trecentis annis usum Verrius tradidit. Quo tempore nullus e-
 rat Alice usus, nec unquā post hac, nisi post Pompei magni aenum. Proinde, inquit idē P. un. Alicares Romana
 est neq, Pompei magni etate in usu fuisse traditur, nec pridē excogitata Præterea differre Alicā a farris testatur
 apertissime Asclepiades eo in eclogmate. q̄ scribitur a Gale. lib. 7. de comp. medicam. per genera c. 5. sic inquit:
 Farris Clusini appellati sextarium dimidium, decocti marrubii viridis sextarium unū. Hac in vas vitreum
 coniecta per diem & noctē macerari sinato. sequenti die Pharmacum molito. quē admodū Alicā maceramus.
 Hoc idem manifestius ac clarius demonstrat Aet. lib. 9. c. 35. ita ex Archigene transcribens: Quod vero Latine
 in regionib. Roma vicinis far appellatur, hoc modo apparatus. Frumentum mox tempore aqua madefacito,
 indeq, extractum & in pilam coniectum, veluti ptisanam, a cortice repurgato, ubi vero cortice exueris, tollito
 atq, insolato: Deinde manibus tritum, donec penitus a cortice fuerit mūdātum crassissime molito, ita ut granū
 unum in quatuor aut quinq, partes redigatur, & siccum asseruato. In suo autem tempore Alicam modo coquitur,
 & a sanis in cibo sumitur. pro agris vero varie apparatus. & Epuhematis quoq, admiscetur. Quidā huius fru-
 menti adhuc virides tollunt, ex ipsiq, far concinnant, quo modo & suavis & iucundius redditur. Hac ite. Ad
 hac facile constabit, Far nihil cum Alicā habere cognationis si Zea substantia recte expendatur. Est. n. hac fra-
 gilis, ac mollis adeo, ut cortice expoliari non possit (ut Plin. inquit) nisi in pilis ligneis cum lapidis duritia fran-
 gatur, nec queat in frigidis tractibus feri, nisi Vere inchoante, cum sit algoris & frigoris impatiens Far vero cō-
 tra, q̄ durissimum sit, quodq, algores ac frigidissimas hyemes superare possit. Ac ea propter, dicebat Plinius loco
 superius dicto far ex omni frumentorū genere esse durissimum, & contra hyemes firmissimum. Patitur, inquit,
 far frigidissimos locos & minus subactos, vel a siccis sitientesq, Primus antiquus Latio cibus, magno argumē-
 to in adorea donis, sicui diximus. Optimum far dabat olim Clusum antiquissima Etruria urbs, unde dicebat
 Plin. lib. 18. c. 7. In transpadana Italia scio vicinas quinque libras farris modios pendere circa Clusium & Senas.
 Hinc itaq, tibi palā fiet nulla dubitatione esse affirmādum, non solum Far ab Alicā differre sed quod improprie
 in quibusdā Italicis locis Alicam far nuncupent cum alicā (ut diximus) ex eo Zea genere fiat, qua dicoccos ap-
 pellatur, queq, Foroiulienibus vulgo vocatur Pirrafarra, quod ipsi quoq, perperam Alicam far legitimum esse
 putent. Sed rectam Alicā nomenclationem adhuc retinent Ananienfes in agro Tridentino, quippe qui Zeam a
 putaminibus repurgatam Algā, quasi Alicam vocant farrig, quod etiam habent proprium referuante no-
 men. Siquidem Adorem suo idiomate appellant formento farro. Quo autem factum sit, ut Alicā farris nome-
 in aliquot Italia locis hoc tempore sibi vendicauerit nulli mihi alia succurrit ratio, quam quod putarim, quod
 cum legitimi farris usus ibi defecerit, Alicā in eius locum successerit, vel quod facie fortasse far ipsum referat.
 Quomodo laricis resina, Terebinthina nomen & locum sibi vendicavit: Acorus, odorati calami locum
 40 tenet, & magnum Centaurium ubiq, legitimum mentitur Rhaponticum. Farris apud Græcos (quod memine-
 rim) nulla habetur historia, quod proprium sit far Latinorum, quanquam apud Asclepiadem (ut Galenus in-
 quit) & apud Archigenē, ut recitat Aetius) Latinū hoc nomē ex Latino Græcū sit factum. Verū tamen si far-
 ris proprium nomen apud Græcos nunquam exciterit: non tamen nobis putandum est, neque credendum, quin
 illis Far innotuerit cum eosuis in medicamentis sint usi. Namque (quantum mea fert sententia) cum si farris
 nomenclatura carerent, illud sane sub chondri genere collocarunt, tāquam sub generali nomine omnium semi-
 num, qua ad ciborum usum contracta molis expetuntur. Quamobrem Chondroptisanam & chondroalicam
 dixerunt, ut palam est ex Galeni verbis lib. primo de aliment. facult. ac etiam ex Aetio 10. & 11. noni libr. cap.
 Quamvis non negaverim quin etiam χόνδρος Græcis simpliciter Alicam quandoque designet. Nam & in E-
 50 truria tritici granum vocant, cum tamen granum uniuersale omnium seminum habeatur nomen. Quinetiā
 Latini Zeam semen appellauerunt, quo fit ut recte etiam a nobis chondros far dici posse putarim. Eodem sane Pti-
 sine nomine Græcos usos esse reperio, quod et si proprium hordei sit, eo tamen sepe numero generaliter utuntur.
 Siquidem non solum hordei sed & Alicā, & Tritici, & Oryzæ ptisanam apud illos inuenio. Testatur hoc pri-
 mum Dioscorides lib. secundo cap. de hordeo, ubi sic habet: Facit hordeacea ptisana ad acrimoniā omnes fan-
 cium asperitates & exulcerationes, quibus & triticea accommodata est. Galenus deinde lib. 1. de aliment. facult.
 Veterum nonnulli, ait, veluti Dioctes & Philotimus, Ptiisanam triticeam chondrum hoc modo paratum appel-
 lant. Et paulo inferius inquit: Quidam autem dicunt ex Alicā ptisana egrotum fuisse sanatum. Plinius præter-
 ea ex Oryzæ fieri Ptiisanam testatur est 8 cap. 18. libri sic inquit. Itali quidem maxime Oryzā gaudēt, ex qua
 ptisanam conficiunt. Quibus palam est, quod quemadmodum chondros, ita etiam ptisana apud Græcos indiffe-
 60 renter capi solent. Hoc idē in farris videri pariter obseruasse Latinos, qui tamen si far parari asserunt ex frumento
 illo Adoreo, aliquando etiam farris meminerunt hordei. Cuius rei testis est Columella ac etiam eum sequentis
 Palladius. In enim ubi phasianorum pullos nutrire docens, illis far hordei dare precipiunt: adeo ut quemadmo-
 dum Græci cum Ptiisana se habent & chondros sic Latini suo cum farris agunt. Cum tamen simpliciter prolātū
 semper adorem significet, sicut Ptiisana hordeū & Alicā Zeam. Quo fit ut mihi persuasum velim (ut superius
 diximus) quod ubi Galenus lib. 1. de aliment. facult. χόνδρος dixit: ex genere est tritici, valenterq, nutrit ac suc-
 cum lentum habet, ut ibi de farris scripserit, nō de Alicā, qua ex Zea paratur. Quem postea sequens Paulus po-
 sunt Chondrum simpliciter pro triticea specie, de Alicā post hac speciatim scribens, tanquam ab altera diffe-
 Quo postea factum est, ut Medicorum nonnulli, qui hac ignorant, plurimum sint admirati Paulum a Chon-
 dro separasse Alicam. Et hæc quidem sunt, mi Salandi qua de Alicā Farrisque differentia nunc ad te scriben-
 E E 3 de

Alicæ tris ge-
nera.

Adorem semē
frumenti genus.

Romani 300.
annis farris can-
tum vixerunt.

Farris parandi
ratio.

Farris & Alicæ
differentia.

Quo factum sit,
ut quidam abicā
far appellent.

Chondros, Pti-
sana, Far, indiffe-
renter ab auro-
ribus capiuntur.

Far ex hordeo
apud Columell.

Chondros apud
Galenum pro
farris.

Pauli locus ex-
plicatus.

Paliurus.

Lib I cap. 104.

da succurrunt, qua si accurrere, ut soles, perlegeris, nihil mihi verendum est, quin priorem abicias sententiam. Porro plantam, quam pro Tragorigano ad me misisti, cum folia serpylli non habeat, nihilque linguam exarsaciat, siccetque, sed mansuetitiam ac mollitiam quandam praesferat, haudquaquam Tragoriganum esse potest. Sunt qui eam alteram faciant Helenium, quod in Aegypto nasci scribit Crateus, & alii, qui Panacem Chironium esse putent, sed cum nota non adstipuletur, neque his neque illis habentibus subscribere volui. Paliurum quammittere polliceris, gratissima sane mihi fuerit, si legitimam referat. Sed eam tantum semen a Dioscoride describatur, nec ullam ceterarum partium notam is descripserit, nescio quo pacto mihi fuerit affirmandum Paliurum tuam esse legitimam, nisi ea ratione, quod a Graecis (ut ais) Paliurus passim dicatur. Sed varia apud antiquos reperitur Paliurum historia, ut in commentariis nostris in Dioscoridem diffusius sum commentatus. Vale, & ne obliviscaris rogo, quin Apologia tuas, quas te missurum scribis quamprimum ad me mittas. Goritia.

PAMPHILVS FLOREMBENVS FORO-
sempronienſis, Pet. Andr. Matthiolo, S. D.

Agitur de altera Dioscoridis Clematide.

Miraberis fortasse Andrea doctissimum, qui te nunquam viderit, nunquam fuerit allocutus, literas tamen ad te scribat, & amicitiam tecum inire aliquo pacto cogitet. Sed ea est eruditorum conditio, ut e multis amentur colanturque, quos illi ne noverunt quidem, tantum abest ut conspexerint. Tunc vero unus ex tanta est ingenii tui ac doctrina gloria, quem plurimi viri, & doctissimi, quidem tempore hac nostra plane venerentur. Quis enim est hodie qui Medicina studium operam navet, qui non Dioscoridem commentarios non perlegerit, non perdidicerit? nam adeo multiplici doctrina, & recte cognitione referti sunt, ut merito illos medici nocturna manu, ac diurna versare decreuerint. Me vero in primis adeo illi ipsi delectant, ut nulla dies elabatur, quin aliquid ex iis tanquam ex aliquo perenni fonte, hauriam, quod facultatem hanc medendi meam, si qua est, quam sentio quam sit exigua, locupletet: nec parum mihi contulerunt ad herbarum, fructuum, arborum, metallorumque cognitionem. Cum vero legerem ea, quae scribis de altera Clematide Dioscoridis, non videris aliam plantam conspexisse, quae illius descriptioni magis respondeat, quam eam, quae vulgo flammula nuncupatur: nec illam ipsam esse negares si per arbores reperet, quod exigit Dioscorides. Ego vero superioribus annis cum essem Forisempronii (ea est civitas prope Metaurum Umbriae, nullibus passuum a Pisaurum distans) & campos nonnunquam peragrarem, & herbas quibus locus abundat, examinare, illa saepe numero vidi, legi, gustavi, flores observavi, radices (ut nihil non excuterem) euellendam curavi, & in sententiam tuam pedibus tui Semel ante contigit arbore quandam proceram, & amplam conspicerem, de qua puniceos flores quamplurimos dependebant: cum vero propius accessissem, frutex quidam, similis Iouis flammula, viticulis ramulis, & rufescentibus, gustuque acerrimis flore tuniceo per illam repens totam occuparat: Cum primum igitur illam degustassem, haec est altera Clematis, ut existimo, dixi, & haec enim illam esse non dubito: habet enim omnia quae in ipsa Dioscoridum exigit. Hac de re volui certionem te facere, ut posthac diligenter (ut soles) inquiras hunc fructum, examinesque, & si mea tibi sententia placuerit publica utilitati elargiaris, nec adeo difficile fuerit videre tractareque, nam tamen si ager in quo nunc degis eam fortasse non seriat, habetur tamen hic Venetiis in hortu cori qui diuinus Franciscum sancti proficitur: locum appellant S. Francesco da la vigna. Sed ignorare te illud nolo, me non aque acris exulcerantique gustu praeditam reperisse hic plantam ac Forisempronii, quod nihil me mouet. Ibi enim sponte nascitur: hic vero nequaquam. Vale & me ama, a quo amaris plurimum. Venetijs.

Clematis altera
Dioscoridis
quae.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Pamphilo Florembeno. S. P. D.

Præcedenti Epistola respondetur.

Rata quidem ac peritucunda mihi fuerunt literae tuae. Ex iis enim facile intellexi quantum doctrina valeas, quinetiam (qua tua est humanitas) quantum sit tuus in me amor. Ecquid aliud sperandum erat a Pamphilo viro eruditissimo? Nulla equidem sum admiratione affectus, quod tu, qui me nunquam conspexeris, neque de facie honoris, ad me scribas & amicitiam mecum contrahere cupias cum non desint clarissimi viri, quorum consuetudine, literarum maxime, delector, cum medica materia studiosum in aliis scientiis optime versari, qui etsi nunquam me noverint, nec viderint, frequenter tamen ad me scribere solent, ac de variis materia medica dubiis per literas mecum agere. Quam ob causam facile adducor, ut aliquando mihi assenter ipse, mihi que gaudeam, non quod laudantur tantum labores nostros desiderem, sed quod optimos quosque viros us delectari audiam. Tibi vero ingentes, & ego, & habeo gratias, quod me tantum facias in Dioscoridem commentaria, quodque tam humaniter fatearis nullam prolabi diem, in qua libram meam non legas, & magno cum emolumento reuolvas. Siquidem haec omnia maxima sunt & certissima tui in me amoris argumenta. Verum quid a te in posterum expectandum, cum quae iam tertio multis auctorebus ac illustrata praedibunt in lucem, alacriori animo perlegeris? nimirum me tot laudibus abs te celebrari spero, quod nunquam mea scripta promereri crediderim. Sed haec iam missa faciamus, & ad alteram Clematidem Dioscoridum accedamus, de qua ita accurate ad me scribere videris, ut eam per te tantum cognitam, proximis Commentariarum nostrorum editionibus ceteris rei plantaris studiosis mea opera innotescere delecteris. Scias itaque veluti me idcirco tibi perpetuo fore deum, quod viderim te nulla alia ratione ad me, ut de re hac ad me accuratius scriberes, quam ut amorem erga me tuum, cuique animi liberalitate semper apud me testatam relinqueres, atque nostros in Dioscoridem commentarios splendidos redderes. Quos si, ut nihil tibi magis nunc sit in votis, quam tuam videre Clematidem puniceos flores ferentem. Hoc si conuig-

fateatur: quin etiam, ut si fortasse is falsam eorum imberit doctrinam, degustato Matthioli antidoto, hanc statim remonat. Sed iam audias quam belle, quam recte, quam facile horum confutari calumnias.

ACORVM.

Pseudoacori radicem
duntaxat acridine
pudita.

Fateor quidem, ut et Monachi scribunt, me in meis scriptis vulgaris Pseudoacori radicem, quod flore melino in palustribus & aquosis nascitur, gustui non esse acrem: gustanti enim mihi, mandentique sapius hanc, omni prorsus acridine destitutam reperi. Sententia nostra maxime astipulatur Euchsio vir profecto clarissimus, quippe qui scribat in suo libro de stirpium historia, Pseudoacorum hoc nullam gustantibus acridinem relinquere. Quod & tu facile affirmabis, ubi primum huiusce facti periculum feceris. At qui non ob id contendam reperiri non posse Pseudoacorum alius in regionibus gustu acris, ut Monachi velle videntur, quum pro regionum natura aliquando variet in plantis sapor. Verum enimvero cum loca non nominarint ubi Pseudoacorum degustauerint acris, facile adducar ut credam censura subesse mendacium, quo fit ut à primo instituto ne tantillum quidem commouear. Ego de Italico loquutus sum, Euchsio de Germanico. Sed Monachi fortasse de fanatico disputant.

Castigatio.

GALANGA.

Castigatio.

Si instituti immemores Monachi, scribunt de Galanga differentes, se falso à me de eo esse redargutos, quod ipsi nusquam scripserint, quasi inferentes his verbis, se haudquaquam scriptis commendasse communis usus Galangam non esse genuinam, sed lunci odorati radicem. Constat tamen dementatos esse Monachos suo ipsorum testimonio, quandoquidem in Galanga antidoti commentario id apertissime fatentur huiusmodi. Hec autem radix, qua pro Galanga habetur in usu, teste Brassanolo, Acorus est, imo verius, secundum alios, radix qua utitur pro Galanga, est radix Squinanthi, & non Acori. Hec illi: Quod postea reperierunt in Diamorulis antidoto, ubi Galangam vocatam pro Schœniantho substitui iubent: Quo fit, ut non parum subit furtive messis suspitio, cum sata segetis non recordantur messorum. Nouum iam audis problema, de quo fortasse latius alias differam. Interim de calumnia tuus iudex esto.

Partiæ messis
suspitio.

MEVM.

Sed videas quam inane, ac infirmum sis tertium eorum spiculum, quod in me iaculantur, cum statim excussum dissiliat & aculeum in eos resiliat. Scribunt enim mentientes, me duas Mei facere species contra Dioscoridis mentem, quod scilicet is non duas species, sed duas Mei differentias habeat, me quasi his verbis insimulantes tanquam dialectices imperitum: Quinetiam illud mihi imputant, quod genuinum non nouerim Meum. At qui qua fronte id scribere audeant asserere profecto nescio: Siquidem in primis nusquam legitur fecisse in suo codice Dioscorides plures Mei species, vel differentias, prout ipsi somniarunt Patres, cum ibi unum tantum Mei meminerit. Id quod manifesto est argumento, quam sint hi Monachi medica materia imperiti, & quam escitanter in Dioscoride studuerint. Plinium dixi non Dioscoridem Mei duas facere species, vel duo genera: quod idem significat, ubi quis Grammaticus genus pro specie intelligat, nulla prorsus facta differentiarum mentione his verbis. Duo genera eius, nobilius quod Athamanticum vocant: quo fit ut iam aperte cognoscas quanta sit Monachorum fides. Deinde, quod mihi vitio adscribant me legitimum non cognoscere Meum, haud sane moror, quandoquidem ingenui esse animi semper existimaui, & fidei hominis munus orafateri. Caterum nullam aliam ob causam de hac re me accusant, quam quod ego non sine ratione dubitarem, num Meum ab us in Neris, & Calabria montibus repertum, genuinum illud fuerit, de quo scribunt Dioscorides, & Plinius, ac si eorum scriptis aliquo in re credere deberem, haud secus quam si ea Apollinis vel Asculapi manu conscripta essent. At qui ego non ita facile soleo de rebus affirmare, quas antea non viderim, nouerimque: quine iam nec dubiam eorum soleo sequi fidem, qui nullo iudicio, nulla rerum experientia pradi, verum a falso discernere nequeunt. Profecto nunquam abre esse crediderim, nec a ratione alienum, de rebus difficultibus dubitare, quousque tractu temporis adeo inclarescant, ut nulla in posterum reliqua sit dubitatio, quo postea factum est, ut nihil temere de Meo discernere voluerim, etsi non desint qui pro legitimo Meo plantam nulla dubitatione demonstrarent, cuius imaginem nos etiam fauente Deo opt. max. nostris in commentariis unam ceteris pingi curabimus, non tamen ut hoc tantum argumento fateri videar illam genuinum referre Meum, sed ut illud nobis antea non ignoratum (ut Monachi opinari videntur) ostendam. Hanc certo scio Apulia, & Calabria Imperatricem appellari & ob id eam esse plantam, quam genuinum esse Meum nulla dubitatione hi Patres affirmant. Siquidem Imperatoriam vel Imperatricem vel herbam Imperatoris hanc stirpem vocari scribunt. Eandem plantam misit nuper ad me Balthasar Pepulus myropola Bononiensis: quo fit ut haud recte putarint Monachi me seum nunquam vidisse Meum. Vidi quidem ac noui, quinetiam pluries degustavi, sed an legitimum sit, multum de causis dubitare contigit. Etenim est in primis quod viderim, huiusce plantae radices longe crassiores vegetioresque, quam legitimum expetat Meum, quippe longas, & tenues radices Meo reddidit Dioscorides. Est deinde quod eadem grauius potius, quam suauiter oleant, quum tamen Dioscoridi Meura radices requirantur odoratae, non graue olentes. Est praeterea quod mansa non multum acrimonia respiciant. Verum, quum Galeno teste, Meum ex tertio excalfacientium ordine habeatur, nihil est quod obstat, quin illud genuinum acriori vi pollere putauerim, quam hoc omni fere acrimonia destitutum. Est etiam quod extant manuscripti Dioscoridis codices, qui Meum non Anethi, sed Anisi foliis faciant. Id quod etiam fateatur Plinius: Qui deinde non sine ratione est adductus, ut scriberet non nasci in Italia Meum, & tantum a Medicis usque ad nodum paucis fieri solere. His itaque palam est, ut non abre in censendo Meo mihi plurimum fuerit ambigendum. Etenim mihi perpetuo decretum volui, non ita facile de rebus dubiis affirmare, ne id arroganter temeritatisque, quam doctrina & diligentia nobis adscriberetur. Quam ob causam illos mihi perpetuo damnandos proposui, qui tam temere de incertis sententiam ferunt, quinetiam & eos longe magis, qui, ubi fatentur hanc vel illam non vidisse nec nouisse plantam, mox mihi irascuntur & erroris arguunt. At qui parum horum dentes pertimescere soleo, quod semper optimi viri manus esse putarim ignota vel dubia potius innol-

Lib. 1. cap. 3.

Castigatio.

Lib. 21. cap. 23.

Mei species duae.

Derebus difficultibus dubitare, non est a ratione alienum.

Imperatrix herba.

Meum, quo recentiores vruntur, pharmacopœi, non per omnia legitimo correspondet.

Meum legitimum in Italia non nascitur.

Lib. 21. cap. 28.

Authorisi. Ait. n. l. m. s.

invalere, nihilque de illis decernere, quam in posteritatis discrimen falsa pro veris describere, & dubia pro certis afferre.

SALIVNCA.

Delirus aliquando fieri Monachos manifesto est argumento, quod afferant scripisse Matthiolum nihil a Celtica narudo differre Salivncam, cum nusquam hoc in meis extes commentariis. Quinimo ibidem contrarium legitur, dum & Plini autoritate, & rationibus nonnullis contra Ruellium & Leoniceum Celso nardum & Salivncam plurimum inter se differre sum commentatus.

Solida Monachorum cetera

COSTVM.

Venio nunc ad Costum, in quo non leuiter me accusant, quod perperam scripserim dulcis Costi nunquam meminisse authenticos scriptores, cum tamen Serapio non parum faciendus autor, Constantinus & Mauritiana, dulcis Costi mentionem fecerint. Porro miror sane cur etiam Aescopi fabulas contra me non citauerint. Sed vobis obsecro quam belle ex balneo cognoscantur ones. & ex istis anseres. Serapionem ego nunquam sum ignoratus, quod is Dioscoridem, & Galenum sequutus in simplicium medicamentorum libro proculdubio inter Arabum primas tenent. At qui ubi Costi historiam & vires describit, Costi dulcis nullibi meminit, quod admodum nec Auicenna. Quod ut mihi persuadeam, ubi amari dulcis, Costi meminit capite tertio Mori quatuor subcurari, ubi priores sube, se mendis, quibus ubiq, scitent cuncta Mauritianorum vel imina. Etenim si entis id erroris facile crediderim non solum interpretum negligentia & insidia, sed etiam arrogantia, quod aliquando non modica, sua ipsorum inuentionis verba addere soleant. Quapropter nil mirum si recentiores Medici, qui hoc non ignorant Mauritianorum scriptis vel parum, vel nihil credant. Menia argumentum praebet idem ipse Serapio: etenim si sicuius dulcis Costum haberi, nulla ratione mihi credendum est, quin is illius mentione ufi fecerit, ubi proprii capite de Costi historia & viribus egit. Ceterum Constantini autoritatem, nihil horum nam praece id quod idolo in hoc decepit se. Arabum errores sequutus, cum fuerit & ipse Monachus, vultu suppliciter est testis, cum de iure iuratum sit Monachus test. mentum nec liceat si atrem de fratre, nec profra tre testari. De Montagnana autem nil aliud dicam, quam quod Galeni & Dioscoridis manes mihi excedendi sunt, et montem hunc Monachos in iudicium vocent. Et sua insidia arguant. Nam cum huiusmodi monte, ubi tot in mansueta sylue, tot precipites angustiae, tot senescio la damera, tot ferae tot veneficae reptilia habentur, nihil mihi negotii est. Igo interim vridaria & florida prata colam, amanos inuisum colles, fruzifera in agris colligam grana, afferos vero, & senticosos montes, quinetiam stramina Monachis & Eremitis relinquam.

Castigatio

Serapio nite et non improbat.

Mauritanorum volumina mendis ubique scitent.

Cap 312.

Monachi testimonium uo recipiunt.

SCHOENIANTHOS.

Scr. bent in primis de Schoeniantho agentes quod ego probare contenderim communis vsus Schoenianthi nil aliud esse, quam genuinum, sum pro ab ipsius radicibus argumento, quod si licet ex candicantes cernantur, ac tenuis, contra de apionis mentem: quippe qui haec radices fecerit cum nigras tum etiam laticas. Deinde non tolerant, ut a quibus est, Patres, sed se cla nan falso in Schoenianthi calamo a me esse redargutos quod ferre omnes Dioscoridis codices, tam Graeci, quam Latino sermone donati, nihil de calamo meminerint. Sed haec somnia potius apparent, quam cenitra. Somnia nquam, quod nusquam in commentariis meis probare contenderim Schoenianthum communis vsus, esse legitimum ex radicum, notis quum ibi de radicibus nullam fecerim mentionem. Somniarunt praece (pace eorum dixerim) scripisse Serapionem Schoenianthum radicibus esse laticis & nigris. Etenim tamen si Schoenianthi radices thymis radicibus aliquando cum laticis tum tenuiores fecerit Serapio: non tamen ob id cum Monachis dicendum sentio, radices Schoenianthi Serapionis testimonio laticis & nigras esse debere, quum is nihil de uigredine meminerit. Quod autem ad latitudinem spectat, ut in me intelligendum est voluisse Serapionem haec radices facie esse laticas, sed quod diffusius eadem per huiusmodi purgantur ac dilatentur. Quum cum thymis radices tenues admodum sint capillari modo, & quae Schoenianthi sunt, Serapionis testimonio uis longe tenuiores habentur, manifesto cuiusque erit argumento, non intellexit Serapionem de latitudine substantiae ac forma, sed quod magis late se humi diffunderent, quam uis ipse interpretes Serapionis ipsius sententiam ineptissime explicauerit. Ceterum non minus somniasse videtur de Schoenianthi calamo, cum omnes Graeci Dioscoridis codices tam manu scripti quam typis excusis, qui ad manus sunt habent, & de τὸ ἀπὸς καὶ τὸ καλὰν, καὶ τὸ πικρὸν, quemadmodum legunt Hermolam, Ruellium, Marcelium, & Cornarium praecipue Dioscoridis interpretes, quorum nemo habetur qui in suis versionibus calami non meminerit, quos si legisset Monachi, fortasse non uasemere fabulati fuissent.

Castigatio

Cap 170

Monachorum infamia Lib. 1. cap. 100

SANTALVM RVBRVM.

Medicamentorum profectio omnium ignari, non parum me accusant in Santalorubro quod illud scripserim non esse odoratum, quum tamen contrarium (ut ipsi dicunt) reperitur. Fateor quidem vera loqui Monachos. Sed e contrateorum de odore detestor, sententiam cum nusquam hactenus reperiunt, sit Santalum rorum, quod per se fuerit odoratum. Per se inquam, quod quandoque euensat, ut dum cum ceteris Santalis conuehitur, ascitio eorum odore ex contactu spirare soleat, quemadmodum & vestes, & lintheamina odorata fiunt, ubi vel Moschum, vel Ambatum, uel alia quavis odoramenta in interponuntur, id quod et ad hunc usque tempus euanscit ubi in posterum ab odoratis secerantur.

Rubrum Santalum ad est odoratum.

CANCAMVM.

Monachorum
querela.

Actiam propemodum vereor, ne tu, qui rei medica studiis admodum delectaris, fastidias in audiendis innumeris horum Monachorum erratis. Sed velim hac equo feras animo, cum tu ipse hac incommoda tibi paraueris. Conqueruntur Monachi, quod eos reprehenderim in Cancamo, quod pro Cancamo sanguinis draconis lachrymam substituerim in ea Antidoto, quam Diallacā vocant, propterea quod Cancamum menses suppressos eliciat, contra vero lachrymas illa prohibeat. Atqui cum non nouerim (aiunt) multas in plantis contrarias esse facultates, ut exempli causa in ipso Cancamo, cuius non solum (teste Dioscoride) facultas est, ut menses remotos pronocet, sed ut sanguineas gingiuarum fluxiones cohibeat, me ignorantia acriter accusant: quin etiam ut non abs re de me conqueri videantur, videri apertissime clamant hasce contrarias facultates non in Cancamo solū, sed in maiori & minori centorio, in phillirea, in alismate, in medio & in aliis quam plurimis, adduntque preterea ut suam magis videantur comprobare sententiā, mastichem, teste Galeno, constringere, ac pariter emolli-re. Id quod etiā a me scriptum esse sciunt capite de prunis, ubi affirmare non dubitavi Pruna, Tamarindos, & Myrobalanos aluum & exoluere, & simul constringere posse. Verum non possum horum satis demirari ignorantiam: siquidem cum Dialacca antidotum Cancamum excipiat eam tantum ob causam, ut recur, & ventriculū roboret, ac eorundem, & lienis infarctus expediat, ictericos iuuat, menses eliciat, & aquas cutem subentes pellat, videas tu obsecro, quare ratione lachryma, quā Draconis sanguinē vocant, cur tantū vis inest adstrictoria, Cancami loco tū temere substitui possit. Cancamū itaq; Myropola ne tā detestandū sequantur errorē Monachorum scriptis delusi, & ne falsa eorū doctrina morbos augentes affectos subinde facile in necem trahat. Quod autē dixerit Dioscorides admoto Cancamo sanguinem ē gingiuas manantem cohiberi, ut Monachi affirmant, profecto me legisse non memini, sed quod gingiuas humore prophanas attenuet, ea sane facultatis ratione, quā pariter obesos extenuat. Somniantur itaq; Patres, Cancamum sanguinis profluvia adstringere, cum nec apud Gracos, nec apud Arabas id vsquam reperiri possit. Ad id autem quod dicunt, me non nouisse quam plurimas esse plantas, quae contrarias constant facultatibus qualitacibusq; nil aliud respondendum succurrit, quam quod ipsi recte de suo testantur mendacio. Siquidem dum affirmant id me in Mastiche, Prunis, Tamarindis & Myrobalanis cognouisse, tu facile nosse poteris quam stulte se suo iugulauerint gladio.

Castigatio.
Cancami vires.

Sanguis Draco-
nis.

Myropola ad-
monentur.

Lib. 1 cap. 23.

Monachi suo i-
pforum gladio
iugulati.

COCCOIGNIDIUM.

Piper montanū.

Scripsi quidem nec id unquam fateri erubescam, Coccoignidium Ananienibus Piper montanum appellari, nisi monachi id mihi vitio vertant, & rem aliam montanum Piper esse velint. Thymelaeae enim baccae quae Coccoignidium Dioscoridi dicuntur, adeo pipere similes sunt, ut nil mirū, si rustici similitudine persuasi has baccaes in montibus prouenientes Piper montanum vocauerint. Nam & Theophrastus libro nono cap. 22. de historia plantarum ubi de Pipere agit, illico de Gnidio grano meminit, utpote quod maxime pipere faciem referat, & admodum etiam acre ienturatur. Atqui facile concedam, alius fortasse in locis fieri posse, ut incola alterius generis bacca montanum piper appellent, quod sciam alias etiam esse plantas, quae pro regionum more variis vocantur nominibus, quibus alia etiam alibi vocantur plantae, ut exempli causa de Cichorio dicam, quod id quibusdam Italiae locis vocatur Girasole, quo nomine in eadem Italia appellat alii Ricinum. In foro Julio Abrosinum ubiq; appellatur Veronica, quae tamen maxime differt a Germanorum Veronica: Ideoq; non ob id facebor iure in me scripsisse Monachos, praesertim quum quid velint pro montano pipere non dixerint.

Plantae regionū
more diuersis
vocantur nomi-
nibus.

MYRTINVM OLEVM.

Castigatio.

Myrtini olei
parandiratio

Quod cum Myrti foliis, ac baccais Myrtinum oleum parari dixerim, fateor. Atqui etiā fateor perpetuo hallucinari Monachos, quippe qui tam temere negare audent Myrtinum oleum Mesui nusquam cum fructibus parari. Siquidem is Myrtinū oleum eodem modo parari scribit, quo paratur ē Cydonis malis. Cuius parandiratio, Mesui ipsius testimonio est, ut non solum Cydoniorum malorum succus, sed ipsa etiam mala tesseratim incisa in oleo decoquuntur. Quamobrem non satis admirari possum euandam Monachorum censurā, & quod tam aperte negari non dubitauerint, ullo pacto Myrteas baccaas in myrtino oleo imponi debere. Ceterum nostra huiusce olei parandiratio Mesui non est, nec etiā Dioscoridis, sed secundum sententiā nostram: quam si improbauerint Monachi parum sane moror, cum nullo iure me Mesuem sequi quispiā cogere possit. Verum ipsi merito quidē arguendi sunt, quod in Myrtino oleo parando suum Mesuem, in quem commentati sunt, non sequantur, nec eius doctrinam recipiant & aliam huiusce olei parandirationem a se inuentam afferant.

PISSASPHALTVM.

Lib. 14 cap. 7.

Monachorum
imperitia dete-
gitur.

Scripsisse me, Pissasphaltum nil aliud esse quam picis asphaltiq; mistionem quandam, non memini, nec ullibi in meo habetur scriptis. Quamobrem neminem mihi vitio vertere putarim, si dixerim hoc etiam somniasse Monachos. Scripsi quidem id dixisse Plinū, quod etiam iterum affirmo. Sed cur Matthiolus non Plinū persequens fuit Monachi, ut obsecro respondeant, quibus veritas cordi est, & horum iam norunt insaniam, quae eo magis vinculis coercendam putarim, quo insipidius affirmare deprehenduntur Sodomeum bitumen modo Asphaltum, modo Pissasphaltum, quod est falsissimum, Graecis appellari.

MACER.

Monachorum
in Macere que-
rela.

Monachorum
argumentum.

Falso hallucinari nos in macere, inquit Monachi, scribit Matthiolus, cum tamen in hoc ille plurimū caecutiatur, dum comprobare contendit, Dioscoridis Macerē a vulgari Mace plurimum differre: Quinetiā falso Serapionis auctoritatem adducit, q; nō scribat aliud esse Dioscoridis Macer, sed quod aliter illud appellauerit Dioscorides. Verum si ita res se haberet, ut ille inquit, q; scilicet differret Dioscoridis Macer a Mace Serapionis, quidnā Galeni sententiā respondebit? Fateri quidē cogetur se in quā maximo versari errore. Patet error Serapionis testimonio, quippe qui Galeni verba referēs, antea quā Dioscoridis verba afferat, nō scribit Galens Macerē a comuni Mace differre. Quib; facile coniciet quispiā idem esse Galeni Macerē cū Mace Serapionis. Ideoq; si Galens a Macer nihil differat a Serapionis Mace, & Diosc. macer differt a Mace Serapionis, ergo Diosc. a Macer a Galeni a Macere differt. Quod tamen falsum esse conuincitur, Adhuc tamen si Dioscoridis codex, quē vertit

Faanis ac fabu-
losa ostenditur
Mona horum
sententia.

Ruborum & Ro-
sarum differentia

Infructuosa de Cy-
nosbati fructu
sententia.
Castigatio.

Cynosbati fru-
ctus qualis.

Cynosbati fru-
ctus quo pacto
colligendus.

tis testatur apertissime Plinius, cum dicat Liliam quoddam rubrum vocari Cynorrhodon. Et Capparis plantam aliquibus appellari Cynosbaton: quibus prater id habeatur rosa quadam sylvestris, quae fructum eam olivae nucleis magnitudine. Haec illorum sunt verba. Sed cuius sint valoris, et quam inania ac fabulosa, iam audies. Fabulosa, inquam, quod nusquam a me scriptum sit, Plinius et Theophrastus Cynosbaton differre a Dioscoridis Canirubo, sed tantum horum Cynosbaton plurimum differre a sylvestri rosa: quo fit, ut ubi praemissa sunt falsa, quae sequuntur vera esse nequeant. Prater id quod Cynosbati planta tam cum rosarum, quam cum ruborum generum cognationem habeat, insipida quidem videtur sententia. Quippe hoc argumento assereret quispiam, cura tamen rationem omnem, inter sylvestres rosas et rubos, qui mora proferunt, nullam intercedere differentiam. Sed quis tam fuerit amens, qui non noverit hasce plantas floribus, fructibus, caule, foliis, aculeis, et radicibus inter se maxime pugnare? Nemo sane id unquam affirmavit, nisi prorsus desipiat. Ad haec nullibi, quod legerim, viderimque, inter sylvestres rosas Canirubi meminere unquam Theophrastus et Plinius, etsi id fortasse somniarunt Monachi. Caterum ad id quod aiunt Cynosbaton fructum differre ossis olivae similem figuram non magnitudine, vel aliud verius dici potest, quam quod in hoc, quemadmodum et in ceteris, cecitavit. Probatum hallucinari Monachos ipsiusmet Dioscoridis testimonio: Siquidem de Cappari, et corno arboreo agens, proferre hos inquit fructus olivae similes, quibus facile quispiam noverit hic de magnitudine et forma intellexisse Dioscoridem: quum sensibus nostris palam sit, harum plantarum baccas non forma solum, sed etiam magnitudine olivae referre. At si Monachi in Dioscoridis lectione versati essent paulo diligentius, has fortasse non ita ignorassent. Etenim is ubi vel flores, vel fructus, vel folia cum aliis plantis comparat, nisi ad unguentum in forma, quam in magnitudine sibi corresponsdeant, semper addit magnitudinis, et paritatis differentias. Id quod in huiusce planta fructu minime praetermisisset, cum omnibus palam sit, rosarum sylvestrium fructus, non solum olivarum nucleis, sed etiam ipsis olivis esse longe maiores. Vei um prorsus dementatos esse Monachos facile coniecies, si recte perpenderit, quod hic asserant Cynosbati baccas olivarum nucleis esse aequales, et in Misiiis commentariis de Diamorone agentes huiusce planta fructum pyris similem faciant. Praterea nunquam Dioscoridem se ipsius reperio, Cynosbaton fructum semel aliquod includere, quemadmodum in rosarum fructu cernitur, quippe is copiosissimo semine refertus est non lanugine, siccis tantum, ut Dioscorides inquit, et eum sequitur Galenus. Caterum non possum subinde demereri Monachorum fidem, quippe qui asserere ausi sunt, illico post sylvestres rosas de alio Canirubi genere scripsisse Theophrastum, quum tamen de domesticis, et sylvestribus resis egerit libro et capite sexto de plantarum historia: de Canirubo vero libro tertio capite 18. inter alia ruborum genera, non inter sylvestres rosas, quemadmodum fecit Serapio Theophrastum imitatus. Sed differre Cynosbaton a sylvestri rosa idem testatur Theophrastus libro et capite nono de plantarum historia. Siquidem is Canirubi fructum averso flatu colligendum esse scribit, alioqui periculum oculis imminere: id quod aperte demonstrat super eo vel tenuem quandam lanuginem, vel pulverulentum aliquid insidere, quod si a vento expellatur in colligentium oculos, cecitatis periculum imminere. Quod tamen in sylvestrium rosarum fructu nunquam visitur. Postremo si Dioscorides scivisset, nil aliud esse Caninum rubum quam Rosam sylvestrem, sat erat illi profecto dicere, quod Caninus rubus Rosa esset omnino similis, non autem quod arboreo instar assurgeret rubo longe maior, quodque folia ferret Myrto latiora, a quibus rosa plurimum differre videtur. Theophrastus Canirubum punica speciem referre ait, quae cum folia Myrto similia proferat, non putarem ego differre Theophrasti Cynosbaton a Dioscoridis canino rubo.

SYLVESTRIS OLEA.

Infructuosa mona-
chorum fides.

Manifesta Mo-
nachorum te-
mentas.
Olea sylvestris
spinosa

Nescio profecto an temeritati vel invidia, an stultitia vel ignorantia, vel fortasse malitia ascribenda sint haec Monachorum calumniae, quum nihil prorsus rationis aut veritatis respiciant. Negant audacter Monachi, fidem nostram insimulantes, sylvestres oleas ullis rigere aculeis, nec ullo authorum testimonio contrarium comprobari posse. His, ut censura plus fidei auctoritatisque adiungant, addunt se plures vidisse in Apulia olearum plantas, tam domesticas quam sylvestres quam ego sere viderim folia: sed quantum a veritate absit eorum fides, tu ipse tibi facile testis esse poteris, quum in agro nostro Senensi sylvestris Olea frequens habeatur. Quin etiam idem ceteri testabuntur quamplurimi rei plantaria studiosi, ad me quotannis Patavio (qua eorum est humanitas) huc Goritiam proficiscentes, qui amplum sylvestris olea ramum firmissimis aculeis rigentem inspexerunt, ex Arbi Hadriatici maris insula aduectum, et ad Monachorum deliramenta aptissime utilem.

CORNUS.

Monachorum
in Geographia
ignorantia.
Idem Troic mons.
Castigatio.

Sed in Corno quid dicitur? me perperam scripsisse ex Theophrasto, Cornum arborem folia ferre Amygdala, a quibus longe magis distat, quam a Salice Ficis: quinetiam nec novisse, vel in hoc loco in Theophrasti codice subesse mendam vel fortasse Cornum nunquam vidisse Theophrastum. Prater ea, ut etiam Geographiae non imperitos ostendant, addunt nusquam legi in Theophrasti codice Idam Troiae esse montem, sed montem quendam in Creta tantum haberi insula. Ex quibus facile quispiam sana mentis coniecere poterit, quanta sit horum in Geographica lectionibus ignorantia. De Ida Troiae monte ob Paridis iudicium famosissimo scribunt apertissime Strabo, Ptolemaeus, Plinius, Pomponius Mela, et ceteri clariores Geographi, quorum non solum volumina non legere Monachi, sed nec (pace eorum dixerim) eorum fortasse novere nomina. At qui ut sapientior aliquantulo eorum evadat cuculla, sciant velim, haud nos latere in Creta quoque esse montem nomine Idam, cum saepe legerimus apud Virgilium:

Dictamnus genitrix Creteae carpit ab Ida.

ac idem a Geographis omnibus describitur. Verum non ob id dixerim, ut somnare videntur Monachi, apud Troiam alium non haberi eiusdem nominis montem, longe famosorem. Is enim Geographorum omnium consensu altissimus mons est ad Troadem praeterea in quo ingentissima habentur sylva, praesertimque resinosarum arborum, quod facile ex Theophrasti lectione quispiam coniecere potest, quippe qui saepe sapius Ida et Idaeorum plantarum meminit. At qui Theophrasto, qui plantarum historiam non Geographia de describit, non fuerit opus addere Idam esse Troadem montem, cum id ceteros, praeter Monachos, haud latere non ambigeret. Quod

autem scripserim ex Theophrasto Cornum arborem que in Ida monte crescit, folia habere Amygdala fateor, cum nec ex Theophrasto facile probare possit. Sed me credidisse, vel scripsisse, nostratam Cornum, qua nihil in hi notius est, Amygdala esse folius, nunquam sane fatebor. De Ida vero Corno, quam nunquam vidi, nullam ego certam possum afferre sententiam, nec tamen est quod prohibeat, quin libere credere queam, Cornum in Ida nascentem folio esse oblongo Amygdala emulo, quum de foliorum in plantis varietate ac forma pro regionum natura nulla sit apud auctores controuersia. Quamobrem id potius mihi credendum statuerim, quam temere cum Monachis affirmandum Theophrastum non nouisse Cornum: et si recte sane quispiam dubitare possit Theophrasti codici hoc in loco subesse mendam.

Lib. 1 cap. 11
de planta hui

N V X V O M I C A E T M E T E L L A .

Respicientne unquam hi Patres Reuerendi? Vix id mihi persuadeam, nisi fortasse cum ad Elleborum venient. Nam ubi iam cum Vomica, & Metellis nucibus, qua propria sua ipsarum facultate delirium faciunt, iis aliquandiu sit immorandum, verendum est ne tam propere ad mentem & rationem reuertentur. Scribunt me in hisce censendis nucibus adeo esse hallucinatum, ut quid de iis scripserim nesciam: quum ea nucs, que inter Myristicas reperitur nec Vomica sint, nec Metella, sed nucum Myristicarum monstrum, in quibus nulli cognoscitur deleteria facultas, ut ego mihi persuadeam. Verum Monachis danda nunc venia videtur tanquam ab hisce nucibus dementatus, & eorum toleranda calumnia: Calumnia, inquam, quod nusquam a me scriptum sit reperiri Vomica nucs, nec etiam Metellas inter Myristicas, qua su-

Monachorum
calumnia. cap. 10
dicitur.

L A M P S A N A .

Negant me nosse Lampsanam, quod scripserim hanc flore esse albo, quodque in Italia non usurpetur in cibus, quum genuina flore sit melino, & in Apulia frequentissime in cibum veniat, ubi omnibus & pueris etiam ipsis notissima habetur. Quibus recte respondi posse crediderim, quod si diligentius accuratum, que rem plantaria expendissent, & optimos legissent auctores, qui plantarum historias scribunt, non ita fortasse facile se omnibus deridendos obiecissent. Scripsi quidem, Plinii testimonio florem proferre Lampsanam napo candidiorem, non album, ut Monachi somnare videntur: id quod iterum atque iterum affirmare non verebor. Namque tamen si Lampsana melinum proferat florem, quemadmodum & Napius, cum tamen Lampsana flos colore sit longe dilutiore, recte sane Plinio scripsum est, hanc flore esse napo candidiore. Quibus verbis videtur voluisse Plinius Lampsane florem dilutiore habere colore quam napi, & non, ut Monachi volunt, absolute candido. Verum si huic rationibus sibi satisfactum iri negauerint, & me Plinii sententiam haud recte intellexisse contenderint, recte sane obuci poterit, eos legitimam non nosse Lampsanam, quum hac, Plinii testimonio, album non melinum gerat florem.

Lib. 20 cap.

B A L S A M I T A .

Sed iam esse offert recriminanda Balsamita censura, in qua, quod scripserim Balsamitam vulgo mentham Romanam vocari, non parum me hallucinatum affirmant, quum, ut ipsi dicunt, omnium consensu ea planta genuina sit mentha Romana quam ipsi Lassulatam vocant. Sed quid aliud rectius responderim, quum Monachos sua ipsorum falce sibi secuisse pedes? Etenim quum superius de Cynobato litigantes ostenderit, probauerintque plures haberi plantas, qua uno & eodem nomine appellantur, huic unitarium argumento, si saperent, acquiescere deberent. Ceterum planta, quam ipsi Lassulatam obsecro tamen auctore appellant ea est, quam in hortu passim habemus foliis salvia latioribus betonica emulis, per ambitum serratis, colore ex viridi albicante. caulibus cubitalibus, & aliquanto maioribus, corymbaceis floribus melino colore in summitate emergentibus, amaro in vniuersum sapore, & odori grauescentia. Hac itaque (ut scio) variis appellatur nominibus, cum quibusdam dicatur herba Dina Maria, nonnullis mentha Græca, aliquibus salvia Romana: sed qui mentham Romanam vocauerint, habeo neminem præter Monachos. At si a foliorum forma denominanda fuerit hac planta, cum illa salvia longe similiora proferat quam mentha, facile coniciet rei herbaria studiosi rectius hunc salvia quam Mentha nomenclaturam conuenire. Ceterum ego vulgaria hac plantarum nomina parum sane moror, quamuis nunc, ut Monachorum censuram irritam reddam, comprobare compellor non solum meo ipsius, sed tuo etiam testimonio, Balsamitam mentham Romanam nobis appellari: nec ob id tamen negauerim alius in locis, aliu vocari nominibus, cum scierim hanc, Brasanolii testimonio, Ferraria mentham Florentinam, & alibi, a crispis foliis Mentham crispam appellari.

Castigatio.

Lassulata Monachorum qua.

Salvia Romana.

A M B U B E I A .

Balsamita ad Ambubeiam veniunt, ubi me perperam affirmasse contendunt. Rostrum porcinum appellari Ambubeiam, cum nil aliud sit Ambubeia quam genuinum Cichorium. Atqui (pace eorum dixerim) rectius fortasse responderet quispiam, nil aliud esse Porcinum rostrum quam horum desipientium, quo materiam Medicam pene vniuersam defraudant, & inueterant. Quandoquidem mea ipsius sententia nusquam scripserim rostrum porcinum esse Ambubeiam, sed vocari quibusdam caninum vel leoninum dentem, nonnullis Monachi caput, alius vulgo pisca alero, quibusdam vero etiam Ambubeiam. Id quod facile comprobat Ruellius, qui in indaganda stirpium facultate inter recentiores facile primas tenet: Siquidem is, etsi scripserit primum Cichorium Latini vocari Ambubeiam: deinde tamen de Ambubeia particulare edidit caput, in quo pro Ambubeia nil aliud intelligit, quam Rostrum

Porcinum so-
rum.

FF.

porcinum

Castigatio.

porcinum sine. Monachi caput. Sed hac non meminisse Monachos non parum demiror, quum ibi tam diu derasum habuerint, caput.

OCIMUM.

Ocimi genera
trā
Caryophyllatū
Ocimum.

Cap. 150. 157. 155.

Castigatio.

Iam tedei profecto cum istis ineptiis me ad nauseam usque contendere, sed tibi satisfaciendi promptitudo me ipsum vincit. In Ocimo me accusant, quod tantum tria Ocimi genera attulerim, nec Citrati, Caryophyllati, Ocimi meminarim. Scripsi quidem ut ingenue fatear tria haberi Ocimi genera, que si aliogenus expendissent Monachi, nouissent fortasse reperiri inter ea cum Citreatum, tum etiam Caryophyllatum, cum id, cui folia in sunt purpureo Amarantho similia Citream malum olentia, vel aliud quam Serapionis Citreatum: illud vero cuius folla in sunt parua ac tenuia, incundissimum odorem spirantia, nil aliud sit quam Caryophyllatum. Etenim si quis Ocimi genera, que Serapioni tribus diuersis capitibus describuntur, diligenter expendisset, facile quidem eadem esse cognosceret, qua in nostris habentur commensariis. Sed nescio quo vultu se taceant Monachi, se primum Caryophyllatum Ocimum hoc aeno adinuenisse, quum id Serapioni folia parua in scula proferat, & caulem angulosum, his vero folia melissophylli maiora, & caulem rotundum edat.

SMILAX HORTENSIS.

Lib. 2. cap. 140.

Capreolus q. d. d.

Lib. 4. cap. 7.

Castigatio.

Quod scripserim hortensem Smilacem varii coloris phaselos proferentem capreolos edere, quibus in arboribus, aliisque sustentaculis se implicat, longe a scopo me aberrasse clamant, cum tamen si hanc in re in manifesto versentur errore. At qui cur non fatear hoc me scripserim, cum illud idem scribat Dioscorides, & Smilax ille claviculas sine capreolos reuera manifesto proferat? Facile hoc non negassent fortasse Patres, si omnes huiusce plantae partes, notasque diligentius expendissent, sique non ignorassent, quid Capreolum Latinis, quid ἑλίξ Grecis designet. Siquidem hortensis Smilax seu (ut illi vocant) Indicus phaselus capreolus utrinque in caule profert, qui etsi vitium, & cucurbitarum capreolis per omnia similes, non cernitur capreoli, tamen sunt in per omnia similes qui in aspera Smilace, in altera Clematide, & in Peristimeno habentur. At proinde recte scribit Dioscorides Clematidem alteram reperere per arbores, ut Smilax. Ceterum cum hisce plantis capreoli bicornes non sint, sed uno tantum processu prodeant, paruo emergente in caeruleo folio, putant patres hosce processus, quibus hortensis Smilax arboribus se implicat, haudquaquam appellari posse capreolos, sibi (ut puto) persuadentes ita à capreolorum cornibus denominari. Porro si haud ignari vocabuli energiam intellexissent, & sciuissent capreolum Latinis à capiendo suam duxisse denominationem, & ἑλίξ Grecis à verbo ἑλίσσω quod vertere, circumuolueri, circumflectereque designat, suam trahere originem, nouissent profecto capreolos à bicorni forma minime denominari. Hinc itaque palam fit, non oportere plantarum capreolos omnes esse bicornes, ut fortasse sibi persuasere Monachi. Quibus tamen danda uenia fuerit, quum magis diuinis lectionibus quam humanis operam nauarint.

CHELIDONIUM MINUS.

Testiculus Sacerdotis.

Ficera castigatio.

Subdubitari quidem an planta, quam Chelidonium minus vocant, genuina, ac legitima dici debeat, cum teste Galeno minus Chelidonium usque adeo acutum sit, ut exulceret ranunculi modo. At qui ob id usquam me affirmasse scio hanc herbam Chelidonium illud esse non posse, cum omnes in uniuersum nota Chelidonium minus quam maxime referant. Quinimo ut comprobarem legitimum esse, ea qua de Aro scribit Galenus in medium attuli. Nam, exempli causa, si ut ille inquit, Arum Cyrenis omni exutum acrimonia rari modo estur ab omnibus in cibus, & in Gracia perinde ac in Italia tanta illi sit acrimonia vis, ut non solum manum linguam, & fauces acerrime vellat: sed etiam cutem exulceret appositum, non est sane quod prohibeat, quum hoc idem in minori Chelidonio effecerit natura, praesertim cum in hac planta nulla penitus sit nota, qua reclamare videatur. Hac itaque etsi scripserim, ut meam soluerem dubitationem, non ita tamen temere à Monacho accusari debeo. Nec etiam quod ob acrimonia defectum subdubitari testiculum Sacerdotis (ut vocant Monachi) minus esse Chelidonium: Namque cum sciam de incertis dubitare, virtuti potius quam uisio esse ascribendum, nec ullibi de testiculo Sacerdotis uerbum fecerim, Monachos in seipso latrare sinam, & de suis inter se contendere testiculis, in quibus an aliqua reperitur acrimonia u rectius testabuntur.

RHABARBARVM.

Rhabarbarum à Rhapontico differre.

Castigatio.

Rhabarbarum à Rhapontico differre adeo firmis rationibus in nostris comprobauimus commentariis, ut nil aliud Monachis contrarium sentientibus mihi respondendum sese offerat, quam quod extrema dementia sit Rhabarbarum cum Rhapontico astimare. Nam cum nullis argumentis, nullis probatorum scriptorum testimoniis contendant, nihil Rhabarbarum à Rhapontico differre, cum astra mihi certandum non est, sed linere. Monachos sua sui ignorantia, perinde ac ceteros sui similes, qui tantum suis opinionibus additi in pertinacia simo latere malant, quam nitidis ac floridis ac quiescere rationibus.

ARISTOLOCHIA CLEMATIS.

Sed quam temere in clematide Aristolochia, quam tantum ab his et non videtur quidem, in similes, in sibi ipse facile iudex esse poteris, ubi commentariis uultus Latino sermone est profectus.

primum edendos legeris. Ibi enim non solum Monachorum censuram, peruersamque sententiam explorare reperies, sed Cordi, Adami Louicri, & aliorum quorundam opiniones consutatas agnosces, quippe qui cen eant eam genus: nam esse clematidem Aristolochiam, quam vulgum longam existimat. Clamant Monachi maxime hallucinari Mattheolum, quod asserat, fateaturque, non solum non cognoscere clematidem Aristolochiam, sed in Italia haberi neminem, qui eam demonstrat, cum tamen ubique hac vineis, aliisque in locis habeatur frequentissima, & dactylite ubique copiosior, quam putant me nunquam vidisse, & ob id haudquaquam se ambigere aiunt, me Clematidem pro dactylite perperam accipere. Huius itaque cum (ut antea dixi) satis superque responsum sit in Latina illa editione, quam propediem dabimus in lucem, & ne in hisce inaniatibus plura quam deceat et aetate nostra momenta emanescere permittamus, non est cur ea quae antea scripta sunt hic a me repeti expectet.

RUTA SYLVESTRIS.

10 **Q**uam temere asserant, ea omnia, quae de sylvestri Ruta in meis scriptis commentariis, & suis in Mesuem scriptis esse de prompta, unicuique facile constabit, qui eorum, & meos legerit commentarios. Sed nolite, obsecro, Deus Optimus Maximus, ut tam sim amens, ut Monachorum ineptias imiter unquam, in censenda mundi generis Ruta, quum ibi nil aliud habeant, quam somnia, deliramentaque, tam clara tamque euidencia, ut nullis non risum excitare possint, simulque stomachum mouere. Ipsi enim (ut rem hanc exordiar) simulac longa verborum serie de alia sylvestri Ruta, quam Armolam vocant Arabes, egerunt, concludunt tandem, ac suadent, cum haec non habeatur nisi rarissima in Italia, Myropolis eius vice recte uti posse Androsamo, quod Hypericum vocamus, quum nil aliud Hypericum si quam genuina sylvestris Ruta altera. Quae in re usque adeo desipiunt, ut non ab re mihi verendum sit, ut ullo unquam tempore ad mentem restitui possint. Sylvestris primi generis Ruta, Dioscoridis ipsius testimonio, in omnibus suis partibus hortiensi est similis, praeterquam quod gustatu sit acriori. Haec in Corinthensi agro Saluati- no, & Gargano montibus, adeo copiosa prouenit, ut toti tere Europa pro parandis medicamentis sufficere possit: quam qui viderunt, rei herbariae studiosi, horum deliramenta, quae me sibi furatum esse mentiantur, perpetuo deridebunt, quin etiam qui haec legent, quum illud palam fiet in quam multiplici hic versentur errore: In multiplici errore inquam, quod primum existimauerunt Sylvestrem Rutam ab Androsamo, & Hyperico nihil differre: Deinde quod putauerunt Androsamum, & Hypericum unam, & eandem esse plantam, quum tamen Dioscorides de his seorsim, tanquam de differentiis plantis egerit. Postremo quod prodiderint, hanc primi generis sylvestris Ruta historiam huius a Dioscoride esse descriptam, magnamque habere cum Hyperico cognationem, quod potius somniasse quam sensuum iudicio scripsisse videntur Monachi, quum non huius Ruta caput sit, in cuius fronte in quibusdam falsis codicibus illa leguntur, quae doctissimorum virorum testimonio hic ascripta, Hyperici autem propria censentur: sed eius quod proxime sequitur, in quo alterius sylvestris Ruta, quam alii Moly, alii Armolam vocant, describitur historia.

PANAX

40 **Q**uod Mesues in describendo Panace aberrauerit, & Asclepium cum Heracleo confuderit, fatentur hanc omnes contra Monachorum sententias, Medicae materiae studiosi, qui in Mesui codice Panacis caput perlegerunt. Gummi enim, quod Opoponacum vulgo vocant officina, ex Heracleo tantum (ut Dioscorides inquit) collachrymat, quippe caetera Panacium genera nihil liquoris fundunt. Atqui cum Mesui: ex planta desinat Opoponax, quae ferulaceis sit foliis, facile quispiam nosse poterit Asclepium pro Heracleo perperam accepisse Mesuem. Etenim Heracleum Panace foliis non exit ferulaceus, sed ficulneus. Deinde sui Panacis caulem facit Mesues cubitalem, quod proculdubio indicat Mesuem Asclepium describere, quod Dioscoridis ipsius testimonio Heracleum altissimum caulem proferat, Asclepium vero cubito haud maiorem. Quibus palam est una cum Mesue hallucinari Monachos.

CARVM.

50 **C**rediderunt Patres Carotam Italiam vulgo vocatam, cuius purpurea radice in acetariis hyeme vescuntur, legitimum esse Carum: quod attestantur eorum in Mesuem commentaria, quorum auctoritate freti, non leniter me erroris accusant, quod una cum vulgo crediderim illud genuinum esse Carum, cuius semine passim utuntur Myropole, quodque iidem, & Mauritianos sequuntur, Carum vocant: sed in hoc, quemadmodum in caeteris, cecuriosos Monachos apertissime demonstrat Carota semen, quippe quod gustantibus, mandentibusque nullam, vel obscuram admodum, relinquit acrimoniam, nec aliam qualitatem, qua quispiam recte asserere possit ex tertio esse ex calcamentum & exiccantium ordine, ut de Cari semine scribit Galenus, & manifeste apparet in vulgari Caro. Siquidem hoc acrimonia qua pollet, linguam non obscure mordet, & os (ut Dioscorides inquit) non ingrato odore commendat. Quis & (ut Galenus ait) manifeste ex calcificat, urinam ciet, & flatu mirifice pellit, id quod Carota semini praeter Monachos ascribet nemo, quum id nulla sit acrimonia praedium, nec aliqua in eo percipiatur caliditatis siccitatisque tam valida facultas, quae talia prestare possit. Cari historiam, qui scribat antiquorum, habeo neminem, quo sit, ut alia ratione comprobare nequiverim Carum, quo passim utuntur, esse legitimum, quam ab ipsius facultate, quae facillime gustatu deprehendi potest.

SYLVESTRE CUMINVM.

A Caro ad sylvestre Cuminum veniunt, in quo censendo non parum me ignorantis insimulant, quod non nouerim flavum Melanchinum, vel (ut ipsi dicunt) Nigellam cursum sylvestre esse Cuminum.

Nigella citrina
quid.

Seminum color
genus planta-
rum non immu-
tat.

Castigatio.

primi generis Dioscoridem: sed in mea sane sententia in magno & aperto versantur errore: quandoquidem
ut unusquisque sanamentis per se cognoscere potest, nil aliud unquam fuerit Nigella citrina quam flauis colo-
ris Melanchium, cum neminem lateat, si Monachos excipias, nigellam hanc in alio à Melanthio non
differre, quam in seminis colore. Catera namque in forma, magnitudine, sapore, ac omni denique faculta-
te nulla differentia discerni possunt, cum eadem utriusque sint folia, idem caulis, flos idem, capita utriusque per
omnia similia, idemque in omnibus hisce partibus sit sapor eademque facultas. Seminis quoque nulla ser-
ma visitur differentia, sed tantum coloris, quem qui dixerint genus immutare posse, & ex Melanthio syl-
uestre Cuminum efficere, extrema eos teneri dementia proculdubio censebunt omnes rei herbarie studiosi:
speciem enim immutare poterit coloris in semine vel in floribus varietas, sed haudquaquam genus immuta-
bit. Sed quid multa? nonne hoc idem, in papauerum semine quotidie comperimus? Ex quibus tamen ve-
rius seminis color non prohibet, quin omnia sint papauera. Id quod etiam perspicuum est in hyoscyamo, la-
taca, hortensis foliace, anguria, quam cucumerem vocamus in Hetruria, & aliis nonnullis plantis, quarum
semina etsi quandoque albo, quandoque nigro, nonnunquam & flauo rubentique colore variant, non tamen
aliud ab illis planta genus constituunt. Nam si, exempli causa, in genere Leucoii, quod albam violam
Latinis designat, non solum Dioscoridi, Galeno, Plinio, ac ceteris plantarum scriptoribus id Leucoium ap-
pellatur, quod album emittit florem, sed etiam quod croceum, quodque purpureum, amentis profecto fue-
rit opinio, quod Nigella citrina Melanthium non sit, quod sola coloris seminis varietate à Melanthio dif-
ferat. Hinc itaque palam fit, ut in hac censenda Nigella, & syluestris huiusce Cumini historia hi Patres,
& qui eos sequuntur, plane hallucinati deprehendantur. Quippe huiusce syluestris Cumini semen, in ca-
pitibus mollibus ac rotundis acerosum gignitur, fortasse vulgaris pimpinella nostratis modo, quam quidam
sanguisorbam vocant, non autem in capitibus Melanthii instar durum, solidum, ac fractu con-
sumax.

OREOSELINVM.

Castigatio.

Cap. 2.

Serapionis locus
explanatus.

Sed in Oreoselino quid somniauerunt Monachi? Somniauerunt, inquam, quod una cum Marcelo
perperam crediderint montanum Apium, quod Graci Ορεοσελινον vocant, semen papauerum modum
capitibus proferre, cum tamen hoc sit falsissimum Hermolai & Ruelli testimonio, qui recte sane animadu-
terunt Dioscoridis codicem hoc in loco subesse mendam: ideoque locum hunc pristino candore restituendum
proferant montanum Apium semen proferre non papaueris, sed cicuta, quemadmodum cetera Apium
ra. Id quod manifeste demonstrat antiqua Dioscoridis versio, ac etiam Serapionis lectio: siquidem in ma-
nifeste legitur montanum Apium cicuta semen progignere. Hac Monachorum in Oreoselino est aduer-
sum me censura, imo ridenda stultitia. & non vulgaris amentia, quum ego Hermolai, & Ruelli opinionem
sequutus, imo potius Theophrasti lectione persuasus, scripserim in commentariis meis Oreoselinum haud-
quaquam capitula papaueris modo progignere, sed semen cicuta amulum: quod omnibus palam fiet, quin
meis in Dioscoridem commentariis meam de omni Apio perlegerint censuram. Ad hac falsum esse con-
uincitur Serapioni proferre Oreoselinum semen cicuta simile, cum quispiam facile nosse possit, non sine hac
menda fuisse Dioscoridis codicem à quo transcripsit Serapio, cuius hac sunt verba: Oreoselinum est planta
habens virgam longitudinis unius palmi aut circa, qua egreditur à radice una subtili, à qua plures virgæ par-
ua egrediuntur, & a virga egrediuntur ramuli plures super quos sunt capitula similia coma, nisi quia sunt
minora satis, & rotunda, & in eis semen longum. Quibus palam est, quam acutum sit Monachorum
iudicium in indaganda stirpium historia, cum non dicat Serapio similia Conio sed Coma, quod verbum à
Meconio corruptum esse nemo sane inficiabitur, qui non usque adeo fuerit stupidus, ut nesciat an cicuta
vel papauer capitula proferat.

CHAMAELONES.

Inutilis Mon-
achorum opinio.
Lib. 3. cap. 12.

Castigatio.

Um meam in Chamæleonibus damnant sententiam, quod mihi perperam persuaserim plantas Carlinas
vulgo vocatas genuinos esse Chamæleones, in profecto in hisce censendis Carlinis prorsus hallucinari de-
prehenduntur, cum nulla dubitatione affirmauerint, Carlinam caulem habentem, quam nigrum Dioscori-
dis Chamæleonem habentem: semper existimaui, eiusdem esse Spinam albam, quam Graci ἄργυρα λευκή
vocat: Alteram vero caulem viduam, spinam esse Arabicam, quam Arabes Sucham vocant. Et
enim cum spina alba (Dioscoridis testimonio) caulem proferat inanem, bicubitalem, albicantemque per-
inde ac folia, unde fortasse suam duxit nomenclacionem, & flores purpureos: Carlina vero hac caule sit do-
drante paulo maiore, pleno, non inani, rubro, non albicante, floribus versicoloribus hyacinthi amulis, non
simpliciter purpureis: nulla ratione dici posse crediderim Carlinam hanc esse spinam albam, sed potius ru-
fam, de qua fortasse somniarunt Monachi. Neque etiam eos similiter probare posse censeo Carlinam
caule vacantem spinam Arabicam esse, quod nusquam inuenerim scripsisse Dioscoridem spinam Arabicam
caule vacare sed spina alba potius esse persimilem. Ex quo sane recte quispiam concludere poterit, Arabi-
cam quoque spinam proculdubio caulem edere perinde ac albam. Caterum quod firmissimum argumen-
tis tam rationibus affirmauerim Carlinas esse Chamæleones contra Monachorum censuram, nec id teme-
re ex me tantum depromserim, tibi ac ceteris maxime erunt argumento meum in Dioscoridem commentariis,
qui Latine iam iam è prelis prodibunt in lucem. Quamobrem quum ibi satis sententiam meam de Cha-
mæleonibus comprobauerim, non videsur hic esse opus eadem iterum repetere. Legente (ut spero) quam plu-
rimi rei medicae studiosi nostros illos labores, qui postea suam de his sententiam ferent, dicentque longe magis
decere Monachos suam colere Breuiarium, quam de simplicibus verba facere: de quibus tamen si tandem
quandoque loqui voluerint, de seipso loquantur. Siquidem usque ad simplicia, ne dicam stolidi suis ex-
scriptis appareat, ut non parua de seipso volumina conficere possint. Si hoc post hac fecerint Monachi, &
in suis persisterint calopedis, non ita fortasse deridebuntur ab omnibus.

LEUCA

LEUCACANTHA.

Porro quam falso me accusent in *Leucacantha*, ipsa mea attestantur commentaria, qua non ita facile Mo-
 nachis fortasse in suum perverterent sensum, si ut tuenda potius, quam deprimenda veritatis fuisset animus.
 Siquidem tamen si dixerim ego non esse omnino rescindendam eorum sententiam, qui *Cardium*, quem quidam
Diua Marsa appellant, *Leucacantham* putant, quod folia illi sint lactea quasi maculis injecta, radixque a-
 mara ac dura, non tamen id unquam me affirmasse constat, quemadmodum habet eorum censura. Quando-
 quidem quum neminem habeam, qui *Leucacantha* historiam scripserit, nec apud *Dioscoridem*, *Plinium* ac
 ceteros, qui de plantis scripserunt ulla habeatur huiusce plantae nota, praeterquam quod sit spina alba similis, no-
 10 abre credere quidam albis illis maculis adducti, ac etiam fortasse radicis amaritudine ac durtate, hanc lo-
 gitimam esse *Leucacantham*, quanquam haecenus horum placitum subscribere noluerim.

Falsa Monacho-
rum accusatio.Cardius Diua
Marsa.

TRAGACANTHA.

Negant subinde patres communis usus lachrymam, quam passim *Tragacantha* gummi vocamus, legiti-
 mam esse, quod genuina lingua subdita, facile (*Dioscoridis* testimonio) colliquefaciat, hac vero nunquam.
 Quinimo si lingua supponatur adeo lentescit, ac tenax euadit, ut nullo fere modo dissolui queat. Qua quidem
 in re toto caelo aberrant, ut qui *Dioscoridis* verba perperam intellexerunt. Etensim *Dioscorides* haudquaquam
 de sola lachryma lingua subdita, sed de eclegmate, quod hanc exceperit lachrymam scribit his verbis: Huius
 20 increbruit usus ad oculorum medicamenta, ad tuissos exasperatas fauces, reusus voces, ceterasque distillationes
 cum melle in delinctu, liquefcitque subiecta lingua. Hac *Dioscorides*. Quibus palam est voluisse *Dioscoridem*
Tragacantha lachrymam non solam, & per se tantum, sed in eclegmate cum melle paratam lingua esse subisci-
 endam, ut clarissimorum medicorum institutione fieri a solet cum *Bechicis* cataportis & *Diatragacantho*, qui-
 bus ipsa lachryma commiscetur: quandoquidem cum oporteat medicamenta quibus aspera arteria, pulmones,
 ac pectus uniuersum expurgari debent, quadam temporis diuturnitate ore retenta, vel lingua subdita, sen-
 sim leniterque liquefcere, ut commode in tracheam percolentur arteriam, voluit ibi *Dioscorides* eclegmatis u-
 sum describere. Nam si huiusmodi medicamenta denorentur, nihil profus proficerent, quum ita non in
 pectus, & pulmones deferantur, sed in ventriculum. Alia huic accedit ratio, quod si lachrymam per se
 tantum lingua submittendam intellexisset *Dioscorides*, subiunxisset quidem, ut sui moris sit, quibus in mor-
 30 bis id factuandum esset. Etensim absurdum plane videretur scribere, quod aliquod gummi lingua subicia-
 tur paulatimque liquefcere cogatur, ac deinde silentio praeterire quibus in morbis id faciendum. Quibus
 itaque rationibus non modo recte, meo quidem iudicio, intelligi potest voluisse *Dioscoridem* eclegma, quod
Tragacantha lachrymam exceperit, lingua subiciendum esse, non ipsam per se lachrymam, sed etiam *Monachos*
 in hoc, perinde ac in ceteris, esse deceptos.

Monachorum in-
scitia in expla-
nando *Dioscori-
de*.Lib. 3 cap 20
Dioscorid. locus
explicatus.

HYSSOPVM.

Magno etiam mihi vitio vertunt, neque ineptissime stirpium comparationem facere scribunt, quod (ut
 ipsis falso calumniantur) totam *Hyssopi* plantam unum tantum corymbum fecerim, ut cum *Chrysole*
 concordari videretur. Sed profecto nil mirum, quum haecenus ad *Elleborum* non peruenierint. Atqui
 40 quum illuc adire nequeant, nisi prius iter faciant per *Hyoscyamum*, *Papaueram*, *Mandragoram*, *Soporiferum*
 ac *manicum Solanum*, non parum sane verendum est, ne somno longe altiori adducti eo nunquam perue-
 nire queant, nisi fortasse somniantes. Ego enim, si vera fateri debeam, nusquam unum tantum corym-
 bum *Hyssopi* plantam feci, sed quae densioribus fuerit cum surculis, tum etiam solis floribusque comam
 recte imitari. Quibus palam est *Monachorum* argumenta perperam ex commentariis nostris esse de-
 prompta.

Faceta calliga-
uo.

STOECHAS.

AB *Hyssopo* illico ad *Stoachadem* se conferunt, in qua non parum me aberrasse volunt, quod eam *Arabicam*
 esse *Stoachadem* affirmauerim, qua *Venetias* affertur, quum ipsi *Arabicam* viderint plurimum forma ab
 50 altera differre. Ceterum in hoc falsa deprehenditur *Monachorum* censura, quod non absolute unquam scri-
 pserim *Stoachadem* omnem, qua *Venetias* conuehitur, ex *Arabia* deferri: sed quod non solum nascitur *Stoachas*
 in *Stoachadibus* insulis, unde illi nomen, sed etiam in *Arabia*, unde *Alexandriam* primum, & hinc deinde
Venetias defertur. Idcirco non ob id mihi imponere debet patres, quod scripserim, putarimque non afferi etiam
Venetias *Stoachadem* aliunde quam ex *Arabia*, quum id nusquam affirmarim. Atqui *Monachi* ipsi recte re-
 dargui possunt, quod ita temere dicant nullam esse *Venetias* *Stoachadem*, qua eo ex *Arabia* aduecta fuerit, cum
 tamen non desint negotiatores, qui *Monachorum* sententiae reclamabunt. Ad id autem, quod dicunt *Arabi-*
cam *Stoachadem* forma non parum esse ab altera dissimilem, nil aliud contra illos in medium afferam, quam
 propria eorum scripta, quorum non ita facile obliuisci debebant. Siquidem quum iam diu palam sit scri-
 60 pisse illos suis in commentariis, nullam aliam inter nostras *Stoachidem*, & *Arabicam* intercedere diffe-
 rentiam, quam quod hac densioribus sit ramulis: nescio sane qua fronte hic plurimum, hanc ab illa differ-
 re mentiantur, nisi fortasse dixerit quispiam spuria illa esse commentaria, eaque pietate ductos, sibi adopta-
 se patres, nec haecenus ea adeo diligenter perlustrasse, ut de cunctis remuisci queant. Verum ab illis
 scire velim, quoniam ex *Arabia* *Stoachadem* illis videndam transmiseris, si, ut illi aiunt, non affertur
 in *Italianam*.

Falsa Monacho-
rum censura.

DICTAMNVM.

Sed et in *Cretensi* *Dictamno* in me sua spicula mittunt, his verbis: Non declaras *Masthiolum* cuius ge-
 neris *Dictamnus* sit, quod nunc ex *Creta* passim habetur, quum tamen is scire debuisset sensum illud esse
 FF 3

Monachorum
obiectio
genus,

Exploditur Mo-
nachorum opi-
nio.

ius Diofco-
ris restitutus.

genus, de quo postremo loco meminuit Dioscorides. Primum enim nec florem, nec semen profert. Sed tertium illud è contra & flores & semen edit, quo sit, ut illud esse non possit, sed tertium, cum omnibus in confesso sit. Dictamnium quod hoc tempore ex Creta in Italiam comportatur & flores, & semen gerere: quin etiam nec as- firmari debere, aiunt, esse hoc Pseudodictamnium. Nam quum hoc in omnibus suis partibus primi gene- ris Dictamno correspondeat, recte sane quispiam censere poterit, neutiquam hoc flores proferre, nec etiam se- men. Hac Monachorum sunt argumenta, quibus probare nituntur, non solum me in censendo primi ge- neris Dictamno plurimum a scopo aberrasse: sed quod Dictamnium hoc, quo passim pro genuino utuntur Se- plasie, tertium illud sit genus, quod ex Creta quoque afferrit scribit Dioscorides solus silymbrii amulis. Sed quam infeliciter hoc sibi persuaserint patres, testatur apertissime Theophrastus, quippe qui libro nono capite decimo sexto de plantarum historia, simulac de genuino Dictamno, & Pseudodictamno fusius egit, de tertio etiam scribens: Est, inquit, aliud quoddam Dictamnium veluti æquiuoce appellatum: Nec enim speci- em, nec vim habet eandem: quippe quod folio silymbrii constet & ramis condatur maioribus, cuius usus cum aliis minime convenit. Quibus palam est prorsus hallucinari Monachos, quum communis usus Dicta- mnium folia silymbrii non habeat, sed Pulegio maiora, crassiora, tomento quodam, sine spissa lanugine obdu- eta, gustu acrimordacique. Quae quidem nota tantum tertio illi Dictamno reclamant, quantum genui- no, de quo primo loco scribit Dioscorides, omnibus astipulatur modis. Sed deprauata esse ea Dioscoridis ve- lumina, quae de floribus habent, & τε δὲ ἀνδρὸς ὅτε καὶ τὸν φῶγι nescierunt Monachi, cum tamen ex Theo- phrasto comprobari possit. Quippe in loco superius citato de Cretensi Dictamno agens: usus, inquit, non ra- morum nec seminis est, sed foliorum. Siquidem his verbis palam est, Dictamnium primum, & ramos & semen edere, quin etiam per consequens & flores, de quibus apertissime scribit Vergilius libro duodecimo Ae- neidos. Sed cum magis deceat Monachos, Prophetas audire quam Poetas, Vergilianam illam Carmina silen- tio inuolunt. Tu vero si Dioscoridis codicem suo pristino candori restitutum hoc loco habere cupis, ita re- scribito. & τε δὲ ἀνδρὸς ὅτε καὶ τὸν συμπέγει: id est, neque flos neque semen confert, scilicet, in medicamento, ut inquit Theophrastus.

DAUCVM.

Inanis censura.

Lib. 1. cap. 69.
Dauci species
tres.

Non parua profecto meredarguunt ignorantia in Dauci descriptione Monachi sua hae inani censura, quam ita describunt. In Dauci capite Matthiolus una cum aliis nonnullis perperam Dioscoridis interpretatur: siquidem in tertio Dauci genere rem omnem confundunt, quum primum hoc Anethum bellam & semen ferre scribant: Deinde vero addant Pastinacem umbellam, & semen cumino simile. Id quod euenisse scimus quorundam verborum causa, quae hoc loco in Dioscoridis codice desiderantur. Pater menda ex antiqua Dioscoridis versione, quae quatuor Dauci species habet, scilicet tertiam Anetho, & quartam Cu- mino non absimilem. Hec omnia Monachorum sunt verba, quibus non in me solum, sed in ceteros quot quot sunt clarissimos Dioscoridis interpretes, imo in Dioscoridem ipsum inuehuntur: sed temere sane, & suo tantum futili consilio persuasi, quandoquidem nullus (quod sciuerim viderimque) habetur Dioscoridis co- dex, nec manu scriptus, nec typis excusus, qui de pluribus quam tribus Dauci generibus meminerit. Nec plura quam haec habent Oribasius & Serapio, qui ad verbum ex Dioscoride transcribunt. Quinetiam nec Aucenna plures quam tres refert Dauci species, nec Arabs, vel Graecus alius, qui de plantis scripserit. Id- eoque cur magis hisce discalceatis blateronibus credam quam antiquissimis Dioscoridis imitatoribus, & cum tam praeclaris interpretibus, nihil habeo quod me tantillum dimoneat, eoq; praesertim quod antiqua illa Dio- scoridis versio, quae ad manus est, hos manifeste mentiri asserat: quandoquidem etiam hoc non de pluribus quam de tribus Dauci generibus meminit.

SENA.

Zingiber cum Se-
na admisceatur.

Lib. 1. cap. 154.

At quam nec sui se dissimiles praestant in Sena? Etenim quod scribam Zingiber cum Sena miscere Mesuem, non solum ut eius in deicienda alno roberetur facultas, sed etiam, ut ab eius Sena no- xa, quam illi idem tribuit Mesues, defendatur ventriculus, non parum me inscitia accensant Monachi, ac si Zingiberis ignorarem facultates. Numque quum si perperam sibi persuadeant Zingiber nihil posse iuuare ventriculum, nil magis Senae admistum praestare posse putant, quam ipsius augere vires. Sed si maxime decipiuntur, quum Zingiber (Dioscoridis testimonio) non solum aluum leniter emolliat, sed etiam ventricu- lum iuuat. Id quod tertio de Aliment. facultat. capite vigesimo primo testatur pariter Galenus.

ROSMARINVM.

Lib. 1. cap. 72.
Rosmarini ge-
nera.

In Rosmarino nodum in scirpo querentes, non paruo mihi vitio verentur, quod de tribus tantum generibus legerim, quum tamen tum Dioscorides, tum etiam Galenus quatuor fecerint Rosmarini differentias, quin etiam quod perperam foeminam Libanotisidem pro secunda specie reposuerim, eamq; fecerim fruticosam. Qui- bus nil aliud sane fuerit respondendum, quam quod qui facile malignos hominum animos cognoscere cupi- unt, eos intueantur, qui leui quacunque causa rixantur, perinde ac Monachi, qui calami nostri candorem, tam lenibus cauillationibus, ac ridendis admodum censuris interturbare insicereque moluntur. Etenim ubi affirmabam me vidisse Venetium primum Rosmarini genus, intellexeram quidem de utraque maris dif- ferentia, quod pariter ambas maris plantas sub uno tantum genere comprehenderit Dioscorides, quum nullo inter ipsas intercedat differentia praeterquam in semine: quandoquidem is in ipso capitii principio duo, inquit, habentur Rosmarini genera, vnu fecundum, frugiferumq;, alteru vero sterile. Quod vero in capitii ipsius pro- cessu pro frugifero genere utramque maris plantam intellexerit is, pro sterili vero foeminam, si facile affirma- bant.

unt, quoniam Dioscoridis lectione fuerint versati. Quibus cum palam sit priora duogenera unum tantum Dioscoridis legentis: quid Monachis mirum videri debet, si Dioscoridam imitatus ego pariter ex duobus illis unum fecerim genus?

PEUCEDANVM.

Peucedanum, quod legitimum sit se iactant ex Hispania secum attulisse patres. Quoniam vero patineque sunt, quod quippiam praeter ipsos Peucedanum ueniens scribat, non solum negant me in Ananensibus montibus inuenisse Peucedanum sed nec id esse uolunt. Qua in re palam sit quam inanis gloria cupidi, mecum contendant Monachi. Quippe quod haudquaquam pro certo affirmari Ananense Peucedanum esse genus, num. sed adeo Peucedanum suis notis referre, ut illud semper peucedanum existimem, quoad aliud se mihi offerat, quod euidentioribus notis legitimum referat.

LASERPITIVM.

His accedit altera fere similis Monachorum calumnia, in qua etsi nihil deliquerim, non tamen sibi praetermittendum putarunt, quin hac etiam in re mereum facerent. De Laserpitio itaque agentes affirmant, me contra Dioscoridis, & aliorum antiquorum sententiam, Laser pro planta, pro lachryma uero sepe accepisse Laserpitium. Sed quam inique me arguant patres, facile testantur mei in Dioscoridem commentari: quoniam quidem ubi eo in loco ex me ipso loquutus sum nunquam a puero huiusce usus sum nomenclaturis. Ideoque mihi uisio uertere patres non debent, si interpretis, qui Ladouici Romani peregrinationes Latinitate conauit, cuius uerba tibi nobis allata sunt, planta nomenclationem pro lachryma perperam acceperit, quum id erroris sibi non mihi sit ascribendum. Sed profecto nesciunt, quo corruant impis, cum a ueritate uia semel aberrauerint.

EUPHORBIVM.

Postrema Monachorum obiurgatio, ut omnium ineptissima, ita praeceteris sibi explodenda, quum diligentius uidentur esse scribans, an Euphorbium, et ego commentatus sum, ab Euphorbo suba Mauritianorum Regis medico suam desumpserit denominationem. Quam in re mihi forsasse succumbendum fore putarent Monachi nisi Plinius grauissimus auctor eorum retunderet temeritatem, ne dicam insaniam. Siquidem in libro 25, cap. 7, inuenit, inquit, & Patrum nostrorum aetate Rex Iuba, quam appellauit Euphorbium medici sui nomine & fratris Muse, a quo Diuum Augustum conseruatum indicauimus, hac ille. Sed iam me profecto tadet, imo potius pudet tam ineptissimum ac puerilibus Monachorum censuris longius respondere: Nam etsi plura quam haec in me scripserunt, tamen quum nihil frugis praeter hanc inde colligi possit, merito sane cetera mihi despicenda duxi. Quapropter, quae reliqua sunt tibi censenda relinquo. Etenim quum diutius iam sis in simplicium cognitione uersatus, horum ignorantiam, & in plantarum historia insensam facile per te metipsum cognoscere poteris, Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Francisco Melchiorio Medico,
S. P. D.

Literis tuis quas ad 11. Calend. Martii mihi publicus reddidit ueredarius, mirum in modum sum delectatus, quod ex iis intellexerim quam diligenter commentariorum meorum persequari locutionem. Ego uero, quum pro ea paterna beneuolentia, quae te semper complexus sum, summo semper sim desiderio, ut in diis huiusce medicae materiae perusor sis, non possum non laetari plurimum, ubi te intelligo nunc huiusce studii assiduam nauare operam. Ideoque praetermittere non possum quin te, quem fere a teneris (ut Graeci dicunt) unguentis omni paterna pietate educatus, nunc plurimum hortor, ut hoc tuum institutum ad finem usque sequaris. In quo eo magis te promptum assiduamque praestare debes, quod iam mea consuetudine institutus, non sane parum hac in re haecenus profeceris. Itaque legis atque iterum relegis, uelim, lucubrationes illas meas, non modo ut inde aliquid quotidie addiscas, sed ut diligenter obserues an aliquid ibi inuenias, quod minus recte a me scriptum existimes. Non enim uisum quibus mihi persuadeam mea scripta usque adeo esse elaborata expurgataque, quin in aliquibus, imo fortasse in multis reprehendi possint, quam nihil perfectum, inculpatumque praestare possunt homines. Proinde nihil gratius mihi conferre poteris, quam ce his, a quibus tua dissenferit opinio, ad me sepius scribere, quemadmodum nunc primum huiusce tuis literis facere capisti: uideo enim ex iis quam diligenter Marcellum Dioscoridis interpretem, ac etiam eum sequutum Brasauolum in Hyperico a mea tuearum censura, quae eos redarguere non sum ueritus, quod de florum colore minus recte interpretati sint Dioscoridem. Siquidem si hoc pacto tuum mecum exercueris ingenium, non solum tibi ipsi plurimum profeceris, sed mihi etiam respondendi disputandique de his occasione parabis. Scribis uideri tibi Marcellum ipsum atque etiam Brasauolum curarationem omnem a me esse redargutos, quod interpretati sint in Dioscoride Hypericum album edere florem, quum tamen habeat Graeco dicitur *ἄλβιον*: id est, florem habet album. Ac ut non uidearis ex te ipso asserere nihil aliud quam album designare, Plinium in Mediuuicis: quippe qui libro 15, capite septimo, de coloribus agens, Melinum quoque, inquit, coloris candidi, optima est. Optimum ex Melo insula. His itaque Plantanae lectione fretus palam effraguisti Marcellum, Brasauolumque haudquaquam aberrasse, ob idque immerito a me esse redargutos. Quod sane non parum contra meam faceret sententiam, si ita uerba haberet ut tu ex Plinio tibi persuadere.

M-linus color
qualis.

Marcellus, &
Brasanolus haud
recte defenſi.

ſuaſos. Caterum nō poſſum non mirari tuū de animi mei ſinceritate iudicium, cum tertio ſcias ex longa, quam
exocum habes, conſuetudine, neminem ſolere calumniari Matthiolum: ſed eos potius admonere, quos pro-
culdubio deliquiſſe cognouerit. Sed non ob id tibi ſuccenſere velim, quum forteſſe potius diſcendi cupiditate
motus, quam redarguendi voluntate de re hac ad me ſcripſeris. Hoc itaque quum mihi perſuadeam, pater-
ne tecum agam. Si autem animi mei ſinceritatem tantum à veritatis ſcelo commotam eſſe intelligas, & ratio-
nes, quibus inductus ſum clariffimis illis viris contradicere, a veritatis ſcopo non abeſſe cognoſcas, nec meam
me ſeſeſſe opinionem, ſcias utique, velim, nuſquam aliud quicquam Dioſcoridi deſignare Μήλιον quam
luteum, ſive aureum colorem: Albū vero nequaquā. Quo quidem vocabulo in hoc ſignificato uſus eſt is, non
ſolum in Hyperico, cui proculdubio flores aureo ſunt colore, ſed in aliis fere innumeris plantarum floribus, qui
nullo alio colore extant, quam luteo: ſed quod tibi palam fiet, & te à tua amovebit ſententia, ſi in Dioſcoridis
codice Celtica nardi, ranunculi, fertula campana, Heracli, panacis, hieracii, peucedani, conyza, alterius nym-
pheæ, buphthalmi, gallii, verbafci, thapſie, & aliarum plantarum quarundā hiftorias perlegeris. Si quidem in
omnibus hiſce locis habet Dioſcorides αἰθῆρας μήλιον. Quo ſane palam eſt, nil aliud Melinum colorem Dioſco-
ridi deſignare, quam luteum: quum hæc ſingula planta, quas genuinas eſſe fatemur: omnes, luteo aut aureo flo-
re proculdubio habeantur. Nec hiſ obſtat tui Plinii autoritas, qua forteſſe deceptus eſt Marcellus: quando
quidem non denominat Plinius album illum colorem, quo ſuo auro utebantur pictores à vocabuli ſignificati-
one, ſed a loco a quo aduehebatur, nempe ab Inſula Melo, unde ſelectiſſimus afferebatur in Italiam. At qui
Dioſcorides non a loco, ſed a malorum præſertimque Cydoniorum aureo colore, qua Græcis Μήλα dicuntur, Μή-
λιον perquam recte denominat. Quo fit ut non poſſim non demirari Marcelli alioqui doctiſſimi viri inge-
nium, quod in cæteris plantarum floribus, de quibus ſuperius meminimus Μήλιον ubique luteum fuerit inter-
pretatus, & quod in Hyperico ſuiſſis oblitus Μήλιον album reddiderit: quod etiam de Brasanolo dixerim.
Etenim quum is amplum ſimplicium medicamentorum examen ediderit, ne ſcio ſane quo pacto Græcum Dio-
ſcoridis codicem non inſpexerit diligentius, vocabulaque non expendere, qua ad plantarum, & florum colores
ſpectant: quin etiam quod potius Marcelli lectionem ſequi maluerit, quā ad fontem vinum lubia admouere:
ex quo qui commodè limpidam poſſunt haurire aquam, & ad riuulos inde manantes potius declinant, malo
quidem conſilio ducuntur. Hæc ſi diligentius expendere, non ſolum me legimus iure cognoſces accuſaſſe Mar-
cellum ac Brasanolum: verū, & tu ipſe facile fateberis, me nulla alia de cauſa ſcripſiſſe id in clariffimos illos vi-
ros, quam ut errorem hunc è medio tollerem: quinimo & eos ipſos accuſare incipies quos prius defenderas. Ca-
terum non ob id prætermittis velim, quin in poſterum de aliis, qua tua forteſſis obſtabunt ſententia ad me ſcri-
bas. Hoc ſi feceris erit mihi tam gratum, quam quod gratiſſimum: namque ubi erroris conſcium me adme-
ne o, fatebor id tibi ingenuè, & poſthac meipſum emendabo: ubi vero ſecus euenierit, pro virili enitar tam ſer-
mè meipſum tueri argumentis, ut non ſolum tu poſthac iis ſubſcribere poſſis, ſed & cæteri, qui tua potius ſenti-
tiæ, quam meis aſtipulabuntur commentariis. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Hippolyto Brillio Medico, S. P. D.

Probatur Guaiaci ligni decoctum non eſſe indifferenter dandum Gallica lue affectis,
& præſertim ubi bilioſus fuerit affectus.

Prima contra
Matthiolum
poſitio.

Quod ſi ſeruas literas tuas reddidit mihi Marcellus Capuanus Tergeſtinorum Præſectus, quibus
antea reſpondere non licuit, quod in conſiciendo commentariorum meorum Indice plurimum
ſane fuerim occupatus. Ex illis itaque intellexi, quod quum meum de morbo Gallico libellum
nuper legeres, non parum fueris demiratus, quod ſcripſerim Guaiaci ligni decoctum nullaratio-
ne conuenire Gallica lue affectis, qua cum ſtaua bile complicata fuerit: quin etiam nec iis, qui-
bus recur fuerit præter modum bilioſum. Caterum quum tibi videatur mea hæc opinio non parum à veritate &
ratione deſedere, decreuiſſe te inquis, exercendi ingenii cauſa, contra ſententiam meam non inualidè nunc
diſputare a gumentis, quibus facile ſperas à mea me amoturum ſententia. Quod ut præſtare videaris hanc in-
primis adducis poſitionem, ſcilicet, quod ea contraria ſunt, qua maxime inter ſe differunt, qua que ſe conſi-
munt, ac inuicem ſeſe propellunt: ſed ea qualitates, qua ſunt in Guaiaco, & qua ſunt in aqua in qua Guaiacū
iſum decoquitur, ſunt omnino contraria. Nam illud calidum, ſiccumque pollet facultatibus, hæc vero frigidum &
humidum. Vnde palam eſt, magnas admodum inter Guaiacum & aquam haberi contrarietates. Quo fit, inquis,
ut hinc facile ſequatur, quod hæc contraria facultates ſibi adeo opponuntur, ut neceſſario opus ſit, ut altera alte-
ram vincat. At qui quum qualitates, qua in Guaiaco habentur, minus valide ſint ac potentes, validiores a-
que vires ſuperare non valent. Namque Guaiacum (recentiorum medicorum teſtimonio) calidum eſt circa
tertium exceſſum: Aqua vero (ut Ariſtoteles inquit lib. 2. de generatione) extreme hebetur frigida. Quam-
obrem neceſſario fieri oportet, ut calida Guaiaci qualitates, a frigideſſe aqua ſuperentur. Vnde ſequitur, ut
Guaiaci ipſius decoctum potius ad quandam tendat temperiem cum humiditate quadam coniunctam, quam
ad aliam qualitatem qua in calore exuperet. Quin etiam hoc idem fieri contendis, quod in decoquendo me-
dicamento longe maior ſit aqua portio, quam ligni, quum unaquaq; Guaiaci libra in quatuordecim ſexdecim-
ve aqua libris decoqui ſoleat: qua quidem aqua quantitas ob frigidiffimas, qua ei inſunt, qualitates, non mo-
dicas poſſidet vires, quibus Guaiaci calorem mitigare, ac refrigerare poſſit: id quod pariter enuit in hordei de-
cocto, aut cremore quem Græci pteſanam vocant. Etenim tametiſi hordeum frigidum habeatur & ſiccum ob
aqua tamen (inquis) in qua decoquitur, miſtionem, ſicca eius facultas uſque adeo deperditur, ut eius decoctū
frigidum & humidum euadat: quo fit, ut febrientibus commodiſſime, ac admodum utiliſſe exhibeatur po-
tandum, non ſolum ad refrigerandum corpus, ſed etiam ad febrilem calorem extinguendum. Qui argumen-
to ſeruiſſe idem in Guaiaco conuenire aſſeris, quippe quod dum in aqua decoquitur calida eius qualitate ab ipſius
aque frigideſſe proculdubio ſuperentur. Vnde poſtea euenit, ut aqua in qua Guaiacum fuerit decoctum mo-
derato

derat et tum exco' facere, tum exiccare possit. Deinde quum hac sola positione haud satis contra me dictum cen-
 seas huius secundam annectis: quod scilicet is ex rebus, qua in suis temperamentis aequales habentur, nulla
 se altera longe maioribus: id quod ex Guaiaco haudquaquam sequi potest, cum longe facis superque fueris
 comprobatum imbecilliores, minoresque eius qualitates a fortioribus maioribusque in aqua permanentibus
 facile superari. Quibus apertissime cognoscitur, ac probatur Guaiaci decoctum non admodum exco'ficere
 posse. Postremo inquis, quod si ex duabus positionibus concederetur prima, sequeretur ligni Guaiaci decoctum
 biliosis haudquaquam dari debere se a quum consequens sit, aliam habetur falsum & antecedens. Quod enim
 consequens falsum sit patet ex communis praedicantium usu qui indifferenter Guaiaci decoctum propinant in o-
 mnibus corporum temperaturis. Id quod te frequentissime vidi se afferis tum Patavii, tum etiam alibi in quam-
 pluribus, non solum luc illa Calicia affectis se latus etiam diuturnis morbis, qui pro medicorum sententia Gua-
 iaci decocto sanati sunt. Quod tamen si caliditatis aliquid possidat, attamen quantum videri potest plu' sa-
 tis in a minis quam lesionis semper afferi solet. Quibus palam est Guaiaci decoctum in biliosis affectibus
 minime prohiberi debere. Haec tua sunt praesidia, quibus putas meam te destruere sententiam. Sed an ad-
 ueris: quippe quod ubi quis sibi diligenter profecerit, raro aduersis succumbit insultationibus. Caeterum,
 ut ad me a confugiam praesidia, inquam, positiones propositionesque tuas apud omnes tui similes videri so-
 posse efficacissimas: sed ubi recte us mandantur, quibus optimus, & haud infectus fuerit gustus, si uone in-
 illum qui lem salus habere deprehenduntur. Tu (quantum video) elenchi tui fallacia me superare credi-
 deras. Atqui ut videas a se non abesse Matthiolum, primi tui argumenti vim infirmissimam esse pro
 nuncio, quod pariter falsissimum sit fundamentum a quo id proficiscitur. Quandoquidem haec prima qualita-
 tes elementales (id quod quum te Medicum proficaris scire deberes in unoquoque compositum omnes simul ha-
 bentur: ubi quanquam una plerunque aliam suis viribus nonnullis superet gradibus, non ob id tamen ut tu
 perperam arguis) altera alteram destruit, nec a suo loco expellit. Quinimo potius euenit, ut hinc ea non so-
 lum resultent corpora, sed denique corrupta permancant: nec obstat quod altera contrariarum qualitatum al-
 teram viribus superet longe maioribus. & primum inter cetera sibi ven dicit dominium, a quo unumquod-
 que compositum sibi nomen a iustis, vel calidi, vel frigidi, vel humidi, vel sicci a primis que ad quartum tem-
 peramentorum gradum, prout una longe magis quam altera in hac vel in illa exuperat qualitate. Quo fit,
 ut cum tua quibus niteris fundamenta proculdubio falsi inaniaque habeantur, quicquid ulterius edificauo-
 ris destruat, & ruat. Ad id autem quod dicitur calidas qualitates, quae in Guaiaco sunt, frigiditas aqua
 vires nullo pacto vincere posse, quod illa his minores sint, & longe imbecilliores, quodque aqua quantitas
 Guaiaci quantitatem plurimum exuperet, dicam (ut tui omnibus respondeam argumentis) te facis ne
 gligenter perpendisse decoctorum omne genus, qualitates, ac vires. Quandoquidem si aqua (ut tu minus
 recte tibi persuades) calida vinceret superaretque medicamentorum, quae in ea concoquantur, qualitates, de-
 cocta proculdubio fierent temperamento proxima, vel potius ad frigidum, quam ad calidum declinarent,
 si, ut putas, a maiori aqua frigiditate ac quantitate superari deberent, quo fieret, ut non incassum mododa-
 rentur in frigidissimis morbis ubi maxime calida medicamenta requiruntur, sed cum non parua propina-
 rentur agrorum iactura sita tamen, ut quidam faciunt. Pseudomedici, vel potius impostores, consentire non
 puderet, uno tantum medicamento unumquemque posse curari morbum, ut tu affirmare non vereris. Affe-
 rere enim non debitas Guaiaci decoctum indifferenter exhiberi posse tam in calidis, quam in frigidis morbis,
 vel temperaturis. A qui quum hoc decoctum temperamento proximum feceris, nescio sane quo pacto tibi
 persuaseris, ut in frigidissimis morbis utiliter propinari possit, quum huiusmodi affectus haudquaquam
 temperatis medicamentis vel temperamento proximis expugnari queant, sed us, qui plurimum caloris pos-
 sident. Ceterum ut redeam unde diuerteram, scias oportet, quod dum Guaiacum aqua elixatur, cum eius ca-
 lida siccaque qualitates in diuissimo impaeta sint corpore non se permittit vnica ipsa virtus ab aqua frigiditate
 te superari. Etenim durum ubi etiam minoris fuerit quantitatis, facilius agit in molle, quam e conuerso.
 Quinetiam aquae qualitates ignium ut agitata, longe magis in auram resoluuntur, quam quae in Guaiaco con-
 sistunt, quod non aliam ob causam tam longa protrahitur coctione, quam quod difficile admodum eius quali-
 tates ab eis separentur. Ad haec facile probari potest aquam in qua Guaiacum incoquitur, non admodum Gua-
 iaci ipsius caliditatem alterare posse. Siquidem quam primum ipsa effervescit, igneus introducit calor, & o-
 mnis eius naturalis deperditur frigiditas, cuius illico sedem occupat feruoris ipsius auxilio calida ligni facultas
 ta, qua quum subinde paulatim aquam in sui ipsius conuertat naturam prohibet etiam quod simul ac refrige-
 rit, ne exposito ignis feruore frigiditas unquam post hac introducat. Quo fit, ut huiusce ligni decoctum, perinde
 ac crudum lignum, vel etiam fortasse magis excalfaciat, ut postea non infirmis dicam rationibus. Quod autem
 decocta quaelibet veras eorum quae decoquantur qualitates facultatesque sibi asciscant, nec eas, (ut perperam
 indicas) ob aquae frigiditatem vincant, & prorsus redeant imbecilles, facile probatur Aristotelis testimonio,
 qui libr. 3. Meteororum cap. 4. tuam destruit sententiam his verbis: Coctio ab interiori humoris calore effici-
 tur, & propterea, quae in sartagine versantur assursi solent: ab igne enim mutantur, & efficiuntur: humorem au-
 tem in quo ipse calor versatur magis siccum reddit, quandoquidem illud ad se trahit: at id quod elixatur con-
 trarium agit. Nam ex illo ipso humor e calore, quem exterior continet humor, exprimitur. Haec ille. Quibus pa-
 lam sit ea, quae elixantur medicamenta, in liquorem cui incoquantur vim suam transmittere. Ad hunc euenit
 quod ubi dulcis ac potabilis aqua in terra visceribus calefit feruetque in metallis, metalli cuius ascisi, ut sibi facul-
 tates, & ex frigidissima, admodum calida cum actu, tum potentia fiat: id quod: infallibili scitur experientia ex
 earum thermarum aquis sponte nascentibus, quae aut sulphur, aut sal, aut nitrum, aut chalcantum respiciunt. Idcirco
 recte in hunc sententiam concessit Galen. lib. 1. de simp. med. facultatib. sic inquis: quae ex se ac sincere aqua
 est, si per bituminosa sulphurea, nitroaque loca dilurens substantia eius aliquid absterferit, secumque tra-
 xerit, mixta iam est: multa enim est diuersitas potabilium aquarum, & salarum, & earum quae sulphur, aut
 bitumen, aut nitrum, aut chalcitum, aut Myssi, aut chalcantum, aut (ut simpliciter dicam) quae calidiorum
 natura

Secunda positio

Responso ad Primum

Decoctorum consideratio non inuacua

Guaiacum lignum cur longa regat coctione

Guaiaci decoctum non minus excalfacere quam ipsius lignum

Decoctum quodlibet veras eorum qualitates quae decoquantur sibi adsciscit. Altra & elixa contrario modo se habent. Aqua metallis admitta temperamentum permutat.

natura medicamentorum gustu aliquid referunt. Inimica enim sunt omnes calidis nostrorum corporum affectibus, ex quo clares has omnibus facultatibus esse calidas. Hec omnia Galenus contra tuas obiectiones tumque medendi usum: cum afferas feliciter dari Guaiaci decoctum, quod calidum siccumque faciunt omnes in principio tertii excessus, Gallica lue affectus quā biliosus foueat humor, & ubi secur ipsum prater naturam fuerit excalfactum: quin etiam iis, qui simul cum hoc morbo marasmo etiam laborant, quum afferas indifferenter dari omnibus. Verum nunquam negauerim ego non posse secure propinari decoctum in biliosis temperaturis, ubi Gallica lues ab ipsa bile immutata non foueatur, sed ab alio quouis humore, quum morbi contrariis curentur, temperamentum vero similibus sanferuetur. Sed ubi biliosus fuerit affectus, calidis curare medicamentis extrema sane dementia fuerit. Adhuc, ut omnibus tuis respondeam argumentis, dicam etiam, quod ubi scribit Aristoteles aquam ultimo excessu esse frigidam, ibi de aqua nostri usus non loquatur, sed de simplici, ac purissima aqua, ut elementum purum, in quo nulla sit ceterorum elementorum qualitatum admixtio: quandoquidem nostri usus aqua nequam simplex fuerit, nec talis, cum omnium philosophorum consensu cū ceteris mixta sit elementis nec vacet terreis, aereis, ac igneis qualitibus, ut Galenus testatur libro primo elementorum, & libro de ptisana, & pariter Auerrhoes diuersis in locis. Siquidem si nostri usus aqua frigida esset ultimo excessu, ut inquit Aristoteles, de simplici ac purissima aqua, proculdubio potantem interficeret, quā talis sit eorum facultas, quae extreme sunt frigida: extinguitur enim ab his naturalis calor, ut de Cicuta, & Meconio scripserunt fere omnes antiqui Medici. His itaque cognosces quam frivolis mecum agas argumentis. Ad exemplum autem quod adfers de hordei decocto, quo probare niteris quod Guaiaci qualitates aqua coctione reddantur imbecilles, nil aliud respondere possam, quam quod existimem te in non paruo versari errore. Etenim si diligentius, accuratiusque expendaris, qua ratione velit Galenus hordei decoctum seu Ptisanam longe magis sitim extinguere quā simplicem aquam nostri usus, reperies sane scribere Galenum euenire hoc non quia in aqua deperdat hordeum dum coquitur siccam qualitatem quam possidet sed ab us verioribus de causis, quas tamen quum medicum te profitearis, ignorare non deberes. Ceterum quum apertissime cognoscam haec te prorsus nescire, audias obsecro, ut doctior paulo fias. Galenum de ptisana differentiem his verbis: Ptisana, inquit, sim hordei decoctum sitim reprimat ceu humidum, atq; eandem (quantumuis humiditate inferior sit) plus aqua compescit. Porro quod citius digeratur quod ob eius lentorem firmam quandam habeat humiditatem, quodq; praeterea frigida sit: Horum inquam, nomin. febribus ardentibus accommodatissima est, nec eatantum gentia quod his vndequaue repugnet sed quod e maxime coctilibus sit, atque in nulla non qualitate imbecillima digestuque facili, atque ob deterfivam vim putridos succos lustrat, semiputres autem concoquat. Haec Galenus. Cuius doctrinam si rectius expendaris, causas, quibus hordei decoctum magis refrigeret, & sitim extinguat, quam aqua pura potabilis, facile cognosces, & tui erroris conscius fies. Quinetiam illico coniciis hordei ipsius qualitates nullas destrui posse aqua relaxatione, sed in ipso semper permanere decocto: id quod apertissime testatur Galenus cum dicit: Ptisana (quantumuis humiditate inferior est) sitim plus aqua compescit. Quandoquidem hisce verbis manifesto ostendit Galenus non aliam sane ob causam ptisanam aqua potabilis minus esse humidam quam quod in ea remanserit siccā hordei qualitas: quinetiam hoc idem ostendere videtur cum dicit ardentibus febribus accommodatissimam esse ptisanam, non ea tantum ratione, ut his vndequaue repugnet: id quod proculdubio indicat non vndequaue ardentibus febribus repugnare ptisanam ob hordei tantum siccitatem, quae in ea permansit. Praeter id quod in ptisana, vel hordei decocto, conseruetur siccā hordei quali as idem maxime palam facit Galenus, ubi scribit ardentibus febribus etiam convenire ptisanam, quod sua detergendi vi putridos succos lustrat. Etenim quum deterfio in hordeo ab alia qualitate quam a siccā esse nequeat, cogaris, velis nolis, necum fieri hordei decoctum siccam eius qualitatem sibi proculdubio ascivisse. Itaque dicemus una cum Galeno non debet magis humectare ptisanam, quod aqua potabili sit humidior, sed quod humiditas, quae in ea reperitur ob lentorem qui illi inest firmior sit, & magis permanens, quam quae habetur in aqua. Nec alia saneratio est quod longe magis ab aqua, quam aere humectentur Ethica febre laborantes, quanquam est aer sui natura humidior quam aqua, quam quod aqua humiditas firmior, crassior ac permimentior habeatur quam aer: proindeque primo canticorum dicebat Auerrhoes: oportet autem te scire aerem esse humidiorē aqua, & quod aqua sit nihilominus in humectandi corporibus quibus obuiat potentior quam aer propter maiorem substantiae consistentiam. Quantum vero spectat ad secundam positionem, scilicet quod ab his, quae equali sunt temperamento nulla prorsus resultet actio, &c. nil aliud mihi respondendum videtur, quam quod cum iisdem confundatur argumentis, quibus primam, una cum consequentibus irritam fecimus, superfluum sane esset, ac radiosum, hic eadem repetere argumenta. Ceterum ad tertiam in qua dicitur (petendo id, quod est in principio) quod si concedatur prima duarum positionum, scilicet quod ea contraria sunt &c. sequeretur, quod in biliosis affectibus, nullo pacto dari deberet Guaiaci decoctum: sed quum consequens sit falsum necesse est esse falsum etiam antecedens, quodque falsitas palam sit ex medicorum practicanum usu, &c. Respondeo hac omnia non parum tua detrahere authoritati, quippe qui, spretis philosophicis rationibus fallaci inhaeris experimento, quod tamen Hippocratis testimonio periculosum, ac fallax est, nisi ratione consistat. At qui posteaquam hoc tantum te reus fundamentum, fateor ego ingenue, quod nullum unquam viderim recte curatum simplici ligni Guaiaci decocto, qui Gallica illa lue biliosa teneretur, quum tamen certo sciam innumeros Guaiaci truncos, & corticis eius quamplurimum non solum in lue illa, sed in aliis permultis diuturnis affectibus me feliciter consumpsisse. Quod cum exercitatis, mi ac doctissimi Medici non ignorent ubi coguntur in biliosa Gallica lue, vel ubi secur nimia bile redundet, Guaiaci decoctum exhibere potantem, in vniuersa aqua quantitate (ut tu faciendum putas) calidam ipsius non temperant qualitatem, sed aut intubum, aut cichorium, aut buglossum, aut melopeponum, cucurbitarumq; semina admiscunt. Siquidem horum frigida qualitates cum permanentes sint, & ab aqua asciscantur in qua decoquantur, corrigunt temperantque calidas & siccas Guaiaci qualitates, unde postea sit, ut agri nulla percepta noxa conualescant. Sed non possum non mirari plurimum quod hac te ignorare iam primum animaduerto, quodque tibi persuaseris Guaiaci decoctum parum, vel non multum abesse a temperamento, cum non solum ex assertis rationibus, sed etiam gustu, quo fere solo medicamentorum qualitates cognoscuntur, quis recte apertissime conicere possit decoctum hoc usque ad tertium caliditatis gradum ascendere: id quod maxime palam facit acerrimum incendium, perire

Decocti Guaiaci temperantem

Responso ad exemplum de hordei ptisana vel decocto.

Lib de Ptisana.

Ptisana facultates. Ptisana cur febribus repugnet

Hordei qualitates coctione non destruuntur.

In ptisana non deperditur hordei siccā qualitas.

Deterfio in hordei decocto aqua fiat qualitate.

Cur ptisana magis humectet quam aqua.

Aer magis humectat Ethica febre laborantes, quam aqua.

Responso ad secundam. Responso ad tertiam.

Guaiaci decoctum quibus admiscendum in biliosis affectibus. Cucurbitulas admiscrari non debere repletis corporibus.

10

20

30

40

50

60

fere simile, quo fauces & guttur afficiuntur ex huiusce decocti potu: quin etiam & copiosissimus sudor, qui a pro-
 tione idico fere in uniuerso corpore emanat: Siquidem hac fieri non possunt nisi ab acris & calidis acrio-
 medicamentis. Sed tu fortasse nunquam gustatu decocti ipsius vires explorasti, nec quare ratione tam adu-
 dorem elicias: sed de his satis. Quum autem plus otii nactus fuero scribam contra tuam sententiam, cucurbitu-
 las in secula scalpello cute administrari non debere, nisi prius parua: corporibus. Mannam, Cassiam, & cetera cetero-
 mentuora medicamenta dari secure posse utero gerentibus quocumque tempore, necesse prater Hippocratis in-
 stitutum: Quinetiam Rhabarbari dilatum in biliosa Pleuritis de rellis sane ac nulla repugnante ratione a me-
 dici nonnullis exhiberi. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
 Iacobo Bosello Vtinenfium Medico,
 S. P. D.

Disputatur quid Rhacomia apud Plinium, An Saccharum antiquorum nostrum
 sit Saccharum, & an pinguedo à frigido, vel ab humido gene-
 retur in animalibus.

Mibi dedit natura ingenium, hoc assignauit temperamentum, ut si quid mihi quandoquē
 qui iam polliceatur, quiescere non possit animus meus, quouque quod promissum est, fuerit
 consequutus. As eo magis longa dilationis mora angore quodam teneor, quo expectat e res
 maior fuerit consideratio, maius quo illius consequende desiderium. Ideoque vellem, ut in eo,
 quod mihi hinc proficiens iam tribus elapsis mensibus pollicitus fueras, fidem tuam liberares
 (es autem pollicitus simul atque Vinum peruenisses, tuis idico pollicitationibus & nostris te satisfacturum ae-
 sideris) Et te perquam maxime hortor, non quod de constantia, fideque tua dubitem (puto enim te hominem
 esse certissimum) sed quia incredibili cupiditate ardeo e. u. ce rei, quam tu mihi promissisti, ut longiori temporis
 mora non differas ad me scribere, tuam de Rhacomia sententiam ex Pliniana lectione depromptam. Cupio
 enim mirum in modum in re plantaria abste doctior fieri, atque id, quod ante hac a nemine didicerim, tibi
 acceptum referre, ubi de Rha Barbarico (ut spero) plura fuero commentatus. Ego quidem, qui amicorum
 delationes legitimis apud me impedimentis defendere soleo, sed sine mora presso, nec tua adscribebam negligenti-
 e, nec imperitia sed verebar ne agrorum curis detentus, qui frequentiores, numerosioresque in estate adesse
 solent, & longa temporis mora, huiusce negotii suorum oblitus: sed cum nunc audiam ab his qui Vtino Gorsi-
 tiam veniunt paucos admodum nunc istos homines agrotare, excusari nulla ratione potes quod nihil tuarum
 literarum ad nos miseris, quibus aut te purges, aut tuis satisfacias pollicitationibus. Quo fit, ut non ab re
 esse putarim sibi negotium hoc uerum in mentem redigam. Meministi enim cum hic esses & de Rha Bar-
 barico sim illo colloqueremur, percontanti tibi, nunquid scirem unde Rha Barbaricum nomen hoc accepisset,
 respondisse, de nomenclatione hac nihil aliud me exploratum habere, quam quod probatissimus scriptoribus,
 praesertimque Mesius posteritatis memoria fuerit commendatum: nempe quod a regionibus à quibus conue-
 nit, sibi nomen a se uerit. Quandoquidem (responderam) non solum medicamentum hoc Rhabarbarum
 a Mesie, sed etiam solum, sed Rhaenicum, & Anasarcticum, quod non modo ex Barbaria afferri solet,
 sed a Turcis, & Sinis (ut puto) qui extremae Indiae sunt populi: Cur autem fiat, ut id quod nunc ex India ad-
 uenit Barbicum dicatur, illud in causa est, sed quod scilicet quum olim fortasse maior ipsius quan-
 titas ex Barbaria adueheretur, & ob id longe magis Barbarici nominis quam Indici, vel Sinici apud omnia
 inualuerit usus, nihil mirum uideri, si haec quoque tempestate alius etiam e regionibus allatum perpetuo Barba-
 ricum dicitur. Quo uis te respiciam, si facile memineris, me veram Rhobarbari nomenclaturam originem i-
 gnorare, qua non a Mesie, sed a Plinio petenda erat: quippe qui Rhabarbaricum Rhacomiam uocans, ad in-
 genti presentis uia cum Costo nasci scribit in quadam flumine Gangis insula, qua Barbaria appellatur, unde
 tractu temporis factum est, ut ab Insula illius nomine Rhabarbarum posterioribus appellari ceperit. Hoc
 quum abs te audirem, quo Pliniana lectionis exercitatioem intellexeram esse neminem, loci uidendi percipi-
 diu, illico Plinianum codicem coram afferri curavi. Atqui longe aliter inuenimus de Rhacomate libro
 uicesimo septimo capite 12. scripsisse Plinium, quam tu, vel tuus ipsius, vel aliorum fortasse commento, nar-
 raueras. Siquidem nec India, nec Gangis, nec Insula, nec Barbaria, nec quod uia cum Costo nascatur Rha-
 comia, uia ubi Plinio fiebat mentio. Etenim ille de Rhacomate scribens plura quam haec non habet: Rhacomia
 affertur ex his, quae supra Pontum sunt regionibus: Radix Costo nigro similis, minor, & rufior paulo. sine odo-
 re, calefaciens, & gustu adstringens: eadem trita uini colorem reddit ad crocum inclinantem. Haec ille. Nec
 plura tunc in Pliniano codice de Rhacomate, quod Rhaponticum. Dioscoridi intelligo, abste inueniri potue-
 runt. Id quod tantum mihi tadi molestiaeque attulit, quantum prius uidentis historiae assequendeque doctri-
 nae conceperam voluptatis. Caterum tu, ubi te captum agnouisti, ne fabulatoris crimen subires, non leuibus sane
 uerbis affirmabas te hoc alicubi in Pliniano codice proculdubio adnotasse, quamuis tunc non ita facile id ex te-
 pore reperiri liceret, pollicebarisq, quam primum Vinum uenires domique tuum inspiceres Pliniam, illico de
 re hac ad me scripturum, & Pliniam ipsius locum assignaturum. Sed cum tam longe expectationi abs te haudqua
 quam satisfieri uideam, vel quod, ut antea dicebam, praeterquam audieram agrorum curis detinearis, vel quod
 maleuolus forte, se quispian e tuo Plinio aliquam exciderit paginam non potui diutius tolerare quin ad te scri-
 berem, ut si de re conuuleres, & me hac re frustratum non dereliqueres. Ego autem (ut ingenue fatear)
 etsi non parum Pliniana lectione sum delectatus, non tamen usquam apud Plinium me plura de Rhacomate, &
 Rhabarbarico legi se resorder, quam ea de quibus nunc superius diximus. Quamobrem iam primum abste ex-
 pectabo, aut noua hanc Rhabarbari historiam aut non indignam longae more aut erroris excusatione: Er-
 roris, inquam, quod uerear ne id quod in Plinio te legi se putas, in alio fortasse legeris auctore: ut ne Plini-
 i lectio-

Rha Barbarici
 nomenclatio
 unde ducitur
 uulg. ncm.

Rhacomia

Rhaponticum
 Plinio Rhaco-
 ma dicit.

lectionem cum Ptolemai Geographia confuderis. Siquidem hic in quadam Indi fluminis Insula, non Gangi, quem admodum perperam ex Plinio affirmabas, ciuitatem quandam non regionem describit, quae Barbaria dicitur. Atqui non ob id, nec ab illo, nec a quouis alio (quantum legerim uiderimque) scriptum esse reperio circa ciuitatem illam nasci Rhabbarum, nec inae uisuisse sibi nomen. Quo fit ut a Mesuis historia mihi (ut praediximus) Indorum omnium ultimis ad nos conuehatur: Barbaricum uero quod ex Barbarica afferatur regione. Hinc itaque palam est hallucinari plurimum Ambrosium Calepinum municipem tuum, quippe qui non solum Barbariam prouinciam in Aethiopia circa Carthaginem haberi ait, sed (ut Ptolemaeus scribit) esse etiam in Gange flumine Insulam quae Barbaria dicitur. Quod autem Rhabbarum nomenclatio a fabulosa Calepini Insula non duxerit originem, id apertissime testatur Mesues, quum dicat, Indicum Rhabbarum esse optimum, & potest ipsam secundum locum obtinere Barbaricum. Id quod proculdubio concludit, haudquaquam in India esse Barbariam, ut tuus somnauit Calepinus: cuius fortasse (ut diximus) lectione deceptus, in eam te adductum opinionem esse suspicor, ut id in Plini Codice te legisse censeas, quod in Calepino illo longe antea legeras. Verum haec, ut a me obiter dicta recipias uelim, non quidem affirmanter, donec prater meam opinionem, rem hanc aliter se habere ab te factus fuero certior. Sed ad Saccharum uenio. de quo, cum simul colloqueremur, contra meam disputabas sententiam, Saccharum nostri usus illud non esse Saccharum, de quo antiqui scripserunt. Cum autem plura in contrarium adducerem testimonia, nil aliud respondebas, quam quod de re hac plura contra sententiam meam esses commentatus, quae ad me mittere decreueras, ut uis perlectis ac degustatis, in tuam concederem sententiam. Quod si praestiteris, non parua cum gratiarum actione ea omnia tibi accepta referam. Sed nolim tuis consiliis tantopere confidas, antequam de his ceteri ferant iudicium. Huic etiam accessit tertia de pinguedinis in animalibus generatione disputatio. Siquidem cum Galeni testimonio confirmarem pinguedinem, tam in homine, quam in ceteris animalibus a frigiditate oriri, fieri, ac coherere: id nulla prorsus facta distinctione, falsum esse pronuntiabas. Quinimo etiam affirmabas haudquaquam a frigiditate fieri pinguedinem sed ab humiditate tantum. Quod cum scirem Galenicam doctrinam quam maxime repugnare, & te haec omnia tradidisse obliuioni, praeterire quidem non potui, quin illico libros de temperamentis afferri curarem, ibique in secundo tibi facile ostenderem, quam aperte contra tuam opinionem censeret Galenus his uerbis: Quicquid in sanguine pingue, leue & tenue est, id in calidioribus corporibus alimentum quoddam calido fit: in frigidioribus uero seruetur. cumque id uena extra se transierint, ubi in frigidis particulis incidit quae genus membranae sunt, in iis concreuit. In partibus uero naturae calidioribus, cuiusmodi carnes sunt, a calore ipso absumitur ac digeritur: nisi si ubi frigiditate temperamenti etiam uita indulgentior accidit, ipsis carnosissimis particulis adipis aliquid allinat. Quae ratio etiam, quae hyeme delitescunt animalia non raro ueniuntur adipe obesi: & femina uiris sunt pinguiora: quod si licet uisum mari sit frigidior, & plurimum domi uerjetur. Haec enim ille. Quam quidem sententiam paruo post ostendebam iterum repetisse Galenum, ac postremo affirmasse in eis plus adipis reperiri quibus plus pinguedinis est quam humiditatis, & ideo adipem omnem ex ipsius habitus frigiditate progigni. Quae omnia tamen sitae uisum hanc modis refrigabantur sententia, his tamen haudquaquam acquiescere uoluisti, sed Galenum dicebas ibi de ea tantum solidam differuisse pinguedinem, quam Sciuris appellamus, non de ea, quae carnosissimis in toto corpore partibus cohaeret: nec de adipe illa molli, quam in suis uisceribus canibus, uersis progigni uidemus, quamque axungiam antiquis appellatam scimus, cum reuera haec duo adipis genera non a frigiditate sed ab humiditate tantum & orientur, & coalescant. His autem, quamuis etiam facile respondere, tuamque cum Galeno opinionem destruere potuissem: ob temporis tamen angustiam id praestare non potui. A qui ne uiderer quicquam a mea defecisse sententia, pollicebar per literas te reddaturum certiore, in quam magno uersareris errore. Quamobrem cum nunc primum a tuo hinc discessu ad te scribam, praetermittendum mihi non duxi, quin ceteris eas attexerem cum Aristotelis, tum Galeni sententias, quibus posthactuum de adipe ignorantiam apertissime cognoscere ualeas. Uelim itaque scias proculdubio hallucinari eos, qui putant hoc in loco (ut tu tibi persuades) Galenum de solida tantum intellexisse pinguedinem, cum de omni pinguedinis genere absque ulla intelligat repugnantia. Quinimo potius de molli, quam de seorsum pinguedine intelligere uidetur: Id quod facile ex eo cognosci potest quod hic Galenus de humano potius adipe, quam de ceteris scribat. Quando quidem, ut Aristot. libr. 1. cap. 6. de partibus animalium, ac postremo Galenus libr. 11. de simpli. medicament. facultatibus posteritatis memoria tradiderunt, solidus adeps in illis tantum gignitur animalibus, quibus cornua insunt, & dentes in superiori mandibula deficiunt, cuiusmodi habentur boues, caprae, cerui arietes & huiusmodi plura: molli uero in his, qui utrinque dentati sunt, & cornibus carent, scilicet in hominibus, suis, canibus, uersis, & eiusdem generis pluribus. quod haec humidior, illa uero sicciore praedita sint temperamento, non quod ob id differat ad partem horum generationis causa, cum reuera solum a frigiditate tantorum auctorum consensu, uterque fieri possit, sine qua impossibile est, ut sanguinis pinguedo e uasis ipsis ex se conuolueret. Quae quidem pinguedo in seorsum in animalibus coalescit, quorum sanguis fibrosus & terrestris furit, in aliis uero humidioribus in axungiam uertitur, & mollior, & fluxibilior euadit, ut usum in locis apertissime testantur Aristoteles, & Galenus, quorum uerba hic afferro non libuit, ne longiori sermone tibi molestior essem. Ceterum quod is de molli potius intellexerit, maxime palam facit exemplum ab eo allatum eorum animalium, quae hyeme delitescunt, cuiusmodi sunt uersi, glirae, mantani, mures, melles & alia pleraque, quae tamen omnia quum sint utrinque dentata, mollem, non solidam generant pinguedinem, ipsamque copiosam, quod frigida admixta sunt ob otiosam desidemque uitam, & somni longitudinem. Quod deinde adeps ille qui una cum carne in carnosissimis gignitur partibus a frigido non ab humido fiat, facile idem testatur Galenus, siquidem non solum eius testimonio, sed Physicorum quorumcumque consensu frigidum proprium est condensare humidum uero dissoluere: quae quidem facultates quam sibi inuicem repugnent, nihil mihi uerendum est, quin tu a me excitatus iam recognoscas. Ceterum, ut ad tacitas etiam respiciam obiectiones, quibus meam posses impugnare sententiam: si fortasse a me quereres, qui fiat, ut supra cor in quo calor uisus residet, & feruentes admodum uitaes hospitantur spiritus, generentur pinguedo, quae quandoque in superiori cordis ipsius parte non modica uisitur, quum ne tantillam ibi quidem frigiditatem ex: et: quinetiam cur supra renes plus pinguedinis gignatur, quam in ceteris corporis partibus, quum tamen

Rhauesceni.

Ambrosius Calepinus notatur.

Saccharum.

Pinguedo a frigiditate oritur.

Animalia quae hyeme delitescunt cur pingueant.

Boselli de pinguedine opinio explosa.

Solidus adeps in quibus gignatur animalibus & in quibus axungia.

Cur in superiori cordis parte coalescat pinguedo, ac etiam in rebus plus quam in ceteris partibus

10

10

40

50

60


hi plurimum

10
 20
 30
 40
 50
 60

in utroque abundant calore? Ego illico tibi responderē, generari in superiore cordis parte pinguedinem ab aere
 rariitate, quem continuo in spiram trahimusque in corpus ad refrigerandum vitales spiritus, & cor i-
 nterius. Et hoc quandoquidem ubi primum effluxit e pulmonum arteria, illico superiorem cordis par-
 tem irradit, ut non mediocriter refrigerat. In renibus autem id fieri dicerem, quod et si calidiores sint,
 cum tamen suapte natura, quod aquosum in sanguine generatur, excervant ac trahat, nil mirum, si cum aquo-
 so sanguinis excremento multum esse pinguedinis ducant: quae frigidis quibusdam membranis quae ibi ha-
 bentur inhaerens, facile in adipem coalescit, qui cum frigidus sit, nec quicquam caloris, vel spiritus contineat, in
 causa sane est, ut aucta ibi frigiditate ob copiosa pinguedinis continuum accessum, adeps adipsi concrecat, per-
 inde ac aqua, quae per glaciem excurrit, illico in glaciem concrevit. Postremo ne putes velim, adipem Galeno
 coniungam tantum vel mollem designare pinguedinem, sed omne indifferenter pinguedinis genus. Quippe is
 id aperte ostendit libro xi. de simplicium medicamentorum facultatibus sic inquit. *At si voles oleosam
 & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, sicuti & pinguedinem appellari totum hoc
 genus licet. Sed de his fortasse plura quam par fuerit. Quibus tamen, nisi potius pertinacia, quam veritati
 fueris addictus, facile quidem cognoscere poteris adipem quemcumque, in quavis corporis parte genitum, a
 frigiditate, non ab humiditate coalescere: quin etiam inspicere quam longe a Philosophia scopo aberraveris o-
 pinio tua. Nec putes velim hac ad te scribere Matthiolus tua impugnanda doctrina ratione persuasum,
 cum te ipsum, tuamque doctrinam perpetuo, & laudaveris, & probaveris apud omnes: sed ut cognosceres
 haec illic non ignorare. Interim ego tuas expectabo literas, sed velim, ut quemadmodum libere aperteque
 nunc in te arguo, nunc tuis ipse respondeo obiectionibus, tu quoque par pari (et aures) referas, ubi valentioribus
 & melioribusque rationibus & argumentis persuasus sententiam tuam defendere statueris. Vale. Goritii.*

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS Iuliano à Marostyca Medico, S. P. D.

Disputatur an Turdi salubre praebeant alimentum.



Vnum Lelium à Cusano, virum cum nobilitate, tum ingenii praestantia clarum, simul
 in diuturna illa febre curarem, & de victus ratione simul colloqueremur, egoque
 turdos in cibum illi describerem, tu contra ab eis abstinere suadebas. Saonarola do-
 ctrina persuasus: quippe qui scribat (ut tu ipse affirmabas) Turdos quartanarius mini-
 me onuenire, quod crassum, atrabiliarumque generent alimentum. At qui pluribus
 sanctis modis hac in re te errare animadverto. Primum quod apud Saonarolam, quem
 tantopere sectari videris, nusquam reperio, turdos in tibus melancholicum gignere suc-
 cum: deinde vero quod tuum hoc argumentum ne tantillum quidem Galenica doctri-
 na respiciat, nec antiquorum quorumcunque placitis ad stipuletur. Legi cum domum me recepissem Saonarola-
 lam tuum, qui tamen perperam Galeni verba accepit, nec plura quam haec de Turdis scripsisse illum inuenire
 licuit his verbis annotata: *Turdi, & Merula difficili sunt digestionis, sed remouetur hoc si ex iure pingui
 decoquantur: haec ille. Quibus palam est Saonarola ipsius testimonio Turdos concoctum tantum esse con-
 tumaces, non autem melancholicum succum gignere, imo si pingui iure decoquantur optimum inde subsequi
 alimentum. At qui aliter de Turdis video scripsisse Galenum, quem minus recte tuus ille percepit auctor, dum
 suam hanc ab eo depromebat doctrinam. Si quidem Galenus libro tertio de alimentorum facultatibus ita de
 turdis non is scriptum reliquit: *Auimum porro omnium genus, leuissimum cibum praestat, si ad quadrupedes con-
 ferantur: in primis vero si ad suillam, qua non aliud facile inueniatur, quod valentioris sit nutrimenti. Verum
 tamen eorum, qua volatu fidunt, caro ob facilem concoctionem praecipuam laudem meretur, maximeque per-
 didicis, attagenis, columbae, gallorum, gallinaceorum, & gallinarum: turdorum vero, merularum, parnorumque,
 passerum illis durior est: quas ipsas turturis, palumbi, anatisque caro duritie etiam superat. Haec ille. Quibus
 omnium palam est, haudquaquam affirmare Galenum turdos concoqui difficulter, ut tuus somniauit Sano-
 narola, nec melancholicum, crassumque praebeere alimentum, ut tu ipsius inuentione addebas, sed esse eorum
 carnem perdidicis, attagenis, & iuuenam gallinaceorum carnibus duriozem. Quod et si verum sit, non tamen
 sequitur esse verum, ut turdi demorati egre difficileque concoquantur. Etenim tametsi (exempli causa) haec
 caro medicorum omnium consensu concocti facilius est, quam vitulina: non tamen ob id sequitur vitulinam
 carnem non concoqui facile. Quamobrem his cetum argumentis, tum testimonio aperitissime quippiam nosse
 poterit, quam valeat apud Galenum Saonarola auctoritas, cum satis superque Galeni ipsius scriptis nobis suc-
 rit comprobatum, turdos nec crassum praebeere succum, nec ad concoquendum esse contumaces, sed contra potius
 concoqui facile, & inculpatum praebeere alimentum. Id quod Lucidius ad clariorem huiusce loci expositionem,
 lib. de cibis boni & mali succi idem testatur Galenus, sic inquit. *Cibi autem nulla omnino ex parte dam-
 nandi, neque tennes, neque crassi sunt, sed veluti in symmetria, omnisque excessus mediocritate consistunt. E-
 ius generis panes optimi habentur, quorum confectionem libro primo de alimentorum facultatibus scripsimus.
 Praeterea ex Gallinaceorum genere femina quidem & mares, ex auibus phasiani, perdidicis, attagenes, colum-
 ba, merula, turdi, turtures, passeruli que omnes. Et libro de attenuante victus ratione. *Ex piscibus saxatili-
 bus, inquit, montanisque auiculis, multum ac copiosum potest alimentum ad tenuantem victum accommoda-
 re, & ut ego iudico, aues monticola, non modo quod aeris, sed etiam alimentum, quod nobis praestant, tenuitate
 antecedant, alis auibus, quae in locis aquosis ac campestribus degunt, sunt preferenda. Auculas igitur, tur-
 dos, merulas, perdidicis, & reliquas id genus aues monticulis mandas licet. Abstinentiam autem ei, qui atte-
 nuante victu uti volet, alis auibus, quae in locis aquosis viuunt. Haec si recte perpendis per te facillime cog-
 noscas****

Obiectio

Saonarola ta-
 xatur.

Responso

Turdorum fas-
 cultas.

quod si quantitas non solum à Galenicis decretis, sed ab ipsa veritate tuus desciverit Sazonarola: quo postea fiet, ne illi in posterum tam facile credas. Caterum si hisce aulatis testimonis rationem addamus, nemo, qui suavis fuerit compos, negabit unquam, eorum animalium carnes, que probatissimis vescuntur alimentis, & in optimis degunt pascuis, longe excellentius altere, quam que contrario modo se habent. Siquidem non aliam ob rationem Galeno improbantur pisces qui in fluminibus capiuntur, que magnas per civitates excurrunt, quam quod putridis vescantur cibus, cum in huiusmodi flumina universa urbis latrina, ac immunditie cotruant. Eadem saneratio olim in coenis vetabantur coturnices (ut Plinius est autor) ac etiam improbantur Sturni, quod scilicet hi cicuta, ille veratri semine alantur. Quapropter quum Turdi in eo habeantur volatiles a genere, qua optimis videntur cibus nempe sicibus, visis, oliuis, myrti & iuniperi baccis, degant que in montibus & vineis, ubi salubrior est aer, aliter saneratio concludere nequit, quam quod Turdorum caro salubrior alat, ac nutriat. Postremo cum turdos videamus canoras esse aves, id manifesto potest esse argumento has melancholico succo haudquaquam abundare. Quod cum non ignoraret Galenus de quartana febris curatione ad Glauconem scribens, volatilibus vescendum suadet, que boni succi sunt, & in paludibus non degunt. Quibus nemo inficiari debet, quin etiam tibi turdos concedat Galenus, utpote qui ubique eorum commendauerit alimentum. Sed cum te sane nouerim in medendis morbis optime exercitatum, quoniam Galenicis lectionibus assiduus, non parum quidem sum demiratus cur a viuo fonte deflexeris ad riuulos, nihil fortasse, ut meam hoc modo experireris doctrinam. Qua tamen si per omnia tua eruditioni non correspondet, non tamen adeo tenuis est, ut putes me alimentorum omnium facultates ignorare. Vale. Goritia.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Iacobo Bosello Medico, S. P. D.

Disputatur item de Rhabarbaro, Rhacomate, & Saccharo antiquorum.



Quod primum postulaueram, ut in his, qua pollicitus fueras, de Rhabarbaro & Rhacomate tuam fidem liberares, ad id nihil mihi respondes, quod te tuum fateri errorem apertissime ostendit. Quo fit ut nunc facile cognoscam haud meam me sefuisse opinionem, quod per te a tuo Calpino esse delusum, quin etiam te plura tibi de re hac confinxisse, cum nullum Plinius Rhacomate & Rhabarbaro testimonium afferas, nec ullum verbum facias de Barbaria insula illa, quam in faucibus Gangis extare affirmabas. Ad hac autem primum tibi respondendum fuerat, & deinde si qua rebus scribenda afferendaque videbantur argumenta, de iis posthac tibi agendum fuerat. Hec itaque decore viri peritum & compotem mentis videbuntur. Atqui tu, nescio quo pacto tui oblitus, ne hoc aberrasse videaris, nouis quibusdam aliis argumentis pugnas, quibus fortasse putas meum adeo te occupaturum ingenium, ac illud a priori causa auersurum, ut nulla eius posthac in me remaneat memoria. Astute sane ac prudenter meditaris, sed an recte sincereque, tu ipse tibi conscius es. Caterum tamen si ipso iure nouis hisce tuis argumentis me opponere non tenerer, nisi ubi prius debitum persoluisses, vel falsus esses mentis fortasse imbecillitate te esse deceptum: ne videar tamen ea que recenter affers exuauescere, recusare sane non possum, quin illis pluribus respondeam modis. In primis itaque (ut rem ipsam statim aggrediar) scias velim non fuisse tibi opus tantum temporis conterere in describendis tot autorum nominibus, qui de Rhabarbaro scripserunt, cum proculdubio scires, te nihil a me scribere, quod multo antea non nouerim atque scuerim, ut mei in Dioscoridem commentariis (quos te legisse non ambigo) apertissime attestantur. Ibi enim libro tertio de Rhaponico agens, ea omnia que nunc in medium affers, ac si abs te nunc primum nascerentur, & ea me docere velles, à te fusius descripta sunt. Dein de ad ea que dicis non aliam ob causam te eos omnes attulisse autores, qui de Rhabarbaro scripserunt, quam ut ostenderes illorum neminem haberi, qui de pluribus, quam duobus Rheigenibus (ut tuis utar verbis) meminere, & ideo hallucinatum esse Mesuem, quod prater caterorum sententiam tria Rheigenera descripserit, dimiseritque Barbaricum a Sinico, que quidem genera (ut tuas fert opinio) nihil inter se differunt: respondeo te ipsum, non Mesuem mihi videri hallucinatum. Etenim tamen si quotquot attulisti autores in duorum tantum generum Rheigenem meminere, id sane haudquaquam impedire uolet, quin huiusce medicamenti adhuc plura possint haberi genera, quam si de pluribus meminisse nequiderint, quam de his quorum notitia ad eos peruenit. Quo fit, ut hinc palam sit quam infirmis rationibus Mesuem impugnanne contendas. At si hec, quibus uteris, argumenta ita vera essent, ut tibi falso persuades, non minus aberrasse Paulum, Anicennam, Rasim, quorum patrocinio niteris, quam Mesuem, fateri cogeris. Siquidem cum Dioscorides, & Galenus, qui in Plantaria facultate primas tenent, quisque alios omnes hanc docuerunt, nusquam de pluribus, quam unius Rheigenibus meminere. Et Paelus, Auicenna, Rasisque, qui eos longe satis post tempore sequuti, Rheigenes duos fecerunt genera, Pontici videlicet, & Barbarici, nihil est quod impediat, quin velis nolis fatearis hosce quoque magnos autores una cum Mesue aberrasse. Cuius manus si paulisper ad nos reuocarentur, & abs te ut ais, in iudicium vocarentur, nihil mihi verendum est quin longe plura acerbioraque tibi responderet Mesues, quam à me hic breuiter sunt allata. Quandoquidem diceret, quod cum is posterior vixerit, non solum non ignorauerit ea omnia que iisdem descripta sunt autoribus, sed etiam quod longe plura didicerit, legerit, viderit, inuenerit ac comprobavit, quam tu, qui tot secula post ipsum consensit & hac ignoras eorum fortasse opinionem sequutus, qui nihil quicquam volunt nobis esse nouum, nihil antiquos latuisse, cum tamen audacia hac infelicis, cesserit quam pluribus. Atqui (si vera fateri debeam) non parum sum demiratus, quod adeo tua fueris addictus voluntati, ut tam petulanti licentia hac in re ausus sis infidelitatis arguere Mesuem, cum omnium rei medica studiosorum consensu nemo ante ipsum, tanta fide ac diligentia scripserit de exoluentibus simplicibus medicamentis, quin etiam de compositis omnibus quibus in morbis quibuscunque curandis quam felicissime utitur uniuersus Medicorum. catul.

Practica

- Præterea ad id quod ad me scribis, quod si Barbaria (ut mea fert opinio) extra Indiam esset, Mesuæ prociuidatio defendi posset, & quod libenter a me audires quò Geographo autore alibi esse Barbariam inteuam, hoc sine respondendum videtur, quod cum satis superque comprobauerim in meis in Dioscoridem commentariis Barbariam antiquis dictam esse Troglodyticam Æthiopia regionem, non esse hic opus eisdem repetere, sed illuc ad meas te lucubrations recurrere debere. Barbaria & Troglodytica regio idem. Quantum autem Æthiopia ab India distet, quærem Geographisam intelligunt tibi facile dicent: Quo postea fortasse fiet, tum non solum in hoc recognoscas errorem, sed etiam in eo, quod tam temere nunc primum asseras Barbariam quam prius Gangus insulam faciebas, regionem esse in Parala Indici fluminis insula, contra Geographorum omnium sententiam. Nam qui scribas in Parala, siue (ut quidam vocant) Patalena esse Barbariam habeo profecto neminem. Sed ut adnotauit
- 10 Ptolemæus in alia eiusdem luminis insula ciuitas est (quemadmodum antea ad te scripseram) nomine Barbaria, a qua Sini populi longius distant quam tribus millibus & noningentis Italicis miliaribus. Nimirum (ut idem Ptolemæus est autor) a faucibus Indi fluminis ad Sinos sexaginta quinque, intercedunt latitudinis gradus. Quibus palam est Rha Sinicum nullam cum Barbarico habere cognationem. Siquidem quanquam cecederemus, quod tamen non facimus, a Barbaria illa, quam tibi fingis tua tantum defendenda opinionis causa, aduehi ad nos Rhabarbarum, adhuc tamen in magno versareris errore, cum Sinicum & Barbaricum idem esse censes. Ideoque velim ne posthac ita mordicus teneas excogitatas a te tantum opiniones, sed ut facilius veritati acquiescas. Si vero secus feceris, & pertinacia potius, quam rationi & veritati fueris addictus, nolim, ut agre feras, si nihil de his tecum in posterum conferam. Adhuc quod Rhabarbaricum non sit, adeo nobis comprobatum esse scimus ex commentariis nostris in Dioscoridem editis, ut opus nunc non sit hic plura ad hac afferre argumenta: namq; id adeo palam fecimus, ut scripserit vir quidam tempestatu nostra clarissimus, extrema esse dementia Rhabarbarum idem cum Rhabarbarico estimare. Etenim non solum hac radix ex Ponto aduehitur, quo a Rha fluminis accolis apportatur, sed etiam ex India, & Troglodytica regione, quam Barbariam veteres vocauerunt, ad nos defertur, argumento quod quâdoque eadem radix quam Potiam vocamus, a Venetis negotiatoribus inter Rhabarbarum Alexandria Ægypti allatum, quo ex India, Arabia & Æthiopiaque mercimonis deferuntur, reperitur id, quod si nescis, si voles, resciveris facile, ubi huiusce facti negotiatores diligenter interrogaueris. Hoc itaque cum non ignorauerit Myrsipiscus ille Alexandrinus, qui tam diligenter scripsit de componendorum medicamentorum ratione, ubi catapota quadam componit, cap. 110. ad ventriculorum, & lienis affectus, Rhabarbarum & Rhabarbaricum admiscet, tanquam diuersa medicamenta. Etenim cum frustra (ut ait Aristoteles) fiat per plura, quod fieri potest per pauciora, non fuerat illi opus duo hac admiscere medicamenta, nisi magnopere virum facultate ea inter se differre agnouisset. A qui ne agre feras obsecro, si tecum verbis quandam antea amarusculus de Rhabarbarico egi. Namque id amaroris in Rhabarbaricum ipsum potius quam in Matthiolum tibi reuocandum putarim. Ceterum cum nunc de Saccharo mihi tecum disputandum sit, degustata dulcedine, facile hanc Rhabarbarici amaritudinem temperabis. At qui iocis hisce relictus ad Sacchari ipsius controuersiam me confero, in qua, ubi (ut spero) et tuis te deicero presidium, mihi plurimum gratulabuntur amici. Siquidem, cum ad me scribas qua tibi infirmitatis conficis, quod si fortasse in Rhabarbarici ex amine tuas superauerim vires, in hac secunda sacchari causa te nemine agnoscere, qui tuas possit vincere rationes, magno admodum honori mihi adscribent omnes, ubi me etiam in hoc vicisse intelliges, nisi id fortasse obstat, quod iunior seniosem vicerit iam fatiscentem. Ne autem diutius in hisce immoremur sermonibus, rem ipsam aggredior.
- 20 tua imprimis argumenta quibus cum Auicenna tum etiam Rasis auctoritate improbare niteris saccharum antiquorum a nostro plurimum differre, infirma satis ac inania esse respondeo: eo sane argumento, quod horum nemo Sacchari historiam descripserit, quin etiam nec quo pacto illud a natura procrearetur, & hoc arte fieret. Ac quanquam isti de utroque Saccharo, describunt, nusquam tamen scriptum reliquerunt quod alterum ab altero differat, & in aëris gignatur calamus: quin etiam nec quod hoc errore proueniat, illud ex arundinum succo exprimitur. Scripserunt quidem de utroque Saccharo hi antiqui patres, non quod in diuersis natura calamus id gigni censerent, sed ut posteritatis memoria commendarent, Saccharum non solum a nobis arte parari, suis decoctis & expressis calamis, sed etiam nature ipsius opera concretum in eisdem calamis reperiri. Etenim si sciuissent id, quod Saccharum arte paratum aliud fuisse liquoris genus, aliud vero quod ipsa per se parauit natura, putandum quidem non est, quin huiusce differentia meminissent, quemadmodum sequenti capite silentio inuoluerunt, qua inter hoc & Saccharum Albaser siue Haoscer intercedit differentiam, dum huius historiam descripserunt. Scribis Dioscorides Eleomel in Palmyris Syria è trunco cuiusdam arboris per se manare: verum esse etiam hominis, qui ut plus liquoris consequantur, arboris cortices tundant, & prelo liquorem exprimant. Præterea de papauere agens Opium scribit è vulneratis capitibus gustatim prodire. At qui non deesse etiam subiungit, qui papauerum ipsorum capita una cum foliis contundant premantque, deinde & ita plus liquoris accipiant: ita etiam Caphura duo genera recensent Arabes, alterum sua parte natura exiliens, erumpensque gummi modo, alterum arte exemptum haudquaquam pellucens. Resina è Pinu quanquam per se facile distillat alba nitidaque, vi tamen ignis pix nigra copiosior fluit. Quo fit ut mirari non debeas si isdem è calamus, qui olim Saccharum per se fundebant, antea quam ars nature opus præoccupasset, nunc hominum industria exprimitur, ut inde longe maior accedat proventus. Ceterum videtur ab omni ratione alienum, quod absque ullo autorum testimonio, vllaue coniectura sibi persuaserint quidam, quos te secutum video, Saccharum, de quo Græci meminere, è rore concreuisse, cum tamen sciant illud in calamis reperiri, & quod è calamis nostrum exprimitur. Ad id autem quod inquis scripsisse Dioscoridem, Galenum, Plinium Saccharum me esse in calamis concretum, quod quod si mel est, & mel (ut Galenus inquit lib. 3. de alimentorum facult.) nec succus sit nec fructus, nec pars alicuius plantæ, quomodo fieri potest, quod hoc mel arundinis sit succus: respondeo: quod Galenus hoc in loco de illo tantum speciatim scribit melle, quod apum artificio conficitur. Siquidem cum ex plantarum floribus suum mel colligere apes quæ etiam ex herbis ipsis omnibus palam sit, ne fortasse censerent, homines mel ex ipsis plantis prouenire, recte nos admonet non esse mel illud aliquam plantæ partem. Cum itaq; de apum melle ibi tantum intelligat Galenus, non autem de Saccharo, quod a dulcedine mel improprè appellauerunt antiqui, antea quam proprium ascriberent illi nomen, non est quod tuus suorum argumentis. His alia etiam accedit ratio, qua non parum contra te pugnat. Namque, cum discat Galenus,
- Parala siue Patalena ubi.
- Rha Sinicum à Barbarico differt.
- Rhabarbaricum etiam ex India auferri.
- Saccharum.
- Reprobata de Saccharo antiquorum sententia.
- Lib. 1. cap. 14.
- Lib. 4. cap. 6.
- Caphura generata duo.
- Galeni sententia declarata.

- pregnantes à quibus, non à iuuenibus, Saccharum gummi modo antiquum manare solebat adeo frequenter habeatur. tu quidem hinc meum argumentum illico reclamās, & ea sane plurimum veritate refutari affirmas. Itaque rationem à me exposulas, qui fiat, ut magis ab adultis quam à iuuenibus calamis fundatur succus, quam tamen hi teneriores, rariore, & succo turgentiores habeantur, quam qui consenescentes in dies sicciore inanioreque evadunt. Et autem hanc tuam coniecturam magis tuere videaris, addis minime dubitandum esse, quin Indi antiquitus etiam è concisis & decoctis calamis Saccharum expresserint, ideoque id in causa non esse quod antiquorum Saccharum ad nos conuehi desierit. Nam quum (ut asseras) praeclarissimum autorum testimonium satis superque fuerit comprobatum, è calamorum radicibus Indos semper dulces eliciisse liquores, ad facilius è calamis qui, è manu ad manus erant, elicere potuerunt, quam fodiendo humum tam ingentium arundinum radices extirpare, quae quidem (ut Strabo & Solinus testantur) tricenum, quinquagenumve passuum longitudine, tanta vero crassitudine, ut quibusdam diametrius sit ternum cubitorum. Hae itaque sunt quae aduersum me scripta habes argumenta. Quibus respondebo facile magis esse rationi consentaneum succo praegnantiores esse adultiores arundines quam quae annuatim promeniunt & exciduntur. Siquid haec dum crescunt maiorem humoris partem in suum ipsius augmentum assumunt, et apertissime videmus in omni arborum genere, quae dum adolefcunt, usque ad quendam temporis terminum, nullos ferunt fructus, quos siferunt simulac aliquandiu adoleuerint. paucos admodum eos esse cernimus: quippe cum continuo crescant, maior humoris pars quem è terra assumunt, in eorum transit alimentum, quod vegetabilis administrat facultas ad corporis incrementum. Achinc fit, quod omnes quaecunque extant arbores fecundiores sunt quum ad consistentiam & que peruenierunt, quam antea. Etenim cum tunc crescere desierint, nec subinde augmento opter sit, nec se sane est.
- 10 us ad alimentum, quod prius ad hoc munus conferebat natura, aut ad fructuum generationem se recipiat, aut per corticis rimas egrediasur, aut per insensibiles digeratur vapores. Videmus enim aperte quod re inferioribus plantis omnes, cuiusmodi sunt abies, pinus, larix, & id genus aliae quinaetiam gummiiferae, et amygdalium, prunum, comasiam, resinam aut gummi haudquaquam fundunt dum adolefcunt, quemadmodum etiam in animalibus cernimus. Idem quoque palam est ex his arboribus quae perpetuo fructificant, fructusque in tertium ac quartum annum ferunt, cuiusmodi sunt aurantia, & medica malus. Harum enim plantarum fructus succo multo densiores sunt ac suauiores, quam qui annuatim decerpuntur. Id quod te ignorare magnopere demerem cum è Theophrastum te, & medicum proficaris, & idem scribas Theophrast. lib. 6. cap. 16. de plantarum causis sic inquis: Vbi planta in longitudinem augeri cessauerunt, crispari deinde dilatarique incipiunt sicut etiam animalia. Eadem causa est & quamobrem tadam picemque, aut resinam nullam penitus nouelle arbores habeant. Alimentum enim totum ad incrementa, fructificationemque, absuntur. Quippe postea in tadam vertuntur, atque omnino fructibus illum destinatum humorem magna parte usurpant. Tunc enim velut sordes naturales quaedam haec relinquuntur, cum vis augenda longitudinis desierit, & radix, atque, vniuersa arbor plus roboris capere inceperit. Hac itaque ratione plus Sacchari reperietur in arundinibus quae pluribus creuerunt annis, quam in illis quae vnius tantum anni spacio feruntur, nascuntur, crescunt, secantur, premunturque, deinde antea quam consistant. Ad haec au Indi etiam antiquitus è Sacchariferis arundinibus quae nobis Saccharum ferunt idem pariter expresserint, an non mihi nunc disputandum non est, quod nihil nostris conferat colloquius. Atqui tamen, si sane noverit, quod est tibi concederemus, quod non facimus, Indos antiquitus etiam arte parasse Saccharum, id tamen adeo exiguum fuisse diceremus, quod usque ad Dioscoridis, Galeni, & Pauli tempora, nihil illius ad nos conuehebatur.
- 20 quae illa adoleferent, quam quae quotannis secarentur. Nec his obstat Strabonis & Solini auctoritas, quum in medium afferis, cum non repererim apud Strabonem, nec alium quenquam, ex illarum ingentissimarum arundinum radicibus Indos unquam expressisse Saccharum, sed nasci has in aqua & ibi tantum ob caeli pluuia naturam, arborum radices & praesertim arundines esse dulces, aqua à solibus tepescita, tam caelesti quam sicca. Siquidem (ut ipse inquit) ea quae apud alios & fructum & succorum maturitas dicitur, apud illos coccoctio est quae tantum ad dulcedinem operatur, quantum ea, quae per ignem fit. Atqui hoc posteritatis memoria haudquaquam commendauit Strabo, ut nos admoneret ex hisce radicibus apud Indos Saccharum fieri solere, sed ut regionis illius dulcedinem narraret, quanquam ille hanc de tadamentibus arundinibus historiam potius fabulosam, quam veram censere videatur, quemadmodum & Plinius. Caterum si haec vera sunt, potius credendum est (ut Lucan. inquit) quod ex hisce arundinum radicibus succum extraherent ad potiones parandas, quam ad Saccharum consiciendum, praesertim.
- 30 quae cum in Syria, Cypro, Creta, Sicilia & in aliis sacchariferis insulis, vnde nunc Saccharum ad nos conuehitur, ex arundinum medulla, non ex radicibus exprimitur. Praeterea ad Isaaci auctoritatem, quem scripsisse inquis in antiquis arundinibus non inueniri Saccharum, respondeo, me haudquaquam de valde veteribus & caducis intellexisse, sed de his, quae ad consistentiam usque creuissent, quanquam id in meo Isaaco nusquam profecto reperio. Quo fit ut mihi persuadeam, te fortasse in hoc esse delusum, perinde ac de Rhacomate in Pliniana lectione. Ad ea autem, quae obiciunt, quod si Sacchari historia apud antiquos ita se habuit, quemadmodum a me describitur, illud te plurimum demirari, quod id concreti liquoris Ponticae nucis non esset maior, cum tamen aliarum arborum resinae ac gummi portiones quantitate longe maiori reperiuntur, nil aliud tibi respondendum succurrit, quam ut naturam ipsam consulas. Nullus profecto mortalium nouit haec, praeter illam: lusit enim illa quatenus ei libuit, sui vniuersi vnicum exemplar, aut, sequestra, heras, administra eadem, nullius indiga, non precario, non coacta, non impedita. Hanc si consulas non solum haec tibi dissoluet nodos, verum etiam dicet, quamobrem tam ingenti mole creauit Elefantos, tamque minima formicas. Atque si cum natura de his colloqui non possis, & mihi dixeris tu quamobrem lentiscus raro mastichen fabae maicrem gignat, cum tamen arbor sit non infima proceritatis, cur ab arbore, cuius umbra centum obteguntur homines, capura portiunculus non emanat amygdalae nucis maioribus: cur longissima Cyparissus adeo exiguum semen gignat, ut fere oculos fallat: quinaetiam cur cucurbitarum, melopeponumque planta tam ingentes ferant fructus, cucumerum vero his longe minores, ego posthac tibi facile aperiam qui factum sit quod Sacchari illius pariter nucem Ponticam magnitudine non excedant. Dicis postremo quod Saccharum apud antiquos tantum medico fuit usum, in cibis vero nunquam. puta pro hoc argumento aliquid etiam contra meam sententiam, quum nostris plurimum uentus in cuminatum usum. Sed haec satis ridenda videntur. Etenim & si

Arundines mirae magnitudinis.

Arbores quae sunt per se fecundiores.

Arbores Indicae omnes radicibus dulces.

id Plinii testimonio in tuam cōtuleris opinionem: ego tamen Strabonem adducam, quippe qui scribat ex arundinum Saccharo homines ebrios fieri. Id quod manifesto est argumento in potionum cocinnamenti etiam antiquos suum addidisse Saccharum. At si responderes quod de cibis, non de potibus fueris loquutus: dicerem ego id euenisse, quod Saccharum non curauerit in cibis addere antiquitas, quemadmodum nec Medica mala, nec alia complura: ac etiam fortasse ob eius penuriam, qua fiebat, ut vix ad medicamenta sufficeret, id quod tunc ad nos conferebatur. Possem & alias offerre rationes sed cum satis superque de re hac me dixisse putem, & iam fere in volumen excreuerit epistola, ea quidem silentio non abreinuoluere libuit. Eoque praesertim quod in meis in Dioscoridem commentariis adeo Sacchari historiam expenderim, ut nullus relinquatur dubitandi locus, quin veterum Saccharum ab iisdem resudant calamis, e quorum medullis nostrum conficitur. Verum si his satisfactum tibi non sit, mannam, qua quotidie uteris, accipito, & vehementissimis solibus exponto, vel in furnum conuicito. Id si feceris nihil mihi verendum est, quin illico palinodiam sis meditaturus. Caterum putaram de pinguedine te tuas ad me scripturum defensiones. Verum cum videam illa omnia negare qua Goritia non solum contra meam, sed aduersus Galeni sententiam afferebas in medium, ne testes habeam quorum praesidiis uti possim, id conscientia tua ponderandum relinquam. Sed cum sciam de pinguedinis origine cum Paulo Regolino viro doctissimo, collega tuo, te sapius habuisse sermones, facile ab eo resciam, an plus mihi quam tibi credere debeam. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Icanni Francisco Nascimbene

S. P. D.

Agitur de Resinis omnibus, quarum meminere Dioscorides & Galenus.

Quo natura sim ingenio, eaque perpetuo voluntate, ut ubi studiosus quispiam, medica praesertim facultatis sectator, aliquid a me petierit, recusare non possim, quominus illi pro tenui mea facultate satisfacere auctor, et si nulla antea cum eo mihi intercesserit amicitia: viderer nunc profecto, non parum a meo deficiente instituto quin etiam boni viri officio si ad ea, qua a me petis de Resinarum dubiis explicandis, quantum intelligam, puerem. Cum non solum doctrina, & eximia virtus tua, id quod petis, iure mereri videamur, sed etiam, quod magis est, nostra diuturna amicitia nulla unquam ex causa violanda, illud idem magnopere exposcat. Non miror autem in censendis arborum quarundam resinis, multis in locis, ut scribis, te esse adeo implicatum, ut sine aliorum auxilio inde te extricare nequeas cum certo sciam praeter te non deesse doctissimos & in plantaria facultate iam diu versatos, qui non solum in resinis examinandis de pluribus dubitarunt, sed in eandem historia tractanda non parum etiam aberrarunt: argumento quod resinarum genera ab ipsis speciebus nesciuerunt distinguere, nec earum nouerunt differentias: quinetiam quod veras vocabulorum nomenclationumque proprietates non intellexerunt. E quorum numero unus est Andernacus, quippe qui, ob harum fortasse ignorantiam, in vertendo Galeni libro de com. medic. secundum genera, adeo multa confudit, ut nihil mirari debeam si tibi ac etiam aliis ille non paruum facerit negotium in hisce censendis medicamentis. Verum ut ad id quod a me petis, veniamus, tibi sententiam meam illico exordiar. Scribis itaque in primis legisse te apud Dioscoridem Pineam, Piceamque resinam, qua sua tempestate ex Gallia & Hebruria conuehebantur, olim conuehi solitas esse a Colophonia celeberrima minoris Asia ciuitate: quo argumento concludis Pineam & Piceam resinam nihil prorsus differre a Colophonia. Atqui (inquis) si id verum esset, tibi quidem non parum verendum fore, quin hac in re aberrauerit Galenus, quum is apertissime scribat lib. 3. de comp. medic. per genera. Piceam Pineamque resinam a Colophonia differre: quinetiam alteram altera viribus esse praestantiorum. Id quod etiam lib. 7. eiusdem voluminis iterum affirmauit. Qua omnia (ais) magno nobis esse posse argumento, non paruum inter hasce resinas intercedere differentiam. Deinde scire desideras, an Galenus de pluribus resinarum generibus meminere, quam Dioscorides: cum tibi videatur is de pluribus proculdubio scripsisse, quod praeter eas de quibus scribit Dioscorides, frictam vel Colophoniam habeat, quam vulgo vocant Septalia Gracam, atque etiam Hispanicam, & aliam quandam, quam nullo alio appellat cognomento, quam quod ex syulini impuratumur, & ubi purgetur in frictam mutatur. Ad haec scribis, eam praeter has eandem habere Galenum, quae picea phys. mailli vocatur, quaeq; Andernaco modo picea, modo pinea germinatio vertitur. Quo sit ut non desit tibi suspitio quin ibi lectio fuerit deprauata, ubi non ambigo deprauate vertisse interpretem. Quin etiam praeter has meminisse Galen. (inquis) Terebinthina, Strobilinae, quam omnino te ignorare fateris, et si scias strobilum nihil aliud esse quam Pinam. Atqui cum in alio loco idem scribat Galenus utriusque seu pinea &c. videtur quod nihil differat pinea & strobilum quoniam quos quos, quum tamen idem Galen. lib. 3. de simp. medicam facultati inter has manifestum interponat differentiam. Huius subinde Laricinam, Abergnam, & Pineam eodem ex Galeno annectis, viderique tibi, inquis, pineam hanc a ceteris differre, quod peculiariter a ceteris utriusque quos quos, de Strobilina pineaque idem meminere Galenus: sed quod non vides de tot resinarum generibus scripsisse Dioscoridem. Postremo haberi etiam apud Galen. inquis, Lentiscinam atq; Piceam quae an pix liquida sit a me seu e desideras: haec denique sunt, quae tuis literis a me petis. Verum cum tam diligens fueris in enumerandis resinis omnibus, nescio quo pacto factum sit, quominus Cyparissina memineris, cum etiam hanc habeat Galenus. Caterum anteaquam ex hisce te eximam implicationibus, quae ingenium tuum perplexum reddunt operis precium nobis est nonnullas assignare distinctiones & interpretis errata corrigere, quae (ut video) mentem tuam non mediocriter perturbant. Velim itaque primum scias Colophoniam resinam duas haberi species, quarum altera, cruda, liquida, mollisque est, ita sane a pineo vel piceo caudice

Andernacus
taxatur.

Resinarum impli-
cata historia.

Colophoniam
duas species.

in suavis: altera vero cocta sine fricta, perinde ac illa qua nunc in Seplassu omnibus Colophonie nomine retinetur. Hec esse veritate scitur ipse Galenus, lib. 7. de compos. medicamen. per genera sic inquit. Quoniam vero Piceam & frictam resinam, & Colophoniam appellare consueverunt. sciendum erit aliam quandam esse Colophoniam (sive masticha per simile aliquid habens, quemadmodum illa & Thu. Siquidem ex hisce Galenus ubi facile palam est in Colophonie genere, coctam sine frictam alteram haberi siccam: crudam alteram, mollem, tractabilemque, artificio nullo paratam, de qua prius speciatim ipse meminerat Galenus lib. 2. eiusdem voluminis cap. 20. de viridi Andromachi emplastro differens huic verbis: Liquida tamen diutius perdurat, sicut etiam Colophoniam thuris redolens, quae nonnullis sola vocatur Colophoniam, eoderm in usum quandam referens, sicut Abietina & colore meoeteci praduta: nascitur admodum modica, atque ob id preciosa. Et ubi 3. eiusdem operis, ubi de medicamentis nervorum egit, de Colophoniam cocta sine fricta inter siccas resinas peculiariter scripsit sic inquit: Omnium vero siccissima est, quam nonnulli frictam, alii Colophoniam vocant. Praterea nonnulli se ignorare tres haberi resinas in ista specie, quae a Pino proveniunt, inter se differentes, quarum duae candice manant, tertia vero enucleibus, quae Graeci εσχιδας vocant. E candice manantium, altera quidem est Cominum praestantissima liquida, mollis, ubi arboris ramentorum foliorum, omniumque immunditia expers, & ut Galenus inquit Jenuis redolens, & ubique sincera, Colophoniam proprie appellata. Ac ea est hac de qua inter liquidas resinas meminit Dioscorides. Altera sordida est & rotorrida, impura ac exoleta, quae appellatur Galenus Pitynon Phycema, quae ab hoc in ipsa arboris germinatione exudet. Hac enim ea ratione exoleta provenit, quod iunc temporis universae plantae humor longe magis distribuatur ad nova germina producenda foliaque, non illa nutrienda, quam ad aliud peragendum natura operi: quo postea fit, ut qua eotempore manas resina, posterius deterior habeatur: quae in ista de re describit Plinius quod fere a Sabae legitur. Hoc vero quum haud interet Theophrastus in libro 9. cap. 20. de plantarum historia: Terebinthum & Pinum, dicebat is, & si qua resinam alia surdum cedendum esse post germinationem affirmant. Postrema vero est quam Strobilum vocant, quae tantum enucleibus provenit: Σεβιδας enim pinam nucem designat, non pinum arborem ipsam, ut te tibi persuasisse video. Ab hoc illud quoque scire oportet, haberi in resinarum genere liquidarum & aridarum differentiam, quinetiam utraque ex eisdem arboribus manare. Quandoquidem & Pinus & Picea & Abies cum pingues liquidasque, tum etiam siccas ac exoletas proferunt resinas, ea nimirum ratione de qua superius diximus. Itaque in pinguium seu liquidarum genere ea praecipua esse videtur quae Colophoniam appellatur, ac alia quaecumque illi similis quae in astate & autumnosus ab arboribus legitur, finita plantarum germinatione: inter siccarum vero generum exoletarumque, ea in primis habetur quae Pitynon Phycema vocatur, deinde quae in fictilibus adnebeatur, tertia quae igne decocta fuerit Colophoniam. Ideoque dicebat Galenus libro tertio superius citato omnium esse siccissimam, quam nonnulli frictam, alii Colophoniam dicunt, & huic etiam succedere, quae ex figulinis impura & despumata sumitur. Quinetiam huic ambobus sicciorem esse, quae dicitur Pitynon Phycema: Ex liquidis, nonnullas liquidas permanere, quemadmodum Terebinthum, alius vero inarescere, sicuti Strobilum. Sed haec sane omnes inter aridarum genera reperio descripta apud Dioscoridem, ut clarum postea intelliges. Postremo & illud etiam scire debet Andernacum minus recte veritatem piteivon ovonua id est, picea germinatio, quod Graeci titus pinam non piceam designet. Cuius erroris seipsum accusat, cum illud idem modo piceam, modo pineam germinationem vertat. Hac itaque praefari prius oportebat, quam petitis tuae respondere. Nunc vero ut ad rem ipsam me conferam non video de viribus resinis scripsisse Galenum quam Dioscoridem, quanquam hic non ita diligenter, ut Galenus curam enarrauerit species. Resinifera ergo arbores Dioscoride, praeter Cedrum, de quo postea peculiariter scribit, plures quam septem non sunt, nempe terebinthus, lentiscus pinus, larix, picea, abies & Cyparissus. De quarum omnium resinis idem Dioscorides speciatim meminit, nec de pluribus video scripsisse Galenum. Nec obstat quod apud ipsum plures videantur esse resinarum appellationes, quia non reperiuntur apud Dioscoridem, ut est exempli causa Pitynon Phycema, & quae ex figulinis impura sumitur. Siquidem hoc nec genus variet, nec speciem, sed aut tempus in quo manare incipiunt, aut cognomen a fictilibus in quibus apportantur aut maiorem aut minorem praestantiam ostendit. Praterea quanquam certum est Dioscoride Colophoniam aliam non esse, quam pineam vel piceam, non tamen dicam ob id aberrasse Galenum, quod (ut inquit) libro tertio de compositione medicamentorum secundum genera, Colophoniam a pinea & picea differre scribat. Quandoquidem quamvis de siccis resinis agens differre asserat coctam Colophoniam a Strobilum, ac etiam ab ea quae Pitynon Phycema dicitur, nullibi tamen reperies affirmasse illam a Colophoniam differre pineam aut piceam, quae selectissima sit, liquida, mollis, pinguis, & thuris redolens, proprie Colophoniam appellata. Ideoque scire debes quod ubi eodem libro in tuo Galeno reperis pineam resinam ceteris minus praestare, contra priorem ipsius Galeni sententiam, & eam ob causam in iunioribus fere ibi haberi locum, non esse id erroris Galeni adscribendum, sed interpreti Andernaco. Quippe qui perverse admodum illa Dioscoridis verba a Galeno ibi allata inverterit. Quandoquidem Dioscorides piceam, non pineam in denulismo collocavit loco sic inquit. *πεγαιες δε παρων των ρητινων η τερεβινθη και μετα ταυτων η εσχιδας ετε η πτεβιν, και η λεατιν μεδ ες αες θιν, και η τε πτεβιν και η σεβιδας, id est, Terebinthina resina omnes antecellit proxima lentiscina, & pinus & abiete, haec sequuntur picea & strobilum. Quibus palam est pineam resinam non postremum, ut tu ab Andernaco deceptus putas, sed tertiam bonitatis locum obtinere. Ceterum quo pacto fricta sine cocta parari debet, non solum ex pinea piceaque, sed & ex ceteris liquidis, diffusius scribit Dioscorides, quam obrem non est quod pices frictam fuisse illi incognitam. Quandoquidem haec Galeni tempore etiam Colophoniam dicebatur: idoque libro tertio eiusdem operis dicebat idem Galenus (ut antea diximus) omnium vero siccissima est, quam nonnulli frictam, alii vero Colophoniam appellant: & libro septimo Pineam resinam, dicebat, & frictam & Colophoniam appellare consueverunt. Atque ea quae sordida & impura in figulinis afferebatur, aridam illam esse facile crediderim quam ab abiete, piceaque, manare diximus, cum is inter aridarum species haec etiam reposuerit. Nec aliam ob causam dicebat ille, quod haec ubi a sordibus purgabatur fricta fiebat, quae ex purgari nequisset, nisi ad ignem colliqueret. Quo postea fiebat, ut cum sui natura esset arida, non potuerit tam parvo tempore inter ignem calefieri, quominus illico aridior fieret, cocta frictave Colophoniam similis.*

Pineae resinae generatim

Pitynon Phycema

Resinam liquidam & aridam differentiam

Andernaci versio improbatum

Dioscorides de resinis omnibus de quibus & Galenus scripsit

Alia versio Andernaci reprehensio

Resinae pineae praestantia

Arida refertur à
quibus proueni-
ant plantis.

De ea autem quae à nucibus pineis emanat strobilina vocata meminit Dioscorides libro primo cum inquit: τὴν τοῦ ἐνεῖς ἢ μὲν ἐστὶ σελιδίνα, καὶ ἐλαπίνα, ἢ δὲ πικρίνα, ἢ δὲ πικτινὴν: id est, Quae vero aridarum generi a-
scribuntur, quaedam ex pineis nucibus, alia ex abiete, picea & pinu exierunt. Quibus palam est non solum
Strobilina memnisse Dioscoridem, sed & ceterarum de quibus meminit Galenus. Siquidem nil aliud est a-
pud Dioscoridem sicca pini resina quam quae πικτινὴν φύσιν vocatur: quinetiam nil aliud figulina, quam quae
à picea abieteque sicca colligitur. Quae quidem, ut hoc etiam auro, ad nos comportantur impure ac arida sicca
arborum foliis & corticum ramentis vitata, quibusdam in receptaculis suarum plantarum corticibus para-
tis, ita nihil sane prohibet, quin credamus easdem aduexisse antiquitus in fœditibus homines. Ad ea autem,
qua postulas an picea resina, de qua scribit Galenus libro tertio de compositione medicamentorum per genera,
liquida sit pix, de qua plurimos idem meminit, respondeo, hanc haudquaquam esse picem, sed picea arboris re-
sinam sua sponte manantem. Etenim liquida pix nunquam sua sponte fluit, sed arte accensis igne pinis, quae in
eadem contabuerunt, ut pluribus differimus in nostris in Dioscoridem Commentariis. Hisce itaque cum ra-
tionibus, tum a Galeni testimoniis non solum quae prius confusa de resinis videbantur, iam clara, aperta,
ac extricata cognoscens, sed etiam quod in resinarum historia nihil à Dioscoride dissentiat Galenus, quodque
plura quam is habeat earundem genera. Quinetiam fortasse plura Coritia vel Vini de resinis te didicisse fa-
teberis, quam Patavii, cum ad me scribas, ubi te adiuuuisse neminem, qui ex hisce tenebris te liberaret, dum tibi
medicam materiam addiscebam. Vale.

Galenum nihil à
Dioscoride in re-
sinarum historia
dissentiat.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Iohanni Francisco Nascimbene Medico,
S. P. D.

Declaratur quae sit aris nigri squama apud Galenum.



Si antea ad ea non respondi, quae datis ad me literis, de nigri aris squama, à me petieras, de qua
lib. 2. de composit. medic. secundum genera ca. 2. de gyluis emplastris agens meminit Galenus:
id tamen velim tibi persuadeas haudquaquam euenisse, quod non semper accinctus sum quini-
nus tuis satisfaciam petitionibus, aut id tantum mihi laboris facessat, sed quod pluribus fuerim
mensibus occupatus in argendis excolendis que meis in Dioscoridem commentariis, nec ab hisce

studii sine iactura potuerim ingenium meum auertere. Atqui cum otium nunc aliquid super sit, diutius sane dis-
ferre non possum, quin tuis humanis literis respondeam. Scias itaque velim, quod quanquam non negli-
genter perlegi cum antiquorum, tum recentiorum libros, qui de metallicis scripserunt, non memini me tamen
legisse apud quempiam reperiri es quod suapte natura nigrum fuerit. Sed haberi es aureo, argenteo uel
ex rubro nigrescente, asserit Plinius lib. 2. cap. 2. sic inquit: Aris tria genera, Candidum argenteo nitenti
quam proxime accedens, in quo illa mixtura preualuit: alterum in quo auri fulua natura: tertium in quo aequa-
lis omnium temperies fuit. Prater haec est es cuius ratio reddi non potest: suo colore preciosum ad iocinoris co-
lorem vergens, quod ideo Hepatizon appellant. Huiusque sunt aris colores de quibus meminit Plinius, qui
longe diffusius de are scripsit quam ceteri qui ante vel post ipsum claruerunt. Atqui inter omnia haec aris ge-
nera nulla nigri aris Plinio sit mentio, nisi quispiam forte asse diceret, illud nigrum esse es quod Hepatizon idem
vocat Plinius: quod cum sit (ut ille inquit) ceteris praestantius, praestantior etiam fuerit eius squama & medi-
co usui competentior. Hac fortasse opinio tibi non displiceret, praesertim ubi eam pluribus, efficacioribusque ra-
tionibus augere adniterer. Nec dubito quin te in hanc sententiam longe melius adducere possim, quam tui illi

Aris genera
tria.

Probatissima ar-
is squama quae.

Præceptores, qui dicebant, imo nulla dubitatione (ut ais) affirmabant, illud esse Galeno es nigrum, quod Plinius
Hepatizon appellat. Sed quoniam horum placitis mea non subscribit sententia, nec etiam videtur assen-
sari Galenus, nolui sane, ut ignorata huiusce rei veritate us acquiesceres: ideo que diligentius questione hanc
discutere oportet. Dioscor. libro quinto duas tantum aris squama species habet, de quibus differit his verbis:
Probatissima aris squama est, quae in Cyprus arariis ex clauis Cyprio are confectis crassa decutitur, Helitis id
est clauaris proprie dicta. Damnatur contra, quae vulgari are aut candido confecta fuerit tenuis & infirma,
quam & nos reprobamus, maxime approbantes crassam. De his duabus, nec de pluribus scribit Galenus libro
nono de simp. medic. facultatibus, & Paulus Aegineta in 7. & Aetius in 2. nihil prorsus de nigri aris squama
differentes. Quo fit, cum apud Gal. & ceteros aris squama duae tantum habeantur species, ut necessario harum al-
teram nigri aris squamam vocauerit Gal. Quoniam autem in medicamentis parandis, praestantiora selectioraque
expeti solent, quum Helitis squama Dioscoridis testimonio probatissima sit, infirmissima vero altera, aliter
sane mihi censendum non est, quam quod Galenus pro nigri aris squama Helitem intellexerit, quae in Cypriis
officinis a rudi are, è quo clauis fiebant, ad nauium fabricas malleis ferreis decutiebat. Nec leuis sane ratione
adducor ad credendum id proculdubio esse verum, quum certo sciam es illud, è quo virga fiebant, è quibus cla-
uis parabantur, alio non fuisse colore, quam nigro: tum in primis quod non solum es runde, sed argentum & fer-
rum suapte natura nigrum contrahant colorem quamprimum in ignem coniciuntur, tum deinde, quod es i-
psum, simulac è sua fluit minera, coitque vel in massam, vel in virgas digeritur, illico superficietenus nigrum
reddatur. Sententia nostra subscribit Plinius capite nono eiusdem libri sic inquit: Exurente enim coctura
es nigrum conficitur. Ceterum si a me percontareris qui fiat ut aris squama, quae ignium vitantum nigre-
scat, ea longe magis praestet, quae à repurgato elaboratoque are excutitur, è quo cacabi omneque genus vasa pa-
rari solent, cum tamen unum & idem sit es, & ex eadem minera prouenerit: dicerem id non alia euenire ra-
tione, quam quod pro conflandis clauis, rudi tantum aris virga sumantur. Siquidem haec dum ignium vitra
experiantur, ut inde clauis fiant, excrementa omnia à centro ad circumferentias cutetenus remittunt, quo po-
stea sit, ut subinde malleis percussa, crassiorem pleniorum, solidiorumque exuani squamam, quam quae decuti-
sa fuerit ab are pluribus vicibus repurgata, ut fieri quotidie videmus in arariis officinis, ubi varia vasorum ge-
nera

Squama aris ni-
gri est Helitis.


nera malleo & include, nullo accedente igne, conflantur. Etenim aris huiusce squamæ cum tenuis sit & parum contineat excrementi, in quo maior inest siccandi vis, infirma est, ut Dioscorides inquit, & fere inutile in medicamentorum usu. Ideoque recte dicebat Galenus, Helitem sane principem in siccando locum obtinere & tenuissima omnium esse substantia. Quamobrem in ea perpetuo sum sententia, quod ubi libro secundo de compositione medicamentorum per genera in gilio illo emplastro & in alio Hera ad ulcera contumacia lib. quarto eiusdem operis, aris nigri squama meminisset Galenus, de Helite intellexeris: id est de squama aris rudis, non elaborati. Quippe quoa (ut prædiximus) expurgatum as, è quo cortina, cacabi, lebetes, ceteraque vasa conflantur tenuem admodum squamam remittunt, minimeque excrementosam: cuiusmodi est aibi aris squama (ut Plinius est auctor, quod hoc non parum argenti contineat). Hac itaque sunt, que tibi de re hac referenda putavi, quibus si tibi satisfactum esse putabis, gaudebo mihi sane plurimum: ac si forte se secus euenierit, velim ut pro tua humanitate meam non accuses ignorantiam, aut negligentiam, sed quod plura non repererimus qua viderentur meliora. Vale.


TYPOGRAPHVS LECTORI.



Librum primum Epistolarum, separatim & quidem secundo excusarum, claudit Epistola Francisci Parthini ad Matthiolum, quam nunc Apologia in Amathum præfixam inuenies, hac in re auctorem imitati, qui suæ Apologiae præfixit. At librum secundum, exorta est Apologia & Censura in Amathum: quibus subiecti ea quæ sequi vides. huus te monere voluimus, nequid in Epistolis à nobis prætermisum, existimares.

F I N I S.





PETRI ANDREÆ MATTHIOLI EPISTOLARVM MEDICINALIVM LIBER SECVNDVS.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS, BERNARDO Disenio Cronenburgio Medico,
S. P. D.



Vanta sit doctorum studiosorumque virorum inter se sumpta, mi candidissime ac doctissime Cronenburgi, ego quidem indices magis ac magis exporior, cum non exiguus sit doctissimorum virorum numerus, qui nostrorum commentariorum lectione moti, partim mihi plurimum per Epistolas gratulentur, partim me amore & benevolentia summa prosequantur, partim vero contra invidios obrectatoresque meos sua me sponte defendant, qui tamen nunquam meo facie noverunt, nec vlla mihi cum illis antea intercessit necessitudinis causa. Atqui inter hos neminem sane habeo, cui plus quam tibi me debere sciam, utpote qui ad me non amandum modo, quod ipsum sane per se maximum est, sed etiam absentem & ignotum tuis doctissimis scriptis defendendum, laudandum, colendumque accesseris. Quod quidem in causa est, quum tu sint qui tum scriptis, tum verbis (que eorum est humanitas) plurimum me collaudent, atque etiam obseruent, ut non facile commovear quorundam invidiorum ac perditissimorum hominum calumniis: proferim cum videam mihi non deesse clarissimos viros, qui me etiam nesciente contra horum rabidos morsus mihi patrocinentur. Tu enim primus causam meam contra Lusitanum illum suscepisti in doctissimo illo tuo ac compotendu medicamentis volumine: quin etiam innumeris sane locis dignitatem meam quibus potuisti amplissimis verbis ornasti. Et me ceteris, qui hoc nostro avo de medica materia scripserunt (qua tua singulari fuit benignitas, proferre voluisti. Tantus autem tuis beneficiis non videor mihi facile respondere posse, nisi forte ita sensurus es, ut me tibi referre gratiam putes, quum beneficia hac tua memoria tenebo. Quam nimirum memoriam colam benevolentia sempiterna non solum dum vivam & anima spirabo mea sed etiam quum te mortuo monumenta tui beneficii permanebunt. Nosco quidem amplissimam tuam erga me humanitatem, nosco benevolentiam, quin etiam incredibile amorem quibus me tantopere prosequeris: nosco candorem ingenui animi tui, & propensam tuam in me voluntatem. Quibus omnibus etsi animo & corde sim par, verbis tamen & literis satisfacere non possum: Dum enim aude cupio exprimere quam me tibi deum tunc putem, mihi nec stylus, nec oratio superpetit. Cognosco te cum virum doctum, tunc etiam officii plenum, mea laudis ac fame studiosum, frangi hominem, ac plane virum bonum integerrimumque studiosum omnium virtutum. Id, etsi nunquam te de facie noverim, novi tamen ex tuis doctis monumentis, qua de parandis componendisque medicamentis posteritatis memoria reliquisti. Quando quidem clarissimi & amicissimi hominis praeclara hac ingenii ac doctrina monumenta aspiciens, cum sane ipsum visus sum aspicere. Nam ipsa oratio & dicendi genus eiusmodi est, ut nihil nitidius, nihil elegantius, nihil modestius, neque venustum magis desiderari possit, vel in delectu cultuque verborum, vel iudicii acrimonia, vel dignitate & copia sententiarum. Apparet itaque in te ipso, ut extat, quaedam rara natura tuae probitas & singularis integritas nullo obfusata obrectandi studio. Quod tamen est vera atque perfecta virtutis proprium, cuius qui compotes sunt cum ipsi sibi confidant, alienas solent virtutes exosculari. Porro tunc de scriptis meis iudicium, tanquam profectum ab homine doctissimo ac laudatissimo, magna quidem me voluptate affectit. Ea est enim profecto iucunda laus, qua ab iis proficiscitur qui ipsi in laude vixerunt. Atqui nescio quonam modo possim tuam in me compensare beneficentiam, nisi pro virili dem operam, ut aliqua ex parte tua de me laudes vera videantur. Interim ego quicquid officii, opera, consilio, auctoritate, diligentia, studio pro tanta in me benevolentia prestare possum, semper me prestaturum polliceor. Ceterum quum Dioscorides meus elapso anno auctior illustriorque iterum editus sit, additis quam plurimis stirpium & animalium imaginibus, videamque te ex tuis frugiferis scriptis eius lectione delectatum esse plurimum: praetermittere quidem non potui, quin nunc exemplar unum ad te mitterem una cum Apologia contra Lusitanum Amatum illum, quem tu tam pulchre ac tanto cum iudicio compendiosissime cribrasti, quamque ut legas maxime rogo ac peto. Duplex enim causa extitit, qua ad hanc ederendam Apologiam me plurimum induxit: Altera quidem, ut ne me tacente putarent nonnulli me alicuius erroris conscium esse, aut meis diffidere scriptis: altera ut noscerent omnes acerrimum tuum de Lusitano iudicium. Ego hic Praga (ut meam tibi declarem conditionem) tam per quinquenniū Serenissimi Principis Ferdinandi Archiducis Austriae Physicum ago, ubi etsi non minima sint cura, qua non parum mea impediunt studia, succisuius tamen temporibus in literis & libris assiduus sum, paroque nunc novas plantarum imagines prioribus longe maiores elegantioresque, quarum aliquot nunc ad te mitto, ut de his tuum feras iudicium. Imperator Ferdinandus, & Serenissimus Archidux meus amplissimis

hoc operi euidendo mihi sunt Meccenates, adeo ut facile mihi persuadeam (modo Deus Optimus Maximus si propitius) non longo admodum tempore rem hanc honorifice me perfecturam. Quamquam non parum vereor, ne una cum opere crescant & inuidia: quod tamē non multo facio, magnam enim Philosophia habeo gratiam, qua non modo ab omni sollicitudine ceterisque animi morbis me abducit, sed etiam contra omnes fortuna impetus & inuidorum latratus armat. Postremo id maxime rogo atque etiam peto, ut eo in me amore, ea benevolentia semper esse velis, quibus semper antea fuisti, scilicet dignitatis meae protector ac acerrimus defensor. Hoc si feceris erit mihi tam gratum, quam quod gratissimum: Sed an quid opus est ut te hortor ad ea praestanda, qua tua sponte praestas? Nunquid ego equo (ut aiunt) sponte currenti calcaria adhibebo? Biteras si ad me scribere volueris Norimbergam ad Clarissimum Medicum ac Philosophum (immum Hieronymum Donzelinum, vel in Caesaris aulam ad Clarissimum Iulium Alexandrinum Sae. Maie. Archiatrum mittere poteris, nam illinc posthac ad me tuto deferetur. Vale, Praga decimo tertio. Kalend. Septembris.

BERNARDVS DISSENIUS CRONENBURGIUS

MEDICVS;

PETRO ANDREÆ MATTHIOLO

S. P. D.

Antecedenti respondet Epistola.



Cquid primum in te collaudem, mi Domine Matthiole, Vir multis nominibus Clarissime ac doctissimi, humanitatemne admirabilem, an insignem animi candorem, & incredibilem integritatem amoremque meo, an potius simul omnia? Natu homo eximius es, in quo elucet egregia virtus, & omnis humanitatis plenus, nisi verius ipsa humanitas nominari merearis, qui sic te met deicias ac negligas, in sublimi residens, in Italia totius doctrina parente natus, institutus:

- 30 apud Principes, Reges, imo Caesares admirandus, ut me humi repente, tenuis eruditionis aut potius nihil hominum Germanorum respicias, dum literis tuis eruditissimis, omni que officiorum genere refertissimis non visero modo, verum insuper magnopere predicare, atque ingenui tui factura monumento perpetuo ac nunquam inter morituro locupletare volueris. Nec est quod de tua adhaec quicquam mireris que inter viros ingenuos probos, doctos, semper est solida, & adamantino quodam vinculo connexa, praesertim eiusdem fidei ac professionis, utcumque delinquit malevoli & agresti ingenio improbi, quorum haud exigua isthac calumniatrice etate turba naderit. Nam ut de me verissime confitear, quando commentaria tua longe omnium doctissima in Dioscoridem legere ac relegere, atque insuper icones elegantissimas typis ad vinum expressas contemplari coepissem, mox quantum ingenii viribus, quantum animi fortitudine Herculeo quodam indefessoque labore simplicium veram cognitionem explicuisses genuinam Dioscoridis interpretationem edocuisses, lapsus plerisque etiam doctis non inuadentes indicasses, ambiguum obscuramque iectionem instaurasses, opiniones falsas refutasses, atque ut non natura copuliam, totum Dioscoridem redintegrassem: ita mihi aliorum in eundem scripta languere aut siccum minus absolute elaborata videbantur, quantumvis etiam maxime illi nominis atque rarissime doctrine viri fuerint (etiam suam quisque iandem & gloriam meretur, quam immensis laboribus proximi iuandi studio suo coniecimus est) ut continuo ad diuinam pene indolem tuam, incomparabilem ingenii vim, uberrimam scientiam, eloquentiam summam amandam, suspiciendamque exarserim, ut quiduis malui sem quam tui amorem deserere. Scripsit de simplici Medicina materia hoc auro Euerius Cordus, scripsit Ottho Brunfelsius, primi: Similiter Leonicius, Canardus, Marcellus Virgilius, Hormolaus Barbarus, in hoc eximium Viri exercitissimissimi atque eminentissimi. Hos sequuti sunt Clarissimi & persusissimi Ruellius, Hieronymus Tragus, Antonius Brasauolus, Fuchsius, Mundella, Gesnerus, & si qui sunt alii in arte celebres.
- 50 At reuera omnes superat & post se longo relinquit intervallo vnus, me iudice, Matthiolus, ut postremus, ita facile supremus: quia neminem habemus (liceat mihi sine aliorum detrimento quod res est pronunciaré) in hac studiorum palestra tibi conferendum, si modo non vniam aliquam laudem, sed vniuersas dotes tuas simul expendamus. Id praeter purissimam dictionis facultatem, diuicem verborum suppellectilem, exactum ubique iudicium, rerum luculentam veritatem, inculpatas Stirpium Ideas, irreprensibilem operam, predicandam in corrigendis aliorum erroribus modestiam, intrepidam admonitionem, fidelem remedium plerorumque communicationem, similesque dotes eximias, indubitata prorsus fide manifestum fit, quod nemo huic disciplina amplius quicquam patet addendum, sed ad vnium omnes tibi cedant, te laudent, extollant, & ceu absolutum, post Dioscoridem, exemplar imitandum sibi proponant, dum vltro ac passim tibi gratulentur, te studiose prosequantur, & aduersus amulos ac calumniatores quosdam (quia vix unquam tam inculpatum fuit seculum quin monstrum tale vnium aut alterum produxerit) suo etiam periculo innocentiam pariter & industriam tuam tueantur. Atque has praeclaras virtutes quum ego quoque in te, mi Domine, agnoscerem & intelligerem, tibi ne an cuiquam nouum siue rarum videri debuit, si pro meis viribus obiter tui defensionem contra malignissimum Sycopiantam & impium Apostatam susceperim, qua sane non egebas, nam nosti illud Horatianum,

Integer vita scelerisque purus,

Non eget Mauri iaculis nec arcu, &c.

Si inquam ad te amandum, laudandum, imo colendum venerandumque impulsus sum? Et recte faciunt, qui simili honesto studio tenentur, quoniam ita demonstrandarum stirpium provinciam suscepisti, ita feliciter iconas omnium expressisti ut ab omni ambiguitate pariter & obscuritate vindicaueris, & pristinam laudem Dioscoridi simplici Parenti, afferuaueris. Ceterum an primus inter plerosque Clariss. Viros, ut scribis, causam tuam

contra

contra Amathum Lusitanum susceperim, nescio: hoc tamen scio, hunc, potiorē operam ex Commentariis tuis primo editis Italice in Dioscoridem, impudenter ac furtive sibi vendicasse, quod flagitium est improbum minus, dissimulandum. Præterea eundem, per quem profecerat, imperitissime, immodestissime, ac odiosissime nominatum insectari improbissimum est, & plane eorum qui omnem pudorem humanitatemque, exuerunt, cuiusmodi perfidissimum testimonium de seipso præbuit nebulo a Christianismo ad Iudaismum turpiter iam dudum desciscens. Certe hac temeraria improbitate & invidentissima insectatione tui, nihil aliud est consequutus, quam solent, qui ex aliena gloria popularem invidiam ac commune odium merentur. Potuisset aliquo eruditorum numero & aliqua laude dignus haberi, si sua sorte contentus à morsu celeberrimi nominis tui abstinuisset: sed infelix dum te cepisse videretur, ipse misere captus est, suorum inuento malum sibi accersit, adeo ut iure maximo, maximam Medicorum ac Studiosorum omnium iram in se concitarit, dignus iccirco, quem omnes Reipublica utilitatem amantes & probi doctique homines exhibent atque explodant. Si igitur innocentiam ac præstantiam ingenii tui utcumque tutatus sum, meumque de pessimo calumniatore iudicium Commentariis meis, ita ferente occasione, inseruerim, magno equidem id commotio meo feci, ut qui tam sis vir munificus ac locuples, quod non aspernando fœnore studium illud meum compensare volueris insigni laudum mearum præconio, quas agnoscere non possum nisi vehementer ambitiosus: neque negligere, nisi ignominia notam subito velim. Proinde utcumque sit, certe beati me testimonio amoris, benevolentia ac humanitatis tue: Siquidē abunde tota epistola declaras, quo me amicorum loco habeas, habiturusque sis sempiterna memoria, non modo dum vivas, sed etiam dum te mortuo, monumenta illius beneficii mei contra Lusitanum pro te suscepti permanebunt. Hoc si vere dicis, sicut omnino credo (alioqui non erat necesse id scribere non expectanti neque de facie unquam viso) pluris mihi est sincerissimus hic animus tuus, quam univere Cræsi opes, spondeoque bona fide memoriam tui nunquam apud me interituram, quo me cumque fortuna vehat: sed inviolabilem, sanctam, perpetuam ad eoque immortalem fore: Neque enim me ullius iuris aut necessitudinis nexu tenacius obstringere potuisti. Atqui o utinam utinam sacrum illud pectus intueri, sacros mores discere, os sacrum genasque amabiles deosculari, vel quod malim, corpus totum complecti semel liceat: Quanta hac mihi felicitas, quanta læticia, quanta voluptas? Verum quum id non possim, facio tamen quod possum: fruor eloquentissimis doctissimisque commentariis tuis, in quibus vivam imaginem tui indubitanter expressam video: Hos ingiterante oculos positos habeo, non illos quidem primo evulgatos, sed quos tua liberalitate, seu perennis amoris nostrorum, superiori Francofordensium mercatu, ad nos misisti. Istis foueo amorē tui, istis memet veluti quotidiano speculo oblectans intueor. Specimen ingens corporis tui videre me mihi persuasi: Iste animus tui desiderio flagrans, quoad præsentem restringo: Istis velut amoenissimis Musarum virentis fruor ac pascor ad faciendam: quibus accedit Epistolam tuam tua exarata omnis eruditionis ingenuaque humanitatis tua plenissima, qua equidem univere ad absolutam civitatis necessaria tamquam facta tecta explicantur. Hanc reposui inter ea qua animo meo charissima sunt, unde quodam eam repeto, nouo me gaudio eiusdem relectioe imbuitur. Quod autem tu regas ac petis, ut Apologiam tuam contra Amathum, quæ cõpeditiosissime calamo meo cribratū asseris, legam: duas adiungens eiusdem editionis causas, quarum una est, ne quis amulus alicuius te erroris conscium fore, tuisque diffidere viribus tacenda existimari: Altera vero, ut omnibus iudicium meum de Lusitano constaret: Legi itaque non solum illam, sed in super Censuras in Amathi enarrationes, qua lectioe ita sum recreatus, quasi coram duobus utriusque spectatu dignissimo, assistente toto Herbariorum choro, preside atque iudice Apolline, testibus Dioscoride, Craeua, Theophrasto, Galeno, aspexissem: in quo, Deum immortalem, quot colaphos, quot alapas, quot verbera, quot vulnera, quot vibices homo ineptus, pugnandi imperitus, turpiter accepit, & nisi tu maiorem vite illius rationem, quam ipse sua, habuisses, iam in ipsa pugna occubuisset miser. Itaque si quicquam sapit, cauebit omnem consuetum etiam cum imperitis parumque exercitatis. Legi & alias editæ Apologie causas scripto tuo comprehensas. Porro quod ad priorem illam attinet, non arbitror quempiam fuisse tam inertem, improbum, malignum, aut prorsus sine mente, qui tam iniquam suspicionem concipere voluerit de viro multarum linguarum peritua & incomparabilis ingenii excellentia clarissimo, qui publico commendo profuit multis, obfuit nulli, tanta intermodestia aliorum errores castigans, ut omnium amore ac veneratione iure dignus haberi, vel hoc nomine uno, debeat. Nec credo ullum eorum, quos nominatim errorum admones, singulari sane urbanitate, imo cum laude ac honoris præfatione, tantillum commotum aut questum, quum tamen & Aristoteles unicum pene naturæ miraculum, veritatis potius quam amici Platonis rationem habendam esse iudicauit. Quare ego Lusitani stultam arrogantiam, & prodigiosam insaniam, risu potius ac Elleboro explodendam & expurgandam, quam scripto confutandam iudicarem: attamen, quæ tua sublimis est doctrina & animi ingens magnitudo, famaque tuenda laudanda integritas, hominem irrefragabilibus argumentis ac disertissimis rationibus semel conuincendum conterendumque censuisti: quod certe sic factum Apologia tua pariter ac Censura decerno, ut nunquam exurgere vel emergere possit amplius. Alteram quam allegas causam, humanitatis benevolentiaque tua est, Vir sincerissime, quibus Craneburgium nominis tui, aut magis veritatis prouehenda tutandaque studiosissimum, iudicio acerrimo praditum, significare voluisti. Id quaecumque sit apud te, tuique similes exacta censura viros, examinandum relinquo, quanquam tergiuersari poteram, nisi decreto tuo tam impense faverem, aut saltem unice delectarer: mihi satis fuerit, si a sena laudis & doctrina iniquissimum amulatorem coloribus suis vere depinxerim. Atque utinam idem tam copiose quam scelerate illius confidens malignitas meretur. Et hæc hætenus. Nunc vicissim breuiter vita mea statum tibi exponam. Ego Italiam Anno 38. & doctissimam Bononiensem Academiam, in qua D. Curtium aliosque Medicos proficentes audieram, relinquens, relecta (Deo propitio) ad patrios penates in Hollandiam florentissimam regionem redii: cuius laudes verissimo Elogio celebravit ter maximus Erasmus Roterodamus noster, ad finem Chiliadum, titulo Auris Batava: ubi dum annum unum artem exercuissem, mox ab inclyto & prudentissimo Senatu G. uninga urbis, quæ profecto magna, opulenta, munita, ac bene instituta est, non ita procul ab Orientali Oceano, publico are accersor. Hic annis nouem commoratus multis equidem dolentibus, Coloniam Agrippinam perueni, adiuuante tunc institutum nostrum clarissimo medico Ioanne Echthio amico meo charissimo, studiorumque meorum per Italiam sodali coniunctissimo: In qua Academia etiamnum vivo, natus annis quinquaginta: miram fortune improbitatem multipliciter expertus sum. Nullis Principum obstrictus, tametsi talium condictionum occasiones

non defuerint, quia ingenium meum aulis non perinde conuenit, utpote liberum ac simplex, atque eas alioqui formido, cogitans: Exeat is aula, qui pius esse uolet. Quas ad me misisti Simplicium picturas, uehementer probo, simulq; laudo & predico Summorum Monarcharū liberalitatem, ac propensam in te iuuando ornandog, uoluntatem, quibus dotibus sese uere Reges declarant: nam nisi conatus eiusmodi hac ratione inuarentur, non uideo quorsum literas & disciplinas didicisse, easdemq; posteritati, immensa corporis iactura, tradere esset opera pretium, quibus constat omnis polstia, rerum harmonia, philosophia moderatio, hominum salus, quibus a reliqua mortalium sece disiungimur, & ad Deorum beatitudinē sensim deducimur. Postremo quando maxime rogas, ut in amore beneuolentiāq; tui perseuerem, & qua sequuntur in Epistola. Hoc tibi iure iurando affirmo Vir Excellentissime, me nulli tuorum amicorum cessurum, tamen si ceteris sum inferior, etiam si capitis periculum obendum esset, meque paratum esse pro uirili improbissimorum nebulonum uirulentam insaniam, in quorum Catalogo primas tenet Amathus, propellere. Tu modo da operam, quod facis, ne temere hunc affectum concepisse uidear, & me similiter amare perge. Interim maeste uirtute, mi Matthiole, & qua capisti uigilantia, doctrina & gloria rem Medicam prouehere, eadem quaso absoluas, ut omnes natum te gaudeamus, Sacrosanctae arti nostra gratulemur, simulque calumniatorem tuum Lusitanum Amathum execremur. Certe admirantur te docti omnes, imitantur tam pauci, quam reprehendit nemo, quicquid amarulentus Amathus, quem facete & false Amathum uocas, inepte garrat. His ualebis Vir animo meo charissime, & si quid habes in manibus materia Medica, eius me quaso facies participem, ut istiusmodi beneuolentia magis tibi deuincias Croneburgium, quem iam dudum totum obaratum additumq; possides. Lueris tuis amantissimis iam diu respondi, si ut mihi paratus calamus, ita promptus fidusq; fuisset nuncius. Iterum uale doctissime me Matthiole. Colonia XX. die Martii, Anno M. D. L X.

MELCHIOR GVILANDINVS BOR-
ruffus, Conrado Gesnero Medico,
S. P. D.

P Lato philosophia pater, & diuiniore scientia autor longe clarissimus, itemque Stoici omnes uarietiam, hoc est diuinationem introducunt per instinctum admittuntq; diuinum, quem ἰνδυναμίον Graci uocant, qui phanaticus furor est, feruorq; lymphaticus per somniorum imaginationes, ac Chaldaeorum observationes, Magorumq; Brachmanum, Gymnosophistarum, Druidum, atque Augurum disciplinam. Caterum hi plerasq; uaticinii partes & commendant & probant, quamuis Xenophanes, ac Epicurus λιλανδία omnem e medio tollere conati sunt. Huius dices, quo denique tam longe petitum exordium tendet? Cum literas tuas, uir clarissime, doctrina haud uulgari reueras, & omni humanitate officiiq; genere plenas perlegissem, adeo mihi mentis argumentis, corpus autem armis telisq; uacua relicta sunt, ut qua denique ratione tot in me acutissima directa spicula uiriliter propulsarem, oculus nequaquam circumspicere possem, parumque absuit, quin παλιπδία meditarer, & insuper gratias agerem, planeque tuo iudicio acquiescerem. Mamas apud Paulum & Holoconitum apud Hippocratem, non modo diuersorum generū plantas denotare, uerum etiam utranq; uocem prorsum ab Italicorum Dulcichinis (qua Veronenses Trasci & Trasci uocant, Genuenses ζιζιφας terrestres, Hispani Iuncum anellanam, Arabes denique Habbaz, si Leoni Africam describenti, itemque Bellunenfi credimus) discrepare. Quod dum ita toto die anxie sollicitaq; mecum ipse cogito, rubore suffusus interim aliquoties, non tam quod sententiam meam corruisse magnopere dolerem, quam quia minime prauidissem, quibus eam fulcris contra aduersariorum insultus commuierem. sensim pater ille rerum omnium Sol, ex nostro delapsus horizonte ad inferius hemispherium ad latentes hactenus tot Antipodum myriades nostris gentibus cognitas deuoluitur, & mihi placidus membris omnibus sopor undiq; circumfunditur. Interea in somnio opprimor manifesto liquidoque, ac uolitare circunquaq; incipio, ueluti in festo mari uentis pulsata nauis: In terrā uniuersam excurro, e terra in caelum efferor, uniuersum transmitto mare, aere peruolito totum, cum Sole terram ambio, cum Luna circumferor, ceterorum astrorum inuigor choro, & quod mirum est, integro etiamnum in repentina & uolenta adeo peregrinatione manente corpore: nec plane prius ἰππομανεῖν καὶ ἐνδυναμίον desino, quam in floridissimum pratum vastissima illius & remotissima Hesperidum populorum telluris, quam diuinus Plato in diuino Timeo Atlantidem dici tradit, & prolixè graphiceq; in Critia describit: nec sane alia est ulla, quam qua hodie Orbi noui, & Indiarum Insularū terra firma Americaq; nominibus uniuerso mundo innotuit, descendo, ubi, inter cetera, Dulcichinorum molem conspicio magnam, Hippocratemque ipsum, mirabile dictu se uero aspectu granem, manu dextera Balin illam Xanthi tenentem, sinistra uero canos leniter pertractantem, uoce deniq; alta Trasci a se Holoconitum appellari succinentem intonantemq;. Dum hac si menti obuersantur, expergiscor, ad meque ipsum redeo, nec scio scio gaudione magis, an dolore attonitus. Laetabar equidem non parum, & magnam plane capiebam delectationem, quod qua de die medita ualde ac magno adhibito studio apprehendere neuisquam potuissem, ea, omni cura solutus, & aliud omnino agens, uera esse cognouissem. Vera dico cum Platoniciis & Stoicis, qui diuinationis partem unam ex somniorum imaginibus apprehendunt admittuntq;, quando & a Peripateticorum placitis alienum non est, animam interdum mercenariam corpori inherere, neque posse ueritatem contemplari: noctu autem ab hac seruitute solutam, & in loco qui est circa thoracem conuoluntam, ad uaticinandum promptiorem fieri, & propterea in somnia nasci. Angebar autem insigniter, quod quibus rationibus ueritas in somnio agnita doceri posset minime perspiciebam. Certum tamen erat arreptam semel opinionē & in somnio confirmatam mordicus tenere, nec mutare uelle unquam, ac ne quicquam potius ad ea respondere, qua tu in medium attulisti, quam culpam deprecari. Videbam enim: in re ipse esse arduam, uerū tu nouitatem dare, uoxis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus uero naturam, & naturae sua omnia. Sed tamen, uir πολυμάδιστα τε καὶ πολυλάτιστατε, animum aduerte quaso, & placidas mihi aures praebe, cognosceque qualis semhi inter angores hos conuēctura, non am stabilitendae sententiam, dum cum-

Et aliuu rimor scriitorque, in tuis literis obtulit. Scribis non viderete cur Mamiras Pauli, quod mihi, vulgare, Mamiras Aegineta vocetur. Denique Holoconium Hippocratis, Moly a Dioscoride appellari sentio. Verum cauendum tibi est apprimere, Gesnere iucundissime, siquidem undequaque videris esse eruditissimus, ne dum mea studeo conuellerere acrius, et veritatem conaris inquirere anxie, in densissimas prolabaris tenebras, idemque tibi eueniat quod Chymistis usu venire cernimus, qui iam diu frustra versendis speciebus, et decantato illi aureo velleri summo et temporis et rerum omnium dispendio incubuerant, incumbenteque posthac in posterum. Nam si Dulcichinum, Mamiras est, ut profecto Pauli verba attestantur, radiculam esse tradentis herbule geniculis frequentibus nodosis cinctam, detergentis natura, nequaquam do Trallianus inter Mamiras et Bolloxasaron discreuit, utriusque separatis locis mentionem faciens. Mamiras sane libro medicina 2. cap. 5. nominat: Bolloxasaron autem libro 7. περιεμπυνηματων meminit. Nec probe

Dulcichinum est Mamiras.

Bulbocastanum.

Goupylum et Andernacum, viros alioquin celeberrimos, αντι Bolloxasaron, Βαλανοξασaron substituentia, siquidem non tam vox ipsa Bolloxasaron, quam equidem vetustatem haud redolere fateor, quemadmodum nec χυβιδαν, nec τρώξιμον, nec καρβύλιον, et sexcentas alias, quibus tamen frequenter Alexander utitur, et ab omnibus eruditis tolerantur, quamq; autoris eo loco propositum spectandum est, quando rectam vitæ rationem parulenta excreantibus prescribens, abstergentibus nutriendos precipit, qualia sunt, Ius gallorum, phasianorum, non pinguium, perdicum, attagenarum, turdorum, similitumq; auinum. Ad hac, si sanguis reiciatur purus, inficulo ei incoquere mandat Bolloxasaron, alicam, itrium, similaginem, et eius generis alia, qua ob succi crassitatem, vasa sanguinem continentia modice obstruere et pectus lenire atque abraderere potis sint. At tantum abest Castaneas detergendi farciendiq; vi pollere, ut nihil detergentibus et farciendis magis possit esse contrarium. Adde vocem Βαλανοξασaron aque esse nouam atq; Bolloxasaron, et quod permagni refert, nullam plane possunt Castanearum glandes επιυχοις utilitatem commodumue afferre. Proinde versorem veterem lectionem auguror, et Bolloxasaron pro herba interpretor, qua pingui succo constat, et facultatem obtinet humorum crassitatem mediocriter incidendi, adeo ut execrationibus e pectore sit idonea. Quod vero Bolloxasaron vix alia esse planta possit, quam illa ipsa cuius semina ad te misi, argumenta habeo, tum quia attenuandi natura pollet, et lentitiam in se habet, tum quia radice constat bulbosa, Castanea tamen similiore quam bulbo, quando cortice foris obducitur nigro, intus vero substantia Castaneis similima expletur, que res et nomini occasione prebet, ut composita nomenclatione Bolloxasaron diceretur, quia Bulbum Castaneamq; mentiri videtur. Sed haec leuiora. Quod maxime me mouet ut Bolloxasaron credi herbam, cuius semina hoc titulo inscripsi, illud est, quia nomen in Gracia in hodiernum usque diem retinet, Chio ἀρξιοξασaron, Byzantiis ἀρξιοξασaron, Rhodis Βολloxasaron appellantibus. Ad stipulatur in omnibus mea sententia, aut ego potius sua, vir grauissimus, cum doctrina, tum humanitate clarus, Gabriel Fallopius Mutinensis, in ordine et numero schola Medicorum Patavina minime postremus. Anatomicorum huius aui facile princeps, atq; in simplici palastra athleta inuictus, imo vero in debellandis domandisq; Chirurgia prodigiis, Italicus Hercules. Quid habes, mi Gesnere, quod damnes? Quis sensus est verborum tuorum? que tua mens? oculi? quid aures? Nimis urgeo, commoveri videri, siquidem errorem tuum agnoscis, Dulcichina non modo Bolloxasaron dici non posse, sed nec Mamiras quidem recte Bolloxasaron appellari. Verum ne in nouam figmenti suspicionem apud te incurram, quod vel ex nuda feminis figura argumentari veritus non es, radicem eius bulbosam esse nequaquam tibi probabile videri, ideo radicem unam ex Chio ad me allatam ad te mitto: quam ut terra mandes iubeo, cognoscesq; liquido Melchiorum tuum nihil minus scire quam nugari. Folis vestitur Crithamo similibus, cauliculo breui, candidos flosculos in umbellis sustinentem, quibus semina angusta, et striata, canaliculatae, Cumino aequalia succedunt. Non is sum, qui cauillis et imposturis inanem gloriolam aucupari velim. Mentiri nescio, nec, si scirem, velim. Nondum eo dementia deueni, ut Matthaeoli pellem, qui eo nomine male apud eruditos, nec immerito audit. Brasissaco corio anreponam. Metamorphosis ista haecenus molesta mihi esse non cepit, nec placet cum Euantha et Agriopa ex homine in lupum verti, rursumq; restitui sibi. Satius esset eius generis homines nasci nunquam, aut profecto in cunis emori prestitisset. Neq; enim res vlla maius bonarum literarum studiosis detrimentum apparuit unquam, quam ista eruditorum mentendi audacia impunita. Caterum Doronicum vulgare non posse ab Aegineta Mamiras vocari, ut Fuchsius putat, consimili plane argumento priori comprobatur. Nam cum sit verum Doronicum, ut descriptio attestatur, et doctissimi quiq; fatentur, Ruellius, Leoniceus, Fracastorius, Manardus, Cardanus, Mundella, Matthaeolus, Brassaeolus, Amatus et denique tota Medicorum schola clamat, Mamiras profecto nullo pacto esse poterit, quando Auicenna Mauritana factionis princeps libro secundo tract. secundo, separatis locis Doronicum et Mamiras, quod Memiren nuncupat, prosequatur, et de hoc in M. de illo in D. prolixè pertractet. Illud est in nodum huic, duo esse Doronici genera inueniens, Orientale nempe, et Europaum, quod officinarum seplasiarii Romanum vocant: sed te concedere quidem Orientale esse legitimum Barbarorum Doronicum, nostrum autem, vel maxime ire inficias. Equidem non dubito, vir clarissime, quin utriusq; radices iam dudum conspexeris probeq; perpenderit, nec aliam inter eas differentiam deprehenderit, quam quae est inter duo eiusdem alitis oia. Quod vero Doronicum Romanum non sic ut Orientale ferueat, et linguam vellicet (qua Ruellii opinio est) id nostri caeli soliq; temperiei ferendum esse acceptum, ut quisq; est eruditissimus, ita sententiae huic promptissime accedit. Radices enim plantarum dissimilibus saporibus a terra proprietate perfici, uti etiam in fructibus euenire videmus, credendum omnino est. Si enim radices arborum, aut vitium, aut reliquorum seminum non ex terra proprietatibus succum capiende ederent fructus, uno genere essent in omnibus locis et regionibus omnium saporis. Sed animaduertimus in insula Creta Monobasites vinum (Maluasium vocat vulgus) in Cirno Corsicum, in Campania Graecum et Lachrymam, circa Messanam in Sicilia Mamertinum, in Thracia maritima parte Maroneum, Smyrna regione Pramnum, utrunq; Homeri testimonio celebre. in Liguria Amabile, in Germania, quatenus Rheno abluunt, neq; omnib. partibus, Rhenum, in Pannonia Ungaricum, reliquisq; locis plurimis innumerabili multitudine genera vini virtutesq; procreari, quae non aliter possunt fieri, nisi cum terrenis humoribus suis proprietatibus. Saporum in radicibus dissimilitudo vnde.

Fallopii laus.

Bulbocastati descriptio.

Matthaeolus arguitur.

Doronicum vulgare, non esse Mamiras.

Doronicum duplex.

Saporum in radicibus dissimilitudo vnde.

Monobasites vinum.

Chelidonium minus.

... tum nihil minus scire quam nugari. Folis vestitur Crithamo similibus, cauliculo breui, candidos flosculos in umbellis sustinentem, quibus semina angusta, et striata, canaliculatae, Cumino aequalia succedunt. Non is sum, qui cauillis et imposturis inanem gloriolam aucupari velim. Mentiri nescio, nec, si scirem, velim. Nondum eo dementia deueni, ut Matthaeoli pellem, qui eo nomine male apud eruditos, nec immerito audit. Brasissaco corio anreponam. Metamorphosis ista haecenus molesta mihi esse non cepit, nec placet cum Euantha et Agriopa ex homine in lupum verti, rursumq; restitui sibi. Satius esset eius generis homines nasci nunquam, aut profecto in cunis emori prestitisset. Neq; enim res vlla maius bonarum literarum studiosis detrimentum apparuit unquam, quam ista eruditorum mentendi audacia impunita. Caterum Doronicum vulgare non posse ab Aegineta Mamiras vocari, ut Fuchsius putat, consimili plane argumento priori comprobatur. Nam cum sit verum Doronicum, ut descriptio attestatur, et doctissimi quiq; fatentur, Ruellius, Leoniceus, Fracastorius, Manardus, Cardanus, Mundella, Matthaeolus, Brassaeolus, Amatus et denique tota Medicorum schola clamat, Mamiras profecto nullo pacto esse poterit, quando Auicenna Mauritana factionis princeps libro secundo tract. secundo, separatis locis Doronicum et Mamiras, quod Memiren nuncupat, prosequatur, et de hoc in M. de illo in D. prolixè pertractet. Illud est in nodum huic, duo esse Doronici genera inueniens, Orientale nempe, et Europaum, quod officinarum seplasiarii Romanum vocant: sed te concedere quidem Orientale esse legitimum Barbarorum Doronicum, nostrum autem, vel maxime ire inficias. Equidem non dubito, vir clarissime, quin utriusq; radices iam dudum conspexeris probeq; perpenderit, nec aliam inter eas differentiam deprehenderit, quam quae est inter duo eiusdem alitis oia. Quod vero Doronicum Romanum non sic ut Orientale ferueat, et linguam vellicet (qua Ruellii opinio est) id nostri caeli soliq; temperiei ferendum esse acceptum, ut quisq; est eruditissimus, ita sententiae huic promptissime accedit. Radices enim plantarum dissimilibus saporibus a terra proprietate perfici, uti etiam in fructibus euenire videmus, credendum omnino est. Si enim radices arborum, aut vitium, aut reliquorum seminum non ex terra proprietatibus succum capiende ederent fructus, uno genere essent in omnibus locis et regionibus omnium saporis. Sed animaduertimus in insula Creta Monobasites vinum (Maluasium vocat vulgus) in Cirno Corsicum, in Campania Graecum et Lachrymam, circa Messanam in Sicilia Mamertinum, in Thracia maritima parte Maroneum, Smyrna regione Pramnum, utrunq; Homeri testimonio celebre. in Liguria Amabile, in Germania, quatenus Rheno abluunt, neq; omnib. partibus, Rhenum, in Pannonia Ungaricum, reliquisq; locis plurimis innumerabili multitudine genera vini virtutesq; procreari, quae non aliter possunt fieri, nisi cum terrenis humoribus suis proprietatibus. Saporum in radicibus dissimilitudo vnde. Chelidonium minus, q; rudis herbarum plebecula Scrofularia nigrum vocat, cum quartis ordinis

ordinis absoluti sit in calefaciendo & desiccando, si Actio credimus, ideoq; magnam pra se fert acrimoniam. & gustum erodentem, cur, quae so, commanducando saepe nullam prorsus nobis acrimoniam imprimit, idq; potissimum quod in humido loco natum sit? Cur item Cicuta, Socratus maxime supplicio nobili, in Germania, Gallia, in plurimisq; Italiae locis fere innoxia nascitur? An ob eam causam quam Galen. libr. xxi. τὸ ποῦν δὲ τὸ αὐτὸν secundo scripsit reliquit? Dicit enim Aru Cyrenis minimū medicamentali, minimumq; acrimonia possidere, adeo ut in citis vel Rapis utilis habeatur: In Italia vero, ac minori Asia contra adeo acre, ut medicamentis duntaxat expetatur. Parit ratione fieri potest ut Chelidonium minus, & Cicuta, in Creta, Aetia, Chio, Ciliicia, & Graecia eiusmodi viribus praedita nascantur, quales eis a veteribus contribuantur, in Italia vero, Germania, & Gallia nocendi oblita pronensant. Comprobant idem primis insignia autorum testimonis, Plinius,

Cicuta fere innoxia.

10 Columella, Marcellus, Galenus, Dioscorides, & ceteri, Persicam arborem in Perside exsitosam esse, ut Asiae in Aegyptum, macata natura in cibos receptam. Idem Beonio accedere literarum monumentis prodidit Aristoteli πειρὸν τὸν primo. Poma mortu in provincia Peru Occidentalis India, an Sorba esse ignoras? At varietate regionis adeo perniciosam plantam evadere non debet, cum & excentis aliis eiusmodi mutationes accidere consuet. Summa summarum, quod si terra generibus humorum non esset dissimilis, & dissimilata, non tantum in Syria, & Arabia in Harundinibus, & Iuncis essent odores, neque abietes in Arabia Thyre manarent, neq; Oles in Troglodytice regione Myrrha gubulus funderent, nec Hedera in India Piperis bacca daret, nec Cyrenis in Ferulis Lujer nasceretur, nec Cinnamomum & Cassia in Moluccis insulis ex Lauris decorticarentur, sed in omnibus terra regionibus & locis, eodē genere, omnia procrearentur. Haec autem varietates regionibus & locis, inclinatio mēdi, & solis impetus proprius, aut longius cursum faciendot aies efficit ter-

Poma mortu Peru Sorba

20 re humores: quae qualitates non solum in his rebus, sed etiam in pecoribus & armentis discerni notius esse autumamus, quam ut autorum testimonis demonstrare habeam necesse. Illud in transitu adiecerim, nobiscum sentire Theophrastum & Plinium clarissimos rerum conditores, Calamum & Iuncum odoratos, nequicquam a nostris harundinibus & Iuncis discrepare, praeterquam quod fere comperimus sit, ut quae locis frigidis odore careant, ea feruidis odorata sint, ut Calamus & Iuncus in Syria. Abunde jatis, & latius etiam quam res exigebat demonstrasse me arbitror, Doronicum Europaeum eandem prorsus esse cum Orientali plantam, quando & nomen, & radice effigies, & par utriusq; natura illud coarguunt, nullo alio quam maioris minorisq; discrimine. Itaq; Doronicum vulgare nequaquam Mamiras appellabitur, ut Fuchio placet, cum Doronicum sit, Auicenna inter Memiren, quod Mamiras est, & Doronicum differentiam adnotante. Quare cum haecenus nihil obstare animadvertam, quo minus Dulcichinum Mamiras dici possit, non recantabo, nec dimouebo a mea sententia, nisi tu exercitiores in literaria palaestra athletas in arenam deducas de novo, qui id agant, ut tua & fulciant comprobentq; & mea destruant constringantq; quod ut facias, vehementer etiam atq; etiam rogo. Scia non defuturam tibi argumentorum copiam, quibus existimationem tuam tuearis, & defendas, ac meam opinionem conuellis confundasq;. Ridendus hoc loco Bellunenfis, qui Dulcichinum ab Auicenna Granum Alzelin vocari asserit, non animadvertens, Alzelin inter fructus, non radices ab autore connumerari, & Serapionem cap. 337. Simpliciter medicamento, in silisquis nasci tradere. Habzelin (inquit) granum pingue est, magnitudine Ciceris, citrinum ab exteriori parte, albū ab interiori, boni saporis, apportantur à terris Barbaris, nominaturq; Piper Aethiopicum (verum Piper Aethiopicum vera est aliud) in Barbaria dicitur Croni. Forma spectatur phaseoli siliqua & grano minoribus. Color grani citrinus nigerue. Sapor acutus ad instar Piperis. Vis eius gradu tertio calida, humida primo, haec ille. Ex quibus planum sit, ingens esse discrimen inter Dulcichinū & granū

Bellunenfis error. Alzelis quid

30 Zelin. Memini me Venetiis aliquando Ayrta in medio foro Balsami laudes, & praclaras eius virtutes (ut id genus hominum facere assolet) decantantem conspexisse, qui post longam inanum verborum seriem, siliquas quasdam faseolisimilimas, breuioribus, aromaticis saporem praferentibus, quibus semina nigra faseolo aequalia, sed minora sperant, pro Balsami fructu venditabat, quae res & doctus, ut audio, imposuit, verū veterum Carobalsamum cum iactatione etiamnum discutiantibus, quibus tamen medicus fidus aliud nihil sint quam Croni, seu Habzelin. Sed iam tempus est ut Holoconium Hippocratis, Dulcichinum esse probem, & differre a Molyo, non solum Dioscoridis, verū etiam auctorum omnium ostendam. Magna & vetus est eruditorum concertatio, cuiusmodi planta sit, quam antiquissimus ille Graeciae vates, vnicus ingeniorum omnium fons & victor Homerus, Plinius iudicis ingeniorum summus sententia, Mercurium Phyllo tradidisse in remedium carminum Circe in decima Odyssae Rhapsodia cecinit.

40 Zelin. Memini me Venetiis aliquando Ayrta in medio foro Balsami laudes, & praclaras eius virtutes (ut id genus hominum facere assolet) decantantem conspexisse, qui post longam inanum verborum seriem, siliquas quasdam faseolisimilimas, breuioribus, aromaticis saporem praferentibus, quibus semina nigra faseolo aequalia, sed minora sperant, pro Balsami fructu venditabat, quae res & doctus, ut audio, imposuit, verū veterum Carobalsamum cum iactatione etiamnum discutiantibus, quibus tamen medicus fidus aliud nihil sint quam Croni, seu Habzelin. Sed iam tempus est ut Holoconium Hippocratis, Dulcichinum esse probem, & differre a Molyo, non solum Dioscoridis, verū etiam auctorum omnium ostendam. Magna & vetus est eruditorum concertatio, cuiusmodi planta sit, quam antiquissimus ille Graeciae vates, vnicus ingeniorum omnium fons & victor Homerus, Plinius iudicis ingeniorum summus sententia, Mercurium Phyllo tradidisse in remedium carminum Circe in decima Odyssae Rhapsodia cecinit.

Πλὴν μὲν μέλαρ ἔχει γάλακτι δὲ ἴσχυος ἀνδρῶν, μᾶλλον δὲ μὲν ἰσχυρὸν θεοῖ χαλεπὸν δὲ τ' ἄνθρωποι. Ἀνδράσι γὰρ θιντοῖσι, θεοῖ δὲ τε πάσι δύνανται.

Quod interpretans Onisius Transformationum quarto decimo ait. Pacifer hinc florem dederat Cyllenius albus.

Moly vocant superi, nigra radice tenetur. Et meminit Lycophron in Alexandra obscuro poemate, μᾶλον αἰσῆσι πικρῶ. Ubi Isaacius commentator ait, μᾶλον δὲ δὲ ἡμεῖς τὸς ἰατρῶν τὸ ἀχρὸν πύραρον, quod & Suidas, Eustathius, & scilicet eius Erasmus duobus locis, praefatione in Aristotelis volumina Graeca, & in proverbio, Neq; mel, neque apes, Moly ἐδδνυρεῖος interpretatur, radice nigra simbolo laboris molestiam significari affirmantes, quae peruenitur ad animi tranquillitatem virtutis absoluta praesentia. Dixerunt censur, quisquis ille fuit,

50 qui hos versiculos condidit, quos in Priap. In sib. extare obseruasti. Hic legitur radix, de qua flos lactem exit, Quem cum Moly vocant, mentula Moly fuit. Theophrastus & Plinius herbam esse existimant, & nasci eam circa Peneum, & in Cyllene Arcadia tradunt specie illa Homericam, radice rotunda, nigra, magnitudine cepe folio scilla, effodi autem difficulter. Hoc enim modo Theophrasti verba legenda sunt, πικρὸν μὲν ὄντι τὸ γὰρ ἴσχυος χαλεπὸν, non quemadmodum Galenus vertit, & omnes Graeci codices habent, οὐ μὲν ἴσχυος γὰρ ἴσχυος χαλεπὸν, tum quia Homerus ita tradit, tum etiam quia Plinius difficulter erui ait, Theophrastum proculdubio se iunctus cuius verba referi ad unguem. Adieci hinc sententia calculi Homericus scholiastes, Moly appetitum efficit, tribens αἰσῆσι τὸ μᾶλον, ὅστις ἀχρὸν πύραρον τὸ δόρυμαρ, & αἰσῆσι δὲ ἀχρὸν πύραρον τὸ δόρυμαρ τὸ δόρυμαρ τὸ δόρυμαρ. Quae verba clario sunt argumentis, non radice ipsam euellit moleste, (ut pleriq; iusto reuocant) sed eius mortis periculo eruentē se subicit, haud facile a quoniam

effodi posse. Quae cum ita se habeant, luce meridiana patet clarius, Homerum per Moly aliud intellexisse nihil quam Cynospastum ceu Aglaophotin terrestrem Aelian, quae, uti a te observatum egregie est, Baharas Iosephi in Belli Ind. hist. dicitur, & a Democrito Marmaritis nuncupatur. Tradunt enim autores illi, Baharas seu Cynospastum captivae admodum difficilem esse, & rhiſotomi manus fallere, oculosque, refugere, neque prius consistere quam mulieris menstruorum profluvio laborantis lotio fuerit conspersa: neque tamen hoc etiam modo retentam sine periculo euelli, quippe extrahentem praesentaneam mortem consequi, nisi eiusdem radicis amuleto fuerit communitus, quo carentes, terram circum circa scarificare, radicemque laqueo vincitam cani alligare, ac repente discedere, tandemque nimio conatu sequuturum canem radicem extrahere, & veluti domini persoluentem vices illico commori, & nullo postmodum periculo radicem illam a quovis tractari posse. Vix enim in expiationibus praestantissimam esse, ut etiam qui a spiritibus vexantur immundis, protinus liberare comperit sit. Moly hoc in marmoribus Arabia Persico latere, & in Iudea iuxta Macheruntem oppidum querendum. Neque enim dici posse quicquam longius a vero remotum arbitror, quam Moly, quod Homerus celebrat, Narcissum Theophrasto appellari, & Dioscoridi Colchicon, ut Tragus censet, quando Colchici flos laeteus non est: & Theophrastus insuper magnam inter Moly Homericum, & Colchicon Dioscoridis, suamque Narcissum discrimen statuit. Sed eiusmodi errores, Trago fere fatales, toto opere passim. Homines sumus, fateor: sed parcius errare possumus, modo velimus: per incuriam multa committimus. Ut quimus aivnt. Opera laudanda, non opus. Alioquin Molyos meminit Dioscorides & Medici omnes, cui graminis, non Scilla folia, radix non Cepa magnitudine, sed parva. Id tu Holoconitin ab Hippocrate vocari credis, illa fortasse coniectura fretus, quod autor is libro de muliebribus morbis primo radicem eius velut bulbum esse narrat, nec plane Olyna parva dissimilem: qua nota Molyi a Dioscoride reddi videntur. Equidem plenissime perspicio cam, hac in parte, tum in aliis plurimis singulare illud ingenii tui quo polles, acumen, & fateor exosculaturum me fuisse, protinusque ambobus, quod dici solet, pedibus in istam tuam sententiam descensurum, nisi me Galenus medicina coryphaeus revocasset, & veriore amplecti existimationem coegisset. Nam autor ille in libello quo obsoleta Hippocratis vocabula planiora facit, μόλιζαν Hippocratem vocare ait, quae ceteris Moly dicitur: ὀλοκωνίτια vero herbam esse agrestem, & a Dioscoride δερχωνίτια appellari, quasi dicas in monte natam. Quibus verbis perspicuum sit, nihil minus posse statui quam Moly Dioscoridis, & Holoconitin Hippocratis unius esse stirpis nomina, quando quod Dioscorides Moly nominat, Hippocrates μόλιζαν nuncupat: contra quod hic ὀλοκωνίτια, ille δερχωνίτια. Queres tu, ubi apud Dioscoridē δερχωνίτια habeatur. Respondeo, usquam. Falso igitur Galenus Dioscoridem allegat. Nego. Nam & Auicenna eodem libro quem supra indicavi cap. 743. in describenda Zedoaria, & Serapio cap. 104. medi. simpl. in Decchon, id est, Panico, non Moly, ut male interpretis vertit, & Plinius, non is qui naturalem historia condidit, sed alter, libro de re Medica quarto, capite ultimo in Spomelidibus pomis, Dioscoridem citant, cum tamen nusquam, quae nominati auctores de iis plantis adferunt, apud Dioscoridem reperiantur. Nisi igitur nomine Dioscoridis alium quam Pedacium Anazarbenm intelligant, profecto volumina, quae hodie sub hoc nomine circumferuntur, manca esse in plerisque videntur. Sed haec per coniecturam dicta sint. Ad institutum redeo. Holoconitin Hippocratis, non esse Moly Dioscoridis, iam tandem te agnoscere arbitror, alioquin nec Galenus μόλιζαν apud Hippocratem, Moly interpretatus fuisset, nec Holoconitin a Molyo separasset. Quid multis? Et descriptio, & natura Holoconitidi ab Hippocrate reddita, attestari videntur, nequicquam a Dulcichino dissidere. Reliquum est, ut pariratione Moly Dioscoridis excusiam, perpendamque vera an falsa sint, quae a Deo illo herbariorum Mattheolo traduntur, Moly ignotam esse Italia plantam dicenti. Ridere subinde mecum ipse soleo, Gesnere lepidissime, doctorum quorundam nostri aevi hominum audaciam (temeritatem enim non dixerim) qui ut fucum, nescio, hercule quam laudatum, sua preterant ignorantia, frequenter fateri non erubescunt, multa se praeterire, sed quae nec aliis quidem perita sint, nec si docta esset, si diis placet, ignorantia, ea nescire, quae ab aliis hactenus prodita non sunt. Verum τὸ το μὲν ὀδὲν αἰεὶ ἐν τῷ ἔργῳ ἀριστοφάνους Sirepsiade, aut si manus ὀδὲν αἰεὶ τὸν Διόνυσον cum ceteris. Alterius ista instituti: alium hac locum postulant. Dabunt tandem imperitia sua poenas. Moly, inquit Galenus eodem loco quem proxime commemoravi, Allium est simplex caput habens, & non diuisum in spicas. Quem locum si Mattheolus apud Galenum legisset, ut profecto legere debuit, namquam in Molyo, & suam, & reliquorum ignorantiam accusasset. Nihil enim mediis fidius allio sylvestri μονοκεφάλῳ esse potest notius. Nascitur locis campestribus passim, foliis exilibus, gramini aut croco proximis, sed latioribus, tenerioribus paucioribusque, quinarium numerum raro excedentibus: Caule alto, tenui, concauo, albicante, in cuius vertice σποδοειδὲς quiddam inest. Flores candidi sunt, non plane iis dissimiles quos in Lilio conuallium cernimus. Radix subiacet parua, bulbosa, nullos in nucleos secta, sed simplex, & unica, allium olens & sapiens quae causa fuit ut a Trago Allium caninum diceretur, & eo quoque sub nomine secundo loco post Allium sylvestre depingeretur. Sed de omnibus satis a me dictum est, pleniusque ac ab initio quidem putaram, nec pauca praeter institutum: quare iam opportunum est classicum comprimere, & receptus canere, contractisque huius epistole, sine potius libelli velis, sensim portui ad nauigare. Illud currens notauerim, Moly a Dioscoride vocari, & Eringion, & Solanum soporiferum, quod Plinius item comprobat, & Ruta utranque speciem, Montanam, & sylvestrem alteram. Nec me praeteriunt, quam monstruosa sint, quae Plinius de suo Molyo memorat, radicis 30. pedes longa. Verum ego super eo alibi copiose. Hac in transitu monuisse quid officiet? Habes igitur vir praestantissime, incomptam quidem, nec qualem tua dubitationes exigerent, sed ingennam responsionem, quam ita accipias velim, ut ab eo qui te diligit sine aliquo fucos proficiscentem. Tuum erit, acrituo ingenio, & exacto iudicio, tam hac quam alia quae a me scripta sunt, diligenter examinare, calculumque vel album, vel nigrum singulis porrigere: utrunque enim aequi bonique consulant, modo me ames, quod ut facias etiam atque etiam rogo. Vale.

CONRADVS GESNERVS MEL-
chiori Guilandino. S. P. D.

Ro epistola tua, erudita sane & proluxa, quanquam mihi cum voluptate legenti per breuis ea vi-
sa est, gratias tibi habeo doctissime Guilandine. Nam quod ad breuissimam meam tam copiose:
quod ad subiueam & familiarē, tam grauer & argumentose referre dignatus es, id qui-
dem ex amoris in me tui abundantia profectum interpretor. Tantius autem orationis tuae appa-
ratus est, ut perlectis omnibus, animo consternatus, & nescio quomodo affectus (quod ex mea

- 1^o etiam nimium simpliciter condita, ut idem tibi contigisse, ut scribis, miror) sententiam omnino mutarem, & vi-
ctum undiquaque, ut faterer, non parum absui. Id quod (ut mox in initio dicam, ne prorsus contumacem & re-
fractarium me putes) circa Bulbocastanum certe ingenue fateor. Dabo enim hoc honori tuo, ut victoriam tibi
adscribam eius rei, de qua tecum non certauis, sed interrogans duntaxat subdubitans: atque hoc etiam gloriosius
tibi est si me non tanquam aduersarium, sed ut preceptor discipulum vincas. In reliquis vero non eque, ut in
progressu epistola dicam, tecum sentio. Neque vero me a te amando, colendoque, (hoc eruditio tua, illud benefi-
centiam meretur) acres & vehementes illa tua *ἐπιπληκτικὰ ἰστορητικὰ* dimouebunt: non magis quam ab Antisthe-
ne Diogenem baculus. Imo quod tam audacter me increpas, quod mentem & oculos in me requiris, declama-
torio quodam & pene tragico dicendi genere, equidem minime agre fero: qui malim, si in alterutram peccan-
dum est partem, nimio in uentende veritatis seruore peccari, quam remissione nimia nullum in nobis rem in-
- 2^o quirendarum studium si agrare. sique, ut hoc tibi condono, & vicissim eodem erga te candore ac libertate, ho-
mini Heluetico & libere educato agendi, absque ulla indignatione tua, tuus egomet mihi sumo atque postulo. Epi-
stola mea, quantum memini, nimium forte familiaris, dubitationes tantum & interrogationes aliquas conti-
nebat: ut plenius instruerer de iis que tu simpliciter ad me scripseras. Tu vero ita commotus es, ac si eaque scri-
pisti, vera esse negassem, & toto (quod aiunt) caelo aberrarem. Atque inter errorem ac dubitationem melius
intereat: adeo ut inuicem contraria sint, ita ut *ἕξις* & *σιγήσις*. Dubitare cerie non est negare: neque penitus in-
gnorare, sed principium quoddam & uia ad cognitionem. Et philo sophi hominis, non quidem ignorare nihil,
quod in nullum hominem cadit: sed ignorantiam fateri primum, deinde in utramque partem argumenta dis-
quirendo conferre. *ἔστι δὲ τοῖς ἐπιπληκτικῶν ἐυλομένοις πρῶτον τὸ διαπορήσειν καλῶς. ἢ γὰρ ἴσταν ἐπιπληκτικὰ, λίσσις τῶν
περίσσειον ἀπορρυμίων ἐστὶ λίσσις ἀνὲς ἐστὶν ἀγνοῦν τὸν δεσμὸν* inquit in prima philosophia Aristoteles. Et in lib. de
- 3^o longitudine ac breuitate uitae: *ἀρὰ δὲ δὲ τῆς σκέψεως ἀι ἀλιγία πρῶτον ἐκ τῶν διαπορήσειν τε ἐπὶ αὐτῶν.* At ex lege secus,
ne inquirendo anxie ueritatē in densissimis tenebris abeam periclitari me auo: & stoltissimus hominum in huius-
modi me cōparas immerito: illi enim rem impossibilem quarentes merito non inueniunt: ego uero diligentis in-
sugatione & hactenus in hoc ipso Stirpium genere quadam inueni, Dei gratia: & inuenio subinde, nullius ante
me literis, qua ad me peruenerint, prodita. Dices fortassis discentē aequum esse credere & assentiri. Fateor: & in
plurimarū rerū cognitione, doctore te fini licere mihi optarim. Sed discentiū conditio duplex est, nam qui pueri
uel tanquā pueri discunt, simpliciter & absque demonstrationibus etiam, fidē auctoritatis preceptorum, et filij
parentiū, adhibere debent. Qui uero methodi ac demonstrationis uim intelligendo consequi possunt, illos iure ue-
mini utcumque amico, & auctoritati absque certa ratione credere, in rebus quidem humanis, prorsus ἀπίστος
est. In amicitia uera uoluntati & beneuolentia utriusque, habenda est mutua fides quā sincerissime, ita ut neuter
4^o de alterius animo dubitet, etiā si euentus aliquando non uideatur referre. Multa enim sunt causa & circū-
stantia, propter quas multa secus quam institueramus eueniunt. Iudicio uero & doctrina sua, quamuis dubita-
tiones in contrarium non desint, credere amicum postulare, ambitiosum est, & neruum amicitiae aequalitatem
excedit. Poteras mihi nullo artificio, paucis & breuiter comprehensis argumentis satisfacere, ac dubitationes
meas dissoluere: sed oratorem te esse declarare mihi uoluiti. Non erat quod tantopere mirareris Guilandine,
Italiae quasdam aut Graeciae plantas, mihi esse ignotas. Aut cur non Dioscoridem quoque, Galenum, Plinium,
Theophrastum, Hippocratem, & alios qui in hac natura parte reliquis mortalium excelluerunt, singulos pluri-
mā alienarum regionum uerimenta uel ignorasse prorsus, uel nomina uel uires eorum (nihil hoc nomine
indoctores) non probe calluisse mirari? Cur non te ipsum? qui forsitan omnium hominum ad nostram usque, ita-
rem diligentissime harum rerum cognitionem es persecutus: ad nos tamen si uenires, Helueticas quasdam, alpi-
5^o nas & alias quasdam plantas (non dubito) uel prorsus, uel nominibus quibusdam, uel facultatibus, ante hac
ignotas tibi ostenderem. Tu uero admiraris, Mamiran esse Dulcichinum aut Oloconitum, non statim me tibi
asserenti credidisse, idque sine auctoritate (quis enim hoc ante te docuit?) sine rationibus. Poteras saltem ex tam
breui & incompto Epistolo meo, etiam si non expressissem, hoc tempore prorsus a stirpium historia alienum esse
me cognoscere: & in eo adhuc lucubrandi argumento herere, quod ante multos annos incepti: atque utinam sa-
liciter & aliquo cum studio foris fructu aliquando absoluam: Animalium historiam dico, cuius pars de Aqua-
tilibus totum nunc me occupat, ut uix aliud cogitare liceat. Et hac etiam nunc que scribo, imo effundo, ali-
ud agens, horas aliquot piscibus meis suffuratus scribo. Quod si otium suppeteret, & eadem diligentia in planta-
rum historiam incumbere possem, quam nunc in pisces consumo, de paucioribus forte dubitarem, ac mirus tibi
sciscitando molestus fuisset: nec illos quos tu mihi profers, Tralliani locos ignorassem. Sed cauebo in posterum,
6^o quando iam noui ingenium tuum, ne importunius sciscitando, aut argutus dubitando, negotium tibi facef-
sam. Quanquam nunc etiam non male hac audacia mihi cecidit. Nam & ego natura (hoc est, Dei beneficio)
non admodum commoneor: & a bonis doctisque uiris amandis, inter quos mihi me postremum locum tibi
tribuo Guilandine, nulla increpatione me absterrere patior. Tu quoque vicissim, si magno celoque animo
uir es, qualem te esse mihi persuadeo, non ideo me amare desines, quod aliter forsitan quam expectares tibi re-
sponderim. Magnum enim amicitia tua amissa dolorem mihi scieret. Tu qui Germaniam Italiam, Grae-
ciam, Africa oram, & alias regiones peragrasti: qui ingenio uales, & indefesso semper studio omne genus libro-
rum excutis qui doctissimorum uirorum amicitias fiores, multa non me tantum, sed publice omnes docere po-
tes: idque ut facias, & omnes tuas uarias, & eruditissimas, copiosasque observationes, in stirpium histor. practi-
cae, in literas mature referas, antequam humanitas aliquid tibi accidat, etiam atque etiam te rogo. Et quan-

quam te vellem simplicius proponere pleraque si tamen opera precium videbitur interdum, ne hominibus auctoritas cuiquam imponat, illis etiam qui viri magni videri velunt, interdum reprehendis, siue nominatum, siue opinione ipsorum duntaxat, non abstinebis. De me quoque, postremo in hoc scriptorum ordine, ubicunq; dissenferis, pro arbitrio statues, totum enim in potestatem me tibi trado. Quod si quid laude dignum in me laudaueris, amabo te: si quid merito taxaueris, non irascar. Puerile profecto, ἀγροικον & nequaquam sapientis, ne dicam impij, viri est, sanctum amicitia ius propter aliquot herbas, earumue nomina, dissolui, quod hodie tamen vel inter viros magnos & graues, ut sibi aut vulgo videntur, infrequens non est, quibus hoc fere exprobrari posset, quod Cynicus Diogenes homini amicitiam eius expetenti, saperdam vero (aut caseum, ut alij tradunt) ferre detrectanti, dixisse fertur: τὴν σὺν καὶ ἐμῶν φιλίαν σαπέρας δίδουσι. Nisi tu fortassis aliud etiam hic spectari putas, gloriam & ostentationem ingenij, quonemo libenter cedit. At hoc etiam absurdus est, ambitionis & contentionis studio summam virtutum amicitiam solvere. Nos igitur istos, φιλὴ κεφαλὴν, rideamus: & alter alterius posthac sententiam ac argumenta placide tranquilleque (hoc est ἀπαδῶς, aut certe μετεροπαδῶς) audiamus: ut si fieri poterit, consentiamus per omnia: sin minus, salva amicitia, libere, simpliciter, candidaque inter nos dissentiamus, nullis amulationis, invidia, similitudinē, aut calumnia affectibus obnoxij, ut indoctissimi quidam docti hodie sunt. Amicitia vera animorum inter se vinculum est, virtutum ac pietatis ratione connexum, huiusmodi saltem, quorum nomine suscipitur, rumpenda non est. Quid ad virtutem aut pietatem herba, frutex, lapis, piscis: qua vel suis nominibus ignorari, vel ipsa stirpitus interire, quam sacrosancta amicitia iura Guilandine loquor: nec te huius criminis reum facio: sed alios nostri temporis homines, vix homines, noto: qui mundo se deridendos prebent, dū vel in medicina nostra, vel aliis de rebus neq; magni momenti, & ad vitam ac pietatem minime necessariis litigantes, tumultuantur, insaniant, cælum terra permiscunt, neque somniantes tantum (ut tu somniabas) sed vigilantes ἰππομανθῶν. ἀπλὸς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἐστίν. Nihil simplicius veritate, nihil simplicitate pulchrius, cum aliis in rebus, tum in oratione & doctrina. Agamus igitur deinceps inter nos quam simplicissime: & ut in Arcopago moris erat (neque enim maior illius maiestas fuit, quam amicitia inter viros bonos esse debet) ἀπὸ παδῶν καὶ μερομῶν: ut veritas ipsa nuda sic magis elucescat, quamquam enim feruore aliquo & iusta emulatione ingenium in astruendo vero excitatur, nimium tamen altercando & indulgendo affectibus sepe amittitur veritas. Ego forte te omnium in hac palestra exercitissimum, aut nihilam perparum docere possum, mi Guilandine: excitare saltem te & veluti obstetricando, ea qua concepisti, quoque parturis, vberius, feliciter & maturius in lucem ut edas, interrogando dubitandoq; efficere, quantum in me est, percipio, nam hoc etiam non cuiusvis est, de unaquaq; re commode dubitare. Sed ego met mihi prolixior esse, & displiceo, quam tamen epistola tua propemodum mihi extorsit. Expectas forte ut ea qua ad confirmandam opinionibus tuas attulisti, tandem refellam: ego vero non tecum disceptare, sed profecto abs te aliquid adducere, & rationibus tuis intellectis cum ipse solitius tecum sentirem, tum apud alios iisdem argumentis uti, & sententiam tuam fulcire possem, in animum induxeram. Nunc quoniam & res ipsa postulare, & tu quoque petere videris, si quid in contrarium possem, ut depromam, ne facile de sententia semel non sine ratione concepta recedere videar, quod lenitatis non indicij est, expectationi tue aliqua ex parte (quantum & per ingenium & per ocium licet) satisfacere conabor. Non deessent mihi probabilia multa, qua in contrarium adferrem: iis tamen abstinere, cum mihi prolixiori esse, nec liceat, nec libeat: quanquam tu quoque in tuis astruendis probabilia multa, ut oratores solent, non undiquaq; firma aut necessaria, protulisti. Quid pridem ad te scripserim, non equidem satis memini, neq; Epistola ad te data copiam habeo: sed ex tua, qua scripserim, pleraq; agnosco. Primum igitur in eo quod dubitasti an Mamiras Pauli, Bulbocastanum Tralliani forte esset, plene a te satisfactum mihi est: & plantas esse diuersas facile agnosco, & tibi qui tam liquido id mihi demonstrasti, gratias habeo maximas. At superiori estate, cum semina quedam peregrina ad me dares pro tua liberalitate, pro Mamirā quidem Dulcichinum mittebas (ut nunc quoque sentis) radículas scilicet: eam vero Oloconium Hippocratis esse negabas, quod ridicule rhizotomus quidam ita sensisset: Oloconitidis autem semen seorsim mittebas, nigrum, rotundum, durum, sapore fere nitroso, magnitudine, qua minimum genus vicia. Scheda inscriptio haec erat: Oloconitis Hippocratis, quod ei apud reliquos medicos nomen quarendum. Nunc vero in epistola tua, qua prius separaueras, coniungis: Trasi siue Dulcichinum recentiorum, Pauli Auicennaque Mamiran, Hippocratis Oloconitin esse magna voce clamas, & asserentes idem Hippocratis manes producis. Itaque tum forte dubitasti, possetne idem Bulbocastanon dici, quod radix veluti bulbulus quidam, saporis dulcedine castaneis proximis (ut Matthiolus scribit) appareret: nunc vero penitus tecum sentio, postquam & Bulbocastani radicem mihi communicasti, & Rhodios etiamnum sic appellare docuisti, &c. Quamobrem & assertam a te veram Trakiani lectiōnem, & rem ipsam quoque demonstratam, ex animo tibi gratulor, assentior, gratias habeo: & cum doctrinam diligentiam que tuam admirabilem veneror, & candorem exosculor: qui communia mihi & haec & alia complura, doctissimis tuis ad me literis, & nunc & prius facere dignatus es. Bulbocastanon igitur quid sit, nihil est quod amplius addubitem. Mamiras vero quid sit, si venia tua licet, adhuc sum dubius: & rursus veteris alicuius Medici (non Hippocratis, qui Mamiran fortassis haud agnouit: sed Pauli vel Auicenna) manes, si qua arte non illicita potes, non Magia non Necyomantia, euocari a te vellem, qui omnem nobis hac de re dubitationem tollerent. Tu Mamiran Dulcichinum esse affirmas: aut potius somnas: ego vigilans nego. Veterum igitur de Mamira audiamus scripta: & an ea Dulcichino conueniant, consideremus. Mamiras (μαυσεῖς, ultima circumflexa in prima declinatione, & seruat alpha in obliquis) veluti radícula quedam est. εἶον ἢ ζῆν π. herba, habens veluti nodos frequentes (νοδὸδὸς ποικίλος) qua cicatrices & albuginos attenuare creditur, abstergentis nimirum natura, Aegineta libr. 7. Mamiram Auicenna libro secundo cap. 487. est lignum sicut nodi, declinans ad nigredinem, in quo est reflexio parua: & est acutius quam vena unctorum, calidum & siccum in sine secundi gradus, abstergit & expurgat, siquidem abstergit albedinem unguium. Succus eius humiditatem crassam detrahit, & purgat excrementa cerebri. Radix eius dolori dentium medetur. Purgat albuginem oculi, & acuit visum, fit cum eo alcohol, & abstergit humiditatem crassam, proprie succus eius. Radix etiam utilis est ictericis. Dolori ventris pungentis medetur: & est in eo pronocatio. Hac Auicenna. Quod si vires Mamirā perpendas, easdem

Mamiras & Bulbocastanum diuersa.

Mamiras an Dulcichinum.

- omnes fere Chelidonio vel maiori, vel minori, à veterib. Græcis adscriptas reperias, non dico Chelidoniū Mamiran esse, vires convenire dico: nempe Chelidonium minus euidenter causticū, & siccat (hoc est in secundo gradu, vel principio tertii) abstergit, crassos circa pupillam humores dicitur, radice & succi vsus est, è succo collyrium fit, dentium dolori medetur, scelericis prodest, hac omnia sicut Mamira tribuit Auicenna: & insuper quod unguis albos (scabros intelligo, emendet, & propter acrimoniam succi eius naribus immixtus, caput expurget: qua duo remedia Græci Chelidonio minori adtribuant. Non (inquam) Chelidonium Mamiran esse dico sed viribus cum eo congruere: vende apparet, quantum à vulci humectante & inflante radice Dulcichinorū abfit. Acutum (vel, ut vetus interpretis habet, calidius) esse Mamiran Auicenna inquit, quam venas tinctorum. Eodem autem in lib. cap. 736. de venis tinctorum scribens (Arabice est Haruch subagin) eadem prorsus de ipsis tradit, qua de Chelidonio Galenus. Ergo Chelidonio aut æquales habebit vires Mamira, aut etiam vehementiores. Quid hoc ad Dulcichinum radiculam, qua primum calfaciendi ordinē non excedit, & acrimonia omnino caret? Neque hic me commovebunt argumenta tua Guilandine, quibus circa Doronicum ceteris, quod in Europa & nostris regionibus, sapore, odore, viribus ceteris inferiora nascantur pleraque, videmus enim & experimur, eosdem primarium qualitatum ordinem in nostris herbis reperiri plerisque omnibus, quos suis olim Græci attribuerunt: quod si pauca quadam excipias, n. b. hac ad universalem sententiam infringendam faciunt. Possem hic euagari ad longam digressionem, sed non libet nec vacat. In Dulcichinis eximia est dulcedo: Mamiran dulcem esse nemo dixit, sed acrem & acrimoniam abstergentem: qua quidem facultate remedia multa prestat, ad qua nemo hodie Dulcichinis utitur, nec utereur profecto feliciter. Dulcichini radiculas geniculatas ceruimus: in Mamira condylos, id est, nodos habent. Sic & Polypodii radices, nodis & veluti cicatricibus aut tuberculis distinguuntur, geniculata non sunt. Tacio Auicennam Mamiran lignum facere, quod Dulcichino nequaquam conuenit, & Eginetam non radiculam, sed veluti radiculam. Apud Trallianum lib. 2. cap. 5. ad extirpandis cicatricibus oculorum vox μαμίας in Græcis codicibus deest: a Gupulo ex Egineta enim in locum recte reposita. Apud Nicolaum Myrepsum requiritur in Antidotū de Croco Esdra, mox ab iniussu: Actuarius in Riccio versione habet Mamira. Actius quidem & Paulus in eiusdem antidoti descriptione (Fuchsius teste) Mamiran non meminerunt. Doronicum Orientale, Paulo Arnabo aut Mamiras vocatur: eo Romanum durius & solidius est: Fuchsius. Sed profecto Doronicum, Arnabo & Mamiras, ut voci n. b. tria, ista res etiam tres diuersa sunt, ut ostendemus. Doronicum nostrum, ut vulgus medicorum appellat quod in alpinis nostris & horis etiam transplantatum, provenit, mollius est Romano & Orientali, nisi fallor, ad manum enim peregrina nunc non habeo, nostrum mollius esse scio. Ruellius apud Actuarium Mamiran interpretatus est Doronicū, ita ut lector suspicari possit ipsius auctoris eam interpretatiōnem esse: quod fidei interpretis non est, & n. b. forte impostus, sicut & Fuchsius Gyraldus Simeonis interpretis: Errant (inquit Fuchsius) quæ carnabadium recentiorum Græcorum, idem cum Doronico esse putant, nam ita Simeoni Sethi careum appellatur: Nicolaus autem Merepsus cum n. b. Ethiopicum. Atqui hoc non Simeon Græce scripsit, sed de suo adiecit Gyraldus interpretis, carnabadium esse careum. Caterum iisdem fere rationibus, quibus Dulcichinum non esse Mamiran negari, Doronicum etiam vulgo dictū Mamiram esse negari potest. Iac. Syluius etiam verba de Doronico ex Serap. non bona fide recitantur: Doron. (inquit ille) Serapioni est radix parua, foris subflaua, intus alba, dulcis, calamo aromatico similis, calida, sicca ordine tertio, flatu, præcipue uteri, dissipat: cordis palpitationi confert, ipsumque roborat, venenosis ictibus auxiliatur, sumpsum & admotum (cum sicibus) Hac Syluius. At Serapionis codex meus Argentina olim excusus, in voce Haronigi (Syluaticus legit Varonig) cap. 325. neque dulce Doronicum, neque Calamo aromatico simile facit: sed reliqua, qua Syluius de eo tradit: Frusta sunt (inquit) crassitudine ramorum scetaragi, magnitudine nodi pollicis ad summum: & sunt vena (radices) alba intus, subcutrinæ foris, aliquantulum dura & graues: & deferuntur ex Sem. et pl. in m. m. Et mox de viribus, eadem qua iam ex Syluius retulimus, scribit: (qua certe cum Doronico hodie dicto sine Europeo sine Orientali, minime conueniant: & antidotum magnum admisceri ait, sicut & Auicenna libro 2. cap. 210. Durungi vel Durunegi vocans: Est autem (inquit) frustum lignosum radicale, nodus habens, intus album, &c. Loco eius ponitur Zurumbad æquale pondus, aut dua tertia ponderis ipsius de caryophyllis. Ex his verbis descriptione Mamira & Durunegi, similem esse apparet: colore tantum excepto: nempe lignum radicis instar, nodosum, remedia vero ex utroque diuersa: etsi utrumque, calidum ac siccum sit, hoc ordine tertio: illud in fine secundi. Ergo veri Doronici, seu Durunegi loco quandoquidem eo caremus, vel Galangam, vel Zedoariam, vel caryophyllis cum seminibus, qua flatu dissipant, usurpabimus: His scriptis, apud Syluaticum sic legi: Doronico radix est similis brance pulpi, (pedi vel brachio polypi, acetabulis tanquam nodis aspero: à qua similitudine filicula etiam nomen fecerunt Græci) & adfertur ex India sed quia raro habetur, ponitur pro ea vernix: Sed pro vernice puto Varonig legendum, quod est Doronicū Serapioni, ut paulo ante recitavi. Idem Syluaticus alibi sine auctore: Doronici (inquit) sunt radices parua, cuiusdam herbae similiter nominata, habentis folia parua, ut cunque rotunda, & flores violaceos, nascitur in montibus & rupibus. Et eandem esse Varonig. Arabice dictam sentit. Vulgare nostrum Doronicum flores luteos profert, bedypnoidis aut barba senis (quam vocant) floribus si niles forma coloreque: qui forsitan cerulei quoque in specie alia mihi adhuc ignota reperiuntur. Doronicum nominatur in Diambro Mesæ: Actuarius in eodem non habet. Doronicum vulgo dictum nimia dulcedine omnes fere radices, ita ut amaritudine Gëtiana, acrimonia Zinziber excedit: at veteres Doronico suo nullam saporis dulcedinem ascripserunt. Quod si etiam tibi donarem Doronicum nostrum & veterum (sic enim Durunegi appello): andem e se herbam, quoniam tamen, ut tu quoque fateris, nostro eadem vires non sunt, in remediis qua veteres prescripserunt, non nostro utendum, sed aliis succedaneis de quibus dixi: inter qua & Zurumbad est. Matthioli in Serapione duo capita de diuersis Zurumbet confundit: posteriori sane videtur carpesium, & Zarnabo ab Auicenna dicitur: nam & festucas esse aiunt arboris cuiusdam, & pro Cinnamomo poni. &c. Zedoaria Auicenna (Algieduar ipse nominat) eadem prestat qua Aristolochia, & qua Durungi: sed efficacius quam Durungi aduersatur veneni, nominatum napelli (ut Antitona dici mereatur) vipera, & alii. Porro Zurumbad eadem est herba, vel lignum: ut Bullunensis emendat, simile Cypero, sed minus, & minus odoratum, calidum & siccum in tertio abscessis. Pituitus dissoluit, impingnat, & auferit odorem vini. & aliorum & ceparum. Cordis lassitiam & robur conciliat. Vomitu retinet. Astringit naturā, (aluum intelligo) &

Mamira & Chelidonia carum dicitur vitium

Dulcichini & Mamiras comparatio.

Doronicū, Arnabo & Mamiras

Zurumbad

uteri inflationes pellit. Morfibus venenosis efficaciter medetur, Zedoaria in hoc propinqua. Ponitur autem loco eius aduersus venena Durungi sesquialterum, & dua tertia (portiones) ponderis eius de taraxaco syluestri, & dimidium ponderis eius de granis citri. Vides quam cognata inter se natura ac viribus remedia sint, Zedoaria, Zurumbed & Durungi: & quam inique facturus esset, qui pro aliquo istorum Doronicum nostrum supponeret: Rutam ego malim, aut Aristolochiam, ex remediis quae nostrae regiones ferunt, quam Doronicum nostrum pro veterum Durungi usurpari, sed Zedoariam praeter ceteris probo. Ceterum quod Zurumbed Arabes, hoc Graci recentiores Carnabadium dixerunt, ut ex Simeone Sethi apparet: *καρυβάδιον* (inquit) calidum est & siccum ordine tertio: concoctionem ciborum adiuvat, flatum dissipat, stomachum roborat, ventrem sistit, lumbricos interimit, urinam cit, pituitam incidit, sed flauam bilem in calidis corporibus gignit. Porro Zurumbeth alterum Serapionis (cap. 261. in mea editione) quae Arabice aliter in translatione Gal. Tarich adhueba vocari dicit: *αρομα* est calidum & siccum. prope tertium gradum, casia & cubebis viribus proximam, quod pro cinnamomo ponit Galenus & Paulus auctores sunt. Et Isaac filius Amram: Est (inquit) arbor magna, in montibus Lubnen: id est, in Oriente, nullo fructu, foliis longis, colore inter viridem & citrinum, similia foliis salicis: idem & ramorum color est, odor citri. Calefacit, siccatur, astringit, resoluit (status nimirum, potius quam apostemata, praesertim matricis, ut in cap. 72. ex Mesarugie quidam transtulit) & adstringit ventrem. Est in eo astrictio una cum subtilitate & caliditate. Eadem efficit quae nux moschata, sed est subtilior ea. Confert dolori capitis frigidus & humido cum oleo violaceo, si sternutatorium inde fiat. Stomacho & hepatis vi aromatica sua prodest. Hac Serapio. Vnde apparet facultates easdem fere utrique Zurumbeth suo eum attribuisse: & si forte errauit Matthioli duobus capitibus, in unum confusis, leuem & ferendum hunc errorem esse. Sed prolixior sum, quam par sit. Certe Arabes medici plerique, saepe res diuersas in unam confundunt, & ex una propter nominum varietatem multas faciunt: & scripta Gracorum inepte transferunt: quanquam in plurimis interpretes potius eorum, quam ipsi fuerint accusandi. Carnabadium, Zarnabo, Arnabo, aut res una & eadem sunt, aut substitui inuicem possunt. Zarnabum simul & Zeduaris in antidotum diamoschu Actuarii recipiuntur. Zadera in diamargaru. Carnabadium & zedoaria in antidotum aurea Alexandri: ubi Fuchsius Nicolaum Myrepsum Carnabadium nomine intelligere dicit cuminum Aethiopicum, idque constare ex antidoto eius 406. ubi ipse ita interpretatur. Ego in ea antidoto nihil tale inuenio, & numerum a librariis corruptum puto: nec magna apud me Myrepsi auctoritas est. Cuminum Aethiopicum certe carnabadium esse minime concesserim sed in locum eius forte succedere posse. De grano alzelin Bellanensis verba haec reperio: Granum alzelin vel aliczen, est granum quoddam Venetos appellatur Dolceghini: & nascitur etiam in Africa, & alio nomine Arabico dicuntur Hab alze. Eius sententia Leonem quoque (nescio quem) Africe descriptorem esse ais: Eruditius etiam & longe peregrinam vir Alexander Benedictus idem sentit. Tu contradicis. Mihi hoc tempore non licet diligentius rem perpendere. Video tamen Granum Zelim a Serapione describi cap. 327. & reprehendi illos qui id cum Croni vel pipero Nigrorum confundunt. Ego Dulcichinos granum alzelin esse sentiam: Croni vel piper nigrorum, id quod tu etiam sic appellas, sed cum grano alzelin contra Serapionis sententiam confundis donec verisimiliora cognouero. An non Dulcichinum tu quoque calidum & humidum esse fateris. & Venerem stimulare? atqui hoc de grano alzelin scribunt. Conuenit & color, albus interius, foris citrinus: & sapor bonus, videlicet dulcis, sed magnitudo ciceris, inquit, non conuenit: atqui misse a te Dulcichini radice parua sunt, & in Africa multo minores nasci testis est Alexander Benedictus, ubi & cicere forte maius habetur: si modo cicere recte transtulit interpretes. Quod si res eadem non sit, vires vero sint eadem, quid est quod digladiamur? Venio tandem ad Oloconitis & Moly. *Ολοκωνίτιδος τις γλυκέας ἴζη. ὅτι δὲ αἰς ὁ βολεδός σμικρὸν ἢ αἰς ἐλαίν.* Verba sunt Hippocratis libro primo De muliebribus morbis, ubi a Dioscoride *ὀλοκωνίτιδος* pro *ἐλοκωνίτιδος* scribitur. *ἡνὶ δὲ διοσκορίδης τὴν ἐπὶ ὄρει γενομένην ὀλοκωνίτιδα ὀνομάζειν δαί.* Galenus in Glossis. Ex quibus verbis miror putare te Guilandine coniecturam meam Oloconitin Hippocratis, Moly Dioscoridis esse, destrui posse, quasi non etiam Moly illud in montibus nasci possit, aut si in montibus non nascitur, quid tum postea? neque enim vel Galenus, vel aliquis bonus auctor hoc dixit: sed Dioscorides, veluti grammaticum agens, & etymologiam quaerens cur oloconitis diceretur, a montibus, sic dicit eam coniecit, Moly quidem Theophrasti siue idem, siue aliud est, apud Pheneum & Cyllenam Arcadiae montes nascitur. Quin potius Galeno credamus, cui *ὀλοκωνίτις* est *βοτάνη τις ἀγρία ἰαχυνώδης*: hoc est olus quoddam syluestre: (utpote & bulbosa & dulci radice) alera autem quam syluestria, non herbas montanas, aut in altis tantum montibus nascentes appellamus: sed qua circa vrbes & pagos, & in agris fere nascuntur. Dioscoridem dicat aliquis bonum esse autorem: esto, sed Anazarbeum, cuius de medica materia libros habemus: de illo autem Galenus hic non loquitur, quod tu non animaduertisti, sed de altero recentiore, qui proxima ante Gal. aetate (patris ipsius memoria) vixit: & multis libris Hippocratis dictionem exponere sonatus est: ut ex Gal. in glossas praefatione apparet. Hunc vero tanquam minime bonum autorem aliquoties reprehendit Gal. Sed vehementius instas: Gal. (inquit) *μάλιζαν* Hippocratem vocare ait, quae ceteris Moly dicatur, itaque, infers, Moly Dioscoridis & aliorum, Hippocratis Molyzam esse, non autem Oloconitin eius. Imposuit tibi forte Latinus interpretes aliquis: certe Galenus Graece hoc non dicit, his verbis: *μάλιζα, σικεῖδον ἀπλῶ τὴν κεφαλὴν ἔχον, καὶ μὴ δὲ γλυκομένην εἰς ἀγλίας πνέες δὲ μῶλυ* hoc est, Molyzam vocat Hippocrates allium capitis simplicis, non in spicas diuisum. Aliqui vero Moly interpretantur: insinuans priorē sententiam sibi magis probari, merito sane: nam Hippoc. lib. 1. De muliebribus morbis facunditatis experimentum hoc scribit: *μάλιζαν σικεῖδον ἀπλοῦς, πρὸς θεῖναι, καὶ ὄρεϊν εἰς δὲ τὸ σῶμα τὸ ὄρεϊται.* sic enim posteriora aliquot verba legi oportere, & res ipsa & Cornarii interpretatio indicat, quae huiusmodi est: Caput allii derasum appone pro pello, & an odor per ostra secat obserua. Porro in simpl. medic. hoc censu, & *μύλη* & *μῶλυ* a Galeno memorantur: Moly eius est, ruta syluestris Dioscoridis, quam & ipse Moly vocari dicit in Cappadocia. a similitudine, quam cum Moly seruat radice nigra, flore candido. Myle vero Galeni, proculdubio Dioscoridis Moly est, radice parua, bulbosa, vuluis utilis. An vero eas aperiat, an claudat: & melior ne Dioscoridis an Galeni sit, nunc inquirere tempestiuum mihi non est. Plin. Molon appellauit, caule striato, foliis mollibus paruis: radice quadrantalī, in qua per extremum allii caput extuberat. Eodem Syron, aut Scyron Plin. dicitur. Ego Oloconitin sic enim sine aspiratione scribere malo) Hippocratis, Dioscoridis Moly & Galeni Mylen eandem esse stirpem sententiam non dum muto. Myle quidem a rotunditate radice dici posse videtur, nam & *μυλοειδής* rotundum significat. Ceterum

Zurumbed est
Carnabadium.

Zurumbeth al-
terum Serapio.

Cuminum Aethio-
picum.

Granum Alze-
len.

Croni.

Oloconitis & O-
toconitis.

Dioscorid. alter.

Moly, estruta
syluestris.
Myle Galeni est
Moly Dioscor.

Oloconitis est
Moly.

Ceterum an alium caninum Tragi, Dioscoridis Moly sit, accuratius mihi inquirendum videtur: in presentia non concesserim. Moly vel Morion Plinio libro vigesimo primo capite trigesimo primo, halsaccabius est, o-
 pio etiam (inquit) velocior ad mortem. Iam quod Moly idem esse cum Aglaophotis de terrestri Elianus affir-
 mas, uno duntaxat argumento, quod Moly etiam ut Scholiastes Homeri: prodit, ἄλλομωι πικρὸς τῷ τῆς θά-
 νατον ἐπιτίθει, τὸ ἀπὸ πῶν, quod Elianus Aglaophotis attribuit: non satis ad faciendam fidem mihi vide-
 tur: & possem verisimiles aliquot rationes contra te producere: sed nihil quam λερμαχία aut σκιαμαχία qua-
 dam haec fuerint: quoniam res ipsa nobis ignota sunt, ex remotis ad Orientem terra marique, petenda: ab incolis
 scilicet Arabia, a quibus forsitan aliquis ad Trogloditas, aut Indos remitteretur: semper enim longius refugi-
 unt huiusmodi miracula, & tandem nusquam in natura reperiuntur. Hoc tantum dicam, non debuisse te asse-
 10 uerare tanquam luce meridiana clarius (sic enim loqueris) Moly Aglaophotis esse, sed ex coniectura dunta-
 xat hoc proponere, propter similem ab autoribus traditam radicis enulsionem, qua coniectura tamen, ut dixi
 infirma est, nam & Mandragora radicem cum olim sic solitam erui, Eustathius refert in μύλων mentione: Mandragore enā
 tum hodie istidem de eo quidam nugantur. Et Hyoscyamum & ἰπὸν (Papaner nigrum forte intelligit) simili-
 ter, non tamen canibus, sed aubus alligatis, Elianus alicubi tradit. De Bulbocastano, ut dixi, plantis tibi
 subscribo: sed qua de facultatibus eius scribis, non satis assequor. Numeras enim id inter ea, qua ob succi cras-
 sitiem vasa sanguinem continentia modice obstruere, & pedibus lenire, atq; abradere queant. Et subinde, Ca-
 20 staneas vero (inquis) tantum abest detergendi farciendiq; vi pollere, ut nihil detergentibus & farciendis, ma-
 gis esse possit contrarium: Et paulo post, Bulbocastanum, non aliam esse plantam quam ego assero, argumenta
 habeo, tum quia attenuandi natura pollet, & lentitiam in se habet, &c. At si crassi succi est Bulbocastanum, &
 30 obstruendi leniendiq; vi praeditum, & farciendi similiter ut alica, irium, similago (quibus cum a Tralliano
 numeratur) & reliquum genus emplasticorum: quomodo abradere, detergere & attenuare, vel ipsum, vel ul-
 lum aliud emplasticum dicemus? Trallianus non quibusvis purulentis, usum istorum commendat, neque ut
 pus & sordes pulmonis abstergantur: sed iis tantum, in quibus sanguis purus appareat, quem sisti & obturari me-
 ritus res postulat.

Aglaophotis

Mandragore enā
dicatio.

Bulbocasti facis
tates.

Hac habui in presentia, qua subito ad epistolam tuam mox ut accepi, respondere visum est: tu scriptio-
 num tumultuariam & inconditam aequi bonique facies. Ego enim hac omnia & tuo & amicorum iudicio submit-
 tere paratus sum: & te magis etiam in posterum, quam si nulla unquam inter nos controuersia oborta fuisset,
 amabo.

30 MATTHIOLVM de facie non noui, neque viri ingenium aut mores. Doctrina eius & diligen-
 tia, ex editis in Dioscoridem Italice Latineque Commentariis, non vulgaris apparet. Sicubi tamen errat, aut
 errauit, humanum hoc est, & nobis commune. Emendabit forte multa in posteriore editione, qua nunc expe-
 ctatur. αἰ ἀπὸ τῶν γὰρ φερνίδος σφώτρων. Quamobrem si quid in eius scribis est, quod reprehendus, modestius
 & simplicius ut facias rogo: neque tam hominem, quam eius errores uisuperes.

ἔλεγχ', ἐλέγχω, λοιδορεῖσθαι δὲ ὑπέρπει
 ἀνδρας φιλοσοφους, ὡς πρὸς ἀποπώλιδας

Vale optime mi Guilandine, & me ama. Tiguri. Martii die X. Anno Salutis M. D. LVII.

40 PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
 SENENSIS MEDICVS,
 Gabrieli Faloppio Mutinensi Medico præclarissimo
 S. P. D.

Agitur de Bulbocastano, Oloconitide, Mamira, Traso, Moly, Dronico, Grano Zelin,
 Zedoaria, Zurumbeto, Carpesio, Baara, & aliis nonnullis sim-
 plicibus medicamentis.

50 **N**ecidi nuper, nescio quo fortuito casu (praestantissime Faloppi) in tui Guilandini,
 & Conradi Gesneri binas literas, quibus illi non tam famulari aliqua se oblecta-
 rent salutari uincula, quam seria (ut postmodum uidi) disputatione inter se alter-
 carentur. Ac primo aspectu quum utriusq; nomen, nesciquam mihi incognitum,
 me nonnihil alliciebat ad lectionem, tum non mediocriter hoc animum meum ex-
 citauit, quod titulus utriusq; epistola iam statim promitteret eorum concertatio-
 nem non alienam fore a medica nostra materia, cui rei (ut nosti) semper animum
 addidissimum propensissimumq; habui, ac totam uersari in quorundam stirpium
 60 ndagatione & facultate, nempe Bulbocastanei, Moly, Mamira, Oloconitidis,
 Doronici, Trasi, aliarumq; nonnullarum, quarum cognitio non omnibus, imo for-
 tasse perquam paucis rei herbariae studiosis haecenus innotuit. Fecerat id tam Ges-

Gesneri laus.



nerus, non infima eruditionis uir, & qui non inter postremos Medicae facultatis professores numerari ue-
 lit, ut nihil leue, nihil humile ab eius officina expectandum putarem: Verum quantum hac in parte meae
 postmodum satisfecerit opinioni, liquido cognosces ex his, qua mox in medium allaturi sumus: Guilandinum
 70 uero tuum (mi doctissime Faloppi) eo usque somniantem pertuli, dum adeo profundo inmergitur sopore, uel
 potius extra se ipsum, nescio, in quas remotissimas terras (credo ad Cimmericas caeligenas, quamuis sibi aliud il-
 le persuadeat) una nocte somno abripitur, ut sui Gesneri, & omnium penitus oblitus, me ipsum quoque pro-
 cacissime pungat, & importunius calcibus impetat. Et licet antea quoque sic de omnibus disceptaret, ut et-
 iam

Guilandinus res
diliguitur.

Facere.

Faloppilanus.

Guilandini nequitia.

De Balanocastano & Bulbocastano.

Goupylo & Andernaco de fenestris.

nam ipso tacente, facile deprehenderetur eius somnium, eatenus tamen nolui dormientem perturbare, quia non id somnium non manifestam, & contumeliosam mihi inferret acerbiter. Etenim, quem admodum bo-
 nimo, remule atos, & furiosos toleramus ut insaniant, dummodo neminem laedant. Si vero hoc eo, ut spectet
 furor, nec manus a reliquis abstineant, tum eorum propulsamus iniurias: Eodem quoque modo Guilandini
 somniantem feremus, si aliud peccet nihil, nisi hoc solum, quod noctes atque integros dies vigilans etiam
 stertat. Sin autem eo eius erumpant somnia, ut intolerabilis in innocentes eius sit petulantia, quis non huius-
 modi somniatorem excitet? Quis non Borussiacum hunc glirem exstratis deiciat? Nam profecto nihil a-
 ptius, & verius in huiusmodi sua disceptatione dici potuit, quam hac talia deliramenta afferat Guilandini-
 nis, quum ut se ipsum non haec tam argute disputasse, & perpendisse, quam vane. & futiliter scripsisse fateatur.
 De me vero quam abrupte, & petulantiter somniarit, ut optime iudicabunt, qui hasce eius legerint ineptias,
 quas postmodum toti orbi non erubuit divulgare. Quid, obsecro, commisi? Quodnam flagitium perpetravi?
 Quid contra me habet Guilandinus? cur tam aspere & repente in me inuehatur? Certat cum suo Gesnero, ni-
 hil in me reprehendi, nulla usquam mei ante facta est mentio, nihil attingit quod ad me pertineat, & ecce, ne-
 scio quo maligno ac virulento morfu ex improviso, relicto Gesnero, rabias canis instar, dentes mihi iniicit. Si
 quem vel leuissimum meum recitaret errorem, non modo a doctissimo quouis homine, sed vel ab ipso Guilan-
 dino, cui nemo somnians fortasse par est, libenter & aequissimo animo corrigi, & emendari me paterer. Per-
 ro cum tam ista suas disseminet nugas, infartas contumelias & maledicentia, easque in ceteros cerebrose conge-
 rat, fatius iudicamus patefaciendam ipsius imperisiam, quam nostratolerantiam tantam impudentiam, &
 audacem inscitiam, & in praclarissimam artem Medicam, contumeliam sustinendam. Verumtamen sicrem
 mihi esse cum Guilandino meminero, ut nullas inimicitias, a quibus maxime semper abhorruerim, sentiam mihi
 cum ipso suscipiendas. Dissimilimum me plane illi praebebo, ut non persequi furiose videar personam, quod i-
 psum fecisse satis liquido constat, quin ut potius eius errata remoneam, ne ille Medicina candidatos somni-
 ando remoretur. Hanc fructum sicut ipse perpetuo in meis studiis sum venatus, ut ex meis qualibuscunque la-
 boribus vberissima semper utilitas in studiosos redundet: Sic Guilandinum in me ita delirare non patiar, ut &
 suis intricatissimis, & involutis somniis studiosa imponat inuentuti. Atque quo sincerius sine omnibus con-
 titiis, ab que omni similitate agere paulisper cum Guilandino decreui (mi praclarissime Faloppi) eo libentius
 huius nostri sine colloqui, sine certaminis testem, iudicem, ac arbitrum te constitui, in quo summa doctrina
 cum singulari certat humanitate. Cuius rei, tuorum nimirum ornamentorum, non solum domestici, qui qu-
 tidiana tua fruuntur consuetudine, verum & exteri, in quos latissime hac diffunduntur, clarissimum danti-
 stimoniam. Quorum nonnulla a te ex Patavina Vniuersitate Pragam venientes, cum amicitia causa, quam
 inter nos intercedere norunt, tua misererent, vehementer apud me obstupuerunt, cum tali viro in eadem domo,
 plena ac referta omni eruditione flore, suauitate, lepore, ac summa integritate, hunc barbarum, impium, ac pe-
 ne immanem Borussium conuicere posse. Et quantum te doctrina, & omni virtutis decore praecellere, tantum
 hunc ab his laudibus non alienum solum, sed & animum iisdem habere infestissimum predicabant. At quid
 mirum, si inter amantissimos flores venenosi aliquando delutescant angues? Quid si inter lenissimas segetes simul
 adolescant tribuli, & Xantia, & id genus inuicilium herbarum? Latet serpens inter flores, suo tempore caput fal-
 ce concidendum prodeit. Quae ista familia tam bene instituta, in qua nulla se exerceat improbitas? Satis ma-
 gnam tu in hoc laudem & gloriam adipisceris (miseruditissime Faloppi) quod non tantum domus tuae habe-
 at quem sequatur, sed & tota fiorientissima Patavina Academia in te iam dudum recumbat, te intueatur, ad-
 miretur, & flagrantissimo studio imueatur. Quo maior erit nequitia Guilandini, si eo domestico non monea-
 tur exemplo quo summam voluptate gaudent & fruuntur exteri. Ac ob eam quoque causam hac ino iu-
 dicio dedicata volui, ut pro tua modestia homine domi tuae admonerem, & tua humanitate reuocem ab hac ma-
 ledicendi licentia. Quod si tuis non acquieverit consiliis, & saluberrimis admonitionibus, an non toti mundo
 suam barbariam, imperitiam, inhumanitatemque ipsemet optime declarabit? Ad me quantum attinet, si ni-
 hilominus, quem admodum cepit, conuicari, ac maledicere perrexerit, feram (ut potero) eius proteruitate:
 At ipsius nequitiam & peruersam omnium verum ignorantiam, facile detegam apud honestos & eruditos vi-
 ros. Si enim Gesnerus, qui interdum etiam me reprehendit, ferre non potuit tam effrenam petulantiam, quam
 in me ex improviso enomuit Guilandinus, quin eam sua epistola reprimeret, adeo ut ipsum comparauerit ma-
 luerculus panes in foro vendentibus: Ego illam in me, & in totam rei Medica disciplinam impune grassari, &
 insanire permissam? Continebo felicem illum somniato: em inter arctos fines, ne ad Americam illam euage-
 tur, & somnians lasciuat. Quinetiam ne tibi fortasse diuina Hippocrate perurbet dum tanti viri Manes com-
 pellere nititur, ut in sua opinionis robur falsa pro veris afferant in medium. Sed praetermisso omni ioco, re ipsam
 quaeso, diligenter agitemus, quam hac nobis eructant somnia. Audi obsecro (mi Faloppi) ut inate reficias for-
 tuna, qua Endymione non sub dio, sed sub tuis laquearibus domi stertentem: alas. Vide ne frustra te tandem Pata-
 uis queramus, & ne ita violenta, ita monstrifica, ita venefica sint ista somnia, ut pariter domum una nocte so-
 mnians ad Occidentales Indias in Americam transportent. At quid rem ipsam diutius differimus, qua doctis-
 simul & candidis, requirit censuram, & quam serio & fidelis. Padua domi tua somnians in America repe-
 risse latatur Guilandinus? Neminem certe praeter te habui (candidis, Faloppi) inter quam plurimos amicos
 facultatis nostrae, nec mihi magis idoneus, magisque paratus sese obruli, cui libere mea hac in re sententia, mea
 iudicium (sit tamen citra omnem iniuriam cum ceterorum venia dictum) recte sancteq, proferrere. Clamat Guil-
 60
 & improbat suam Alexandri Trall. lectionem ab Andernaco, ac etiam Goupylo, viris in utraque lingua doctis-
 simis, quod particulam, qua in veteri exemplari, a quo nona & vltima product editio, de praeuie legebatur
 Βολβουκαστάνων, ipsi Βαλανοκαστάνων vel verterint, vel restituerint. Sed mea sane sententia, inscite ac turpiter halle-
 cinatur, & parum, ne dicam omnino nihil, in re Medica se versatum ostendit. Quinetiam nec amicos se legisse de-
 monstrat, a quibus Alexander hoc esse edoctus medicamentum, nec eos fortasse, qui idem ab Alex. acceperunt. Si-
 quidem omnes in vniuersam glandes, qua Graeci Βάλανοι dicuntur (ut Diosc. & Gal. attestatur) adstrictoria
 vi, qua possent, sanguine reuicentibus maxime perire conserunt. At cum Castane omnium consensu in glandium
 genere habeantur, & isdem sine praedita facultate, quoniam fuerit iam velors, aut amens, ut non iudicet Gan-
 61
 pium ut Andernacum recte legisse Βαλανοκαστάνων, non (ut Guiland.) Βολβουκαστάνων? Nam horum opinionem
 recte

- me nasci nunquam sibi satius duxerit, vel in cunis emori, quum certo sciuerit ab Hippocratis Manibus, quos excutauerat, admonitus, me sua temeritate futurum esse dormitorem. Atqui ego hunc vinum sua insolentia, inscitia, ac vecordia spectatorem perpetuo aduersari velim. Quanta praeterea sit huiusce Borussi imperitia, arrogancia, & temeritas in censendis, Oloconitide, Mamira, ac Traso, quinetiam in suscitandis Hippocratis Manibus, quod illa omnia unam tantum designare plantam, vel radicem censeat, eos vero falsa attestari velut, ut suam inanem euebat opinionem, ex sequentibus facile palam fiet. Hippocrates grauiissimus autor libro primo de mulierum morbis, ubi ad Secundas pellendas medicamenta describit, Oloconitidis meminit his verbis: Oloconitidis dulcem radicem. Est autem velut Bulbus, & parua velut Oliua, hanc in vino terito, duas dato, si vero maior, una sufficit. Hac ille. Quibus facile arrogans Guilandini conuincitur assertio, & Hippocratis Oloconitidem non esse Trasum, quod Veneti Dulceghinum vocant, neque Mamirans, non magno sane negotio palam fiet. Verum tamen sunt in primis ponderanda Hippocratis verba, quod a grauiissimo sint prolata auctore. Etenim cum afferat ad Secundas pellendas Oloconitidis dulcis radicem, videtur quidem hisce verbis asserere, quod alia sit Oloconitis quae dulcis non sit, sed amara fortassis, vel alterius saporis, alia non fuisset illi opus addere, dulcis, nisi differentia causa, & praecipue cum dulcem appellauerit plantam, non radicem, id quod maxime impedit Oloconitidem, Trasum siue Dulceghinum esse non posse: Trasi enim planta dulcis non est, sed tantum radix, quae nullo vsquam alio (quod sciuerim viderimque) sapore habeatur quam dulci. Praeterea Trasorum radices substantia bulbose non sunt, nec bulborum modo ullis velaminibus circumtectae, sed cortice quodam tenui, aspero, & adstringente, qui pertinaciter admodum inhaeret, adeo ut nucleos potius referat, quam bulbos. Adde quod nusquam vlla Trasorum visa sit radix, quae Oliua magnitudinem aquaret, sed omnia longe minores habentur. Adhac cum iubeat Hippocrates ad pellendas Secundas unam tantum dari Oloconitidis radicem, vel duas ad summum, si parua fuerit una, maxime quidem hoc ipso indicare videtur radicem hanc vehemens esse medicamentum, quo sane indigemus ad secundas trahendas. Hoc etiam proculdubio confirmat Oloconitidem non esse Trasum, quia primum caliditatis ordinem fortasse non excedit, nec vlla prouocandi vi pollet, ac adeo clemens habetur, ut edatur a Veronensibus, in quorum agro frequentissima nascitur, praesertimque a pregnantibus mulieribus, quae talia fere semper appetunt ad saturationem vsque, nullo penitus incommodo. Postremo quum Galenus eo libello, quo obsoletas Hippocratis voces explanat, dicat Oloconitidem agrestem, & oleraceam esse herbam, facile quis nosse poterit Trasorum plantam, in qua nihil penitus oleracei percipitur, non esse Oloconitidem. Ceterum nec potest Trasum esse Mamira, quia Mamira Auicennae testimonio medicamentum acrius est, quam Vena tinctorum, quae illi Chelidonium designant, & calidum, & siccum in fine secundi ordinis. Praeterea Mamira Auicenna abstergit, mundat, prouocat, attrahit, praesertim a capite pituitam, si mandatur, vel naribus sursum trahatur. Quinetiam praestat ad Ictericam, & diuersos intestinorum, quae omnia proculdubio in Traso desiderantur. Nec potest Trasum dici Mamira, quae quodradiculas geniculatas habeat. Nam id asserere ex hac tantum nota maxime fuerit absurdum, cum innumera habeantur planta, quae geniculatas edant radices. Porro nec Oloconitidem Mamiram esse putamus, quando hac Auicenna testimonio acutior est Chelidonio, illa vero Hippocratis auctoritate dulcis. Verum si quis Mamira notas ac facultates diligenter explorauerit, facile conicere poterit parum, vel fortasse nihil, ab Anemone distare. Etenim Dioscoridi Anemone radix est Olea magnitudine, quae veluti geniculis quibusdam cingitur, vis illi acris, & ea de causa succus naribus infusus, purgat caput, Commanducata radix pituitam trahit, decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus, cicatrices eorundem, & hebetudines emendat, sordida ulcera abstergit, lac prouocat copiosum, menstrua scit vellere imposita, & lepras extertit. Quae omnia adeo cum Auicennae Mamira conueniunt, ut nihil impediatur, quin Mamira & Anemone nihil inter se differant. Conferamus, obsecro, mi Faloppi, Auicennam cum Dioscoride, ut clarius lucidiusque nostra comprobetur opinio. Mamira (inquit Auicenna) nodosum est, acutius Chelidonio, absterfuum, mundificatum, & prouocatum. Quibus optime recteque correspondent, quae scribuntur a Dioscoride, cum inquit: Anemone radix veluti geniculis quibusdam cingitur, vis illi acris, sordida ulcera abstergit, lepras eximit, lac copiosum prouocat. Item Auicenna Mamira succus extrahit humiditatem grossam ex capite, & mundificat superfluitates cerebri: Id quod etiam Dioscorides de Anemone scribit cum ait: Succus naribus infusus purgat caput. Praeterea Auicenna testimonio Mamira confert dolori dentium, sed & idem videtur de Anemone annuere Dioscorides quum inquit: Commanducata radix pituitam trahit, nam fere omnia, quae mansa pituitam trahunt, dentium dolores mulcent, ut exempli gratia Pyrethrum, de quo scribens Dioscorides, Pyrethrum, inquit, pituitam elicit, ideo in dolore dentium auxiliatur. Atqui id clarius confirmat Plinius libro 21. cap. 23. ubi apertissime Anemones radicem dentes sanare scribit, si commanducetur. Id quod etiam confirmat Matcellus antiquissimus Medicus cap. 2. ubi de dentium medicamentis agit. Deinde ait Auicenna, mundificat albuginem & acuit visum. Cui maxime astipulatur Dioscorides, quod scripserit mederi Anemones radicem oculorum inflammationibus, & cicatrices eorundem & hebetudines emendare. Adhac, inquit Auicenna conferre Ictericis, quod in Dioscoridi Anemone non reperitur. Sed cum a Galeno scriptum sit libro sexto de simplicium medicamentorum facultatibus, Anemonem omne genus vasorum orificia referare, nihil prohibet, quinetiam Anemone Ictericam curare valeat, & menses remotos pellerere, ut Dioscorides inquit. His itaque sic collatis, prorsus adducor, ut credam nihil aliud esse Auicenna Mamiram, quam Anemonem Dioscoridis. Nam praeter hac (quod viderim legimque) nulla extat planta, quae magis suis facultatibus cum Chelidonio conueniat, quam Anemone. Quod cum animaduertisset Dioscorides, non longe a Chelidonio descripsit Anemonem. Nec nostra opinioni obstare videtur, quod Paulus & Anemonis, & Mamira meminerit. Siquidem is (sit tamen tanti auctoris uenia dictum) separatum in simplicium historia & cognitione fuisse versatum ostendit, quando e i, quae breuissime admodum de simplicibus medicamentis habet, ex se ipso haudquaquam depromit, sed modo ex Dioscoride, modo ex Galeno transcribit quemadmodum, & alia omnia quae in suo volumine congegit. Quo fit ut mirari desinam, quod quandoque aberrauerit Paulus in earum stirpium nomenclaturis, quae ab aliis, nouis quibusdam describuntur nominibus. Id quod iam diu nouisse nostra tempestatis eruditissimos quosque Medicos non ambigo. Eodem etiam pede claudicasse Auicennam animaduerto, quippe qui nomenclationum varietate delusus (quibus pro suo arbitrio varii utantur autores) bis Anemona meminit. Nempe

Oloconitidis
examinatio.

Hippocratis verba
ponderanda.

Rationes contra
Guilandini sententiam.
Trasorum exami-
natio.

Trasi tempera-
tia.

Trasum ubi plus
simum.

Mamirae exami-
natio.

Mamirae facultas.

Mamira non esse
Oloconitidem.
Mamiram ab Anemone
nihil distare.

Omnia quae per
os pituitam desponunt
dolori dentium conferunt.

Paulus notatur.

Auicenna notatur.

- primum, cap. 486. sub Mimiris titulo, & deinde capite 664. sub nomine Sakak, quod pro certo crediderit ob appellationum varietatem Sakak & Mimiram diuersas esse stirpes, quemadmodum in aliis nonnullis eundem simili lapsu cecidit obseruauimus. Atq; id plerunq; us accidere solet, quies ab aliis transcribunt, quorum nulla, vel admodum tenuis est experientia. Hac itaq; si tuus perpendisset Guilandinus, non adhuc suam in re herbaria deprehendisset ignorantiam? Tam ne temere ceteris, qui plurimum temporis & laboris huic facultati impenderunt, insultasset? Mirum mihi Faloppi doctissime, uideri crebro solet, quosdam homines sui penitus adeo immemores, ut nescio qua facultate, quibus digitis aut unguibus, cælum, terram, & omnia metiri cōtendant. Quidum vano quodam tinnitu, & mera iactantia reliquorum nituntur explodere labores, ut nobis facilius suas cōmendent nautas, aliud nihil asequuntur, quam ut inaniter tinniendo omnibus suam retegant, qualatebat, inscitiam. An non hunc fructum sua temeritatis, & arrogantia nactus est Guilandinus? Audi, obsecro, mi Faloppi tu, qui plurimos ingenio, doctrina, & auctoritate praeceles quam etiam Guilandinus in hoc seipsum vincat. Nam quo magis Guilandini epistolam perlego, eo plus eius ridendam imperitiam detego. Ipse enim dum contra Bellunensem Granum Zelim apud Serapionem non esse Trasum, sine Dulceghinum perperā contendit. Ethiopicum piper (ut etiam Gesnerus annotauit) cum Grano Zelim turpiter confundit, de quibus uno & eodem capite scribit Serapio his uerbis: Habzelin granum est pingue, Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album interius, & habet bonum saporem, & defertur ex terra Barbaria, & nominatur Piper Nigrorum. Verum Piper Nigrorum secundum veritatem est aliud, & in Barbaria nominatur Croni, & est simile Faseolis in forma sua, nisi quia grana eius, & cortex sunt minora Faseolis, & habet colorem nigrum, & confert doloribus dentium. Haftenus Serapio. At Guilandinus magnus Serapionis interpres ea omnia quae de Ethiopico pipere Serapioni describuntur, ad Granum Zelin refert, & Bellunensem (quātum mea fert opinio) perperam impugnat. Etenim hallucinatus non uidet, quam aperte Serapio Ethiopicum piper tum notis, tum facultatibus a Grano Zelin distinguat. Denique cum scribas Serapio, Habzelin granum esse pingue, magnitudine ciceris, citrinū exterius, & album interius, boni saporis, quomodo quis imaginari poterit ipsum dixisse, quod sit simile Faseolis, & quod habeat colorem nigrum & saporem acutum, sicut piper. Si (ut Guilandinus falso interpretatur) de Grano illo Zelin intelligeret Serapio. Nonne hisce uerbis luce clarius palam est hic Serapionem piperis Ethiopici historiam describere. At cum Guilandinus ad scribendum potius uideatur adductus calumniandi causa, quam sustinende indagandaeq; ueritatis, magna sane cum ignominia auctorum sententias ad suas inuertit chimeras. Quod si forte se negabit fateri cogetur suam in Serapione inscitiam. Verum cum utrunq; illi magno de decoro scribi possit, sua uel ignorantia, uel temeritate pœnas meri o d. bit. Porro is Bellunensem deridendum temere clamat, quod scribat Habzelin nil aliud esse Mauritanis quam id quod Veneti Dulcichinum uocant. Sed mea quidem sententia non solum is longe magis deridendus fuerit sed etiam acriter accusandus. Quippe qui Bellunensem & perperam, & citra omnem rationem deridendum censeat, & qui uel sua imperitia Serapionem non intellexerit, uel forte male uicia corruperit. Bellunenensis enim cum diu in Africa fuerit uersatus, adeo ut Arabica lingua peritissimus euaserit, & ibi Trasum, uel Dulceghinum uiderit, & nomen eius Arabicum recte obseruauerit, quis praeter Guilandinum adeo fuerit uetors ad temerariū, ut dicat hac in re ridendum esse Bellunensem? Quis eius opinioni, & genuina interpretationi merito non subscripserit? Profecto nemo. Praefertim quum scribat Auicenna Granum Zelin calidum esse, & humidum, quinetiam impinguare, & semen augere. Quas quidem facultates Dulceghino omnes proculdubio adhibent. Huc cum etiam subscribat Guilandinus, quid pluribus opus est eius confutare petulantiam? Adhuc compr. batur
- 40 Bellunenensis sententia Serapionis auctoritate, qui Habzelin granum asserit esse pingue, id est carnosum, boni saporis, id est, dulce, citrino cortice, & alba intus medulla. Id quod in Dulceghino luce clarius cernimus. Nec obstat quod Dulceghini, qui in Veronensi agro proueniunt ciceribus sint maiores, quando qui Africam perlustrarunt, eosdem longe minores ibidem nasci fateantur. Quae omnia etiam confirmant, quae praeter hac a uobis contra Guiland. sententiam scribit Gesnerus, qui illum inconstantia astute notat, quod alias ad se Dulceghinum pro Mimirā miserit, quod tamen negabit esse Oloconitidem, & ea propter Oloconitidis etiā semen Guilandinum misisse scribit, ex quo forte admirandum aliquod monstrum prodiit in lucem. Quod autem Doronicum cuius passim in Myropolis est usus, Mimiras non sit, tamen si contrarium sentiat Fuchsius in Nicolai Myrephi annotationibus, ego quidem non ambigo, dissentio tamen a Guilandino, quod Doronicum nostrum uel id, quod in Orientalibus prouenit regionibus, quam aliud, quod in Europa nascitur, non existimem esse legitimum. Nam quanquam hoc probare nititur Guilandinus Ruellii, Leonicieni, Fracastorii, Manardi, Cardani, Mundella, Brasuoli, & nostra etiam auctoritate: nil tamen asserit, quod iure aliquo admitti possit. Quippe quantum ad me attinet, nescio quo pacto Borussus ille audeat me autore affirmare Doronicum uulgari usus, legitimum esse Doronicum, de quo scripsere Mauriani, quum id ego nunquam affirmauerim, neq; negauerim. Atque si meam de Doronico debeam in medium afferre sententiam, dicam ingenue legitimo nos carere. Cum enim Auicenna Doronicum excafcuat, & sicces ordine tertio suae, ui ualenter status dissoluat, non uideo cur Doronicum nostrum, legitimum appellari possit, ac debeat, quum nulla in eo reperiatur qualitas, quam non obscura dulcedo, cuius nullus est inter Arabas qui meminerit. Ceterum inanis, & frivola est Guilandini ratio, quod uelit nullam aliam ob causam Doronicum, quod in Europa nascitur, linguam minime uellicare, ut Orientale, quam regionum, uel soli discrimine. Etenim tamen si (ut ipse asserit, & nos quoque alias scripsimus) non desint plantae, ac radices, quae in quibusdam regionibus nascuntur acres, in quibusdam uero insipidae (ut constat exempli gratia de Acoro, & minori Chelidonio) non tamen est hic admittendum frivolum Guilandini argumentum, eo quod etiam Doronicum Orientale, quod pro legitimo asseritur, omni penitus acredine destitatur. Quod si degustasset Guilandinus, ut decebat tam admirabilem stirpium indagatorem, facile quidem errorem hunc euitare potuisset. Ceterum quomodo fieri possit, ut Doronicum & Mimirā, unū & idem possint esse medicamentum (ut Fuchsius existimat) nulla prorsus est ratio, tum quod Auicenna de utroque diuersis scripsit capitibus, tum quod medicamenta sint diuersis praedicta facultatibus tum quod a nobis superius luce clarius comprobatum sit, nil aliud esse Mimirā quam Anemone. Nec obstat quod utrunq; sit acre, & calidum (de legitimo Doronico loquor) Quippe innumera sunt medicamenta, quae acredine polent, & in qualitatibus conueniunt, nec tamē sunt eadem. Nec pariter obstat quod Doronicū & Mimirā pa-

Animaduertit
in Guilandinus

De grano zelim.

Habzelin quid.

Piper nigrorum.

Guilandinū ca-
lumniam causa
tantum scribereBellunenensis de-
fenditur.Granum Zelin
id est legitimum esse
legitimum.Guilandinus a
Gesnero nota-
tus.Probatum Doron-
icum, non esse
Mimirā.
Doronicum nos-
trum uel aduicetum
num.Doronici legiti-
mi facultas.Doroniciū a Mimirā
differt.

rum forma viacentur differre. Etenim plura sunt (ut alias diximus) qua, cum tamen sint diuersa, adeo sibi
 facie correspondent, ut quandoq; peritos etiam medicamentorum exploratores fallant. Ceterum an Græcus Car-
 nabadium idem designet, quod Mauritanis Doronicum non adeo compertum habeo, ut mihi non relinquatur
 dubitandi locus. Siquidem Nicolaus Myrepsicus antidoto 429. quod ex Hermodactylo, id est, de Behen, ap-
 pertinet habet Cuminis Ethiopici, hoc est, Carnabadii. Actuarius vero in quodam antidoto ad cordis vibratio-
 nem sensum stuporem, inuoluntarios fletus, tremores, & terriculamenta (si tamen recte interpretatur Ruell-
 ius) habet Carnabadii, id est, Doronici, sed mihi non constat, quum Actuarius Græcus codex non sit ad manus,
 quod hactenus a nemine (quod sciam) sit excusis, an illud id est Doronici, Actuarii sit, vel interpretis. At Si-
 meon Sethi de Carnabadio Græce scribens, quid sit non explicat, quanquam ex facultatibus, quas illi reddi-
 dit, facile conicitur, nil aliud illi esse Carnabadium, quam Cari semen. Quo fit, ut non parum sit ambigendum,
 quis horum recte Carnabadium fuerit interpretatus. Antidota autem tam Nicolao quam Actuario descri-
 pta, utraq; ad Cardiacam, cordis palpitationem, & melancholicos affectus præstant. Quamobrem Actuarius
 sententiam probarem, si scirem illa Ruellii non esse verba. Nam Doronicum Mauritanorum omnium consen-
 su, præsertimq; Serapionis & Auicenna, ad cordis vibrationem mirifice confert, & cor ipsum admodum robo-
 rat. qua tamen vires in Cuminio illo Ethiopico & Caro, autorum omnium consensu desiderantur. Verum si
 quispiam argueret, quod in hoc antidoto Cuminum vel Carum addatur, quod utrunque status propellat, qui-
 bus plerumq; hypochondriaca gignitur affectio, a quo cordis palpitatio, & iracundiarum exciatur morbi, illi sa-
 ne facile responderi poterit, non modo præstare Doronicum, quod legitimum sit, ad cordis affectus, & hilarita-
 tem conciliandam, tum Serapionis, tum Auicenna testimonio, sed ad ventris, & uteri dolores, à crassiori fla-
 tu excitatos. Nec tamen ob id velim me hac omnino affirmare censeas. Cum enim nihil solidi, certiq; mihi sese
 offerat, quo vere asserere possem Carnabadium esse Doronicum, haudquaquam id ausim decernere, eaq; præ-
 sertim quod hisce diebus nuper elapsis Gulielmus Quacelbenus Flandrus eruditissimus Medicus, & rei plan-
 taria studiosissimus Constantinopoli, una cum plerisque aliis peregrinis ac raris simpl. medicamentis ad me mi-
 serit Ethiopicum Cuminum, cui Carnabadium inscriptum erat, ea fortasse ratione (ut puto) quod ibi a Græ-
 cis ita Cuminum illud vocari audierit. Nec placet eorum opinio, qui Doronicum Orientale Pauli Arnabo-
 nem esse existimant, quod nusquam apud Arabas legerim, viderimque Doronicum addi in unguentis odoris
 gratia, nec quod eorum aliquis Cassia, & Carpesio illud viribus simile fecerit. Ceterum si Pauli Arnabonem,
 & Auicenna Zarnabum recte expendamus, nil aliud clarius veriusq; representabunt quam postremum Se-
 rapionis Zurumbetum. Quamobrem manifeste hallucinatur Gesnerus in sua epistola ad Guilandinum, dum
 falso in Zurumbeto me accusat. Quippe qui existimat posteriùs Serapionis Zurumbetum esse Carpesium, cum
 tam apud ipsum quam apud ceteros Arabas nil aliud sit Carpesium, quam Cubeba. Nam ubi Paulus Arna-
 bonem suum Carpesio facultate similem facit, Serapio Zurumbetum Cubebis comparat. Præterea quum Ga-
 leno libro primo de Antidotis Carpesium herba sit, non arbor magna, ut de Zurumbeto scribit Serapio, cadit
 peritq; Gesneri sententia, qui perperam in me inuehitur, ac præter omnem rationem scribit, quod duo capita de
 Zurumbeto Serapionis simul confuderim. At qui potius mihi videtur confusus Gesnerus, cum certo putet po-
 steriùs Serapionis Zurumbetum, quod nos iam dudum scripsimus esse Pauli Arnabonem, esse Carpesium. Non
 equidem alia de causa dixisse illum me hac duo capita confudisse crediderim, quam quod primum Zurumbetum,
 Serapionis Zedoariam fecerim. Ceterum cum legatur in principio huius capituli Zurumbet, id est, Ze-
 doaria sunt radices rotunda similes Aristolochia, & idem de Zedoaria asserat Auicenna, non ab re mihi fa-
 ctum constat, si primum hoc Zurumbetum Zedoariam fecerim. Præterea cum Serapionis Zurumbetum primo
 loco descriptum conferat morsus venenosorum animalium, ut Auicenna Zedoaria, non video sane quid obstat,
 quin hoc Zurumbetum Zedoariam designet. Quo fit, ut iniuria me accusauerit Gesnerus. Etenim hec ego
 haudquaquam confudi, sed per se ipsa confusa spectantur. Quippe Serapio primum sui Zurumbeti caput una
 cum Zedoaria confundit, vel quod similia fuerint inter se medicamenta, vel facultate paria, ut testatur aper-
 tissime Auicenna, ubi de Zurumbeto egit. Verum enim vero, ut res tandem ad calcem redigatur, primum Se-
 rapionis Zurumbeti caput confusum pronunciamus, quod in principio de Zedoaria, in processu vero ad calcem
 usque de Zurumbeto tantum agat: Secundum vero non aliud esse medicamentum dicimus, quam Pauli Arna-
 bonem, & Auicenna Zarnabum. Verum, ut nihil intactum relinquamus, dicendum est mihi aliquid et-
 iam de Moly, in quo cæsendo postquam pluribus probare contendit Guilandinus contra Gesneri sententiam,
 Dioscoridis Moly non esse Olocon: idem, reliquum est (inquit) ut pariratione Moly Dioscoridis excutiam,
 perpendamque vera an falsa sint, qua a Deo illo Herbariorum Matthiolo traduntur, Moly ignotam Italia
 esse plantam dicenti. Quibus sane verbis suam in nos inuidenti in aperitissime declarat. Nam quanquam prius
 quasi iureiurando dixerit, non is sum, qui cauillis & imposturis inanem gloriosam aucupari velim, metiri ne-
 scio, nec si scire velim: hic tamē sui ipsius oblitus sibi sane plurimum, non mihi imponit. Sed utinam Guil. hic sui
 sit memor, ut in a hic cauillis & imposturis inanem gloriam aucupari nolit, ut in a hic metiri nesciat. Itane me di-
 xisse, vel unquam cogitasse affirmat? Nequa (me hercule) scripsi ego Moly esse plantam Italia ignotam. Scripsi qui-
 dem me hactenus in Italia reperire non potuisse Moly quod Diosc. delineationi responderet, nec scuisse ab aliis mihi
 fuisse repertum, aut aliunde eo aduectum. Quæ verba quantum distent a Guil. calumnia, unusquisq; sana men-
 tis facillime dignoscere poterit. Sed is recte cauillis se ipsum fallit, cum tam stulide hallucinetur, ut credat can-
 nam Allium a Hieronymo Trago, secundo loco appertum esse Moly. Etenim Diosc. planta est Moly, quæ folia
 habet gramineis latiora, humi sparsa florē alba viola similem sed minorē, magnitudine viola purpurea ama-
 lum, lactei coloris, & caulē candidū quaternorū cubitorum. At allium alterum, à Trago can: nū appellatum,
 folia gerit gramineis angustiora, sursum spectantia flore Lilio conuallium amulo, viola purpurea longe minorē,
 caulē viridem nunquam superhama, aut ad summum cubito, longiorem. Quæ quidē nota, si recte expendan-
 tur, facile palam fiet, quam magna sit Guiland. vanitas, quam insolens inscutia. Sed quo autore ista proferuntur
 in medium? Vnde ista erupunt? Ex Gal fortasse dicit, & ex eo libello, quo obsoleta Hippocr. clariora facit. O
 fœlicem interpretem, o admirandum rei plantaria indagatorem, qui μῶλυ ζαυ apud Hippocratem, μῶλυ inter-
 pretatur. Subinde vero, ut suam inanem cōprobet opinionem, falso asserit Gal. eo in loco μῶλυ interpretari Allium,
 quum aperitissime scribat non μῶλυ sed μῶλυ ζαυ Hippocrati vocari Allium capitis simplicis, non in spicis diuisum.
 Quo

Medicamento-
 rum inditudo
 nos fallit.

Carnabadii exa-
 minatio.

Orientale Doro-
 nicum non esse
 Pauli Arnabonē.

Zarnabum.

Zurumbetum.

Argumenta con-
 tra Gesneri opi-
 nionem.
 Carpesium.

Serapionis error.

De Moly.

Guilad. inuidē-
 tia declaratur.

Guiland. calum-
 nia.

Moly descriptū.

Guiland. μῶλυ
 ζαυ perperam in-
 terpretatur.

Quo forte etitur Hippocrates, quod aptius altero sit ad supponendum, & vultu iniiciendum. Hinc magne palam sit Guilandini malitia, qui, ut probet Caninum dicitur se magis, ita Galeni verba in suam pervertit sententiam, id quod facile deprehendi poterit, si Galeni verba recte perpendantur. quae ita scripta reperio. μόλυδος οὐκ ἔστιν ἀπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐκείνου, καὶ οὐδὲν ἔστιν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐκείνου. Τὸ δὲ μόλυδος, id est, Moly est. Alium, simplex caput habens, & non univium in nucleos: Quidam vero dicitur. Quibus verbis maxime constat, non probo esse Galenium eorum sententiam, qui μόλυδος ἔστιν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐκείνου, quum ipse aperit, n. e. dicitur μόλυδος Hippocrati, nil aliud designare, quam Alium simplex caput habens, cumque etiam non ignoraret non v

Guilan- tular

- 10 tentias evertere, & falsū pro veris asserere? Non enim (inquit) eo dementia vens, ut Mat. hio spellem huius fieri certo anteponam. At qui tamen si hic stultissime (ut alibi diximus) loqui videatur, in hoc tamen non sapere demonstrat, quod corium illud suum tantum faciat, p. asugiens forte se si aliquando viderit. Quam obrem corium illud attingenter univium asseruare poterit, & prothetantore, onare. Nam quid vult, ut quod aptius ad tympannum faciendum, vel Musicum sua genitū varem. confidendum, quam Guilandini corium? O infelicem hominem, qui putat non solum maledictus sed etiam minacibus verbis terrorem nobis incutere. Dubitant, inquit tandem imperitia sua pœnas qua caueat, si non iuraverit, ne ipse primus experiat. Sed qui dicit longe antea quam forsasse Guilandinus hunc Galeni locum, quamvis temere me illum nec tenuisse, neque se ceperit. Lege sane, ac vidi, sed non ut ille perperam intellexi. Moly itaque Alium non est, ita Moly est Hippocrati, Galeni testimonio Alium designat integrum capitis. Quo fit, ut si dixerim huiusce rationibus. Quorum testimonio persuasus, me hactenus Moly non reperisse in Italia, non propterea tam acriter accusatus, ut Guilandinus, qui tam admirandum monstrum prolegimus Moly in medium affert. Caterum nec facere Gejnero velle ferim, quod putet Dioscoridis Moly esse Hippocratis Oloconside: Siquaem contrariis omnino constanti factis Oloconis & Moly. Etenim hoc Galeni autoritate, contrahitur est factis, ut cum farina Lolis suppositum, apertas valeat occludere vulvas, illa vero maxime aperire. Ceriant inter se de Moly Guilandinus & Gejnere (sed ut ingenue fatear, & ut Gejnere viri alioqui non vniuersi pace dicunt, quod sentio) tanquam cum Tyresia talpa, cum hinc uterque cacuciat. At quid nunc de Homericis illis Moly in medium afferam sane non habeo, nec etiam quod probet Guilandini sententiam, qui temere (ut solet) asserere videtur, nil aliud per Moly intellexisse Homerum, quam Cynobatum, siue Agleophotus terrestrem Eliani, siue Baram, de quo libro septimo capite vicesimo quinto de bello Indico meminisse F. Iosephus: Sed falsi decipique Guilandinum in hoc, ut etiam in ceteris facile palam fiet: Siquidem Homerum in Odyssæa Moly sui radicem nigram esse scribit, his verbis.

Gejnere opinio probata


Guilandini sententia de Moly non inueni probata

Πίζη μὲν μέλας ἔσται γάλακτι ζῆλλον ἀνδρός, μόλυδ' ἢ μιν ἐξέσει θεοί.

- At Iosephus Baara radicem flammeo colore nitefcere asserit, adeo ut circa vespertas videatur veluti ignis fulgurans. Verum quoniam fabuloso perpetuo despexerim, et si longe plura hic aduersus Guilandini ineptias asserere possem, ea tamen potius silentio duximus praetermittenda, quam in medium proferenda. Porro Gejnere gratias habeo ingentes, quod contra Guilandinum causam meam suscepit, sit amen hoc ipsum fecit defendenda potius veritatis, & nostra vindicanda calumnie causa, quam illius accusanda insolentia. Hac itaque sunt spolia (mi candidissime Faloppi) qua prostrigato Guilandino tibi mittenda duximus, quod te mirum non modum semper dilexerim, ac etiam plurimum obseruauerim, quem mihi fortuna dedit, non modo amplificatorem dignitatis meae, sed etiam inimicorum ultorem. Quandoquidem praeterquam, quod id mihi pollicentur tua in me praestita officia non desunt siue studiosi sit hinc ad nos remeantes, qui non solum de tua admirabili virtute, eruditione, integritate humanitateque plurimum commemorant: sed saepe, ac saepe auduisse Faloppium (qua tua est beneficentia) de Aristoteli doctrina, eruditione, ac laudibus publice differentem predicant. Quamobrem si tuus es, qui tuus sententias me sapissime ornasti, qui tuis praconis, qui summis tuis laudibus usque ad sidera me euexisti, verendum mihi non est si quis tam impudens in posterum forsasse emerferit, qui nostris sincerissimis conatibus obesse voluerit, qui tua doctrina, eloquentia, & auaritate, quibus maxime praestitisti me absentem defensoris sis: Nam haec omnia sic in te elucescunt ut cum quolibet antiquorum comparari possint tua virtutes. Interim me excuses velim, si uehementius, quam nos decere putas, ac acrim quam pro more antea consueuerim, in Guilandinum dixerim. Siquidem cum nullus hic offeratur lenitatis locus, feneritate putavi reprimendam esse huiusce conuiciatoris impudentiam. Plura tamen non dicam, ne in quo obiurgem, id ipsum videar imitari. Vale Italia decus, mei non inmemor.

Baara apud Iosephum.

Praga Calendis Ianuariis.



PETRI ANDREÆ MATTHIOLI EPISTOLARVM MEDICALIVM LIBER TERTIVS.

GVLIELMVS QVACELBENVVS CVRTACEN. Physicus, Petro Andreæ Matthiolo, S. P. D.

Agitur de plantis quibusdam peregrinis Constantinopoli à Quacelbeno missis.

Non tam temere utilissimas tuas occupationes, reiq; herbaria iam tandem reuiuiscenti in primis necessarius, Doctissime Matthiolo, inturbarem, nisi mihi de summa tua humanitate, quæ ex æquo omnes prosequeris, vel ex sola Magnifici Domini mei Oratoris testatione confisisset, ut nihil vereri debeam, quin amicissime has primas meas salutationes sis accepturus. Neque vero illa ab ignoto prorsus homine venient, nam quamuis vix bis præsens te præsentem conspexerim (prohibebat enim tui cõueniendi cupidissimum familiaris tecum agere morbus, quo superiori itinere uersus Viennam distinebar, grauissimus & diuturnus) absente tamen iam secundo Byzantium, atq; inde etiam ad Ponticam usq; Cappadociam Amassiam comite usus sum assiduo & suauissimo, atqui nec comite tantum uerum etiam præceptore fidelissimo, & ex quo emolumentum plurimum fructusq; percepi. Luculentissimis profectus in Dioscoridem commentariis totum debeo quicquid hætenus de herbarum, aliorumque simplicium medicamentorum natura, solida cognitionis assequutus sum. Flagranti quidem ego ab ineunte ætate illorum cognoscendorum non mediocri desiderio, sed quod non parum relaxarunt doctissimorum nostri temporis de unaquaque fere planta varia atque incerta disceptationes Septisariorum, quibus Medica materia, curam atque scientiam superiores Medici detestabili quadam sua uerborum, & magna mortalium egrorum pernicie reliquerant, extrema ignorantia: deinde hinc Græci, inde diuersa sentientes Arabes: postremo quod nullus in uniuersum produisset, cui uelut certo in tanta uia incertitudine ductori tuto confidendi posset. Sed postquam semel in publicum editas eruditissimas tuas, plenissimasq; in Dioscoridem enarrationes uel a limine tantum salutasse, recepto protinus animo, capere maiori longe, quam antea unquam, rei herbaria studio teneri, confirmata peruenit in hoc animi sententia, nos talem in hoc scientia genere instauratorem nactos esse, qualem superioribus ætatis in anatomicis administrationibus doctissimum Andream Vesalium. Scripserunt de eadem materia ante illum complures, sed quos post se multis parasangis reliquit. Scripserunt quoque ante te non pauci atque huius tempestatis Medici celeberrimi, sed qui libenter nisi philantia quadam transuersi rapiantur, tibi palmam sint cessuri. Ita accurate, ita dilucide, ita ad numerum apposite omnia pertractas. Habuit Vesalius (ut in comparatione persistam) suos æmulos non ignobiles viros, habes & tuos, sed quos ut ille facile, pugnante pro te in uita perpetuo Veritate, retundes. Patiaris obsecro, doctissime Matthiolo, me mihi in hac parte indulgere, neque unquam in animum inducas, me leuiter potius adulantem tibi, quam uere, atq; ex animo hac scribere. Adulandi namque nulla mihi necessaria causa incumbit, ut plurima sunt e diuerso, quæ, ut quam optime tibi uelle debeam, de te quam optime sentire, ac loqui, hortantur, atque etiam impellunt: eruditio tua summa, inducium de re herbaria exactissimum, studium iuuandæ Medicinæ, quæ parte iam maxime laborat, indefatigatum, lucubrationes postremo tunc laboriosissima, ex quibus eos progressus me iam fecisse in simplicium medicamentorum notitia sentio, futurumq; indices maiores spero, ut tandem illa ardenti meo cognoscendi desiderio satisfactum iri confidam: sed de his satis. Ad ea conuertar, quæ potissimè huic epistolæ scribendæ causam dederunt, quæque quod, ad susceptum tibi negotium proxime faciunt, non ingrata futura satis scio. Magnificus Dominus orator Augerius a Busbeck non minori, quam ego noscendi res nature mirabiles studio captus, quo nescio an aliud homini libero & nobili conuenientius excogitari possit, cum prior itinere præppero & impræmeditato, multa sibi ad animum suum explendum defuisse animaduertit, secundo Byzantium remissus, de assiscendo in familiam suam inter cetera perito aliquo pictore, cuius opera adiutus, quæ minus commode auertere posset, depicta saltem quam optime referret, cogitabat, impulsus quoque ad hoc Serenissimi Principis Ferdinandi, &c. Domini tui atq; nostri, missis ex Oeniponte literis, quæ de referendis in librum aliquem peregrinarum arborum, cuiusmodi hic complures reperiri certum est, imaginibus, agebant. Constantinopolim igitur reuerso, & diligenter sibi commissam prouinciam tractanti quam non leuem tantum præmissa tanto Principi obsequendi uoluntas, sed suauem etiam animus natura eo propensus, faciebat, superuenerunt altera eiusdem instituti litera a Gastalo Rege,

- Regio, tum temporis apud Venetos, Oratore, qua de transmittendo hinc tuo Acoro illum commonebāt, quod qui non tam Principis, quam tuo nomine fieri intelligeret, capis non solum de mittendo Acoro, neq. de arboribus exoticis tantum, verum etiam omni generis plantis raris (praecipue qua in tuis commentariis, aut ipso etiam Dioscoride desiderantur) & nostro orbi incognitis animalibus, quantum per negotia legationis difficultate conceditur, depingendis curare, id quod haecenus ob durissimam, qua hic viximus, conditionem, non omnino successis pro animi sententia, successurum tamen non infeliciter sperarem, modo optata tam diu pacis tempora tandem elucescerent, & studium suum non ingratum Sereniss. Principi, neque impensu difficile fore intelligeret. Locus enim hic est ad ista accommodissimus, Ponto herbarum omnium (ut pernocti) parentis fecundissimo, Asia item & celeberrimis mediterraneis Insulis vicinis, Emporium praeterea omnium rerum abundantissimum. In primis vero earum, quae raritate commendantur, trahentibus huc ex omnibus pene orbis regionibus, externos mercatores, primorum procerum studiosis, qui mercium nouitate praeceteris hominibus, quos usquam vidi, vel maxime delectantur. Porro cum huiusmodi mercium nonnullas ad Serenissimum Archiducem domini Orator, data per collegarum suorum discessum occasione opportunissima, mittere constitisset, nā illius mandato emendas Vienna suscepit, adiunxit in tuam gratiam cistellam quandam vis medicamentis instructam, qua, ut ex tuis commentariis cognouimus, tibi optata iam diu aduenient. De his ob id breue narrationem aduciendam putavi, quod, quaedam sint nostris antehac (ni fallor) penitus incognita, quaedam nota quidem, sed tanta cum aliis quibusdam similitudine coniuncta, ut vix a perito harum rerū inuestigatore exacte discerni possint. Nomina & facultates, duo potissima ad cognoscendam uniuscuiusque rei naturā instrumenta, partim à Pharmacopolis, partim à facultantibus hic Medicinam Iudais, accepta conuinxit, quod non parum ad faciliorem illorum perquisitionē tibi commodatum censerem. Nihilominus tamen omnia ex altissimo tuo iudicio perpendenda relinquo, illud unum iterum atq. iterū rogans, ut has meas primicias, velut meslis à suo semine propagata, benigniter suscipere digneris.

- CALAMVM** vulgarem, quem Acorum in tuis commentariis esse affirmas, nec male meo iudicio illi conueniente Dioscoridis descriptione, Dominus Orator dato comitatu per Septasiarum quēdam Fulginatem, cuius apotheca in Pera est, non procul a Nicomedia, ex vastissimo quodam lacu deferris curauit. Attulit ille complures plantas, inter reliquas tantū una quidpiam angulosum velut caulis simile gerebat: vertice truncum, exaridumq., ex latere vero oblique eminebat aliquid, non dissimile, aut plantaginis capitello, aut auellana nucamento, digitali longitudine, quod paucis post diebus, ad virgines floris modum efflorescere visam est, idq. paulo ante Calend. Maias, post vero aliud floris vestigium nullum apparuit. licet plantas amplissimis vasis impositas, affusa indies ad semipedalem altitudinem aqua (sic enim dicto lacu innascebantur) eam ob rem hucusque dominus Orator asseruari curauerit, ut idcirco omnino metuam, ne si florem Iridis similem in Acoro requiras (cuius tamen non meminit Dioscorides) verum hic sit Acorus. Superiori Amasiano itinere nō procul a ripis Halys, qui Galatiam à Cappadocia determinat, vix pene dierum itinere, me herbam vidi, te recordor, cui optime Dioscoridis descriptio quadrabat, eamque habebat radice divisionem, quam appropinquato libro, qui tum in curru praemanibus erat nobis, imago refert, odorata praeterea erat, & candida. & quo licet gustanti primum acris parum videbatur, tanta tamen postea acrimonia non solum fauces, verum etiam iula interiora vellitabat, ut proculdubio si non Acorus fuerit, plantam aliam insignem fuisse oporteat. Huiusmodi potissimum memini, quod è medio caulis eminebat, qui circa Calend. Aprilis florem promittere videbatur. Extirpationem plantae cum in reditum distulisset, ut auferendis recensitorem potestatem esset incidente sabilli granissima domini Oratoris valetudine, dum illum sollicitus obseruo, immemor designatum locum praeteri, campus erat vastus, non lacustris, sed quem intumescens Halys aliquando inundaret.

Calamus vulgatis, est Acorus.

- Alter a herba **RUTA** est syluestris, quam copiosissime toto itinere ab Amasia ad Sangariam usq. nasci vidimus, ignotam tunc temporis, at post tamen cognitam, intellecto hic ab Arabibus illius nomine. Isarmel enim isti, ut priores, qui de ea scripserunt, appellant, eodemq. modo inducta cerebro velut ebrietate quadam rerum tristitiam molestiam tollere asserunt.

Ruta syluestris seu Harmel.

- Tertia hic vulgo **ELISSOTH**, vocatur, id est, herba gladiolus. vtuntur hac ad alui deiectiones, quem vero humorem purgando potissimum trahat, ex imperito istius discriminis vulgo cognoscere non potui. Experimento autem tentare in tanta aliorum mihi cognitorum copia, neque tantum videbatur, neque conueniens.

Elisoth seu herba gladiolus.

- ALUMEN** Iameni, sic à Persia regione, unde aduehitur nominatum, ut hic volunt, namque aliter antiquum Arabicarum vocum in Auicenna interpretem exponere memini, rem factitiam esse ex insertis transuersim paxillis, aperte constat, cuius hic frequentissimus, praesertim in ocularibus equorum medicamentis, est usus, hominibus quoque non inuisitatum rubentes inflammatione oculos illo moliter delinensibus.

Alumen Iameni.

- BLATTIA** Byzantia ab ungue odorato, communiter huius urbis Pharmacopola distinguunt, atq. hac, qua mittimus Blattia. Quae vero tuo libro depicta sunt, ungues odoratos appellant.

Blatta Byzantia.

- BOZETH** an Alcyonis Milesii species sit, incertum esto iudicium. Dioscoridis certe descriptio non male conuenire videtur.

Bozeth.

- CHESMENZEN** tam vulgare hic ad oculorum morbos est remedium, ut tritum sit prouerbum. Si doleant oculi, habes Chesmenzen. Petrus Bollandus in Gallia suis commentariis de rebus Turcarum memorabilibus, Acacalim esse affirmat. Ex Aegypto sane adferri certo mihi constat, eaq. abundantia, ut nummulo, quantum vix requiras, emere possis.

Chesmenzen seu Acacalis.

- CHRYSOCOLLA** quam mittimus, fossilis est, rara istius officinis, nam plerumque ut nostra, factitia vtuntur. De hac si quicquam nostro aurifabro credere liceat, hoc tantum habemus, nostram longe ad auriferruminationem efficaciorē esse.

Chrysocolla.

- CASTANEARVM** species hic frequens reperitur, quae ob id vulgo equina cognominantur, quod ternae, aut quaternae deuorata, pectoralium equorum morbus, tuus praecipue, & anhelus difficultati optulens.

Castaneae equinae.

- CARDAMOMI** species ex diuersis apothecis diligenter corrasimus, penes te sit liberum de illis iudicium.

Cardamomus, iudicium.

dicium. Turca huius urbis incolae, commansis aliquot seminibus, vini odorem tegere solent, alioquin non sine vita periculo se produturi si quando ad magistratus suos appellentur.

adidum.

CARNABADIVM ubi de Ornithogalo agis, cum Actuario Doronicum esse sentire videris. Nicolaus autem Myrepsus aliquoties Cuminum Ethiopicum interpretatur, cui adstipulantur duo manuscripti Graece dictionaria, quorum adhuc alterum apud nos habemus. Vulgo praeterea nota etiamnum appellatio, ex cuius opinione iam illud mittimus.

cul.

DE Coulcoul, & Hebnlben, nil dum certi intelligere potui, nisi quod Coulcoul, quibusdam in delitiis suis, praesertim quando recentes ex Aegypto aduehuntur. Genus quoddam resinae a Persa mercatore Capura vna cognominatum, ob id Dominus Orator, quantum vis magno erendum putauit, quod illius nullam adhuc apud quemquam, nisi sub alio fortasse nomine mentionem factam intelligeret. Venerem in primis stimulare contraria virtute ab Arabibus attributa Caphura, idem mercator referebat. Odor certe saporque non mediocrem caliditatem possidere tantum restantur. Hic admonendus es, dum imprudens vitreum vasculum in quo asseruabatur tractarem, collisa ansula, particulam vnā atq; alteram vitri liquori incidisse.

Fucus odoratus.

FVNCVM odoratum ob antiquitatem odore euanido a Iudaeo quodam pro vero, magno Dominus Orator redemit, mirum quanta acrimonia gustantis linguam mordicet.

Lapis Bezahar.

LAPIS Bezahar è Persis mercatoribus è regione quadam Armuzio vicina, ut ipsi referunt, sed veror ne false, apportatur, precio ob id grandissimo, quod rarior sit & illis non secus atq; Arabibus olim, praesentissimum aduersus omne fere venenorum genus praesidium habeatur.

Hematites.

HAEMATITAE nostro non male quadrarent Dioscoridis nota, si de friabilitate tantum constaret: sed cum ea non uno solum modo in rebus consideretur, nihil fortasse impedit, quin hic sit Hematites, praesertim quando ad eos morbos à Medicis Iudaeis hic adhibeatur, ad quos conducere affirmat Dioscorides, qui, ut non sunt vulgares, ita non vulgaris hic quoque est precii.

Maslach.

MAHV METANI sua lege vini potu prohibiti, diuersi generis compositiones, inter quas communissima est, quae vulgo Maslach dicitur, meditati sunt, quibus non dissimilem ebrietati, mentis alienationem sibi inducere consueverunt. Atqui nec istam tantum, verum immanem quoque aliquando insaniam, quam nunc ad ponendam animi maestitiam, nunc ad fugandum suborientem in rebus difficilibus panorem, conducere opinantur.

Nux Farfalach.

NVCES Farfalach ego tuas atq; Arabum, vomicas esse arbitror, propterea tamen mittenda censui, quod inter illas vna sit cortice superiori iniecta, qualem me illic vidisse non recordor.

Nux Aegyptia.

NVCIS quoddam genus ex Aegypto adfertur, cuius non externum tantum cortex fibrosus, glaber, colore subrufescente, sed & internus, si vera hic narrant quod, qui recens mollescit, illius regionis hominibus pro delitiis expetitur. Illud de eo mirandum est, in tantam postea duritiem euadere, ut aptissimum hic habeatur terebrarum capitellum, in qua, velut in planulis cardines circumuoluantur.

Nitrum.

NITRO vero longo iam tempore destituimur, non sine maximo agrorum incommodo. Bellonius in Aegypto se verum vidisse asserit, quod fidem aliquam mihi facit, cum ex Alexandria hoc nostrum aduectum sciam, neque cum quoquam fossilium, atq; nitro maiori similitudine conueniat, verum nitrum esse posse, quod si sit, quoniam abunde satis illinc aduehitur, quantum putas nostris regionibus adiumenti accessurum?

Glaucium.

SADETHZ non minimi inter Iudaeos nominis medicus, apertissimo errore (ut ex Dioscoride patet) Glaucium esse contendebat, ego eruginis potius scolacia speciem aliquam arbitror. Gustanti nescio quid seabacei saporis refert, atque ego profecto è seuo compositum esse aliquid putarem, nisi lumini admotum non distillare, quae illius est natura, sed paulatim indurescere, post etiam siccitate aut ipso calore nimio dehiscente vidissem. Arabes hic Dembehe vna vocant. Ocularibus vero compositionibus plerumque solet admisceri.

CASSABOVSSERIRE Bellonius in dictis suis commentariis, cum vulgo hic Pharmacopolarum Calamum aromaticum esse opinatur, meo quidem iudicio absurdissime. Placet Aucenna potius spodium esse, quod arundines vi ventorum & partium ad se inuicem confricatione adustas esse, videtur indicare, ac tale quidpiam huic arundini accidisse, aliquis non inepte dicere mihi posse videtur. Nihil tamen certi de hoc statu, sed totum ut alia omnia priora ad tuum iudicium relego.

Zedoaria Indica.

POSTREMA est Zedoaria Indica, ut praesentissimum ad qualibet pene venena creditum remedium, ita incredibili fere precio hic venale, ut si Arabum iuramentis credere liceat, nullum vel maximis Principibus dignius munus excogitari possit.

HAEC, doctissime Matthiolo maiori (ut ingenue fatear atq; ipsa orationis, & characterum inaequalitas testabitur) labore, & tibi gratificandi studio, quam cura & diligentia tumultuarie congesta, idcirco boni consulas, quod ad missam à Magnifico Domino Oratore cistellam, ut ante ostendimus, pene necessario videbantur adicienda, pro iis vicissim, nisi maiores te occupationes alio auocet, liberrimum de omnibus tam missis quam scriptis iudicium tuum postulo. Latissimam praeterea si placet earum rerum explicationem, quae apud vos illic aut desiderari nouisti, aut improbas tantum corruptasque prostrare. Sic occasionem dabis commodissimam cognoscendi animi mei ad tua officia paratissimi. De herbis peregrinis, animalibus item & arboribus atque aliis nonnullis libens quaedam adiungerem, sed prohibet Epistola longitudo, qua in iustum iam prope volumen excreuit, eamque ob causam molestam fore metuo. Quod si gratam tibi meam battologiam intelligam,

scribam alias quam copiosissime. Interea Deus Optimus Maximus te Principi nostro Serenissimo

ac publico Studioforum Medicinae bono, quam diutissime incolumem conseruet. Constantinopoli VII, Cal. Aug. 1557.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Gulielmo Quacelbeno Curtacensi Physico,
S. P. D.

Respondetur precedenti Epistola, censuque quodam omnia
expenduntur.



Vantum gaudis, quantumue voluptatis attulerint mihi interea tua, quantumque debeam Clari-
ssimo Augerio Romanorum Regis istius apud Turcarum Imperatore Oratori, quod tam pul-
chra, tam rara, tam pretiosa ad me miserit medicamenta, omni auro, ac gemmis preferenda,
nulla dicendi facultate eloqui, nec ullo calamo exarare possum. Nam quid mihi gratius,
quid incandius, quid suavius, quid optatius, à quoquam donari potuit? Profecto nihil. Cum
nihil magis mihi unquam fuerit in optatis, quam perpetuo Medicae materiae Studiosis aliquid noui, boni pra-
clarique comparare. Etenim studium angendi ac illustrandi Medicam facultatem, suauisque posterit-
tatem, adeo me totum complectitur, ac detinet, ut spreto ceteris humanae vitae voluptatibus, hoc solum tantum-
me oblectem, solumque plurimum. Nam cum Dei Optimi maximi munere lucubrationses nostrae quotidie ma-
gis, ac magis inolare scere, non solum apud omnes praclaros res Medicae studiosos, sed etiam apud alios cuius-
uis facultatis doctissimos viros anima in certam quis profecto mihi unquam persuadebit, ne praclarissimam
hanc simplicium medicamentorum facultatem omni thesauro preferam? Quamobrem & Clarissimo Auge-
rio & tibi quoque tantus habeo gratias, quantus studia erga me vestra ac officiosa voluntas requirit ac postu-
lit. Fatebitur & posteritas (nisi fallor) se vobis plurimum debere, quod me in hoc tam necessario ac utili labo-
re iuuerit, si modo non ingrata pro tanto beneficio fuerit, quod haudquaquam futurum censeo. Nam quic-
quid prope modum toto nostra vita curriculo, magno labore in medica facultate consecuti sumus, id totum in
eius commodum collatum volumus. Hic paternus noster amor, quo mirifice erga eam affecti sumus, multus
Clarissimus viris notus est, qui eo libentius nostros conatus summo studio adiuuant, & promouent, quo magis
posteritatis commodo ducuntur. Ceterum etsi nulla opibus, nullis officiis, haec in me collata beneficia repende-
re qui uero, enitar tamen, ut scriptis, ac praconus nostris omnibus palam fiat, nos ingenue fieri, per quos pro-
fecimus. Non me praterit, quantum tibi merito debeam, quod ita Commentarios nostros (quae tua est huma-
nitas) ad caelos usque euehas, & ceteris alii preferas, quod facile ex hoc animaduertam, ingenui animi tui erga
me voluntatem, ac beneficentiam esse haud vulgarem. Gaudeo sane abste uis apprime eruditio commendari
labores nostros, non quod hisce delecter commendationibus, ut praeceteris exhi velim, verum ut hinc certior
fiam me non incassum laborasse. Commentaria illa nostra nunc primum iterum in lucem prodierunt, aucta
non modo sexcentis fere locis, sed quam plurimis plantarum, & animalium imaginibus, quae in prior editione
non habentur. His praeterea accessit Apologia aduersus Amulium Lusitanum, & censura in eius enarratio-
nes, quo fit, ut codex iam multum excreuerit. At quum iam dudum mihi compertum sit, quanta animi pro-
pensione rem plantariam excolas, quantumque hac facultas tibi sit cordi dabo sedulam operam, ut Venetius ad
te istae huc non a haec nostra perferantur. Curabo itaque ut mittantur ad Venetiarum Oratorem (Bailum Vene-
ti vocant) istae agent, ut citius, & securius ad tuas deferantur manus, & eis pro arbitrio uti possis, donec tertio
perficiantur Iconibus, longe maioribus, ac elegantioribus, illustrata. Alonunc hic sculptores plures, qui omni solertia,
ac diligētia ad pictas excidunt tabellas, ut ex iconibus quas ad te mitto, facile conicere poteris. Opus est magnū,
magni admodum sumptus, ac laboris. Verū quum primū Deum Opt. Max. habeam, qui hac sua Clemētia mihi
infundit, nec Reges desint, nec Principes nostri, qui hac de causa mihi non mediocri liberalitate succurrunt, nō
vereor quin rē hanc a laoptatū deducā finem. Quis sit ut hinc conicere possis, Candidissimi Gulielme, quā magno
gaudio, quanta animi voluptate vestra hac peregrina exceperim medicamenta, quum non solum magno sim-
captus desiderio, illustrandi haec nostros labores elegantissimis imaginibus, sed & augendi talibus peregrinū
medicamentis, quae paucis aut fortasse nullis hactenus visa sunt. Quamobrem te rogo atque obtestor per ami-
citiā nostram, per communia studia, per mortalium salutem, quibus maximo esse potes auxilio, ut tuā con-
tinue naues operam, ac diligentissime cures, ut si qua istae reliqua sunt, quae operi nostro profutura censeas,
illa summo studio colligas. Porro quae nunc à me desiderantur, hic per se annotata recenses. Atqui quum mihi
facile persuadeam longe plura abs te inueniri posse, quam a me peti, non vereor quidem quin tu & augēda me-
dicae facultatis, & posteritatis causa, te totum ad hoc munus obeundum promptissimum exhibeas. Nec admo-
dum fore difficile crediderim, ut ea quae abs te inuenta fuerint, huc ad nos adferantur. Quippe cum istae sit Ve-
netorum Orator, eius auxilio censerem, quod omnia secure mitti Venetas possint ad Caesaris Oratoris manus,
qui postea per Veredarsos, qui illinc quotidie ad nos veniunt, haec omnia tuto mittere posses. Sed de his hacte-
nus. Nunc vero ad ea me conferam examinanda, quae a Clarissimo domino Augerio, nobis missa sunt, & a
ceteris humanissimis literis mihi descripta.

IN primis est Acorum, cuius non solum plures accepi plantas, sed imaginem ad vinum pictam, adeo ut
iam omnes Sole clarius nosse possint, Calamum vulgare nostrum, nil aliud esse, quam legitimum Dioscoridis
Acorum. Quinetiam & palam fiet, eos toto errasse caelo, qui Galangam Acorum esse contendunt. Dideras-
sem tamen, ut caulem quoque vel eius Iconem misisses una cum agnatis in latere Capuulis, quorum recte me-
ministi. Si quidem haudquaquam crediderim, quod tu qui non solum doctrina, & eruditione, sed et-
iam prudentia ac ingenio praestas, capitula ista, & caulem tibi afferuaueris, cum proculdubio scieris haec per-
eegrina, rarissima ignotaque, esse omnibus, qui Europam incolunt. Quamobrem te quam plurimum rogatū ve-
lim, ut caulem istum una cum capitulis ad me mittas, sic cupis huiusce plantae perfectam, te auctore, a me dari
imaginem. De alia vero planta, quam te inuenisse ais, non procul a fluminis illius ripa, qui Galatiam a Cap-
padocia auferminat, quid sentiā, afferere non aulim, cum planta non sit ad manus, nec possum de incerto, &
nusquam visis nisi temere meam afferre sententiam.

Acorum verum.
Calamus Aio-
maticus vulgaris
vltus quid.

Sylvestris ruta
legitima.

SYLVESTREM Rutam recte probamus legitimam esse Harmolā, quum omnibus illi respondeat
notis, quam cum hactenus nec viderim, nec nouerim, hilari admodum animo accepi.

Elissoth videre.

DE ELISSOTH, quam etiam gladiolum appellas, quid dicam non habeo, cum nusquam hanc me
vidisse meminerim. Recensebo tamen fortasse illam inter desecloria medicamenta. Quare si forte fortuna in-
rim cognoscere poteris, quem proprie nostri corporis exoluat humorem, & qua detur mensura, molestum tibi nō
ducas, id ad me scribere.

Alumen Iameni.

ALUMEN Iameni ves factitia est, ut ex insertis festucis quisquam conicere potest. Atqui si ve-
ra fateri velim, & meam de eo in medium adferre opinionem, potius illud Chalcanthum putarem, quam alie-
rius generis alumen, quod nihil sapore a Chalcantho differat, tum etiam quod Chalcanthum Pannonicum ha-
beam colore illi omnino simile. Serenissimus Princeps meus allectus colore & rei nouitate, id totum quod mis-
sit ad se recepit, quo postea factum est, ut periculo facto comperire nequiverim, an diluto gallarum additum,
id atrum redderet. Quod autem non putem hoc alumen, id esse, quod Arabes Iameni vocant, illud in causa est,
quod sciam nihil aliud Mauritanis esse Alumen Iameni, quam alumen scissile, albi non caerulei coloris, quum
etiam per se fossile non arte paratum. Opinioni nostrae recte quidem astipulatur Serapio ex Dioscoride scribit,
capitulo 420. ubi sic habet: Multa sunt Aluminis species, sed illa, qua administrantur in medicina sunt
tres. Vna est illud, quod dicitur Iameni, & est melior aliis, & melius ex eo est illud, quod est recens albu, for-
tis albedinis, facile diuidens se, & habens velut capillos albosissimos. Serapioni subscribit Auicenna lib. 2. cap. 70.
his verbis. Scissum vero est Alumen Iameni, & est album ad citrinitatem declinans. Quibus palam est, hoc
alumen non esse legitimum Iamenum, sed Chalcanthum factitium potius, id quod facile comperio, si gallarum
decocto aut diluto illud adiciat.

Alumen Iameni
est alumen scissi-
le.

Blatta Byzantia.

QVI Blattiam Byzantiam ab ungue odorato segregat, perperam meo iudicio faciunt, cum Serapioni,
& Auicenne nil aliud designet Blattia Byzantia, quam unguem odoratum, vel conchulam Indicam, de qua
lib. 2. meminit Dioscorides. Verum cum in Serapione de Blattis Byzantiis duo habeantur capita, scriptorum
(ut mea fert opinio) errore repetita, cogitauerunt fortasse quidam differre inter se Blattias Byzantinas & odo-
ratos ungues, quo postea factum est, ut ab impostoribus hoc Conchyli genus, quod ad me missum est, pro Blat-
tia Byzantia inuentum sit, & subinde in medicum usum concesserit. At si Medici vel Pharmacopœi in Se-
rapione caput 151. & 442. in quibus de Blattis Byzantiis agitur, accurate legerint, facile hanc nouerint im-
posturam.

Alcyonium Mi-
lesium.

ALCYONIUM Milesium, quod Turca Bazeh vocant, nisi mea me fallit opinio, legitimum esse
puto, quod pluribus illi respondeat notis. Quod ad me missum est, totum accepit Serenissimus Princeps. Nec
propterea Alcyonio Milesio sum destitutus, cum iam pridem sint mihi una cum illo alia Alcyonii species.

Chefmezen.

QVOD seminis genus Chefm esse possit, mihi sane incompertum fateor. Nec tamen Bellionusen-
sentia accesserim, qui semen hoc Acacia in perperam esse putat, quum nihil cum myrica habeat similitudinis,
vel cognationis. Seram ego hoc semen futuro vere, nisi aliud diuinitus nobis accidat, ut quid inde proueniat,
inspicere possim. Tu interim cui res ipsa plantaria plurimum est cordi operam dabis, ut videas, an isthic amer-
catoribus, vel Myropolis, vel Medicis explorare possis, utrum semen sit arboris, fruticis, vel herba, quin etiam
an eius planta ramusculum consequi possis. Cupio praeterea abs te scire huiusce medicamenti usum ad oculo-
morbos, & an valeat frigida, vel in calida causa.

Chrysocolle.

CHRYSOCOLLA tua omnino similem vidi alias Venetiis plurimam, sed si Chrysocolle nota
a Dioscoride petamus, huic nihil cum legitima cognationis reperies, nisi quod utraque aurū ferruminet. Pla-
cuerunt sane admodum Castanea, quas istis equinas vocari, ais, quod anhelosis, & tussientibus equis maximo
sint auxilio. Cuperē tamen abs te certior fieri, an ab arbore producantur vulgaribus Castaneis simili, an et hi-
nato concludantur in uolacro, & an ut nostra tuto possint denorari in cibis.

Equinae casta-
neae.

Cardamomi vul-
garis genera.

QVID certi dicam de tribus illis Cardamomi generibus, praeter id, quod in Commentariis nostris pe-
steritatis memoria mandauimus, non superest. Nec tantum otii nunc mihi se offert, ut alius Cardamomi &
Graeci & Arabici historiam expendam. Spero tamen me id breui facturum non sine fructu. Quod si effecturo
fortasse ut velim, statim tibi meam probabo sententiam.

Cuminū Aethio-
picum.

ET SI semen quod Aethiopicum Cuminum esse censeo, isthic Carnabadion Graecis appellatur, cum ta-
men certo sciam, carnabadium esse carum, non possum tua acquiescere sententia, & ob id mihi facile persuade-
rim ea verba in Actu.ario potius esse Ruellis, quam Authoris.

Coulcoule Staphy-
lodendron.

NUCLEUS quem Coulcoule & Hebu'ben appellas, frequentissimus in Bohemia, Austria & Gori-
tensi agro nascitur. Huiusce fructus arbor Plinio Staphylo dendron appellatur: scripsimus nos huius arboris hi-
storiam, ubi in Dioscoride de Pistaceis egimus.

Caphura vius
quae.

LACHRYMAM quam viusam Caphuram a Persis appellari scribis, plurimi facis. Cogitabo post-
haec sedulo an fortasse legitima sit Staete. nam adeo odore placet, ut credam non obscura facultatis esse medi-
camentum. Explorabo itaq; rem hanc diligentius. Tu vero interim videas an scire possis unde afferatur, ubi
nascatur, & a cuius generis planta fundatur hic praclarissimus liquor. Nec etiam te pigeat me reddere certio-
rem, quo pondere, vel quantitate, quo modo quae ratione sumatur, ubi frigeat Venus. Ceterū mihi rem gra-
tissimam facies si an undem iterum ad me miseris.

Iuncus odoratus.

DE IUNCO odorato ita ad me scribis. Iuncum odoratum ob antiquitatem odore euāido a Iudeo
quodam pro vero, magno pretio Dominus orator redemit, mirum quanta acrimonia gustantis linguam mor-
dicet. Quibus minime correspondet id, quod facto periculo non solum mihi, sed aliis nonnullis accidit, quan-
doquidem, & mihi, & illis hunc iuncum mandentibus nihil praeter amaroris plurimum dereliquit gustan-
dum. Sed mirum quod tu qui iudicio, & experientia praestas, hanc potius imposturam odoratum Iuncum
esse putaueris, quam Officinarum Squinanthum, cum tamen hoc notis omnibus odoratum Iuncum re-
ferat.

Lapis Bezar.

LAPIDEM quem Mauritanii Bezar vocant accepit in sui commodum Serenissimus Princeps.
Ego iam dudum plures illi similes vidi lapides, sed an veri, vel adulterini sit profecto nescio. Atqui si Sera-
pionem, & Rasim consulamus, non video cur probem lapidem hunc legitimum esse, nec est ut plura nunc de eo
18

in medium afferam, cum sententiam meam lib 5. nostrorum commentariorum in Dioscoridem, postquam de Lemnia Sphragide egimus, suffus declarauerim.

NO N est ut dubites, quin Hamatites tuis sit legitimus. Friabilitas enim in illo non intelligitur eo modo, quo digitus frangi possit, cum scribat Dioscorides Hamatitem lapidem esse durum, sed quod cum frangitur, facile scindi possit. Scates enim venis innumeris, quae cum facile diducuntur, tum subinde non magno negotio teruntur in puluerem. Nascitur hic etiam in Bohemia, Misnia & Saxonia frequens. Sed tuis duritia & praestantia hos plurimum superat, quod ex orientali plaga afferatur.

Qualiter friabilitas Hamatitiz intelligenda sit.

MAHV METANORVM Maslach minime parui penderem pluribus de causis, si quibus componatur medicamentis, me haud lateret, quin etiam qua quantitate, vel mensura dari possit. Crediderim ego

Maslach Mabanometanorum.

10 non uno tantum medicamento parari, sed pluribus quorum tum nomenclationes, tum facultates libenter abs te audirem.

RECTE quidem iudicasti nucis farfalach eas esse quas Vomicas appellant Arabes. Ego Venetis aliis ab his emi, qui Myristicas nucis selignant. Nam plurimum inter illas ad nos conuehantur.

Nucis farfalach.

NVCE S alia, quas ex Aegypto istuc affertis, ut a me nusquam haecenus visa, ut nec facultate cognita. Admiranda sane mihi est, non solum peraminis interioris duritia, sed multo magis nuclei, cum nihil nec facultate cognita. Admiranda sane mihi est, non peraminis interioris duritia, sed multo magis nuclei, cum nihil a durissimo quoque marmore distet. Cuperem quidem ut de earum viribus mihi aliquid adungeres, curaresq; ut etiam huius arboris ramusculi ad nos afferretur.

Nucis Aegyptiz.

20 **NITRVM** (ut ex Commentariis nostris in Dioscoridē tibi palā fiet) olim in Aegyptiis nitriariis ex Nilii aqua factitium habetur. At quoniam Plinij testimonio constat, nitri cumulos tractu temporis lapidescere, facile adducor ad credendum, ut hoc tuum legitimum sit nitrum, cum illi omnibus notis corresponderet. Quamobrem quum iuuanda Reipub. promptissimus tibi sit animus, velim, ut negotiatoribus, qui vel isthinc, vel ex Aegypto in Europam manigant, suaderes, ut hoc nitrum copiosum ad nos conueherent, multum enim utilitati humano generi conferre poteris, si tua opera id nostra assequantur regiones.

Nitrum.

QVI putant Sadeth esse Glaucium mea etiam sententia plurimum falluntur. Nihil enim obstat mihi, quin tecum censeam compositum id esse medicamentum. At ego ex Sapone, arugine & nonnullis fortasse aliis, quam ex Seno paratum crediderim, cum Sapo luminis flamma admotus non liqueat, sed areseat potius, magisq; faciat ad detergenda oculorum impedimenta, quam seuum. Videas tu interim si parandi rationem ab aliquo consequi possis & unde istuc afferatur.

Sadeth non esse Glaucium.

30 **ERRASSE** toto caelo Bellonium nunc proculdubio animaduerto, quod tam facile credideris Lapideos calamos illos Aromaticum esse calamum. Nec ob id tecum sentire possum, ut si Spodium sint Auicenna. Nam tametsi antiqua Auicenna lectio habeat, Spodium esse radices cannarum adustas propter fricationem suarum extremitatum cum ventus eas perflat, non tamen Bellunen lectio, qua haecenus probatur ab omnibus, loco cannarum habet Alcanna, qua nobis Ligustrum designat. Caterum si priorem versionem magis etiam probauerimus, quam ultimam, quum Spodium illud canna radix combusta esse debeas, non ipsa canna, id quidem mihi maxime obstare videtur, quin hoc Auicenna sit Spodium. Praeterea si diligentius hos cannarum trunculos expendamus, quis non potius illos lapideos effectos indicabit, quam fricatione vel igne aliquo combustos? Scio autem te minime lateret, reperiri fontes, flumina ac lacus in quibus quacumq; imponantur, lapidescant. Quo fit, ut mihi facile persuadeam hoc calami genus in litore alicuius lacus scatentis petrifico succo provenire, qui subinde vel ventorum impulsu, vel alio quouis casu in lacum demersi, in lapidem vertantur. Id quod facile palam fiet, si unde afferatur scire curabis, & etiam quomodo fiat, ut potius Lapis, quam calamus videatur.

Bellonij error.

40 **ZEDOARIAM** Indicam cum nusquam haecenus nouerim nec uiderim, quid tibi de ea narrare possim, sane non habeo. Verumtamen quum odoris tantillum in ea perceperim, nihilq; saporis mandentibus derelinquat, qui eius praestantiam ostendat, agre quidem adducar ad credendum tam admiranda contra venena radicem hanc prestare posse, ut Arabes illi praedicant. Idcirco decreui omnino huiusce Zedoariae aliquod periculum facere, vel in Gallis syluestribus (ut de Theriaca docet Galenus) vel in aliquo alio animalis. Porro nisi id agat, a propria forma, mihi persuadere non possum, hanc Zedoariam tam admirandis prestare viribus ad superanda venena. Vidi tamen alias radices ex quibusdam cisalpina Gallia montibus aduectas, quam Antitora (antitora potius) herba esse affirmabant, & ad venena omnia, quam maxime prestare aiebant, quae nihil penitus a Zedoaria ista dissidebant. Verum cum illas nec olfecerim, nec gustauerim, ex visu tantum affirmare non ausim, Zedoariam hanc, & Antoram illam unam, & eandem esse radicem. Caterum cum Auicenna scriptum esse animaduertam Zedoariam una cum napello crescere, & idem de Antora fateri recentiorum quosdam, suadet profecto genius meus, ut credam Zedoariam hanc, & Antoram nihil inter se differre, quod comperit habeam una cum napello Antoram provenire: quamobrem demiror, quod isthic tam magno veniat precio. Ob idq; te admonere opera precium duxi, ut ab impostoribus, ac deceptoribus caueas, quorum infinitus est numerus. Nec velim hac a me dicta esse censeas, ut te negociandi modum doceam (Minervam enim mihi docere non licet) Sed ut cognoscas me hac in re etiam aliquid intelligere.

Zedoaria Indica quae.

Antitora.

50 **PLACENT** non parum Behen albi radices, quod notis nonnullis legitimis referant. Est Serapioni Behen radix contorta, odorata, & mansueta, quae ex Armenia afferatur. Auicenna vero sunt frustra radicem lignosa. In tuis desideratur tantum odoris fragrantia, qui fortassis radicem vetustate exoleuit. Catera meo iudicio correspondent, quo fit ut mihi persuasum velim, hoc Behen album esse legitimam, quousque aliud ad me non adferatur, quod magis odoris suauitatem fundat.

Behen album.

BEHEN rubri radices nil aliud (mihi crede) sunt, quam bistorta seu colubrinaradices. Nec ob id improbauerim, qui hasce radices Behen rubri loco in usum medicum traxere, quum sciam non obscura esse facultatis aduersus deleteria medicamenta, & ad venenosorum omnium ictus. Ego cum mihi haecenus persuaferim Ben rubrum communis usus, Limoni esse radicem, nihilq; conducere ad cordis affectus, nec ad venena, eius loco Tormentillam vulgo vocatam medicamentis ad cordis affectus parandis semper addere soleo.

Tormentilla.

BDELLIVM (teste Dioscoride) translucidum esse debet taurini glutinis in more suffuso odoratum, & gustu amarum. At cuius tamen nigro sit colore, nullis in parte pellucidum, nec suffuso odoratum, sed virum potius nota redolens,

Bdellij legitimi

redolens, cur id legitimum dicam non habeo. Quandoquidem sola amaritudo, qua illi inest, ut ceteris ferulae
chrynis, ac resinis non sufficit, aliis non adstipulantibus notis, ut adulterinum hoc Bdellium legitimum faciamus.
Hermodactylum, cum tamen neminem habeam qui Hermodactyli historiam scribat, an tuus legitimus dici
possit, nec affirmare, nec improbare ausim. Rem itaque mihi gratissimam facies, si diligentissime exploraueris
ubi nascatur, & an isthuc utantur Medici pro legitimo Hermodactylo. Præterea ut cures plurimum opto, am
plantam cum foliis, & radice consequi possis. Ceterum si facto periculo habeas pro comperto, conducere Her-
modactylum hunc ad articulorum dolores, rogo atque etiam obsecro, ut plures ad me illius mittas radices.

Rubricarum tria
genera.

RUBRICARVM tria illa genera vidi ac degustavi, eaque nihil differre video a rubrica illa com-
muni quam Seplastia Bolum Armenum Orientalem vocant, & quam ego Lemniam terram proculdubio esse, &
confero. Sed abs te fieri certior velim, an illa omnia rubricarum genera ex Lemno Insula isti huc aduehantur,
vel an alia sit rubrica vel terra species, qua ex Lemno asportatur. Cum enim Lemnum, quod vulgo nunc Sta-
limene vocant, non longe absit a Byzantio, facile fortasse poteris legitimam terram Lemniam adipisci. Nam,
ut puto non deerunt, qui quotidie istinc eo nauigent negotiationis causa, quibus tuto rem hanc committere
possis.

INTER hæc rubricas paruum quoddam inueni terra frustulum, cuius color ad luteum potius,
quam ad rubrum se habet. Quapropter mihi cogitandum fuit, an fortasse hac illa sit Armenia terra, de qua
Galenus scribit, & plurimum aduersus pestem præstare ait. Tuum ergo erit, me certiores facere, an ex Arme-
nia montibus fuerit allata, an aliunde. Ceterum nec prætermittas obsecro, quin omni studio, ac diligentia in-
quiras, ut legitimum Armenium Bolum consequi valeas.

Zaccharum al-
basser.

SI ea qua scripsimus de Zaccharo Albasser in commentariis nostris in Dioscoridem expendere, facile
mecum senties id quod ad me misisti, adulterinum esse, quod nulla in eo percipiatur amaritudo, nec etiam Sac-
charea dulcedinis quicquam. Verum cum de his peregrinis difficile sit, tum recte negare, tum etiam affirma-
re quicquam, tum potius in hoc requiram iudicium, quum in eo sis loco (ut tu ipse fateris) in quo multa pere-
grina adipisci posse non ambigis. Cures igitur ut intelligas, in quibus regionibus Zaccharum hoc proveniat.
Ac etiam si fieri possit, ut sua arboris ramusculus vel folium aliquod ad te afferatur.

Tucia.

TUTIA illam tuam, qua passim pro legitima utuntur Pharmacopœi, Cadmiam Batrytem legiti-
mam semper existimaui, ut ex nostris in Dioscoridem commentariis tibi palam fiet.

Argillada.

CORTICIS illius frustulum, cui titulus erat Argillada, putarem ego pseudocassiam esse, quam
Pharmacopœi Cassiam ligneam vocant.

Lapis Armenus.

LAPIDEM cui titulus inscribitur, Lapis Armenus, ceruleum proculdubio esse censeo, quod ceruleus
sit coloris, non viridis. Atqui Armenium Lapidem illum esse non ambigo, cui titulus erat, Roccha de Turcia
ne, quo ego sepe usus sum magno auxilio ad Melancholicos.

Herba tinctoria.

POSTREMA est herba tinctoria, quam etsi non nouerim nec viderim hætenus, eam tamen esse
crediderim, qua Turca utuntur ad suos inficiendos equos rubro colore. Si qua itaque ei sit facultas, qua aliquid
ornamenti rei medica afferre possit, velis rogo de ea me certiores reddere.

HIS breuioribus, quibus potui, verbis, tibi nostram declarauimus sententiam, non eam ob causam, ut
tantum authoritatis mihi nunc arrogare velim, ut putem censuram nostram nulla controuersia abs te probari
debere, sed ut tibi tantum, id a me petenti, satisfactum esse non ignores. Ceterum quod nihil peregrinarum sti-
pium, animalium, ac aliorum quorundam simplicium iis nunc ad me missis adiunxeris, ne fortasse (ut aiunt)
longiori sermone me obtunderes, vel molestiam inieceres, non potui sane non agere ferre. Quippe quum antea no-
meris, ex his, qua in hac re præstitis, medica materia me adeo esse adductum, ut nullis machinamentis illinc au-
li possim: cur igitur tibi putandum fuit, molestiam iis rebus nobis afferri, quibus præceteris, maxime delecta-
mur. Videas tu potius, ne id, quod de me vereris, tibi ipsi forsitan accidat, dum plura quam possis, a te petam
fieri. Quod si quandoque euenire animaduertas, velim te ipsum tantum accuses, quod nimia humanitate, ac for-
tasse liberalitate, ad id plurimum me excitaueris. Qua nunc a nobis desiderantur, scheda hæc nostris annexa
annotata reperies quibus cetera interim a te inuenta, ut addas maxime rogamus. Vale, mi amantissime Gu-
lielme & ad me quam celerrime fieri possit, de omnibus fusissime scribas. Interim ego Deum Optimum Maxi-
mum precabor, ut non solum posteritatis iuuanda causa te seruet incolumem, sed & sospitem, ac hilarem ad nos
reducat, ut tua valeamus consuetudine, doctrina, & humanitate frui. Praga, Pridie Nonas Decembr. An-
no. M. D. L VII.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Medicus, Michaeli Florino à Lambstein
Medico S. P. D.

Disputatur quanam sint exanthematum, ac morbillorum causa.



Ametisiam dudum nihil mihi incundius, delectabiliusque euenire posse putabam, quam nostra
facultates problematibus, qua in medium afferebantur respondere, temporis tamen tractu fa-
ctum est, ut rei domestica curanda negotium, agrotantium cura, & medica materia indaganda
labores, illinc me penitus diduxerint, quo fit, ut hac in re parum, vel omnino nihil præstare
hoc tempore valeam. Verum enim uero, quum tibi viro doctissimo, & rei medica studiosissimo
negare non possim, quin tuis petitionibus morem geram, neruis omnibus hoc in negotio mihi contendendum
laborandumque erit: ea tamen lege, quod si forte fortuna, ubi memoriam refricare conabor, caput, parietis impin-
gam id non mihi tantum sed imbecillitati etiam nostrae, nostrisque, vita incommodis ascribere debeat. Nam si
ea præstare nequivero, qua velim, velis in (obsecro) plura non exposcere, quam a me præstari posse, cognosce-
P R O-

PROBLEMA itaque dubium vetuum erat, an probanda, vel improbanda sit communis omnium fere Medicorum sententia, de morbillorum ac variolarum quas vocant, causis, quae pueros, adolefcentes, iuvenes & quandoque senes invadunt, quum proculdubio censent, id plerumque evenire, menstrui materni ve sanguinis impuritate, ac malitia, quo alimur omnes (ut coram fert opinio) dum matris utero gestantur. Tu autem, qui ingenio ac eruditione, ane non ob eum a plurimum praestas, videbaris horum sententia profus rejecta, argumentis quibusdam adversariis, nec vix negligendis. Caterum quam tantum tibi fidere non auderes imo potius recusares, rogabas, ut quid in hisce difficultatibus sentirem sincere afferrem in medium. Adhuc quidem primum dicebas, ut in eorum sententiam ire non posses, quum Galeno scriptum sit, quinto Aphorismorum Com. 2. - Fœtum in utero contineri ac nutriti purissimo praestantissimoque sanguine. Id quod nos etiam scripsisse scimus libro primo de sanitate tuenda, tertio de morbis vulgaribus, & libro de atrabile. Dicebas praeterea quod in communis Medicorum opinio veritati consentanea esset, quum menstrui sanguis venenosus, proculdubio sequeretur, omnes in unum summas infantes non solum huiusmodi corripere morbillis, sed etiam omnes videm suffusos nasci. Siquidem necessarium putabas eo statim tempore, quo menstrui sanguinis venenosus vis in fœtum via conceperit, sanguinem effervere sentiam fieri debere, ne autem temere id tibi perfusum esse ostenderes imo sibi esse contendere, venenosam illam qualitatem, tanquam natura humana inferissimum hostem, una cum tu adhuc tenella & ubi calor modicus imbecillisque reperitur, in sanguine vniusa, in pugna dici non posse. Quippe necessarium fore putabas, aut vitio ob venenosam illam qualitatem succumbere nunciam, aut eandem vitricem propellere. Ad hac ne videreris futuri quodam sermone hac te in medium assidue alius etiam argumentis tuam tuam opinionem nitentibus. Proinde dicebas ingenue, menstrui deiectiones venenosae sibi. & quodam vniusa arguuntur singulis mensibus natura ope ac via puriore sanguine secretum, cuius tanta sit pernicietas, ut contactu tantum illius novella vires vel crescant vel commoriantur siuges steriles evadant pereant & exuriantur in ita horum germina. Quinetiam sibi baris auctoritatibus quibusdam abortire utero gerentes, quae menstrui sanguinem alterius fœtus in se in praetergressis, quaeque eos sibi peribunda in secerint, idque conceptionis sibi advenire vis, quae utero non gerunt. Praeter id afferebas, canes, qui sanguinem menstruum degustaverint, in rabiem agi, homines autem minus incommodum affligi. Quum obrem veteres non immerito dicebas menstruum tanquam venenosum esse. Hic itaque rationibus fretus, non esse credebat, afferebas fœtum in utero tenellum & quasi coeum ex eo sanguine venenoso nutriti ac inde alimentum capere. Ea, propter vniusa vniusa opinionem, qui morbus, ut variolaeve ex alimento menstrui sanguinis suam trahere causam existimant. A fœtus autem praeter ea id maxime eorum sententia rejigari, quod muli invenerantur qui non semel tantum, sed bis, & saepe in diebus affecti sunt. Quos proculdubio censens non ex menstruo sanguine id evenire sibi, ut ex contagione & aere, aut ex humorum putredine in sanguine exorta. Hoc quidem infantibus accidere, sibi abas, vel ob lactis infectionem, vel ob eiusdem ingentem copiam, quum infans sua voracitate plus quam par sit exigit, quippe, quod eo oppressa natura, facit id in putredinem vertere possit, ac subinde morbis excutere perire de acerbis, quae vniusa vniusa sunt praeter naturam. Adolefcentes autem eundem vitio ingluvie & voracitate accersitis, quod inde obstructions, infarctus ac putredines oriuntur his morbillorum affectibus infestari censebas. Postremo causam cur Senes quandoque, sexagenarij morbillis infestantur pariter in cruditate reueiebant, non ex voracitate quidem, verum ex nativi caloris imbecillitate, & humidi sibi, antiscii (ut tuis utar verbis) defectu coquisitas. Haec erat summa vniusa argumentorum, quibus opinionem tuam, opinionem & veritate non desistere. Cui super, probasse putabas. Caterum istius argumenti maxime d. f. ut opinio nostra quod Galenus ipse tua vniusa sententia profus rejecta videatur. Quando quidem nutriti fœtus sanguine menstruo eo tempore, quo utero geritur, ipse luce clarus demonstrat, lib. 1. cap. 7. de Symptomatum causis, ubi dicit, sine pice quae praegnantibus primis mensibus accidere solet, causas recenset. Ibi enim modo nutriti fœtum bono sinceroque sanguine, sed etiam tractu temporis (ut postea dicam) vitioso ac malo. Quod post ipsum posteritatis memoria praediderunt Paulus lib. 3. cap. 1. Aetius vero lib. 16. cap. 10. Praeter ea hoc tibi aperit, sibi statur idem Galenus lib. 1. Aphorismorum, com. 4. d. b. de vena sectione, adversus Erasistratum lib. 2. de summe, cap. 1. ac etiam alius in locis. Cui subscribitur Avicenna Auenzarr, Haliabbus, & alii plerique Arabici familia auctores, quo fit, ut ubi dixerit Galenus nutriti fœtum purissimo ac praestantissimo sanguine explanatione sit opus. Nam mea sane sententia, nihil aliud velie Galenum semper putaverim, quam quod fœtus nutritur praestantiore purioreque sanguinis menstrui parte. Siquidem (ut Aristoteles inquit: libro primo, de generatione animalium & eum fortasse secutus Avicenna Libro tertio Fen. 21.) menstrui sanguis in foemina utero gerentibus in quatuor, natura officio, dividitur partes. Una enim transit simul cum semine ad ipsam procreandum fœtum, alia in ipsius transit nutrimentum tertia ad in amillu fertur (ut etiam Galenus testatur libro de sectione vena adversus Erasistratum) ubique in lac vertitur. Reliqua excrementum & superfluum est, quae in praegnantis corpore consistit usque ad horam partus. Id quod etiam fere Haliabbus sententia, lib. 5. Theorica, ubi fœtum nutriti sanguine menstruo puriore praestantioreque, remanentibus excrementis ad tempus sui ortus, apertissime facietur. Hic itaque, omnibus patet, sanguinem menstruum ab ipsius natura suis expurgari excrementis, adeo ut sine aliquo fœtus incommodo non solum fiat illi accommodatissima alimentum & in lac purissimum vertatur, sed etiam concurrat ad ipsius fœtus generationem, ut Galenus pariter testatur libro secundo, de semine, capite quinto. Et libro secundo, de natura albi facultati bus capite secundo & tertio, Libro de natura humana, capite decimo nono. Et libro tertio de vniusa partium capite decimo, quibus in locis id apertissime facietur. Quo fit, ut non solum nutritur fœtus, dum in utero manet sanguine menstruo, sed ut etiam ex eo exordium sua generationis ducit, una cum semine, eoque nutritur postquam editus fuerit. Quippe satis superque comprobavi esse censemus, luc in fœtarum mulierum vniusa ex menstruo gigni sanguine, quod non solum in infantibus primum praebeat alimentum sed etiam hectica febre, marasmusque affectus, suberrimum est, quinetiam ad alia corporis incommoda praestat, quae libens praeter eo. Quod minime praestare dicitur si ex venenoso sanguine ut tu imaginari videris generaretur. Quandoquidem si (ut inquit Gal. lib. 3. de alimentorum facultatibus) eos qui lac vel capra vel alterius cuiusvis animalis foemina, aut tithymalum depasti, cibi loco sumperint alii praestantissimo omnino officio debere, pari sanatione sequeretur ut omne periret, vel in magnum veniret discrimen, qui muliebri lac degustaverint, si ex venenoso sanguine fieret. Sed quum

Problema an... fans in utero tan gane mensiuo nutritur.

i. Ratio negatiua.

ii. Ratio.

III. Ratio

Menstrui sanguinis malitia.

III. Ratio.

V Ratio.

VI Ratio

Senes sexagenarij aliquando morbillis agrotare.

Responsio argumenti.

Fœtum nutriti praestantiori sanguinis menstrui parte.

Sanguis menstruus ad fœtus generationem concurrat.

Lactis muliebris facultas.

In caprarum tithymalum de partentium alium exolvit.

Sanguinem mē-
struum simplici-
ter venenatum
non esse.

Quare quidam
citius, quidam
tardius morbil-
lis afficiantur.

Sanguis mēstru-
us est vitiatu san-
guinis excremē-
tum.

An canes, qui san-
guinem mēstru-
um degustarūt,
rabidi fiant.

Sanguis mēstru-
us qui omnium
pessimus.

Vinum merum
& alia quaedam,
quæ in cibo sunt
lethifera.

Fœtus excremē-
titio sanguine
nutriti.

Auēzoharis fen-
tentia pulchra.

Morbillos fieri
ex menstrui san-
guinis alimēto.

Quæ plurimum
vitate fiant mor-
billi.

hoc nunquam (quod sciverim) euenerit, falsam omnino eorum sententiam existimauerim, qui sanguinem menstruum venenatum simpliciter esse crediderunt. Quo fit, ut sequi necessarium non sit, nasci debere infantum morbillis ac variolis suffusos, quamuis necessarium esse censeamus, editos omnes aliquo post tempore vis omni-
no affici debere, ut postea dicemus. Nec est quod putes necessarium, ut eo statim tempore, quo menstrui sangui-
nis venenosa vis in fœtus vasa concesserit, sanguinis efferuescentiam esse expectandam, quandoquidem (ut
præmissimus, & paulo post dicemus) menstrui sanguis non est, nec potest dici simpliciter venenosus, sed ex-
crementosus, & malitia quadam infectus: quibus non adeo afficitur natura, ut illi necessarium sit, statim in
sanguine efferuescentiam moliri, nisi sibi prius asciscat sanguis determinatum tum modum, tum gradum ca-
loris, sicut non ebullit mustum illico a vinaceorum expressione. Hic autem modus reducendi caloris ad actum,
non est in fœtu adhuc in utero existente, quin etiam nec in infante nuper edito. Latet enim calor suffocatus
conclusus, obtususque cum magna humiditate. Quum itaque per discursum ætatis acquiratur talis mo-
dus actuandi caloris, siue id intrinseca, vel extrinseca molietur causa, tunc fit sanguinis efferuescentia, & sub-
inde varioli & morbilli. Caterum quoniam huiuscemodi acquirenda dispositionis facultas, in ipso calore va-
riis diuersisque fit modis, nempe secundum infantium temperaturam, & regiminis ac æris diuersitatem, ea
propter euenire non ambigimus, ut etiam diuersis temporibus acquiratur huius caloris ad agendum facultas,
quo postea fit, ut aliquicitius, aliqui tardius hisce corripiantur morbillis. Præter id non negamus, quin san-
guis menstruus, qui quolibet mense per uteri venas fluere solet, sit quoddam vitiatu sanguinis excrementum,
quamuis nobis minime fuerit affirmandum, sanguinem hunc esse venenum, tum quia Galeno aliisque anti-
quis authoribus hoc nunquam (quantum legerim) memoria proditum sit, tñ etiam quia omnia, ea quæ in
medium affert, ad tuam probandam opinionem, nihil hac in re concludere videantur. Plura namque sunt
cotidiano esui idonea, quibus tamen, si vel nouella vires, vel insita, vel germina, vel fruges, vel alia quævis
plantarum genera inficiantur, eorum contactu illico arescant. Hoc enim præstant, præ cæteris oleum, acetum,
muria, quinetiam quam plurima reperiuntur medicamenta salubria, omnisque veneni expertia, quæ sup-
posita vel illita, abortum & sterilitatem faciunt. Quod item canes, qui menstruum sanguinem deuora-
uerint in rabiem agentur, ego quidem probare non auri, quum sciam non deesse mulieres, quæ non aliunde
causa Meliteos caniculos domi alant, quam ut, dum mensibus laborant, ea lingant excrementa, quæ con-
creta pudibundis partibus inhaerent. Nec proinde unquam euenit (quod certo sciverim) ut huiusmodi ca-
niculi, quos quidam ab officio cunnilingos appellant, rabiosi fierent. At concedamus canis, qui multo
mensibus degustauerint, rabie consistari, non quidem ob hoc unquam affirmare quis poterit menstruum san-
guinem esse venenum, quum idem faciant aromata quæ maxime profunt aduersus venena, nempe piper ac
Gingiber. Præterea non negauerim recentioribus quibusdam, ac etiam nobis, qui eorum placita sequuti su-
mus, memorie proditum esse, menstruum sanguinem præsertim biliosarum mulierum, ac facile rixantium,
eos, qui sumpserunt, variis afficere incommodis, ac Symptomatibus. Siquidem (ut ipsi fatentur) amentes, ac
lunatici ii plerunque fiant, sed non propterea dixerim ego sanguinem menstruum quocumque esse venenum,
quoniam veneni proprium est necare eum, qui sumpserit. Verum quum plura habeantur, quibus continuo
vescimur in cibis, quæ quandoque varios excitant morbos, quæ si fortasse negligantur, homines ad interitum
ducunt, ea inter delictoria medicamenta a nonnullis computantur. At quis ignorat vinum merum, passum,
aquamque potabilem non esse venena, neque venenosa medicamenta? & tamen a quam pluribus inter vene-
na relata sunt, quod sumpta liberalius, præsertim a coitu, balneo, cursu, vehementique exercitatione, homines
in magna trahant discrimina. Caterum esto, sanguinem esse venenosum, qui scilicet quolibet mense expelli-
tur a natura tanquam inutile excrementum, sed quum hic sanguis ab eo differat, quo alimur, dum utero geri-
mur, illico soluitur questio. Quod si quis obiecerit, non ergo generari morbillos ex menstrui sanguinis malitia,
cum ita purus a natura fuerit redditus, illi facile respondebimus, sanguinem illum non ita ad amissum ad pu-
ritatem sinceritatemque esse redactum, quin aliquid adhuc menstrua infectioni respiciat. In hac alia etiam ac-
cedit ratio. Quippe quum dicat Galenus libro primo, de Symptomatum causis, quod fœtus antequam redditus
ampliore eget nutrimento, & ob id euenire, ut non solum quicquid optimum in venis est, attrahat, sed ali-
quid etiam quod vitiosum est, palam omnibus fieri crediderim, fœtus omnes excrementitio etiam sanguine
nutriti. Ad hæc, si Auenzoharis sententia ad stipulamur, alio etiam modo sanguine menstruo inficitur.
Nam (ut ipse testatur) quum sanguis menstruus continue in uterum feratur, & in uniuersam eius substan-
tiam, ac corpus infundatur, nihil sane mirum fuerit, si infans ibi continuo permanens, a menstruo hoc sanguine
aliquam contrahat infectionem. Quandoquidem quamuis fœtilia vitro circumlita, non facile impositos
combibant liquores, tractu tamen temporis videmus, quod ipsos tandem combibunt, mediante fermenti qua-
litate, postquam ibi genitum fuerit & manserit diu, adeo, quod si post longam fœtilis ablationem, azymum cru-
dum panem in huiusmodi fœtile imposeris, sine aliqua fermenti mistione, ibi fermentationem accipiet, quod
minime consequeris, si in nouum fœtile conieceris. Quo fit, ut hoc facile etiam fieri possit in fœtu in utero de-
cumbente sanguine menstruo oppleto, a quo non leditur, tum quia uteri robur illum tuetur: tum etiam, quia
prestantia optimi alimenti Menstruali malitia resistit. Quibus omnibus palam iam est pluribus modis in-
fici posse fœtum materno sanguine, quamdiu in utero moratur. Quamobrem non ita facile nobis fuerit mi-
randum, quod scripserint Auenenna, Auenzohar, Halliabbas, ac alii etiam præclariores Mauritanii, mor-
billos, variolosque, plerumque, fieri ex menstrui sanguinis alimento. Quorum in uniuersam placitis refragari nemo
debet, qui magis sua modestia, sinceritateque, quam arrogantia ac temeritate consultum velit. Constat præterea
plurimum fieri morbillos, ac variolos ex menstrui sanguinis affectu, non solum quod aperte fateatur Auen-
zohar illud manifestissimum esse signum, quod scilicet pauci, vel nulli reperiuntur, qui in hunc non incidant
morbum, sed quod etiam hoc ratione comprobari possit, quum hic affectus in aliam causam, quam in prædi-
ctam reuerti nequeat. Quandoquidem ex ipso sensu omnibus palam est, hominem fere inueniri non posse, qui
hac lue non liberauerit. Huc accedit, quod etiam manifestum sit quam plurimos, imo fere omnes in prima æ-
tate, ad quimum, vel ad septimum annum usque in hosce incidere morbillos, adeo ut mirum admodum videa-
tur, si aliquando forte fortuna acciderit, ut aliqua communis sit causa, qua
eum non posset ascribi cause vsus lactis, eo quod lac humanum conueniat pluribus, non poterit igitur hæc cau-
sa

farei nisi in utero maternum. Nulla autem hinc potest esse causa communis, nisi materia mensurata sanguinis. Quis sit, et non sit amplius hac in re ambigendum. Nec obstat, quod aliqui inueniantur, qui plurimum ex exordia emittunt, laborauerunt. Quippe tametsi ipsi primo affecti sint causa materni sanguinis, tamen nihil prohibet, qui ipse tractu temporis, sterum atque iterum hac luce ex aliis etiam causis in meam aditus suscipiuntur corrumpunturq; Nam minime negant auctores, imo potius stipulantur, quoniam nulla ael variola, nisi alicuius in causis fieri possit. Reliquum est, ut meam proferam sententiam, an crediderim ego, hoc malo corripere senes quandoq; sexagenarios ob materni sanguinis causam, an ob putredinem ab eorum cruditate proveniente. Dixi enim ego ob ista mihi non esse mirandum, quod etiam senes possint morbillis variolisq; affici, materiam tantam infectione, cum maxime ex his, quae superius diximus, tum etiam quod scripserit Galenus lib. de cibis bonis & malis facci, & libro de curatione renum, quod quamuis quandoq; accidat, ut nulla ex frigidissimo potu iuuenibus sensibilibus accidat, lesio, euenit tamen et sensim, occulteque crescentem vitio, si manifeste laesionem sentiant, quum iam atas sensu progressu temporis accesserit. Quinetiam (ut auctores comprobant) quia canerabido demordentur, non omnes ante quadragesimum diem in rabiem aguntur, cum alii per integrum annum, alii per septem annos, alii ad quadragesimum usq; manserint, antequam in aliquod rabie incommodum inciderent. Potest enim inueniri corpus tam sincerum, tam robustum, tamque superfluitatibus vacans, & in quo plurimum caloris innati consistat, ut mirum non sit, si in tali corporis dispositione tam diu protrahatur ea sanguinis efferuescentia, quam diu perdurauerit innati caloris robur. Hanc quur ob causam rarissime sit, ut senes hinc morbillis inficiantur, quod tua opinioni maxime refragatur, qui omnes causas in cruditate ferere uis. Nam cum senes cruditatibus longe magis cateris scateant, sequeretur tua sententia, ut illi cateris omnibus plus morbillis, ac variolis essent obnoxii. Sed hoc sensibus repugnat, quoniam reuera ea corpora, quae inciora habentur, minus contagiosos experiantur morbos. Ea itaq; de causa pituitosa excrementa, ac cruditates, quibus senes fere omnes ex accidenti abundant, rariis contagiosos excitant, morbos. Sed antea in aetate infirmitates, deffusiones, tu fies, articulorum dolores, vertigines, apoplexias, & alia plura incommoda, quae tubens praetereo. Potuissim plura etiam adducere, & auctorum sententias hic integras alius connectere, sed ne longior fieret oratio, quam res ipsa exposcat, illa omnia silentio inuoluenda duximus, Vale.

Quia de causa quidam plures morbillis afficiuntur.

Auctoris opinio de morbillis affectis.

Quia canerabido demordentur, non omnes ante quadragesimum diem in rabiem aguntur.

Cum senes raro morbillis afficiantur.

GASPAR NOEVIVS, ILLUSTRISSIMI Saxoniae Ducis Electoris, Augusti Medicus, Petro Andreae Matthiolo Medico S. P. D.

Admonetur Matthiolus de quibusdam plantis, in quibus ab ipso dissentit Nauius, nempe, de Scorpioide Polygala & Cytiso.

40 **H**is ex doctissimis tuis in Dioscoridem commentariis, in quibus rem herbariam communi studiorum fructu, stylo eleganti, ac in perstringendis aliorum erroribus modesto summa cum laude tua, industria singulari, pra alius hoc saeculo exornasti, mihi non vulgarem de praestantia tua humanitate spem, & ex predicatione quoque aliorum concipiebam semper, antequam te uissem, quae excitus cogitabam ignotus etiam, tibi que splendore nominis, ac fama doctrina impar scribere ad te, de nonnullis in simplici medicina, de quibus ambigebam. Tamen eam ipsam longe nuper superasti, Praga tecum cum essem, uir doctissime praestantissimeq;. Cum enim ex Thaddaeo Nemico communi, cupidum esse tui, amicitiamque tuam ambire me in via cognosceres, declinasti posthabitis tuis negotiis & vestigio ad meum hospitium, meq; ita excepisti, ita complecti es uisus, ac si longa tibi consuetudine iunctus fuissim. Collocutus uero es mecum de studiis tuis communibus, ea humanitate, ut ad inuestigandum, quae tui desiderabam, uidebaris me quasi inuitare excitareq;. Caepi itaq; fretus illa, conferre tecum, & pro natura mea liberius fortasse, quam me deceit, aut tua etiam admittit auctoritas, de picturis nonnullorum simplicium in commentariis tuis, non me hercule ostentandi ingenij causa, multo minus, ut te uirum doctissimum dicerem, Quid enim (quod dici solet) sis Minervam? Sed studio potius indagande ueritatis, cuius uide te effudit doctissimum, & praecipue de pictura, quam Dioscoridis capiti Scorpioidei iunxisti, motus forte simile uineae corniculorum in imperfectione descriptionis eius herba, cum illa Telephi capiti congruere potius mihi uideatur, cum ob similitudinem multarum notarum tum uero ob facultatem quoque, quam non exarscientem, ut ex Galeno astruis, sed cum adstrictione frigidam reperio in illa planta. Crescit enim apud nos nunc uertim, ex illo semine quod ex pago Saxo uocato prope Bononiam collegi, ac mecum decimum tuli, una cum Polygala, quam exiccata propediem ad praestantiam tuam mittam, cum animaduertam ex commentariis tuis, & illam tibi uisam non esse. Dicebam praeterea Cytisum Dioscoridis cum picturam nullam capiti iunctam uiderim in commentariis tuis illam uideri mihi, quam officina uulgo Melilotum appellant, nec moueri me, quod fruticem illam Dioscorides appellet, quem proprietatis lingua Graeca, hominem quippe militarem & in castris degentem, studiosum parum fuisse, & Galenus testatur, & exemplis, ubi frutice pro herba fit usus, confirmari potest, quamuis & eandem in agro Patauino in quatuor aut quinque cubitos exurgentem frutescentemque uiderim. Hac & alia tu pro singulari tua humanitate modestaque praeter morem nonnullorum, omnia pro auctoritate sua, praeter rationem, etiam mordicus uentum, cupide audiebas, nec ratione adductus, auersabaris. Et cum auctiorem picturis Dioscoridem propediem te daturum promitteres, rogabas etiam pro modestia tua, ut contemplatis collatisque singulis picturis cum capitibus suis, si quid reperirem, in quo rationibus quibusdam a te dissentirem, id ad te ut perscriberem. Et quamuis

D. Scorpioide esse Telephiura.

Polygala.

Cytisus Dioscor. est Melilotus officin.

mibi iudicium de cultissimis doctissimisque tuis scriptis non sumo, sum enim ab arrogantia illa, ut quimaxime, alienissimus. Quia tamen studiis in hoc genere tuis valde fauco, teque ob illa & veneror & colo, pollicitus sum, si quid apud nos, aut in Saxonia ad iuandum conatum tuum pulcherrimum utilissimumque reperiri possit, me pro testificanda obseruantia gratitudineque summa voluntate missurum. Erant & alia de quibus tunc libenter tecum contulisset, tum in simplici medicina, tum in aliis artis nostra problematis, mihi que dubiis, & non sine fructu, ut sperabam tua consuetudinis. Sed quia negotia tua utrisque & mihi quod querebam, & tibi quod cupiebas, tum peragere non permittebant, reieciimus illa in tempus aliud, meque ut per literas, de quibus basitarem, tecum agerem, amanter es cum sollicitatione responsionis haud grauate cohortatus. Pro qua humanitate, quod me colloquio tuo doctissimo literarum dignaris, eas, quas meritus es, gratias maximas ago. Et cum mihi studiisque meis in excellenti tua doctrina subsidii plurimum positum in posterum existimem, scribam ad praestantiam tuam de nonnullis cum Hebraeo nostro singulis mensibus ad vos eunti, fecissemque hactenus, nisi crebris ab eo officio peregrinationibus fuisset impeditus. Thaddaeo vero nostro reuertenti ad te has literas dare volui, te, te mea obseruantia, ut intelligeres memoriam tui me reuerenter conseruare. Adiunxissem & literis portiunculas metallorum nonnullorum, nisi se ante sarcina librorum grauatum, excusasset, sed feret illa Hebraeus & propediem Fratrem tuo nomine, ut voluisti, salutari, is summis votis tuam exoptat amicitiam, iussu te obseruantia summa resalutare. Desert autem tibi studium & voluntatem suam. His vale vir clarissime doctissimeque, ac praestantissimum Medicum Gallum collegam tuum officiose nostro nomine saluta, ac Nennios tui studiosissimos, teque ob eruditionem excellentem suspicientes, commendatos habe. Dresda, vicefimo octauo Ianuarij. M. D. LVI.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
 medicus Gaspari Nœuio medico
 S. P. D.

Respondetur ad Nennij epistolam, & eius sol-
 uuntur Quaestiones.



Dibus Febr. iucundissimas ac pariter humanissimas literas tuas reddidit mihi Thaddaeus Nennius, & tibi & mihi amicitia coniunctus, qua quidem tanto opere me delectarunt, ut explicare satis nequeam. Tanta enim humanitate modestaque mecum agis, tot laudibus labores nostros extollis, tantaque animi propensione (qua tua est benignitas) me prosequeris, ut tamen si meam omnem impendam operam, ut propter haec tibi gratias tum agam, tum etiam habeam, non ita tamen, ut velim, hac in parte mihi satis facere videar. Nec sane opus est, ut me tanta humanitate beneficiis collaudes, quod ad hospitium tuum, tui tantum inuisendi salutandique causa accesserim, cum longo plurimum me tibi debere sciam, ob tuam illam mei cognoscendam voluntatem ac animi tui erga me beneuolentiam, quibus me tam humaniter complexus & prosecutus es. Nam nihil gratius, nihil charius, nihilque suauius mihi accidere potest, quam ut doctissimos, eruditissimosque viros, in quorum albo iam dudum te descriptum habeo, sapius inuisere, & eorum amicitia, ac consuetudine frui possim. Quotiescunque enim eorum colloquio familiari me interesse contingit, simul cum mirifica voluptate, non mediocrem eruditionem hinc discedens asporto. Quod etiam eo paruo temporis spacio, quo tecum hic eram mihi euenisse animaduersi, quum plura, quae iam diu obliuioni tradideram, mihi in mentem cum mira suauitate reuocares. His accedit magna ingenii animi tui liberalitas, siquidem non solum varia medicamenta, nunquam mihi antea visa nec cognita, contemplanda ac inspicienda exhibuisti. sed etiam horum aliquam partem, cum aliis quibusdam non contemnendis muneribus nobis donasti. Postremo cum terrogarem, ut iudicium tuum de commentariis nostris in Dioscoridem, & plantarum iconibus nobis significares, cum magna dexteritate, ac singulari candore id praestitisti, ac deinde eandem sententiam licet modestissimis grauisissimisque ad nos perscripsisti. Quo fit, ut cognoscam me longe plura, ac maiora tibi debere, quam prestare possum. Miraris autem primum & tibi rem nouam videri significas, quod Scorpioidis capiti (tuis enim hic verbis utar) plantam adiunxerim, motus fortasse cerniculum similitudine in imperfectione descriptionis illius herba, cum tamen illa Telephus capiti congruere potius tibi videatur, cum ob similitudinem multarum notarum, tum vero ob facultatem quoque, quam nec excalfacientem, ut ex Galeni sententia astruo, sed cum adstrictione frigidam reperis in illa planta. Haec tua sunt, qua tamen quantum faciant quantumue valeant contra sententiam nostram, nunc sibi palam fiet. Scias itaque, velim, talia mihi iam diu obieciisse quosdam doctrina & ingenio clarissimos, quibus quum responderim, demonstrauerimque ipsos in errore versari, nil deinde ulterius voluerunt obicere. Verum ne his tantum verbis censeas meo me velle tueri sententiam, audias (obsecro) quibus contrate nitatur rationibus. Dioscorides de Telephio scribens ultimo capite secundi libri sic habet. Telephium herba est Portulaca similis, & caule, & folijs, alas binas in singulis foliorum geniculis. Ramuli a radice seni septemque prodeunt, folijs referti ceruleis, crassis, lentis, carnosiss. flore luteo aut candido. Nasitur in cultis, & maxime circa vites tempore verno. Hac ille. Quae si perpenderis, & Telephii notas cum Scorpioides nostra comparaueris, facile sane conicies in Scorpioides illa nullam esse notam, quae cum Telephio conuenire posset. Siquidem primum Scorpioides illi nulla inest Portulaca cognate similitudine: nam haec folia sunt pinguis, lenta, ac crassa, quae & eius ramuli pingues, leni, crassique spectantur, quae tamen in Scorpioides nostra omnino desiderantur, quae tenuissimis, macerrimisque, tum folijs, tum canthibus constat. Praeterea Telephio addit Dioscorides alas binas in singulis foliorum geniculis, quae sane in Scorpioides nostra nusquam

Obiectio in
 Scorpioide.

Responso.

Telephii descri-
 ptio.

Scorpioidem &
 Telephium ma-
 xime inter se di-
 stare.

- nusquam obseruare licuit. Præter id Telephii ramuli foliis referti sunt, Scorpionis vero cauliculi foliis admodum paucis vestiuntur. His accedit neminem extare (quod sciverim) qui scripsit Telephium corniculos edere Scorpionum caudis similes. Quos ut nullus (quod viderim) notis comprobari possit, plantam, quam pro legitima Scorpionide appinximus, legitimum esse Telephium. Caterum quod Scorpionis conveniat, nostra hæc imago, attestantur corniculi, qui Scorpionum caudas per omnia referunt. Quinetiam folia, qua in ea planta paucarumque visuntur, adeo ut (quemadmodum Dioscorides inquit) eam potius herbulam, quam herbam appellare liceat. Nulla enim vera ratio præ oculis sese offert, qua conucere possim, duci eos, qui aliter sentiunt, nisi fortasse vocabulorum similitudine decepti (ut quandoque fieri solet) Telephium pro Telyphono accipiant. Nam cum hæc planta Scorpionem etiam dicatur a radice, quæ Scorpionis caudam refert, & Scorpionum
- 1^o istibus aduersatur, credidere fortasse plura negligentes, nostram Scorpionidem legitimum esse Telephium. Ad ea autem qua dicis hanc plantam Scorpionidem esse non posse, quod Scorpionides Galeno ex tertio sit ex calfacientium ordine, hæc vero quæ nostris commentariis appinximus, frigida & adstringens gustu, vel etiam fortasse experimento deprehendatur: Respondeo. Quod nec Telephium esse potest, cum Telephium fecerit Galenus ex primo ex calfacientium censu. Verum (ut ingenue dicam, quod sentio) cum huiusce herbula nota notis omnibus (ut prædiximus) Scorpionidi respondeant, crediderim potius euenire cæli vel soli causa, ut ea in regionibus nostris, præsertimque in Germania nullum coloris signum præferat, quam quod adulterina dici debeat. Siquidem (si Galeno credimus) ut Arum Cyrenis omni penitus acredine vacat, & vaporum modo gustu dulci deprehenditur, contra vero in Italia acerrimum. Et ut Chelidonium minus, e conuerso in Italia omni penitus acredine vacat, in Græcia autem adeo sit acre, ut in tertio ex calfacientium ordine illud reposuerit Galenus,
- 2^o facile etiam in Scorpionide Italico vel Germanico id euenire posse crediderim. Nam, ut Theophrastus etiam inquit: loci à locis differunt. Quamobrem nihil me mouet facultas, quam huic herbula inesse scribis, præsertim cum illam viderim, probauerimque nullam cum Telephio habere similitudinem, contra vero Scorpionidi maxime conuenire. Habes itaque & rationes & auctoritates, qua me compellunt, ut credam herbulam hanc Telephium esse non posse, imo nec quamuis aliam plantam præter legitimam Scorpionidem. Verum enim vero nihil gratius mihi facere poteris, quam si mihi afferas rationes, quibus sententia nostra refragari, ut si forte me in errore versari nouerim, possim te duce veritatem agnoscere. Nunquam enim cum ratione pugnare soleo. Non est præterea quod mireris te Polygalam nostris commentariis appellatam non adinuenisse, nec ob id putes velim plantam quam pro Polygala quamplurimi rei herbaria studiosi usurpant, me non vidisse ac etiam gustasse, ac sæpius fuerit ad manus. Verum, cum tam paucis notis à Dioscoride describatur, ut arduum sit ne dicam impossibile, plantam hanc de qua loquimur legitimam facere Polygalam, non placuit illam nostris commentariis adscribere. Nolim tamen ob hoc ut a tua recedas opinione, nec ut adeo refrigescas, quin eam quam præ manibus habes, ad me (ut polliceris) mittito. Siquidem si præter id quod folia habet lenticula lac etiam prouocare copiosum tibi experimento constet, eam nostris commentariis adiungere haudquaquam verebor, te maxime auctore. Porro ad id quod de Cytiso scribis nihil aliud respondendum habeo, quam quod si ea que de Cytiso scripsimus, paulo diligentius perlegisses, nouisses quidem Cytisum fruticem vel potius arbusculam esse, quam herbam. Versabar enim & ego iam dudum in huiusmodi errore, nec aliud putabam esse Cytisum, quam vulgare Germanorum Melilotum, quod nos tribulum & equinum trifolium appellamus. At quum tracta temporis rem diligentius examinarem reperissemque Galeno, Columella ac Plinio Cytisum esse arbusculam, non potui, in tantorum virorum non ire sententiam. Verum cum nulla usquam mihi sese obtulerit
- 3^o planta qua legitimum Cytisum præ se ferre videretur, non licuit eius imaginem suo loco demonstrare. Caterum cum alia adhuc te habere scribas, tum in re herbaria, tum in aliis rei medicae problematis, de quibus mecum libenter contulisses dum hic eras, nisi temporis angustia id vetuisset, rogo atque etiam obsecro, ut quod ores tunc narrare non licuit, per literas nunc ad me scribere velis. Nec tamen id facias velim quod in re Medica herbariaque me adeo versatum existimes, ut omnia de quibus dubitas, explanare ac interpretari valeam, quum talis sane non sim, quod hoc fortasse, ut putas, ita præstare possim, sed ut a te excitatus doctior euadam. Hebraeus ille per quem Metallica nonnulla ad me mittere tuis literis pollicebaris, ante Thaddæum (ut audio) huc se contulit, nec aliquis tuo nomine mihi presentauit. Quamobrem te rogatum velim, si tamen id absque tui incommodo fieri possit, ut metallica illa per illum vel per alium ad me mittere non differas. Cupio enim in fossilium historia aliquid præstare, ob idque mecum ipse decreui hoc anno, mense Maio vel Iunio ad vallem, quam Ioachimicam vocant, me conferre. Audio autem Agricola doctissimum præstantissimumque virum, qui in indaganda metallorum historia, hac ætate, præ cæteris splendet, iam suum ultimum obiisse diem, quod sane mihi multum molestia attulit, cum decreuissem hac ætate ex hisce Metallis ad eum diuertere. Auxit præterea molestiam quod a Nemico audierim, tam præclarum probumque senem, qui patria sua plurimum auxit decorem, illinc tantum solinò adinuenisse, quo suum posset operire cadauer. Proh Di immortales. Est ne hoc Christianæ religionis institutum? Estne hæc charitas illa Christiana, quam nunc proficitur vniuersa fere Germania? Nescio profecto quid dicam, nisi quod ubique iam sint plena dolis ac similitatibus omnia, & ubi ista sunt, Christus non est. Bilis ita me scribere coegit, cum omnino inhumanum sit talia exercere facinora in probos ac doctos viros, & præsertim ubi non in eos viuentes, sed in eorum cadauera tam vilis exercetur vindicta. Sed cur hæc mecum forsitan dices? Non alia sane responderim, ratione, quam ut cum homine virtutibus admodum prædito lugeam præclarissimi Agricola miserrimum finem. Reliquum est, ut clarissimo fratri tuo agas meo nomine gratias, pro tanta eius in me animi propensione, dicasque illi velim ac etiam ut pollicearis rogo, me illi futurum perpetuo amicum. Cupio enim tantum amari ab illo, quantum à me ille amatur & obseruatur. Clarissimum Doctorem Gallum & fratris & tui nomine officiosissime salutans, qui econtra gratias agit, & vos pariter resalutat. Vale vir optime ac doctissime, & me ama. Nam a me non solum adamari quamplurimum, sed etiam obseruari. Præg VII. Calendarum Mart.

M. D. LVI.

IOANNES HESSVS NORIMBERGEN-
 sis Medicus, Petro Andreae Matthiolo,
 S. P. D.

Proponuntur Quaestiones aliquot simplicium medicamentorum, nempe Cardamomi, Gelsomini, Succini, Salsa Parilla, Glycyrrhiza, Hyosciami albi, Aluminis, Halosanthis, Lapidis Marochii, & aliorum quorundam.



Vanquam mihi nulla haecenus tecum intercesserit familiaritas, tamen propter diuinum illum laborem, quem non solum interpretatione Dioscoridis, sed potius omnium, qui de medica materia scripserunt, praestitisti, semper sum te admiratus, optauique ex animo, dari mihi occasionem contrahendi aliquam tecum amicitiam, ut a te per literas, si quid scrupuli in hac materia occurreret, doceri & erudiri possem. Postquam autem ad nos venit Dominus Hieronymus Donzellinus, Philosophus & Medicus doctissimus, tuique studiosissimus, non tantum raram tuam eruditionem, de qua iam antea ex tuis Commentariis eram certior factus, sed singularem etiam humanitatem, erga omnino sum moperere praedicans, hoc meum desiderium longe magis auxit, & tandem perfecit, ostensis etiam tuis literis, in quibus hoc videbaris petere, ut deposito omni pudore, has ad te literas exararem, ut de his, de quibus haecenus dubitarem, erudirer.

Cardamomum.

Cardamomo vero quam Arabum, tam Graecorum non puto nos omnino carere, ut autem rectius possis de hac re iudicare, mitto ad te duas species Cardamomi a Serapione descriptas: Maius videtur omnibus notis descriptioni conuenire: Minus est maiori simile, sed substantia subtiliore, non habet caput respectu maioris, sed grana habent corticem, vel forte dixit carere capite. Nam quanquam sit inter illa species frequentissima, tamen rarissime suo cortici inclusa adfertur. His addidi & tertiam speciem, qua forte ad Cardamomum Dioscoridis referri potest. Mitto tibi etiam verum Galeni Carpesium, ut puto, vides enim fructum hunc esse quasi tenuia virgulta, & odore Phumitari.

Carpesium.

Gelsominum.

Gelsominum vulgo dictam plantam, ab Arabibus Iesemin esse dictam, quod flores odoratos albicantibus alba viola modo proferat, & ex eo unguentum Iasmininum Dioscoridis esse parandum, ut credam, mouet me authoritas Serapionis, qui omnes vires a Dioscoride descriptas attribuit suo oleo Zambacino: opitulatur corporibus, quae calefactionem & discussis humoribus laxationem desiderant, grauius etiam spirat, ut quibusdam e naribus sanguinem eliciat, quae quidem Leucoio albis floribus minime competunt.

Succinū esse bituminis speciei.

Succinum non esse aliud, quam bituminis speciem, ex quibusdam scopulorum crepidinibus erumpentē & tandem in mare defluentem cum Agricola sentio. Quod & Nicias sensisse videtur, cum dixit, Succinum esse succum radiorum solis. Nam ab, quae dubio non putauit, quod hic succus ipsis solaribus radiis, nihil praeter qualitatem existentibus insit, sed quod radiorum feruore, pinguis ille terra sudor, foras eliceretur, quod plerisque in locis etiam in liquido bitumine videmus. Archelaum vero falso affirmasse, quod sit succus arboris, manifeste ex natura rei comprobari potest. Cum omnes tales succi aquea sint natura, quare etiam si solis aut ignis calore densentur, aqua tamen qualicumque, infusa, statim dissoluuntur. Cuius contrarium nostro Succino accidit, quod liquidum in mare influens statim densatur. Nec esse arboris Resinam glebarum forma, soliditas & magnitudo satis ostendit. Plinius scribit glebam allatam esse Romam 13. librarum pondere. Nos vero scimus nostra memoria repertam esse glebam septendecim librarum & unciarum quatuor. Quibus accedit quod est fossile, ut etiam Philemo rectissime sentit. Nam & nunc quoque inter arādam grandes gleba eruuntur, mutis a syluis & lutore passuum millibus.

Salsa parilla est Smilacis speciei.

Salam parillam, esse speciem Smilacis aspera, ut credam, historia & vires, quae subscribam, memorent. Retulit mihi aliquoties doctissimus vir, & rei herbaria peritissimus D. Lucas Ghinus praceptor meus, omnium quos unquam habui, fidelissimus, Ducem Florentinum habuisse in sua aula nobilem quendam Hispanum, qui cum aliquando negotiorum suorum gratia, in patriam esset profectus, ut rediret Domino suo gratior, secum attulisse varia illius regionis dona apud nos rariora, & inter alia integram illam cum radice plantam. Sagacissimum igitur Ducem, ut intelligeret, an hac planta etiam in Italia proueniret, vocasse se Ghinum & alium quendam Medicum, cuius nomen excidit, illosque communi iudicio statim agnouisse esse herbam, a Dioscoride sub nomine Smilacis aspera descriptam: quod etiam euentus comprobauit. Nam postea radicis Smilacis aspera decocto, in curando morbo Gallico, sicut ipse interfui, Lucas Ghinus magna cum laude usus est, quem postea alii in Italia Medici sunt secuti, ut Roma D. Gibertus Horschius Flander, qui singulis annis ad hunc usum ex vicinis locis & Regno Neapolitano, ubi copiosissime nascitur, ita ut viderim sepes ex ea confici, magnum acerum huius plantae sibi curauit colligi. Neque hoc est a sententia Dioscoridis alioquin, qui hanc plantam inter Alexipharmaca recenset. Hanc eandem historiam aliquando recitabat in lectione D. Fallopius, addebatque se huius diiudicationi interfuisse, quod tamen Ghinus negabat. Et quanquam aliqua appareat inter has radices differentia, Hispanicam scilicet & Italicam, quod Italica sit lenior & nodosa, Hispanica vero rugosa: Tamen ante paucas septimanas apud D. Paulum Ellingerum primi apud nos nominis Materialistam, ut vocant, tales radices nihil plane ab Italicis differentes, una cum aliis mercibus ex Hispania allatae sunt sub nomine Salsa parilla.

Smilax aspera duplex.

Glycyrrhiza vulgaris non est Dioscoridis.

Glycyrrhizam vulgarem, non esse plantam eam, quae a Dioscoride depingitur, hinc satis patet, quod haec vulgaris sterilis sit. Dioscoridis autem fructum ferat, magnitudine pillulis platani similem, asperum, qui si liquas lentinum modo ruffas habet & paruas. Nascitur autem in vicinis locis apud nos, vulgari per omnia similibus, nisi quod seras fructum illum asperum, quem ad te mitto. Et propter hanc fructus asperitatem, puto hanc plantam inter aculeatas a Plinio esse connumeratam.

*Hyoſcyamū album iam per tres annos habui in meo viridario, habet folia rariora & molliora, quā uigila-
ria ſios est candidus parum ad flauedinem tendens eius figura ſatis commode eſt expreſſa in Dioſcoride. Anno
1549. Francofurti cum figuris impreſſo.*

Hyoſcyamus al-
bus.

Alumen.

*Aluminis ſpecies omnes Puteolis cum D. Bartholomæo a Miranta diligenter inquiſiui, & inter alias
reperiui ſpeciem liquidis aluminis, albo quidem colore ſed flauoſcente, ſpirantem odorem caſei putridi, que
manibus lenteſcit. Quare ſape ſum ſuſpicatus leſionem Græcorum codicum, qui legunt. Τυφώδες, uerſiorem eſ-
ſe lectione Pliniana, qui legit τυφώδες, quem omnes ſane interpretes poſtea ſunt ſequuti. Cum hac ſcriberem vo-
lui reuiderere illam aluminis ſpeciem (nam eius portionem aſſeruo) & inueni non tantum amiſſiſſe odorem, ſed
maiorē eius portionem eſſe mutatam in Alumen plumoſum, ita ut manifeſte appareat, ex alumine liquido
10 proceſſu temporis fieri plumoſum, ſicut etiam ex plumoſo fit ſciſſile, quod antea obſeruauimus.*

*Halofanthos eſſe illud medicamentum, quod inepto & fabuloſo nomine nunc in officiis ſperma ceti vo-
catur, una cum D. Valerio Cordo, qui primus huius ſententiæ author fuit, ſentio. Habet enim omnes notas a
Dioſcoride & Plinio ſuo Halofantho datas. Reperitur in ſtagnis mari adiacentibus, & per conſequens etiam in
Nilo, quod tot oſtus in mare inſluit, odorem gari habet, pingue eſt, & totum in oleo reſoluitur, mordax eſt, &
ad colorem croceum uergit. Quod maxime uerum eſt de hoc medicamento nuper e mari extrahto, nec adhuc
loto. Nam cum nunc hoc medicamentum eo exiſtmetur præſtantius, quo eſt candidius, certe nunc lauanti, ut
aliquo modo colorem & illam acrimoniā deponat, ſicut Cordus in quodam tractatu de hac materia ſcripto,
elegantè & doctè oſtendit.*

Halofanthos eſt
ſpermaceti oſſi-
cin.

*Lapis Morochtus reperitur circa Bononiam, ubi etiam uulgo uenditur, cuius portionem, quam inde tu-
20 li, adhuc mecum habeo. Hæc ſunt de quibus expecto accuratiſſimum E. T. iudicium.*

Lapis Moroch-
tus.

*Petit porro a me nomine tue Ex. D. Donzellini Catalogum mearum plantarum, quod quidem primo
illi reuſui, cum ſcirem, quam rude eſſet chaos ſine omni ordine & delectu congeſtum. Nam non ſolū hæc plan-
tas collegi, ſed communem operam præſtiti mihi egeſus Medicus D. Iohannes Prunſterius, qui ante paucos
annos obiit. Hinc factum eſt, ut unica planta decies aliquando ſit repetita, prout eam in diuerſis locis inueni-
mus. Hæc accedit quod aliquibus impoſuerim nomina, ut tunc eram inſtruetus, de quibus nunc plane aliter ſenti-
tio. Tamen cum inſtaret, malui inſiſtente apud te, reus fieri, quam quicquam quod poſceres, negare. Hæc bene uale,
& ut meæ ineptias boni conſulas, meque tibi commendatum habeas, oro & obteſtor. Data Norimbergæ die
Purſificationis Mariæ. Anno a Virgineo partu. 1559.*

30 PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Ioanni Heſſo Medico, Norimbergenti,
S. P. D.

*Soluuntur propoſitæ quæſtiones, quæ in præcedenti episto-
la continentur.*

*40 Cæpi humaniſſimas literas tuas, ad 15. Calend. Martias, quibus, quod hætenus non reſponde-
rim, non in cauſa fuit, quod reſpondendi argumento deſtuerer, quo plane abundabam. Sed
cum maximis occupationibus implicarer diſtinererq; ac ſcirem tua ſcripta cuiſmodi eſſe, quæ
mihi ab omni cura, & negotio uacuo cum diligentia & attentione legenda ac ponderanda eſ-
ſent, diuiniſſimè poſitionem diſtulit. Ac quidem uix tibi exponere poſſum, quantum voluptatis qua-
tumque iucunditatis ex literarum tuarum lectione ceperim, neq; id uero ea ſola de cauſa, quod ſupra omnem
expectationem meam, tam doctum uirum & rei plantariæ tam peritum, meæ ſcriptis amicum mihi compara-
uerim, ſed etiam quod ab illo plura edoctus, & rebus a me prius nuſquam uisus humaniſſimè donatus. De iudi-
cio uero, quod tibi ego præ cæteris in plantariæ facultate Medicæq; materia præſtantior uideor (quando hoc
ita accipio, ut id tui potius erga me amoris iudicium eſſe putem, quam ullius meæ doctrinæ, ac uirtutis teſtimo-
nium) habeo tibi magnas gratias. Cumq; talis uiri beneuolentiæ ſatis mihi pro illuſtri teſtimonio ſit, magnifi-
cio ſane ſinceram amoris erga me tui uoluntatem, tibi que parem offero, ac polliceor animi mei candorem.
50 Nam nihil me magis allicit, uel potius rapit ad amandum, quam amoris erga me ſignificatio, quæ cum in re
ex tuis literis non mediocriter appareat, multa que ſint præterea, quæ ego in te non probem ſolum, uerum etiam
admirer, nemini admirationi eſſe debet. ſi tua amicitia nihil mihi eſſe gratis affirmauerim. Fateor enim in-
genue, niſi tibi tam fuiſſe unquā in uotis, quam eorum amicitia ſui, qui eo officio ſuam mihi ſinceritatē de-
clarent, quo poſſim ſi, quid in meis ſcriptis aberratum, uel prætermiſſum fuerit, id totum reſtituere, ac etiam
ſupplere. Quod cum a te mihi impartiri uideam omni cum affectione & humanitate, eaque beneuolentiā, &
amore, ut meos labores non ſolum iuues, ſed etiam plurimum ornas: uelum quidem ita mihi fauere fortunam, ut
poſſem tibi aliquando eas referre gratias, quas habeo ſane plurimas, quo tibi palam facere poſſem, quanti faci-
am tuam in me liberalitatem & animi tui candorem. Quod uero te ad me ſcribere ſignificas, ut de quibusdam
60 dubiis confirmeris ac erudiaris, ſingulari candore te id facere uideo. Nam eſi ea doctrinæ ac peritiæ in medica
facultate præditus ſis, ut uix a me doceri poſſis, tamē collationē ſententiarum ac opinionum inter doctos uilem
ac neceſſariam eſſe exiſtimas. Gratiffima itaque nobis tua hæc uoluntas fuit, quæ dexteritatem iudicij & animi
candorem patefacit. Nunc igitur ad ea, de quibus te dixit are aiſ, reſpondebo.*

*Tua de Cardamomo ſententiā mihi ſane noua non eſt, Ego uero, qui rerum ſcriptoribus adeo inherere
ſoleo, ut difficile illinc abiaci queam, niſi ueris ac probatis rationibus perſuaſus, non potui hætenus in hanc
concedere opinionem, ut cum plerique aſſeuerarem, hoc nouum Cardamomi genus, cuius iam pridem omnes
apud me ſeruantur ſpecies legitimum eſſe Arabum, uel Græcorum Cardamomum. Siquidem Serapionis ut
de Arabico primum diſſeram) maiori Cardamomo requiritur, ut eius capita roſarum capitibus ſimilia ha-
beantur, in quibus Bacca concludantur, Loti arboris baccæ magnitudinē æquales, quæ intra ſe granam parua &
anguloſa*

Matthioli ſentē-
tia in uulgaribus
Cardamomo.

- angulosa concludant: id quod in huiuscemodi Cardamomo nostro reperire nequeo. Nam prater id, quod eum enuolucrum potius bulbum, vel ficum forma referat, quam rosarum capitulum, nullum intra se granum vel baccam concludit, loti arboris parem, in quo parua illa granula afferuntur sed granula ipsa angulosa simul coherentia intercursantibus tenuibus membranis, quibus pariter circumuestiuntur, ut passim in punicis mabo cernitur. Ideoque nescio quo pacto possim a mea recedere sententia, nisi quis me in hac facultate prestantior, firmissimis argumentis, vel in hoc conuenerit, vel ostenderit, Serapionem sui Cardamomi historiam minus recte descripsisse. Id quod difficile probari posse crediderim, cum a nemine (quod extet) praterquam ab illo, ita aperte describatur: cui tamen videtur subscribere Auicenna, cum inquit: Magnum Cardamomum est, sicut cicer nigrum, quod cum frangitur, ineriori habet granum album mordicans. Quippe loti arboris Bacca, parum a Cicere magnitudine distant. Idem pariter sentio de minori. Quippe quod Serapioni Cardamomum minus nullo concludatur capitulo, sed ita semina ut pleraque alia nuda orientur. Idcirco si per notas a quam ferenda de omnibus sit sententia non video, quo pacto a qui indices me damnare possint. Si qui vero coniectura aliqua aliter censerent, iis ego ad stipulari non possum, nisi cum illis mihi persuadeam, Serapionis coniectura mendam inesse non minimam, vel eundem fortasse id ex aliis authoribus transcripsisse minus fide dignis. At qui quum hanc coniecturam comprobare nequeam, non mihi videor deliquisse, si a te quemadmodum, & a ceteris, qui ita sentiunt, in hoc hactenus dissenserim. Nihilominus non ita sum opinionioni mea addictus, ut inde auelli non patiar, ubi abste viro sane doctissimo, efficacioribus argumentis me conclusum cognouero. Praterea non est quod credam, Cardamomum hoc cum Græcorum Cardamomo comparari posse, e ratione, ut quis putet, fortasse nihil ab eo differre. Quippe quod Dioscoridi Cardamomum nullo concludatur inuolucro, sed semen sit plenum, frangenti contumax, gustu acre, subamarum & odore caput feriens, qua quidem nota, prater acridinem (quantum video) in Cardamomo isto non reperiuntur. Siquidem facillime frangitur, nullam respicit amaritudinem (qua Galeno adeo conspicua esse videtur, ut ea de causa vermes necare asserat.) nec odoris violentia caput inuadit, imo potius suauiter fragrat odore. His accedit Plinii autoritas, qui Cardamomum Amomo simile facit, semine oblongo, quinetiam eodem modo meti scribit in Arabia, quo sit, ut mihi prorsus persuadeam, Græcorum Cardamomum, Amomi modo racematim oriri, non hisce tegumentis conclusum.
- Cardamomum Plinio Amomo simile. G. æcorum Cardamomum Amomi modo racematim prouenit. Carpesium quid.** Siliquas nigras racematim coherentes, quas ad me pro Carpesio misisti, cur probem legitimum esse Carpesium, nihil penitus argumenti mihi sese offert. Etenim quum Galenus Carpesium, prater id quod herba fistigata & facultate Phu similis, festucis, vel stipulis tantum constare asserat, non siliquis, neq; granis, non video, quo pacto tua acquiescam sententia presertimq; quum iam pridem compertum habeam, hasce siliquas milialid esse, quam Piper nigrorum ita Serapioni uocatum, qui eius historiam posteritatis memoria commendauit his uerbis. Ethiopicum Piper Barbari nominant Croni, & est in forma sua Phaseolis non absimile, semina tamē minora habet, & cortices siliquasue breuiiores, colore nigro & gustu fere acri ueluti piper, atq; e nigrorum plaga aduehitur, dentium doloribus non inutile. Qua quidem nota adeo conspicua sunt in hisce siliquis, & granis intus conclusis, ut nullus relinquatur dubitationis locus. Adde quod mansum (ut mihi experimeto constat) dentium dolores mulceat. Et ad nos non ex Syria vel Pamphylia (ubi Carpesii plurimum prouenire testatur Galenus) sed ex Ethiopia afferatur.
- Gelsimini examinatio.** Quod autem ad Gelsimum (ita uulgo uocatum) attinet, non possum a mea recedere opinione, iis semper fretus rationibus, quibus nixus sum in meis in Dioscoridem commentariis, qua nisi ualentioribus soluantur argumentis, in eadem sententia semper mihi manendum proposui. Tu autem ut probes, Dioscoridis Iasmenum parari debere ex floribus Gelsimini nostri, ais ad hanc sequendam opinionem, te maxime moueri a Serapionis auctoritate. Quippe qui suo oleo Zambacino easdem attribuat vires, quas Dioscorides Iasmeno assignauit. Id quod mihi Dioscoridem cum Serapione conferenti minime constare uidetur. Inquit enim Serapio: Zambacinum oleum est iuuatiuum in hyeme: sed si quis calidiore temperamento refertus, illud odorat nimis, uerendum est, ne sanguinis fluxiones e naribus conuertet. Hac ille. At qui longe aliter (si recte sentio) Iasmeni facultates describit Dioscorides his uerbis: Iasmenum usurpatur apud Persas inter epulandum odoris causa, nam toti corpori conuenit, presertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, qua calfactionem & laxationem desiderant. Grauius enim spirat, quam ut libenter a plerisque recipiatur. Hactenus Dioscorides. Quæ omnia Leucoium album cuius cum floribus suum ipse comparat Iasmenum prestare posse, non ambigo. Nam quum Leucoium (Galeno teste) valeat plurimum ad uteri phlegmonas, qua temporis diuturnitate in scirrhi modum indurserit, & idem pariter asserat, Dioscorides, menstrua prouocet, lienes minuat, & podagricos iuuat, quis etiam non concedat, iis eius oleum opitulari posse, qui laxationem calfactionemq; desiderat? Adhac cum Leucoium flore albo ceteris omnibus odoris fragrantia & acritate prestat, adeo ut cum Gelsimino de odoris bonitate certare possit, tanto magis adducar ad credendum, ut in hac mea sententia minime decipiar, presertim cum Dioscorides Gelsimini nusquam meminerit. Etenim si Gelsimum nouisset ille, mihi nunquam persuadere possem, quod uirtutis in describenda Medica materia facile Princeps, eius historiam & facultates non descripsisset, cum non adeo uulgaris & inutilis sit planta, ut is eam ita facile silentio sibi pretereundam duxisset. Prater id, si Iasmeni nomenclaturam expendamus apud Græcos, inueniemus quidem Atticis Leucoium Iasmen appellari, unde postea Iasmenum oleum dictum, quod ex eius paratur floribus. Postremo tamen si instaret quispiam Gelsimum nostrum Dioscoridi fuisse cognitum, non tamen ei fuerit concedendum tam improprie uocasse illud, eius flores, alba uiole flores, ac Gelsimum cum Leucoio confudisse.
- Salsa parilla.** De Succino uero & Salsa Parilla quamuis iam pridem aliam (ut uidi) nec sine rationibus sequentium opinionem, nunc tamen quum ueram Succini originem a Borussis & salsa parilla historiam ab Hispanis acceperim, non potui non complecti ueritatem, qua eo magis nunc mihi clara lucidaq; sese offert, quo uideo me nunc a te uiro doctissimo in hac noua opinione confirmari.
- Hyoscyamus albus.** Hactenus album Hyoscyamum non uidi, si tua uel amicorum tuorum opera eius semen consequi possem, faceret profecto mihi rem gratissimam, nam ex illa imagine in Diosco. illo appicta non video, quo pacto mihi ipse satisfacere possim: confusa mihi in ea uidentur omnia.
- Alumē liquidū.** Placet mirum, in modum castigatio illa tua in liquido alumine, nec aliter posse locum illum legitime legi

nunc primum mihi ex Gaudeo. Tantoque magis in hoc tibi gratulor, quanto plus animaduertis Dioscori...

Locus Dioscori dis in Alurine ex Orbasio re stitutus.

Plura sunt, qua me ancipitem reddunt in censendo salis flore. Primum est color quem in Spermate Ceti...

Floris na ceti.

Lapidem Morochium nunquam hactenus mihi videre licuit. Aique quum nunc abste certior sim...

Lapis Morochi tus.

Quantum sane tibi debeam pro legitima Glycyrrhizae fructu, non possum satis verbis explicare. Quod...

Glycyrrhizae fru ctus aculeatus.

Plinii erratum in Glycyrrhiza.

Vidi non sine admiratione Catalogum tuarum plantarum, quas tibi cum tanto comparasti labore: ob idque gratulor tibi plurimum...

CASPAR NOEVIVS MEDICVS Petro Andreae Matthiolo, S. P. D.

Agitur de quadam terra caerulea quam pro Armenio lapide mittis ad Matthiolum.



De Armenio lapide semper dubius fui, quis esset, vir doctissime excellentissimeque. Itaque quum ex doctis de ipso quaesierim ad me ex Italia Molochitem pro eo, ex Norico nuper lapidem viridem...

Terra caerulea.

Respondetur Nœuio & explicatur Matthioli de lapide Armenio censura.



Armenii lapidis
examinatio.

Armenii lapidis
calor.

Lapis Armenus
legitimus qui.

Armenus & cœ-
ruleus ex eadem
sunt materia.

Lapis qui passim
pro Melochite
venditur genui-
nus non est.

O Eruleam terram, quam Armenium lapidem esse meditaris, mi doctissime Nœui, una cum
u is humanissimis literis accepi diebus hisce præteritis, sumq; in iis perlegendis plurimum dele-
Et atus, ob eam præsertim, quam erga te habeo, benevolentiam ac etiam obseruantiam. Ut an-
em in hac re, de qua meum iudicium habere cupis, meam tibi declarem sententiam, etsi id (ut
t fortasse velis) à me præstari non posse sciam, ne tamen videar hunc subterfugere laborem, di-
eam ingenue quod sentio. Itaque libere proferam, si rationibus, autoritatibus ac experimentis fuerit ad stipu-
landum, Terram hanc nullo pacto Armenium lapidem esse posse iudico, primum quidem quod terra sit omni-
no, non lapis, eaq; adeo inconstans ac friabilis, ut tam leuiter tangi non possit, quin statim manus inficiat, id q;
Armenio lapidi nemo antiquorum ascripsit. Nec puto Dioscoridem, Plinium, nec alios, qui de huiusmodi
lapide scripserunt, tam friabilem terram, qua leuissimo contactu statim dissiliat, tam improprie lapidem vo-
tasse. Deinde crediderim ego, Armenium lapidem porracei esse coloris, non omnino cœrulei, Plinii autori-
tate fretus, quippe, qui Armenium lapidem scribit infectum esse Chrysocolle modo, illumque optimum haberi,
qui maxime viret, communicato colore cum cœruleo. Auget præterea opinionem nostram Auicenna, quum
Et ipse scribat, reperiri in Armenio lapide aliquantulum cœrulei coloris, quum tamen ipse non sit coloris omni-
no cœrulei. His etiam accedit Mesues autoritas, qui lapidem Armenium facit colore medio inter viridem,
Et obscurum. Horum ac nostra etiam sententia astipulatur Georgius Agricola rei metallica peritissimus, qui
in Armenio lapide, mistum colorem esse scribit ex viridi Et cœruleo. Quo fit ut nihil habeam, quo persuaderi
possim, tuam hanc terram, qua cœruleo tantum colore cernitur, ipsoque obscuro ac saturatori, Armenium le-
gitimum esse posse. Nec me à mea reuocat opinione Dioscoridis nostri codex, qui legit Armenium lapidem cœ-
ruleo esse colore, nam cum viridi admodum saturato sit infectus, ut quasi cœruleus videatur, nihil mihi mihi
videtur, si Dioscoridi Armenii lapidis color cœruleus describatur, cum etiam dicat Plinius, distare à cœruleo
Armenium candore modico, qui tenuiorem hunc efficit colorem. Si autem fateri ingenue debeam, quem lapi-
dem recte credam legitimum referre Armenium, nullam sane alium dicam, quam hunc quem ad te mitto. Est
enim is colore maxime viridi non solum ad cœruleum vergente, sed cœruleis etiam maculis infectus, adeo ut
à pictoribus, qui eo frequentissime utuntur, viride cœruleum vocetur. Præterea mihi, quæ admodum Doctori
Gallo quoque, qui primus facti opericulo, lapidem hunc ex agro Tyrolensi ad me misit, innumeris constat ex-
perimentis, lapidem hunc Melancholiam sanare, Et ea omnia exacte præstare, que illi reddidit Alexan-
der. Caterum mea semper fuit opinio Armenium, Et Cœruleum ex eadem constari materia in terra visceribus,
nullamque aliam inter eos intercedere differentiam, quam quod cœruleus fuerit magis excoltus. Etenim cum
sciam, ambos hosce lapides iisdem pollere facultatibus, Et in Armenio frequenter cœrulea macula videantur,
ut in hisce lapillis, quos ad te mitto, cernere poteris, præsertim ubi aqua vel salina eos deterferis, nihil habeo,
quod me à mea retrahat opinione. Idcirco eos prorsus aberrare existimauerim, qui lapidem hunc Melochite
esse censent, quum Melochites, etsi crassa sit viriditatis, nihil tamen cognationis habeat cum cœruleo, nec
melancholicos inuenit, sed tantum pro amuleto infantibus, Et pueris suspendatur aduersus nocuos casus. Quan-
quam sua non frustrentur opinione, qui Armenium pro Melochite suspendunt. Quandoquidem (ut fatetur
Serapio Linacri autoritate) idem Armenium præstare potest. Atqui si a me percontareris, quid terram illam
tuam esse putem, cum Armenium esse ex præmissis non potest, dicerem potius factitium aliquem representare
colorem, ex cœrulei fortasse puluere lanigato Et aqua subinde excepto, quam per se ita in fodinis oriri. Paucis
hisce volui meam tibi aperire sententiam: tuum nunc erit, eam vel probare, vel improbare. Caterum si tibi pro
tua in me confidentia satisfecerim, la labor quidem, sin minus, minime tristabor, præsertim ubi tu veriora ac
lucidiora mihi attuleris argumenta, quibus me ab errore retrahere possem. Nihil noui nunc habeo, quod ad
te mittam, præter Armenium meum. Te autem, qui fortasse quam pluribus talibus inuitatus, seu non ita
communibus Et vulgaribus rebus abundas, rogatum velim, ut si quid rari in eo genere tibi asseruaueris, id et-
iam nobis impartiri velis. Libellos hosce duos, quos ad te mitto, nuper è nostra prodierunt officina, quos si lege-
re non dedignaberis, facile conicere poteris, quam recte ab innidis illis me defenderim, qui (ut scribis) mihi
indigne obgannunt. At obganniant quantum velint, non tamen aliqua molestia inde afficiar, posteaquam
Dei Optimi Maxima auxilio non desunt mihi milites voluntarii, qui acerrime pro me pugnent, ut ex longa
his alligata pappo certior fies. Plura que nunc ad te scribam non habeo, id tantum abste peto, ut quan-
doque ad me scribere velis. sunt enim litera tua mihi semper iucundissima. Interim præ-
sor tibi omnia felicia, petoque ut clarissimo fratri tuo me plurimum com-
mendatum facias. Vale. Praga. XV. die Augusti.

Anno 1558.

GEORGIUS MARIUS HERBIPOLEN-
sis Medicus, Petro Andreae Matthiolo,
S. P. D.

*Agitur de plantis nonnullis, nempe Picea, Chamæleonibus, Pyrethro, Saxifra-
gia, Hermodactylo, & quibusdam aliarum imaginibus.*

- 10  *Um mibi recitaſet tuas literas Doctiſſimus Hieronymus Dantzellinus, cum quo ob ingenii acutiſſi-
mi magnas dotes, virtutum & ſcientiarum omnium, præſertim Medicæ artis, familiaritatem pro
illius ſingulari humanitate iam pridem contraxeram, nihil mihi uſum eſt, iucundius a tanto viro
accidere potuiſſe, vir Clariſſime & excellentiſſime quam quod eos ſermones, quos inter nos de tuis
perpetuo uicturis monumentis habuiſimus, ut pro ſua uirtute candidè perſcripſerit, ut fortassis expectationem
tibi de me fecerit, poſſe me ſtudio qualicumque non deeſſe tuis pulcherrimis laboribus, quibus mihi te uicium
materie Medicæ uindicem ſemper ob oculos propoſui. Eſi autem doctorum hominũ notiſſima clariffima & ma-
xima apud me ſemper fuit, tamen eorum qui noſtram artem exornarunt, ſemper eſſe uolui obſeruantiſſimus,
è quorum numero cum te ab hominibus laudatus non minimam obtinuiſſe laudem ſciam, magnam gratiam
illi referam, qui me tui notiſſiam habere uoluerit. Tecum uero, uir maxime, ita loquar, ut partim meam er-
gante obſeruantiã, partim candorem animi, quo me ſolo beatiſſam iudico, intelligere poſſis, quorum iſto in a-
micitia nihil ſi miſis arduſque inter bonos eſſe poteſt, illis uero nihil pulchrius & rectius, quam ut ius iudici-
um de rebus arduis deferamus, qui omnem ætatis operam in id ſtadium ſumma dexteritate conſulerunt. Lu-
cas Ghinus, uir omniſi immortalitate digniſſimus, cum me ſuperioribus annis Medicinam doceret, & ſubinde
nobis Dioſcoridem cum Galeno communem eſſe uellet, in eas cogitationes uenerat, ut de pingendis & ſcriben-
dis plantis, quæ piẽtæ hætenus a nullo eſſent, deliberaret, quod cum differret, & illi poſtea in manus ueniſſent
tui Dioſcoridiſ Commentaria, ita illis ſemper delectatus eſt, ut quantum ego iam conuicere poſſum ſui propoſiti
ſententiã mutari, a que in eam impem uenerit, non poſſe quenquam noſtro ſeculo melius id præſtare quam ſe-
ipſum, cui eſt ſua laudum iure debere crederet. Caeterum cum animaduerteret nonnullas plantas non ad uiuum
& naturam a ſculptore expreſſas uſuſque artificis picturis delectatus eſt, ut earum aliquot ſeorſim pingi uolue-
rit, ea (ut dubium mihi non eſt) uoluntate, ut eaſtuo iudicio & cenſura ſubmitteret. Fuere ex illis, ut pauca
adhuc memoraſ teneo, Picea & Pini genera, quarum alterum pro altero poſitum putaret, & alia addenda,
quæ iam elegantiſſime recentis editione ſatis deſcripta & expreſſa ſunt. Chamæleontes ambos, ita pictos aſſere-
bat, ut in tuis ſculpturis albus nigrum potius referret, & contra, quod uiuus plantis demonſtrabat, idque uel
Typographi, uel ſculptoris uitio facile fieri potuit. Pyrethrum, & ſi non omnino diſſimile, tamen aliud & mul-
torum iudicio veriſſimum, ex lacubus Piſanis oſtendebat. Saxifragiam longe aliam cenſebat, quam piẽta hæ-
tenuſ a quouis eſſet, uenerat enim in eam opinionem, ut in Dioſcoride non legendum putaret, Eubymio ſi-
milis, ſed Thymo, neque alienam plantam ab illa eſſe, quam Paulus pro Betonica deſcriberet: cuius planta co-
piam proxima occasione uobis faciam. De Hermodactylo ita ſentebat, ut paucas eam plantam hætenus co-
gnitam crederet, oſtendebatque aliquam que Bononia in ſecretis uallibus ſiniſtrae partis non longe a Diui Mi-
chaelis ede creuerat, binis tantum foliis maculoſis, quantitate, ut in lilus, ſtore, ni fallor, ſubcæruleo, radice
digito humano non omnino diſſimilem referente, cuius copiam miſiſſem, ſi mihi meorum librorum apud me
pars aliqua fuiſſet. Hæc ex paucis (ut pauca uero omnia erant) eo animo ad te ſcribo, non quod credi Ghini
iudicium tibi diſplicere, aut quod male tantum uirum iam mirum apud te inſimulare uelim, qui ut tibi
addictus erat, ut iam paucis diebus, antequam è uita in immortalitatem ſecederet, plurimas plantas ad te
miſiſſus fuiſſet, atque ſe literis de ſua ſententiã, quid de qualibet ſtatueret te rectius admonuiſſet. Uſinam illius
ſcripta non perpetuo latere poſſent. Uſit adhuc Bononiae eius frater chirurgus: uſit Doctor Camillus & V-
lyces, qui illi famulantes quotidie fuerunt, quibus omnibus, credo, pictor ille notiſſimus erit, à quibus omnia
percontari & interrogare licebit, neque ego ſi quid poterò, quod ſentio quam ſit exiguum, operam aut ſtudium
pretermittam a ſtudioſis Germanis illa inquirere, ſi quid ex picturis ſuperſis & ſi hæ uſui eſſe poterunt. Pin-
xerit idem aliquot elegantioreſ plantas, quæ deſcriptæ quidem a te, ſed non expreſſæ ſimulacris erant, ſed an-
eaſdem adhuc habeat neſcio. Vereor enim, ne pars aliqua ad Fuchſium peruenerit. Verum de his melius pi-
ctor reſpondebit, cuius nomen mihi excidit. Hiſ de rebus ad Medicos Montepeſſulanos ſcribam, quorum
auditor ad annos fere tres fui. Si quid tibi eſſe poſſet, quod rei tuæ conduceret, ſcio neminem eorum nobis deſer-
torem. Is ſolus locus Italiã adæquare, ſi non in quibusdam etiam ſuperare, mihi uſus eſt: Herbarum
ſingularium ita fertilis, ut Roremario, Lentisco, Terebintho, Chamælea & aliis focum foveant incola. U-
num interca te uirum Maximum contra omnium aculeos uehementer hortor & oro, ne ſtadium in deſeſſum
excolenda huius partis Medicæ nobis inter moriſinas, pro quo nemo unquam te ſatis laudare, nec ul-
lam ſatis gratiam poſteritas pro eo fructu referre poterit. Vale, & me in poſterum ama, ac com-
mendatum habeto, quod ut facias rogo, ſi me tui obſeruantiſſi & tua neceſſitudi-
ne dignum eſſe iudicaueris. Norimbergæ IIII. Non. Septem-
bris. M. D. LVIII.*

Piceæ & Pini
Chamæleon.

Pyrethrum.
Saxifraga.

Hermodactylus.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
 Georgio Mario Herbipolensi, S. P. D.

Respondetur precedenti Georgii Marii epistola.



Iteris tuis iam dudum respondere voluissem, Doctissime & humanissime Mari, nisi hisce diebus ob Caesaris praesentiam, & Serenis. Archiducis Caroli adversam valetudinem, noua & insolita negotiorum accessisset multitudo. Quae quidem & si neutiquam me tui facere potuerint immemorem, sitamen mentem & corpus mihi ad alia distraxerunt, ut magis accelerare non possem, ad quod & meus in te inuitabat amor, & tua singularis erga me postulabat humanitas ac beneuolentia. Quis tuus hic erga me animus? ut longe maiora mihi tribuas, quam ego in mea hac mediocritate sentire vel ausim, vel queam? Quod tamen si multi alii tecum sentiant eruditissimi viri, tamen ego magis hac candida oblector doctorum praesertim virorum beneuolentia, quam ut tanta de meipso mihi audeam vendicare. In hac autem nostra Medica facultate, in qua (ut fortasse non ignoras) non paruam aetatis meae partem consumpsisse me fateor, & si quantum haecenus potui, id mea sponte publica utilitati prestiti, tamen nescio, quo pacto ad istud cumulatiuè quotidie iterandum & omnes obeundos labores, & tua, & plurimorum doctissimorum virorum incredibilis benignitas me prouocat & accendit. Quorum integerrimis & optimis iudiciis quo plus recreor, eo minus improborum nequitia vel calumniis lador. Gaudeo itaque & summo opere lector, non plane infrugiferas ac inutiles meas in publicum venisse lucubrationes. Quod tanto amplius de curis spero, quo copiosius tuo peritissimo iudicio satisfactum animaduerto. Nec tibi modo multum debeo, sed & Donzellino viro Clariss. & utriusque amicis. Qui si forte immodicus fuit, in meis decantandis laudibus, ego id magis ipsius inter nos amicitia singularique humanitati tribuerem, quam ut tantam de me complecterer foremque existimationem. Nunc autem licet minora longe omnia promerear, tamen nec tantus tuus, neq; Donzellini in me potest inclinari fauor, ut doctissima iudicia fallantur, aut leui aliqua persuasione perstringantur. Quamobrem in posterum magis mihi connitendum censeo, ut vestra amicitia & grauissima de me contestata existimatione respondeam, quam ut haecenus id satis a me factum putem. At certe ob id etiam gratior iucundiorque mihi est hac tua de me opinio, referta omni beneuolentia, ac doctrina, quod eam a tuo preceptore Luca Ghino, homine sane excellenti & in hac plantaria facultate exactissimo iudice, velut hereditariam disciplinarum possessionem acceperis, & tuo iudicio ac longo studio auxeris. Qui quem animum erga me semper gesserit, quidne de nostris in Dioscoridem Commentariis sincerissime iudicauerit, testantur ipsius quam plurima ad me scripta litera omni humanitate referta, quas adhuc penes me referreo, ne tanti viri unquam me capiat obliuio. Quod autem in nonnullis plantarum iconibus is a me dissenserit (ut inter eiusdem facultatis studiosos plerunque fieri solet) fateor ego ingenue, at qui ea modesta eaque animi sinceritate, ut nihil unquam inter nos exortum fuerit, quod fraterna non admitteret amicitia, adeo ut cum de his ad me aliquando humanissime scripsisset, tam candidè, tamque solide pro ingentoli meae facultate responderim, remque omnem, iis, quae succurrebant, argumentis enucleauerim, ut deinde is non parum subdubitarit, utri nostrum danda esset palma. Censebat ipse, quum fortasse legitimam piceam nunquam inspexisset, montanam pinum piceam esse. Id quod a me nunquam probari potuit, iis fretis argumentis ac rationibus, quibus maxime contra Bellonii opinionones usus sum, in Commentariis nostris in Dioscoridem postrema editione excusis. Quae si perlegere non graueris, facile fortasse, in nostram concedes opinionem. Etenim picea folia (Plinio teste) pini non sunt, sed abietis prorsus amula. Nostra etiam sententia fortasse subscribis, si de utroque Chamaleone primum Dioscoridis verba mente rectè conceperis, & deinde commentaria nostra perlegeris. Equidem minime conicere possum, quomodo, qua ratione, quaque auctoritate a me dissenserit Ghinus, quum Dioscoridis ipsius testimonio, albus nulum gerat caulem, sed tantum niger. Ghini praeerea Pyrethrum fateor me vidisse nunquam, ideoque, quid ad hoc respondeam, non habeo. Si autem tua opera id consequi poterò, nihil mihi gratius prestare poteris. Sic namq; (ut meam tibi in sinu mentem) affectum me deprehendo ad hanc nostram plantarum indagationem, ut beneuolentia amicorum dona, omni auro, gemmis ac ceteris muneribus preferam. Scio quidem Pyrethrum meum (ut etiam lectorem admonui) quod careat umbella, à Dioscoridis Pyrethro satis differre. Atqui non ob id mihi vitio vertendum puto, quod vulgare illud demonstrauerim. De saxifragia autem, auditis à Ghino doctissimis argumentis, non potui in eius non concedere sententiam, adeo, ut nihil mihi sit amplius in hac re dubitandum. Est siquidem proculdubio (ut scite inquis) prima Pauli Betonica. Nam id maxime confirmat Galenus (a quo non ambigo transcripsisse Paulum) libro & capite quinto de sanitate tuenda, ubi de vinis dissertit, quae senibus accommoda magis habentur. Inquit enim: *Fit vero qui calculo laborat, etiam aliquid Betonica & Cestri, qui in Gallis nascitur, est immiscendum: vocant autem herbam eam, saxifragon. Hac ille. Plantam vidi habuique virentem quodam in fictile, sed aruit (ut ingenue fatear) mea negligentia. Cum autem nunc non sit ad manus, facies mihi rem gratissimam, si eam ad me miseris, ut humanissime polliceris. Verus Hermodactylus, qui à Ghino iam dudum ad me est missus, frequentissimus hic in Bohemia prouenit, cuius imaginem suo etiam tempore me daturum in lucem spero. Ceterum erant & alia nonnulla, in quibus a me dissentiebat vir ille bonus, nempe in acuta spina, in Palistro, & aliis quibusdam. Sed cum ad omnia rationibus adeo praestantibus a me illi responsum sit, ut in posterum nihil in contrarium repetierit, nihil aliter mihi cogitandum fuit, quam quod is meis acquieuerit rationibus: nisi forte (ut ais) morte praeventus, id facere nequiverit. Scio quidem me maximam accepisse iacturam, cum mihi è vinis sublatuè est Ghinus, in quo maxime, & quamplures fulgebant animi dotes, inter quas precipuum locum sibi vendicabant, integritas, sinceritas, humanitas, fides. Nulla unquam, in eo fuit inuidia. Cuius rei hoc maximum omnibus praebebit indicium, quod quum is decreuisset, ut rectè scribis, volumina quadam, quae de plantis conscripserat, una cum imaginibus in lucem edere, visis perlectisque commentariis nostris, non solum ad me gratulatorias scripsit literas, quod illum praenenerim eiusque subleuauerim labores, sed & quam plurimas misit plantas, quas illi sane refero acceptas,*

Chamaleon.

Pyrethrum Ghini.

Pyrethrum Matthioli.

Saxifragia.

Betonica prima Pauli quae.

Hermodactylus nascitur in Bohemia.

Ghinus in quibus platis dissentiebat à Matthiolo.

Lucè Ghini laudes.

vb: earum imaginibus nostrum ornauimus Dioscoridem. Post autem illius interitum cum antea non ignorarem, illi fuisse in animo, nouas quasdam, de quibusdam plantis opiniones ad me scribere, & nonnullas etiam plantas, nouas vulgares mittere, scripsi ad Vlysses Aldrouandum, virum sane insignem, ut diligenter perquireret, an nouae illae opiniones, inter eius scripta, reperiri possent, sed nihil (ut ille respondit) huiusce rei inuentum est.

Est enim inter nos magna vis amicitiae, nec me ab eo delusum unquam putarem.

Hae diebus quoque, scripsi ad illum, ut Gbini imagines illas, de quibus me admones, ad me mittat, si tamen eas mihi profuturas putauerit, si vero secus censeat, ut tantum nomina mihi describat, namque ex his facile coniciam, an emolumenti aliquid ex iis mihi accedere possit.

10 De his qua pro iuuandis rebus nostris, ad Montepessulanos Medicos scribere polliceris, habeo tibi gratias ingentes.

Si quid itaque ut spero, ab iis consequeris, id totam illico, ut mihi communicare non graueris, rogo, & ubi poteris, vel in Italia, vel Gallia, vel in Germania, vel ubicunque locorum apud amicos meos, aliquid rari pulchriue mihi comparare, nihil pratermittas obsecro, quin id agas sedulo.


Pollicor me vicissim, & omnia (ut decet) tibi accepta relaturum, ubi in commentariis nostris, de his aliquid differam.

Eiusdem tibi plurimum gratulor, & mihi maxime gaudeo, quod talem nactus sum amicum, qui tam amanter, ac humaniter honoris mei curam gerat.

Ergo interim versa vice omnem meam operam tibi defero, & ex corde pollicor maiora etiam praestaturum, ubi sese obtulerit occasio, Vale. Praga pridie Idus Decembris, M. D. L. VIII.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Georgio Hantschio Medico,
S. P. D.

30 Describitur Ellebori nigri diluti parandi ratio ad Quartanarios.



Iametsi, mi Georgi, Ioannem Noenium Clarissimum virum, Illustrissimi Saxoniae Ducis, Sacrique Imperii Electoris Medicum, de facie nunquam nonerim, nec vlla haecenus mihi cum illo intercesseris necessitudo, nomen eius tamen praclarum, eruditio non vulgaris, & erga omnes humanitas iam diu mihi nota sunt.

40 Nam praeter ea qua a Casparo Noenio viro doctissimo eius fratre, ac collega, de eius in medendis morbis felicitate cretenus intellexi, non desunt quotidie huiusce regni proceres, ac nobilissimi viri, qui ad illam tantam ad sacram anchoram confugiētes, ubi a ceteris medicis eorum morbi curari nequiverint, hi eius doctrinam, & in medendo dexteritatem, laudibus quamplurimis extollunt.

Quo fit, ut illum quamuis absentem, non solum semper dilexerim, sed etiam obseruauerim.

Tanta enim inest virtuti vis, ut illos quos nunquam vidimus, nec cognouimus adeo amare, ac etiam colere compellat: ut non solum eorum doctrinam, nomen, famam & morum apud omnes promoueamus, sed etiam opes quandoque pro eis effundamus.

50 Quamobrem pergratissimum mihi est nunc abste audire, Noenium ipsum datis ad te literis expetisse, ut eius nomine a me percontareris, an Ellebori dilutum, de quo ad quartanam febrem curandam memini in meis in Dioscoridem commentariis, illud sit, quod in libello meo, de morbi Gallici curatione posteritatis memoria mandaueram, an aliud alia ratione paratum, quodque si aliud est, eundem instanter petisse, ut parandi rationem a me peteres.

Quandoquidem cum iam diu mihi fuerit in votis, ut aliqua sese offerret occasio, qua virum hunc praclarum mihi conciliare possem, quaque me illi beneuolum declararem, laetor sane nunc plurimum, me honestam habere causam, qua id quod maxime optaueram sibi consequutus.

Atqui cogitavi, non tantum dilutum hoc, ab altero longe diuersum, tibi simpliciter describere, sed etiam addere quibus medicamentis atrabilarios succos preparare prius soleam, antequam Elleborismum illud aegris potandum precipiam, ut tanto magis, de mea erga Noenium voluntate, tibi constare possit.

60 Cum itaque signa aliqua coctionis apparebunt, vel sit id a natura sponte factum, vel concoquentibus medicamentis adiuta.

Syrupus ad quartanarios.

Summitas Aspleni

Adiantum

Fumaria

Melissophylli

Absinthii Pont.

Artemisia

Agrimonia

Pulegii

Thymi

Sene

singulorum manipulum.

Florum Anthemidis

Bethonica

Buglossa

Borraginis

Rorismarini

Stoechadis

Epithymi

cuiusque manipulum semis.

Radicum Cichorii

Intybi

Appii

Foeniculi

Asparagi

Rusci

Paonia

Anonidis

Eryngii

Angelica

Buglossa

Borraginis

Doronici

singulorum drach. sex.

Seminum Anisi

Foeniculi

Ocimi

Citrei mali

cuiusque drach.

Cinnamomi selectissimi unciam.

Santalorum flavorum drachmas duas.

Agallochi drachmam unam.

Iubeto effervescere ad tertias in aqua, quod sufficit secundum regulam, tandemque percolato, & deinde sumito.

Decocti prescripti uncias tres & semis.

Syrupi, de Fumaria

de Epithymo

Bisantini

Acetosi de radicibus

sing. drachmas tres.

Misceto simul omnia & fiat potus, propinatus diebus 15. continuis.

Elleboris ad quartanarios.

Deinde Elleborismum sequens prabeto decima sexta die.

Sumito decocti prescripti uncias quinque.

Rha Barbarici optimi drachmam unam & semis.

Corticum radicum Ellebori nigri purpureum florem ferentis scrup. quinque.

Iunci Odorati

Zedoaria

Semen paonia decorticate } sing. scrup. semis.

Vini cretici drach. duas.

Tertio, quateri debent, & deinde misceto simul omnia, & die ac nocte macerato affuso decocto. Demum percolato, & exprimito, dein cum hoc diluto dissoluto.

Electuarii lenissimi drachmas quinque.

Confectionis Amech drach. duas.

Syrupi de pomis Reg. Sabor. unciam.

Misceto hac omnia diligentissime, & fiat potus.

Hic habes, mi Georgi, Matthioli Elleborismum ad quartanarios, doctissimo Nævio mittendum, de cuius assidua in commentariis meis lectione plurimum quidem latatus sum: quin etiam illi gratias habeo, quod ita labores nostros, suo iudicio probavit, ut illis videndis tantum temporis impartiat. Nam hoc ego ita intelligo, ut id potius sua erga me humanitatis amorisque indicium esse censeam, quam ullius prestantia mea testimonium. Reliquum est, ut tuis literis ita cum Nævio viro illo preclarissimo agas, ut certo intelligat

Matthiolum sui habere amanti-
 Nævium perinde, ac ille disponere non valeat,
 Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Aliprando Spezzalancio Chirurgico,
S. P. D.

*Agitur de Emplastri albi Damocratis parandiratione, explicaturq, quid
ibi tryphera designet.*



10 *U*m plurimum Galeni medicamentis utaris, qua ad Chirurgicam spectant facultatem, & in
iis tibi comparandis nullis parcas laboribus, paraturus nunc album Emplastrum Damocratis
carmine à Galeno descriptum, ad calcem primi libri Κατὰ γυν, postulasti a me quid illi verba
illud tryphera designet. Cum tryphera (quod legeris) nusquam meminerit Galenus, nec un-
quam audieris trypheram compositum medicamentum in Emplastris addi. Ego vero tamen
locum istum nunquam expendere, neq, fortasse accurate legerim, nisi nunc tuis literis excitatus, non tamen
in eo explanando illa me duci ignorantia censeo, qua quosdam ductos nunc primum agnosco. Quare haud pre-
termittendum mihi putavi, quin meam de hac tryphera ad te scriberem sententiam. Atqui scire te primum ve-
lim, me minime mirari, quod hac in re non parum forsitan haeris, in qua doctissimi quoq, viros Graece linguae
peritissimos in tryphera hac explananda non haesitasse solum observavi, sed etiam manifeste aberrasse. Etenim
Cornarius, qui hos Galeni libros in Latinum vertit sermonem, cum fortasse (ut puto) ignoraret, quid ibi try-
phera designet, Graecum vocabulum reliquit, nec ausus est Latine id explicare. Sed longe magis videtur ab-
errasse Lacuna, qui tamen si in omnes fere Galeni interpretes acerrimas scripserit censuras, hic tamen ipse ma-
xime est hallucinatus. Siquidem ubi in suis in Galeni libros epitomis album hoc Damocratis soluta oratione,
ex carmine vertit, sic habet: Cerusa libram unam, lithargyri, tryphera singulorum uncias quindecim. Id quod
Lacuna ipse in sententiam manifeste palam facit. Ex hac enim versione non aliud quicquam existimasse Lacu-
nam sibi persuadere poterit, quam non solum, quod vocabulum illud subsistat a Damocrate sit positum, sed
etiam quod aliquod simplex, vel compositum designaret medicamentum. Ridenda sane in Italia, illi quoque fere
comparanda, de qua libro primo, de Antidotis scribit Galenus. Ibi enim suo tempore Medicum audentem no-
uisse ait, qui paraturus Theriacam, nesciens quae quid ibi Hedychroum designaret, a Pharmacopoeis instanter
petebat Hedychroum, ut herbam, vel aliud simplex medicamentum. Caterum Cornario Lacunaq, in verten-
do Damocratis carmine, longe preferendus est Andernacus qui Latine hanc dictionem vertit. Nam ubi Cor-
narius habet lithargyri tryphera, Andernacus habet lithargyri mollis. Quandoquidem cum proprie τρυφερά τρυφίβη.
idē Graecis significet, quod Latinis delicatus, & idem fere sit delicatus, quod mollis, recte sane Andernaci ver-
sio preferenda est, ac etiam multo magis mihi probanda. Quo sit, ut ibi nihil aliud voluisse Damocrate ex-
istimauerim, quam ut ad suum album conficiendum lithargyrius delicata adderetur, id est, nitida, pura,
selectissima, & omni sorde, vel excrementis vacans. Audisti iam sententiam meam, cui, ut spero, facile ac-
quiesces. Vale.

Emplastrum al-
bū Damocratis,
Tryphera quid
significet Cole-
no in alio tra-
damocratis.

Lacuna erratum
it explananda
Tryphera apud
Damocratem.

HIERONYMVS HEROLDVS NO-
rimbergensis, Petro Andreae Matthiolo,
S. P. D.

*Agitur in hac epistola de Cytiso, Petasite, Mesua Eupatorio, Gratiola, Sisere, Antirrhini-
nis, Betonica alba, Lupino Hispanico, Flore sancti Iacobi, Lilio conuallio,
Aquilicia, Panico pratensi, & quibusdam aliis, de quibus suam
Heroldus declarat censuram.*



50 *L*iquoties, Clariss. D. Doctor, Excellentia tua nomine me appellavit & salutavit D. Donzel-
nus vir doctiss. & mihi amiciss. rogavitq, ut ad Excellentiam tuam scriberem, & si possem sim-
plicium numerum auerem, & si videretur, de quibusdam dubiis admonerem. Illud et si mihi pro-
pter cursitationes assiduas difficile esset, scribere nempe tibi viro simplicium peritissimo, & qui
forte iam diu, qua scribo, vel mitto, optime nouisti, tamē ut petitioni ipsius satisfacerem, cura-
ni quasdam herbas depingi, quas mitto, quam ipsas herbas habere non possum. Mitto etiam quasdam meas co-
gitationes consignatas, de quibusdam herbis, & fruticibus, quas ut legas, & iudices, rogo, atq, ut humaniter ea
expendas, etiam atq, etiam vehementer cupio, offeroq, Excellentia tua studium meum, in omni officiorum ge-
nere promptissimum.

40 *D*E CYTISO, miror quod non pingatur, cum copiose nascatur in Italia, ante aliquos annos, quā per
Apenninum irem Florentiam, oblatu Cytisus, quem agnoscens decerpebam ramulos, quos Ghino post ostende-
bam Pisis tum profuenti. Is idem mecum sentiebat, atq, in suo horto eum fruticem spinosum ex montibus trans-
latum ostendebat, monstravit mihi eum etiam Conradus Gesnerus in suo hortulo, à quo facile pingi poterit.

*D*E Petasite, nihil dubito, quin ea sit radix, qua a Hieronymo Trago, Pestilenti & vniuersi appellatur. Ea
radix in humidis pratis pediculum emittit rubicantem, illi pediculo annascitur statim folium magnum, tandē Petasites.
radix serpit vehementer, & tandem plura folia, plures etiam pediculos producit. Aequant folia, ut ipse vidi,
magnam patinam, ut messores se à solis aestu, iis interdum tneantur. Pulvis radice drachma unus pondere
datur in peste, magno adiuumento mirifice sudorem ciet, est acris & amara, ulcera maligna, tum in hominibus
tum in equis mirifice sanari ea radice saepe vidi. Folia utiliter equis anhelosis dantur.

*G*RATIOLE vocata herba a me cum Valerio Cordo, creditur Eupatoriū Mesuae, omnino enim de-
scriptio & vires conueniant. nā purgādo magnā vim habet. In febrib. cotidianis, & tertianis notis, ut saepe sum
expertus, vires Cetaurio minori admodū respondent.

Gratiola est Eupatoriū Meliocy

Sisymbrium est
Lec. Hul.
Antirrhini variis
etis.

Betonica du-
plex.

Humaria duplex.
Lupini Hisp.

Senecio duplex.

Liliū conualliu.

Talietri est spe-
cies Aquilegia.

SISE R altitum depictum, sentio cum Cordo, quod sit Secachul Serapionis, neq, quicquam, quodre-
pugnet, habeo. In Suecia mulieres preparant maritis atq, usum norunt.

ANTIRRHINON, multiplex apud nos visitur, & illud Os leonis appellatum triplex est. Vnum
flore luteo, aliterum purpureo, tertiu albo. Inter hac, quod luteu florem habet, folia habet Anagallidis, de quib,
in cōmentariis dubitatur. Minus etiam Antirrhinon, Dorant Germanis dictum, dictas differentiis tres habet.

BETONICA, apud nos duplex est. Altera albis floribus, qua copiose in pratis quibusdam prope Ra-
tisbonim crescit. Altera flore rubicante.

FVMARIA etiam apud nos est duplex, altera albicantibus floribus, altera vero rubicantibus.

LVPINI etiam Hispanici apud nos visuntur luteo flore.

SENECIONE M etiam cum Trago duplicem existimo, maiorem & minorem. Maiorem sepe in
alpiibus vidi, nec ullam differentiam vidi quam magnitudinis.

LILIVM conuallium polygonati speciem cum Aloisio sentio.

TALJETRI tres species tantum magnitudine differetes vidi sepe in his regionibus, cuius speciem esse
Aquilegiam non dubito, & imo, maximam inter quatuor eas, puto. Sunt amarissima omnes, atque foliis & flo-
ribus exiguum differunt: tantum quantitas differentiam constituit. Valeat Excellentia tua. Norimberge.
XIIII. Martii. Anno, M. D. LIX.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Hieronymo Heroldo Norimbergensi,
S. P. D.

Respondetur precedenti epistola, & suam Matthiolus de predictis omnibus, ac
de quibusdam plantarum imaginibus, afferre
sententiam.



Lurimum sane debeo Donzellino Viro Clarissimo, quod non solum apud te me maxime collan-
d.uerit, ac pluribus fortasse, quā par fuerat, sed quod illud idem. (qua sua est humanitas) apud
cateros viros perpetuo facere soleat. Rogavi quidem illum pluries, ut te meo nomine salutaret, si
quidem, quum ex eius literis acceperim, abs te mea scripta laudari admodum, & pre ceteris et-
iam pluris estimari, propter eam quam erga me pra te ferebas beneuolentiam. pratermittere qui-
dem non potui, quin Donzellinum ipsum rogarem, ut pluribus te meo nomine salutaret, & tibi de tuo in me a-
more gratias ageret. Ceteri quum is saepe ad me scriberet, certiorē me fecit, de tua non vulgari peritia, & sim-
plicium medicamentorum cognitione, habereq, te dubia nonnulla significauit, de quibus libenter mecum con-
ferres. Ego autem cum is sim, qui pro mea consuetudine gratissimo semper animo doctorum virorum placita
complecti soleam, nihil, nec gratis, nec optatus mihi contingere posse putem, quam ut habeam huiuscemodi
doctos amicos, qui sua mihi proponant consideranda, & ego mea vicissim ipsorum candida censura amicissime
subuciam, Donzellinum ipsum magnopere rogavi, ut peteret abs te, ac etiam ab Hesso collega tuo, si quid nona-
rum opinionum contra mea scripta in animis vestris versaretur, vel si quid plantarum haberetis mihi fortasse,
vel non visarum, vel incognitarum, candidē de omnibus, ac libere ad me scriberetis. Quod quum ab utriusq,
humaniter amiceq, factum sit, & illi, & tibi maximas habeo gratias.

AD Hessi literas, quem ob suam doctrinam, & in re herbaria peritiam plurimum diligo, respondi his-
ce diebus elapsa ea cum humanitate ac sinceritate, qua potui, ac debui. Id quod pariter nunc tecum me factu-
rum decreui. Fuerunt autem litera tua mihi gratissima, tum quod tua in me beneuolentia memoriam apud me
perpetuo testatam relinquent, tum etiam quod nouerim, nē amicam mihi comparasse, qui nostros etiam labo-
res iuuare possit. Accepi sane congratulans plantarum imagines, quas ad me misisti, qua eo mihi chariores sunt,
quorariore puto, dabog, operam ut una cum meis edantur, & eas, ubi id effecero, & ut mei moris est, tibi re-
feram acceptas. Sed iam ad ea venio, de quibus partim dubitas, partim a me dissentis. Dicam itaq, de his sen-
tentiam meam candidē ac libere, non tanquam is qui alias docere, vel cupiam, vel velim, nec ut videar tuis a-
liorumq, refragari opinionibus, si qua in re a te, vel ab illis dissentio, sed ut mentem meam tibi sincere patefa-
ciam. Quapropter velim ut ea omnia boni, & equiq, consulās.

Cytisi imaginē
cur in suo D:osc
non appinzerit
Matthiolus.

CYTISI imaginem cur in meo Dioscoride non appinzerim, id sane in causa fuit, quod non solum eius
planta non esset ad manus, sed quod etiam dubitauerim, an legitima in Italia prouenerit, ubi rarā haberi o-
mnino scribit Plinius. Ego vero haecenus nullam vidi, qua omnes pra se ferat Cytisi notas. Habeo quidem ad-
huc plantam, quam pro Cytiso ad me misit Ciariss. vir Lucas Ghinus res plantaria profecto acerrimus indaga-
tor, sed cum folia nullam ostentarent canicem sed potius saturata virescerent, non duxi eam in meo libro pu-
gendam. Tu vero si quam a' am habes, qua folia gerat loti trifolia maiora incana tota dorso prominente, odo-
re eruca, recentium cicerum sapore, & ligni materie nigra ac fere ossea, illam proculdubio legitimam Cytisum
esse fatebor. Verā Cytisum, qua a Diosc. historia nihil prorsus euariat, asserit se reperisse prope Neapolim in colle
quodā doctiss. Bartholomaeus a Marata, in suo de methodo cognoscendorū simpliciu libello, nunc primū in luce
edito, a quo si plantā fortasse (ut spero) conseq,ui potero, edam eius Iconē, illiq, ut decet, acceptā referam.

Cytisus Maran-
thiz.

Petasitis exami-
natio.

NIHIL prater ea unquā dubitavi eos in errore versari, qui putant verā Diosc. Petasitem, eam esse ple-
tam foliis magnis, qua tam a Fuchio quam a Trago pro Petasite pingitur. Quandoquidē Diosc. Petasites pe-
diculus est cubito maior, crassitudine pollicis, a quo pro grande foliū galeri modo amplū ceu fungus dependet.
Quae quidē nota si cum Petasite Fuchii, vel Tragi conferantur, nullo sane modo quis in re plantaria versatus
affirmare poterit illorū Petasite eam referre, de qua Diosc. scribit. Nam prater id q, planta illa folia plura, am-
pla ab ipsa statim radice pferat (non unum tantū folium, ut legitima Petasiti reddidit Diosc.) nusquā tamen
visa est in summitate pediculi, sed est caulis foliū producere amplū Galerii modo, vel fungi instar dependens.
Nam

Nam quis ignorat fungorum pediculū in sui orbis centro esse affixum? At in Petasite illa vulgari lōge sane aiterris se habet, cum folia plura proferat tellure tenus à radice prodeuntia, & caulem Veretantum emergentē, in quo non solum fungi modo suspensum habet, sed flores fere spicatos ac papposos. Quæ nota si recte perpendatur, facile, ut spero, quis dignoscere poterit, & Fuchsum & Tragum & ceteros, qui hanc, æquuntur opinionem esse deceptos. Sed an quis sane mentis, unquam sibi persuaserit, tam ingentem plantam cauliculum ita appellasse Dioscoridem? An non omnino irrideretur, si quis descripturus Elephantem, illum animalculū appellaret? Ego sane haudquaquam illis ad stipulabor, qui hac in re Dioscoridi detrabere videntur. Nec ea me unquam commovebit ratio ut credam hanc plantam esse Petasitem, eo quod agricola, ac messorum est in calidioribus, hisse foliis pro Galero utantur, quum sapius etiam viderim personata foliis & aliarum plantarū eisdem sibi caput innumbrare, quas tamen stirpes, non ob id Petasitem esse putamus. Quamobrem plantam, qua pro Petasite minus recte à quibusdam pingitur, eam quidem esse putaverim, quam à Plin. Personatam appellari scio. Hanc ego maiorem Tusilaginem potius existimarem, pluribus notis, tum rationibus, non infirmis motus. Idque magis nunc affirmare ausim, cum abste certior sim factus eius radicem dari utiliter anhelosis equis. Siquidem ex Personata (ut Dioscorides est author) purulenta exiissentibus mirifice auxiliatur. Adde quod hinc planta idem sit sapor, qui in Personata ipsa reperitur. Atqui veram legitimamque, Petasitem fuisse se vidisse Viricium Leonorius Medicus Pragensis senex, & apprime eruditus in quodam Bohemia loco, qua à Dioscoridi historia nihil prorsus recedit, cuius diligentia, spero me eam omnino consequuturum.

10 **Q**UOD autem planta virgo Gratiola dicta, Mesue Eupatorium (ut Cordus deceptus scribit) referat, nibile est quod me moueat, ut cum illo sententiam, cum neque facies neque facultas Eupatorio illi tantillum sane correspondeat. Hinc enim Eupatorio Mesue ipsius sententia, requiritur, ut planta sit cubitalis, foliis Centauri minoris, viridibus, tactu asperis, per ambitum serratis, & tenuibus caulibus adnexis, qua cum sicantur pallorem concipiant, quinetiam, ut in caulium summitatibus flores erumpant subulsi & oblongi, quibus notis prorsus gratiola caret. Namque ex cubitali planta non est, sed suprapalmi altitudinem raro assergens, folia Centauri minoris minime profert, sed Hyssopi potius, lenia, pinguique, non aspera, equalia in ambitu non serrata. Item flores in caulium cacuminibus Gratiola haudquaquam profert subluteos, sed inter folia in toto fere caule ex candido leuiter purpurascens. Quæ quidem nota quantum ab Eupatorio illi distent, tu ipse hisce perpensis rationibus, tibi iudex esse poteris. At fortasse dices, convenire has plantas facultate, quod experimen:io constat Gratiolam tum bilem, tum pituitam deicere, sed quum non desint aliæ plantæ, qua idem efficiunt, & tamen Eupatorium non sunt, cur hac tantum causa Gratiolam, Eupatorium illud esse dicam, nulla sane ratio mihi sese offert, præsertimque, cum videam dari à Mesue ad exoluendam aluum pulueris Eupatorii drachmas duas vel tres. Quod sitantidem Gratiola propinquaremus, proculdubio sumentes duceremus in magnum discrimen, cum tantum pulueris huiusce herba scrupulum sumentes plurimum exoluantur.

20 **N**ec nostris rationibus obstat, quod Gratiola ipsa sit amara perinde ac Eupatorium illud. Etenim quum amaritudo facultas sit innumeris plantis communis, id minime concludit Gratiolam esse Eupatorium, de quo nunc agimus, aliis non astipulantibus notis. Præterea Eupatorium Mesue corroborat ventriculum, re- Gratiola non est Eupatorium Mesue.

30 **L**egi in iustia, Mesue Eupatorium, illud proculdubio erit planta, qua Dioscoridi Ageratum vocatur. Quis- Gratiola delectatio.

40 **S**i altero nobis appulto Siferi folia essent Pisi, non Pastinaca, flores violacei coloris, ipsique, violis longe maiores, qui non Vere solum, sed per initia mensium prodirent albi ac parvi, in umbella Pastinaca simili, semen verociceris magnitudine, rotundū, nigrum, succosum, & sapore dulci, non latum, ac foliaceum lentis fere instar, ut in sphondylis, secum profecto cum Cordo sentirem. Atqui quum hisce notis, quas suo Secaculo ascripsit Serapio, Sifer alterum prorsus destituatur, non video quo pacto & tibi, & Cordo astipulari possim.

50 **A**NTIRRHINI genera quatuor, iam pridem apud me extant, foliorum & florum, quinetiam & plantarum magnitudine discrepantia. Quorum icones dabuntur (ut spero) una cum novis imaginibus nostris. Nec mireris velim, si in commentariis meis de Antirrhini foliis dubitauerim: siquidem tunc, non nisi una tantum Antirrhini planta fuit ad manus.

60 **R**EPERIRI Betonicam flore albo, res nova mihi non est. At quoniam huius nusquam meminit Dioscorides, ob id non sum ego accusandus, si de alba nihil scripserim, præsertim eam mihi persuaserim florum coloris, speciem haudquaquam immutare, & proinde nec facultates, ubi cetera respondeant. Id quod etiam de fumararia nunc dictum esse volo, quam iam diu novi ac vidi. Veruntamen tibi habeo gratias, quippe qui hac mihi in mentem reuocaueris. Etenim facile adducar, ut de his etiam alias scribam.

70 **L**UPINVS, quem Hispanicum vocas, luteo flore hæcenus usquam mihi visus non est. Reseram illum tibi libenter acceptum, si tua opera fieri possit, ut ad me transmittatur.

80 **P**LANTAM, quam Germani florem Sancti Jacobi vocant, quod ad finem Iulii florere soleat, maiore esse Senecionem facile & tibi, & Trago concedam, quanquam in floribus & pappis nonnulla haberetur differentia. Id quod non multi facio, quum eadem in foliis & caulibus facies cernatur idem sapor & odor in utraque planta appareat.

90 **Q**UOD Liliū conuallium sit Polygonati species, non ita facile cum Aloisio sentiam, quod geniculatas radices non proferat, à quibus Polygonatum denominationē accepit, quinetiam, quod nec caules, nec flores proferat, qui cum Polygonato comparari possint, quemadmodum nec omnino ipsa folia, qua Liliū esse videntur, ut hæc differentias recte expendentibus facile constabit.

100 **Q**UVM Aquileia a recentioribus ita vocata planta sit, qua ob eius maiestatem, & florum artificium, ac pulchritudinem longe diffusius describi mereatur, quam a Dioscoride factum sit in Thalictro, mihi sane, non ita facile persuadeam, hanc plantam legitimum esse Thalictrum, nec id tantum me mouet, ad id am conseruandum sententiam, quod Aquileia folia dissecta cernuntur Coriandri modo, cum hac tantum nota id probare non

110 **S**I altero nobis appulto Siferi folia essent Pisi, non Pastinaca, flores violacei coloris, ipsique, violis longe maiores, qui non Vere solum, sed per initia mensium prodirent albi ac parvi, in umbella Pastinaca simili, semen verociceris magnitudine, rotundū, nigrum, succosum, & sapore dulci, non latum, ac foliaceum lentis fere instar, ut in sphondylis, secum profecto cum Cordo sentirem. Atqui quum hisce notis, quas suo Secaculo ascripsit Serapio, Sifer alterum prorsus destituatur, non video quo pacto & tibi, & Cordo astipulari possim.

120 **A**NTIRRHINI genera quatuor, iam pridem apud me extant, foliorum & florum, quinetiam & plantarum magnitudine discrepantia. Quorum icones dabuntur (ut spero) una cum novis imaginibus nostris. Nec mireris velim, si in commentariis meis de Antirrhini foliis dubitauerim: siquidem tunc, non nisi una tantum Antirrhini planta fuit ad manus.

130 **R**EPERIRI Betonicam flore albo, res nova mihi non est. At quoniam huius nusquam meminit Dioscorides, ob id non sum ego accusandus, si de alba nihil scripserim, præsertim eam mihi persuaserim florum coloris, speciem haudquaquam immutare, & proinde nec facultates, ubi cetera respondeant. Id quod etiam de fumararia nunc dictum esse volo, quam iam diu novi ac vidi. Veruntamen tibi habeo gratias, quippe qui hac mihi in mentem reuocaueris. Etenim facile adducar, ut de his etiam alias scribam.

140 **L**UPINVS, quem Hispanicum vocas, luteo flore hæcenus usquam mihi visus non est. Reseram illum tibi libenter acceptum, si tua opera fieri possit, ut ad me transmittatur.

150 **P**LANTAM, quam Germani florem Sancti Jacobi vocant, quod ad finem Iulii florere soleat, maiore esse Senecionem facile & tibi, & Trago concedam, quanquam in floribus & pappis nonnulla haberetur differentia. Id quod non multi facio, quum eadem in foliis & caulibus facies cernatur idem sapor & odor in utraque planta appareat.

160 **Q**UOD Liliū conuallium sit Polygonati species, non ita facile cum Aloisio sentiam, quod geniculatas radices non proferat, à quibus Polygonatum denominationē accepit, quinetiam, quod nec caules, nec flores proferat, qui cum Polygonato comparari possint, quemadmodum nec omnino ipsa folia, qua Liliū esse videntur, ut hæc differentias recte expendentibus facile constabit.

170 **Q**UVM Aquileia a recentioribus ita vocata planta sit, qua ob eius maiestatem, & florum artificium, ac pulchritudinem longe diffusius describi mereatur, quam a Dioscoride factum sit in Thalictro, mihi sane, non ita facile persuadeam, hanc plantam legitimum esse Thalictrum, nec id tantum me mouet, ad id am conseruandum sententiam, quod Aquileia folia dissecta cernuntur Coriandri modo, cum hac tantum nota id probare non

180 **S**I altero nobis appulto Siferi folia essent Pisi, non Pastinaca, flores violacei coloris, ipsique, violis longe maiores, qui non Vere solum, sed per initia mensium prodirent albi ac parvi, in umbella Pastinaca simili, semen verociceris magnitudine, rotundū, nigrum, succosum, & sapore dulci, non latum, ac foliaceum lentis fere instar, ut in sphondylis, secum profecto cum Cordo sentirem. Atqui quum hisce notis, quas suo Secaculo ascripsit Serapio, Sifer alterum prorsus destituatur, non video quo pacto & tibi, & Cordo astipulari possim.

190 **A**NTIRRHINI genera quatuor, iam pridem apud me extant, foliorum & florum, quinetiam & plantarum magnitudine discrepantia. Quorum icones dabuntur (ut spero) una cum novis imaginibus nostris. Nec mireris velim, si in commentariis meis de Antirrhini foliis dubitauerim: siquidem tunc, non nisi una tantum Antirrhini planta fuit ad manus.

200 **R**EPERIRI Betonicam flore albo, res nova mihi non est. At quoniam huius nusquam meminit Dioscorides, ob id non sum ego accusandus, si de alba nihil scripserim, præsertim eam mihi persuaserim florum coloris, speciem haudquaquam immutare, & proinde nec facultates, ubi cetera respondeant. Id quod etiam de fumararia nunc dictum esse volo, quam iam diu novi ac vidi. Veruntamen tibi habeo gratias, quippe qui hac mihi in mentem reuocaueris. Etenim facile adducar, ut de his etiam alias scribam.

210 **L**UPINVS, quem Hispanicum vocas, luteo flore hæcenus usquam mihi visus non est. Reseram illum tibi libenter acceptum, si tua opera fieri possit, ut ad me transmittatur.

220 **P**LANTAM, quam Germani florem Sancti Jacobi vocant, quod ad finem Iulii florere soleat, maiore esse Senecionem facile & tibi, & Trago concedam, quanquam in floribus & pappis nonnulla haberetur differentia. Id quod non multi facio, quum eadem in foliis & caulibus facies cernatur idem sapor & odor in utraque planta appareat.

230 **Q**UOD Liliū conuallium sit Polygonati species, non ita facile cum Aloisio sentiam, quod geniculatas radices non proferat, à quibus Polygonatum denominationē accepit, quinetiam, quod nec caules, nec flores proferat, qui cum Polygonato comparari possint, quemadmodum nec omnino ipsa folia, qua Liliū esse videntur, ut hæc differentias recte expendentibus facile constabit.

240 **Q**UVM Aquileia a recentioribus ita vocata planta sit, qua ob eius maiestatem, & florum artificium, ac pulchritudinem longe diffusius describi mereatur, quam a Dioscoride factum sit in Thalictro, mihi sane, non ita facile persuadeam, hanc plantam legitimum esse Thalictrum, nec id tantum me mouet, ad id am conseruandum sententiam, quod Aquileia folia dissecta cernuntur Coriandri modo, cum hac tantum nota id probare non

250 **S**I altero nobis appulto Siferi folia essent Pisi, non Pastinaca, flores violacei coloris, ipsique, violis longe maiores, qui non Vere solum, sed per initia mensium prodirent albi ac parvi, in umbella Pastinaca simili, semen verociceris magnitudine, rotundū, nigrum, succosum, & sapore dulci, non latum, ac foliaceum lentis fere instar, ut in sphondylis, secum profecto cum Cordo sentirem. Atqui quum hisce notis, quas suo Secaculo ascripsit Serapio, Sifer alterum prorsus destituatur, non video quo pacto & tibi, & Cordo astipulari possim.

260 **A**NTIRRHINI genera quatuor, iam pridem apud me extant, foliorum & florum, quinetiam & plantarum magnitudine discrepantia. Quorum icones dabuntur (ut spero) una cum novis imaginibus nostris. Nec mireris velim, si in commentariis meis de Antirrhini foliis dubitauerim: siquidem tunc, non nisi una tantum Antirrhini planta fuit ad manus.

270 **R**EPERIRI Betonicam flore albo, res nova mihi non est. At quoniam huius nusquam meminit Dioscorides, ob id non sum ego accusandus, si de alba nihil scripserim, præsertim eam mihi persuaserim florum coloris, speciem haudquaquam immutare, & proinde nec facultates, ubi cetera respondeant. Id quod etiam de fumararia nunc dictum esse volo, quam iam diu novi ac vidi. Veruntamen tibi habeo gratias, quippe qui hac mihi in mentem reuocaueris. Etenim facile adducar, ut de his etiam alias scribam.

ausim. Miror præterea, quod afferas Aquileiam, ut ceteras illas species, de quibus meministi, esse amarissimas, quum mihi dum hæc scribo, eam mandenti subdulcis prorsus deprehendatur: quod etiam a Euchsio, video fuisse obseruatum. Cupio tamen reliquas plantas, quas illi congeneris facis inspicere, ideoque rem mihi per gratam facies si eas mihi videndas transmiseris.

at cū pratense.

Manna semen.

STIRPEM, quam pratense Panicum appellas, iam diu obseruaui, cum ea nihil frequētius in Italia proueniat. Attamen planta, à quo semen illud exiguum excutitur, Germanis Himmelhauu appellatur, nobis uero Mannapanicum hoc syluestre non est, sed graminis species quadam, qua in culmorum cacuminibus quinque tenuissimas, longas tamen gerit spicas, ueluti digitos, ut diffusius legere poteris in nostris in Dioscoridem commentariis, ubi Secundo Libro de Coronopo meminimus. Seritur hæc planta in Carniola, & in Goritensi agro passim ad ciborum usum, ueluti cetera Cerealia, ideoque illis frequentissimo est usui, quem admodum Bobem, apud quos ego hoc semine pingui carni iure incocto maxime sum delectatus in cibis. Nascitur sponte etiam ibi plurima locis incultis. Sed quoniam culta longe mitior redditur, ea propter eandem colunt in campis. Dabo fortasse etiam eius imaginem, ceteris nostris addendam, curaboque plantam mihi afferri tui causa cum semine, ubi abs te intellexero, tibi gratam futuram. Qua uisa, facile eos damnabis, qui tibi ex Panico illo colligi mannas suaserunt.

Buphtalmū Cordi erratum.

Consilio.

PLANTÆ illius imaginem, quam Cordus, minus recte Buphtalmum appellauit, nonnulli uero hallucinati (ut Tragus, qui eam etiam pingit) nigrum Veratrum legitimum esse censent, tam negligenter pictor ille tuus delineauit, ut a me, uel a quoquam, nunquam cognosci potuisset, nisi mihi abs te descripta fuisset. Erat profecto eadem planta, ipsa die ad manus, a quodam Myropola mihi allata (nascitur quidem frequentissima circa Pragam) qua tua ad me allata sunt literæ, quo factum est, ut curauerim à pictore, quem domi alo, ad uiuum statim depingi, tibi mittendam, ut uideas quam longe pictor ille tuus a scopo aberrauerit. Dedi ego uisum scilicet stirpis imaginem in postrema commentariorum meorum editione, inter Ellebori icones, non quod Elleborum eam esse censeam, sed quod in aliqua uerfer opinione, hæc legitimam fortasse esse Consiliginem. Cum itaque uideam pictorem tuum in hæc pingere da planta plurimum ab eius facie aberrasse, vereor quidem, ne in aliu etiam idem effecerit. Quo fit, ut non ausim curare, ut a meo delineentur pictore, nisi prius abs te mihi fuerit persuasum: uel plantas ipsas uiuas fuerim consequutus: de quo te plurimum rogo. Habes itaque uir doctissime, de omnibus, de quibus ad me scripisti, iudicium meum. In quo, si tibi satisfactum fuerit, mihi quidem gaudebo plurimum, ac si secus euenerit, uelim tamen, ut boni consulas, & id grato animo suscipias, quod tibi satis facili gratia scribo. Uelimque, ut si quid melius habes, quo posset quispiam hisce meis argumentis, ac rationibus ob stare, ad libere in medicinam afferas, cum nunquam tam pertinax fuerim, & meis opinionibus addictus, quin potius ueritati acquiescam, quam mihi ipsi morem geram, Vale. Praga XI. Calend. Maii, Anno M. D. L. IX.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Vlyxi Aldrouando Bononiensi Medico,
S. P. D.

Agitur hæc epistola de picea, Pino, Chamaleonibus, Geranio bulbosa radice, Saxifraga, Nitro, Acoro, Platano, Equinis quibusdam Castaneis, & nonnullis aliis plantis.



Summa quidem voluptate affecerunt me literæ tuæ. Recognoui enim in illis tuam pristinam uirtutem, coniunctam cum singulari erga me beneuolentia. Quarum alteram semper in te admiratus sum: altera quum me antea delectauerit, tum uero præcipue in hoc tempore delectat: quo, cum ego, aulicis hisce negotiis impediatur, nec regio hæc raris sit plantis referta, quibus mihi ipse prospicere possim, tu tua opera opus meum, quod nunc præ manibus est, ex animo iuuare nitur, plantis innumeris ad me transmissis, quæ quidem magno sane illi erunt ornamento. Quod opus etsi difficilimum omnium est, quemadmodum & te sentire non ambigo, & egore ipsa experior, tam animo non deficio, quam Principum (quod multum est) & amicorum suffragia non deficiant. Utinam sic euentum meorum consiliorum fortunet Deus Optimus Maximus, quemadmodum mea causa nihil, neque laboris deerit, neque studii. Nec est, quod te mihi tam uehementer excuses, quod tam diu ad me scribere neglexeris, ueritus fortasse, ne de aliqua fidei tuæ inconstantia subdubitarim. Cum enim ego tantum te diligam, quantum literis exprimere non possum, non iudico posse hoc accidere, in natura ingenna & liberali, cuiusmodi tua est, ut posteriores in amando partes ferre uelis. Quamobrem certus sum, me tibi esse cordi, quemadmodum quidem antea semper fui. Atqui non parum mihi mæroris adiunxit, quod uis molestis, de quibus scribis, impeditus, ad me prius non scripseris. Verum cum (ut aiunt) rerum sit uicissitudo, omnino statuo, & confido, quod sub noui Principis imperio, cuius electionem propediem expectamus, omnia feliciter, tibi & ceteris doctis uiris, facile sint successura. Ceterum perlectis tuis literis non potui non admirari plurimum Lucam Ghinum, uirum profecto huiusce ætatis clarissimum, & qui in re plantaria indaganda parem fortasse habuit neminem, in ea fuisse sententia, quod illud syluestris montanique Pini genus, cuius ramusculum, una cum Cono, ad te nunc primum miseram, quod Ananienses, imo & ceteri, qui in agro Tridentino degunt, uulgo appellant Cembro aut Cermolo, ipsa legitima esset Picea, de qua Dioscorides scribit ac etiam Theophrastus. Ac eo magis id mihi mirum uideatur, quod abs te nunc certior factus sum, ea rarissime ita sensisse illum, quod Picea (ut inquis) pini folio esse debeat. Id quod nunquam, ni fallor, me legere memini apud ullum antiquorum, qui de stirpium historia scripserunt. Nam quamuis scribat Dioscorides Pinum & Piceam eiusdem esse generis, sed specie tamen differre, non ob id tamen nobis statuendum censeo, piceam pini foliis uirescere. Verum potius censerem ego accepisse hic genus, pro omnibus Conferis & resiniferis plantis, quæ fere omnes iisdem sunt facultatibus prædita. Quo fit, ut dixerim pini

Ghini sententia in picea & syluestri Pini improbatum. Cembro.

- Et piceam non genere, sed specietantum differre. Quod autem acceperit hic Dioscorides Genus pro uniuersali, ac (ut ita dicam) generalissimo Coniferarum arborum genere, facile quis reddi certior poterit ex his, quae capite de Fago & Illice ipsemet Dioscorides scripta reliquit his verbis: Fagus & Ilex, Quercus eidem generi assignantur, & consimile munus obeunt. Quae uerba si recte perpendantur, manifesto cuique palam fiet hic, quercum generaliter posuisse Dioscoridem, pro omni arbore glandifera, quum & eius non solum Graecis significet, quercum ipsam, sed in uniuersum glandiferas quasque stirpes, e cuius genere fecit Fagum & Ilicem, quae tamen arbores non solum foliorum forma, sed fractu, cortice, & ligni materie inter se maxime differunt. Ideoque eodem sane modo de pino & picea nobis fuerit censendum, praesertimque cum illarum qualibet diuerso appelletur nomine. Quandoquidem si picea (ut ille censebat) e pinorum genere fuisset, non erat illi opus proprium habere nomen, sed tantum cognomento aliquo suam poterat depromere speciem, quemadmodum exempli causa populus, quippe, quae cum complures habeat species, eae cognomentis distinguitur, hanc albam, illam nigram, alteram Libycam appellantes, id quod de Myrto pariter dixerim. Siquidem hanc latifoliam, angustifoliam illam, alteram coniugalem, hanc item Tarentinam, illam satiuam, hanc uero syluestrem appellant, seruato semper generis nomine. Quod eo magis fuisset in Picea obseruatum, si hoc pini genus, pro picea receperit antiquitas, quod idem foliis, floribus, nucibus, cortice, ligni materie, resina, ac uniuersa facie culta referat pinum, tamen si nuce, nucleosque, tanquam diuersum genus paulo minores proferat. Ad haec quamquam Theophrastus, a quo fortasse Ghinus suum desumebat argumentum, ubi de foliorum conuenientia differit libro primo, capite sexto, de historia plantarum, scribit pinum, piceam, abietem, cedrumque foliis esse in summitate acuminatis, quod & nos pariter fatemur, non tamen ob id sequitur, quod eiusmodi arbores omnes pini foliis amittantur, quum non desint aliae plantae, ut Juniperus, Sabina, & complures aliae, quarum folia quamquam aculeatis cacuminibus uisuntur, sus tamen forma plurimum quidem a pini foliis distant. Et quae propter, quemadmodum Abietis & Cedrifolia, longe diuersa a pini foliis sese nobis ostendunt, ita de picea foliis quibuscuque censendum putarim. Id quod luce clarius demonstrat Plinius libro decimo quinto capite uicesimo quarto, sic inquit: Infecta peltinum modo (intellige folia sunt) picea abietique: & decimo eiusdem libri capite, taxum arborem, scribit folia proferre abietis & picea similia. Id quod non solum firmissimum praebet argumentum, piceam folio esse abietis, non pini, quemadmodum & taxus, quod uir ille aliquis clarissimus, ac (multorum pace dixerim) alter in Medica materia Dioscorides, in re hac non parum fuerit hallucinatus, dum sibi persuasum uoluit, hoc pini genus, uel alterum quodcunque, legitimam esse piceam. Etenim, si pinum hanc diligenter expendamus, nihil magis (mea sane opinione referre uidetur, quam Tarentinam, de qua scripsit Plinius, libro decimo quinto, capite decimo, digitis fragili putamine autumque expositum furto in arbore. Siquidem nuce nucleorumque putamina non magno sane labore digitis frangi possunt & ausum rostro frangi, ut dulcibus illis pasantur nucleis. At si Ghinus, non adeo mature (id quod quamplurimi optant) communibus cesset factis, & postremam editionem Dioscoridis mei, cui semper (quae sua erat benignitas) fuit addidit, inspexisset, mihi quidem, huius quaequam aliter censendum est, quam, quod is qui candidissimus fidelissimisque rerum fuit indagator, suam hanc rectissimam opinionem. Caterum quod demiratus sis, Marantam in sua medicina cognoscere, hanc simplicium, quae non parum sum delectatus, in aspera Lonchitide, quam in medicina Dioscorides, tanquam eadem legitur esse censet, me ita falsitatis in simulasse, quod certo sciam eam in simplantam a Luca Ghino esse mihi transmissam, ego sane non demiror, cum res ipsa illatam mihi in iuribus apertissime praeseruat. Quod uero id agere feras, habeo tibi gratias, utpote cui exprobranda displicere aeternum. Acquire respondebo ego illi adeo firmis argumentis, ut mihi minime uerendum sit, quin probentur res omnes in illum commoueam, eoque praesertim qui uiderint, legerintque, quam humaniter de illo scripsimus, quam benigne eum ipsum laudauerim, quamque honorifice collocarim inter tot clarissimos viros. Nec deerunt mihi numerandi errores & opiniones, quibus saepe seipsum fallit, quae tamen non concitato calamo, sed animo quo potero tranquillo, ut hominem senem ac Philosophum decet, humanissime recensebo. Sed haec de his. Quod autem ad Chamaleones spectat, scias, pro certo uelim, me non esse mea opinioni adeo pertinaciter addictum, quin facile in tuam, ac ceterorum deueniam sententiam, ubi plantas fuerim conspicuas, quae euidentioribus notis, quam meae, Chamaleones referant, quamquam non ob id aliter mihi post haec persuaideam, quam quod haec, uel mea stirpes, sint Chamaleonibus illis omnino congeneris. Quamobrem te rogatum uelim, ut pro tua humanitate, uel plantas ipsas, uel earum imagines a perito artifice deloneatas propriisque coloribus pictas, ad me perferri cures. Cupio enim in Chamaleone nigro, praeter omnem carduorum naturam, inspicere umbellam, quae aculeatis rigeat floribus. Geranium bulbosa ac subrotunda radice, quod cum tuis literis ad me misisti, fuit mihi tam gratum quam quod gratissimum. antea enim id mihi uisum non est, nec fortasse in Italia prouenit, quum scribas, hoc ex Illyria esse allatum. Accepi & suberis ramusculum, sed iam alius erat ad manus glandibus refertus, Roma ad me delatus. Saxifragam folio Thymi, quam Agnetica uel Veticam puto, Dioscoridis Saxifragam iam cum ceteris esse sentio. Uidi eam dum agerem Roma, Leone decimo imperante, sub Capitolino colle in quibusdam aedificiorum ruinis, scioque saxifragam illam appellasse quendam, qui ea in expellendis renum calculis utebatur, sed tunc temporis, non multum de re herbaria fueram sollicitus. Pulcherrima ac uirescens iam est ad manus, proinde non est opus, ut mittenda illius causa, meos nunc fatiges amicos. Nurum a Placentino Myropola tibi transmissum diligenter sum conspicatus, ut autem ingenue fatear, quod sentio, mihi potius salis speciem quamdam praeserferre uidetur, quam ustri. Quod nunc ad te mitto, Constantinopoli ab Augerio Flandro, viro ut doctissimo, ita & nobilissimo, & humanissimo Caesaris Oratore ad me transmissum, substantia & sapore a tua non parum distat, mihi que adeo legitimum nitrum refert, ut nihil sit, quod (me indice) reclamet. Praeter id transmissum ad me Gulielmus Quacelbenus eiusdem Oratoris nomine cuius Medicum agit, aliquot odorati calami uulgaris plantas, meo tantum causa e Nicomedia petitas, longis ac fibratis radicibus refertas, e quibus folia emergunt Iridis angustiora longioraque, adeo ut omnibus sane notis Dioscoridis Acorum referant. Huius accessu Platanus ramus, cui latiora, quam antea uiderim, insunt folia, pilulaeque uergetiores, quam in ea conspiciuntur Platano, quae Patani in horto Bembi uirescit. Quo fit, ut facile putarim, plures etiam Platani haberi species. Allatum est quoque, una cum praedictis, Castanearum genus quoddam, cuius amplissimi folia pentaphylla plane modo diuiditur, fructus uero a uulgaribus*

Ad nomen
ue. de
glac
boru.

Populi e
nora.
Myrti ge. uia
plura.

Picea & abietis
folia qualia.

Pinus Tarenti-
na.

Lucas Ghinus
non solum excu-
sa, sed etiam
laudatur.

Lonchitis aspe-
ra.

Chamaleon

Geranium bul-
bosae radice.

Suber.

Saxifraga legit-
ma.

Nitrum.

Calamus odori-
tus.

Platanus orien-
talis.

Castaneae equi-
nae.Harmola legiti-
ma.

Pyrethri Ghini.

Alisma.

Lorus arbor.

Oxyacanthae fru-
ctus duplici nu-
cleo.

Consiligo.

bus Castaneis nostratibus non admodum differt, est tamen aliquanto rotundior. Concluditur is echinatus, crasso, raris ac firmis aculeis circumuallato, qui plurimum a nostrate differre videtur. Scribit ille hasce Castaneas, Constantinopolitans ideo equinas vocari, quod anhelosis equis tuis, laborantibus, maximo sint proficio, ubi ab eis deosentur. Misit idem sylaestrem etiam Rutham, Harmolam quibusdam dicitur, & alia quaedam antea mihi prorsus ignota: qua omnia, cum fortasse nusquam vidisse putem, diligenter afferuo ad te transmittenda, cum nuntius qui spem adsit, qui vel Venetias, vel Goritiam proficiscatur. inde enim facile ad te transmittentur. Mitterem ego hinc ad te quam libenter, per Caesareos veredarios, si hasce capsulas qua illos maxime impediunt, ferre non recusarent. Quotquot habeo amicos nunc continuo defatigare cogor, ut has verillas ad me tran, mittam stirpes. Ita enim nunc mea studia exposcunt & plantarum imagines, quae speciosiores maioresque iam praemanibus sunt recudende. Proinde ne egre feras obsecro, si tibi modo, sicut & ceteris factus sum molestior. Cupio admodum universam iuuare Rempublicam: quam ob causam mihi fas esse crediderim, auxilium & consilium ab omnibus expetere. Si itaq; inter tuas plantas, quas prope innumeratas a te afferuarijcio Poteris, Moly, Pycnocomum, Mantacum, Solanum Bulbus esculentus & vomitorius, Phyteuma, Catanance montana Nardus reperiri possint, rogo ut ea omnia quantum poteris maturius ad me transmittas, vel ipsarum plantarum imagines. Dabo enim operam, ut quicquid auri, vel argenti hac in re exposueris, id totum tibi quam libentissime reponam. Ghini Pyrethrum reperi inter ea, quae olim mihi misisti simplicia, ac pariter Hiermodactylum. Mito tibi nunc Pyrethri mei ramulum vna cum radice, quod te nunquam vidisse aus: quem autem posthac flores ediderit, integram tibi plantam conferre abo mittendam, vna cum alisma, quam antea petieras. Nullo enim plane negotio id efficiam, cum utranque plantam abunde proferat Bohemicum solum. Dum Goritia agerem misit ad me Bononia Vincentius Cantonius Medicus, municeps meus, arboris cuiusdam ramulculum baccis refertum pulcherrimis in purpura nigrescentibus: quarum plantam pro vera ac legitima Lotoarboire, a Fabricio Garzono Medico Bononiensi se accepisse narrabat. Sed cum tunc Bohemico itinere me accingerem negotiis occupatus, nescio quo pacto plantam neglexerim, & quo in loco recondiderim: namq; domi posthac frater meus illam reperire non potuit. Erat quidem planta aspectu perquam iucundo, baccis pulcherrime serie dispositis ac copiosis, quae (ut audio) istuc Bononia nescio in quibus praclaris edibus habetur. Cum autem plantam hanc recuperare cupiam, velim ut pro tua erga me benivolentia, Fabricium ipsum meo nomine alloquarui atque ipsum roges, ut tibi ramulculum eiusdem arboris iterum mihi mittendum det. Audio enim hominem esse humanum, doctum, benignum, & mei etiam amantiissimum, cui opto ut non solum me commendes sed & offeras, velimque ut ad me scribas, quo nomine istuc hanc arborem vulgo nuncupent, & tuam de illa sententiam. Mito nunc ad te Oxyacanthae meae aliquot baccas, quae non unum tantum nucleum, sed duos vna se concludunt, ut hinc eorum argumenta expleta fueris, qui hanc plantam Oxyacantham esse negant, quo leuis baccae unum tantum officulum habeant, cum proprium sit Oxyacanthae plures habere, ut illi affirmant. Postremo facies mihi rem perquam gratissimam, si tuam de consilagine opinionem ad me scripseris, velim tamen ut antequam id agas, meam etiam de ea videas sententiam, ubi sum de Elleborum Dioscoridem commentari. Plura nunc ad te scribenda non sua currunt: si qua interim sese offerant, de his alias ad te scribam. Vale. Pragae pridie Idus Septembris.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Hieronymo Heroldo, Medico Norimbergensi,

S. P. D.

Tractatur de consilagine, Elleboro nigro, venenatis sagittis, Eupatorio Mesux & Secacul.

Ellebori nigri
altera species.

Ccepi literas tuas vna cum ea planta, quam ego alteram Ellebori nigri speciem esse statuo, tu vero Consiliginem cum Fuchsio & Trago esse censens, mirorque quod tam deleteria facultatis hanc esse scribas, cum huiusce plantae radicibus ego saepe numero sum vsus in atrabiliaris morbis magno sane iuuamento, ubi alterius Ellebori purpureum florem ferentis non erant ad manu. Quinimo Tridentini Myropola atque etiam Foroiulenses nullum aliud, quam hoc

Florum colores in
plantis quanquam
species variant,
genus tamen non
immutant.

veratrum colligunt, quo postea Medici vtuntur. Ideoque hanc nequaquam Consiliginem esse putarem, sed certam veratri nigri speciem, qua herbaceos flores proferat. Nec quisquam mirari debet, si nigram veratrum diuersas habeat species florum, colore & foliorum exilitate vel magnitudine differentes, quemadmodum in quam plurimis aliis plantis continue videmus. Hec enim quanquam speciem variant, genus tamen immutare non possunt. Nam, si exempli causa Symphytum maius videmus reperiri flore albo, melino ac purpureo, idemque spectamus in Ononide, in Cynosorchis, in Antirrhino, in Ocimoide, in Rosis, in Iasmeno, in Irise, de quarum plantarum varietate (excipio Leucotum) nihil, quod sciam, meminit Dioscorides. Quid igitur vetabit, quin etiam plures veratri nigri species reperiri queant? Nempe ut haec flores edat purpureos, illa albos (quemadmodum ego diligenter obseruaui) & altera herbaceos, & alia ex candido purpurascens? Ceterum qui Consiliginis historiam & eius faciem notasse conscripserit, nusquam me legere memini, quo fit, ut eius non mirari nequeam, qui Elleborum hunc tam temere Consiliginem esse statuant. At fortasse dicas a facultate facile cognosci posse, hanc plantam esse Consiliginem, quod in sanandis a pulmonis pecoribus, ubi in traiecta inseratur aure, quam belle consiliginis obeat munus. Valeret quidem hoc argumentum, praesertim ubi alia non adsint nota, nisi Hieroclem, Absyrtum & Plinium habere auctores, qui nigram Elleborum scriberent idem efficacissime prestare, cuius haec planta, si omnes eius

Consiliginis ex-
aminatio.

nota

hanc ac facultates diu genitius expendantur, est proculdubio species. Namque etiam si Dioscorides unam tantum nigri Ellebori speciem descripserit, id tamen natura obstaculo nunquam erit, quin alius quoque Elleborus nigri procreari possit, et in aliis quam plurimis (et super iudicimus) eam fuisse non ignoramus. Præterea, cum plantam hanc, ut etiam patens facultate quadam venenosa non vacet perinde ac qualis et alcerius Ellebori nigri, speciem miror ane quorundam auctores, tam temere afferere audeant, qui tali auctum opinione hanc plantam esse conuulgentem, cum, ut ait Plinius de perarum in Phibis eius radice compertantissimum esse medicamentum, sed tibi debere ex aqua, haberi que a. d. ne sub lingua. Hoc si sua cum Consilagine, tentabunt, nulli dubium est, quin inobediens quodamque quam primum e medio tollant. Nihil præterea in peau hanc plantam Ellebori esse fessentem, quod cum caulis in terram perduret annum, et si uicis speciem induat, cum nigrum Elleborum in montibus, sepe uiderim, sola nunquam amittere. Et si uicis speciem induat, cum nigrum Elleborum in montibus, sepe uiderim, sola nunquam amittere. Et si uicis speciem induat, cum nigrum Elleborum in montibus, sepe uiderim, sola nunquam amittere.

20 Inscitela a uenatoribus Ellebori nigro succo, ut hoc veneni genere constata, feraciter uentent, hæc tamen non asidui. Sed otamen arte quam parari ex a. b. i. Veratrum radicem succo venenum, quod in his sagittis et uentur Hispani uenatores, id ut mihi experimento constat, ubi sanguinem congerit, artem hanc quæcunque paulo post interficit. Verum enim uero me non parum admirationem adauxit, quod si uicis speciem induat, nisi magna fuerit quantitas, nihil plane in comedi afferre solet. Ideoque ipsi uesce uenitote affirmant, cum purgationes alui moliri cupiunt, ob idque nihil mirum si ferina carnes hoc ueneni genere conquisita, nihil proficiat comedentes inficiant. Verum ubi facta a saculo uulnere sanguini se immisuerit, nullo alio modo, o. enuari animal potest, nisi demoratus Cotonem malis, id quod a Cajure Verandando p. uesce an dicit. Fabulari itaque eos putar in uel aqua uel in gram. uera r. m. p. o. a. b. o. accipere dixerim, quod si hoc illud quoque prorsus esse affirmant. Quandoquidem tantum abest, et nigrum ueratrum copacit animalis necare queat, ut perforatis auribus uel lateribus immissum uirum crine facile extrahat. Hoc sane pastores et reuistic ad lecti, non ignorant, quippe qui boues pestilentia laborantes et a serpente demoratos infertis Ellebori nigri radicibus in eorum auribus, pedibus crinibusque, partim curant. Ceterum ad id, quod sententia mea in Secaculo et Eupatorio a. M. i. u. e. r. i. p. t. a. n. d. a. m. a. s. s. e. n. t. i. u. p. o. s. i. t. et ob id admonet, et diligenter Mesuem inspiciam, nil aliud nunc resciscande opere precium mihi uideatur, nisi ut tu epistolam istam meam attentius relegas, et mea argumenta accuratius inspicias. Quod si præstiteris et potius ueritati indaganda, quam mordacæ opinioni tue, retinende in manu, et mentem applicueris, multo antea Mesuem me diligenter legite accurateque inspectis facultate intellegas. Hoc tantum de Secaculo addam, quo tecum scribit Auicenna libro quinto Secaculo esse radices peregrinas Zingiberi similes, que ex India aduehuntur, id sicut superque affirmare crediderim, eos uero hanc uenari, qui putant Secaculo esse plantam que F. u. h. s. d. i. e. r. designat. Aliqui si hac non sufficiant, non uideo sane, quo pacto tecum de his ulterius agam, præsertim, ubi neglecta argumenti nostri, quibus tere uolere therabam, nil aliud mecum ago, quam quod iterum ad Mesuem referenda uoluerim. Quam cum antea satis uiderim legerim, parcau obsecro, si in hoc tantum nunc tibi morem non geram. Vale.

Sagitta...
Cottoni...
Data...

Cotonea...
an...
uen...
astag...

Elleboro nigro...
cur...
pro...
laborantia.

Secaculo...
sicut...

V DALRICVS LEONORVS MEDICVS, Petro Andree Matthiolo S. P. D.

Queritur an Syrupi aluum deficientes recte, secureq. dari possint pluribus continuis diebus, in diuurnis præsertim morbis.

20 **T** si scia. Excellentissime Matthiolo, te semper multis et grauibus tui in curandis agris, tui in rebus etiam medica (quæ certe his temporibus egyptie et fideliter illustrare et excolere iudicis) publicis ac utilissimis occupari laboribus, det. a tamen in me humanitate et benemolentia tantam spem conceps, ut certo mihi persuaserim quod si te his utilissimis lucubrationibus intentum, aliquantisper ab usdem abstrahere uidebor, am inter saltem si lacuru hanc morulam, præsertim uero cum non tam proprii commodi, quam ueritate et publica utilitatis coram te promouendo gratia, rei ipsius dignitas ad te ut scribam, me compulerit. Sane sane quidam medici, qui cum ceteris de illis uidevi uolunt semper quidam impetulare quo ab aliis differant, h. b. t. e. n. t. et si quid ab aliis ex ratione etiam factum conspexerint, id tamen et soli sapere putentur, ut probare non uentent, atque et suam furo quodam obuenient malitiam, ubi diuina rationem et experientiam oppugnare se posse minime fidunt, ad auctoritates tantidem Hippocratis et Galeni confugiunt, quas pro suis firmandis opinionibus sacras uent, ac parum apte adducere solent, nam adducta uel nihil ex eorum re factant, uel si quid tamen facere uidentur, ubi diligentius inspecta fuerint, pariter nihil pro defendendis eorum ineptis rationibus et experientia contrariis, pugnareprehenduntur. Sed ego tales homines nouitati potius ostentande, quam ueritatis tuenda studio, uulgo placeote uolentes, multum tibi sapere concedo, parum alius arbitror. Ex horum autem cœtu etiam esse puo hos nostros aduersarios, qui usum frequentiore Syruporum aluum deficientium humana saluti nocentissimum clamitant, ac propterea omnibus modis extirpandum suadent: atq. ut noui quid (prout solent) adferre uideantur, nouum commentum ueteribus inuicatum atq. contra eorum statuta recepisse dicunt, adducentes et hoc Hippocratis: Concocta medicari atq. non uere non cruda. Nobis uero ipsius rei experientia diuersum testatur. Videmus enim quæ plurimos in Germania Medicos his Syrupis summa cū laude et agrorantiu comodo uti, ipsi quoq. quotidie eorū experimur uirtute, et quanto minus eos nocere dicere possumus, tanto magis ut nulla alia medicamenta in diuurnis præsertim morbis conferre proficere cogamur, necesse est. Et quāuis nos illorū parū moneant uani strepitus, tamen ne reliqui etiam a tam salubriū medicamentorū usu istorum deterreantur clamoribus, negotiū hoc tam uile, tam necessariū, tuū desidei et patrociniū, in quod ut illud suscipias perquam rogo ac intercedo. Quod si

feceris magna voluptate nos afficies & opinionem nostram confirmabis, & premunies, illos vero non medio-
criter confundes & de manifesta pertinacia coargues, si in Syrupis tua publice eo abundius hac de re aperueris
sententiam, nempe, An recte commodeque dari possint in morbis, praesertimque diuturnis, Syrupi aluum de-
icientes pluribus continuis diebus, ut quam plurimi in Germania faciunt Medici, felices admodum (ut
ipsi dicunt & nos experimur) successu. Quin & an hoc fieri possit, praeter celebratissimum Hippocratis & Ga-
leni institutum, qui Concocta medicari, & non mouere cruda praecipunt. Quod si feceris, additis aliquot
eiusmodi Syruporum formulis (sicut non dubito) non solum a nobis, sed a posteritate quoque, ut in aliis pluribus,
ita etiam in hoc magnam mereberis laudem. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS,
Ulrico Leonoro medico,
S. P. D.

Probatum dari posse Syrupos aluum deicientes pluribus continuis diebus
in morbis diuturnis, nec esse praeter Hippocratis,
& Galeni institutum.

Questio an syra-
i aluum citan-
si- quenter,
possint in



Eficiunt propemodum ingrauescente iam aetate caloris innati flamma, qua ad studia ante hac ani-
mum incendebant. Quamobrem ne mireris, si tuis literis tam diu non responderim. Quaris amo-
an commode recteque dari possint in morbis, praesertimque diuturnis, Syrupi aluum deicientes pluribus
continuis diebus, ut plurimi in Germania faciunt Medici, felices admodum (ut illi dicunt) successu.
Quin etiam petis an hoc fieri possit, praeter Hippocratis & Galeni institutum, qui concocta medicari praeci-
unt, & mouere non cruda. Quis istio sane non vulgaris hac est, & qua mihi negotii non parum accessit, tum quod
de his disserere absque labore nequeam, tum etiam quod non desint Medicae facultatis periti, quorum nonnulli
Hippocratem sequuti, hosce Syrupos non solum dari prohibent, sed maledictis & execrationibus detestantur:
alii vero contra experimento & rationibus quibusdam nixi, eos ceteris fere preferunt medicamentis & secu-
re recteque dari posse contendunt. Namque si hos vel dari prohibeam, vel praecipiam, non deerunt, qui no-
stram improbarent sententiam, & mihi fortasse laborem facient. Verum tamen si mihi laborem & periculum
subeundum esse sciam, constitui tamen potius ea in re tibi gratificari, quam laborem subterfugere & aduer-
sarium morsus pertimescere. Existimo enim plures fore, qui nostram sententiam sint comprobaturi, quam
qui eam conuellerent conabuntur. Erunt etiam alii opinionem nostram sequuti, qui non solum eam pro viri-
li defendent, sed etiam a molorem petulantiam compescunt. Ut autem, quod de re hac sententiam tibi explicare
incipiam, in primis distinguendum est, de quo Syruporum genere nobis intelligendum sit, an scilicet de his, qui
clementioribus parantur aluum deicientibus medicamentis, cuiusmodi sunt Cassia, Manna, Rhabarbarum,
Rosarum dilutum numerosis macerationibus paratum, aut Syrupus ex eo confectus, aut ipse purus rosarum
succus, Fumaria, Mercurialis, Epithymum, Myrobalana, Sena, Polypodium, & huiusce classis alia: vel de
his, qua Scammonium, vel Turpetum, vel Pyrusam, vel agrestis Cucumeris succum, vel Elleborum, vel
alia similia, qua electiue (ut aiunt) purgant, & proprie quaeppaxa a deleteria eorum vi appellauit Graecorum
antiquitas, excipiunt. Si itaque de his, qui tantum clementissimis illis parantur simplicibus, intelligamus,
haud dubie affirmabo, facile, & recte dari posse hos in diuturnis morbis, pluribus continuis diebus: nec esse id
praeter Hippocratis & Galeni institutum. Alios vero minime. Quandoquidem si recte Hippocratis verba
expendantur, qua sic habent πείρατα φάρμακων ἐν τῷ κρείττω, μὴ ὀμὰ, facile sane deprehendet quispiam, non ali-
ud per φάρμακων velle illum, quam non debere cum Pharmacia, id est, cum electiue purgantibus medica-
mentis immatura expelli, quod eiusmodi pharmaca, ubi humores incoctos repererint, eos non deiciant sed san-
guinem inficiant colligentque, ac perniciose sint. Eiusmodi enim medicamenta hisce de causis dari vetant Hip-
pocrates & Galenus, non autem qua clementiora sunt, nec electiue, nec fortiter purgant, nec ullo praeterea modo
sanguinem colligare, vel insicere possunt: horum per pauca ipsis cognita fuisse. Namque Cassiam nigram, Rha-
barbarum, Myrobalana Senam, nec ipse Hippocrates, nec Galenus nouit unquam. De Manna tamen memi-
nit in libro tertio de aliment facultatibus, de melle scribens. Item de Rosis libro octauo, de simplicium medica-
mentorum viribus, sed utriusque medicamenti deiectionem facultatem ignorauit. Id quod post haec multum
diligentia explorarunt Mauritanii, qui recte sane clementiora haec medicamenta Benedicta vocauerunt, quod
nihil in eis repererint, quo sumentium corpora ullo afficerentur incommodo. Quamobrem in morborum etiam
acutorum principiis, magna cum utilitate haec propinquantur a medicis. Siquidem si negligantur humores in ven-
triculo ac locis illi propinquis existentes trahuntur post haec per uniuersum corpus in venas, non sine egrorantium
discrimine. Ideoque haud recte mea quidem sententia, haecenus contendere quidam, nulla facta medica-
mentorum distinctione, dari non debere deiectionem facultatem in morborum principiis, qui si sciuisent, de quibus
intellexerit Hippocrates, & quid illi proprie designet φάρμακων, a clementioribus abstinere Medicos non pro-
hibuissent. At qui nolunt ob hoc fortasse putare, me affirmare velle, Syrupos aluum citantes in egritudinum prin-
cipio non duobus diebus pluribus dari posse. Quandoquidem, qua in ventriculo locisque circumstantibus sunt ex-
crementa tot non indigent euacuationibus. Sed cum in principio ea omnia medicamenta, quibus idem Syru-
pi consistunt, tuto dari possunt, longe tutius dantur ubi iam materia concoquitur, nec profus fuerit matura.
Nec putes velim meum hoc esse institutum, sed Galeni. Quippe qui lib. 13. de Met. cap. 15. de iocinoris phlegmone
agens, iam ubi coctio aliqua fieri incipiat, vacuare non docet assiduis medicamentis aluum deicientibus, his
verbis. Procedente autem tempore, ubi phlegmon iam concoquitur, etiam valentioribus urinam mouentibus
medicamentis in cibis uti licet, nempe Asaro & Celtica nardo, & Phn quod nominant, & Petroselino, &
Smyrnis

Medicamenta
clementia, quae
dicantur.

Medicamenta
quae electiue pur-
gant.

Nec Manna nec
rosarum deie-
ctionem facul-
tatem nouit Ga-
lenus.
Clementia medi-
camenta cum v-
tilitate propina-
nt in morborum
principiis.

Galenum in io-
cinoris phlegmo-
ne quod dicitur de
diffusione huius
ta aluum deici-
entia.

Syrupis & Mleo, sicut etiam per ventrem vacuare, si iocinoris canum afficiunt, Cnico eibus admisto, & vni-
ra, & Mercurialis, & Foethymo, & Poirpodio, & omnibus praterea que modice aluum ducunt, magis se
in remissionibus, cum his ipsis audacius, quam ante, utendum tum vero que hu sunt, valentiora partim in
Pisana incolitur, partim tuis & in molli, sicut puluerem redactis. Exhibenda vero & hac sunt, vel ex Pisa-
na, vel ex aqua. Egonamq, etiam Polypody aliquid in Pisana aliquando incoxi, & nigri veratri corticem.

Nigrum veratri
corticem & Polypod-
ium in Pisana
quo de
partim

10 magis concoquatur materia etiam valentiora, ut Eleborus Pisana incolitur. Quo fit ut nihil sit quod prohi-
beat, quominus possimus etiam nos huiusmodi medicamenta sicut temporis propinare, & praesertim clementi-
ribus admista, quod hac prater id quod aluum ducunt, propria sua facultate manente, subinde quod acuti-
bus exuperantes humores preparant. Et quum fere omnia partim attenuent partim incidant, partim aperiant,
partim abstergant, quarum facultatum auxilio coctum crudo admistum facile separantur & excedunt, tunc de
propria horum medicamentorum virtute. Seruans hanc medendi normam p'issim ab omnibus in remissionibus
Medicis, tam qui probant, quam qui improbant, in contumacibus febribus, animaluero. Significat etiam
p'issim Syrupis ad coctionem facientibus, ac exolvente subinde pharmaco, seorsus non remiserit ad alios sicut in pro-
perant, quorum vis humorum preparationi peridonea habeatur. Sed id plerumq, cum Rhabarbaro expediunt, mo-
do Syrupos propinantes qui Rhabarbarum exceperunt, modo in usdem Rhabarbarum macerantes tenui linteolo

Quod prohi-
beat, quominus
possimus etiam
nos huiusmodi
medicamenta
sicut temporis
propinare, &
praesertim clementi-
ribus admista,

Medicis omnes
in d'acuta, fe-
bris veru in Sy-
rupis Rhabarba-
ro.

20 ex eptum & pluribus assiduis diebus propinantes. Caterum perquam facillime etiam dantur hoc modo aliu
ciantes Syrupis in rigidis admodum & pituitosis affectibus, quum etiam in us qui ex adu'is proueniunt humo-
ribus quorum coactio vel tardae admodum, vel fortasse nunquam sit futura, ideoq, Aucenna Epilepticis quoti-
diebis Hieram Uermetis propinari praecipit. Quare in d'io cordis anno toto quod diebus, vniuersa huiusmodi
ma non fore Comitialibus attonitu & vertiginibus propinandum adert. Ideo, si fortiora & electiore purgan-
tia medicamenta in huius morbis non ine auxilii oportet adere. Medici continuis diebus, quid prohibebis er-
go, quominus nos in similibus morbis seorsus in clementibus conamus? ac etiam quandoque, ubi necessitas ad-
sit electiore purgantibus, ut Galenus in Eleborum aciebat? Nihil sane, nisi potius a quorundam opinionibus,
quam rationibus & experientia adhaerere velimus. Eadem enim conuenire (ut diximus) in adu'stis mor-
bis nihil mihi verendum est, cum Galenus libro secundo ad Glaucomem, Cancrum purgantibus medicamen-

Dioscorides an-
to toto vitis abx
radicem epile-
pticis propinan-
dum laudet.

Cancrum frequen-
tibus in edicandis
purgantibus
curat Galenus.

30 tis, ex quibus simul sequitur, prompte succumbere cribit. Et id iam dix facientium praecipiat, donec sanitas
pristinam partem subsistat. Id quod etiam reperit lib. 14. Methodi cap. 9 his verbis, Communis igitur cura
tio est, ut humorem in l' vitium est, nam in illico vacues simili vacuationis genere est, qua in aliis tumoribus
supra est comprehensa max probibere possimum si fieri potest, ne de caetero eiusmodi succus in venis coacta-
tur. Sed id fieri nequit, si tunc cum omnino ex intervallo vacuare & huiusmodi partium firmare ne quid humo-
rum redundante valeam consistat. Quibus palam est nihil ane ob stare, ubi in diuturnis & contumacibus
affectibus vitati humores continere possunt, quum medicamentis aluum ducientibus frequenter vacuen-
tur, hac tamen conditione (ut Galenus inquit) ut ea in miscantur, quae laesit' arguentibusque partibus ro-
bur conferre valeant. Cuiusmodi sunt Myrobalanorum omne genus, Rhabarbarum, Rosarum succus,
ac etiam acidi d'yle, quos Tamarindos vocant officina. Siquidem ubi frequentioribus euacuationibus ali-

40 quid non accideret, quo robur affectus partem adderet, nihil profecto noxius esset qua frequenter euacuare.
Atqui quum omnibus palam sit, quod in pituitosis morbu maxime conferat, extenuatio, hac etiam ratione hi
Syrupis conuenient, ubi in diuturnis affectibus pituita plurimum redundet. Quippe non solum iude morbi ma-
teriam partem partim preparabunt, partim educent, eo quo praediximus modo, sed peculiariter etiam exte-
nuabunt. Quod autem hac aluum ducentia medicamenta assidue sumpta corpora nostra extenuent, manife-
stip il in facit Galenus lib. 6 cap. 8. de sanitate tuenda, ubi obesos extenuare docet, his verbis. In his, qui im-
modice sunt obesi minuenda id gestio est augenda vero corporis exhalatio. Porro minuetur digestio assidua ve-
tris deiectione, nepe assuescentibus nobis nutrimenti instrumenta quaecumq, continent, ea statim pessimum im-
pellere. Corporis autem ex d'atio augetur, celeri exercitatione. De quo autem medicamentorum genere hic
intellegerit Galenus, de his intelligam ego, de quibus meministi lib. 3. Methodi in iocinoris inflammatione,

Syruporum pur-
gantium vidi-
tas.

Obesorum corpo-
ra assidue purga-
ntibus medicame-
tis extenuari do-
cet Galenus.

50 nempe de Mercurialis, Cnico, Filicula, Epithymo, Poirpodio, & huiusce classis aliis Id quod aperissime decla-
rauit Aucenna Fen septima, quarto capite de corporis obesitate si. inquit, Et medicinae lenientes naturam,
valde eis conferunt. Extenuant enim corpora quoniam conuertunt cibum a venis, & ideo quando administran-
tur, multoties fit motus utriusque purgantis, & confusio utriusque ex aere, quod vadit ad eas apud quemlibet
motum humorum ad intestina, & quando sunt medicinae lenientes naturam, subsistantes & diuretica, nec
peruenit ad venas res magna ex nutrimento. Hac ille. Quibus facile patet huiusmodi eos, qui in morbi Gallici

Argumenta con-
tra eos qui in cura
morbi Gallici
deiectionis medi-
camenta cum
Guaiaci decocto
miseri prohi-
beat.

60 curati in eos redarguunt qui ligni Guaiaci decocto medicamenta hac ducentia assidue addunt, cum nihil ma-
gis in hoc morbo conueniat, quam extenuatio exiccatione, quam perpetuo molimur cum Guaiaci deco-
cto. Nec valet eorum argumentum, quod ubi aluum ducentia illa eidem decocto admisceantur, illico deper-
datur decocti ipsius propria facultas, qua sanari morbum Gallicum fatemur, quum facultas hac superari non
possit, nisi alia forte, se alterius medicamenti propria facultate, qua illi fuerit contraria. Nam sicut manifesta
ligni illius qualitates calidae & sicca minime impediunt, in iocinore calida & sicca temperie affecto, et in mor-
bo Gallico semper euenire non ambigimus, quominus vis illa occulta iecur ad suam temperiem naturalem
revertatur, ita nec ducentia aluum medicamenta id efficere valent, imo potius decocti ipsius vires augent, quod
materiae continue minuunt & exiccationem augent, adeo ut non opus sit tam tenui victus ratione uti agro-
tantes. Hoc valet multoties exemplum, qui cum nullo alio medicamento, nec simplici Guaiaci decocto pluris sumpto
sanari potuerunt in huiusmodi deiectionis medicamenti admixto, sanati sunt. Atqui animaduertendum est,
quod in similibus ac diuturnis morbis, ubi humores praesens non sint, hi Syrupi aluum mouentes propinari non debent,
nisi prius al. qua facta fuerit coactio crudorum humorum. Sed hac cum valde calidis & tenuium partium medica-
mentis faciendae non est & talium facultas concoquendi non sit sed preparandi, quae iam concocta sunt, vel coquo-
caperint. uicibus.

Purgantia medi-
camenta cum
Guaiaci decocto
magno dati au-
xilio.

Quid seruandū
in propinandis
Syrupis aluum du-
centibus.

Quib⁹ cum me-
dicamentis hu-
morum crudorū
cōcoctio sit mo-
lienda.

Qua ratione
quove tempore
concocta prępa-
rari debeant.

Medicos omnes
plurimum debe-
re Mauritanis
authoribus.

Syrupi primi ad
pituitosos affe-
ctus parandi ra-
tio.

*cęperint. Namq; si cruda adhuc existente materia, calidiora medicamenta propinentur, morbum proculda-
bio augebunt cruditates in venas pellentia. Non itaque cum his concoctionem moliri debemus, sed cum tempo-
rate calidis, ut Galenus docuit, in quarto de ratione victus, commento quadragesimo quarto. Hoc autem non
solum fieri debet cum his, quatinus in corpus sumuntur, sed etiam cum his, quę exterius applicantur, nempe
fomentis & inunctionibus ventriculo & hypochondriis adhibitis, ut idem Galenus docuit, quarto de sanitate
tuenda. Quę in re maxime prestat Chamamalinum olenm & Chamamali florum decoctum. Namq; hu-
xilis fovetur naturalis calor, adeo ut quiescentibus ob id humoribus commode concoctio fiat. Quippe quę-
admodum quies temperat usq; calor ad hoc maxime faciunt, ę contra agitatio, quę a calidis valde medicame-
tis fit in humoribus, quietem impedit, & naturalem calorem accendit, quo postea fit, ut non concoquantur hu-
mores isti, sed potius putrescant. Vbi vero concocta fuerit materia, vel saltem concoqui cęperit, securius cali-
dioribus uti possumus medicamentis ad eius preparationem conficiendam, una cum exoluentibus alium Sy-
rupu, ut etiam antea dictum ęst. At ubi humores pręassati fuerint, cum ii veram concoctionē pertransierint,
quanquam vera concoctione tunc opus non ęst, oportet tamen nos innatum iuvare calorem, quo incoctos hu-
mores cum pręassatis coninnetos concoquas, adeo ut semper nobis opus sit, aliquam prius moliri concoctionem,
antequam ad hosce Syrupos veniamus. Possẽm quidem adhuc tibi plura de re hac in medium adferre, quę nec-
iam ostendere, quod multi sint inter recentiores, ut Montanus ille clarissimus, qui huiusmodi utuntur Sy-
rupis experientia docti, sed ne Minervam docere videar, lubens ea omnia pretereo. Addam autem tantũ hoc,
quod plurimum Medici debeamus Mauritanis, qui nobis hac tam salubria ostenderunt medicamenta,
quibus tutius uti possumus, tam in diuturnis quam in acutis morbis, in quibus non nisi magno cum agri-
tantium discrimine electiue deicientia medicamēta propinari possunt. Nunc autem reliquum ęst, ut prima
facta pętitione, hic tibi describam, quo pacto hosce Syrupos parare soleam, in pituitosis & atrabiliaris affeci-
bus, quę etiam in morbi Gallici curatione. Quod & si sciam supervacaneum esse, quod non desint præclarissi-
mi Medici qui ante me similes descripserunt Syrupos, ne tamẽ fortasse putares me hoc laboris velle subterfuge-
re, hic habes, quo ego utor in pituitosis & Melancholicis affectibus.*

Sumito itaq; Adianti

- Aspleni
- Betonica
- Agrimonię
- Intubi
- Cichorii
- Amaraci
- Florum Stęchadis
- Salvia
- Rorismarini

Singulorum manipulum.

Radicum,

- Fęniculi
- Petroselini cōmunis,
- Asparagi
- Eryngii
- Centaurii maioris

Sing. unciam.

Polypodii contusi drachmas VI.

Seminum,

- Anisi
- Fęniculi
- Amm
- Coriandri
- Agallochi drachmas II.

Singulorum sesquinciã.

Santalorum, Flauorum
Alborum

Sing. drach. III.

*Fervefacito hac omnia servato coctiois ordine, in aqua libris decem ad tertias, & subinde mudo linte-
lo percolato. Sumito deinde, Foliorum Senę orientalis libram.*

Cinnamomi electissimi drachmas X.

Florum cordialium Sing. unciam.

*Excipito hac omnia fiftili vitreato vel stanneo vase angusti orificii, & affuso decocto prescripto seruo-
ti, macerentur in calido loco, ocluso vasis ore duobus diebus continuis. Demum colentur.*

Sumito item huius diluti lib. III.

*Diluti Rosati pluribus rosarũ macerationib. parati, vel succi rosarũ puri, ubi dilutũ nõ esset ad manũ, li. II.
Sacchari libras III.*

*Coquito ad tertias, & tunc addito Rhabarbari selecti crassiuscule selecti sesquinciã. Turpeti optimi semina-
ciam, & coquito usq; ad Iulapii consistentiam. Demum sacculo lineo percolato, & vase mundo asservata.*

Atqui si compendium desideras, hoc aliud parari iubeto, minori tempore ac labore.

Sumito, Foliorum, Senę orientalis uncias. IIII.

Absinthii Pontici manip. Semis.

- Adianti
- Aspleni
- Intubi
- Cichorii
- Melissophylli
- Betonica
- Hysopi
- Agrimonię

Singulorum manipulum.

Radicum, Fęniculi unciam.

Syrupi secundi
breuior parandi
modus.

Petroselinii }
 Apii }
 Asparagi } Sing. drachmas VI.
 Polypodii }
 Eryngii }

Glycyrrhizae mundata drach. III.
 Anisi }
 Foeniculi } Singulorum Semiunciam
 Apii }
 Animi }

Cinnamomi selectissimi drachmas V.
 Rhabarbari optimi drach. VI.
 Turpetigenans drach. III.
 Agarici crudi praestantissimi semiunciam.

Coquito omnia in aqua quod sufficit, servato legitima coctionis ordinem ad tertias, & deinde addito Sacchari albi quantum satis fuerit ad conciliandam dulcedinem. Praebeto quotidie diluculo uncias quatuor, aut quinque, pro morbi, aetatis, & virium ratione.

Ceterum ubi velis his uti medicamentis, in Melanchol. affectibus, Epithymum & radicem nigri veratri cortices pro arbitrio addito. Quineti: Myrobolana, Chebula, Empelica Nigra, cum in diluto, sumo etiam in decoctis.

In morbi Gallici autem curatione ita parato.

Sumito	Fumaria	} Singulorum manipi
	Adianti	
	Aspleni	
	Intubi	
	Agrimonia	
	Cichorii	
	Pulegii	
	Betonica	
	Melissophylli	
	Lupulorum	
Florum	Stæchadis	} Sing. unciam.
	Borraginis	
	Buglossi	
	Rosarum rubearum	
Radicum,	Glycyrrhizae	
	Foeniculi	
	Borraginis	
	Buglossi	
	Centaurii maioris	
	Polypodii uncias IIII.	
Seminum	Anisorum	} cuiusq; semiunciam
	Peonia	
	Foeniculi	
Corticum	Myrobalanorum	} Sing. drach. X.
	Chebulorum	
	Emplicorum	
	Nigrorum	
	Radicum Elleberi nigri unciam.	
Zedoaria drachmas.		} Sing. semiunciam.
Sansalorum Flavorum Alborum		

Syrupus in melle, choleis affectibus.
 Syrupus Guaiaci decocto admiscendus.

Coquito omnia in aqua quod sufficit, servata legitima coctionis norma, & deinde linteolo percolato.

Sumito deinde, Foliorum Senae orientalis libram }
 Epithymi Cretici uncias IIII. }

Cinnamomi selectissimi minutim concisi unciam.

Excipito tria haec fictili vel stanneo vase haud amplioris, & deinde affundito decocti praescripti fermentis lib. VI. & concluso vasis ore ne quid expirare possit in loco calido collocato, macerasq; sic horis quinquaginta. Demum percolato.

Sumito post huiusmodi Diluti lib. IIII.

Diluti rosarum crebris macerationibus parati, vel sacci rosarum puri ubi diluere non sit ad manus, libras II.

Syrupi de pomis Sabor Regis libram.

Sacchari libras III.

Coquito ad tertias, postea addito Rhabarbari in tenues particulas secti semiunciam. Et coquito deinde quousque concipiat. Iulapi consistentiam, postea colato & asservato. Propinato mane binas uncias, & usque ad tres, ubi adstrictior fuerit alvus, additis Guaiaci decocti uncias quaternas quibusque. Quiescat deinde affectus, nec sudet. Vesperis sumat decocti Guaiaci simplicis horis tribus ante cenam uncias septem & sudet. Et post sudorem Syrupus alius 2 ebibat eiusdem decocti uncias quatuor, & post horam capiat cibum. Vbi autem copiosius medicamentum pendiosior parari cupias, ita rem expedite.

Sumito,

Sumite, Decocti primi Guaiaci lib. VII.
 Foliorum Sena orientalis lib. V.
 Rhabarbari selecti unciam.
 Epithymi drachmas X.
 Polyposi semicontusi uncias V.
 Radicum Borrachinis
 Bugiossi } Sing. se unciam.
 Glycyrrhiza }
 Seminis Anisi unciam.
 Ammi semiunciam.
 Florum cordialium singulorum unciam.
 Santalorum Flauorum } cuiusque drac. III.
 Alborum }

Coquito simul omnia seruato coctionis artificio ad tertias, deinde addito Sacchari quod sat fuerit ad conciliandam dulcedinem. Præbeto diuiculo senas uncias, nec affectum sudari sinito. Reliqua expedito ut in altero diximus.

Hac boni consulas velim, mi Vrice dilectissime. Interim si quid aliud habeo, quo tibi gratificari possim, velim intelligas, nihil mihi esse tam carum, quo minus illud tibi etiam impertiar libentissime. Vale. Praga.

IOANNES CRATO MEDICVS,
 Petro Andreae Matthiolo.
 S. P. D.

Hortatur Crato Matthiolum, ne ob maleuolorum insectationes à Republica iuuanda suis studiis se dimoueat.

Beneficam tuam naturam & publici commodi studiosissimum plurimam amari: ac cum laboribus tuis saepe suavissime perfruar, aliquoties mihi in animo fuit, tibi pro mea parte gratias agere, reque si quo modo possem, in curriculo industria, in quo tibi malevolentia atque impudentissima maledicentia, impedimenta quaedam obiciuntur (etsi virtus tua confirmatione nostra non egere videatur) confirmare. Sed amoris atque officii mei iter nescio quid impediuit, nec inepto mouendi partes, quae sunt prudentia, mihi assumere volui. Cum autem intelligam, te singulari studio iterum in eo esse, ut Dioscorides illustrissimus ab ingenii tui prestantia & artificum manu conspicatur, hac exigua quidem sed grati atque beneuoli animi mei ignificatione tibi calcem addere visum fuit, ac si hoc pateris, rogare, ne laudatias Borussi, aut aliorum insectationes a laudabili instituto te dimouere patiaris. Minime recta via laudem affectant, qui eam ex alterius ignominia petunt, & maledictum maledicto trudere, perinde est ac insaniam insanendo depellere. Tuis laudibus, quas omnis posteritas exceptura est grate, tua fama, Borussus ille conquisitis monstris vocabulorum ineptissime, parum apud bonos & virtutis rectique amantes nocuit. Ienus si commouit, sua pessime consuluit. Vnica autem Socratica ratio respondendi conuenientissima videtur: Nihil respondere, & plagas ac si asinus calce te percussisset, a quo animo pati praesertim cum vera proferre atque tueri absque altercatione & dimicatione liceat. Sed nescio quomodo de labor ad id quod huic Epistola non erat propositum. Illud ostendere significatione aliqua, ac potius tibi confirmare tanquam Syngrapha volui, te (si quid hoc tua refert) a me non solum propter tua in rem Medicam praclarissima merita, valde amari, verum etiam propter exquisitam doctrinam & industriae excellentiam singularem, tanti fieri, quanti ab eo potes, qui eximias ingenii tui dotes & virtutes intime nouit, candidissime aestimat, & perspicitissimas habet. Hunc meum animum si ulla re verius, atque euidentius, quam lueris probare poterō, efficiam, ut id quod sum, me tui studiosissimum & amantissimum cognoscas. Nobilem & prestantem virum dominum Sauromannum, ut ex his meis literis, tanquam me amantem complectaris, magnopere peto. Bene vale. Vratia slauia.

Contra Guilandinum.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS,
 Iohanni Cratoni. S. P. D.

Respondetur precedenti epistole. Detegitur quanta sit in historia plantarum Guilandini imperitia, & eius nonnulla discernuntur calumnia.

Non dixerim facile, mi Crato, quantum mihi placuerit tuum de Borusso illo impudentissimo iudicium, non certe quod gaudeam doctos viros inimicitias suscipere cum obrectatoribus meis, sed quod illorum testimonio, apud omnes inclarescat nefarie & prope dixerim scelerate istorum cum agere, dum maledicis & virulentis scriptis inuidiam mihi & laboribus meis facere nituntur. Id quod ita magno cum affectu, tamque pertinace animo agunt, ut tanquam rabie correpti canes, si illis ira aduersus innocentiam, percussis lateribus & morsu, aut sicut tu prudenter dixisti, etiam calcibus tanquam asini quidam me impiant. Atque, utinam quanto strepitu spiritusque, pronoluunt criminationum maledictorumque, saorum factitatem, tam firmis argumentis, aut saltem probabilibus veritati patrocinari si non possent.

possent, niterentur saltem, equiore certe animo acciperemus etiã ea, qua contra nostrã sententiã afferrentur. Sapiens tu quidem, & amicissime precipis, ne passus a Borussi, vel aliorumcunq, maledictis, ac in seclationibus a meo me dimoueri instituo, verum ego ita vitam meam iam pridem institui, ut nihil mihi magnopere metuendum existimarem, quod quidem a culpa absit. Quinetiam, id quoque in animum induxi meum, et a iuuanda meis studiis posteritate, nullis calumniis, nullis latratibus me auertere sinam. Etenim si pulchrum est (ut dixit) laudari a laudato viro, putarim quidem a perditissimis nebulonibus & impudentissimis Sycophantibus laudari, prudentem virum neminem optare. quum id hominum genus laudare nesciat, nisi a finos su. similes. Imo vero ab iisdem si vituperetur studiosi, & de Republica bene meriti, maximo id illis semper esse honori existimaui, cum huiuscemodi insidiatorũ consilia, nihil aliud moliantur, quã virtutẽ opprimere, veritatemq, confundere, vitium vero (si tantum possent) extollere & mendaciũ fucatis sophismatibus ubi cunq, alere, et praeceteris hisce illusionibus, miraculis aliquid in medium afferre videantur. Huius factionis principem locum obtinere hoc eno Guilandinum, quem tu vna cum ceteris merito vituperas, neminem iam latere cenẽo qui eum in me calumniis criminationes, conuitia, maledictaque omni sane scditatum genere illita, in libello illo, non ita pridem Patavii edito, perlegerunt, a quo iam omnes tam eius amici quam inimici, quibus veritas, ac humanitas cordie est, tanquam a scetore intolerabili nares non aliter auertunt, quam ab horribili quacunq, latrina. Quam antiẽ, praeter id quod malum est, etiam amens sit. palam facit infelicissimi libelli vel titulus solus. Cum enim cum Apologia nomine inscribat, tanquam refutationem eorum, qua a me contra eum in Epistola ad Celeberrimũ virum Gabrielem Faloppium de Bulbo, Castaneo, Oloconit: de Mamyra & aliis nonnullis incognitis ei plantis dicta erant, instituisset, mox instituti sui oblitus nihil eorum affert, nec facit, quã mendax inscriptio pollicebatur. sed se totum addidit conuitiis, nisi quod obiter mihi quaedam errata, centũ circiter numero (ut ipse inquit) obicit. Quod si ego contra vanum hunc hominem facere vellem, hoc est, & dicere & facere, qua facile possem, tam angustam ei citra magnum meum negotium Europam redderem, et vestigium in ea quo pedem poneret, vix esset inuẽturus. Sed melius est me temperare, vel iustissima ira mea. Iam vero quam leuibus armis, cõtra me pugnat, dum errores (ut ille ait) quosdam meos nudos nulla addita ratione, nec etiam antiquorũ scriptorũ auctoritate recẽt, ipse tu, mi Crato, ista considera si placet, & haud dubie insignem pessimi hominis ubiq, impudentiam, & rei plantaria imperitiã deprehendes, quotiescunq, me erroris alicuius insimulat. I. Confundere me in primis duo medicamẽta scribit, Foliũ & malabathrum. Sed manifeste mendacis illum accusant studiosi omnes, qui mea in Dioscoridem commẽtaria perlegerunt, ubi Syriaci foliũ & Indici Malabathri, non confuse (ut ille mentiri non erubescit) sed aperte, & perquam distincte ex Plinio me mini. Siquidem alterum haberi dixeram in Syria nascens quadam ex arbore folio conuoluto, colore arido, ex quo oleum ad vnguenta exprimebatur, alterũ vero in India, in paludibus gignit, lentis palustris modo, Graeci Μαλάβατρον appellant. II. Eade praeterea calumnia in Cassia, & Cinnamomo me falso insimulat, cũ tam aperte mentiri audeat. scripsisse Galenum Cinnamomũ transire in Cassiam, non autẽ Cassiam, ut ego verterã, trãfire in Cinnamomũ. Sed tam procacis nebulonis calumniã, quam maxime detestantur Galeni ipsius verba. lib. i. cap. ii. de Antidotis, qua sic habet. Επει δὲ μάλα πικρὸν εἶπεν ἐν γαλλάνῳ εἰς σαγαπνὸν ἔσον ἀν ἀφρῆδες ἐν αὐτῷ οὐσαν καὶ λευκὸν ἑτοιμῶς ἐν ἰχθῶ κίεται, σεθδεῖναι μὲν τοι καὶ τῷ λόγῳ, καὶ μάλα δὲ τὴν ὁμοιότητα τῆς μεταπέσεως ἐκ τῆς ἀείσης καὶ αἰσῆς κινάμομον ἐδιασάμω γάρ ἦδη πολλάκις ἰφίλης καὶ εὐδαλῆς καὶ αἰσῆς, ὡς εἰς θαμνομέζεδος ἀνίκειν, ἀκρέμονας πνας ἀκείβῳ ὁμοίως κινάμομῳ κατὰ τὴν ὕψιν, καὶ τῷ φλοῖν τῷ λεπτότητι, καὶ πρὸς τούτοις ἐπὶ τὰ βεβαυότατα γυνώσματα κινάμομῳ δὲ τῆς γούσεως τε καὶ ὁσφρήτους γινόμενα, id est. Quandoquidẽ autem dixi transire ex Galbana in Sagapennũ, quisquid illius spumosum, cõsistens, albũq, facile in humorẽ dissoluitur, addendũ etiã hoc sermoni est, & maxime propter similitudinẽ permutationis ex optima Cassia in Cinnamomũ. Nimirum vidi iam sepius Cassia procera, quãq, ita feliciter excreuisset, ut ad fruticis magnitudinẽ perueniret, germina exquisita, plane similitudine Cinnamomi, tã quo ad aspectũ, quam corticis tenuitatẽ, aliasq, certissimas Cinnamomi notas, quas tũ gustu tũ odoratu exploramus. Atqui longe etiã cumulatius cap. 14. eiusdẽ lib. idem recitaui Gal. sic inquitens. ὅτι δὲ ἡ καὶ αἰσῆς πλησίον τῷ κινάμομῳ τῷ γένει καὶ γὰρ καὶ γίνεται ποτε κινάμομον ἐκ μάλα βολῆς αὐτῆς ὡς ἔλεον μὲν ἔρῳ τὸ οἶον δένδρον ἀκείβῳ καὶ αἰσῆς ἀκρέμονας δὲ πνας ἐν αὐτῷ κινάμομῳ συνεχῆς, τοῖς κλάδοις τῆς καὶ αἰσῆς εὐεῖς κείδαι id est, Cassia autẽm genere ad Cinnamomum accedit. Etenim sit nonnunquam ex transmutatione illius Cinnamomum, adeo ut conspiciatur quidem tota ipsa quasi arbor exquisita Cassia, germina autẽm quaedam in ea Cinnamomi continua ipis Cassia ramis reperiantur. Hec ille. Qua quidem qui legunt, non sine indignatione & stomacho mendacissimi hominis temeritatem exhibitant, ac execrantur, sibi certo persuadentes, diuinius hunc apud Aristophanẽ mimum, histronẽ, parasitumq, professum, quam apud Dioscoride & Galenum in plãtaria praesertim facultate versatũ. III. Ceterũ quam etiã a Poetis explodenda veniat nomi huiusce interpretis sententia in censendo Viburno, qui tam elato supercilio Viburnum clamat, non planta alicuius singularis esse nomen, sed cuiuscunq, in vniuersum virgulis fruticisue proprium, ij facile indicabunt, qui rerum Epithetis examinandis diuinius insudarunt. Inquit enim Vergilius. Quantum lenta solent inter Viburna Cupressi. Sed cum frutices, virgultaq, prope innumera habeantur, spinosa, rigida, obdura, duritie ramis, nec vlla in parte obsequiosis, huiusce fabulatoris insolentia omnibus palam sit, qui nulli lensori obnoxii, sed veritati tuenda addidit, rigidiori vultu hasce intuentur ineptias. Quibus praeceteris refragatur Ruellius, qui in replantaria examinanda, indagandaq, inter recentiores facile primas tenet, quemadmodum multiplici lectione, Latini & Graeci sermonis peritia, quã plurimos antecellit. Is enim cõtra nugatoris huiusce fabellas, eã ipsam plantam Viburnum putat, cuius nos imaginẽ appingi curamus. Non solum quod flexilis, ac lenta valde omnibus suis partibus habeatur, sed etiã quod in Gallia haec tenus propriũ retineat nomen. Siquidem Galli arbusculam hanc, vna tantũ detrita litera, suo idiomate Viurna vocant. IIII. Atqui an Armenius bolus (de Orientali & seclẽtissimo loquor) quo passim vtuntur Medici, terra sit Sinopica, non sine reprehensione respondebit Agricola precellens fossilium indagator, quippe qui tametsi hac olim a Sinope Cappadocia vrbe, vnde nomen inuenit, importabatur, nihilo secim haberi alibi etiam inquit: in aurariis, argentariis, arariis ferrariisq, metallis, in quibus in Ilia (ut alias diximus) Tyrrheni pelagi Insula, huiusce rubrica plurimũ inuenitur. Est enim hac (ut Dioscorides inquit) grauis, densa, ad iocinoris imaginem vergens, non autẽm (ut seclẽtissimũ Armeniu bolus) leuis, & bucyri instar pinguis. Vtimur & nos nostra Sinope, quam vilẽ, rudẽq, bolũ Septusia appellant, ad

Laudatur Cratonis consilium.

Nebulonum Sycophantarumq, munus.

Guilandini apologia.

Guilandini obiectio in folio & Malabathro explorata.

Calinia in Cassia & Cinnamomo confutata.

Cassiam transmutari in Cinnamomum, non e contra, contra Guilandini inscientiam.

Guilandini sententia in Viburno improbata.

Calumnia in Armenio Bolo confutata, non esse Sinopicam terram.

Medicamentum non esse Consuetudine.

Saliuncam non esse Nardum Celiticam. Dictamnium albi non esse Tragium. Cneoron non esse Thymalaeam quae Chamalaeam Cneoron Theophrasti Cneoron Dioscoridis & Galeni dicitur.

Cneorum Cassiam ab Igino appellari.

Guilandini ignorantia in censendo Ben rubro.

Galenus a Guilandini impugnatione defenditur.

Sabinam Bacciferam reperiri.

Guilandini calumniam in Cedro explosa. Veratrum album non esse Consiliginem.

Herbam Belladonnam non esse Mandragoram Calumniam in solonico Solano excelsa.

Rotundum piper non esse Cubebam.

Santala nostrum visum legitimum.

sanguinis profluuium, quemadmodum & Galenus usus est, ubi Lemnia terra non erat ad manum. Quae in re non obscuras sane vires retinet. Zedoariam praeterea legitimum esse costum, ut impudens somniauit Guilandinus negabunt proculdubio Dioscorides & Galenus. Ille quidem quod Helenii radicibus, quae vegeta magna sunt, Costum adulterari scribat, hic vero quod pluribus in locis asserat Costum ex discufforia & adstringente conflare facultate, & adeo eximii fragrantisq; esse odoris, ut non minus ad unguenta odoratiora paranda eius apud antiquos inualuerit usus, quam malabathri, amomi, casia atq; myrrha. quibus tamen tu notis tu facultatibus Zedoaria prorsus destituitur, cum potius grauius, quam suauiter oleat. Adde quod Costo Galenus leuissimam plane amaritudinem & validam tribuit acredinem. Sed haec in Zedoaria contrario modo se habent, cum in ea validior amaritudo, & acrorem remissior gustu facile deprehendatur. VI. Saliuncam quoque non esse Celiticam Nardum manifesto indicat Plinius libr. 21. quippe qui uno & eodem capite, de utraque speciatim egit, tanquam de plantis inter se differentibus. Nec praeter id, ea tantum iis dissident notis apud antiquos aures, sed etiam natali solo & viribus. VII. Nec minus in censendo albo Dictamno, quod Dioscoridis Tragium facit, hallucinatus deprehenditur sordidus hic Matthiolumastix, cum Tragium Dioscoridi sit semine, folio, ramis, singulis Lentisco minoribus, Dictamni vero huiusce folia, triplo Lentisci foliis maiora habeantur. Adde quod e Tragio lachryma distillet, qua illa spicula e vulneribus euiciat. Id quod in alba Dictamno nusquam haecenus usum est. VIII. Cneorum quod videat inter adulterinas Thymalaeae non enolaturas habere Dioscoridem, quodque habeat Galenus libro nono, capit. tertio de compositione medicamentorum ex Archigene *κνέωρον ἢ ἐνίοι χαμαλαίαν καλοῦσι*: quinetiam quod scribat Plinius libr. 23. capit. 21. Thymalaeam aliquibus Cneorum, aliquibus Cneoron vocari, id quod me adnotasse ignorabat, non sine ingenti latratu barbarus ille Canis me adoritur. Verumenimvero, si tantum rei herbariae peritia, quantum maledicentiae haberet, facile quidem nouisset utrumque Theophrasti Cneoron, a Dioscoridis & Galeni Cneoro pluribus differre notis, quinetiam a Cneoro, de quo hoc loco meminit Plinius. Theophrasto duo Cneori genera descripta reperio. Album quidem odoratum & nigrum inodorum. Atqui utrunq; radice nititur grandi alteque descendente, floretq; post equinoctium autumni, & multo denique tempore flores humiq; se spargit. Thymalaea vero Chamalaeae ambae graueolentes sunt, grandi altaq; radice haudquaquam nituntur, nec florent nisi Vere inchoante, nec humi procumbunt. Adde quod nigro Cneoro folia Tamaris reddidit Theophrastus. Sed eiusmodi folia, nec Chamalaeae, nec Thymalaeae insunt. De hoc albi Cneori genere meminit Plin. libr. 21. cap. 9 inter odoratas plantas, quibus ad coronas utebatur antiquitas, & Cassiam appellari Igino scribit, quem postea sequutus est Gaza. De altero vero Cneoro, de quo Dioscorides & Galenus scripserunt, in quo Gnidium granum nasci ait, meminit is loco superius citato. Scribit de Gnidio grano Theophrastus statim simul ac de pipere egit, non autem, ubi tam diligenter Cneori historia describitur lib. 6. cap. 2 de plantarum historia, utpote, qui Gnidium granum non ignorabat (Cneori non esse fructum). Plura autem reperio plantarum similia nomina quae tamen varias denotant plantas. Telephium plantae per se est, ita proprie appellata, verum & semper uinum uertit ipsi quoq; Dioscoridi Telephium appellatur. Helxine, Parthenium idem appellat Dioscorides, Asarum Baccarem, & Asplenium Hemionium, cum tamen Parthenium, Baccharis, Hemionium alia per se sint planta. Haec qui ignorant, & de his ratiocinari volunt, nil mirum si a peritis derideantur. IX. Imaginem quam pro Limonio appinximus genuinum Ben rubrum Mauritanorum unum cum vulgo esse pronuntiat, cum tamen nullis notis Ben ipsum referat. Feram tamen patienter, quae hac in censura, de syluestri beta contra me affert quod eadem de re, longe magis laceret Galenum, ut Plinius seruet, qui aliorum fidem sequutus, in quam pluribus deceptus est. Is enim Limonium syluestre Beta esse ait. Quo fit, ut non Galenus, neq; Matthiolus, qui de Limonio satis superq; scripserunt, male herbarii (ut ille inquit asinus) Betam syluestrem subtrahere cupiant, sed Plinius & Guilandinus, id facere nitantur. X. Bacciferam Sabinam si nunc, quam vidit, tam summus plantarum indagator cur Eufhsium & Matthiolum reprehendit? Matthiolum scio ego e Baccifero ramo suam appinxisse Sabinam nec vereor quinetiam Eufhsium suam quoq; ex vna planta delineari curauerit. Sed huiusce rei seueri Rhetorom censuram inanem, infirmamq; pronuntiant Auicenna, ac etiam Serapio, qui de Sabina baccis apertis se me meminere, & in medicum usum vertere. XI. Porro iam ad stuporem usq; huiusce calumniatoris insolentiam, infidelitatemq; demiror, quod mentiri non erubescat, scripsisse me Cedrum magnam bacciferam esse arborem. Homini tam procacis mendacium deprehendunt, qui mea legerunt in Dioscoridem commentaria. XII. Quid dicam etiam de huiusce blateroni in consiliginis censura, ubi mentiri tam temere audeat? Inquit enim, quinetiam, etiam affirmat, Plinio, Columella, Vegetio, Absyrtog, Veratrum album Consiliginem vocari, cum tamen horum nemo id ullibi scribat. Consiliginis radicem inquit Plinius deploratis in Phisipraestantibus esse medicamentum, sed bibi debere ex aqua, habetiq; assidue sub lingua. Vbi autem legerit nouus hic Aesculapius albo Veratro curari posse Phisipros, subdicit, id Glycyrrhizae vice sub lingua, recitet is inter cetera, quae refert, deliramenta.

Letetur futura posteritas tantum se medicum habitura, qui hac consiliginem tabidos ab inferis reuocet ad vitam. XIII. Solanum maius, Italiae herba Belladonna vocatum, Mandragoram esse Theophrasti contendit, unica tantum racemorum nota cum tamen, nec foliorum, nec florum, nec caulium, nec radicis usquam meminerit Theophrastus. Non enim planta ex racemis tantum, ut ex auribus Asini cognosci possunt, sed aliis pluribus notis. XIII. Somnificum a Luca Ghino acerrimo simplicium indagatore Pisis mihi transmissum est sine floribus, crocatis baccis folliculo obiectis frequentibus caulibus foliis plenis, malo cotoneo amulis, & (ut Theophrastus inquit) pilosis, & in ima parte latoribus, radice subalba ut in sicca platea idem assignat Theophrastus, & ut Ghinus assererebat, saxosis locis & maritimis nascens. Haec itaq; si perpendamus notas, vanam acerrimi sophistae censuram facile esse desicimus praesidium. XV. Rotundum piper Indicum iam negotiator factus, Theophrasto Cubebam esse statuit. Sed videat diligentius oportet inuertatq; piperis aceruos si ad mentem reuocari cupit. Ibi enim innumera reperiet rotunda piperis baccas, subrubro adhuc putamine obductas, minime rugosas erui amulas, tegmine, carne neque constantes (ut idem inquit Theophrastus) sicut laurina bacca. Cabeba enim suum intra putamen non carnem sed nucleum includit qui longe magis amarorem, quam ullam respicit acredinem. Maiori sane iniuria affici non poterat Theophrastus, quam illi genuinum rotundum subtrahere piper, ac si tam notum aroma illi fuisset ignotum. XVI. A reliqua de Myrsidano & Myrrhidano quod is rotundum piper facit, apud Hippo, respondebit Galenus, ane ille tam temere reprobat, libro de obscuris Hippo. vocibus. XVII. Santala nostrum visum contra huiusce conuulsi opinionem, Mauritanorum esse Santala perpetuo crediderim, sed aberrasse eos in eorum sepe ramis, unam cum ceteris a. β Medicis, non ambigo. Quae de maro & amayaco scripserim qui legerunt in

- mei in Dioscoridem comentarius, merito hunc damnabunt calumniatorem, & omnium mendacissimum promulgabunt. XIX. Fabariam, quam tã temere Telephium non esse me putasse censet, si quis Telephium modo calidam abstersorsamque dixerit, hunc extremo laborare stupore, quis non asserat? Hanc si (ut in commentariis nostris diximus) Telephium facere volumus, dicamus necesse est, hinc facultatibus nostram carere Fabariam, ob cœlis soliq; nostri temperiem, ut de Cyrenaisco Aroscribit Galen. Sed Telephium Theocrito Nicandri Scholasta vocari Scorpioidem nostram, nihil sane moror, quod plantis pro regionum more diversissima sint nomina. Sat quidem mihi est hanc plantam Dioscoridis Scorpioidem adeo per omnia referre, ut nulla pro sua nota sit, quare clamet. XX. Caterum quantum in censendis Dioscoridis nostri plantis valeat huiusce Pseudocrateia iudicium, quis non noscet in censendo Amello. Iam sententiam illum in Vergilium video, virgus una colligatis, ad eius compescendam insuetam. Si quisdem cum is florem, nō herbam describat, ferula excipiendū hunc esse putat, qui pro Amelli flore, vel Chelidoni minoris, vel Primule Tercio folia, dubia & incerta sententia accipiendum censet. An quisquam, nisi stolidus amensue, non videt nullam caulium sylvam ipsamq; ingentem (ut Vergilius idem scribit) ē Chelidonio minori, aut altera illa planta extollit? Taceo saporis asperitatem, qua in hisce plantis nulla reperitur, quin etiam florendi tempore praetero, quod tantum Vere ipso inchoante floreat Primula verus ac pariter Chelidonium illud aduentantibus ad nos hirundinibus, Amellus vero autumnus tempore, in tonsis a falce iam vallibus. Prater hac cum florem, non herbam describat Vergilius, de foliis illis sese in toto floris ambitu circūfundentibus scripsisse necesse est, nō de herbā cuiusvis folius. At qui sane demiror, quod eisdem ut tertium Amellum in medium afferret, maiorem nō attulerit Persicariā, quod hinc longe evidentiora, quam illis allatis plantis nigra illa stigmata in foliis videantur, ut numerosa in Amello progeniem relinqueret.
1. Caterum cum te virum doctissimum esse intelligam, cui mihi non opus sit, hac omnia explanare figmenta, cūq; iam ad nansam usq; de his alias disputaverim, plura hic Guilandini somnia nunc explanare non libuit, quin etiam ea potissimum causa, ne mea ingravescentis iam aetatis momenta, qua in posteritatis & Reipub. commodū mihi conferenda sunt, in hisce confutandis inanitatibus conteram. Borussum hunc divina esse indole facile intelligo, quod non sequi tantum naturam, sed eius praeire, non illam explicare, sed noui per se ipsum condere velle videtur. Non dubito quin ubi ex India in Italiā redierit, modo interim elementa, tam sublimem nobis non rapiant natura indagatorē, aliam naturam in Europā sit allaturus, qua inauditas plantarum animaliq; transformationes nobis pariat. Verum si hac duce suos etiam inhumanissimos non transformabit in merces, non deerit Reipub. vindices, qui Caco demonē hunc ad inferos repellant. Nam & in Helvetia Fraxinum natus scimus, qua non tantū virium facultate, sed ligni etiā robore huiusce Borussiacae viperæ venenū coercere potest. Egregiū vero excogitavit Symbolū, quo ad suū Oenopolium potantes alliceret. Quid enim stultius, quid insolentius, quid deniq; inconspicuum, quam unius tantum hominis causa universam in se concitare regionē. Et quam regionem? Helvetiā nimirū qua euertit se imis a fundamentis optavit potius, quā publicas iniurias impunitas relinquere. Audio a fide dignis hunc maledicorum obtrectatorumq; Coryphaeā, sua ē patria exulare publico montis Regii Academia decreto, quod seditiones nonnullas excitasset. Ideo mirum nobis esse non debet, si eo in Italiam reiecto ilico ibi plura corrumpi & male admodū olere cœperit. Agasonem Romae, & in Sicilia primū (ut audio) legit, quod tanta fuerit illi penuria panis, ut aliunde sibi victū comparare nequiverit, quā ex allatis e montibus suo cum asino radicibus, cum quo, cum tã diu versatus sit, nulli mirū videri debet, si asininos induerit mores. Facinorosum hominem nebuloni huic similitū nunquam antea genuisse Borussiam facile intelligo ex illius gentis bonorum doctorūq; virorū moribus, quibus cum & in Italia, & in Bohemia, ac etiam in Polonia non parua mihi intercessit consuetudo. Inter quos sunt Valerius Fidlerus, Matthias Stoius, ambo Borussiaci Principis Medici, Ioannes VVilbrochius apud Serenis. Ferdinandum, Archiducem Austriae, &c collegam meum, Robertus Finckius Serenis. Regina Poloniae Physicus, Bartholomaeus Vuagnerus, qui in amplissima Reipub. Dantisiana medicinam facit, & alii pleriq; quos partim de facie, partim ex scriptis noui. Horum doctrinā, humanitatem, pietatē, fidem, modestiā, insignemq; animi candorē, nescio quibus verbis, prout merentur, extollere debeā. Quo fit, ut credam hoc monstro patria pulso, nihil tibi post hac facinoris, factorisue esse reliquum. Sed ignosce obsecro mi Crato, si doloris iustissimi vehementia longius prouectus, molestias omnes animi mei, in tuū amicissimi mihi hominis sinū ita confidenter effudi. Leniri enim mihi aliqua ex parte videtur dolor meus, cum est, cum quo quasi partiri eum, vel colloquio, vel per literas commode possum. Caterum velim tibi persuadeas me, eam amicitiam, ad quam me tui primum libelli iam sapius in vulgus editi, deinde etiam nuper scripta humanissime ad me epistola inuitauit, sancte quoad vixero culturum, & ubicunq; occasio aliqua se dederit tua fama, & commodis tuis, omni studio seruaturum, Vale.

Fabariam deesse
esse facultate
Telephii.

Nicandri Scholasta
Telephii
quid.

Guilandini in Amello
manifesta
insuetia.

Fraxinum in Helvetia
natus ad
coercendā Guilandini
peculantiam.

Borussorum
Dantisiana
laus.

THADDÆVS NEMICVS A HAGEK
Medicus, Petro Andreæ Matthiolo,
S. P. D.

Queritur quid sint bacca piscatorie, quas Germanica officina vocant Cotulas Elephantinas.

- 60 **V**us erga me amor, & beneuolentia cū summa humanitate coniuncta, Doctissime Matthiolo, facit, ut liberius de communibus nostris studiis, vel praesens, vel per literas, dum ita fors fert, tecum colloquar. Quare etsi nihil mihi possit accidere gratis, tamen quod tuo illi me amori nihil adhuc reddere potuerim praeter parem beneuolentiam, & perpetuo memorem, pro tuis quam plurimis officiis erga me, voluntatē, aliquo animi angore afficio. Cui quidem, tum demū aliquid adiumenti & lenationis adferre videor, quoties mihi in conspectum propono, Deum & naturam ideo sane te praclaris illis dotibus animi & fortuna ornare voluisse, ut haberes & occasionē bene merendi de ceteris, & liceret etiā ex tuo abundanti & perenni doctrina fonte, uberrimā haurire cognitionē. Id quia & mihi iā saepe contigit, hanc felicitatem mihi grauior, & tibi mihi Matthiolo maximas ago gratias. Et quia nihil est quod vicissim nunc a me tibi praestari possit, perorare non desinā, ut tantisper meū in te redamando animā & beneuolentiā

MM 2 parem

Pharmacum ad
capiēdos pisces.

parēferas, donec maiorib. aliquando officiis tibi eundē declarauero. quod ad presentes literas attinet, cur eas ad
e scribā, et si coniectura ad equi potes, percontari me quidpiā ex te in doctrina simpl. (nam dābis potissimū inter
nos colloquia, & sermones miscere solemus) tamen ne diutius te de, in eā, ordine rem exponā. Paucis ab hinc die-
bus, accessit quidam meam officinam Pharmacopœam, & petiit sibi vendi, nostro idiomate Gebulas, officinā
Cotulas Elephantulas vocare consueuerunt. Et quoniam illas iam olim plene cognoscere desiderabam, hac re-
corda rone vetus illud desiderium noua quadam & ardenti cupidine vsq; eo in me exarsit, ut non conquesterē
animo, donec quidnam essent, ex te cognoscerem. Nam qui eas explicasset hactenus, quod sciam, vidi neminē.
Solutus Fuchs, virus praeclara eruditionis vir ab animali Elephante eas vocari putauit. Sed verisimilius fortasse est
grana alicuius planta esse, de quo quidem, quae tua sit sententia, malo potius te dicentem audire, quam incertis
agitari opinionibus. Hactenus praequam ad capiēdos pisces, quod equidem sciam, nullius usus erat in Me-
dicina. Solent autem eas miscere cum veteri caseo, melle & farina tritici. Inde formant globulos seu pilulas pisi
magnitudine, quas in flumen, ubi piscium concursus frequentior fieri consuevit, proiciunt. Alii hac sequenti
compositione utebantur, quae & ego dum essem adolescens delectabar, non quod tenerer studio capiēndorum
piscium, quam quod vehementer admirarer artē & effectum. Sic autem habet praedicta pharmaci compositio.
Sumito Cotularum Elephantularum, Adipis agni, cuiusque semiunciam, casei antiqui fescunciam, & Cana-
bini seminis unciam. His addito seminis Anethi, Hyosciami, cuiusque drachmas tres, farina tritici drachmas
duas, mellis drachmas sex, Caphura drachmam unam. Hac omnia in mortario in massam redigantur, & fi-
ant inde catapotia pisi magnitudine, quae flumini piacido iniecta (ne videlicet rapidius flumen pisces alio abri-
piat & deferat, unde posthac tolli non possint) & a piscibus deuorata, paulula interiecta mora, eos infatuant,
ut hinc inde nunc in flumine discursent, nunc moueantur in orbem, magna cum voluptate adolescentum.
Mox fatigati & iam fere exanimis, in summo fluminis natantes, reticulo piscatorio extrahuntur. Extra-
cti subito, vel exenterantur, vel in recentem aquam coniciuntur, eiecta prius ex illorum ore pilula deuorata,
qua plerumque adhuc in faucibus, ex ventriculo fortasse eorum reiecta, herere solet. Plerique redeunt ad se,
& quasi reuiuiscunt, quod etiam quibusdam accidit, si forte paulo diutius, vel in flumine relinquuntur, vel
vis fluminis in alium locum deferantur. Sed piscatoribus eiusmodi captura piscium odiosa est. Itaque qui
sic pisces capere desiderant, locum fluminis solitarium deligere solent, ubi nec a quoquam conspici, nec in eius-
modi captura deprehendi possint. Quod vero ex illo pharmaco sic infatuantur & exinguantur pisces si natura
illarum rerum, quae in commissionem veniunt, consideretur, omnis interim cotulis, non agre deprehendi po-
test. Duo enim sunt summa & praecipua, quae circa illam compositionem in considerationem veniunt, quo-
rum alterum est, quod delectat & allicit, alterum quod perniciem adfert. Quae delectant sunt haec tria, fari-
na tritici, mel & caseus: constat enim his plurimum pisces delectari: reliqua exitiosa sunt piscibus. Commis-
tur autem delectabilibus ne fraus deprehendatur. Sic interfecturi muscas exhibemus Arsenicum melle mistum:
hinc prouerbum: Sub melle fel & venenum. Semen Cannabis & Anethi calida sunt & sicca, praecipue ve-
re Cannabis caput ferit. Ac cotulas illas eiusdem esse facultatis, ac substantia calida & ignea ipse gustus in-
dicat. Adeps seu Seuum sensus hebetat, & somnolentiam inducit. Camphora nimia frigiditate stupefacit, &
Hyosciamus peculiariter exitiosus est piscibus. Habet enim vim deleteriam & mentem maxime turbat. Itaque
non mirum est si pisces ex deuoratione talis pharmaci sic veluti inebrientur & pereant. Sed ego cesso ulterius
rationem compositionis excutere, quin potius, ea omnia, tuo diligentissimo examini, & acutissimo iudicio re-
linquo, & ut ad me de hoc toto negotio perscribas, uehementer rogo. Bene vale, & me ut facis, ama. Praga.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS,

Thaddæo Nemico, à Hagek Medico

S. P. D.

Respondetur questionī praecedenti, & declaratur cur piscatoria bacca
à Germanis Pharmacopœis Cotula Elephantina
sunt appellata.



Omni consulas velim, quod petitioni hactenus tua non respondi. Nosti enim quot quantisque, sine
semper negotiis occupatus, quo sit, ut non dubitem, quin tu ipse meam excusaueris tarditatem.
Amote (ita Deus me amet) uehementer ob tuas in primis animi dotes, tum deinde ob multa
abs te in me collata officia, adeo ut voluntas, mihi nō desit tua in me voluntati pariter, ac equa-
liter correspondendi, modo pro tua de me expectatione, id tam facile prestare possim. Equidem
tameis in indaganda describendaq; simp. medic. historia consenuerim, tamen nihil unquam de rebus dubiis
affirmare ausim. Ideoq; cum id perpetuo vitauerim, nescio sane quo pacto in re non solum dubia, sed peregrina,
& cuius historia hactenus nobis a nemine quod sciam, tradita est, aliquid certi veri q; afferre possim. Bacca,
quas pharmacopœorum vulgus, Cotulas Elephantinas appellat, notas satis habeo, quin etiam earum vires. Sed
a qua proueniant planta, vel an ab herba, vel frutice, vel arbore, cum prorsus me lateat, non est quod putet, id
tibi aperire posse Matthiolum. Qui Alexandria Aegypti ad nos mercimonia conuehunt, nudas earum bac-
cas ferunt, quarum permulta suis adhuc racematim harent pediculis. hederæ corymborum modo. Id quum
pridem non animaduertissem, putabam has Tithymali alicuius esse fructus, quod Tithymalis omnibus necandis
pisces certissima sit facultas. At qui tractu temporis cum diligentius hasce baccas examinare, nec iis necari pi-
sce sed in soporem, vel stuporem agi videre, priorem coactus sum deferere sententiam. Quo factum est, ut post-
hac mihi persuaserim alicuius soporifera stirpis illius regionis, a qua deferuntur, eas esse fructus. Non tamē di-
cam Somnifici solani, Dorichni, aut Mandragora, q; hoc minime cōperitū habē, sed alterius fortasse planta,
quae si non genere us cōparanda sit viribus nihil secius similibus habeatur. Sed non desunt praeclara eruditionis
Viri in Germania, qui ab animali Elephate eas vocari putent. q; in Germania perperā ha Cotula Elephatina
à Myropolis (ut puto) appellari coeperint. Scio quidē no deesse inter hos qui afferere non sint veriti, Elephatinas
vocari q; Elephantis gratiā, sit cibus. Sed iā veritate longe sane aberrant, ut statim audes. Allata primū sunt
ba bac-

Cotula Elephan-
tina.

Tithymali om-
nes pisces ne-
cant.

- ha bacca in Italiam, nullo appellata nomine. quo factum est ut nostra ueniente uocata sint à Venetis ne-
gotiatoribus Coccoled. Leuante. id est. bacca orientalis. Coccoled enim Italis, Venetique praesertim, nō sū-
lind designans quam ueniat. nec aliud Leuante. quam Orientem. Hoc nomen postea in uariis partibus Italiam
dimulgatum est. Deinde uero cum a Germanis mercatoribus uia uniuersis peregrinis mercimoniis defer-
rentur in Germaniam, uocariq; eas audiuissent Venetis Coccoled. Leuante, idem Italicam linguam sua a-
pera prolataone corumpentes Cotulas di. E. eshante eas ipsas uocauerunt. Quam uocem, siue nomenclaturam
recipientes subinde Pharmacopaei Cotulas Elephanti in istis buccas Latine appellare ceperunt. Nomencla-
tionis origo tam apud Italos quam apud Germanos sic habet. Nec est, quod plura quam haec de orientalibus
baccis a me expectes, quod nemo harum. historiarum (quod si uerum legerim, que hactenus descripserit. Quan-
tum autem ad Pharmacia paranda ex Orientalibus haec baccis rationem attinet, ad fallendos pisces, etsi de
omnibus, qua in illud ueniunt, medicamentis, & que adeo sū rationatiuū, ut nihil iere addi posse crediderim,
ne fortasse tamen subterfugendi laboris causa, me nil de hac re ad te scribere uelle putares, si in silentio prae-
terirem. Et ne potius assentatoris quam fidelis amici consilium me se qui censes, situm in hac re iudicium pra-
ceteris laudarem, relinquere sanè non possum quominus meam, ut rogas, tibi de his aperiam sententiam.
Placet sanè (ut in genue sarear) qua de tritici farina, melle & caseo aspersis, quinetiam qua de Canabino &
Anethino semine censes, quod hoc sua propria facultate somnum conciliet, illud caput feriat. Atqui dum o-
rientium baccarum facultates mihi propono examinandas, cum adeo soporiferas esse sciam, ut sumentes in
stuporem agant, easdem sanè calidas, igneas, siccas, & que habere uires, nota facile mihi persuadere possum.
Soporiferas esse has manifesto est argumento, quod additis caseo tantum, & farina, ac subinde defruto, vel
dulci uino excepta piscibus que obiecta, si paulo post stupidifiant. Nec me a mea ueritate opinione amaror ille
qui gustu percipitur, qui que te non absque ratione calidas, esse has ad credendum inducit, quod Opium quo
nihil ualidius est in sopore stupore ue excitando, amaritudine longe maiori pollere uideamus. Qua quidem
amaritudo non impedit, si Galeno credimus) quominus Opium sit ex quarto refrigerantium ordine. Quin-
etiam amara sunt Papa serum capita foliaque quemadmodum & Mandragora radices amarore non uo-
cant, quae tamen omnes sua frigiditate somnum conciliant. Caphuram praeterea medicamentum esse frigi-
dissimum & sua ingenti frigiditate sumentes stupidos reddere, ut falsis Mauritanorum inualuit opinio,
haudquaquam mihi persuaserim. Namque cum non solum accensa uehementissime flagret etiam in aquam
proiecta, sed quod acutissimo sit odore, & usque adeo tenuissimum partium, ut nisi diligenter asseruetur fa-
cile in aerem euolet, quinetiam si mandatur, os totum excalet & siccat non est, quod credam tantillum
quidem frigiditatis in Caphura nostra reperiri posse. Talis itaque cum sit, tenuissimarumque partium
referta, recte quidem medicamentis frigidissimulis admisceri Caphuram putauerim, non refrigerandi, nec
stuporis inducendi causa sed ut crassorum medicamentorum uires secum uehat & facilius introducat in cor-
pus. Caterum facit nunc Caphura ipsius mentio, ut filere non possim me cum is haudquaquam sentire, quasi
si persuadent Caphuram bituminis esse genus. Quandoquidem, praeter id, quod scribat apertissime Serapio,
hanc ingentissima arboris esse resinam, & eius historiam pluribus diligentissime prosequatur si pernatur in distil-
latorio uase, nec oleū nec aquā mittit sed hydrargyri modo ad uasis cacumen ascendens, ibi candidior nitidior,
selectiorq; cohaeret. Id quod nulli praestat bituminum genus, siquidem haec omnia artificio & igne facile in ole-
um uertuntur. His paucis meam de orientalibus Baccis sententiam audisti quinetiam de medicamentis iis ad-
miscendis, nec pro a nunc sese offerunt, qua tuae petitionibus accommodare possim. Haec si probaueris labor
sanè plurimum. Sin minus, ea boni consulas opto, tanquam a me sincerissime prolata. Nec uelim, ob id desistas
de aliis etiam ad me scribere, ubi tibi sese aliqua offerat occasio: nam eo gratis nihil mihi unquam prestare po-
ueris. Vale. Prag.

P. Coccoled. bac-
ca. id est. haec
Orientalis
Pica una bac-
ca. uero Ger-
manis uocentur Co-
tula Elephan-
ta.

Orientalium bac-
carum facultas
examinatioque

Caphuram non
esse frigidissimam
Mauritanos

Caphura cur frigi-
dissima sit
medicamentis.

Caphuram non
esse genus bitu-
minis.

GEORGIUS A TURRICOMES ET LI-
ber Baro, Petro Andreae Matthiolo S. P. D.

- Vper Matthiolo doctissime, Pragae cum Parente obseruandissimo, Goritiam incolens redii, ubi
quum aliquandiu commorati essemus, tandem pater ipse, ut grauissimum animi dolorem, quem
ex tam recenti saetura (ut nostis) accepimus, cum ut publicas, tum priuatas occupationes, aliqua
ex parte rusticatione lenires, Rubiam se cotulis, cum quo ipse etiam sum profectus. Illic post qua
uile amoenitatem, caeli temperiem, illiusque rerum omnium oportunitatem, ac quae cum uo-
luptates tum fructus & utilitates, res rustica secum afferat, paulo accuratius mecum ipse cogitasset, plane il-
lorum explodendam esse sententiam cognoui, qui urbanis quasiuibus addicti, agriculturam damnant, eosque
sordidos, & minus liberales existimant, qui cum opibus & dignitate florent, relictis ciuilibus molestis, omni-
bus cupiditatibus soluti, ruri vitam agant. Constat enim antiqua illa florentissima Romanorum aetate sum-
mos viros, qui ad gubernacula Reipub. sedere consueuerant, in agris commorari, & Non tantum modo die-
bus, unde etiam Nundinarum conuentus sunt usurpati, ad res urbanas gerendas in Urbem per viatores eno-
cari solitos. Neque enim Quinto Cincinato obsessi Consulio liberatori uisio uertitur, quod ab aratro ad Dicta-
turam uenerit, aut Marcus Curtius, & C. Fabritius minus apud posteritatem laudis gloriaq; sunt consequuti,
quod Pyrrho ex Italia pulso, domitisq; Samnitibus, ruri, qua intra oppidorum moenia consensere maluerint.
Quinimo Cyrus ille prestans uir ingenio, & Imperii gloria Persarum Rex summus haud iniuria laudibus ce-
lebratur, propterea quod incredibili solertia & diligentia suis manibus arbores conserere, easq; dimittis & or-
dines in quincuncem dirigere solebat, ex quo ille a Lyfandro Lacedaemone summa uirtutis uero, beatus est appel-
latus, quoniam uirtutis suae fortunam consuetam esse cernebat. Cuius deinde exemplum secutus Diocletianus
Imperio sponte sese abdicauit, atque se in dulcia rura conferens, nullis persuasionibus potuit a rure beato auellis,
sed assidue predicans voluptates, qua ex agro excolendo percipiuntur, laetissimos solos dicere consueuerat, afful-
gere ruri habitatoribus. Denique, ut alios plerosque praeterea, potissimum autem Carolum V. Inuidiosissimum
Augustissimumq; Casarem adducam, qui rebus amplissimis gestis, Imperio Regnisque florentissimis, incredi-
bilis uirtutis magnitudine relictis, se in lectissimum quoddam Hispaniarum Cenobium, hortosque amoenissimos
recipiens,

Agriculturam
apud antiquos
in magna fuisse
ex estimatione.
Reges & consu-
les agricolae.

Carolus V. Ro-
manorum im-
perator.

Franciscus Tur-
rianus Comes,
rei Agrariae stu-
diolus.

Peticio.

recipiens, extremis vite dies, consimili rusticationis genere claudere decrevit. Summi enim & praeclarissimi vi-
ri animadverterunt rerum omnium mortalium nihil agricultura melius, nihil uberius, nihil homine liberius
dignius, nihil dulcius, aut iucundius excogitari posse. Sed hac pluribus fortasse quam par est, ad te virum eru-
ditissimum, non idcirco scripsi, quod tibi minime persuasum esse verear, istos urbanarum rerum studiosos lon-
ge a vera solidaque felicitatis usu aberrare. Sed ut intelligas Parentem quoque meum non frustra rei rusticae
summa delectatione duci, qui non modo villam hanc satis amplis ad usum & habitationem aedificiis, verum
etiam amplissimo leporario & amoenissimo pomario, ad voluptatē exornare instituit, in quo iam varia sunt arborum
semina consita, in quibus Amygdalarum, malorumque, diversigenis surculos inserendos curavit, quae nunc
mira iucunditate in singularem proceritatem adulescere videntur. Itaque ex eorum aspectu non modica oblecta-
tione afficior, frequenterque novum ingredior pomarium, ex arbuscularum tum ordinibus, tum viriditate sum-
mam voluptatem capiens. Verum sicuti Marcum Catonem illum seniosem, non modo fructus, verum
etiam vis, & natura rerum rusticarum magnopere delectabat, quoniam summa cum iucunditate confide-
rabat, quemadmodum terra gremio molli & subactō semē exciperet, ac deinde illud tepesactum vapo-
re & complexu suo diffunderet, atque eliceret herbescentem ex eo viriditatem, quae stirpium nuda fibris ad-
lesceret, & denique frugem optatā oportuno emitteret tempore. Ita mihi evenit, ut admiratione quadam deli-
cter, cum cogito, qua ratione ex fici tantulo grano, ex acino vinaceo, ex tam parvo cupressi semine (quod tu et-
iam in tuis eruditissimis in Dioscoridem commentariis es admiratus) aut aliis stirpium minutissimis semini-
bus, trunci ramique in tantam proceritatem, atque in malleolis, vitibus, radicibus, propagini-
bus, fructibus, plantisque omnibus varia & diversa ratione, singulari quasi miraculo natura operetur, fru-
gesque producat, quae cum ad voluptatem & alimenta humana, tum in re medica praecipuum obtineant
usum. Quo fit, ut me plena perfectaque huius pomarii voluptate frui non posse putem, nisi non modo ea,
quae cum externe cernantur, & quotidiano percipiuntur usu, etiam a peritis agricolis disci possunt, verum
etiam vires & naturam frugum ipsarum arborum, cuius cognitionem eruditissimi duntaxat viri consequi
solent, exacte percipiam. Cuius rei cum incredibili teneam desiderio, neque alius occurrat, per quem hu-
ic cupiditati meae aequae ac per te satisfieri posse putem, has ad te dare institui, obnixē petens, ut quemadmodum
iam pridem luculentissime tuis in Dioscoridem commentariis omnium elegantissime & copiosissime planta-
rum stirpiumque historiam es prosecutus, tantoque & ingenii acumine, & dicendi copia simplicium medi-
camentorum materiam illustraveris, ut iure optimo inter nostrates istius facultatis scriptores principem locum
obtimeas, nunc singulare studium in describendis Amygdalarum malorumque, cuiuscumque generis viribus, usu,
natura & facultate adhibeas. Quo uno officio me tibi usque adeo devinxeris, ut si quem fructum aut ob-
lectationem ex ipso Pomario percipiam, id tibi, doctissimiisque scriptis tuis potissimum acceptum referam, Va-
le. Rubia.

PETRVS ANDREAS MATTHIO-
lus, Illustri Comiti Georgio à Turri,
S. P. D.

Tractatus de Amygdalarum, malorumque historia
& facultatibus.

Per paucis ante diebus, Illustris Comes ad te scripseram, cum mihi tua litera Corithia sunt reddita,
Iucundissima sane illa, & mihi gratissima, ut cui nihil optatus esset, quam de te ex te ipso ali-
quid tandem audire. Nam postquam Praga profectus eras, nihil de te neque a te in eum usque diem perla-
tum ad me fuerat. Gratulor autem tibi plurimum, te isthuc una cum Illustri patre sanum, bi-
larem, sospitemque peruenisse. Tua enim & patri tui salus quantum mihi cura esse debeat, sciunt
hic omnes, quos minime latet, quanta benevolentia, ac favore (quae vestra est humanitas atque benignitas) me
semper complexi sitis. Caterum, velim te scire, me saepe Deo Optimo Maximo maximas agere gratias, quod
Illustris pater tui meminerit patrociniō, cum hunc facile coniciam principis benevolentiam erga me indies
non parum augeri, & invidorum, maleolorumque, quibus ipsa virtus, & honorum virorum commoda sto-
machum faciunt, maleficos dentes penitus retorqueri. Placuit deinde mihi summopere id, quod de Amygda-
lis & Pomis tam humaniter a me petis, quippe quod nihil aliud unquam magis optarim, quam officia meo-
rum in tua, Illustris, genitoris tui conferre placita. Scribis itaque (si recte intellexi) esse tibi viridarium pul-
cherrimum, in quo praeter ceteras fructiferas arbores consitas esse Amygdalarum Malorumque, innumeras plan-
tas. Quorum fructibus, cum plurimum delecteris, cupi per literas a me scire, non solum quomodo tuis salubriter
vesci possis, sed utriusque arboris naturam & facultates. Quibus petitionibus tuis, & si forte es scribēd: genere,
non satisfaciam, quod ingenui tui praestantia & res ipsa exposcere videntur, nolim tamen ut id mihi negligē-
tia ascribas, quum omnia mea opera tibi morem gerere velim, sed si quid defuerit, id totum nostris occupationi-
bus, ut ascribas, opto. Amygdala itaque nuce anthorum omnium consensu, duorum sunt generum: Dulcis
scilicet, quarum in cibis est usus, & amara, quae tantum medicamentis expetuntur. Dulcium item (ut observa-
re poteris) plures sane sunt species. Siquidē quaedam magna sunt, quaedam parva, quaedam mediocres, quaedam com-
presse, quaedam rotundiores. Itē nonnulla durissimo conteguntur operimento, alia vero tam fragilis, ut non solum
dentibus, sed digitis cōfringi possint. Sunt itē quae duplici constant nucleo. Quo fit, ut pro generis varietate alia a-
lias dulcedine & suavitatem superent. Fiunt ex amaris dulces, si stipite circumfosso, & in una parte circumforato de-
fundatur. E duris item nucibus fragiles, mollesque, ex amaris dulces Amygdalas creabis, si radicibus ante flo-
res ablaqueatis, aqua calida frequenter ingeratur. Solet plerumque, etiam contingere Amygdalarum plantas, parum
esse

Amygdala nu-
ces duorum ge-
nerum.
Dulcium Amy-
gdalarum species
plures.
Quomodo ex a-
maris Amygdal-
is fieri dulces.
Dura Amygda-
larum nucamina
qua ratione fiat
fragilia.

- eff. feraces. quod quidem maxime agre ferunt cultores. Id si forte Amygdalus tuo in viridario in virentibus acciderit, facile fructigeras redas, si perforato arboris caudicis calculum inieceris & ita librum in quoque permiseris, ut foramen concludat. Praestat item ferreo palo arboris caudicem ut perforare, & deinde quernum paxillum forte percussione inferere. Nec minus id facile consequeris, si perforata cerebro radice tade prapungis cunctum malleo adiges. Seritur Amygdalus visis radice, anulo etiam ramo, & nuce ipsa. Tibi autem anulo ramo tibi ferenda fuerit, effossa ierobe, cacumen pro radice in terram figere iubebis, sic ut crassior lignosiorq; pars sursum peccet. Sed autumno hoc fieri expedit, priusquam hyems inualescat. At si nucibus id efficere libeat, ea terra non credam, nisi prius liquido fimo, vel aqua multa nocte una maceratas. Quod tamen facere oportet circa Calen. Februarias. Caterum nihil aequo degenerat, quam Amygdalus, ideoq; aut plantam sapienter transferri, aut adultam inseri praecipiant. Fructum perdis Amygdalus facillime ante maturitatem, nocetq; illi pium inimum Austrinum caelum. Sed audiam rom scitu pulcherrimam. Democritus posteritatis memoria prodidit, naves Amygdalus inscriptas, si aperto putamine quis nucleum illasum tollat, & in eo quod libet scribat, involutumq; charta & iterum luto, ac sulto stercore nucleum terra credat. Amarescunt dulces Amygdale si primo germine scella arbores a pecore decacamentur. Dulces (ut Galenus inquit libro 11. de aliment. facultatibus) nihil prorsus adstringentis facultatis sortis a sunt, sola enim extenuandi atq; abstergendi vi pollent, quia tum vis fera repurgant, tum humores e pulmonibus, ac thorace spatus expellorant. Oleosa tamen ac pinguis facultatis, ut iuglandes participes sunt, cuius causa & ipsa procedente tempore sunt, ut illa Oleosa, quod eis longe minor ignis haec qualitas, quam iuglandibus. Ex his sane intelligi potest, quod neq; ventri subducendo conferunt, neq; corpus multum nutriunt. Haec de dulcibus Amygdalis Galenus. Quibus omnibus palam sit, quam ridenda sit
- 10 aut adultam inseri praecipiant. Fructum perdis Amygdalus facillime ante maturitatem, nocetq; illi pium inimum Austrinum caelum. Sed audiam rom scitu pulcherrimam. Democritus posteritatis memoria prodidit, naves Amygdalus inscriptas, si aperto putamine quis nucleum illasum tollat, & in eo quod libet scribat, involutumq; charta & iterum luto, ac sulto stercore nucleum terra credat. Amarescunt dulces Amygdale si primo germine scella arbores a pecore decacamentur. Dulces (ut Galenus inquit libro 11. de aliment. facultatibus) nihil prorsus adstringentis facultatis sortis a sunt, sola enim extenuandi atq; abstergendi vi pollent, quia tum vis fera repurgant, tum humores e pulmonibus, ac thorace spatus expellorant. Oleosa tamen ac pinguis facultatis, ut iuglandes participes sunt, cuius causa & ipsa procedente tempore sunt, ut illa Oleosa, quod eis longe minor ignis haec qualitas, quam iuglandibus. Ex his sane intelligi potest, quod neq; ventri subducendo conferunt, neq; corpus multum nutriunt. Haec de dulcibus Amygdalis Galenus. Quibus omnibus palam sit, quam ridenda sit
- 20 corum sententia, qui lacteum cremorem e dulcibus Amygdalis parari solum dari minime debere anhelosis, caterisq; pectoris & pulmonum vitis laborantibus contendunt, quod falso sibi persuadant cremorem hunc omnino adstrictoria facultatis non obscure esse participem, eo tantum argumento freti, quod magno sane auxilio Dysentericis propinetur, minime advertentes, id euenire (si tamen vera referunt) non quod ulla sit in Amygdalu (ut Galenus inquit) adstrictoria facultas, sed praeter id quod alium non subducant (ut ipse etiam scribit) sua pinguis qualitate humorum acredinem, quibus plurimum Dysenteria fieri solet, resundant, & inest inordinatol dolores mulceat. Hinc itaq; hos prorsus hallucinari Medicos facile comperies, qui falsa hac opinione ducti, ventant dari lacteum Amygdalarum cremorem tussientibus, pleuriticis, anhelosis & asthmaticis contra Galeni & ceterorum probatissimorum auctorum sententiam. Sed iam tu ipse iudicare poteris, quam magno duceretur errore censor clarissimus ille, qui coram te, tam elato supercilio mecum contendebat, lacteum cremorem ex Amygdalis dulcibus expressum adstringenti vi non mediocri pollere, & ideo inspirandi difficultate non esse propinandum. Hac silentio involuenda non duxi, non tamen (ita me Dis amens) ut mea apud te crescat auctoritas, sed ut cognoscas non omnes de hoc recte differere posse. Hinc itaque facile quis intelligere poterit Amygdalas haudquaquam adstrictoria esse facultate, nihilquo magis earum cremore anhelosis, & quoniam pectoris ac pulmonum morbo laborantibus in cibis prodesse, cum parum nutriant, assenuent, detergant, viscera expurgent, tum humores e pulmone ac thorace educant ac promoveant. Praestant in cibis quoniam maturitatem adeptae recentes ab arbore decerpuntur, quod minus oleosae substantia pinguedinisque sint referta. Praestant item quatenus diu frigida fuerint macerata, ut facile delibrari queant, praesertim si cum ficibus denorentur. Sicca vero, quae nullum experta sunt humorem longe minus probantur. Quae parum igne torrentur pinguedinis expertae esse, stomacho magis competunt. Lacteus earum cremor ex Saccharo paratus gratissimus est cibus & nutritio-
- 30 ni idoneus, concoctusq; facilis, vis maxime utilis, qui ardore urinae laborant. Auet Amygdalarum in cibis usus genitale semen, & visum etiam acuit, praesertim si cum Saccharo denorentur, vel in placentas conformentur ex Saccharo, quas Martiapas vocamus. Torrefiunt etiam & in particulas dissecantur, & subinde Saccharo, vel melle ad summum cocto excipiuntur, fiuntq; inde retorrada placentae, quae secundis mensis commode pro bellariis apponuntur. Teruntur cum amylo, tragacanthaeq; lacrima & subinde lacte bubulorum & Saccharo excipiuntur, miscenturq; simul donec consistant, & ad formanda inde varia animalium genera, siccilibus quibusdam ad id effigiatu reponuntur, quousq; tremulam quadam firmitatem consequantur. Tali saepe edulcorum apparatu Principum, Heroumq; mensa exornari solent. Atteruntur in marmoreo mortario ligneo pistillo una cum Saccharo gingeris momento & Caporum pulpa, & digeruntur in offa, quae magnam cum palato inest gratiam. Non desunt etiam qui huiusmodi offas tenuissima pasta circumuoluant, & deinde frigans in fermentis butyro & postremo Sacchari pulverem superaddant. Adduntur integra delibrataq; coagulata in sculis, quod non solum esu placeant, sed quod etiam decoris addant aliquid. Sumuntur una cum malis, & in tenues secantur partes, miscenturq; in sculis, quae ex vino, vel defruto, unu passis, aromatis, & croco paratis pro ferinis carnibus condiendis in usu sunt hyemali praesertim tempore. Teruntur delibrata & rosarum aqua perfusa in lapideo mortario & addita mica panis ex succo aurantium macerata cum gingeris momento ad carniem in tintus. Veniunt Amygdala & in alios ciborum apparatus, quos, ne cocum magis quam Medicum hic agere videar, silentio involuendos duxi. Volui tamen nonnulla tibi describere, ut variis etiam modis pro libidine aut cibus Amygdalis uti possis in cibis. Virides Amygdala anteaquam ligneam contrahant duritiam, si denorentur, humida stomachi vitia emendant. Ideoque nonnullis scio esse obseruatum, conferre plurimum ad praegnantium malaciam. Amygdala (ut Florentinus in Georgicis ait) ad legendum maturitatem fatentur, cum exterior earum cortex dehiscere inceperit, quae firmiora lauantur, & candidiores euadunt, & diutius incorrupta asseruantur ad usum. Si autem agre corium exuant, palea obruta continui relaxabunt. Amara (ut de his etiam aliquid tibi in medium afferam) et si in cibis obsoniisque nullum praestent vnum, non tamen velim ut earum arbores tuo e viridario, si forte inibi aliqua fuerint, tollantur, cum plurimum expetantur ad medicamenta. Praesumpta enim sex septemue numero (ut Dioscorides, Plinarchus, & Atheniensium more prodiderunt) hominem inebriari prohibent, ob idque refert idem Plinarchus apud Drusum Tiberii Caesaris filium, quendam Medicum comensari solum, qui omnes bibendi certamine promocaba, veni niq; cedebat in vini potu. Is tandem deprehensus est anteaquam biberet quina senaue amara comesse Amygdala, quo minus temulencia tentaretur. Porro cum eas denotare vetuissent, nec pauxillum quidem in huiusmodi potu resistebat. Haec tibi narranda mihi proposui, non quod credam se adeo potationibus esse addictum, ut

Amygdalus sicut
tibi quomodo
ferax nat.Quot modis feratur
Amygdala?Amygdalus facillime
degenerat.Amygdalus naves
quomodo inscriptae
ascantur.Dulces in curia
amare ferunt.

Amygdalus facultas.

Medicorum quorundam
opinio explorata.Amygdalarum dulcium
facultas.Lactei cremoris
vis.Martiapas
facultas.Bellariis ex Amygdalis
parandi ratio.Cibus albus ex Amygdalis
paratus.

Offa amygdalina.

Condimentum ex Amygdalis
pro ferinis carnibus
conciendum.Intinctus ex Amygdalis
dulcibus.Amygdalarum viriduum
facultas.Quo tempore maturitatem
ostendunt.Amarum Amygdalarum
facultas.Amygdalus amara
ex crapula at-

Si caudica sint pomia, si ea radici lapsus impactus ea retinebit. Si copia ingenti ramos onerabunt, fulcimentis sustineantur, tolli incut que, qua inutilia, & vitiosa videbuntur, hoc enim pacto relicta pleniora emadent, & arbor grauiamine subleuabitur. Inferuntur Mala in syluestri Pyro, in Cydonio malo, in Oxyacantha, ac etiam nigra Moro, qua deinde ruberrima fiunt. Si eruca accesserint, suffiantur arbores bitumini, picce, ac etiam sulphure, id quod non solum hac in arbore operatur, sed etiam in ceteris. Hic itaque habes, mi Illustris Comes, qua de Amygdalis & Malis obiter se se obtulerunt describenda, in quibus sibi satisfactum esse intellexero, erit mihi istam gratum, quam quod gratissimum. Vale.

Malorum es ad corum remedia. Quibus in plantis in alus lateri possit. Remediū conitō erucas.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Casparo Peucero Medico, S. P. D.

Agitur de Hircis quibusdam lac copiosum praeferentibus.

Memineram saepe me legisse apud Aristotelem libro tertio, capite vigesimo, de historia animalium, fuisse olim in Lemno Insula Caprum, e cuius mammis, quas geminas iuxta genitale gerebat, tantum lactus emulgebatur, ut inde colostrum conficerent. Idque etiam proli mascula Capri illius euenisse. Sed quum hoc ostentis potius annumeret Aristoteles, adeo ut Lemnio illi pecoris domino consulenti, responderit oraculum, amplius futurum peculis incrementum, putabam quidem, id non, nisi rarissime, tanquam aliquid factum prae natura ordinem euenire posse. Atqui nunc pri-

Tres Hirci Bohemate sunt in Bohemia tempore huius praesentis.



mum animaduerto, hoc tam rarum non esse spectaculum, cum uno & eodem tempore, hic in Bohemia diuersis in locis tres hirci reperti sunt, qui suis ex uberibus lac satis copiosum reddunt. Delatus est primus, cuius hic ad te imaginem mitto, ad Serenissimum Archiducem Principem nostrum, e cuius mammis ipse haecenus plures lac copiosum emulsi. Nam cum, qui hoc monstriferum animal attulit, inreirando asseueraret, lactus illius potus se Epilepticos aliquos curasse infantes, ut & ego medicamentis periculum facerem, illum domi mea alendum tradidit mihi Serenissimus Princeps meus. Atque iam certior factus sum, id proculdubio non esse falsum. Dedi ego lac potandum pluribus non solum infantibus, sed etiam adolescentibus & adultis, quibus omnibus non paruum praestitit auxilium, quanquam infantibus magis, quam ceteris.

Lac hircini Epilepticos sanant.

Verum cum sciam hircinum iecur, a quo sanguinis totius fons emanat, comitialibus adeo esse inimicum, ut si deuoretur ab illis, illico deprehendantur, non possum profecto non mirari satis lac ipsum e sanguine genitum non solum id non efficere, sed quod maius est, Epilepticos magnopere curare. Habet hoc animal, ut hic ex eius imagine videre poteris, ubera ante testiculos, non longe a genitali, ut de Lemnio illo scribit Aristoteles. Sed alter, quem ante paucos dies misit ad Serenissimum Archiducem, Illustris Heros Gulielmus a Rosenberg, vir quidem ut Romana origine Clarissimus, ita virtute & liberalitate splendidissimus, eo in loco ubera non habet, sed retro in utroque latere iuxta testiculos, nec tantum lactis, ut ille alter, reddere videtur. Videbimus nunc, an qui ex iis nascentur hirci suum sequuntur sint genus, nam plures ex iis capra iam in utero habent. Haec tanquam noua & nostris temporibus inaudita ad te scribere volui, ut ceteris isthic Medicis & naturalis Philosophia studiosis illa etiā impartiaris. Nec putes velim me tibi fabulas describere: plurimi enim sunt hic homines curiosi, qui videnda non ita causa & ubera tractarunt & lac emulserunt. Vale. Praga.

BALTHASAR KLEIN MEDICUS,
Petro Andreae Matthiolo,
S. P. D.

Mittitur Matthiolo lignum in Armeniam lapidem conuersum.

Non haecenus distulerim promissionem meam propter occupationes quasdam, vir Clarissime, tamen non existimabis illam me obliuioni tradidisse. Qui enim fieri possit, ut Matthioli obliuiscar, viri cum omni genere doctrina tum virtute praestantissimi? Equidem ut desint haec tibi (ut sunt sane in te excellentia) tamen excidere e memoria mihi non possis, vel ob eam humanitatem, quam ignoto mihi exhibuisti. Quare maxime persuasum tibi esse cupio, me dum admiratione virtutis & doctrinae tuae, unum nunc esse eorum numero, qui tui sunt studiosissimi. Utinam autem vicissim tibi meis sic placuerint mores, & consuetudo (qua quidem per paucorum fuit dixerim) ut tuo iudicio, Matthioli tanti viri amicitia dignus censear. Sed de his alias.

Nunc ut datam fidem liberem, mitto lignum in naturam luti Armeni conuersum, & carbonem autem lapidi, dignum utrunque admiratione & spectatu perpulchrum. Dicerem id me arguments loco mei

in te amoris & obseruantia mittere, nisi tam vile esset. Non tamen dubito, quin tibi homini Philosopho, futurum id sit haud omnino ingratum. Misissim aliud mearum lucubrationum, ut tuum de iis iudicium (quod permagni facio) cognoscere possim, sed describi non potuerunt tam subito, posthac, Deo dante, accipies. Vale Clarissime, Carissimeque Matthioli. Ex Caballino monte.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Balthafari Klein Medico, S. P. D.

Respondetur precedenti Epistola.

Habeo tibi gratias (mi Doctissime Balthasar) non solum ob tuam, quam erga me ostendis, obseruantiam, sed etiam ob tam rarum metallicum illud munus, quod paucis ante diebus ad me transmisti. Deinde cum me ut deam abs te viro Doctissimo, qui Lipsensi Academia annis pluribus legendo, docendoque maximo fuisti ornamento, tot laudibus commendari, non possum mihi non gaudere plurimum, quod nihil in hac vita praclarior quispiam desiderare posset, quam laudari à laudari & doctissimis viris, è quorum numero te haud postremum esse, non ambigo. Noui tuum erga me amorem non vulgarem, noui animi propensionem, & tuam in mihi gratificando humanitatem, noui amplissimam doctrinam tuam, virtutem, & ceteras ingenui animi tui dotes. Quibus de causis non solum fit, ut tuam plurimum delecter amicitia & consuetudine, sed ut apertissime cognoscam, non parum me tibi debere. Sed haecenus de his. Quanta quidem admiratione sim contemplatus ligni illius frustum Armenium bolum factum, non possum tibi breuiter explicare. Est enim meo iudicio, tam rarum natura artificium, ut ab omnibus Medice materiae studiosis spectari cum admiratione possit. Idcirco velim intelligas tuum hoc munus longe mihi carum esse, quam si auri purissimi tantundem è tuis fodinis ad me transmissetes. Id namque intuenti mihi etiam perquam diligenter Santali rubri frustum propemodum apparet, ubi vero dentibus experior, lapidem inuenio non admodum durum, sed qui facile diuidi possit, qui que etiam labiis appositus, iis inhereat. Mira sane natura vis in transferendis transmutandisque rebus. Sed hoc etiam magis mirum videtur, quod hoc anno in quibusdam Bohemia montibus, ubi argenti metallum foditur in lapidea quadam montis fodina reperitur sit a fossoribus integer ac ingens abietis arboris caudex, totus lapideus factus. cortice adhuc non immutato, praterquam in colore. Sed non tam facile quispiam coniectare potest, quo pacto magna illa arbor per ducentorum passuum dimensionem tam ingens durumque saxum penetrauerit, praesertim cum nulla in vertice appareat rima. Oportuit sane (si quid veri nobis imaginari licet) olim hoc saxum profundam latamque habuisse voraginem, in quam abies illa deciderit, eandemque subinde longo admodum temporis tractu, extuberante petrifica vi esse occlusam & arborem immutatam in illius lapidis naturam. Nam crescere lapides & metallorum cuniculos derelictos repleri, nulli dubium est. Verum non placet eorum opinio, qui sibi persuadent, haec admiranda monstra in terra cavitatibus aliquando procreare naturam. Si quis autem quereretur, cur cortex non fuerit immutatus una cum interiori materie: responderem ego, haudquaquam agens agere posse in patiente non deposito. Etenim cum in cortice plus aerea qualitatis, in ligno plus terrea habeatur, nil mirum videri debere putarem, si cortex perinde ac lignum non fuerit immutatus. Fossiles carbones longe antea vidi subdubitauique, an ex sepulto in terra ligno, an ex subterraneis lapidibus fierent. Atqui cum carbonem hunc tuum ad eo lapidis adnexum videam, ut ex eodem lapide factum intelligam, mea iam omnis cessat dubitatio, quo fit ut mihi persuadeam, eodem natura artificio è lapidibus, vel è pingui glutinosaque terra fieri carbones, quo fiunt è lignis lapides, non tamen iis dicam facultatibus, cum aliam facultatem petrificam esse intelligam, aliam vero (ut ita dicam) carbonificam. Sed quoniam de his copiose admodum scripsit vir doctissimus Agricola, & montes haberi crebros in Misena scribit, in quibus ingens carbonum quantitas foditur, non est quod hic de his plaribus tecum agam. praesertimque cum sciam huiusce metallica materia te esse peritissimum, & in ea diligenter exercitatum. Cupio autem, ut, si quid adhuc habes, vel in posterum fueris consequutus, quod rarum singulareue existimes, ne praetermittas, quo minus huiusce generis, aliquid mihi etiam iterum atque iterum impartiaris. Lucubrationes illas tuas magno cum desiderio, ut ad me mittas, expecto. Scio enim eas non tantum delectationem, sed etiam utilitatem mihi allaturas. Vale. Praga.

Ligni in Armeniū bolum mutatio.

Abies in centro faxi montis in lapidem conuersa.

Fossiles carbones.

LAVRENTIVS SPAN A SPANOVV
Medicus, Petro Andreae Matthiolo,
S. P. D.

Queritur quid sit κρυών apud Hippocratem, Quidque κρύψλλον.

Ro ea, qua inter nos est haudquaquam simulata familiaritate, & obuiio tuo in rem Medicam studio, nequaquam mihi liberum video, ut si quid dubii forte obueniat, vel calem tuam praestantiam, vel compellere audeat nolum. Nam & amicitia nostra aliquid derogare illud videretur, & priuari doctissimo tuo iudicio & sententia nostra professionis homines per me flagitium existimo. Itaque & tuo amori ac benevolentiae communisque commodo potius satisfacere volo, quam tibi a loqui maxime occupato negotiis parcere, cuius quidem veniam deprecari a te, qui non solum a quo audire tam sed & cum iudicio respondere paratus es, ociosum fore non ignoro. Recensebo igitur, quid velim,

uolunt, breuiter. Hipp. lib. 2. de ratione vitæ meminit potus cuiusdam, quem κυκωνά vocat, ubi scribit, ubi uult, apud Hippoc. quod. unde constat ipsius tempore in morbo etiam acutis, hanc sorbitionem fuisse in usu, quem admodum hodie apud nostros pitisana est. Et si uero ex Etymologia uocabuli patet, mixturam aliquam fuisse, κυκων enim misceo significat, tamen ex quibus constiterit, diuinare non possum, cum autor ipse porro nihil dicat. Nec facile persuaderi mihi patiar, esse Homericum illum Cyceonem, de quo Iliados 11. scribit, quod Hecamedæ,

*ἰν τῷ πάσῃ κύνῃσι γυνὴ εὐκῆια δῖῃσιν
οἶνον μεμιεῖσιν ἰπὶ δὲ αἰγῶν κῆν τρεῖν
κῆσι χαλκίῃσι δ' ἄλφειτα λουὲ πάλωι.*

Nam vini fortis cum caseo & alba farina mixtura, in morbo iis, de quibus ibi agit Hippocrates, plaud non competere videtur, cum autor abstergentia, sputum facilitantia, & maturantia exhibenda doceat, & febris plerumq; consuetæ illis morbis, vini fortioris usum omnino prohibeat. In eo igitur animi pendeo, nec quid certi statui re possum. Et quia neque apud recentiores ullam certam huius mentionem fieri uideo (Ruellium excipio, cuius de natura stirpium libro secundo capite decimo octauo ad finem Homericum tantum Cyceonem infert) abs te preclarissime uir amanter & officiose peto, ut, quid tibi constet, & mihi & meo nomine nostra facultatis studiosis benigne & fideliter pro tuo ueteri more communicare digneris. Facit quoq; Hippocrates 7. de morbis popularibus libro in curatione Charytis febre acuta laborantis mentionem Calliphylis cuiusdā, cuius potus suppressam urinam exciuerit, hanc autem herbam, nam herbam ex appellatione opinor, apud Dioscoridem, Plinium & Theophrastum non reperio. Ideo te quam plurimum rogatum uelim, ut tuam de hac planta exponas mihi sententiam. Promerere eo dignas apud multos bonas gratias, & ita amicitiam nostram confirmabis, ut in officiorum commutatione, quæ a me præstari possunt, deuotissimum tibi reddas. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Laurentio Span, à Spanovv, S. P. D.

Respondetur præcedenti Epistola.

T Ametiosii fere nihil mihi superfit, præter ea, quæ senectus ipsa incipit iam afferre incommoda, cum tamen ob tuam in me obseruantiam & meam erga te beneuolentiam omittere non possim, quo minus tua de me confidentia omnibus modis respondeam, cæteris post habitis, epistola tua de Cyceone, & Calliphyllo apud Hippocratem, nunc paucis respondebo. Sed an tibi satisfacturus sim nescio, quum Galenus antiquissimus, & grauissimus Hippocratis interpres Cyceonem proprie, & singillatim describere nequiverit. In enim comment. secundo super Hippocratis libro de vitæ ratione in morbo acutis (sicuti à te obseruatum uideo) ubi Hippocrates Cyceonis meminit, ne uerbum quidem de Cyceone in medium affert. Nec id ab re fortasse factum est. Nam cum lib. 3. Commento sexo de morbis uulgaribus, de eo se latius tractasse sciret, non uidebatur illi ualde necessarium, iterum de illo uerba facere. Hoc itaque in loco, quem te haudquaquam legisse animaduerto, Medicos docet Hippocrates, dolores in uniuersum curare, sic uerbis. In doloribus proximum uentrem purgare & sanguinis uentrem rescindere, uisio, sectio, calefactio, refrigeratio, sternutatio, stirpium humores in quibus uim habent, & Cyceon, maleficorum las, allium, uinum ferne factum, acetum sal. Hac ille. Quæ declarans Galenus, cum ad Cyceonem deuentum est, quem parari uino aliquo edulio admixto non ignorabat, ita rem exorditur. Nempe quod uinum dolores oculorum ex obstructione orientes mitiget, ex Aphorismorum interpretationibus didicisti. Nunc uero & aliorum, quicumque eadem ratione concitantur, dolorum, nonnunquam ob sanguinis crassitudinem, nonnunquam ex frigiditate, uobis in mentem ueniat, cum sepius & in uentris doloribus & in dolore capitis uocato Hemigræca, meracius uinum sumptum, confestim quidem manifeste iuuisset, accedente deinde somno, in totum dolorem sustulisset uideritis. Vidisti autem me, non illico ieiuno sed assumpto cibo exhibere. At hoc loco utrumque miscuit Hippocrates, cibum, & potum. Tale enim quiddam Cyceon est, quemadmodum apud Homerum didicisti: miscensibus quidem alia cum uino, commune uero omnium uinum habensibus: fortasse uero & cum polenta uinum miscebant, necessario autem, & alia misceri ex hoc nomine Cyceon, ueteres significare quæpiam putauerit, si eos appellationem hanc in eum sensum magis accipere iudicatis. Aliquando autem ego quempiam dolore vexatum sine cibo uino uti iubens, ut opinionem meam confirmarem, multis subito calidis uaporibus affectum locum petentibus, eum ut sui ueritus, magis cruciatum animaduerti. Ego profecto uinum sine cibo epotum lasum ire arbitrabar, & experientia idem testada firmiorem opinionem meam reddidit. Cyceon autem, cum in seipsum cibum contineat, offendere nequaquam poterit, nam ex utriusq; mediocri mixture, æquabilis paulatim calefactio in partibus affectis augetur, sine multis uaporibus, & refrigerata calefacit, & intensa digerit. Hac ad litteram Galenus. Quibus tamen nihil certi affert nobis de parandi Cyceonis ratione apud Hippo. Nam etsi dicat is FORTASSE UERO ET CVM POLENTA UINVM MISCEBANT, non tamen id determinate affirmat. Nec sufficit quod dicat Cyceonem cibi & potus mixturam esse, quemadmodum apud Homerum didicerunt eius discipuli, quippe quod hic non huiusmodi mixtura componenda rationem afferat, sed de uocabuli significatione agat. Quo fit ut nihil certi de Cyceonis apparatus, de quo Hippocrates intellexit, ex Galeni scriptis tibi describere possim. Verum si meam de Cyceone debeam dicere sententiam, crediderim ego uariis modis id apparasse antiquos, quod uidetur etiam sensisse Galenus, cum dicit: MISCENTIBVS QUIDEM ALIA CVM VINO, &c. Nam quemadmodum nos in uentriculi doloribus à frigiditate, uel statu excitatis Cyceonem nostrum paramus ex Cretico uino, Saccharo & butyri momento, quinetiam ex pane triturato, & carniū iure insolito, & addito deinde uino, ita sane Cyceonem suum parasse ueteres haud dubitauerim, uel ex uino & pitisana, uel ex eodem & polenta, ut Galenus suspicari uidetur, uel ex aliis fortasse edulsiis, quorum usus apud illos extitit. Nam & apud Homerum (ut tu recte scribis) ex uino, caseo & alba farina parari Cyceonem uidemus. Sed minime credendum est de eo Cyceonem

Calliphylon
Hippoc.

Hippocratis lo-
cus restitutus.

ceonis genere (ut recte animadvertisti) intellexisse Hippocratem, quod ea mixtura compositio, nullo pacto, nec in victu acutorum morborum, nec in doloribus conveniat. De Calliphyllo autem dubitauerim quidem depra- uate legi apud Hippocratem, καλλιφύλλον pro καλλιφύτον. Nam Galenus eo libro, quo obsoletas Hippocrati vo- ces explanat, nullibi καλλιφύλλον meminit. Id quod manifesto est argumento non καλλιφύλλον sed καλλιφύτον legi debere apud Hippocratem quemadmodum mihi videtur legere Galenus, qui sic habet. καλλιφύτον ὅπερ καὶ κα- λιφύτον καὶ ἀδ. αὐτὸν ὀνομάζεται. Adeo ut credere nobis necessarium sit, vel in Hippocratica lectione subesse me- dam, vel e contra. Sit tamen quomodocunque, Galenus obsoletam hanc vocem καλλιφύτον ἔσ' ἀδιαντὸν inter- pretatur. Quod maxime Hippocratica doctrina astipulari videtur, quippe hac planta potui dāra, Charysi- se prouocasse urinam, ipse scribit Hippocrates: Adianto enim cienda urina non obscura inest facultas. Huius et- iam sententia esse scio Iulium Alexandrinum Cesareum Archiatrum, virum ut doctissimum, ita ἔσ' iudicio summo praditum. Plura quam hac, non est quod à me expectes, non quod nolim omnibus modis tibi satisfacere, sed quod nesciam quomodo meliora reperire possim. Vale.

IOANNES IORDANVS MEDICVS, Petro Andreae Matthiolo, S. P. D.

Rationem Elleborismi parandi ad quartanam do-
ceri petit.



Mpudens tibi fortasse videbor, Doctissime ἔσ' Excellentissime D. Matthiolo, qui prorsus igno- rus ἔσ' nihil de te promeritus id à te ausim expectare, quod notissimis tantum ἔσ' amicissimis ti- bi Medicis hactenus communicare voluisti. Verum fretus animi tui nunquam satis lauda- ri candore, quo non amicis solum, sed etiam uniuerso orbi remedia longe praestantissima publi- casti, non sum veritus id à te per literas petere, quod in nullo, nec rei, nec nominis dispendio pra- stare posses. Mihi esset optatissimum simul ἔσ' maxime necessarium. Equidem veterum medicorum vestigiis insistens in profligandis morbis Melancholicis Elleboro, velut precipiunt, correcto nonnunquam sum usus satis quidem feliciter, at non sine aliqua agrorum molestia ἔσ' periculo. Quae ambo evitare cupiens diligenter legi, ἔσ' relegi varia Medicorum veterum ἔs' recentiorum monumēta, nihil tamen inueni, quod omni experimen- tum Ellebori usum efficeret. Incidi tandem in doctissima tua in Dioscoridem commentaria, ἔs' legi quod ad- mones de Ellebori diluto magno agrorum commodo propinato, rationem tamen diluendi, seu infundendi apud te retines, eam ego ad plenum si non est molestum, ex te intelligere valde cupio. Quare te quam possum rogo, ut mihi per hunc tabellarium rescribas, quae ratione, ἔs' preparatione utaris utroq; Elleboro, ἔs' amicos tibi Me- dicos uti docueris, hoc uno beneficio me tibi iam pridem deuinctissimum, emolumento ex tuis doctissimis com- metariis percepto, reddaturus deuinctiorem. Et si quid erit in hac regione, in quo tibi vsui futura sit opera mea, eam offero promptissimam, absq; ulla prorsus exceptione. Mitto portunculam eius planta, quam nostrates An- toram vocant, ea admodum frequens in montibus his nascitur. Utuntur radice ad puerorum lumbricos. Scire cupio, an ea sit, quam cap. de Aconito Dioscoridis scribis ab Auicenna vocari Napellum Moyfi. Habet hoc lit- tus Peplion ἔs' ἀνδρ. μαλάχλω sponte nascentem, copiosam, radice, caudice ἔs' stolonibus lignosis, folio, flore ἔs' semine Althae paulo latioribus. Toto habitu, longe alia planta videtur, quam ea cuius picturam exhibes, capi- te de malua quam ex Theophrasto ais, cultura tantum, ἔs' arte proceram fieri, ut vidisti Grignanii ad lacum Benacum. Habet hac regio plantas non contemnendas, è quibus si quid desideres, curabo pro virili hac in reti- bi gratum facere. Deus Opt. Max. doctissime ἔs' Excellentissime D. Matthiolo, te diuissime seruet incolumi, ἔs' semper ad meliora prouehat. Genua Non. Nouemb. Anno M. D. LIX.

Antora.

Napellus Moyfi.
Dédromalache.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Ioanni Iordano Medico, S. P. D.

Epistola hac sequens respondet precedenti.



Vanquam te nunquam de facie noui, nec ulla hactenus mihi tecum intercessit amicitia, gratissi- ma tamen fuerunt mihi litera tua, tum quod ex iis cognouerim, quātam doctrina ἔs' facundia valeas, tum etiam quanta tua sit erga me animi promptitudo, ac in consequenda nostra amicitia voluntas. Etenim nihil esse suauius in hac vita mihi semper persuasi, nihil gratius, nihil deniq; beatius, quam optimos, ac doctos habere amicos. Nostra huic sententia fauisse plurimum Deum Opt. Max. hinc facile conicere possum, quod non desint quotidie optimi, ac doctissimi viri, qui sua sponte mi- hi quem nunquam viderunt, scribant, ἔs' meam exposcant amicitiam. Quo fit, ut nullius impudentiae te accu- sare debeam, quod nunc ad me tibi ignotum scribas, sed potius te totum hilari ac benigno completi animo, atq; etiam letari, de tua in me confidentia, ac humanitate. Ut autem id quod à me petis consequaris, ἔs' me homine candidum virtutumq; tuarum amantißimum cognoscas, mitto tibi Epistolam huic annexam, quam cuidam alteri medico de Elleborismo in quartanis propinando iam pridem scripseram. Hac itaq; tibi satisfactū iri cen- seo, nec aliud addendum fuit, nisi ut scias quod eadem ratione album etiam Elleborum preparare soleam. At- qui hunc in quartana febre propinare hactenus nunquam ausim. Vsi sum nonnunquam illo in Melancholi- cis affectibus, sero caprino macerato, additis Paoniae seminibus, Zedoaria, ἔs' Scheniantho. Alia Ellebori pa- randi ratione nunquam usus sum, nec vllum eius genus in puluerem contritum unquam dare potandum ex- cogitavi. At qui velim ubi medicamentum expertus fueris, illud ceteris, quos nosti, Medicis patefacias, ne pe- tarent fortasse à tui me id in meis non recitasse Commentariis, vel auaritia, vel inuidia persuasum. Id enim ne- gligentia potius quadam praetermissum est, quam q; voluerim hoc medic. obtegere ἔs' mihi tantum asseruere. Vidi Antora summitates, quae longe chariores mihi fuissent, si cum floribus ἔs' radicibus eas ad me misisses: hoc


Antoris exen-
tio curantes suū
non descripterit
Elleborismum.
Antora.

hoc si post hac feceris, meam de re hac habebis sententiam. Quandoquidem, quanquam ex virgibus (ut dicitur) Leo cognoscipotest & ego nunc non aliter sentiam, quam quod haec summitates eius sint Antores, quoniam puto appellasse tuam etiam Napellum Morsum. nolo tamen id pro certo tibi affirmare, nisi prius integram eius plantam (coss. v. m. Napellum) genuinem, nisi fallor, dedi ego nunc cum Napello, sed nescio, quomodo Chalcographorum, vel fortasse aliud nunc eorum plantae titulus fuerit immutatus. Id quod mihi euenisse video in maiori malua, quippe quod nunquam in ea fuerim operatus. Malua genus arboream fuisse Maluam de qua veteres scripserunt, cuius rei argumento esse potest, quod id nunc nomen in meo affirmauerim Commentarius. Porro nec eam quam in Franciscanorum monachorum cenobio Grijmarij fecimus, genuinam de *δερφομα* esse censeo, quod si fuerim, hanc ex hortensi ac vulgari malua, Monachi cum *δερφομα* nomen ac diligenti quadam cultura instar arboris excreuisse. Quam sententiam eo magis amplector, quod nunc abs te factum certior, isthic sponte prouenire genuinam *δερφομα* a *χρ.* Hanc fateor ingenuè me nunquam vidisse. Quod sit, ut nonnulli plantarum cupidus, nunc abs te petam ne me hac planta vel eius semine diu destitutum relinquant. Poteris cum hac materre etiam Peplion. Hoc si pro tua humanitate praestiteris praeter id, quod mihi gratissimum feceris, non modicam fortasse laudem tibi comparaueris. Nam ubi primum harum stirpium imagines in meo addam Commentarius, omnia haec tunc tantum accepta referam. Velim praeter haec ut quotquot fuerint isthic planta, quibus putas augeti posse Dioscoridem nostrum in Reipub. commodum, eas omnes hos anno diligenter mihi asseruare, quin etiam ut nullus parceres sumptibus. Curatio enim ut nullo tua pecunia dispendio hoc abs te fiat, ut scripsit Antianus, qui tibi haec meas dabit literas, oratenus explicabit. Vale, & eo quo cepisti me amore prosequere.

Napellus Moyli
In Napello Moyli
titulus immu-
tatus Chalcogra-
phorum uegr-
genia.
In Malua maiori
δερφομα
δερφομα χρ.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS,
Iulio Moderato, Pharmacopœo Ariminensi
S. P. D.

Describuntur Ceruini fungi historia, & vires.

3  **V**ix rebus nouis te plurimum delectari sciam, Tuber quoddam subterraneum, quod hic ceruinum Bole-
tum Bohemi vocant, cum hisce meis literis ad te mitto. Puto enim de eo te nihil unquam auduisse, quod
nulla apud antiquos, recentioresve scriptores extet huiusce fungi memoria, quodque reperiri non possit,
nisi in syluis, ubi plurimi habentur cerui, ac venatores, qui hac natura secreta norunt. sed quam hac
maudita sint apud vos, nolim te in posterum latere ceruini fungi historiam & vires. Fungum itaque hunc
tuberum, vulgari modo sub terra nasci affirmant venatores, ubi certino semine in coitu insicitur solum. Id quod ple-
runque fieri solet exempto e vulua genitali adhuc seminis aliquid continente, maris impetum fugiente femina. Hanc for-
tasse inuenire nemo possit, ni cerui ipsi locum quodam statuto anni tempore ostenderent. Scalpunt enim naturam quodam
instinctu ducti anterioribus pedibus locum, ubi globosus fungus sub terra dilatescit, quod olfactu percipere eos affirmant.
Spirat enim fungus graui odore praesertim recenter effossus. Qui secreta hac norunt venatores & rustici, qui sylvas fre-
quentant, loca diligenter obseruant ceruini pedibus diducta, effossaque serobe, fungos eximunt, & pharmacopœi ven-
dunt, qui dissectos in particulas, & siccis traiectos siccant postea in umbra seruantque in medicum sum. Huiusmodi feri fa-
cies inest, quam in ceteris spectamus tuberibus, globosa tamen in omnibus, & inaequali. Extrema cuticula subnigrae,
carnosa vero & ipsa fungosa substantia albicat. Sunt etiam qui genus aliquod reperiri dicant, erecta virgula mentulae for-
ma, ad ortum in altera parte detecta glans, in altera globuli quidam testiculos referentes conspiciantur. Hic fungus in ci-
barium usum hactenus non venit, nec eo vescuntur Bohemi, sed eo us in medicamentis vtuntur, quae venereum mouent. Si
quidem ad hoc plurimum illum valere putant, & praesertim qui humani genitalis faciem refert. In quem usum siccipul-
uerem ex dulci vino propinquant, drachma, vel sesquidrachma pondere. Lactis vbertatem hunc etiam afferre aiunt ex pi-
sana vel muliebri lacte potum, sed valentius id agere si longi piperis aliquid addatur. Suffitu oculos femininarum locos re-
ferare tradunt, & vulua strangulatus auertere. Non desunt superstitiose mulierculae, quae us abutuntur in amatoris po-
culus, quibusdam prius admurmuratis incantationibus. Affirmant praeterea valere ceruinum fungum ad epota venena,
ex mero haustum, quin etiam ad venenosorum omnium morsum, non modo potum, sed etiam illum excalfacere hunc ex
odori graeolentia, quispiam facile iudicabit. Optarem ut tam rarum medicamentum Italia hactenus ignotum feri vel
transplantari posset, & inter cetera rara simplicia quae in tuo tam celebri viridario, diligenti admodum cultura alii, hic
etiam viueret fungus. Sed postquam hoc nobis vetat natura, hunc siccum tibi asseruato. Mitto tibi praeter
id legitima Chalcutis, & vera Mysis aliquot frustra, quae ut apud vos
rara, ita sane cara tibi futura spero. Vale.

Ceruinus bole-
tus.

Ceruini fungi
historia.

Ceruinus fungus
virilem mentu-
lam referens.
Fungi ceruini
vires.

Chalcitis &
Myli.

PETRI ANDREÆ MATTHIOLI EPISTOLARVM MEDICINALIVM LIBER QVARTVS.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS Vlyssi Aldrouando Bononiensi Medico S. P. D.

Disputatur an Larix nostra, sit Larix Plinij & antiquorum.



VOD epistolam illam meam, quam antea ad te miseram, tantopere laudibus effers, facti id quidem humaniter & amice, & ego me hercule mihi ipsi plurimum hoc nomine gratuler, referim cum Robertely viri Doctissimi (vt scribis) iudicio, non parum, tum elegantia, tum doctrina alicuius nomine probetur, id quod ipse mihi vix persuado quando ne mihi quidem in satisfacio qui tamen scripta mea, qualiacunque sint, aspernari non soleo. Atqui multo magis tuo nomine gaudeo, quod meus argumentis persuasus, iam de Picea & Pino in aliam transferi opinionem, adeo vt tecum ipse statueris (qua tua est humanitas) vbi in publicis lectionibus, de pine & picea differere tibi sese offerat occasio, meam non solum auditoribus afferre sententiam, sed etiam comprobare. Pro qua ingenui animi tui erga me proferre, si eas tibi gratias non referam, quas me tibi debere non ambigo. boni consulas velim, quod plura nunc prestare non valeam. Verum vt cognoscas, quam promptus sit Matthioli animus in tuis expediendis petitionibus, et si, que nunc tibi a me scribi de Larice desideras, factu dictuq, non admodum facilia sunt, non tamen pratermittam ob eam, quam de me concepisti spem, quin omnibus modis tua satisfactam voluntati. Quod utque in commentariis nostris in Dioscoridem nulla dubitatione scripsi Laricem nostram ab antiquorum Larice nihil differere, cum ob rem rationibus nonnullis persuasus, dubitasse te semper affirmas, imo etiam credidisse videris, arborem quam Laricem vocamus illam non esse, de qua scribit Plinius. Et ne videaris prater rationem hoc in re hesitare, plura contra sententiam meam in medium affers argumenta. sic inquit: Larix Plinij testimonio, perpetuo viret, folia pungentia habet, non floret, & eius lignum non ardet, flammamque non concipit, & eius cortex leuior est, quam picea & sterilis est. Sed Larix vulgaris perpetuo non viret, folia pungentia non habet, floret, ardet, & cortex valde crassum habet, & fecunda est: ergo Larix vulgaris, non est Larix antiquorum. Maior nota & est ex Plinij historia, & quod non ardeat, notum est apud Vitruvium. Minor propositio est etiam notissima, vt te non ignorare censeo. Nec dicere oportet errasse Vitruvium, Palladium & Plinium, cum certo illis notissima fuerit Larix. Ad hoc si vulgaris Larix esset Larix antiquorum, cum illa Agaricum proferat, tam notabile medicamentum, id sane non pratermississet Plinius cum tam diligens rerum naturalium fuerit indagator. Hac tua sunt argumenta, que in hanc te vocarunt dubitationem. Ea cum mea sane sententia vt statim audies si non sunt, sequitur vt nec tua vera sit conclusio. Imprimis autem cur Plinio credam, Laricem perpetuo virere, nihil est, quod me moueat, tum quod reperiam in resiniferarum arborum historia pluribus in locis illum sibi ipsi contradicere, & sicuti confusus de his omnibus scribere, tum etiam quod videam affirmasse illum, Terebintho & Tamarici folia non decidere cum tamen nos contrarium videamus. His accedit alia etiam ratio, qua Plinij fidem mihi maxime suspectam reddit. siquidem vbi eas recenset arbores, que perpetuo virent: Syluestrium generis inquit, folia non decidunt Abieti, Larici, Pinaestro, Turipero, Cedro, Terebintho, Buxo, Illici, Aquifolio, Suberi, Taxo, Tamarici. Inter vtraque genera sunt. Adrachne in Gratia, & vbi que Vnedo. Catera vero omnes extra predictas (etenim numerare longum est) folia deperdant. Sed hoc est falsum cum Picea, Phyllirea, Licium, Cistus, Myrtus, Oleaster, Thua, Sabina, Syluestrius Laurus, Phellodrys, Celaster vbi que perpetuo folio vireant. Caterum cum hec omnia ex Theophrasto libro 1. capite 15 transcribat Plinius, non deest suspitio, quin ipse πικρον apud Theophrastum (vt plerunque id fecisse animaduertimus) Laricem verterit. Quod sit, vt hac in re nulla mihi Plinio sit adhibenda fides.

Larix nostra eadem cum antiquorum. Argumenta contra Matthioli sententiam.

Responsiones ad argumenta Plinij pluribus in locis sibi contradicere in Resiniferarum arborum historia. Plinius notatur. Arbores que perpetua coma viret

Laricem non esse debere folus aculeatis. Ruellius notatur

Plinij locus in Larice restitutus.

Prater ea, quod antiquorum Larix folis fuerit aculeatis quodque eius cortex leuior sit, quam Picea, non satis quidem exploratum habeo cum Plinij ipsius testimonio, etiam contrarium probari possit, et si fortasse, ob non intellectam Plinij lectionem, in hoc aberrauerint Ruellius, & alij docti viri. Quippe qui Plinium non intelligentes, ea que de Larice libro decimosexto, capite decimo idem scribit Plinius, Picea tribuerunt. Etenim si locus ille diligentius expendatur, facile cognosceat quispiam Grammaticus, & Latina lingue peritus, lectioni subesse mendam. Vt autem me vera narrare, & Laricem Plinij ipsius testimonio acuminata folia haudquaquam proferre cognoscas, exponam in primis vulgatam Plinij lectionem, quam si tuo addideris Plinio, statim eorum deprabenderis errorem. Plinius itaque loco prius citato (vt vulgatum legit exemplar) sic habet. Sed Picea minus alta quam Larix: illa crassior, leuiorq, cortice, folio villosior, pinguior, densior, molliorq, flexu. At Picea rariora siccioraq, folia, & teneriora & magis algentia, totaq, horridior est & persusa resina. Hunc itaque locum si diligenter expendere, non magno sane negotio cognosces Piceam, non Laricem cortice esse leuiorem, & pungentia habere folia. Nam vbi Plinius ait, Picea minus alta, quam Larix: illa crassior leuiorq, cortice, nemo qui Latina lingue fuerit peritus & Grammatica non ignarus, affirmabit vnquam particulam ILLA, referri debere ad Laricem, sed ad Piceam tanquam ad priorem & remotiorem particulam. Prater ea si illa omnia, que sequuntur Picea assignaret Plinius non fuisset illi opus per transitivam disunctiuam hanc orationem paulo post dicere: Sed Picea rariora, siccioraq, folia. Nam haec admodum manifeste demonstrat prius aliqua de Larice dixisse Plinium. At tu si vis hunc locum restituere, & omnibus reddere clariorem, ita tuum castigabu Plinium ex meo manu scripto. Illa crassior leuiorq, cortice, hac (id est Larix) folio villosior pinguior, densior, molliorq, flexu. At Picea &c. Quod si non feceris, haudquaquam recte hunc planatum locum, nec vllum vnquam viuum illi adertu sensum, imo in pluribus sibi contra dicere Plinium cognosces. Siquis

dem si de Picea illum loqui dices, cum ais, illa crassior leuiorque cortice, dicas item oportet, Picea historiam sequi, cum inquit, folio villosior, pinguior, densior, molliorque flexu. Sed quomodo fieri possit, ut ea folia, qua prius fecerat villosiora, pinguiora densiora, mollioraque, illico fecerit rariora, sicciora, tenuiora & magis argentia. tibi sibi tu index esto. Quamobrem, si haec omnia recte expendaris, illico animaduertes in vulgari, vbi: cunque edita sit, Plinij lectore, desiderari particulam. H A E C, non solum ex Plinio manu scripto, sed ex deprauato lectionis sensu. Quae omnia cum vera sint, factum esse conuincunt, Laricem esse cortice Picea leuiorem & pingentia habere folia. Siquidem villosum & spinosum contrario modo se habent. Nam villi, pilisunt ractu molissimum, qui quantum a spinis differant, haud te lateret non ambigo. Ideoque Plinius cum scriret Larici folia non esse aculeata, eadem villosiora, pinguiora, mollioraque pilorum modo haberi scribit, quemadmodum in nostra visuntur Larice. Id quod eodem capite reperit de Larice pariter scribens his verbis. Mas breuior & durior, Fœmina procerior, pinguioribus folijs & simplicibus atque non rigentibus. Nec velim putes dixisse Plinium, Fœmina non esse rigentia folia, ad maru differentiam, quod ibi, A T Q V E, nil aliud significet, quam etiam, Id est, etiam non rigentibus, quemadmodum in mare videmus, alias sibi ipsi in eodem serè loco contradiceret Plinius, ex allatis superius rationibus. At si obijceres, eundem scripsisse Plinium libr. 16. capit. 24. Pino, Picea, Abieti, Larici, Cedro, pingentia inesse folia, cum hac videam transcribere illam ex Theophrasto lib. 1. cap. 15. de plantarum historia, nec ibi Larici vlla fiat mentio, vereor sane, ne Plinius ibi Theophrasti τὴν Laricem verterit, ut alijs in plerisque locis idem fecisse annotauimus. Quae quidem peruersione persuasus Theodorus Plinij potius sequutus errores, quam Graeci Theophrasti fidem, Theophrastum ipsum in quibus plurimis locis peruertit. Siquidem vbi Theophrasti codex habet, Ἀκαθιδόδες δὲ ἐκ τῶν ἀκρῶν κατὰ τὸ τῆς πικρίας καὶ τῆς σιτικίας, καὶ ἐλάτης, ἐστὶ δὲ κέδρον. Theodorus vertit, Pini quoque, Laricis, Abietis, atque etiam Cedri extremitate pingentia folia insunt. Quod etiam fecit libro 8. cap. 2. de historia. Ibi enim Theophrastus habet. οἷον ἐλάτην, πικρίαν, σιτικίαν. Quae verba perperam vertit Gaza, ut Abies, Pinus, Larix. Atqui non hic solum τὴν Laricem inuertit, sed libro quarto, cap. sexto, & libro 5. capit. 1. & 9. capite primo, & 2. de historia. Quinetiam de causis libro 1. capit. vigesimo primo, & lib. 5. cap. 24. & lib. 6. cap. 18. ac alijs plerisque in locis, quam in Latino Theophrasto castigare poteris. Quod autem Plinius Pinum saepe perperam pro Larice acceperit, constat ex eo, quod libr. 10. capit. 10. scripsit his verbis, Laricis morbus est, ut tada fiat. Quandoquidem Pini proprium est hoc, non Laricis. Id quod apertissime comprobatur Theophrasti testimonio, qui libro 3. capite 10. de historia sua habet, Morbum Pinus accidere talem Idai incole narrant, cum non solum cor, sed etiam pars extrema caudicis in tadam transuerit, tunc strangulare quodammodo, quod sponte accidit vbertate arboris largissima, quo ad quis coniectare possit. Tada enim totum efficitur. Ergo hac Pini propria affectio est Haënus Theophrastus. Id quod hic in Bohemia, vbi ingentissima Pinorum sylua vbi que serè habentur, continuo videmus. Præterea Plinius loco superius citato scribit Laricem vltis radicibus repullulare nunquam. Picea vero contra. Quibus manifeste deprehenditur, hic etiam perperam Laricem pro Pinu vsurpasse illum. Etenim Theophrastus eodem libro & capite nuper citato, Pinum, inquit, ad vltis radicibus nunquam regenerare, Piceam regenerare quidem affirmant, ut in Lesbo accidit incenso monte Pyrrheo, qui Piceus scatur. Adhuc libro vigesimo quarto, capite sexto Laricis & Picea foliorum ex aceto decoctum, dolori dentium prodesse ex Dioscoride idem transcribit Plinius. Atqui Dioscorides non ex Larici folijs id parari medicamentum ait, sed ex Picea & Pini folijs. Sed de his alijs fortasse plura. Quod autem non florere Laricem nec fructum ferre Plinius dixerit, ad id nil aliud respondendum videtur, quam quod, cum in huiusce planta historia pleribus alioqui modis hallucinatus sit, non videam quo pacto eius possum comprobare sententiam, præsertim cum et si ipse affirmanter scribat libro decimosexto, capite vigesimoquinto, Illicem, Piceam, Laricem, Pinum nullo flore exhibere, Theophrastus tamen libro tertio, capite sexto, de historia plantarum, florere Pinum & Piceam, nec negarit, nec affirmarit. Sed florere vtranque apertissime testantur Bohemia sylua, vbi florida quotannis inspicuntur Pinus odore (ut ego mihi testis esse possum, haud quidem ingrato. Quos ita, ut Plinio mihi subscribendum non sit, præsertim cum videam negasse illum, Populum, Myricam, Alnum haudquaquam fructum ferre, nec Bechium florem, cum tamen hoc falsum esse sciatis, non solum rei plantaria periti sed corarij ac vetula.

Plinij locus expolitus.

Plinius saepe τὴν ex Theophrasto Laricem male vertit.

Theodorus notatur pluribus erroribus.

Plinii errores in Larice probantur.

Pinorum sylua in Bohemia frequentissima.

Pinus floret. Plinii error notatus.

Laricem ardere contra Pliniorum & Victruuorum.

Lapidibus lignorum loco ad ignem quivcantur. Victruuii testimonium impugnatur.

Plinii in Agarico erratum.

Postremo negas antiquorum Laricem, nostram esse posse, quod Plinij, Victruuij & Palladij autoritate satis sit comprobatum, Laricem non ardere nec igne vnquam accendi. Atqui velim ut si Plinio perpetuo tibi credendum statueris, statuas etiam eidem Plinio credere, proculdubio ardere Laricem, vbi ignis admoueat. Quandoquidem in libro decimosexto, capite duodecimo, in Macedonia Laricem masculam vtere Macedones scribit. Fœminae radices tantum & ex his parare carbones. Quibus iam certior fies, quam belle sibi constituit Plinius in Larici historia, quamque de ea fabulose scripsit Victruuius, a quo Plinium transcripsisse, non ambigimus. Caterum quam vana ac futili ducantur opinione qui Victruuij ac Plinij autoritate freti, Laricem nostram genuinam non esse contendunt, quod eam facile accendi comburique videant, præter Macedones, ipsa manifeste testatur ratio. Siquidem cum tam antiquorum quam recentiorum scriptorum consensu, præsertimque ipsius Victruuij & Plinij Larix, prapinguem, liquidam & copiosam resinam fundat, mellis Artici colore, qua perinde ac bitumen igni admotâ, quam celestime accenditur & vehementissime flagrat, ignari imo potius solidi hominis est, credere Laricem prapinguem, resinofam & resiniferam arborem, quae (si Plinio credimus) facile tabescit in eadem qua nihil est ad ignem accendendum aptius, ignem respicere, cum lapides ipsi, qui sui natura flammis nunquam flagrant, vbi tamen bituminoso succo redundant, ut Gagates, perinde ac ligna exurantur vertanturque in cineres. Id quod facile testantur Flandri, Brabanti, & alij plures Aquilonares populi, qui lignorum penuria, hisce lapidibus succo perperuo fouent ignes. Ideoque si vera esse consentimus, qua narrat Victruuius de Castello illo circa Alpes trabibus Laricinis extracto, quod scilicet iussu Caesaris adnotis incensis virgarum fasciculis ac facibus, Laricea illa trabes admotum respuerint ignem, dicamus id euenisse necesse est, non quod Larici materia non comburatur, sed quod ventorum, aeris, niuium, pluuia & algoris iniuria quibus Alpina regio illa quocunque serè tempore afficitur, durior ac lapidosior facta, non ita facile accendi potuerit, præsertim quod omnis arborum materia, qua solidior sit, non illico primo statim occursum facile accendatur. Etenim Larix soliditate ac duritie præ ceteris præstat, quae vbi aeris illi affectibus lapideam quandam contraxerit naturam & eius resina contabuerit, mirum sane non est, si non ita facile accendatur. Ad id autem, quod si Larix antiquorum nostra fuisset Larix, cum Agaricam proferat, non prætermisisset Plinius maximus verum naturalem indagatorem, qui de eo aliquam fecisset mentionem, nil aliud respondendum succurrit, quam quod mihi nihil mirum sit id prætermisisset illum, cum certo sciam alia longe maiora notioraque ab eo esse prætermisisset. Sed mirari potius debeo, quod in libro decimosexto, cap. octa. fuerit fabulatum, Galliarum glandiferas maxime arbores agaricam ferre, quod tan è, ut si Plinius scripsisset, ita a nemine antea scriptum esse, non ignoramus, ut in commentariis nostris in Dioscoride de Larice agentes iussu diximus. Nec velim credas, huius Pliniana lectionis subesse mendam, quod scilicet ibi coniferas non glandiferas arbores legendum sit.

Guilandinus.

vt impostor ille omnium impudentissimus ad Rosarium Polonum scribens fabulatur, & hanc Plinij locum se primum esse
 stituisse gloriatur. Siquidem ibi Plinius in vniuersa illius capituli oratione de alia re non scribit, quam de his, qua e glan-
 difera arboribus proueniunt. Quo fit vt quum veterator ille locum hunc Plinij haud emendarit non Plinium castigasse,
 sed ipsum castigatione indigere iam cognoscere possis. Caterum si praeter haec reliquas Laricis notas expendamus, nihil
 sane erit quod impediatur, quo minus Larix nostra non sit legitima. Siquidem si corticem intueamur, est quidem in Picea
 cortice crassior, vt Plinius inquit. Si materia praestantiam, solidam eam, firmam, robustam, perpetuamq; conspiciamus,
 & adium & nauium fabricis aptissimam, cum non solum in sicco, sed in humore (vt Plinius inquit) praeter ceteris valeat.
 Si ligni colorem inspiciamus, quin etiam si odorem experiamur, rubescere sane nostratam Laricem, ac acrisse odore, vnde
 cum Plinio fatebimur. Si mansu eius quoque saporem degustemus, amarum illam cum Viētruuio dicemus. Adhaec si de-
 corticatam in flumen, vel lacum proiciemus, non fluitare Laricem nostram, sed illic eandem fundum petere intuebi-
 mur. Quae omnia certissimum praebent indicium, nihil ab antiquorum Larice differre nostratam. His accedit arboris vasta
 proceritas, natale solum, & ipsa tripartita germinatio. Etenim nostra Larix facile ceteras coniferas arbores longitudine
 superat. Nascitur in montibus, & in vniuersa Rhætia regione copiosissima habetur. Vnde ad restituendum Neumachia-
 rium pontem, Tyberius Caesar (vt ipse testatur Plinius) ingentes Lariceas trabes aduehi curauit. Quinetiam observa-
 tum esse scimus ter in anno nostram Laricem germinare fundere. Praeter id manifesto est argumento Laricem nostram esse
 genuinam, ea, quam fundit Resina, falso Terebinthina Myropolis appellata. Siquidem hac substantia consistens, quin
 etiam colore, odore, saporeq; nihil penitus distare videtur a Laricea Resina, de qua ipse meminit Plinius libro decimo sexto,
 capite decimo, & libro vigesimo quarto, capite sexagesimo. Etenim e Larice Resinam erumpere ait melleo colore atq; len-
 tore, odore viroso, nunquam durem. Id quod ante ipsum dixerat Viētruuus. Siquidem is Laricis Resinam liqui-
 dam esse scribit, mellis Attici colore & Phibiscii vtilem. Quae quidem nota in nostra Laricea adeo clara apparent, vt
 Thyresia caciore dici possit, & Marpesia caute stupidior, qui hanc non nouerit Resinam esse Larignam, de qua meminit
 Viētruuus & Plinius. Caterum si cupiam fortasse tot rationibus, tot argumentis, tot praclarissimorum autorum testi-
 moniis satisfactum non est, consulat is etiam Galenum & eius κατὰ γένος libros perlegat. Ibi enim lib. I. cap. decimo
 quinto, & lib. II. cap. I. & II. quinetiam lib. IV. capite 14. pluribus sane modis atq; testimonio comprobatum esse
 reperiet, Resinam Lariceam nostram, nihil prorsus a genuina distare, sed ipsam eandem esse, de qua idem scribit Gale-
 nus, cuius etiam auro Terebinthina loco usurpatur Larigna, vbi illa non esset ad manus. Quamobrem mirum nobis non sit,
 si post haec, vbi superioribus annis Terebinthina resina defecerat, vbiq; penes eius loco Larigna inualuerit vsus. Sed huic so-
 lide aperteq; comprobatum esse arbitror, nostram & antiquorum Laricem vnam & eandem esse plantam, vt nihil em-
 plius hac in re non solum tibi fuerit ulterius ambigendum, sed nec aliis quibusdam, nisi fortasse pertinacibus ac contem-
 ptiosis, quibus cum nullum mihi intercedit negotium. Ex quorum agmine, qui tam temere asseuerant Laricem nostram,
 magnam illam esse Cedrum, quam Plinius Cedrelaten appellat, cuiusq; in sacris literis apud Hebraeos tam frequens, bono-
 rificaq; sit mentio, deinceps ab omnibus deridebuntur, vbi hanc nostram epistolam legerint. Sed nihil est, quod magis ho-
 mines etiam non indoctos in delirium ducat, quam ipsa pestilens ambitio, qua plurimum ij ducuntur, qui, vt praeter
 scire, ac sapere videntur, nil aliud die noctuq; moluntur, quam vt noui inauditq; aliquid vel dicant, vel scribant. Quod
 vt consequantur sicuti sophistaribus suas aduocant sententias, ac poliunt, vt studiosa iuuentus, cui hac non ita
 facile innotuit impostura, hos perditos nebulones praeter ceteris euehat ac colat. Sed vbi in eorum veniant iudicium, qui
 rem ipsam vbiq; exploratam habent, facile spongia veritatis detergitur fucus & detegitur impostura. At quis tam fue-
 rit mente alienus, qui credat Laricem nostram Hebraeorum esse Cedrum, cum Plinius de ea peculiarem a Larice fecerit
 historiam, & quod illa Abieti non sit absimilis, Cedrelaten appellauerit? Quam qui in monte Libano viderunt, vt Bello-
 ninus, & qui Hierosolymam ad SALVATORIS nostri tumulum peregre proficiscuntur, non Larici similem pingunt,
 sed Abieti: Vnde recte illi nomen a Graecis desumptum Κεδρελάτην Plinio inditum est, adde etiam quod huic folia perpe-
 tuo virescant. Talis itaque est pestilens quorundam doctrina, quam cum tractu temporis veris, ac solidis argumentis ex-
 pugnatam, dirutam, collapsamq; cernunt nec ullis possint se tueri praesidiis illic ferarum more in furorē aguntur mo-
 re canum rabidorum latrantes & spumanti ore oberrantes. Quinetiam vipereo quodam veneno perfusi, tantum commi-
 tiis, criminationibus, maledictis, & omne genus seditatibus confidunt. Quod postea fit, vt dum alios laesos se patant,
 se ipsos interimant, & non solum ab inimicis, sed etiam ab amicis perpetuo habeantur opprobrio. Ego vero cum verita-
 ti propalanda sustinendaq; semper fuerim addictus, nihilq; mihi magis semper fuerit in votis, quam Rempub ac posteri-
 tatem iuuare, horum perditorum hominum calumnias, criminationes, conuitia, maledicta, pestilentesq; eruptiones,
 potius aequo ac forti animo ferre decreui, quam a meo instituto desistere. Sed ne agere seras obsecro, mihi amantissime Al-
 drouande, quod tecum de his colloquar. Quandoquidem cum haud me lateat, te virum esse integerrimum, candidum,
 & doctum, volui hac ad te scribere praeter ea, qua de Larice differui, vt vbi in hosce incidere Sophistas & contem-
 ptiosos Sycephantas, meum sequaris consilium: Cum probis, candidisq; viris longè consultius sit, malorum omne genus ex-
 pediri, quam ne tantillum quidem a veritate deflectere: quam qui opprimere student, ij sane digni sunt, vt e medio tol-
 lantur. Interim velim, vt tibi persuadeas, te tantum tibi de me posse polliceri, quantum cognoueris a me posse presta-
 ri. Vale.

Larignam resu-
 nam pro Tere-
 binthina vsu-
 paauerunt etiam
 antiqui.

Laricem non
 esse Cedrum.
 contra Guilan-
 dinum.

HIERONYMVS DONZELLINVS MEDICVS
 ac Philosophus, Petro Andreae Matthiolo Serenissi. Princi-
 pis Ferdinandi, Archiducis Austriae Medico,

S. P. D.

Consolatur Matthiolam aduersus inuidos & blaterones.



Vm omnium artium is vsus sit ac finis, vt mortalium saluti & commodo seruiant, ac famulentur, eorum
 tamen nulla scopum hunc propius attingit, quam Medicina, qua reliquarum veluti princeps & archite-
 ctonica, illi vtitur tanquam administris, ac earum actiones ita temperat ac moderatur, vt qua aliqui
 noxia & perniciose erant futurae, eius beneficio & commode fiant & saluatae. Sic itaq; ad Medicinam
 affecta sunt artes inferiores, vt earum ipsa veluti regina sit constituenda. At qua nobiliores sunt & ra-
 tionem

tionem ac contemplationem magis requirunt disciplina ac scientia, eius ope & auxilio ita videntur indigere, ut sine ipsius fructu nec comparari, nec exerceri commode satum possint. Cum enim ingenij, ac Sipientia studia bonam & aeternam vitam contempnant ac laesant, & quod generaliter ab Aristotele est prolatum. Vnus scilicet res ortum, alterum esse interitum, hoc etiam apertissime accommodari possit, quis non videt, solus artus Medica opera adiuos homines in Diuinatione, atq; humanarum rerum contemplatione versari diutius posse? Et quando humanus animus, si perpetuus periturbationum, quibus agitur, ad rerum scientiam peruenire minime possit, ac verissimum sit illud, quod dixit Arist. in sedato ac tranquillo animo facile prudentiam ac doctrinam imprimi & comparari, efficacius hac in parte Medicina quam Ethica saluare nobis potest. Si enim animi mores e corporum temperamentis, tanquam e fontibus manant, ac oriuntur, quemadmodum in peculiari lib. certissimis rationibus Galenus confirmauit, ea vero immutare solus Medici sit opus, conficitur, non tantum corporis, sed animi quoq; valetudinem a Medico tractari, quae sine vtraque ad sacra Philosophia studia liberum nobis ad rationem patefacit. Quinetiam cum bonorum tria genera ab Aristotele recensentur, quae ad corpus pertinent, inter animi ac fortunae bona medio in loco sunt constituta, ut commodius vtriusq; suffragari possint. De nobilitate illis animi bonis quemadmodum Medicina indigeant, antea dictum est. Fortuita vero sine prima valetudine, ac robusta, nec comparari, nec retineri, nec eorum fructum percipi posse, sicut patet, cuius certa sola Medicina opifex est, ac procreatrix. Famulaeque non tantum artium omnium praestantissimi, sed etiam generis humani materem nutrimentum atq; alumnam esse, quibus facile potest iudicare. Cuius etsi multa sunt partes, de ea tantum mihi nunc futurus est sermo, quae Medicam materiam dicitur, & a Graecis ἰατρικὴν ἢ ἰατρικὴν ἰατρικὴν est appellata, quam ego certe nunc multis nominibus, alij praesens audacter pronuntio. Hanc sane primo inuentam ac reliquis antiquiorem esse, Galenus est auctor. Vnde etiam apparet eandem ceteris distitans reilem esse mortalibus, cum sine hac alia tamen inanem tantum, ac inutilem notitiam nobis afferunt, ac largiantur. Videmus certe multos etiamnum solida Medicina imperitos, sola tamen auxilium notitia plurimos iurare. & Empiricos olim reliquarum Medicina partium rudes, atq; ignaros, multa praestitisse in generis humani salutem, Galenus testis est luculentissimus. Quicquid vero aut dicitur, aut contemplatur Medici, hunc vnicum scopum habent, ut medica materia vite atq; oportune vti possint. Et digniores, ac praestantiores Medicis, iam per se habiti, qui in medicamentorum sylua cum diuites sunt, ac opulenti, tum vires & facultates singulorum habent perspectas, ut prudentes & cum mortaliu emolumento illis vti sciant. Post longas enim speculationes, post diutinas Medicorum inter se sub deliberationibus concertationes post morborum examina, post causarum, symptomatum signorum, indicationum, ac reliquorum quae legitima curationi sunt praemittenda, exactam investigationem ad materiam ac remedia penitentem recurrunt sine quo omnis conatus irritus ac studium sine fructu est futurum. Hanc praeterea Medicinae pars ea est praestantia, ut multiplicem ac variam pulcherrimarum rerum scientiam in se contineat & complectatur, quae per se ac sola vsuq; nondum adhibita animum perficere atq; omnium bonorum ordines, in qua quaedam voluptate ad se alliere ac delectare quam maxime possit. Quicquid caelestis ac immortalis illi orbis suo ambitu & complexu circumseriunt, id totum materia est Medica. Ergo peritum Medicum eorum nihil fugit, quae in sublimari hoc mundo, sunt collocata. Et quamuis subiecti nobilitate, alij Philosophia partibus, non antecellit, utilitate tamen, rerum varietate ac scientia certitudine, illi non est inferior. Igni itaque genera, acris facultates, terrarum differentias, maris, flammam fontium, lacuum, paludum qualitates fossilium metallorum, lapideum gemmarum, herbarum fruticum, arborum animantium, ut piscium avium reptilium quadrupedum rerumque omnium, quae ad illa quoquo modo pertinent, aut ex illis oriuntur, ac profluunt, vires ac naturam Medicus nouit, & contemplatur, inq; eo potissimum elaborat, ut sit sola, aut simul mixta, ac varie preparata & ad prestandos morbos oportune adhibita, ut sicut Galenus dixit, ex ἰατρικῇ βινδύματα, quae sane praclaro Encomio Asclepiades insigniuit, qui ἰατρικὴν ἰατρικὴν appellauit. Hanc Medicinae partem plures antiquorum tractant, nemo tamen luculentius nemo exactius, nemo diligentius, quam Dioscorides Anazarbeus, qui profecto in ea tradenda tam praclare est versatus, ut omnes tum aequales suos, tum antiquiores etiam suo lumine ita obscurant, ut neglecta a posterorum monumentis, & squalore obducta, ac obliuioni tradita, tandem interierint. Quicquid etiam posteriores ea de rescripserunt, illi vni vitro acceptum referunt & summam hoc in genere laudem illi iure merito concedunt. Vnus mihi instar omnium futurus est Galenus, qui honorificum ac locupletissimum illi, in verbum testimonium impertitur. Inter omnes porro Dioscorides mihi videtur perfectissime confecisse tractatum de medicamentorum materia. Fuere quidem & antiquorum & posteriorum plures qui aliquam Medica materia partem, puta de animalibus, aut de plantis, aut de piscibus, aut de metallis, a fossilibus separauit sunt persecuti, ac Dioscorides vniuersum corpus saluberrimo totius posteritatis exemplo sibi pertractandum duxit, quem postea imitati recentiores, eandem rem excoluerunt atq; elaborarunt, quaedam etiam addiderunt, ut solet tempus, rerum

Lib. de ortu & interitu II.

Libro Phy. VI.

Libro Ethic. I. & Rech. II.

Lib. ad Thrasibulum.

Lib. de Sectis.

Gale. III. Methodi.

Dioscorides ex- ac de materia medicam re- etauit.

Lib. de simplicibus VI.

In Arabes.

Matthioli como mendatio.

Manardus ac Leoniceus.

Medicae materiae duas partes

cultates docet, altera vero historiam exponit, tu utraq; enarras, ut nihil prætermisum videatur. Praclarum sane huius
 adficij abs te tactum est fundamentum, cum Dioscoridem ipsum explicandum suscepisti, ex cuius vnus vera intelligi-
 ria hac demum Medicina pars pristinum, ac legitimum candorem recuperare potest. Nec vero ipsum tantum auctorem
 explanas, obscura retegis, abdita p:tefacis, ac legitimum sensum eius verbis restituis, sed quicquid etiam à posterioribus
 Graecis, Arabibus & Latinis est inuentam, in tuum illum veluti thesaurum ita reponis, ut quacunq; vlli bi extant ea de re
 lectu digna, illic tanquam in opere absolutissimo suis in locis apte collocata reperiantur. Si quid præterea, aut antiquius,
 aut a recentioribus à recta ratione est aberratum, errorum fontem aperis, & optimis argumentis ab eorum sententia disce-
 dendum suades scilicet ne rudibus, ac imperitis grauium alioqui & doctorum virorum auctoritas imponat. Quoniam
 autem sunt plurima medicamenta tam simplicia, quam composita, non ita pridem inuenta, quorum vsus multu adhuc
 est ignotus, complura etiam arcana, quae paucorum admodum manibus contrectantur: Tu inuidorum odia nihil veritus,
 publica omnium saluti consulens ex reconditis locis haec in lucem profers, eorum vero energiam & rectam vtendi ratio-
 nem doces, qua certe in re & liberalis & candidi animi egregium in primis specimen abs te editum cum summa gratia-
 rum actione cuncti agnoscent & confitentur. Nemini igitur mirum videri debet, si vninersis mortalium ordinibus & con-
 ditionibus tam gratus acceptusq; fuerit tuus hic labor, ut non tantum Medici, Clinici, Chirurghi, Pharmacopœi, sed omnes
 etiam alij, qui ab honesto studio minime abhorrent, tuum Dioscoridem tum voluptatus, tum vtilitatis causa expectant, le-
 gant, ac manibus quotidie terant. Memini certe cum optimus vir ac diligentissimus typographus Vincentius Valgriffus
 Venetis mihi narraret à prima illa editione supra triginta duo millia exemplarium hæcenus fuisse diuendita & distra-
 cta audisissime tamen à quam plurimis etiamnum flagitari, quasi vero nunc primum recens in lucem emittatur, ut faci-
 le appareat, nostra hac atate librum nullum magis gratum, aut libentius atq; alacrius acceptum in publicum produisse.
 Ne tamen tantus thesaurus solis Italus esset communis, ex Italica, in qua primo fuit scite scriptus, lingua, nullis laboribus
 aut vigilis pariens, Latinum reddidisti, tuam ita φιλαυθροπίαν declarans & bonum quo communius, eo perfectius atq;
 praestantius esse, minime ignorans. Tandem ne quid in absolutissimo opere desiderari possit, rerum fere omnium, quas
 Dioscorides tractat, viuas imagines adiecisti quarum spectaculo non tantum erudiri, sed delectari etiam homines queant.
 Id autem ut exacte perspiceres, diu vix potest, quot labores, aestus frigora, caeli tempestates, peregrinationes longinquas
 pertulisti, quot inaccessis montes ascendisti, quot valles, sylvas, nemora peragrasti: quot immanium ferarum truculen-
 tia, te, tuamq; vitam exposuisti, scilicet, ne idem tibi contingeret, quod Galenus in his ceprehendit, qui rerum atq; herba-
 rum, quas ne per somnium quidem viderunt, figuras describere aggrediuntur, quæ nimirum ridens praecentibus similes
 facit, qui fugiuus mancipij notas ab aliis traditas publicant, quod ipsi non modo non viderint vquam ante, imo si coram
 forte assistat, ne agnoscat quidem. Quandoquidem vero in opere eo, non solum modo tot tantaq; molestia & tam gra-
 uia incommoda, uti diximus, erant tibi sustinenda, sed in elaborando eliminandq; potissimum, & ut rite ederetur, curan-
 do, diuersissimorum artificum opera diligentiaq; in primis necessaria foret, diuinam hic providentiam mehercule, satis ad-
 mirari non possum, qua quidem, ne honestissimis studiis & optimis conatibus tuis vllum omnino obiceretur impedimen-
 tum in tota Europa Splendidissima ac Illustrissima Austriaca familia clientela oportune te insinuauit, cuius singulari li-
 beralitate aditus benecepto ad ficio summum imponere colophonem posses. Maximam profecto letitia causam superio-
 ribus diebus tua mihi litera suppeditarunt, quibus pariter inuictissimi Casaru Ferdinandi & simul Illustriss. ac Generos.
 eiusdem filij Mæcenatis tui, Ferdinandi iunioris, promptam adeo atque alacrem in te voluntatem significasti, quorum
 splendidissimo munere tuis iam longe magis ac magis Dioscorides sic illustrandus. Post tot corporis labores, & tam gra-
 ues ac assiduas animi curas, quid quæso superest, quam legitimus tuæ virtutis fructus gloria immortalis? bonorum, si-
 licet atq; eruditorum virorum de consummata tua doctrina ac virtute concepta opinio, & publicus quidam omnium ho-
 minum plausus? Nullus quippe nunc est in omni Europa angulus, nullus in luce hominum viuens, cui non modo notum
 sit Matthioli nomen, sed etiam praclarum in primis. Tu viuens & valens diuturna iam tot annorum fruens laude & glo-
 ria, id quod paucissimis sane conceditur, quo magis tibi etiam vleo nomine est gratulandum. Dignus ante omnes pro-
 fecto mihi videre, cui publico non solum totius Italiae, cuius peculiare decus es & ornamentum, verum etiam totius Europa
 consensu antea statua etigatur ingenij nimirum tui & praestantia immortalale monumentum. Nam si Demostheni de vni-
 ca patria bene merito id honoris grati Athenienses detulerunt, quo magis illud tibi de immenso orbe optime merito debe-
 tur? Si qui igitur sunt in hominum cœtu, ut multos esse verisimile est, (deteriorum enim rerum vberior prouentus sem-
 per est) qui de te secus, quam par est, aut sentiant, aut loquantur, eos ego quos terra sustineat, indignos puto, hominum
 pestes ac reipub detrimenta. Eorum calumniis ac petulantia iam dudum te vexari scio, id quod mihi accidit certe mole-
 stissimum. At quoties rem propius intueor, intra tuae excellentiae haud obscurum sane testimonium ac pulcherrimum ve-
 luti trophaum iudico. Vna & fatalis quodammodo, doctissime Matthioli à mundi exordio ad hæc vsq; tempora, bono-
 rum & insignium virorum fors hæc fuit. Non ineleganter sapientissimus Aristoteles dixit. Τὰ ἐναντία ἀπαρὰ λυα μάλ-
 λον φαίνεται. Nunquam enim magis conspicua est insipientium ac improborum cecitas vitium, atq; inscitia quam vbi
 prudentium & proborum opposita virtute ac splendore detegitur ac illustratur. Qui in deteriore sunt statu, omnes sui si-
 miles esse vellent. Noctua solis lumen ferre non potest. Hominum scelestorum colluies ac caeca indoctorum turba illos
 omnes delirare credit, qui non in eadem criminum sentina malurum lerna, luto ac cœno secum voluntantur. Hinc odium,
 inuidia, calumnia, detrectatio, reliquaq; animi impotentia, qua perditorum petulantia boni atq; honesti viri pulsati ac
 laceffiri solent. Sed quia tantæ indignitate non parum te commoueri est æquum, rationes quibus tuam animam su-
 stentes & consolentur, aliam hic repetere, per oportunum duxi. Antiquissima illa est consolatio & natura humana maxi-
 me consentanea.

Triginta duo
 milia exempla-
 ria vendita.

Italice primum
 scripsit Matth.

Lib. de simp. i. 7.

Contra Mat-
 thioli olores.

Lib. Rhet. III.

Quid lib. Meta-
 morphos.

Similes aliorum respice casus.
 Mitius ista ferēs.

Pythagoras.
 Themist. in So-
 phista.

Socrates.
 Platon. Apolog.
 & in Phaedro.

Pythagoras adeo sapientia dicitur excelluisse, ut Philosophorum omnium veluti parens merito habitus fuerit, idem
 tam in propter liuidos ac turbulentos homines ex orris semper in aliena vixit regione. Nam ex Samo Crotonem propter
 Polycratem, Crotonem ad Lacrenses propter Gylonem aufugit. Ex Lacrensisibus autem non vnus duntaxat, sed omnes in
 eum insurrexerunt, non alia certe ratione, quam quod tanti viri virtutem diuinus tolerare nequuerint, ab his itaq; Ta-
 rento exiit. Tarentini insuper nox, tanquam grauiori aliquo onere se leuaturi in Megapontium detulerunt, vbi
 postquam ad quadraginta dies cibo abstinuisset, in Musarum templo inecrisse perhibetur. Quid vero optimo illi Socrati
 acciderit, quid acimet hoc loco commemorare? Meicyto, Anyto & Lycone cunctorum plena sunt hominum aures. Et
 profecto

Plures interim in Italia aliisque regionibus viuunt, qui Vesalio adhuc obfistunt, scilicet ne Herculi desint monstra, quibus conficiendis magis magisque nomen eius illustretur.

At cur ego in recensendis exemplis potissimum longior sim, quandoquidem vna & eadem perpetuaq; bonarum artium calamitas, semper fuisse comperiatur? Vnde etiam factum credo, vt non modo nostris temporibus, sed semper hincrisumi viri nonnulli reperirentur, qui animorum imbecillitate potius, quam sano iudicio adducti, explorata & incute humana prauitate, et turba frequentiaque vulgi, ceu à valida quadam tempestate, & procella, ad solitudinis salutarem portum se receperunt. Quales profecto, quanquam promiscua multitudini ignoti, Diis potissimum immortalibus amici equalibusq; viris optimis ipsi optimi existimantur. Hi tranquillam vitam agunt, neq; egre permittunt, versuto & prauos homines in populo gloriam admirationemq; aucupari. Ex eorum albo Philosophos excellentissimos, longeque principes seuerosq; admodum, & pergrauos viros extitisse complurimos, auctor est Cicero.

Offic. Lib. I.

Tu igitur optime Matthiole, tantum abest, vt tuorum aduersariorum impetu atq; inuidia debeas commoueri, quin eadem de causa precipue tibi gratulandum censeo. Te siquidem eximiis illis viris similem esse declarant, quos superius nominavi, quorum vestigiis tenaciter insistentes, si in eosdem scopulos incidis, minime mihi mirum videtur. Nec vero sis acerces mercaturam, pacatum ac tranquillum ad quamcumq; navigationem mare, & secundos ex animi sententia ventos & onustas precioso auro naues tibi semper polliceris? Nonne vndarum iactationem, tempestatu procellam, Scyllam, Charybdinque, & his omnibus periculosius naufragium, & grauiorem Oceani fluctuantis aestibus, pyratarum latronumq; incursum subinde exhorrescas? & interdum etiam de eiiciendo in mare mercibus cogitares? Sed neque illud à te est expectandum, vt communi sorte exemptus plane habeas neminem, qui tibi se opponat: neque id postulare debes, cum impetrari minime possit. Omnem etatem suos habuisse Zoilos, tibi est notissimum. Damnant tua Commentaria nonnulli, è diuerso plures sunt, qui eadem summis laudibus ad caelos vehunt. Tu is es, qui & illis respondere & te tuaque scripta constantissimis argumentis & re ipsa tueri potes. Vt cunque tamen in eo certamine nullo non tempore defuturi sunt ἀντιζημιῶν: sic at tamen in hoc temetipsum consolaberis, quod grata posteritas nullis omnino affectuum praiudiciis occupata, de rebus tuis sincerius iudicium feret. Hoc certe in statu, quo tu nunc versaris, israelitis mihi similitudinis videris, quos sacra historia refert, post suam ex Babylone in patriam reditum, cum Hierosolymam denovo extruerent, pari difficultate laborasse: Siquidem id non vulgare fuit fortitudinis specimen gladiis accinctos, camentum & lapides comportare, vna manu strictum enses vibrare altera facere opus, trullam versare, atque ita simul architectura dare operam, simulq; ad praelium expeditos esse. Et tamen videmus id non obstitisse, quo minus constanter infractisq; annis pergerent in cepto conatu, quoad tandem vsque pertinaci eorum assiduitate, hostium improbitas & rabies frangeretur. Idem profecto de te est expectandum, quinunc altera manu intercidentem iam diu Medicina partem restituis, altera vero aduersariam hostium vim strenue repellis & fortiter eius repugnas, qui egrorum ac salutare toti humano generi, hoc tuum studium impediunt ac remouantur. Porro autem, cum ego diligentius rem considero, aduersarios tuos in duo genera partiti esse video. Quorum ij quidem & docti sunt & eruditi, nullog; aut leuiori aut contentioni studio tecum pugnant: Sed cum idem omnino ipsis, quod tibi, propositum sit & institutum iudicium hercle, non animi acerbitate vel odio abs te dissentiant. Quando autem in omnibus artibus ac disciplinis perpetuum hoc fuisse constat, neque ea in re quicquam tibi accidit nouum, insolens aut inusitatum, a quo animo abs te ferendum iudicio. Nil equidem aliud Galeno interprete diuinus Hippocrates voluit, cum iudicium difficile pronuntiavit. Ex qua potissimum difficultate & in Philosophia & in aliis scientiis tot secta prodierunt. Hos ego amico animo in te esse non dubito. Et cum te natura humanam ac facilem nouerim te vicissim erga illos, vt par est, egregie affectum esse, aequè mihi certum est.

Lib. Esdræ 2. c. 4.

Matthioli aduersarij duum generum.

Aphorif. primo.

Socratem ac Platonem, vbi bene de se meritis præceptor es summo honore Aristoteles colebat, non vna tamen in re ab ipsis aperte dissentit, quinimo eorundem amicitiam sibi sacrosanciam esse haberiq; testatus, Veritatem tamen omnibus præferendam ducit. Priorem hanc inimicorum aciem, salua incolumiq; necessitudine, rationibus solu tibi expugnandam relinquo. Cum altera vero mihi est congregandum, eiusmodi enim sunt, vt cum illis disceptare certaq; tibi putem indecorum. Vtranque Philosophiam isti ignorant, tam eam, que in naturæ contemplatione rerum versatur, quam que affectuum impotentiam virtutum mediocritate moderatur solo nimirum mentis furore, sola animi inconstantia, sola petulantia, sola inuidia ob tam scelerem rerum tuarum successum, ad te lacessendum permouetur. Talis cum sit eorum conditio, ne apud bonos & eruditos viros, sua auctoritate tuam existimationem ledant aut obscurent, minime tibi est verendum, quippe cum perditissimi sint & Reipub. labe & macula, quis obsecro, mistralpa caciore, est futurus, qui eorum verbis fidem adhibendam in animum inducas? Eosque enim se prodis eorum factor, vt omnium naribus excipiantur: ab eoque omnes tanquam à Mephiti quadam, vt sentina longe diffugiant. Animos ij habent teterrimo veneno delibatos, & nigerrimo hoc, quo ha meltere exarantur atramento, foediores, vt indignissimi sint, quorum nomina à te perstringantur, aut quibus candidissima hac papyrus à me inquinetur. Horum itaque ne tanti illa tibi quidem ratio, mea sententia habenda est. Vt tamen aliqua saltem ex parte leuium hominum insolentia temeraria retundatur, iam specularem illum parans, in quo improbitatem suam manifeste ac palam intueantur.

Ego Matthiole Candidissime, ab adolescentiavsq; & bonorum præceptorum monitu & meo etiam peculiari quodam genio, ita sus comparatus, vt antiquos, maxime Græcos scriptores mihi duxerim persequendos. Verum vbi aliquando natu grandior factus, nostrum hoc seculum non paruum doctorum hominum prouentum attulisse animaduerti: illos quoque mihi statui perlegendos, neq; facti me admodum pœnituit, quod in eorum numero plures inueni, qui & doctrina & facundia merito cum ipsa antiquitate sint proxime conferendi, hosce ego omnes tua virtuti eruditioniq; laculentum testimonium dare deprehendi. Et quanquam ego antea idem de te sentiebam, non parum tamen (vt ingenue fatear) eorum me virore auctoritas permouit. Igitur quod me impulit, nihilominus ponderis apud alios quosuis habiturum ratus, coniuuxi doctorum nostro eua de tua ingenti solertia non obscura testimonia, qua etiam (si id tibi non ingratum fore intellexero) duplici nomine edere in publicum vellem. Cum primum enim in veteratorum manus peruenerint, ea que viderint ac perlegerint, si quis illis reliquus est pudor, ingenium cito mutabunt. Nam cum insignis sit stultitia argumentum, à sapientibus dissentire, vt meliorem mentem aliquando recipiant, hoc veluti Elieborismo vtendum censui. Deinde cum in magnis laboribus ac diutinis vigilis iam diu verseris, hoc leuamento vires tuas sustentandam ac spiritus addendos existimaui. Nam vbi classicos auctores videris tam præclare de te & loqui & iudicare, nonne vtiligatorem & scypharum morsu facile contemnes, & alacrius in tam sceleriter cepto curriculo insistentium, gloriari tibi in meta propositam prope contemplantus, minime hasitabis? Nec enim est hoc dissimulandum, quod obscurari non potest, sed præ nobis ferendum, Trahimur omnes laudu studio & optimus quisq; maxime gloria ducitur: nullam enim

Cic. pro Archia

edenim virtus mercedem aliam laborum periculorumque desiderat, præter unicam hanc laudis & gloriæ, quæ quidem detracta, quid rogo est, quod in hoc tam exiguo vitæ curriculo & tam brevis tantis nos in laboribus exerceamus? Certe si nihil animus præsentiret in posterum, & si quibus regionibus vitæ spatium circumscriptum est, isdem omnes cogitationes terminaret suis, nec tantu se laboribus frangeret, neque tot curæ & vigiliis angeretur, nec toties sanè de vitæ ipsa dimicaret. Nunc incidet quædam in optimo quoque virtus qua noctes & dies animum gloriæ stimulus concitat atque admonet, non cum vitæ tempore esse dimittendam commemorationem nominis nostri, sed cum omni posteritate adequandam. Scio equidem generosos animos, veramque ac genuinam virtutem, nihil peregrinum aut extrinsecum morari, sed contentam esse seipsa, ac proinde artus Medici a gloriâ imprimis ac publicam humani generis salutem, hoc in certamine tibi fuisse propositam. Quæ tamen idem tibi quod Chremeti illi Terentiano accidere absurdum non est, scilicet, ut humanis nihil à te alienum putes hoc tanquam in castamento non potui te non adhortari, ne ab hac statione discedas, in qua magno mortali commodo diuinam consilium ac providentiam iam dudum te collocavit. Vale.

In Heautontimoroumeno.

Hic habes candidissime Lector virorum nostra ætate præcellentium Ælogia de eximia doctrina & virtute, Clarissimi Medici Petri Andreae Matthioli Senensis.

Nicolaus Muttonus Mediolanensis, Medicus.

Sunt inter recentiores Victor Trincauellus, Aloysius Mundella, Lucas Chinus, Nicolaus à S. Michæle, Augustinus Gadaldinus, Franciscus Camerius, alij, innumeri quos ne tadium pariat oratio, lubens ac volens prætereo. Non omnitendus tamen singularis eruditionis & perspectæ diligentia. Petrus Andreas Matthiolus, qui primus, quod sciam præstantissimam ac multo iam seculo comprobatam Medicæ materiam scriptorem Dioscoridem in Italicam linguam quam elegantissime vertit. Quo sex hactenus peracto labore commentaria adiecit, in quibus Medicæ materiam scientiam, cum ad usque hæc tempora in nocte densissima delituisse, tanquam interemptam nunc primum à caliginosis latebris in lucem reuocauit, & eam veluti alio quodam partu genuit, & per omnia membra aluit, eduxit, vestiuit, & omni ornatu insignem reddidit. Hæc ille in præfatione sui Serapionis.

Præterea in suis annotationibus in thesauros Pharmacopæorum, Matthioli auctoritate fretus, quamplurimos annotauit errores. Quin & in suis in Serapione in plantarum nomenclaturis Italicæ a Matthiolo omnia accepta refert. In Serap. & annotat. in thesauros.

Vbertus Barlandus, Medicus Gallus.

Porro hoc in negotio non extemporium d. casten egi, verum in exprimendis simplicium facultatibus & forma Galenorum sequutus sum. In priuatæ vero simplicitate censurâ, eximium illum & eruditione & perspectâ diligentia Matthiolum reddidi præcipue, quum in Dioscoride censendo hic & operam nauarum singularem atque adeo Colophonem addiderit.

Hæc in Epistola nuncupatoria super suas annotationes in Dioscoridem:

Item. Quod si omnium longe in tractando Dioscoride acutissimo Matthiolo Senensi credimus, verum Acorum id esse probabimus, quod officinis Galanus odoratus nominatur. Cap. de Acoro. Item: Nec hodie Meon prouenire in Italia præcellentis. Matth. ait: Cap. de Meo: Non modo his locis citat Matthiol., sed alius sane innumeris.

Bernhardus Dillenius Chronenburgus, Medicus Colonienis in libro suo de compositione medicamentorum.

Opinionum controuersiam luculenter Andreas Matthiolus Medicus in Commentariis suis in Dioscoridem sustulit, dum Calamum vsus quotidiani odoratum, verissimum Acorum ostendit, cuius doctrina ut pote germana refragari nemo debet. Cap. de Acoro in antid. hæmagogo. Item: Solum Andreas Matthiolus, solide de Indica Nardo pronuntiat. Cap. de Nardo in Aurea Alexandrina. Item: Qui volet doctissimi Ruellij Commentaria, & hæc ætate in plantarum scientia omnium principis Matthioli opus in Dioscoridem referet. In dialatyrco.

Item: Caterum Matthiolus excellenti constanti, ingenio, quam reliqui omnes auctores Matricariam vocarunt, atque alteram Dioscoridis Arthemisiam pronuntiarunt, Parthenium decernit. In Syrupo de Arthemisia.

Item: Manardus veram Acaciam primus putat in Italia deesse, cui summi iudicij & exquisitissimæ eruditionis vir, Matthiolus Senensis subscribit. Cap. de Acacia. Item: Huc sententia mea ad stipulatorem habeo Clarissimum Medicum, Andream Matthiolum cuius verba quoniam imposturam simul omnem ac reuerentiam indicant, hæc adscribere operæ precium omnino duxi. In Theriaca Andromachi. Capite de terra Lemnia.

ITEM: In summa, non quæuis alia est recipienda. Pingit eum exquisitam imaginem in Dioscoride suo Matthiolus Senensis, vir ad vnguem in arte absolutus. In Syrupo de Eupatorio. Capite de Bedeguar.

ITEM. Quam quidem fidem Matthiolus summus Medicus, & in herbarum omnimoda cognitione nemini secundus, comprobat. In Benedicta Nicolai Cap. de Turbit.

ITEM. Amatibus Lusitanus frequenter odiosa confidentia virtus invidentiæ suæ in clarissimum modestissimumque virum Matthiolum Senensem eructat, dum passim nimis intempestive huius doctrinam super Commentariis in Dioscoridem editis, coarguit & insectatur, quibus probata fidei hominibus nil aliud, quam malignum animum & perniciosam inuidiam ostentat. Ipse interim infinitis modis dignus, qui ob magnam stirpem imperitiam atque improbam, in se transfatam operam alienam (quod crimen est longe omnium turpissimum) velut à sublimi doctus veniat deridendus. Ecquid enim enarrationibus suis inseruit, quod non iustissimo titulo vni Matthiolo acceptum referre debet? à quo emulandi studio dissentit, in graues manifestosque errores imprudens homo prolabitur, cuiusmodi exemplum tum in hac planta, tum in Acantio, Coronopo, Helichryso, ac plerisque aliis visitur. Multo satius fuerat quo doctorem se aestimaret, eo quoque modestiorem præstare, quod ingenuam Philosophum decet. In oleo Hypericonis. Capite de Carduo Benedicto.

ITEM. Primus eius auctor est, Petrus Andreas Matthiolus Senensis, celeberrima fama Medicus libro suo de curatione morbi Gallici. In oleo ligni Guaiaci.

ITEM. Quanquam mihi nemo hæcenus extitisse videatur iudex æquior, quam Andreas Matthiolus, qui lib. 4. Diosc. cap. 37. eius figuram ostendens. Eupatorium hoc vulgare Aucenæ esse indubitanter pronuntiauit. In Syr. de Eupat.

ITEM. Postremo absolutissimam censuram suam edidit Matthiolus indubitatis ipsius herba notis, quas impugnare contentiosus prorsus est ingenii. Et si non negauerim in vtraque opinione plantam rationibus quibusdam trahi posse. Sed tamē reuera Phyllitis est decernenda quod ille idem Matthiolus oculis subiectæ Hemidionidis genuina imagine demonstrauit. Itaque ambigere & contendere amplius desinant, quibus veritas cordis est. In Oxy. velite splenico Pauli. Cap. de Scolop.

ITEM. Nescio qua ratione ad acer oppugnator Meus, sit Manardus vir alioqui singulari humanitate, modestus.

stia, & eximia animi sinceritate & moderatione. Sed totam hanc diffensionem exquisita doctrina sustulit, perperam memoria dignissimus Matthiolus in Commentariis suis super Dioscoridem, quos lectitent Medici, nam Sepiasarius sufficit hoc aperuisse. In Dialene Nicolai Cap. de Sena.

ITEM. Sed Aucenna defensionem singulari ingenij modestia & eximia pariter aequitate Matthiolus in Commentariis suis in Dioscoridē suscepit lib. 4. cap. 27. quo etiam loco quatuor Aconiti formas conspiciendas proponit, homo in simplicium cognitione ac medicina peritia clarissimus. In Trochisco è vesicariis diaphysalido. Capit. de Cicuta.

ITEM. Cynoglossum prorsus iuxta Dioscoridis scripturam apud Clarissimum Medicum, Andream Matthiolum, in doctissimis Commentariis suis, in eundem studiosissime elaboratis, conspiciere quis poterit. In Trochisco de terra Sigillata: Capite de Bolo Armeno.

ITEM. Solus Matthiolus in clarissimis nuper editis Commentariis suis, ad viuum affabre Symphytum petreum expressit, è quibus petant plantaria rei studiosi. In cerato ex pelle arietina. Cap. de Consolidis.

ITEM. Hanc opinionem simul & Fuchsum impugnat Matthiolus in doctissimis Commentariis suis supra Dioscoridem conscriptis, & omnino legitimum Horninum isthic affabre pictum ostendit. In Oleo Saluiz.

Conradus Gesnerus Medicus Tigurinus.

PETRI Andreæ Matthioli Medici Senensis præclarissimi extat liber vnus de morbi Gallici curandi ratione. In fine huius operi multa rara & mirabilia experimenta auctoris. Edidit & Commentarios longe doctissimos in libros sex Dioscoridi de Medica materia, qui sapius Italice editi, postremo ab ipso auctore in Latinam linguam translati sunt. Adiecta insuper sunt huic operi innumera plantarum, & animalium imagines ad viuum expressæ. Eiusdem extat Apologia, qua se ab erroribus & calumniis vindicat, quibus notatur ab Amatho Lusitano, Medico. Extant, & obiectiones quibus ipsius Amathi errata patefacit. In Bibliotheca & Epitomis.

Petrus Andreas Matthiolus Senensis, Dioscoridem nuper in sermonem Italicum conuertit, & Commentarios eadem lingua copiosos & eruditos adiecit, vbi diligentissime quacunquē de iisdem medicamentis Galenus scripserat, suo quoque loco recenset. Plerunque etiam Plinij & aliorum scriptis nititur, & recentiora medicamenta à Dioscoride omiſsa recentioribus passim commode adiecit, & plurima sua aduersus varios morbos & eximia quadam experimenta describit. Audio nunc idem opus Venetiis nunc primum Latine edendum. In præfationibus editis in Hieronymi Tragi Herbarium. Quin etiam in finitis fere locis Matthiolum citat, & eius vitur laboribus lib. de hist. anim.

ITEM. Petrus Andreas Matthiolus Senensis, in Commentariis Italicis, super Delphino Dioscoridi Senam diligentissime describit, & Ruellij errores resellit. Libro de historia quadrupedum de Boue.

ITEM. Petrus Andreas Matthiolus, rectè annotauit Theophrastum in Orobanche alicubi per imperitiam esse sum. Ibidem.

ITEM. Nam Ruellij sententiam de frutice illo amplexicaule, quem sigillum Dine Marie aliqui vocant, & ipse alibi Malacocissum, alibi Cyclaminum alterum facit, Matthiolus iam optime reprobendit. Cui nos libenter subscribimus. Ibidem.

ITEM. Ego Matthioli sententiis magis accesserim, qui Helychryson apud Thuscōs abunde nasci scribit. In Tauro.

ITEM. Matthiolus Ruellium reprobendit, quod hanc Cynocramben Atriplicem syluestrem esse putauerit, cum Atriplex ista libro secundo, post satiuam statim à Dioscoride commemorata sit. Qua quidem in re cum Matthiolo sentio. In Cane. Quin etiam innumeris fere locis in eodem volumine, in libro de quadrupedibus ouipatis, & de volatilibus Matthiolum citat, & eius vitur inuentis ac laboribus.

Andreas Lacuna Secubiensis, Hispanus.

Porro veram Dioscoridū Baccharim ignotam hactenus, à nobis autem haud ita pridem in Romano hisce agris repperit, nuper misimus ad Petrum Andream Matthiolum, virum & amicum, & medicamentorum simplicium, hac nostra aetate indagatorem acerrimum. In annotationibus super Dioscoridem.

ITEM. Seruieron me no poco en este trabajo tan importante, los Commentarios del Doctor Andreas Matthiolo Senense Medico excelente de nuestros tiempos: el qual con increíble destreza traslado el mesmo Dioscorides en lengua Toscana, y le dio grandissima claridad con las singulares exposiciones que sobre el hizo de las quales nos aprouechamos el elgundo lugares de nuestras annotations. Id est. Non parum auxiliij nobis attulerunt, in hoc nostro tanti ponderis negotio Commentaria, Doctoris Andreæ Matthioli Senensis, excellentu huiusce tempestatis Medici, qui non solum quadam incredibili dexterritate in Etruscam linguam eandem vertit Dioscoridem, sed maximum addidit illi splendorem suis in eum editis Commentariis, quorum auxilio multum profecimus nonnullis in locis harum nostrarum annotationum. In Epistola nuncupatoria ad Sereniss. Philippum Angliæ, &c. Regem super suo Dioscoride Hispanice edito.

ITEM. Demas de lo suso dicho con los appelladas de aquellas plantas que suelen hallarse en la Europa dimos iuuentente sus figuras y proprias formas para que por ellas pudiesse conocer cada vno las viuas quando las tuuiesse delante. Para lo qual heximos diligentemente esculpir todas aquellas figuras de nuestro amico el Doctor Andreas Matthiolo, qua fueron bene intendidas, y sacadas al natural dellas verdaderas por quanto non podian mejorarse. Id est. Damus præter ea vna cum dominibus earum stirpium, qua inueniri solent in Europa etiam imagines, ac proprias formas: vt ex aspectu his ante oculos obiectis posset vnusquisque ipsas viuas cognoscere. Quapropter diligenter excidi curauimus imagines illas omnes, quas edidit Andreas Matthiolus amicus noster. Namq; hæc ex viuis & veris plantis appicta sunt tanta rei intelligentia, vt elegantiores fieri nequiverint. In epistola ad lectorem eiusdem libri Diosc. in calce.

ITEM. Andreas Matthiolo Senes, Varon muy exercitado en la Vniuersal materia medicina ly principalmente en aquella de los venenos describe dos remedios excellensimos contra todo genero de poncooma, conuiene à saber vn Electuario y vn oleo, los quales, por haer yo dellos visto admirables pruenas, he querido que se annadiesen à estas nuestras annotations. Id est. Andreas Matthiolus in vniuersali Medica materia, vir admodum exercitatus, & in ea præcipue, qua ad venena spectat, duo describit remedia aduersus omne genus venena, nempe Electuarium & oleum quoddam. Quorum vsu cum viderim ego admirabiles successus, volui hæc omnia in has nostras transferre annotations. In præfatione Senis lib. eiusdem Dioscoridis.

Hieronymus Ruscellus Viterbiensis, in sua Epistola nuncupatoria super Boccatum Italicum ita de Matthiolo habet.

Habbiamo noi per opera del Matthiolo fatti nostri (cioè Italiani) Tolomeo & Diosc. non solo mi gliati,

glori, che i Latini non gli hebbero, ma diro anchora che Greci stessi, Id est, Feclitius taro nostros (i est, Italicos) Dioscoridem & Ptolomæum opera & diligenti Matthioli: Et non solum meliores, quam habuerint Latini, sed dicam quam ipsimet Graeci.

Antonius Vincentius Typographus Lugdunensis

AD HÆC eundem Dioscoridem, squalore, nam ac maculis, quibus hactenus scaturit innumeris, beneficio Andrea Matthioli, hominis in hoc genere versatissimi & Doctorum approbatione Medici doctissimi, elatis atque expurgatis, probe curatum, nitidum & tersum à nobis emitti: castigationes præterea quam plurimum locorum eiusdem Matthioli solertia & ingenio elucubratis ad calcem capitam adiunximus.

In Epistola ad Lectorem in Dioscoridem Lugduni impressum.

Ioannes Baccaniellus Medicus Regiensis.

Libro de consensu Medicorum, ubi in calce de simplicibus medicamentis differuit, honorifice Matthiolum sepe citat.

Robertus Stephanus Matthiolum etiam quandoque citat authorem: Aquo etiam Cinnabaris historiam prompsit.

Battholomæus à Maranta Venusinus Medicus.

AC tandem Andrea Matthiolum, qui tanta rei cognitionis videtur, quasi extremam manum imposuisse, ut paucè admodum, que suo vitio non sunt restituta, desiderari possint.

In præfatione suæ methodi de cognoscendis simplicibus.

Medicinæ Studiosi quamplurimi, qui Patauij Philosophiæ Medicinæ diu operam nauarunt, affirmant audiuisse sæpe ac sæpius Clarissimos Medicos Ioannem Baptistam Montanum, & Gabrielem Faloppium in suggesto legentes Matthiolum summis laudibus extulisse: Id quod ipse etiam attestari possum: Quin etiam Lucam Ghinum præclarissimum materiæ Medicæ indagatorem, Pisis, & Bononiæ magis præconijs Matthiolum celebrasse.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Hieronimo Donzellino, Medico ac Phi-

losopho S. P. D.

Respondetur præcedenti Epistola.



Cœpili literas abs te tuas, vt longa: ita doctas, ita officij plenas, qua me mirifice recrearunt. Reconuisti enim in illis pro summa prudentia tua, causas omnes, quibus à dolore animus meus reuocaretur, quibus quidem omnino acquiescere me, acquisitum fuit. Vtremque autem aliquanto quam par fuit, alcubi te, prouexit amor in me tuus. dum recenseres laudes operis mei, quas dum et si meo me me-
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000
 1010
 1020
 1030
 1040
 1050
 1060
 1070
 1080
 1090
 1100
 1110
 1120
 1130
 1140
 1150
 1160
 1170
 1180
 1190
 1200
 1210
 1220
 1230
 1240
 1250
 1260
 1270
 1280
 1290
 1300
 1310
 1320
 1330
 1340
 1350
 1360
 1370
 1380
 1390
 1400
 1410
 1420
 1430
 1440
 1450
 1460
 1470
 1480
 1490
 1500
 1510
 1520
 1530
 1540
 1550
 1560
 1570
 1580
 1590
 1600
 1610
 1620
 1630
 1640
 1650
 1660
 1670
 1680
 1690
 1700
 1710
 1720
 1730
 1740
 1750
 1760
 1770
 1780
 1790
 1800
 1810
 1820
 1830
 1840
 1850
 1860
 1870
 1880
 1890
 1900
 1910
 1920
 1930
 1940
 1950
 1960
 1970
 1980
 1990
 2000
 2010
 2020
 2030
 2040
 2050
 2060
 2070
 2080
 2090
 2100
 2110
 2120
 2130
 2140
 2150
 2160
 2170
 2180
 2190
 2200
 2210
 2220
 2230
 2240
 2250
 2260
 2270
 2280
 2290
 2300
 2310
 2320
 2330
 2340
 2350
 2360
 2370
 2380
 2390
 2400
 2410
 2420
 2430
 2440
 2450
 2460
 2470
 2480
 2490
 2500
 2510
 2520
 2530
 2540
 2550
 2560
 2570
 2580
 2590
 2600
 2610
 2620
 2630
 2640
 2650
 2660
 2670
 2680
 2690
 2700
 2710
 2720
 2730
 2740
 2750
 2760
 2770
 2780
 2790
 2800
 2810
 2820
 2830
 2840
 2850
 2860
 2870
 2880
 2890
 2900
 2910
 2920
 2930
 2940
 2950
 2960
 2970
 2980
 2990
 3000
 3010
 3020
 3030
 3040
 3050
 3060
 3070
 3080
 3090
 3100
 3110
 3120
 3130
 3140
 3150
 3160
 3170
 3180
 3190
 3200
 3210
 3220
 3230
 3240
 3250
 3260
 3270
 3280
 3290
 3300
 3310
 3320
 3330
 3340
 3350
 3360
 3370
 3380
 3390
 3400
 3410
 3420
 3430
 3440
 3450
 3460
 3470
 3480
 3490
 3500
 3510
 3520
 3530
 3540
 3550
 3560
 3570
 3580
 3590
 3600
 3610
 3620
 3630
 3640
 3650
 3660
 3670
 3680
 3690
 3700
 3710
 3720
 3730
 3740
 3750
 3760
 3770
 3780
 3790
 3800
 3810
 3820
 3830
 3840
 3850
 3860
 3870
 3880
 3890
 3900
 3910
 3920
 3930
 3940
 3950
 3960
 3970
 3980
 3990
 4000
 4010
 4020
 4030
 4040
 4050
 4060
 4070
 4080
 4090
 4100
 4110
 4120
 4130
 4140
 4150
 4160
 4170
 4180
 4190
 4200
 4210
 4220
 4230
 4240
 4250
 4260
 4270
 4280
 4290
 4300
 4310
 4320
 4330
 4340
 4350
 4360
 4370
 4380
 4390
 4400
 4410
 4420
 4430
 4440
 4450
 4460
 4470
 4480
 4490
 4500
 4510
 4520
 4530
 4540
 4550
 4560
 4570
 4580
 4590
 4600
 4610
 4620
 4630
 4640
 4650
 4660
 4670
 4680
 4690
 4700
 4710
 4720
 4730
 4740
 4750
 4760
 4770
 4780
 4790
 4800
 4810
 4820
 4830
 4840
 4850
 4860
 4870
 4880
 4890
 4900
 4910
 4920
 4930
 4940
 4950
 4960
 4970
 4980
 4990
 5000
 5010
 5020
 5030
 5040
 5050
 5060
 5070
 5080
 5090
 5100
 5110
 5120
 5130
 5140
 5150
 5160
 5170
 5180
 5190
 5200
 5210
 5220
 5230
 5240
 5250
 5260
 5270
 5280
 5290
 5300
 5310
 5320
 5330
 5340
 5350
 5360
 5370
 5380
 5390
 5400
 5410
 5420
 5430
 5440
 5450
 5460
 5470
 5480
 5490
 5500
 5510
 5520
 5530
 5540
 5550
 5560
 5570
 5580
 5590
 5600
 5610
 5620
 5630
 5640
 5650
 5660
 5670
 5680
 5690
 5700
 5710
 5720
 5730
 5740
 5750
 5760
 5770
 5780
 5790
 5800
 5810
 5820
 5830
 5840
 5850
 5860
 5870
 5880
 5890
 5900
 5910
 5920
 5930
 5940
 5950
 5960
 5970
 5980
 5990
 6000
 6010
 6020
 6030
 6040
 6050
 6060
 6070
 6080
 6090
 6100
 6110
 6120
 6130
 6140
 6150
 6160
 6170
 6180
 6190
 6200
 6210
 6220
 6230
 6240
 6250
 6260
 6270
 6280
 6290
 6300
 6310
 6320
 6330
 6340
 6350
 6360
 6370
 6380
 6390
 6400
 6410
 6420
 6430
 6440
 6450
 6460
 6470
 6480
 6490
 6500
 6510
 6520
 6530
 6540
 6550
 6560
 6570
 6580
 6590
 6600
 6610
 6620
 6630
 6640
 6650
 6660
 6670
 6680
 6690
 6700
 6710
 6720
 6730
 6740
 6750
 6760
 6770
 6780
 6790
 6800
 6810
 6820
 6830
 6840
 6850
 6860
 6870
 6880
 6890
 6900
 6910
 6920
 6930
 6940
 6950
 6960
 6970
 6980
 6990
 7000
 7010
 7020
 7030
 7040
 7050
 7060
 7070
 7080
 7090
 7100
 7110
 7120
 7130
 7140
 7150
 7160
 7170
 7180
 7190
 7200
 7210
 7220
 7230
 7240
 7250
 7260
 7270
 7280
 7290
 7300
 7310
 7320
 7330
 7340
 7350
 7360
 7370
 7380
 7390
 7400
 7410
 7420
 7430
 7440
 7450
 7460
 7470
 7480
 7490
 7500
 7510
 7520
 7530
 7540
 7550
 7560
 7570
 7580
 7590
 7600
 7610
 7620
 7630
 7640
 7650
 7660
 7670
 7680
 7690
 7700
 7710
 7720
 7730
 7740
 7750
 7760
 7770
 7780
 7790
 7800
 7810
 7820
 7830
 7840
 7850
 7860
 7870
 7880
 7890
 7900
 7910
 7920
 7930
 7940
 7950
 7960
 7970
 7980
 7990
 8000
 8010
 8020
 8030
 8040
 8050
 8060
 8070
 8080
 8090
 8100
 8110
 8120
 8130
 8140
 8150
 8160
 8170
 8180
 8190
 8200
 8210
 8220
 8230
 8240
 8250
 8260
 8270
 8280
 8290
 8300
 8310
 8320
 8330
 8340
 8350
 8360
 8370
 8380
 8390
 8400
 8410
 8420
 8430
 8440
 8450
 8460
 8470
 8480
 8490
 8500
 8510
 8520
 8530
 8540
 8550
 8560
 8570
 8580
 8590
 8600
 8610
 8620
 8630
 8640
 8650
 8660
 8670
 8680
 8690
 8700
 8710
 8720
 8730
 8740
 8750
 8760
 8770
 8780
 8790
 8800
 8810
 8820
 8830
 8840
 8850
 8860
 8870
 8880
 8890
 8900
 8910
 8920
 8930
 8940
 8950
 8960
 8970
 8980
 8990
 9000
 9010
 9020
 9030
 9040
 9050
 9060
 9070
 9080
 9090
 9100
 9110
 9120
 9130
 9140
 9150
 9160
 9170
 9180
 9190
 9200
 9210
 9220
 9230
 9240
 9250
 9260
 9270
 9280
 9290
 9300
 9310
 9320
 9330
 9340
 9350
 9360
 9370
 9380
 9390
 9400
 9410
 9420
 9430
 9440
 9450
 9460
 9470
 9480
 9490
 9500
 9510
 9520
 9530
 9540
 9550
 9560
 9570
 9580
 9590
 9600
 9610
 9620
 9630
 9640
 9650
 9660
 9670
 9680
 9690
 9700
 9710
 9720
 9730
 9740
 9750
 9760
 9770
 9780
 9790
 9800
 9810
 9820
 9830
 9840
 9850
 9860
 9870
 9880
 9890
 9900
 9910
 9920
 9930
 9940
 9950
 9960
 9970
 9980
 9990
 10000

IOANNES CRATO MEDICVS,

Petro Andreae Matthiolo

S. P. D.

Probantur Matthioli defensiones, in Cuiusdam diuini, quædam
 vero pluribus afferenda censentur.



Ibil in vita mihi optabilius fuit honorum erga me benevolentia, & iudicio recto de me. Ac vti id in præcipua
 parte felicitatis meae, si qua est solida in rebus humanis, posui, ita ne improborum malevolentia ab hac
 sententia dimoueret, studiose sum adnixus. Idcirco cum non modo humanitatem, eruditionem & prudentiam
 singularem qua vt patet est magnificatio, atq; veneror) litera tua præ se ferant, verum etiam candorem
 & propensionem voluntatis tuae erga me testentur, gratissimas eas habeo, & tibi maximas gratias ago,
 cum tam amanter, tam accurate, tam prolixè scriptas misisti, atque ijs amicitia tua fores benevolentissime patefacisti.
 Ego vero in tua benevolentia, quam virtutis tue publicis commodis dedita & doctrina singularis admiratione expetui,
 libentissime acquiesco, & operam daturus sum diligentem, vt studium & fidem meam pure, sine fuce, more maiorum
 nostrorum tibi ijs officijs, qua à tenentate nostra proficisci possunt, probem. Ceterum cum intelligam te impulsam odii atq;
 malevolentia, à bonitate tua non recessurum, nec propter aprum istum horridos tuos & sat in arbores omnibus sectis pro-
 futuris, deserturum sane tibi hunc animum gratulor, & vt Deus cum tibi conseruet atq; diuturnum validumq; vita spatium ad
 excolenda hæc studia & perpetuum decus tibi conciliandi benigne cõcedat, oro. Vides quid ferat vbiq; furor iudicium, & mi-
 rib. infra petulãtia. Ea vt feramus necesse est. Obsecro velles tua ijs probari: qui nãq; quod latidabile, neq; quid piti aut ho-
 nestum, vel saltem cum humanitate committit, vident? Nam si nihil nisi omnino numero absolutum tam rãpaz orar areu. & q;
 probandũ est, quã reperies ut in rebus humanis, quod possit probari? Quam securitate de ab orũ censura insectatores. Ut, si
 sua prostrant, sibi poterint polliceri exhibere iste, si potest, integros in Dioscoridi Cõmentariis, et aliorũ iudicia subeat.

In Guilandini
acerbitatem, &
malevolentiam.

Nam reprehendere quam docere, esse facilius de veteri sententia notum est. Certe nihil de amori, nec (à quomatma. atq. institutione absum) auribus. Praclara atque laudabilia exierunt in hoc genere opera, sed tuum (si quid iudicare possum) mihi quidem ἰὼν ἐπὶ τοῖς ὄντων βέλτιον videtur. Neque propter hanc animi mei inductionem Guilandino bellum induo, aut in vituperationem adduco. Acerbitatem odij & malevolentia toto pectore auersor, & doleo eum ingenium minime obtusum, cognitionem literarum haud paruum, studium acquisitionis non plane iners, ad obrectationes, criminationes, insectationes & calumnias conferre. Ineptum esse fateor ἀβασανίστος quiduis credere. Nec quisquam Iustitiae & moderationis laudem expetens, tam duras leges seruis praescripsit, ut quae displiceant, probent. Sed illud profecto iniuriam, & temeritatis atque peruersitatis plenum est, omnem occasionem ledendi querere, impetum in bene merentes facere, ea quae recte cogitata firmaeque sunt, malevolentia conuellere, & ex suo ingenio omnium voluntates aestimare. Nimis enim inconsulte hoc fingit Theon te displicere omnibus. Guilandino cum non placeas. Nimis inconsiderate pronunciat de malitio, Folium ac Malabathrum discernis? Annon manifesta est calumnia de Castia in Cinamomum transeunte concertatio? De Viburno aculeata magis, quam firma obiectio, & Nemesianum propugnaculum minime tutum. In Cnereo male cadit nimia illius iactantia. Effert autem se immodice βομολοχία agrestis, de Beta syluestri. Sabinam bacciferam hic si fuisse ei in horto quodam Cuius nostri grandem admodum ante paucos annos monstrare potuissem, & etiam nunc stare puto. Quid obsecro est occidit malevolentia, si hoc non est, cum non maiori, sed minori Cedro te baccas tribuere vider? De Consilijque quando verbis auctorum male intellectis odioso pugnat, eaque veteratorie producit. quid aliud quam insulas cauillationes & suam in arte Medica infertiam prodit? Ad Solanum, si inderimiffet, factum ab eo esset probe Piper & Cubeba eum satis excitant. Vtramque autem excuteret intelligentiam suam, cum Galeno tantam tribuit oscitantiam, & Mariatque Amaratque manifestum discrimen tuum ex Galeni sententia ante temerariam scriptionem considerasset, atque ad censuram, de Santalis, Fabaria & Telephio rectius ex veritatis studio excitatum iudicium attulisset. Sed de his satis. Cum autem optime mi Matthioli, nihil tam prauum, atque ineptum sit, quod non suos admiratores & approbatores reperiat, cumque de multorum sermonibus mihi certo constet, Guilandinum suum heatrum in Italia habere, & quosdam δεικνύει ἀλλ' ἢ εἶναι φίλους rectissimum est, vel ἐν τῷ ἵππυράζειν φιλοποιεῖν καὶ ἰδία πείθειν, dum illi inuidia malevolentia, morsuque doloris lacerari conficiantur, vel si quid publica utilitatis studio suscipimus, nostra cum aliorum malis non misceamus. & quantum in nobis est, maledicentiam fugere studeamus. Est autem secundum Plautum, atque non est in manu nobis, quin dicant non est, merito ut ne dicant, id est, Haec ego scribo, non quod tua doctrina excellentiam in ambivum vocem, aut prudentia dissidam. Verum ne dum tuam innocentiam mihi atque alijs probare cupis, in dicta malevolentia incurras Nam si hanc tuam Epistolam (id quod de scriptionis diligentia existimo, nec quod minus id fiat obsto) ederes, vereor ne dicturi quidam essent, te in reliquis ad qua non respondes, manus dare, quadam etiam minus attentè (id quod in ista conuictorum & criminationum impuritate & scditate, à quo omnes bonorum sensu abhorrent, minime mirum est) considerasse. De Malabathro afferre possent, Plinij auctoritatem, non satis munitam esse boni testimonij. Ad illud Castiam & Cinamomum vnius planta corticem nihil responsum. De Bolo Armenica, quod non ex Lemno afferatur, nihil allatum. Zedoaria autem pro Costo ita alitè in multorum animis radices egit; ut vix extirpari posse videatur. Mihi quidem à te euulsa est radicitus. Conquerentur de Saliunca, de Dictamno albo non satis factum. Illud uon animaduersum, quod contendit in Cap. de Trago apud Dioscoridem legendum maiora, non minora. Lachrimas, quas producis, abstergere conabuntur. In Limonio autem iniuriam fieri clamabunt Guilandino, cum ille contendat plantam, quam pingis (officinis Benrubrum appellatam) non esse Limonium. Tu verò existimare videaris, illum statueri non esse verum Ben Mauritiorum. Amellum Vergilij plantam quam ostendis esse concedent, quod sit Aster Atticus Dioscoridis, pugnabunt. Haec et si scio cogitationis tuae comprehensionem non effugere, tamen ut probarem tibi amicissimum studium meum, nonerere, quod est amici, volui, neque dubito ac potius certo scio, te in optimam partem accepturum, praesertim cum intelligas me, non alia voluntate, quam tuum laudabile propositum consolandi confirmandiq. ista scripsisse. Quod autem & ad fidem in ista amicitia nostra attinet, ita tibi eam prestabo, ut inter multos tui amantes, amantissimam Cratone, vix sis habiturus. Vale. Vvratijlawia.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS,
Iulius, Ioanni Cratoni Medico
S. P. D.

Comprobantur quae Cratoni non satis firma videbantur,
contra Guilandini calumnias.



Micitia recentis, quae mihi tecum contracta est, iam fructus vberissimos capio ex literis illis, quas superioribus diebus ad me dedisti. Plena enim sunt non tantum amoris in me tui, sed & officiorum eiusmodi quae alere & conseruare animorum coniunctionem in primis solent & possunt. Atque ut de ceteris non dicam, monita tua, quibus exasperatum me aduersarij importunitate ad lenitatem reducere conaris, quanti me facere oportuit? Nimirum sic decet candidum animum, quibus bene velis, eos ut non collaudes tantum, ubi quid rectè factum est, sed reprehendas lapsos, imminente autem periculo etiam moneas meliorum. Obtemperabo autem tibi, mi Crato, & moderabor animo meo. Si me tamen doloris acerbitas erumpere in gemitum coegerit, id te commodè interpretaturum, haud diffido. Graue est à vipera morderi, sed infinitis partibus Theonini dentis morsus molestior. Dij prohibeant, ne eum tu vnquam experiaris. Adde quod idem curationem perfectam nunquam recipit, ut ut purges, ut ut antidotis pugnes, serpit veneni virus, & licet omnia ad tollendum malum adhibeas, semper tamen aiquid haeret. Non erat, ille aper, ut putabaris, qui vastasset hortulos meos: stant quidem incolumes, & immortales. Dijs volentibus, labores mei cincti sepibus veritatis, vastari nequeunt. Me, me, non illos, dum planto, runcio, trigo, summaque fide excolo viridarum meum, Theon iste ex apidum genere venenosissimus, enutritus herbarum mearum succo (qua mirum, ut illi in venenum venerant) inopinantem laesit. An non iustus tibi videtur dolor meus, sic demorsi praeter omne meritum meum? Nihilominus te hortatore, in posterum si non compefciam, saltem tegam & assequam.

de simulo eum, quantum in me est. Sed enim veniam merebor interire, si quemadmodum Possidonius Stoicus, cum omnino non dolere statuisset, exclamavit iansen: O dolor, nihil facio. sic & ego nonnunquam humanum quid passus quiritem, praesertim apud amicum, qualem te esse iudico. Atque hactenus impetrasti a me, quod maxime volebas, ut deinceps in scriptis meis tibi temperem.

Nunc ad eam partem tuae epistolae venio, qua requiri aliquid ais ad ea, qua Guilandini objectionibus respondi. Nam ut singula ea excutiam, qua Theon parum cognita mihi fuisse recenset, id sane integrum operis fuerit non Epistola. Hic tantum mihi fuit scopus cum ad te scriberem, ut ex paucis ostenderem, qualia reliqua essent illius. Nec propterea dedi manus, quod eo in loco hostem penitus conficere non volui, eum alio tempore, Deo volente, tractaturus.

10 Sed qua deesse putasti meis literis, ea sic habent. De Plinii auctoritate in Malabathro non satis munita, miror eorum, quos ais, iniquitatem, ne dicam impudentiam, qui ut graui auctori detrahant fidem, nulla alia causa inducuntur, quam ut sibi, illo spreto & reiecto, fides habeatur. Agnosce autem ipse id minime decere homines, qui docere se posse alios profitentur. Confutare Guilandini opinionem, quod Galeno auctore, dixerit, Cassiam & Cinamomum unius esse plantae corticem, non videbatur necessarium. Quam enim contra eum iam probauerim, Cassiam in Cinamomum transire, non autem e contra, ut ille tam temere mentiri non erubescit, sane tibi & ceteris perspectum futurum, videbatur, intellexisse Galenum, cum haec dicit, de Cinamomo & Cassia corticibus tantum, qui ex Cassia plantae eximebantur, quarum surculi extremi in Cinamomum quandoque transibant. Namque uniuersalis haec propositio esse non potest, absque manifesta Galeni contradictione, qui Cinamomi arbutulam a Cassia planta diuersam facit.

Plinii auctoritas defenditur.

Cassiam & Cinamomum in uno esse unius plantae corticem contra Guilandinum.

20 Armenium bolum cum sciam ego, Constantinopoli ad nos aduehi, & illuc apportari ex Lemno (sita in Veneti negotiatores mihi vera narrarunt) nihilque deesse illi, quod Lemnia terra non conueniat, putabam hoc sane haud te latere, nec ideo esse opera pretium, ut cum Guilandini fabulis contenderem. Mendaciam enim fides nulla est. Conquerantur in Salinca quantum velint Guilandinici Theatri applausores. Mihi enim longe magis Plinio, quam Marcello ad stipulandum est: quippe qui post Plinium, Dioscoridem, & Galenum vixerit, ut ipsemet faceret, nec ullam habuerit medicamentorum peritiam. Satis autem superque mihi probatum existimo ab auctoritate, a viribus, a natali solo, Salinca & Celticam Nardum, diuersas esse plantas, nec uno tantum Marcello, ut Guilandinus, meas comparavi probationes. Manebo itaque in sententia, nec inde me tantillum demouebo, ni mihi clariora in contrarium afferantur.

Bolus Armenius orientalis videretur.

Marcellus Veneta est nomen. Citatam in seculis peritiam saluocum & Celticam Nardum eadem plantam.

Disceptationem hanc excitauit, (ut doctissimus Marcellus inquit) una tantum Dioscoridi addita vox, 30 qua nec una nec eadem in antiquis Graecis exemplaribus est. Sed in aliquibus, Σαλίονα in aliquibus Αλιόνα in quibusdam Αλιόνια & in nonnullis duplicato λ, Αλλιόνια legitur. Ex qua multiplici lectione facile quisquam conicere potest, hic, ut in quam plurimis aliis locis animaduertimus, Dioscoridi subesse mendam. Ad ea autem, qua in albo dictamno vocato, obicere posse eos contra meam sententiam putas, nempe legendum non esse, μινεῖ τε α sed μακρῖ τε α, respondebit pro me Oribasius, qui ex Dioscoride transcribens μινεῖ τε α non μακρῖ τε α legit, quemadmodum legerunt omnes quotquot sunt Dioscoridis interpretes, Hermolauus, Marcellus, Ruellius, Cornarius. Quorum nullus extat, qui hac de lectione dubitauerit.

Guilandinus Plinium sequutus, cuius fidem infirmare eius felicitates, paulo ante dudimus, ut aliquid non in disputationem afferre videretur, μακρῖ τε α legendum somnians, quod is scribat, Tragium non ientisco, sed Terebintho esse simile, cuius folia cum longe Lentiscinis sint grandiora, certat Guilandinus, μακρῖ τε α 40 ea legendum esse. Sed quam feliciter Plinii sententiam in suam uerterit, manifeste testatur ipsius Plinii in describenda Tragii facie inconstantia. Quippe in libro decimo tertio, capite vigesimo primo, Tragium Terebintho simile facit. Mox volumine vigesimo sexto, capite ultimo, Junipero simile esse scribit, magno in utroque loco errore, de quo apertissime testantur Dioscorides, Galenus & Oribasius. Qui quidem omnes cum 50 praeter hac una cum Plinio affirmant, in Creta tantum insula nasci Tragium, e suo illo asino cadit Guilandinus cum quo radices Romam afferre solebat, quod ubique locorum suum nascatur Tragium.

Grati in Tragio censura explosa.

Plinii in describendo Tragio inconstantia.

Tragium nasci tantum in Creta.

At si (ut inquit) lachrymas e Tragio manantes abstergere conabuntur aduersarii, eadem opera Eibipigi nigredinem abstergant, & Nili alneo aquas. Certe Dioscorides, Galenus, Oribasius, Plinius, Tragii lachryma apertissime meminere, quorum abstergere scripta, nulla unquam Guilandinica poterit spongia. In Limonio fateor errorem, sed non mireris, ni Crato, non enim poteram nasum a tam fetida latrigia, quam o- 50 let Guilandini Theon auertere, quo minus etiam oculos retorquerem, quo postea factum est, ut legendum sim hallucinatus. Credam tamen eam plantam, legitimum esse Limonium, quousque aliam afferant contentiosi illi, qua euidentioribus notis a mea me amoneat opinione.

Limonium.

De Attico Astore nihil respondebo, ni prius Amellum illud non esse uerioribus comprobent argumentis. His auditis, quid in hoc etiam prestare valeam, illico intelligens: ni fortasse Ruellii minus probandam uer- 60 sionem, quam ipsius Dioscoridis uerba complecti statuerint. Hac erant, qua ego praeteritis multis Guilandini calumniis consulto respondenda putavi, & quidem paucis. Idque ea de causa, ut tu uir aliqui doctissimus ex paucis his, conuictoris illius infidelitatem temeritatemque cognosceres. Sapientes omnia docere uelle quenquam uani prorsus hominis consilium esse censeo. Ignaris itaque caetera referuabo, ubi respicere ceperint, aperienda facileque ostendam sophistica esse omnia. Pertinacibus autem perpetuo tacebo. Bibant illi quos 60 tuentur errores, quasi maternus lac, ut prauum hoc ingenii alimentum, tanquam in organa indiociorum transmutatum, nunquam postea deponere possint. Vale mihi dulcissime

Aster Atticus.

Crato, & eo, quo capisti, me semper amore prosequere.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Stephano Lauro Medico Cæsareo,

S. P. D.

Exploditur Lacuna consilium de propinando infantibus Armenio lapide
de scrupuli pondere.

Andreas à Lacuna
Dioscoridem
in Hispanicâ lin-
guam vertit.



Argentum vitû
contra vermes.

Armenii lapidis
deiectionis vis
qualis.

Lacunæ opinio
improbata.

Armenium Lapi-
dem pueris po-
tandum exhibet
Aetius.

Armenius Lapis
qua quantitate
sumendus.

Mellicamentum
ad pectoram E-
pilepsiam & spi-
randi difficulta-
tem.

Argentum vitum
secrete dari posse
potandû ad ne-
cândos interane-
orum vermes.
De Fragmela
hoc est aditum.
Argentum vitum
dum non sine au-
xilio magis actu
est. Sic enim
Argentum vitum
la uatus.

Um hoc anno in patriam iturus hac iter faceres, offerebas mihi Dioscoridem ab Andrea à Lacuna, 10
vire in Græcis, & Latinis literis versatissimo in Hispanicam linguam conuersum, & annotationi-
bus etiam illustratum, sed inter cetera cum legeres in lapide Armenio eius annotationes, mirabaris
sane plurimum, quod scriberet Armenium lapidem scrupuli pondere propinatum ex minoru Cen-
taurii decocto, ad puerorum epilepsiam, admirabile esse auxilium. Cum itaq; iudicares Lacunam hominem,
ut doctissimum, ita in curandis egris esse exercitissimum, (quanquam, hoc tibi vehementissimum videba-
tur medicamentum,) hominis tamen experientia, & doctrina persuasus, videbaris eius sententiam non omnino
improbare. Nam cum tibi antea compertum esset, & in Italia, & in Hispania haberi non obscura fama me-
dicos, qui ad vermes interaneorum necandos tuto, certog, auxilio pueris argentum vitum potandum exhibe-
rent, quod tamen inter lethalia medicamenta recensent antiqui, putabas non esse mirandum, si præter medicâ
ratione, & tui ipsius opinionem tam feliciter in lactentibus pueris epilepsia vexatis, Armenio lapide uteretur 20
Lacuna. Hæc dum mecum conferres, petebas, ut de re hac meam tibi exponerem sententiam. Atqui tametsi tua
faciende petitioni promptissimus esset animus, cum tamen tunc itineri maturando omni celeritate te acci-
geres, ego vero antea negotiis occupatissimus essem pollicebar me tibi per epistolas satisfacturum, quam primû
in Cæsaris aula: edissem. Nunc autem quum primum intelligam superioribus diebus, illuc te sospitem adue-
nisse, ne pollicitationis meae me immemorem esse censes committere sane non potui, quin illico sententiam me-
am, de re hac ad te scriberem. Si vero quid sentiam ingenue fateri debeam, nulla sese offert ratio, qua Lacuna
sententiam comprobare possim. Quippe experimento sine ratione facto, non video, cur ita facile mihi subscri-
bendum sit, præsertim ubi hoc ius fiat medicamentis, quorum cum occulta facultates, tum etiam manifesta, no-
tissima sunt omnibus. Scio ego non solum Tralliani consilio edoctus, sed præsertim in curandis egris experien-
tia, Armenium Lapidem ex eo haberi medicamentorum genere, qua electio per vomitum, & per aluum, 30
purgant, nec quamuis diligenter lotum propinari posse etiam robustissimis vitis, quo minus perturbet, & vio-
lentas moueat vomitiones, & alui deiectiones, scrupuli vel semi drachma pondere haustum. Id quod manifeste
fatetur Mesues: quippe qui scribat Armenium lapidem nocere stomacho, quin etiam cum subuersione, & an-
gore purgare, quo fit ut temerarium admodum esse censeam Lacuna iudicium, quod lactentibus infantibus
Lapidis Armenii scrupulum propinare audeat, addito etiam Centaurii minoris decocto, amarissimo sane re-
medio, & propterea abominabili pueris. Itaque credas in posterum velim, quem admodum mihi etiam per-
suadeo, hoc medicamento scrupuli pondere haudquaquam usum esse Lacunam, sed incircumspecte id ex A-
etio transcripsisse, qui libro secundo, capite quadagesimo septimo, ex Nichessoni auctoritate, sic de Armenio
Lapide scriptum reliquit, Armenium quoque piores utuntur, duodecima drachma parte melancholicis & san-
guinem crassum habentibus datur. Datur & pueris pectoris morbo infestatis. Reuomunt enim, cum vomitu- 40
rium existat. Datur & morbo sacro obnoxio, ac furiosis hoc modo. Centaurii fasciculos manipulares tres in a-
qua marina heminis tribus coquito, donec una supersit, & cum excolito decocto Armuthei lapidis, quæ Græci
Armenium vocant, tertiam drachma partem terito, ac confidenter exhibeto, nihil enim periculi est. Hæc
Aetius ex Nichessone posteritatis memoria commendauit. Quibus tibi facile palam fiet, non solum parû ad-
modum sibi constitisse Lacunam, dum hæc in suas transferebat annotationes, sed nullam, vel exiguam medi-
camentorum habuisse peritiam. Addam etiam (pace docti viri dixerim) quod negligenter satis Aetii verba
experderit. Si quidem cum is in uniuersum melancholicis & sanguinem crassum habentibus, duodecimâ drach-
ma partem tantum exhibeat, miror sane, cur scrupulum infantibus lactentibus, ex centaury decocto dare au-
deat Lacuna, cum id tantum furiosis, maniacis, & sacro morbo vexatis dari precipiat Aetius. Atqui infan-
tes nec maniaci, nec melancholici, nec furiosi fiunt, quo fit, ut de his haudquaquam intellexerit ille, sed de vi- 50
ris iam atate adultiore iisque robustis. Probo quidem ego Nichessoni medicamentum, sed Lacuna consilium
modis omnibus reprobô. Ideoque unius vel alterius grani pondere id infantibus dari posse crediderim, cum E-
pilepsia, tum spirandi difficultate affectis admirabili sane inuamento, rhodomelito, oxymeliteue, vel pisanæ
exceptum. Nam cum illud reuomant sumentes, (ut Nichesson ille inquit) nihil penitus periculi affert et potest.
Nam scrupulo quatuor sexue posse iugulari infantes, ego sane non ambigo. Utinam ad Lacunam perueniret
hæc nostra epistola, antea quam unquam alicui infanti suum hoc propinet medicamentum. Utinam eo is fuis-
set iudicio, dum hæc describeret, quo in propinando infantibus argento vituo fuisse illum animaduerto. Quod
quidem meo iudicio securius dari potest sesamini seminis quantitate, vel etiam coriandri in adultioribus, quâ
Armenium scrupuli pondere, Siquidem cum nulla alia lethifera facultate (ut Dioscorides inquit) interimat,
quum quod suo ingenti pondere intestina laceret, nihil sane verendum videtur, minimam eius quantitatem. 60
id dari posse unquam, præsertim cum sua grauedine, ac Sphærica forma, facile è corpore per inferiora labi-
tur. Idcirco mirari non debemus, si Brasauolus tam clarus atatis nostra medicus, ad necandos interaneorum
vermes dari pueris argentum vitum nullo incommodo scriptum reliquit, & eo tam feliciter usus sit alter qui-
dam Clarissimus Medicus Patavinus, quanquam præsertim dandi, dandique rationem neminem unquam docere
voluit. At qui ego, etsi hoc medicamento nunquam sum usus, vidi tamen dari saepe illud scrupuli, vel sesqui-
drachma pondere, a Goritiensibus obstetricibus agre parturientibus mulieribus, nullo prorsus incommodo, sed
sæpius semper euentu. Datur vitum non extinctum, ut quidam putant. Quod enim extinctum est, ventri-
culi habet, & intestinis & senua excitat symptomata. Lauandum tamen prius ex acerrimo aceto cum sale misto,
mox tenui corio excipendum, manibus, quæ tam diu prehendendum, quousque per corii meatus excidat. Sic enim pur-
gant.

... et volunt. Hic habes, mi doctissime Stephane, meam de Lacuna medicamento sententiam, quã non te probes sed et iudices ad te mitto. Magnificatio enim iudicium tuum, & ingenii tui acumen, quibus hæc omnia me longe magis te enucleaturum non ambigo. Vale. Praga.

PETRO ANDREÆ MATTHIOLO
Senensi, Medico clarissimo, Bartholomæus
Maranta Venusinus Medicus,
S. P. D.

Excusatoria est Epistola, de quibusdam contra Mat-
thiololum editis.



Vm ad te librum meum, quem de ratione cognoscendorum simplicium conscripsi, paucis ante mensibus miserim, nec literarum aliquid abs te acceperim, sane id mihi perquam molestum fuit, quod expectatissimis tuis literis frui non licuit: quibus ego aliquam meorum laborum, ac laudis (si qua erat) gratulationem tui expectabam, quæ quanto incundior ac gratior futura eras, tanto gravior, ac molestius fero, quo illa primor. Et cum hoc ipsum cum amicis dolerem, extiteret, qui non solum suspicarentur, sed qui certo se quasi diuinasse crederent, factum id a te esse, non tam quod operosis negotiis, quæ ipse accusabam, distrahereris, quam quod alieno a me animo esses, eiusque re: causam fuisse mentis ipsum, quod ad te misi, opusculum, affirmant. Atiebant enim te, si librum ipsum uniuersum, ut credere par est, percurreris, omnino eius lectione fuisse commotum, quod quadã de te in eo minus modeste aus honorifice, quam vel maxime tui nominis authoritas, vel singularis tuus in me amor exposcat, sint perscripta, eaque sine stomacho legi a te non potuisse. Quamobrem ingrati animi crimen, hac in re non effugisse me affirmabant, non esse nisi claudicantis amicitia iudicia adiungentes, ab eius opinione velle discedere, qui me non solum magno amore sit prosequutus, sed summus etiam laudibus ornauerit. Illudque crimen eo grauius esse & videri, quod ea, quibus a te discrepo, nullum seruans modum, aut modestiam, sed potius proterue, ac petulantèr prosecutus sim: ut videar voluisse, dum multam mihi laudem ancipari studeo, tuo splendore, ac gloria quodammodo tenebras offundere. Nam quemadmodum non est vllum certius amicitia vinculum, quam consensus & societas consiliorum & voluntatum, ita simul, atque sibi, vel gloriam, vel utilitatem, vel aliquid aliud, quam alteri quisquam maluerit, ipsam nullam fieri, ac funditus eueriti, asserunt. His quidem ego non mediocriter perturbatus sum, nam cum mihi nihil unquam maiori cura fuerit, quam ut primum ab te ipso, deinde à cæteris omnibus, quam gratissimus erga te esse cognosceret, & cum nihil, quantum in me fuit, prætermiserim, ut dignitatem atque existimationem tuam (quæ semper apud me maximi ponderis fuit) & vererem, & summis etiam laudibus efferrem, non potui non summo affici dolore, quod sint nonnulli, qui me in senso a te, atque inimico animo, esse suspicentur & asserunt. Ac tametsi graue est vere accusari in amicitia, longe tamè grauius, im- per duxi falso accusari. Cumque mihi ipsi conscius sim, nihil à me unquam excogitatum esse, nedum commissum contra dignitatem, atque amplitudinem tuam, illorum, qui me accusant, reprehensione non usque adeo commo- tus essem, nisi inter cæteros, Ioannes Antonius Pisanus Medicus, vir summi iudicis, maximeque in hac nostra urbe autoritatis, idem admonuisset. Nam is, cum & mei amatissimus sit, & tuorum scriptorum studiosissimus, etsi in cæteris omnibus, in hac tamen potissimum re, audiendum mihi fuit. Cognoui enim illum non ideo hac dicere, quod vellet me temeritate, atque impudentia nota aspergere, tametsi non ignorem, illum pro honore atque dignitate tua, maleuolorum obreclationes & inuidias, si quando opus fuit, prostrauisse, sibique perpetuam pro te propugnationem suscepisse. Sed cum te non mediocriter obseruet, me autem plurimum diligit, putauit suas esse partes, me de eare commonefacere, quæ (nisi prorsus prius sit) immutare te mihi facile posset, quod ipsi (quæ sua est erga utrumque nostrum beneuolentia) tam esset molestum, quam quod molestissimum. Itaque ostensis ab ipso mihi locis, quæ id quodammodo apertius præ se ferre videntur, cæpi mea illi mentis, ac consilii rationem reddere, atque quid me ita vel scribere, vel sentire impulserit, manifestare, tandemque effeci, ut illum a priore sententia deducerem, atque una mecum affirmare hominem coegerim, nihil in eo opusculo a me contra existimationem tuam scriptum esse, quod vir aliquis probus redarguat, si modo sententia, ac res ipsæ, non verba, ac litera asseruntur. Verum consuluit, ut eare ad te scriberem, meque tibi totum patefacerem. Non enim verebatur, ut si qua tibi ab alienati mei in te animi suspicio incidisset, futurum, ut eam protinus abicerem. Illisque etiam omnibus satisfactum iri, qui id ipsum quoquo modo sibi persuasissent. Obtemperauit igitur Pisano, atque hæc ad te iue- ras exarare volui, quibus cognoscas, nunquam mihi, tui aut colendi, aut obseruandi voluntatem defuisse. Ac video quidem duo præcipue esse, in quibus meam erga te, vel fidem, vel amorem eo in opere illi desiderans. Pri- mum quidem quod à te multis in rebus dissentire voluerim: Deinde quod in nonnullis acerbius asperiusque, quã amici officium exigere videatur, a te discrepauerim. Quæ duo, cum, ut spero, diluero & illi, & tibi, si oportu- erit, etiam planius ostendam, me nihil adeo unquam horruisse, quam ingrati animi crimen. Atque ad primum ne respondere quidem deberem, cum cuius notissimum sit, non propterea violari frangio, leges amicitia, quod ab amici sententia quandoque, declinemus. Id enim, ut a te peti minime solitum esse, certo scio, ita si a quopiam pe- tatur, neque ei concedere verus, ac minime blãdius amicus debet. Quid enim turpius esse potest, quam cum ami- co in us rebus velle consentire, quas aliter esse quispiam sentiat, ac iudicet? aut quæ maior pestis in amicitia esse potest, quam adulatio? blanditiæ, assentatio? Si quid igitur in eo opusculo, à me scriptum est, quod cum his, quæ à te scriptis tradita sunt, non ex omni parte consentiat, feci id quidem, non quod odio quodam, ac similitate a te dissidere vellem, nec ut ex huiusmodi contentionibus aliquam mihi inanem gloriam, laudemque, compararem, sed ut fidelis bonique scriptoris munere fungerer, cuius est veritatem, quam putat apertam, ingenue, ac libere ex- ponere, nihil fictum, nihil inultum proponere, sed in sola veri inquisitione, atque inuestigatione, ita laborare,

non inquam aduersarium aliquem convincere sed veritatem ipsam, quae in primis est hominis propria, idcirco iustus est. Ex quo non a te solū, sed a multis aliis praclarissimis viris dissentire mihi licere arbitratus sum, non modo quod ex peris. Et a veritate emanare solet, invidere hominibus, viderer. Quis enim esse posset melius mortalibus, si dum amicis eblādiō, id cōlem, quod praecipue ab illis expetitur? Quae etiam meo consilio sic a tantum scripsero, quae vel a te, vel ab aliis maximi nominis viris prius diligenter atque diligentius sunt demandata? Nisi forte eam provinciam, ideo mihi suscipiendam putassem, quod tua alioquin a meo testimonio confirmata, libentius lectum iri ab hominibus mihi ipsi persuasissimū. Sed unde benevolentia genus? Unde haec tam inusitata beneficentia? unde adeo inauditum officium, ac si non ideo ad te, vir praclarissime, scribo, quod putem displicuisse tibi, me a te in nonnullis rebus obrectatorum nugis iter intercludam. Noui enim te veritatis amantiſſimum, cupidissimūq; ab honestis laboribus non solum, non inuideas, sed libenter eos etiam complectaris: Et si quid in illis reperas, quod tu non prius excogitaueris, aut inueneris, id ipsum non asperneris. Vt qui Et scias Et confitear, quod tua scientia posse in dies nova excogitari, idq; et si in omnibus, praecipue tamen in simplicium medicamentorum indagacione exenire, quod tu in eruditissimis tuis in Dioscoridem commentariis ostendisti. Cum aliorum operam in tuis laboribus locupletandis non solum sponte oblatam non recusaueris, sed etiam libenti animo expetueris, quod Et in tuo opere suis locis ingenue aperiteq; confiteris, cum nulla in re, ne minima quidem, defraudare aliquem suo labore volueris. Quin potius in aliquo celebrando, atq; in referenda gratia, prolixiorem, atq; liberaliorem, quam exiguitas officii postulare, te prabuiſti. Cuius quidem rei, vel ipse testis sum, quippe cui longe plus tribueris, quam res Et veritas ipsa concedat. Nec enim tu mihi gratiam modo habuisti, sed cumulatissime etiam retulisti, ut nisi pari studio erga te sim, Et voluntate, non solum ingratum, sed etiam impium ipse me existimem. Verum quanti te faciam, semperq; secerim, non dubito, quin ex Luca Ghino primum, dum inter mortales agebat, deinde ex multis aliis utriusque nostrum necessariis, acceperis. Puto igitur tibi exploratū esse, persuasumque habere, meum studium semper extitisse colendi tui atque obseruandi, teq; existimare, nihil esse tam laboriosum, aut difficile, quod non pro te mihi susceptum, incundum sit futurum. Hac inquam, in te mecum semper extiterit voluntas, id ipsumq; tibi persuasissimum fuisse crediderim, induci ad credendū nullo pacto possum, ac re cogitatione quidem complecti, tuam in me benevolentiam, iam leui causa refraxisse quare nihil etiam est, quod aliorum suspiciones extimescam. Verum quia (vti dicebam) ubique reperiri solet quadam pestes hominum, qui nihil a te student, atque concordiam inter coniunctissimos disjungere, ne quid eiusmodi inter nos accidat, haud alienum esse existimaui, amici mei consiliis morem gerere, ut prius de huiusmodi ad te scriberem meumque erga te animum simplicem, atque promptum aperirem, quam de me perfidia male uolentium tale aliquid garrat, constitutam quod inter nos concordiam distrahere possit. Sed vt ad secundam accedam quod multum momenti habere videtur, duo potissimum loca mihi ostendit Pisanus, (nam vix tertium reperiat aliquis, de quo aliqua ratio habenda sit) qua cum peruerse aliquo modo, quis interpretari possit, ignarus mea erga te voluntatis, peruersi animi calumniam non effugere fortasse existimabit. Sed ea cum exposuero, mea que sententia rationem reddidero, non dubito fore, vt quemadmodum Pisanus ipse, vir optimus atque in egerimus, ita Et quibus non iniquus rerum astimator, boni consulat. Atque illud mihi primum occurrit, quod de aspera Lonchiti primo libro nostra Methodi scripsi, ubi haec leguntur verba. Hanc in doctissimis suis commentariis non depinxit Andreas Matthiolus, sed aliam, quam nescio, quo pacto a Luca Ghino pro Lonchitide ad se missam falso asserit. Hac nos. Qui verba haec ita nude, ac simpliciter, vt sonare videntur, consideret, existimabit te a me, vt mendacem vanumque scriptorem notari. At qui rem ipsum, nostramque mentem potius aestimet, longe aliter rem se habere comprehendet. Nam hac vis verborum, non tam te redarguit Et refellit, quam meam admirationem manifestat. Admirabar sane a te aliquid cuiquam tribui, quod scire nulli minime sensisse, non autem assereram, te minime vera docere. Cur enim in tam paucis verbis adeo inconstans essem, vt quem mendacis couergerem, eundem doctissimum appellarem? Unde mihi per Deos immortales tecū adeo familiaris inimicitia, vt quasi venenum in mellito poculo tibi offerre expiam? An vero mendacis notari dixerimus aliquem, cum dubios nos esse asserimus, cur ita scripseris? An haec verba (Nescio quo pacto) non ita corrigunt attributam tibi falsitatem, vt nihil minus quam falsum te esse significant? An tandem putas me tam ineptum, vt inuolentiores contradicendi, calumniandi que modos excogitare non potuissem? utque nulla in breuius verbis contradictione commissa, aliquem Et falsum, Et mendacem reprehendere valerem? Sed vt rem omnem a principio exponam, scito plantas omnes, quae a te Pisis Lucas Ghinus anno ab hinc nono misit, mihi prius ab eo fuisse ostensas, inscriptionesque, quas singulis plantis apposerat, non solum vidisse me, sed etiam descripsisse. Erant enim in illis inscriptionibus eius opinionum rationes, quas maxima utilitati mihi, iam tum simplicium cognitionem magnopere expetenti, futurae esse (vt certe quidem fuere) existimaui, easq; apud me vel nunc seruo. Inter eas vero erat Lonchitis altera, qua hunc ad verbum habebat titulum adnexum. Hanc esse Lonch. asperam alique sentiunt: Ego vero potius filicis genus, nam asperam Lonchitidem veriore agnosco, habentem. Tu eandem depingis, faterisque, te illam vidisse studio, ac liberalitate Luca Ghini, qui eam Pisis ad te misit. Ac tamen si non explices, pro Lonchiti aspera ab eo, ad te missam esse, id tamen non rudis lector ex verbis tuis facile colligat. Quam enim liberalitatem in Luca agnosceres si hanc de Lonchiti opinionem ei acceptam non referres? Cum igitur inscriptio illam non Lonchitidem, sed filicis genus appellet, Et videam non aliam sed eandem a te pro Lonchiti vera efformari, non potui non in summam admirationem adduci, quod quasi imprudens, nolensque a Luca Ghini mente aberraueris. Sed te cum virum ingenuum candidiq; animi cognoscerem, non malitiose, aut ex fraude, sed rationabili aliqua persuasione inductum in hunc errorem incidisse, credendum existimaui. Quae ratio cum esset mihi minus comperta, vt veram Luca sententiam, vtque veritatem ipsam, quam putabam, aperirem, dixi a te minus vere, nescio tamen quo casu, Ghino illam tribui de Lonchiti sententiam. Nam cum ego aliam pro Lonchiti vera ostendero in eo apud poculo vellem, idque inuentum Luca Ghino (a quo primum eius rei sum admonitus) acceptum referre in animo esset, nisi ita de ea scripserim, Et Lucam Et te, Et me ipsum etiam inconstantem, variumq; reddidissim.

Lucam quidem, quod ei diuersam ab ea, quam illi se ascribit, opinionem tribuissim. Utunque vero nostrum, quia cum ea in re inter nos non constarem, data esset lectori causa, vt alterum nostrum

Lonchitis aspera.

Plantae à Ghino missae Matthiolo.

- mendacii congereret. Quare, ut ex tot angustiis emergerem, exponendum mihi erat, cur à te dissensissem. Quamquam ad sententiam cum non tam circa rem ipsam, quam in exploranda Luca Ghini mente versaretur, existimans a quo animo te laturum, si in re nullius fere momenti, casu nescio quo falsum te esse tui amicissimus, atque amantissimus diceret. Nihil enim vetabat, ut vel pagella illa, in qua Lonchitis inscriptio erat, deperderetur, vel ero, si obiter atque ad te perueniret, ita ut eius integram sententiam tibi videre non liceret, vel quod eam semel tantum a te lectam, dum plantam ipsam depingendam sculpendamue praeberes, rescisses, tandemque ob rerum incredibilem varietatem, quam quidem in tam laborioso opere conficiendo quotidie struebas, quod in ea continebatur, mente caderet, vel ut quavis alia fortuna incidere, qua animum tuum a veritate ipsa distraheret. At quem admodum ea, quae casu eveniunt criminis experta esse debent: ita neque te ignominia, aut dedecore
- 10 affectum iri existimabam, quod falsus in eare appellare, quam nec opinatus casus gubernavit. Hanc igitur meam existisse mentem in illis verbis, vir clarissime, nullo pacto dubites velim. Denique, testor immortalem, nulla me iniquitate, aut peruersitate commotum, sed integro, atque sincero animo ea protulisse. Quod si haud satis aptis, appropis, que verbis, sed potius duris, ambiguisque illud affectus sum, in hoc accusari, atque reprehendi non a te solum, sed etiam a quovis facile patiar, meumque erratum deprehensum iam, atque manifestum confiteor, quod tamen si criminis est, inconsiderantia cuiusdam negligentiaeque crimen est, non voluntatis. At ex verbis, & literis mentem alicuius estimare, calumniatoris officium, est nam ubi rerum testimonia adsunt, quid opus erit verbis? An putamus aliquid ponderis habituras esse in rebus ambiguis, & obscuris interpretum explanationes, ubi autor ipse scriptorum suorum ratione, sententiaque, sua expositionem perspicuam manifestat. Iam puto me tibi plenus exposuisse consilium meum, ac rationem reddidisse, cur ita scripserim de Lonchiti altera, in qua quidem re, non despero fore, ut (quod tuus est animi candor) in meis rationibus acquiescas. Verum, cur ita senserim, ac quid potissimum me mouerit, ut tuam de Lonchiti sententiam persecutus non sim, breuiter exponam. A Louit me quidem in primis Luca Ghini autoritas, qui cum in ea, quam tu depingis, asperitatem multam desideraret: nunquam pro certo affirmare ausus est, illam veram esse Lonchitiam asperam, tandemque ad inuentam illam, quam nos veram credimus, ita a priore sententia detrusus est, ut illam filicis genus esse crederet, hancque, ut veram ac genuinam, agnosceret. Atque induci ad credendum vix possum, ut de hac sententia Lucas deduceretur, rursumque, in pristinam reuertetur, quando in hac non asperitatem solum, sed omnes alias notas ita apposite Dioscoridis delineationi quadrare cognouit, ut nulla in re, vir ille alioque modestissimus, optimusque, adeo se magnifice iactaret, atque ob nihil fere aliud, ita gaudio existeret, quam ex huius Lonchitis, quam verissimè existimabat, inuentione. De qua intellexit in superius adducta inscriptione, cum inquit: se acriorè
 - 30 Lonchitiam agnoscere. Habet enim hac folia scolopendrii maiora, longe magis diuisa, ac multo asperiora. At illa quam tu depingis, praeter figuram quandam, Aspleni nihil habet, meo quidem iudicio, Dioscoridis descriptioni congruum, nullam enim in ea videre est asperitatem, sed ex utraque parte laevis est: tantum abest ut scolopendrio asperiorum esse eam dicamus. Nisi forte idcirco asperam illam dixerimus, quod duriuscula, & quodammodo solida sunt eius folia: Sed non ita se res habet, quando fieri non potest, ut vere dicamus, alterum altero asperius, nisi in utrisque insit asperitas, ut neque recte fiat comparatio nisi in asperitatibus eiusdem naturae, & speciei. Quare si Lonchitiam quantum ad asperitatem pertinet, Aspleno comparabimus, inueneri primum debemus, quodnam genus asperitatis in Aspleno sit, ut eandem sed maiorem in Lonchiti queramus. Sed nullam ego in ea inuenio praeter hirsutiam, seu scabritiam illam, qua ex auersa fronde flauescit. Concludendum est igitur eodem pacto a nobis in Lonchiti asperitatem queri oportere. Sed diuersis vocibus, eadem rem voluit explicare Dioscorides, ut quod in Aspleno appellauit hirsutum, voluerit id, in Lonchiti asperum dicere: & quoniam hirsuta esse Aspleni folia dixit, voluit in Lonchiti asperiora esse dicere: quod perinde est, ac si hirsutiora dixisset, vel scabriora, quod facile comprobatur ex varia interpretum versione, cum nouerint has duas voces τειχὺς & δαῦς sapius apud Graecos ita confundi, praesertim in plantarum signis, ut sine ullo discrimine alterum pro altero sumatur. Atque ut à proposito exemplo, non recedamus, quod in Aspleno Grace δαῦς Ruellius vertit hirsuta, Marcellus aspera. Rursumque quod in Lonchiti iacet τειχὺς, Ruellius reddit asperiora: at Hermolaus scabriora, quod idem fere est, quod Hirsutiora. Quamobrem adduci non debemus, ut diuersam idcirco accipiamus asperitatem in Aspleno & Lonchiti, quod diuersis nominibus utatur Dioscorides, cum constet idem intelligere voluisse. Quod si uia est (ut certe est) non video cur possu pro Lonchiti aspera ostendi planta, qua nullam habeas asperitatem scolopendrii similem, nedum maiorem. Accedit hoc, quod neque magis diuisa sunt folia eius, quam tu pro Lonchiti depingis: quod enim in Lonchiti Grace est μάλλον ἰσχυρὰ, sapius apud Dioscoridem non tam continuam scissionis quantitatem, quam numerum denotat. Atque ita hoc loco etiam intelligendum esse existimarem. Ruellius vertit, & multo magis diuisa: sed clarius Marcellus, pluribus incisuris diuisa. Sed quod idem voluerit exprimere Ruellius ex alio nonnullis Dioscoridis locis, ubi eadem verba leguntur, colligere est, praesertimque in tertio Aconiti secunda speciei, ubi quod Grace habet μάλλον ἰσχυρὰ reddit crebriore diuisura, nullum constituens discrimen (quantum ad sensum pertinet) inter primam & secundam iam adductam versionem. sed planta ipsa Aconiti hanc Dioscoridis fuisse mentem testatur, ut tu optime nosti, qui tertium Aconiti genus depingis multo crebriore quam platani folia sunt, diuisione. Idem obseruare est in Ligustico, cuius folia Dioscorides dicit esse prope verticem graciliora καὶ μάλλον ἰσχυρὰ. Ligusticum.
 - 60 Ac nisi ad numerum diuisionis retulerimus, oporteret fateri, non graciliora, ut Dioscorides dicit, sed maiora debere esse folia ad summam: maior enim diuisio, maius etiam subiectum requirit. Verum quia Dioscorid. asserit graciliora esse, & magis diuisa, necesse est, dicamus, ideo macilētiora fieri, quia tenuius scinduntur. Ad quod animum cum aduertisset Marcellus, tam in Ligustico, quam in alis supra commemoratis locis, illa verba Graeca vertit, Et pluribus incisuris diuisa. Hoc non eo spectat, ut existimem, ubicunque reperiantur haec duo verba, semper numerum diuisionum significari. Scio enim quantitas scissionem frequentius ab illis denotari, sed asseneramus, ac firmiter credimus in multis apud Dioscoridem non aliter, quam uti exposuimus, intelligi debere, quod exempla & versiones adductae satis declarant. Sed fac hasce versiones nullius momenti esse, quamam quae in tua Lonchiti diuisio est? nullam enim inspicio, sed video quo mensura tendat. Putas enim unicum duntaxat folium esse oblongum, utrinque diuisum totum, id, quod a radice ad extremum acumen protenditur. Sed longe aliter, mea quidem sententia, asserendum est: nam quae tu diuisiones appellas,

Trichomanes.

Notanda Dioscoridis in foliorum diuisura Phralis.

Similitudo Lonchitis cū Asplenio.

De Chamæleonæ albo.

Plantæ partes ut adpienda.

potius separata folia dicenda sunt, cum nihil sit, quod alterum cum altero connectat. At in *Aspleno* non ita. Possimus namque in ea, quod ab radice oblongum assurgit, oblongum appellare folium, atque diuisum dicere, quia eius scissura ita sunt, ut ad extremum pediculum non perueniant: sed est portio adhuc, quæ seclâ partem cum altera coniungit. Atque hunc fuisse Dioscoridis morem, ex aliis clarissime cernimus. Neque enim *Trichomani* oblonga folia diuisaque tribuit, sed potius folia lenticula, in ordinem utrinque digesta, aduerso in se in ramulis tenuibus. Sed nonne idem pene foliorum exortus est in *Lonchitina*? Cur igitur in *Trichomane* folia appellabimus, eademque non folia, sed foliorum scissionem in *Lonchiti*? Sed si recte consideremus ea, quæ à Dioscoride tradita sunt, inueniemus in omnibus idem ab eo obseruatum esse, ut ubicunque perfecta esset, atque absoluta partis à parte separatio, dum modo illa partes eandem effigiem, eandem quantitatem, saltem in pluribus obtineant, eas frondes appellaret: Non autem uniuersam ex illis partibus compositionem, unicum folium uocauit diuisum in plures particulas. Sic quinquefolia folia mentha tribuit, quina singulis pediculis, non autem unicum folium quinquepartitum. Sic etiã *Viticem* olea folia habere recte dixit, tamen si ex uno pediculo plura exeat, quemadmodum & filici ex uno pediculo cubitali folia exire multifida alarum animum modo expansa: non autem cubitali illa longitudinem unicum folium existimauit multipliciter scissum. Ac mirari hac in re licet Marcellum, qui id sibi persuaserit, reclamantibus omnino Dioscoridis uerbis. Contra uero *Ricinum* uult habere folia Platani, maiora, tamen, quia non putauit appellanda esse separatim folia, quæ diuiduntur quidem sed non ad extremum usque pediculum: Ita & *Veratrum nigrum* dicit retinere folia *Sphondylii* similia pluribusque incisuris diuisa: uniuersam multifidi folii compactionem unicum folium appellans. Sed huiusmodi exempla ita clara sunt, tibi que tam sepe perspecta, ut in illis immorari amplius non oporteat. Quod si igitur, hac uera sunt, nullo pacto scissis foliis tuam *Lonchitiam* dicemus, sed plura habere folia parua, utrinque ex uno pediculo dodrantia, uel minore aduerso in se, atque ita Dioscoridis descriptio, ei nullo pacto quadrabit. Si quis igitur plantam habuerit, quæ nullam ex his difficultatibus patiat, cur non potius eam pro *Lonchiti* altera ostendat, quam tuam? At cuiusmodi est, quam nos ueram existimamus, multo enim magis, quam *Asplenium* diuisa est, sine id pro maiore diuisione, siue pro crebriore accipiamus. Est præterea maior & hirsutior. Sed si ita est, circa quid uersabitur eius cum *Aspleno* similitudo? Nempe circa substantiam & asperitatem & colorem. Neque enim potest esse in forma siue figura, quia diuersim in ea constituit formam, maior siue crebrior scissio. Quod eo magis tuam arguit, cuius omnis, ac sola cum *Aspleno* similitudo in figura est. Ex aliis enim, quæ subdit in plantis delineandis Dioscorides explanat, circa quid perstringatur similitudo: Ut cum *Trichomanem* dicit esse filicem similem, ad substantiam retulit, non ad figuram, quia subinnotuit exiliorem esse & foliis lenticula. Ita de *Lonchiti* intelligamus necesse est, quia quemadmodum *Scolopendrium*, superne herbacea est, inferne hirsuta & 30 flauescens, ita & *Lonchitis*, in gradu asperitatis solum eam superans: ceteris etiam, quæ ad substantiam pertinent per similes. Quæ omnia in nostra esse nemo, qui eam semel uiderit, negare potest. Adde quod aculeus qui in nostra est, in summitate aduersus, non nisi rationem exprimit, quod in tua non euenit. Hæ sunt rationes, quæ in causa fuerunt, cur tecum in *Lonchiti* aspera minus consentirem, quæ si uera sunt, mihi gratissimum erit. sin minus, gratissimum etiam feceris, si probabilioribus rationibus efficias, ut a mea sententia deducar. Ut enim ea mihi semper uoluntas extitit, ut alios sine pertinacia refellerem, ita & refelli sine iracundia paratus sum. Nihil enim iniquius semper duxi, nihil ab omni pietate magis abhorrens, quam ueritatem occultare. Sed de his satis multa diximus, iam ad alia transeamus. Nam quod secundo loco diluendum est, quod auctoritatem tuam uidetur, nescio quomodo offendere, meumque in te animum in suspicionem adducere, est id, quod in sipe capitis decimi, secundo libro nostri opusculi de Chamæleone albo a te depicto diximus, ubi tuam 40 picturam minus ueram esse asseruimus, ac facta comparatione inter tuam & *Euchisii*, hanc ut rectiore (quam & suam etiam ex toto non acceptauimus) admittendam censuimus: hac nimis ratione adducti, quod radículas illas tenues, quæ crassæ radici connectuntur, non exprimas, sed statim crassiori radici echinatum capitulum, in quo & semen, & flores continentur, apposueris, Dioscoridis descriptionem magis (ut uerba etiam mea referam) quam plantam ipsam integram forte contemplatus. Ex quibus sane uerbis colligere aliquis posset, te a me reprehendi, quasi fictitias plantas, ac nusquam tibi uisas effingas, easque tanquam a ueris uinis quo extractas, posteritati exhibeas, atque ita legentibus imponas. In qua quidem re, multum mihi laborandum non est, ut hanc de me suspicionem dimoueam. Quando id ipsum ego (si mihi contingeret depingendarum plantarum provinciam suscipere) facere non dubitarem, neque propterea probro, ut impudentia mihi uersum iri existimarem, dummodo non integras plantas (hoc enim, ut difficilimum, ita & temerarium iudico) sed 50 partem aliquam ipsarum, quam summa etiam diligentia adhibita, habere mihi non liceret, adiungerem. Quod etiam audacius prosequerem in his, quæ semel, uel sapius antea à me uisa fuerint. Nam si statuis ob antiquitatem mutilatis, ex alieno marmore, uel nasum, uel aures, uel aliud membrum adiungere licet, quo pulchrior uniuersa facies spectetur, tamen si incerti sumus, an ueram illius membri effigiem fuerimus assecuti. Cur etiam depictis plantis aliquid addere non liceas, quod uel uiderimus, sed nunc eius partis facultas nobis non sit: uel non uiderimus, duce tamen Dioscoridis descriptione accommodemus, dummodo clariorem ita eius cognitionem fore speremus? Neminem enim, uel minimum in herbarum indagatione uersatum, latere arbitror, non posse omnes plantas in una tantum regione haberi, sed necesse esse, ut à remotissimis partibus bona pars earum transmittatur. Atque eam, qui uniuersam stirpium picturam ostendere aggrediat, oportere, ut arecentium multarum ut cunque potest, picturam exhibeat. Transmittuntur autem, uel non integra, uel non expansa, uel 60 non exacta iam ipsarum ætate, ut quandoque sine floribus, aut fructibus accipiantur, uel integra quidem, atque absolute transmissæ, casu aliquo confringantur, separenturque ita partes, ut quo pacto radix cum caule connectatur, uel flos semine cum caule, aut ramulis, tandemque folia cum uniuersa planta cobareant, facti recte assequi non liceat, ut taceam uariari omnium partium plantæ colorem, odorem, saporem, substantiam, & quod caput est, formam. Quod quidem nonnullis exemplis demonstrarem, nisi id ipsum, & tibi notissimum esse cognoscerem, & uberrime in meo libello transgessissem. In his rerum angustiis moribundas exiccataeque plantas, atque aliquam eiusmodi transmutationem possidentes, si, ut iacent, depingeremus, cum Dioscoridis descriptione non conuenirent, atque ita, ut falsæ a quouis reicerentur. Si nullo pacto illas depingendas esse existimarem, uix paucarum effigies dare possemus. Consilium igitur est, ut considerato arecentis plantæ defectu, 70

- memoria repetendi eius imaginē, si contingat illā virentē aliquando vidisse, id addamus q̄ ariditate incruentā abstruit. Quod si quandoq; accidat, ut quod addendū est, minus recte assequamur, non propterea dēnari debemus, cū id in paucis admodū enenire possit. Hoc ita verū est, ut a te ipso effectū esse, puto, negaturus non sis, nec sineges facile id tibi concedatur. Ea eris enim multas plātas a multis tibi missas esse, quae viua virentesq; ex longinquis partibus ad te minime pervenire potuerūt, in quarū nonnullis, nisi nescio quid accommodales, ne cogitatione quidē quisquā assequi possit, vere a te efformari potuisse. Nā Lycium ramulus ex Dalmatia tibi aliatu est. Baccaris Roma & Arimino Horninū sativum, & alia cōplures Pisis. Hemionitū Putaui, atq; ex alius exteris nationibus, haud sane paucis. Iā vero si virentium absolūtā formā arecentes planta, eruarent, nunquā pfecto Pistachiu ferrata folia depinxisses in Latinis tui cōmentariis, si illius cum pingeretur virentis copia tibi suppeditaretur. Nam cum tandem virentem eam vidisset, iterum illam in Italico sermone, scriptis cōmentariis sine ullis in ambiguis denotibus, verius expressisti. Mutasti etiam Apis, quae & Ischa dicitur effigiem, in iisdem vulgari sermone conscriptis libris, quia quam Venetus ad te Nicolaus a sancto Michaele miserat, (ut credere par est) assequi minus probe obmutatam ariditate faciem potuisti. Atque ut nonnulla etiam exsequi persequar, cum Trifolium Asphaltitem pingis quō non animadvertat, plantam tibi alii qui nos, piam tuam gram tum ad manus esse non potuisse, cum nec ramulos nec flores in ipsa exprimas? idemque de p̄nionē, & alicamarine, Sifimbri aquatica, Aloes, aliarumque nonnullarum stirpium partibus, quae in tuis p̄nionē de p̄nionē rantur, afferere licet. Iam igitur ad rem ipsam accedentes considerent quae tibi, qui me temeritate nota aspergunt, quantum ponderis habeant, verba a me de Chamaleone albo scripta, non enim vercor, quin totum, a quibus bonisque faciendum esse existiment. Scripsimus nos eo in loco potuisse a te erratum in p̄nionē cōmentariis ob plantae viuae penuriam, nonne in his verbis cum errore eius excusationem apposuimus: Quae excusatio si a quoquam non admittatur potius pertinacia fiet, quam veritate. Quod autem me in suspitionem adduxit ut crederem non existisse tibi viuae plantae copiam cum illam depingendam tradidisti fuit non solum p̄nionē qua cum his, quas sp̄ssime nos collegimus, non convenit, verum etiam, quia tuis in cōmentariis p̄nionē quidem, ubi nigri Chamaleonis, quem putabas, ubertas proveniat, sed ubi album videris non apponis. Unde non ab re coniecti quoquo modo poterat, non licuisse tibi in his locis, quae loca penetrasti, nascentem viuamq; hanc plantā videre, sed aliunde transmissam. A fieri potest, ut qui indog, radix sola quandoque folia sola cum capitulo ad te mitterentur, vel si integra quidem missa esset, casu aliquo separate partes ad te pervenirent, quam cum pingere velles a Dioscoridis delineatione adiutus, ea nua ut tacet typis excusseris. Id si ita contigisset, quis nisi stultitia seu per mediantem tuam solertiam damnabit? Quod si vere id accusari debuerit, iam me ipsum primum reprehendant, homines, qui in ea sententia, non solum tunc eram, sed adhuc permaneo. Tibi vero nulla sit iniuria ab eo, qui id quod scripsit iniuriosum esse non noverat, cuiusq; animus in tuis laudibus celebrandis, ex aliis rebus tibi notus perspicit, abunde est. Omnes enim decipimur specie rebus, quare non verba sed mens astimanda est. Neque vero nunc iterum a album Chamaleonem nostrum extolimus, ut tuam p̄nionē omnino falsam iudicemus, quando nihil verat quin climatis aut solis varietate, ita proveniat, ut a te depingitur, quod non solum credimus sed multis exemplis in nostro opusculo comprobauimus. Nam cum tuam p̄nionē veram non esse diximus, cum his illam comparabamus, quas nos pluribus locis effodimus. Atq; huius spectabant ea verba, quae habent Dioscoridis descriptionem magis, quam plantam integram forte cōtemplatus. Quae verba etiam, cum dubitantes nec certo proferā, ut satis indicant, me illud non affirmasse, sed liberum lectori reliquisse credendum fieri posse ut planta illa, ita inveniatur, ut a te depingitur. Quod quidem si explicite protulissem, iam nullah se in re caderet ambiguitas. At quis omnia ita minutatim consideret, quin in ea, quae noluit, nonnullam quam incidat? Videor enim mihi hoc loco pro me posse Horatianum illud addicere,

Verum opere in longo facile est obrepere somnum.

- SED hac mea culpa, eo magis toleranda est, quod in ea commoror urbe, quae ut ceteris omnibus fortuna dōibus, alias fere omnes superat, ita bonarum artium professoribus destituitur, praesertimque in hanc de simplicibus cognitionem, ita nemo est qui operam dederit, aut dare cogitet, ut vix unum, aut alterum inuenias, qui paucarum plantarum cognitionem teneat. Quamobrem neminem habere potuimus, cui opus nostrum inspiciendum atq; iudicandum traderemus, sed me ipsum mei laboris, & autorem, & iudicem esse oportuit, quo quid potuit esse infelicium? Scis enim sua quaeque Philantia, ita decipi, ut non raro circumspicitos quoque homines atque alioqui temperatissimos cacos reddat, & in graues errores coniciat. Sed cum vni mihi esset
- Ioan. Vincentius Pinellus, in quo omnis mihi spes erat, & a quo non modo certam atq; integram de meo libello sententiam expectabam, sed etiam stabilem, & sine ulla assentandi, calumniandine suspitione integram, optatis meis aduersa fortuna non respondit. Vix enim extremam manum operi imposueram, cum vir ille Putaniam studiorum causa, profectus est. Itaque inops consilii manu scriptum exemplar, Vincentio Valgriso misisti, ea tamen lege ut non prius typis committeretur, quam a Gabriele Fallopio vniuersus perlegeretur. Non enim verebar, quin is pro sua in me beneuolentia labore hunc & libentissime susciperet, & quicquid in eo minus cohaerens esset, quod vel ad res ipsas vel ad aliquorum auctoritatem emendam pertineret, accommodaret, ac corrigeret. Sed nescio quo futo factum est, ut operis ipsius dimidia fere pars excusa esset, quam ei illud inspiciendum liceret. Remisit igitur opus ex toto excidendum, meis literis, quae de eare ad illum conscripseram ita, ut scis, respondens. Hoc ego omnes praeclarissimos viros, eius rei testes optimos grauisimasque volo & do. Quae cum fortuna, quam vitare nemo potest, gubernauerit, ipsa etiam horum omnium malorum culpam sustineant, me vero in tot incōmodis satis superq; consolatur recta mea voluntas, meorūq; officiorū conscientia. Hac sunt praestantissime vir, quae mihi a Pisano ostensa sunt, tuā dignitatē offendere quibus quidem ita satisfactum puto, ut omnem criminis suspitionem me expurgasse existimem. Nā etsi paucis quadā alia, ab aliis animaduersa sunt, tamen leniora quae sunt, quam ut de eis aliqua sit habenda ratio. Quanquam confido fieri nullo modo potuisse, ut tu eadē, quae ceteri, de me suspicareris: cū nec dissidā, ut si quid vere a me commissum esset, a te pro sua humanitate, & liberationē culpe, & errati veniam impetrare. Quare hac non tibi, quae alius, qui hac cōmentari possent, scribuntur. Petog, abste, ut nō de his solum, in quibus aliqua tui mentio fit, sed si quaerunt alia (erūt autē certe plurima) quae a veritate ipsa abhorrent tibi videbuntur, ad me per primarias literas, amice (ut solet omnia)

In Pistachiis et rot.

Apii figura mutata.

Folium Asphaltite.

Ioan. Vincentius Pinellus.

scribas, ut quod mihi ob locorum longinquitatem, ante quam opus ipsum ederetur, nō licuit, eo iam edito licet, tandemq; per te, cum secundo edetur, ab omnibus erroribus repurgatum, per manus hominum versari incipiat, unde & obtrectatorum calumniis & existimationi nostra consulatur. Te vero etiam, atque etiam rogo, ut me totum suscipias defendendum, eamq; voluntatem, quam in me laudando ornandoq; tibi nunquam defuisse noui, perpetuam, ac constantem retineas. De me autem sic existimes, ac tibi persuadeas vehementer velim, nihil me spectasse semper, quam ut nullum officii erga te studiq; munus pratermittere. Quod si a quopiam mihi minus concedatur, mea mihi conscientia plura est, quam hominum suspitio. Sed dabo operam posthac, ut omnes intelligant animum meum, ab omni alia cogitatione ad tuam erga me benevolentiam conciliandam augendamq; iam pridem traduxisse. Itaq; non in hac nostra vrbe solum, amicis meis omnibus, sed etiam Faloppio, & sapissime Ioanni Vincentio Pinello, proximeq; Iocobo Antonio Cortusio, ornatissimis viris atq; utriusq; nostrum amantissimis, totum me patefeci, atq; his singulis saepe & accurate scripsi, quam nihil aliud semper maluerim, quam meam erga te obseruantiam tibi gratissimam esse. Nec dubito, quin de ea re ab illis certior factus sis: cuius me constantia fore, ut nunquam poeniteat, non despero. Quare has literas velim existimes forederis habituras esse vim, non Epistola, meq; ea, qua tibi promitto, ac recipio, sanctissime esse obseruaturum, diligentissimeq; facturum, Vale, & me, ut fecisti, ama. Neapoli.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLUS,
lus, Bartholomæo Marantæ
S. P. D.

Amice respondetur ad Marantæ excusationem.



Atearis oportet, mi Maranta, si tuis nolueris refragari argumentis, aliquid omnino subesse causa, cur tam multi unanimi consensu durioribus quibusdam commentariorum tuorum verbis offensum me esse, pradicent. Ita enim missis ad me, de re hac literis, ipse testaris, multos ex amicis tuis fuisse, quibus minus modeste & honorifice, quam mea dignitas, nostraque postulabat amicitia, locutus de me esse videreris. Idque in primis visum est Ioanni Antonio Pisano summi iudicis maximeque i. sic Neapoli antoruitatis viro. Atqui idem, non illis solum, sed omnibus ceteris visum est, quotquot tuum adhuc scriptum legerunt, quos quidem eo seuerius de ista tui sermonis acerbitate iudicare credibile est, quo minus ad gratiam loquuntur ignoti, incorruptisq; ad censendum iudicium afferunt, qui citra omnem affectum quam, qui amore & benevolentia preoccupati, ad iudicandum adhibentur. Apud hos neutrarum partium studio corruptos iudices, si nostra disceptetur controversia, procul dubio vicerō ego. Sed ut nulla in re non equior sim tibi, fingamus hos omnes, quod quidem prudenti uno nemini persuadetur unquam, fingamus, inquam, lectores libelli tui uniuersos, non aut amore mei, aut odio tui, sed maius quaedam ingeniorum conspirasse ad hoc, ut verba tua per calumniam interpretentur, appellemus ab his, ad alios iudices, sitq; penes te, ut deligas, quos maxime tua causa fauere existimas sint sane illi amici tui, quibus cumiosa seriag; quod dicitur, ardua & occulta consilia confers. Atqui hi iam ante, a me minime submoniti sponte sua liberog; iudicio vsi, quanquam maiorem apud te gratiam inuissent, si probarent, quae descriperas, pronuntiarent tamen ab officio te recessisse, quod de amico, tam acerbe locutus esses. Hos certe insimulare in syncera interpretationis, citra immodestia crimen non potes. Vt mirum videri cupiam non immerito debeat cum ipse, quid amici tui, de scripto censuerint tuo, recenseas, cur dicas paulo post, tui oblitus opinor, nihil esse contra existimationem meam scriptum, quod probus vir redarguat. Certe multi tui, ut tui ipse testis es, redarguerunt. Ergo & illis improbitatis crimen impingere te necesse est, sed hoc quam prudenter ab te, secusue dictum sit, nunc non prosequar. Hoc tantum dico, non id vanum omnino esse, nec de nihilo ortum, quod multi passim dicunt. Etenim sermones longe lateque vagantes originem ducere alicunde necesse est. Idcirco fuisse aliquid omnino in commentario illo tuo, quod famam meam offenderit, vel hoc argumento uno nemo profecto dubitauerit. Verum tu suspicioni huic succursurus, remedium affers. Ais non verba, nec literas esse, ut sonant, accipiendas, sed mentem tuam animumq;, quo ista scripseris inspiciendum. Quid audio? verba ne ergo contumeliosa in me esse fateris, animum negas? Atqui homines ex verbis de scriptoris animo iudicant postquam iam ita cōditi sumus, ut fenestra illa, qua cogitationes cuiusque intueamur, quamq; Memus olim ille diuinorum operum aestimator desiderari criminabatur, destituamur in uniuersum omnes. Si negas ea contumeliosa esse, cur igitur ea inspici & perpendi, ita ut natura sua sonant, non permittis? Cur eorum interpretationem non ex communi loquentium usu, sed ex tuo tantum arcano consilio depromendam census? Nisi vero ea tibi tantum & Musis arcanorum tuorum consciis locutus sis, non autem hominibus voces Latinas ita accipientibus, ut ratio proprietatq; eius lingua postulat. Noli, mi Maranta, tuo exemplo hoc genus excusationis in mores publicos introducere, ut simulatq; aliquis iracundia, aut quavis simili animi perturbatione commotus, quippiam effutierit, quod indiditum mallet, nephas esse dicat, verba interpretari, mentem inspiciendam esse. Hac vi grauium virorum reprehensionem non effugies. Dicit falso me assenerare, quod Lucas Ghini cum plantam mihi miserit pro genuina veraq; Lonchitide, quam eius nomine in commentariis meis depinxi. Hac verba non reprehendunt opinionem, quam sequor in Lonchitide, nam id mihi molestum plane non esset, sed ad fidem meam infirmendam, qua una ego repretiosorem nullam possideo, pertinent. Proponis in opere q; tui posteritatem latuū speramus omnes (est enim eruditissimū) ite me, inquam, amicū tuum coloribus de scriptum omnibus hominibus proponis, non tantum, qui nunc sunt, sed qui etiam post nos nascentur, ut si inimicos grauios nos usdem illeuisset grauiorem de se poenam sumis, vel a crudelissimo aduersario, potuisse negarent. Demus hoc sane, lapsus sim pagella, ut tuis verbis utar, in qua Lonchitidis inscriptio erat, crofa obliterata ue ad me peruenisset, aut semel lectam, dum plantam depingendam praheo, posses ab-

Ioan. Antonius
Pisanus.

Excusatio.

Matthioli que-
rela.

Haec abiectum: breuiter aliquam tandem mihi causam erroris fuisse fingamus. Tuum ne erit, lapsam ita le-
uem amicitiam tam seueram, ac ad aeternam secula duraturo supplicio vindicare? meam fidem on mihi sufficit
reddere in te tam leui? Quid faceres, si quod grauius tibi crimen meum notum esset, id toleres. Subiect. Ca-
terum vellem tantum te opera non posuisse in inuestigandis nonis interpretationibus illis, a sono verborum
inorum plane alienis. Ad haec verba, NESCIO QVO PACTO, dicti corrigere a seueritate Ego
vero id non inteligo: imo illa addita angere atrocitatem aixerim. Falso dixit A. Lucius: huius transmissio, sicut
hanc a Luca Ghino plantam esse, tolerabile est: dum addis nescio quo pacto, suspicionem arges, ut fronte id
consilio, an leuitate aliqua fecerim, subdubians. Nam si fortuito casu, aut errore aliquo id factum a me
esse dicere voluisset, non addendum erat, nescio quo pacto sed nescio quo casu. haec excusantis vox est, illa fi-
dem in dubium vocantis. Itaque cum conueniens multorum in sermonis interpretatio confirmat, tam a-
liena ista tua expositio non excusat, macula meam innocentiam non leui ubi te respersam esse. Quid vero si
20 grauius testimonio conuictus, Lucam Ghinum eam mihi plantam pro vera Lonchitide transmississe, si eius
manum & tibi, & alius monstrauerit? Monstrans certe iam multos, qui mecum sunt, doctissimi patres &
integerrimi viri, quibus ego aduersum te testibus actor. Sed multo in loco sit clarissimus vir, Vlyses Al-
drouandus Bononiensis Medicus, qui recens ad me datis literis, se meminisse affirmat, quod Anno quin-
quagesimo secundo, missa tibi a Ghino haec verba sunt cum inscriptione Lonchitidis altera. Hanc reuicere testem
non potes, Ghini manum notissimam tibi ex diuina cum illo viro consuetudine, negare neguis. Quid au-
tem erit, an non poenitet tam in me tam imprudenter, & praeter omne merum meum coacta suspitione? Di-
ces, miramini quidem ad te missam plantam anno quinquagesimo primo cum hoc titulo, Hanc esse Lonchitidis
30 asperam aliquos sentiant, anno autem sequenti eandem missam esse inscriptione mutata, ignoravi. Tu ergo
quod factum esse ignorabam, id nunquam fieri potuisse statuisti. Hocque tam leui fundamento mixtus, effuisti
in amicum, qui in hostem non competebat, nisi certius explorasset omnia, qua propter ista diceres. Non is
ego sum, mihi Maranta, qui honoris & existimationis meae rationem non habeam, proinde non est quod cense-
as, scripsisse Lonchitidem hanc me Ghini liberalitate esse consequutum praeter illius sententiam, ut quam pri-
mum vir ille candidissimus meos inspeccisset commentarios, mendacis & temeritatis me accusaret. Sed haec
non persequar ulterius. Non enim dubito, quin ipse erratum tuum iam agnoscat, quod sius imprudentia, si-
ue negligentia, obrepente nimirum in opere tam longo somno ut dici solet, commissum fuit, erratum, certe su-
is tibi iniuriosum, in me longe grauius. Verum quicquid hoc est, quod offendere animum meum illa
ratione potuit, id totum dono amicitia nostra, dono Cortusa, dono Aldrouando, viris clarissimis, & virisq;
40 nostris amantissimis, dono Pinello nobilissimo alia homini, sed dedicatione commentarii tui longe nobiliori
facto, ac cupidissimi, ut petis redeo ad perspicuum illum tibi saepe, mihi dulcem amorem tui, qui & si nunquam
e pectore meo extinctus est, refrigerat, tamen aliquantulum tristitia ab suspitionem mutatis erga me animi
tuis. Venio nunc ad alteram epistola tua partem, qua prior erat ordine, in qua offensum me esse arbitaris, quod
opinione a me aliquot in locis dissentias. Ego vero tantum abest ut id agere feram, ut magnopere gratuler tibi,
quod ita fideliter in medicum labores, verumque in profundo puteo, ut quidam Philosophus dicebat, re-
conditam tuis vigiliis, & lucubrationibus eruendam & proferendam suscepisti. In quo quidem labore socium
50 so datum esse mihi vehementer gaudeo, integrum viribus, stantem aetate, ingenio summo, iudicio peracri pra-
ditum, laborum patientissimum, insuper, ut se dulci lectorem, ita candidum interpretem totius antiquitatis.
Sicut autem in omni opere coniunctu duorum vel plurimum conatibus peragendo, hoc requiritur, ut iuuent
40 mutuali, alios, exhortentur inter se, imbecilli succurrat robustior fesso recentior, & in summa ne tam quod
gloriosum cuique factu quam quod ad finem necessarium est, eligant: ita nos quoque veritatem unam nobis
propositam singulari contentione uterque inquiramus: cui non refert, quantum tu, quantum ego inuenerimus:
aut utrius inuenta splendidiore sint, sed hoc necesse est, ut quisq; suo loco fideliter laborantes inuenimus alter al-
terum suggerendo, monendo, exhortando, errata etiam nonnunquam comiter offendendis. Ita enim fiet, ut
collatis fideliter operis, ut utriusque privata posthabita, existimatione etiam aliqua ex parte pro bono publico non-
nunquam neglecta, veritas tandem clariose specie hominibus eluceat. Quod ubi per nos factum erit, tam-
demum officio nostro perfunctis probe uterque fuerimus, iam abunde praemiorum receperimus, etiam si nulla a-
lia commoda consequamur. Itaque nequaquam succenseo tibi, sed parum gratias quam maximas ago, eo so-
no nomine, quod quareperisse te ino stulto, & labore utilia existimas, ea in medicum proferi, & mo tibi a veri-
tatis semita deflectere putas, meliorum admonendum censet. Qua quidem ego sequar etiam, ubi talia mihi ef-
50 se persuafero, quae tibi videntur. Sin autem vel sponte, vel tuis monitu excitatus, veriora aliqua eruero, et
tu quoq; boni consulas, opinor. Atque haec de officio utriusque nostrorum, hoc loco dicta sunt. Nunc reliquum
est, quod officii mei est, ad re etiam, & opere, ut exequar. Placet enim pauca quaedam huic sermone atterere.
Et primum quidem, quae ad defensionem eorum pertinent, quae a me antea assertuata in doctissimo commen-
tario tuo vniu firmis argumentis oppugnasti, deinde etiam assertiones quasdam in eundem commentario
60 am meae, amanter & candido recensere. Vtrunq; cum horum ad veritatis enucleationem plurimum interesse
videtur. Auspicabor autem a Lonchitidis consideratione, quam me nec pinxisse, nec nosse veram arbitrari.
Ego vero meam, quam proxime ad descriptionem Dioscoridis accedere existime. Libet autem prius verba il-
lius auctoris excutere. Id ut recte fiat, mea mihi, cum tua interpretatione conferenda est, adhibenda est
70 ad iudicandum aequo lector, penes illum sit praecipuare, uter melioribus rationibus suam sententiam stabili-
uerit. Inquit auctor. Folium Scolopendri emittit. Comparatio est foliorum. Similitudo ergo eorum aliqua sit,
necesse est. In quamam autem care consistat, hoc dubium videtur, propterea quod in in secundo tuorum com-
mentariorum scripsiste, foliorum Lonchitidis asperum & Scolopendri similitudinem, ad substantiam referri
debere, non ad figuram. Mirum quidem voca substantiam, qua comprehendit sensibus non potest: itaque si hoc
vocabulo useris, ut vulgo utuntur alii, non credo te cogitasse, quid tunc scripseris. Alicubi tamen reperio sub-
stantiam rei usurpari pro crassius, aut tenuitate partium, sed quid tenuitas & crassities partium, ad simplici-
um faciem cognoscendam? Quidam amicum meus homo in primis acutus, percontanti mihi quidnam tibi signifi-
ficaretur substantia vocabula: recitavit ordinem verborum ex eodem secundo libro tuo, cap. 12. Foliorum vero Lon-
chitidis, &c. quae sequuntur. Postea cum arguit, Maranta dicit substantiae similitudinem ex se carere
Dioscoridis

Gratiuissimam
si amicus com-
probat meo
Matthio in Lon-
chitidis peram
a Luca Ghino
bi fuisse manum.

Maranta laeta

Responso ad
Marantz regim-
menta in Ape-
ra Lonchitidis

Lib. 3. cap. 149

Lonchitidis &
Aspleni similitu-
do ex Dioscorid.

Dioscoridis verbis intelligi, asperiora, maiora, multoque magis diuisa, necessario voluit, vel asperitatem, vel magnitudinem, vel multifidam sectionem substantiam dici, aut certe omnia simul. Hæc ille dicebat. Sed non puto, tam excordem se esse, ut amicus ille meus recte diuinarit. Itaque fateor me istum locum non intelligere, quippe cum eum saltem sermonem didicerim, quo alii utuntur præsertim huiusce facultatis professores, nescio diuinare, quid ista noua ratio sermonis sibi velit. Dicam ergo ingenue, quam similitudinem in mea Lonchitide & Aspleno deprehendam, nec utar dubiis, aut obscuris vocabulis, sed qua tu, & quius intelligat. Video in Aspleno folium multis segmentis diuisum, idem video in Lonchitide mea. Dein in Aspleno eiusmodi segmentorum situs est, qua una ex parte media ubi venæ coherent segmenta, illis præcise ex aduerso non opponuntur, qua in altera parte sita sunt, sed aliquanto aut altius, aut humilius desinunt, nec eodem in puncto dextra & sinistra intersectiones venam per medium folium transeuntem contingunt. Talis fere etiam segmentorum, quibus folium Lonchitidis mea distinguitur, ratio est. An ne tu hanc aliquam similitudinem putas? putabis certe, si modo præcepta illa, qua in secundo volumine tuo tradidisti, ipse tueri voles: quo quidem in loco ad Aspleni & Filicula foliorum similitudine esse ducis, ut eodem modo secta utraq; esse appareant. Nec repetam omnia, qua tu ad confirmandam sententiam hanc eruditissime, eo in loco disputasti: Potius aliam adhuc, præter hanc similitudinem ostendam. Tam Asplenum, quam Lonchitidis mea, auersa parte asperis quibusdam punctis, folio adnatis flauescit. Rara planta sunt, qua tam insignibus notis comparari possunt. Iam tu voces similitudinem hanc, vel substantiam, vel figuram vel scindapsi, vel quocumque alio nomine, mihi satis est similia folia esse. Nec enim aliud vult Dioscorides. Dices, at non per omnia similia sunt. Hic nihil respondeo. Nam liber ille tuus profecto doctissimus, qui secundus est ordine, patronus meae causæ erit. Idem multas rationibus defendet sufficere ad similitudinem, ut in aliquibus saltem congruant planta. Sequitur in Dioscoridis textu: Sed Asperiora maioraque. Maiora esse in mea Lonchitide nemini dubium est, asperiora quod sint negas. De eo vero mihi rationibus tecum disputandum non est, sed prouocandum utriusque nostrum ad sensum tactus. Is huius controuersie index esto. Appropinquandam curam propterea utriusque plantæ imaginem, ut cognita ex pictura earum facie & comparatis sibi uiuis plantis rei herbariæ studiosi digitus tangant, de quo nos, tam multis verbis disceptamus. Hi omnes Lonchitidis meam Asperam esse deprehendent. Nullam, inquis, est videre asperitatem. Visus sensum hic ut adhibeas, opus non est, tangas oportet, & sic asperitatem percipies, manibus non oculis. Ille enim, de asperitate, & leuitate, hi de coloribus iudicant, quæquam mea Lonchitidis ita aspera est, ut oculis etiam id intueri liceat. Sed quis sit, ut tu mox oblitus scabrum dicas, cum asperam neges? Quid est scabrum, quam vehementer asperum & inæquale in superficie. Vide quo absurditatis delabaris, quod laue esse antea asserasti, id nunc scabrum, hæc est insigniter asperum fateri cogeris. Laue est, quod cum tangitur digitum minime retinet, sed lubrica superficie illum hinc inde oberrare circa offensionem permittit. Asperum vero dignum remoratur superficiem inæqualitate offensum, idque cum immodice facit, scabrum dicitur. Quo pacto ergo idem & laue & scabrum esse potest? Nec vero in eo tibi mens satis constitit, quod inquis hirsutum scabrumve, quasi rem eandem hæc duo significant. Hirsutum vocatur quod villosum est, scabrum aliud est. Si scabram meam Lonchitidem esse ducis, aio esse, si hirsutam, nego. non enim pilos vel villos ullos habet. Pergis, non sit recte comparatio, nisi in asperitatibus eiusdem naturæ & speciei. Hic uideris mihi sepiam piscem imitatus, qui cum elabi aliter piscatoribus non potest, atramentum offundit, obscuratisq; hæc fraude aquis elabitur. Cum enim hic comprehensum te iri intellexisses, obfudisti nobis caliginem obscuris verbis, qua nemo intelligit. Quid uocas tu asperitates eiusdem naturæ & speciei? Certe asperitas accidens est superficiem quorumcunque corporum, & ideo omnia corpora superficiem habentia externam, conferri inter se quo ad asperitatem & leuitatem possunt. Dicimus ferrum aliquod asperius ligno. Cutem hominis dicimus asperam, sed minus asperam, quam sit lima aut pumex. Vides itaque asperitatem, in quocumque subiecto sit, posse cum cuiuscunque corporis asperitate secundum magis & minus conferri. Ideo uerba sunt, ista tantum, nihil significantia, qua hic de asperitate eiusdem naturæ & speciei affers. Nam asperitates omnes eiusdem generis sunt, & non differunt nisi secundum magis & minus, & quauis potest cum quauis conferri. Iam uero quam bene dixeris hirsutum eodem modo cum aspero tu uideris. Certe hirsutum est, quicquid villos extima superficie habet, qui villi si molles sint, lauem sepe sepiam reddunt, si duriusculi, asperam. Hirsutum ergo, vel asperum, vel laue esse potest. Leuitatis exemplum habes apud Plinium de syluestri Brassica scribentem, libro vigesimo secundo, capite nono. Inquit enim, Folia habet bina parua, rotunda, plantis oleris similior, candidior satina, & hirsutior. Hirsutum ergo vel asperum, vel laue esse potest. Proinde perperam ais idem esse hirsutum & asperum. Quod Marcillus uertit aspera, male uertit, quod τερπύτρεα Ruellius asperiora, Hermolam scabriora, bene factum ab utroque. Asperum enim & scabrum, ut supra dixi, idem fere significat. Noli ergo interpretari τὸ τεράχιον hirsutum, cum causam eius nullam habeas, nisi quod sic transferrere tuae opinioni congruebat. Sed pergamus. ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΙΣΜΕΝΑ hoc est, magis incisa. Ita enim uertendum est, si uim Græcarum uocum recte excutiamus. Apparet cuius ad uerborum præteritatem attendentis continuam fissionis quantitatem his significari. Μάλλον enim apud Græcos omnem quantitatem significat, ut πλεον discretam. Sic ubi uero hæc uerba, μάλλον τερπύτρεα recte conuertuntur, crebrioribus incisuris diuisis, ubi improprie locutus est Dioscorides, quod tu negare non potes, ut mirari quispiam non immerito queat, cum hic retenta propria significatione sermonis, commode interpretari Dioscoridis textum possimus, cur tam sis operosus in peregrina excogitanda expositione. Stante ergo hac genuina interpretatione, iam conuerte oculos ad Scolopendrium & Lonchitidem meam, & demonstrabo tibi, quid uocet Dioscorides, folia magis incisa. Qua parte segmenta folii Aspleni venam mediam contingunt, lata basi sunt. Non enim eoque molita est incisionem natura, ut in tantam separaret eam a media uena, ut puncto aliquo solum illi adhererent, quemadmodum in Lonchitide mea fit. Ideoque merito maior incisio in huius foliis esse dicitur, nimirum, ea, non solum ad mediam usque uenam adducitur, sed ulteriore diuisura ab illa segmenta adeo separat, ut extremitate quadam sua solummodo illam contingant. Accipe Aspleni folium, & eius sectiones aliquanto profundius ducis, mox uidebis quandam Lonchitidis mea imaginem. Hinc simul ratio patebit tibi in mea planta singula segmenta, singula folia uisa sunt, quippe si talia non uiderentur, non recte dixisset auctor, Lonchitidis huiusce folia esse μάλλον τερπύτρεα. Hactenus demonstravi meam opinionem cum Dioscoridis uerbis

Hirsutum & scabrum non esse idem.

Asperitas, quid.

Hirsutum quid.

Ασπλην και τεραχιον οὐδὲν ἰδὲν significant. ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΙΣΜΕΝΑ, ut interpretandum.

verbis congruere. Venio nunc ad eum locum, ubi qua ego segmenta vni folij, eam separata esse affirmas: quum locum non dubito quin inuito & aduersante calamo scripseris. meorum argumentorum inopiam cauitim. Hic enim totum tantum abest, ut protefaciat, et etiam magnopere obicit. Scribis inibi in ad pleno a divisiones ad medium usque pediculum non perungere. Id ego diligenter considerante admonitus, ac aliter te habere deprehendi. Bene enim segmenta e direccio postea neutiquam contingunt, si, intercedente aursura usque ad ipsum pediculum. Sed demus contingere sine cohaerere, & vni inuicem. an tu propterea folium sectione usque in pediculum medium desinente, diuidi posse negabis? aut quod si diuidatur id folium, esse noles? Dices posse quidem hoc fieri, sed ubi fiat, eum modi divisiones vni modo loquendi more folia dici non debere. Id confirmas exemplo Trichomanis, in quo propter diuisionum profunditatem hoc oritur, quod a radice affurgit, oblongum folium non dicitur. Sed paruis illis lentium instar orbiculi, qui nigro colore splendensibus colliculis utrinque adherent. Miror, me hercule, superstitionem hanc tuam in re tam leui, qui vocabulis, qua saepe alio atque alio modo, prout res nata tulere, usurpamus, ita alios homines, et eos tibi huius sese accommodare, non autem illi ad usum suum flectere oporteat. Quae dicitur vel Dioscorido, vel quibus aliis, Trichomanes alius verbis describens, totum quod separatum a terra enascitur, folium dicitur, illa autem lenticulae instar totiola, segmenta, num tu hoc magnum crimen esse putares? Aut si quis eo modo & in loco segmentum in aliqua planta, folij nomine, perspicuitatis gratia appellet, aut e contra quod folium sit, segmentum dicat, an in hunc scelus magnum committi posse arbitraberis? Sunt quaedam in herbis de quibus dubium est, diuisiones ne an folia sint, num eas propterea indescriptas relinquemus? verentes ne his fortasse vocabulis magno piaculo abutamur. Dolendum certe, si res vocabulis nos adeo adstringunt, ut rebus ipsis accommodata vocabula inueniri non liceat, cum contrarium potius fieri debeat, ut vocabula rebus, non res vocabulis accommodentur. Quae cum in Trichomane folia appellabimus: eademque non folia, sed foliorum scissuram in Lonchide? Diuisionem quae commodum erit. Dioscorido illic folij vocabulo uti, hic scissuram. Licet enim in his cuius vocabula ad rem praesentem apta ad dilucidiorum explanationem, non uti tantum, sed etiam si res ita ferat, a se cum liquido consueti rerum longe maiorem varietatem esse, quam verborum, quibus illa explicantur. Quum quoniam in Trichomane ei pediculus, qui lenticulas illas sustinet, describendus peculiariter erit, ob inueniendum illum ex nigro colore splendorem, cum appellamus perspicuitatis gratia ramum tenuem. Sic enim, e melius putabat, intellectum iri, quam si venam diceret, aut nervum, aut pediculum. Ergo oportuit postea, ut, quae illi adhererent, folia diceret. Lonchitidem autem describendum cum similem aliquo modo plantam reperisset, cum qua illam conferret, oportuit etiam hoc in Lonchide folium dicere, quod in illa folium vocauerat. Nec conueniebat, quod ob profundiorum incisionem a similitudine discederet, ut obscuritatem afferret. Lectori discederet autem tota oratione a similitudine, si id folium vocaret in Lonchide, quod in Aspleno esset sectio. Ideo necessarium erat, folij nomen utrobique retinere, & comparationem postea corrigere, additis verbis, magis incisus factus erat. Placuit antiquis proprietates, supersticio non placuit. Satis erat illis sic uti nominibus, ut animi sensa aliis patefacerent. Si qui verba tantum ad amissim examinata captarent, rerum interea negligentissimi, eos indignos suis libris censuerunt. Incertum est verum & in Trichomanis descriptione & in Lonchide propriissime voce folij Dioscorides usus sit. Ego sane indignum censeo, ut de eo disputetur, cum res ipsas, quas describere voluit, cognoscamus. Quid? quod & in Filicula sectiones usque ad medium pediculum factas, non foliorum loco habet Dioscorides, sed incisiones nominat, folium autem appellat oblongum illud totum, quod proxime a radice enascitur. Sic enim inquit in Aspleni descriptione. Folia Polypodi modo sunt. In Polypodi folium intelligi oportet. Atque illud certe crebris incisuris usque ad medium reuoluitur. Ergo quod in Trichomanis exemplo adstruere conatus es, id vides iam altero hoc meo refutatum. Quae quum non opus fuerit, etiam hic me adducere. Erat enim aliud propius ad manum, nimirum in Aspleno sectiones usque ad nervum sunt, ut manifestum est cuiuslibet animi ad hoc aduertenti. In reliqua exemplis qua adducis, inquirere hoc loco nec vacat, nec opus est. Satis sit paucis probasse Theorema illud inuicem, quod si biliter tantopere conatus es, vniuersale non esse. Ostensum itaque, hactenus abunde est, non valere tua argumenta quibus eas, quas ego divisiones voco, folia separata esse confirmare conatus es. Unde iam dubium nemini esse potest, quum in hac mea planta per omnia Lonchitidis aspera descriptioni congruat. Caterum summam usque in manum tuam quoque, & consideremus folium ne illi sit Aspleni, idque maius, asperius, magisque diuisum. Si folium Aspleni est, quum in re id illi simile dicemus? Inquis, non in figura & forma, addis, neque enim potest esse in forma. sine figura, quia diuersimodum ea constituit formam, maior sine crebrior incisio. Egregia vero hac ratio est. An non audis Diosc. Aspleni folium simile esse Lonchitidis folio, eo excepto quod hoc magis diuisum est, asperius & grandius? Aut secundum quid similia esse, non secundum omnia. Cur tu igitur hoc obicis inopportune, quod ipse Dioscorides praecipue alius sciens aliqua deesse similitudine? Itaque, hac excepit, in reliquis similia esse voluit. Iam secundum substantiam conferri plerumque inauditum est. Qui scire possumus secundum substantiam plantas sibi similes esse, cum substantia nec videamus, nec tangamus. Quum tu ut declares quid voces substantiam aut accidentia aliqua persensibus obuia in quibus similitudine consistit? Hic colorem & asperitatem offers. Si similitudo in colore est, certe non apte Lonchitidem descripsit Dioscorides. Qui enim plantam aut res quasvis describit, cum comparare talia cum re delineanda oportet, qua singularem aliquam cum ea conuenientiam habent. Si conferat qua in qualitate aliqua multis communis congruant, nihil certi intelligi potest. Aspleni autem altera parte in uigine quadam aurea flauet, altera viret, id ei cum aliis nonnullis commune est. Nunc ampla haec comparatio habetur, nec satis depingens plantae faciem. Sed consistat sane in ea re similitudo, non tamen propterea sequitur, tuam plantam Lonchitidem esse, nisi etiam caetera adfuerint, nota quae a Dioscoride attribuantur. Aspera est. Id vero ego penitus nego, nam lanugine quadam mollissima auersa parte obducta est, quam si tangas, videris tibi holosericum tangere. Ergo tu mihi, contra sensum communem, noli afferere, asperum esse, quod videri videntem, sed modo & perquam laue est tractanti. Hactenus nihil inuenimus in tua Lonchide, quod in Aspleno nullo colore tam videamus, num etiam ei maiora folia sint. Hic prius mihi tecum disputandum est: tuo exemplo, si folium vocare debeat. Nam quod tu eo nomine appellare videris, id video ego diuisum esse in uersa usque ad pediculum pertinentibus, ergo rami sunt, quae tu folia, & folia sunt, quae tu divisiones esse censes, si nobis istudandum sit illis, quae tu magno contra me de differentia foliorum & segmentorum distulisti.

Aspleni folij diuisio.

Cur aliter in Trichomane aliter in Lonchide folia appellauerit Dioscorides.


Lonchitis Aspera Marantae examinatio.

Secundum substantiam conferri plantas in iudicium est.

At relin. . . in hac ego arma qua antea iam semel tanquam obtusa & inepta in te improbaui. Concedam tibi folium esse, quod tu sic vocas, & eodem id nomine appellabo. Quero iam ab te an illud maius sit folio Aspleno? Hic taces & aliud prater rem ac institutum affers. Ais plantam tuam maiorem esse Aspleno. Quid facis Maranta? folium tibi cum folio in magnitudine comparandum est, non planta cum planta. Quamquam nescio etiam si planta cum planta conferretur, an tua maior Aspleno esset. Iam μάλλον ἐσχισμένα interpretaris utro placuerit modo, neutro ostendes, Folia tua magis incisa esse, quam in Scolopendrio. Nam crebriore diuisura secta esse non possunt, quia, ut tu dicis in Epistola, crebrior diuisio maius subiectum requirit. Tua autem Lonchitidis folium ad oculum multo minus est, ut antea dixi folio Aspleni. Caterum profundiori diuisura minime secta esse, tacitus ipse fateris, & sensus idem comprobant. Nihil nunc restat prater acumen illud in extremitate folii, cuius tamen non meminit Dioscorides, quo te tuearis, atq; illud in mea Lonchitide multo acutius est. Tuum ergo illud obtusum acumen merebitur nomen lanceola, meum acutius non merebitur: iniquum id

LONCHITIS MAT-
THIOLI.

LONCHITIS MA-
RANTÆ.



Aspleni folium
diuisum cultro
quam maxime
Lonchitem refe-
rens.

Albi Chamaleo-
nis examinatio.

certe. Imponam iam finem hisce de Lonchitide disputationibus. Satis enim multis argumentis ostendi meam plantam esse similem foliis Aspleno, hac tamen maiora & asperiora, ac magis diuisa. Contra tuam demonstraui nec folio esse simili, nec maiore, nec asperiore, nec magis diuiso. Iudicet aequus lector, utra sit vera Lonchitis aspera, non modo ex praedictis, sed ex ambarum plantarum imaginibus, quas hic appingi curauimus una cum Aspleno, cui dissectum cultello folium in sinistro latere addidimus, ut palam magis intuentibus sit, quam bella Lonchitidem nostram referat, ubi profundius scindatur. Atqui non eam ob causam utriusque Lonchitidis imaginem hic appingere placuit, quod ex earum inspectione vel tactu quispiam, de earum asperitate, villositate ue indicare debeat, sed ut ex earum facie, quilibet aequus iudex, sibi viuas conquirere possit, qui ante eas non viderit, & ex illis rectum ferre iudicium. Sed haec tamen non sustinenda mea opinionis gratia, sed indaganda veritatis ad te scribo: pro qua non solum, ut tu ipse tua in Epistola inquis, debet quispiam nihil fictum, nihil simulatum proponere, sed (ut ego puto) ad mortem usq; certare: quinetiam cuius amicitia, consanguinitas, ceterisq; animi affectibus preponere. Veritate nihil pulchrius, nihil amabilius: Cuius causa etiam colaphus, & calcibus cedi non indecorum sit: nedum verborum contumeliis incesse. Thesauro hoc nihil nobilius praestabiliusq; diuina providentia mortalibus concessit. Ac Sole potius nobis & igne, & aqua carendum esset, quam veritate. Sed iam ad album Chamaleonem me confero, in quo ne mihi iniuriam fecisse videaris, ut quidam fatentur, te ipsam ac etiam me pluribus excusis argumentis: quorum si meminisses, dum ea, quae in Commentariis illis tuis contra Chamaleonem meum scribebas, facile calamum tantisper suspendisses, quisq; dulciora succurrissent argumenta, quibus mecum ageres. Quinetiam non fuisset tibi opus tam multa nunc tuam declarare sententiam, si ea in memoriam revocasses, quae scripseras lib. & cap. primo tuae Methodi, ubi plantam rem variam ac multiplicem esse fateris, & unam ac eandem plantam pro locorum ac regionum natura atq; etiam aliis ob causis fortasse nobis ignotas, variis quidem oriri modis, & hanc tantum ob causam (ut paulo ante dixeris) certi in Methodum in describendis plantis inuenire non potuisse Theophrastum. Nec etiam operae precium fuisset, ut hic eadem uteris excusatione, qua antea etiam vsus es, cum dicebas, non

verba scribentis, sed mentem esse estimandam. Sed nescio, quo pacto hac vera esse intelligas, cum nihil sit, quod magis internam animi voluntatem palam faciat, quam verba. Facile aliorum verba scriptaq, exploramus ac in-

ASPLENVM.



telligimus, sed qui eorundem internas animi voluntates agnoscat, prater Deum habeo neminem. Ideoq, infirma satis apud me hac tua excusatio est, utinam apud alios valere possit. Nascitur planta, a qua imago illa mea delineata est, in Iapidia & Istria montibus, ubi nusquam plantam, albo Chamaleoni nostro congenerem videre licuit, quae plures, quam unum Echinum ipsumq, magnū, proferret. Oritur is à summa statim radice, è quodam singulari ipsius processu, quod in imagine nostra videri nequit, ob folia quae anteriori parte ad radicem inuersa, ipsam operiunt. Id attestari facile poterit Georgius Liberalis Pictor, qui ex integra & viva planta, non ex mutata (ut tu suspicari videris) meam delineauit imaginem. Utinam Pictor alter Venetus, cui tunc à me & Pistacia ramusculū delineandum dederā, tam sedulus fidelisq, atq, Georgius fuisset. Ille enim Goritia Venetiae profecturus susceptus a me plantam in itinere amisit. Quapropter veritatis, ne ipsius agra ferrem negligentiam, si id rescuisssem, reuocata in memoriam harum plantarum facie, illas memoriter delineauit, & excidendas curauit, non sine magna animi mei indignatione. Sed ut redeam unde diuertera me, ego quidem, etsi Chamaleonem album, tot in radicis summitate processu habērem, nusquam conspexerim, tuam tamen haudquaquam impugnabo fidem. Quippe quod quemadmodum in corporibus nostris videmus, non parum sapius variare naturam in partium positione, praesertimque vasorum ac neruorum, adeo ut facile reperimus hunc plura habere vasa arteriasq, illū vero pauciora rarioraque: eodem sane modo quam plurimas haberi plantas non ambigo, quae etsi vni tantum generi assignentur, varians tamen quandoq, figura, quandoq, colore, nonnunquam partium numero & quantitate. Verum non ob id negauerim plures (ut tu recte putas) me dedisse plantarum imagines, quae è siccis plantis ad me transmissis

Apil & Pistacia figuca.

Naturā in partium positione plurimum variare.

Chamaleonis nigri examinatio.

Carlinae alterius radices in acetatis.

delineari curauerim, sed affirmauerim etiam, quod aqua egelida maceratione contractas a siccitate rugas adeo in eis extenderim, ut hac ratione rediuisa & parum admodum à viridibus distantes viderentur. Posses ego par pari referre, si dicerem album Chamaleonem tuum, Dioscoridis Chamaleonem non esse, quod illi hac planta, è media radice sine caule summo proferat echinum, tua vero à radicis summitate plures emittat processus, quorum singuli singulum echinatum capitulum proferant. Sed cum plures esse causas, non ignorem, quibus tanta fiat in plantis varietas, ab hac impugnatione lubens abstineo. Tuum autem iudicium, quod illa Fuchsi imago rectius, quam nostra Dioscoridis Chamaleonem album exprimat, parum sane moror, cum equos iudices sciam non defuturos, qui sententiam hanc tuam indicabunt. Sed hac omnia tibi quam libentissime condo, ut nostra conseruetur amicitia. Caterum cum Chamaleo album nigrum mihi in mentem reuocarit, dicam ingenue quid de illo tuo sentiam. Sed antea recensebo, quae contra meum habeas argumenta. Inquis itaq, lib. secundo, cap. septimo tuae Methodi, ubi quandoq, pro regionum natura variari plantas scribis, me non parum in nigro Chamaleone aberrare, quippe qui, ut probarem alteram Carlinam nigram esse Chamaleonem, non obstare opinioni meae dixeris, quod in Italia hac Planta venenata non sit, ut ex Galeno esse deberet, ad regionem confugerim, ratus sane quod quanquam fortasse in Graecia & Ponto niger Chamaleo, venenosus reperiat, fieri tamen posse, ut in Italia sit salutaris immutata natura, ut in Persia arbore, Aro, minori Chelidonio & quibusdam aliis plantis, hac tantum de causa immutari naturae proprietate non ignoramus. Ac ut non sine ratione hac dixisse videaris, sententiam hanc nostram acceptari posse ais, si non una hac tantum nota, sed etiam cetera consentirent, quarum cum nulla sit in nigro Chamaleone, quae illum legitimum faciat: me tandem in errore versari concludis. Sed ut hoc etiam magis probes, inquis (nescio quomodo) quod nec folia, nec caulis, nec radix, nec sapor, nec magnitudo, nec echinatum capitulum consentiunt, Carlinam alteram nigram esse Chamaleonem. Sed quid facis Maranta? an non vides in altera Carlina folia Scolimo minora, tenuiora, & rubro colore infecta? Caulem dodranalem, vel paulo longiorem non consideras? Radicem exesam, subnigram exterius, interius subflavescentem non aspicias? Saporē nō gustas? Miror sane quod Clarissimus ille Ghinus praeceptor tuus pro raphano mandis huius radices cum acetatis sapissime asserere solitus sit, & cetera adeo sensibus pateant, ut nihil sit, quod nigro non respondeat Chamaleoni, praeter echinatum capitulum, de quo etiam plura dici possint, audeas tu his omnibus contra dicere. His accedis, quod hac planta in campestribus ficit, & climosistractibus (ut Dioscorides inquit) proueniat. Sed nolo pluribus meam causam defendere, ne videar contentiose rem agere. Dicam tamen, quae mihi nigri tui Chamaleonis plantam contemplanti, sese offerunt, reuocanda. Imprimis enim dum eius umbellam examinandam mihi propono, eam quidem potius aculeatorum capitulorum globum, quae improprae siliquae a te vocatae cenfeo, quam veram umbellam representare puto. Folia deinde rubro colore variata non sunt. In caule nulla apparet rubedinis nota, nec mansa radix acre dicitur tantulum reuocata. Adde quod (ut Dioscorides inquit) exesa non sit quin etiam nec caules digitali crassitudine videantur. Quo fit, ut hisce deficientibus notis, non ita facile consentiam hunc tuum Chamaleonem

Obiectio de Oxyacantha diluitur.

Amperlum.

Censura de Lepidido & Iberide exploditur.

Draba siue Arabis caput Dioscoridi adulterinum.

Obiectio in altera Acacia diluitur.

Aspalathus.

genuinum dici debere. Nec propterea meum adeo me probare velle scias, ut si alia mihi sese offerat planta, quae magis genuinum referat, quam meum & tuum, nolim veritati acquiescere: sed quod (ni fallor) plures fortasse sint in me nota, quae legitimo correspondent. Fateor quidem umbellam illam quamquam non explicatam adlere tuo Chamaleoni nescio quid auctoritatis, sitamen cetera conuenirent, nec essent, quae adhuc in dubium vocari possunt. Dico tibi sententiam meam pro iudicii mei ratione. Quid enim tam liberum esse debet, quam suum unicuique de re quacunque iudicium? Opiniones porro inter amicos dissensio aliqua aliquando est, voluntatum vero nuncquam. Praeter hac cum non solum in praedictis me offensam a te plurimi iudicent, nec de his mihi te excusares, ne fortasse si silerem, censerent in me eos fateri errores, de quibus modo clam, modo palam me arguis: praetereunt nunc nequeo, & veritatis propalanda causa & nostrae ueritatis dignitatis, quominus de his aliquid hic euam dicam. Si itaque, imprimis demiratus, quod in Oxyacantha me non parum aberrasse putes, quoniam pro Oxyacantha fructu: com non arborem statuerim, quum tamen planta, quam ego nois omnibus ad stipulantibus Oxyacantha esse statui, arbor sit non frutex, ut in agro nostro Senensi & Tergestino, quinetiam in Lapida syluis, in Bohemia Morauia, Ungaria ac Germania videre quispiam potest. Namque, hisce in locis frequentissima visuntur Oxyacantha arbores, quae & ficus & oleas, & quandoque pyros, ac quercus proceritate & caudicis crassitudine superant. Id cum non ignorasset Clarissimus ille Lucas praeceptor tuus, uelletque probare contra sententiam meam (ut facile, si parum per memoriam refricabis, meminisse fortasse poteris) hanc arborem non esse Oxyacantham, sed aliam quandam a se inuentam: hoc contra me habebat argumentum, nimirum quod nostra Oxyacantha uiderit plantas syluestribus pyris longe maiores, cum tamen Dioscoridis testimonio, minor Oxyacantha esse debeat. Quo fit ut nesciam qua ratione tam insignem arborem fruticem feceris, quum uero in Theophrasto lib. 1. de plantarum historia ab radice, caudice multiplici, ramosumque se attoluit, ut Rubus & Paliurus, id quod nisi rarissime in nostra uideatur Oxyacantha. Quae quamquam quibusdam in locis, ut ceteris syluestribus arboribus pro soli & caeli natura euenire uidemus, aliquando pumila uideatur, plurimum tamen simplici caudice, ramosoque, & haud facile dissolubili spectatur: quae propria (Theophrasti ipsius testimonio) arborie sunt nota. An quis dixerit, contra Dioscoridis sententiam, Lentiscum, Myricam, Ligusticum, Cornum, Salicem, Myrtum, quod frequentissimo fruticose caudice, multiplici spectentur, ob id non esse arbores: cum tamen & Dioscoridis, & Theophrasto arbores sint, nec aliam ob causam fruticent quam caeli & soli natura. At tu cum fortasse aliquibus in locis Oxyacantham nostram fruticare spectaueris, eandem in uniuersam arborem esse negas. Si uero latius, ut nos, Europam quandoque peragraueris, ac Ungaria, Bohemia, & Germania syluas, exploraueris, mihi quidem uerendum non est, quin hanc sis reuocaturus sententiam. Probarem nunc Amperlum meum genuinam esse Oxyacantham, nisi id antea satis superque praestitsem in meis in Dioscoridem Commentariis. His deinde accedit uia de Lepidido & Iberide censura, qua non parum clam me mordet. Damnas enim eorum sententiam, qui duas hasce plantas uenam tantum existimant, quique caput de Iberide tanquam superuacaneum e primo Dioscoridis libro rescandam praecipunt. Aequae ut hac non temere dixisse uidearis, eos non ita libere hoc pronunciaturos fuisse, affirmas, si qua capite de Draba habentur, animaduertissent, cum hanc uelit Dioscorid. folia habere Lepididi, sed molliora & candidiora. At cum nulla sit foliorum conuenientia inter Iberim & Drabam, quod huic lata sint, illi uero angusta admodum & Nasturtii modo incisa, nulla prorsus dubitatione eos omnes, qui ita sentiunt, in magno uersari errore existimas. Ceterum cum ego una cum illis in ea perpetuo sim sententia, quod apud Dioscoridem Iberis & Lepididum nihil inter se differant, & ea de causa Iberidis caput ex primo Dioscoridis libro rescandam esse scripserim, non possum sane praetermittere, quo minus sententiam meam, quam ueram esse non ambigo euidentissimis tunc rationibus. Quod autem Iberis & Lepididum una & eadem sit planta, testatur in primis Galen. decimo de Compositione med. per genera, ante & post Iamblicum illa carmina, quae de Iberide scripsit Damocrates. Deinde hoc idem ante ipsum scriptum reliquit Archigenes & Hygicenus Hipparchus, quos postea secutus Paulus Aegineta Lepididum scripsit aliquibus Iberida appellari. His accedit Dioscorid. auctoritas, qui Lepididum herbulam, non herbam esse scribit. Id quod manifesto palam fuit, Lepididum foliis esse paruisculis ac gracilibus, non autem latis ac longis, ut in nostra uisuntur Draba. Sed magis demiratus sum, quod tu, qui tam diligentem in Dioscoride exanimando te praestitisti, non animaduertaris, Draba caput multis sane argumentis esse Dioscoridi adulterinum. Nam si huiusce planta nomenclationem expendamus, illam quidem facile coniciemus (ut Marcellus recte animaduertit) nec Graecam esse, nec Latinam appellationem. Deinde cum nec apud Galenum, nec apud Orbasium, Paulum, Aetium, aliosque, Graecos auctores quicquam de Arabi Draba scriptum reperiat, hic facile conici potest, Drabam Dioscoridis esse adulterinam. Adhuc & illud, rem sic se habere, maxime arguit, & ab aliquo Dioscoridi additam esse Drabam, quod bis in Graeco exemplari manu scripto lib. 2. habeatur, tum statim post Thlaspi, tum etiam post Glastum ad libri calcem intrusa: sed isthic Arabis appellatur, & alias isthic de ipsa traditur etiam uisdem uerbis, ut nec de nomine, nec de re satis constet, maxime cum apud nullum alium scriptorem, neque Draba, neque Arabis mentio fiat. Postremo si Draba, Arabis Dioscoridi legitima esset, cum ipse Lepididum tenuem pumilamque, statuat herbulam, persuadere quidem sibi quenuquam haudquaquam crediderim, Draba Lepididi folia tribuisse Dioscoridem. Quo fit, ut recte doctique sentiant, qui Iberidis caput ad primi libri calcem Dioscoridi accessorium putant. Porro ad ea quae de secunda Acacia aduersum meam habes sententiam, dicam ingenue quod tota planta ipsius facies pro se ipsa pugnat. Nec mihi obstat, quod Neapoli uere floret & fructum ferat aestate. Et enim praeter id, quod pro caeli & soli natura una & eadem planta hic citum, illic seruis fructum proferat, accedit Plinius auctoritas, qui scribat lib. XXIII. cap. XII. utriusque Acaciae semen colligi Autumno quod ante collectum nimio validius habeatur. Quae uerba si recte perpendantur facile quispiam hic colligere poterit ante Autumnum fructum proferre Acaciae, sed quod uis non legatur in aestate propter nimiam eius adstrictionem, nisi cum tractu temporis Autumno mite sit. Quo fit, ut scripserit Dioscorid. Acaciae hanc fructum ferre Autumno quod eotempore decerpi soleat. Hanc autem esse Aspalathum, hac tantum ratione, quod eam Spalathum uocet Graecorum uulgus non ita facile crediderim. Quippe (ut Plinius inquit capite XIIII praescripti libri) plura sunt spinarum genera, quibus Aspalathi nomen inditum est. Ideoque longe magis periculosum esse puto in cognoscendis censendisque plantis uulgaribus, uti nomen caturis quam alius euidentioribus notis, quum plurimae habeantur plantae quae ob adulterinas nomenclaturas multum negotii rei herbarie studio sis accessunt. Qui autem alterius Aspalathi faciem scripserit nomen habeo, nec qui dixerit unquam idem Aspalathi semen in

semen in fili quis proferte, Acacia modo. Quo fit ut nesciam, nec videam, qua ratione Acaciam alteram nostram
 A palatum alterum faciam. Hac abste, mi Maranta si veritatem fateri debeam, haudquaquam agre fe-
 ram. Nam cum te tanto veritatis ardore affectum esse cognoscam, & in ea promovenda occupatum, mihi qui-
 dem aliter persuadere non possum, quam quod hac, ipsius tantum veritatis zelo publice edenda curaveris, idq;
 feceris tuus ipsius genio persuasus, utpote, qui proculdubio censebas sententiam tuam longe magis, quam meam
 ad veritatem cognoscendam, conferre posse. At qui cum ego in eadem opinione iam conuenissem, essem quidam
 studis, quibus me totum iam deum applicui, omnino indignus, si vel amicorum, vel maiorum, vel etiam me i-
 psius causa ab hoc proposito deficerem. Ideoq; si nulla animi perturbatione, & tuas, & ceterorum ab opinione
 nostra dissentientes a quo sane animo accipio, non est ut posthac putem, te mihi succensere, sicuti pariter a te dis-
 sentiam. Nam cum hanc ob causam a me ipso etiam dissentissem, & ob id plura in commentariis nostris emenda-
 verim, ac etiam in posterum emendare auerere, decreverim, nec mihi ipsi pepercerim: non video, quamobrem
 aliorum errata retere non debeam (sitiam sequi debeam sententiam) cura ullam amicitia iniuriam. Hoc
 non solum nulla dubitatione haecenus te fecisse, sed etiam in posterum facturum esse, ex tua hac epistola animad-
 merito, cum non parum in illos inueharis, qui potius amicus blandis adulariq; student, quam ut veritatem decla-
 rare, & eorum errata retere. **NAM QUID TURPIUS (inquit) ESSE POTEST, QUAM
 CUM AMICO IN HIS REBUS VELLE CONSENTIRE, QUAS ALITER ES-
 SE QVISPIAM SENTIAT, AC VIDEAT? AUT QUAE MAIOR PESTIS IN
 AMICITIA ESSE POTEST, QUAM ADVLATIO, BLANDITIAE, ASSEN-
 TATIO?** Hoc ut clarius exponas, addis fidelis bonique scriptoris esse munus, ut **VERITATEM,
 QUAM PVTAAT APERTAM INEGENVE, AC LIBERE EXPLANET, NI-
 HIL FICTVM, NIHIL SIMVLATVM PROPONAT, SED IN SOLA VERI
 INQVIRITIONE ATQVE INVESTITIGATIONE TALABORET, VT NON
 TANTVM ADVERSARIVM CONVINCERE, SED VERITATEM IPSAM,
 QUAE IN PRIMIS EST HOMINIS PROPRIA, INVENIRE, AC INVEN-
 TAM ILLUSTRARE STUDEAT.** Assentiar in hoc tibi, mi Maranta, si modo hoc fiat si aterne,
 simpliciter, sincere, & citra ullam offensionis notam. Sed si hac omnia cum amico servanda sunt, considerandum
 est, an publice & in conspectu omnium, tam amicorum, quam inimicorum, an privatim & secreto amici admo-
 neri debeant. Hac si recte sancteq; iudicabimus, facile cognoscemus, sinceri veriq; amici esse munus, ut etiam de
 erratis amicis comonefaciat nec unquam publice ab eo dissentiat, quomque is tanti beneficii utilitatem sper-
 nere videatur. Hoc si feceris, ne Republica, & futura posteritas defraudetur, veritasq; occidatur licet tui
 quam posthac publice, vel ab amicis quibuscunq; assentire. Hac si fierent, non vereor, quo minus quam pluri-
 mi reperirentur, qui ab edendis aliorum erratis abstinerent. Quandoquidem si antea, quam id agerent, an di-
 rent, qua contra afferri possent argumenta, saepe evenerit posse, non ambigo, ut qui in alium scribit, esse par assent,
 eadem in re se hallucinatos agnoscerent, in qua illum aberrasse censebant. Quo postea fieret, ne tot tuorum dissen-
 sionis, tot inimicitiae inter studiosos quotidie orirentur. Sed hac ambitio facit, quam veritatem interpretantur.
 Rogas tu quidem, ut si quid tuo in libello, quod minus placeat, adnotaverim, vel a veritate ipsa abhorreant mi-
 hi usum fuerit, id tibi per priatas literas amice (ut soleo) significare velim. Sed nescio qua ratione id a me
 velis, nec qua autoritate alios publice arguere tibi licere putas, te vero clam & privatim admoneri petas. Vel-
 lem sane, mi Maranta, si possem etiam in hoc gratificari tibi: sed quo pacto, qua mea non sunt, absq; aliorum dono
 tibi condonare possem, nulla quidem mihi ratio sese offert. Condonavi tibi ex animo, que non parum fidem, hono-
 rem, & dignitatem meam offendeant, q; hac ad me tantum spectarent: sed qua ad Rempublicam spectant, tibi, vel
 alteri condonare nequeo. Nam que publice edita sunt, & ad Republicam utilitatem spectant publicis etiam de-
 fensionibus, & annotationibus indigent, ubi a quopiam claudicare deprehendantur. Sequitur itaq; ego in hoc
 institutum tuum, ne (ut tuis verbis utar) si dum amicis obblaudirer, id celarem, quod precipue a ceteris expe-
 titur. Possem & cetera, quibus ibidem tuam tueris scribendi libertatem hic in meam trahere sententiam, sed
 cum ea legi debere in Epistola tua, ab omnibus mihi persuadeam, illa omnia nunc libens pratero. Legi itaq; li-
 brum tuum a capite ad calcem, non solum ut viderem in quibus a me dissentires, sed quod ea lectio (ita me
 Deus amet) plurimum delectaret, & semper inde doctior recederem. Sed quemadmodum in pratis & usrida-
 riis, inter rosas, & amantissimos flores, & tribula, & cardui oriuntur, qui legentium manus sapenumera offendunt,
 ita pariter tuo in illo viridariolo pauca quedam offensa, qua mentem & intellectum meum pungebant. Primum
 fuit Doronicum, de quo maxime miratus sum. Nam cum omnium consensu, id non parva sit praeclarum facultate,
 ad omnes cordis affectus, ad venenatos quoscunq; ictus, ad epota venena, & pestilentes quoscunq; morbos, obstu-
 pui sine, quod illud in atrocissimum ocysimumq; permutaveris venenum, nempe in Aconitum, q; a Pardis necan-
 dis Pardalianchen Graeci vocant. Sed longe magis perturbatus sum, quod in refellendo Galeno tantopere te oc-
 cupatum invenissem, quod de Aconito illo ad tuam comprobendam opinionem non scripseris, cum tamen non solum
 Galenus tibi contradicat, sed omnes quotquot sunt authores, qui de Aconito Thelyphono scripserunt, cum Galeno
 consentiant. Dicis itaq; in primis, ut non ante hac inauditam comprobem opinionem, Aconitum Thelyphonon,
 quod Doronicum esse statuis, haustum homines quidem minime necare, nec id usquam a Dioscoride & Theophrasto fuisse
 dictum sed quod & oves, & boues, & iumenta, ac in summa quadrupedes omnes eodem die, ipsius Theophrasti au-
 toritate, interficiat, si tantum radícula vel folium genitalibus imponatur. Doctae ut tua opinionis augeas ar-
 gumentum, probare niteris eiusdem Theophrasti verbis, Thelyphonum haustum non solum hominibus nihil
 nocere, sed plurimum conferre auxilii ad Scorpionum ictus. Quibus etiam addis a Theophrasto Thelypho-
 num non Aconitum appellari, nec inter Aconita recenseri. Qua cum contra Galenum esse statuas, tibi
 illico licere putas tam gravissimi auctoris testimonium posse haud temere impugnare. Atqui considerante
 mihi & in memoriam reuocanti, qua de Venenis in sextum Dioscoridis librum sum commentatus, nulla sese
 offert ratio, qua impediat non posse homines eo necari veneno, quo boues, oves, pardi, tauri, equi, leones, ti-
 gres, ursi, lupi, elephantes, & quadrupedia omnia, quorum plura viribus homines superant. Porro si obiciat,
 fortasse reperiri venena, quo et quibusdam ab animalibus deoritur, nihil tamen illis afferant incommodi, ali-
 quibus vero eadem illico necem inferant, ut de Scornis Cicurum comedentibus scribit Galenus, tibi quisquam facile respo-
 dsbit

Doronicum etiam
 natio, non est
 Aconitum.

Aconitum the-
 phonon, Dio-
 scoridum est Mar-
 ca.

Aconitum Par-
 dalianchen ho-
 mines neque ac
 Pardos & Lupos
 necare.

debet non valere argumentum, quod hec sturnorum tantum non volatilium omnium peculiaris sit facultas. Et in eo tantum veneni genere, quod non propria facultate, sed calidi vel frigidi exuperantia sumentes interimunt. Sed aliter se habet veneni vis, qua propria sui facultate animalia omnia necat, quod huiusce generis venena haec usquam in alimentum mutari possunt, ut ea qua temperamentorum excessu venena sunt, vel esse censentur, quemadmodum comprobatur Galenus, sturnorum et anus cuiusdam Atheniensis exemplo, quae nullo modo veneno citius imdevorare consueverat. Nec valere puto ad tuam sustinendam sententiam, quod Theophrastus ad Scorpionum ictus Thelyphonum tuto propinet, cum etiam Cantbaridis ad rabiosorum canum morsus, et Necurum ad venenosorum serpentium ictus magno propinentur auxilio. Quae tamen cum lethalia sint, venena, si cupiamus alteri hisce moribus non affecto exhibeantur paulo post necem inferunt. Caterum an Theophrasti Thelyphonum non modo potum, sed genitalibus (ut ipse inquit) admodum, homine perinde ac quadrupedis omnes necare possit, docet nos apertissime Plinius, qui lib. 26. cap. 2. de Aconito illo posteritatis memoria hac qua sequuntur scripta, reliquit. Sed antiquorum curam diligentiamque, quis posset satis venerari, cum confiteri omnium venenosorum oryxisimum esse Aconitum, et tactis quoque genitalibus feminei sexus animalium eodem die inferre necem. Hoc fuit venenum quo interempta a Calphurnio Bestia uxores M. Caelii accusator obiit. Hinc illa arrox peroratio, eius in digito mortuas. Hoc quoque tamen in usum humane salutis vertere, Scorpionum ictibus aduersari experiendo datum in vino calido. Ea est natura ut hominem occidat, nisi inuenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur velut pari intus inuento. Sola hac pugna est, cum venenum in visceribus reperit, Mirumque, ex utraque ambo per se cum sint duo venena in homine commoriuntur, ut homo suae sit pars vero et ferarum remedia antiqui prodiderunt, demonstrando quomodo venena ipsa sanentur. Torpescent Scorpionis Aconitum et stupentque pallentes et vincit se confitentur. Auxiliatur eis Helleborum albu adhaeresoluenne Cedruq, Aconitum duobus malis, suo et omnium. Quod si quis illa ab homine excogitari potum, se credit, ingratis Deorum munera intelligit. Tangunt carnes Aconito necantque gustu earum Pantheras, nisi hoc fieret, repletur asinus. Ob id quidem Pardalianches appellauerunt. Haec tamen de Aconito Pardalianche Plin, cuius verba si recte expendas, non magno sane negotio cognoscas claudicare in hoc sententiam tuam, cum de ipso tantum Thelyphonum Theophr. haec scripserit. Plin. Haec, inquit, si expendas, non parua sane iniuriate Gal. affici se fateberis. Quippe qui lib. 6. de simpl. med. fac. Aconitum Pardalianche, inquit, putrefacendi fac. obtinere, et lethale esse med. ante istud, ideoque in cibo potuque, fugiendum Prateribo Dioscor. Pauli, Aetii, et Auicenna testimonia, qua tibi maxime aduersantur, cum notiora sane sint, quam a nobis describi mereatur. Nam hi omnes inter venena huiusce Aconiti meminere. Nec placet deinde quod scripseris non aliam ob causam huiusce Aconiti meminisse Dioscor. quam quod palam faceret eo necari Pantheras, Lupos et cetera quadrupedia, quae illud deuorant. Siquidem cum nonnulla sint animalium horum partes, quibus ad varios morbos utimur, affirmas hanc doctrinam existima, se Dioscor. non fore Med. cui inuisile quod obiecto quadrupedibus hisce feris Aconito una cum carne sine alio venenationis negotio ea consequi possent. Atqui docere Med. eos hac animalia veneni interficere, ut post hac eorum partibus utantur ad morbos profligandos, ab omni profusa ratione videtur alienum, cum animalia a serpente uicta vel veneno interempta ubique corruptantur. Et praesertim ubi Aconitum deuorauerint, cui magna vis inest putrefactoria: quemadmodum et ceteris quoque propria facultate sumentes interimunt. Quo fit ut canis, qui caudam veneno interempta vorauerit, in ab emagantur. Proinde animalia qua in usum Medicum trahendae sunt haec quae veneno necari debent. Ego vero cum mihi persuadeam hoc haudquaquam ignorasse Dioscor. id nullam aliam ob causam eum manifestasse censeo, quam ut tam noxia pecori, hominisque animalia facile e mediocritererentur, et ne eorum exiret numerus. In qua sententia me maxime confirmat Plin. ut patet qui loco superius citato in fieri carnes Aconito aut Pantheris obducendas ne situs ac regiones illis replerentur. Possremo si nostris argumentis acquiescere nolueris, quae tamen difficile crediderim, quod non ambigam te hominem esse rationabile, facito huiusce noui Aconiti periculum. Hoc si feceris, illico procul dubio in nostram concedes sententiam. Nam et si sexcentos vulgariu Doronicorum modios hoc in negotio consumpseris, nunquam tamen Pantheras vel Lupos necabis. Canis meus deuorata Doronicorum rescuncta longe alacrior factus est. Adhuc quod legimus Aristoteli Doronicum ex tertio esse excalfaciendum et siccamium censu, eandem temperamenti naturam habere scribitur quod fortasse putes Doronicum, quo Arabes seruire, nihil a vulgari prostrate differre. Sed aliter rem se habere maxime polliceor gustus. Nulla enim alia in eo percipitur qualitas, quam mediocri dulcedo omni profusa ac redine vacans Cuius tamen dulcedo nullum est inter Arabas, qui meminere. Praeter id non parum in Cneoro ate dissentire cogor quod cum quibusdam censeas, Theophrasto nil aliud designare Cneoro, quam Thymelaam et Chamelaam. Nam Thymelaam praeter id quod nusquam folia odorata sunt, sed potius si digni fuerint viro odor reddant radice grandis non est neque alte descendens quemadmodum nec Thymelaam. Nec humi Chamelaam procumbit nec floret post equinoctium Autumni, sed vere ipso inchoante. Adhuc Cneoron nigru, quod Thymelaam esse arbitraris folio est Myrica, quod quantum a Thymelaam folio absit, id facile iam diuisere non ambigo. His altera accedit ratio, quod nullum sit inter Thymelaam et Chamelaam coloris discrimen quoniam nigra altera appellari debeat altera vero alba. Deinde Cneori folia olim in coronis venissetantur Plin. Ad quod maximo est argumento ut non alia de causa quam odoris coronas ex Cneoro parasset antiquitas. Hinc fit, ut mihi persuadeam Casiam nil aliud Vergilio in Bucolicis designare quam Cneoron. Ibi enim non de Casia arbore scribit Vergilius, sed de herba odorata, quae a Naiade in corollis necebat, ut facile testatur hoc carmen.

Plinius de Aconito.

Galenus defendit.

Animalia, quae in ueneno ueniunt haudquaquam veneno necanda.

Doronicum non esse venenosum.

Cneoron nec Thymelaam, nec Chamelaam esse.

Casia Vergilii est Cneoron.

Tum Casia atque aliis intertextis sauiibus herbis.

Gaidium granum

NAM et Iginus (ut Plin. est autor) Cneoron Casiam uocat. At qui tu haud recte, quantum videtur Cneoron Casiam a Theophr. vocari ait, cum id fecerit Gaza Theophrasto nesciente. Praeterea cum antiquorum omnium consensu Gaidium granum a Thymelaam proueniat, putandum mihi non est, id ignorasse Theophrastum qui de Cneoro esse Thymelaam cum diligenter admodum Cneori historiam describat, non possum a thymelaam credendum, quin de Cneori bacca ubi aliquid meminisset. Meminit tamen in Gaidium granum ubi nihil praeter de Cneoro scripsit reliquit. Ceterum non negaverim, ob id Dioscor. Thymelaam, et Galen. lib. 9. cap. 1. de compositione medicamentorum per genera, Chamelaam appellari. Sed contra affirmaverim, Theo-

- Theophrasti Cneoron & Galeni & Dioscoridis Cneoro plurimum distare. Has Cneori differentias proculdubio noui Plinius, quippe, qui Galeni & Dioscoridis Cneori meminit, libr. 23. cap. 21. & in hoc Cnidium granum oritur. De Theophrasti uero Cneoro egit libr. 21. cap. 9. inter odoratas plantas, quibus ad coronas crebatur antiquitas, & Casiam appellari Igino scribit. Plura enim sunt plantarum nomina, quae pluribus conueniunt plantis. Sed cum hac haud tuleret, etiam, ne Minervam fortasse docere uidear, pluribus ea declarare non libet. Adhuc in Zingibere maxime tibi refragatur Plinius. Nam ubi tu arboris radicem Zingiber esse asserueras, sic de Zingibere & Piperis scribens, libr. 12. cap. 7. Non est, inquit, Piperis radix, quod uocant Zingiberis, alius uero Zingiberis, quae uisus sapore simile. Idem in Arabia & Troglodytica nascitur regione in uillis, parua herba, radice candida, celenter ea cariem sentit, quamuis in tanta acritudine. Id quod pariter testatur Lusitanus: & alii qui in locis ubi Zingiber nascitur, & magna colitur diligentia. Sed ad Tio-
- 10 las albas Iasme ueniamus. In quibus cen, in Iasme etiam a me aperitissime dissentis. Putas enim tu haudquaquam tibi de albis Leucosi floribus intellexisse Dioscoridem, sed de his, quae uulgo appellamus Gelsimini. Ac quoniam ego scripseram, si de uulgaris Gelsimino intellexisset is, haudquaquam pratermississet, quo minus de eo alicubi scripsisset, & historiam, & vires, cum planta sit uiribus, non obscuris reserta, aperte sententiam nostram impugnare uideris, cum inquis non esse hoc firmum argumentum, cum Dioscorides multorum simplicium mentionem fecerit, nempe Thuis arboris, Buxi, Aegyptia spina, Stybi, Amomis, Hirculi herba, syluestris Lin: Pyracantha & nonnullorum quorundam, quorum nec vires, nec historiam descripsit. Idque ea tantum de causa feci, se illum asserens, quod in medicum usum haec nusquam ueniant, & alius, quam in Medicina, operibus deseruiant. Sed nescio profecto, mi Maranta, quo suadente genio haec scripseris tu, quae tam diligenter
- 20 in Dioscoride uersatus esse uideris, cum Aegyptia spina & Stybium in multiplici medicamentorum usu, ipsi Dioscoridi habeantur. Sed id sine magnam in admirationem me duxit, quod uiderim te nulla dubitatione affirmasse, Aegyptia spina & Stybi historiam nusquam scripsisse Dioscoridem, qui tamen de Stybio libr. 5. proprium describit Caput. Et pariter de Aegyptia spina libr. 1. capite de Acacia, quae nil aliud est, quam spina Aegyptia quemadmodum declarat ipsemet Dioscorides his uerbis. Acacia in Aegypto nascitur spina instar arboris sicutifera, non se in rectum attollens: florem habet candidum, & semen Lupino simile in folliculis, ex quo fructus expressus siccatur in umbra. Spina decoctum solutos artus totum commutit, &c. Sed quod magis est tua ipsius uerba contra te pugnare uidentur. Nam si, ut inquis, Thuis, Buxi, Hirculi & ceterarum, quas meministi plantarum, historiam non descripsit Dioscorides, quod haec in Medicam usum nusquam ueniant, nescio profecto, cur tibi persuaseris eadem de causa Gelsimini historiam, non descripsisse illum, cum hoc ad
- 30 multa uile habeatur, & ipsemet Dioscorides scribat, Iasmenum prater id, quod odori suauitatem toti corpori conciliat, ea corpora iuuare, quae ex caliditate laxationemque desiderant, & toti corpori conuenire, cum in balneas descensum est. Non asseram nunc, in quam multiplicem medicamentorum usum ueniat, apud Arabas, quod haec longe antea te scire, non ambigam. Posses quidem hic plura recensere argumenta, quae me inducant ad credendum Leucosi floribus, non Gelsimini Iasmenum parasse Persas, nisi de re hac fusius differuissem, tum in Epistolis. Scio Atticis Leucosum appellari Iasme, quo fit, ut a mea dimoueri non possit, in opinione. Quod uero Dictamnium, ut scribis contra Dioscoridis & Theophrasti sententiam, non solum in Creta nascatur, sed in aliis etiam regionibus, non tibi facile concedo. Nam tametsi ex semine a Creta allato Pisis, in hoc Gbini prouenerit Dictamnium, id tamen nil Theophrasto & Dioscoridi detrahit, quum illi de Dictamno sponte proueniente scribant, non de satiuo, cuius semen a Creta fuerit allatum. Plinius post in Persica arbore
- 40 sequitur, una cum illo implicatus uideris: quippe qui dicas Persicam arborem in Aegypto & locis proximis fructificare, quauquam in Rhodo usque ad iorem duntaxat deuenit. Haec enim de Persica Aegyptia intelligenda sunt, non de Persica nostrate, quae Rhodus ubique abundat fructu nostrate, longe fortasse maiore sapidioreque. Quinetiam in Myrrha a te dissentire cogor, ubi Myrrham tenes, non esse odoratam, nisi fortasse incensa suffiat, quemadmodum & Thuis & Agallochum, quae tamen mihi diligentius expendenti, etsi non trantur, aperitissime odorem reddunt. Aique Myrrham quoque esse, per se odoratam, id maximo est argumentum, quod statte, quae Myrrha tantum pinguedine est, adeo sit odorata, ut eam per se tantum nullo addito odoramento, unguentum facere scribat Dioscorides. Neque aliam ob causam Myrrham in unguento Amaracino, Cinnamomino, Malabathrico, frino, Cyprino & aliis nonnullis addebat antiquitas, quam odoris conciliandi gratia. Id quod facile comprobatur ipsius Dioscoridis testimonio, in unguenti Nardini apparatus, ubi sic habet. Iuncus odoratus spissamētis gratia adicitur, sicut propter odoris suauitatem, Costus, Amomum, Nardus, Myrrha, Balsamum, & in Cinnamomi confectioe iudatur, inquit, non acre, molli odore Myrrham redolens. Id quod etiam aliis in unguentis repetit. Nam cum antiqui Moscho, Ambaro, Zibetis, uocato destituerentur, Myrrha, Balsamo, Amomo, Costo, Nardo, Cinnamomo, ad odorata unguenta paranda semper usi sunt. Dioscoridis subscribit Galenus libr. 1. de Antidotis, ubi sineam Myrrham maxime bene olerē scribit. Iam libro primo, capite quinto, de comp. medicament. per locas, de medicamentis agens, quae pilos attenuant, Myrrham eis interponi iubet, ut odoratiora reddantur. Idem praterea reperio posteritatis memoria commendasse Plinium, quae tamen in tua opinionis testimonium affert. Si quidem is libr. 12. cap. 15. Cetero passim, inquit, e uulgo coempta Myrrham in folles confarciant, ipsiq; unguentarij digerunt haud difficulter odoris atq; pinguedinis argumentis. Item libr. 13. cap. ubi ea quae in Nardini unguentum ueniunt, recenset. Omnia autē,
- 60 aut, (unguenta intellige) acutiora sunt Costo, Amomo, quae maxime nares ferunt, crassiora Myrrham, suauioraq; Et paulo post inquit, Myrrham & per se unguentum, acit sine oleo, statte duntaxat. Sed & Agallochum esse odoratum, etsi minime suffiat, id maximo est argumentum quod scribat Dioscorides, mande Agallochum, uel eius decoctio os collis commendandi balui gratia, ea quidem ratione, quae quidam hoc auo Moschum quibusdam confectioibus mixtum cotidie mandunt aduersus crisi graueolentia. Testatur item Agallochum odoratissimum esse Lusitanus, qui in Meridiem & Orientem nauigant, quique eius uiderunt plantas, ut fuis in cōmentariis nostris diximus. Betonicam quoque, quae passim utimur in medicamentis haec odoratam esse scribis libr. 2. cap. 5. nisi digitus atteratur, cum tamen nusquam illam integram nec digitis attritam in odoratam reperimus. Catanances subinde radicem improprie in terram flecti & contrahi in formam milui exanimati scribere uideris quod scribat Dioscorides adeo flecti Catanances radicem, ut milui exanimati unguis, non miluum

Zingiber nō esse Piperis radicem.

Gelsimini & Leucosi examinatio.

Opinio, quod Dictamnium alibi, quam in Creta proueniat ex plota.

Perleim a Persica differre.

Myrrham odoratam esse, etiam non suffiat.

Agallochū odorem reddere & si non suffiat.

Betonica.

Catanance.

ipsum totum referat. Qui Plinium acculant, quod Sisybrium in Calamintham mutari scribat contra Theophrasti sententiam, haud recte (meo quidem iudicio) faciunt, cum id erroris deprauata lectio non Plinio sit adscribendum. Præter id enim, quod in antiquissimo Pliniano exemplari legam ego in Mentham, non in Calamintham degenerare Sisybrium, quis non videt Plinium ex Theophrasto transcripsisse? Quippe Theophrasto vero Calamintham referre. Namque facies non immutat plantarum sapes, neque facultates. Videris in Galiopsi & in Primula Veris, quam quidam herbam Paralysis vocant, etiam a me dissentire, sed cum id abs te fiat infirmis satis argumentis, sat in re hac mea Cōmentaria tibi respondere arbitror. Hortensis Solani fructū nigricantem aut fuluescentem facere Dioscor. censet, quod nunquam vere niger, neq. vere fuluus videatur. At ego aliter rem intelligo: cum Hortense Solanum modo fructu nigro, modo rufescente, modo ex viridi nigricante sapissime viderim. Sapiam tuam verbenacam, perquam libentissime spectarem, quam non longe a Bitontis Apulia a te inuentam scribis. Verū cum Dioscoride teste ea singulari rario plurimum constare debeat altitudine, non ita facile tecum sentiam, quum tua ramulos plures adscribas, qui tribuli terrestris modo humi repunt. Etenim reperere hanc nusquam scribit Dioscorides, sed ramū dodrantis altitudine proferre. Eruum sanguinem per urinam ducere non posse, nisi frequenter copioseq. sumatur, tecum sentio, sed in eo quod venena non interficiant, nec suam (ut tu ipse inquis) ostendent ferocitatem nisi certa quadam mensura accipiantur, prorsus a te dissentire me cogit ipsa veritatis ratio. Siquidē tamen si nonnulla reperiantur venena, qua nisi certa quadam quantitate pota non interficiunt, ut Cicuta, Meconium, Euphorbium, & alia plura, que tantū venena sunt ob calidarum frigidarumq. qualitatum exuperantiam, sunt tamen quam plurima, que propria sua facultate, vel (ut alii dicunt) propria forma enecant. Etenim hac quanquā pauca admodum quantitate sumuntur, ut vix sentiantur, tanta tamen est eorum malefica atroxq. vis, ut breui temporis spatio tantum augentur dum in seipsa corporis humiditatem conuertunt, ut postea breui temporis momento sumentes in necem trahant: Huiusce classis sunt Acozita omnia, Toxicum, Napellus, & alia id genus plura. At qui si hac tantum a me ipso putas excogitata, audi quæso Galenum, qui lib. 1. de semine hoc idem testatur his verbis. Qua ratione etiam minima particula humoris lethalium venenorum, que deleteria appellant, ubi animalis corpus ingressa fuerit totum id momento temporis immutat. sibiq. simili affectione alterat: non secus fit curatio, que per venenorum remedia & antidota adhibet, &c. Et lib. 5. cap. 19. de simplicium medicamentorum facultatibus. At medicamenta, inquit, que tota essentia nobis contraria sunt, proinde si vel minimum eorum assumptum fuerit, omnino ledat necesse est. Item lib. 3. cap. 22. Medicamenta erodentia, inquit, & putrefacientia, etsi in quantitate minima sumantur, omnino tamen corrumpunt, quia videlicet que putredini obnoxia sunt calore humiditateq. putrescere solent. At qui calidus humidusq. sanguis est, itaq. putrescere nunquam cessare possunt. Proinde longo post tempore etiam a quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum, que crassa terrenaque essentia habentur. Hac Gal. Quibus palam est, uniuersalem hanc tuam propositionem nihil pro te concludere posse. Citrii mali corticem & semina nulla dubitatione esse calida, & eorum acidum succum frigidum una tecum affirmo, Sed in Ono non parum a te dissentio, cuius album contrariam fere vitello facultatem possidere ais. In hanc sententiam me adducit Gal. lib. 11. de simplicium medicamentorum facultatibus, ubi sic habet. Temperatura porro Ouorum album symmetro frigidum est: itaq. eo utendum, non tantum ad oculos, verum etiā ad alia omnia, que medicamenta requirunt suauissima, minimeq. mordacia, ut sunt uniuersa sedis ac pudendorum ulcera contumacia: sed iu miscetur que absq. morsu ea possunt desiccare. Porro & ipse vitellus assimilis est nature. Hac ille. Iuniperi baccas & folia, & fraxini etiam frondes ad quasdam affectiones valere intus sumpta scribis a Dioscoride doceri, verum si utriusq. arboris ligni ramenta deuorentur, perniciem asferre. Sed ut priora esse vera non ambigimus, ita posteriora suspecta censemus. Etenim cum Galen. Paulus & Serapio, qui ex Dioscoride transcribunt, nunquam huiusce fabula meminerint, nec ratio ipsa consentiat, non est quod prohibeat, quominus credendum sit, Dioscoridis codici subesse mendam, præsertim cum non desint Græca exemplaria manuscripta, in quibus Iuniperi caput ubiq. fere deprauatum legitur. Id quod etiam de Fraxine ligni scobe censendum puto, cum id non affirmet Dioscorides, sed ita aliquibus tradi ait. Cateris hoc adiungere libuit, quod non placeant comparationes, que cum suspectis sunt lectionibus.

Hæc itaq. sunt, mi doctissime Maranta, que tuo in illo viridariolo senticosæ nobis visa sunt & inde erandanda putamus. Atque tamen si de his mentem tibi propalam iudicium, nolim tamen hæc tanquam ab Oraculo prolata accipias, sed tanquam ab homine amico, qui non ambitione, non inuidia, non petulantia, non iniuria vindicanda, non tua impugnanda doctrina, nec sua promouenda opinionis causa, sed veritatis propaganda & seruanda posteritatis ad te scribat. Dixi tibi sententiam meam, que unicuique libera esse debet, amabilius sane verbis, pacatissimiq. animi affectibus. Quinetiam omni seposita mentis perturbatione, citra omnem inuidiam, & sermonis asperitatem, causam meam abs te pluribus oppugnatam argumentis, leniter humaniterq. defendi. Sed inuitus sane (ita me Deus amet) & præter animi voluntatem in hanc deueni disputationem. Inuitus, inquam, quod cum amicis haudquaquam certare soleam, quum vix tam leue, humanumque certamen ullum esse possit, quod aliquid vel lesionis, vel emulationis non afferat. Atqui omnes, ni fallor, huiusce facti culpam in te reiciunt, qui tuam illam Methodum legerunt, & hanc tuam Epistolam intuebuntur. Siquidem ubi animaduertent, quod non solum eo in libello & fidem nostram laferis, & scripta pluribus in locis impugnaveris: sed quod hæc etiam in Epistola dum te ab illata mihi iniuria pluribus modis excusare niteris, tuam opinionem tueri, nec tantillum quidem a priori ds moueris sententia, imo Epistola ipsa ad respondendum me provocas, non vercor, quin illico iudicent, tua tantum ipsius violentia me in certamen hoc esse adductum. Quanquam autem libelli illius amarisculis quibusdam argumentis mihi insensus indicareris ab omnibus, sed tamen nihil me ad scribendum in te mouebat, quod non defuturos sperarem, qui vel causam meam defendendam susciperent, vel de illata mihi iniuria (ut prudens tuus ille Pisanus) te admonerent. Sed longe abster se habet Epistola tua argumentum, quippe quod Epistola qualibet responsum petere videatur. Inhumanum enim atque illiberalis animi crimen esse putant, probi ac sinceri homines, ubi quispiam acceptis libris non respondeat. Sed nescio profecto, an huiusce facti culpam in te reicere debeam, an in illos fortasse quibus libellum videndū, examinandum ac emendandum commiseras, an vero in utrosq. id erroris reiciam. Porro

Plinii locus refutatus.

Galiopsi & Primula veris.

Solanum hortense. Verbenaca supina.

Eruum.

Opinio de venenis explosa.

Citrii mali qualitas. Ouorum temperatura.

Juniperini ligni, fraxineiq. scobis non esse venenosam.

- Porro si veritatem fateri debeam, dolo sane plurimum, & tua, & mea sortis eventum, quod tua tam male referit opinio, & cogar ego cum amico certare, ni velim inhumanus, illiberalis, indoctus, negligens, dignitatis honorisq; mes contemptor ab omnibus haberi. Sed quum, ut apprime doctus & eruditus, ita prudens ac pius a me habeatur, nihil mihi verendum est, quominus hac omnia amabiliter suscipias, & certaminis nostri causam abs te ortam agnoscas. Quod ut facias rogo, atque etiam obsecro, ne nostris laboribus invidentes, dissensionibus nostris latentur. Polliceor tibi, mi Maranta, non modo me nihil unquam facturum, sed ne cogitarum quidem, quod amicitia nostra vinculum rescindere valeat. Sum enim tui amantissimus & honoris tuique fama studiosissimus. Id quod multi docti viri, quorum hic consuetudine fruor, attestari possunt. Nam demonstrantibus illis, quatenus in libello aduersum me habes, suadentibusq;, ut acerbam aliquam in te ederem Apologiam, non solum eorum suasionibus morem gerere recusavi, & cum eis pro te pluribus disputavi argumentis, sed laborem illum tuum, & illis, & ceteris, quibuscumq; laudibus non minimis promouendum curavi. Ad te amandum promouendumq; excitavi primum Lucæ Ghini preceptoris tui de tua singulari eruditione testimonium: deinde vero virtus tua ac doctrina, tuiq; utiles in Medica materia labores, quibus pro virili futuram posteritatem iuuare niteris. Quamobrem audebo te hortari, ut manea perpetuo in sententia. Tui illius Methodi lectione (et antea fassus sum) mirum in modum sum delectatus, & ingenii tui acumen admiratus, quo fit, ut etiam longe magis me delectari posthac putem Commentariis tuis in Dioscoridem editis, quod maiori iudicio maioriq; fortasse diligentia hac esse edita putem. Utinam tam essem doctrina & eloquentia praeclatus, ut tibi auxilium aliquid consilium hoc in negotio prestare possem, facerem quidem id ex animo, tanta tua iuuanda doctrina est mihi voluntas. Sed cum ad hoc munus obeundum in idoneum me esse intelligam, & itineris distantia hanc meam erga te impediatur voluntatem, rogo atque etiam obsecro, ut animum hunc meum boni consulas. At quoniam eiusdem te esse in me voluntatis mihi certo persuadeo, cum sciam istuc in toto Regno haberi montes, maria & vales, quinetiam viridaria, in quibus rara ac utiles virescunt planta, velim ut pro tua singulari humanitate, ea omnia, qua nostra Commentaria augere illustrareq; posse censebis, ad me mittere non dedigneris. Quod te facturum omnino spero. Nam si tuam respexeris probitatem, & animi ingenuitatem liberalitatemq;, hac omnia tibi facile persuadebunt, ut illico votis meis satisfacere studeas. Si deinde meum in re hac desiderium etiam considerabis, illico cognosces haberi fortasse neminem, qui me dignior sit, cui hac largiri debeas. Nulli enim hac concedere poteris, qui tui nominis laudes magis extollat, qui diligentius suis in libris collocet & appingat, qui que hac omnia maioribus preconis tibi accepta referat, quam MATTHIOLVS. Tam honestam petitionem pluribus ab amico optimo exigere suasionibus operapretium non est, ne videar quasi vel factis argumentis, vel melliflua quadam verborum dulcedine, ea ab ipso extorquere velle, qua tantum eius benevolentia ac liberalitate consequi desidero. De cetero sat recte nos valemus, tamesi ingrauescente iam aetate, non desint quandoque senectutis incommoda. Sed hac feremus forti animo. Vale. Praga.

ANDREAS DE BLAVVEN MEDICVS,
Petro Andree Matthiolo, S. P. D.

Agitur de multiplici auri potabilis parandi ratione.

- 40 **S**apius ego, Prestantissime Matthiolo, sum admiratus plurimos aetatis nostrae summos & clarissimos Medicos, naturaque indagatores acerrimos: qui cum in materia medica cognoscenda, & explicanda plurimum nauarint opera & laboris, interea tamen aurea illius aqua, magni in primis & nunquam satis laudati remedii, mentionem omnino nullam faciant, quam tamen adeo nobis commendarunt ex veteribus quidam, ut ceteris eam omnibus medicamentis facile praetulerint, quippe qua vires, ut ut ille langueant, restituantur in tantum, ut reiuuescere utentes, vigoremq; inde incredibilem facultatum omnium corporis recipere videantur. Eius rei causam, an in difficultatem eius aqua paranda, quod in conficiendo chymicos labores requirat, quos pauci sciunt, vel tanquam sordidos abhorrent, an in auaritiam & sumptuum parsimoniam referam, dubito. Complures certe esse scio, qui cum ipsi remissa arduam, vel ignaua, vel mentis hebetudine non valuerint assequi, conatus in ea aliorum industriarum hominum sumptuose contemnunt & eleuent. Quorum ego impudentem & insciam temeritatem deplorans, mihi ipsi gratulor, quod in huius Sereniss. Principis nostri seruitium adscitus sim, nimirum quod in deo mihi tecum, quem in secretioribus istis remediis parandis iudicio & usu plurimum posse constat, de huius & aliis familiariter conferendi & coram vobis differendi sit data occasio.

- 50 Ex notitia enim inter nos per triennium hoc indies conuersando quam familiarissime contracta, me non laetet, te utcumque scribendi studio & aliis curis occupatissimum, furtinarum tamen horarum quicquid est, ut plurimum rarioribus hisce parandis medicinis tribuere, teque his adeo affici, ut laborum nihil propriis etiam manibus peragendum subterfugas. Alunt fouentque conatus nostros socii studiorum, itaque & ego tuo exemplo maiore diligentia in arcanam illam parandorum medicamentorum rationem incubui. Qua autem de auro potabili diuturna inquisitione, varia lectione longaque experientia, nec sine magnis sumptibus comperi haecenus, ea libuit coram te hoc loco referre: non ut te docerem, quod ignorares, sed ut hoc modo aliquid elicerem, quo ipse eruditior redderem.

Porro nostri varias esse a diuersis excogitatas rationes, quibus in liquorem potabilem aurum reducere conati fuerunt. Sunt enim qui illud aqua, quas a vehementi corrosione fortes dicunt, in aqua resolunt. Parantur Primus dissolue. ista vulgo Chymicus ex Salis nitri una parte & dupla Chalcanti. Separatur his aurum ab argento, ideoq; Sepa- di auri modus per aquam fortem. trices aquas vocant. dissoluitur enim argentum in aqua, aurum vero subsidet in fundo palustri sculo nigro simile. Si quis prioribus addiderit quartam partem Salis Ammoniaci, paratq; ut prius, habebit aquam, quam Regiam Au. Aqua Regia- risabri & Chymicus appellat. Subsides separando in hac argentum calce simile, liquefit vero aurum in aqua vere auri fulgentis nudi, coloris. Sed ne quis hac utatur, unico canendum: viscera enim omnia excederet. Habet Phi-

Alius soluendi
Auri modus.

Aurum dissolui
cranei humani
satis.

Humanorū ca-
pillorum ad du-
cilia reddenda
metalla magna
vis.

Auri potabilis
simplicissima
conficiendi ra-
tio.

lippius *Vistadius* descriptionem auri potabilis, quod *Joannem de Toletis*, & *Hugonem*, ambos Cardinales, in omnibus ferculis surpassasse, & pro maximo thesauro habuisse dicit. Exurit in aqua, qua soluitur, est positionem, non tantum sulniri, & *Ammoniacum*, sed & *Mercurius sublimatus*, quibus, cum summe sint corrosius, nec veneno carentia, nullo pacto utendum consulerem. Nec tūcūm propterea, sed ne ventriculus auro obducatur, verendum. Inficit enim illa aqua omnia, qua attingit, pro varietate rerum, quibus est commixta, auri si auro, nigro colore, si argento, vel *Mercurio vivo*, viridi si cupro, &c. Excogitavit ille quidem quicumque eius fuerit author, rationem non admodum ineptam, malignitatem eius adimēdi, qua scilicet aquam illam rodentem, iterum destillando ab auro soluto abstracturum se sperat, ut in fundo bulyro simile remaneat aurum: sed ipsius aqua fortis, salis praesertim *Ammoniaci* & *Mercurii* tanta est vis corrosiva & venenosa, ut frustra se quis ea a remanente auro separaturum speret: maxime vero ipsum argentum vivum, quod libentissime, & facillime cum Auro unitur & remanet, sicut etiam utcumque liquidum sit, & tactui cedat, solum in se aurum recipit, reliquis omnibus renitens. Aqua ego calida distillata potius materiam infundere, sepiusq; abluere tentarem, qua proculdubio falsedo illa, & forte vis venenosa promptius auferretur. Alioquin huiusce creditae medicinae, cum tantis venenis preparata, usum non temere tentandum, nec admittendum esse constat. Alios ego novi, modumque conficiendi habeo, qui ex priori parte cranei humani calcinata, ad *Cristallinum*, ac *Diaphanum* sal redutta, quod te quoque vidisse puto, se Aurum potabile conflare posse sperant, sed utrum confecerint, nescio. Utinamque verores hac se habeat, omnino ut sal ex craneo paretur, oportet. Cum autem Salium nativorum copia nobis suppediet, & aequae ex aliis rebus omnibus combustis Sal confici possit, quid ipsos ad Cranei potissimum inquisitionem commoverit, miror. Recordor ego quidem *Alberti de mineralibus* dictum, ubi asserit magnam inesse virtutem mineralem capillis humanis, illis praesertim qui de capite abscinduntur, suorum tempore visum, & inuentum esse Craneum hominis, quod inter dentes sutura superioris partes multas aures pulveris habuerit admixtas. Scio quoque *Gebrum* (qui solus fere, ex ipsius natura principis Chymiam tradidit, quemq; ob hoc artis illius studiosi tanquam *Aristarchum* suum adhaerentur) oleum quoddam ex capillis humanis pro inceratione, ut loquuntur seu preparatione ad faciliorem praefactionem metallorum mire commendare. Sed detur ipsos aliquid eo efficere, tamen ratio hac preparandi valde remota & longinqua videtur, cum alia multa reperiantur, qua per se id ipsum praestant, ad quod craneum vix multo tempore perducipotest. Idque eo magis, quod sal istud conficiendo, ut experti sunt qui illud parare tentarunt, craneum dum eximitur tetrosuo, & maxime fatenti odore (ut comburendo ossa pleraque solent) graviter naribus feriat, omnemque ambientem inficiat aerem. Habeo porro *Argentinenis* cuiusdam Medicis rationem conficiendi Aurum potabile, ex solo Auro, absque vili re alia addita praeter ignis vim, quem lege artis Chymica, Aurum per *Sybiūm* expurgatū, & in tenuissimas laminas redactum, ac vasculis ad hoc idoneis, libere, ne sese usquam lamina contingant appensum, dum exurit & calcinatur, in fornace ad hoc debite parata per medium annum quam ferventissimum sustinere oportet, quousque tandem lamina illa Aurea illinc exempta, libero & frigidior: exponantur aeri, & oleosus quidam humor inde destuat & resoluatur rubei coloris, sapore subdulci. Eliciebat autem ille ex libra una auri ad uncias duas olei. Sin vero, quod igne fortassis non undiq; pariter fuerit aurum exustum, minus prompte liquor ille destuat, spiritum vini rectificatum aliquoties infundere solent, idque tam diu adeoque saepe reiterare, donec omnis ille color fulgens extraheretur, aurique pulvere subalbo in fundo relicto nihil porro coloris auri spiritus ille, vini inde reciperet. Quam subtilissime vero hosce spiritus, vel quinam essentiam rectificabis. si eam in cucurbita vitrea sub alembico, praeposito recipiente, in gelidissimam, vel niue refrigeratam fontis aquam impones, ipsum capellū panno lineo in aqua calidore imbuto undique teget. Per autem praesertim partes illa tenuiores & subtiliores sursum feruntur, aqueis in fundo relicti. Hoc, inquam, vinum auro, ut dixi, calcinato infusum, & per alembicum denuo destillatum, in fundo post se relinquit eundem illum subrubentem liquorem, aurum scilicet potabile: quo se & alios ad multos annos saluum & incolumem conseruisse Medicus ille dicitur. Solebat ille, per purgandum prius corpore, raso & calefacto vertice capitis, drachmam unam eius affundere, ac tantumdem in maluatico bibendum exhibere. Neque vero hac eius preparandi ratio, adeo absorta videtur, cum & experientia confirmet, & *Geber Chymicorum Princeps* libro tertio capite sexagesimo tertio asserat: Metallica corpora omnia vere calcinata solui per reiterationem calcinationis, rationem subiungens, quod omnia calcinata ad naturam salium, vel aluminum accedant. Hunc auri potabilis conficiendi modum maxime probavit *Generosus* & *Magnificus Comes Iulius ab Hardeck* &c. *Serenissimi Principis nostri Mareschalcus, Maecenas mihi summus*, qui sumptibus faciendis, & sedulo studio secretiora illa, igne parata remedia inquirendi, nemini cedit, cum pra aliis modis hic sibi placeret, maioremque spem faceret. & securus eo utendi & magis conferendi humanae salutis, quod liquor ille auro absque alio (ut alii solent) corrosivo addito pararetur. Itaque laborē suscipi curavit, eoque ad viginti Septimanas progressus: ad ducentas vlnas maiores, quaternos cubitos capientes, lignorum insumpsit.

Sed fato nescio quo contigit, ut artifex operis vita excedens, opus reliquerit imperfectum. Quod licet in primis, tanquam destruxerit, & in absolutum opus, *Magnificus Comes* negligeret, elapsis tamen aliquot diebus videndi eius desiderio allectus, vasculis exemptis, inuenit ferramenta quaedam, pro sustinenda fornace parata, aureis maculis passim conspersa, qua utraque ipsorum facie, etsi latum digitum crassitudine excederent, apparebant, atque adeo quia illas laminis decedentes ferrum totum penetrasse videre licebat. Sicut ad hunc usque diem videre est ferramenta ista ob hoc, a *Magnifico Comite* asseruata. Unde proculdubio facile credendum, cum guttule istae calore decedentes partium tenuitate, ferrum penetrarint, in humano corpore longe facilius, ad omnia vasa deferris posse. Sed lignorum penuria, & laboris diurnitas haecenus, quo minus denuo pararetur, obstuit. Vidimus uterque nostrum simul & gustauimus aquam illam, *Serenissimi Principis nostri* iussu, nobis & *Doctori Gallo* praclare memoria, pro auro potabili ostensam, qua a montibus *Curtinis* celsitudinis suae dono missa erat. Referebat illa quidem diaphano suo & fulgente colore, ut si quid aliud, purissimum aurum, quod visu incandescens erat: ex sapore vero nihil praeter spiritum vini, ex quo & ipsimet artifices se confecisse fatentur, deprehendimus. Sed (quod dolendum) effectus in morbis illis, quibus periculum eum a nobis fiebat, autorum promissis non adeo respondebat. Sunt similes aurearum aquarum ex vino parandi rationes insinuae in voluminibus *Raymundi Lullii*, qua edita partim, partim conscripta est.

Aque aureae ex
vino parandi
rationes.

emferuntur, sed aliis alie plus temporis & laboris requirunt. Ego quoque similis aqua ex vino & auro conficiendi rationem per me & alios expertam habeo, sed magni est ac diuturni laboris partes. Quibuslibet res vini ab aqua, & terrestrius recte abstrahere & separare: quod elementorum separationem Cyprius dicit. Has habet enim omne vinum in se terreum, & siccum aliquid, quod distillatione nobis separatim, adeo tetrum horrendum & grauiser olentem faetorem exhibebat, ut non tantum vascula quibus continebatur, sed & ipsa cisternae imo & conclauia adeo inficeret, ut Asiam finem quis accensam deserasset. Sicurque tamen, & haec & passim alia sint inuenta & vasa probata, plures viae, & rationes aurum in aquam potabilem redigendi, experientia tamen, & ratione firma constat nihil in rerum natura inueniri quod tam aurum, quam reliqua metalla promptius in aquam vertat & soluat, ipsumque sponte siccum quum sit, facilius fluat, quam salia mineralia.

1° Neque enim unquam vinum per se, aut ipsius spiritum (nisi per salia aurum sorte sit preparatum) utcumque aliquid ex auro coloris recipias, omnem eius substantiam in aquam conuertet, nisi vel ipsum vinum diuturno igne acrimoniam summam & saljedinem acquirat, vel ipsius fax terrestris & foetida, de qua superius dictum, diuturna calcinatione quam Raymondus abunde docet) dealbata & exalta in ipsa natura conuertitur. Omnes itaque haec rationes in hoc conueniunt, quod aurum, aut per ipsa salia soluantur, aut per ista, quae ignis vidui exusta, salis aliquid (ut solent omnia combusta) acquirant, quo in ipsa metalla agant. Quod & perspicue testatur Geber, capite 22. libri. dicens. **OMNE Q'OD SOLVITUR NECESSE EST SALIS AUT ALUMINIS, VEL EORUM CONSIMILIUM NATURAM HABERE: NEQUE INVENIUNTUR ALIA SOLVI PRÆTER ILLA. IGITUR QUÆCUMQUE SOLVUNTUR NECESSE**

2° **EST PER ILLORUM NATURAM SOLVI.** id est, in aquam redigi. Quoniam autem maior salium horum mineralium pars, & praesertim ex ipsis parata aqua, sapore & caore fetidissima sunt, horribiles & atrociter ac humane nature abominabiles, ideo plerique isti haecenus plurimum omnium sapere videntur, quoniamque se rem confectisse putarunt, qui illud ita pararent, ut minimum in se corrosionis haberet, ac quia ad hunc intractabilem exhiberi possit. Hec & ipse mecum animo, quam diligentissime reputans, in eam tantum diuturnam sententiam, cum experientia doceat **SALIS COMMUNIS** usum humano generi, non modo non nocuum, sed pergratum, ac adeo necessarium esse ut neque sine ipso aliquis nobis cibus ardeat & si per se id eo sit non, in morbos ex parte sine facile incidat, sicut & carnes & reliqua edulia humaniora per se, nisi ipso conferuntur putredini, quam maxime, sunt idonea: cum inquam ita se habebant, in ista communi Sale illo communi feliciter fortassis & aque facile, ac aliis Salibus in aquam aurum redigi

3° posse, atque ad eam, cuius inuestiganda semper arduissimus fui, varie per me & alios, quorum ad hoc opera utebar, tentatis, ac aliqui inanis inaniter, & frustra quaerenti, tandem se via obtulit, qua res satis feliciter successit. Cum enim in vallis mea Blausa, ubi praedia mea & officinas, quibus ferum coquitur laminaeque cudentur, & inter reliqua, ad hoc laboratorum (ut Chymici vocant) extructum habeat, quod locus, in montibus (quos Sueda Perla me nuncupat) situs, ob yberum & carbonum coenam, simul & vitruum, ac petrum coemendi faciliorem occasionem ad hoc parandum maxime idoneus esset, illa laborarem: um primo quidem, sed interea sepius & hic Praga, cum hac mea apud Serenissimum Principem nostrum condicione fungor, aliquoties ex **SALIS COMMUNIS** quo condendis cibus utimur, aquam vel oleum potum quoddam pinguisculum & quare confecti, in quo aurea lamina, vel eius puluis, quem calcem dicunt, per Stybium primo lege artium in aqua in vasis vitrii spatio, sensim, & paulatim liquefit & in aquam conuertitur: ad eamque subtile ac re-

4° gium in aqua in vasis vitrii spatio, sensim, & paulatim liquefit & in aquam conuertitur: ad eamque subtile ac re-

5° gium in aqua in vasis vitrii spatio, sensim, & paulatim liquefit & in aquam conuertitur: ad eamque subtile ac re-

6° gium in aqua in vasis vitrii spatio, sensim, & paulatim liquefit & in aquam conuertitur: ad eamque subtile ac re-

Omne vinum solucadi... salib' conuulsa

Ratio dissoluen- di aurum per e- leum Salis communi.

Auri potabilis... leo salis parati facultates.

Auri preparandi modus.

Acerum ad hunc vium quo pacto distillandum.

li subtiliores leui igne primi ascendunt & effluunt, aqua vero deinde sequitur: ita è contra acetum pauciore igne & in principio aquam dimittit, ipsum vero tandem multo maiorem requirit ignem quo sursum feratur. Separata autem, modo quo dixi, omnia aqua, reliquum aceti per cineres destilandum est igne fortiori. Sed tamen neque illud totum, ad finem usque abstrahendum: turbidum enim redditur, & adustionem redolet. Verum quæ unum primum tertius, aut media pars excepta fuerint, urgendo cessandum, & reliqua abiicienda. De muna salis, ut dixi, Halensis libram unam paucissimo aceto infundens, semper agitando, id vase fictili bene obturato, in loco calido repositum lente exiccetur, atq; hoc tertio, aut quarto iteretur. Porro ad quamlibet libram Salis communis, misce huius acidi salis unciam unam atque alteram. Sicque distillationi sal preparatum habebis. Fornax sit similis illis, quibus aquas, quas fortes dicunt, elicimus: in qua undique cucurbitam ignis ambiat. Ego tamen semper posteriori parti fornacis alteram adiunxi altiore, quam, quod vigilis, & labori car- 10 bonum imponendi parcat. inepte pigrum Henricum artista nominant. Ex vasis maxime idonea est cucurbita, qua Chymicis, quod ventre sit amplo, collo oblongo, & angustiore contorta. Retorta dicitur: quam undique limo munire oportet, ut ignis vim facilius sustineat. Simile fere est vitrum excipiendo proponendum, sed amplissimum, quod duas in se habeat libras aque distillata. Fictilis retorta media pars sale, ut dixi, preparato impleatur. Mox eidem, ut fieri solet, fornaci transuersim imposito, altera continens aquam exterius opponatur. Ignis primis quatuor horis sit valde leuis, deinde paulatim augetur, donec sumi, vel nubecula alba fluctibus similes in cucurbitam ex Retorta rostro intrare videantur. Quod si fiet, simili modo ignis regatur, quam diu illud videre licebit, quod plerunque, per sex horas durare solet. Deinde paulatim spiritus urgeto, igne magis, atq; magis augendo, quousque retorta penitus candescat, atque sic ignis per triiduum, aut quo diutius eo melius conseruetur, non habu ratione, quod nec gutta, nec visibiles alii spiritus sursum ferantur. Licet enim nulli con- 20 spiciantur, videbitur tamen in fundo aqua & parietibus vitri indies aliquid pulueris albi ceu creta adherere. Quem ego cum ut eo plus terra istius alba colligerem, per seique alterum mensuram simili igne urgerem, indies apponi, atq; augeri obseruavi: atq; quod mirandum singulis diebus per hora, incerta tamen mediam partem, adeo gratus, adeoque fragans odor, non in ipso tantum conclauis, ubi parabatur opus, sed & à longe, imo per integram aliquando domum percipiebatur. qui nec optimo etiam Moscho gratia cedebat, quod ipse cum aliis Magnificis Dominis, quos, ut scis, huius testes habeo, non sine magna admiratione sapienter deprehendi. Est autem terra ista adeo dulcis, ut si quis bene eam degustarit, dulcedinem, nec vino, nec alio liquore aliquot horis ex ore ablucere possit. Credebam ego non nunquam terram hanc esse alterum fumum, siue vaporem eorum, quos in igne genitos ad compositionem elixiris & dulcorationem liquoris soluetis, &c. sapius Geber Chymistarum Prin- 30 ceptus requirit. Factis prior hac distillatione, ex recipiente vitro omnia sunt eximenda, atq; partes inter se con- fusa, mixta aqua, sicut ac. u. olei. salis, & terra istius dulcis ab inuicem exactissime separanda. Quod ita fiet. Ponantur illa in cucurbita imposito capello in Balneum Mariae, seu Cacabum feruente aqua plenum & lentissimo igne effluet aqua paulatim, donec tota emanarit. Terra vero ista alba, quam Cretam referre dicebam, in cucurbita interea dum aqua separatur, paulatim concreset in lapillos oblongos, partim obnatantes, partim neque vitri parietibus adherentes, diaphanos, dulcissimos, ignis patientes: liquefcunt enim neque igne enap- rant, qui tum paruulo ligneo & foraminibus pleno cochleari, quali pro despumandis carnibus coci utuntur, b in d e, aut quoties concretis apparebunt, eximendi sunt & custodiendi. Pro maximo enim secreto quibusdam ad conficiendum elixir expetuntur. Similique ratione pergendum, donec aqua omnis simul, & acetum per alembicum emanarit, quod gustu facile est deprehensu. Remanebit autem in fundo oleum salis limpidissimum, ex albo virescens, quod a facibus, quas paucas in fundo admixtas habet, in vasculum ex purissimo vitro Ve- 40 neto paratum diffunde. Si quam purissimum id esse, quis exoptet, poterit in Balneo Mariae denuo destillando, quod adhuc secum aqua habet, separare. Hoc, inquam, est Oleum salis, saporis, ut prius dicebam, inque ipse gustasti, Limonum. cui si laminas auri purificati imposueris, in cineribus calidis triduo sensim illud liquefcet, & paulatim omne in aquam conuertetur, coloris vere aurei, qua tutissime intra corpus a quouis assumi possit. Si quis facilius, & cuius aurum illo dissolui expetat, addat salis, quod à principio Retorta diximus imponen- dum, aliquid salis nitri: Soluetur enim facillime, sapore manente eodem. Interea vero de ignis regimine sit plu- 50 rimum sollicitus, leuis enim error totum opus destrueret. Sed cum, ut prius dixi, aqua hac auri dum recens est, & nuper parata, aliquid quamuis id vix perceptibile, acerbi sapiat, mihi si illa iterum paranda esset, plane statuissem facere perualum, an crystallinis istis, quos dixi, lapillis adeo dulcibus aliquid illi gratia addi posset. Quod facile, cum ex eodem utraq; sint parata sale, futurum sperarem. Sin minus succederet, extracto tamen 50 Saccharo, cuius à quotis inter nos mentio facta est, id facile prestari posset. Illud enim a facibus suis, quas habet plurimas, tenacis pro nigra non dissimiles, graniterque olentes, adeo ut pauci Saccharo tales adesse crederent, probe expurgatum, longe redditur subtilius: dulcedinem autem paucam licet quantitate mixtum, alius ad- di longe maiorem, quam commune Saccharum. Præterea colore aureo, quacumq; per se limpida sunt & aquea, singit. Scio plura vasa vni sublimati hoc ipso mixta ac dulcorata pro aqua vitæ, bono lucro diuendita & dis- tracta. Habet enim præter alia in se hoc à plurimis desideratum, quod cuiuscumque liquori mistum, facile eo dis- soluitur, & omnibus partibus exacte miscetur, neq; unquam subsidet: quod in paradisi aquis illis ex spiritu vi- ni, aquas vitæ vocant, plurimis hæcenus defuit. Ideoq; variis variè illis gratia conciliare conati sunt, alii enim viuis passis id efficere perarunt, alii vasis recipienti fuleb infundere, cui spiritus ille vini distillatus misceant, sed quam felici successu ista contulerint, ipsi viderint. Verum huiusce cum experientiam ego sæpius fecerim, atq; ad 60 hanc rem plurimum conferre sciam, ne quid meorum te lateat, rationem ipsius conficiendi subiungam. Perfi- citur vero quicquid ad hoc requiritur purissimum, aceto distillato. Namque si Saccharo parum aceti infunda- tur, in calidis cineribus, paucis diebus repositum, totum liquefcere & dissolui videbitur, cui si vnum addes sub- limatum, breui partes illæ puriores a facibus adeo separantur, ut ab illis facile diffundi possint, rubrumq; assu- mit colorem. Quod si quis solidiorem ipsius consistentiam exoptet, in Cucurbita cineribus tepidis imposita len- te destillando, id facile impetrabit, sed vitrum, ubi Saccharum eximere volis frangi oportet. Hac ratione præ- paratum Saccharum, si misceueris auro, & potabile, non dubito quin dulcius id & gratius gustui, contempe- 70 rata eius acerbitate, effeceris. Iam si in abstrahenda auri dissoluta desideras, sed potius eius tincturam, quam lau- dibus sequitur in sua Chirurgia T. caphrastus Paracelsus, opinor, se, si periculum feceris, non ita magno labore

Sal quo pacto præparandum.

Fornax qualis esse debeat.

Vasa qualia requirantur.

Separatio illorū quæ extiterunt ex proxima salis distillatione.

Auster* Auri potabilis sapor quo pacto corrigendus.

Saccharum quæ ratione se ipso multo dulci efficiat.

Sacchari præparatio.

Tinctura auri.

- ex nostra illa aqua elicere eam posse. *Alodum enim ibidem ipse tradidit, cum inquit, sulfedine à recluso, per aquam dulcem dilige. et abiusa, sinturam auri spiritum vini, excipi & deinde ab eodem separari debere. Porro nunc maxime inquirendam videtur, inq. eo cardine totum versatur negotium. Primum aliqua harum, quae hactenus pluribus pro Auro potabili dicitur, preparata sunt aurea aqua verum illud Aurum potabile sit antiquorum, aut recte sitis loco exhiberi possit. Quamuis autem de hac per multos annos abstrusa. A medicina ipsi, met autorsibus, adeo eam cœlantibus, egre quia. aliis ac certis nobis statim possit, tamen quantum ex lectione plurimorum, de hac re autorum, privato studio, labore & sumptibus percipere licuit, apparet plerisque autores Chymicos, ubi de lapide suo phisio/phorum, vel elixir dicto, loquuntur, constanter & unanimiter asserere e quod illa ipsa Medicina non tantum si super metalla, quae quod auri perfectionem & durandi vim non habeant) imperfecta vocant, prouocatur statim illa redigatur in auri perfectam & incorruptibilem substantiam sed etiam in liquida forma sumpta (ubi cum Aurum potabile dicunt) morbos omnes arceat, iuuentem & prosperam valetudinem ad multos annos conferuet, & deo quo unam & eandem esse ego rem Chymicus video Elixir & aurum potabile nullog, penitus differre, nisi ipso fere usu, nimirum quod alterum solidum & paulo fixius in metalla liquet, illa pro seclum illa perficiat, Alterum vero Elixir vna Raymundo dictum in aquam potui commodam, resolutum iuuentatem conferuet, & vires restant. Experientia autem certa mihi & aliis constat, neq. quisquam haec recte tractans inficiare poterit, quin pleraque dictarum aquarum mutando argentum in aurum, aliquid, idque satis conferant & faciant. Verum ad uberiores perfectionem, quam Chymici promittunt, eas adhuc non redactas vidi. Licet enim metalla mutant, tamen hoc ipso pauco lucrosos sumptus & labores rependant, ac superant. Quod aliquid perfectionis illis adhuc deesse omnino arguit. Ad alterum quod attinet, morbos scilicet arcendos, & prosperam valetudinem conferuendam, vna quidem sepius, ut dixi aqua similes debita adhibita ratione usurpata plurimum profuisse sed qui omnes promiscue morbos istis curarit, detes elapsos, & unguis restituerit, hactenus vidi neminem. Quod (nisi, ut vereor, encomis eius Cymistae in hoc, ut in ple risque solent, nimium indulgeant) similiter aliquid ad perfectionem illorum adhuc ad siderari ostendit. Vnde equidem quis non immerito antiquorum esse verum & perfectum Aurum potabile dubitabit. Minime tamē ideo usum ipsius omnino abiiciendam censeo. Cum enim auri puluis, Anticenne & reliquis Medicis ad affectus cordis & alios morbos adeo commendetur, & Arnoldi auri infusionem, & vna candentis extinctionem in vino tantopere laudet, proculdubio longe plus prestabit, si in partes adeo subtilis & penetrantes omnes venas redigatur, idque maxime si absque rofione effeceris. Est altera veri Auri potabilis nota minime negligenda, quod est in perfectis metallis mixtum ea perficiat, ex se tamen ipso Aurum reduci nunquam posse debeat, quod in*
- 10 perfecta vocant, prouocatur statim illa redigatur in auri perfectam & incorruptibilem substantiam sed etiam in liquida forma sumpta (ubi cum Aurum potabile dicunt) morbos omnes arceat, iuuentem & prosperam valetudinem ad multos annos conferuet, & deo quo unam & eandem esse ego rem Chymicus video Elixir & aurum potabile nullog, penitus differre, nisi ipso fere usu, nimirum quod alterum solidum & paulo fixius in metalla liquet, illa pro seclum illa perficiat, Alterum vero Elixir vna Raymundo dictum in aquam potui commodam, resolutum iuuentatem conferuet, & vires restant. Experientia autem certa mihi & aliis constat, neq. quisquam haec recte tractans inficiare poterit, quin pleraque dictarum aquarum mutando argentum in aurum, aliquid, idque satis conferant & faciant. Verum ad uberiores perfectionem, quam Chymici promittunt, eas adhuc non redactas vidi. Licet enim metalla mutant, tamen hoc ipso pauco lucrosos sumptus & labores rependant, ac superant. Quod aliquid perfectionis illis adhuc deesse omnino arguit. Ad alterum quod attinet, morbos scilicet arcendos, & prosperam valetudinem conferuendam, vna quidem sepius, ut dixi aqua similes debita adhibita ratione usurpata plurimum profuisse sed qui omnes promiscue morbos istis curarit, detes elapsos, & unguis restituerit, hactenus vidi neminem. Quod (nisi, ut vereor, encomis eius Cymistae in hoc, ut in ple risque solent, nimium indulgeant) similiter aliquid ad perfectionem illorum adhuc ad siderari ostendit. Vnde equidem quis non immerito antiquorum esse verum & perfectum Aurum potabile dubitabit. Minime tamē ideo usum ipsius omnino abiiciendam censeo. Cum enim auri puluis, Anticenne & reliquis Medicis ad affectus cordis & alios morbos adeo commendetur, & Arnoldi auri infusionem, & vna candentis extinctionem in vino tantopere laudet, proculdubio longe plus prestabit, si in partes adeo subtilis & penetrantes omnes venas redigatur, idque maxime si absque rofione effeceris. Est altera veri Auri potabilis nota minime negligenda, quod est in perfectis metallis mixtum ea perficiat, ex se tamen ipso Aurum reduci nunquam posse debeat, quod in
- 20 alius aqua, quae colore aureo inficiunt: (qualis erat, de qua supra dixi, quam in adibus clarissimi Doctoris Galili praclara memoria croceo colore tingere videbamus) facile factu est. Infusa enim aqua fontana, cui Tartari parum alii miscent, eaq. paulatim rursus exhalante, in fundo auri puluis residere debet. Quod tamen, si recte paretur, aut per Alembicum ascenderit, minime euenit. Hac ad te clarissime Matthiole, ut dixi, non docendi nomine scribuntur, nec ut alius, quorum forte aliud est de hu iudicium, illa praferam. Quamuis, nec haec natura secreta, quae ad Medicum usum plurimum conieci te possunt, aliisque aliis illa inquirendi occasionem prebent a spernanda, & abiicienda arbitror. Unice enim detestandi videntur Znuisti, qui viros bonos, cum, ut vita vsuque mortalium consulant, plurimum diligentia, cura, laboris & sumptuum in perquirendis huius natura secretis Medicinis conferant, nec forte semper omni ex parte ad vota res succedat, inuide eos reddendi, mordendi, ac carpenti finem nullum faciunt, neque tamen ipsi interea meliora in locum restitunt. Sed
- 30 quum hoc nostro infelici seculo, clarissimorum etiam virorum conatibus & labores felicissimi, horum morsus non effugiant, quid mirum, haec ubi ad vota, non adeo facile perfici possint, ab illis (ut ignota plerique carpunt) reprehendi, calumniisq. dilacerari? Alterum est hominum genus inuidum, & inutile terra pondus, his non minus reprehensione dignum, qui ingenio licet laboreque suo & industria aliquid operis efficiant, partim tamen ambitione adducti, ut habeant quo pra ceteris excellent: partim auaritia, ut lucrum faciant, aliquando etiam per ignorantiam veterum scriptorum, quasi non eadem, aut meliora multo veteribus sint prodicia, pro secreto & quasi mysterio in priuatum sibi thesaurum possident & calant, neque in publicum usum proferant. Medium autem tenere beati. Tu igitur Praestantissime Matthiole merito beatissimus, Tu omnium obseruatione, favore & benivolentia dignissimus. Tantum enim abest te aliorum in Chymicis inquirendis sudores naso suspendere, improbare, vel calumniari, ut ipse quoque domus tuae fornaces extructas habeas, quibus te, ubi opus datur, sedulo oblectas, illisque tantum profeceris, ut à te parata aqua, quae a restaurando vitali spiritu, Aquas vna vocant, tam in Serenissimi Principis nostri, quam aliorum Magnatum Bohemorum manibus in dies versentur, & summi remedii loco merito habeantur. De fidelitate vero tua inuenta ad publicum usum divulgandi, non est quod dicam, cum scripta tua clarissima abunde testentur, tibi, plenus rimarum cum sis (ut cum Terentio loquar) undique illa diffuere. Nihil enim tam egregium, tam secretum, tam rarum tecum deluere, quod ad rei Medica cognitionem augendam faciens a te cœlatum sit, certo affirmare amsim. Arguemento inter reliqua est Sibus calcinati vsus, quem dum alii pro maximo secreto occultare studebant, in pri-
- 40 mius, quod sciam, literis propalasti. Merito igitur praclarissime Matthiole, quae mecum de aqua hac antea cognita & concepta habebam, ad te scribere videor, in certam spem veniens, te, si quid huius ad rem Medicam, eiusue cognitionem augendam facere sperabis, id exacto tuo & acri iudicio confirmaturum, rerum vsu, quo polles, per hac ad altiora veniendi, usum monstraturum, & si qua tibi de auro potabili conficiendo sunt alia huius meliora, mihi & vsui publico fideliter communicaturum. Quod ut candidè, ingenue, ac liberaliter facias, pro familiaritate nostra minime dubito, & per illum, quo te prosequor, amorem, ac publica Rei Medica utilitatem oro & obsecro,
- 50 Vale. Praga.

Lapis philosophorum.

Elixir, & Aurum potabile idem.

In Chymistis.

Auri puluis Anticennae.

Sibus calcinatus.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
 Andreae de Blavv Medico, S. P. D.


Respondetur precedenti Epistola.



Et si sermonis spurcitiæ & affectata caligine obtenebrarunt scripta sua Magistri Chymici, reperiuntur tamen ingeniosi homines hoc seculo, qui ex illis ipsis obscuris libris, non tantum veterum autorum sententiam colligant, verum etiam opera mirifica, cum ad metallorum perfectionem, tum ad hominis sanitatem, vel conservandam, vel instaurandam pertinentia, per ignem efficiant. Quippe quemadmodum Magnes ferrum solum attrahit, argentum vivum solum aurum admittit, cetera metalla respuit omnia: sic eiusmodi ingenia ad veris scientiam nata, mirum quibus occasionibus, quibus è libris, quibus ab experimentis, utilem & veram doctrinam extrahant, falsam respiciant: cum interea alii noctes diesque laborantes nihil descant, nihil inveniunt. Caterum in primis admirabile mihi tuum ingenium videtur, Vir Clarissime, qui ista in aetate, adhuc iuuenili, præter absolutam artium omnium ceterarum, Medicarum præcipue cognitionem in Chymica arte tantum profeceris, ut non solum antiquos Philosophos obscurissimos intelligas sed etiam experientia & usu confirmatus, idoneus videaris, qui hoc seculum tam arte præstanti, speculationis Philosophica parte fere nobilissimis scriptis edoceas. Ita enim aestimo ex scripto eruditissimum tuo, quod proxime mihi tuo nomine oblatum, continebat insignia quadam præcepta de ratione auri potabilis præparandi. Id ego cum avidissime aliquoties perlegissem, dignum iudicavi, quod meo Epistolarum operi infereretur. Peto autem magnopere abs te, ne id factum a me agre feras. Decet enim te, cum possis, publice tuo ingenio prodesse multis. Caterum quod ad rationem auri potabilis conficiendi attinet, nihil habeo, quod aut contradicam, aut te dicam splendidius: omnia enim tibi lucide, ita & verissime explicasti. In primis autem illud plenum est ingenii & acuminis, quod omnes dissolvendi auri modos ad Salta mineralia redegit. Itaque omnino tecum sentio, quod qui cranei humani anteriore parte ad hanc rem utuntur, eos proculdubio id in Sal prius redigere. Nam & ego memini aliquando me ex duobus craneis humanis Sal destillasse. Sic de ceteris cogitandum, seu herba sint, seu metalla, prius ea ad Salis naturam per ignem esse convertenda, antequam ad hunc effectum adhibeantur. De facultatibus autem auri potabilis, dubium non est, quin ea sint maxima, cuiusmodi à te eruditissime recensentur. Ausim dicere, neminem Medicum absolutum esse posse, imo ne mediocre quidem, qui in hac nobilissima destillandi scientia non sit exercitatus: id cum alibi, tum in primis in Chronicis morbis est animadvertere, ubi tota massa sanguinea in universo venarum ambitu corrupta est, & referta multorum morborum seminariis: hi, inquam, morbi citra metallica deinceps vix possunt. Ea enim sola vi ignis ita attenuantur, eamque penetrandi vim acquirunt, ut habitum totius hominis facile permeent: cum interea cetera planta eoque ignem non sustineant. At qui eiusmodi morbos citra scientiam res metallicas tractandi aggrediuntur, ii plerumque re infecta cum magno dedecore & suo, & artis Medica desistunt. Nec desunt exempla magnorum Medicorum, qui remediis Chymicis magnos effectus in curandis agris ediderunt. Ut reliquos taceam, Montanus certe nostra aetate celeberrimus Medicus tantum tribuit distillationibus, ut non solum iis ad agros curandos usus sit, sed etiam libros multos de illis composuit: qui quidem libri adhuc latent alicubi, prodituri aliquando in publicum, si tantum bonum fata hominibus non amplius inuidebunt. Interea te hortor, ut tu in eo genere iuvas studia discipulorum. Nec vero patiaris te dimoveri calumniis leuissimorum hominum ab exercenda arte tam nobili. Valeant illi: habebis & tu, qui opus laudent, ingenium mirentur, laborem remunerentur. Multorum millium loco tibi sit Serenissimus Archidux, qui te cum ob alias excellentissimas dotas tuas, tum vero ob Chymica artis peritiam (qua quidem quam plurimos, difficillimos casus curare te indies experimur) amplo stipendio in aulam adscitum conduxit. Nec desunt alii proceres regni huius, qui te amant & suspiciunt: quorum favore fretus facile est contemnere stoliditatem & malitiam eorum, qui Chymice arti detrahunt. Hæc paucis ad tuum scriptum libuit respondere. Non enim pluribus poteram, & occupatus rebus aliis, & impeditus valetudine, qua in hac ingravescente iam aetate non semper eque commoda utor. Vale.

Sal ex officio humani capitis.

Montanus libros composuit de distillationibus, & eis felicissime v. luse est.



PETRI ANDREÆ MATTHIOLI
EPISTOLARVM MEDICINALIVM LIBER QVINTVS.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Iacobo Antonio Cortuso Patritio Patauino
S. P. D.

Expendantur planta quadam non vulgares.

10
30
40
Mucundissima mihi fuerunt litera tua, Idque ipsum sane multis de causis. Primum quod tua, id est, viri optimi atque doctissimi, deinde, quod elegantissimis numeris nostro Italico idiomate contexta sint. Præterea quod mirificam quandam tua erga me voluntatis significationem habeant. Postremo quod lucris utilitatique plurimum, præter omnem expectationem, & mihi, & Republica attulerint. Nam non modo ex his te amicum singularem mihi esse intelligo, quem incredibili amore ac benevolentia (qua tua est humanitas) me prosequi animaduerto, sed quod a te, tua tantum liberalitate & propria animi ingenuitate pleraque raras sim consequutus plantas, quas antehac a nemine consequi licuit. His cum certo sciam decoris plurimum nostris Commentariis in Dioscoridem esse accessurum, non dubito etiam quin rei herbaria studiosi te plurimum sint collaudaturi, ubi viderint hac omnia me tibi accepisse ferre. Hoc itaque nomine ago tibi gratias ingentes. Atqui si mihi optata Deus concesserit, efficiam profecto, ut ne te peniteat hac in me contulisse: sin autem (ut humana sunt) mea spes me forte frustrata fuerit, tu tamen virtutis tua & officii fructum tecum auferes. Optarem quidem hanc tuam erga me animi propensionem simili aliquo munere me posse compensare. Sed quum nihil sit ad manus, quo te dignum existimem præter me ipsum solum, me tibi totam offero, ac voveo. Sed hæcenus de his.

QVOD autem ad plantas attinet, rescribam, ut petis, de omnibus opinionem meam: quinetiam sincerissime significabo, qua legitima genuinaque, quæq; spuria videbuntur. Sed id sane faciam pro ingensoli mei tenuitate. Non quod autem posse me aliquid singularis iudicii ad te scribere, sed ut petenti tibi morem geram. Verum hac conditione id a me accipias velim, ut, ubi tuo acriori iudicio, me fortasse de his minus recte iudicasse animaduertes, non sileas, sed quid melius sentias mihi significes. Sic enim fiet, ut discussis ventilatisq; omnibus inter nos, veritas tandem elucescat in medium.

RHABARBARI imago coloribus ad vinum ornata, una cum eius historia, à Persis allata, ut rhabarbari imago. ita mihi cara est. Hanc illico pingi excudisque curavi, quod eius inspectionem plurimos delectaturam non ambigo.

50
ELATINEN quam nunquam ante me vidisse memini, una cum floribus, quo diligentius inspicio, eo liberius genuinam esse statuo, nec quicquam in ea videre est, quod legitima non correspondeat. Elatine.

MEDIUM Dioscoridi & Plinio folio est Iridis, sed his subesse mendam iam in suspicionem me adducit Orbasius. Quippe qui Medium Intubi esse folio ex Dioscoride scribit. Cui satis hac planta, quam ad me transmisisti ad stipulari videtur, quamq; Dodoneo Violam Marianam vocari scribis. Hanc plantam multis in locis pluries mihi visam recordor, sed haudquaquam animaduerti legitimum eam esse Medium, quod in Dioscoride & Plinio legere me memineram, Medium Iridis folio esse debere. Etenim Græcus Dioscoridis codex qui ad manus est, legit, ἐχρησθη ὁμοια ἰεῖδης. Sed Orbasii codex ὁμοια ἰεῖδης habet. Quo fit ut cum hac planta complures habeat notas, qua ad amassim Medio correspondent, facile tecum sentiam legitimum eandem esse Medium: præsertim cum abs te edoctus sim eam in saxosis & opacis tractibus nasci. Atqui gratum admodum mihi feceris, si semen tua opera consequi poterō. Quod cum tantum sexto mense a satū germinet, optarem, ut quam citissime fieri possit, ad meas perveniret manus.

GINGIDIUM plantam ex omnibus notis agnosco esse legitimam, sed integrā omnibus suis partibus defidero, ut ad vinum delineari possit. Hoc præstare sane facile poteris, cum hanc tuo in viridario, inter quamplurimas alias, virescere intelligam. Gingidium.

PLANTAM, quam cum Tripolium esse censes, Venetiis in littore maris consensisti, locis, qua allicit vnda, & ibi summa cum diligentia eduxisti, quamque nunc mutata sententia Marina viola speciem esse censes, nusquam me vidisse recordor: ideoq; nec de nomine, nec de viribus tibi quicquam scribere possum. Verum tamen cum non sine speciali natura artificio delineatam esse animaduertam, crediderim hanc profecto ad multa, qua ignoramus, esse utilem. Tripolium.

- SCAMONII** radicem superioribus diebus Turcico solo sepultam, misit ad me Constantino poli Cæsareus Orator Augerius, qua iam germinare incepit. Interim folia, flores, & semen obseruabo: quod si uidero tua illam esse simile, non te posthac grauabo, ut etiam iterum cum floribus ad me mittas. Erit tamen mihi ualde gratum, ut me certior facias, unde ad te allata esset. Nam in Italia nasci Scamonium, hæcenus non audiui.
- PERILOCAM** serpentem ante decennium misit ad me Pisis Lucas Ghinus acerrimus rei herbarie indagator. Cui subscriptum erat Doricium repens. Sed cupio abs te audire cum florum, tum etiam fructuum historiam.
- SESAMOIDIS** minoris stirps, quam antea nunquam uidi, mirum in modum placet. Nulla enim deest illi nota que legitima non correspondeat. Folia enim habet Coronopo maiora, hirsutioraq; caules dodrantales, in quorum summitate capitula exeunt, è quibus subpurpurascens prodeunt flores, quibus accedit tuum de semine & radice testimonium: nec me ab hac unquam remouebit opinione, quod hac planta folia habeat Coronopo maiora. Siquidem Oribasius $\mu\alpha\kappa\epsilon\tau\epsilon\epsilon\gamma$, non $\mu\iota\kappa\epsilon\tau\epsilon\epsilon\gamma$ legit. Id quod manifesto est argumento Dioscoridis deprauate legi $\mu\iota\kappa\epsilon\tau\epsilon\epsilon\gamma$.
- QUAM** Elleborinam pleriq; ais uocari, nonnullis uero ueneficum Scolopendrium, uocabat Lucas Ghinus qui primum Pisis eandem ad me misit Phyllitum minorem. Ego uero notas non habeo, quibus hanc Elleborinam, uel Scolopendri genus aliquod facere possim. Cupio autem edoceri, quo argumento hanc herbam ueneficam appellent. Quinetiam an uere uenensa sit, an uenefica dicatur, quod fortasse ea utantur quidam ad ueneficia & fascinoes.
- SPINÆ** alba folium placet, quantum mutila placere possunt, sed integram desidero plantam: solo enim hoc folio tota planta delineari non potest.
- SCIO** non deesse rei herbaria studiosos, qui plantam, quam ad me pro Thlaspi mittis, idem tecum sentiant. Atqui si cum Thlaspi, de quo scribit Dioscorides, diligenter conferatur, non uideo sane, quibus argumentis in legitimum Thlaspi transmutari possit, cum nulla fere nota in eo uideatur, que illi legitime conueniat. His accedit feminis non obscura amaritudo, nulla penitus acredine pradiata, que in Thlaspi semine maxime requiritur. Non tamen negabo, Thlaspi, quod in Tauro monte in Cappadocia nascitur (ut Galenus est auctor) Cretico non esse simile, nec alii cuiuscunque, quod passim ubiq; nascitur: id quod argumento est plura esse Thlaspi genera. Ceterum an hoc ad me transmissum Cappadocio congenerum sit, ego sane decernere nequeo, cum (quod scierim legerimque) eius historia à nemine describatur, nec de feminis amaritudine mentio ulla fiat, quam in tuo uehementem esse reperio.
- NI SI SMYRNII** Cretici integram uidero plantam, & recentem eius radicem diligenter inspexero, asfirmare sane non ausim, eam Smyrniū esse Dioscoridis. Interea igitur, ut hæcenus semper, uulgo uocatum Macerona plantam pro Smyrniū habeo. Pergratum tamen mihi facies, si integram huius plantam ad me transmissis. Nam fortasse sententiam mutare constituam, omnibus huiusce planta partibus diligenter inspectis: quod si sim, qui non meo opinionibus, sed ueritati me perpetuo addixerim.
- PAPAUER** corniculare flore rubro, frequentissimum in Morauia nascitur inter segetes, & in agrorum aggeribus, eo præsertim tractu, quo Praga Viennam proficiscimur. Quam procul autem à mari distet hæc regio, sciunt hic omnes. Quod aureo flore à Dioscoride describitur, nusquam ibi uidere licuit, nec alibi, quam maritimis locis: quanquam fortasse in mediterraneis etiam alicubi proneniat.
- ALTERAM ACANTHII** habeo stirpem, folio tuo longe maiori. Quod tantum Soli pinguedine ariditate uel factū esse censeo. Sed nulla intercedit lineamentorum facieq; differentia, utraque enim uerum genuinumq; refert Acanthium. Simulac fui contemplatus Æthiopicum **SESELI**, quod etiam à Iulio Moderato Arimino mihi transmissum est, illico inclinauit animus, tuum hoc magis legitimo adstipulari, quam meum, quod tamen non dubito quominus Sefeli sit genus.
- AMOMUM** historiam Plinio adeo confuse describi animaduerto, ut nihil certi inde elici possit. In primis enim Amomum, Labruscam esse Indicam scribit: Deinde aliorum opinionem sequutus fruticem esse ait Myrto similem, foliis Punice mali: quibus non parum correspondent arbuscula folia, quam Plinius Amomum appellat. Sed cum scribat is hanc plantam uuas, non baccas, proferre, non ita facile adducor ad credendum, eam stirpem Amomum esse Plinii. Itaq; si clarsiora tenes indicia, quibus hanc tuam possis tueri opinionem, de his, ut ad me scribas, perquam maxime rogo. Quinetiam scire uelim, an peregrina sit planta, an in Italia proneniat. Id quod pariter de alia etiam planta audire desidero, quam quidam Dioscoridis Amomum esse censent. Cuius ramusculum quam libentissime uiderem cum suis floribus ac fructibus: uel si hoc fieri nequires, ob planta fertasse raritatem, uellem saltem eius iconem inspiciere à diligentissimo pictore delineatam.
- REPENTEM** herbulam foliis Helxines argenteo quodam uore splendentibus, nusquam me uidisse recordor. Itaq; non est ut de eius historia & uiribus quicquam à me expelles: eam tamen adstrictoria esse facultatis, non ambigo. Huius si nomen mihi inueniendū foret, eam quidem ab argenteo nitore Argentanam uocarem.
- GENTIANVLA** (ut ita dicam) nascitur circa Pragā copiosissima, cuius plures habeo species magnitudine tantum differentes.
- STIRPIS** illius ramusculum, quam quidam (ut inquis) Ambrosiam esse censent, crediderim ego Polygoni potius esse genus. Nulla enim ratio mihi sese offert, que persuadeat hanc legitimam esse Ambrosiam. Nascitur hic copiosa Officina centum grana a copioso semine uocant. Laudatur decoctum eius ex aceto ad dentium dolores.
- PENTAPHYLLUM** illud magnum radice alba magnoq; natura artificio nodulis & lacinis elaborata, Dentarie speciem faciunt quidam. Memini huius ego in meis in Dioscoridem Commentariis inter Symphyta dixisse, a Germanis Saniculam albam appellari. Ceterum aliam nosco ego dentariam, folio quinq; etiam adicibus diuiso, cuius nigra bacca, que Cortandri feminis magnitudine habentur, ubi dua uel tres de uorentur, sementes illico demerant & in delirium agunt. Uidi ego quosdam, dum Goritia agerem, quibus iocandi causa hæc bacca date fuerant, qui triduo perpetuo delirio laborarunt: laborassentq; fortasse diuini, nisi nostris auxiliis ad mentem renocati essent.
- PLANTAM** radice odorata & adstringenti, que foliorum facie Agrimonium refert, nostrates uocant.

heros fuisse memini, herbam diuisi Gualelmi appellant: quemadmodum vestrales S. Christophori vocant. Hanc
quamquam diligenter sum contempletus, non tamen reperi locum, in quo meo in viridario eam ferere liceret.
Præferunt eam quidam ad Scrumas, si frequenter denoretur, vel hauriatur in potu.

Herba diuisi Gualelmi.

NON dixerim facile, quam mihi grata fuerit rara illa planta, quam vulgo appellant nostri SERRA
RA (AVALLO. At eo mihi carior est, quo omnibus suis partibus ornatio accessit. Omnia in ea adeo in-
tegra incorruptaque sunt, folia, caules, flores, filiquæ, radix, ac si nunc primum è terra decerpta essent, qua omnia
ad vitium delineari excindique curabo. Nam non vereor quam plurimis perquam gratissimam futuram eius
imaginem, præsertim Chymia & Magis studiosis. His sane ingentes tibi habebunt gratias, quod tua opera, ac stu-
dio hæc planta in communem omnium conspectum venerit in lucem.

Serra Canallo.

10 PETROSELINI Macedonici plantam, una cum eius imagine ad vitium delineata, magna cum
animi voluptate sum contempletus, quod antehac a me visa non sit. Itaque eam rarissimi muneris loco habeo. Rem
ipsam ob eius raritatem multifacio, pluri tamen fidem tuam, qui scribis legitimam esse plantam, quod scias (ut
mihi persuadeo) velle Macedonia, vel Epiro esse allatam, ubi Petroselinus plurimum nasci scribit Galenus.

Petroselinus Macedonicum.

NUNC primum in Marino Bryo me perperam damnassem Plinius animaduerto, inspecta tum eius plan-
ta, tum imagine, quam à virenti recentique cespite delineatam agnosco. Est enim lactuce crispæ adeo per omnia
similis, ut merito à piscatoribus Lactuca marina appellari debeat. Nunquam putassem herbam per omnia La-
ctuca similem tum improprie Bryon appellasse Plinium, cum nihil, cum marino arboreo Lactuce similitudi-
nis habeat. Sed ea tantum causa hanc censeo Bryon appellasse illum, quod Concharum testis & lapidibus inha-
rens, virefeat & vinat.

Bryon Marinum Plinii.

20 Quamquam OENANTHE utraque mihi valde placeat, quod nominum plantarum inspectione plu-
rimum delectari soleam, est tamen quod in utraq. desiderari putem. Prima enim cuius folium Pastinaca am-
bulum una cum integra imagine ad me misisti, legitima Oenanthe dici posset, si radix qua fere nihil magnitudi-
ne, ac facie a Filipendule radice abest, crassior, tuberosiorque spectaretur. Altera vero Oenanthem tuberosam tan-
tum radice referre videtur, foliis minime. Dico tibi sententiam meam, cui nolim acquiescere, nisi probaueris.

Oenanthe.

NARCISSORVM omnium, quin etiam Hyacinthorum, Bulborumque imagines, vitium ac genuinis
delineata coloribus gratissima mihi fuerunt. Cupio tamen vitium horum omnium plantarum meo in viridario solo-
luquando alere. Id quod singulari tua diligentia me consequentur spero. Itaque ubi Bulbos mihi comparare po-
teris, id ut diligenter facias, obsecro.

Narcissus Hyacinthus Bulbi.

30 APII Orientalis semen, suo post hæc tempore seram. Cum vero adoleuerit, sabulosa terra (ut doces) ea
ratione operiam, ut albescat, qua Cinuarum & Intubum Olistores hyeme in Italia obruere solent. Experiaturque
postea an in obsoniis eam quam polliceris, cum palato ineat gratiam.

Apium Orientale.

CONFERVAM de qua lib. 27. cap. 8. meministi Plinius, sæpe fontibus innatantem vidimus, ac et-
iam inde exemptam diligenter inspeximus. Non tamen animaduerti, de ea ita aperte scripsisse Plinium. Qua-
re plurimum tibi debeo, quod tua operam me doctiorem esse agnosco.

Conferua.

RUTE sylvestris, quam Armolam Aphri vocant, habeo, Constantinopoli à Guilelmo Quacelbeno Ca-
sarei Oratoris Medico mihi transmissam cum floribus & capitulis: sed una & eadem planta cum tua esse videtur.

Ruta sylvestris.

PLINIANI Pelacini plures planta in quodam amici mei horto hic cum filiquis contortis & floribus
virentes spectari possunt, qua nullis notis à tuo differre videntur.

Pelacinum.

40 TRIFOLII Asphaltis semen quod polliceris, erit mihi gratissimum, non quod inde plantam alere cupiam, ad vitium
delineandas, cum hoc iam diu factum sit, sed ut hanc herbam ad morbos curandos copiosam ad manus habeam.

Trifolium Asphaltis.

PRÆTER eas plantas, de quibus ad me scribis, reperi in ipso capsula fundo alias quasdam, inter quas
erat PORTULACÆ arboris ramus, Glaux, Cretamus aculeatus, Gramen quoddam spinosum, ac ea
etiam stirps, cuius filiqua ferreo venabulorum mucroni similes habentur, quibus utuntur venatores apris, ac
vrsis inuadendis. De Portulaca alias meam dicam sententiam: nunc enim nihil est, quod magis dicam. Pla-
ces nimirum Glaux, sed longe fortasse magis placebit cum floridam eius plantam inspiciam, intelligamque in-
maritimum nasci. Cretamum aculeatum nondum antea vidi, quare charum mihi est. Ignota etiam mihi est, qua
mucronatis filiquis provenit. Lonchitibus hanc tertiam adderem, quod lancea omnino speciem filiqua referat.
De vitibus si quid habes, id plurimum abs te doceri cupio.

Portulaca arbor.

Glaux.

Cretamus aculeatus.

Gramen spinosum.

50 VNCVM quem Plinius Spartum facere quosdam scribis, ubique examinandum mihi proposui. Sed
cum in montibus Carthagenensis Hispania ceterioris asserat is siccissimis locis nasci Spartum, non in litore ma-
ris, viderimque ego Hispanicum Spartum ab hoc longe satis differre, non ita facile horum placitis ad stipulari pos-
sum. E Spartum strata rusticis fieri scribit Plinius, quin etiam ignes, faces, calceamina, & pastorum vestes, qua
omnia è suo Spartum in ea Hispania regione pura omnia parant. Sed non video quo pacto ex hoc crassissimo lunci
genere vestes parari queant. Ex Hispanico Spartum calceamenta contexta sæpius vidimus, sed placidioris satis,
quam istius lunci materie.

Spartum.

MITTO ramulum Pisani suberis, cuius folia non parum à Romano distant. Pisanum enim specta-
tur folio longe productiore acuminatioreque, adeo ut ut potius Ilicium quam suberis videatur, tantum potest calis
folii natura. Nec dubito quin etiam fructum differant. Nam si recte memini Romanum ut folio breuiore, ita
glande compactiore, & rotundiore spectatur. Vbi autem Roma Suber cum glandibus tuis tibi mittet Mac-
-

Suber.

60 gum, quem magno admodum virtutum cumulo ornatum esse audio, id ad me delineandum, ut mittas, quam
maxime rogo. Hoc itaque est, mihi amantissime Cortuse, candidum liberumque, tui Mathioli iudicium de rarioribus,
ac pulcherrimis plantis, ad me transmissis: quod si fortasse ullibi claudicare deprehenderis, velim ut pro tua hu-
manitate manum illi adiungas: quod si (ut spero) feceris, sane mihi gratissimum feceris. Quam magno tenear
videndi desiderio Cedri è monte Libano ramusculum, id quod tua opera fieri promittis, non ita sane facile di-
xerim. Ideoque cupio abs te certior fieri, an illum consequendi aliqua certa sit spes. Audio enim simulac aruerit
mox decidere folia, quod in Larice etiam obseruavi. Gratulor autem mihi plurimum, quod tam humaniter
polliceris scripturum te in Cretam ac Cyprum ad tuos amicos, qui iis in locis agunt, ut si quid pulchri rarique
ibi repererint, quod ad hanc nostram spectet facultatem, id ad te mittant, tantum (qua tua est benignitas)
mea causa. Sed faxit Deus Optimum Maximus ut quas me tibi habere gratias certo scio, quandoque cumu-
latim referre valeam.

Cedrus Libani.

Larix.

Palma.

Mata.

Remedia ad len-
tignos.

Expecto veram Palma arboris imaginem, ac etiam involucrium, quod Elaten appellant: quinetiam illud
Pumila Palma genus, quod vulgo Neapoli ab Encephalo appellant Cefalioneum. Expecto & Musaconem a
clarissimo Faloppio, cui ut me commendes, plurimum abs te peto. Reliquum est, ut pro lentiginibus delendis
Nobilissima illa Virgine, cuius virtutes mihi tantopere collaudasti, aliquid remedii scribam. Sed scias ve-
lum difficile eiusmodi maculas adeo deleri posse localibus medicamentis, ne posthac tractu temporis repul-
sulent, praesertim astino tempore, cum causa in ipso haereat sanguine. Attamen vidi ego pluries ex toto deleri
lentiginos frequentis serofa lactis illitis. Praestat idem sulphuris oleum, cuius parandirationem scripsimus, libro
nostro de morbo Gallico. Sed huic addere oportet tertiam Tartarini olei partem: quinetiam Amygdalarum o-
leum ex amaribus nucibus pressum, & cum Bryonia succo illitum. Praestat ad id nuncius unguentaria oleum, quo
unguentariis ad multa utuntur. Fit oleum e lacertis quod ego sum expertus, hoc modo. Sumito Lacertas vivas
decem, & affundito olei Amygdalarum amararum libram. Collocato deinde in balneo ferventis aqua vas vi-
treum, quod Lacertus, & oleum exceperit, aperto ore, & ita dimittito horis continuis decem: deinde extrahis
& percolato, & inungito, addito cera odorata momento, ut diutius haereat. Vale.

IACOBVS CAMENICENSIS, MEDICVS, PETRO
Andreae Matthiolo, S. P. D.

Continet Epistola secti cuiusdam hydropici historiam

EX quo tempore te in has regiones ultra Alpes transmisere Dii immort. clarissime Matth. non nos tantum, qui
in hac urbe amplissima medicinam facimus, verum etiam e longinquis locis, ad te tanquam ad Themidis oracu-
lum confugiunt plerique Medici consulunt in rebus dubiis, tuam summam prudentiam, iudicium, eruditionem, consilium.
Quo sit, ut multi agra morbis gravissimis liberentur, qui pessimi irent, nisi te hominem tanta doctrina, experientia
& humanitate etiam praeditum ad manus haberemus. Cum autem hac in urbe reces casus in auditum acciderit, nec
ego nunc propter certas, quas nosti, causas domo excedere possim, ut tecum coram colloquar, putavi me a boni-
tate tua hac scheda facile tantum impetraturum, ut tuam, mihi sententiam de hac ipsa, quam dixi, re expo-
neres, eamque literis consignares: ita enim dicta tua crebriore meditatione facilius recolere, & amicis etiam meis
discendi cupidis communicare potero. Res autem de qua iudicium tuum audire cupio, sic habet. Hisce diebus
ego & amici aliquot mei, secum in cadaver hominis, qui diuturno morbo laborauerat. Is autem & hydropicus
postremo effectus erat. Resecto autem ventre, cum transissemus musculos abdominis, inuenimus aquam illam,
citrinam vocatam, intra peritonaeum & intestina: de quo ab aliquibus dubitatum tamen fuisse video. Max-
imè inde respeximus ad hepar, tanquam in eo causam, morbi manifestam visuri. Id reperimus grande, colore ni-
gricante, & feretali qualem in splene alias conspiciamus. Folliculus felleus plenissimus erat bile. Hepatis vena in
parte eius caua, priusquam in communem illum caudicem porta desinunt, omnes obstructa erant, lapillis eas disten-
dentibus foris nigris, intus flauentibus. Porro & ille meatus, qui ex folliculo felleo in intestinum desinobat, lapide eius-
modi obstructus erat. Hunc cum excissemus, nihilominus tamè bilis effluxit: coaluerat enim foramen illud de-
suetudine bile ad intestina mittendi. Hanc istius meatus obstructionem ego causam fuisse video iteritiae, cum qua
hic homo ante hydropem longo tempore conflictatus fuerat, regurgitante ad totum ambitum venarum bile, qua
purgare per intestinum debuisset. Nam meatus ille, qui ex folliculo felleo in Hepar est, liberrimus erat. Ceterum
Hepar ipsum tota sua conuexa superficie aduatum Diaphragmati conspiciebatur, interueniente membrana qua-
dam crassa & firmissima, nata fortasse ex calore affante in eiusmodi quasi crustam externam superficie hepatis.
Nam & idem ager perpetuo de insigni calore dextri hypochondri queri solitus erat. Ita te erudiri cupimus nun-
quid etiam apud veteres eiusmodi lapillorum morbo aliqua facta sit. Gal. quidem, quod meminerim, lapides in
renibus & vesica tantum, interdum vero etiam in intestinis generari credidit. Quod autem in locinore genera-
tur, id aut nesciuit, aut si sciuisset, certe scriptis non prodidit. E Georgio Bohemia Rege adhuc hodie folliculus fel-
lis post mortem exemptus, extat, in quo loco bilis lapis durus continetur, huiusmodi lapidis colore similis. Res miran-
da, & digna, de qua te audiamus. Neque enim est alius, qui nos docere de re tanta melius te possit. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS, IACOBO CAME-
niceno Medico, S. P. D.

Respondetur ad Epistolam praecedentem.

PER gratum sane abs te mihi factum est, mi Camenicene, quod de inuentis in secto illo Hydropico me certiore
reddideris, & praesertim cum de lapillis in locinore repertis, nec apud antiquos nec apud ceteros Medica-
culatibus scriptores, vlla (quae legerim viderimque) posteritatis memoria sit facta mentio: quanquam id facile fieri
posse, ut postea dicam, non ambigo. Colligi plurimum in Ascite hydropicorum aquam inter Peritonaeum & intestina, ut
Gal. fatetur, cum libr. qui dicitur Medicus, tum etiam quinto de locis affectis, mirum non est, sed magis mirum, quod
quidam, ut inquis, de re hac dubitauerint. Nam cum id manifeste asserat Gal. ac etiam Auicenna, cur dubitare
debuerint sane non video, sed eorum iam cessabit dubitatio ubi abs te audient sub peritoneo aquam esse repertam.
Testimonium enim tuum adeo sensibile est, ut si quis posthac dubitare perseveret, is pertinax omnino dici merea-
tur. De Iecoris magnitudine, & nigredine nihil etiam mihi mirandum est. Fatum est enim hoc visum obstructi-
onibus, accidentibus. Quippe obstruens humor, tenuiora visceris vasa primam implet, & infarcit, auctus deinde in
omnem eius substantiam se diffundit, & eam posthac, perinde, ac vasa obstruit: quod si rursum adhuc plenior multo
cumuletur, in ampla mole iecur totum distendit, & tumidum admodum reddit. Tumori si postea accedat nigredo, nil
etiam mirum videri debet, cum ex infarctu crassescat sanguis, & visceris facultates omnes robur amittat. Reddita e-
nim imbecilli expultrice facultate, atra illa sanguinis excrementa, quae ad lienem transmitti postulat, in ipso ho-
mine locinore, & eius non solum permutat colore, sed etiam substantiam. De lapillis autem iis in venis repertis, quae in
iacinoris canitate interiori, in vena Porta caudicem desinunt, si mecum tibi dicam sententiam, nulla mihi sese offert ra-
tio, quae non consentiat, id fieri in iecore posse facile, quemadmodum in renibus, vesica & articulis. Namque, tamen si
non dixerit Gal. hoc tamen nihil obstat, quo minus etiam in iecore, ut in renibus, oriri calculi possint. Quippe cum
in iecore eade sit materia crassa glutinosa, quae in calculis gignendis idonea, nec ibi calor deficiat, cuius vi lapidescat,
nihil prohibet, quin calculi ibi etiam fieri possint. Dicebat enim Gal. libr. de renum affectu dignatione, Lapidem
in homine a calore generari, eoque, vel vehementi, vel tepido. Si crassa materia est (ut ille inquit) sufficere potest
lapide

Se&eadueris
hydropici cuius-
dam Historia.

Lapilli in iecore
inuenti.

Fellis meatus la-
pide obstructus.

Iecur tota conu-
exa superficie
peritoniae adu-
atum.

Georgii Bohem-
iae Regis fel-
lipedum fa-
ctum.

Iecoris praeter-
naturalis magni-
tudinis causa.

Facile calculos
in iecore gigni
posse.

Lapidis in ho-
mine generatio
quomodo fiat.

repida & moderata caliditas, & qua naturali est ad firmandam, & indurandam terramodo hanc materiam: est enim
 et asperitas ad generandum lapidem singulariter accommodata. Si tenuior est vehementiori, tunc plane indigebit calidi-
 tate siue naturali, siue prater naturam, qua durefiat in terram. Siquidem calor renues materia partes dissolvit atq; ubi
 valuerit, lapidem conformat. Hec ille. Quibus palam est, non esse prater naturam si in iecore etiam lapilli gignantur, cum ibi
 non deit materialu causa, nec efficiens, nec instrumentu, quibus q; in eo generari possint, cum eo obstructo, quoadq; cras-
 sa, quandoq; glutinosa, quandoq; ambo simul ibi habeant excrementa, calor non desiciat, nec vasorum cavitatis in qua cal-
 culi gignantur. Nam si crassu glutinosu succu, qui in renibus lapidefiat, ex iocinore per venam canam fertur in renes,
 mibi iam prohibet, quo minus in eo lapidefiere possit, ubi haeserit diutius. Hu rationibus itaq; fretus crediderim ego lapides
 in iecore ut in renibus si frequentissime gigni. Sed quoniam propter visceru insensibilitatem non excitant dolores, nec expel-
 luntur extra corpus, nec videri possunt, nec tangi, quemadmodum qui in renibus & vesica fiunt, sed in occulto delitescunt,
 in Med. coram consideratione non veniunt. Quo fit, ut hu ignoratis quandoq; mirentur Medici, cur in morbu, qui ex ioc-
 inore instar calculi oritur solent, nihil penitus curae valeat villo medicamento ru genere. Lapidē amygdala nucus quantitate in
 Aurelia Petruca iocinore Pandulphi Tyrāni conjugis Senus reperit esse scio, in quem interitus illius causam reueiebant Me-
 dici. Sed in felle nasci lapides testatur Fernelius: vir nostra aetate praeclarissimus, qui lib. vj. de partium morbu sic habet. Cal-
 culus in cystifelle plerunque concrevit niger sed leuis, & qui aqua immersus innatat. Origo illi est à flava bile, qua pro-
 prio concepta vitio diutius coarctata nec tempestive vacuata, nec noue influxu renouata mirum in modum obdurefcit. Id
 autem in primu accidit, cum vterque Cystis ductus obstruitur. Huius quidem neq; manifesta sunt nota, neq; graua sym-
 ptomata, quibus certo ac facile detegi possit. At suspectus iis esse debet, quibus grauis ac diuturnus fuit icterus. Haec enim ille.
 Quo morbo cum hydropicus ille tunc diutius admodum laborasset, nec medicamentis expugnari potuisset morbus, nil mi-
 rum si lapillus in eius felle fuerit inuentus, qui ductum illum occluderet, qua bilis in iusterna deferri solet, quoniam si
 post hac coaluerit ductus, ubi ducendi munus cessauit. De felle autem Georgy Bohemia regis in rubeum lapidem conuerso.
 res miranda (ut putas) non est quod idem in pluribus fiat. Nam ut Fernelius inquit, Senex quidam decrepitus ad iram
 iure propensus, post decessum sine felle & sine cysti inuentus est, in cuius sede calculus ingens confederat. Quoniam fuisse
 alios scribit, qui post diuturnum icterum, oborto alui profluuiobur natura innumeros calculos instar Pisi aut hordei gra-
 norum, per aluum emiserunt. Quo fit ut quandoque hallucinari possint Medici, qui, ubi per aluum excernere lapillos quoniam
 priam viderint, hos in intestinis exortos censent. In bubulo felle reperiri saepe lapides iuglandu magna quantitate, rufo colo-
 re, ego ipse testari possum, qui plures à Lanys exemptos mibi comparauit, ad varios morbos curandos, ut in nostro in Diosco-
 ridem Commentarijs suis differuimus. Verum mirum omnibus videri possit, sed necur conuexa superficie septo trans-
 uerso fuisse adnatum, nisi monstrifica plura in alijs etiam humani corporu partibus saepe viderentur. Id quod dubium me
 reddit, an natura lapsu, an ex morbo (ut tu suspicari videris) hoc fuerit factum. Potuissent pluribus hanc tractare quasto-
 nem, sed quoniam nec opus esse videtur, nec otium abundat, boni consulas rogo Epistola breuitatem. Vale.

In iecore esse
 omnia quae Lapi-
 de gignere pos-
 sunt.

Cur morborum
 causas ignorent
 quandoque Me-
 dici.

Lapis Amygda-
 lae nucus magni-
 tudine in iecore
 mulieris reper-
 tus.

Lapides in hu-
 mano felle gi-
 gni.

Fel decrepiti Se-
 nis Lapideum
 factum.

Calculos è felle
 per aluum qua-
 doque excerni.

Bubuli felis
 lapides.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS,
 Ioanni Matthesio S. P. D.

Agitur de Magnete Theamedem continente.

DE humanitate tua, qua vsus es erga me superiori aestate, cum ad me aliquot metallicorum species mitte-
 res, iam dudum tibi egissem gratias, nisi me & aula negotia, & operu mei editio impedisset. Ago: amen
 nunc, aut habeo potius: relaturus aliquando eas, ubi occasio mibi sese aliqua commoda obtulerit. Inter re-
 liqua, qua miseras erat Magnes, cui Theamedem inesse Vvillebrochio dixerat, propterea quod vna ex
 parte ferrum, quod alia atraheret, repelleret. Verum ego, cum eius periculum faccerem, nihil tale depra-
 bendi. Ferrum enim vndiq; atraheret. Itaque errorem tunc interuenisse credo cum Vvillebrochio traideres. Nam & ipse
 mibi retulit duos esse Magnetes habuisse, quorum vnus simplex esset, alter vero etiam Theamedem contineret. Nam & ipse
 fieri potuit, ut illos imprudens, inter se permutares. Rogo autem pro summa humanitate tua, ut si quam portionem Ma-
 gnetis, cui Theamedes coniunctus sit, habes, eam mihi mistas. Id munus mihi tam gratum erit, ut magni id thesauri loco
 sim apud me repositurus. Eram tibi missurus exemplar commentariorum meorum in Dioscoridem, sed nullum mihi nunc
 ad manum est, quare id alio tempore à me expectabis. Epistolarum opus meum sub pralo est. Id quam primum edetur ad te
 et transmittemus. Salutat te Vvillebrochius collega meus, qui superiore aestate mox nomine te isthuc conuenit. Vale.

Magnes Thea-
 medem altera
 parte habent.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
 Balthasari Pepulo Myropolae Bononiensi S. P. D.

Traditur exactissima Theriaca paranda ratio.

AMETSI iam diu mibi persuasum habeam istuc non deesse praeclarissimos Medicos, & in simplicium medica-
 mentorum cognitione peritissimos, qui tibi in tua consicienda Theriaca, me longe magis auxilio esse, ac
 sui consilii adiumenti plurimum Reipub. afferre valeant, adeo ut tibi opus haudquaquam sit nostra expe-
 tere auxilia, vel consilia: quum tamen tot precibus, petitionibus, ac literis à me esslagitatus, ut hac in re te
 iuuem, & meam de omnibus, quibus indigemus ad huiusmodi Antidoti consiciendi apparatus, ad te scribam
 sententiam, non potui tibi non morem gerere, praesertim cum videam te in ea versari opinione, ut ubi fueris meis auxilium de-
 stitutus, nunquam à Senatoribus te consequuturum putes Theriaca consicienda facultatem. Quae res mihi tanto incun-
 dior accidit (quamquam sortasse de me plura tibi polliceris, quam te ipsa praestare valeam) quod non solum causas, quibus ad
 hoc moueris, mihi significaueris, sed & audiam abs te, quam istuc mea scripta in Dioscoridem magni fiant, dum mihi tam
 aperte assueueris, omnes sero doctos viros & rei medica studiosos, qui in tuam concedunt Myropolium, ut tuorum simplicium
 medicamentoru pro Theriaca ipsa consicienda inspiciant apparatus, mea semper secum afferre Commentaria, ut his duci-
 bus agnoscant, quae vera sint & quae adulterina, quae probanda & quae reprobanda videantur, existimantes se tuta via facti-
 citer procedere. Caterum ut in hac tua sane laudabili petitione tibi morem geram, ignorare sane primum non debes, me in
 ea semper fuisse sententia, hoc auo minime à nobis parari posse Theriacam ex his simplicibus, ea fertilitate ac ratione, quibus
 à Galeno parabatur, nec si paratur eadem praestare, quae illa praestitit: quod multis destitutum medicamentis, quae in hanc

Theriacam à no-
 bis ea fertilitate
 parari non posse,
 quae parauerunt
 antiqui.

Planta
cuiuslibet
facile

veniunt antidotum. Namque, quoniam in horum defectu supposititiis pro more utimur, (ut quidam putant) à Galeno est
stituta, non ob id tamen nobis putandum est, his assumptis optimam parari posse Theriacam. Quandoquidem hec tamen
in apparentibus manifestis, qualitatibus cum his convenire videantur, quae nobis desiderantur: non tamen (quod magni-
facio) in latentibus, quibus mea sententia, nulla caret planta, ita facile illis correspondent. Quapropter nulla reperitur in
Europa Theriaca ab Andromacho conscripta, quae viribus per omnia illi correspondeat, quae ab ipso Galeno Romano illis Im-
peratoribus parabatur. Nā & ipsius Galeni tempore (ut ipsemet scriptum reliquit lib. 1. de Antidotis) quamvis plures essent
Romae homines admodum divites, qui sibi hanc Antidotum parari curabant, quod eo tam feliciter vii Imperatores fierent,
non eam tamen iisdem viribus praestantem consecrabantur ob simplicium quorundam defectum, quae tantam apud Impe-
ratores ipsos extabant. Nec eam tantum ob causam parū de supposititiis confido medicamentis, sed quod libellus ille, in quo
de his tractatur (ut inferius de carpobalsamo agentes diffusius differemus) falso sit Galeno ascriptus. Quo fit ut qui illius do-
ctrinam ubique sequuntur, perpetuam suam conficiant Theriacam. Nec tamen ob id ego illis Medicis ad stipulor, qui volunt non
debere parari Theriacam, quum fieri eo modo nequeat, quae antiquitus tum ab Andromacho, tum à Galeno parari solebat.

Librum de sup-
posititiis medi-
camentis non
esse Galeni,
Theriacam etiā
nobis parari
posse.

Theriacae bases.

Sane maior pars medicamentorum ad eius parandi rationem necessariorum sunt nobis ad manus, atque ea de causa Theria-
cam scio antebac à quam plurimū & Venetiis, & Patavij aliisque Italia locis esse paratam pararique, quotidie summis appro-
bantibus Medicis. Quamobrē si in hisce civitatibus, ubi nihil temere à Myropolis parari solet, & ubi ars Medica primas tenet,
ij qui Reipub. praesunt, clarissimorum Medicorum consensu parari Theriacam iubent: non video profecto, quid tibi soli ob stare
possit, cur tu etiam eandem parare nequeas, ubi praesertim intercedat tantorum Medicorum, quorum in tuis literis memi-
nisti, autoritas, & omnibus iam diu constat de tua singulari industria & fide. Ut autem (quam nihil esse reliquum putem,
quo tua voluntas impediri nunc possit) id quod desideras feliciter consequaris, conabor plura tibi in mentem revocare, quae
fortasse rei Medicae studiosis non ingrata erunt, ac tuis & Reipub. commodis non inutilia. His itaque rationibus nullū esse cen-
seo, qui secus sentiat, praesertim quum Viperei pastilli, Opium, & Piper, quae totius Antidoti bases esse videntur, nobis ubique
sint ad manus. Atqui si quis inveniretur tam pertinax, qui Theriaca praeparatione impediret, ob causas superius recitatas,
is sane exercitus Praefecto esset comparandus, qui suos milites loricas ferreas induere prohiberet, quod bombardis non resis-
tant, ac si lancea, gladius, ac sagittis non esset obstandū Tibi itaque Theriacā (ut spero) confecturo expedit, ut simplicia omnia
tam legitima, quam quae supponenda erunt, magna cum dilgentia & iudicio summo tibi examinanda proponas. Quod ut
facilius agas, hic statim meam de omnibus tibi aperiā sententiam.

Radices quales
esse debeant.
Fructus qui pre-
stantiores.

RADICES sint oportet extenso cortice non rugoso, hoc etenim earum maciem ostendit, & quod in tempore cape-
tenti non fuerint effossa, vel fortasse sub calentibus admodū solumbus exiccata: & quae nec verustate, nec carie exoleverint.

Semina quae pro-
bentur.

FRUCTUS, virgulta, & germina, vegeta plenaque esse debent. Item & quicquid semen includit, tegmina certi-
ca & involucria.

Liquores & suc-
ci.

SEMINA probantur, quae gravia ac plena habentur, quod ex eo conijciemus, quod tantum corticem habeant,
non rugosum.

Piper longum.
Piper longum
domesticum, &
Sylvestre repe-
rit.

LIQVORES & succineque diuturnitate arefacti sint, neque suas qualitates obscuras habeant, has dico quas gustu
alsatūque percipimus. De his cum satis in uniuersum dictū sit, dicemus nunc speciatim de omnibus, à longo pipere incipientes.

Opium quod
passim habetur,
non esse genui-
num.

PIPER longum Galeni tempore fraudulenter concinnabatur, quamobiē aqua macerari iubet. Soluitur enim hoc
pacto, quod subornatum est. Porro praestantissimum nullis adulteris vitiatum Venetiis copiosum visitur, id peculiariter do-
mesticum vocant: namque, Sylvestre etiam ostendunt. Eligendum est recens non cariosum, nec situ obductum, vegetum,
compactum acerrimumque.

Meconium ab
Opio differere.

OPIVM quod passim in Seplassis praestat, legitimum (quantum video) non est. Nā si Dioscoridi est adhibenda fides,
Opium ex lactea papauerū capitum lachryma colligitur, illudque praestantissimum habetur, quod fuerit densum, gustu ama-
rum, odore soporiferum, & quod facile aqua diluitur, laeve, candidum, neque asperum, neque grumosum, & quod lucernis ad-
motum non atra luceat flamma. At id quo passim Seplassia utuntur, candidum non est, sed ex nigro virescens aut ex lacteo
nigricans, asperum potius quam laeve, odore mirum in modum caput feriens, quin & lucernis accensum non modo nigrum,
sed nigerrimum edit flammam. Quo fit ut credam communis vsus Opium legitimum mentiri, & id potius esse quod Diosco-
rides Meconium speciatim vocat. Quandoquidem Meconium Dioscoridi ac etiam Galeno Opium legitimum non est, quod ex
lactea tantum papaueris lachryma parabat antiquitas incisus ceteris cultello capitibus: sed succus pressus concretusque
eius iisdem papauerum capitibus Opio longe imbecillior. Posset tamen ad antidota usurpari legitimi Opij vice, si tamē im-
posturis non fuerit vitiatum: detentum enim in ore non solum saluam suberoco colore inficit, sed acedine quadam linguā
adeo vexat, ut plerumque vesiculas excitet. Id quod sane non obscurum praebet adulterij indicium, quod scilicet aut Glaucifant
Chelidonijs succum admixtum habeat. Carent itaque Pharmacopoei, vel legitimum sibi afferri, vel ipsimet nigra serant papa-
uera, & Opium sibi conficiant, vel saltem selectissimum Meconium habeant, quo in legitimi Opij defectu tu in tua para-
da Theriacae vi poteris.

Rosa.

ROSAE probantur paniceae & quae praeceteris odoris suavitatem praestant, decerpi tamen debent anteaquam peri-
tur debiscant, & eo sicari ordine, quo pastillos Vipereos sicari docuit Galenus.

Scordium.

SCORDIVM herba, quod palustrem Trifaginem etiam vocant, iam adeo vulgaris est notitia, ut nullus amplius
saperit ambigendi locus Creticum primas tenet, quoniam in alijs etiam regionibus nascitur non contemnendum. Opti-
mum sane iam pridem ex Pannonia mihi allatum est, odore caput feriens, & ceteris quae gustauerim acutius. Proh dolor
quam in magno versati sunt errore Medici quam plurimi qui ante nos claruerunt, Allium sylvestre Dioscoridi Ophioscro-
don vocatum pro Scordio suis Theriacis miscerent.

Napi semen.

NAPI semen an hortensis vel sylvestris Theriaca sit admiscendum non erit ab re differere. Nam tamen si Gale-
nus sylvestris Napi semen ex Creta allatum imponendum praecipiat, illi tamen non omnino ad stipulandum videtur.
Quandoquidem Andromachus, nec agrestis nec satini aperte meminit, sed dulcis, quum scribit talibus verbis. *ἡ δὲ ἄγριος
πῦς ἀνίσταται βλαστάδις. & dulcis seminis Napi: id quod palam facit Andromachum potius immiscuisse satini Napi
semen, quam agrestis. In agresti enim (quod sciverim) nulla percipitur dulcedo, sed potius acuta quadam amaritudine
in satino vero contra, utimur enim eo in cibis sua allekti dulcedine. Praeterea iunior Andromachus, qui ex patre suo
transcribit Theriacam, habet Napi tantum simpliciter, quemadmodum & Democritus, quod etiam hoc arguit de do-
mesticorum Naporum semine intellexisse: Nam cum Napi satinus sylvestrisque habeatur, quum simpliciter ponitur,
rationi consonum videtur, ut potius de satino sit intelligendum, quam de sponte nascente. His accedit Dioscoridi Medica
materia facile Principium magnificanda auctoritas. Etenim li. ij. de satino Napi scribens, ita de eius semine scripsit reliquum.*

Domestici Na-
pifemen praestā-
tias contra ve-
dona, quam syl-
vestre.

Napi

Napi semen potum veterum vires hebetat, antidotisque admiscetur. Quas tamen vires Sylvestri de quo scripsit libro 4. nusquam reddidit, sed tantum ad urinas secundasque ducendas commendavit: quin etiam lieni, vesicae & renibus utilem esse dixit. Id quod etiam, de eo scribens ipsemet asserit Galenus. Plinius deinde libro vigesimo, capite quarto, postquam primo loco Sylvestris Napi meminit, & illum praesertim Dioscoridem fortasse sequutus, ad feminatam purgationem, vesicae affectum, & ad urinam ciendam. Alterum, inquit, Napi genus est, quod Buniada vocant, Raphano & Rapo simile, semini praclaro contra venena, ob id & in Antidotis utuntur illo. Quibus palam est de satiuo postremo locutum esse Plinium: quippe is facie ad vnguem Raphanum refert, gustu vero saporeque, quam maxime rapum. Quamobrem nescio qua ratione ductus Galenus scripsit libro primo de Antidotis, ubi simplicia quae in Theriacam adduntur expendit, sumendum esse Sylvestris Napi semen: Nisi fortasse is peculiariter compertum haberet, id quod suo auctore ex Creta assereretur propria fortasse quadam vi pollere ad Antidota paranda. At quum nos eo desistamus, suaderem sane ut satiuo semine uterentur Pharmacopaei, & id tantum suis admiscerent Antidotis, quod palam sit tantorum praclarissimorum virorum auctoritate praestare hoc, ad venena & in Antidotis addi.

IRIS omnium praestantissima est Illyria: quin etiam Macedonica. Ex Illyria facile Venetias comportatur. Eligenda tamen in hoc genere, quae praeter ceteris fuerit odorata. Reicienda est Libyca, tum quod odore deficiat, tum quod Galeni testimonio tantum ab Illyrica distet, quantum abest cadaver a viuo corpore. Nascitur in aliis etiam gentibus, quae viribus ab Illyrica parum recedit, qualis est, quae in Apulia provenit, & quae candidum edis florem. Ceterum quum Illyrica sit omnium efficacissima, ea tantum tibi fuerit seligenda.

Iris Illyrica praestantior ceteris.

AGARICVM (ut Galenus inquit) fraudem nullam admittit. Desit conuehi ad nos ex Sarmatia, Galacia, & Cilicia: quod autem per Italiam circumfertur, & Venetias comportatur, legitur partim in agro Tridentino, Tyrolensique Comitatu, ubi montes ubique Laricibus hyluescant: partim vero offertur ex Norico tractu aliisque circumiacentibus regionibus, quibus sane in locis praestantissimum provenit. Non autem multum refert, aut quo in loco crescat, aut a quo afferatur, modo praestantissimi notas habeat. Paulo praesertim albidissimum, friabile, minime lignosum. Sed nos ex Mesue sententia addendum censemus leue, ratum, primo statim gustu dulce mox amarum adstringens, ac etiam subacre. Quod autem tale non fuerit, reicere oportet. Siquidem nigrum, densum, ponderosum, silis quibusdam veluti neruis interiectum acerbumque maxime improbat. Quo fit, ut Dioscorides libro sexto inter deteretia medicamenta, id quod tale sit, reposuerit.

Agaricum. In Agro Tridentino Agaricum copiosum.

Agarici optimi nota.

CYNNAMOMVM iam diu defecit, ut in Commentariis nostris in Dioscoridem editis fusius diximus, quamquam non sine errore sibi persuadet Euchsus, libro de Compositione medicamentorum Lusitanum Amatum illum fortasse sequutus, reperiri legitimum Cinnamomum (ut sua verus utitur) in capsis Canella refertis, quae ad nos conuehantur. Adhuc nihil minus hallucinatur, dum sibi persuasum habet Cinnamomum, quod nobis Zeyla insula mittit, corticem esse arboris: sed aberrasse hunc, testis est Galenus cuius non solum auctoritate, sed etiam aliorum probatissimorum auctorum nobis comprobatum sit, Cinnamomum esse ligni substantiam, non autem corticem. Praestabit itaque, ut Cinnamomi defecit sequi Galeni dogma, quod est, Cassia duplum Cinnamomi loco substituere. Quintus Galeni aetate in Cinnamomi penuria Carpesium supponebat, quo etiam caremus. Nam Cubeba vulgaris Carpesium non est, ut quidam crediderunt: utque in nostris in Dioscoridem commentariis latius discernimus.

Cinnamomum

Pro Cinnamomi quid supponendum.

GLYCYRRHIZAE succus ex Creta & monte Gargano Apulia comportatur. Optimus est Creticus, a quo tantum non longe abest Italicus.

Succus Glycyrrhizae.

OPOBALSAMVM nomine tantum cognoscimus. Perit enim iam diu quod in Iudaea habebatur. Memphitamen (ut audio) in quodam tantum viridario alitur, sed liquoris non valde ferax, nec etiam plurima ibi planta aluntur. Si quid liquoris colligunt, id totum solus Tarcarus Imperator habet. Quos fit, ut iam longo admodum tempore Opopalsamo destituamur, ut in commentariis nostris in Dioscoridem fusius dictum est. Sunt tamen impostores, qui legitimum se habere Balsamum mentiuntur, quod si quis expendat, facile comperiet, non modo id esse adulterinum, sed Balsami ne tantillum quidem in se continere. Animaduertant itaque, Pharmacopaei, ne ab his deludantur. Adulterabatur Balsamum ante Theophrasti aetatem, adeo ut scriptum reliqueris, libro nono, de plantarum historia, id emne quod in Graeciam aduehebatur, non fuisse sincerum, sed pluribus mistionibus vitiatum. Ideoque Galenus narrat libro primo, de Antidotis, quum non ignoraret Opopalsamum diuersis modis adulterari posse, ita ut difficulter pateret ementi fraus, se proprio oculorum intuitu ternere voluisse, & quomodo cresceret Balsamum, & quomodo lacrymam mitteret, voluitque sinceram huius lacrymae partem habere, veluti regulam ad discernendos alios Balsami liquores. Porro offertur iam (ut audio) de occidentali India liquor odoratissimus, liquido Syraci vocato similem, quem qui deferunt, Balsamum appellant, quod notas quasdam Balsami praeseferat. Verum quum (teste Strabone) Balsami lacryma lacteo sit colore, crediderim potius nouum hunc liquorem, Stacteem esse praestantissimum Myrrhae, quam Balsami liquorem. Inest huic odor, caput feriens, & acris sapor, vulnera sanat celeriter, rugas tollit, urinas, & menses citissime spirituosius iuuat, & ceteras fere, ut aiunt, praestat Balsami vires. Quae propter non abs re factum putauerim, si quis eo Balsami vice uteretur ad Antidota, praesertim, quum non modo quam plures habeat Balsami facultates, sed etiam, quod Stacteem ad vnguem refert. Stacte enim substituitur Galeno, & Paulo Opopalsami vice. Sunt qui Opopalsami, loco oleum Caryophyllorum supponendum suadent, quorum sententia nos etiam assipulamur. Quidam Myrrhae oleum suppediant, quod magis sane probarem, si legitimam haberemus Myrrham. sunt etiam qui Myrrhae oleum liquorem Balsami vice accipiunt, a quibus non dissentimus: omnes enim huiusmodi liquores Aromatis plurimum respiciunt, & praclarissima sunt facultatis. Euchsus libro de compositione medicamentorum, in hoc parum sibi constare videtur, quod primum dixerit, ubi de supposititiis medicamentis egit, Opopalsami loco Stacteem supponi debere, ubi vero viperis conspuit pastillos, quibus praeter Andromachi & Galeni institutum Opopalsamum addit, Leucos succo pro Opopalsamo uti suaserit: Sed quam magno ducatur errore, inferius latius dicemus, ubi de Carpopalsamo meam tibi aperiam sententiam.

Opopalsamum.

Impostorum fraus. Balsamum adulterabatur etiam Theophrasti tempore.

Balsami nouum genus.

Stactem Balsami vice supponit Galenus.

Quid Balsami loco substituentum: Fuchii opinio explorata.

MYRRHA qua legitima notas refert, adeo rara est in Europa, ut difficile admodum sit, inuenire qui eam usquam viderit. Quae enim Seplasia utuntur, si inter Myrrhae genera fuerit admittenda, omnium sane vilissima erit, eaque fortasse quam Ergasimam, vel Caucalem vocat Dioscorides, pingui carens, praeter modum exoleta retortidaque. Praestabit itaque cauti, cum praestantior ad manus non sit: sed delectu opus est, nempe, ut in hoc genere ea tantum seligatur, quae odoratior, pinguior ac recentior apparebit. Verum si Stacte sincerissima esset ad manus, nil sane commodum optari posset.

Myrrha.

Myrrhae selectiss.

Crocum.

Crocum præstantissimum in Austria.

CROCVM Corytium Lyciumue ex Olympo monte decerptum, quod (vt Dioscorides & Galenus testantur) ceteris est præstantius, quod sciam, ad nos non aduehitur. Primas in Italia tenet quod ab Aquila Vestinorum vrbe affertur. Præstantissimum esse constat, quod in Germania prouenit, circa Viennam Austria Metropolim. Sed difficulter transit ad Italos, tum quod copiosum non sit, tum etiam quod Pannonos, qui Aromatum & Croci vsu admodum delectantur, illud in suis conuehant regiones. Habet enim Austriacum Crocum omnes fere tum notas tum qualitates quas optimo Corycio redidit Galenus. Quamobrem curent Pharmacopœi pro virili qui Antidota parant, vt è Vienna ad eos adferantur, vel saltem selectissimo vtantur Aquilano.

Zingiber.

ZINGIBER (vt Galenus inquit) adulteria non admittit. Sunt tamen hac ætate impostores, qui fraudes etiam illi parant. Siquidem quum carie Zingiber tentari cernunt, rubrica quadam aqua subacta superliniunt, vt teredinum foramina obstruant. Eligatur itaq; Zingiber, quod rubricam non admiserit, ponderosum, sarctum, solidum, carie vacans, intus album & sapore acerrimum. Facile enim Zingiber carie contabescit, quod (vt Galenus inquit) recrementitia quadam illi insit humiditas, que facile computrescit.

Rhaponticum.

Rhabarbarum, pro Rhapontico imponendum.

RHAPONTICVM legitimum, vt in commentariis nostris in Dioscoridem scripsimus, nostra hac ætate in Italiam afferri cepit. Nec desunt Veneti mercatores, ac Pharmacopœi, qui selectissimum vendunt. Vbi vero, quis adeo ab Italia procul abfuerit, vt illud consequi non possit, Rhabarbarum potius illi supponendum suaderem, quam magni Centaurij radicem, vt recentiorum quidam censent. Quandoquidem Rhabarbarum præter id, quod polleat odoris fragrantia, præstat mirum in modum contra venena & venenatorum morsus: quin & ad pestilentiam, pestilentes febres & interaneorum vermes. Quibus tamen facultatibus omnino destituitur magni Centaurij radix. Nec obstat, quod in libro, quem Galenus ascribunt, vbi de substitutis agit medicamentis, Rhapontici loco substituat magni Centaurij radix. Quippe præter id, quod semper crediderim librum illum esse spurium pluribus de causis, quas postea referam, credi sane par est, quod, si Galenus simplicium medicamentorum indagator acerrimus Rhabarbarum nouisset, nullum aliud quam illud suppeditasset medicamentum, vbi Rhaponticum non esset ad manus: imo fortasse nunquam Rhaponticum suis Theriacis admiserisset. Odoratum enim Rhabarbarum est, vt diximus, quod admodum magnifacere oportet. Quamobrem nulli mirum sit, si Auicenna inter Arabes facile Princeps suis Theriacis Rhabarbarum admiserit Rhapontici loco, quemadmodum & Nicolaus Myrepsicus Alexandrinus, qui quum tam diligenter de medicament. compositione scripserit, vt sequuta ætatis Medici suis plerumque vtantur medicamentis, censendum sane non est, quod fuerit is (vt Fuchsius putat) simplicium medicamentorum adeo ignarus, vt nesciret, quid esset Rhaponticum & quid Rhabarbarum, præsertim, quum is vtriusque sape meminisset & in Hedychroi compositione vtrumque addiderit. Velum itaque vt tu Rhapontici loco, Rhabarbarum supponas. Quod si non neglexeris, Antidotum longe efficacius tibi comparaueris.

Quinquefolium.

Tormentilla.

QVINQVEFOLIVM commune intelligo, non autem Tormentillam vocatam, vt quidam existimant, cuius nusquam (quod sciam) meminere antiqui. Qui vero aliter sentiunt, hallucinantur vna cum Manardo Ferrariense. Nec tamen ob hoc putent velim Pharmacopœi Tormentillam suam, non habere vsu, in alio medicamento à recentioribus inuentis, siquidem herbula est miris pollens viribus.

Calamyntha, Marrubium.

CALAMINTHA, MARRVBIVM Nota sunt omnibus, & in Italia præclara nascuntur. Inter Calamynthæ genera præcellit Montanum, imbecillius est aquaticum.

Petroselinum.

PETROSELINVM Macedonicum, non adeo magnificet Galenus, quin velit eius loco alterius regionis Petroselinum substitui posse. Inquit enim. Tibi vero si Petroselinum Macedonicum quandoq; deerit, ne peiores existimes Theriacam futuram, si aliud imposueris: nam Macedonicum amariorum Theriacam facit, præsertim si recens adhuc imponitur. Quamobrem quum nos tam Macedonico, quam cæterarum gentium Petroselino destituamur, Syrii semen cuius in Commentariis nostris, in Dioscoridem editis, imaginem appinximus, substituendum esse putarimus, nam præter id quod Serpentium moribus opem ferat, si idem omnibus facultatibus pollet quibus & Petroselinum.

Quid pro Petroselini Macedonici semine supponendum. Stœchas.

Stœchas Cretica.

STOËCHAS non ex Creta tantum & Stœchadibus insulis, sed etiam ex Arabia peregrina ad nos affertur. Quamquam in Apulia prouenit in Gargano monte non omnino reicienda. Galenus Creticam cæteris qua in insulis proueniunt, præfert. Recentiores Medici Arabicam semper suis medicamentis admiscunt: qua tamen si recens adueberetur, principem facile locum obtineret. Cæterum cum conuehi non possit, nisi longo temporis tractu facile situm contrahit. Quo fit, vt vna cum Galeno Creticam alius præferam.

Costum legitimum non habet.

Angelica Costo similis.

Angelicam pro Costo supponi posse. Costus amarus.

Pseudocostus.

Fuchsi opinio improhata. Mentha Saracenicæ.

COSTVM quod legitimum sit, nusquam (vt ingenue fatear) mihi hæcenus videre licuit. Siquidem tametsi quoddam circumferuntur radices, que aliqua ex parte Costum referre videantur, non tamen illi paribus correspondet notu. Quamobrem fortasse tutius fuerit eius loco Zedoariam suppeditare, non quod hanc Costum esse crediderim (vt quidam male sentiunt) sed quod iam sexcentis experimentis constat, & venenis aduersari hanc, & pestilentiam attero. Taceo reliquas præstantissimas facultates, ne longior sim, quibus præclarissima hac radix pollet. Sunt etiam doctissimi viri & rei herbaria peritissimi, qui Angelicam ita recentioribus vocatam Costo similem faciunt, quod præstet eximia odoris suauitate, gustu sit acris, leuculam (vt Galenus inquit) habeat amaritudinem & venenis, ac venenatorum moribus opem ferat. Horum opinioni non possum non etiam inharere, quod ratione & experimento funditur. Verum tamen quum scribas Galenus Costum adeo esse acre, vt diu admotum exulceret, placeret quidem Angelicæ duplum ponderis addere. Fuchsius Medicus ætatis nostræ clarissimus, libro de Compositione medicamentorum in Compositione Aurea Alexandrina dicit, quod quoties Costi mentionem simpliciter facit Nicolaus Myrepsicus, semper amarum appellatum intelligere. Verum tamen quum apud Græcos tantum nigri & albi Costi fiat mentio quemadmodum & apud Plinium, quid peculiariter pro Amaro Costo sibi velit Fuchsius hæbenter audirem, & an pro amaro Costo Pseudocostum intelligat, quod quidam impostores ex Gargano Apulia monte per Italiam circumferunt, sapore quam amaro. Scribit quidem Galenus leuissimam Costo esse amaritudinem, sed quum id absolute pronunciauerit, censendum sane non est, vt neutrum amaritudine vacet, sed hic fortasse Fuchsius Arabas sequutus vna cum illis hallucinatus deprehendatur. Cæterum non desunt rei herbaria imperiti, qui hortensem herbam, quam quidam Mentham Saracenicam, quidam Mentham Græcam quidam, vt Tusci, Saluiam Romanam appellant, pro amaro Costo accipiunt aberrantes. Vtriusque Costi imaginem (dulcis fortasse & amari) pollicetur Fuchsius pictam ostendere in altero de Stipium

Aspidium historia Commentario. Sed quum nullus extet Author (quod scierim) qui Costi rotas & Historiam Agillatim descripserit, & peregrina sit planta, multum sane fecisse illum fateri compellat si Costum ex Arabia vel India Syriaue in suum transtulerit librum, & legitimum esse probauerit.

PIPER nigrum nullis, quod scierim, imposturis fraudem admittit. Tanto tamen praestantius fuerit, Piper nigriti quanto ponderosius. Quod enim graue ponderosumq; est & corticem tenuiorem habet ac minus spectatur rugosum, id sane optimum censetur.

DICTAMNUM quotannis e Creta Venetias affertur. Eligatur recens non cariosum, nec situ obdum-
Elum vegetum & vudiq; tomentosum, gustu feruens & odoratum.

IVNCI odorati flores defecerant fere etiam Galeni aeo. qui causam in Camelos refert, quod eos audisti-
me depascantur. Ego vero causam potius reiciam in Arabas, qui illas incolunt regiones, & eorum accujabo-
negligentiam ac imperitiam: quandoquidem nunquam suaderi potero, ut credam Camelos adeo uniuersam
regionem illam erodere, ut nihil fere supersit florum Iunci odorati ac si locustarum ingentissimus numerus ac-
cederet. Paleae itaq; & calamitatio habenda erit, quum floribus destituamur. Sed hac recentia esse oportet, o-
dorata, & quod mansa gustui acri probentur sapore: Quae enim diu asseruata sunt, facile (ut Galenus inquit)
inodorata euadunt, & uniuersam exuunt acredinem. Quo factum est ut prius crederet Euchsus, qui fortasse
odoratum iuncum atate exoletum degustauerat, has, quae circumferuntur paleas esse adulterinas: Sed quum
deinde vel recentes gustasset, vel ex Commentariis nostris in Dioscoridem intellexisset se magno duci errore lib.
Compositione medicamentorum in nostram deuenit sententiam. Monachi qui in Mesuem scripsere pariter in
hoc hallucinati sunt, ut alibi de his diffusius diximus.

Iuncus eor-
tus.Monachorum
error.

THVS adeo copiosum ex Alexandria Aegypti ad nos affertur, ut verendum non sit, quin optimi plurimum
habeamus. Eligatur clarum, albu, leue, rotundu granis concretum & quod igni admotum facile accenditur.

Thus.

TEREBINTHINA refina qua legitima sit, nostra tantum atate ad nos ex Cypro, Chio & aliis qui-
busdam Aegii maris insulis afferri cepit. Cuius loco Larigna vsi sunt Medici qui prae teritis temporibus clau-
runt. Porro quorundam studiosorum Medica materia diligentia ac ope, qui eo nauigauerunt, postea factum
est, ut renixerit Terebinthina. Afferebatur primum cocta frictave, vel quod esset adnectu aptior, vel quod im-
postoribus ad adulteria aditus hoc modo facilius fieret. Verum liquida, ut per se ab arbore manat iam frequens
facta est. Hinc itaq; tantum expectant, qui Theriacam conficiunt, nam cruda hic opus est. Galen. lib. 1. de An-
tidotis Chiano ceteris praefert quod & odore & sapore alias omnes praecellat. Euchsus lib. de compos. medicamē.
scribit Lariceam resinam Terebinthina proximam esse eaq; tuto vii posse Pharmacopaeos, ubi legitima Tere-
binthina defecerit. His praeterea additis Officinas omnes magno errore solam Abietinam pro Terebinthina sub-
stituerent, quum ea longe sit inferior: sed (eius pace dixerim) hallucinatur. Quandoquidem falsum sane est, quod
Laricea resina Abietinam praecellat bonitate. Quippe Dioscorides lib. 1. cap. de Terebintho aperte contra Euch-
sii sententiam, ita de Resinis scriptum reliquit. Terebinthina, resinas omnes antecellit: proxima Lentiscina, &
Pinu, Abie: eaq;. Et capite sequenti ubi in uniuersum de resinis disseruit. E Picea (inquit) & ex Abiete resina
ceteras antecedit, odorata enim sunt, atque thuris odorem imitantur. Id quod postea idem repetiuit Galenus
lib. 3. de Compositione medicamentorum per genera, ubi in resinarum facultatibus fatetur, se nihil a Dioscori-
de dissentire. Praeterea & illud falsum esse conuincitur, quod officina omnes Abiegnam pro Terebinthina sup-
ponant, quum omnibus rei Medica studiosis Pharmacopaeisq;, nulla alia resina pro Terebinthina vti Sepalsias
iam dudum constat, quam ea qua e Larice manat, ut pluribus in Commentariis nostris in Dioscoridem nobis
memoria proditum est. Adhuc abietina peregrina est nec ubiq; uanalis inueniri potest. Ego quidem hanc pro
Terebinthina semper suppeditandam suaderem, quippe quod Terebinthinam quadam odoris gratia superet,
quod adstringat, pelluceat, & longe magis amara sit quam acris: Sed hanc fortasse nusquam vidit Euchsus.

Terebinthina
refina.Euchsii opinio
explosa.Abietinae resinae
praestantia.

CASIA odorata, quam Cannellam vocamus, praestantissima copiosaq; habetur in uniuersa fere Europa: Casia odorata.
delectu tamen opus est, facile enim indicabit gustus an suis praestet viribus: Siquidem ea efficacissima fuerit,
qua non modo gustu acri deprehenditur, sed dulcis & odorata. Quae autem talis non fuerit, reicienda est, aut
enim fraudem aliquam passa est, aut exoleuit.

NARDVS Indica legitima frequens reperitur, sed fecit loci distantia ne ad nos afferatur suis dotibus
vsq; adeo praedita. Eligenda qua recentior fuerit, leuis, largam gerens comam, colore flauo, odorata, Cyperum
redolens, breui spica, amaro sapore linguam siccante, & qua diu suam odoris gratiam conseruet. Si vero huius-
modi non sit ad manus, Celticam quam recentem, odoratam praestantissimamq; habemus tuto supponere possi-
mus. Quippe hac Dioscoridis testimonio, praeter id quod Syriace omnibus suis viribus aequipollent, vrinam a-
gis prouocat, & Stomacho utilis est. Nec obstat quod scripserit Galenus Celticam Nardum Indica ac Syriaca
esse imbecilliozem. Quandoquidem hanc supponi haudquaquam suaserim, ubi optima Indica sit ad manus,
sed ubi tantum vel deficiat, vel euanida suas non asseruauerit vires.

Nardus Indica.

Nardus Celticus

POLIVM verum non diu est quod in Medicorum rediit usum. utriusque imagines quis intueri pote-
rit in Commentariis nostris in Dioscoridem. Montano tamen utendum tanquam praestantissimo.

Polium.

SESELI quatuor est generum, nempe Massiliense, Aethiopicum, Petoponense & Creticum. Galenus Sesele
nullam inter horum facultates habet differentiam, nec alterum alteri praefert. Videtur tamen Dioscorides pra-
ferre Aethiopicum, quod scripserit esse Massiliensi acrius odoratiusq; quin & multa odoris suauitate pollere.

STIRAX qui nunc Venetias affertur, an ex Pamphylia aut Pisidia, aut Cilicia aduehatur, quid verire
feram nescio. Galenus illum pretulit, qui ex Pamphylia in calamis conclusus afferebatur, adeoque magnificis
ut scriptum reliquerit libro primo, de Antidotis, tantum distare hunc a vulgari, quantum a vino quod in ta-
bernis venditur distat Falernum. Quo factum puto ut unusquisq; Medicus semper praecipiat suis medicamen-
tis Calamitem imponi. Quippe Calamitis cognomen aliunde fluxisse haudquaquam crediderim, quam a cala-
mis in quibus olim ferebatur selectissimus. Qui Venetiis venditur non omnis probus, sincerusq; est, quum eius
plurimum ibi reperiat, & imposturis non vacat, quam obre scrutiny opus est: Eligatur itaq; pinguis, flauus,
resinosus, albicanibus granis, quam plurimum in sua odoris gratia permanens, & qui dum molitur melleum
suavis liquorem indicatque prunis suauissimum, mittat vaporem, eiusmodi apud unguentarios habetur.

Styrax

Styrax adultera
tus.Styracis optimum
notae,

Euchsus.

- Fuchsi opinio
explosa.
Lib. I. cap. 68.** **Fuchsius lib. de Comp. medicamentorum, Syracem Calamitem liquidum antiquis fuisse contendit, non alia (quantum video) ratione fretus, quam quod in calamis adhaeretur. Verum, mea sententia, aberrat. Quoad quidem Dioscoridi lachryma est arboris malo Cotonea similis, eaq. cateris praestat, qua flava sit resinosa, albicantibus grumis, & qua dum molitur, melleum liquorem reddit. Quibus facile conici potest Syracis arboris lachrymam nunquam fuisse liquidam, sed in grumos concretam, qui mola subacti liquorem melli similem fundunt. Non enim liquida mola atteruntur, sed arida compactave. Porro ridiculum fuerit dicere, Syracem Galeni tempore portabatur in Calamis, ergo erat liquidum. An non delirio tentari is sane videretur, qui diceret Caricas, palmulasve esse liquidas eo quod ferantur in cadis, lagenisve vini vel olei modo? Nimirum non alia ratione qui Syracis lachrymam collegerant, in Calamis concludebant, quam, quod ne suavisissimus eius odor exspiraret in auram, quemadmodum (ut Theophrastus est author) yfaciebant, qui Diētannum herbam in Creta legebant. Ipsi enim huiusce plantae manipulos in ferula aut arundine intercludere solebant ne odor visq. exspiraret.**
- Thlaspi.** **THLASPI** semen Galeno primo de Antidotis principem sibi locum ascivit, quod in Cappadocia nascitur. Verum non omne, sed id tantum quod in Tamo provenit. Nobis autem quum Cappadocia careamus, nostrate vel Cretico uti licebit: quod enim in Italia nascitur (ut Galenus inquit) non longe abest a Cretico.
- Ammi.** **AMMI** verum, iam nemo fere est, qui non noverit, renixit enim nostra etate. Eius imaginem ad vinum delineatam spectare quis poterit in nostris in Dioscoridem Commentariis.
- Chamaedrys.
Chamaepitys.
Hypocistis.
Fuchsi opinio
improbata.** **CHAMAEDRYS CHAMAEPITYS** omnibus nota sunt, nec longe distant a Creticis Italia. **HYPOCISTIS** qua tam diu sepulta delinuit, hac nostra florescente etate repullulare cepit, adeo ut iam nullus sit in Italia Pharmacopaeus, qui legitimam Hypocistim noverit. Nascitur copiosa in Patavino agro & in Apennino monte. Nec est (ut Fuchsius credit) fungus nec fungi imaginem referens, sed germen Orobancha non absimile. Praterita etas insolato hircina Barbula succo pro Hypocistide perperam usa est: Erroris causa in Aphros reicitur, quippe qui Cistum Hirci barbulam appellaverint. Quo factum est ut errauerint Seplasia sibi persuadentes nil aliud esse Aphros Cistum, quam hirci barbam, quam Graeci τερπον ποδάδικον. Vbi autem Hypocistis ad manus non sit, Acaciam, vel florum agrestis Punica succum substituit Dioscor.
- Tragopogon.** **MALABATHRVM** q. folium etiam vocant, iamdiu ex India ad nos aduehi desit: quapropter Galenus consulendus erit. Is enim libr. 8. simplicium medica. ubi folium absit, Indicam Nardum vel Casiam suppediat. Fuchsius Medicus insignis lib. de compositione med. in Aurea Alexandrina Atractylim herbam pro Malabathro substituit, succidancorum (ut ipse inquit) codicem sequutus, quem falso, ut ingenue dicam quod sentio, Galeno adscribit: quanquam in eo qui nobis est ad manus nusquam scriptum repererim Atractylim pro Malabathro posse substitui. Praterea quoniam, ut ipse ait, Atractylis in Germania non provenit, nisi in hortis sata, Carduum benedictum substitui praecipit. Sed proh Dii immortales, quanta est hic Fuchsi incepta. Quandoquidem non alia de causa Carduum benedictum substituit, quam quod in Germania Atractylis non reperiatur, nisi in hortis sata. Nec tamen videt Carduum hunc nullibi etiam reperiri nisi satum. Ceterum quum & Casia & Nardus in Theriacam veniant, quis posset dubitare an conveniat potius Casia pondus augere, an Spica, quum Casiam & suas & Cinnamomi vices hic explere oporteat. Spicam potius augeri debere existimaverim. Cronenburgius Medicus Colonienfis vir sane ingenio & doctrina praclarus, postquam Nardum & Casiam, ex Galeno attulit supponendas: Macis ex Avicenne sententia recte supponendam etiam esse existimat: id quod ego facile concesserim.
- Malabathrum.** **CELTICA** nardus, quamvis & ipsa iam primum renixerit, adeo nota est omnibus ut nullus iam relin-
- Atractylis.** quatur ambigendi locus: Eligi tamen debet recens, iucunde odorata, numerosis radicibus coherens, plena & qua non facile frangitur. Adulteratur (ut inquit Dioscorides) imposita herba simili, que ab odoris gravitate Hirculus vocatur. Sed facile frangit deprahenditur. Namq. herba candidior est, sine caule, brevis foliis, radice neq. amara, neque odorata.
- Fuchsi opinio
reicta, Cardu-
um Bened. sub-
stituentis.** **GENTIANA** qua in Italia provenit non longe suis dotibus (ut Galenus inquit) a Cretica distat, praefertim ea que affertur ex Gargano Apulia monte. Praefertur solida, rugis vacans & odore caput feriens.
- Macis.** **ANISVM** praestat recens, plenum, non fursurosus, odoratum. Dioscoridi & Galeno praefertur Creticū, nobis Italico uti licebit, ubi Creticū defuerit. Siquidē & in Apulia & in Flaminia provenit non reiciendū.
- Celtica Nardus.** **FOENICVL I** semen quod in Italia habetur & acutum & dulce reperitur, utrunq. tamen odoratum. Verum quum dulcis non meminerint antiqui, acuto semper utendum suaserim. Habetur etiam quoddam aliud genus Barbaricum Venetis appellatum, nostrate longe crassius & dulcius, quod tamen ignavus ad Antidota consicienda putaverim, quum parum sane acredinis gustui relinquat.
- Hirculus** **MEON** quod legitimum sit credidimus iam dudum non oriri in Italia, nec eo aliunde conuehi, q. scripserit Plinius Meon sua etate non creuisse in Italia, nisi a Medicis satum usq. per paucis. Quod proculdubio indicium prebet usq. ad Plinii aenum peregrinum in Italia fuisse Meon. Reperta tamen nuper est planta ipsaq. frons, quo quoniam plures Mei notas pra se ferre videatur, in legitimi Mei locum a peritis rei herbaria Medicis recepta est. Nos tamen, etsi Mei radix Dioscoridi sit odorata, contra vero hac potius graviter oleat, nec adeo sit acris ut quis eam statueret possit ex tertio exalfacientium ordine, non ob id a tantorum virorum sententia discedere ausi sumus. Siquidem acredinis imbecillitas oculi soliq. fortasse nostri causa evenire potest. Adhuc quum scribas Dioscor. si eius plusculū quam par sit sumatur, capiti dolorē inferre, hinc etiā indicium sumi potest gravolentia quandā Meon obtinere. Nascitur planta hac passim fere in tota Italia, & praefertim in montibus. Ea tamen cateris praestat, qua ex Gargano Apulia monte conuehitur. Apuli Imperatricem vocant q. suis fortasse praestantiss viribus tā praclaro nomine appellari promeruerit. Magnificiunt hanc praeter alias fac. ad vipera- rū & aliarū feratū venenosū illū: itaq. hac uti poteris tāquā legitimo Meo ubi tuā paraveris Theriacam.
- Gentiana.** **TERRA LEMNIA**, qua ex Constantinopoli ad nos conuehitur, sine sit, qua pro legitima a mercatoribus venditur. sine quam a Turcarum Imperatore tanquam thesaurum asseruari aiunt plures mentitur notat, quas Lemnia Sphragidi reddidit Galenus, adeo ut omnino mihi persuaserim (si tamen legitima terra Lemnia sit in rerum natura) nihil aliud esse posse hanc, quam bolum Armenum nunc Seplasia vocatum, cum scilicet, qui ex orientali plagā affertur. Habet enim Rubrica hac amara Lemnia terra notat, ac etiam vicia, ut su-
- Anisum.** **CHAL-**
- Foeniculum.**
- Foenic. Barbaricum.**
- Meon.**
- Imperatrix herba.**
- Terra Lemnia.**

CHALCITIS est rara habeatur in Italia, & in aliis fortasse regionibus, reperitur tamen optima & Chalcitis, Botry, Misy, Melanteria in Misina habentur.

et ipsa in Misina Bohemia contermina quibusdam in metallis, ubi et, & Chalcanthi minera foditur, una cum Misy, Sory & Melanteria. Quorum omnium Armarium metallicum meum copiose refertum habeo, non solum in meo ipsius usum, sed etiam amicorum, qui hac & alia a me petere solent. Qui Theriacam in Italia conficiunt Chalcanthum igne torrefactum, pro Chalciti supponunt: quod ubi Chalcitis ad manus non sit, facile concedo, cum Chalcanthum & Chalcitis ex eadem materia gignantur, sed longe melius est Chalcanthum addere. Sunt et recentioribus, qui potius velint sine Chalciti Theriacam parare, quam addere Chalcanthum, quum (ut ipsi aiunt) non alia de causa Chalcitis in Theriacam veniat, nisi ut hac nigro fiat colore. Quamobrem scribit Cordus se quandoq; Theriacam parasse absque Chalciti, qua gustu longe gratior evasit. Horum opinionem, cur probem, vel improbem, solidi aliquid non habeo. Verumtamen quum sciam Chalcanthum & Chalcanthum ex eodem fluxisse metallo, easdemq; habere vires, ne Andromachi sententia corrumpatur, Chalcanthum aut Chalcanthum omnino imponendum suaderem.

AMOMUM quod legitimum sit, hactenus mihi videre non licuit, nec aliquem novi Medica materie Amomum: studiosum, qui illud usquam se vidisse fateretur. Ideoq; semen illud quo pro Amomo perperam quidam utuntur Pharmacopœi, de quo etiam plura diximus in commentariis nostris in Dioscoridem, omnino a Medicorum usu fuerit abdicandum. Praestabit itaque Amomi loco Caryophyllos substituere, quod Amomi modo odoris gratia commendentur, excalfaciant, adstringant & exiccant. Sunt qui codicem de substitutis medicamentis Galeno ascriptum sequuntur, Acorum pro Amomo suadeant supponendum, quorum opinio minime improbata videtur, quum Acori radix, quam Seplasia falso Calamum odoratum vocant, & odorata sit & acris, ac prater id, adstringat siccetq;. Quumque etiam si hac legitima sententia Galeni libro sexto simplic. medicament. ubi scriptum reliquit Amomum Acoro similem habere facultatem. Nec tamen ob hoc Caryophyllos reiicerem, quippe qui longe magis prestare videantur, & has omnes facultates praclariores habeant. Fuchsius libro de componendis medicamentis, ubi simplicia, qua in Theriacam veniunt, expendit, quum eo peruenit, ubi racemosi Amomi meminist Andromachus, omnes Galeni interpretes accusat his verbis. Botryos Græcōs. In hac voce interpretanda omnes Galeni, qui hanc Compositionem tradidit, interpretes hallucinati sunt. Siquidem Andernacus lib. 1. de Antidotis una convertit. Alii omnes & cum iis Cordus, racemosi. Cōtruos vocem, cum Amomi dictione coniungentes. quasi vero Andromachus de Amomo racemoso locutus sit: Quod certe Dioscorides non Cōtruos sed Cōtruos appellat. Separande igitur haec dua dictiones per interiectum comma erunt, hoc nimirum modo Αμώμυ, Cōtruos, ut nos convertimus, ut intelligamus Andromachum de duabus inter se differentiibus herbis esse locutum, nempe Amomo & Botry. Vera esse, qua affirmamus, adeoque locum hunc Andromachi esse legendum, & sic interpretandum vnus Nicolaus Myrepsicus abunde docet, & confirmat, qui ita in Theriaca Andromachi scriptum reliquit. Αμώμυ, Cōtruos καλπικῆς, id est, Amomi, Botryos Celtica, vel Gallica. Neque est, ut quispiam adiuendum interpretum errorem dicat, per καλπικῆς ut saepe aliat & hic Nardum Gallicam intellexisse. Nam quum eius paulo post in hac compositione fiat mentio, non potest nec etiam debet hic repeti. Celticam autem rectissime Nicolaus Botrym nominat, quod copiose in Gallia praesertim iuxta Lutetiam proveniat, atq; hinc est, quod Ruellius hanc herbam Parisiensibus matronis melius, quam Seplasia nosci scribat, q; scilicet odoris gratia vestimentis, pannis & linteis curiose interponat, ut hinc odoris suavitatem contrahant. Hac ille. Quibus palam est, sibi persuasisse Fuchsiū, debere addi in Theriaca etiam Botrym herbam, cuius meminist Dioscorides libro tertio. Nos vero a Fuchsiō, viro alioqui clarissimo, hac in re proterius dissentimus, & ipsum tantum hallucinatum putamus. Siquidem iunior Andromachus, qui Patris Theriacam, ex carmine illo Elegiaco in solutam transtulit orationem, huius stirpis nusquam meminist, sed Amomi tantum simpliciter. Nec etiam Damocrates, qui post ipsum, hoc quoq; e viperis Antidotū carmine descripsit. Praeterea lib. 1. de Antidotis aliam Theriacam carmine pariter descriptam recitat Galenus, ubi sane nulla Botryos fit mentio. Adhuc, ubi Galenus sigillatim simplicia, qua in Theriacam adduntur, enumerat, ac diligenter expendit, Botrym (quod sciverim legerimque) nunquam inter ea recenset, nec eius quoq; alias meminist. Quis nec ubi Theriacā ad Pamphilianum scribit Botrym admiscet, neq; Gallicā, neq; Græcam. Prater id Paulus & Aëtarius, qui ex Andromacho, vel fortasse Galeno transcribunt Botrym, haudquaquam admiscunt, quum tamen Græci fuerint, & proprii sermonis periti. Caterum Avicenna, Serapion & alii si qui sunt Arabes, suis in Theriacis Botrym nusquam enumerant. Quo fit, ut Fuchsiō hac in sententia ad stipulandum non sit, quum in tam manifesto versetur errore. Nec obstat, q; Nicolaus Myrepsicus, ut ipse refert, in sua Theriaca, primo statim loco descripta Botrym habeat Gallicam: quādoquidem (ut Fuchsius ipse, qui Nicolai codicem vertit, milites testitur) Nicolai codex Græcus innumeris admodum scateat mendis. Fieri enim facile potuit, ut Nicolai Græci sermonis non admodum peritus Andromachus non intelligeret, quemadmodum nec Fuchsius intelligit: vel quod scriptorum negligentia, vel Authoris fortasse imperitia, hoc loco depravatus sit codex. Verum erroris causam potius in Nicolaum quam in scriptores reuocandam putauerim, quod is in eundem lapsum etiam incidit in altera Hedychroi compositione, ubi statim post Amomum Botryos etiam meminist. Sunt & alia errorum mendarumque indicia, quod plura etiam admittat medicamentum, quam exposcat Andromachi Theriaca, nempe Piper album, fluuiatiles Cancros, Clematidem, Eruium, Acorum, & Scillam, qua omnia prater Andromachi sententiam addidit Nicolaus. Quibus palam est Theriacam hanc adulterinam esse, & non Andromachi, sed Nicolai. Qui tamen ubi secundo aliam ex Andromacho describit Theriacā, nec Botryos, nec aliorum, de quibus diximus, meminist. Caterum ridiculum sane fuerit Nicolai lapsum fulcire Ruellii auctoritate, qui tot annorum centenapost Nicolaum claruit: Ipse autem quum esset Gallus, nec alibi vnde quam rei herbarie operam dedisset, quam in Gallia, recte de Gallica Botry scripsit, quod alia fortasse, quam Gallica non perlustrauerit loca, quemadmodū Fuchsius de Germanica, nos vero de Italica scripsimus. His itaq; rationibus, ac tantorum praclarissimorum virorū testimoniis palam fit, praestantissimos illos Galeni interpretes, quod racemosum, seu racemiferum Amomū habent, nullo errore fuisse ductos, & perperam a Fuchsiō esse impugnatos. Qui si negabit Amomum racemiferum esse plantam, ut annuere videtur, id quoq; esse falsum facile constabit. Siquidem Dioscor. in Amomi cap. 1. statim occursum sic habet: Αμώμον ἔστι δαμνισκός ἐν ἑλίῳ ἀντιμπε- Ponticus

Amomum:

Charyophyllos
Amomi loco
stituendos esseAcorum legiti-
me pro Amomo
substitutū posse.Fuchsi de Amo-
mo non satis pō-
derata opinio.Opinio Fuchsi
reiecta, dum Bot-
rym Theriaca
dit.Nicolai Myre-
psici errorum.Ruellius in Gal-
lia tantum rei
herb. studuit.Galeni interpre-
tes defenduntur.

Cap. 14.

Ponticum describit, sic inquit, τὸ δὲ ποτικὸν ὑποκίρρον οἰδὲ δὲ σθεγαυόν Κορυμβῶδες: id est. Ponticum vero sub- rufum est. paruum fragile, racemosum Item paulo infra, ubi deligendi notas affert, ita inquit ἐκλιθὸν ἀπέμαται...

Phu. Cibebas vulgares non esse Carpesium.

PHU omnibus notum ubiq, fere locorum provenit. Potico caremus, quod ceteris praeulit Andromachus. Praestabit itaq, nostrate uti nempe maiori. Caterum si Carpesium esset ad manus, felicissime pro Phu suppeditari posset.

Carpobalsamum. Cubebas Carpo balsami vice esse substituendas. Fuchii opinio explorata Leucoii radicem supponit.

CARPOBALSAMUM verum haecenus mihi videre non licuit: namq, id quo passim Seplasia v- tuntur, adulterinum est, ideoq, in componendis medicamentis nunquam fuerit admittendum: praestabit ta- men eius vice Cubebas, quae passim in Myropolis habentur substituere. Si enim Cubebas mandas, dentibusq, conficias, feruorem sane non obscurum gustu percipies, quin & Aromatis non modicum. Id quod in Balsami 20 fructu (ut ipse ait Dioscorides) percipi solet. Nec possum hac in re Fuchio alioqui viro doctissimo astipulari, qui Carpobalsami & Xylobalsami loco in Copositione aurea Alexandrina, Leucoii radicem supponendam praecipit, quae tamen radix, si recte expendas, nullam, quae illis respondeat, qualitatem promittit. Siquidem, nec gustu mordax reperitur, nec feruens ore, nec vlla ex parte odorata. Hoc tamen negare non possum, quin in libro illo, quem falso Galeno ascribunt, de substitutis medicamentis, Leucoii radix Balsami vicem gerat. Quod ta- men a peritis & rei Medica studiosis, non ita facile probatur: quippe, quod librum illum diligenter examina- uerint, ac subinde nouerint (ut inquit Syluius praclarissimus Medicus) non esse Galeni, sed proculdubio spu- rium. In ipso enim statim initio Graecus codex, qui ad manus est, Galenum citat, id quod firmissimum prebet argumentum, librum hunc non esse Galeni. Praterea Anacardi mentionem facit, cuius nusquam meminisse Ga- lenus, nec alii priores Graeci. Postremo multa supponit absurdissima, quae, qui crederet Galeno esse excogitata, 30 omnino amens & omnis iudicii expers dici profecto posset. Nam quid absurdius dici potest, quam pro Aconio, quod deleterium omnino est Pharmacum, supponi syluestris Iridis radicem, pro Agarico Euphorbium, pro Polyodio Chamalae radicem, pro Cerui cornu, Caprinis cornu, pro Epithymo, Colocynthim (prob dii immor- tales) pro Lemnio sigillo Sandaracam pernecis medicamentum, pro Polygonii succo Eruca semen, quod cali- dissimum est, & alia huius generis detestanda plura? Quid postea stolidius, ac ineptius, quam supponere pro Chamamelo Anthemitem, pro Elaterio syluestris cucumeris succum, pro Opio succum papaueris, & pro lapide Pyrite lapidem igniuomum: Quomodo (Dis boni) fieri unquam potest, sic deficiat Chamamelum, ut substitui possit Anthemis, si Elaterium, Cucumeris agrestis succus, qui nil aliud est, quam Elaterium. Sed prob hominum ignorantiam, atq, amentiam: Eo enim furoris peruenere quidam, ut sibi per suaserint Galenum tam admiran- dum grauissimumq, Medica materia lumen, & simplicium medicamentorum indagatorem tam acerrimum, 40 has scripsisse nugas, eo fortasse tantum argumento freti, quod hac omnia apud Paulum legerint, qui ex Galeni Commentariis ea accepisse fatetur. Sed dicant ij ingenue quaso, cui magis credendum putant, an Pauli codici au- rations: Si Pauli Codici dicant, profecto hallucinantur, quod infirmissimum (ut Aristoteles inquit) ab antho- ritate sit argumentum. Quippe non magno sane negotio fieri potuit, ut quis sciolus ea ad voluminis Pauli cal- cem addiderit: quinimo, nec aliter credi par est, nisi quis fortasse stolidus Paulum sibi similem fuisse credat & hac tã absurda stolidaq, eum non perpendisse. At si magis rationi se credere dixerint, profecto saluares est. Quippe nulla unquam erit ratio, quae peritis ac doctis viris, qui cum Galeno diu sunt versati, & Pauli grauitatem ex- penderint, suadere possit, tam absurda tam inepta, tamq, execrabilia Galeno scriptis fuisse mandata. Sed parce, mi Balhasar, si plus quam Carpobalsami examen poposcerit, digressi sumus. Nam & hac tibi scire conueniet.

Hypericum.

HYPERICUM omnibus notum, ubiq, fere locorum nascitur. Italicum Galeni testimonio non longe 10 distat a Cretico. Brasauolus autem quum falso putasset, Hypericum Dioscoridi flore esse albo, scribit nostrat hoc non esse legitimum. Sed qua ratione is delusus fuerit, fat alias dictum est.

Acatia. Acatia loco quid supponen- dum.

ACATIA legitima destitimus. Seplasia autem supponunt succum & syluestribus prunis expressum, & in tenues quasdam placentulas insolatum. Hic Fuchio & Cordo probatur, supponiturq, Acatia vice. Nos vero veterum potius opinionem sequenti, quam vulgarem, una cum Dioscoride Acatia loco, vel Rhois folia, vel Lentisci foliorum succum, vel Hyppocistim supponenda censemus. GVMMI illud hic intelligo quod ab Aegyptia Spina quam Acatiam vocant emanare aiunt. Idem declarat Andromachus quum ait.

Prebatur Gummi e syluestri pruno, vel cotoneo malo, vel ex austero Ceraso.

Δάκρυον ἐξ μίσγριου βαβλῶν κναυπὸν ἀνάδου: id est. Misce atram lachrymam quam Spina remittit. Ideoq, quum Lachryma hac atro sit colore, nullo pacto censendum est, eam id esse gummi, quod passim habe- 60 tur in Myropolis Arabicum vocatum. Namque hoc (ut in commentariis nostris in Dioscoridem fuisu scri- ptum) Aegyptiae spina gummi non est, sed diuersarum aliarum stirpium lachryma. veruntamen quum & i- usum pisset & refrigeret, vulgari hoc utendum suaderem, idq, magis probarem quod ex syluestri pruno, vel Cotonea malo, vel austero Ceraso fluxerit.

Cardamomum duplex.

CARDAMOMUM omne genus, quo antiqui Graeci utebantur, iam diu defecit. Placet tamen id supponi uobere quorã, m vniur Seplasia. Atqui quã Seplasia maius & minus Cardamomum habeant, magis 10 semper putarim suppediandum. Siquidem hoc non solũ olore & acredine praestat, sed aliquid amaroris etiã reperi- tur.

Daucum.

DAUCUM probatur Creticum, sed hac aetate (quod sciam) ad nos non conuehitur. Conuehi tamen non magno negotio posset, si quandoq, Pharmacopœi plus insudarent comparandis legitimis medicamentis, quam 20 cumulan-

melius adhuc est, vitium sarmenta. Salis autem si suo tempore viperas coeperis tantillum immittere oportet: si estate iam incipiente, nihil. Omittere in super eas conuenit, quae maritima loca, quae in aliqua salsa aquarum lacuna degerunt. Antidotus enim, quae huiusmodi viperas acceperit, statim exiitabit. Viperas igitur quantum coctae fuerint, ac si quis ipsas comedere uellet, ab iure primum eximemus, deinde earum carnes ita a spinis auulsemus, ut spinam aliquam non accipiamus, auulsas carnes coteremus, iis deinde panis ex purissima farina confecti optimeque siccati, qui praecipue bene fermentatus sit & in furno non sub clubano coctus, modicum quiddam admiscebimus. Nonnulli tamen in commiscendo panem viperis, hanc mensuram seruandam praecipiunt, ut panis pondus viperinarum carnum dimidio minus sit. Alii, ne tertiam partem excedat, malunt. Ego vero quandoque quartam, quandoque quintam panis imposui. Caterum nisi bene coctus fuerit, periculum aliquid acris imminet medicamento. Melius est igitur panem hunc ita coctum per aliquot dies loco aliquo sicciore exicasse.

Pastillorum viperinorum apparatus.

Verum quum viperas & panem conuinxeris diligenterque adeo subegeris, ut nulla viperina carnis particula non contusa remanserit, pastillos ex ea massa conficito, qui tennes sint, nam crassi cum difficulter siccescere soleant & carnem putrescere sinunt: quomobrem panem quoque ante siccationem torrere satius est, & non quemadmodum ante nos qui Casari Theriacam faciebant, viperarum iure maceratum: quam rem ipse quoque diu feci, sed mihi postea melius esse visum est, panem antea contritum viperarum carnibus exacte iam subactis admiscere. Citius namque pastilli siccantur, qui siccum panem non madidum acceperunt. Si tamen cella, in qua pastillos arefacies in superiori domus parte ad meridiem conuersa, vel saltem ad Septentrionem non respiciat, ut Solis radios tota pene die accipiat: Tali enim in loco commode siccescent statim a compositione ibi collocati, quo solares radii peruenire non possunt. Frequenter autem ipsos conuertere opus erit ut aequaliter utraq, ex parte siccescant: quod facere si quis omiserit, superior quidem pars celeriter arefcet, inferior autem humida diutius permonebit, periculumque erit ne marcescant. Postea vero quam exiccatae fuerint maneant aliquot diebus adhuc eadem in cella longius, quam prius a solis radiis, saepeque denuo conuertantur. Sufficiens autem ad hac omnia quindecim ad summum dies: deinde post hoc tempus, donec Theriacam conficere uolueris recondi debent in vase stanneo, aut vitreo, aut etiam aureo. Vitro siquidem & auro nihil fraudulenter admisceri potest, stannum autem plumbo adulteratur, quod vitare conueniet, non solum in hac antidoto, sed in quibuscumque aliis medicinis quemadmodum si purum non fuerit. Caterum longe melius est haud multo post, quam pastillos confeceris, ipsis uti. Quamquam non multum detrimeti capiunt etiam si peracto anno atque etiam multo post eis utaris. Recte namque a principio siccatae ad tertium quartumque annum integri perseuerant, dummodo tamen apte reponantur, & subinde puluisculus quidam, qui ipsis obnaeci atque obduci consuevit, mundis linteolis interdum abstergatur. Is namque, si diutius inhereat, pastillos perforabit. Perficuum est autem inutile eos tum demum reddi, quum perforati fuerint, quemadmodum anteaquam hoc accidat etiam si multum tempus intercesserit non inuitiles esse. Haecenus Gal. Fuchsius libro de composit. medicament. viperis pastillis, quorum tamen parandi rationem Andromacho acceptam refert, Opopalsamum addit. Quomobrem non potui Fuchsi non mirari, quod non solum praeter Andromachi & Galeni institutum hoc fecerit, sed quod etiam medicamentum addiderit, quo iam penitus diu desistimus.

Pastilli viperici quibus in vasis recondendi.

Fuchsi opinio explosa Opopalsamum additis.

Scillini Pastilli. Pancratium.

Scillinorum pastillorum parandorum ratio.

SCILLINI pastilli ex assata tantum Scilla & Erui farina conficiuntur, sed nos quum veram non habeamus Scillam (ut in Commentariis nostris in Dioscoridem editis fusius diximus) Pancratium accipimus, nempe Cape illud, quod Seplasia omnes legitimam Scillam esse putant. Verum quum admodum parum inter se differant Pancratium & Scilla, eo sane Scilla loco tuto uti possumus. Caterum legitimum Eruium non ita facile omnes habent Seplasia, nec etiam omnes, qui se rei herbariae peritos putant, legitimum nouere. Quapropter omnimodam nanent operam, qui Theriacam conficiunt & Scillos parant pastillos, ut verum sibi comparent. Id enim facile assequuntur, quum iam legitimum seratur ab omnibus. Parandi autem ratio sic habet. Scillam principio succulentam accipies cuius folia penitus iam aruerint. Huic deinde cortice detracto duriorum puliculam induces ex tritici farina quantum fieri potest exquisite confectam. Ipsam postea multo calidior, cineri subiectam non prius extrahas quoad usque circumposita pulicula crusta fiat. Quod si ubi hac agis furnus aliquis adsit, una cum pane Scilla illud inferge potes, inde quum obducta puls iam exaruerit ipsam extrahas & contres. Satis assam vero Scillam intelliges si festacam immisissam admiserit. Vbi vero Scillam diligenter attriueris, candidam Erui farinam admisce. nam quae candida non est, amara supra modum esse consuevit. Cognitum autem unicuique existimo, prius oportere tenui cribro farinam excutere, praeterea diligenter eam leuigare. Scilla vero sesquipondere farinam superet opus est: dico autem sesquipondere, ut si duas farinas sumas, Scilla tres accipias partes. Postremo simul atque rotulas tennes ex hac mixtura conformaueris, in cella sicuti antea dicebamus in compositione pastillorum viperarum ad meridiem vergente repones: quas tamen non in Solis radiis collocabis. Verum sicut de pastillis viperis dictum est, ita de his quoque caetera perage.

Hedychroum.

HEDYCHROVM (ut Gal. inquit) quomodo parari deberet, neque Andromachus docuit, neque complures alii, qui tamen de medicinarum compositione tractarunt, tamen quum Theriacam describerent, Hedychroi compositionem omiserunt, adeo ut Medicus quidam Roma Gal. etate, qui Theriacam conficere nunquam viderat, ipsamque ex sola librorum lectione se compositurum confidebat, ab unguentarius Hedychroum peteret, existimans illud esse quampiam herbam, vel simplex aliquod aliud medicamentum. Caterum postea factum est, ut Gal. diligentia parandi Hedychroi ratio ex Andromachi monumentis prodiret in lucem. Sed mirum sane videtur, quod omnes Graeci, qui post Gal. claruerunt, neque Paulus, Aetius, Actuarius, quin & Nicol. Myrsificum a Galeno aberrauerint. Siquidem Paulus Opopalsamum non habet, sed Carpobalsamum, & praeter Gal. sententiam Rhoem etiam addit. Aetius deinde (nisi sit interpretis lapsus) non Marum, sed Arum admiscet. Praeterea Actuarius exacte recteque describeret, nisi Nardum maiori pondere, quam par sit imponeret. Postremo Nicolaus Myrsificus duas Hedychroi compositiones habet, quarum altera Meon Mari loco admittit, altera vero Rhabbarum, ex Auicenna fortasse, & Botrym pro Maro, ac calamo continet, quin etiam Rhaponticum praeter omnium sententiam. Caterum non deest suspitio, quin hic codex scateat mendis. Siquidem, ubi Gal. Phu pontici meminit, Nicolaus habet Phu simpliciter, & statim ab ipso Phu Rhei pontici, quo sit, ut fuerit suspicandum Rhei particula illuc illegitime accessisse. Is enim quisquis fuerit, qui hac corruperit (ita mihi suspicandum videtur) quum forsasse ignoraret particula Pontici cum Phu esse copulanda, Rhei particula interposuit, tanquam is qui sibi persuaserit,

Pauli, Aetii, Actuarii & Myrsifici errorum.

Nicolai loci repositurus.

rit, esse id à scriptoribus prætermisum. Sed hoc non animaduerterit Fuchsius. Adhuc palam sit. Nicolai Graeci sermonis imperitia, quod post Amomum statim addidit Botrym. Nam quum hoc loco sicut in Theriaca (ut fufius superius diximus in Amomi examine) in Græcorum authorum libris ἀμώμῳ βοτρυῖδος scriptū reperisset Nicolaus, nesciissetq; Amomum, racemiferam esse plantam, perperam βοτρυῖδος ab Amomo disinxit, & aliud per se medicamentum, nempe Botrym designare sibi persuasis. Id quod Fuchsiū etiam in errorem vocauit. Porro Arabes Hedychroum trochiscos Alndaracon appellant. Verum & ipsi in quam pluribus aberrant, descinerēq; ab Andromachi & Galeni placitis. Quamobrem Galenū tantum consulere oportet, & ei per omnia subscribere. Paratur autem Hedychroum ex Galeni sententia hoc modo. **H A B E T Hedychroum, Aspalathi, Afari, Amaraci, cuiusq; drachmas duas, Calami odorati, lunci rotundi odorati, Costi, Phypontici,**

Hedychroi genuina paratio.

10 Cinnamomi, Opobalsami, Xylobalsami, cuiusq; drachmas duas, Malabathri, Nardi Indica, Casia, Myrrha, Croci, cuiusq; drachmas sex, Amomi drachmas duodecim, Mastiches drachmam unam. Excipiantur omnia contrita vetere vino, & deinde formentur pastilli, qui demum siccati debent, ut de vipereis & Scilliticis dictū est. Reliquum est, ut de quibusdam medicamentis, quæ in huiusce magnatis compositionem admittuntur, tibi nostram exponamus censuram.

20 ASPALATHVS Dioscoridis testimonio nascitur in Istro, & Rhodiorum Insula, quinetiam in Creta, ut alii scribunt. Quo fit, ut non magno negotio inde afferri posset, si tamen in uanda Republica magis in hominibus inualesceret ardor, quam agenda pecunia. Quum autem eo nunc destituamur, non displicet eorum opinio, qui pro Aspalatho supponunt Vitisicis semen, quod non modo excalfaciat & siccet Aspalathi modo, sed quod etiam venenatis ferarum ictibus auxilietur. Sunt etiam, qui Agallochum substituis eius loco suadeant, quorum placitis facilius etiam subscribo.

Aspalathus.

Marum.

MARVM an legitimum habeamus, non mihi satis constat, quamuis non desint, qui Marum illud Amaraci genus esse velint, quod minoribus, odoratis, acutioribusq; foliis proment. Quibus non videtur omnino refragandum ut in commentariis nostris in Dioscoridem editis fufius antea diximus. Quo fit, ut crediderim non longe aberrasse, qui hoc Amaraci genus pro Maro suppeditarēt. Si quidem testatur Galenus, libro 1. de Antidotis, se iussisse confici Amaracinum unguentum, in quo pro Maro Amaracus imponeretur: quo postea factum ait, ut unguentum illud tametsi minus odoratum videretur, non tamen viribus inefficacius erat. Dioscorides scribit Marum vires habere Symbrii consimiles, quapropter poterit quispiam etiam eius loco Symbrio uti, cui non placeat Amaracum addere.

CALAMVM ODORATVM non eam esse radicem, qua sub calami odorati nomine utuntur Seplasia, adeo validissimis argumentis docuimus in Commentariis nostris in Dioscoridem, ut nullus posteris relinquatur ambigendi locus. Caterum, quum ego iam pridem existimassem codicem illum, de substitutis medicamentis, qui inter Galeni opera reperitur, legitimum esse Galeni, suadebam pro Calamo odorato Sphagnum suppeditari, sed quum tractu temporis diligentius accuratiusq; rem expendissem, reperissemq; scatere librum illū absurdissimis, ineptissimisque documentis quamplurimis (ut in præcedentibus dictum est) in aliā venire sententiam postea coactus sum. Quamobrem minime quidem recte factum videtur, pro odorato Calamo supponi Sphagnum, id est, arboreum Muscum, quum huius Dioscoridis testimonio adstrictoria tantum infit facultas: Calamo vero contraria: quippe, qui & menses cieat, & urinat, & aqua subter cutem opem mirificam ferat. Quid autem eius vice suppeditari possit, ex veterum testimoniis mihi non satis constat. Non displicet tamen eorum opinio, qui vulgarem Calamum odoratum, quem esse Acorum non dubitamus, pro legitimo odorato Calamo substituant: Non ea propter, quod voluerim hoc esse verum Calamum odoratum, sed quoniam Acorum non solum odorato Calamo vires obtineat paros, sed quod etiam venenis resistat. Nec alia sane ratione factum putauerim, ut Acorum in Calami odorati locum receptum sit, tum à Medicis, tum à Pharmacopœis, quomodo, quod quum priores Medici odorato Calamo se destitutos cernerent, Acorum semper suis loco suppeditarent. Quo postea facile factum est, ut se totum in Calamum commutarent. Præterea, si quis radicem expendat, quam ob odoris præstantiam Angelicam vocant, fortasse non displicebit eam in Calami odorati locum substitueri. Cit enim urinam, pellit menses, prodest iussentibus, aqua in erente laborantibus, & (ut sexcitis constat experimentis) aduersatur venenis, & venenosorumq; animalium moribus, & pestilentem auram fugat. Sunt etiā qui Melanthii semen proponant, quorum opinionē etiam non improbamus: Sed magis priora placent.

Calamus odoratus.

Sphagnum.

Cur Acorus Calamus odoratus vocari cœperit.

Angelica vires.

XYLOBALSAMVM quod in Myropoliis habetur, adulterinum est, & ex Myrto (mea sententia) Xylobalsamum descriptum. Verū quum lignum seminis vires habeat, Cubebas supponerem, quas superius pro Carpobalsamo Cubebas supponendas esse diximus. Adhuc recte quoq; factum crediderim, si quis stannum Satalum substitueret, vel Caryophyllorum pediculos, nobis Italici vulgo vocatos Fusti di Garoffani.

RESTAT modo dicendum, quo ordine, quaque ratione Theriaca recte probeq; parari debeat, quum ad manus fuerint omnia, quibus præstantissima hac Antidotus parari solet. Id enim facile assequemur, si Galenū consulamus. Quippe in lib. 1. de Antidotis Theriaca compositionem nos docet his verbis. Primum itaque dissolunda erunt vino macerata hæc medicamenta, nempe Myrrha & Crocus: si tamen ita facere tutum tibi visum fuerit, nec ipsum, quia humidus sit contundere. Succis autem omnes ideo vino macerantur, ut & dissoluantur & facilius lenigari, Sagapeni dico, Panaces, Papanerisq; cuius liquorem Opium vocant. Atatia quoque, quum humida tibi visa fuerit, nec ad contundendum facilius, Hyppocistidis item, & radicis dulcis succum. Thlaspis autem, & Napi semina primo quidem sicut & ante me alios fecisse videram, in mortarium una cum aliis contundendis ipse quoq; coniciebam. Inde vero quum ipsa pilæ concanitati adherere ob tenacitatem sedulo animaduertissem, melius esse duxi sola in alio mortario prius attrita vino superinfuso macerare, quoad exacte dissoluerentur, dissolutaq; post modum ceteris, quæ peculiariter vino macerantur, ac diluuntur, admiscere. Tibi quoque per se solum in mortario seorsim leniter comminueri satius est, ne in placentiam coeat, tum tibi comminueris & excusseris promptū habere, quo reliquis vino maceratis cum placuerit, ipsum inspergas. Nam Gummi & vino macerare, & ipsum per sese, vel cum Thure lenigare necesse est. Hæc igitur quo diximus parata omnia preparantur, atque humida quidem ex vino dissoluantur, sicca vero in puluerem redigantur. Quo tempore autem cuncta simul miscenda erunt, Resinam Thebenthinam in vase duplici primum colligabis, tum Syracem, & Galbanum antea pistillum ferreis rotabulis confusa, mellisq; crudi parum per instillabis.

Ratio miscendorum medicamentorum quæ in Theriacam veniunt.

hec simul atq; effuderis, & manibus complanaueris, mellis aliquantulum, Resina quoq; liquefacta affundatur, ita vase cooperto ea rursus liquari permittes. Melius est enim his rebus impositis nodum mel admiscere, sed ad operto vase, quod aqua innatat, ut elixentur permittere. Interea dum ista liquefiunt maceratis ex vino rebus, ficas medicinas euenus adiuces, & commiscebis, quousq; spissa esse satis videantur. Atq; ita paulo post in mortarium magno cochleari, liquefacta, repidatamen traxeris, robustusq; aliquis homo tunc ipsa commisceat. Ac postea, quam bene inter se commixta, atq; in unum corpus redacta fuerint, densaq; iam quodammodo videtur experiri, melius moderate decocti, & proculdubio de spumata partem quandam superimittes postea concausa unum medicinarum portionem quandam, deinde rursus mel inseres: postea liquefacta sed repida infundes. Postremo quicquid pulueris, & mellis supererit admiscebis, vehementer omnia magno in mortario, magnaque in decula commiscendo: cum vero in decula ductu in mortario omnia coerint, tum in pilam transferenda sunt, atq; ferreis rutabulis diligenter extersis, ne quid rubiginis insistat, sine intermissione contundenda. Rutabulum vero subinde Opobalsamo perunges, ne subigendarum rerum tenacitate obtineatur, neue difficulter se inde attollentibus resistat. Ut igitur opus expedite procedat, imas rutabulis partes Opobalsamo frequenter inungere conueniet, atq; Opobalsamum hac una in re totum absumere. Melius est autem in Sole Theriacam commiscere sic enim citius in unum corpus simplicia coeunt, dumq; hoc faciemus, pilam in qua Antidotum admiscetur, operiemus. At post quatuor, aut quinq; dies rursus in Sole ipsam eodem modo commiscebimus, eandemq; sex septemue dierum spatio interiecto, iterum atq; deinceps repetemus, donec mensis duo, vel quadraginta dies saltem compleantur. Hactenus quacunq; conscripsimus ad Theriaca vim augendam pertinent qua vero maxime subiungam ad colorem. Danda namq; est opera ut nigram Theriacam conficiamus, nam hoc etsi quo pacto in consuetudinem venerit, nesciam, quisquis tamen huius colorem non consequitur, irridetur, quamquam nulla coloris qualitate medicamenti vis immutetur. Nigra vero Theriaca non erit, si Chalcitis flaua luteaue, dum uritur euaerit: Chalcitis enim particula quantumuis minima colore suo Theriacam inficit. Ne quis igitur hac quoq; in re frustretur, is que dicam mente adhibeat. Quatuor Chalcitis drachmas cum Theriaca solummodo capiat, multo plures assare conueniet hoc modo. Conuce in exiguam ollam Chalcitis cruda drachmas non pauciores quadraginta postea succensis carbonibus, ollam absque operculo in medio prunarum statue. Cumq; liquefactam videris Chalcitim, ac qua leuissima & spumosa pars eius est innatare, statim ollam ab igne amoue humis quo colloca, nec ut aliquando solebamus, sicuti qui ignem accendunt, ipsi insufflabis, mirandum est enim, quantum ita faciendo luteum flauisq; color emergat. Non tamen in Sole collocanda erit, sed in umbra donec frigeat omni tenda. Hinc postea id solummodo capies, quod superne spumem fuerit, quodq; neque luteum, neq; flauum, neq; pallidum est. Deinde experiundi gratia aliquantum eius, quod probaueris accipe atque comminue, & nunc quis ex supradictis coloribus appareat inspicere. Nam si qualis accepta est, viridius, aut cinerea manserit, drachmas quatuor ipsius impones. Talem namque Chalcitim exiguam inuenies etiam si multam exusseris. Que ad componendam conficiendamq; Theriacam requirebantur, omnia iam absoluiimus. Hactenus Galenus.

Color Theriacz
niger vnde.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Iacobo Antonio Cortuso Patritio Patauino,
S. P. D.

Agitur de quibusdam plantis a Cortuso Matthiolo transmissis.



Vis literis ubiq; humanitate, & benevolentia refertis, quibus ad me rescripseras, nihil habere respondere potui, autem negotium impeditum, non negligentia retardatum. Perlegi autem illas magna cum delectatione. Nam ut referta suauissimis plantarum, ac florum odoribus, ita sane iucundissima mihi fuerunt spatior itaq; nunc in tuo plantarum viridario, inter quas prima, que mihi sese offert, est.

Gingidium.

GINGIDIUM integra planta, que quo perfectior altera, quam prius ad me miseris, eo gratior mihi est. Nihil enim imperfectum, minusq; ingenium hominis desiderium explere potest. In priore altera nihil aliud videri poterat quam foliorum, & castrum facies, iam nunc video genuinum Gingidium non esse Cherophyllum, ut mea semper fuit sententia contra Fuchsi, & Ruelli opinionem.

Cherophyllum.

Medium.

VIOLEAS Mirianas Dodonei, legitimum esse Medium iam facile consentiam, cum nasci eas inter saxa, tuo ipsius testimonio factum sum certior. Semen quod mittis terra committam ad finem Autumni, & post hoc obstruabo diligenter quam diu latet, et anteaquam germinet.

Scamoniium.

SCAMONIUM quod antea miseris e Syria (ut putaram) esse allatum, quam libenter audio, sed eius flores, que una, cum aliis plantis ad me te transmississe scribis, nondum ad manus meas peruenierunt. Dolorem tamen si ali quo impedimento alicubi detinerentur, quo ad me deferri nequirent.

Thlaspi.

QUOT QUOT Thlaspi tibi sunt genera, septem, octo, vel plura, ea omnia videre cupio, admiraturus posthac natura n, quod in fingendo Thlaspi tanta artificii varietate uti voluerit.

Periploc.

PERIPLOCÆ repenti hanc historiam perquam diligenter legi. Eam enim literis in mea commentaria transferre decreui. Sed gratissimum mihi foret, si unam, vel alteram eius filiquam ad me transmissis.

Smyrium.

SMYRII Cretici radicem, quam terra conditam te misisse ais, nondum hactenus videre licuit. Vereor sane ne quippiam in itinere eam nobis abstulerit: quod sciam non deesse nostris laboribus invidentes, qui nostrarum plantarum furtis inuigilant. Semen quod a te missum habeo, suo tempore seram, quamquam in Bohemico solario peregrinae proveniant, que una, vel altero anno non degenerent.

Venebicum Scopendium.

DE PENEVICO Scalopendio, nisi nunc nihil ad ea qua petieram, respondeas: cum tamen pollicearis, id aliter facturum, expectabo donec maior mihi satisfaciendi tibi sese offerat commoditas.

Marum legitimum.

PFLCHERRIMAM ac rarissimam plantam, quam Arabs ille infidelis perperam Symphyon petraeum vocabat, omnino tecum sentio, legitimum esse Marum. Habet enim omnes Mari utas adeo perspicuas,

ut Terebinthina fuerit, qui hanc non agnoscat esse Marum. Folia illi sunt Amaraca candidiora, & flores O-
rigano similes. Præmoximè folia amarorem relinquunt, quem deinde acris sequitur sapor: qui tamen (ut
Galenus inquit) ab amaritudine vincunt. Hanc stirpis imaginem gratissimam futuram censeo omnibus rei
herbaria studiosis. Nescient enim posthac quantum facie Marum ab Amaraco distet.

I M A G O quam a Maranta Cytiso delineatam esse scribis, videtur genuini Cytisifaciem non inleganter
referre: si tamen e solo ramusculo integram plantam iudicare liceat. His cum accedat etiam Maranta testimo-
nium, qui Cytisum a se in mentum diligentiissime describit, facile adducor ad credendum stirpem hanc genuinam
esse Cytisum. Velim autem, ut si ab Agidio Cumano nobilissimo viro Cytisifaciem illius ramusculum meo nomine im-
petrare poteris, illum etiam ad me mittas. Cum enim tuis literis factus sum certior, me plurimum amari ab illo

10 (qua sua est humanitas) non dubito, quin huiusce rei me compotem facturum sit.

N O N parum sane placet intellexisse Rhabarbari historiam, quam una cum eius iconè antea ad me misisti.
sti, a Ioanne Baptista Ramusio in lucem editam, homine meo quidem iudicio, integerrimo, docto, & omni ge-
nere virtutum claro. Placuit mihi semper admodum Ramusii ingenium. Nam ad virtutem tantum a natura
factus mihi semper visus est. Ille primus Salusiam mihi videndam obtulit gallas ferentem, tua ad me missa simi-
lem, quam e Creta allatam dicebat: de quibus nullus est antiquorum qui meminerit.

Rhabarbarum.

Salusiam gallas
proferre.

Pistacium.

P I S T A C I I è tuo vitidario ramusculum, eam ob causam ad me missum existimo, quod à Maranta fer-
tasse excitatus, tibi non placeret Pistacii imago, qua in priori Commentariorum nostrorum editone, pictoris cui-
usdam infidelitate minus recte appicta conspicitur. Verum si Commentaria nostra postremo edita & diligentis-
simè inspexisset, non fuisset illi opus emendare, qua nos multo antea tempore emendauimus: nec tibi huiusce sus-
cipiendi laboris causam dedisset.

P L U R E S esse Irionis species iam diu animaduerto. Nam & tua hac planta Irionum generi notis omni-
bus correspondet. In mea nullam video notam, qua Irionem non referat: quanquam non desint blaterones, qui
eam damnant. Folia enim est Eruca sylvestris, cauliculis lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus,
corniculatis, semine Nasturtii exiguo, vrentis gustus, nec alibi nascitur quam iuxta urbes, rudera & hortos,
qua omnia suo Irioni reddidit Dioscorides. Tua maioribus conspicitur siliquis, grandiore semine refertis, quo
fit, ut censeam meam feminam, tuam marem esse Irionem, vel è contra fortasse.

Irionis plures
haberi species.

N I H I L dubito quin planta, cuius ego imaginem dedi, legitimum sit Elichrysum, quod Italia proferat, à
tuotamen notis quibusdam diuersum, quod etiam saepe hic in Bohemia vidi, Creticum vero nunc primum tua
liberalitate agnosco.

Elichrysum.

M A I O R I Pimpinella nostrate, quam quidam Sanguisorbam vocant, ubiq; hic praeferata sunt: que-
admodum & in Ungaria, ubi copiosissimam nasci vidimus.

Pimpinella ma-
ior.

N E dubita quin **M E L I L O T V M** tuum legitimum sit. Nam præter id, quod eius notis omnes legitimo
correspondent, nihil differt a meo, quod ex Campania allatum est.

Melilotum.

C A V D A M Vulpinam, Græcis *Αλωπίκρον* vocatam, è Lagopi esse genere tecum sentio. Sed an hac *Αλωπίκρον*
fit, de qua meministi *Plan. lib. 21. cap. 11.* non ita facile asseram, nisi eius folia perpetuo virescere intelligam. Vul-
pinam caudam enumerat Plinius inter herbas, quibus aeterna sunt folia. Sed an etiam in hoc Plinio fides adhi-
benda sint, anceps quidem sum: cum is inter easdem plantas Heliotropium habeat, cuius planta circa finem An-
tumni emoritur, nec citius repullulat, quam media æstate.

Cauda vulpina.

Plinii erratum.

M A G N I illius semperuini imaginem, cuius plantam Corcyra istuc transmissam esse scribis, magna cum
admiratione semper contemplantis ob rei nouitatem. Iussi in lignea tabella per quam diligenter eam delineari a pe-
ritissimo pictore, ut excisa edatur in lucem.

Semperuini
magnam.

D A C T Y L O S suis racemis hærentes, una cum eorum involucre, quod Palmam Elaten vocant, à cla-
rissimo Faloppio accepi superioribus diebus, quibus nihil mihi gratius esse poterat. Quo tempore eorundem ima-
gines cum tuis literis mihi etiam sunt allatae. Placent quidem icones ad amissimam appicta, sed longe magis Elates
ipsa sicca, & Dactylis suis racemis hærentes. Debeo Faloppio non solum de hoc munere plurimum, sed quod etiam
Musa summatem una cum fructibus & iconè ad me transmissit: quinetiam & Mixæ ramusculum, hæren-
tibus adhuc Sebæstis. Hæc enim tam rara, tamq; paucis nota, mihi gemmis, ac margaritis longe sunt cariora.
Edentur hæc omnia Deo Opt. Max. volente in omnium studiosorum commodum. Nihil enim tam rarum, tam
carum mihi fuit unquam, quod non voluerim commune esse omnibus. Elates historia quam describis, gratiss-
sima mihi est, quod una cum imagine Commentariis meis plurimum splendoris addere possit.

Dactyli.
Palma Elate.Musa imago.
Mixa.

A R B O R I S ramum, quem Smilacis esse censes, de qua inter glandiferas arbores meministi Theophrastus,
adeo descriptioni correspondet, ut facile consentirem è genuina Smilacis arbore esse rescissum, si glandes habere-
ret. Atqui sterilis cum sit, cogor etiam à me ipso dissentire.

Smilax glandifera.

P L A N T A, quam Syria quibus eam affert scribis, *Vishaghā* vocant, cuiusq; umbella festucis utun-
tur Hispani, ac etiam quidam Itali principes ad expediendos dentes Lentiscini dentiscalpii vice: quod non solum
tenaces, sed odorati habeantur, nil aliud contemplantis mihi representare videntur, quam domestica Pastina-
ca speciem. Si itaq; ab unguentariis, qui eius umbellas Venetus vendunt, semine habere poteris, facile comperies,
ubi satum enascetur, an ego, vel qui Meum, vel Ammi eam esse censent, rectius iudicauerint.

Vishaghā è Sy-
ria.

V E R B A S C U M folio cornicularis Papaneris, de quo meministi Dioscorides, tua tantum liberalitate
nunc primum agnosco. Placent inter cetera flores quod in aureo medistullo purpureis floccis niteant. Sed aliud
ego Verbascum vidi in lapidia montibus, flore in uniuersum purpureo à Blattaria diuersum.

Verbascum folio
cornicularis pa-
paueris.

E A N D E M nigri Chamaleonis imaginem huic tuae per omnia similem accepi superioribus diebus, una
cum ipsa planta, ab ipsomet Maranta, una cum Musæ iconè. Verum si sententiam meam sincere tibi narrare
debeam, plura sunt, que in Maranta Chamaleone desideranda videntur: de quibus cum fusius alias scribere
statuerim ad ipsam Marantam, non est ut de ea tecum hic pluribus agam. Hæc enim non pauca argu-
menta, qua huic Chamaleoni non parum refragantur.

Chamaleoni-
get.

A N G E L I C A E radice nigra semen, curabo ut habeas. Nascitur enim copiosa in nostra Bohemia mon-
tibus, Sin Misnia nobis contemina.

Angelicæ semen.

P L A C E T miram in modum **G L A V C I S** historia. Cum enim iam intelligam in Veneti maris lit-

Glauz.

tore provenire hanc folio (ut apparet) Cytisi candidiore flore aureo facile adducor ad credendum, quod hec quam misisti legitima sit Glanx.

Equiseti plures species.

E QVIS ET I plures, quam duas, haberi species, nunc primum animadverto, ex hac quam à te misisti inspicio. Respondet namq; Equiseti maioris descriptioni omnibus suis notis, adeo ut credam tuam hanc, genuinam esse Dioscoridi Hippurum, quod radice sit lignosa, & planta vegetior ac firmior tota.

Solanum Somnificum.

C V R Somnificum Solanum appellaveris eam stirpem, mihi novam, quam antea miseris, quamq; quidem lateum Hyoscyamum recte (meo quidem iudicio) esse censent, nunc primum intelligo. Quare eos accusabo, qui perperam hanc Somnifici Solani appellationem in vulgarem converterunt usum.

Seriphii Absinthii examinatio.

S E R I P H I V M absinthium, quod Alexandria Egypti allatum esse scribis, pulcherrimum mihi visum est. Nam longe magis Abrotanum parvum, id est, feminam, refert, quam Seriphium, quod ad mare in Italia provenit. Hoc enim non adeo tenuis herbula est, nec Abrotano parvo simile, quanquam sapore, odoris graevolentia, & seminis exiguitate, Seriphio correspondet. Quinetiam quod tantum in maritimis locis proveniat. Caterum cum tuum, hoc non solum minori Abrotano correspondeat, & pumila admodum sit planta, sed etiam in Egypto proveniat ubi nasci Seriphium una cum Dioscoride testatur etiam Plinius, adducor facile ut credam, id esse genuinum Seriphium Dioscoridis. Nec me ab hac amovebis opinione, quod absurdum admodum credere videatur, pro Olivarum ramo, tam exiguam herbam detulisse in sacris Æthiæ sacerdotibus, cum id tanquam addititium ex Dioscoride non transcribat Oribasius, & alia plura sint in hoc capite depravata: quedam vero ex aliis autoribus addita, quæ non ad Seriphium, sed ad Ponticum Absinthium spectant. Male autem legitur in hoc capite nasci Seriphium copiosissimum in Tauro monte iuxta Cappadociam. Quilibet enim intelligit, qui prorsus non fuerit stupidus, quod nihil sit absurdius, quam marinum Absinthium in montibus nasci. Nam hoc totum ex precedenti capite ab Absinthii Pontici historia, ad Seriphium translatum est, quemadmodum & illud, quod eius pabulo maxime pinguescant pecora. Siquidem hoc, ut Theophrastus inquit lib. 9. cap. 18. Ponticum, non Seriphium facit. Quæ omnia scriptorum infidelitati, temeritatiq; sunt ascribenda.

Seriphii caput Dioscoridi pluribus in locis depravatum.

Cætarium Marinum.

Q V O D Marinum Cætarium appellas, sunt qui marinam Anagallidem vocant. Alias hanc plantam vidi, sed tanquam ignotam neglexi: si quid ulterius scripseris de eius facultatibus, id erit mihi gratissimum.

Gelsimum.

G E L S I M I N I vulgaris fructus, quem misisti, Lupino non absimilis, eo magis placuit: quo rarior habetur, nec id crederem, nisi viderem ipse, & te huiusce rei haberem autorem. Nusquam enim audivi Gelsimum fructum ferre.

Buxus sylvestris.

S T L V E S T R I S Buxus, res nova etiam mihi est, nec habeo (quod meminerim) qui de eo inter antiquos mentionem fecerit. Libenter abs te audierim, an ligni materies alteri Buxo correspondeat.

V E N I O nunc ad Marantam, ob duriora quedam eius in me dicta iam calamum in eum stringere statueram, quum tamen illum se per literas purgaturum apud me intelligam, & locum in Lonchitide, in quo fidem meam infirmare nititur, emendaturum, tuis prudentissimis consiliis libenter obtemperabo. Cupio enim tui & Pinelli viri nobilissimi causa, Marante amicitiam conservare, si tamen ille honoris mei rationem habeat, & suum recognoscat errorem. Scio quidem vos esse homines, qui fama existimationisq; meæ rationem habeatis. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS, Iulio Moderato, Ariminensi Pharmacopœo, S. P. D.

Agitur de quibusdam simplicibus medicamentis, quæ in Anacardinam Antidotum veniunt.

Burungi examinatio.



Acepi literas tuas, quibus confecturæ Anacardinam Antidotum, plurimum dubitare scribis, quid pro Burungi in ea tibi fuerit addendum, quum varia de eo sint scriptorum opinionæ, ob idq; petis, ut in re hac meiste inuem consiliis. Ego vero non videar hoc labori potius subterfugere, quam quod putem tibi fortasse ac cæteris satisfacere posse, recusare sane non possum. ob tuam singularem erga me observantiam, quin tibi his aperiam, quid de Burungi mihi semper persuaserim, contra eorum omnium opinionem, qui hætenus de eo commentati sunt. Varia sane ac diversa (ut recte ad me scribis) extant de Burungi recentiorum placita. Aiqui tamen si plerique in censendo hoc

Luminaris maioris opinio exprobat.

medicamento non parum laborauerint, nullum tamen reperio, qui recte (quantum conicere possum) exposuerit, quid Maurita iis designet Burungi; tanta est apud Arabas interpretum confusio. Siquidem Luminare maius vocatum Burungi Cubebas interpretatur, sed eius mihi haud placet opinio, tum quod frivolis admodum nitatur rationibus, tum etiam quod rei Medicæ imperitus multa confundat medicamenta. Cordus deinde cuius doctriam in componendis medicamentis omnes fere sequuntur Germani ac Bohemi, Eruca semen Burungi loco admiscet. Sed qua ratione, quæ auctoritate id fecerit, silentio præterit, quo fit, ut nec illi sit assentientium.

Monachorum opinio non accepta.

Monachi qui in Damascenum Commentaria edidit, nisi primo fateantur nihil compertum habere ob varias Arabum lectiones, quid sit Burungi, Melissam tamen, vel Cubebas eius loco sumendas faciunt, quamquam & ipsi nullis nitantur apertis rationibus, nec auctorum monumentis. Præterea ut suam tuantur sententiam, & eorum refellant opinionem, qui Burungi Nigellam interpretantur, auctorem quendam (ego hunc Sylviu crediderim) novarum interpretationum accusant, quod dixerit nosci posse Burungi Melanthis designare ex Anicenna ac Serapione, qui Nigellam habent Burungi loco. Quippe hoc pertinaciter (ut Monachi solent) negantes affirmant Anicennam, Serapionemq; (perperam tamen) præter Nigellam habere etiam Burungi. Caterum hoc falsum esse convincitur, quum horum nemo in hac Antidoto, nec aliis duabus sequentibus Burungi meminerit. Quo fit, ut non ignorantia tantum, sed etiam mendacii sint arguendi. Monachorum opinionem pariter & errores videtur sequutus Fuchsius vir alioqui doctissimus, tum quod & ipse Melissam imponat, tum etiam quod scriptis mandauerit Anicennam quinto canone in huiusce Antidoti descriptione Burungi etiam præter cætera meminisse, quum tamen id (ut prædiximus) sit falsum. Quandoquidem in exemplari nostro, quod est ad manus ab Andrea Bellunensi restitutum, nusquam extat Burungi mentio. Quo fit, ut non possit

Fuchsi erratum.

Quo fit, ut non ignorantia tantum, sed etiam mendacii sint arguendi. Monachorum opinionem pariter & errores videtur sequutus Fuchsius vir alioqui doctissimus, tum quod & ipse Melissam imponat, tum etiam quod scriptis mandauerit Anicennam quinto canone in huiusce Antidoti descriptione Burungi etiam præter cætera meminisse, quum tamen id (ut prædiximus) sit falsum. Quandoquidem in exemplari nostro, quod est ad manus ab Andrea Bellunensi restitutum, nusquam extat Burungi mentio. Quo fit, ut non possit

non mirari Fuchsin alioqui doctissimum prudentissimumq; virum, quin & Monachorum sectatorum acer-
 rimum, quod in hic tantam adhibuerit fidem, ut eorum potius crediderit testimonio, quam quod vellet tantum
 subire laboris, ut hoc loco Auicennam inspiceret. Quod autem, nec Auicennam inspexerit, nec legerit, id ma-
 nifestum prabet indicium, quod scripserit Anacardina descriptione apud Auicennam in nullo prorsus variare
 ab hac, quam describit Damascenus, ob idq; magis hanc Auicenna, quam Damasceno Medico acceptam re-
 ferre debere: quod tamen falsum deprehenditur. Siquidem longe alia est Auicenna descriptio, quam Spodiu,
 Cardamomum, minus Gingsber, Piperis arboris radices, & Anisum admittat, quorum non meminit Dama-
 scenus. Nec e contra capiat Chepulos, Castoreum, Costum, Saccharum, nec Lauri baccas, quibus suam idem
 conficit Damascenus. Prater id cenjet idem Fuchsin Serapionis auctoritate fretus Burungi sive Berungi A-
 phris, nil aliud designare, quam Melissophyllum, quod ipse Melissam suo Arabico idiomate Bedarargie & Be-
 darungi vocet, et ut suam tueatur sententiam, dicit Serapionis codicem hoc loco interpretum inscitia esse omni-
 no depravatam, & legi debere Burungi, non autem Bedarungi, quum nil aliud Aphris sit Bedarungi, quam
 Ocimum. Sed ipse (quantum video) non omnia apud Arabas perlustravit. Siquidem tametsi id ipsum re-
 liquerit Auicenna, Serapio tamen Ocimum Bedarungi nusquam appellat, sed Berengemisch Berendaros & Ocimum, Beda-
 Berendarog, ut facile apud ipsum videre est. Rasis vero lib. 21. Continentis Badarungi Ocimum vocat. Et li-
 bro de Arabicis nominibus Basilicon, inquit, latorum foliorum appellatur Arabice Baduraig. Qua omnia sa-
 cile ostendit, nihil solidi ab Aphris adeptum esse Fuchsin, quo recte probari possit Burungi esse Melissophyllum.
 Caterum, nec eorum argumenta probanda putaverim, qui Melanthium pro Burungi admisceri contendunt,
 eo quod Auicenna, ac etiam Serapio nigellam habeant, & Burungi non meminerint. Quippe quum ii (ut pra-
 diximus) prater nigellam alia plura habeant simplicia, quorum nulla Damasceno sit mentio, recte sane haud-
 quaquam affirmari potest, an Nigella potius, quam Cardamomum, vel Piperis radix, vel Zingiber, vel Ani-
 sum, quorum si speciatim meminere Burungi loco fuerit usurpandum. Caterum ut tandem meam de Burun-
 gi tibi aperiam sententiam, putaverim ego legi debere Durungi, non autem Burungi. Durungi enim Auicen-
 na secundo Canone Doronicum designat. Quod ad hanc Antidotum parandam admodum competere videtur.
 Quandoquidem Doronicum Serapionis & Auicenne testimonio, cor mirifice roborat animumq; hilarem red-
 dit, Neminem enim latere crediderim, qui se Medicum profiteretur, medicamentum ea, qua ad cordis praestant af-
 fectum, facere etiam plurimum ad Cerebri morbos quum spiritum attenuent, clarioreq; reddant, ea tamen in-
 telligo, qua facultate sunt calida. Facili enim ac lubrico fuit Chalcographi lapsus, qui D in B. nimia fortasse
 manus properantia verit, dum charecteres connecebat. Namq; ubi D. inuersum fuerit, in B. max conuersum
 videtur, quo fit, ut Durungi non Burungi legi debeat.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Medicus, Bono Baldino Myropolæ,

S. P. D.

Examinantur quadam medicamenta, qua veniunt in Trypberam
Saracenicam.

Ratius Trypberam Saracenicam magnam Ioannis Damasceni, quae datur ad melitendos,
 quid pro Secacul, quid pro Seitaragi sive (ut quidam legunt) Siharagi, quidue pro Origano
 Persico fuerit immiscendum, quum haecenus a nemine in hisce censendis medicamentis tibi fu-
 erit satisfactum. Qua in re non possum petitioni tuae non morem gerere, tuis ut cognosca me tua
 de me confidentiam, non parui facere, tum etiam ne si silerem, fortasse censeret Arabum medica-
 mentis me non ita exacte explorasse perinde ac ea, de quibus Dioscorides scripsit. Ut itaq; de Secacul in primis
 meam ad te scribam opinionem, nihil dubito hallucinari eos, qui putant Secacul esse Eryngium, ac pariter eos
 (ut Manardus Ferrariensis) qui hoc idem existimant esse Polygonatum. Etenim Pisi folia, ut Secacul, Poly-
 gonatum non habet, nec flores purpurascetes violae maiores, sed minores, albicantesq;. Praterea Secacul Sera-
 pioni radicibus nititur pollicis crassitudine, & indicis longitudine. Contra vero Polygonatum, quod multo lo-
 gioribus sit radicibus. Adhuc (ut testatur ipse Ioannes Damascenus, ac pariter Serapio, ubi de Secacul, sac-
 charo, vel melle asseruando scribunt) eius radices cinereo exterius cernuntur colore solida intus matrice, atque
 uernosa, qua omnia in Polygonati radice desiderantur, quum candida admodum sit, fragilis, & nulla intus ma-
 trice. Quod autem non sit Eryngium in Commentariis nostris satis superq; probauimus, praesertim quum Seca-
 culi nusquam planta fuerit aculeata. Re autem vera Secacul radix est Indica: Hoc enim testatur Auicenna
 lib. 5. ubi sic habet. Secacul sunt radices Zingiberi similes, qua conuehantur ex India, & sit ex eis, quum sunt
 recentes conditum in loco suo. Apud nos autem humectantur in primis in aqua calida: Quae etiam ad ungue Se-
 rapioni de eo pariter scribuntur, ubi de pluribus Saccharo, & melle asseruandis exit. Quibus palam est Seca-
 cul radice esse peregrina, qua ex India olim conuehebatur. Sed quum iam diu ad nos conuehi desierit, cogimur
 eius loco alio quopiam uti medicamento. Quamobrem suaderem ego, ut pro Secacul Pastinacam, tum satina, loco Secacul
 tum etiam syluestrem supponeres: quum Pastinaca utraq; iis fere viribus praestet, quas suo Secacul ascribunt.
 Mauritani. Caterum Seitaragi sive Siharagi, sive Sybragi (Synonyma haec sunt apud Arabas) plura quidem
 designare nemini fuerit ambigendum, qui eius historiam apud Serapionem & Auicennam legerit. Quandoqui-
 dem, quanquam nil aliud Serapioni est Seitaragi quam Diosc. Iberis, sive Lepidium, Auicenna tamen Seita-
 ragi tria genera clarissime explicantur, quum inquit: Et ille qui est Indus, sunt frusta ligni parua, tenuia, & cer-
 uices sicut Caryophylli: Et ille, qui est fructus declinat ad rubedinem, nigredinemq;. Et Seitaragi quidem oritur
 in parietibus antiquis, ubi non foditur, neq; aratur, & habet folia sicut folia Nasturtii, & in aestate sunt folia pla-
 rima quorum sapor, & color assimilatur Cardamomi. Haec ille. Quibus clare satis patet tria esse Auicenna Seitaragi
 genera: quorum postremum nulli dubium est, quin legitimum Ibericum designet. Interpretis tamen error vniuersum, pa-
 tebit, ubi legitur hanc plantam odere, & sapore esse Cardamomi: Quippe non Cardamomi, sed Cardami, id est tunc erant
 RR 4 Nastur-

Monachorum
sententia explorata.

*N*asturii legendum est. Quae vero medicamenta ex iis, quae nostris in Myropolis habentur, cetera duogenera praeseferant, nullus hactenus (quod sciverim) recte explicavit. Nec probanda videtur Monachorum sententia, qui in Damascenum commentaria edidere: Quippe qui perperam sibi persuaserunt, nil aliud Mauritanis Seitaragi designare, quam Indicam Casiam, veterem Auicenna editionem sequuti. Siquidem Alpagm ille Bellanensis, qui magna diligentia Auicenna volumina restituit, libro 5. in confectione Philosophorum, in Tryphera magna, quum in prima, tum etiam in altera in Electuario de granis viridibus aliisque nonnullis, ubi Gerhardus modo Casiam simpliciter modo Casiam Indicam vertit, Casia huiusce loco Arabicum nomen Seitaragi sine Sythragi restituit. Id quod fecisse eum arguit, quod Arabica lingua peritus pro certo sciuerit, Arabicum hoc nomen nullo pacto ad Casiam referri posse. Caterum cogitanti mihi num primum, ac secundum Seitaragi genus, de quibus meminit Auicenna, ad nos aduehatur & in Myropolis extet: statim sese mihi censendas obtulerunt odorata festuca illa Caryophyllorum instar, quas nos vulgo vocamus Fusti di Garoffani, &c. quin & fructus illi Caryophyllis tumidiores insipidioresque, quos Italica Seplasia Antophyllos & Pseudocaryophyllos vocant. Siquidem festuca illa primum, hi fructus vero secundum Seitaragi genus apud Auicennam praeseferre videntur. Frustra enim Caryophyllorum ita nobis appellata priori Auicenna descriptioni, quam maxime congruere videtur, quum ait: Sunt frusta ligni parua, ac tenuia, & cortices sicut Caryophylli. Verum pato subesse interpretis, vel scriptoris mendam in dictione cortices, quum Caryophylli cortices non sint, sed fructus, & comparatio omnino absurda videatur: quapropter putauerim ego ita legendum: Sunt frusta ligni parua & tenuia, odorata, tanquam putamina Caryophyllorum. Etenim nulli dubium est frusta illa seu festucas, quae inter Caryophyllos ab eodem reperuntur pediculos esse & putamina Caryophyllorum, quae a Gerardo perperam (ut alia innumera) cortices sint translata, quum cortices etiam putamina appellantur. Ideoque a Brasauolo aliquo doctissimo viro, ac acerrimi ingenii dissentire cogor, quippe qui minus recte existimauerit Seitaragi primum genus esse Carpesium: quum hoc Galeni testimonio ex Pamphylia afferatur, & ingens eius proventus habeatur in Syria: Seitaragi vero primum genus Indicum sit medicamentum. Praterca Carpesium nullo Caryophyllorum odore commedatur, nec ullam cum Caryophyllis habet cognationem neque similitudinem, sed omnia sunt illi (ut Galenus inquit) Phu vocato similia. Adhuc quum Auicenna de Cubebis scribens cap. 38. secundi libri, nil aliud scribat quam Carpesium, nullo sane pacto rationi consentaneum videtur, quod Seitaragi illi Carpesium designet. Atque si fructus, quos Italica Seplasia Antophyllos vocant parumper expendamus, non sane absurdum videri debet, si hos dicemus facile esse posse Seitaragi secundum genus: quippe hi fructus sunt e Caryophyllorum genere colore ex atro rufescente. Nam & hi expetuntur ad composita medicamenta, quae ad corporis imbecillitatem praestant, ideoque recte Nicolao Myresico in suo Diathamaro adduntur. His itaque rationibus mihi omnino persuasam velim, nil aliud Seitaragi Indici loco in hac Tryphera imponi debere, quam Caryophyllorum festucas, sine pediculos, quod odoris sui fragrantia, & virium robore maxime hic ad rem faciant. Quod autem ad Origanum Persicum spectat, quid tibi certi asseram in praesentia sane non habeo: nam Persici Origani meminisse Dioscoridem, Theophrastum, Galenum, Plinium aliosque, qui ante, vel post claruerunt, Gracos vel Latinos autores (quos legerim viderimque) hactenus non reperi, tamen apud Arabas illud sapius innenerim descriptum in compositis medicamentis, praesertimque apud Auicennam, qui eius tamen non meminit, libro secundo ubi de Origano peculiariter scripsit. Origanum itaque Persicum (ut tibi meam aperiam sententiam) a loco omnino dictum putarim, videlicet quod apud Persas proveniat: sicuti etiam dicimus Phu Ponticum, Rhus Syriacum, Bitumen Iudaicum a locis, a quibus comportantur ea denominantes. Nec fortasse, ut puto, aliam ob causam Persicum Origanum hic praeulit Auicenna, nisi quod certe sciret ea in regione provenire Origanum omnium praestantissimum. Namque apud Persas diu floruisse Auicennam maxime testatur Bellanensis. Nos autem quum Persico omnino careamus, Cretico eius vice securius uti possumus, quam nostrate, tum cum legitimum Origanum non sit, tum quod nec ea, quae Creticum, praestare possit. Vale.

Caryophyllorum
festuca Seitaragi primum genus.

Antophylli Seitaragi secundum genus.
Locus Auicennae restitutus.

Brasauoli opinio non accepta
Seitaragi Carpesium consentis.
Antophylli.

Origanum Persicum.

Origanum nostrate.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Petro Spezzalancio Pharmacopoeo, Compatri suo,
S. P. D.

Examinantur simplicia quadam medicamenta, quae in Antidotum
Hamagogum veniunt.

Magno sane sum desiderio, ut tuo in Myropolio, quo solo hic Goritia utor, Antidotum Hamagogum Nicolai Myresici paratum habeas. Nam etsi rara sint in Italia Seplasia, quae Antidotum hanc parare soleant, quod pauci vel nulli fortasse reperiantur Medici, qui eo utantur, quum tamen ego medicamentum hoc pluris faciam, ob mirificas eius ad varios morbos facultates, eoque sexcenties usus sum ipso careere non possum. Velim tamen (ut tua semper fuit diligentia) nihil in eo praetermitti, quod inueniri possit. Namque, ut nullus in parando committatur error, nec aliquid ibi deficiat, quae in hac paranda Antidoto mihi videntur annotanda, hic tibi statim aperiam. Primum itaque animadvertere te oportebit, quod ubi Nicolai codex interprete Fuchsio semen Ictybi habet, antiquus Latinus codex habet Asari. Quod mihi longe magis consentaneum probandumque videtur. Asari etenim radix Dioscoridi ex-calfactoria vi, qua pollet, urinam cum, cutem subeuntes aquas eicit & menses trahit, quo fit ut longe utilius huius Antidoto veniat admiscenda, quam Ictybi semen, cuius facultas est refrigeratoria. Praterca tamen si recentior Nicolai editio, eodem Fuchsio vertente, Centaurium maius tantum admittat: potius tamen mihi videtur acceptanda antiqua versio, quae maius & minus Centaurium recipit. Quandoquidem Dioscoridi Centaurium minus menses, & partus extrahit, quinetiam nervorum vitium succurrit: Galeno item tacinoris obstructio-nes referat, & induratos lienes sanat. Quod maxime pollicetur hac Antidotum, quibus tamen viribus praestantius praefertur coma floribus referta. Alium vero, nempe maius, quod passim pro Rhapontico usurpant Seplasia,

Nicolai loca re-
stituta.
Asarum.

Centaurium ma-
ius & minus.

radice sola pollet. Nuper has radices recentissimas a Gargano Apulia monte ab Antiano Herbario allatas te comparasse scio, nec aliunde aduectas vidi ego unquam praestantiores. E igitur recentes, vegetas, ponderosas, sanguineo succo praegnantias. Solent enim cito humorem amittere, ubi calido & sicco loco reponantur. Sed ut quae cupis incorruptas eas diutius asseruare, vel in melle sepelias, vel in magno mitu acervo tela cera superillita circumposita reponas. Adhuc caueas, velim, ne in admiscendo Elleboro, Fuchsi opinionem sequaris. Ille enim alioqui vir clariss. quod in antiquo Graeco Myrepsici ipsius codice legerit ἐλεβίου μέλαρος credidit non ἐλεβίου legi debere, sed μέλαρος. Nam quum adiectionem Μέλαρος nulla profus ratione, cum Helenio conuenire posse cerneret, non abijque manifeste ratione mendam iussisse putauit. Atqui longe alia sum ego opinione, quippe qui Helenium non Elleborum admiscendum censeam: ea omnino ductus ratione, quod prater id quod sciuimus

1^o *Gracum Nicolai codicem numerosis admodum ubique scaterere mendis non videam, quid emolumentum in hac paranda Antidoto Elleborum nigrum laboriosum medicamentum, aliumq, non sine incommodo deiciens praestare possit, praesertim quod ventriculo sit infensissimus, nec menses ciere valeat, nisi pro glande suppositus. Contra vero Helenium. Quandoquidem id Dioscoridis testimonio menses & urinas ciet, flatus expellit, & stomacho utile est: quae omnia Antidotus Hamagogos nobis pollicetur. Quo fit, ut credam, imo omnino mihi persuasum habeam, dictionem ἐλεβίου neq, amouendam esse, neq, immutandum, sed dictionem μέλαρος potius corrigendam. Etenim (ut mea fert opinio) non μέλαρος sed Μέλαρος legendum est: adeo ut pratermissas nolim, quin Melanthium etiam admiscas cum Dioscoride & Galeno opinioni nostra astipulantibus, qui Melanthium flatus ducere, urinas ciere, & menses elicere tradunt. Prater id ne aliquis committatur error in dictione Sisonis pratermittendum non duxi, quin tibi indicarem quae mea semper fuerit opinio, in hoc censendo medicamento. Ego itaq, quum Sisonis nusquam meminisse Rei Medicae scriptores animaduernerim, non Sisonis, sed Sisonis legendum esse putauit. Sison enim Dioscoridi lib. 3. exiguum semen est, quod in Syria nascitur Apio simile, oblongum, nigrum, feruens, cuius facultas est lienem absumere, urinas ducere, remoratosq, menses trahere: Id quod maxime expetit Antidotum Hamagogos. Quo fit, ut a Fuchsiu dissentiam qui Sisonem facit Syluestris Petroselinum semen, cuius etiam nullus probatus auctor (quod sciuerim, vel legerim) meminit. Quin & ab his dissentire cogor, qui Sisonem Sium interpretantur, quum nulla mihi sese offerat ratio cui adstipulari queam. Verum quum Sison ex Syria affertur deserit, Cari semen usurpandum censerem, quod pariter excalfaciat, urinas pellat, flatus extinguit, & concoctionem adiuuet: quod & ut facias velim. Est etiam tibi animaduertendum, quod ubi Gracum Myrepsici codex habet ἐλεβισσαύου, id est Salvia, Latinus habet Sabina. Atqui quum utraque menses eliciat, parus & urinas extrahat, non multum referre videtur an una vel altera admiscetur. Verum tamen cum Sabina omnium consensu longe magis Hamagoga habeatur, quam Salvia, quod non solum valentissime pellat menses, sed etiam sanguinem per urinam trahat, non possum tibi non persuadere, ut Sabinam pro Salvia adicias. Postremo etiam Gracum idem codex ex hac Antidoto Carpobalsamum excludat, quum tamen Latina versio id admittat, suadeo ut pro Carpobalsamo, quo omnino destituimur, vulgares addas Cubebas. Hac itaque si feceris, nihil nobis verendum erit, quin optimam Hamagogum paratam habeamus. Vale.*

Centurionis qui ra licet e Gargano monte optima.

Fuchsi opinio improbat Helenium.

Melanthium.

Sisonis nō Sisonis legendum.

Fuchsi sententia non accepta.

Sisonis loco substituentum Cari semen.

Sabina & Salvia.

Cubebas pro Carpobalsamo.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Petro Azaiglae, Caesaris Ferdinandi Pharmacopoeo.

S. P. D.

Agitur de quibusdam simplicibus medicamentis, quae in auream Alexandrinam ingrediuntur.

Ameti (ut ex tuis accepi literis proxime ad me datis) iam diu in componendis omne generis medicamentis maxime versatus sis, & in eis etiam cognoscendis non parum insudaueris, non tamen ob id, inquis tam clare hac in re ea omnia te esse haecenus assequutum, ut plura adhuc non supersint, de quibus tibi dubitare contingat. Quapropter quum nunc in paranda aurea Alexandrina, nonnulla tibi habeas, de quibus dubitas, quando nihil certi solidiq, haecenus a recentioribus, quod de medicamentorum compositione scripserunt, traditum sit, postulas a me, ut meam tibi de his describam opinionem, quod fortasse (ut scribis) tibi persuadeas, me hac in re operam tuam ceteris omnibus plus inuare posse. Ego vero quamuis in medicamentis censendis, tantum me praestare non putem quantum mihi tribuere videris, non tamen tuae petitioni unquam refragabor, non quod te docere possim, vel velim, quum mihi iam diu persuasum habeam, te Sephasiarium esse exercitatissimum, & Rei Medicae peritum, sed ut cognoscas quanta tibi satisfaciendi mea sit promptitudo, quantaq, te prosequar beneuolentia. Primum itaq, quantum ad Zedoariam spectat, mea semper fuit opinio, quod legitima ad nos non afferatur, sex notis quibus suam Zedoariam describunt Arabes, ea nobis censenda sit. Siquidem Auzenna una cum N. pello crescere Zedoariam scribit, & Graecum portiones esse ait similes Aristolochiae. Caterum an longa, vel rotunda, id manifeste explicat Serapio, quippe qui Zedoariam scribat radices habere similes Aristolochiae rotunda a qua longe sane abest Zedoaria, cuius passim est usus. Atqui si meam de Zedoaria censuram tibi ingenue declarare debeam, velim non ignoras me eam radicem veram, legitimamque tum Auzenna, tum Serapione Zedoariam esse censere, quae Antitorā sive Antitorā legitima esse Zedoariam.

2^o *Antitorā sive Antitorā legitima esse Zedoariam.*

3^o *Antitorā legitima esse Zedoariam.*

4^o *Antitorā legitima esse Zedoariam.*

5^o *Antitorā legitima esse Zedoariam.*

6^o *Antitorā legitima esse Zedoariam.*

Zedoariam eandem esse legitimum.

Antora sive Antora legitima esse Zedoariam.

(ut tu ipsemet suis in literis ad me datis legisti) mihi affirmavit, & ob id incredibili fere pretio ab Arabibus, qui eam Constantinopolim comportant, vendi scribit. Verum quanquam hisce radicibus Seplasia omnes pro-
sus destituuntur, nolim tamen ut putes me ad te scribere hac, ut alio quopiam medicamento, quam vulgari Ze-
doaria earum vice te uti velim, sed ut tibi declarem speriamque, qua sit Arabum legitima Zedoaria. Nam
quum innumeris constet experimentis nostri usus Zedoariam, prestare mirum in modum ad venena, veneno-
forumque animalium ictus, quin & pestilentem auras proculdubio arcere, nihil sane mihi sese offert medicamen-
ti, quod legitima Zedoaria loco convenientius substitui posset, quam nostri usus Zedoaria, qua (ut censeo) me-
rito legitima locum sibi vendicavit.

Loc^o Nicolai re-
stitutus.

Prudenter praterea animadvertisti Codicum Nicolai variam esse in quam pluribus lectionem, ut in hac
habetur Antidoto. Quandoquidem ubi Græcus codex habet ἐλεισφαύ: id est, Salvia, Latinus antiquioris
lectionis legit Saliunca, perperam tamen me iudice, quippe qui hunc errorem semper reiecerim in imperitos scri-
ptores. Facit aurea hac Antidotus ad frigidas cerebri fluxiones, ad delachrymantes oculos, ad dolorificos dentiū
rheumatismos, confert tabe laborantibus, tussientibus, anhelosis, & sanguinem reiciētibus, auxiliatur resolu-
tis: prodest item uterinis affectibus & urina stillicidiis. Qua omnia facile Salvia per se prestare potest, Sali-
unca vero minime. Siquidem, Plinio teste, huius radix prestat tantum ad cohibendas vomitiones, & ventri-
culum roborandum. Nec velim, ut cum Leoniceo, Ruellio, Fuchso, & Cordo credas, Celticam Nardum &
Saliuncam eandem esse plantam, quod (pace tantorum virorum dixerim) vel Dioscoridem negligenter lege-
rint, vel non intellexerint, vel fortasse depravatam habuerint. Quippe Dioscoridis Græcus codex, qui ad ma-
nus est antiquissimus ἀλιγγία habet, non σαλιγγία, ut fortasse legerunt optimi illi viri. Constat praterea (ut
Plinius est author) non solum forma & quantitate à Celtica Nardo differre Saliuncam, sed etiam facultate
& natali solo. Ut autem de forma primum & quantitate disseram, Saliunca planta est foliosa, & adeo densa
ut fere manu pressa videatur, quinetiam adeo brevis, ut nec tibi sane non possit. At Celtica Nardus nec foliosa visi-
tur, nec densa, nec adeo brevis est planta, ut nec tibi nequeat, quum teste Dioscoride in fasciculos probe colliga-
tur, cuiusmodi est, qua ex Stiria & Carinthia ad nos comportatur in fasciculis. Adhuc Saliunca radicibus nu-
merosis cohaeret, contra vero altera. Prater id si Saliunca facultates expendas, nihil virinum in ea conspicias, qua
Celtica Nardo conveniant. Postremo si natale etiam solum considerandum nobis fuerit, reperiemus Saliuncam
in Pannonia & apud Noricos oriri, Celticam vero Nardum in Istria, Carinthia, Stiria & in Liguria Alpib.
Quo fit, ut maxime hallucinari deprehendantur, qui censent Saliuncam & Celticam Nardum eandem esse
plantam. At si tibi forte obiiceret quispiam, Celticam Nardum hac in Antidoto imponi debere, quod Saliun-
ca nil aliud ibi designet: illi facile respondere poteris, id a ratione abesse plurimum, quod Antidotus hac Nar-
dum habeat Indicam, qua cum iisdem cum Celtica sit viribus, ea quidem supervacua accederet. His itaq; fa-
cile eorum deprehenditur error, qui Salviā hac in Antidoto non addunt.

Saxifragia.

Betonica Pauli.

Venio nunc ad Saxifragiam, cuius plures habentur species, ut te non ignorare non ambigo. Verum qua-
nam inter ceteras seligi possit, neminem habeo, qui recte decernat. Proinde si Dioscoridis Saxifragia uti vole-
mus, hac ea sane fuerit, qua Paulo Betonica appellatur. Quippe ramulos profert hac (ut ille inquit) Pulegio te-
nuiore, & folio Thymi maiores, vel Satureia. Ego vero quum legerim apud Dioscoridem Saxifragiam plan-
tam esse Epithymo similem, putavi quidem aliquam hic subesse mendam: attamen quum mihi persuaserim,
adeo tenuia illi inesse folia, ut Epithymi modo capillamenti speciem referrent, hac tandem persuasus opinione,
herbam quandam nascentem in petris ad calculos renum frangendos, ducendosque maxime utile, legitima Sa-
xifragia loco pingendam curavi. Ceterum quum tractu temporis Pauli Betoniam primo loco descriptam re-
pererim, legerimque hanc ad renum vitia usurpari, contemplatus diligenter plantam, quum animadverterem
illi folia esse Thymi, nascique inter saxa, quinetiam exiguum esse fruticem: illico inclinavit animus facile scri-
ptorum lapsu euenisse, ut in Dioscoridis codice, qui passim habetur Epithymo pro Thymo perperam legeretur.
Quo postea factum est, ut hanc prioris loco pingi curarem. Hanc itaque si consequi valebis (est enim in Italia
iam omnibus cognita) securius admiscere poteris, ubi vero eam consequi nequeas, suaderem ut pro ea Ononi-
dis radicis cortice uteris, quum huic maxima frangendi calculos insint vires. Quod deinde de albo & rubro
Arabum Behen censendum putem, id facile intelliges ex meis in Dioscoridem commentariis. Caremus nos
proculdubio legitimis hisce radicibus, quo factum est, ut ego rubri Behen loco Tormentilla, vel Bistorta radi-
cibus semper sim usus, pro albo vero minoris Phu, qua si tibi fortasse non placebunt, poteris cum Anicea utri-
usque Behen loco securius fortasse supponere, vel tantundem Horminii, vel dimidium ponderis lingua anis.

Dioscoridis lo-
cus restitutus.

Pro saxifragia o-
nonidis cortex,
Behen album &
rubrum.

Quid pro Behen
supponendum.

Acorum.

Galanga maiorē
non esse Acorū.

Ceterum quantum ad Acori radices attinet, cum adeo validissimis argumentis nobis comprobatum sit,
Calamum Aromaticū vulgaris usus legitimus esse Acorum, ut nullus mihi superfit ambigendi locus, id sem-
per tibi ad manus esse poterit. Nec putarim unquam eorum frimolam complecti opinionem, qui maiorem Ga-
langam legitimam putant esse acorum, praesertim si memineris te videre, apud me Acori radices Constantino-
poli allatas, cum integris foliis Iridi amulis: quanquam (ut Dioscorides tradit) angustioribus. Id quod falsam
earum explodit sententiam, qui contendunt hasce Acori radices, radicem esse odorati Calami. Testis enim tu ti-
biesto, an ea planta Calami aliquid gerant, an folia ipsa tantum. Ceteris vero profecto id attestari poterunt
Clariss. D. Augerius Flandrus, Casareus apud Turcarum Imperatorem Orator, atque etiam Gulielmus Qua-
celbenus eius Medicus, qui hisce radicibus è Nicomedia petitis Calamum nullum eas unquam proferre scri-
bunt, sed caulem angulosum, è cuius latere aliquid emergat plantaginis capitulo non ab simile, quod paulo post
ad vitiginei floris modum florere soleat. Ad Carnabadium nunc me confero, quod quidam Doronicum esse pu-
tant à Ruellio fortasse falsi. Quippe is Carnabadium Doronicum esse censet, sed falso quemadmodum etiam
Actium falso citat, quod nusquam (quod legerim viderimque) Carnabadi meminit. Nemo enim inter Græcos de
Carnabadi viribus scribit prater unum Simeonem Sethi, quod ita de eo habet, Carnabadium calidum est,
& siccum ordine tertio, utile vero est ad concoctionem ciborum & flatuum discussionem, stomachum firmat,
ventrem fistit, lumbricos necat, urinam movet, pituitam scindit. Hac ille. Qua si conferantur cum his, qua de
Caro scripserunt tum Græci, tum etiam Arabes, nihil profecto à Caro differre Carnabadium comperies: Gale-
nus enim Carum ex tertio excalfacientium, & siccantium ordine staturit, quinetiam qualitatem moderate a-
crem possidere, itaque & flatum extinguere, ac urinam cito posse, inquit: non solum semen, sed etiam plantam. Ca-
lorum

Carnabadium,
Ruellio Doroni-
cum male.

Carnabadiū esse
Carum.

- terum Dioscoridi stomacho est utile, & concoctionem adiuvat. Serapioni autem, & Auicenna à quibus Si-
meon ipse Sethi cateriq, posteriores Graci plura desumpserunt, vermes interancorum necat, ventriculum robo-
rat, & ventrem sistit. Quibus palam est, nil aliud esse Carnabadium quam Carum. Atqui posset aliquis huic
nostra sententia refragari Nicolai Myrepsici testimonio fretus, quod is in Antidoto quadringentesimo vige-
mo nono quod ex Hermodaelylis inscribitur, habeat Carnabadi, id est, Cumini Ethiopici. Huic tamen e-
go facile responderim, verba illa, id est Cumini Ethiopici, ignari alicuius esse expositoris, ut alia com-
plura: vel Nicolaum ipsum earatione esse delusum, quod tanta Ethiopici Cumini seminis, & Cari sit simi-
ludo, ut alterum ab altero minime secerni possit, nisi quis utrumq, degustauerit. Est adhuc ad manus Ethi-
opicum Cuminum, quod tu etiam degustasti, Constantinopoli ab eodem Quacelbeno ad me missum, quod ad-
10 eo semen Cari refert, ut nisi mihi gustanti Cumini nostratis saporem referret, ego nunquam à Caro differre cen-
serem. Quo factum sane crediderim, ut Nicolaus horum seminum similitudine fuerit hallucinatus, si tamē is
(quod mihi suspectum est) Carnabadium ibi Cuminum Ethiopicum fuerit interpretatus. De Macedoni-
sio autem quid sentiam nil aliud habeo, quam quod putem Macedonicum designare Petroselinum, quum
quid sit Macedoniam nulli extet antiquorum: Aëtuarium enim in hac Antidoto Macedoniam loco Petroseli-
num habet, quinetiam Latinus, qui extat Nicolai codex. Proinde non est mihi Fuchsio ad stipulandum, quip-
pe qui velit pro Macedoniam eius planta inaudiendum esse semen, qua Gracis Hippofelinum, & Romanis olus
arum appellatur, per Hippofelinum eam plantam intelligens, quam nos legitimum esse Smyrniū alias dō-
cumus. Sed quum fortasse audierit Fuchsius, Seplahus huiusce planta semen vocari Macedonicum, sibi for-
tasse persuasit de hoc intellexisse Nicolaum. Quod autem factum sit, ut Smyrniū semen Macedonicum ap-
20 pellari cœperit, ego quidem inde euenisse putarim, quod Petroselini Macedonici penuria in eius successerit lo-
cum: Si quidem quum iam Macedonicum Petroselinum diu ad nos afferrī desierit, Medici qui praterito
auro claruerunt, Smyrniū semen in eius locum supposuerunt, quo postea factum est, ut tractu temporis Ma-
cedonici nomen sibi usurpauerit. Sed quanto errore ducantur, qui hanc plantam esse censent Dioscoridis Hip-
poselinum, non est hic nobis repetendum, quum in commentariis nostris in Dioscoridem, id adeo fuerit com-
probatum, ut nullus super sit ambigendi locus. Atqui nolim ut putes me hac in medium attulisse, quod tibi at-
que cateris interdicerem velim, ut in posterū caveatis ne Smyrniū semen legitimi Petroselini loco huic admiscea-
tis Antidoto, quum facultatibus, quibus pluribus pollet, maxime conveniat, sed ut sciant omnes hoc Smyrniū
non Petroselini esse semen, minnsq, Hippofelini, ut putat quidam.
- De Libystico profecto tacere decreueram, quum sciam te non ignorare, quid legitimum sit Libysticum,
30 nisi ceteros admonere voluerim, qui hac fortasse legent, hallucinari eos, qui pro Libystico Hippofelini semen,
quod falso quidam Libysticum vocant suis compositis medicamentis passim admiscunt. Reuixit tamen hac no-
stra etate (ut te haud latere scio) Libysticum, quorundam rei herbaria studiosorum diligentia, & iam in 7-
talia frequentissimum habetur, unde facile quis illud consequi poterit, nisi adeo erroribus antiquis fuerit ad-
dictus, ut hac neglexisse videatur.
- Nunc reliquum est, ut dicam Latinum codicem antiquum, neque Sapphyrum, neq, Smaragdum, ne-
que Iaspidem admittere, qua etiam Aëtuario silentio sunt pratermissa, quo sit, ut non desit suspitio, quin hac in
Graco codice adulterina fortasse habeantur. Ideoque nec temere factum putarim, si hac non admiscerentur,
tum quod semper crediderim lapidos, quantumcunque lanigatos, nihil ab innato calore immutari posse; sicut
nec aurum, nec argentum. Item e contra, nec temere factum dicam, si quis magis vulgariū opinionem se-
40 quantus, quam rationem, hosce lapillos admiscat. Nam tamen si fortasse nihil afferant auxilii, nocere tamen
non possunt. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Bono Baldino Myropolæ, S. P. D.

Agitur de optimo parando sero, quū etiam de decoctis
ac dilutis.

- 50 **R**ēterū quidem, Bone Baldine, Bonus vocaris, quum omnium qui tecum versantur testimonio
vir bonus sis, frugi homo, & qui nō solum amicis omnibus officiis gratificari cures, sed etiā Rem-
publicam ipsam iuare. Etenim etsi id antea nouerim, ex ea maxime qua mihi tecum iam diu
intercesserit, necessitudine: noui tamen longe magis ex literis, quas nuper ad me dedisti, quibus
eorum sententiam explodere nueris, qui in dilutis conficiendis, ubi lactis sero opus sit, id suo usu
accommodant, quod ex lacte, cui coagulū admixtum sit, vel ex ipso caseo dum premitur emanat: eo argu-
mento fretus, quod nusquam extet apud Dioscoridem & Galenū, vel alium quemcūque Medicū mate-
ria scriptorem, serum coagulo à caseo separatū expeti debere ad medicamenta: tum etiam, quod hoc sero ge-
nus acescat facile, & breui compūtescat. Proinde hosce arguis Myropolus, qui eiusmodi sero utantur, &
præferim ubi dilutum illud fuerit parandam, quo medicamenta macerari oportet, qua in illam veniunt An-
tidotum, qua Hamech Mesui appellatur, quod tibi persuadeas præter id, quod hoc serum sit parandis me-
60 dicamentis idoneum, euenire sane non posse, quin acescat, putrescatque, priusquam dilutum illud perficia-
tur quinque dierum termino. Adhuc eos quoque damnandos censes, qui in hoc parando diluto Rha Barba-
rum a ceteris separat medicamentis; quod putent, id nullam vel omnino modicam admittere coctionem,
postquam fuerit maceratum. Hoc ut probes, ais Medicamenta, qua simul macerantur, adeo sibi inuicem
uniri, ac colligari, ut si subinde ferueant, vel elixentur, ea minime resolui posse in vaporem, qua ob partium
tenuitatem imbecillis atemque breui admodum indigent coctione, quemadmodum resoluuntur, ubi prius ma-
cerata minime decoquuntur ex aqua: nisi illud seruetur institutum, ut qua tenuissima sunt substantia postre-
mo imponantur, & paruo temporis momento conferant. Et ut tuam auctoritate etiam comprobet sen-
tentiam, Mesuem non postrema auctoritatis Medicum in medium affers: quippe qui in parando Sympo de
Glycyrrhizæ, omnia qua in eum veniunt medicamenta simul macerans, ac deinde coquit ad mediam, nulla
Adiantum

Loc^o Nicolai re-
stitutus.
Carnabadiū non
esse Cuminum
Ethiopicum.

Macedoniam est
Petroselinū Ma-
ced.

Hippofelinum.

Smyrniū semen
cur Macedonicū
votatum.

Smyrniū non est
Hippofelinum.

Libysticum.

De pretiosis la-
pillis auctoris o-
pinio.

Adianti habita ratione, quod tamen in decaetis nisi postremo loco addi debet. Hoc itaq, Mesuis exemplo fretus, eos maxime hallucinari existimas, qui per se medicamenta macerari iubent, qua facile longa coctura resoluntur, ut eorum dilutum postremo addant feruefaciendum ne dissoluatur, contra ipsius Mesuis sententiam, qui si secus sensisset, cum fuerit in parandis medicamentis omnium diligentissimus, haud unquam permisisset, quin alicubi de re hac meminisset. Atqui quum tibi ipse hoc in negotio considerare non audeas, me etiam consulere uoluisti, ac de his omnibus meam audire sententiam, ueritus fortasse, ne tuis argumentis decipereris. Quamobrem petis ac rogas, ut ad te scribere uelim, an probanda, vel improbanda tua mihi uideatur opinio. Ego uero qui tua causa longe maiora prestare nunquam recusauerim: quanquam in compositis medicamentis parandis non sum adeo exercitatus, ut de his ita praclare differere ualeam, quemadmodum tu tibi fortasse persuades: ne tamen uidear laborem hunc subterfugere, & huiusce artis omnino ignarus, dicam de his candidè, & ingenue quod sentiam. Ut autem breuius, qua à me desideras aggrediar, si libere ueritatem fateri debeam, non possum in his, qua ad serum spectant, tua omnino adstipulari sententia, quamuis partim experientia, partim auctoritate niti uideatur. Experientia quidem, quod compertum habeas, serum quod ficulneo ramo, & Oxymelite à lacte seceratur, non ita facile corrumpi, perinde ac illud quod admixto coagulo passim parari solet. Auctoritate uero, quod nusquam Dioscorides & Galenus alterius seri meminerint, quam illius, quod per Oxymel conficitur. Si quidem hisce, quas in medium affer rationibus mihi non constat, rem hanc ita se habere, ut tu tibi persuadere uideris. Quapropter alius has mihi trutinanda uidentur, nec ita temere fortasse proferenda. Etenim tametsi serum, quod Oxymelitis & ficiramuli facultate à lacte diuiditur, non ita facile corrumpatur, acescatq, perinde, ac illud, quo passim utimur, quum tamen id ego non parandi rationi, sed Oxymelli tantum tribuerim, quod proprium mellis sit, qua illi admiscetur, seruare incorrupta: fit sane ut nec putarim in causa esse coagulum, ut serum communis usus, una uel altera tantum die acescat, quum lac ipsum purum, cui nihil coaguli admixtum sit, eodem temporis spatio acidum fiat & corrumpatur. Præterea quum nusquam legerim (quod meminerim) apud Dioscoridem & Galenum, serum coagulo paratum in usum medicum haudquaquam esse expetendum, cur igitur illud improbem, non habeo. Meminit quidem seri Galenus Oxymelle parati, Comment. 4. de uirtu ratione in morbis acutis: ipsumq, ibi non solum casu laborantibus ad exoluendam aluum, eiciendamq, bilem præfert, sed etiam ipsius conficiendi modum exponit: nec id alia sane ratione, quam differentia causa, quodque serum cui Oxymel admiscetur magis aluum exoluat, quam quod simplex fuerit. Is enim quum in eo morbo exoluere aluum desideret, ualentius, quam simplex & commune serum prestare possit: ne quis à scopo aberraret, quo ibi sero fuerit utendum, ac etiam quomodo id fuerit parandum, docet. Quandoquidem si tantum huiusce seri (ut tu tibi persuadere niteris) Galeni auro extitisset usus, non fuerat illi opus, ut seri illius conficiendi rationem describeret, nec ut peculiariter illud afferret in medium. Quod autem simplici sero per coaguli uim à lacte siue caseo separato saepe usus sit Galenus, facile conici potest ex his, qua de lacte & sero ipse scribit libro 3. de aliment. facultatibus. Quippe is ibi præcipit mel atq, etiam sal sero esse adiungendum, ut magis ac feliciter aluum exoluat. Id quod supernacuum & ab omni ratione alienum uideretur, si Galenus nunquam ullo alio sero fuisset usus, quam quod per Oxymel paratur. Etenim quum id, tot Oxymelitis Cyathos excipiat (Dioscoridis testimonio) quot fuerint lactis hemina, à quo seuentum fuerit, nulla sane ratio mihi sese offert, qua persuaderi possim, Galenum mel atq, etiam sal sero illi addidisse, qui in ipso apparatu mellis plurimum admiserit, præsertim quum præcipiat istantum mellis esse iniiciendum, quantum citra stomachi euerfionem suauitate inducat. Idem præterea conici potest ex his, qua libro quinto Aphorismorum Aphorismo 64. idem scribit Galenus, ubi serum pariter cum melle, & sale propinandum suadet, quibus Hypochondria intenduntur: id quod manifeste arguit, quod ibi quoque de simplici sero loquatur. His accedit Mesuis auctoritas, cui plurimum uideris adductus, qui ad maceranda ea, qua in antidoto illa Hamech adduntur, non serum Oxymelite paratum, sed aquam casei, id est, serum, quod à caseo fluxerit, recipere Myropolas præcipit. Quo fit, ut nostri usus serum minime impugnamdam esse putem. Namq, si Oxymel, mel ipsum, saccharum, aut sal illi addatur, nihil mihi uerendum est, quin hoc etiam diutius ab acore seruari possit. Nec mihi persuadere possum, quod tantus auctor Mesuis eo fuisset usus, si (ut tu arbitrari uideris) à Medico usus id esset expellendum. Proinde serum quodcumq, in medicum usum expetiposse arbitror, modo ipsa seri substantia sit prorsus casei expertis: parum enim referre existimo, an per oxymel, an per coagulum, an per Cinare flores, an per Cnici semen, an per ficulneum lac, an alio quouis modo fiat. Quum sane non ignorem (ut antea dixi) si unicuiq, istorum mel, aut oxymel addatur, præter id, quod diebus pluribus unumquodq, incorruptum asseruari possit, vires quoq, illi augebuntur. Sed si quis in deligendo sero committitur error, is mihi uidetur coarguendus, quem nonnulli faciunt Myropola, utpote qui plerumq, serum accipiunt, quod non parum casei in se continet, ut plauè albus indicat color, qui in huiusmodi conspicitur sero. Quod itaq, tale fuerit, merito à medico usui tollendum est, nisi tantisper serueat prius, quousque quicquid casei fuerit ad fictilis fundum considat, & serum clarum euadat. At tu quum eantari opinionione, de qua superius diximus, eos redarguis, qui ad parandam antidotum illam in communi sero medicamenta diebus quinque macerant, ea sane non improbanda ratione, quod eiusmodi serum ante prædictum tempus corrumpatur, & medicamenta inficiat. Quod ego etiam fateri cogor, sed in hoc serum minime improbare ausim, quum potius Mesuis ipse, qui huiusce erroris extitit auctor, mihi sane uideatur improbandus. Cæterum id erroris facile uitare possunt Myropola, si tantum sacchari uel oxymelitis communi sero addiderint, quantum antiquis addi solebat. Quod autem ad eos spectat, qui per se Rhabarbarum macerant, ut dilutum illud in fine coctionis addant, sibi persuadentes Rhabarbarum modicam uel nullam admittere coctionem: ego quidem horum sententiam haudquaquam improbauerim. Nam quum vis ipsa exoluens (Mesuis ipsius testimonio) tenuissimis Rhabarbari partibus contineatur, nulli dubium est si diutius decoquatur, quin tenues illa partes in auram euaporent. Quorum, inquit, Mesuis, vis facile resoluitur, quia uel imbecilla est, uel in superficie est posita, uel in subiecto raro consistit, omnia eiusmodi parumper, nec ualenter coquenda sunt. Præterea nec tua illi opinioni facile subscribam, quod medicamenta diuersa diuersarumq, partium, ubi simul macerentur, adeo simul coeant, ac colligentur, ut nulla posthac coctione possint earum dissolui facultates. Nam tametsi Mesuis ipse scribat, coctionem medicamentorum facultates diuersas optime miscere, adeo ut ex omnibus una tantum resoluet, & uelut concretam faciat actionem, iubet tamen, si qua fuerint imbecillia, ea minus ualenter esse coquenda. Idemq,

Serum quod cū oxymelite paratur cur non corrumpatur.

Serū vi coaguli paratū antiquis etiā fuisse in usu.

Serum cōmunis usus non improbandum.

Serū quomodo parari debeat in coactione Hammech antidoto.

Ideoque tum Mesues ipse, tum Medicorum omnium coetus exoluentem Rhabarbari vim potius maceratione, ex qua nihil per vaporem deperdi potest, quam coctione, à ceteris facultatibus separant. Quod autem tua opinio mihi recipienda non sit: id plane in causa est, quod nullum sit tam solidum compactumque plantarum medicamentum, quod coctione non dissoluatur, & cuius tenuissima partes, si plus quam par sit, decoquantur, non abeant in vaporem, ut etiam tibi ipsi constare non ambigo. Si itaque exempli causa coquatur Rhabarbarum, in quo natura varias, ac diuersas simul colligauit tum substantias, tum facultates, ignea à terreis separantur, & facile vehementi coctione in auram resoluuntur: non video quid prohibere possit, quin hoc idem etiam cuiuslibet diuersorum medicamentorum diluto arte parato, ubi diutius quam par sit efferverit, euenire possit. Quinimo si dilutum quodlibet ferueat longe magis euanesceat, eo argumento, quod maceratione tenuissima tantum medicamentorum partes à ceteris excipiantur, qua quum suapte natura facile seruefacte resoluantur: nemo sane qui ratione nitatur, tua poterit astipulari sententia. Hinc enim fit, ut Mesues dilutum illud coctionis Hamech breui admodum tempore ferue fieri iubeat, ne tenuiorum partium vires amittantur. Quamobrem non video, quo pacto ab errore defendi possit Mesues in parando Syrupo de Glycyrrhiza, nisi vel deprauata sit lectio, vel ipsum peritum non ignarus Pharmacopœus scripsisse dixerimus. Idcirco si quis pertinacia potius quam rationi non fuerit addictus, hic facile in nostram concedet sententiam. Si vero contra tam pertinax fuerit, ut sua nolit refragari opinioni, poterit isena dilutum exempli gratia parare, & aliquot uncias infumere. Deinde vero dilutum ad medias coquere tantundemque illius altera die ebibere, hoc si fecerit facile sententiam mutabit, cogente ita experimento. Ceterum mihi persuadere non possum, quin tu cui peritia plurimum in Medica materia attribuere soleo, hac ignoraueris. Ideoque te ea à me expetisse censeo, ut experireris quantum consilij in medicamentis parandis prestare possim. In quo si tibi satis fecerim, non parum sane laetor: Si vero secum euenierit, tuam de me accusabis opinionem. Vale.

Rhabarbari deiectiona vis maceratione non coctione excipienda.

Syrupi de Glycyrrhiza examinatio.

Dilutum quodlibet si coquatur vires amittet.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Balthasari Cleufelio Myropolæ
S. P. D.

Agiur de quibusdam simplicibus medicamentis, qua in Antidoto Diatriasantalos, in Pastillis de violis & in Philonio persico adduntur.

- 30 **L**audaui semper (mi Balthasar) apud omnes diligentiam, & solertiam tuam in parandis compositis medicamentis, qua tuo in Myropoli in medicum usum asseruas, quod non solum selectissima cuiuscunque generis simplicia tibi comparare soleas, sed quod etiam, ubi dubium aliquod sese offerat in libris de medicamentorum compositione, quorum scripta passim sequuntur Myropola, statim tibi medica peritos consulas. Video id nunc apertissime ex tuis literis, quibus mihi dubia proponis, qua habere videris in ea paranda Nicolai Myrepsici antidoto, qua à tribus santalis Diatriasantalum appellatur. Quinetiam in Pastillis de violis & in Philonio quod Persicum appellauit Mesues. Perro dubitas in primis Cordi dispensatoriū sequutus, quo nullum praestantius esse putant Germani Pharmacopœi, cur in ea de Santalis antidoto bis saccharum repetatur, & an ubi primo loco saccharum habetur, ibi aliqua fortasse adsit menda: adeo ut non sine ratione putes aliquod aliud simplex medicamentum, ibi pro saccharo esse desiderandum quum praesertim non desint (ut ais) qui non saccharum, sed zaccaram: id est: Pphyllium legi debere contendunt, Matthai Syluatici pandectis persuasi, quippe qui zaccaram ibi Pphyllium interpretatur. Hæc tua prima est dubitatio quam non magno admodum negotio tibi statim exoluam. Sed audias velim rei veritatem & eorum ignorantiam agnoscas, qui Pphyllium pro saccharo addi iubent. Huiusce antidoti, ut prædiximus, author est Nicolaus Myrepsicus Alexandrinus, cuius Græcus codex hac in antidoto sacchari nomen suam meminit, nec item Latinus, quem postremo interpretatus est Fuchsius. At qui antiquus Nicolai codex, qui vna cum Mesuis operibus haberi solet, non bis, ut Cordi dispensatorium, Saccharū admittit, sed semel tantum statim à rosis. Quo fit, ut perperam Cordus Saccharum sine iterum addiderit drosati, vel Syrupi rosacei loco, ut Nicolaus Alexandrinus præcipit, qui non simplici Saccharo hanc Antidotum excipit, ut nunc omnes faciunt tum Medici tum Myropola, sed Drosato rosaceo, ut magis refrigeret ac roboret. At Cordus quum sciret hanc antidotum nunc ubique parari in solidis orbiculis, vel oblongis particulis, quas Myropola suo more morsellos vocant, Saccharum rosacei drosati vice eidem addidit. Quo postea factum est, ut ij qui nunquam Nicolai codicem legerunt, de re hac dubitare cœperint, mendamque subesse crediderint. Ceterum si quæreres quam ob causam in antiqua Nicolai versione additum sit Saccharum, quum in Græco non reperiatur, responderem hoc proculdubio addidisse Medicos, qui iam diu ante nos claruerunt, ut gustui Antidotus gratior, ac suauior esset, quum in puluere propinatur ex stillatitiis aquis, vel carniū iure, vel modo quocunque alio: Quo fit ut Saccharum non sine ratione additum sit. Opinioni huic nostra astipulatur Platearius huiusce antiqui codicis commentator his verbis: Consicitur Triasantalum sic. Pulueribus paratis additur Caphura cum parte ipsius pulueris post Saccharum contritum ut melioris sit saporis. Hæc ille. Verum enim vero non solum Saccharum addendum putarim, ut Antidoti puluis magis gustui placeat, sed ut diutius à carie & situ conseruetur. Siquidem eandem ob causam Saccharum, quod Septasie Candium vocant, in Abbatibus Diatbedone addidit, in quo etiam bis Saccharum ingreditur, & Nicolai ipsius sententia, ut Græcus habet codex. Quamobrem eos proculdubio hallucinatos esse crediderim, qui Pphyllium addendum censent: quum Pphyllium contritum in antidoto venisse nusquam me legere meminerim. Siquidem quum inter venena tam Græci quam Arabes, qui de lethiferis pharmandis refrigerandis, ad iocinosos, hydropicos ac spleneticos facit, sane non video: praesertim quum scribat Mesues Pphyllium medullam delecteriam esse ex quarto ex calfacientium ordine. Nescio profecto qua ratione, quæve auctoritate Syluaticus ille Zaccarā Pphyllium fecerit, quum ea vox nec apud Græcos, nec Arabes nil aliud designet quam Saccharum. Nō tamen si id ex libro de Dynamidibus perperam Galeno ascripto, & ex Isaaci viatico probare contendat Syluaticus, ne syllabā tamen in iis codicibus reperire potui, qua Syluaticus sententiā tueretur, quum nil aliud quā Zaccara simpliciter habeat ibi absque vlla authorum commentatione. Sed mea sententia nil aliud Zaccara illis designat, quam Saccharum, quod ibi eadem ratione adesse censeo. Quod autem Zaccara Saccharum designet, manifesto est argumento Oxy Zaccara, qua ab aceto & Zaccaro ita cognominatur. Sed nec Cordus sine censura dimitti debet, quod in temere Nicolai sententiā peruerterit.

Diatriasantalos

Zaccara, Pphyllium

Cordi erratum.

Responsio ad racionem quaestionem.

Error quorundam Pphyllium addentium.

Zaccara non est Pphyllium.

Syluatici erratum, Cordus notatur.

Violacei pastilli
qui parandi.

Philonium Per-
sianum.

Fuchsi senten-
tia explorata.

Fuchsi erra-
tum.

Etenim ubi in fine Zuecharum addidit, ibi sane admonere Myropolas debuerat, cur rosaceum Drosatum in Saccharum commutaret, ut nihil ei dubitandum relinqueretur. Sed in breuitati nimium indulgens & celerius quam par fuerit percurrrens, nil mirum cuiquam videri debet, si saepe pedem impegit. Sed iam ad violaceos Pastillos me consero, in quibus dubitas, an ex purpureis violis, quae in campis florent, an ex Leucorum parari debeant, quum scribas Cordus contra communem usum ex albis violis quas Arabes Keyri vocant, hosce pastillos esse parandos. Hoc dubium sane paucis tibi aperiam si mihi distinxeris an Nicolai Pastillos an Mesuis parare volueris. Etenim si Nicolai Pastilli tibi conficiendi sunt, Leucorum album accipito. Si vero, quos Mesues habet, purpureas violas desumito. Id quod per te facile cognoscas, si relicto Cordo Mesuem & Nicolaum consulueris. At qui id sane haudquaquam ignorare debes, Medicos in vniuersum omnes, nullos alios in suum vertisse usum quam qui Mesui describuntur. Proinde velim ut hosce, quos haud recte negligis Cordus, non illis paratos habeas, ne Medici qui tuis utuntur medicamentis decipiantur, & agri subinde defraudentur. Qui a Mesue describuntur, ab his satis longe absunt, quos parat Nicolaus. Illi enim ex purpureis violis biduo iam flavescentibus, turpento manna & Gyrrhizae succo conficiuntur, addito etiam quandoque Scammonio. Illi vero (quod perurinum distat) ex albis Leucis stiribus Amylo Rhabarbarico plantaginis & papaueris semine, Balsamo & Rhodostagmate parantur. Qui si recte expendantur contrarios prorsus effectus facere eos, nemo fortasse ambiget. In Persico philumio nihil tibi dubitandum erit an piper album aut papauer album commiscendum sit, si Mesui librum legeris, ubi de sanguinis refectione scribit. Ibi enim ad capitis calcem Philonium Persicum asserens, papauer album non piper album imponit, quod in sanguinis fluxione nulli pipere opus sit, sed quae refrigerent & fluxiones cohibeant, cuiusmodi est papauer. Quae sit ut hallucinae Fuchsi in hoc perinde ac in multis alijs facile quis deprehendere possit: Qui si Mesui librum legisset, non ita in Cordum inuectus fuisset, & rei veritatem proculdubio agnouisset. Recte autem Philonium hoc pipere destituitur, nam quum pro frendo Optio, & croci & castorei satis excipiat, illi sane opus non est addere piper, ut magis incalescat, ubi potius refrigerari debet medicamentum, quod sistendo sanguini paratur. Postremo quod Fuchsi sententiam improbes, quod non solum in antidoto est Santalis Nymphaeae floris pro Caphura substituat, sed in ceteris compositis medicamentis, quae Caphuram accipiunt, recte te quidem facere arbitror: Siquidem nunquam probam qua nulla astipulante ratione ita proferuntur temere. Sed de his fortasse latius alias. Utitor tu interim Caphura, ubi medicamenta quae Caphuram admittunt parabis, & Fuchsi suae Nymphaeae floris relinquo. Huic paucis audisti sententiam meam de hisce tuis dubitationibus: quam si sequaris profecto, vi spero, non aberraueris. Vale.

IOANNES ODORICVS MELCHIORIUS
Medicus, Petro Andreae Matthiolo
S. P. D.

Agitur de quadam admirabili planta, in Hispania reperta,
& de Belenio apud Aristotelem.

Bene abs te accipi literas eiusdem propemodum argumenti, quae etsi grata mihi quidem fuerint eo nomine, quod memor te me esse testabantur, dolore tamen non leui animi mei perstrikerunt. Intelligebam enim ex illis haud sane libenter, perturbari te plurimum quorundam calumniis & obreptationibus, quos praeter meritum & expectationem non satis aequos tuorum scriptorum reperisti iudices. Hic ego si inuestigarem meam qua mihi perlectis literis tuis plenus illis iustis querimoniis, obortae est, referre omnium velim me d. stix profecto sine excedere iudicium, tuisque auribus non citra adulationis suspicionem nimium tribuere. Illud certe asserere non dubitem, nunquam me ex quo tempore vitali hoc spiritu diuina benignitate inter homines fruor, magis indulgere dolori meo, neque etiam putare maiorem me dolendi causam habuisse unquam. Primum enim te de ingenio, de valetudine, de salute hominum tam benemeritum, ita conuictis proscindi ferebam iniquissime, praesertim, quem ego mihi ex omnibus hac aetate, non tam omni officiorum genere colendum, quam sincero amore & tacita veneratione quadam prosequendum elegeram. Deinde a tua vniuersi in iuria ad considerationem nostrorum temporum transiens, vsitaram illam hodie inuehendi in optimos quosque impunitatem, in vniuersum deplorabam. Videas enim licet quamcumque in partem te vertas, magnam tandem libellorum qui nostra aetate editi publice in Bibliopoliis prostant, copiam, alio argumento propemodum constare nullo, quam quod conuictur vniuersum vndequaque doctissimus & bonus, eamque consuetudinem, tam profecto standam ita nunc inuatuisse animam adertimus, ut nullum sit tam abiectum ingenium, quod obreptatione & calumnia, eruditissimi cuiusque laudem & applausum hominum promereri se posse non speret. Nec falluntur unquam profecto spes, Nam simulatque aliquem magni nominis traducere ad populum & reprehendere audacter cepit quispiam, haud dubie reperitur subito (ut est ad nouitatem & contentione rerum cognitarum pronissimum vulgus) quillum doctum, & egregium hominem ceterisque longe superiorem: reprehensum vero illum alterum ob ignorantiam a meliore magistro redactum in ordinem esse consistunt. Haec caca & inepta praecipitaque hominum iudicia audacissimo cuique tradunt animam deducunt hanc in quoscumque: certo nimirum eam esse populi leuitatem & inconstantiam, ut repente atque iurgidi quidpiam fastuosa oratione commendatum alicuius castigationem promittens, in medium prolatum est, id cum applausu omnium abis, quod aiunt, vniuersum libentissime excipiant. Quo fit ut commendaturi iam libellos emptoribus hoc tempore illorum venditores hoc potissimum nomine vendibiles efficiant, cum in titulo polliceantur correctas & emendatas in illis aliorum sententias esse. Simulac hoc dixit aliquis, impetratur ab omnibus facile fides, & magno accersu mox diuenduntur exemplaria. Hi mortis inquam & haec plebis inscitia, haecque proscinditorum hominum impudentia & arrogantia, impedimento d. scenibus maxime sunt, & reliquam vitam quam addiscendis & tractandis vitae laetis artibus summa cum voluptate eramus transacturi, impartunt sine perturbatione omnem, & ex dulci longe acerbissimam reddunt. Atque ideo cum nunc in tot maiorum cogitationem occasione doloris tui deuersissimam, duplicata mihi indignatio animi est, dum & iuram, non bene affecti causam, & publicam imprimis vicem deploro. Scribis per te factum iam te tot laborum quos publice vsitatis gratia susceptos & exantatos cum qui etiam & gloriosam sententiam tibi parturus esse existimasses, nunc videas probratum & conuictum occasione tantum d. d. ff. Idque nunc eandem sententiam annis contigisse queritis, in quibus cum praeter cetera incommoda, quae illa fert aetas, molestiarum abunde tibi domi nascantur in-

etiam si abunde nihil aduersi sese ingerat, in pace te, & otio sine odiis & inuidia, atque obrectatione optime factorum conscientia munitum pie & religiose decebat viuere. Equidem fateor si obscuro genere vite olim probato Græcorum præceptum illud *ἀεὶ καὶ εὖ* sequi, & tibi viuere tantum, non etiam prodesse Reipub. cōmentando statuisses, nunquam hoc fuisse euenturum, ut homines ambitiosi hoc tempore violando honore & oppugnanda dignitate senij tui gloriam sibi & famam aucuparentur. Qui possent enim inuidere, si opes tu omnes tuas domi diligenter obseruatas, tibi tuisq; vsurpares tantum? Verum quando amplissimos thesauros ingenij tui, foras omnibus conspiciendos protulisti, tuarumq; diuitiarum amplitudinem liberaliter impartiendo, hoc est, candide docendo omnibus nationibus patefecisti: non est mirum tam ampla bona, tam splendida, tam omnium oculis exposita, imo omnium manibus contrectata indies, mouisse alicui ex tam multis ad inuidiam animum, quæ cum u ipse desideraret maxime, nulla tamen ratione se consequi posse consideret, tibi ea iam liberaliter diuino munere contigisse doleret summo perire. Dolor ille in odium vertit, odium ad calumnias, & conuicia reperienda ingeniosos vel quoslibet facit, & nunquam non, sicut in scirpo nodum, ita in quantumuis bene dictis & factis reprehensionis aliquam causam, querit & inuenit: aut certe inuenisse credit. Hac causa est inuidia, quæ te flagrate dicit: quæ quidem eiusmodi est, ut nemo omnium hominum sit, qui non eandem eadem de causa sibi conuiliatam omnibus votis exoptet, eamq; si contingat in summorum bonorum numero ponat. Dices, at gratia illa mihi senij est: Ad hæc et si dicere multa possem: viridem nempe adhuc tibi senectam esse, & viuendi robore præditam, & complura alia in eandem sententiam: tamen aliud est, quo magis uiti, tuosque te canos (quanquam ne illi quidem annoso adeo prodierint multi) consolari in primis uelim, nimirum ut cogites in uirtute tua & recte factorum conscientia, tuorumq; pulcherrimorum & uillissimorum operum contuitu acquiescere te toto animo debere. In his enim rebus solida in primis & nunquam peritura laus potissimum consistit: nec est sane homini finem bonorum omnium serio spectanti. præter hæc externorum commodorum magno perire quippiam expectandum. Ille enim sola sunt tua, non tantum in hoc breui spatio uita, quod hic degimus, contra omnes fortuna vicissitudines duratura constanter, sed & apud Deum Optimum Maximum immortalia tibi in celo premia comparatura. Eiusmodi fundamentis cum optima spe confidentissime inniti possis, caue aliunde, ut tibi pendendum esse arbuteris, ut ab inconstanti hominum iudicio, rumore vulgi, applausu populari, laude uel vituperio cuiuspiam: quæ indignis sepe uicibus blandiri quam indulgentissime quotidiana experientia comperimus omnes. Hac cum pro tua prudentia perspecta tibi abunde sint, opus est auertere te iam post hæc oculos atque uires, animumque simul, à uultu & à sermone ignobilis & stolidi vulgi, nec ex illorum iudicio colligere, quid sentire, quid gaudere, quid dolere de te ipse debeas. In te descendas ipse oportet, tuamq; bona nosse, & recto, hoc est tuo, & non aliorum iudicio ea æstimare consuesce. Deprehendes nimirum in te, quæ si in alio quopiam cernere posses, beatorum illum profecto & summe felicem esses predicaturus. Neque inmerito sane. Nam si rem recte cogitare, & contemplari animo attentius uelis, quanta te læticia perfundi necesse est, quoties meministi tot laborum, molestiarum & uinerum, cursitationum, uigiliarum, quæ omnia publica utilitati gratia suscepta, & infracto animi robore tam multos annos tolerata, tibi & toti Italia, imo uero toti hominum sociatati, quæ terrarum orbis patet, tam bene, tam utiliter, & feliciter cesserunt. Iam quid tibi spectatu iucundius est, quam cum cernis in generosissimis quibusque nostri seculi mentibus iam emicare passim radios doctrinæ, de luculentissimo ingenij tui lumine accensos, discussa nimirum superiorum annorum caligine: quæ contecta & oboluta delituerunt omnia: & per doctissimos Commentarios tuos, in lucem sunt prolata? Sane quoties in priorum nostrorum memoriam cogitatione repeto, eorum ego cum in ceteris artibus capessendis, tum uero etiam in Medicina addiscenda miseram conditionem fuisse iudico. Ut enim tunc felicissima produisse ingenia demus, & ad ratiocinandum in rebus difficilissimis inprimis opposita: Vbi ceteris rebus omnibus abunde instructi iam ad medendum accesserant, instrumentorum uotitia, quæ ex antiquis authoribus petenda ad hanc rem necessario requirebantur, destituebat medicatos. Quæ quidem ex re insignis calamitas & innumera damna in uniuersum genus humanum redierunt, donec tandem res hominum placatiore uultu respiciens ille mundi & rerum omnium fons & effector Deus, excitatis aliquot ad hoc negotium idoneis ingenij, hæc in parte succurrere nostris necessitatibus statuit. Extiterunt igitur hoc æno linguarum externarum periti & in antiquorum lectionibus exercitissimi uiri non pauci, quorum nomina doctis omnibus nota sunt, Hermolauus Barbarus, Nicolaus Leonicensis, Ioannes Manardus, Ioannes Ruellius, Marcellus Virgilius, Leonardus Fuchsius, Antonius Musa, Iacobus Syluicæ, Alysius Mundella & aliquot præterea alij, qui omni diligentia, studio, uigiliis & laboribus hoc unum enixi sunt maximopere omnes ut auxilia Medica a ueteribus descripta in cognitionem, & uisum tandem reuocarent. At deerat adhuc, qui extremam his conatibus manum imponderet, & quasi iudex quidam diuersissimorum opinionum quibus illi inter sese dissiderent, cuius tandem iudicio, altercantibus inter se tot excellentissimis uiribus, staret hæc ætas nostra, ut certa in dubia ueritatis possessione frueretur. Hic tu Matthiole diuina procul dubio prouidentia ad eam rem destinatus, id unum omnibus optantibus nobis, doctissimo calamo tuo erudire at ætem nostram læpisti. Idque, ut faceres feliciter ceteris, omnes dotes, quæ ad uirum tantas res suscepturum pertinerent, in te cumulatissime diuinitus collatae sunt. Summa doctrinæ, summum ingenium, excellens iudicij acumen, admirabilis rerum lectarum memoria, pertinax in uirgendis semel susceptis laboribus constantia, ardentissimus ueri amor, animi robur nullis difficultatibus cedens. Quid multa? Molituro rem tantam nihil defuit. Atque ideo quam primum admirandum illud opus tuum typis excusam in hominum manus peruenit, tanquam Gorgonei capitis aspectu præ admiratione quasi obstupuerunt omnes, quibus eadem de materia scribere animus erat, depositisq; de manu calamis, & scribendi proposito mutato in te unum ora animosq; conuertunt. Tanta apud omnes eodem momento & nominis & operis tui ueneratio extitit. Suscepisti autem hoc negotium ea ratione tractandum, ut meliore quisquam hominum id tractare neutiquam posset. In autorem enim antiquissimum commentarios scribere instituisti, qui quidem solus propemodum ex uetusto illo seculo relictus erat, diligenter scriptor rerum eiusmodi, Dioscoridem dico, quem Galenus inter omnes eos, quorum scripta ad illius ætem peruenerant, approbat & laudat maxime. Nemo quippe Græcorum hominum remedia in usum conserre potest commode, cui Dioscorides non ad uinguem ediscatur. Qui enim posset? cum præter illum, quas res quibus uerbis indicant, nemo tradiderit alium. Itaque iam eo dementum erat, ut quidam etiam magna existimationis Medici non iam clanculum apud suos, sed palam in uerbis publici negarent manifesto, posse quenquam ex Galeni libris Medicinam facere. Quid causa est? Quia nimirum Dioscoridis lectione neglecta, quibus instrumentis Galenus uti uixisti, maret, ignorabatur. Hac igitur in parte anxius & laborantibus, per oportune tu sane nobis assuisti. Introducti enim tua opera in Dioscoridis lectionem, quo pacto Galeni consilia utiliter medicando uti possemus, didicimus. Itaque debere se tibi hæc de re quotquot sunt elegantioris Medicinæ studiosi omnes fatentur unanimitè. Ita autem nobis Dioscoridem declarasti, ut una cum illo & Galenum & ceteros Græcos ac Arabes uiribus, uti quæ erant, diligentissime contuleris, ne ad tanti authoris ac Medicæ ueritatis intelligentiam

in nobis quicquam desideraretur, Quæ ratione simul factum est ut & in cæteris Medicina authoribus, multi loti à te ex-
 plicati sint, quorum intelligentia in primis erat necessaria ad medicandum. Sed hæc tu non ex professo, sed tanquam
 obiter, & velut aliud agens, fecisti. Primus enim laborum tuorum scopus erat, ut Dioscoridis lectionem bonis ingenii
 planam redderes, tum vero etiam cum multa essent materia Medice partim nostra ætate, partim paulo post illa sæculi
 Græcorum tempora inuenta, earum etiam rationem habendam esse ducens, singulas per occasionem opportunam notis
 omnibus diligentissime descripsisti, vires enumerasti, utendi modum fidelissime docuisti. At vero ut nulla non in re car-
 rorum, quot quot ante te scripserunt, diligentiam vinceret, pictura à te tam elegantes & summa industria ad viuam
 expressa additæ sunt, ut vel ex illis incognitas plantas cognoscere, vel conspectas quidem antea, sed è memoria lapsas in-
 mentem rursus reuocare, non admodum sit difficile. Quæ quidem in re quanta tibi cura attribenda fuit, ut optimos
 quosq; pictores, & quod longe difficilius fuit, sculptores quoque vndique optimos, ut nunc continuo facis, conquireret.
 Hic tu sumptibus nullis pepercisti, de longinquis regionibus homines idoneos accersens, quosdam etiam ipse ad recte pin-
 gendas & sculpendas herbarum imagines facta rerum propriarum iactura exercens. Iam vero tot numero tamque va-
 rias res ut inuestigares, quantas molestias perferre te oportuit, tot peragere magno cum sumptu regiones, excelso-
 mos ac præruptos scandere montes, sub ardentissimis solibus squalidum vagari per prata, per agros, per sylvas, per
 marium, ac fluminum littora. Vitam sæpe maris tempestatibus discendi gratia committere: ac ne quid aliud dicas,
 quantus labor tibi subeundus fuit fatigandis amicis per literas, qui diuersis & longinquissimis regionibus commoran-
 tes, exquisita plantarum exempla magna sane cura asseruat tibi suppeditarunt? Quid igitur mirum si è recentiori-
 bus quidam, qui ante te plantarum imagines in suis Herbarijs crassiori satis, ac rudi omnino facte pinxerunt, ut Loni-
 cerus nunc primum quamplurimas recudi curauerint ex iconibus tuis in sua volumina transferentes? Quid item si
 nonnulli qui post te de plantarum historia, ac viribus scripserunt, nullis aliis stirpium imaginibus sua exornauerint
 scripta (ut Lacuna in suis Hispanicis commentariis, quas etiam Iustianus ille alter ex tuis fere profus deprompsit)
 quam is quæ è tuis viridariis apertissime radicibus extirparunt? Id fortasse magis mirum quamplurimis videbitur,
 quod hisce apertissimis furtis tuorumque laborum depopulationibus visis, non solum illis, non irascaris, sed potius plu-
 rimum tibi gaudeas, & illis non modicas videaris habere gratias, quod tuos tanti fecerint labores, ut illos tanquam pa-
 rentes thesauros depradari haudquaquam sint veriti: earatione frenus, quod dum ijs ditari illustrariq; satagunt, tum,
 non illorum, splendor in illis emicare videatur. Sed hæc si aggrediarticere, obliuiscar epistolam scribere. Me illud saltem
 dicere necesse est, Fortis hoc omnino animi fuisse & ardentis cum veritatis amore, tum studio prouehendi publici boni
 tantas nimirum offensiones magnorum hominum incurere te sustinuisse, quos de errore conuictos nominatim repre-
 hendere palam ausus es, Odiosa quidem hæc res & tibi sane parum utilis. Dicere tamen verissime hoc omnes possu-
 mus, nisi id fecisses, nequaquam tuos libros tam multis vsui futuros fuisse. Quamquam enim à te omnia rectissime in-
 uenta, & firmissimis rationibus, ac veterum scriptorum authoritæ confirmata sint, ut nemo iam de veritate dubi-
 tet, qui tua attente legerit, vides tamen, quæ vulgo sit discidium in perpendendis rationibus ignauia, ac negligentia.
 Nam quod quisque alicuius nominis vir dixit, id nulla adhibita ampliore consideratione tanquam certum arripit.
 At qui si reprehendi quempiam animaduertunt ab alio, ibi primum quasi coacti excitant mentem, & rationes, & ar-
 gumenta, quæ ex utraque parte adducuntur, tunc demum diligentius expendunt. Id cum pro tuo exquisitissimo iudi-
 cio optime intelligeres, non dubitasti veritatis gratia te ipsum precipitare, & odia & inimicitias multorum, quos ami-
 cos te habere, nisi communis boni maiorem rationem ducendam esse censuisses, priuatarum tuarum rationum magni-
 tererat. Hæc commemorari eo prolixius, ut ostenderem recordationem tanti operis, tamque laboriose confecti in deli-
 berationibus tuis opponere te debere calumniis perditorum hominum magis, quam affirmare felicem te ex bono domesti-
 co tuo, quam ex alieno malo infelicem. Calumnia enim non tibi maior est, sed illi, qui tam male affecto & corrupto
 perditio est animo ut conuictio afficiat nihil tale merentem. Quid? quod omnium sapientum & magnorum hominum
 inde vsque à mundi primordiis semper aliqui reperti sunt oppugnatores, sique non pauci numero, per quos illorum virtus,
 prudentia, studium, patientia, ingenium denique ipsum exercetur. In horum numero recenserite si cupias, conditiones
 etiam illas non recuses oportet, quas commune fatum semper adiunctas esse voluit, vera virtuti & sapientia, quæ qui-
 dem certè moribus & inuidia maleuolorum semper fuit obnoxia. Quinimo plane optabilius est vituperari à talibus,
 quorum calumnia præter omnem rationem affici te animaduerto, quam summis ab eisdem laudibus verbi. Illi enim ve-
 rum arbitror alium laudauerint, quam qui per omnia ei simillimus sit. At enim mors tibi, potius ipsa & fortuna-
 rum omnium discrimen adendum sit, quam illi, moribus, instituto, ingenio, assimilari ut optes. Fuerunt profecto, &
 sunt etiam hæcenus celebres aliquot & magni viri, qui cum tanti essent, ut amplitudinem, & præstantiam tuam consi-
 pere omnino facile possent, & senserunt, & loquuti sunt semper de te honorifice & amantissime. At vnum tantum in-
 ter multos commemorem, qui tamen vnus plurimorum loco ab omnibus nobis haberi merito debet, Illustrissimus ille, ac
 omni laudis genere celeberrimus vir, Bernhardus Clesius olim Cardinalis Tridentinus, Serenissimi Regis Romanorum
 Cancellarius, in tanto te semper honore habuit, ut à latere suo nunquam, nisi inuitus, dimiserit. Non enim ille tibi vitæ
 tantum & valetudinem credidit (quod per se maximum est) sed & in maximis arcanisque negotiis, sine tuo consilio de-
 curuere nihil voluit vnquam. Tanti enim fecit, non solum eruditionem, sed & prudentiam & fidem tuam, homo tanti
 iudicij, ut quem cum eo comparemus, hoc sæculo non facile alium reperiamus. Annos quatuordecim in Anania valle vici-
 sti, vbi tuam industriam, fidem, benignitatem morumq; tuorum innocentiam ita approbasti, illustri præsertim Clesiæ
 familia, aliis cæteris, & toti in vniuersum populo, ut abiturum inde magna multitudine, cum viri, tum etiam matronæ
 vna cum liberis flentes longe satis per agrum illum te prosequuti sint, benefactorem & patrem solenni voce appellantes.
 De Goritiensibus vero, apud quos annis duodecim Medicinam fecisti, quo illi in te animo fuerint, peruagata iam in omnes
 terras propemodum fama est. Ut enim non recenseam omnia quot illi & quales sua erga te obseruantia notas ediderunt.
 Nam præter id, quod dum illic viueres honestissimum stipendium tibi sponte contulerant, ac instituerant, palam etiam
 tunc omnibus eorum in te animus fuit, cum incendio tibi domus vna cum facultatibus omnibus vna nocte interiret:
 mirum postmodum ad te certatim confluentes viri, ac matronæ singuli aliquid suppellectilis obiecerunt, alij etiam pecunias
 non modicas ad subleuandam illam ingentem iacturam contribuuerunt, fuitq; tanta eo tempore plurimorum nobilium
 virorum erga te liberalitas, ut eodem die post tantam factam iacturam rerum omnium, diuor mox quam prius fuerat,
 effectus sis. Sed maior fuit estimatio virtutis tuæ apud illos, quam ut sufficere tibi hæc premia putarent. Ideo Magi-
 stratus Nobilium decretum publicum fecit, ut tibi illico annui spatij stipendium ab ararij præfecto persolueretur. Quippe
 inuicem merita tua deuincti, & misericordia tam subita calamitatis affecti, non tantum subleuari te, sed & certissimè
 consolari

consolari, sua pietatis humanitatisque esse partes, consueverunt. Deinde, ubi fama nominis tui ad Caesarem Ferdinandum perlata, a te Serenissimi filij Medicum esse voluisset, ut rostarentur, ad vicinum constanti: suam suam erga te benevolentiam, torquem tibi aureum non contemnendi ponderis donarunt. Id si nul etiam apud te palam professi, neminem se Medicum sibi ascituros, nisi quem tu eis nominasses. Postremo datae sunt literae ad Serenissimum Archiducem, quibus impense petuntur ab illo, ut si quando vel ob senium, vel ob quemcunque casum alium au'icos labores amplius sustinere non posses, non liceret tibi demigrare alio, quam Goritiam: scilicet v. cum te v. & valente siui non possent, officibus saltem & cineribus tuis sua in ciuitate conditis extrema pietatis officia praestarent. Tanta in colendo & amando te constantia in homines quantumuis pios humanissimosque cadere non posset, nisi ea à virtutis admiratione ortum duceret. Vides, doctissime Matthiole, abunde te à non paucis honoratum esse, idque ab honorato viris, ut tibi iam insignificularum laetatus obesse magnopere non possint. Verum ut non ita magnificiamus hac, an non summa hac tua gloria est, quod inuisibilis totius Christiani orbis Imperator, te tuosque praclarissimos in Dioscoridem Commentarios tanti faciat, ut non tantum amplissima accessione stipendium auxerit, sed & peculiariter magnam summam argenti ad pertendas, quos nunc in manibus habes, libros donauerit? Exemplum sequui liberalissimi Imperatoris ipsius filij, & omnes totius B. hemia proceres magnam sane vim pecuniae ad eandem rem tibi contulerunt, v. his praclarissimum plantarum, & animalium figuris ad viuum delineatis, quibus sane pares haecenus non extant, nec fortasse in posterum extabunt: quas nunc pra manibus habes. Iam verò, si in partem gloriae tuae publicam famam, quam tu tamen nec capisti vnquam, nec magnificasti (qua tua modestia est) admittere velis, quid illa celebris est? in Italia, in Gallia in Hispania, in Germania nemo tam est rei literariae studiosus, qui tuum nomen non semper in ore animoque, Commentarios in manibus habeat, imo iam eo ventum est, de decus ut summum sit, in bibliotheca sua non posse ostentare Matthiole. Magna vero laus in eiu lectioe plurimum profecisse: contendentes nimirum iam certatim omnibus, occasione tuorum scriptorum ingenium in re herbaria cognoscenda periclitari. Vnde non mirum mihi est, quod retulit recens diligentissimus & fide dignus Typographus Vincentius Valgriffus à prima illa editione supra triginta duo in illa exemplarium esse diuendita, accurrentibus nihilominus ad emendum vsque tam multis, ac si nunc demum in lucem editus prodiret. Eam fortunam vilius vnquam libri fuisse, nemo est, qui asseuerare audeat. Quinetiam vidias iam instrui vbique hortos insignium plantarum refertissimos, quas ex tuis libris cognitas, magnis sumptibus aliunde ad se apportatas domi quisque sua summo studio & assiduitate educant & colunt. Illud etiam addendum puto, quod mirum fortasse omnibus videri queat, iactari iam hoc vulgo à meretriciorum negotiatoribus, qui lucri quarendi gratia longinquissimas & diuersas mundi regiones adeunt, vbique locorum haberi & legi Matthioli Dioscoridem. Sunt qui in Syria se eum vidisse dicant, alij in Persia, in Aegypto, alij cum Alexandria, tum etiam Memphi, quoniam & Arabes & Perios delictari eius inspectione dicunt. Ipse quidem audiui, qui diceret Thessalonica se illum Hebraice scriptum reperisse à docto quodam Hebraeo translatum. Ceterum quid dicam de pietate summa, ac liberalitate ingenii animi tui? nescio profecto quid magna: cum in minori satis fortuna, ac rerum omnium tenuitate studiosos nonnullis adolescentes, qui pro rei domestica angustia, sua prosequi studia non poterant, in publicis Italiae academijs proprijs aluisti pecunijs magnis à te laboribus conquisitis, libros illis innumeros coemisti, Doctoratus insignia persoluisi, atque his postremo peractis, eos optines honestissimis in locis collocasti. Ipse quam plurimos audiui Materiae Medicae studiosos, Patavium Goritia reuersos, ubi tecum fuerant plantarum cognoscendarum causa, vel te fortasse tantum videndi, allecti praclari nominis auisaria, qui non solum tuam in rebus omnibus agendis dexteritatem, & in ostendendis censendisque plantis facilitatem sunt admirati, sed magnis quoque vbique praconijs tuam decantabant liberalitatem, humanitatemque summam, cum praeter id quod in conquirendis demonstrandisque plantis, nunc in montibus, nunc alibi, nusquam laborum pertasus inspicere poterat, quotquot ad te veniebant, domi tuae exceptos à te esse aiebant, perinde ac fratres amantissimos. Tot tu laudatores & admiratores tuorum operum, ac animi morum doctumque adeptus, spernere ceteros citra vllam iacturam tuam, tuto & facile potes. At dicas: optabile erat omnium consensu recte facta approbari, & paribus studijs certatim laudari illos, qui de omnibus in vniuersum benemeriti essent. Equidem sic existimo eum te esse virum, in quo cohonefando omnes simul elaborare merito conueniebat. Veram tanto honore dignus cum sis, si non agnosces te tantum, a sinu quispiam calibus feriat, nunquid tuis ornamentis quicquam ex eo decussisse arbitraberis? Licet autem mihi cum hoc animante conferre amulos tuos: siquidem cum nullo conferri possunt magis apposite, quippe qui non reprehendunt ab illis, ad quos hoc pertinet, ut de summorum virorum monumentis sententias ferant, sed à stolidis quibusdam ac impudentibus, extremeque ignavis hominibus. Qui cum vix communi sensu praediti sint, vulgaro tamen illo animi morbo infecti tanquam totius sapientiae arcem tenerent, non modo censent omnes, damnant, & contumant, nihil nesciunt, ut est inscitia nihil impudentius, vel arrogantius, verum etiam, quod longe detestabilis est, ubi, quod iustu rationibus reprehendant, reperire nequeunt, conuictis & maledictis omnique criminum genere aptiorum & doctissimorum virorum labores infectantur. Verum hos obscurabit & opprimet tandem fama splendorque nominis tui. Et sane iam vidimus quibusdam per summam ignominiam & dedecus silentium imposuim per Magistratus publicos esse. Vix enim annus elapsus est, cum scripto in te acerbissimo libello quodam, ubi eum editum esse, contempnit Senatum Venetum, non tantum grauibus sub censuris vetuitne distaberentur exemplaria, sed ut igni impusita cremarentur, mandauit seuerissime. Itaque iam & summi Monarcha & amplissima illa Respublica pro tuo honore dispuant. Quo futurum facile non dubito, ut breui repressi, manus dent aduersarij isti tui, aut si quid omnino magis conuentur efficiantque, tempus ipsum profecto tandem posteritasque doctorum hominum scriptis semper equisurua, merita tibi gratiam, dignasque laudes referet. Cum enim hac aetas, tuque ipse, atque inuidi tui fatali mortalitatis lege transierint, nouumque successit seculum, tunc sine nominis statusque dignitate, aut respectu, sola existimabuntur ingenia, nec considerabit lector cuius, sed quale sit, quod legitur. Tunc nec amicorum auctoritas claritasque deterrebit, nec inimicorum calumnia auertent, nec munera opesue corrumpent, nec officia, aut odia, amorve seducunt ac perturbant iudicatos de scriptis homines. Sed nuda illa, remotis omnibus, quae à recte iudicando abducunt, obstaculis, per se ut sunt considerabuntur. Tunc si quis post fata superest sensus, ut est sane, candida veraque de tuis scriptis iudicia expectent, recipiesque tuorum laborum aeterna & immortalia praemia. Sed de his haecenus. Veram no sine aliquo fructu, ynde commodi, vel beneficij aliquid ad Rempublicam per te redire possit, hac nostra ad te perueniat epistola, plantam quandam siccam ex Hispania ad me transmissam, vna cum eius imagine ad te mitto, quod nihil sane magis mihi nunc sit in votis, quam ut herbam hanc viuam virentemque conspicerem. Scio enim in herbaria facultate doctorem esse neminem: quo sit ut aliquam huiusce herbae utilitatem ab te consequantur me sperem, sit tamen alibi quam in

Hispania nascatur. Quapropter te plurimum rogatum velim, quod si quam illius cognitionem habes, id mihi (vt soles con-
cateris) amanter significare velis. Namque digna est vt ob admirabiles eius facultates vbique habeatur in hortis. Imagi-

Planta ex Hispania
allata.
Plantæ historia.



Vires.

nem hanc vna cum herba & radicibus ex Hispania misit ad me Clariss. Casareus Medicus, Petrus Cannizerus cū hac inscri-
ptione. In hac depingenda herba multiplici luxu rerum patens natura colorum ornatu, felicissime lasciuit visa est. Illius siquidem radix dodrantalis, simplex & vnica nonnullis circumqua-
que prodeuntibus fibris innititur, crassitudine satiuæ Pastina-
ta, ipsa carnosæ, rara, teres in mucronem turbinatur. Cortice obtegatur simplici, subnigro, aspero, tenui: hic simulac inaruit
rit contrahitur, & in tenues rivas scissit. Candida eadem in-
tus est, pingui quodam & digitis adharente præ lentore succo,
gustu subdulci qualis fere in Pontica nuce. Summa tellure laciniat
a herba folia diffunduntur, carnosæ, longa, acuminata, colore viridi
languescente, singulaq; ex intervallo disposita. Cales gerit plures teretes,
graciles ac durisculos, in quorum summitatibus herbacei prodeunt calices
longiusculi, torosi atq; teretes, cuspidate toto ambitu denticulata: e qua
Majo mense latius prodeunt flores adeo numerosis foliis dense stipati, vt numero, ac
longitudine latitudinis angustiam abunde pensent, vbi vero prorsus
explicata fuerit, orbem radiatim circumstantes adeo pulchri visuntur, vt
aureo colore, & figura solem exprimere videntur. Ineunte autem solstitio
planta hæc deflorescit, mirabili facta transmutatione. Namque calices ipsi
globosè horrent aristarum agmine, quæ acie disposita glutinis continuo
excubant, vt semina ipsa densiori congerie intra aristarum vallum munita
statuto a natura tempore demum profiliant. Prouenit in montibus
vliginosis solo mortalibus operi laturo. Namque presentaneo remedio
aduersus viperarum caterorumque venenatorum morsus iclusive, ac pestiferos
morbos quoscunque, tam è foliis quam è radice succus desamitur, præbeturq;
potandus. Coniunctis item ingruente insultu mire affectu subuenit. Cardia-

is item datur & vertiginosis. Enimvero commanducata per se radix tristitiam discutit, hilaritatemq; conciliat. Quin etiam lactem radicis succus oculorum aciem acuit. In summa, tota planta magni est ad omnia vsus. Hæc sunt que planta ipsius iconi subscripta erant. Sed Hispanus, cui hanc mihi ferendam dederat Cannizerus, addebat hanc in Catalonia à quodam seruo Aphro à Ceruero Letidano viro nobili, pretio emptam primulum fuisse ostensam. Nam quum quidam (vt ille assererat) in agro messorum à viperis demorderentur hic, qui in Aphrica plantam hanc nouerat, propinato eiusdem succo, incolumes seruabat omnes, quotquot demorsi fuerant. Sed nemini plantam ostendebat, ne lucro defraudaretur. Quo postea factum est, vt v. s. riores quidam obseruantes à longinquo tractum à quo Aphro ille plantam deserebat, illuc concesserint, plantamq; conseruati sunt, inuentis resesse nuper herbe reliquiis, & repertis quibusdam huius herbe plantis, à quibus humo tenuis folia resessa erant, certiores facti sunt, se plantam adinuenisse, quam querebant. Ea deinde effossa, factaq; succi in aliquibus periculo diuulgata res est. Quoniam autem vipera cuius venenum superat hæc herba Hispanus Scurzo appellatur, post hæc eadem SCVRZONERA nominata est: quod idem significat, quod viperina. Nam & Græci ab Eχis Echium appellauerunt. Mihi vero omnibus carnis esse poterit, quam si tua opera in eius cognitionem deueniam. Habeo præterea quod etiam in Helenio abs te queram. Si quidem dubium non parum me reddidit superioribus diebus, liber ille Galeni de Theriaca ad Pisonem, quod ibi lagerim Datas & Dalmatas tela Helenij succo inficere: idque hoc per vulneratorum sanguini congregiens occidere posse. Verum quo pacto id fieri possit haudquaquam intelligo, quod non factum à nemine scriptum sit. Helenium vim aliquam habere lethiferam, sed quod scribat Dioscorides serpentium morsibus auxiliari: te consulendum putavi, quod tuo sperem auxilio ac doctrina ex hac ambiguitate me extricaturum. Reliquum erat, vt te hortarer ad vrgendos susceptos labores tuos. Sed excreuit iam nimium epistola, quam ne alias occupatissimo tibi negotium facessat amplius, melius est me hoc loco abrupte. Vale.

Quo pacto primulum in Hispania inuenta.

SCVRZONERA

Quæstio de Helenio.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS
Ioanni Odorico Melchiorio, Serenissimæ Reginae Bohemix Medico S. P. D.

Respondetur ad præcedentem Epistolam, & declaratur quid Helenium significet apud Aristotelem.

Hæc si solat plurimum mihi attulerunt humanissima litera tue, quod modis omnibus contra inuidorum obrectatorumq; morsus, iis confirmare & quasi munire me nitaris, non tamen animi perturbationes adeo lenire potuerunt, quo minus vicem meam adhuc dolere perseuerem. Non quod videam à pessimo nebulone citra causam omnem non solum nostros dilacerari labores, sed etiam dignitatem conuiciis, probris & maledictis petulantissime impugnari. Habeo tamen tibi gratiam, quod tuis dulcissimis verbis, tuis dicens scribendisq; facundia, ac fideli de rebus à me gestis commemoratione, dolores animi mei haud parum demulseris. Sed quem admodum tu, quem filij loco dilectissimi semper habui, amoris in te nostri omnibus tuis officiis haud immemor te exhibere, ita nunquam oblitiscar ego, vnum te semper extitisse, qui me ex animo dilexeris, obseruauerisq; quam nunciam.

Pro qua tua, in me propensione at pietate, ego tibi vicissim modis omnibus perpetuo respondebo. Dicant scri-
bant agant, latrent contra me hi perditissimi Sycophantae, lacerent labores nostros, addant maledicta, criminationes, con-
tumelias, non tamen ob id iustitiam iuvanda Respublica, propagandaq; veritatis me auercent, nec unquam satis venenatis
moribus scripta mea adeo dilacerabunt labefactabuntq;, quin concia innata eorum malignitatem continuo in me-
dium doctorum virorum emergant, & elucescant. O te si haberem, quo cum studiis meis communicarem, ut antea sole-
bam, nihil mihi pariter evenire posse beatus. Hec enim in studiis voluptas socium requirit, sine quo quarequum illa qui-
dem manca non est, esset tamen ea proculdubio hilarior, vberior, dulciorq;, ubi adesses tu, quo cum quotidie cor ferre pos-
sem. Sed fortasse conuiget vos Deus Opt. Max. antequam a corpore animam disjungat. Ille autem, cum animi mei vo-
ta in conspectu habeat, tui vice, paucis ante diebus socium mihi addidit Ioannem VVilbrochium Borissum Medicum, ho-
minem ut iterum, ita virtutis in primis studiosum. Is in aula Sereniss. Principis nostri nunc primum ascitus est, ut
mibi animalium historiam meditanti aliusq; interim negotiis occupatissimo, sua opera sit auxilio. Nec dubito quin con-
iunctu operu hanc doctrinam ita negligenter hactenus tractatam ex cultiore & veriore aliquando studiosis propositu-
risimus. Est enim Sereniss. Princeps noster adeo huiusce instauranda historia studiosus, ut multum iam in locis doctos, ac in-
dustrijs homines aliat, qui non libros tantum antiquorum ea de re consulant, sed in ipsis animalibus oculati testes, quid
sit, quid non sit verum, considerent. Taleo pictores qui externis in regionibus principis are, quadrupedum, volatilium,
reptilium, insectorumq; omnium imagines ex ipsis viuū animalibus catamo perquam diligentissimo delineant ac propriis
pingunt coloribus. Itaq; tanto principe aut ore habebunt iam Philosophi in posterum pulcherrimam illam sua profes-
sionis, qua hactenus caruerunt, partem integram, bona fide, non ex libris collectam, sed ab ipsa rerum natura descriptam.
Quanta enim ingenij excellentia Principem hunc diuina prouidentia ornauerit, vel ex eo manifestum est, quod cum in
Philosophorum libris adductus inde maturius ad maiorem, Regni nimirum administrandi gloriam, magnopere versari
non posuerit, ista tamen de naturis rerum & sentit, & differit, ut non tantum intelligere Philosophorum decreta videat-
tur, sed eis etiam, adductis rationibus & observationibus propriis contradicere audeat. Vnde fit sepe, ut non illum a no-
bis, qui nomen titulumq; doctrina gerimus, sed nos ab ipso de rerum huiusmodi veritate, exquirere sepe numero necesse
sit. Sed ut redeam vnde diuerteam ego me istud iudicium persequar, nec ab illis unquam me separabo, quousq; anima separatur
a corpore, ne posthac temporis amissi reddenda mihi ratio foret. Sed venio ad plantam, cuius imaginem vna cura historia,
& vtrius ad me misisti: quam et si antea Norimberga mihi misit ex aminandam Ioannes Hissus Medicus, qui conquiritu-
da comparand. q; sibi plantis vniuersam fere peragravit Europam non tamen sit, quin tua mihi tam grata fuerit, quam
quod gratiss. ma: quum vna cura imagine integram sicca herba plantam ad me transmiseris, in qua omnia viuū sum con-
templatus. que ea in imagine mortua fere apparebant. Ex illa enim non solum viuam veramq; omnium partium delinea-
tionem sum magna cum voluptate contemplatus, sed radicis saporem ac etiam odorem degustare licuit. At doleo profecto
plurimum, quod tuae petitioni, ut velim, satisfacere nequeam. Nam planta haec peregrina antea mihi visa non est, & si for-
tasse visa, nō tamen cognita. Memini quidem talom fere me conspexisse plantam in Geritienfi agro quodam in prato pa-
rum ultra Sontij fluminis pontem quam cum a longo Tragopogonem censerem, alia postea reperta est. Verum an haec illa
fuit planta affirmare sane non ausim quod foliorum imaginem in mentem reuocare nequeam, nec radicem videri ef-
fossam. Habet enim Scurzonera haec tua flores Tragopogoni amulos, quum etiam radicem perinde ac in illo dulcem, adeo ut
Tragopogoni species dici posset, nisi folia Cichoracea planta speciem referrent, caules longe aliter quam in Tragopogono se-
haberent, & nisi radix crassior, succosior & lacte praegans haberetur. Porro vetant haec ne Scurzoneram Tragopogoni
congeneram faciam. Non desunt praeterea, ut audio, in Hispania rei herbaria fortasse non ignari, qui hanc plantam Chon-
dryllam esse censent, tum quod foliis eam referat, tum etiam quod Chondrylla ex vino pota viperarum moribus succu-
rat. Atque cum flores Cichorij non sint, radix amara non sentiat, sed dulcis, & eius natale solum circa montium cacu-
mina vniuersis locis habeatur, non possum horum subscribere sententia. Quo fit, ut putem hanc proprii sui generis ef-
se plantam, cuius nulla apud antiquos extet historia, quemadmodum & aliarum multarum, qua nostris temporibus re-
perta sunt. De huiusce herba inuentione, eandem historiam quam tibi retulit Hispanus ille, qui herbam hanc tibi reddidit,
narravit etiam mihi, dum hac astate istu agerem, clarissimus Rybera Casareus Physicus, cuius testimonium, ad ea omnia
confirmanda non parum conferre censeo. Plura de hac planta non habeo, qua tibi nunc explicem. Sed vellem ut semē
a Cannuzero peteres. Hoc enim consilio id quod plurimum desiderare videris, facile consequeris. Hoc si tibi comparare
curaueris, & Medicos & rei herbaria studiosos omnes ob tanti antidoti collata beneficia perpetuo tibi deuincies. Sed ad
Helenium venio, de cuius venenosa scruitate te dubitasse non miror, quod ipse de eodem longe antea dubitauerim. De qua
te dum alias cum docto quodam amico, & rei herbaria studiosissimo, conferrem; dicebat non ibi Helenium legi debere,
sed Belemium, Aristotelis testimonio, qui libro primo de plantis sic habet, Βελίνιον δὲ τὸ ἀπὸ Περσῶν τὸ γινόμενον ἐν
Περσῶν κατὰ τὸν Ἰνδόν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Παλαιστίνῃ γίνεταί τε βρώσιμον: id est Belemium vero, quod perniciosum est
in Persia natum, in Aegyptum transplantatum & Palaestinam fit edendo. Atqui (quantum conicere possum) Aristoteli
tam hanc lectionem doctus viris deprauatissime legi constabit, quam ibi Aristoteles de Persea arboris fructu, vel de ipsa Per-
sea potius scribere videatur, quam de alia quauis planta. Nam hoc idem de Persea scribunt Dioscorides & Galenus. Idq;
eo magis mihi persuadeo, q; nusquam apud antiquos scriptores repererim, qui Belemij meminerint. Porro si coniectari licet,
an verē liber ille ad Pisonem de Helenij veneno nobis referat historiam, dicerem ego satis dubiam esse illius libri fidem, quod
non solum certo sciam librum hunc non esse Galeni, tum quod de trifolio Asphaltite fabulose satis scripseris, ac etiam in
aliis quibusdam non parum claudicare obseruauerim. Nisi fortasse autor libri illius de alio Helenij genere intelligat, de
quo libro primo scribit Dioscorides, praefertim cum dicat, Helenium illud, ab incolis Nico appellari. Plura certioraq; de
his, qua ad te scribam, non habeo. nam de incertis quicquam affirmare non ausim, nec etiam diuinare possum. Caterum
cogitanti mihi, quo pacto munus tuum compensare valerem, id commode fieri posse succurrebat, si tamen etiam aliquod
reperio, tibi mittendam decreuerim. Emit autem id Serenissimus Princeps meus paucis ante diebus a Theodorico quodam
New Coloniensi pluribus ducatorum centenis, animalis raritatem contemplatus ad publicum spectentulum. Aiebat New
burgam Selandiae ciuitatem. Refert hoc animal partim Camelum, partim vero Ceruum, ad eum recte quidem Graeco
idiomate Ελαφοκάμηλον appellari posse crediderim. Longitudo totius corporis a ceruice ad caudam sex pedum est, aliu-
no vero a dorso ad pedis plantam quatuor tantum, & colla longitudo a scapulis ad ceruicem, duum. Capite, collo, ore, su-
perioris praefertim labris figura, at genitali Cameli fere refert. At caput elongius est, aures habet Ceruinās, oculos bi-

Animalium hi-
storiam instau-
rari.

FERDINANDI
Archiducis
Austriae laus.

Matthioli de
Scurzonera cen-
sura.


Helenium

Βελίνιον quid.

Aristotelis lo-
cus restitutus.

Libri de Theria-
ca ad Pisonem
dubia fides.

Ελαφοκάμηλος
& eius historia.



bules. Anterioribus dentibus in superiori mandibula
sed molares vtrinq; habet vt bisulca fere omnia & vt illa et-
iam raminat. Dorso est sensim prominente, quod per inci-
riam à pictore neglectum est. Scapulis prope collum depressis,
lateribus tumidis, ventre lato, clunibus altioribus: & cauda
breui: spithama fere longitudine quibus omnibus ceruum fere
refert, quemadmodum etiam cruribus, præsertim posterioribus.
Pedes illi bisulci sūt, diducta anteriori parte diuisura. Ungues
habet acuminatos, qui circa pedis ambitum in cutem crassam
abeunt. Nam pedis planta non ungue sed cute, vt in multis
di & in ipso Camelo, contegitur. Retro mingit hoc animal,
vt Camelus, & testes substrictos habet. Pectore est amplo, sub
quo vbi thorax ventri connectitur, extuberat globus, vt in
Camelo, vomica similis, è quo nescio quid excrementi sensim
manare videtur. Color colli, ceruicis, pectoris & anteriorum

erarum est illi albus, Reliqui vero corporis subruber, vel ex nigro rufescens. Rostro tamen est nigro & anterioribus cruri-
bus à genu albicantibus. Cicur ac mansuetum est animal, sed frigoris impatiens, vt alia que è calidis ad nos ducuntur re-
gionibus. Neminem offendit sed miro admodum ingenio ab illata se vindicat iniuria. Nam vbi aliquis illud vexet, vel
circa clunes opprimat, non calcibus, aut moribus se defendit, sed vomitu, vel cibi, vel humoris in vexantem retorsum cum
impetu ei aculato, ob protensam colli longitudinem. Salacissimum hoc esse animal, id mihi coniecturâ facit, quod cum sui
generis femellis sit desitutum, magna cum prurigine capris se commisceat, non tamen erectis, vt alias capra hirco ascen-
dente solent, sed humi ventre accubantibus, ita cogente animal anterioribus cruribus. Itaq; superascendens coit, non au-
tem, vt falso de retro mingentibus animalibus affirmat Aristoteles, auersis clunibus. Id quod etiam falsum esse de Leone
obseruauimus, illi dum coiret astantes. Adeo Venere vernali autumnalique tempore stimulat ut hoc animal, vt illud vide-
rim ego humile quoddam præsepium auena refertam conscendisse, genitalemq; illi magno cum murmure tam diu conficaf-
se, quousq; semen redderet, pluribus vna hora replicatis vicibus. Non tamen concepere capra huiusce animalis semine re-
fert, quod, vt puto, vi coacta illi prostituerint continuo balantes, tum quod hoc cum animal earum non conueniat species.
Indicam quem appellabat hoc animal, qui illud ad nos aduexit. At qui à nostris quibus quantum distet, cuius se iudicare po-
teris. Sed de Ceruocamelo hæcenus. Vbi vero alia rara afferentur, nihil præteribo, quin te de ois certiore reddam. Quod,
vt tu etiam facias (vt capisti) plurimum opto. Vale.

Aristoteles ar-
guitur.

Indica ouis.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS

Aliprando Spezzalancio Chirurgico

S. P. D.

Declaratur quid sit Cozumbrin Catapotiu è Cynoglossio.



Vum catapotia passim è Cynoglossio appellata, secundum antiquam Nicolai versionem nunc in tui Myro-
poli vsu parare decreueris, petus à me quid significet tibi COZUMBRI, & an pro eo liquidis Styra-
ciam, vt inquit autor Laminaris maioris, vel Styracem rubeam, vt inquit Cordus, vel vt quidam alij præ-
cipiunt, Thymiam, quod vulgo Itali Pharmacopœi appellant Tignam, admiscere debeas. Nam cum vi-
deas tot varias hominum sententias, nec ab his te explicare valeas, longe tutius facturum te putas, si de te
hæc me consulas, quam si eorum sequaris confusiones. Ego vero etsi non adeo multum in censendis examinandisque, compo-
sitis medicamentis hæcenus insudauerim, perinde ac in simplicibus, dicam tamen, ne tua de me te fallat opinio, quid
hæc re simpliciter sentiam. Quod est vt pro Cozumbrin selectissimum imponas Styracem, non liquidum tamen nec eius
faciem, vt perperam scribit ille, sed quem à calamis, in quibus olim asserbatur, Calamitem vocant officina. Etenim is cum
Dioscorido, tum etiam Galeni testimonio, tusti, distillationibus, rancedini, grauedini & interceptæ voci mirifice medea-
tur, quin etiam cum præter hæc facultates soporiferum sit medicamentum, in hisce Catapotiu vtiliter additur. Soporife-
ra facultatis esse Styracem idem facile testatur Galenus libro 12. cap. 1. de Methodo medendi, lib. 6. commentario quin-
to, de morbis vulgaribus de aurium doloribus agens: & lib. 2. cap. 1. de Compositione medicamentorum secundum locos, de
dolere capiti febri citantium differens. Quippe omnibus in locis Styracem soporiferum esse medicamentum apertissime
fatetur, id quod ante ipsum posteritatis memoria tradidit Dioscorides libro primo, in Styra-
ciam capitulum calce. Quibus palam
est in Catapotiu de Cynoglossio nihil conuenientius, ac magis legitime pro Cozumbrin addi posse, quam selectissimum Sty-
racem calamitem. Namq; Catapotia hæc rheumatismis, tusti, distillationibusq; peridonea sunt, non solum quod medica-
menta excipiant hisce affectibus conuenientia, sed quod præter id soporifica eorum facultate quibus omnibus referre est
Styrax, de fluxiones cohibeant, quibus hæc symptomata plerumq; excitari solent. Sententia nostra astipulatur Simon Lo-
nensis Arabici idiomatis fidus interpret, qui Cozumbrin Styracem interpretatur. His accedit Nicolai Myrepsii autho-
ritas, quippe is lib. 32. de Catapotiu omne genus agens, vbi ad soporifera deuenit, quorum plures parandis rationes habet,
ad diuinam tustim, purulentas excreationes, ad arteriacos & distillationes omnibus Styracem admiscet. Quo fit, vt eo magis
mea in hæc opinio, quo euidentiores sunt rationes, que in hanc me trahunt sententiam. Placeret quidem hic Valerij
Cordi doctrina, qui rubeam Styracem imponi iubet, si tamen pro rubeo flauum, vt pote præstantissimum intelligeret. Sed
tum ipse Germanus fuerit, & sciam ego Germanicas Septasias nihil aliud quam Thymiam, quod Dioscoridi Nariaph-
thum vocari censeo, Styracem rubeam appellare: vereor sane, ne ipse quoq; pro Cozumbrin, Thymiam addendum credi-
derit. Sed demum eum de selectissimo Styra-
ce intellexisse, errauit tamen, cum sciret quid apud suos Myropoli rubeus desi-
gnaret Styra-
cem, quod illi manifestam errandi ansam præbuerit, à quo errore non habeo quibus eum excussem: præsertim
cum mihi certo persuadeam, Cordum in hoc Iacobum Manlium esse secutum. Namque Manlius simulac perperam expo-
suit Cozumbrin, faciem esse Styra-
ciam liquidis, mox subiunxit Arabicum nomen secundum Compositorem nil aliud designa-
re, quam rubrum Styracem seu Thymiam, seu Thus Indiarum. Quæ vt inepta, inania, & incertis autoribus allata, uari-
danda & reuocanda videntur. Vale.

Pro Cozumbrin
Styrax.

Styrax Soporifera
est facultas.

Catapotiu
è Cynoglossio
facultas.

Styrax rubea
Germanis qua-
lit.

Cordi citatum.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS IACO-

bo Antonio Cortuso Patritio Patauino

S. P. D.

Examinantur quadam planta & restituitur Dioscoridis
locus in Osyride.

Certe mihi litera tua tantum ne? imo vero & perceptata & dulces, quod iis intelligam, quanta me prosequaris benevolentia, quantaq; ingenui animi tui liberalitate continuo perseveras cum nouas tum etiam raras ad remittere plantas: quibus contemplandis eo maiorem capso voluptatem, quo dulcior est fructus, quem ex his capere soleo. Magnus earum catalogus mihi palam facit, quam diligens in iis comparandis fueris, quamq; sedulus in iuuando labores nostros. Pro quitus collatis in me officiis, ac beneficiis, ego quidem multum me tibi debere scio. Sed cum ea non sim facultate, ut hanc tuam erga me benignitatem solus compensare queam, dabo mox diu omnibus operam, ut non solum presentes rei plantaria studuisti, sed et posteri tibi se plurimum debere fateantur. Quod ad censuram harum plantarum attinet, utinam ea esse in doctrina, eo ingenio, eaq; in plantaria facultate experientia, ut recte, ac aliquo cum iudicio de omnibus iudicare possim. Cupio enim non tantam tibi perenti morem gerere, sed mihi ratiocinanti etiam satisfacere. Verum si sciam, id a me non ita exacte, ut velim praestari posse, dicam tamen de his, quemadmodum de aliis prius dixeram, libenter quod sentio, ne si nunc id facere recusarem, viderer negligentior factus. Primum itaq; ad eam venio, quam quibusdam SIDERITEM, Heracleam vocari ais. Sed cur horum probem sententiam, mihi est quod me moueat. Folia enim qua Salvia maiora sunt non minora, quaq; longo magis Betonicam referunt, quam Marrubium vel Saluam ipsam, Sideritem haudquaquam referre videntur. Crederem ego hanc plantam huiusmodi potius Hormium esse genus, quod plures ius habeat notas.

Sideritis Hera-
clea.

FOLIA quorum subscriptio est BETA SYLVESTRIS, Spinachij potius folium referunt, quam Beta. Gale-
nus agrestem Betam nullam reperiri scribit praeter Runicem. Sed Plinius Limonium, sylvestrem Betam appellauit.

Beta sylvestris.

LAMP SANAE profecto speciem refert illa, qua Chirurgicos, uti ait, am sollicito successu ad vulnera glutinanda. Sed
Lampiana non est (quantum mea fert opinio) de qua scripsere Dioscorides & Plinius, cuius nos imaginem dedimus.

Lampiana.

TORAM non esse Aconitum Pardalianchen plures indicant nota, de quibus cum fusius nobis dictum sit in ipsius
Aconiti appendice in commentariis nostris in Dioscoridem non est ut hic plaribus tecum agam. ALIAM vero plantam,
quam quidam Aconitum faciunt, folio aliquatenus cucumeri simili auersa parte albicante, Lucas Ghinus Cataliam non
male censet. Si quidem Catalia folia fert alba, magna, & rursi & scabritiei arteriarum prodest, Tragacantha modo.

Toram non esse
Aconitum Para-
dalianchen.

Cacalia.

Id quod in hac planta ipsa Tusilaginis facies indicat. Est enim adeo per omnia illi similis, ut nisi folia oblongiora essent, ac
maiora paulo, nemo est, qui eam Tusilaginem ipsam esse non diceret. In Aconito Pardalianche folia requiruntur Cyclami-
nis, Cucumerisue minoris, ac subhisut a. at qui hac longe maiora spectantur, alba lanugine, ut Bechiam, auersa parte ob-
ducta & raris leuia. Adde quod herba haec venenosa non est, nec radicem scorpionis cauda similem habet, quo fit, ut ego
Lucas Ghini sententiam sequens Cataliam hanc esse censentem.

POTERIVM Dioscoridi large fruticat. Corvace est obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis lon-
gis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacantha proximis, foliis paruis, rotundis, flore exiguo, candidi coloris, & semine gustu
dento & odorato. Sed cum illius planta ramusculus, quam quibusdam Poterium appellari scribis, large fruticare plantam
non indicet nec spissa, nec raris lanugine vestiatur, ramulus longis non sit, nec lentis, non video, qua ratione hanc Poterium
faciant. Poterij plantam, qua omnibus suis notis legitimum refert, habeo ego Constantinopoli allatam, ab Augerio Sere-
nisi. Caesaris Ferdinandi Oratore. Nil enim illi deesse videtur, quod in Poterio desiderari possit.

Poterium.

HERBAE cui inscriptum est Splei splec, splec, Corydalis, & tertium Fumaria genus nusquam antea mihi visa est.
Scio tamen Corydalis meminisse Galenum lib. 11. de simpl. medic. facul. de Corydo, id est Galerita aue scribens, quam her-
bam colicis conuenire ait, perinde ac ipsam Galeritam. At qui cum eius notas non deseripserit is, nec quenquam antiquo-
rum habeam, qui illius faciat mentionem, nescio quo pacto hanc Corydalis esse credam. Verum cum non sine ratione, &
auctoritate ita abs te plantam appellari censentem, gratissimum mihi fecerit, si tuas de hac herbula coniecturas mihi impar-
tiri volueris.

Corydalis.

PLANTAM qua summis canaliculis, quaternis gerit folia crucis in modum distincta, lentis racematim sine folli-
culis proferens, & quam aquis innatae scribis, magna cum admiratione sum contemplatus. Est enim ut rara, ita omnium
spectatu dignissima. Hac longe alia est a lente palustri Dioscoridis. Sed ubi in Italia nascatur, & quibus sit praedita facul-
tatibus, quam libenter abs te audirem.

Lentiaquatica
altera.

LAPPAGO Plinio ita appellata folio est Anagallidis, cui folia inesse oblonga, nec vllibi in ambitu ferrata, nemo
est qui nesciat. Sed planta, quam Lappaginem nonnulli censerit scribis, folia habet rotunda, circunquaq; denticulata,
Timpinella nostratis modo. Id quod me maximo adducit ad credendum, eam haudquaquam esse Lappaginem.

Lappago.

SAGITTA, quam Magonis testimonio, Pistanam Graecis appellari, & inter vluas nasci scribit Plinius, copiosa hic
in Bohemia provenit circa Muldam fluiuium, qui Pragam transit, media inter Vluam & Typham appellant eam. hic Her-
culis sagittam. Videtur ex eo esse plantaginei genere, quam Fuchsius Barba hyluanam appellat, quamquam folio distanti.

Sagitta.

GERANII imaginem radice rotunda, cuius primo loco meminuit Dioscorides, iam diu misit ad me Vlysses Aldro-
mandus. Nunc vero tua liberalitate & herbam ipsam & radicem inspicio. Plantam ille ex Dalmatia sibi allatam refere-
bat. Sed an tua illinc ad te peruenierit, vel in aliqua Italia regione oriatur, non parum scire desidero.

Geranium.

LONGHITIDIS aspera plures esse species, ex tua quam ad me mittis, iam primum animaduerto. Nihil tamen
a mea differt, nisi quod tua nil magis folium diuisum habeat, quam Scolopendrium, & minor satis est planta, in ceteris
vero nihil similem, nihilq; aequalium, adeo ut putem meam marem, tuam feminam esse, quod mea omnib. suis partibus ve-
getior, grandior, firmitior, distinctiorq; sit quam tua. Nam femininum genus imperfectius est, quo fit ut in animantium fe-
minis capitis sutura, non ita, ut in viris, perspicue cernantur. Tuam non nouisse Dioscoridem ex hoc animaduerto, quod
suam faciat folio Aspleno magis diuisam. Id quod in mea apertissime videtur, in tua vero minime. Hanc non credo vsquam
vidisse Marantam. Nam si eius aliquam habuisset notitiam, non ita fortasse sua fuisset addictus opinioni.

Lonchitis aspe-
ra altera.

ALATERNVM scribit Plinius foliis haberi inter ilicem & oleam, quib. cum minime corripundant ramuli illius
folia, quem ad me transmisisisti, nihil dubito quin tu id recte animaduertis, quia videris folia illi esse in cacumine spinosa
& olea

Alaternum.

- Attinia.** & olea perquam longe minora. Idem dicam de Attinia, cum ramusculum ad me transmissum folia habeat Lauri, ut Vlmi, & flores umbellatim coherentes, è quibus baccas gigni corimbaceas non ambigo. Attinia enim Plinio omnium Vlmi generum excelssima recensetur, ac sterilis. Quo fit, ut illorum opinionem, qui hanc Attiniam faciunt, minime comprobare queam.
- Fucus marinus.** PLANTA cuius titulus est Fucus marinus, albicantibus ac tomentosis foliis, alias Goritia fuit ad manus. Vtebatur ea quidam circumforaneus ad Enterocelas, sed an fucus Marinus sit non ita facile decernam, praesertim cum sciam hanc in mari sub aquis non nasci, & asseras tu oriri etiam eam in agro Foroiuliensi in sicco Tiliauenti fluvij alveo. Nasci autem Eucum marinum sub aquis, non in sicco quispiam ex Galeno certior fieri potest: quippe qui libro 8. de simplicium medicamentorum facultatibus de eo sic habet. Phycos etiamnum humens & virens ex mari exemptus desiccatur ordine secundo. Id quod etiam testatur Plinius libro 13. capit. 23. Dicerem ego potius hanc plantam Gnaphalium esse, vel eius aliquod genus, quod folia illi sint crassa, alba, & adeo spissa lanugine obducta, ut pro tomento iis quis commode uti possit.
- Ononis flore luteo duplex.** ONONIS flore luteo nascitur pluribus in locis circa Pragam, sine aculeis tamen. Sed iam primum ex hac tua animaduerto, eandem aculeatam reperiri. Est enim proculdubio Ononidis tertia species, sed quartam etiam hic Ononidem reperiri, flore vbiq; candido, quam alibi nusquam videre licuit.
- Aster Atticus.** ASTER ATTICVS flore in ambitu purpureis foliolis, circumsepto, in medio vero luteo, nascitur hic vbiq; copiosus nullis deficientibus notis. Manet ergo in sententia, ac interim ridebo blateronum quorundam petulantiam, qui in meam de Attico Astore imaginem inuadunt.
- Spina alba.** PLACET sane Spina alba stirps, sed est adhuc aliquid, quod in ea desiderem. Contemplabor diligentius omnes eius notas, deinde meam solidiorem de ea asseram censuram.
- Cytisus.** Vidi CYTISI florentis ramum, quem à Maranta te accepisse scribis, sed nolim ob hoc praetermittas, quin aliam quoque ab Aegidio Cusmano, viro ut nobili, ita doctissimo meo nomine petas: Cupio enim filiquas, quibus ille refertus est, veras ac viuas inspicere.
- Verbena.** VERBENAM quam à Maranta te accepisse scribis, cur legitimam faciam, nihil habeo. Scribam de hac ad illum, Deo volente una cum aliis nonnullis, quae annotavi in illius Methodum de cognoscendis simplicibus. Hanc scribis ille Tribuli terrestris modum humi repere, & plures habere ramos, cum tamen Verbenam singulari tantum ramo radiceq; sola constare, nec vllibi humi repere scribat Dioscor.
- Clymenum.** Cui CLYMENVM inscriptum reperiri, planta sane est (ut inquit) foliis Plantaginis minore, caule quadrato, compresso tamen, pinnulis herbaceis utrinq; secundam longitudinem se diffundentibus, capreolum multum referto, quibus vicinis se implicat plantis. Siliqua Gensla, vel vicia modo, in longam protensa crassiore tamen longiore, & sensim in cacumine prona subrubens maculis transuersim sese diffundentibus: quas quidem notas, si diligenter quispiam inueatur, facile cognoscet, hanc plantam non esse Clymenum. Ego sylvestrem Pisum potius appellarem: Clymeno enim salsiculos tribuit Dioscorides in sese inflexos, ut in Polyporum piscium cirris, à quibus quam longe distent huiusce planta siliqua nulla sui parte inflexa, sed quatuor digitorum longitudine protensa, & longa pedicula adalligata, non dubito sane quam tu ipse videris: sed tanta tua modestia est, ut potius mea velis acquirere censura, quam tuo ipsius iudicio. His accedit, quod nusquam Dioscoridi scriptum sit Clymenon capreolos mittere, quibus propinquus se implicet stirpibus huiusce sylvestris Pisi modo.
- Chamaesyce.** CHAMAESTYCEM, quam mihi censendam proponis, etsi humi repat, cum tamen folia lentis non habeat, sed minori Ocimo grandiora, oblongioraq;, nec semen sub foliis praefert, sed in ipso foliorum exortu, non possum in aspiculari, qui eam Chamaesyce esse censent.
- Corchorus.** CORCHORVS (ut Theophrastus inquit, libro 8. cap. 7. de historia plantarum) ob amaritudinem in procerbis est. Sed stirps, quam pro Corchoro Alexandria Aegypti ad te allata est, amara pro suis amaritudine variet. De foliorum facie disidet Plinius à Theophrasto: quippe hic Corchori folia Ocimo similia facit, ille consolata esse dicit, sensibilitudine Mori. Sed in hac planta potius ad Ocimi similitudinem accedunt, quod Theophrasti Corchoron esse indicat, si tamen amarorem respicerent folia. Qui vero eandem Circeam esse volunt, si folia diligentius inspicerent, quae nullam cum hortensi solana habent cognationem, si flores aureos, non nigros, & semen non Miliis, sed Echii simile, nil sane vereor quin aliter sentirent.
- Clematis altera, altera species.** PLACVIT summopere Clematis altera, altera minor species, quam nunc primum tua summa benignitate agnosco. At qui si semen consequi liceret, esset quidem mihi gratissimum, quod in recenti herba vehementem acridinem illam degustare cupiam, & florum suavitatem percipere, quin etiam ut omnes eius partes, folia, inquam, flores, capreolos, & sarmenta & radices inspicere possem.
- Osyris.** OSTRIDIS stirpem perquam diligentissime sum contemplatus, quae quancquam quibusdam notis Dioscoridis descriptioni respondere videatur, nempe quod tenues habeat ramulos & lentos, & in his rara lini folia, ut ille, inquit, tenua quaternaria, quina, senaue, sunt tamen quadam, quae me mouent, ut non ita facile fatear hanc plantam legitimam esse Osyridem. Est enim in primis Galeni, Pauli, & Actij autoritas, quippe qui scribant ex Osyride commode parari scopas. Quibus parandis, planta quam misisti, inidonea satis apparet, ob nimiam surculorum tenuitatem imbecillitatemq;. Deinde tamen si rara in surculis sunt illa folia lini emula, non leui tamen coniectura mihi constat, hac verba Dioscoridis esse addita, γ, ἔστι δ' ἡ δὲ ἴσ' ἡ δ' ἴσ', cum hac non legat Oribasius, sed simpliciter scribat in Osyridis ramulis folia haberi ceu lini, quemadmodum etiam habet Plinius. Praeterea est etiam ad manus antiquissimus Dioscoridis codex manu scriptus, in quo hac verba non reperiuntur, Μέλανα κατὰρχαὶ μετὰ βαλλόμενα δ' ὑπὲρθεα γίνονται. Id quod manifesto est argumento in hoc capite, in Dioscoridis codice, qui passim circumfertur, non deesse mendas. Quo fit, ut potius ad credendum meum inclinet animus, Osyridem eam esse plantam, quam vulgo nos appellamus Beluedere, quam aliam quancumq;, quam hactenus viderim. Est enim hac saturate viridis, ramulos ferens tenues folia pro suis lini emula, & ad scopas parandas adeo idonea, ut plurimi sint, qui hac tantum causa eam ferant & alant.
- Suber.** DV M hac scriberem, allatus est ad me, una cum tuis literis, Suberis ramusculus glandibus refertus, quem Roma ad te missum dicit, ut abs te petieram. Quo fit ut continue tuam erga me beneficentiam augeri intelligam, pro qua quantum tibi debeam, non facile dixerim. De ceteris non est, ut nunc meae expectes censuram: nam cum partim mihi ignota sint, partim vero adeo mutila, ut difficile iudicari queant, non egre seras obsecro, si nunc plura de his ad te non scribo. Sed aliter fore esse id praestaba, cum quietior fuerit animus. Reliquam est, et clarissimus Marco Antonio Caballino me plura

tuam committentes, & ne egre ferat meo nomine significes, si nunc ad eius humanissimas literas non respondeo. Agnosco certe me illi plurimum debere, ob eam non vulgarem, quam de me habet, opinionem. Vale.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS MARTINO Guidottino Pharmacopœo Tridentino. S. D.

Docetur ratio parande antidoti quam Mithridaticam nominant.

Literas tuas, quas una cum lapide Asio pulcherrimo ad me misisti, verum non tam hac de causa te nunc ad me scribere animaduerso, quam quod me consulas, quomodo in paranda Mithridatis antidoto te gere- re debeat. quum non desint scopuli, quos tamen si posses, vitare velles. Sed utinam tam prudens, tamq. ex- ercitatus sis nauclerus, ut meo consilio te adeo iuuare possim, ut nauiculam tuam in portum illasum re- ducas. Faciam tamen, vt gratificer tibi, periculum, cum tibi omnino persuadeas, te neminem me habere praestantiorẽ, cui te committere possis.

PETIS itaq. primum, an in hac paranda antidoto Andromachum an Damocratem sequi debeas. Nam cum vi- deas Androma- chi Theriacam ceteris praeuulisse Galenum putas fortasse te recte facturum si Mithridatis antidotum para- ueris, qua ab eodem Andromacho describitur. Quae quidem sententia, & si haec dirfirmis nitatur rationibus, sunt tamen argumenta quibus fateri cogimur, Damocratem in hac paranda antidoto, Andromacho alias Philosofo ac medico cla- rissimo esse praefendum. Nam si ex medicamentorum praestantia ac viribus iudicium ferendum est, cum capiat Da- moctratus composito Agaticum, Macchadum longum & album pip. r. Balsami baccas, Bdellium, Creticum Dictamnium, Asarumq., quibus omnibus altera desituitur veniantq. haec omnia praeter Asarum etiam in Theriacam, quod venenis mi- rifice resistant, non censo haberi quenquam qui aliter sentiat quam quod ea, quae Damocrati describitur, alteri sit pra- feenda. De his autem, quae ad succedanea sp. etant, meam inter illos opinum ex hac epistola ad Balthasarem Peperulum de paranda Theriaca quam huc adnexam reperies. Siquidem quid pro Opobalsamo, Costo Malabathro, Carpobalsamo, Cardamomo Acoro, Meo. Acatia, & Petroselini semine supponendum sit, ibi diffusius scriptum reperies.

Mithridatis an- tidotus a Da- moctrate descri- pra ceteris praes- stantior.

DE ACORO nihil etiam dicam, quod antea à me scripsit superq. comprobatum sit in meis in Dioscoridem com- mentariis, calamum aromaticum vulgaris vsu legitimum esse Acorum.

PRAETER EA anima tuert as oportet, haberi huiusce antidoti compositiones quae Asari loco Ari legunt, sed mea- quidem sententia longe utilius Asarum, quam arum capit. Est enim Asarum odoratum medicamentum, Nardo fere pro- ximum, quin & Opobalsamo, & Carpesio facultatibus proximum. Quod facile comprobatur Galeni testimonio: Quippe qui libro secundo de comp. medica secundum locos, ubi hieram componit ad eos quibus ex ventriculo caput dolet, pro Asa- ro Carpesium supponit, quo pro Cinnamomo quidam Galeni auo in Theriaca utebantur. Et libro nono eiusdem voluminis capite 3. in quodam medicamento ad hydropem Opobalsamum Asari loco supponendum suadet. Quo fit vt Curdo tibi assi- pulandum non sit, qui arum Asari loco componit.

Asarum impos- nendum non Arum,

Cordi erratum

CYPHIS, de quo etiam meam exposcis sententiam, Aegyptiorum antiquorum thymiana diu tantum extitit, cuius suffitu Solem placare venerariq. solebant in sacris. Quod magno nobis est argumento, antiquissimum medicamen- tum esse Cyphum. Ceterum sequuta aetas non solum Cyphi vsa est pro suffitu ad acris infectiones arcendas, sed etiam ad an- tidota, quae sumuntur in corpus & per se quoq. ad nonnullos corporis affectus. Atque extant Cyphos varia, ac inter se pu- gnantes compositiones. quod haec plura, quam illa admittat medicamenta, altera vero ab altera ponderum numeris eua- riet: quemadmodum videre est apud Dioscoridem, Andromachum, Damocratem. Galenum, Alexandrum, Paulum, Aetium, Actuarium, Nicolaum Myrpsicum, & alios plerosq., quibus omnibus fere singularis habetur Cyphos composi- tio. Praclarissimum tamen aetatis nobis, a medici Damocrati Cyphum ceteris anteponunt. Quo um placitis eo utilius nobis ad stipulandum est, quo praestantius medicamentum eiusdem auctoris esse censemus, qui sua consuetudine antidoti, eius- dem Cyphos sibi propriam compositionem parauit. Quae sic habet.

Cyphos varia compositiones

- Vua passa pinguisima detractis cortice & vinaceis contusa & subacta.
- Terebinthina igne terrefacta singu. vnci. 3.
- Myrthe
- Floru Iunci odorati cuiusq. sesunciã.
- Cinnamomi drachmas 4.
- Vnguium Bdellij.
- Spi. e narai.
- Casia selectissima.
- Cyperis.
- Buccarum Iuniperi magnarum sin. drach. 3.
- Aspalathi drach. 2. S.
- Calami odorati drach. 9.
- Melles quantum sat est.
- Vini odorati paruum.

Samito.

Cyphos pa- randi ratio.

Myrtha, Bdellium, & Terebinthina vino subiguntur ad mellis consistentiam, deinde vna pass. per se subacta addi- tur, simulq. triu. mellis quod sat est infunditur, ceteraq. in puluerem trita insperguntur. Et inde demum formantur pastilli & in umbra siccantur. Porro ne in hu parandis vllus committatur error, sunt quaedam, quae te diligenter vspeco- re oportet. Quorum in primis occurrit Vua passa, quae (vt puto) ea minima esse non debet, quae passim vtinam omnes. Quippe praeter id, quod laboriosum esset, ab ea corticem & nucleos detrabere, nihil fere vbi hac fierent pulpa reliquum. Vua passa quae imponenda.

Vua passa quae imponenda.

Synocallita, vel de Sybelica hui simile, quam e Pamphylia aduehi solere scribit Galenus libro secundo de aliment fa- cultatib. In enim plurimum inest carnis, quae si forte esse non essent ad manum, praestabunt, quae ex Creta, Cypro, Corcyra, & alijs quibusdam Aegaei pelagi insulis ad nos importantur. Nam vna omnes, quae insolat a siccantur, passa in vniuersum Galeno appellentur, quae eo praestantiores habentur, quo generosiores sunt vitae a quibus decerpuntur. Atque cum hic pulpa plurima op. sit, maiores ac pinguires sunt celandi.

CVM flore odorati iunci omnino destituamur, quod etiam sua etate euenisse scribit Galenus, præstabit uti vici-
tioribus ipsius foliis, quippe hæc gustantibus, non obscuram reddunt acredinem, grato quodam odore accedente.

VNGVIVM Bdellij meminit Dioscorides libr. 1. Namq; vbi per notas probatissimum Bdellium expendit, illud
aliis prætulit, quod præter cetera vnguibus sit simile. Ideoq; recte hic Damocrates Bdellij vngues immiscet. Cornarius ta-
men vbi in Aetio hanc Cypheos compositionem interpretatur vnguivum Bdellij loco vngues odoratos addidit, eum locum
perperam vertens, quod Bdellium ignorauerit suos etiam habere vngues. Ceterum cum (vt putō) legitimo ac genuino
Bdellio destituamur, vt in commentariis nostris in Dioscoridem fusius d'fferuimus, quid pro eo supponi possit, erit nunc de-
cernendum. Codex Galeno ascriptus de supposititiis medicamentis in Bdellij penuria Sphagnū supponit, sed cum nulla se
Sphagni cum Bdellio communis facultas, id sane probare non ausim. Ego veropotius Belzoinum nobis vocatum suppo-
nerem. Est enim gummi perquam odoratum, quemadmodum & Bdellium faciunt, quod in Cyphi odoris gratia addidisse
antiquos haud vnquam dubitarem. Nec ab re factum mihi videretur, si & Bdellij loco selectissimus adderetur Styra. 10
Quippe hic maxime suis facultatibus cum Bdellio conuenit. Quo factum esse censeo, vt illico post Stryacis caput de eotra-
diderit Dioscorides. Excalfacit enim Styra, emollit, concoquit, tussientibus prodest, vulua spiracula laxat, menses ciet,
& discutientibus malagmatis vtiliter admiscetur. Quibus facultatibus præstare Bdellium maxime testatur Dioscorides.
Reliqua que supponi debent, si qua tamen supponenda erunt, ea in epistola inuenies, quam ad Populum scribimus. Nunc
alia aggrediar, de quibus præter prædicta meam etiam petis censuram.

AD ID in primis, quod queris an in Philonio Persico addi debeat album piper, an papauer album, quod non par-
ua sit de hoc inter Myropolas controuersia, id tibi respondebo, quod superioribus diebus responderam Balthasari Cleofelio
Serenissimi Principis mei Pharmacopæo, idem à me petenti, quod est, vt Mesuem consulas. Nam vbi de sanguinis reiecti
curatione agit, Philonij huiusce compositionem instituens, papauer album, non piper album imponit. Ita enim habet
Mesuis codex, qui ad manus est. Id quod non sine ratione factum videtur, quod vbi sanguis abrupto vase fluat, nullo pipere
opus sit: sed qua sua frigida vi, sanguinem crassorem reddant, & fluxiones sistant. Recte itaq; faciunt (vt mea fert opi-
nio) qui piper negligentes, papaueris semen addunt. Nam cum ad coercendam opij malitiam & croci, & castorei satis
excipiat antidotum, non video cur opus sit addere piper vt magis incalescat, vbi potius refrigeratione sit opus. Quo fit vt
Fuchsius alioqui doctissimus haud recte Cordum reprehenderit, quod papauer non piper admiscuerit. Pono itaq; tu au-
dacter albi papaueris semen, & ne cures aliorum errata imitari.

QV AERIS item an in compositione Electuarij de Sebestenis Montagnana aberrauerint Luminaria Manlij & a-
liorum in aqua ponderibus, quod fere impossibile tibi videatur, vt tam parua aqua quantitate, qua vix sufficit ad mace-
randa ea omnia medicamenta, posse quempiam illa omnia macerare, coquere, ac dissoluere. Quam re vellem sane tibi sa-
tisfacere, si id Medici munus esset non Myropola. Sed cum ego censendis medicamentis, non decoquendis me totum dede-
rim, consultius tibi fore sperarem, si de re hac te ipsum consuleres. Quod si feceris, cum sciam te seplasiarium esse exercita-
tissimum, nihil sane vereor, quin tuus statim tibi suus sit genius, vt aqua pondus angeas, vbi ad illa omnia paranda
aqua illius quantitas non sufficiat. Ceterum vbi medicamentum parare decreueris suadeo, vt genuinum autorem sequa-
ris non Cordum. Nam etsi electuarium hoc Montagnana is referat acceptum, longe tamen id ab eius compositione eua-
riat, quod genuinum Sebestenorum, Prunorum, Tamarindorumq;, quin etiam seminum frigidorum decoctum tantum
excipiat, Cordinum vero (vt ita dicam) horum omnium pulpam, præter authoris sententiam, & seminum frigidorum
duplum habeat.

QV AERIS præterea an serum, quo vti debent Myropola ad maceranda medicamenta, & ea præsertim quibus
paratur confectio Amech passim vocata, sumi debeat, quod à caseo separatur, dum premitur, an illud, quod expresso caseo
coquitur, & à casei reliquiis, e quibus recocta paratur, secernitur altero longe clarius. Hæc tua quaestio est. Verum si recte
considerabis, nil aliud esse serum, quam partem lactis aquosam à butyro, & caseo omni separatam, illud proculdubio legi-
timum, ac purum erit, quod à casei & butyri reliquiis prorsus fuerit expurgatum. Tale enim est, quod expresso caseo co-
quitur, & à recocta secernitur. Sed nec id quidem præstabit pro iu macerandis medicamentis quinq; absiduis diebus, qua
in illam veniunt antidotum, quam Amech Arabs conscripsit. Acescet enim serum hoc, quod tandiu manserit anteaquam
coquatur, & antidotum acidam reddet, nisi ab initio tantum sacchari, vel mellis addatur, quod id ab acore & putredine
seruare possit. Quamobrem recte serum à caseo separabant antiqui, additis seruenti in fictili nouo lacti, tot oxymelitis cya-
thi, quot erant lactis hemina continue ficulneo ramo versantes, vt secundo libro docet Dioscorides. Verum vt diffusius,
ac clarius parandi, seruandiq; seri rationem intelligas, mitto tibi aliam etiam epistolam, quam superioribus mensibus Bo-
no Baldino Pharmacopæo exercitatissimo Viennæ commoranti miseram, quod & etiam de parando sero plura à me esset
percontatus. Ex ea enim facile intelliges seri cuiusq; explicationem.

PRAETER id à me etiam scire desideras, an vnguentum Alabastri, quod describitur à Iacobo Manlio in suo Lu-
tinari, illud sit vnguentum Nardi spicati vt ipse nulla dubitatione affirmare videtur, quo à Maria Magdalena inunctus
est SALVATOR NOSTER CHRISTVS. Nam cum vnguentum hoc, quod Galbanum, resinam Terebinthi-
nam, Colophoniam, Sabinam & Hedera gummi excipit grauisime, non suauissime oleat, non parum dubitandum mihi so-
re inquis, an Manlius vera referat, vel fabulas narret. Sed non ab re quidem dubitas. Ego enim longe antea animadu-
teram id esse falsum, quod in sacris literis habeamus, tantam fuisse vnguenti fragrantiam, vt vniuersa domus repleta sit
suauissimo illius odore, quineriam tam magno pretio fuisse emptum, vt proditor dixerit Iudas posse illud venundari mul-
to, & dari pauperibus. Atqui si meam tibi debeam aperte sententiam, crediderim ego, Nardum illud fuisse pretiosis-
simum, quod antiqui parabant (vt habet Dioscorides) ex Malabathro, Nardo, Iunco odorato, Costo, Amomo & Opobal-
samo. Hoc enim Romanorum luxu parari solitum, ad gratiam delicatarum mulierum, inquit Galenus, tum lib. 6. de se-
uitate tuenda, tum etiam 8. de Methodo medendi vbi de diariis febribus egit, qua à ventriculi cruditate proueniunt. Quo
fit, vt putem Mariam Magdalenam hoc vnguento haudquaquam fuisse destitutam, vt pote qua mundanis delitiis ac vo-
luptatibus se totam prius dedisset. Fiebat olim hoc vnguentum pretiosissimum, omnium præstantissimum (vt Galenus est
antor locis superioris citatis) Laodiceæ Asia vrbe, vnde postea deferbatur à negotiatoribus ad alias nationes quemadmo-
dum nunc fieri videmus, cum Moscho, Ambaro, & Zibeto, qua partim ex India partim ex Aethiopia, partim ex aliis lon-
ginquis regionibus voluptatis & lasciuie gratia ad nos afferuntur ad suauissima vnguenta, quibus non solum mulieres
vtuntur, sed etiam viri. Tantus inualuit hæc tempore deliciarum luxus apud omnes. Huius autem cum antiqui destitueren-
tur, excogitarunt etiam ipsi aromatu omnium suauissimis parare odoramenta, quibus postea delicata vt erentur mulieres
quorum posthac exoleuisse usum facile crediderim, simulac Moschum, Ambarum, & Zibetum afferri ceperunt, cum illis
suauo-

Cornarii erra-
tum.

Quid pro Bdel-
lio substituend-
um.
Belzoinum.

Styrax.

Philonio Persi-
co an piper al-
bum, an papauer
album adden-
dum.

Cordus defen-
ditur.

Electuarij è Se-
bestenis paran-
di ratio contra
Cordum.

Serum quod
præstantius.

Seri ab acore
conseruandi
ratio.

Vnguentum
Alabastri.

Vnguentum
quo inunctus
est IESVS
à Maria Magda-
lena.

suaviora, odoratiora, pretiosioraq; haberentur, nil mirum, si neglectis illis, sequuta posteritas priorum loco hac in usum vocauerit.

CAETERVM ad ea quae quaeris, an in Syrupo de Eupatorio Spina alba, & Arabica loco, quibus nos desitui putas, addi possint Caryophyllata radices, aliud quidem respondere non possum, quam quod hoc optime factum crediderim. Siquidem non solum haec Caryophyllorum odore, quo praedita sunt, vitales spiritus non parum recreant, sed aliis non vulgaribus facultatibus huic Syrupo quam maxime conueniunt. Prosumt enim epota Coeliacis, Stomachicis, Dysentericis, & cruenta exuentibus, mensas cohibent ac ceteras quascunque fluxiones, adeo vt Spina alba & Arabica facultates omnes habeant, sintq; praeter id suauiter odorata.

Spinæ albæ & Arabica loco quid supponendum.

10 QV AERIS vltimo loco, an Mumia, quae ex Alexandria Aegypti ad nos affertur in usum medicum conueniat, vbi in Arabico compositis medicamentis Mumia fuerit imponenda. Huic quaestioni, & si satis superq; responderimus in nostris in Dioscoridem commentariis, vbi errare eos diximus, qui siccas humanorum corporum carnes, vel ossa pro Mumia sui interponunt medicamentis, non tamen ob id praeteribo, quin noui aliquid de Mumia ad te scribam, vt scias praeter Pissphaltum aliam Mauritanis esse Mumiam, quae olim vt ebantur. Sed audias quae de Mumia Arabum mihi sese offerunt scribenda, contra Bellonij sententiam. Scribit itaq; is, & longius contendit ambagibus, maxime hallucinari eos, qui putant Mumiam Mauritanis illud designare condimentum, ex Aloe, Myrrha, Croco, Balsamo, & aliis fortasse aromatibus paratum, quo apud Syros, Aegyptios & alias is conterminas nationes hominum cadauera infarciri solebant, cum sibi perperam persuadeat, nullam vquam extare Mumiam praeter Pissphaltum. Praeterea spiculis quibusdam occultis me pungit, quod scripserim posse & apud nos parari Mumiam, si defunctorum corpora huiuscemodi odoratis medicamentis condirentur, & deinde Aegyptiorum more linteis, fasciisq; colligarentur, & idoneis collocarentur in sepulchris. Sed quam magno ducatur errore, dum nos perperam hallucinari contendit, pluribus sane Arabum testimoniis facile comprobari potest. Etenim Rhafis libro de Arabicis nominibus, autoritate Isach, Mumia, inquit, est nomen Persicum, & est res nigra confecta, & est etiam alia res reperta in sepulchris, quando fodiuntur, quae ponitur cum mortuorum cadaueribus, vt vermes non approximentur eis. Rhafis subscribit Serapio cap. 293 primo statim initio vbi sic habet. Mumia sepulchrorum fit, cum Aloe, Myrrha, & quod admiscetur eis ex humiditate corporis humani simul coerint. Hac ille. Quibus nunc facile cognosceret ille, si haec quandoq; perlegeret, suam in Mumia ignorantiam, nec longas posse peregrinationes uocere quenquam, vbi bonorum authorum lectio, experientia & iudicium absint. Vale.

Mumia an in usum medicum conueniat.

Mumiam duplicem esse contra Bellonij sententiam.

PETRVS ANDREAS MATTHIOLVS MEDICVS,
Ioanni Viscero Dembdingensi
S. P. D.

Tractatur de vertigine, Occipitij dolore, stupore, pilorum defluuio, & glandibus in inguinibus exortis.

46 **V** Nam potissimum habeo causam, vir doctissime, a qua orti sint affectus ij quibus vexaris, nempe vertigo, Occipitij dolor, stupor in dextro brachio & glandes in eodem brachio, atq; in inguinibus abortae, eamq; externam, & a frigore tantum genitam. Aisenim praeterita hyeme, dum e Germania Patauium venisses, frigora ibi te adeo magna perpressum fuisse in pedibus praesertim, & cruribus, vt partes ea sere stupida redderentur, & quamuis frigora longe maiora, diuturnioraq; sint in Germania, quam Patauij, & in vniuersa fere Italia: in Germania tamen suis hypocautis inclusi ab ingentissimis frigoribus diu se tuebantur homines, in quibus sua tractantes negotia, hyeme perpetuo serme morantur. Ea propter factum existimo, vt quum praeterita hyeme studiis assiduam operam impenderes, in loco fortasse nunquam vel raro calefacto, nerui in crura & pedes excurrentes tanta frigiditate fuerint affecti, vt plurimum inde noxa contraxerint, quae postea cerebro per os communicata, vertiginem effecit, stuporem, & Occipitij dolorem. Nec sane mirum, cum dicat Hippocrates. Frigidum inimicum est ossibus, dentibus, neruis, cerebro & spinali medulla. Frigus enim exterius adueniens non modo vertiginem, sed quandoq; apoplexiam, Epilepsiamq; procreat, vt Galenus est auctor, libro de morborum causis. Quod autem vertiginis & horum morborum causa eadem esse possent, comprobatur eiusdem Galeni testimonio, libro qui dicitur Medicus, vbi sic habet. Caligines oculis infuse & vertigines, cognata sunt vitia morbo comitiali, ab eisdemq; causis prodeunt, atq; easdem sedes occupant. Idem III. Aphorismorum inquit. Vertigines quoq; cerebri lesiones consequuntur, sicuti & apoplexia. nam & haec passio fit, cum caput repletur pituita: Quod facile euenit cerebro plusquam par sit refrigerato. Quandoquidem oppresso diminutoq; eius calore, quae eo deferuntur, tum alimenta, tum excrementa concoquere recte nequeunt, quo fit, vt inde excrementitia pituita plurimum oriatur, a qua praedicti morbi oriuntur. Ob id itaq; dicebat Paulus vertiginem affectum nasci, cum frigidus glutinosusq; humor cerebrum occupat. Hinc quoq; & occipitij dolor fit & in brachio quandoq; leuis ille stupor, hincque glandula illa duxerunt originem. Siquidem pituita in occipitio decumbens, immutata a partis ipsius tempeie dolorem excitat. Nam, vt Galenus inquit lib. 2. de Symptomatum causis, Nullum corpus offenditur a propria natura. Adde quod etiam ex flatu in capite genito, ob partis refrigerationem possit vtique fieri dolor hic ex Galeni sententia, II. de compositione medicamentorum secundum locos, cum inquit. Et adhuc alia est capitis doloris causa, cum scilicet in quibusdam capitibus partibus propter imbecillitatem flatuosus spiritus innascitur. Et quarto Aphorismorum Aphorismo LXX. Fiunt, inquit, capitis dolores & ex humorum abundantia caput opprimente, & propter aliquam loci obstructionem, vel spiritu flatuoso habente in parte ipsa generationem, qui quidem flatuosus spiritus non modo doloris causa esse potest, sed etiam ipsius vertiginis, cum dicat Galenus 3. de locis affectis: quod vbi quis cerebro vertitur, inaequalem & turbulentum & inordinatum motum, tum humorum, tum spiritus in eo fieri omnibus in confesso fit. Porro ex eadem etiam pituita neruorum in brachium excurrentium originem quadam tenui obstruente oritur leuis ille stupor: quemadmodum in & glandula ab ea, quae ad inguina decurrit & in affectum brachium: namq; haec semper a crasis proueniunt humoribus. Nec profecto mihi vnquam persuaserim, quod haec a Gallica lue originem duxerint, cum mihi saepius affirmaueris, te nunquam scortis vacasse, nunquam cum hoc morbo affectis in eodem lecto cubasse, nunquam penis vlcibus, nec pustularum eruptionibus, nec compagum doloribus laborasse. Neq; illud meae opinioni repugnare videretur, quod tibi quandoq; & capilli, & barba

Non omnes
quibus pili de-
fluunt Galli-
calue laborare.

Continentiam
à venereis, ius
uicibus pluri-
mum nocere.

pili decidere conspiciantur. Non enim solo pilorum defluuio Gallica lues deprehenditur, cum (vt Galenus est autor primo de compositione medicamentorum secundum locos) ab aliis etiam causis affectus hic oriatur. Qui enim ex Gallica lue pilorum defluuio afficiuntur, iis in vniuersum decidunt, & cutis vbiq; glabrescit, quod vitiosus humor in iecinore sedem habens, non in caput tantum, sed in vniuersum feratur corpus. Verum tibi id nunquam accidit: cum per temporis interualla non ex vniuerso corpore, sed tantum è barba & capite aliqui modo decidant pili, modo renascantur. Quin potius ideo illud factum esse crediderim, quod cutetenus in facie & capite facta sit aliqua pituita exustio, id quod indicant tenues squamulae sursum similes inde manantes, quae vbi pilorum radices arefecerit, est causa, vt ij postmodum decidant. Namq; id mali, aut humidi defectu, aut succi prauitate contingit. His igitur rationibus compulsus, aduersam tuam hanc valetudinem à contracto frigore primum, deinde ab humore frigido, non autem à Gallica peste emeruisse putauerim. Sed auxit fortasse morbum secunda etiam causa: nempe longa coitus abstinentia, quae iuuenes multoties in magnum ducit discrimen. Ait enim Haliabba si spermatica superfluitas suis aucta in vasis coitu non purgetur, nec poterit eam expellere natura, in inguinibus extensio fit, & alii corporis partibus omniq; in corpore grauitas. Id quod etiam ante dixerat Galenus 6. de locis affectis, cap. 5. his verbis. Equidem noui quosdam quibus huiusmodi erat natura, qui praepudore à libidine vsu abstinentes torpidi pigriq; facti sunt, nonnulli etiam Melancholicorum exemplo praeter modum maesti, ac timidi, cibi etiam tum cupiditate, tum concocione vitiosa. Quamobrem cum fatearis longo iam tempore à Venereorum vsu te abstinuisse, certissimum hinc sumi potest argumentum, quod etiam à retento semine aucta fuerit noxa & glandularum in inguinibus extensio, & nunc primum emerferit Gonorrhœa. Caterum quibus medicamentis quoue regimine victus reliquum noxa curari tolliq; possit, cum eius non parum sustulerint, & Guaiaci decoctum & alia plura quibus mea opera hac astate vsus es, certoq; sciam te ex iis maius longe commodum reportasse: ni aëstus & Sirius iam praesens, quae mente conceperamus ad finem vsq; prosequi interdixissent, nostrum illud consilium esset, vt proximo autumno, Septembri praesertim, illa omnia quae fecimus, audacter repeterentur. At si fortassis id negotij inuitus susceperis, non nisi multum tibi profutura putauerim Patuina balnea. Sed cum eo breui te conferre decreueris, sintq; ibi Medici omnium praeclarissimi, & qui suorum balneorum vires praeceteris norunt, non est cur hac in re plus consilij à me expectes, nec praeterea altam, vel alimenterum, vel medicamentorum seriem, ne videar (vt in communi prouerbio est) noctuas Athenas mittere. Nec putes velim quod hoc facere recusauerim subterfugendi laboris causa, cum non te latere existimem, me ea qua potui maiori humanitate te primum suscepisse (ita enim virtus, ac mores ingenij expetebant tui, & meus in omnes probos amor) postea omnino studio, ac diligentia te semper adiuisse, atq; omnem meam curam, & operam in egritudine tua adhibuisse. Quod si vltra nobiscum manendi tibi daretur facultas, pro viribus adniterer, vt omne meum officium apud te testatum relinquerem. Sed illud te admonere non praetermitam, quod si Patuij futura hyeme (vt putas) moram traxeris, omnino hypocausium tibi parari cures, ne denuo frigoris & algoris noxam expertus in eosdem affectus recidas, vel conceptos adaugeas, è quibus ante hyemis aduentum te prorsus euasurum spero Dei Optimi Maximi munere, si modo Medicorum consilijs obsequi staueris. Vale.

IOANNES VISCERVS VEMDINGENSIS, Petro Andreae Matthiolo Medico S. D.


Respondetur praecedenti epistola.



Vni in animum reuoco mihi, vir clarissime, dulcissimum ac suauissimum conuictum, quo per menses aliquot, quibus tecum fui, non sine maximo sanitaris & studiorum fructu & commodo, frui licuit, recoloq; eruditissimos sermones ac doctissima colloquia, quibus me de rebus Medicis quarentem erudiebas, vehementi, mehercule, tui desiderio animum meum percelli sentio, & ad vestras amoenissimas vales hinc, si possem mox auolare cupio. Multa enim sunt, quae me alliciunt, caelis salubritas, loci pulcherrimus situs, vina suauia: in primis vero praeclarae tuae virtutes atq; eruditio praestans. Turpe tamen aestimo, vitamq; ob hoc acerbiorum duco, quod tot tantisq; beneficiis, quibus me ignotum & immeritum cumulatim affecisti, nulla ratione respondere potuerim, nec adhuc vlla gratitudinis meae signa edere possim. Agnosco enim ita officium tuum me tibi deuinctum, vt & vsu & proprietate, vt Iurisconsultorum verbis utar, me totum tuum esse profitear. Animi certe gratitudinem perpetuam tibi polliceor, meaq; studia & officia seruiliter offero, & quod solum possum nunc praesto. Omnibus cum quibus sum animi tui dotes narro, praeclaram tuam eruditionem, solertiam in medicando insignem, diligentiam in excolenda re herbaria, eximiam, miram ingenij suauitatem & animi candorem, in conuictu familiaris comitatem humanissimam, in sermone leporem dulcissimum, meis conuictoribus quotidie praedico: idq; faciam semper dum spiritus hos reget artus. Et si Deus me patria incolumem reddiderit, nomini tuo ita patrocinabor, vt omnes animi mei gratitudinem cernant. Victori Triacuello & Bellacato scriptum tuum de causis symptomatum quibus adhuc premor, cum honorifica tui commendatione exhibui: vterq; consilium tuum & approbavit & laudauit. Hisq; auctoribus ante quinq; dies aquam Patuinam bibere cepi, et si fere desistere à proposito coactus fuisset: nam primo triduo vix dimidium aquae adhibita omni industria, externebatur: verebar igitur ne obstructions aliquas in venis, aut hepata gigneret, quod repositione huius aquae in corpore fieri solere audio. Quarto tamen die aqua sibi viam inuenit adeo vt nunc satiu felicitate tota reddatur. Quando completa fuerit ista medicina, scribam quid ex ipsius vsu commodi acceperim. Semen Senae & si qua alia semina habeas rariora summo opere oro, vs mibi mittere digneris, quae donem cognato meo Docteri Fuchsae.

V A L E.

PETRVS



PETRI ANDREÆ MAT-
THIOLI SENENSIS MEDICI

IN LIBRVM SVVM, DE MORBI GALLICI
CVRANDI RATIONE, PRÆFATIO,



Vm valle quadam secreta, locisque desertis ab omni sequestratum penitus medicorum conuictu fato me continerem, censuissemq; sicut olim Philoctetes, diutius in solitudine mihi permanendum, per hyemem nostræ disciplinæ memoriam literis propagare non alienum putavi, vt & nobis solatium, & lecturis pro virili vtilitatem pararem, ne quando non solum vitæ in obscuro transactæ, sed etiam temporis amissi reddenda ratio foret. Nam dum tempus ferebat, & herbæ, arbores, virgulta, cæteraque id genus in collibus, prætis, & conuallibus germinabant, quæ aliquid medicinæ conferre videbantur, ea consecrabar, solatiique loco mihi tunc erat, hæc vacuum partim sub vmbra, vt flaccescerent, collocare, partim æneis & vitreis organis igne subdito in purissimas aquas redigere: sicut ardente iam Syrio domi subtilissimæ naturæ liquorem, summoque pretio comparatos medicamentorum potus conficiebam. Longum esset antidota, collyria, cataplasmata, quibus tunc insudabam, sigillatim connumerare. Nec ab industria vacuus autumnus erat: per altissimos namque montes sedulo gradu radices vtriusque Veratri, quod Helleborum Græci dicunt, Dictamnique Bezoardici perscrutabar, herbarumque ferme omnium, quarum apud Medicos nomen est celebre passim, gramina radicitus extirpabam. Nec minus, prout occasio sese ingerebat, & abietis oleum summo odore præditum, vulneribusque conglutinandis aptissimum, & ex larice cum Agaricum, tum gummi liquidum, ex quibus summa male habentibus medicina salutem promittit, colligebam. Nunc vero cum hyems in autumnum locum successerit per Brumam quid aliud agendum superest, quam quæ à diuersis authoribus de medicina tradita fuerint, memoriæ commendare, siue aliquid scribere? Sed cogitanti mihi aliunde mortuorum memoriam minime pendere, nisi ex monumentis literarum, dubius distrahebatur animus, Commentariæ conscribere in eminentissimos medicinæ Professores, an aliquid meo Marte cadere deberem: nec sane quid potius esset præstandum suppetebat: nam primum satis vulgare videbatur, ab altero detinebat negotij magnitudo. Quæ dum egomet mecum disquiro, forte fortuna in manus inciderunt, quædam de morbo, quem Gallicum dicunt, à neotericis conscripta, quibus cum multa mihi comperta adiaci, & pleraque meliora fieri posse viderentur, accepissemque iam calamum exaraturus opusculum, quod meo iudicio posset non nihil laborantibus opis afferre, Franciscus Aliger præsto fuit, in quo præter fidem, mirificamque in me animi inductionem, summa inerat comitas. Mutua igitur data acceptaque salute, confectisque tribus aut quatuor spatiis in tepidario sedimus, vbi post familiarem sermonem friget, Franciscus huc euasit. FRANCISCVS. Et otium tuum. & hyemis solitudo hortantur, vt te pro summa inter nos beneuolentia, quod iam dudum concupieram, sed pudore pene subrustico deterritus non audebam, tot alioqui negotiis districtum diutius interpellare, nunc obtester, de morbo gallico diligenter vt differas. Nam hæc opuscula, quæ circumferuntur potius aliquando infirmitatem, quam sanitatem patientibus exhibent, quæ quidem tanquam deterrima detestor: nec me hercule iniuria. Quid etenim præter suffitus illinitionesque viui argenti (extinctum, quod viuum est, dicunt) quibus mea sententia nihil est deterius in se habent? A te vero cum primis originem, causam, cognitionem, principium, qualitatem prædicti mali, deinde victum, abstinentiam, quam sustinere debeat affectus, tum potiones, medicamenta, Pharmaca, fomenta, quibus

huiusmodi noxa fere plerumque solet expugnari, desidero, nulla alia de causa, nisi, ut vbi primum talia fuero diligenter expiscatus, tanquam planus improbissimus secundarum partium, statim primarum fiam. Proinde vide quid agas. Hæc te prius scire volui, ne postea dicas non prædictum. **ANDREAS.** Bene profecto & ex usu nostro id sermonis nunc incidit, quippe de his me percunctaris, quæ iam dudum scribere conceperam animo: calcaria igitur equo sponte currenti (ut aiunt) addidisti. nam quod tu perplexe minitaris postea videro: quamuis (vere dicam) nimium oneris, nobis imponis, quasi vero cæteros in hac cura medicos excellamus. Tu quidem mihi Franciscæ, qui tantum mihi tribuis, quantum ego nec agnosco, nec postulo, facis amice: tamen vellem aliquando confore, quod credis esse, aut futurum breui speras: sed certe (ingenue dicam quod sentio) nihil in me ideo signi, quo possim quandoque id futurum mihi promittere. Sed de his hætenus. Verum antea quam hi sermones se altius efferant, ut viva tantum Veritas cœlestis spiritus gratia ore nostro proferatur in lucem, in primis Deo Optimo maximo inuocato colloqui incipiamus.

DE MORBI GALLICI CVRANDI RATIONE DIALOGVS.

ENARRATIO.



Mnipotens pater (ut Hesiodus) antiquorum peruicaciam perspiciens, Pandoram cum dolio malis referto terris immisit. Denuo memoria patrum, ut in effrenatam mortalium luxuriam debitis afficeret pœnis, aut propositis contineret supplicis, morbo quem Gallicum vocamus, Italiam bellorum procellis concussam consecit, qui postea contagione vulgatus est. Quidam Deo, cum sit summa bonitas, mala tribui non debere contendunt, proinde gentium collusionione aerem infectum producunt. Habes originem nunc causam cognosce, de qua medicorum præstantissimo cutq; diuersa sententia est, ut non possis quis vero propius accesserit, facile conicere: quippe quoniam philosophantes plerique, in Saturni Martiq; aspectu cum retrograda Venere causam coniciunt, cuius conjunctionis tanta fuerit malitia, ut non immerito morbus inde processisse sit visus. Fuere qui corruptum calidum tractum sanguinem in atram bilem, conuertentem causati fuerint. Nonnulli morbum Gallos, cum per montem Saluum iter facerent, à fœminis leprosis per coitum primitus contraxisse, eorum postea intemperantia atram bilem pituitamque procurante, memorie prodiderunt. Inde putarunt medicinam plerique profitentes malum Elephantia non ab simile, qui Cornelij Celsi, Galeni, Paulique Aeginetæ sententiis videbantur inniti. Nonnulli melancholicos varos, quos etiam morbillos dicunt, aut malum mortuum dixerunt. Nos vero multis, eisdemque potentioribus argumentis conuincemus, hunc morbum ab Elephantia plurimum distare. Ceterum morbillos melancholicos, siue malum mortuum, quis sana mentis dixerit, qui nouerit morbum Gallicum sauas neruorum distentiones, iuncturarum dolores, osium putrescentium corruptiones, & vlcera sequi malignitatis suprema? Quibus omnibus sane conuincitur, nobis accessisse egritudinem nouam.

FRANCISCVS. Agis perplexe mecum, tardiusculus sum, quamobrem cum hæc abs te differi verbosius velim, tum illud imprimis, quod minus est triuiale, quibus scilicet signis Medicus ille, qui laborantem sit suscepturus, hunc morbum à sanguine, aut à bile, aut à pituita, aut ab atra bile cognosceret procedere, quoniam mihi satis compertum est à quatuor humoribus hunc foueri posse.

ANDREAS. Recte tu quidem Franciscæ, & vere: neque enim ab isto morbo, ni ita esset, ut dixi, tanta contagio, tanta nobis impenderent mala: quoquo te verteris, hæc noxa præsto est, nullo pacto excluditur, semper intempestiua, semper molesta est. Verum tibi mos geratur. Nonnullos plerumque videmus pustulis, & tuberculis exitibus subrubris totum corpus aspersum gerentes, quibus sub alis, & in inguinibus, abscessus corporis turbinati, quadam malignitate subito emerferant. Quod Galenus cum à sanguine, tum à bile fieri credidit his verbis, sexto Aphor. libr. Sublimiores pustula, atq; tubercula, ab humore calidiore generantur. Hæc ille. Sed is morbus, cum à sanguine fouetur, humoris benignitate leuioribus curatur remediis. Sunt qui maculas tantum rubreas, in latetem tendentes colorem monstrauerint, quibus & in faucibus, & circa pubem, nunc erisypelas, nunc Persicus ignis, & Phthiriasis noua quadam specie se efferant: hi fere biliosi circa frontem dolore confluctantur. Pituita vero, & atra bilis signa sunt, dolor in occipite, distentio neruorum, crurum vexatio, luentes & verrucosæ suppurationes, è gypso præterea concretis nodis affecti, nocte magis quam die torquentur. Vnde non abnuerim, morbum Gallicum à quocunque foueri humore, præsertim cum viderimus omnes species apostematum, cutisque exulcerationis, & malorum vlcerum, ab expertis chirurgis, eisdemque doctis, si vis, eorundem monumentis annotata, huic complicari, quibus rarius, aut nunquam fortasse remedia monumentis literarum prodita Gallica malignitate contulerunt. Omnia itaque (ut vno verbo dicam) morborum genera, qua à medicis describuntur, possunt cum Gallico concurrere: tantum etenim inest virus, ut vbi primum tecum occupauerit, mortales illico in morbos præatos fieri detrudat. Si quod etiam corpus occupauerit, infeceritue, aliqua egritudine prius imbutum, in suam malitiam breuis conuertit eam, ut scelerum multitudine nobis tam virulentam pestem à diis immissam non immerito videar dixisse. Sed nunc quod pollicitus sum. Nonnulli medicinae interpretes non contemnendi tempestate nostra, pluribus præscorum monumentis innixi, morbum Gallicum esse Elephantiam omnino voluerunt. Quorum sententia non accedentes, dicimus testimonio eorum, qui de Elephantia conscripserint, semper ex ea pedes agrorantium intumescere. Celsus etenim his verbis utitur: Summa eius cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, & pedes intumescunt. Galenus etiam de medicis diffinitionibus sic ait: Elephas est affectus, qui cutem crassam, & inæqualem reddit, tum colorem liuidam in albo oculorum facie, exeduntur pedum, manuumque summa partes, sanies defluit liuida, & male olens. Plinius etiam libro 26. capit. primo naturalis historia sic: Diximus Elephantiam ante Pompeij Magni ætatem non accidisse in Italia, & ipsam à facie sæpe incipientem, in nare primo veluti lenticula, mox inualescente per totum corpus, maculosa, variis coloribus, &

Omnia morborum genera cum Gallico concurrunt.

Morbum Gallicum non esse Elephantiam.

ribus, & inaequali cute, alibi crassa, alibi tenui, dura acuscabie aspera, ad postremum vero nigrescente, & ad ossa carnem apprimente, intumescens digitis in pedibus manibusque. Hac equidem dicta si recte perpendimus, maximum discrimen inter hos innuunt, cum dicant, quod summa cutis est inaequaliter crassa tenuisq;. Quod morbo Gallico laborantibus fere non evenit. nam quamvis sint tubercula, pustulae in corpore fere toto, summa tamen cutis aequalis apparet. Addunt Elephantiam prope nares semper oriri: at Gallicus colera testiculosque quam primum infestat. Postremo Elephantiaci maximos in pedibus patiuntur tumores, sicut etiam pedum, manuumq; summa partes exaduntur: at in Gallico secus est.

FRANCISCVS. Quid tu haec mihi? quasi vero cum imperitissimis rerum omnium sermonem habeas: nam quocumq; est, qui tibi talia differenti tacitus assentiatur? Verum ut ad meredeam, quod ex autoritatibus veterum persuadere conaris, aliter esse experientia comperit habeo. Roma dum essem, nonnullos vidi turba praetereuntem expositos in Aurelio ponte, iuxta molem Hadriani, morbo Gallico male affectos, manibus exesis, naribusq;, tum detritis omnibus articulis, inaequali summa cute: quo fit, ut aut hunc morbum Gallicum non fuisse dicas, aut Elephantiam Gallicum morbum fatearis praeter sententiam.

ANDREAS. Noli tam superbe: ne dicam subabsurde, dicentem compellere, cum tu, si recte memoria teneo, superius cum omnibus humoribus conglutinari, ego cum omnibus agritudinibus habere cognationem dixerimus. Quod cum ita sit, qui fieri potest, ut annuat, Elephantiam pedum potius, quam aliarum corporis partium malum? Quod si superioribus verbis parum credideris, adducam Galenum ad Glauconem libro secundo, cap. de Cancro, talia dicentem: Sapius cancer ad varices decurrit, & quandoq; ad cutim vniuersam expellitur, fitque is morbus, quem Elephantem nominant. Quid igitur obstat, cur non in Gallicis, quos adduxisti, tum humoris admistione melancholici, tum medicorum praetera negligentia, Elephantia accesserit? Quin etiam Auicenna III. sui Canonis, Elephantia, ait, est additio in pedibus secundum modum, qui accidit in venis varicibus. Item Rasis in libro diuisionum sic: Elephantia accidit in pede, & crure, ita quod quando confirmatur, non habet curationem. Subsequitur ius Auenzoar: Dicitur Elephantia, quia taliter disponuntur pedes, ut assimilentur pedibus vel tibis Elephantis. Causas autem eiusmodi agritudinis pauca VI. Aphor. libr. Comment. 21. aperuit Galenus, cum dicit: Varix autem est, cum vena latiores sunt in coxis, & cruribus, quod ex crasso, & melancholico humore contingit.

FRANCISCVS. Hoc me iudice nihil ad rem: nam Galenus de varicibus tantum, non de Elephantia loquitur.

ANDREAS. Sat tibi erit audire Auicennam, Galeni interpretem, asserentem III. Can. Elephantiam esse in pedibus augmentum, secundum modum, qui accidit in venis varicibus: quod non aliter à Galeno superius percipi videtur, cum dicit: Fitq; is morbus, quem Elephantem nominant. Eiusdem sunt sententia neotericorum pleriq;, quorum rationes pluribus explicare longum foret. Elephantia igitur cum in cruribus, & pedibus plerumq; versetur, & morbus Gallicus cum in pudibundis articulis, tum deinde per totum corpus emergat idem esse non possunt. Non tamen insicias eò, Gallicum morbum Elephantia accedere posse, sicut etiam contra. Nam secundum Galenum Elephantia duae sunt species: cum enim asserit cancerum ad varices decurrere, pedum Elephantiam excitare comprehendit: cum vero ad cutim vniuersam, Elephantiam in toto corpore, quam ab Arabia autores Lepra appellat. Verum cum ab eisdem causis atq; humoribus non minus vna, quam alia eueniat, de his tecum indifferenter sum locutus: nam de agritudinibus nominibus parum curandum censemus (ut Galenus) cum aderit morborum bona curandi ratio. Isach enim in suo Viatico: Constantinus ac pleriq; alij excellentiores vnam tantum Lepra speciem Elephantiam dixerunt, cum quatuor lepra à quatuor humoribus ingruant. Prima causatur ex sanguine combusto, qua alopecia dicitur. Secunda à pituita corrupta, non absimilis Tiritem tanquam faciem leonis efficiens. Quarta & vltima ab atra bile, qua cum agrotantium crura ad Elephantum speciem tumeant, Elephantia dicitur. Quibus liquido patet, Elephantia duas esse species, agritudinem scilicet pedum peculiarem, tum etiam Lepra, de qua Plinius & Celsus dixerunt: quia cum ista complicantur, macula per totum corpus, ossa corumpuntur, & articuli decidunt. Ideoq; bene Galenus: Exeduntur ex ea manuum, pedumq; summa partes. Quamobrem liquido patet, cum vnaquaque Elephantia, manuum, pedumque tumorem, articulorumque casum complicari, ac alteram in cruribus & pedibus, alteram prope nares oriri. Non igitur recte morbum Gallicum Elephantiam dixerimus.

FRANCISCVS. Cogor autoritatibus, rationibusq;, quas attulisti mihi, omnino assentiri: Quo fit ut te facile patiar isto modo differentem.

ANDREAS. At quires maxima agitur, quae pluribus indigeat autoritatibus: neq; mihi tantum tecum esse seruum iudico: volo igitur ut sese efferant ij sermones nostri: quamobrem me pluribus ratiocinantem feras. Nunc ut ad rem redeam, Rasis libro diuisionum: Quando ait, cum Elephantia magnificantur eminentia, non recipit curationem. Item Abmansori nono: Hac passio postquam inueterata fuerit, ad sanitatem omnino redigi non potest. Cui assipulatur Auic. inueniens Elephantiam malignam esse, quae parum sanescit, & oportet, ut dimittatur cum dispositione sua. Quibus omnibus cum sit comprobatum, inueteratum Elephantiacum nullis medicamentis sanescere, liquido patet Gallicum ab hoc plurimum discrepare, ut pote qui tam vetus, quae recens à nobis recte curetur. FRAN. Confundis, me iudice, oratione, neq; possum recte conuicere, an de Elephantia Arabum, an Graecorum loquaris. ANDR. De vtraq; profecto mi Franciscus loquor: neq; Arabum, neq; Graecorum morbum Gallicum esse Elephantiam puto. FRAN. Cur igitur Galenus vndecimo de simplici medicina, Cap. de carne, quem Elephantia iam dudum torserat, haustu vini, in quo forte fortuna vipera quadam vitam cum morte commutauerat, diebus canicula curatum fuisse memoria prodidit, cum tu inueteratum Elephantiacum nullis medicamentis sanescere contendas? AND. Hoc totum nihil ad me: quippe quod asserit, prodigy loco habetur. Nam Galenus idem lib. secundo ad Glauconem videtur aliter sentire, cum dicit: Viperas etiam decoctas ex oleo, sale aspersas modico perinde ac anguillas in cibum recte dabis: quae morbi initio omnia tentabis: quippe inueteratam Elephantiam, radicibusq; innixam, reprimes potius, quam curabis. Iterum VI. Aphor. Comment. 47. inquit, in altero Elephantem inchoantem, primo per Vena sectionem, & purgationem se curasse, & singulis deinde annis hunc purgasse vna tantum purgatione, qua tamen omnia statim morbum rediuiuum fuisse. Nos aut plerumq; à morbo Gallico, tum recentem contracto, tum cum malis perniciosissq; accidentibus inueterato curauimus, qui postquam conualuerunt purgationem portionem nunquam acceperunt, & iis tamen nequaquam morbi accidens aliquod rediuiuum fuit. Quo argumento istorum morborum differentia aperte conuincitur: Nec hoc tantum dixisse sufficit: alia est addenda ratio, Galeni autoritate nixa, qui libro de tumoribus asserit, Elephantiam à melancholico sanguine in atram bilem temporis intervallo conuerti, cuius os facti- dous argumentum fuerit, & horribilitas in vultu. Morbus igitur Gallicus cum à quocumq; humore defluat, & Elephantia

fit tantum sanguinis melancholici, longe ab eo diuersa comprobatur. Et quoniam praemisimus medicorum multorum sententia morbum, quem Gallicum dicunt cum pituita & atra bile tantum habere consortia: propterea multi ab eiusmodi morbo non emergunt: quippe quoniam sanguineus humor aliter quam biliosus curatur, & discrepat in curatione pituita ab atra bile, ut inferius docebimus. Nam si biliosum & melancholicum eiusdem medicamenti quibus sanguineum & quoniam pituita male habet curaueris, aggressi fuerimus, magis mortem quam valetudinem promittemus. Quod nonnullorum Empiricorum vno pharmaco omnes homines curantium insuetudine siue dementia potius deprehenditur, teste Galeno qui primo Aphorismorum sic ait: Quod si aliorum humorum fiat euacuatio, & non eorum qui corpora nostra molestant, contrarium euenit, neque enim confert & grauiter ferunt. Quamobrem morborum causas altius inuestigandas recte patet. Quod asserit idem Galenus primo Aphor. libro: Morbos ait imprimis maxima diligentia indagandos, quoniam si recte coniciantur, qua sit adhibenda proprie medela facile coniciemus. **FRAN.** Bene sane & ex sententia dixisti: quo fit ut non possint istorum non detestari iudicium, qui nauquam se satis euasisse vim morbi ducunt, nisi in Empiricorum manu inciderint, qui nullo discrimine et aetate, habitudinis, sexus, eodem medicamento mortales curant, siue potius vrant. **ANDR.** Quod mirum non est absurdum: nam & eiusmodi hominum genus, ea promittunt se praestituros, quae vnaquam ne somniant quidem, nedum praestiterint, paucis pecuniis conducti. Est etenim tanta morbi malitia graueolentia, contagiosa vi, ut non iniuria medici, quorum existimationem plurimi faciunt, id empiricis condonent, id est, tonsoribus, Iudaeis, & circumstraneis pharmacopois, nihil omnino purgationis agnoscentibus, praeter vnam colocynthidem, quam ut siliolam semper amplexantur. Sed ad propositum reuertamur. Memoria teneo nonnullos me legisse, qui morbum Gallicum pituita tantum dixerint complicari, idque astruere non dubitarunt hoc argumento: Hominem quendam defunctum membratim incidere, cuius iuncturas magna vis pituita suberat. Quod quamuis dederim fuisse, nihil est tamen, nam praemisimus, cum quouis humorum Gallicum morbum conglutinari. Huic igitur cum multa laborasset pituita viuens, quae suapte natura ad iuncturas semper defluit, mortuo id euenisse non est mirum. Nam Galenus VI. Aphor. Semper, inquit, in articulis compagibusque humor pituitosus aceruat, quem mucronem appellant. Quod si dixissent, ex viginti incisuris eodem morbo confectis hac omnibus apparuisse signa, satis apud me ponderis haberet. At ego dum essim Roma a Sancti Spiritus diuersorio curationi egrotantium conductus, mecumque esset Bernardinus Hispanus, Bartholomaeusque quem neueras, ad Xenodochium incurabulum sancti Iacobi sapius accessimus, ubi multos morbo Gallico iam defunctos articulatim oberuncuimus, ex quibus plerosque, nulla penitus inuenta pituita deprehendimus. Sed ut procedat oratio, sub idem fere tempus ligno, quod Indicum dicunt, iis prudentiores medici temere medebantur: quod meo iudicio, experientia magis quam ratione procedebat. Nam lignum, ut inferius explanabimus, biliosis & melancholicis minime comperit, cum sanguineus & phlegmaticus maxime conueniat, Galeno VI. Aphor. sic dicente: Carnes habentibus humiditas adhibere conuenit, sames enim exiccat corpora. Vnde nec audiendi sunt a Germania medici, qui morborum generibus fere cunctis, hoc ex aqua de celo medentur. Nam apud Germanos apprimae ventri deditos, plerumque quod hoc cura genus successerit, non est mirum, cum cuncti eorum morbi fere ventris indulgentia eueniant. Verum quod superest videamus. Hunc morbum aetate patrum, sicut diximus, irrepsisse constat: nec miremur, cum saepe alias in aliis morbis idem vsu eueniret. Nam Plin. 26. historia natur. Capit. primo: sensit, inquit, & facies hominum nouas, omnique, euopriore incognitas non Italia modo, verum & fere vniuersa Europa in morbos, tunc quoque, nec tota Italia, nec per Illyrium, Galliasque, aut Hispanias magnopere vagatos. Celsus etiam saepe ait incidere genera morborum, quorum causa & natura ignoratur. Ceterum fons huiusce mali ab hepate est, namque cum eo gradatim ascendit, omnes inscit humores, sed magis atram bilem, & pituitam. Quod cum ira sit, nunc nomen eius vnde primum defluerit, disseramus.

FRANCISCVS. Istud abs te tacitus desiderabam. Nam quamuis quaequam supra dixeris, pluribus tamen verbis sigillatim nomen explicandum videtur, ut cum vigilantiam patrum mirificam cognouerimus, qui nobis industriae suum comparauerint hoc malum, quo nomine appellauerint etiam non nesciamus.

ANDREAS. Iocaris tu quidem: sed in hercule extra iocum hoc vnum scias, ante Caroli Francorum regis aduentum, nec morbum nouisse Italiam, nec nomen audisse: tunc primum Gallorum intemperantia, victorumque temeritate coniuucta superbia, sacra prophana iuxta habentium, hic morbus inuasit: praesertimque cum per Campaniam populabundi vixarentur: nam (ut nosti a Sallustio dictum) victoria non saltem insolentes effere, verum etiam sapientiores corrumpit. At eorum furor, recordaque processit eo, ut non ab intatu, non a religiosis, non ab infectis iniuria vim abstinerent, sana infectaque muliercula iuxta habebantur, nihil sibi officere posse ducentes: quae est eius gentis in superbia, innataque vanitas. Forte fortuna dum moechantur inciderunt in quosdam morbo confectos contagioso, quem (ut par erat) contrahentes, nec a meretricibus abstinentes tum in deterius prolabebantur, tum sanas, quod deterius, insciebant: inde vulgari morbus cepit, ut veluti continens incendium prouincias totius orbis momento temporis inuasit. **AGILLVS** igitur quoniam primum emerferat, dici Gallicum iure is morbus ab omnibus est captus, praeterquam, quod Galli nomen hoc patria: infame non agnoscentes, Parthenopeum a loco dixerunt. Porro quocumque nomine appelleret, coitu imprimis, & vnius lecti consortio contagiosus, primum pene vitis inscit colem, scrotum, & inguina infestat. Quae autem vuluae seminarum quibusdam crustis, & exulceratione, statim corrumpit, ex quo grauis odor, & pus virulentum maxime, defluit, ut nares sine propius accedentibus non immerito continenda. Nam sunt qui crediderint contrahi noxam non solum coitu, ac lectuli consortio, verum etiam solo odore. Quibus refragatur Nicolaus Massa, nulla al quando contagione Gallicum fieri ducens, sed euenire ex affectis humoribus, aliisque causis nonnullis, ut febres, caeteraque agritudines indices eueniant: vnde non immerito sibi videtur, quo magis suam astruat sententiam, exempla paucorum non lactentium, quos ipse curauerat, ne totum hoc scilicet lacti infecto ascribatur, apposuisse. Adde etiam plerosque hoc morbo affectos, quorum colem & scrotum neque pustula, neque exulcerationes vnaquam aggressi sunt. Quam sententiam nos improbant, asserimus duplici de causa fieri potuisse, tum quod materia non morbi primo iecur occulte serpens inuasit, inde diffusa totum corpus suis accidentibus corripuerit parua temporis intercapedine: nam ex subagitatione verendorum pori laxantur, & commode ingrediens inde virus hepar occupat, ut Conciliatori disse. 177. de lepra differenti placuit: tum vero fieri potuisset, ut osculo, complexuque, dum viderem exercerent, inherentes, haud difficulter insicerentur. Nam mirum non est ex anhelitu posse quempiam noxam contrahere, si Plinio credimus qui libro 26. capit. primo sic scribit de morbo lichene. Granissimum ex his lichenas appellare graeco nomine: latine, quoniam a mento fere oriebatur, ioculari primum lasciuia, ut est procax natura multorum in alienis miseriis, mox & usurpato vocabulo Mentagram, occupantem in multis totos vultus, oculis tantum in manibus, descendens vero & in colla pectusque, ac manus, fudo cutis fursure. Non fuerat hoc lues apud maiores patresque nostras

Morbum Gallicum cum sola pituita non complicari.

De Morbi Gallici contagione.

Dostros & primum Tib. Claud. Caesaris principatu medio irrepfit in Italia, quodam Persino equite Romano questorio scriba, cum in Asia apparuisset, inde contagionem eius importante. Nec sensere id malum feminae, aut seruitia, plebesque habu-
 mulu, & media sed proceres veloci transitu osculi. id si quis dederit paucis osculis fieri potuisse, tanto magis continuo
 complexu, inq; osculo dabit. Nam & pueros familiariter cognati deosculantur, vniis gestant, secum habent: inde tenel-
 li, delicatique, tum pituita multa imbuti, contagioni sunt obnoxij. Consentaneum fuerit igitur morbum Gallicum sola
 eoragione per mortales grassari. Nam Astronomorum apud me iam dudum est explosa sententia, qui constellationibus huius
 totum tribunt: quippe quoniam si vera dicerent, cum magis atq; magis indies inualefeat hoc malum, necesse esset quoque
 quotidie fere eosdem fieri stellarum concursus, quod quam consentaneum sit, ipsi viderint. Certe sanctissimus ille vir
 Damascenus, quo cum libentius errauerim, quam cum in vera dixerim, in Aphorismis, sic contra Mathematicorum sen-
 tentiam superius enarratam testatur: Nulla res sub coelesti globo, vel circulo posita, quocumque gradu mutetur circulus vt-
 tra reuocatur in aeternum ad illud qualitatis, & quantitatis, in quo fuerit in ipso circuli motu. Hac ille. FRAN. Vere meo
 iudicio nonnulli morbum Gallicum non esse agritudinem nouam asserentes, a veritatis via penitus diuerterunt. Nam die-
 bus elapsis, Aggregator cuiusdam Lugdunensis de Medica materia opus ad manus meas deuenit, quod dum lego, quod adans
 de morbo Gallico oculis meis sese offerunt. Quamobrem noui aliquid addiscere desiderans, quod de re ipsa ibi scriptum inue-
 ni, diligenter excerpfi. Omnibus igitur deinde perscrutatis, maxime aberrare mihi videbatur: nam & Morbum Gallicum
 appellare Mentagram ausus est eadem Plinij autoritate, quam tu contra Massam adduxisti. Nam si Mentagra (quod
 morbi genus Graeci lichenas appellant) feminas, seruos, plebemq; humilem, ac mediam non inuasit, verum proceres tan-
 tum veloci transitu osculi, Aggregator ipse viderit, quomodo rectius dicatur Gallicus. Nam tempestate nostra, nullis in-
 mumbus relictis, per mortales grassatur. ANDR. Ingenue tu quidem, quamuis etiam alia ratione eius opinio confutari
 possit. Præmissus enim, Gallicum sapius in verendorum particulis oriri, at lichen, quoniam mentum inuasit, Men-
 tagra nomen sibi vindicauerat. FRAN. Laurentium quendam Phrisum diebus istis offendi, qui Augusto mense præterito,
 de morbo Gallico suam opusculum omnibus aperuit: quo fere tantum siderum aspectibus morbum euenisse fatetur, ac de-
 inde digestiuis, solutiuisq; pharmaciis non omisis, linimentis argento vniis carentibus istum pellere morbum attestatur: quod
 quidem perpulchrum videtur, cum omnes fere Medici in Mercurium inuebant. ANDR. Hic etenim, quem asfers, penitus
 ignorantia refertus dici par est, nec vna tantum veritas ab eo elici potest. Nam ea qua scripsit, potius somnia, quam ex-
 perta dici possunt. Putat enim suis linimentis Gallicum morbum fugare, quo nil est deterius, quibus quidem parte lertis
 scabies curari poterit. Semel eius tantum perlegi librum, qui mihi postmodum tantam nauisam euocauit, vt ipsum è do-
 mo nostra perpetuo exulare decreuerim. Quod superest, sicut arbores plerumq; solent primo vere frondescere, vtiq; flo-
 rum generibus ornari, ita diuersicoloribus pustulis humanum corpus scedabatur: quas si medicorum cura periuigil expul-
 rat, denuo nihilominus repullulabant, sine certo temporis intervallo continuis vlceribus diffundebantur, aut glandulas
 stantes, & tubera ex se gignebant, aut ossa penetrantes vitiabant: quanquam sine his etiam superiora nonnunquam fie-
 bant. Multi, quos morbus male habebat, noctu magis quam interdum intolerabili frontis dolore, neruorum, compagumq;
 ac tibiarum distentione torquebantur. Nunc omnia se mitius habent, tum quod non ita morbus sit noxius, tum quod iam
 a medicis vera monstrantur huic excogitata remedia. Nam, vt in aphorismis Damascenis, ex mutatione stellarum in lon-
 gitudinem & latitudinem vitæ, & consuetudines mutantur. FRAN. Satis qua abs te primo loco petieram, explicasti.
 Superest, vt de medicina eius agamus. Attentum interea auditorem me præstabo. ANDR. Fiat vt vis. Iam dudum mor-
 bum Gallicum ex quatuor humorum oriri alij putantes: aut enim in sanguine, aut bile versatur, aut pituita, aut cum atra-
 bile commiscetur. Quæ quatuor, quanquam inter se colligata, atq; implicita sint genera, tamen ex singulis certa medica-
 mentorum species nascuntur. Hæc omnia sigillatim cum decreuerimus agere, latius declarabimus: tamen videtur aliis
 quadam prius repetere consentaneum.

Gallicum mor-
 bum non esse
 mentagram.

Laurentij Phrisij.

Diuisio Medicinæ.

Dividitur Medicina in tres partes, cuius prima diuina, secunda phisica, tertia chyrurgica, à Græcis recte di-
 citur, secundum Celsum, ex Diocles, Caristij, Praxagora, Herophili, Chrysippiq; sententia, vt esset qua victu, qua
 medicamentis, qua manu mederetur. Hac in huiusmodi curatione nobis omnia necessaria sunt. Nam nequaquam meo
 quid. in iudicio, recte curatur is qui maxima abstinentia, longioribus medicamentis & solerti manuum cura morbo non
 oppugnauerit, quoniam vix supra dicta sufficiunt. Sed quoniam quadrifariam, id est, per quatuor humores hunc diuisi-
 mus, sigillatim medicinas in applicabimus.

De morbo Gallico sanguineo.

Morbus itaque Gallicus crori admixtus sine compaginum dolore, plerumque exulceratis pudendis, abscessus corpo-
 ris, qua Græci apostemata dicunt, interdum in dextro, nonnunquam in sinistro inguine, aliquando vtrinque gi-
 gnit: qui rubentes calidique, & nonnihil intumescetes, continuam febrem sapius gignunt. Nonnunquam per totum
 fere corpus, circa collum potissimum frontemve, pustula subrumida rubeo calore subsusa solent emergere, oculi rubent,
 vena intenduntur, præter consuetudinem dulcescit os, cætera membra torpent, à nona noctis ad tertiam diei horam ma-
 lum ingrauescit, arteria sine pulsus concitatus moventur, vrina vero subrussa admodum spissa deprehenditur: præ-
 fertimq; considerabis aetatem, corporis habitudinem, regionis tractum, animi tempestatem, præcedentem victum, & in-
 ferimus, triplici via curationi insistemus, quippe diata potioneque non omissa, per vntiones, suffitusque primo loco ten-
 tabimus. Ligno vero ab Indu accersito, quod Guaiacum dicimus, deinde postremo aqua nostra philosophica curationem
 perficiemus: qui tamen modum medendi verbo si infra patebit, nunc alias curationes explanabimus. FRAN. Hoc abs-
 te expeto. ANDREAS. Tacitus omnia citius audies. Aer primus omnium sit frigidus & siccus, hunc rosacea, planta
 ginis, acetose aquis, aceto commixtis, suffitu præterea sandalorum, camphora, myrtillorum, rosarumq; salubriorem reddet.
 Cibum sit boni succi, id est, ex obsonis bonum procreantibus, malam vero sanguinem puriorem facientibus. Simila panis
 fermentatus, sale conditus, diligenter in clubano tostus. Carnes vitulinas affectus edat: hædos non aspernetur: pullos do-
 mique Gallinaceos appetat: aucupij omne genus ex montibus, prætis, & syluis petitum, præter coturnices, quibus (si Plin-
 io credimus) ex veneno sumitur cibum. Horum carnes cum assas, tum elixas, prout eius appetit stomachus, recte dabis
 undit et amygdali, medulla panis, acrig, vna. Ordicemate, alia, tum pane intrito ex aqua vel carniuum iure frua-

Victus iudicij

Coturnices

tur. Iis adiaci potest lac amygdalinum, aqua ex ordeo succoq, malorum aureorum, qua hodie Arancia dicitur, siue vino acri confectum. Quandoque p'fces huic etiam conferunt parui, saxatiles, sabulosi, ex aceto elixi. Trunculi etiam, cum petiolu hædorum, vitulorumque, ex vino punicorum malorum, & pusca decocti, congelatique, vt prouocetur appetitum, recte dantur. Ex oleribus spinacia, borago, lactuca, intybus, lupulus, cicorea scariola, acetosa, portulaca, cucurbita etiam ex vino acri, vel succo arantiorum condita. Legumina vero, lac, lacte confecta, bulbarum omne genus, & obsonia pipere aspersa, vt pipere linguam adurentia, vitanda sunt omnia. Fructus ferme omnes fugiat, præter pruna damascena. Pyra etiam & poma decocta, tollenda nausea gratia saccharo aspersa in cibum stidem non negauerim. Conferunt tamen cydonia prunis costis, quippe qua & stomachi exhalationes prohibeant, & concoctionem adiuent. Quod si ager sine febre fuerit, oua sorbilia ex aqua decocta, cortice libera, cum acri succo dabis. Euenit plerunque, vt affectu oris exulceratione non mediocri cibum conficere non possit: huic pullorum gallinaceorum intritum, medulla panis addita, lac amygdalinum, & ius carniū imbecillarum, ex cyatho propinabis. Potio sit vinum album, siue rubeum, lene, decocta aqua dilutum, siue berberorum, siue punicorum malorum succus. Quod si post hanc siti male torquetur, ℞. tamarindorum, prunorum damascenorum, sebesten, ordeis, florum lupulorum, sem. quatuor frigidorum maiorum, singulorum vnciam florum violarum manipulum. Hæc omnia in aqua libris decem coquantur ad quartam, post hæc exprimantur, expressioniq, succi curri, vini granatorum, vini berberorum singulorum vnc. j. ℞. addantur, & fiat cum saccharo potio longa. Et si patientis innatant, qua confecerit stomacho, tunc u illinatur oleo cydoniorum malorum, nardino, ac etiam mastichino. Sex horis, aut ad summum septem, per noctem dormiat. Die vero, si fieri potest, somno abstineat. Pila ludus ante prandium per horam hunc exerceat: deambulatio sit concitior vsque ad sudorem, quippe quoniam curationi morbi Gallici exercitatio plurimum confert. Bis die cibum capiat: à prandio septem horarum decurso spacio, exiliior sit cœna. Pro virili tristitiam expuat agrotus, & latitiam complectatur. FRAN. Quid tandem causa esse dicam, quamobrem medicamentorum pondera, etiam iuxta præscripta antiquorum præsertimq, Cornelij Celsi quæ semper in manibus habes, quem tantopere miraris, & pro viribus emularis alioqui, non dirigas? ANDR. Quasi vero è medica suburra sermones nostros expectes: non est ita. Hæc enim quamuis tecum agam. Consentinis tamen & Brutus Luciliano more arbitramur eloqui. Pinguis igitur (vt aiunt) Minerva: cum præsertim si volueris nimis obsoleta, qua tu requiris, denuo in lucem proferre, miræ non obscuritates modo, sed tenebra etiam sint secutura. Nam quibus vulgo medici nominibus is componendus vtuntur, & nos vti quis vetat? Sed nos ad propositum. Ius ita se habentibus, vrina si erit admixtione biliosa, non admodum spissa, ante venæ incisionem, accipiat pro alui lenitione floris castis drachmas 10. siue electuarij lenitiui tantundem: si fuerit spissior, & subrussa, violarum, ualuarū betæ, mercurialis, singulorū accipiantur manipulus, & ex aqua tribus libris omnia decoquantur, & per clysterē infundantur, quibus addita prius fuerint castia cribrata drach. 10. olei violacei vnc. ij. sacchari rubei vnciola, ouique vitellus. Clystere deinde reddito, ex vena hepatis quantum sufficit sanguinis extrahatur. FRAN. Quaso me interpellantem sustineas, quippe nunquam satis attendi, quis modus sit mittendo sanguini, qui cruor sincerus, quis infectus. Nam si Cornelio credimus, crassus & niger vitiosus, pellucens autem & rubens est integer: idemq, præcipit tamdiu sanguinem mittendum, quoad is pellucere incipiat: Sed vereor vt nostrorum corporum imbecillitas ferre possit: quamobrem hæc abs te differi latius velim. ANDR. Mos geratur. Recte quidem Cornelius Celsus: nam si fuerit niger sanguis & crassus, donec colorem immutaueris, recte mittetur. Quod si diutius idem perseueraueris, suppressendus est, ne patientis deficiat anima. Nam dicit hæc Auerrorij vij. colliget, cap. de cura synocha: Artemittatur natura, sed ipsa nunquam in laudabili crisi vsq, ad syncopen euacuat. Propterea clinicus chirurgus mittendo sanguini semper assistat, ne hesitatione timidius demittentis scalpellum fiat, vt summa cute tantum lacerata exiliat sanguis subtilior, subrida q, crassior. Ad hæc illud accedit, quod si pelluceat, est statim suppressendus, etiam, rater quod iusserit absens medicus. Nam operarij chirurgi non recte agunt, qui à mandatis ne transuersum quidem vnguem nunquam audent ab errare sua ignorantia haud sanguinem agnoscentes. Nam Hippocratem y quidem non attendunt primo Aphor. dicentem: Et vasorum inanitio si talis fiat, qualis fieri debet, & confert, & bene tolerant: sin minus, contra. Hinc deterior habitudo, medicorum dedecus, & agrotantium mors. Si vero etas, & vis corporis, eiusmodi venarum incisionem tergiuersantur, cucurbitulas (cute prius incisa) scapulis & clunibus admovebimus. Caterum, vt materia digeratur, qua plerunq, sanguis putrescit, hic syrupus recte septies propinetur qui conficitur ex rheubarbari electi drach. ij. florum violarum, boraginū, buglossæ, capillorum Veneris, lupulorum, radicem intybi, singulorum manipulo, ordeis semuncia, feminum com. frigid. minorum. sing. drach. ij. tamarindorum, prunorum, sebesten, singulorum drach. vj. Contundantur sic omnia leniter, macerenturq, ex aqua sumiterre, lupulorum, & intybi, triduum deinde bulliant ad decoctionem quarta partium colentur, & prelo diligenter exprimantur: cremori sacchari quantum sufficit addatur, postea defecentur, & fiant syrupi septem, qui plurimum iecinori conferunt. Quod si impendio voluerimus parcere, ℞. syrupi de cicorea compositi, de sumoterra, rosati, singulorum vnc. ij. ℞. aquarum lupulorum, intybi, sumiterre, singulorum vnc. v. & fiant syrupi septem. Qui etiam sic fieri possunt: ℞. syrupi de succo curri, de lupulis de sumoterra, de succo intybi, singulorum vnc. ij. aquarū portulacæ, intybi, lupulorum, violarum singulorū vnc. v. Digesta materia hoc potu securius euacuari poterit. ℞. electuarij lenitiui drach. ij. de succo rosarum, de psyllio, singulorum drach. ij. syrupi rosati solutiui vnc. j. ℞. & cum decocto florum, & fructuum cordialium fiat potus. Vel sic: ℞. Manne electæ vnc. ij. dissoluantur ex decocto, florum & fructuum cordialium, & indantur diacatholiconis drach. iij. ℞. electuarij rosati Mes. drach. iij. syrupi de cicorea compositi vnciola, & fiat potus. Vel sic: ℞. Rheubarbari electi drach. ij. spica nardi dimidium scrupuli, nocte vna macerentur ex aquis lupulorum & intyborum, accedatq, pauillum vini aromatici albi: deinde factæ vehementi expressioni manna mastichina vnc. ij. ℞. addatur: diacatholiconis præterea, electuarij de sebesten sol. sing. drach. de psyllio drach. j. syrupi violati vnc. ij. & fiat potus. Aegro sic per purgato cucurbitula, qua sanguinem inter cutem exhauriant, ferro prius scarificata cute conueniant: iuxta illud Gal. cap. de hirudinum curatione, & cucurbitulis: Eæ, inquit, purgati prius corporibus viles quidem, sed in repletis (qua plethorica Greci vocant) prætermittende sunt: debent itaque scapulis apponi vtting, prope spinam, uariibus, & sceminibus. Postremo die cubiculo se contineat ager. FRAN. Quid tu? Quantum video, agro pro agrato pro libidine vteris: quod si restiterit Grammaticorum turba, tanquam ludat cogent te in verba sua iurare: namque præcipiunt ac iubent, agrotum corpore affectum dici debere: egrum vero cuius animus sit perturbatus. ANDR. Quasi tu sis ex Grammaticis vnum, ita videris eorum partes suscipere. Quod si mihi stomachum feceris, adducam vel sexcenta in te poetarum testimonia: quibus si minus credideris, Ciceronem citabo. quid hoc? credis tibi cum imparatis rem esse? Sed vno ero contentus: ne tibi multitudinem verborum sim molestior. Virg. iib. III. AEn. id. Aut egra trahantur corpora. Quem testem si tanquam poetam repudiaueris, Cic. in familiaribus ad Patrum: Scaturit egræ tibi quædam pariter. cum u scilicet Patrum Po-

Lagra laborasset. **FRAN.** Perge quae cepisti. **ANDR.** Quis sciat igitur eger in lecto. Lotus, quo cubat, eodem sufficitur, quem superius exposuimus, foueatur, semelq; vel bis ad summum quoridie pro viribus isto linimento tibia, dorsum, & brachia unguentur. Recipe unguenti rosaces, Mes. unguenti triapharmaci in mortario plumbi ex oleo, & aceto rosato subacti, singulorum libram, mercurij extracti vnc. xj. sublimati drach. ij. camphora drach. β. & fiat in mortario linimentum. Sive, Recipe ad pis porcini, berytrecensis, sing. lib. liquefiant omnia lento igne, ex aceto postmodum & aqua rosarum cum plantaginis spatibulati, ne vnius hora momento subagitantur. Deinde electis aquis, & aceto, addantur unguenti triapharmaci ebullito prius lithargyro ex aceto) vnc. xj. unguenti sandalini vnc. iij. mercurij extracti vnc. viij. camphora scrup. ij. & fiat unctio. Quam si efficacitorem volueris, sic efficies. Recipe unguenti rosaces Mes. libra pondo, berytrecensis vnc. xj. unguenti triapharmaci superioris vnc. iij. sandalini vnc. ij. saponis nigri vnc. xj. olei amygdalini dulcis vnc. ij. mercurij extracti vnc. xj. sublimati drach. ij. succi brassicarum, scabiose, fumiterrea, singulorum drach. iij. & conficiatur in mortario linimentum. Porro haud sis insciens, patientem carissimè superioribus unctioibus inungi debere, quoad putauerimus omnino materiam consumptam. Quod cum ita sit, dierum numero diffinire qui possumus? Signa tamen certissima dabimus, quibus certo scias, illinitum satum: cum dentes dolent, os exulceratur, lingua intumescit, dolores medicamentis cedunt, distentio reruorum deficit, & totum corpus lassatur, satis illinitimus: quibus perceptis, cibo superius dicto, potiq; liberalius affectum fouebimus, quod tamen ad peritioris medici assistentis sententiam relicto. Interea si cor aeri deficere videbitur, hoc remedio obuiam ibis. Recipe aqua rosacea, violacea, buglossa, boraginis, acetosa, melissa, singularum vnciam, aceti rosati, vini malorum puniceorum, singul. semunciam, pulueris cordialis temperati drachmā, croci scrupulum. & fiat Cataplasma cordi applicandum. Sed euenit ex huiusmodi unctioibus, propter humorem qui ex toto corpore ad os redundat, v' sauces exasperentur, guttur, exulceretur, & gingiua male habeant, tamen si sanguinis minus id fiat. Primo igitur diebus id diuenter per os exciatur: nam si malignitatem peccantis materia retinuerit aget, nunquam sanescet. Colluat ergo os aqua ex ordeo, melle rosaceo admixto, siue aqua ordeacea, & diamorone, siue aqua in tybi, & syrupo rosaceo. Sed si dolor cum rubore, & inflammatione non mediocri circa guttur agrum male torserit, lacte caprino, in quo ex igne candens chalybs deserbuerit, fiat gargarisatio: nam mirifice dolorem sedat, ac incend. u' exringuit. A septima die syrupo rosaceo cum aqua plantaginis, lactucag, totum os foueat. Mundabimus, & ad cicatricem perducemus exulcerationes, ex aqua plantaginis, admixto melle rosaceo, & alumine. Postremo poteris idem perficere gargarisatione tali. ℞. aqua fabrilis lb. vij. plantaginis vini cidoniorum malorum, sing. vnc. iij. balaustriarum, myrtillorum, sumach. rosarum, sing. manipulum, cauda equina manip. ij. aluminis vnciam: & bulliant hac ad tertia partis consumptionem post coeantur, & addantur diamorone, mellis rosacci, singulorum vnc. ij. & fiat gargarisatio. Quib. remediis si morbi malignitas nequaquam parebit. scapulis & naribus, incisa cute, per cucurbitulas materiam diuerter: quin etiam si necessitas compulerit ex vena capitis, siue brachij, protinus sanguis mittatur. **FRAN.** Bene sane, & ex vsu egrotantium gargarisationes addidisti, quibus exulceratum guttur & os sanesceret. Empiricorum etenim turba cum sibi traditum perunxerint, faucibus ilico morbos emergentes nulli medicamentis discutiant: quorum inscitia plerumque euenit, vt momento temporis edentuli penitus fiunt. **AND.** Hoc nihil est: vidimus enim multos edentulos, insuper lientericis, dysentericis passionibus miru' iugiter male torqueri, quibus etiam succubuerint: quamuis non negauerimus, hac si in corpore athletico fiant, corrigi statim recte non debere, inde enim saepe sequitur perfecta salus in validis: at exiliiori cibos valentes sapius vnoquoque die recte dabis, vinumque rubrum diluimus. fabrilis aqua propinabis, stomachum & aluum oleo cotonei mali, rosaceo, myrtillo, nardino, spinaz, hircino ceruinove adipe perunges: lac praterea chalybeatum, siue ius capitis veruecini, adito melle, & oleo rosaceo, adipeque hircino per clyster infundes. Quod si casus eiusmodi desperationi proximus fuerit, at b. n. si am, vel Philonium affectus bibat. Somni praterea difficultas vim maxime deprimit. Sic igitur affectus, ex semine papaueris contrito lactucag, aqua cremorem in potum recte dabis. Accedet temporibus & brachij spongia, ex collyrio eiusmodi. ℞. vini cretici cyathum mediu' succi hyoscyami vnc. ij. croci elisci drachmā, qua subigatur in vnu corpus omnia: rectus tamen ex eo spongiam naribus apposueris. Ceterum donec laborauerit, nec culcitras, nec vestes in quibus cubauerit unquam mutaueris. At si nihil venter excreuerit, per clysteres lenitiuos aluum ducatur. In pristinam sanitatem redactus ager, hac lotione calida totum sibi corpus lauet. ℞. vini albi odoriferi lb. 10. lixiuij lb. 5. rosarum, myrtillorum, camomilla, florum salicis sing. m. ij. qua decoquantur ad tertiam. Deinde strigilibus puris bene siccatis, per illam diem conuiescere iubebis. Eodem gallinaceis pullis, & carnibus boni succi, vires pristinas paruo temporis interuallo reuocabis. Solet plerumq; medendi genus hoc, morbum Gallicum non solum recenter contractum verum etiam inueteratum discutere. Sed quoniam nonnunquam vlcera puerida, excisa, carcinomati proxima, quaeq; serpunt more phthiriasis, morbum Gallicum sequuntur, cum eo etiam vt ossa vitentur, manus operam male affectus etiam desiderat, sine qua frustra remedia omnia tentabimus.

De bilioso morbo Gallico.

Iam satis de morbo Gallico sanguinea qualis atis dictu' puto, reliquu' est, vt agamus de bilioso, qui cum pudenda cuiuspiam interius ingerentes, citreū colorē referunt. Pus fertur ex his fretidū, admixta sanie citrina, virulentaq; Accedit pruritus, doctiq; qui non mediocriter afflicti pungit. Frons a dextro tempore magis quam sinistro, a tertia potissimū ad nonans diei hūa, summo tenetur dolore. Guttur vt plurimū tumet erisipelate. Nonnunquam vero is morbo in Phthiriasim comutato, adeo palatū male habet, vt cibis & potus per nares ascendendo destuat: macies totū inficit corpus, fiuntq; tabifici haud dissimiles: vultus & oculorū albū, croceum contrahunt colorē accedit febricula qua tertiana tenorē, siue erucea modū referens solet affectos exercere: at vrina ad citrinū tendit. Brachij vena pulsu veloci frequentior & dura deprehenditur. Amaror & siccitas in vna inest ori. Quod si corporis habitudo praecedens, victus, atas regio, & tempestas anni concurrerint, materiam biliosam facile concere poteris. Porro curatio morbi praedicti ad frigidū & humidam tendentia postulat, qua ne tibi multitudine verborū sim molestior, praetermitto. **FRAN.** Non adeo simplicium medicina rerum sum expers, vt quacurata, qua sanguineo conferre hodie meū es collosurus, huic etiam adhiberi possunt. Perge igitur recto tramite. **ANDR.** Bene profecto. Igitur cum bilem deprehenderis, medicamentum quod leniat huiusmodi poteris conficere. ℞. florū Cassia volueris agere, ℞. syrapi ros. solutius vnc. ij. manna elect. vnc. j. aqua violarū vnc. ij. & fiat potio. Si vrina spissior feretur, bipatica vena vtiliter scindatur, eo modo quo sup. At si tenuior pro libidine sanguinis missione poteris praetermittere, quam per

per urinam non possumus id recte iudicare. Nam quosdam biliosos curavi, quibus et si subtilior urina, tamen crassior sanguis, & niger facta incisione ferebatur. Non igitur fuerit absurdum fortasse semper ijs sic affectis sanguinem mutare, cum, teste Auicenna, phlebotomia sit euacuatio vniuersalis. Nam sanguinem bonum: statim supprimemus, infectum vero tandiu sinemus defluere, quandiu eundem retinuerit colorem. Quod attestatur Albucasis Cap. de utilitate phlebotomie, dicens: Nam sanguis si est niger, tunc dimitte ipsum exire, donec rubeat: & similiter si vides ipsum grossum, tunc dimitte eum, donec subtilietur: & similiter si est acutus, donec auferatur acuitas eius. Hac ille. Post venarum incisionem, ut materia concoquatur, quinquies vel potius septies syrupus u bauriatur. Recipe scariola, intybi, cicorea, lactuca, portulaca, acetosa florum violarum, sing. manip. j. s. seminum com frigid. ma. vnciam, rheubarbari electi scrup. ij. radicem centaurae maioris scrup. ij. spica grana tria, seminis papaueris albi, floris nenupharis sing. drach. ij. s. sandalorum omnium scrup. iij. contundantur vna rheubarbarum, spica, radices, semina sandalig, in aqua libra vnius ponderis, intybi, & fumiterra, & lupulorum, per dies continuos tres macerentur postmodum ex libris tribus aqua ordeacea, & libra vna vini malorum puniceorum, cum predictis herbis, ad mediam concoquantur. Addantur ijs flores ad finem fere decoctionis, postea colentur, & exprimantur prelo, expressioni sacchari vnc. viij. addantur, inde sint syrupi vij. Vel ℞. syrupi acetosi simplicis, syrupi rosarum ex infusione, syrupi de sumiterra, singulorum, vnc. ij. s. aquarum intybi, acetosa, lupulorum, fumiterra, sing. vnc. vj. misceantur haec omnia, fiantq; syrupi vij. Qui sic etiam fieri possunt: ℞. syrupi de acetositate citri, de succo intybi, oxyaschara, sing. vnc. iij. violati, vnc. ij. aquarum cicorea, intybi, portulaca, fumiterra lactuca singul. vnc. v. & fiant syrupi vij. Enimvero cognoscens materiam iam digestam, ℞. seminum quatuor com frigidorum mai. sing. drach. ij. seminis papaueris albi drach. iij. Contusis deinde in mortario lapideo ex vncis duabus aqua egelida intybi, & fumiterra, exprimas cremorem, cui syrupi rosacei solutiui vnc. ij. Electuarij ros. Mes. diacatholiconis, sing. drach. iij. addes, quam portionem affecto propinabis. Vel, ℞. diacatholiconis drach. iij. elect. de psyll. o. confectiois Hamech. sing. drach. ij. s. & cum infusione drach. j. rheubarbari preparati ex aqua intybi, & fumiterra: fiat potus. Sic aliter fieri potest. ℞. syrupi rosacei solutiui, sy. de cicorea compositi, manna electa sing. vnciam, elect. lenitiui drach. iij. de succo rosarum drach. ij. s. rheubarbari subtiliter puluerisati drach. mediam, spica gra. ij. & cum decoctione florum, & fructuum cordialium, fiat potio longa. Reliqua poteris superioribus recte conijcere. Caterum tibia, tum cetera corporis compages hoc vnguento illiniantur: ℞. vnguenti rosacei Mes. libram, ex aquis florum pomorum hesperidum, qua hodie arancia vocant, siue florum myrti, rosarumq; damascenorum, sing. quantum sufficit. Hac spatula lignea per horam subagitabis, postremo proiectis aquis, in mortario marmoreo, pomata tum odorifera, tum recentis vnc. vj. saponis damasceni odoriferi minutim incisi vnc. ij. vnguenti triapharmaci ex oleo rosaceo omphacino, & aceto rosato vnc. iij. musci ex aqua rosacea scrup. semis, camphora scrup. ij. pulueris cypri drach. iij. mercurij extrinsecti vnc. vj. sublimati drach. iij. sandalorum alborum drach. j. adiectis in vnguentum rediges. Si vero pauperibus consulere volueris, ℞. aruina porcina libram, butyri recentis vnc. ij. liquefiant simul ad ignem, ex aqua postea solatri, portulaca semperuiua, & aceto rosato, ex vase fictili ligneo baculo subagitantur, dehinc proiectis aquis, addantur vnguenti triapharmaci superius dicti vnc. iij. cerusa lota vnc. iij. mercurij extrinsecti vnc. v. sublimati drach. ij. & fiat diligenter linimentum Reliqua superius diximus. Hoc etiam morbi Gallici contractam recenter noxam, sine vntionibus discuties. ℞. aqua rosarum lib. ij. plantaginis solatri, sing. lib. j. s. viri granatorum, succi vna acerbera, singulorum lib. s. aquarum scabiosa, fumiterra, sing. vncias tres, mercurij sublimati vnc. ij. Mercurius in puluerem tenuissimum redactus, predictis aquis maceretur: Hac deinde omnia ex vase vitreo, igni succenso ferueant, non alio mehercule pacto, quam decocta aqua ex ordeo fieri solet. Hoc quidem egelido omnes corporis compages lauentur, brachiaq; cum tibis, a genu, & a cubito, donec dolores cum ceteris euanescent. Diebus lotionis e cubiculo pedem male affectus non offerat, sed caueat omnia perinde ac si inungeretur. Hinc etiam qua praeuimus accidere solent, oris scilicet ulceratio, defectus animae, ventris deductio, somni difficultas: quibus omnibus quo pacto fuerit occurrendum declarauimus. Enimvero non ab re fuisse ostendere, quantum hoc morbo affectis inuebat detrimenti curatio per lignum, quod superius declarauimus, praesertim si Gallicus is macie affectus fuerit, nisi id inferius asserere decreuissim. FRAN. Satis superq; te differentem de sanguinis, bilisq; qualitate, tulimus: quamobrem iam pituita se ingerat.

De morbo Gallico pituitoso.

ANDR. Omnibus igitur agrotantibus, quos pituita male habet, rarius pustula per totum corpus emergunt, nisi forte affectu sanguinis aliquid adiectum fuerit: quia pituita natura (vt dixit Gal. 6. Aphor.) ad iuncturas potissimum decurrit: vnde omnium non solum iuncturarum, verum etiam articularum intolerandi dolores fiunt, qui occiput potissimum tibiasq; male habent, noctu magis quam interdiu, id est, a tertia hora noctis, ad nonam potissimum torquentur. Horror est in capite, ceterisq; membris: at cum materia salis accedit, tota inguina, cum coleris, vultumque, tum volas manuum, pedumque, impetigo arripit. Quod si cum sanguine complicatur, vt plerumque vidimus, circa collam, gulamque, sub alis, inguinibus, & pedum compagibus quaedam glandula struuis haud dissimiles emergunt, os albescit, sensus obtunduntur, bucca multo fluore insulso, acri, nonnunquam salso redundat, nares mucosa, stomachus male concoquit, urina alba, spissaque fertur, vena subsidit. Quod si corpus, etas, ceteraq; eiusmodi a pituita fuerint, morbum admixtum esse phlegmati conicies. Requiritur huic ergo curacioni primo loco sex rerum non naturalium regula ad siccum & calidum declinans. Cubiculum sit meridiano, siue exorienti soli expositum, cuius aer, praeter astatem, quotidie bonis odoribus suffatur. Nec absurdum fuerit haec omnia in pilam redacta per hyemem manibus affectum gestare. ℞. ladanii electi vnciam, ligni aloes ℥. s. ambræ ℥. s. gallia muscata, styracis Calamita, bezuum, sing. ℥. ij. s. serpilli, amaraci, satureia, sing. ℥. ij. quae terantur omnia, & ex aqua lauendula in pilam subigantur. Cum vero inedia, teste Damasceno, Celsoque, medicina potissimum nitatur, de ea primum erit sermo. Nec diuersis cibis pro libidine vti decet affectum, neque nimia inedia torqueri: nam Auicenna primo Can. sen. iij. cap. vij. nihil deterius esse ait, quam diuersa nutrientia simul adiungere, & cibi sumendi tempus prorogare, nec cum sumpseris postremum, primus iam incipiat concoqui cibis. Hac ille. Nos enim in primis praecipimus famis tempus semper expectandum, cum eo tamen, ne desiderium cibi nimium urgeat: quoniam, teste Principe, loco quo supra, inedia nimia stomachum malis humoribus inficit, & imbuat. Panis sit ab omni mixtione grauitate, humiditate, asperitate, graueolentiaue sequestratus, ideo iubemus fieri ex farina pura boni tritici, & quod sit fermentatus, bene coctus, biduanus, triduanus, quatruiduanus, & sale mediocriter conditus: neque recoctus ab re fuerit, quem, cum de ligno Guaiaco tractabimus, paucis absoluemus, nisi forte ventri nimia subductio obstitit. Carnes edat vitulinae, hadinae, veruicinae: agninae vero fugiat, quod pituitosum sanguinem reddant. Nec a venatione abstineat, vt pote cum dama, hinnuli, lepuleuli, maxime sint ex usu. Nec aucupium spernat, nam perdicis, porphyronis, atagena,

Aqua ad lotionem.

- ait. *egene, phasiana, turdi, ficodula palumbuli, merula conferunt: quamuis grues, anates, anseres, querquedula, aucupia, omne genus in stagnis, & paludibus degentis noceant.* In cibis etiam caueat pisces, quoniam teste Principe comedendi non sunt, quod facillime corrumpantur, & humores corrumpant, & pituitam gignant, praesertim post exercitium. Oni etiam recentia ex iusculo sumpta proficiunt, sicut abhorrent eadem fixa, duraque. Lac, lacteque confecta fugiat. Ex leguminibus cicerum decocto tantum perfruat additis amaraci, menthaeque foliis. Ex oleribus petroselino, fœniculo, serpyllo, salvia, mentha, roer marino, melissa, amaraco, canaceto, satureia, arthemisia, origano, calamento, palegio, & si qua alia calida fuerint. Ex radicibus baucia, pastinaca, radices petroselini, fœniculi, recte in cibum sumuntur. Allium, cœpes, bulborum omne genus, radiculam, raphanum, erucam, sinapi, quod inflent & innatent stomacho, & sanguinem adurant, fugiat. Ex iusculis amygdalarum panem decoctum ex iure carniū conducentium, dare poteris.
1. Ex fructibus conferunt palmula, ficus, nuclei piner, pistacia, amygdala, cydonia decocta, additis fœniculo, & coriandro: sicuti pomæ, pyra, chrysomela, cerasa, cum sint humiditatis & frigiditatis maximae, non mediocre his inferunt nocumentum. Ex conditiis myrobolani chebuli, cortices citri, gingiber, hyringi, & acori radix nux myristica, cubeba, carpobalsamum, crocus, lignum aloes. Utatur in potu vino albo, siue subrubeo leni, iuxta illud Auicenna primo Can. cap. de eo quod comeditur & bibit, quæ sic: Scias etiam quod ex vino illud est melius, quod inter vetustatem & nouitatem est æquale, & quod ad rubedinem trahit, bonum habens odorem, æqualis saporis, & quod non est acre, neque dulce: dulcia enim a facienda oppilationes sunt velocia, quoniam natura attrahit ea, antequam digerantur. Nec post cibum hoc bibendum est, quia est ex rebus magis impediens concoctionem, quoniam digeritur velociter, & facit penetrare cibum indigestum, & facit hereditare oppilationes, & putrefactiones. Quod si Gallium sitis male habuerit, us post cibum talem potionem pitisset. ℞. ligni aloes ꝑ. j. cinnamomi ꝑ. j. coriandrorum preparatorum ꝑ. ij. iuiubarum, sebesten singulorū ꝑ. j. liquoris rase ꝑ. j. storum cordialium m. j. Hac omnia ex aequalibus decem ponderis, vsq; ad tertiam concoquantur, inde colentur & addantur sacchari ꝑ. vj. & fiat iuleb longum. Nec audiendi sunt nostrates Empirici, qui quoties agroti visum fuerit, vinum rubeum, nec minus album subausterum iisdem propinant: sed sua sententia rationem viderint. Nobis vero qui traditus est ager, nec nimium cibo repleti debent, nec nimium fame torqueri, teste Hippoc. Aphor. II. sic asserente: Non satietas, non fames, nec aliquid quicquam quod modum natura excesserit. Galeno quoque astipulante primo de regimine sanitatis, qui, Dux, ait, sunt intentiones sanatiua diæta, vna scilicet repletio euacuatorum, altera vero euacuatio superfluitatis. Magna igitur cum diligentia horum affectibus succurrendum censeo, quamobrem si maior appetitus extiterit, quam pro viribus stomachi, adhuc etiam famescens cibo finis est imponendus, vt intemperantia comedenti a cibo, neque venarum pulsus inualeat, neque spiritus difficulter reddatur. Nec edendum prius, quam bene concoctum fuerit: id enim septem horarum interuallo plerumque fit. Porro cibus nisi leuitas intestinorum accesserit, sit liquidior. Si quis debilitate stomachi bis quotidie comedere sat non habet, proportione tribus viuis voret. Prandium sit prolixius quam cœna. A somno surgentibus superfluitates corporis expellantur. Lauentur manus, & facies, ex aqua salvia, primula veris, amaraci, lauendula, siue vino odorifero. Corrigitur alui nimia subductio, clysteribus lenientibus, & balanis ex melle confectis: aut ager aliquando ꝑ. ij. vna thymia ex syrupo violaceo contrita, addito nonnihil olei dulcissimi amygdalarum, tribus ante cibum horis sumat. FRAN. Sol iam columnas Hercules spectans exhausta clepsydra, nos admonet, vt vela contra hauriamus, remos inhibeamus, & portum despiciamus: quæ sequuntur igitur in pauca conferas: AND. Libero te ista cura, nam quod times propulsabo facile, quippe abiturum detenturus, cubiculum, culcitras, vestesque tibi iam parauimus. Sed vt redeam vnde diuerteam, huic opus est pila, similibusq; corpus exercere: nam Galenus vno libro inde confecto, pilam summis laudibus extulit. Cornelius etiam Celsus non vnquam prater misit, cuius exercitij laudes si sigillatim coner cõnumerare, dies me profecto defecerit. Ad hoc illud accedit etiam quod plurima non solum Galenus, verum etiam plerique alij, multi in locis de pila monumentis literarum commendata non immerito reliquerunt. Nam per deos immortales quid dici potest conducibilis? hac superflua quæque digeruntur, pila natura vim prouocat, eadem virtutes amissas reficit, corpus exiccat, spiritus exhalationib; noxiis liberat, poros corporis aperit. Plurimos deniq; vidi morbosos, qui exercitio tantum sanitatem receptam referre merito possent. Morbosi igitur corpus pila, aut quouis alio tali ludo exercendum est, donec citra lassitudinem concalescat, & hoc eo tempore, quo mundius sit, quod teste Principe tum videtur esse, cum ieiunum sit, ne mali subsidentes humores exercitio tali diffusi, venas atque intestina corrumpant. Qui si forte eo tempore subsidere deprehendantur, euacuatione aliqua primitus depellantur. Posteaquam se satis exercuerit ager, cibum capiat, secundum quem conquiescat vsquequo satis concoxit, ea tamen lege, ne post cœnam statim cubitum se recipiat, quippe tres horas ad minus agroti praestolandum. Cum vero lecto se dederit, horis septem, siue octo ad summum dormiendum. Somniculosus etenim (vt inquit Princeps II. Cant.) sequitur anima torpor. At si ieiunus obdormiuerit, repletur fumo caput & vaporibus, a fecibus & superfluitatibus eleuatis. FRAN. Quid hoc? ergo nec saturo, nec ieiuno dormiendum? Nam quæ est hac fabula? eorediges me tuis sermonibus, vt nunquam, aut saltem parum conquiescam. Mori me Hercule satius est, quam somno toto illo tempore non conquiescere. ANDR. Atqui somnum non prohibeo, nisi qui nimis. Nam cum dico, neque ieiuno, neque repleto dormiendum, perinde est ac si dicam, quiescendum quando id tempus postulas, ita precipiente Cornelio Celso. Et Auicenna tertia primi cap. VII. sic inquit: Non ilico post comestionem est dormiendum. FRAN. Quid hoc monstris est? Auicenna sibi ipsi dissidet quantum video: secundo enim Cantica dicit: Post cibum est dormiendum immediate accumbendo, donec ad locum digestionis peruenerit cibus assumptus. ANDREAS. Tante tu quidem, nihilominus duobus modis hoc explanare non dubitabo. Primo quidem scias hoc Principis dictum (si re-abstinere omnino non possumus, dicit accumbendo nobis dormitandum: quæ quidem fuit Auerron sententia. Secundo modo potest hac contradictio translatorum, aut impressorum errore euenire. Nam si legeris nouum Cantica textum ab Andrea Belunensi recognitum, qui Arabica lingua fidus fuit interpres, leges profecto, Non est quoque post cibum & comestionem dormiendum: quod vnusquisque sana mentis credere potest. Hinc igitur est, vt plerique Auicennam exponunt. Princeps tertia primi cap. IX. habet, quod super vacuitatem dormire, est malum, quia est deiciens virtutem: & super repletionem est malum anteaquam a superiori ventre fiat descensus, quoniam replet caput vaporibus, & ferum alias hoc totum videro: tu dic hoc primum, quomodo sit corpus somno componendum. ANDREAS. Bis Auicenna quod queris explanauit tertia primi, septimo capite ac nono. In septimo: Sic oportet prater ea vt super dextrum latum dormiat pauillo tempore, deinde reuoluatur super sinistrum, & postea reuoluat se super dextrum.

Nono vero: Sed quæ ex figuris somni est melior, est ut super dextrum incipiat latus, & deinde ad sinistrum reuoluatur: quod si eius inceptio super ventrem fiat, auxilium fert magnum in digerendo, propterea quod calorem retinet naturalem. FRAN. De die postquam concoxerit, poteritne somni tantillum capere? ANDR. Nihil minus: nam Princeps tertii primi: In die quoque dormire est malum, generat enim agritudines humectantes, & rheumatismos, & corrumpit colorem, & grauat spem, laxat neruos, & generat pigritiam, debilitat desiderium, & generat apostemata, & febres. Quo fit ut dies vigiliis, nox quieti sit nata. Nam Paulus Aegineta, in præceptis de tuenda valetudine, cap. 97. dixit: Nocturno autem somno haud alius melior est: siquidem nox suapte natura, tum humore, tum tranquillitate somnum alliciens, concoctionem perfectam efficit. Et Auerrou in commento Cantica: Tempus matutinae refectionis est totum tempus somni. Cornelius Cels. libro primo, nocte dormiendum, die vero vigilandum suadet. FRAN. Huius argumenti nihil reliquum mihi videtur esse, nisi quæpiam de contingentibus anima volueris addere. ANDR. Haud inuitus mihi Francisce. Gaudium igitur, angor, iracundia, odium, furor, mœstitia, sollicitudo, metus, inuidia, luxuria, auaritia: quæ quidem omnia, affectus anima ab autoribus recte dicuntur: iis etenim cum mortales se intemperantius extulerint, in perniciosos corporis morbos penitus conuertuntur. Nam Galenus primo regiminis sanitatis dixit, oportere medicum, qui sanitati mortalium studet, pro virili operam dare, ne mores animi corrumpantur, quibus aditus agritudinibus corporis pateat: quippe furor, fletus, sollicitudo, cæteraq; id genus magis quam par est, febrium, morborumq; cæterorū sunt principia. Quin etiam Princeps tertii primi (si recte memoria teneo) dicit: Accidentia animi horribilia, & motus corporei fortes, digestionem fieri prohibent, cum multi proficiantur ex cruditate morbi. Galenus etiam libro artu medicinali inscripto huic astipulatur dicens, omnes animi immoderatos affectus, iram, furorem, mœrorem, metum, inuidiam, à naturali gradu corpus deicere. Deinde inferius: omnes animi motus, siue perturbationes maluerimus dicere, corpus humanum excitare. FRAN. Sed quid iram dicemus? ANDR. Aristoteles in primo problematum, iram nihil aliud esse ait nisi: cœsionē sanguinis, circa cor. Quinetiam Cicero libro Tusculanorum quæst. idē ex autoritate Homeri videtur dicere: quod sic in Latinum traduxit:

Corque meum penitus turgescit tristibus iris:

Cum decore atque animi me orbatum laude recordor.

Galenus etiam libro de differentiis febrium sic: Ira est aestuatio quadam, & motus vehementior virtutis ad irascendum prona, quæ cor diuisidet, cum calescit ipsa substantia. Et in secundo quoque de accidenti & morbo: Ira est feruor caloris in corde propter motum animæ. Et in quinto: Ira est magnus & fortissimus motus, & propterea valde corpus perturbat, & permutat à naturali consistentia. FRAN. Apud Haliab. eandem pene sententiam vidimus, sua Theor. lib. V. cum dicit: Ira est sanguinis cordis ebullitio, naturalisq; motus caloris, & eius ad exteriora exitus: semel subitoq; ad vlciscendum nocent. Sed heus tu, quidnam inter odium & iram differentia esse dicemus? Nam differre ea inter se ex Valerio Maximo didici, qui libro IX. cap. XXX. memorabilem suorum sic: Ira quoque aut odium in pectoribus humanis magnos fluctus excitant, pro cursu celerior illa nocendi cupidine, hoc autem pertinacius, ac nunquam sine tormento sui violentius. ANDR. Princeps libro de viribus cordis sic: Est quidem sciendum, quod ira quando cessat velociter, non perdurat in imaginatione, seu phantasia forma nociui, sed cito deletur, & ideo non causat odium, siue rancorem: odium enim est perseverantia forma nociui in imaginatione seu phantasia, & perseverantia siue imaginationis affectus ad vindictam sumendam ex eo. Dicemus ergo, quod ex odio accenditur ira: quod quidem odium post iram consummatum rancor appellatur. Quod forsitan rectius non intellexit Valerius. Ex ira etiam nonnunquam, cum bilis concitatur, melancholica oriuntur passionēs, sicut Haliab. V. Theor. Nam inquit ANDR. Arist. X. problematum: Timor est infrigidatio exteriorum, & caloris contractio ad partes interiores sub corde. Et trigesima particula eorundem ait: Timor quidem infrigidat manifeste: & manifestant hoc terrefacti, tremunt enim. FRAN. Quid enim noxij in se habet? ANDR. Galenus V. de acciden. & morb. Timor sanguinem calorem, ac spiritum reportat ad interiora, scilicet ad suam originem, & ad cor, atque exteriora corporis infrigidat: & in timore virtus animæ non confortatur. Et lib. de sympto. Timor est terror, qui turbat virtutem, & debilitat ipsam non minus aliis causis. FRAN. Inde processit illud Auicenna in Cant. dicentis: Timor incitat frigiditatem, qui quandoque magnificatur in tantum, donec ledat in ultimo. ANDR. At mæror exitiosior, ex quo complures sibi necem consueverunt, Galeno de acciden. & morb. sic asserente: Quibus accidit tristitia frequenter mortui sunt: & hoc pusillanimitas solet euenire: nam eorum anima debilis atque defecta extinguitur. Princeps etiam de materia tertij sic ait: Tristitia est causa corruptionis digestionis. Et Gal. V. de methodo medendi: Tristitia, & ira, & agonia, & sollicitudines quolibet modo nocent dissoluentes virtutem. FRAN. Frons semper igitur est exporrigenda, quoad eius fieri potest. ANDR. Modus omnium rerum est optimus: nam non minus nimia lætitia gestiens (si Ciceroni credimus) quam mæror exitio est. Princ. ij. primi: Multum gaudium perniciosum, nam ex eo ventriculi cordis sanguine euacuantur. Et Auerrou super Cant. Magnum gaudium est ex rebus impinguantibus corpus: quod si magnificetur valde & contingat, subito necat, & interficit, & maxime valde pingues. Monumenta literarum, Romaniq; cum primis annales id nos docent: Titus enim Livius post illam Cannarum cladem memorandam, mulierculas duas, quibus falso nunciata filiorum mors fuerat, statim sospiritibus eisdem visis, lætitia expirasse memoria prodidit. Anima igitur affectibus temperandum, teste Principe, sic dicente tertii primi cap. 4. In temperamento morum custodia sanitatis animæ & corporis simul consistit. Haliab. etiam in V. Theorica cap. ultimo sic: Gaudium naturalis est exitus caloris corporis ad exteriora, eiusq; diffusio, si quasi paulatim facta fuerit, animam habet confortare, caloremq; naturalem in omni corpore, & humores temperare, & sanguinem calorem naturalis temperantia, & calorem augere, nisi quod quando semel, subitumq; fit, aliquando interficit naturalis dissolutione caloris. Et Galenus V. de accidenti & morbo: Ex ira nullus vnquam mortuus est, ex gaudio autem quamplurimi pusillanimes. FRAN. Superest ut de inuidia differamus. ANDR. Inuidia nil aliud esse manifestum est quam boni alterius angere. Boni igitur hominis est inuidia omnino abstinere. Luxuria etiam tanta est scditas, ut nihil supra: quantum aliquando aliquibus corporibus opem præstare videatur: nam Cornelius Cels. neque nimiam indulgendum Veneri, neque nimium abstinendum præcipit: sed nos qui morbosis consulimus, ne sibiipsis, ac foemellis etiam maxime noceant, hac omnino abstinendum censemus. Nam Galenus Aphor. VI. ait: Coitus est fortis causa in generanda podagra. FRAN. Atque XXX. problem. philosophus: post Venerem, inquit, plurimi magis læti fiunt. Et Haliab. V. Theorica: Si spermatis superfluitas sui aucta in vasis coitu non purgatur, nec poterit tam expellere natura, in inguinibus fit & alii simul extensio, omninq; in corpore grauitas: saepeq; suis spermata calescit in vasis, fitq; febris: nonnunquam autem eius ascendunt ad cerebrum vapores, ubi & pessimos generant morbos. Et Haliab. Rod. III. Techni: Superfluitas aggregata in corpore ex spermatis

- quod non egreditur per coitum, obactatur in corpore. & generantur ex ea egritudines mala, & vapores mali, qui ascendentes ad cor & cerebrū, & stomachum, corrumpunt sanitatem illorum membrorum, & generant egritudinem. AND. Sed hoc totū superfuit atū est retentū: inde dicit Haliab. superfuit atū aggregata. FRAN. Princeps in Canticis, cōmendat eam etiam venerē iuueni, dicens: Coitus cōmendatur iuuenibus, quatenus per eum a nocentibus perniciosi liberantur. AND. Dixit ergo, tantū iuuenibus conuenit, eo quod iuuenes exuberent spermate: sed de superflua Venerē ne verbū quidem vllum fecit: nam prima tertij sic: Quandoq, accidit homini, ut in vasis seminalib. aggregetur sperma plurimū, & corrumpatur, & infrigidetur, & cōuertatur ad qualitatem venenosam: & quia fit hoc pluries iuuenibus, eisdem dixit venerem conuenire: nam cum quis appetit, non nocet: ut Almanforis IIII. voluit Rhafis dicens: Viri prater ea ac mulieres cum appetunt, coire debent: quod quidē faciunt natura nō repugnantes. FRAN. Modo ais, modo negas veneri indulgendum. Quousq, patier te isto modo differentē? Quin tu vno verbo dic: quid est, quod me prestare velis? AND. Ita faciam. Primum in hac re illud edico tibi, mulierosi corpus in deterius semper latet, teste Conciliatore diff. CXXIII. sic asserente: Coitus superfuit atū, & frequentia. omnē praxiam corporis acquiris dispositionē. Arist. quoq, IV. probl. Coeuntes exoluuntur, & infirmiores fiunt. Gal. 2. de spermate: Non solum a serosa humiditate priuari omnes animales particulas accidit ex superfluo coitu, sed & vitali spiritu. Es princ. XIII. tertij: Coitus est ex reb. magis nocentib. stomacho, & dimissio eius est ex reb. maxime cōferentib. Arist. etiā quarto probl. Plurimo coitu vtentes manifeste in oculis, & anchi patiuntur. Et princeps tertia tertij Cap. V. Multiplicatio coitus est res nocibilis oculo. Es Almanforis quarto: Qui coitu saepe vititur. oculorū habet concavitatē. Post repletionem superflua est venus. Haliab. V. Theor. Si cibo homo repletus aut potu coitu vtatur, debilitas eius fit corpori, eneruatio neruis, dolor in genibus, viscerū oppilatio, generanturq, abinde humores grossi. Cuius vsus si hoc fiat modo frequens, & assiduus. hydropisis sequitur, asthma, & tremor. Nam nihil obstat quod Paul. Aegin. lib. de tuenda valetudine, post cibū, & ante somnū precipiat concubendum, nam non nullā vult esse inter eos distantia, qua corpus neq, repletum, neq, vacuum dici possit. Idem etiam voluit: Gal. in arte medicinali, cum dicit: Tempus autē ad coitum opportunum est, cum in excessuum omnium mediocritate corpus fuerit constitutum. Cui assentitur Auicē. XX. tertij dicens: Et oportet etiā ne coitus fiat super repletionē, quia prohibet digestionē & debilitat: neq, coeat aliquis cum adest vacuitas, hoc est enim nocibilis, & onerosus nature & magis pernecans calorē innatam. FRAN. Sat habeo: sed dicas quaso, quanta temporis intercapedine inter coitum uti nobis par est: nec ab re se percunctor, scimus etenim quosdā singulos noctis vnius spacio formellas singulas iniisse decies, citra noxā. AND. Abeant ij, quos attulisti mihi, in malam crucem, cum hac sua intempestua venerē, nam mihi consilium non placet, aliorū explere luxuriam, mihi dum noceat, cum creberrimam agrotationes perniciose, senectusq, matura subsequantur. Vnde Cicero: Luxuriosa iuuentus maturā tradit senectutem. Item lib. de senect. Libidinosi etenim, & intemperans adolescentia affectū corpus tradit senectuti. Galenusq, in arte medicinali sic inquit: Venerē uti vero, iuxta Epi-curii sententiam, nullus est vsus salubris: re autē vera confert, si tantum interualli in earum vsu adhibeatur, ut neq, resolution aliqua sentiat, & ipse se homo quodāmodo senior factus melius spirare videatur. Quod caput est tandē sic habeo, nullam capitaliorē pestem esse, quam corporis insatiabile voluptatem. Sed ad curationē morbi Gallici redeamus. Seruatis igitur sex reb. non naturalibus, materia pituitosa digerenda videtur hoc syrupo: ℞ amaraci, saluie, origani, mētha, absynthij, eupatoriij, sumiterra, baccario, lauendula, calamenti, pulegij, thymi, saturie, sticados. sing. m. j. calami aromatici, zedoaria, diastamni albi, hermodactylorum, hellebori nigri, sing. ℞. j. Rheubarbari electi ℞. j. spica, squinantibi, sing. ℞. j. ex aqua vsq, ad mediū decoquantur, inde colentur, addanturq, syrups de fumo terra, de sticados, mellis ros. sing. ℞. iij. & fiant syrups vij. sunt qui errant, mea quidem sententia, nolentes haurire decoctionē, sed appetentes syrups ex aquis elaboratis. Quippe maiorem decoctionis vim comperi. Verum ut & illū morem geramus, ℞ syr. de sticados, oxymellis comp. mellis rosati, sing. ℞. j. B. aquarū saluie, lauendula, amaraci, sing. ℞. ix. & fiant syrups vij. vel ℞ oxymellis simp. syr. de sticados, de prapsio, de absynthio, sing. ℞. j. B. aquarū absynthij, prapsij, iua, melisse, & fiant syrups vij. Facta digestionē, ut ad extrahendā materiam procedamus, ℞ Rheubarbari electi ℞. j. agarici preparati ℞. j. aloes hepatica lota ℞. j. B. turbit gra. x. hermodactylorū gr. vj. gingiberis gr. iij. spica gr. iij. hac simul ex aqua saluie libra macerentur per noctē, deinde ad mediū cōcoquantur, postea colentur, & accipiantur decoctionis istius vnc. V. vel VI. secundum virtutē agrotantis, dulcorenturq, cum vngua tria, gingiberis, hermodactylorum, singulorum scrupulum, contundantur haec omnia leuiter, & infundantur inde aqua lauendula, vel amarici ℞. j. decem horarum spatio, inde cōprimantur: expressioni addantur, electuarij lenitiui ℞. j. diastamni, electuarij indi, sing. ℞. j. B. & fiat potio, additis mellis rosacei ℞. iij. Tertius iis etiam accedit modus. ℞ Rheubarbari gr. iij. aloes lota ℞. j. elect. lenitiui ℞. j. diastamni drachmam, & cum saccharo fiat pastillus. Ex quibus primum medicandum videtur? nunquid iis etiam adhibebimus, Auicē. testimonio fulti, dicens: Phlebotomia est euacuatio vniuersalis, qua multitudine euacuat humorum, multitudo vero est augmentum humorum super aequalitatem ipsorum in venis. AND. Recte tu quidem ex Auicenna: nam subsequitur Vgo de Senis, quod ista euacuatio vniuersalis intelligi debet ex humoribus, qui continentur cum sanguine in ipsis venis: & de his locutus est Princeps: quoniam humores extra venas secus naturam procedentes, potius sunt elidendi. Morbus igitur Gallicus a pituita, cum magis in iuncturis, quam in venis existat, sanguinis misio per incisionem vena videtur superuacua. Dicitur enim phlebotomia euacuatio vniuersalis, quod omnes vniuersaliter educat humores, & neque aliquem eligat. Pharmacum vero a forma specifica euacuans eligit illum quem sibi proprium est euacuare. Cum autem pituita sit in membrorum compagibus coaceruata, & indigeat portione, particulariter eligi phlebotomiam penitus relinquam. FRAN. Sententia tua non accesserim, tamen si sexcentos adduxeris sanguinis purioris hospitium, vtiliter in his morbis nimirum exhauritur. ANDR. Nihil agis, nam hac omnia minimo (ut aiunt) digito prosternam: nam quod tu dicis, re se fieret, si materia calida foret. Nam Rhafis sic VII. Alm. attestatur: Oportet autem cauere quantum possibile est, ne phlebotomia in tempore calidissimo, aut frigidissimo fiat: neque phlebotomiam ignominia causa distimulauerunt, quibus minime sanguis mittendus est. Nam princeps in corporibus, que profertis perpeffa sunt egritudines, cauendum esse a phlebotomia affirmavit. FRAN. Quamuis mea te exagitem sententia, assensior tamen: nam apud Galenum legitur, quod ij qui per totum corpus humorum multitudine grauantur, minime sanguinis missionem pati debeant. AND. Vtiliter igitur si pustula per totum corpus emerferint, sanguinem inter cutem pituitosum poteris per cucurbitulas extrahere. Nunc autem ad linimenta, qua huic conferunt morbo. ℞ radicem ebuli,

bedere, dictamni, gentiana, inula, bryonia, bermodactylorum, sing. manip. contundantur hac omnia leuiter, & ex vini cre-
tici lib. xij. ad tertiam decoquantur. Inde addantur am. traci, baccaris, camomilla, absynthij, hypericonis, laudula, ori-
gani, thymi, nepite, pulegij, calamenti, sing. m. j. s. iterum ferueant ed medium, inde accedat florū, rorifmarini, primula
veris, salvia, sing. manipulus, & bulliant leuiter vna paruo temporis interuallo, postmodum colentur, & pralo expressu
indantur, olei rosacei, camomillini, anethini, hypericonis, costini, sing. ℥j. s. alei terebintini ℥vj. resina pinea ℥ij. &
bulliant vsq. ad perfectam vini consumptionem, denuo addantur cum tolluntur ab igne, croci ℥ij. cinamomi calami a-
romatici, ligni aloes, styracis calamite, ladani, benzuin, sing. drachma, cinnabaris vncia, mercurij extincti vnc. vj. subli-
mati drach. iij. aruina porcina libra, cera quantum sufficiat. & fiat fortiter agitando linimentum. FRAN. Haec tamen
congruant, tamen quidpiam breuius desiderarem. AND. Mos gerendus est tibi. Igitur ℞ axungia porcina colligata a lib. j.
butyri recentis ℥vj. olei laurini ℥ij. olei vulpini, hypericonis, terebintini, sing. ℥. v. styracis liquidi eloti cum aqua ca-
momilla, & vino cretico, ℥ij. olei de sulphure ℥. iij. cinnabaris ℥j. s. mercurij extincti ℥vj. sublimati ℥j. cera quantum
sufficiat, & fiat vnctio. Quod si compendium magis affectas, ℞ axungia colligata libram, vnguenti Agrippa, marciato-
ni, olei laurini, terebintini, singulorum ℥ij. mercurij extincti ℥vj. sublimati ℥ij. & fiat in mortario illimentum: sed
istorum primum laudabilis, meo quidem iudicio semper fuerit. FRAN. Memini quosdam se dicentes suffitu, laconico q-
tantum sanatos. AND. Quamuis nonnullis id euenerit, multi tamen succubuerunt. Ideo, nisi cum de egrotō desperatum
fuerit, suffitus omnino sunt excludendi, teste Galeno, sic dicente: AEgritudo qua non habet nisi vnam viam ad curandum,
velit nolit infirmus, oportet quod per eam transeat, & primo Aphor. Hippocrates: Extremis morbis, extrema exquisite re-
media optima sunt. Quamuis non negauerim suffitus me tentasse successu laudabili, in hominibus videlicet athleticis: quō
quidem suffitus fuerint huiusmodi: ℞ Cinnabaris vnc. iij. myrrha, thuris sing. vnciam, aloes hepatica, sandaracha, styra-
cis calamita, benzuin, sing. drach. iij. misce. & fiat puluis crassior. Itē alioquin ℞ cinnabaris vnc. iij. myrrha, thuris, aloes,
ladani sing. vnc. j. contundantur in puluerem. & cum styrace liquido subigantur, inde fiant trochisci iuglandis magnitudi-
ne, qui singuli suo tempore sigillatim primum subditi collescant. Item ℞ cinnabaris ℥ij. s. auripigmenti, cadmea ar-
gentea, sing. ℥ij. thuris, aloes, myrrha, styracis calamita, ladani, singulorum ℥ misceantur hac omnia, & in puluere cras-
sum redigantur: erit enim hoc aliis potentius. Et si superius in athleticis tantum hoc fieri debere affirmauerimus, accidit mi-
hi tamen aliquando hoc fecisse felici successu etiam in corporibus delicatis, & debilibus: & fuit eiusmodi: ℞ cinnabaris
vnc. j. auripigmenti drach. ij. dictamni albi, toruenticilla, gentiana, ben albi & rubei, angelica, sing. drach. iij. sem. curi,
feno. acetose sem. ocimi, doronici, sing. drach. ij. cinnamomi, garioflorum, calami aromatici, croci sing. scrup. ij. thuris san-
daraca, styracis calamita, benzuin sing. drach. s. aloes drach. iij. redigantur hac omnia in puluerem, vel cum theriacis
formantur trochisci. Posteaquam male se habentes perpergat i fuerint, cubiculo claudantur, & sub conopæo nudi carboni-
bus accensis, in umbentes altius sedeant: quos semuncia pulueris praedicti, siue vnius trochisci sumus, nisi vis egroti diffici-
lius patiat, per horam torqueat: nec satis decidi potest, quoties id tentandum: ideo non alio mehercule pacto, quam si
eundem inueneris, id obseruare poteris. FRAN. Quod si anima defecerit? poteritne ager e conopæo tantillam caput educa-
re? AND. Recte quidem, modo ne sepius id fiat. Sed pergamus, qua cepimus. Quoties suffitus per diem sit tentandus,
corporis habitus, anni tempus, et aetate, sexusque poterant nos edocere. Sed vt fortius hoc ferat, initio cataplasma, quod
superius enucleauimus, est applicandū cordi, horaq. ante suffitum ota bina recentia forbeat affecti, aut cochlear vnum sym-
pi de corticibus citri liguriant, aut trochiscum confectionis eiusmodi vrent. ℞ pulueris electuarij Conciliatoris, pulueris
diamafsi dulcis, diamargaritonis, singulorum scrup. ij. inde cum aqua melisse, & saccharo fiant cum igne trochisci. Eui-
nit etiam plerumque, vt tam suffitu, quam vnctionibus vtentium bucca exulceretur, quibus ea poteris applicare reme-
dia, qua superius diximus: quamuis hoc addere non alienum putauerimus. ℞ rad. prunellorum syluestrium m. ij. cym-
sum rubi, rosarum, myrtillorum, sumach, cauda equina, sorbaria, pilosella, garioflata, millefolij, trinitatis, soliorum a-
laustri, ordei, balaustrarum sing. manipulum. treos, rubea fullonum, consolidae vtriusque, centaurae maioris, sing. drach. iij.
myrobalanorum citrinorum, conorum cupressi, sing. vnciam. Contundenda leuiter contundantur, & bulliant ex libris x-
que ferrariorum sabrorum, vini granatorum, succi cotoneorum, aque plantaginis sing. libra, ad med. um concoquantur,
inde addantur cum iam pene concoxerint, aluminis rocha vnc. ij. nitri drach. ij. diamoronis, mellis rosacei, sing. vnc. iij. li-
cij vnc. ij. haec colentur, inde expressum seruetur in vase vitreo, ex quo subinde sibi colluat os affectus. Verum enim vero ple-
rosque vidimus egrotantes, quibus os totum adeo deprauatum Empiricorum incuria erat, vt cancri speciem accessisse vnos-
quisque sana mentis dixerit: illis etenim quamuis superior gargarissatio consentanea fuerit, hoc tamen conducibilem arbi-
tratur. ℞ decoctionis praedictae lb. iij. vnguenti egyptij ℥ij. s. dissoluanturq. simul, inde frequentius os colluat. At si gin-
giuarum accesserit exulceratio, vnguento tawo prius egyptio perungantur eadem, mundificat enim cum primis, & vt se-
pius experientia comperi, redundantem malitiam reprimat. Quod si materia superfluitas medicamentu superius enarra-
ta, haud facile cesserit, cucurbitulis, clysteribus, lotionibus, frictionibus, sibilu non parum doloru ingerentibus, & ceteris
id genus est ab ore diuertenda malitia. FRAN. Post oris exulcerationem accedunt dentibus, gingiuarum mira discidia, vt
parum a casu abesse videantur. Adde spectaculum, quod etiam sputorum seditate contuentibus nauseam commouent, vt
non numerito tale spectaculum fugiant omnes. ANDR. Ita est: tunc hoc puluere non erit eū absurdum succurrere. ℞
squilla assata, pulueris leuissimi testacei, cornu ceruini vsti osu sepia, osium dactylorum combustorum, consolidae vtrius-
que, rosarum, sumach, sing. drachmam, cinnami, thuris, mastichis, sandaracha sing. drach. j. s. aluminis exusti scrup. ij. co-
rallorum rubeorum & alborum, sing. drach. iij. musci grana vj. Omnia redigantur in puluerem, ex quo frequentius cum
gingiua tum dentes fricentur. Superfluum fuerit de reliquis differere, de quibus satis dictum superius.

De morbo Gallico Melancholico.

A Pituitoso ad melancholicum nunc igitur deslectas oratio: quamobrem tibi persuadeas velim, malum hoc atrabile
commixtum, modo supercilia, modo craneū, nec non brachia pernasae, tuberibus durissimis, ab apostematibus, qua
Graeci schirrhos appellant, non dissimilibus infestare: quin etiam per totum corpus emergunt liuentes pustula verrucarum
speciem representantes. Sinistrum tempus per noctē male habet, inde vigilia, color plumbeus, inflammatio thoracis, debili-
tas stomachi splenis grauitas, aut dolor, aut durities vrget: vrina fertur alba, plumbea, siue subruffa, tendens ad nigrū co-
lorem: vena brachij exilis, & tardior: nigra excrementa deiciuntur: excreatio plenior: ructus sunt acidi: crura varices, in-
mor pedes inuadant, vt elephantiacos referant: quibus eadem fere confert viuendi formula, quam superius, cum de pitui-
toso differeremus, explicauimus: vt tamen non sit alienum, qua sequantur annectere. Si perspexeris igitur a fece sanguinis
in melancholicum versi hoc fieri, sinistra manus venam, quam saluatellam recentiores appellant, siue varicum, siue quatuor
saphenam vident, recte fundes. Praedicti etiam sanguisugorum ad atramentum, quae haemorrhoides Graeci vocant, applica-
tione.

ratio. Quod quidem si à biliosa adustione pendere videatur, sanguinis missio penitus fugienda decernitur. Cucurbitula etiam cum balneo, quando est error sanguinis crassioris, conuenire possent: quanquam Princeps quarta primi dixerit, cucurbitularum quidem iuuamentum in corporibus grossum habentibus sanguinem est paruum, quoniam ex istu non extrahitur sanguis sicut oportet: imo qui ex eo vehementer est subtilis: & hoc accidit quia resoluuntur Spiritus illius membri, & sic calorem naturalem debilitando, resolueno etiam de humido substantifico, membra debilitant. Huic obstat sententia Haliabhas, cum nouo Practica cap. V III. cucurbitulas melancholia conferre testetur. Hac quidem ratio bisariam d'strahitur, quippe & sine scarificatione capitis humores deriuando, cucurbitula melancholia conferre possunt, & ex balneo cutis incisione, subtilitatem sanguinem, qui prius fuerat crassior, recte exhauriant, cum aegritudines melancholica per totum fere corpus versantur. Unde Germani ganeis confecti, proptereaq, varicosi ac elephantiaci, hypocaustis inclusi, quibus sanguis crassior plerumq, subtilior fit, iu uiliter curantur. Quo fit, ut ex balneo non negauerim, melancholicis potissimum, (si tamen purgatis corporibus id fiet) scarificata prius cute, cucurbitulas. Optime sic ergo eos purgabimus. ℞ epithymi Cretensis, folliculorum sena, capillorum Veneris, florum boragini, buglossa, violarum, roris marini, melissa, sing. manip. rad. cent. aurea maioris, polypodij, rbeubarbari, sing. drach. j. succi scabiose vnc. iij. radices contundantur, & ex aqua ad mediam decocta diligenter exprimantur, instillentur inde syropi epithymi & sumiterra quantum sat est, fiantq, syrapi v. aut septem. Vel, ℞ syrapi de sumoterra, mellis rosacei, de lupulis, de epithymo, sing. ℥ iij. aquarum sumiterra, buglossa, lupulorum, melissa, sing. quantum sufficiat. & fiant syrapi v. aut vii. Quinetiam, ℞. syrapi intybi compositi, de epithymo de sumoterra, sing. ℥ ij. s. aquarum sumiterra, Capil. Veneris, buglossa, lupulorum, melissa, sing. ℥ iij. & fiant syrapi numero v. FRAN. Recte tu quidem. verum quod magis concupiscit animus meus, id rotices. AND. An dicitur syrupum, quo plerumq, sine vllis vntionibus, aut aliis eiusmodi medicamentis ad sanitatem perduximus quosdam male affectos? FRAN. Istum ipsum. AND. Quamuis in gurgustio cordis mei delituerit haecenus, ut ita dicam, tamen iubente protrahatur in lucem: nihil etenim meum tibi recedendum fuerit vnquam. Viuentibus igitur adhuc anguibus, posteaquam extremitates vtriusq, quatuor digitos mensura à cetero corpore gladio secueris, permittes totum sanguinem defluere, mundatas inde carnes, lauas aq, ter in aceto, tū liquore buglossa, citriariaq, suscipies theriaca optima vnc. viij. succi sumiterra, lupulorum, intyborum, buglossa, sing. ℔. ij. polypodij recentis corticis citri sing. vnc. ij. aloes hepatica vnc. v. hac omnia ex vitreo vase, per Balneum maria, in cuius fundo quantitas barena resideat, subdito vapore ignis, in aqua purissimas rediges, quarum tres vncias ager, addita vncia syrapi de corticibus citri, vel de epithymo. quotidie diluculo sumat. Iu syrapi à XL. die multos (ut pradiimus) Deo duce curauimus. Est etiam, quod imprudens silentio pene praeterieram, non praetermittendum, quo minus ager septimo quoq, die catapotia voret helbori, qua constabunt inferius, cum purgationes humoris melancholici te docuerit. ℞ igitur myrob. Indorum drach. ij. florum buglossa epithymi, singulorum manipulam polypodij recentis semanciam, contundantur haec prius, deinde ex sero caprino decem horarum spatio macerentur: sedulo expressu omnibus, addantur expressioni confectio Hamlech. drach. iij. diacatholiconis, di. asena, sing. drach. ij. succi sumiterra vnc. j. syrapi de epithymo vnc. v. fiat potio. Secundo modo ℞ electuarij lenitiui, conf. Hamlech, singulorum drach. iij. pulueris sena drachmā succi sumiterra vnciam, syrapi de buglossa, vnc. v. ex aqua sumiterra fiat potio. Vel, ℞ myrobalanorum Indorum drach. j. s. epithymi Cretensis, rbeubarbari, sing. drachmā: contundantur haec leniter, deinde die nocteq, in aqua sumiterra buglossa, macerentur, exprimantur, expressioni addas electuarij lenitiui, diacatholiconis sing. drach. ij. conf. Hamlech drach. iij. elect. Indi drachmā, syrapi de epithymo vnciam, hinc fiat potio. Nunc quoniam satis de potionibus est dictum superest ut de Catapotis agamus, qua superius tibi pollicitus sum. ℞ igitur rad. nigri veratri recentis drach. iij. dauci, anisorum, piperis, sing. drachmā florum buglossa drach. s. musci gr. vj. epithymi scrup. ij. contundantur haec omnia leniter, inde diem nocteq, ex vini cretici ℔. v. macerata, potenter exprimantur. Huius expressionis ℥ iij. pulueris pillularum sumiterra, cochiarum, aurearum, sing. drach. ij. s. suscipias, subagitesq, inde permittas exsicari: porro siccat & iterum in puluere redactas, ex eodem vino cretico macerabis, ut supra. & hoc quater. Catapotia autem eiusmodi sigillatim sumenda sunt drachma pondere. Quinetiam potest ingeri catapotium, quod ex precipitato conflat. FRAN. Quodnam hoc verbi est? AND. Est quidam puluis à mercurio conflat hoc pacto. ℞ aqua, qua aurum ab argento dissoluitur, ℔ iij. argenti viui ℔ j. s. hac vase vitreo, ore angusto, collo obtorto, vndiq, argilla praemunito, quod ab altero recipiatur, imponantur, compages inde vasorum luto sigillino sedulo obturentur, ad haec subdatur ignis ex carbonibus conflat, ut semper ingrauescat, eousq, quo tota defluerit aqua. Post haec phialam frangas in cuius fundo residentem placentillam rubeam leniter extrahens, quod album inhaerit proicias. rubeam vero in puluere redigas. Verum enimvero quoniam ex praeter ista plurima possent contingere noxa assumptibus ipsum, nisi prius debita fieret praeparatio, ℞ ℥ ij. praedicti pulueris, & macerentur per noctem in aqua plantaginis. & acetosa. singularum vnc. ij. inde summo mane aquas exhauriens, & nouas superinfundens, ad ignem in vase aeneo, siue testaceo colloces, seruies ferrea vel lignea spatula non cesses agitare, quousq, in puluere non difficulter omnia redigantur, ex quo poteris cum libuerit in morbum Gallicum tam pituitosum, quam melancholicum, catapotium tale componere. ℞ Electuarij Conciliatoris scrup. s. margaritarum, hyacinthorum, sing. gr. v. pulueris precipitati gran. v. pulueris diamusci, diamargaritonis sing. scrup. s. & fiant catapotia quinque numero, qua hora ante diluculum sumantur, inde lecto se contineat ager horas quinque, breui tibi crede, Gallici dolores, hoc catapotio elidentur. Pituita etiam & atra bilis vomitu, nec non alui deiectione euanescent. Ad haec sunt plurima marborum genera qua curamus tali puluere: nam non solum saniam carnemq, purridam delet aspersus, verum etiam non difficulter ulceram ad cicatricem deducit: pestilentiam etiam pauillo theriacis addito, succoq, tunecis herbae, quam Cardui benedictum vocant, siue electuario de gemmis, ante eius confirmationem mirum in modum fugat. Multos etiam lymphaticos, melancholicosq, quos à cacodemonibus incurvari vulgo credebant, eodem curauimus. Quid pluribus immoror? Quarrana confectos saccharo buglossato siue theriaca, mihi dicitur additis, facta digestionem aliqua, hora ante accessionem, quinque vel septem granorum pondere, pro etate. & prout corporis affecti, hoc puluere liberauimus. Quis etiam valet coli, & visorum doloribus adhibitus. nam quosdam stercus per os euientes sanauimus, Pauli Aegineta monumentis Princeps ij. Cant. capit. de argento viuo annotauit. Fascino idem aduersatur: pluribus ad haec virtutibus est insignis, quas cum plus oculi nactus fuero, tibi sigillatim connumerabo: fortasse tunc iucundissimum fuerit etiam explicare, quousq, vntiones virium maximarum differam. ℞ sumiterra recentis manip. iij. radices ebuli, buglossa, melissa, sing. manip. ij. retantur omnia cum libris duabus arumna porcina, ℥ x. butyri recentis additis: inde in vase sigillino vitreato loco virginis dies quindecim reseruentur, ut computrescant: inde liquefiant igne subdito: demum liquefacta colabis omnia ex linteolo: postmodum ℞ olei rosacei, camomillini, terebinthini, sing. ℥ ij. syrapii liquidi, ex aqua sumiterra

precipitatum.

puluis sigillatim praeparati.

psll. ex precipitate.

eloti ℥ iij. lithargyri argentei ℥ v. resina alba ℥ iij. mercurij extincti ℥ vj. sublimati ℥ iij. & fiat ex mortario vnguentum. Vel. ℥ radice hellebori nigri recentium libram, hellebori albi ℥ iij. radice arthanita vnc. vij. contundantur cum axungia & butyro, & vt supra denique omnia fiant. Inde accipe huius adipis libram, olei rosacci, capparis, terebinthini, sing. vnc. j. ℥ sulphurei drach. iij. hellebori nigri redacti in puluerem drach. iij. lithargyri aurei vnc. iij. styracis calamita liquidi ex succo fumiterre loti, ladani. sing. vnc. j. ℥ resina pinea vnc. iij. mercurij extincti vnc. viij. sublimati drach. iij. inde fiat vt supra. Vel. ℥ quatuor aut quinque nigros angues excoriatos, euisceratosque, decisis vtrinque extremitatibus, minutim concisos, quos vas vitreum oris angusti capiat, quod postea obturato ore ponas in caldario aqua refertum, hoc sinas diem noctemque seruere, postmodum repertum liquorem colabis: extractum qui fluxerit commisce libro ij. illius adipis confecti ex radicibus hellebori, & arthanita, addas mercurij extincti vnc. viij. cinnabaris vnciam, sublimati drach. iij. theriacis vnc. vj. & fiat vt supra. Seruabis hoc diligentissime: maioris etenim ponderis est, quam tu fortasse verus. Propterea consentaneum omnino fuerit olei sulphurati, cum aqua melissa, nonnihil agrum diluculo bibere: quippe quoniam, vt superius explicatum fuit, magnum ex eo percipitur iuuamentum. FRAN. Nimirum volo ne oleum hoc, quod tantopere collaudasti, intactum relinquant: In hoc etenim in presentia mihi sunt omnia. ANDR. Tibi nihil innotuit dixerim. Vitreum igitur vas tintinabulo (campanam hodie appellant) non ab simile, illi um figulari luto, à terra vniucubiti mensura, aneo vel ferreo filo suspendens, sub quo metretam vitream maioris circumferentia, cuius medio in versus fuerit cyathus, statues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorum quatuor latitudinis ex igne candentem sustineat, ex qua sulphur accendatur. Hoc dum comburitur recentius superaddatur: inde fiet, vt ex fumo ascendente suspensum vas breui temporis intervallo guttatim in inferiorem paropsidem distillet oleum, quod diligenter collectum, vitrea conseruabis ampulla: nam plurimi semper apud me ponderis fuit: nec me hercule iniuria, quippe non solum confert, huic morbo, sed haustum per hebdomadam, stomachi, intestinorumque torminibus ex materia ventosa frigidiorive prouenientibus medetur, splenis vitia corrigit, vulua, vrinaq, difficultatibus succurrit ex aqua amarisci, vel capli. Veneris quantitatibus guttarum sex. Quinetiam tres vel quatuor gutta ex aqua absynthij, lumbricos fugat. Item contra scabiem, impetiginem, lichenam, strumamque illinitum valet. Doloribus quidem podagricis frigidis mirum in modum fert opem. Præterea male curatis ex morbo Gallico, ad extrahendum vires eiusmodi potum vt ducimus plurimum prodest. Nunc autem mercurij, quem viuum argentum dicunt, vires tibi paucis absoluam. Auicenna secundo Can. frigidum & humidum esse dixit in secundo gradu. Paulus vero Aegineta calidum & siccum asserit in quarto. Verum nos cum Gebere, qui de rebus metallicis optime conscripsit, dicemus mercurium humidum & frigidum palam caliditatem siccitatemq, clandestinam in se habere. Probatum hoc ab eodem Gebere cap. de essentia mercurij cum dicit: In argento viuo similiter necesse est superflua demere, habet enim corruptionis causam terream, & adustibilem. Item libro secundo capite de coagulatione mercurij: Habet similiter sulphuris partes naturaliter sibi mixtas, quas remouere per artificium non est possibile. Quam quidem sententiam nobilis etiam Arnoldus agnouit, libro qui dicitur Rosarius philosophorum, dicens: Manifestum est igitur quod argentum viuum continet in se sulphur suum bonum fixum, ex quo coagulatur in aurum & argentum secundum diuersum disponendi modum. Et Arist. in Meteor. Argentum viuum est aqua, qua admiscetur cum terra nimis subtili sulphurea admixtione facti, donec non quiescat in superficie plana, & hoc est ex siccitate magna, qua inest illi, & ideo non adheret tangenti. Quibus omnibus satis constat, terram calidam siue sulphur esse calidam & sicca complexionis. Cognoscitur etiam hoc sua dissolutione, incisione, penetratione, atq, corrosione, qua quidem omnia caliditatem & siccitatem maximam ostendunt. Nam de eo Dioscorides proprio capite sic autumat: Virtus, inquit, argenti viui est homicidialis corrodingo intestina. Et Aggregator: Argentum viuum corrodit omnia, cui obuiat ex membris intrinsecis. Quod autem sit frigidum & humidum, licet per Auicennam hoc comprobari possit, apparet hoc etiam experimento. Cognoscitur in primis mira eius frigiditas per tactum eius, deinde per operationes, quibus agit in humano corpore: nam non legitime extinctus maxime repercutit, ac nervi, vt Auicenna asserit, dum tremorem stuporem, conuulsionem atq, paralytism causat, magnum affert discrimen: qua quidem omnia à frigiditate maxima, qua illi inest, eueniunt. Humiditate vero eius ostendunt superiores auctoritates cum dicant, quod est aqua viscosa. Nam & hoc non sufficeret, nisi quotidie ipsum videremus ossa corrumpere, carnemq, & nervos putrefacere, eorum scilicet agrotantium quibus Empiricus aliquis mercurium ipsum inunxit. FRAN. Hanc quidem sententiam aliqui minimi comprobant. & putrefactionem non tantum mercurio, verum totum morbi venenositate tribuunt. AND. Falsa quidem ratio ista mihi videtur. Nam si mulieres inspexeris, qua ex eo pigmenta conficiunt, vt pulchriores hominibus appareant, eis quidem dentes fere omnes tum cariosos, tum deniq, putrescentes inuenies. Concordia tamen hac Geberis auctoritate inter discrepantes de mercurio est imponenda. Inquit enim ipse argentum viuum manifestum est, quod mercurius appellatur: antiquorum vsu est aqua viscosa, substantia subtilis, alba, tincta, per calorem temperatissimum, vnita tali vnione per minima, quousq, humidum contemperetur à sicco, & siccu aequaliter ab humido, & quousq, calidum contemperetur à frigido, & frigidum aequaliter à calido. Galenus tamen in VIII. simplicium sibi nil de eo cognitum fuisse testatur, non alia me hercule de causa, nisi quod tanta in eo dissidia sibi coperta erant, vt non facile quid potissimum de eo scriberet inueniret. Inde sapientes Mercurio Planetarum instabilissimo, propter variam ipsius ostentationem, instabilitatemq, copararunt. Vnde recte Plato: Dotauit res natura proprietatibus, omnino enim quodlibet secundum quod mouetur à specie sua, agit quod proprium est: vtiq, enim nullius rei est actio propria, nisi qua species regulat. Verum hoc totum certificare (Mesue sententia) non est medici, sed illius qui se altius agit. FRAN. Sat habeo, verum quid ita in mercurium omnes medicinae Professores veluti coniurati styli acerbitate distinxerunt? AND. Nihil dictu facilius est: hunc namq, doctores compertis noxiis viribus, de quibus superius, merito videntur abdicasse: quamuis reuera sit innocens, modo recte extinguitur: nam qua superbiunt circumforanei, ac pleriq, alij, non extinguntur sed occultationem recte dixerunt: quippe cum horum vnguentum, in quo erit admixtum mercurij, nonnihil ex vase toto liquefeceris igne, in fundo coeunt mercurium liquido deprehendes. Inde fit, vt si quis vnguento tali fuerit imbutus, ad interiora progressus rursus coeat: nam naturalis calor facile in priorē viuacitatem ipsum restituit: quo fit, vt prona corporibus accidentia eueniant. FRAN. At vide quam insolenter se iactitent isti pharmacopola, quanto molimine circūferantur: diceret in his sit à mortali sanitate: quorum inscitia nuper chirurgus quidam summus meus aperuit: testatus est enim exturruisse osse corrupto, pumilionu cuiusdam, qui decies à diuersis Empiricis inunctus fuerat, argentum viuum non semel emanasse. AND. Hoc mihi nouam non est nam & operanti mihi sapius accidit. FRAN. Quoniam igitur pacto extinguitur? AND. Quamuis satis superius quod petis insinuasse me tibi crediderim, tamen non erit incommo- dum, hac eadem vel vltima explicare. Tantum igitur tibi persuadeas velim, verum mercurij extinctionem non aliunde pendere, præterquam à precipitatione: hac etenim via frigidit. & humiditatis sit expertus, quarum causa, quas superius diximus, egritudines procedunt: nec fieri potest vt precipitatione mortuus semel mercurium remoueat. Hac etenim arte frigid. & humiditate priuatus in caliditate

de sulphuris.

Argentis tibi vras.

Extinguendi Mercurij

differtur. Ideo dicebat Rhafis Albanus. V. Argentū viūū quando extinguitur ardens est & corrosiuū & tale est cū precipitatur: nā male olentia vlcera corrodit, & mūdificat sine dolore: quod si alioquin extinguitur, idem non efficit, sed potius repercutit. FRAN. Quid ergo? iū argenti viūū extincti memineris, vtiq; de precipitato intelligi vis. AND. Etenim, nō enim repercutere morbos ad interiora melior, sed omnino purgationibus prius deducere, tum vnguento mundare. Verum dum istū immeror, cataplisma sparadrappum imprudens praterieram, quod brachiis & tibiis decem diebus applicatum, sine vllis vnctionibus morbum Gallicum delex. FRAN. Expecto quid hoc sibi velit. AND. Recipe igitur emplastri de pelle arietina, quod in quibusdam herma doctores applicari precipiant, vnc. iij. emplastri triapharmaci ad ignem confecti, diachilone maioris, singulorum vnc. v. l. resina pinea vnc. ij. liquefiant has ad ignem, & cum infrigidari cōperint, mercurij extincti vnc. v. cinnabaris vnc. ij. sublimati vnc. iij. addantur, & longo temporis interuallo spatula citra ignem commisceantur, & (vt mos est) ex linteolo fiat (vt ita dicam) sparadrappum: hoc tibiis à genu, brachiis vero à cubito, donec signa remotionis aduenerint, applicetur.

Cataplisma Sparadrappum

De morbo Gallico à quocunq; humore contracto.

FRAN. Es si diffusus hucusq; de huiusmodi morbo vniciq; humorum admixto differasti, vellem tamen vt potum illum, quem tibi secretum ascribis, quo quidem etiam vnumquemq; morbum Gallicum recenter contractum fugas, mihi propalare digneris. Hoc te tamen egre ferre non permittas, cum ego tibi non solum corpus ipsum, verum & vitam iam dudum dicauerim. AND. Deceueram omnino mi Franciscē nemini secretum hoc vnquam aperire: tibi tamen virtutum tuarum munere, etiam maiora dicere non dubitabo. Cum igitur aliquem ab eiusmodi morbi iaculis recenter vulneratum offenderis, ipsum eiusmodi pharmacam quadraginta dies absorbere iubebis. Assumitur enim calidum in aurora. pondere sex vnciarum provice. ℞. igitur myrobalarum emblicorū, belluicorum, Indorū, sin. vnc. florum boraginis, buglossifaradicis, ipsarum florum violarum, cicorea, camomilla, singul. manipulum, succorum sumiterra, boraginis, endiuie, buglossa, lupulorum, sing. vnc. iij. succi pomorum dulciam vnc. VIII. vna thymia, iuiubarum, prunorum sebesten, singul. drach. X. liquoris munda vnc. ij. polypodij quercini, sticados. rad. acori, sing. mani. j. B. seminis fœniculi dulcis drach. ij. scolopendria, capillorum Veneris, callitrici, polytrici, sing. manipulum, folicalorum sena, epithymi, sumiterra. singul. vnc. i. agarici boni drach. XVIII. hellebori nigri drach. XIV. aquarum intybi capill. Veneris, sumiterra, buglossa, sing. ℞. iij. vini granatorum ℞. B. radicum inula, hadera, fœniculi, apij, cicorea sing. vnc. j. B. chamapityos, sticados, chamadryos, sin. vnc. squinantibi drach. ij. eupatorij drach. iij. rheubarbari drach. iij. addita aqua pluuiali quantum sufficiat, arte & igne bulliant omnia postmodum linteolo spissiori colentur, preloq; exprimantur, & addito saccharo quantum sufficit, fiat potus longus. Vnaquaq; tamen decimo die dum pharmacam hoc assumpserit ager, accipiat ad materiam expellendam vnc. ℞. istius conf. ℞. turbit, hermodactylorum, ruta agrestis, singul. drach. iij. diagridij drach. iij. gariof. gingiberis, cinnamomi sing. drach. ℞. piperis gr. ij. squinantibi, spica, epithymi, salis gemma, singul. drach. ℞. sandalorum citrinorum, alb. rub. crocei singul. scrup. j. manna electa vnc. ℞. rheubarbari drach. ij. zedoaria scrup. ij. sacchari vnc. VIII. & cum aqua buglossa ad ignē fiant trochisci. Scias enim pro certo, multos hoc remedio fuisse sanatos. Reliqua vero superius explicauimus.

De curatione morbi Gallici per lignum Indicum.

Sed quoniam quemadmodum in edele ducerentur ab extincto mercurio, atq; ab omni genere pharmacorum, satis explicatum arbitror verbis superioribus, sequitur vt hac ligni Indici medicamenta persequar, quae pertinent ad novos medicos, quibus vt vultur homines nunc potissimum, se tutius curari sic arbitantes. Lignum igitur quod alij Indum, alij vero Guaiacum, nominant, ex Taprobana, America, Indiaq; petunt nostratibus medicis interuallo locorum minus comperitum est. Quidam purarunt Auicennam secundo canonis indictione Karon, hoc lignum rememorare, dicentē: Karon est lignum Indum, cuius allatio ad terram nostram multiplicatur, & est magni iuuamenti in negotio fracturae, torsionis, & distentionis non ab re fortasse, nam Princeps ex Arabia genti Indorum propior erat. Quamuis Roma, mihi sub Hadriano VI. Pontifice Max. degenti fratres ab India cucullati exulceratarum tibiatarum remedium quarenti affirmarint iureiurando lignum duodecim cubitorum altitudinē explere, crassitudine vlnarum duarum, folia plantagini non dissimilia, corticem cū nigrum tum subcineritium, flores luteos, fructus rotundos, acidos, quorū species oliuae figuram redderent, haberet. Praterea morbum Gallico similem, medicos illius ora discutere viridi ligno, ex quo, quod nigrum corticem gereret, palmam haberet. Nos quoniam viridi caremus, cariosum dimittentes, id eligimus, quod aqua non innatet, propinquius radicibus. Medicis valentius comperitum est, quod in superficie sandalorum citrinorum colorem medio nigrescente referat. Idem crocum debilius admodum, fœminis & pueris reseruant, cuius naturam vinq; cum nemo satis recte descripserit, ad vnguentum cognoscere quis potest? quamuis ab vsu caliditate, siccitateq; manifesto deprehenderimus, cum eius decoctum bibentium guttur & stomachus patiantur incendium. Superioribus etiā diebus siccioris habitudinis homines vidi, morbo Gallico laborantes, ligni potatione cum ethicam febriculam, tum tamen incurrisse. Resina praterea gummi non absimile ab eo in igne proiecto, flammis obnoxium, emanare videtur, nec non decoctio prima eius pinguis, & crassa colorem lactis referens, magnum corpori nutrimentum praestat: vnde bibentes quamuis inedia torqueantur, rariū fame vexantur. Postremo per euaporationem ab eo non modicum manat oleum. Cum sit igitur omnibus persuasum, resinas omnes, oleumq; fundentes arbores, caliditate & siccitate esse non expertes, idem de hac arbore possumus assignare. At hoc (vt cunq; sit) non laboro modo, nam à proprietate (vt asseruimus) in eiusmodi morbo videtur agere. Noui enim medicum quendam, dicentem agros potius medicina inedia, quam ligno sanitatem receptam referre debere. Qui tamen frustratus est, cum quercus decoctionem eadem inedia nullo successu cuidam dedisset. FRAN. Diebus istis, sicut iam prius, non videtur huiusmodi lignum male habentibus conferre: nam pleriq; eius decoctum assumentes: non sanantur. AND. Euenit hoc exhibitura canones eis exhibent. Peruerso igitur ordine ruunt omnia. FRAN. Ex eo olei conficiendi rationem, quam iam dudum pollicitus es, expecto. AND. Hoc igitur ligno tesseratim conciso, nouum fictile refertum vas, operculo testaceo punctum perituro obturet, quod diligenter argilla circumlitum, excipiat altera testa vacua, terra desossa ad os vsq; superiori desuper spacio desluat oleū: & postea aqua deserbuerint, aperiens, offendes obrutam refertam aqua oleo innatante: quo si papulas, exulcerationes, tubera, compagum & neruorum dolorib. inunxeris, iuuamentū non modicū praestabis. Aqua vero oleo subdam confert: magis tamen si syrupus accesserit eiusmodi. ℞. rheub. elec. vnc. ℞. radicum centaurea maioris drach. ij. spica, squinantibi, sin. scrup. ℞. ligni, aloes, sandalorum rub. sin. drach. j. B. radicum hyringi vnciam, herba tunecis mani. ij. sem. ebulli

Olei ex ligno Guaiaco conficiendi ratio.

drach. iij. hellebori nigri drach. florum cordialium, sticados sing. mani. ij. Omnia contundantur leuiter, & ex vini cretici, aquarum intybi, & sumiterra, sing. lb. iij. dies octo macerentur. postmodum decoquantur ad tertiam, inde pralo exprimantur, expressioni sacchari quantum sufficiat addatur, & fiat syrupus, cum quo predicta destillationis vnc. iij. siue hgni decoctionis de qua dicemus vnc. V. bis in die, summo mane scilicet, & inclinato iam sole bibat affectus ante cibum quatuor horis. Quod si decoctionem volueris audire, paucis absoluam. ℞. Guaiaci concisi lb. ij. B. aquae pluuiae lb. XXX. ex quibus frustula biduum macerentur, qua noua vitreata testa cooperculo praedita capiat ad bulliendum lento igni: spuma calida, quae interea fit, patientis vlcera curantur, membrorum compagibus dolore percitis eadem vt iliter adhibetur, ac etiam tuberculibus. pustulisq. operam asserre videtur. Facta despumatione lignum praedictum decoquas. quousq. super sit tertium. Cum autem tepuerit, linteolo spissiore coletur, conseruetur quod inde fluxerit vrnula vitrea bene obturata, ne scilicet vni evanescat. Huius decocti pro syrupo XL. dies diluculo quatuor horis ante prandiu, nec minus inclinante ia sole quatuor horis ante cenam, vncias quinq. sigillatim tepidas bibat. Ad haec libra XXX. celestis aqua ligno prima decoctionis accedant, vt ferueant eadem olla recta cooperculo, quousq. libra XX. tantum fiant, & ritu prima decoctionis in vase oris obducti seruentur, hanc poterit affectus, cum sitiuerit, siue tepidam siue frigidam sumere. Quod superest, si primam decoctionem cum syrupo rheubarbari praedicto biberit affectus, citius valebit. At si vinolignum incoquere placuerit, maiori cum utilitate curam efficies. Nam in pituitosis felici successu ego saepius periculum feci. FRAN. Quid hoc? Percepi a peritioribus medicis ligno isto curantibus, affectos in hac cura vinum bibentes nullo pacto sanitatem adipisci. ANDR. Recte tu quidem, at non minus ego, cum decoctionem ex aqua morbo si biberint. Verum enimvero vinum decoctionis eiusmodi nullo pacto obesse poterit, efficitur enim ex concoctione medicina valentior, quod adhuc neminem tentasse puto, at ego saepius in frigido morbo felici successu periculum feci. FRAN. Sequere igitur. ANDR. Recipe Guaiaci recentis concisi & electi, lb. ij. rheubarbari electi drach. ij. radicem centauriae maiorem drachmam, solicolorum sena manipulum, squiniantia scrup. B. contusa haec omnia ex libris XX. vini albi odoriferi, & eius aquae dimidio biduum macerentur, inde decocta coletur, non alio mebercule pacto, quam quo superius est dictum: hoc sine praecedenti syrupo vti poteris. Ad hoc Rec. Guaiaci recentis lb. j. quam ex vini albi leuioris lb. XV. per diem macerabis, ita vt postea bulliant omnia, quousq. restent lb. X. tunc infundas desuper aqua fermentu lb. XV. quae simul cum vino bulliant, quousq. libra viginti tantum reliqua sint. Postmodum coletur, seruenturq. in potum prandentisq. cenantisq. affecti. Sic curabis quos non solum victus tenuitas, sed et aqua austeritas terret: neq. absurdum fuerit autumni tempore concisum lignum quindecim diebus cum vuis ad bulliendum ponere, nam nonnullos ex huiusmodi potu sanatos percipies. Is etiam optime consultum fuerit, si post decocti potionem ante prandium spatio vnus hora, cochlearis dimidii illius electuarij abligurierint. ℞. Ligni praedicti subtiliter pulueri, & tunc vnciam, sand. rubr. ligni aloes, thymi, florum buglosse, boraginis, ocimi, sing. scrup. j. pulueris diarhodonis abbatis diamusci dulcis, diambra sin. gra. X. & cu syrupo de corticib. citri in pituitosa materia, vel cu syrupo de cicorea composito in sanguinea quantum sufficiat, ex arte tu fiat electuarium. Verum vt res quam tractamus ad calcem tandem decurrat, de regimine sex rerum non naturalium summam dicemus. Hos igitur oportet diebus viginti bis die tantum comedere, nil aliud assumentes, quam panis recocti binas vncias, accedat vna thyminia praeterea tantundem, bibant aquam siue vinu decoctionis secunda praedicti ligni. Transactis hisce diebus panis albi bene fermentati sine sale clibano tosti vnc. ij. tantundemq. carnis aut asse aut elixa, pullorum gallinaceorum, siue aucupij ex syluis & montibus petiti prandeant, carnent vero thyminias vnas, recoctumque panem, ad trigessimu diem. Quae transacta duas vncias panis albi, carnesq. praedictas ponderis eiusmodi, & prandere, & cenare recte poterint. Cubiculum quo se continet ager, per astatem orienti sit expositum: per hyemem tepidarium, vel locus maxime clausus, vbi continue lignoru boni odoris fiat ignis. Nec inde egrediatur nisi a quadragesimo die: nocte dormiat horis sex. aut ad summum septem. Diluculo primam ligni decoctionem ex aqua cum illo syrupo, siue vini absq. syrupo bibat, statimq. lecto cubans peristromate, vestibulq. sudorem promouet, quem calecentibus linteolis, posteaquam satis superq. desudauerit, abstergat. Inde subucula, vestibulq. pellicis munitus, linteo capite obuoluto, praecedens hora spatio praedictum, surgat, tum lotis manibus, facieq. mundata, decoctione prima ligni, nares & aures purget, deambulans per cubiculum: cui si aluus suppressor fuerit, balano mellis, chystereue ex prima decoctione ligni, addito sale, oleoq. camomillino & violaceo poterit eandem ciere, quo reddito statim prandeat: pransus quiescat, legat, aut ludat, meridianum somnum pro virili declinans: angore nec minus reliquos animi morbos fugiens, exhilaretur. FRAN. Recoctum panem iadudum ingessisti mihi, nec quis sit satis explicasti. AND. Imprudens praetieram. ℞. pollinis farinae triticeae quantum volueris, non sine fermento congruo, quam subactam quatuor digitoru crassitudinis quoquoersum, longitudinis duarum spithamaru in pastillos formabis, decoques in clibano vsq. ad non completam coctionem, extrahes deinde, & posteaquam deserbuerint, acutissimo cultello poteris in tenuissimas partes secare, quas ex aqua rosacea, & saccharo prius maceratas, in tabula sigillatim collocabis, furnoq. iterum mandabis, vt legitime concoquantur. Porro priusquam praedicti ligni decoctum sumant, pro morbo phar-
cis & syrupis superius enarratis sunt muniendi: quin et si morbus exposulauerit, sanguis prius erit mistendus. Verum posteaquam ad quartum decimum diem peruenit fuerit, sumas pituitosus, post die eius diei purgationem hanc: ℞. agarici preparati, turbit electi, hermodactylorum, sing. scrup. j. gingiberis scrup. B. hellebori nigri grana V. contusa per noctem, ex aqua absynthij, melissa & sumiterra, exprimantur, expressioni socientur electuarij lenitui drach. iij. conf. Hamech, diasme, sing. drach. j. & fiat potio addit rhodomellis vncia. Vel. ℞. polypodij quercini drach. iij. sem. ebuli contriti drac. j. solim-
lorum sena, epithymi, thymi, sticados, amaraci, asari, florum salviae sin. pugillum, fiat decoctio in qua colliquefiant electuarij lenitui drach. iij. confectio Hamech, electuarij Indi sing. drach. j. B. agarici preparati scrup. B. trisera persica scrup. j. syrapi de fumo terra vnc. B. fiat potio: quam trigesimo etiam die iterum dare tibi erit expediens. Quod si Gallicus adhaerit sanguini, hoc pharmaco poteris vti. ℞. rheubarb. electi drach. ij. B. ex aqua intybi & vino cretico, cum natu spica: permanceant sex horas. haec omnia superioribus liquoribus infusa, deinde facta forti expressione, diacatholiconis addatur drach. iij. elect. ros. Mes. drach. iij. de succo rosarum drach. B. & cum decoctione florum, & fructuum cordialium fiat potu, addita syr. violacei vncia, quem hauriant cum quinta decima, tum etiam trigesima luce. Qua die purgationes hae exhauserit, carnes elixas prandeat, eiusdem ponderis, eiusdemq. qualitatis: nec minus pane vescatur, ex iure carniu praedictarum: bibat ius tantum eandem, die vero sequenti iterum redeat ad ligni potationem, quam supra saepius meminimus. Transacta quadragesima luce liber alius poterit hunc habere. Postridie parum e cubiculo procedat. Qua sequetur die domo pedem efferre poterit, statim cubiculo se tamen restituens. In sequentibus diebus, gradatim sic se habens, negotia sua breui peraget, cum eo tamen vt diutius cibos sanguinem adurentes, in stomacho putrescentes, pituitamq. gignentes auerferat. Sed quoniam cum his qui ligno curantur actum fuerit optime, si in esicam, aut in tabem non inciderint, non esset absurdum, dieb. ex actis quadragesima restant adatum viru gratia per mensem quotidie duabus horis ante prandium
cochlearis

Electuar. ex pituita ligni.

haec omnia in aqua quantum sufficiat, postmodum conterantur & incernantur: indantur deinde arungia porcina, olei
 de lilio, butyri recentis. sing. vnc. ij. frumenti triticei vel siliginei vnc. iij. alij decocti sub prunis vnc. j. B. farina frumenti,
 fenograci, seminis lini, sing. vnc. iij. ammoniaci dissoluti in aceto vnc. iij. & conficiatur emplastrum: nec expectandum
 quousq; cuius summa per se deducatur, tanta etenim est morbi malitia, ut affectum locum in Carcinoma plerunque sua
 malignitate precipitet. Satius igitur fuerit scalpello iam nigroscens aperire, quod prae paravimus facta incisione prima de
 albumine oui, ac pulueribus conducibilibus, inde per tres vel quatuor dies digestivo de terebintina. & ouorum vitelli, in-
 de hoc utemur mundificatio: R. terebintina clara ex aqua sumiterra, vnc. iij. vitellos oui binos, mellis rosacei, syrupi
 de sumoterra, sing. vnc. ij. farina orobi vnc. iij. thuris, mastici, aloes hepatica, sing. drach. ij. rad. peucedani drach. j. & fiat
 mundificatio. Si volueris virium maiorum mundificatione, accedat unguentum apostolicum: vel si adhuc maximam,
 Aegyptium. Attamen hoc vnum scias, precipitatum mercurium cum aequali pondere aluminis exusti commixtum, miri-
 fice mundificare. FRAN. Quid? ad cicatricem obducendam valebit idem? ANDR. Non, sed triapharmacum cera-
 tum opem prestabit: vel hoc, quo valentius nihil est, administrabis. R. rosarum, myrtillorum, balaustrarum, caudae equi-
 nae, seminis plantaginis, singul. manip. j. myrobalaorum citrinarum, conorum cupressi, sing. vnciam mediam, acacia, hy-
 pocistidos, sing. drach. iij. Haec omnia prius contusa, tribus diebus macerentur in aceto fortissimo, postmodum in co bul-
 liant quousq; medietas evanescat, tunc quidem praelo exprimantur, expressum deinde cum oleo rosaceo & myrtino co-
 pulabis, lithargyrio minioq; additis, ceratum ad ignem conficies, addita turtia semuncia. FRAN. Plerunq; fieri solet, ut
 a morbo Gallico ulcerationes sordidae, corrodes, spongiosaeq; sapis ossa corrumpant: his quibus remediis obuiam eu-
 dum fuerit, explana mihi. ANDR. Bisariam procedit haec curatio: nam si ligno ab Indis petito curare fuerit consilium,
 pluribus diebus precipitato pulvere mundificanda sunt ulcera. Nam quamuis ipsius potionis materia peccans evertatur,
 tanta est tamen materia ulceribus coniuncta malignitas, ut nisi quis optimus operarius accesserit, vix possint ad cicatri-
 cem deduci. At si per unctionem suffitumae procedis, ea tamen prius, quae ossa penetrarint, curare oportet ulcera, corro-
 siva quippe, cavernosa, quaeq; his similia. Ad ossa non accedentia, unguento suffitumae delentur sed os corruptum omnino ab-
 radatur, cauterioq; inuratur, iuxta illud Avicennae. iij. quarti, Capitis de corruptione ossis sic dicens: Necessesse est fricare
 ipsum, & radere, aut cauterizare, perueniendo ad ultimum corruptionis eius, ut cadant cortices corrupti, & remaneat
 sanum. Itaq; cum certissimis argumentis ossis vitium deprehenderit, aut incisione & cauterio poteris operari, aut caute-
 rio tantum. Sane in obducti ore ulcere spongioso, corruptioriq;, nouacula penetrandum erit vsq; ad os incidendo car-
 nem affectam, quae diligenter vringat, postea diducta, linimentum ex albo ouorum, & pulueribus obducentibus cicatricem
 per vim infarciatur: inde fiet, ut postridie eius diei subiciatur os totum nostris oculis vitiatum, quod cum videris, bene se-
 canti ferro putredinem cariostam diduces, & sanam a vitiatum separes: inde candenti ferro, carne madida stuppae prema-
 nita, os vstulabis: Si vero latius patebit vlcus, carnem prius incidere fuerit inconueniens: nam cute deficiente, non po-
 terit nisi frustalim, idq; difficulter ab osse diduci, non sine maximo sanguinis fluxu. Sat erit igitur candenti ferro, quod
 minima fiet sanguinis missione, carnem ad os vsq; vitiatam comburere, tunc n. ex linamentum eiusmodi medicamentum cura-
 bit, quod combustum fuerit. R. vernicis liquidae drach. iij. ex aqua solatri siue plantaginis, vitellos oui tres, butyri recentis vnc. j.
 olei rosacei, emphacini, violati, nenupharini, sin. drach. ij. Misce simul omnia haec, & fiat unguentum, quod locum vstulati mi-
 rum in modum confert. At vlcere circumstantes particulas triapharmacum ex oleo acetosae, rosaceo, ac lithargyrio, in mortario
 plumbis subiecto ad restringendam cauterij vim illinies: quam operationem si quis reformidauerit, poterit quorundam sententia
 euphorbij puluerem eodem peruenire: sed mihi quidem non sit verisimile ut in profundo ulcere valeat is, aut eiusmodi quippiam,
 praeter cauterium, quod curans D. Angelum, Illustriss. reuerendissimiq; Cardinalis Tridentini et arch. Fiscalem, deprehen-
 dit, qui quamuis hoc morbo minime teneretur, ex calce tamen equi plurimo tempore spacio contracto, & inueterato vlcere
 laborabat sinistro crure. Multa medicorum manus, satis honesto conducta salario, ex circumvicinis civitatibus ad eum
 frustra confluebat: quo factum fuit, ut is salutem pene desperans, mihi se curandum tandem tradiderit. Postridie eius diei,
 quoniam vlcus eiusmodi a cute & carne fere spoliatum erat, quinq; medicis astantibus, vitiosam carnem cum osse corru-
 pto cauterio concremauimus. Difficile dictum est, inter curandum quanta fuerit viri constantia coniuncta prudentia: enim-
 vero, (quod dictum citramuidam fuerit) C. Mario praestantissimo viro aquauius non solum Angelum, verum etiam me-
 rito praetulimus: quippe qui non solum teneri se noluerit, sed crus immotum nullo doloris argumento prabuerit. Sed ut ad
 rem redeamus, patuit quamobrem remediis caeterorum nunquam cessarat malum: ad medullam namque peruenerat vitium
 morbi, circumvicina quaeq; corruptens: quod tamen omne quicquid erat in eo noxij, deo dante, duorum mensium spacio
 curauimus. FRAN. Huius etenim cura argumento innixus, tantum mihi pollicor breui confore, ut nostrates non solum
 verum etiam praestantissimos quoq; medicos antecellas. ANDR. Agnosco miram animi tui in me inductionem, qua sit, ut
 nostra tibi maiora videantur, quibus (ingenue dicam) laudari a laudato viro, virtutesq;, quas ne agnoscam quidem, mihi
 tribui facile patiar. FRAN. Sapim sauces palatumq; vidimus affectorum malignis vlcerebus, serpentibus, exesiq; teneri,
 quae quo pacto sint oppugnanda, vellem libentius abs te audire. ANDR. Fiat ut vis. Recipe igitur aqua cuius virtute aurum
 ab argento diuiditur. ℞. ij. rosaeq; byssiam, sing. ʒ. iij. inde misceat. Aut. ℞. aqua saponis ʒ. iij. vitreoli romani ʒ. iij. sa-
 lis ammoniaci ʒ. j. vitreolum & sal diuantur optime, & fiat aqua. FRAN. Qui fieri potest ut aqua quas dixisti partes
 vlcerebus circumstantes non ledant? ANDR. Styli lignei summitatem tomento circumligabis, quae madefacta ex aquis su-
 perius enarratis illinies vlcera, quae cum ceperint mundari, os affecti sibi colluant ex aquis consolidantibus, quas superius tibi
 pluribus explicauimus. Quin etiam pustulis verrucosis eiusdem morbi plurimum confert, nam decidunt statim, resoluunt-
 urq;. FRAN. Solent plerunq; durissima stantes glandulae agrotos male habere, quibus quid apponendum sit scire deside-
 ro. ANDR. Inprimis illud scias, istorum tuberum duas esse species, quorum altera carni adhaerescens diaquilone magno de-
 gummis, alijsq; discutiuentibus emplastris cum per resolutionem, tum quidem per suppurationem curantur nonnunquam. 60
 Altera procedens ab osse difficillime sanescit, nisi cauterium adhibueris: quam curationem cum pleriq; auersentur, caute-
 rium potentius adhibeas, quo quatuor horarum aut quinq; spacio dolore modico urgente macerabitur, ac destruetur ca-
 ro. Recipe igitur aquae prima, quae sit sapo lb. iij. vitreoli romani, vitri, salis ammoniaci, sing. vnciam: quae diligenter vna
 dissoluta, ex testa decoquantur ad sordium crassitudinem, tunc adde opij thebaici vnc. j. B. deinde torreantur igne tamdiu,
 ut lapidescant: effusa autem lapillas adherentes obturato vase vitreo conseruato, quippe noxius est aer aduentitius, quo
 statim in aquam conuertuntur. FRAN. Apicem tuorum in me immortalium meritorum hoc addidisti: quo fit, ut nihil
 aliud abs te nunc expectam, nisi ut sapiam ad te accedam, quo tempore omnes circa morbos ex viridario tuo fructus colligere
 possim. ANDR. Libentissime quidem, ut prius cognouero auditorem attentum te praestitisse. At nunc reliquum
 est tantum, ut curandi corporis necessitate ad conuulsum te cedamus.

INDEX EORVM QVÆ IN ANDREÆ MATTHIOLI POSTERIORI- BUS TRACTATIBVS, NIMIRVM EPISTO- lis, Apologia & de Lue venerea scripto, continentur.

A.	
A bies in Centro Saxei montis in lapidem conuersa 142	Amaracum nō est Parthenium 13. & Sampsuchum idem ibid.
Abietina resina praestantia 139	Amaranthus est Helicbrysum Diosc. 19. non est Chrysocome ibid.
Abscessus pulmonis num per vrinam purgetur 46. & 49	Amaranthus furinam frugem ex messe aliena in suū transfert horreum 10. eius vulpina religio 10. stros passerculū referens 30. Centuria sunt sabulosa 33. ad Iudaismum desciuit 84
Abysso Scripsiū examinatio 192. Eius caput Dioscoridi pluribus in locis esse deprematum ibid.	Ambrosia Matth. 34
Acacali 24	Ambubeia 81
Acacia legitima nos destituit 192. Quid eius loco supponendum ibid.	Amicitia vinculum certissimum est consensus consiliorum & voluntatum 159
Acaciam alteram Matthioli non esse asphaltum 170 eius historia ex Dioscor. 173. nihil aliud est quam spina Aegyptiaca ibid.	Amni veruni 190
Acanthium Matthioli. 182	Amomum 182
Aconitū pardaliches homines aque ac pardos & lupos necat 171 ex Plinio omnium venenorum est ocysimum ibidem.	Amomum ex India in Lusitaniam assertur 10.
Aconitum 37	Amomum legitimū nec Matthioli nec Medicus quiuū aliu vidit 190. Quid eius loco substituendum ibid esse plantam racemiferam ibid. eius descriptio ibid. Optimi nota 192
Acorus 21. Acorus & Galaga sunt diuersa ibid. est calamus aromaticus ibid.	Amperlam Matthioli genuinam esse oxycantham 170
Acorum legitimum pro Amomo substitui 191	Amygdala duorum generū 138. amara quomodo fiant dulces 138. quomodo inscripta nascantur 139. dulcium facultas ibid. viridium facultas ibid. amararum facultas 140. amara necant vulpes, anseres & galinam 140
Adeps Galeno quid 73	Amygdalus sterilis vt forax reddatur 139. facile degenerat ibid.
Adoreum semen est tritici genus. 53	Andreas à Lacuna Dioscoridem in Hispaniam linguam vertit 158
Adipem seu sebum que animalia gignant. & qua axungiam 72	Anemones vires 96
Adulatio maxima amicitia pestis 159	Angelica costo simili 188. pro costo in Theriaca supponi potest ibid.
Aegrum & agrotum esse num inter se differant. 224	Angelica semen 197
Aeris tria genera Plinio 80. Squamae duae species Diosc. ibid. Squama nigra ibid.	Animalia hyeme delitescunt cur pinguescant 92
Affectus animi immoderati à naturali gradu corpus deiciunt 228	Animalia , qua in medicum vsu veniunt, haudquaquam veneno necanda 172
Agallochum odorem reddere etiam si nō suffiatur 173	Antirrhinum 122. eius quatuor genera 123
Agaricum 187. In agro Tridentino copiosum reperiri ibid. Optimi nota ibid.	Anthophylli 200. Saitaragi secundum genus ibid.
Agaricum vires suas in pastillis conseruat 30	Antidotus Mithridatis à Democrate descriptus ceteris praestantior 213
Ageratum Dioscoridis est verum Mesua Eupatorium 123	Antirrhinum 39
Aglaiphotis terrestris Aeliani 88. Gesu. 93. vbi & quomodo colligatur ibid. eius vires ib.	Antora siue Antitora 105
Agriculturam apud antiquos in magna fuisse existimatione 137	Antoram siue antioram esse legitimā Zedariam 201. praclarissimum contra venena medicamentum ibid.
Aiacis in hyacinthum conuersi fabula 52	Antora 144. eius vsus ibid.
Alaternum fol. 213	Antyllis 35
Alcyonium Milesium Turci vocant Bozetb 104	Api figura mutata 163. eius & pistati figura 169
Alca unde fiat 53. eius tria genera 53. differt à ferro 23	Apium orientale 183
Alisma Matth. 36	Aqua nostrae non est extreme frigida 70. eius qualitates 68
Aluum sylvestris 88. caninum Tragi ibid. alverium canini dicti descriptio 98	Aqua sortis 175. regia 175. aurea ex vino parata 176
Alus. 44	
Alumen lamen à Persis dictum 101. est chalcantum seu alumen scissile 104. eius tres species ibid. liquidū sit plumosum, ex plumoso scissile 113	
Aluum 34	
Alutic quid. 87	
	Aquileia non est Thalictrum 123
	Arabes Medici res diuersas confundunt & vnam diuersas faciunt 92
	Arbores omnes resinas oleumque fundentes caliditate aliqua & siccitate poliere 233
	Arbores quando fecundiores 77
	Arbores in siliquis mel ferentes 76
	Arboris nota propria ex Theophrasto 170 quae perpetua coma virent 146
	Argemone altera non est Argentina recentiorum 30
	Argentum viuum quid 231. Eius vires ibid. Cur planeta Mercurio comparetur ibid. Quomodo extinguatur ibid.
	Argentum viuum contra vermes tuto dari posse 158. datur parturientibus ibid. lauitur ibid. solum aurum admittit, cetera metalla respuit omnia 180
	Argentina 182
	Argillada est Pseudocasia 106
	Aristolochiam tenuem esse Clematidem 193. Eius loco longam vel rotundā supponi posse ibid.
	Aristolochia clematis non est longa vulgo vocata 68
	Aristoteles quae fuerit passus 151. in humana sapientia ad miraculum eruditus, idem ibid.
	Aristoteles vnicum naturae miraculum 84
	Arnabo Pauli & Auicenna Zarnabū representat Serapionis Zarnabum 98
	Artemisia Matth. 16. eius genera duo ibidem. differunt crassitudine & magnitudine 17
	Artium bonarum calami 152
	Aram Cyrenis aedime vacat 111
	Aspalathum non est Aloe nec Santalum tubum 12
	Asplenii foliorum diuisio 167
	Asperitas quid 166. Asperum quid ibidem
	Asphaltus Iudaicus 193. vbi nascatur 195. Quid in huius defectu in theriaca sit sumendum ibid.
	Aster Atticus 157
	Aster Atticus fol. 214
	Astragalus 37
	Atrachylis 34
	Attinia fol. 214
	Attrachylis 190. eius loco Carduum benedictum substitui non posse ibid.
	Aues leuissimum praebent alimentum 73
	Auicenna notatur Epist. lib. 2. 96
	Aurea Alexandrina vsu 202
	Auri dissoluedi modus per 27. fortem 175 alius modus Vlstadi 176. vis in salibus consistit 177. per oleum salis communis 177
	Auri potabilis simplicissima conficiendi ratio 176. ex ol. salis parati facultates 177
	Auripulus Auicenn. 128
	Autipigmentum 39
	B.
	Balanocastanum & Bulbocastanum 94. eius

I N D E X.

descriptio 86. facultates	93	nera secundum Arabes	75	Clematidis alterius altera species	fol. 214
Balsamita	61	Capreoli plantarum quid sint	62	Chymenon	fol. 214
Balsamum etiam Theophrasti tempore fuisse adulteratum: 87. Nouum balsami genus ibid. Opobalsamum	ibid.	Carbones fossiles	142	Cneoron non esse Thymeleam neq; chamaeleam 134. & 172. vtrumq; Theophrasti & Cneoro Dioscorid. & Galeni differre ibid.	
Barberia Antiquorum	75	Cardamomum 101. 21. 112. 113. amomo similitudine Plinio 114. Græcorū ab Arabico differt ib eius tria genera 104. minoris nota 114		Coccognidiam	58
Bdellu legitimi nota	105	Cardamomum esse duplex	192	Colchicum	38
Behen album rubri radices sunt 105. Bisfortia seu colubrina	105	Carlina alterius radices in acetariis haberi	169	Color subalbidus & subniger qui sine	21
Behen loco in Aurea alexandrina quid eligendum	202	Carnabadium, Zarnabo, Arnabo aut idem sunt aut substitui possunt 92. eius vires ibid. examinatio	98. 102	Color melinus qualis sit 68. vnde melinum dicitur	ibid.
Beléviou quid?	211	Carnabadium non esse Doronicum nec cuminum Aethiopicum	202	Condimentum ex amygdalis pro ferinis carnibus	139
Beluedere	fol. 214	Carolus V. Imp. in cœnobio et hortis vixit 137		Conserua	183
Bezabar lapis	104	Carpesium Galeno quid 22. & 112. 114		Consiligo 124. & 126. eius examinatio	126
Belzoinum	214	Carpobalsami vice quid substituendum	192	Corchorus	fol. 214
Beta syluestris	fol. 214	Caryophyllorum festuca Saitaragi primum genus	198	Coriandrum	35
Betonica duplex	122	Carum	63	Corydalis	fol. 214
Betonica	fol. 123. & 173	Cassia & Cinnamomum non est vnius plantae cortex 156. mutatur in Cinnamomum non contra 133. Virgib; est Cneoron 172		Costus	134
Betonica prima Pauli que fit	118	Cassia odorata 189. Optima nota	ibid.	Costum. 188. Legitimum non haberi ibid. Amatum	ibid.
Blattia Byzantia 101. nihil aliud esse quam vnguem odoratum	104	Castanea equina	125	Cotonea mala esse Antidotum ad venenatae sagittas	127
Boletum ceruinum	145	Castanea in glandium numero habenda 94. equina	101. 104	Cotule Elephantina vnde afferantur. 137. Cur à Germanis ita vocentur ibid. ab Italicis bacca orientales	ibid.
Bolus Armena orientalis	106	Castoreum selectissimum vbi reperiat 193		Cotulam foetidam non esse Parthenium	17
Bolus Armenicus verus non est terra synopca 133. orientalis vnde afferatur	157	Catanance	173	Coulcoul & Hebulben nucleus 102. est Staphylo dendron	104
Borufforum doctorum latex	135	Cataplasma sparadrappum	232	Cratonis exhortatio ad Matthiolum 132. eius consilium laudatur à Matth. fol. 133	
Botryn theriaca compositioni non esse addendam	191	Catapotiolum è cynoglossis facultas	212	Crocodilium non esse idem cum Carlina 31	
Bozath 101. est Alcyonium Malesiam legitimum	104	Cauda vulpina	197	Crocum esse praestantissimum in Austria 188	
Briou Marinum Plinii	138	Causas morborum cur Medici nonnunquam ignorant	85	Cretamus aculeatus	138
Eritanica	36	Centaurium maius & minus 198. Marinum ibid.		Cubeba 22. Nostras Cubebas non esse veras Arabum, nec legitimum Galeni Carpesium 192. vulgares baccarum generibus sunt ascribenda	ibid.
Bryonia radix Epilepticis confert	129	Centaurium minus	193	Cucumer satiuus	14
Buglossum vulgare non est Cirsium 19. vulgare	20	Chalcanthum igne torrefactum pro chalcitii supponi posse	191	Græcorū quid sit 15. in Lusitan. raro videtur ibid. à curuore dictus. Varro ibid. vulgaris satiuus ab erratico fructu tantum differt	ibid.
Bulbus esculentus & Ascalonica capra non est 30		Chalcitis	145	Cucumis anguinus est syluestris 16. vulgaris non est Pepo	ibid.
Bupthalmium Cordi	124	Chalcitim, sory, Misfy, melanteriam in Misynia plurimum haberi	191	Cuminum syluestre 69. pauci legitimum cognoscunt 54. eius genera plurimum differentia ibid. Aethiopicum carnabadium esse Fuchsius negat	92
Burungi examinatio	198	Chalcitim & Chalcanthum ex eodem metallo, easdemq; habere vires	191	Cycean Hippocratis quid?	145
Buxus syluestris	198	Chamadrys & Chamaptyis	190	Cyclaminus altera	30
		Chamaleo niger	197	Cynobati qualis fructus 60. fructus quo patet colligendum ib. à Rosa syluestri differt ib.	
Cacalia	fol. 213	Chamaleon albus & niger 31. & 117. 118. 64		Cytisus	197.
Calamus odoratus	125	Chamaleones 125. albus 162. eius examinatio 168. nigri examinatio	169	Cytisus	fol. 214
Calamus odoratus 10. vnde deseratur 11. non est legitimum ibidem. verus vbi proueniat ibid. vulgaris est acorum	103	Chamaefyce	fol. 214	Cytisus 12. cur eius imaginem Matthiolum in commentario non appinxerit	122
Calamum odoratum non esse eam radicem, qua sub eius nomine vtuntur Sephasia 195 pro eo in conficienda theriaca quid substituendum	ibid.	Chelidonium minus 62. conuenit cum Anemone 86. in Graecia acie in Italia non	111	Cytisum esse arbusculam non herbam 111. eius imaginem cur suo loco non monstrauerit Matthiolum	ibid.
Calami lapidei non sunt calamus aromaticus	105	Chesmezen est Acacalis Bellonio 101 non est Acacalis	104	Cytisum Dioscoridis esse Melilotum officinarum	109
Calamintha	187	Chirargorum insectia	224		
Calamintha	32	Chondrus Græcis quandoq; alicui designat 53 est Zea genus 27. est nomen generale 53.		D.	
Calculos in iecore facile gigni posse 184. è selule per aluum quandoq; externi	ibid.	Chodrilla est cicborii species 28. differt à Cicborio	ibid.	Dactyls	197
Callyphyllam Hippocratis	144	Chrysanthemum	39	Dauci loco in Theriaca quid supponendum	129
Cancamum 58. eius vires	ibid.	Chrysitis	19	Daucus 66. eius species	ib.
Canes, eademer a veneno intercepta detorantes in rabiem agi	172	Chrysochama	19	Decoctorum vtilis consideratio	69
Canceri fluminales	26	Cibi optimi qui sint	73	Demosthenes qua perpeffus fuerit	151
Cancram frequentibus medicamentis purgantibus curauit Galenus	128	Cicero qua perpeffus mala fuerit	151	Dendromalache	144. & 145
Capitis doloris causa	217	Cicuta vt interficiat	171. & 172	Destillandi scientia Medico necessaria	180
Capitorum humanorum ad ductilia reddenda metalla magna vti	176	Cinamomum 22. eius plura genera	23		
Caphura non est frigida contra Mauritanos	137	Cinamomum 187. quid eius loco supponendum	ibid.		
Cur frigidis medicamentis miscetur ibid. non est aliquo d genus bituminis	ibid.	Circea	fol. 214		
Cadburya viua 102. est lacryma 104. eius ge-					

I N D E X.

<p>Dialia Santalou 205 Dittamnus albus non est Tragicum Diosc. 134 & 137. in Creta solum nascitur 173 Dittamnus Cretensis alter 32. & 65 Dittamnus 119. Optimi nota ibid. Dioscorides simplicium parens 83 Dioscorides exactissime medicam materiam pertractavit 149 Diluentum quodlibet, si coquatur, vires amittit 205 Discentium conditionem esse duplicem 89 Dolichus 28 Doronium Orientale non est Arnabo Pauli 98 Doronicum non est Aconitum 171. non est venenosum 172. eius examinatio 171 Doronicum Europaeum ab Orientali differt 87. dulcissimum 91. veterum a vulgari no- stro differt ibid. vulgare non est Mamiras 86. 97. legitimi facultas 97 Doronicum 199 Drabe caput in Dioscor. esse adulterinum 170 Drys Gracis significat glandiferas quascun- que stirpes 125 Dubitare de incertis virtuti potius quam vi- tio ascribendum 62. de difficultibus licet 56 Dulcibianum Mamira est 86. & granum 28- lin differunt 87 Dysenterici frixu & torrefactis alendi 31.</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>Elaeis duo genera 25 Elaine 181 Elaeagnos 211. Eius historia ibid. Elaemeli 23. non desunt ex palmarum cau- dicibus 23. 29 Electuarij e sebesten parandi ratio 214 Elect. ex Guaiaco 234 Elect. restaurans vires a gall. lue reconva- lescent 235 Elephantiasis quid 220. & 221. unde dicitur 221. dua species 26. prognostica ibid. Ellebori nigri altera species 126. succo sa- gitte illinuntur & venenata redduntur 127. eo sanantur quadrupedia peste labo- rantes 127 Elleborine 182 Elleborismus 120 Elichrysum 197 Eliseth seu herba Gladiolus 101. & 104 Eliseth & aurum potabile idem sunt 177 Emplastrum album Democratis 12 Ephemeron 38 Epilepsie puerorum medicamentum 158 Equiseti plures species 198 Erica 24. bis in anno fleret ibid. Erica ut arceantur 141 Erulita 28 Eruum sanguinem ducere potest 174 Euphorbium 67 Exercitia curationi gall. ci morbi plurimum conferunt 224</p> <p style="text-align: center;">F</p> <p>Faba crassa 19 Fabaria non est facultate Telephij 135 Fallopij laus 94. & 95 Far quid sit 27. unde fiat 52. 53. ex omni fru- mentorum genere durissimum ib. ubi nascatur optimum ib. gracis non inno- tuit ib.</p>	<p>Fel decrepiti senis lapideum factum 185 Ferdinandi Archiducis Austria laus 211 Factum nutriti sanguine menstruo 107 Feniculum barbaricum 199 Fraxinus in Hetruria nascitur 135. eius ligni scabs non est venenosa 174 Fuchsij laus 21 Fucus Marinus fol. 214 Fumaria duplex 122 Fungi cervini historia 145. vires ibid.</p> <p style="text-align: center;">G</p> <p>Gagates 39. ubi reperitur maxime ib. Galanga 36 Galangam maiorem non esse Acorum 202 Galbani optimi nota 193 Galenus quae mala sustinuerit 151. negli- genter legit Dioscoridem 44. parem non habet in Philos. & Medicina 45 eius non esse librum illum, qui de substitu- tis mandatis inscribitur 192 Galiopsis 174 Gallicus morbus a quocumq. fouetur humore 220. non est Elephantia ibid. Potest Ele- phantiae accedere 221. cum sola pituita non complicatur 222. ab epate dependet 226 Caroli Francorum regis tempore emerfit 226. quae membra primo inficiat ibid. ex anhelitu etiam quandoque contrahitur ibid. sola contagione grassatur 223. non est Mentagra Gallica luis biliosa signa & curatio 225. pi- tuitosa signa 226. ex pituita falsa, ibid. ex pituita cum sanguine complicata ibi. Melancholica signa 230 Gallina 27. Belgarum malum praebet ali- mentum ibid. Gallorum superbia & vanitas 226 Gargarismus 225 Gaudij commoda & incommoda 228 Geber Chynicorum princeps 176 Gelsiminum 112. & 198. eius examinatio 114. & 173. Gentianula 182 Geranium 213. bulbosa radice 125 Gnigidium 29 & 181. non est Cherophyllum ibid. non esse Cherophyllum 196 Gladiolus herba seu Eliseth 101 Glandes omnes haemoptoica conferunt 94 Glaucium 33. & 102 Glaux Matth. 182 Glycyrrhiza vulgaris non est Dioscoridis 112 eius fructus aculeatus 115. duplex ib. eius succus 187 Gnaphalium 214. & 35 Gnidium granum non est Cnori fructus 18. 134. e Thymelea provenit 172. Gramen harundinaceum 37 Granum Zelin Dulceghinum est legitimam 97 Granum Alzelinum 92 Gratiola febrib. quotid. & tertianis spurqs conducit 121. non est Eupatorium 123. vo- catur stanco cavallo 123 Guaiacum unde offeratur 233. eius vires & usus ibid. eius decoctum potantes non omnes restituuntur ibid. eius parandi</p>	<p>ratio 234. in vino utroque utiliter potest ibid. decoctum biliosis & melancholicis gallicis minime conuenit 222. & 226 Guaiaci decoctum non conuenit omnibus gal- lica lue affectus 68. eius paradratio ibid. cur longa opus habeat coctione 69. exal- facit ibid. quib. admiscendum in biliosis affectib. 70. decocto directoria semper ad- miscenda 129 Guilandini ignorantia in Eben rubro cen- sendo 134 Calumniam in Cedro explodit Matthiol. 134 in Amello manifesta inscitia 135. Apolo- gia 133 Gummi è pruno syluestri vel cotonea malo, vel austero ceraso in Theriaca compositio- ne probatur 192</p> <p style="text-align: center;">H</p> <p>Habzelin quid 97 Halosanthon est sperma ceti 113. Opinio Matth. 114 Harmala legitima 106 Harundinum radices quales sint 21 Haematites lapis 97. eius nota 105 Hedychroi genuina parandi ratio 194 Helenium 210. 211 Herba Diui Guilhelmi 183 Herba tinctoria 106 Herba venera cur quaedam dicantur 21 Hermodactylus 106 verus 113. non est Epheme- rum Colchicum ibid. Hippocampus 14. quid sit ambigitur ibid. Hippocrates ex Ione genus duxit 151. quae in- commoda sustinuerit ibid. Hippocelinum 203 Hirci tres in Bohemia reperti lac praebentes 141 Hircinum lac Epilepticos sanat 141 Hirculus herba 190 Hirsutum & scabrum idem non est 166. & asperum non est idem ibid. Holoconitii Hipp. est dulcichinum & differt a Molyo 87 Homerus vnicus ingeniorum omnium fons & victor 87 Hordeum 45. 48 Horminum 35 Hyoscyamum album non vidit Matth. 114 Hypericum 192. eius flores quales sint 67 Hypocystu 190. Non esse fungum ibid. Hysopus 65</p> <p style="text-align: center;">I</p> <p>Iacobus Syluius in Gal versatus 36 Iasmini oleum ex Leucon flor. paratur an- tiqui 114. eius facultas ibid. Iecur esse totius sanguinis purioris hospitium 229. Iecoris praeternaturalis magnitudi- nis causa 134. Hircinum Epilepticus con- fert 141 Ielenabin Mauritanor. est mel rosatum 25 Imperatrix herba 56 Inguina iecinoria & splenis esse Emissaria 215. lxx. 57 Inuidia quid 228. cum virtute nascitur 7. vi- tus suam non in obscuros sed excellentes vires eructat ibid. Inunctio pro gallico morbo sanguinei 225 Ira quid 228. ut ab odio differat ibid. Iris plures habet species 197</p> <p style="text-align: right;">X X A Iris</p>
---	---	--

I N D E X.

<i>Iris Illyrica</i> praestantia ceteris 187	<i>ibid.</i> quae vitanda <i>ibid.</i> caducorum remedia 141	<i>Narcissus</i> Theoph. nec Colchicum Diosc. 88. vocatus Eringium & Solanum scopiferum a Diosc. <i>ibid.</i> est ruta hyl. 92 eius descriptio 98. non est holoconitum 99
<i>Iuncus odoratus</i> 189. & 102. de eo monachorum error <i>ibid.</i>	<i>Mamiras</i> & <i>Bulbocastanum</i> esse diversa 90. eius historia <i>ibid.</i> earundem cum chelidonio virium 91. eius facultates examinatio 96	<i>Montani laus</i> & incommoda quae sustinuit. 151
<i>Iuniperini ligni</i> scobs venenosa non est 174	<i>Manardi laus</i> & incommoda quae perpeffus est 151	<i>Morbi Gallici</i> Chirurgica curatio 235. per lignum Indicum 233. sanguinei signa <i>ibid.</i>
K.	<i>Mandragora</i> eradicatio 93	<i>Morbillis</i> cur & adolescentes & senes interdum tententur 107. quidam citius quidam tardius afficiuntur 108. quae etate ut plurimum fiant. 108. eorum causa 109
<i>Kaly bist.</i> 18. prabet alumē vitrariorum <i>ibid.</i>	<i>Manna</i> semen 124. vbi colligatur <i>ibid.</i> a pastoribus substratis pellibus legitur 76. eius & rosarum deiectionem facultatē ignoravit Galenus 128	<i>Morborum genera</i> multa, quorum causa & natura ignorantur 222
L.	<i>Marantae</i> laus 165	<i>Morochthus lapis</i> vbi reperitur 113. & 115
<i>Lac scissile</i> 27. quomodo paretur <i>ibid.</i>	<i>Marum legitimum</i> 196. Quid eius loco in Theriaca compositione sit sumendum 195	<i>Musa.</i> fol. 184. Eius imago. 197
<i>Lacca Arabum</i> 23. vbi gignatur <i>ibid.</i> duplex <i>ibid.</i>	<i>Marrubium</i> 188	<i>Mumia</i> an in Medicum vsus veniat 217
<i>Lagopus</i> 36	<i>Martagon</i> 84	Esse duplicem. <i>ibid.</i>
<i>Lamphana</i> fol. 213. & 61	<i>Martiapanum</i> facultas 134	<i>Myle</i> Galeni Co Moly Diosc. 92
<i>Lappago</i> fol. 213	<i>Maslach</i> 105. 102	<i>Myrepsij Codicem</i> Graecum innumeris scaterere mendis. 191
<i>Lapis Armenus</i> 106. eius examinatio 116. color <i>ibid.</i> a caeruleo in quibus differat <i>ibid.</i> non dandus pueris 158. quae quantitate sumendus <i>ibid.</i>	<i>Matthioli laus</i> 83. aduersarios duum esse generū 152. eius virtus & doctrina 154. 155. eius commendatio 149. ofores 150	<i>Myrica</i> duo genera 24
<i>Lapis philosophorum</i> 179	<i>Mauritanis</i> Medici plurimum debent 130. eorum scripta vitium scitent 57	<i>Myrrha.</i> 187. Eius selectio. <i>ibi.</i>
<i>Lapidis in homine</i> generatio quomodo fiat 184. tū gignentia omnia in iecore etiā esse 185. amygdalae nucis magnitudine in iecore mulieris esse repertum <i>ibid.</i> in humano felle gigni <i>ibid.</i>	<i>Meconium</i> ab opio differre 186	<i>Myrtinum</i> ol. 58. quomodo paretur.
<i>Lapides concrefcere</i> 142. quantumcumq; laeuigatos nihil ab innato colore immutari posse, 203. in lignorum loco ad ignem quae vtantur 147	<i>Medicamenta</i> clementia quae dicantur 128. Electiue purgantia quae? <i>ibid.</i> clementia in morborū principis cum utilitate propinari <i>ibid.</i> Electiue purgantia cum clementioribus mixta quid prestare possint 129	N
<i>Larix</i> Plinii 146. nostra eadem cum antiquorum <i>ibid.</i> ardet, contra Plin. & Vitru <i>ibid.</i> & 183.	<i>Medicina</i> praestantia 148. & 149. Eius partes 223. partem ἰλιχίν seu φαγμαδτικὴν ceteris esse praeserendam 149	<i>Napellus</i> Moysi. 144. & 145
<i>Laserpitium</i> 67	<i>Medicamentorum</i> similitudo plures fallit 98	<i>Napi semen</i> 186. domestici semen praestantius contra venena quam hyluestre <i>ibi.</i>
<i>Laurentius Phrysius</i> minus recte de gallico morbo scripsit 223	<i>Medica materia</i> duae partes 149	<i>Naturam</i> plurimum variare fol. 169
<i>Laus</i> ex alterius ignominia male petitur 132	<i>Medium</i> 181	<i>Narcissus</i> hyacinthus bulbi. 183
<i>Latitiam</i> nimiam gessientem non minus quā mororem exitio esse 228	<i>Melancholicis</i> an conueniant cucurbitula 232	<i>Nardi Indicae</i> optima nota 189 In huius despectu Celticam substitui posse. <i>ibid.</i>
<i>Lens</i> aquatica altera fol. 213	<i>Melanteria</i> 39	<i>Nardus</i> Celticus 190
<i>Lentiginum</i> remedia 184	<i>Melanthium</i> pro Burungi non esse sumendū 199.	<i>Nebulonum</i> scophantarumq; munus 139
<i>Leonice</i> laus 151	<i>Meleghet</i> 22. non est Cardamum <i>ibid.</i> vnde nomen <i>ibid.</i>	<i>Nicol.</i> Myrepsicus diligenter scripsit de medicamentorum compos. 75
<i>Lepidium</i> & Iberis <i>Maranta</i> 170. vna & eadem planta <i>ibid.</i>	<i>Melilotum</i> 197	<i>Nigella</i> citrina 22. quid 64. vnde dicitur 22
<i>Lepra</i> quatuor species 21	<i>Melochites</i> lapis vulgaris genuinus non est 116.	<i>Nihil</i> tam esse prauum & ineptum quod non suos reperiat admiratores & approbatores. 156
<i>Leucacantha</i> 32. & 65	<i>Mellis</i> optimi nota 193. Quale in componenda Theriaca sit eligendum <i>ibid.</i> vetustate amarescere <i>ibid.</i> propriū eius esse, ea, quae illi admiscetur seruate incorrupta 204	<i>Nitrum</i> 105. & 125
<i>Leucoium</i> Attici lasmen vocarunt 114	<i>Menstruus</i> sanguis qualitate peccat 107. eius malitia <i>ibid.</i> in quatuor diuiditur partes <i>ibid.</i> non est simpliciter venenatus <i>ibid.</i>	<i>Nux</i> Aegyptia 102. & 105. Farfalach. 102. & 105. vomica & Metella 81
<i>Liber</i> de Theriaca ad Pisonem non est Galeni 45. & 51	<i>Mentagra</i> nomen vnde? 223	O
<i>Ligni</i> in Armenium lapidem mutatio 142	<i>Mentha</i> Sarracenicā 188	<i>Obesorum</i> corpora asiduis purgantibus medicamentis extenuari. 129
<i>Ligusticum</i> 161	<i>Mesues</i> in componendis medicamentis primas tenet censura in Lusit. 43. 74	<i>Ochra</i> 39. quid significet <i>ibid.</i>
<i>Lilium</i> conuallium 122. non est polygonati species 123	<i>Metallica</i> corpora omnia fere calcinata solui per reiterationem calcinationis 176	<i>Ocimi</i> tria genera 62
<i>Lithospermum</i> 36	<i>Meum</i> 190. vbi nascatur <i>ibid.</i> ab Apulia Imperatricem vocari <i>ibid.</i> an legitimum sit 9. eius species secundum Plin. 56	<i>Ocimum</i> Bedarungi Aphria. 199
<i>Lonchitis</i> aspera 125. & 213. vera nota <i>ibid.</i> similitudo cum asplenio 162. & 165	<i>Mixa</i> 197	<i>Oenanthe.</i> 183
<i>Lotus</i> arbor 126. vrbana 38	<i>Moly</i> Homeri est Cynospastum seu aglaophetis terrestrius <i>Aliani</i> 88. non est	<i>Oenanthe</i> herba 35
<i>Lucas</i> Ghinus alter Dioscorides 125. eius laudes 118		<i>Olea</i> hyl. est spinosa 60
<i>Lupinus</i> Hispanicus 123		<i>Olei</i> eiusdem Matthioli multiplex utilitas 193. ex ligno guaiaco consciendi ratio 233
<i>Luxuria</i> aliquibus corporibus nonnunquam opem praestat 228		<i>Oloconitis</i> Hipp. est Moly Diosc. 92. eius examinatio 96
<i>Lychnis</i> 34		<i>Olyra</i> 27
M.		<i>Ononis</i> flore luteo duplex. fol. 214
<i>Macodonicum</i> , esse <i>Petroselinum</i> Macedonicum 203		<i>Onosma</i> 35
<i>Macer</i> 24. 58. eius duo genera 59		<i>Opera</i> laudanda non opus 48
<i>Macerona</i> 182		<i>Opium</i> , quod passim habetur, non esse genuinum. 186
<i>Macis</i> 190. & <i>Macer</i> differunt 24		<i>Opopanax</i> ex Heracleo tantum profuit 36
<i>Malabathrum</i> 190. & <i>Folium</i> 133		<i>Optimi</i> nota. 195
<i>Malorum</i> varia genera 140. facultas & vsus		Ori-

I N D E X.

<p><i>Oroscelinum</i> 64 <i>Oroscelinus</i> Diosc. 88 <i>Oxyris</i> fol. 214 <i>Oxum Indica</i> 212 <i>Oxorum temperamentum</i>, 174 <i>Oxyacantha fructus duplici nucleo</i> 126 <i>Oxyacantha 170 arborem esse non fruticem.</i> ibid.</p> <p style="text-align: center;">P</p> <p><i>Palurus 24 non est Agri folium</i> ibid. <i>Pliny & Theophr. non est idem cum Diosc.</i> ibid. <i>Palma:</i> 184 <i>Palma Elate.</i> 197 <i>Palma muolucrum 25. Elate quid. eius historia</i> ibid. <i>Panax 63. Mesuis in Panace error</i> ibid. <i>Panicum pratense.</i> 124 <i>Panus recocti parandi ratio</i> 234 <i>Papaver Corniculare flore rubro</i> 182 <i>Pastilli violacei quomodo parandi</i> 205 <i>Patala siue Patalena</i> 75 <i>Paulus notatur à Matth.</i> 96 <i>Pelacium.</i> 183 <i>Pentaphyllum.</i> 182 <i>Pepo quid 15. peponum facult.</i> 16 <i>Periploca</i> 182. & 196 <i>Persea arbor 25. differt à Persico 26. & 173.</i> <i>Persici flores assumpti nocent</i> 21 <i>Petasitis 121. radicis puluerem contra pestem facere. ibid. eius examinatio</i> 122 <i>Esse personatam Pliny</i> ibid. <i>Petroselinum 33. & 188. Macedonicum 183. Quid pro Macedonici semine in theriae compositione sit sumendum.</i> 188 <i>Peucedanum</i> 67 <i>Pharmacum ad capiendos pisces.</i> 136 <i>Phaseolus ab omni Eruiia & piseo differt 28. eorum comestorum incommoda</i> 26 <i>Philonium Persicum 205. an piper album an papaver album huic sit addendum</i> 214 <i>Phlebotomia quid 229. eam non esse admistrandam in corporibus que longas aegritudines sunt perpessa</i> ibid. <i>Pbu Ponticum 192. Quod sit optim.</i> ibid. <i>Phyllam</i> 35 <i>Picea & pinus 117 eiusdem generis, sed specie tantum differre 124 horum folia qualia sint.</i> 125 <i>Piceam abietis folio esse, non pini</i> ibi. <i>Pinus Tarentina</i> ibid. <i>Pinorum syluas esse in Bohemia frequentissimas</i> 147 <i>Pila parue vsus.</i> 237 <i>Pimpinella maior 197. vnde dicta</i> 34 <i>Pinguedo à frigiditate fit</i> 72 <i>Pinus 14. montana non est picea</i> 118 <i>Piper nigrum 189 rotundum non esse Cubebam 134. longum 186. longum domesticum & sylvestre reperiri. ibi. Aethiopici descriptio</i> 114 <i>Pisum sylvestre</i> 213 <i>Pissasphaltus</i> 85 <i>Pistacium</i> 197 <i>Pix liquida nunquam sua sponte fluit</i> 80 <i>Planta varie pro varia regionibus vocatur 38. quando crispentur & dilatentur</i> 77</p>	<p><i>Plantas secundum substantiam conferri inauditum est 167. nullius planta sapores vt nec facultates ex facie illius immutari. 174. Nullam esse que propria careat facultate</i> 186 <i>Planta ex Hispania allata. 210. Eius historia ibi. vires.</i> ibid. <i>Plantarum speciem non genus color immutare potest</i> 63 <i>Platanus plures species. 125. Orientalis ibi.</i> <i>Platonis diuina ppe ac celestis doctrina. 151</i> <i>Platonicos paucis demptis fieri Christianos</i> ibid. <i>Plinius sibiipso contradicit 146. non satis sibi constat. 10. saepe vitio ex Theophr. Laricem vertit 147. eius locus restitutus ibid. eius in Agarico erratum 147. autoritas defenditur 157. notatur</i> 146 <i>Podagra causam fortem esse coitum</i> 228 <i>Polemonia</i> 35 <i>Poligoni genus quod centum grana officinae vocant.</i> 182 <i>Polium.</i> 189 <i>Polygala 39. à Matth. commentariis suis cur non ascripta</i> 111 <i>Pompholyx legitima vbi crescat</i> 52 <i>Populi tria genera</i> 125 <i>Portulaca arbor</i> 183 <i>Potamogeton</i> 38 <i>Poterium à pruno sylu diuersum 32. & 213</i> <i>Potus Matthi. ad gallicam luem recentem</i> 233. <i>Precipitatum quid</i> 231 <i>Pseudoacori radix non est acris</i> 56 <i>Pseudomedici sunt, qui vno medicamento omnes morbos curare volunt</i> 96 <i>Ptisana vnde fiat 52. cruda que sit ibid. hordeacea & triticea apud Gracos reperitur 53. sitim magis extinguit quam aqua 70. eius facultates. ibid. magis humestat quam aq.</i> 70 <i>Pyrethrum Ghini.</i> 126 <i>Pyrethrum Luca Ghini 114. 118 Matthi. ibi.</i> <i>Pythagoras omnium Philosophorum parens. 150. eius mors.</i> ibid.</p> <p style="text-align: center;">Q</p> <p><i>Qualitates medicamentorum fere solo gustu cognoscuntur</i> 70 <i>Quartanarius Syrupus conueniens 120. Elloborismus</i> 120 <i>Quinquefolium</i> 188</p> <p style="text-align: center;">R</p> <p><i>Rhabarbarum 31. & 197. Auicenna est Grecorum Rhaponticum 31. à Rhapontico differt 62. eius nomenclatio 71. eius vires 31. potum conuenit Dysentericis 31. eius imago. 181. vim eius diecloriam maceratione, non collione excipiendam esse. 205. eius in febribus diuturnis vsus in Syrupis. 129. Eius loco Ponticum substitui posse</i> 188 <i>Rhacoma quid</i> 71 <i>Rana 22. q̄ sint venenosa 27 duplices sunt ibi.</i> <i>Rhaponticum ex India etiam & Barbaria affertur</i> 75 <i>Rhasenicum</i> 71 <i>Rhasenicum à Barbarico differt.</i> 75 <i>Origanum Persicum 200. Nostrate</i> ibid. <i>Rha Turcicum</i> 71</p>	<p><i>Rhauescheni</i> 72 <i>Reprehendere facilius esse quam docere</i> 156 <i>Resina colophonica dua species 78 pinea tria genera 79. liquida & arida inter se differunt 79. liquida quo tempore legantur ibid. optima</i> 56 <i>Resini fera arbores que & quot sint 79 non fundunt gummi aut resinam quando adolefcunt</i> 77 <i>Ribes 24 vulgaris non est eadem cum Mauritianorum</i> ibid. <i>Roccha de Turchine</i> 101 <i>Rhody oleastri historia</i> 12 <i>Rorismarini genera</i> 66 <i>Rosa 186 Damascena 24 vnde dicta</i> 25 <i>Rosa Persica apud Auicē. quid significet ibi.</i> <i>Ruborum & rosarum differentia</i> 60 <i>Rubricarum tria genera</i> 106 <i>Rubus caninus</i> 59 & 37 <i>Ruellium in Gallia tantum rei herbaria operam dedisse</i> 191 <i>Ruta Sylvestris 183 & 32 & 63 & 101 est Harmola</i> 104</p> <p style="text-align: center;">S</p> <p><i>Sabinam bacciferam reperiri</i> 134 <i>Saccharum athaser 106 quo pacto seipso multo dulcius efficiatur 178 eius preparatio. ibid. est duplex 75 græcis improprie mel appellatur 76 antiquorum ibi.</i> <i>Saccharo harundinum inebriari homines Strabo affirmat</i> 78 <i>Sadethur non est Glaucium</i> 102 & 105 <i>Sagapeni optimi nota.</i> 193 <i>Sagitta</i> fol. 213 <i>Sai ad aurum dissoluendum quo pacto parandus 178 communis vsus necessarius 177 ex osse humani capitis</i> 180 <i>Sakuntia 22 & 57 non est Pseudonardus 22 à Celtico Nardo differt</i> 134 & 202 <i>Salsa parilla est smilacis species</i> 112 <i>Saluam Gallos perferre</i> 197 <i>Sampsuchus & Amaracus idem</i> 13 & 33 <i>Sannicula dentata</i> 182 <i>Santalum rubrum</i> 52 <i>Santala nostri vsus legitima & Mauritianorum esse</i> 134 <i>Saporum in radicibus dissimilitudo vnde 86</i> <i>Saxifraga 117 non est betonica Pauli 118 legitima 125 ei quid supponendum 202 Dioscoridis esse Pauli Beticam</i> ib. <i>Scabrum</i> 166 <i>Scamoniū</i> 182 & 196 <i>Scandella est hordeum minus</i> 27 <i>Scandix 29 non descripta ab antiquis</i> ibi. <i>Seillam veram nos non habere</i> 194 <i>Schanianthum</i> 57 <i>Scolopendrium venescum</i> 196 <i>Scorpiciades Diosc. est Telephium 109 differt à Telepsio</i> 110 <i>Scorpio Marimus</i> 26 <i>Scordium</i> 186 <i>Scurzonera</i> 210. 211 <i>Secacul examinatio 199 esse radicem peregrinam 127 Indicam 199 Eius loco supponi pastinacam</i> 199 <i>Seitaragi examinatio</i> 199 <i>Semperuium minus 19. magnum</i> 192 <i>Sena 33 Zinziber admiscetur</i> 66 <i>Senecion duplex 122 Maior Germanis flos</i></p>
---	--	---

I N D E X.

<i>S. Jacobi</i>	123	<i>Symphytum petraum</i>	17	<i>Tryphera</i> quid	
<i>Serapij de celsico error</i>	39	T		<i>Tripalium</i>	121
<i>Serapio inter Arabes in simplicium historia enarranda prima tenet</i>	21	<i>Talietri tres species</i>	122	<i>Turdorum facultas</i>	111
<i>Serum, cum oxymelite paratum cur non corrumpatur</i> 204 <i>Serum communis vsus non esse improbandum</i> ibi. <i>Quomodo parari debeat in conficienda hamecti antidoto</i>	ibid.	<i>Telephium</i> 30 eius descriptio 20 vires & facultates ibi. <i>Nicandri Scholiasta qd?</i> 135		V	73
<i>Sesamoides minor</i>	182	<i>Telyphosum</i> dicitur <i>Scorpioides</i>	110	<i>Veneris abstinentiam</i> iuuenibus saepe plurimum nocere. fol. 218 post <i>Venerem</i> plurimos fieri magis letos 228. <i>Abstinentiam</i> illius qua sequantur incommoda 229 qua nimiam frequentiam	161
<i>Seseleos quatuor genera</i> 189 <i>Aethiopicum</i>	182	<i>Tempus rerum omnium pater</i>	149	<i>Veratrum nigrum</i> non esse consiliginem 134 & <i>polypodium</i> in <i>prissana Gale.</i> quotidie propinat	129
<i>Sferra cauallo</i>	183	<i>Terebinthina resina legitima</i>	189	<i>Verbena</i>	214
<i>Sideritis heraclea</i>	213	<i>Terra Armenia</i> 106 <i>Lemnia</i> 106 <i>Synopeia</i> vnde habent nomen 133 eius historia ibi. vsus ibid. <i>Lemniam</i> nihil aliud esse posse, quam bolum <i>Armeniam</i> nunc <i>seplasis dictam</i>	190	<i>Verbenaca supina</i>	174
<i>Sifer esse secaikul</i> 122 eius vsus	ibid.	<i>Teucrium</i>	34	<i>Vertiginis causa</i>	217
<i>Smilax hortensis</i> 29. 62. <i>asper</i> curat gallieum morbum 112 gland. <i>ferre</i>	197	<i>Thalictrum</i>	34	<i>Vesalgia</i> & incommoda q̄ est perpeffus	151
<i>Smurrium</i> 196 non esse <i>Hilinum</i>	203	<i>Theodorus</i> notatur pluribus erroribus	147	<i>Viburnum</i> quid	133
<i>Creticum</i> 182 <i>Semen</i> cur <i>Mace</i>	203	<i>Theriacam</i> a nobis ea felicitate parari non posse, qua parauerunt antiqui 185 a nobis quoq; parari posse 186 eius bases ibid. <i>Ratiu</i> miscendorum medicamentorum eam ingredientium 195 color niger vnde ei accidat	ibid.	<i>Victoria</i> non saltem insolentes efferre verum etiam sapientiores corrumpere fol. 222	254
<i>Socrates</i> qua mala sustinuerit	150	<i>Thlasi</i> 29 & 182 & 196 <i>Cappadocicum</i> ibi. esse inter alia optimum.	190	<i>Victus ratio gallicorum</i>	254
<i>Solanum hortense</i> 174 <i>Maius Mandragoram</i> <i>Theophrasti</i> non esse	134	<i>Thus</i> vnde ad nos proueniat 189 optimum nota	ibid.	<i>Vini optimi</i> nota 198 <i>Que</i> ad antidota conficienda apta sint ibi. <i>Creticu</i> esse omnium optimum	ibid.
<i>Somniferum</i> ibi. & fol. 198 eius nota	134	<i>Thutia</i>	106	<i>Violas marinas</i> <i>Dodonai</i> legitimum esse	196
<i>Solon</i> quas & quantas sustinuerit ignominias	151	<i>Timor</i> quid	228	<i>Viperarum</i> seminarum nota 193 <i>Quo</i> tempore capiendae ibi. <i>Earum</i> preparatio ibi. <i>viperi</i> pastilli	194
<i>Somni diurni incommoda</i>	228	<i>Tithymalus</i> omnibus pisces necandi vim facultatemue inesse	136	<i>Vlcerum gallicorum</i> curatio	236
<i>Sory</i>	39	<i>Toram</i> non esse <i>aconitum pardalianchen.</i>	214	<i>Vmblicus veneris</i>	38
<i>Spartum</i>	183	<i>Tormentilla</i>	188	<i>Vnguentum violaceum</i> seu <i>Iasmenum</i>	214
<i>Spatula foetida</i> non est <i>Xyris</i> sed <i>sparganium</i>	17	<i>Tragacantha</i> 65 eius vsus	ibid.	X	
<i>Spina alba</i>	214 & 182	<i>Tragium</i> in <i>Creta</i> tantum nasci	127	<i>Xylobalsamum</i> , quod in <i>myropolis</i> habetur, adulterinum esse	195
<i>Spinachium</i>	28	<i>Tragopogon</i> 29 non esse <i>Aphris</i> cistum	190	<i>Xyphium</i>	37
<i>Spodium</i> 52 est <i>pompholygos</i> pars grauior & impuri	52	<i>Tragum</i> non est iunci species 18 non est <i>Kalus</i> ibi genuini historia	ib.	Z	
<i>Stacten balsami</i> vice supponi	187	<i>Trasci</i> est <i>Hippocr. holoconitis</i>	85	<i>Zaccara</i> 205 Non esse <i>psyllium</i>	ibid.
<i>Stachas</i> 65 & 188 <i>Cretica</i>	ibid.	<i>Trasorum</i> examinatio 96 temperamentum ibi. vbi plurimum nascatur	ibi.	<i>Zea</i> res est <i>Romana</i>	53
<i>Styrax</i> quid 190 adulteratus	189	<i>Trichomanes</i> 162 eius folia aliter <i>Lochitidis</i> folia appellauit <i>Dioscorides</i> , & quid de causa	167	<i>Zedoaria</i> & <i>Zurumbeth</i> <i>Mauritanis</i> non est idem 29 & 92 <i>Indica</i> 102 est <i>Antora</i> 105 eam non esse legitimam costum 134 <i>vestram</i> non esse legitimam 201 praestare contra venena	202
<i>Soporifera</i> esse facultatis 212 <i>rubeus</i> <i>Germanis</i> qualis	ibid.	<i>Trifolium asphaltite</i> 163 & 183 eius tria genera 34 <i>asphaltites</i> siue <i>hyacinthinum</i>	44	<i>Zinziber</i> 188 Non esse <i>pipervis</i> radicem 173 eius facultas	66
<i>Stibium calcinatum</i>	179			<i>Zizabum</i>	219
<i>Struthium</i>	30				
<i>Suber</i>	125 & 183 & 214				
<i>Succinum</i> est bituminis species	112				
<i>Suffus</i> in <i>lue gallica</i> non admittendi, nisi in desperatis	230				
<i>Suilla</i> caro valenter nutrit	73				

F I N I S.